



*from the ...*  
*coll.*  
*391*  
*ampt*  
*Gov*













VNIVERSALIS  
Plantarum  
HISTORIAE  
Tomus I.



UNIVERSALIS

Plantarum

HISTORIAE

Tomus I.



IEHOVA DOMINE NOSTER QUAM MAGNI  
FICUM EST NOMEN TUUM IN UNIVERSTERRA.

THEOPHRASTUS.

DIOSCORIDES.

# HISTORIA PLANTARUM UNIVERSALIS.

Auctoribus

JOHANNE BAUHINO.

Archiatro.

JOH HENRICO CHERLERO

Doctore:

Basilienfibus.

Quam recensuit et auxit

DOMINICUS CHABRAEUS,

D. Genevensis

Juis vero publici fecit,

FR. LUD. AGRAFFENRIED.

Dñs in Gertzenlee de.

EBRODUNI.

MDCL.

Ad Apples

IO. HEN. CHERLERUS.

Relegimus.

Quam ampla sunt Opera tua, O IEHOVA! quam ea omnia sapienter  
fecisti! quam plena est terra possessione tua. Psalm. 104.



LEONARDUS DOMINICUS NOTER GRAMMATICUS  
LEONARDUS DOMINICUS NOTER GRAMMATICUS

HISTORIA  
PLANTARUM  
UNIVERSALIS

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR

JOHANNES BALTHASAR  
JOHANNES BALTHASAR



HISTORIA  
PLANTARVM  
VNIVERSALIS. NOVA,  
ET ABSOLVTISSIMA  
CVM CONSENSV ET DISSENSV  
CIRCA EAS.

*Auctoribus*

IOH. BAVHINO ILL. CELS. WIRT.  
ARCHIATRO

*ET*

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET  
MED. DOCT. BASILIENSISVS

*Quam recensuit & auxit*

DOMINICVS CHABREVS MED. DOCT.  
GENEVENSIS.

*Iuris vero publici fere.*

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.  
Dominus in Gertzensee &c.

*Continens*

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IP SO PROTO-  
typo maxima ex parte depictas: earumdem Sarum, Cultum, Mangonia: item Vires omnigenas: Preparationes, Extra-  
ctiones, ac Destillationes præcipuas: Exoticarum Orientis atque Occidentis, aliarumque ante nūtrum seculum  
incognitarum supra mille Historias novas. Synonyma: Æquiuoca: Succedanea præcipuarum  
linguarum appellationes.

*In primis vero*

PLACITA VETERVM GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM  
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM  
obscurarum & deprauatarum:

*In qua præterea*

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt Ac continentur  
pleraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETÆ, GRAM-  
matici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

OT ΔΟΚΕΙΝ ΑΑΑ' ΕΙΝΑΙ.

EBRODVNI.

clb l b cl.





# AUTHORES

AD LECTOREM.



Etis verbum est, amice & erudite Lector: VINO VENDIBILI NON OPVS ESSE HEDERA SVSPENSA. At contrâ, illud & necessarium hodie dicimus, & nobis ita bene placitum: quippe, quod in Rempub. proficuum, & tibi volupe futurum, pro certo ac indubitato asserere non dubitamus. Nam quis tibi, aut alteri dicat, quid totis istis annis, imò tot annorum lustris, in tot prouinciarum, torridissimarum Mundi plagarum, montibus, præruptis, niualibus, nudis cauitibus, collium cespitibus, contragosis, saxosis, crepidinibus, cochlacibus, speluncis, opacis, apricis, syluosis, tegētibus, veteretis, vanaetis, aruis, glareosis, pratis, riguis, ritis, littoralibus, mari ipso, parietinis, ruderibus, hortensianis, hōrtis Adonis, etiamq; Regiis, subgrundis, rudectis, frutectis, neglectis, sed nobis perspectis, atq; in ipso etiam Musæolo nostro, per diu, pernōx, è tot voluminibus, tot codicibus, tam variè inter se contrariis, imò ex ipso adeo nostro cerebello vindemiauerimus? Quod, ut ne nescias, accede bonis auibus, ingredere, aspice, gusta, imò sapias, ut in hoc saltem sapias, & quid fons ipse, quid ipsa contineat cella, obiter tantum subolfacias. Cautum est nostro edicto, ne vina hæc iniqua sint vestris capitibus, sed placida, iucunda, proficua: vt tandem intelligatis, non esse, quod Adagio circumfertur:

*Aliud in scripto seu titulo*

*Aliud in pixide.*

VOS IN HANC REM

et POSTERI

TESTIMONIUM PERHIBETOTE.

ΠΟΤΕΡΟΝ Η ΠΟΤΕΡΟΣ.



GENEROSISS. NOBILISS. SPLENDI-  
didissimis, Excellentissimisque Viris

DN. FRANCISCO LV-  
DOVICO AB ERLACH  
LIBERO BARONI  
IN SPIETZ. &c.

DN. NICOLAO DACHSEL-  
HOFFERO, POTENTISSIMAE  
BERNATVM REIPVBLICAE  
CONSVLIBVS perpetuis.

De &

EIVSDEM REIPVBLICAE QVÆSTORIBVS;  
atque TRIBVNIS:

TOTIQVE SENATVI FOELICI, INCLYTO,  
*Dominis gratiosissimis.*



ABET, PROCÈRES ILLVSTRIS-  
simi, In quo sibi gratuletur Aetas  
nostra, eorum Compos quæ nobis-  
simis saluam mouerunt. Trige-  
minos enim quos per quinque Li-  
stra parturiuit foetus Vrbs vestra E-  
BRODVNVM enixa est. In procin-  
ctu est SAPIENS DIVITIARVM <sup>Seneca epist.</sup>

NATVRALIVM QVÆSITOR ACERRIMVS. Orbi <sup>19.</sup>  
nouum accedit lubar. Cimmeriæ secedunt tenebræ. De-  
cussâ papyrorum syluâ facilis in Memphyticam Abaton  
aditus. Mystis Apollineis omnis excutiendæ caliginis conce-  
ditur *Σχαιρία.*

Obscurè de plantis scripserat Theophrastus: barbarè Ara-  
bes:



Scalig. de  
Diosc. jhuat-  
cunim.

bes: oscitanter interdum Dioscorides: insulsè nonnunquam ex  
aliis Plinius: per transennam tantùm Galenus: Milhes lapsi  
erant Recentiores, etiam *δαφνοφόροι*: ac quotusquisque ab alio  
non dissidebat. Prodit natator Delius, conjector Oedipus, e-  
munctæ naris Censor, integer differentiarum Conciliator.  
Prælis submittitur nostris O P V S, cujus immensitas omnes  
huc vsque Typographos deterruit: vtilitas infinita vota exci-  
tauit: varietas & elegantia maris & terræ opes, *Ἐπερίδων μέλα*,  
exhibet. *Ἀνέρες ἢ Ἑλικῶν ἔργον*. O P V S, inquam,  
IOANNIS BAVHINI, in quo perficiendo conse-  
nuit Vir iudicij acris, exactæ memoriæ, studij indefessi. Qui,  
cùm Epimeidis Poëtæ attigerit annos, ejus tamen non dor-  
miuit somnum: sed, vt Aristoteli Scepticus, semper in quærendo  
aut confidendo fuit. O P V S certè eximium, vtile, jucu-  
dum. O P V S, quod non immeritò incomparabile dicatur,  
siue dictionem spectes, siue affabrè pictas & sculptas Icones  
innumeris. Sed *Ἐπιμενίδεον δέσμα*, quod diu admodum Tinea-  
rum & Platiarum esca fuerat, tandèmque omnino in illarum  
cesisset escam, si non à situ, à mucore, & ab Abderitarum for-  
te vindicasset.

Benedictio & MAIESTAS sit sacrosanctæ & inenar-  
rabilis Trinunitati, quæ in hac cadauerosa Mundi canicie &  
secutorum senectæ, inter fatales rerum mutationes, Helueticis  
Laribus tuta impertiri voluit Halcyonia, quibus ponerentur  
hæ Oua, hieducerentur Pulli. GLORIA sit Vobis,  
PROCERES ILLVSTRISSIMI, ob Potentif-  
simæ Reipublicæ ad cujus clauum sedetis, in ancipiti valdè sta-  
u ab omni injuria vindicias: & quòd eâ sitis erga Literas Lite-  
ratósque propensione, vt meritò jam in vestris Collibus Mu-  
sæ suum quærant Helicon, in vestris Lymphis Gratiæ suum  
Fontem Acidalium. HONOS maneat perpetuus Nobi-  
lissimis, Amplissimis, & Splendidissimis DN. MANVE-  
LIBVS, DIESBACHIIS, STEIGERIS, cæ-  
terisq; qui in hoc laudabili Instituto nobis glaciem fregère, a-  
peruere viam. Perennet LAVS magni illius Genij: contin-  
gat ejus scriptis eadem veneratio quæ olim Accij Tragicis: su-  
spi-

ſpiciant Medici BAVHINI NOMEN, plurimum illi debet Ars Apollinea. Nec illaudatus abeat Gener eus CHERLERVS, egregiam in hoc opere navavit operam: & (quod de Cælio Oratore Quintilianus) longiore vitâ dignus erat.

NOBIS verò ſi quid debetur honoris & laudis: Totum id Vobis, PROCERES ILLVSTRISSIMI, ſacrum eſſe volumus: Primum hunc HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM Tomum, in quo non diſcerptum Abſyrtum, ſed numeris omnibus abiolutam ΔΕΝΔΡΟΛΟΓΙΑΝ exhibemus, ſplendidifſimo NOMINI VESTRO ſubmiſſè inſcribentes. Quibus enim aliis? Apud Vos inchoatus eſt, de Veſtro crevit, in Veſtro naſcitur. Quibus aliis Ciuis veſter, cujus tota Proſapia Vobis obſtricta: cui tot Prouincias concedidiſtis in quem tanta beneficia contuliſtis? Quibus aliis Ciuis Geneueſis, Vrbis vobis fœderatæ, quem non ita pridem, nec leui gratiæ argumento, in re ardua ſuſtinere dignati eſtis: Qui veſtram in gerenda publica re admiratus Prudentiam & Fœlicitatem: Aulæ verò perſæctus, nec ampliùs Mauortios ferens fremitus, quum Colonus veſter fieri exoptaſſet, benignè admodum ac munificè, tum ab Ampliſſimis harum Ditionum Præfectis, tum à veſtris Ebrodunenſibus exceptus eſt.

Trita incedentibus via hîc veſtris eſſet locus laudibus: verùm illis recenſendis ſuperſedemus: Cui enim ad id ſuppetat dicendi flumen? Præterea inſignes quibus eminentis Dotes prædicat Orbis: permanebunt illæ in animis hominum, in æternitate temporum, in fama rerum. Commendatione eget ΔΕΝΔΡΟΛΟΓΙΑ, noſtra, non vos, PROCERES ILLVSTRISSIMI: Ac ſic, ne quid παράργων, ad rem redimus.

Admittite igitur Sacrariis veſtris AETERNVM SVAE GRATITVDINIS & OBSERVANTIAE MONVMENTVM appendere volentes. Suſcipite tenellum Fœtum cui tamdiu in ovo fauiſtis. Fouete illũ in vîculis partus. Sereno vultu facite animum ad reliqua. Veſtris Auſpiciis manumittatur in publicos uſus.

Veſtræ



Vestre Autoritatis munimine comitatus micantiùs sese omnibus offerat. Timeant malè feriatì homines arroderè tanto præsidio redimitum. Cæterùm in secula floreat Inclyta BÉR-NA cum toto suo imperio: Vósque, PROCERES ILLVSTRISSIMI, quàm diutissimè CONSV-LES, QVAESTORES, TRIBVNOS, PATRIAE PATRES, RECTORES FOELICISSIMOS habeat. Nobis verò cultu & obsequiis nostris apud vos gratiam detur promereri.

Hæc sunt XAPHΣTHPIA, hæc Vota

Vobis

PROCERES ILLVSTRISSIMI

Deuotissimorum

FRANCISCI LYDOVICI à GRAFFENRIED  
*gratiosa concessione vestra Ebrodunensis ditionis pro tempore Praefecti.*

ET

DOMINICI CHABRÆI. M. D.  
*Illustriss. Celsit. Virtemb. à Consiliis Medicis,  
Vrbisq. Ebrodunensis Medici ordinarij.*

Dabant Ebrodun. Idib. Septemb. anno à partu Virginis M. DC. L.

## EPIGRAMMA

*In Botanicum Baubinianum Fausti ominis ergò scriptum.*

Ad Lectorem.

QVas spectas Plantas in mole VOLVMINIS hujus  
Non illas Solis prolicuit ardor humo,  
Conspita non illas tellus, non cœcula trudent.  
Ponti, non valles, non iuga celsa ferunt:  
Non illas peperit felix quondam hortus Edenis  
Illas Hesperidum non aluère sata:  
Sculptorū ne te frustretur Dexteræ solers,  
Non vivunt quas tu viuere fortè putas.  
Non te decipiat Scriptoris pagina docta,  
Natura certans cognitione sua.  
Hæ non sunt plantæ, Plantarum at Dædala signa  
Quæq. illas oculis restituisse valent.  
Quas spectas cunctas in mole VOLVMINIS huius,  
Sive illas Solis prolicuit ardor humo.  
Educat aut tellus sata, vel marii mare condunt,  
Aut valles humiles, aut juga celsa ferunt.  
Quasque aluère olim pulchræ viridaria EDENIS,  
Et quas HESPERIDVM læta tuiuère sata,  
Hic cunctas spectas, & ni pigmenti a desissent,  
Ari te consilij redderes ambiguum.

Scriptit GEORG. MÜLLER Phil. Prof. Lausann.



NOBILISSIMO ET MAGNIFICO

Vno

DN. FR. LVD. A GRAFFEN-  
RIED DOMINO AGER-  
ZENSEE.

EBRODYNENSI PRO TEMPORE PRÆFECTO  
AMPLISSIMO.

VT ET

CLARISSIMO ET DOCTISSIMO VIRO.

DN. DOMINICO CHABRÆO MEDI-  
CINÆ DOCTORI PERITISSIMO

Incomparabilis magni IOHANNIS BAVHINI Phytopinacis  
Restauratoribus.



Roderat in fatiis fore ab omni parte beatum.  
Nil quod flammifero Phœbus ab axe videt.  
Perpetuo humanis ingentibus obstitit ausis,  
Vltima mors rerum linea, ducta Deo.  
Deserit inceptum Pictori imitabile nulli,  
Docta celebrati Dexteræ APPELLIS opus.

Nobilis ÆNEIS, fatura incipit MARONIS,  
Perpetuus tenebris nunc premeretur adhuc.  
Tanta nisi exuri vetuisset carmina flammis  
ÆGÆSTVS vindex Nominis ipse sui.  
Tucca, Faris,que, manu, partum iunere redemptum.  
Prodiit hinc tanti Nobile vatis opus.

Sic quoque, Teuthonica, Baubinus gloria terra;  
Cui sua nascenti mûnera Apollo dedit:  
Nosse potestates herbarum, usumque medendi;  
Lethoque instanti nec flere posse moras.  
Infandum suscepit opus, mirabile doctû,  
Natura cunctas quod quoque promittit opes.  
Invida prepropera abruptum sed fila senectæ,  
Hoc etiam inceptum nobile abruptum opus.  
Munificus tandem dum Grassinereus Heros,  
Præsidium Aonii dulce decusque chori:  
Hoc lacerum miseratus opus, restaurat Apollo:  
Plantarumque Sacra consulit historia:  
Adfuit obstetrix pereuntis provida partus,  
CHABRÆVS, Medica luxque decusque Scholæ.  
Virgilius quantum Augusto debetque Poëtis,  
Per quos Aeneis restituenda foret.  
Tantum etiam Herotiâneo, medicoque celebri,  
Debet Baubini nobile mentis opus.  
His Ducibus depromit opes natura latentes,  
Authorisque ingens inde resurgit bonus.  
Cedite Romani Scriptores, cedite Graii.  
Nescio quid maius nascitur Hippocrate.  
Omnifera hic thesaurus habet miracula terra  
Et quicquid sensus pascere posse datur:  
Arboreos quotquot præbent virridaria factus;  
Frugiferos frutices, umbriferumq, nemus:

Dona laborande Cereris, quot spicula Campus  
 Reddit aratori, messe vigente suo:  
 Quot quot irriguis nascuntur gramina pratis,  
 Gramina lanigero pabula grata gregi.  
 Quot quot & aprici pinguntur floribus horti:  
 Quot quot in umbrosa lilia valle nitent:  
 Quot palus uda herbas, sinuosa vel aquar a ponti,  
 Thestata vel Tempe, vel iuga cessa foment.  
 Pandit opes Medicina suas, arcana recludit,  
 Pharmaca lethiferis oppositura mala.  
 Hic docet arte sacra, manes reuocare sepultos,  
 Curtaq; Parcarum flamina protrahere.  
 Cede Dioscorides, & vos monumenta Galeni,  
 Magne creatricis tu quoq; Scriba Dee.  
 Gloria Teuthonica non infima Euchysius ora,  
 Cedat Lobelius. Cedat & ipse Pena.  
 Cui Dodona dedit memorabile nomen, & omen.  
 Quem iactas tuum culta Sienae suum.  
 Celsus, atque Tragus, Rhodanusque, Arariusq; fluenda  
 Quem celebrant, primus qui fuit ante liber.  
 Cedite Scriptores Roman, cedite Graii:  
 Inter Scriptores hic Coryphaeus erit.  
 Cunctorum instar erit liber iste medentibus unus:  
 Bibliotheca ingens, hic liber unus erit.  
 Inclute quae Graefenreri, pro munere tanto  
 Perfoluet grates iam tibi posteritas?  
 Dum nemus umbratum, & viridaria culta virebunt,  
 Dum variis pictus floribus hortus erit:  
 Semper honos, nomenque tuum, laudesque manebunt,  
 Nobilis Arctori lucida stella Poli.  
 Quo pede capisti, vestigia astra sequere;  
 Mecenas Musis perge favere sacris.  
 Floruit imperio Respublica patria auro:  
 Parnassusque tuo floreant auspicio.  
 Sic Panacea procul depellat corpore morbos:  
 Sic charum hoc nobis seruet Hygeia caput:  
 Sic tibi Bermen si patria duce & auspicio detur,  
 Semper honorata sceptrum tenere manu.  
 Tu quoque qui magnus medicus Chabrae fuisti,  
 Cui liber hic quondam restituendus erat.  
 Laudibus aeterna seris celebrare seclis,  
 Et tua posteritas nomina grata canet:  
 Sedula deuincit cunctos tua cura medentes:  
 Hinc tibi non reddi gratia digna potest  
 Expectate diu liber hic, ad luminis auras.  
 Prodi auius faustis, auspiciisque sacris.  
 Viuite felices longaeuas Nestoris annos.  
 Hoc quibus eximium viuere coepit opus.  
 Quae quoque Nomen habet deductum ab origine Graeca,  
 Omenque a pura simplicitate suum,  
 Venturo memoricanet immortalia seclis,  
 Versibus aeterno nomina veitra suis.

IOHANNES PETRVS DAPPLES.  
 Med. Pract.





# HISTORIAE GENERALIS

## STIRPIVM SIVE

## PLANTARVM

### LIBER PRIMVS

#### QVI CONTINET POMIFERAS, ET

#### EAS, QVÆ MHAEA GRÆCIS DICTA

prof. runt: Item Pyra, & quæcunque ad hæc aliquo modo  
pollunt referri, tam indigena,  
quàm exotica.



**OTIVS** Nature Botanica (quantum quidem hactenus innotuit) bisforæ pro virili traditur, arborum honores primum celebrasse conveniat. Exordium itaque fiat à Pomiferis arborum vulgatissimis. Quid si & dignioribus ceteris, utilissimis, acque aded humani generi primo cognitissimæ quippe quarum fructus (cuiuscunque tandem generis Pomi fuerit) primum illis d' primi humanis desiderium, quamvis à summo Opifice vetustum, commoverit, quæ fundi nostri est calamitas. Quamobrem sequi par est ordinem naturæ, ac ipsius aded vitæ, ac DEI OPT. MAX. honoribus primordia ingerere. Sed & ordo d. Græna, qui vel maxime nobis, quantum per varietatem lucebit, in hoc opere spectandus, consentire videtur, nempe ut à vulgatissimis, ac nobis prius cognitissimis incipiamus. Sic studiis quoque, quibus potissimum noster hic labor dictus, haud parum consultum videbitur. Quid enim vulgatus Pomi in genere dicitur in toto hocce tractu Europæ? Ac ipsa quidem copiosius, etque, eam statim vel cuius cordato inserat difficultatem, ut existimet, vix omnia è quoquam trahi posse. Sed nescimus est, & ab aliis tradita in ordinem cogere, & ex propriarum observationum cognitione, quanto possimus maximo studio, opus nostrum ditare. Deus adsit rei capitis.

### DE MALIS

#### CAP. I.



Thymon.

Summa fructu.

Descriptio  
Mali, An-  
t. et Græc.  
Cortex.

Materia.

**ERGO** agmen primum ducant Mali seu Pomi, quarum haud temerè aliud genus suppetet varietatem. Et sanè blanditur suo operi humana quoque industria, maioremque viridatorum fructiferis arboribus honorem tribuit, inter quas sine dubio eminet Pomus, restricta laxiore vocabuli significatione, quam eandem Malum vocant, ex Græco fonte deducto nomine; quoniam enim & uocabatur Græci, quam nos Malum: Cuius summa fastigia duo; sylvestre & domesticum. Illud neglectum suæ spontis est: hoc culturæ experitur, ut notius ita vilius, compluriumque specierum. Sic ut vnicuique ferè provinciarum suarum sint, quas alia vix agnoscat, differentiarum; quibus ferè commune, ut ramis magis patula plerumque sit, quàm alta arbor, cortice scabro, sæpe muscoso oblecta, foris cinereo, intus flauo, ac laui potius quàm aspero, materie alba vel candidate, medio-

riter dura, & variis utensilibus præsertim domesticis parandis, atque ad torni artificium haud incommoda, radice non valde multa, nec admodum profunda, sed in summo ferè terræ obhærente. Folia ex rotundo folia oblonga, vel obtusa, vel acuminata, infemè villosa magis, quàm supernè, præsertim noua, in ambitu crenata. Flores simul multi, ex brevibus tomentosis pediculis, suauolentes, candidi vel purpurascetes, ex quinque foliolis congesti, apicibus in medio sufflavis. Ipsa verò Mala aded variant formam, magnitudine, colore, sapore, ut dinumerare haud sit facile. In genere tamen Malum fructus fructus est, magnitudine & figura varius; quippe, aliud rotundum, aliud turbinatum, aliud fissile, quædam etiam angulosa. Sunt etiam quæ ad pugni gemini magnitudinem accedant, sunt & parua, & mediocria, tunicâ omnia contexta vel pallida, vel flauescens, interdum & rubra, aut ex toto, aut ex parte, rariùs subcinerea, aut ad glaucum vergente, cui cato seu pulpa subest mitis, odorata in maturis, in imaturis & sylvestribus durior: sapore vel dulci, vel subacido atque saponoso, vel acidodulci: in sylvestri austera atque acerba. Pediculo suo quodque hæret, eo ipso longitudine & crassitudine diverso, è parte inferna atque, ut plurimum cavata, rariùs prominentem, emerso: in cuius opposito, parte nimirum superna est id quod vulgo qui-

Mali fructus, descriptio generalis

Pediculus,

Thymon

ditullio seu Volua Scribonio dicta Græcis *μῆλον* & *ῥοσιν* femina latitant oblonga, altera parte obtusa, altera acuta qua peciolum spectant intus latentia, nigra quod maturitatis signum est, alioqui candida, membranaceis quibusdam atque duris pelliculis seu parietibus intergerinis secluduntur, ita ut singula, in singulis latent cellulis, interdum etiam gemina, quorum medulla candida, sapore subdulci. Hæc ferè sunt quæ omnibus malis sunt communia, & in figura apposita, quantum fieri potuit, in tantula tabella satis feliciter expressa.

Theophrastus magni nominis philosophus, & priscorum Botanicorum sene æmulo Clarissimus & antiquissimus scriptor, varia diuersis locis de Malo prodidit, quæ compendio huc censuimus referenda, quod ad historiam & naturam eius declarandam plurimum faciant. In genere igitur domesticam agnoscit atque agrestem, & aliam præcoccem, aliam ferotinam, causamque refert ad coctionis facilitatem, vel difficultatem. Sed de differentiis postea specialius agemus. Nunc ea videmus, quæ naturam earum maximè respiciunt. Omnia (inquit ille) quæ montibus & planis communia sunt, spectu maiora pulchrioraque in planis nascuntur, sed si usum spectes, vel materie, vel fructus, in montibus meliora, exceptis Malis Pyrisque; Hæc quippe in planis & fructu & materie præstantiores spectantur at in montibus breues, tortuosæ & spinosæ. Et quæ seu fructus suis nata proueniunt, ea omnia quodammodo deteriora redduntur, quædam etiam prius degenerant, ut Malus suo nata fructu vel deterior exit genere vel ex dulci fit acida. Arborum facillima & innocentiissima est Malus, neque enim numerosam agit radicem, & alimento mediocri contenta est, cito senescit, ut diu infestare nequeat. Nam brevis est vitæ, præcipuè verna, citiusque senescit dulcis, quam acida. Senescunt quidem putrescuntque vel locis cæteris quibusdam arboribus, sed rursus germinant ex seipsis. Ex omnibus infimissima est Verna, & earum potissimum dulcis, quæ tamen præter debilitatem fertilissima est, quæ si aqua feruenti rigetur, fit melior, & si plagis debilitetur, ramorum præcissione sanatur. In genere Malus raro ex ramis emergit: Verna tamen oritur auulsiōne, sine radice aut stolone. Maxime peculiari Malis sunt nodi, quorum sunt quæ belluinam faciem referat, quæ ferè vnus insignis, quem alij minores circumquaque stipant. Possunt Mali ferè & plagas, & incisiones ipsasque aded fisiones, cum reliqua ferè omnia filo caudice percat. Mali dulces magis putredini obnoxii sunt, quam acida, & omnium maximè vernæ, succi, atque totius imbecillitate nature.

Verniculantur quoque maximè Mali, præsertim in locis calidioribus, quod radices earum breui arefcant. Fructum item antequam coquant, amittere possunt, & solent. Hæc ferè Theophrastus de Malo arbore, diuersis, uti dictum, locis, quorum quædam obseruationem & experientiam curiosiorem flagitant, quemadmodum est istud, quod alicubi quærit, cur Mali non congelascant, quam tamen alibi raro corpore esse scribit, quæ dispositio quædam esse videtur ad meliorem frigoris receptionem. Et sanè apud nos Montbelgardi & in toto ferè hoc tractu Mali curtispundulæ dictæ, haud raro patiuntur gelu, eoque necantur. Illud mirum, quod Theophrastus ait: Mala agrestia sui generis vrbis esse Odoratiora, & Malorum, tam syluestrium quam vrbanoz, quæ acerbissima sint, suauissimè olerè: denique eadem plus reddere odoris, si cocta omnino non sint. Causam verò qui scire desiderat, legat c. 24. l. 6. de caus. Plaut. Item: Malu trahit & suscipit humorum odores, quod et si carnosum sit & putredini obnoxium, ipsa tamen semina diutissimè durant. Atque videtur iis pulpa maior obecta in eum finem, ut diutius perdurent, quasi ad eorum tutelam à natura effecta, cui interim hic præfixus sit terminus, ut in hominis cedat vsum. Solebant veteres Mala etiamnum

arbori annexa grandiora efficere hac arte. Ea itaque ramo suo annexa atque olle inclusa sequaci flexu deducbant, atque terra obruebant. Ita optima ratione fiebant maiora. Nam quantum humoris à sole accipere debatur, tantum utique, olla coercedo seruabat: ipso interim fructu è terra quoque alienante succo, quo abundè aleretur. Sed hæc tunc de Mali natura in genere.

Nunc nomina persequamur & differentias. Malus Latinis, à malicia dicta, ut vult D. Hieron. sed Grammaticis à Græco tracta vox, alii Pomus, sed restrictione significatione, ut iam antè dictum. Tamen Plinius in quintodecimo genere neutro ipsam quoque arborem appellauit, ubi Poma putanda esse docet, sicut & Vites Græcis *μῆλον*, ut Hippocrati, Theophrasto, Dioscoridi, & reliquis. Constantinus tamen in Geoponicis *μῆλον* quoque dixit ipsam arborem, quæ vox apud Gal. *ῥοσιν* dicitur, ubi dicitur de Malo Cotonea. Hebræis Tappuah, quod & arborem & fructum significat, auctore Trago. Germ. *Apffelbaum* vel *Apfelbaum*. Belg. *Appelboom*. Gallicè *Pommier*. Ital. *Pomo*, *Pomero*, *Melo Pomaro*. Hisp. *Mancana*, Angl. *Appel-tree*.

Ipsè verò fructus Malum Latinis, & Pomum angusta significatione. Alioqui Pomum sub se complectitur, quicquid apud Græcos *ῥοσιν* continet, ut annotant Hermol. atque Marcellus apud Diosc. Pomum M. Varo dictum autumat, quia potu siccitatis indigeat. Cui non assensit Scaliger, qui dictum potius putat, quia sitim etiam tollant eorum plura, simul vel sint cibo & potui. Quid si etiam Malum dictum, quasi *μῆλον* Antonomasice (inquunt Monachi apud Messem) Poma & Mala idem sunt, & referuntur ad illa, quæ vulgò Mela, seu Mela, quasi mellea vocantur.

Sed quid ad hæc Gotifridus, vir ille doctissimus: Nimirum Malum, inquit, vocabulum Latinis & Græcis ut commune est, ita apud neutros etymologia eius reposita, quæ quidem tolerabilis possit videri. Quid enim frigidius, quæ *μῆλον* non nisi *μῆλον* deducere &c. Mali nomen è sermone nostro (Cimbritico) ad Græcos & Latinos venit &c. Poma Mala dicta sunt, quia ex iis primum hominum conuiuium, siue Mat fuerit apparatus. Item alibi Malum si de prima origine interpretemur, omnem arboris fructum significat, qui hominum conuiuium est idoneus, qui vetus fuit huius vocabuli vsus, quod Eustachius non solum annotat. Et de nouo alibi: Malum apud Græcos & Latinos pro Pomo, à *μῆλον* &c. Græcis *μῆλον* & *ῥοσιν* *ῥοσιν*, ut testatur M. Varro de lingua Latina: & Melophori apud Persas dicebantur piceolores & satelites, quod thoraces, in quibus Malorum effigies expresse forent, ferrent. Ex quibus mille selecti, regis custodie destinarentur & Philomeli dicti, qui auidè Mala comederent: qualis memoratur princeps Gordianus iunior, qui cum esset in omni ciborum genere parcissimus, Pomorum tamen semper aliquid deuorauit, ut tradit Curtius. Constantinus etiam princeps, (referente Ammiano) quoad vixit, Pomorum aliquid semper degustauit. Tales igitur haud temerè quis dixerit Milophagos. Nec male hic referemus, quod apud Athenæum Dionysius primus Pomorum inuenter fuisse legitur, quem Latini Bacchum vocant. Homerus Malum *ῥοσιν* dicit, ob splendidi fructus atque formosi præstantiam & suauitatem.

Arab. *Tiffa*, *Tuffah*. Germ. *Apffel* & *Deffel* Belg. & Angl. *Apfel* Gall. *Pomme* vel *Pome*. It. *Pomo*, *Melo*, Hisp. *Castil*. *Mancana*, *Mansana*. Portug. *Macan*. Bohem. *gabita*. In differentiis multiplex & propemodum infinita varietas occurrit. Hippocrates in secundo de dicta duas agnouit: *μῆλον ῥοσιν* Mala dulcia: & *ῥοσιν* Acida. Theophrastus *ῥοσιν* & *ῥοσιν*, Agrestia & vrbana. Item à tempore Verna, ferotina à sapore, dulcia, acida, sed neutrum horum generum exadè describit. Dioscorides habet *ῥοσιν* alii *ῥοσιν* dicta. Item *ῥοσιν* & *ῥοσιν* Romanis *ῥοσιν* dicta: sed neutrius vel lemma quidem adiciit, ut quæ qualia ve intellexerit, posteritati constare posset.

Galenus

heoph.  
Maloru dif  
ferentia.

Mali in pla  
nis & mon  
tibus.

Mali sum  
ma, aut  
Mali radice  
& arbor.

Malus Ver  
na.

Malorum  
nodi facie  
belluina.

Malidulces.

Malorum  
vernacula  
rio.

Mali fructu  
amurum.

Quæstio.

Malorum a  
grestium &  
vrbanoz  
odor.

Quæ arte  
Mala sunt  
grandiora.

Nomina  
Maloru  
differe  
ntia.  
Pom. m.

Tappuah.  
Hebr.

Nomina  
fructus.

Pomum vnde

Mila.

Mala à Mæ  
voca Ger  
manica.

Melophori

Philomeli.

Milophagi.  
Pomorum  
inuentor.

Bacchus.  
Aglaocar  
pas.

Tiffa Arab.  
Differentia

Hisp.  
Dulcia.  
Acida.

Theophrastus  
diff.  
Agrestia.  
Vrbana.

Verna.  
Ferotina.

ῥοσιν  
ῥοσιν





Platania.  
Mordiana.

Struthia.  
Phaulia.  
Verna.

Purpurea.  
Laconica.  
Siduntia.  
Lanuginosa.

Martiana.  
an Currupendula?

Hermola.  
differentia.

Martiana.

Gangeriana.  
Martiana.  
Iulpania.

Canamela.  
Cestomela.

Aphratomela.  
Cistio diu.  
renit, quæ.  
Languola.  
Sericata.

Mitia.  
Pecocia.  
Scandiana.

Quiriana.  
Martiana.  
Agrana.  
Proflina.  
Tiburtiana.  
Picena.

Canamela.  
Paradiſiaca.

Mallapia.

Petefia.  
Roſea.

Pyromela.  
Malapya.

Rubelliana.  
Purpurea.

Cornica.  
Caſſiniana.

& Platania, succi bonitate commendata. 4. Mordiana dicta, quæ optima speciosissima nascuntur Apolloniz, quam Mordiam nominant: proportionem respondere obicitur. Glaucides inquit, omnium fructuum esse præstantissima Mala Cydonia, Struthia, & Phaulia. His addit Verna Mala: quæ ex Philotimi libro de Alimentis, Pyris ægrius coquantur: Excellentia quidem mala nascuntur in Sidunte agri Corinthij vico, vt auctor est Euphorion, siue Archytas, in Gruc, his verbis.

*Elegans vt Malum quod in argill. sis ripis.  
Siduntis parua purpureum alitur.*

Vernat Malos (Cydonia) Laconicas & Siduntias lanuginosas (Cydonia) appellat. Ego verò, inquit Athen. omnium maximè admiratus sum Mala Romæ venalia, nomine Martiana, (quidam esse volunt nostra Curtipendula) quæ aduchi ferunt de quodam pago, sito in Alpibus propè Aquileiâ. Illis bonitate non multum cedunt, quæ in Gangis vrbe Paphlagoniæ gignitur. Miror inquit Goropius, quid Natali de Comitibus venerit in mentem, vt Battiana in Atheno verteret pro Matianis, vel hæc sunt, vel horum loco edi possunt quæ nos Syter-fath, Hispani Camozar vocant, apud quosdam vitiosè legitur Martiana, quæ admodum & apud Macrobius. Idem Athen. l. j. Malorum Delphicorum meminit, sed ea minus probare videtur. Ex recentioribus HERMOLVS præter ea, quæ ex Plinio transcripsit, pauca de suis adiecit: speciatim Matianorum quoque meminit, ex vico Aquilensi sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondent Gangis Paphlagoniæ vrbe nascentia, nunc Hispania vernaculo vocabulo Matiana in commune esse Mala omnia. In nomine esse & Gestiana siue Sextiana, siue, vt Græci scribunt, *gestiana*: quoniam & Cestomela vocantur ab *Ætio*, quamquam ridiculè à Cesto, id est, loco dicta quidam interpretum existimant, cui similia sunt cortice. Hæc ipsa & Pezomela vulgo dicunt & aspera prædicat. Aultera è dulci sūt Aphratomela: Odorata hæc, & pulpâ habent asperâ & squallētē, vt Cydonia. C V R T I V S partim, ex aliis, partim ex sua obseruatione hæc habet: Columella lapidosa vocat, in quibus reperiuntur calculi. A colore Stricata, Rubra Macrobio, quæ & Rubelliana, cortice sanguinea, carne intus friabili, non ingrato sapore, & ex auctore subdali, nec citò fugientia. Melimela arbitrantur quidam Mitia à Virgilio in Bucolicis vocari. A Celeri prouentu Macrobio Præcocia. Columellæ & Macrobio Scandiana, Cato Scantiana vocat: hic etiâ Quiriana: ille verò addidit Conimela, & reliqua, de quibus supra. Itē *Amurida*, Martiana, Agrana, Proflina, Situtia. Polluci quædam *quiritia* dicta, alij Delphica vocant: Syrica etiâ Macrobio Tiburneriana, siue Tiburtia, vt ait Horatius, quæ Picenis cedunt, vt hic ait:

*Picenis cedunt Pomis Tyburria succo.  
Nam facie præstant*

A sapore dulci Canamela siue Canamila, magnitudine media, colore, cum maturuerunt, luteo, saporis iucundissimi atque odoris gratissimi. Paradiſiaca olim vocata nunc existimantur, quæ addito Mali nomine, Mallapia vocitantur. Præstantissima nunc quoque existimatur, vt de his vulgò decetetur, omne Malum præter Appiū Malū. Nescio nū sit illud genus, quod Plinius Petefia, Hetruria nunc Roſea vocat. Apud nos tamen & Roſea & Melappia distinguuntur. A Pyro quoque dicitur & à duplici genere Pyrorū & Malorū, Pyromela & Malapya. Rambura prægrandia, rotunda, callo fragili, tenera, minimè fugacia: apud Ambianenses in Gallia Belgica præcipua: alibi Rubelliana vocantur. An ea verò sint, quæ Columella Purpurea vocat, dubitatur. Cortice rubro, carne intus friabili, sapore non ingrato. A cornica similitudine Cornica vulgus Italicum vocat. Alia Cassiniana

gustū austeriore, oblonga, mediocri magnitudine, dura, vt castanea cartilagine, vnde nomen sumptum. Alia Franconia, rotunda, callo, & amplo, diuore callo, modica acerbitate grata, quæ in dulcem degenerat. A tēpore maturitatis Ioannina vocamus, quod circa D. Io. Bapt. natiuitatē eiusi sunt. Parua sunt, albertia, citò fugacia, nulla alia dote prædita, quā quod prima edantur. Dicta in honore sunt, ampliora, rotunda: Pollana etiam plurimum, albo callo, carne molli, ac grato sapore, Blandurella, pulchra, rotundior forma, colore albo, nitente cute. Sunt ab Augusto mense, alij Præpomum vocant, quod alia Pomerum genera præcellat, sapore suauis & odorati: Oblongum est, à pediculo in acumen tendens, Patriam nobilitauit quod Sufinum dicitur, à Sula oppido Italiæ: parum hoc, orbiculatum, à latere per lineas rubens, gratissimi gustus, Roſea nonnulli existimant, quæ antiquis Pyrotica dicebantur, Sufinis maioræ, colore rubro, sic appellata. Apud Allobroges Girodeta celebrantur: parua sunt in latitudine rotunda, & in rubrum rufa, multum ferotina. Monachi in Mesum celebrant dulcia, acetosa & Muza dicta. Sic illi vocant: adduntque Mesum per dulcia Mala intelligere Apia nūcupata, in quorum defectu substitui posse aiunt Maciana, seu Mala Derij, seu alia dulcia. Pro acetosis siue acerbis syluestria recipi posse. Muza verò Mala esse media inter dulcia & acra. Eluch. Tab. 2. Poma dulcia, *Epiphyſſi* ex Ieruſalē sunt optima, eorum temperatiora. Sequuntur Fotani & Malui. Tū Poma acida: *Epigymphyſſi*. Idē Tab. 3. Poma dulcia Paradiſiaca, Melonib. dulcibus similes habent vires. Qualia autem ista sunt omnia, & quæ, faciemur nos ignorare. An verso Heronis bona perquirant diligenter. Gallis vt scribit R V E L I V S Pomerum differentia propè innumere, quando cū vites hæc genera Malorum annotauit, posteritas miscella inſiſtione antiquitatem longè viciat. In Gallia principatum obtinent, quæ Capendua vulgò vocant, sui saporis, verum aded grati, vt & trans maria vaneant: gellatam plus quam alicui sit credibile, tolerant in tanta suauitate minimè fugacia, magnitudine media, colore, cum maturuerint luteo, suauis odore, sed angustio, quo tamen animum exhibent: cartilagine corporis dura, vt quæ possint in annum protolari. Sæpè & bina vidimus. Secundas partes sibi vendicant, quæ ab Ambianensi municipio Rambura vulgus nominat, prægrandia, rotunda, callo fragili, tenero, vt quæ ventorum flatu decumbat in partes delibant, mita & suauitate gustus & teneuicidina, ita vt in ore frustra liqueſcant, sed vt fugientia, diu seruari non possunt, neque ferè ad exitum Autumnii prorogantur. Proxima sunt, nec eis suauitate cedentia, quæ vulgò Passipoma nominantur, quod cum reliquis omnibus de primatu certarent, nisi tam fugacia noscerentur, inde vernaculum nomen ductum est, mediocri magnitudine, turbinatiore figura, carne suauis, prætenera, gustu per quàm iucundo, semine per maturitatem in vtero sonante. Sed vt mihi placent, ita citò fugiunt. Accedunt, quæ Paradiſiaca, quasi celitus missa nominantur, præparua, mellea dulcedine, præcoci celeritate, quasi verna, concretu pauco ea malacis prægnantia expectantur, omnium ferè Pomerum fugacissima. Alia dulcia, callo corporis duriore, rotunda, quæ Dulcia ob sui nimiam dulcedinem, à palato morosiore laborantium fastidiuntur, ea putauerim esse, quæ Melimela dicuntur, à melleo sapore eadem à celeritate miteſcendi, Muftea, vt inquit Varro, vocabantur. Muftea sanè veteres appellabant, id quod nos præcocia. Acida vulgus rostrum Malacia à saporis acrimonia nuncupat, oblongiora, dura carne, ex acerbio leniter acceſcente. Annum hæc sæpius durant, ægris ad inuitandam elanguēſcentem appetitum nonnunquā concessa.

Franconia.

Ioannina.

D. dia.  
Pollana.  
Blandurella.

Præpomum.

Sufinum.

Roſea.

Pyrotica.

Girodeta.

Monachori.  
in hac. uſ.  
seruatur.

Apia.

Maciana.

Mala Derij.

Poma Ieruſalē.

Epiphyſſi.

Acida.

Paradiſiaca.

Ruellio Pomerum diff.  
renit.

Capendua.

Rambura.

Passipoma.

Paradiſiaca.

Dulcia.

Melimela.

Muftea.

Acida.

Malacia.

Alia.



- Castinia.** Alia Castinia, austeriore gustu, dura, velut castanea, cartilagine, mediocri magnitudine, oblonga. Alia vulgo Francetina, rotundo habitu & amplo, duriore callo, grata acerbitate, quæ tandem in dulcedinem degenerat, ea diu seruari possunt, & annicula sæpe repetuntur. Sed
- Rubelliana.** & Rubelliana, sanguinea cortice, carne intus friabili, sapore non ingrato, & ex austero subdulci, nec citò fugientia. Melimela verò, quorum antea aliquoties meminimus, nullam in antiquis longiorem habent historiam. De Epiroticis autem, quæ Romani Orbiculata dixerunt, faciliè erit (inquit Marcellus) genus & formam coniectere, si perpendimus, quales Orbiculi sunt in Troclis. Nam si ad Palladij attendamus verba, qui ait: Mala rotunda, quæ Orbiculata dicuntur, sine cura toto anno se feruare possunt, faciliè nobis indicabunt hæc Mala esse, quæ Rosca appellant rura nostras, à Colore.
- Rosca.** Præ cæteris Botanici CORDYS diligenter tradidit differentias Malorum Germanicorum, quas hic lubet proponere cum suis descriptionibus.
- Cordo Potum differentia.** *Misp. Apfel treu* id est, Pulmentaria lata, satis magna sunt, latitudine altitudinem superant, nam quadrantem altitudine non attingunt, aut raro, cum latitudinis diametro tridentem nonnunquam excedant. Colorem habent rubentem & modicè purpurascensibus vibicibus mixtum, carne constant miti, griseoideæ & omnis succi experte: facili in ore, dissolubilique gustu, in dulci subacida, & suavi, odorem verò incundum spirant. Copiosus eorum est Illebij proveniens.
- Misp. Apfel treu** id est, *napotis St.* sic dicta sunt, quod figura protuberantes & ferè acuminatas puellarum mammillas imitentur, tam exquisita similitudine, ut etiam pythmen eorum, papillas aspectu referant: longitudo iis est sextantalis, à qua latitudinis nihil, aut parum differt, iuxta pythmen in obtusum, latum, & vmbilici figura cauum mucronem desinunt. Colorem habent flauum, carnem verò teneram, succosam, gustu suauem, subacidam, vinosamque odorem, reposita, gratum spirant, maturefcunt Autumni initio, & ad Hyemis principium vsque durant, vel paulò diutius. Illebian agro copiosè proveniunt.
- Misp. Apfel runde** id est, Pulmentaria rotunda, ut plurimum globosa, aut rotunda sunt; interdum tamen latitudine longitudinem superant, & e contra, longitudine latitudinem. magnitudine etiam inter se differunt, quantum ad indiuidua attinet; specie autem minimè. Ut plurimum autem quadrantem cum semuncia lata sunt, sed altitudine quadrantem vix attingunt, inveniuntur etiam multa maiora. Colorem habent vndique ferè rubentem; longis & in purpura roseis ceu vibicibus, distinctum. Carne constant miti in dulci modicè accescente, faciliè in gustantium ore liquecente, mediocriter succosa, gustu suavi, vinosaque. Odorem habent incundum. Maturefcunt Autumni principio, & ad Hyemis initium vsque durant, aut aliquantò diutius. Habentur V Vittembergæ.
- Misp. Apfel klein** id est, Pulmentaria minora, rotundis Pulmentariis forma & colore similia sunt, multò tamen minora, oblongioraque, carne etiam teneriore, succosiore, sapore suavi, vinoso & subacido. Odore incundo. Maturefcunt cum rotundis, similiterque durant. Proveniunt in agro V Vittembergensi.
- Misp. Apfel gelb** id est, Pulmentaria flaua, maximis rotundis Pulmentariis æqualia sunt. Colorem habent flauum, ab vna parte raris vibicibus colore sanguineis confectum. Carne constant suavi, dulci, vinosaque, velut rotunda Pulmentaria. Odorem bonum spirant. Autumni initio perficiuntur & in Hyemem vsque durant. Magnus eorum est Illebij proveniens.
- Epistinge stein** id est, dulcia minora, formâ & colore minoribus Pulmentariis similia sunt, sed multò minora; nam rarisimè Corectichiorum magnitudinem excedunt. Carnem habent teneram, succosam, gustu vehementer dulcem & gratam. Odorem spirant suauem. Maturefcunt hæc etiam Autumni initio, & in Hyemem vsque durant.
- Mann. Apfel** id est, Paterniana, lata & plana sunt, altitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine verò quadrantem nonnunquam excedunt. Colorem habent flauum, sanguineis vibicibus, Pulmentariorum instar, maculosum. Carne constant tenera, mediocriter succosa, gustu subacida, vinosâ & vehementer suavi. Odore pulmentaria æmulantur. Maturefcunt cum prædictis, durantque similiter. Proveniunt in V Vittembergensi agro.
- Epist. Apfel** id est, Orbiculata, Paternianis similia sunt figura, odore, & sapore, plerumque tamen paulò minora, pauloque magis in latitudinem compressa. Colorem habent pallidum, interdum flauum in croceo, paucisque vibicibus, iisque sanguineis pictum.
- Gelbarte huc** *Misp. Apfel* oblonga sunt, & in medio, aut inferius aliquantulum tumidiora, quorum pythmen profundiusculè insidet superius, veluti lacuna. Colore sunt in spadiceo rufa, aut fusca: ab altera interdum parte pallidiora, ac rubentibus vibicibus maculosa. Longitudinem habent multò plerumque maiorem quadrante, latitudinem verò quadrantem æqualem. Carne constant tenera, miti ac rara, fungosa, & tamen aliquantulum succosa. Gustu subacida, suavi & in ore faciliè dissolubili. Maturefcunt cum prædictis, atque post medium Hyemis vsque durant. Habentur in omnibus Germaniæ regionibus.
- Haraden. Apfel** *Pat. Apfel* vel Biscope, vel Episcopia, omnium dulcium Malorum nobilissima sunt. Figura eis est ut plurimum rotunda, colorem habent ab vna parte suauiter tenuissimis, contiguis, roseisque vibicibus rubentem, ab altera verò in candido pallidum, vix euidetibus, dilutisque vibicibus confectum, incertum, & descriptu difficilem, vnde etiam Cartechianorum nomen inueniunt. Odorem spirant gratum, ac incundum, longitudine quadrantem cedunt, latitudine verò eundem æquant. Carne constant tenerissima, succosa, niueaque. Gustu supra modum suavi, dulci atque miti. Maturefcunt Autumni initio, & in Hyemem vsque durant. Habentur in omnibus ferè Germaniæ nationibus.
- Harstinge wels** id est, Duracina alba, rotunda sunt atque modicè in latitudinem compressa, altitudine sextantem, latitudinis verò diametro sextantem & semunciam excedunt. Colorem habent vna parte, qua solem exceperunt in flauo rubentem, altera autem viridi candicantem: intus albescentibus maculis, per cutim transparentibus aspersa sunt. Carne constant tenera, & tamen solida, succosa, gustu acida, vinosâ & suavi. Odorem, reposita, aliquandiu spirant incundum. Maturefcunt Autumni initio, & in Hyemem totam durant. Habentur vbique ferè in Germania.
- Perstorffer** id est, Porstorfana, eandem habent, quam Duracina alba figuram & proportionem, paulò tamen minora sunt, colore quoque non multum ab eis differunt. Siquidem ab vna parte pallent, ab altera verò suauiore insipientes rabore delectant. Carne constant iam dictis duracinis simili, gustu vehementer suavi & generoso, veluti si quis Duracina Cartechianis commisceat. Odorem

spirant gratum. Coluntur in Misnia, vbi propter sapientis nobilitatem ceteris omnibus præferantur. Maturefcunt cum dactylis, & similiter ferè durant.

**Presiliana.** Presilich apud Jid est, Presiliana aspectu sunt pulcherrima, figura rotunda & globo similia, colore rosea, atque presilij materiz dilutam prouocantia, magnitudine quadrantem vt plurimum æquant, nonnunquam etiam excedunt. Carne constant tenera, subfolida, gustu dulci, simulque acescente & suauis. Maturefcunt Autumni initio, & vsque ad hyemale solstitium durant. Magnus eorum est Hildesheimij prouentus.

**Crocina.** Crocine vel Crocinete Jid est, Crocina, è nobilissimis haud quaque sunt postrema, figuram habent globosam propemodum, tam longitudine, quam latitudine sesquiuncialia, latitudo eorum longitudinem non raro excedit, paululum tamen, in summa Coreititij ferè æqualia & similia. Colore sunt inter viridem flauum crociæque dilutum medio, quem serenis & calidis æstatibus puniceæ croceæque maculæ tenuelque vibices distinguunt, eo insigni pluuiosis æstatibus distinctiuntur. Carne consistunt tenera, gustu dulci, aliquantulum subacida, suauis & aromatico quodam halitu gustantis palatum commendante: quin etiam suauiter & iucundè redolent. Maturitatem adipiscuntur Autumni principio, & vsque ad æquinoctium vernum durant, itequenter etiam longius. Habentur Hildesheimij, præsertim in hortis Monachorum in Salta extra urbem sito Cœnobio.

**Crocina rubra.** Crocine rubra Jid est, Crocina rubentia, Crocinis figuræ & magnitudine æqualia sunt, colore verò pulmentatis & dulcibus minoribus: nam similiter sanguineis vibicibus roseam superficiem distinctam habent. Carnis substantia, saporis qualitate, maturefcendi, durandique tempore Crocinis respondent. Proueniunt autem in Saxonia Hildesheimij ac Honoburg.

**Pulmonea.** Pulmonea mala quæ Romani Pulmonea olim nominabant, omnium dulcium maxima sunt, figura globosa, diametri quoque versus non raro trientalis, colore flaua, nonnunquam etiam in viridi pallido, præsertim vbi frigidiori humidiorque æstate enata fuerint. Carne constant rara, fungosa, instar pulmonis, unde etiam nomen sortita sunt: ea digitis confricata & auribus admota strepitum edunt. Saporem habent dulcem, non insuauem, nulla alia qualitate mixtum, maturitatem consequuntur æstatis exitu. Durare aliquandiu possunt, nunquam tamen aut raro hyemale solstitium attingunt. Proueniunt copiosè in Hassia.

**Pulmonea interio.** Pulmonea salici inserta, Pulmoncis iam dictis æqualia & similia sunt. Carne constant paulò ratiore, gustu dulci atque aliquantulum amarescente. æstatis exitu hæc quoque maturefcunt, & similiter modico tempore durant, coluntur à quibusdam in Hassia. Possunt horum ad exemplum etiam alia salici inseri, præsertim dulcia & alioquin rare substantiæ, atque facilia.

**Duracina ruffa.** Duracina ruffa Jid est, vitrea, pulmoncis similia equaliaque sunt, non tantum figura, verum etiam colore, præterquam quoddam superficiem, nonnunquam etiam carnem habent obscuri vitri modo pellucidam, quod horum Malorum proprium est, idem si alijs Malis contingat, vicium censendum est. Carne constant dulci, suauis, modicè vinosa. Maturefcunt æstatis exitu, diu autem durare minimè valent. Nascuntur Coburgi in Franconia.

**Duracina ruffa.** Duracina ruffa Jid est, Duracina ruffa, figuram habent orbiculatam, interimque globosam, magnitudinem verò neque omnino, neque vbiq; eandem, vt plurimum tamen altitudine sextantem, latitudine sextantem & semunciam attingunt: colore sunt roseo, san-

guineis longisque vibicibus vndique distincta. Carne constant admodum solida & densa, attamen valdè tenera, succosa in gustu, acetosa, cū peculiari suauitate. Odorem spirant non ingratum. Maturefcunt autem Autumni initio atque omnium diutissimè durant: nonnunquam enim vsque ad æstatis medium atque non raro diutius, prorogantur. Proueniunt ferè in omnibus totius Germaniæ pomariis.

**Oenoximela.** Oenoximela Jid est, Oenoximela, Orbiculatis figuræ & quantitate similia sunt, paulò tamen altiora, nec vsque ad eò in planum compressa. Colore ab vna parte in viridi pallidoque candicante, ab altera leuiter interdum rubefcente. Carne constant admodum solida duraque, interim tamen delicata & tenera, succosa gustu vinosaque suauitate, tenuis, austerum, sincerumque vinum æmulante. Maturitatem adipiscuntur Autumno incuntes, & vsque post æquinoctium vernum durant. Abundant in Hassia.

**Angulosa longa.** Angulosa longa Jid est, Angulosa longa, ab angulis nomen inueniunt, à pediculo enim vsque ad pythmæna vndique angulis crassioribus sulcantur, qui tamen iuxta vtrumque caput eminentiores sunt, in medio verò, hoc est, ventre, non tam evidentes. Longitudinem habent quadrantalem, latitudinem sextantalem, nonnunquam tamen in maiorem adulescent. Colorem autem flauum, sanguineis vibicibus, densè confertum. Caro cis tenera, succosa & mitis, gustu inter dulcem atque acetosum saporem media, & suauis valdè. Maturefcunt Autumni principio, ac vernum vsque ad æquinoctium durant. Proueniunt in Hassia ac Misnia.

**Angulosa rotunda.** Angulosa rotunda Jid est, Angulosa rotunda, angulorum eminentis, colore, carnis substantia, sapore, maturefcendi, durandique tempore, Angulosi longis similia sunt, in hoc tantum ab ijs differunt, quod vt plurimum globosam figuram habeant, magnitudine sunt quoque versus quadrantali, non raro tamen maiora, quamquam frequenter etiam minora inueniantur. Proueniunt in Misnia.

**Prasomela.** Prasomela Jid est, Prasomela, figuram habent oblongam, latitudinem sextantalem, longitudinem autem semunciam maiorem, colore sunt in viridi pallido. Carne constant tenera, gustu laui, dulci, simulque acetosa. Maturefcunt æstatis exitu, & totam Hyemem durant. Proueniunt copiosè in Hassia Marpurgensi agro, ac in vicina.

**Gothardina alba.** Gothardina alba Jid est, Gothardina alba, Gothardinis figura, carnis teneritudine, sapore, maturefcendi, durandique tempore similia. Magnitudinem verò inter Prasomela ac Gothardina mediam habent. Colorem autem in viridi candicantem. Frequens eorum est Marpurgi in Hassia prouentus.

**Augustina.** Augustina Jid est, Augustina, parua sunt atque propemodum globosa, sesquiunciam tam latitudine, quam longitudine raro excedunt. Colorem habent flauum, carnem teneram, gustu dulcissimam & valdè suauem. Odorem gratum & iucundum. Maturefcunt Augusto mense, unde nomen inueniunt, eadem fugacia sunt, minimeque durant. Nascuntur vbiq; ferè in Germania, sed in Hassia copiosissimè. Saxones ea Epithym vocant.

**Rosacea.** Rosacea Jid est, Rosacea, Presilianis magnitudine & colore similia existunt, carnem habent paulò dulciorem, figuram verò non vsque ad eò globosam. Maturefcunt æstatis exitu & ad Hyemem vsque durant. Proueniunt Coburgi in Francia.



- Sanguinea.** *Stup. affusid* est, Sanguinea, figura sunt globosa, quantitate sextante paulo maiore, colorem habent foris roseum. Carnem vero teneram veluti in sanguine maceratam, roborisque gratissimi: gustu dulcem, aliquantulum subacidam & suavissimam. Maturefcunt æstatis exitu. Magnus eorum est Coburgi in Francia proventus, quamvis & alibi non desint.
- Dulcia ma-** *Supposit. affusid* est dulcia magna, Pulmonis fi-  
**gura.** gura & quantitate æqualia sunt, paulo tamen mi-  
nora, rotundioraque. Colorem habent in viridi  
fluascentem, ex altera parte subrubentem. Car-  
nem mediocriter solidam, gustu dulcem, su-  
avemque. Odorem spirant gratum ac Matrübio si-  
millimum. Maturefcunt æstatis exitu: abundant  
in Hassia.
- Oximela** *Supposit. affusid* Oximela maiora, dulcibus magnis  
**maiora.** colore, magnitudine, figuraque similia sunt, in  
hoc tamen differunt à dulcibus, ferè omnia acetosa,  
quod candicantia exiguaque puncta per cutim trans-  
parent. Carne constant solida, tenera, gustu a-  
cetosa, vinosa suauque. Maturefcunt æstatis exitu, du-  
rantque in Hyemem. Proveniunt in Hassia.
- Parella.** *Pare affusid* id est, Parelia, Omnium maxima  
sunt, figura globosa, modicè compressa, colore  
in roseo alicubi fluascente, sanguineisque vibici-  
bus confperso. Carne constant tenera, sapore in-  
ter dulcem ac aculeentem medio, estque hic non  
mediocriter suavis. Odorem spirant iucundum,  
maturitatem conf. quantar Autumni initio, duran-  
te ad Autumni finem exitum. Collocat Illebij, vicinif-  
que tractibus.
- Oximela** *Supposit. affusid* Oximela maiora, Dulci-  
**maiora.** bus rufis æqualia similiaque sunt, paulo tamen  
oblongiora, colore in viridi candidoque fluascenti-  
bus, punctisque candicantibus per cutim translucenti-  
bus confpersa. Carne, sapore, maturefcendi, durandi-  
que tempore Oximela maibra imitantur, paulo ta-  
men acetosiora existunt. Proventus eorum est in Has-  
sia magnus.
- Mylcymela.** Idem Cordus apud Diosc. scribit Melimela siue  
Glycymela facile sibi per suafurum esse ea, quæ Ger-  
manis *Wass. Affusid* & *Wass. Affusid* vocantur, si alia acce-  
derent. Esse enim admodum dulcia & suavia, & pueris  
& delicatis mulieribus expeti. Idem alibi Epicotico-  
rum meminit, sed qualia sint, non addit.
- Epicotica.** **TRAGVS**, qui Argentinæ scripsit, Germaniæ qua-  
dam pomorum genera describit: Quæ (inquit) apud  
nos prima maturantur, S. Ioannis Poma vetuaculo  
idiomate, Lat. Præcocia Mala dicuntur. Quæ  
Augusto mæse, rubris vibicibus quasi notata & dulcia  
Glycymela. *Wass. Affusid* vocamus Græcè *præcocia*. Quæ Autumnio  
maturefcunt ac alia quidem incana, alia lutea, alia  
coloribus variegata apparent, omniaque dulcia,  
Aromatica. *Wass. Affusid* quasi Aromatica Mala, à iucundissimo  
Capendua. nimirum odore, tum sapore nominamus, Capendua  
aliis dicta. Poma verò ea, quæ magna sunt, alba & dul-  
cia, in quorum vtero semina per maturitatem sonant,  
Ruellio Passipoma appellantur. Sunt deinde magna  
quoque & similiter dulcia, rubro colore maculata,  
quæ Germani *Schragen. Affusid* aut *Herigone. Affusid* nuncu-  
pant. Alia dulcia, candida & turbinata & oblonga re-  
periuntur, orthomastica nuncupata. Germ. *Strometung*  
Orthomasti-  
ca. *Paradisiaca.* *Strometung* Sunt & Paradisiaca vocata, Germanica  
*Paradisiaca.* *Paradisi. Affusid*, Acidorum Pomorū infinitus est numerus  
quorum vulgarissima, Rot *Affusid* Wein *Affusid* *Affusid* /  
*Strometung* / *Strometung* / *Strometung* / *Strometung* /  
Videtur verò Tragus vulgi secutus opinionem, credi-  
disse Malum, de qua hoc capite agimus, eam fuisse ar-  
borem, quæ à summo Iehouah interdicta fuerat pri-  
mo parenti Adamo, ne ea vesceretur. Sæpe namque  
figura serpentem appingi curauit & caluatiam, his  
Hier. Brunf. vtiq; notis, deceptionem Diaboli insinuans, & mor-  
tem: de qua re iudicent eruditi. Hieron. Brunfch.
- Paratop. Affusid** Poma Paradisi vocat, in quibus morsus  
Eue & Adami apparet, Latine Mela: confusè & igno-  
rante Musam cum Pomis vulgaris confundens. Et in  
quo tandem Pomi genere morsum vidit. Nos alibi suo  
loco indicabimus, qualem eam exitum fuisse  
arborem. Lonicerus verò præter serpentem etià Adami  
& Eue effigiem appinxit, quasi hoc genere Pomi sui  
obliti officij, comederint. Cornarius apud Dioscor.  
Vernorum tantum meminit, & Germ. *Strometung. Affusid* di-  
cit. MATTHIOLVS de Malis Italicis pauca hæc  
habet. In Hetruria, ait, principatum obinent Mala,  
quæ Appie & Meleroft vulgè vocantur, quandoqui-  
dem hæc duo genera cum suauiter oleant gustuique  
arideant, cum natis & palato maximam ineunt  
gratiam, & que propter non longè eum aberrare pu-  
tauerim, qui dixerit, Appia esse Diosc. Melinella. Ro-  
sea verò quæ eidem Epirotica & Lat. Obicculata di-  
cuntur. Quæ verò ad rubent, vt crure petula vi-  
deantur, & acido gustu sunt prædita, non alia de causa  
ita rubescunt, (si rei agrariz auctoribus credimus)  
nisi quod ex Mali & Mori nigri infusione suam traxe-  
rint originem. Cestiana non sunt Aurantiæ Mala, vt  
Cornarius putat.
- Sed nec suæ patriz Malorum oblitus est GESNE-  
RVS diligens omnis naturæ perueffigator, & alter  
quidam Helueticus Plinius: Nam, inquit, Malorum  
quamplurima optimaque in hortis & prædiis nostris  
(Tigurinis & Helueticis) proveniunt: præcocia, me-  
dia, scotina. Horum aliqua deant tribus, quatuor aut  
pluribus mensibus, quædam vsque in sequentem an-  
num, donec alia maturefcunt, commodè reposita.  
Malorum genera quædam (non quælibet tamen) ra-  
mis & brachiis suis in latitu vindique aduoluc  
antiz studiosi solent, vt brachia vndique que in superfi-  
ciem ferè planam extensa, lecti cuiusdam speciem,  
pedamentis in orbem digestis sustentata, præ se ferant.  
Eiusmodi non paucæ apud nos priuatis, publicisque  
locis videntur, in quo arborum excolendarum studio  
Basilienses sanè & totius ferè tradus Alsatici incolæ  
triumphant.
- Idem Gesnerus Malos humiles duorum facit gene-  
rum: vnam, cuius fructus Poma Adami vocat, vtraque  
fuitex potius, quam arbor. Itè Malus nana, *Wass. Affusid*  
Matthie Curtio Lindauiz, Poma ferè Paradisiis  
vulgè dictis non dissimilia, albicantia: quæ sub finem  
Iulij maturefcunt. Atbulum non supra quatuor cu-  
bitos assurgit, fruticans à radice. Item: Curtio eidem  
Malus quædam ex Italia: cuius Poma magna & rugo-  
sa in precio sunt. Pampin vocant. Scalliger quoque me-  
minit Malorum Pumularum, quæ brevis admodum  
sunt vitæ, & quarum aliquæ annuis mortibus hortulos  
deformant. Item eorum, quæ Apioia Italis dici ait,  
dolcia illa quidem, tam iucundè fragrantia, vt vniuer-  
sas Indias sua superent suauitate. Lacuna apud Diosc.  
refert, inter Mali genera in Hispania præcellere Camu-  
cusa: & Amatus ex dulcibus & odoriferis Camusia  
& Regalia dicta celebrata atque odorifera & cordialia  
esse, vt si eorum cortices ignitis prunis iniiciantur, ex  
se odorem referant moschatum. Arabibus Poma musa  
esse medijs saporis. *Wass. Affusid* iisdem esse Galo-  
pomella, Melomella. Carelus Stephanus in opere suo  
Geoponico Germ. Paradisiaca, inter alia peculiaria ha-  
bet, aromatica, alba, dulcia, Franca boni odoris & sa-  
poris. Item, Gallis dicta d' Heroet, de Malangre, de  
Rabure, & Mala *Wass. Affusid* & *Wass. Affusid*  
Germanis dicta: Lo. VVittichius, Poma Porfordoriana,  
quæ ad febres Epidemicas cum Mania commendat.  
Dodonæus est *Wass. Affusid* quædam, siue humilis Malus, chamæme-  
lita modo adolefcens, quæ non propter infusio-  
nem, sed naturâ sua Poma ferè præcocia, mediocriter  
dulcia colore admodum dilutè flauo albicantia. Bra-  
banti vulgè Poma Paradisi, aut Poma D. Ioannis no-  
minant. Lob. & Pena, Mala quamplurima, cultu di-  
uerfa, in Anglia, Belgio & Northmania, esse tradunt

Northmani-  
ca intus &  
oris Coccine-  
a. Differentia.  
Gerardi.  
Carbonaria.  
Carbonaria  
onga.  
Regale.  
Reginale.  
Platomela.

Platarchia.

Gerardus  
notatur.

Taberna-  
montani  
differentia.

Tabern. no-  
tatur.

C. almy  
d. e. p. r.  
e. appo.

Rofea.

Sanguinea.

Orthomafi-  
ca.  
Calamagna.

Pulmonia.

Testa.

Orbiculata  
parua.

Dica.  
Verna.

Sylueftria.

Ann. Galli  
que. Italica.  
Pomi dol-  
ciani.  
Poma D.  
Petri.

Pomoroſſo.

Pomum Pa-  
radifi.

quæ feris intusque Coccineo succo & aspectu mi-  
cant. Ad Anglica quod attinet, Gerardus in suo Her-  
batio Anglico hæc recenset. 1. Malus Carbonaria,  
*The yeme water tree*, 2. Malus Carbonaria longo fructu,  
*The Daders bliff Apple tree*, 3. Malum regale, *The King of  
Apples*: (Tabern. icon. p. 1087. Noet Sommer Disting.) 4.  
Malum reginale *The Quining or Quene of Apples*, (Tab. ic.  
p. 1000.) Mala rubentia, (Streming), 5. Platomela, siue Pyra  
æstiva, *The Sommer Pearmaine* (Tab. ic. p. 2004. Platomela,  
Æstiva) 6. Platarchia siue Pyra hyemalis, *The winter  
Pearmaine* (Tab. ic. p. 2004. Platarchia) 7. Chamæma-  
lus Londini, *The twarffe Apple tree or Paradies Apple*. Hæc  
Gerardus, qui ex viginti Tabernamontani figuris qua-  
tuor tantum assumpsit, nec tamen ipsa describit. Mi-  
rum etiam cur ex duobus Pomis siue Malis faciat Py-  
ros, nulla eius rei appofita ratione! Item cur Chamæ-  
malum recenset inter Sylueftria Poma?

Tabernamontanus, qui postremus est eorum qui  
quidem Herbarium scripserint ex professo, ista propo-  
nit. 1. Mala præcocia, & *Jeans Appfel*. 2. Mala augustea,  
*Magtaten Appfel*. 3. Mala præcocia rubra, *Noet & Jeans  
Appfel*. 4. Mala Carbonaria, *Rot Appfel*. 5. Mala Carbonaria  
longa, *lang Rot Appfel*. 6. Mala æstiva, *Sommer Appfel*. 7. Ma-  
la Orbiculata, *Breitling*. 8. Glycomela, *Süß Appfel*. 9. Gly-  
comela 2. *Süß Rot Appfel*. 10. Ocnomela, *Werm Appfel*. 11.  
Oximela, *Säuerling*. 12. Hemotamela, *Süß Appfel*. 13. Plato-  
mela, *Breitling*. 14. Platarchia, 15. Platomela alia, *Breitling*.  
16. Melapia, *Koenigling*. 17. Mada Appfel. 18. Schaeffmouter. 19.  
*Mehring*. 20. Sommerling. 21. Mala rubentia, *Streming*. Et  
ante ista, *Symmetling* Duracina alba dicit, & Perficis ad-  
iungit, quàm benè, notant, quibus nomen *Symmetling*  
cognitum est. Et quid voluit inanitam suâ, quàm em-  
poris impensa tot figuras dare sine vllis descriptio-  
nibus?

CASALPINVS Medicus Romanus, in opere suo  
Botanico sua veteribus accommodare studet, sic: Me-  
lappia parua sunt, nucem vix excedentia, rotunda, ex-  
terius tantum pallida, odoratissima, sapore dulci. Viden-  
tur hæc Apiana esse apud Plinium, ab Appio de  
Claudia gerente nullo Cotonco, quibus odor est Coto-  
neorum, magnitudoque: sed cum obisset magnitudo,  
melius dicitur apud Dioscoridem Melimela à sapo-  
re melleo esse, quæ à multis dulcia Mala vocantur:  
Nullum enim in genere Malorum illis dulcius est.  
Rofea mediz magnitudinis sunt orbiculata colore  
rubenti, quæ parte solas perit: odor infusus: sa-  
pore dulci subacidus; tota Hyme feruantur incorru-  
pta, meliora sunt, cum rugas contraxerint. Dioscori-  
des Epicorica & orbiculata vocat stomacho vitia. Plini-  
us ex Epio primum allata putat ob nominis argu-  
mentum. Sanguinea rofeis similia, minus odorata, in-  
pidioraque. Plinius colorem sanguineum ex insitu  
Mori, tractum putat, in hoc genere quædam oblon-  
giora, figurâ Mammæ, acidi saporis, Plinius Orthoma-  
fica vocat. Calamagna, quasi pulchræ magnitudinis  
Mala, colore rubente: sapore magis aquoso, Plinius  
Pulmonia videtur appellasse, quæ stolidè tument.  
Quædam colore quali ferrugineo; solidiori carne; sa-  
pore dulci ex austero, vulgè Testa vocant, figura Scu-  
theorum. Quædam parua humili frutice, orbiculata,  
virentia adhuc, gustu non ingrata. Plinius inter vilissi-  
ma Dacia vocat, quæ prima aduentu decerpi properant.  
Dioscorides per verna hæc videtur intellexisse: omni-  
no damnata. Sylueftria similiter parua, quæ præ ac-  
cubitate ingustabilia, Dioscorides Vernis similia scri-  
bit. Auguit Gallus Lombardiz quædam Poma recen-  
sens, meliora apud Brixianis ait, esse dicta Poma dol-  
ciani, parua & media, eodem tempore cum Pyris mos-  
chatellinis matura. Proximè sequuntur D. Petri Mala,  
Pomi di S. Pietro nec nouit aliud genus maturum ante  
Autumnum. Malum quod dicitur Pomo rosso gros-  
so, gratum est, quia carne est tenera: optimum tam  
crudum, quàm coctum cum saccharo, sanis & ægris.  
Verum non diu durant. Probatur & Pomum paradisi

fatis diu durans, quod optimum est post natalitia.  
Eius duo genera, vñ longius altero. Malorum dicto-  
rum Pomi rugginenti duo genera. Præferuntur aci-  
da dulcibus: dulcia edulcia sunt, paulò post natalem  
Domini. Iis prætereuntibus bonitatis perfectionem  
acquirunt acida, in aliquot menses duratura: maiora  
sunt prædictis, firmiora, lapidioraque. Omni tempo-  
re condiri possunt, Pomi Calamini dicta Mala, om-  
nibus placent, sapidissima, nec minus durant cæteris.  
Pomi Pupini dicta in pretio sunt, tum propter bonita-  
tem, tum propter diuturnitatem. Mala dicta Pomi  
rostaroli, grata sunt, quia pulchritudine & liquore su-  
perant omnia alia: vt mitum non sit in bacchanalibus  
tanto pretio inuenibus vendi, præferunt iis, qui per  
vibes, compita, & choreas debachantur. Pomi Appioli  
quod genus magni fcebat ab antiquis, recentioribus  
quoque hodie habentur in pretio, quippe quæ omni-  
bus reliquis delicatiora.

Nec Hispanica sua penitus indicta voluit. Lacuna.  
Vulgè Maneana Camuesia omnibus cæteris præferu-  
tur, quod præter aromaticam gratiam, quam habent,  
gustu & liquore sunt gratissimo. Nec tibi visum hoc  
Pomi genus putat extra Hispaniam & aliqua Flandriæ  
loca: Flandica tamen multum Castellanis cedere.  
His succedunt Mala dicta Pomopero deuclodo. Se-  
quuntur Melopoma Italorum. In Hispaniæ partibus non  
cognoscuntur Diofco. Melimela & Epitorica, vt idem  
tradit. Recedamus in Germaniam.

Coletus in suo diario Oecoromico, pauca quidem  
affert, attamen ab aliis non prolata, aut saltem non  
istis nominibus, vt eo ipso eius diligentia proban-  
da videatur. 1. Mala *Breitling*. 2. *Glaß Appfel*. 3. *Burdaß Appfel*. 4.  
*Melamont Appfel*. 5. *Surgers Appfel*. Quæ sic Latinis verbis  
exprimas licet. V. V. *Veiling*: Vitreæ Nobilit: Melonea: &  
Hungarica. C. Bauhinus apud Matthiolum duo tan-  
tum Malorum posuit de genera, & cicones ex Taber-  
namontano mutatas; rotundorum & oblongorum,  
quem speramus plura daturum in alio opere, ex mul-  
titudine sua observatione. Tandem Schuenek & illius  
queque affert in medium forptulam, Silesiacis Pomis  
referant: quorum quædam antea iam nominata, quæ-  
dam noua videntur, ergo Silesiæ Mala hæc sunt. 1. Ma-  
lus humilis, *quæque* Johannis *Appfelbaum*, fruticis modo  
adolciscit, & sua natura fert Poma præcocia mediocri-  
ter dulcia, colore admodum dilute flaua. 2. Mala acida,  
*Äpfel*, *Semling*, *Sauer Appfel*. 3. Mala dulcia, *melonea* Diofco (vt ille  
patet) *Äpfel*. 4. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 5. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 6. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 7. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 8. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 9. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 10. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 11. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 12. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 13. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 14. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 15. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 16. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 17. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 18. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 19. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 20. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 21. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 22. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 23. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 24. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 25. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 26. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 27. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 28. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 29. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 30. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 31. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 32. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 33. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 34. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 35. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 36. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 37. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 38. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 39. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 40. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 41. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 42. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 43. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 44. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 45. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 46. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 47. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 48. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 49. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 50. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 51. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 52. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 53. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 54. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 55. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 56. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 57. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 58. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 59. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 60. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 61. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 62. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 63. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 64. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 65. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 66. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 67. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 68. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 69. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 70. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 71. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 72. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 73. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 74. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 75. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 76. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 77. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 78. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 79. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 80. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 81. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 82. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 83. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 84. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 85. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 86. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 87. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 88. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 89. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 90. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 91. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 92. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 93. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 94. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 95. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 96. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 97. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 98. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 99. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 100. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 101. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 102. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 103. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 104. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 105. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 106. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 107. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 108. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 109. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 110. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 111. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 112. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 113. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 114. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 115. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 116. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 117. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 118. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 119. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 120. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 121. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 122. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 123. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 124. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 125. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 126. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 127. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 128. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 129. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 130. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 131. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 132. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 133. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 134. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 135. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 136. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 137. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 138. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 139. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 140. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 141. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 142. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 143. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 144. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 145. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 146. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 147. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 148. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 149. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 150. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 151. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 152. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 153. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 154. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 155. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 156. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 157. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 158. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 159. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 160. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 161. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 162. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 163. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 164. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 165. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 166. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 167. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 168. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 169. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 170. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 171. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 172. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 173. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 174. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 175. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 176. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 177. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 178. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 179. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 180. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 181. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 182. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 183. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 184. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 185. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 186. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 187. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 188. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 189. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 190. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 191. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 192. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 193. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 194. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 195. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 196. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 197. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 198. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 199. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 200. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 201. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 202. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 203. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 204. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 205. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 206. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 207. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 208. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 209. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 210. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 211. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 212. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 213. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 214. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 215. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 216. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 217. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 218. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 219. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 220. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 221. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 222. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 223. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 224. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 225. Mala Vi-  
nola, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 226. Mala Mureta, *Äpfel* *Äpfel* *Äpfel*. 227. Mala Vi-  
nola, <



# DE MALIS.

venditare nitatur. Nouisse cuiusque succos, eo iudicio, quo simplices medicamentorum facultates sunt examinandæ, id verò dignum iudicamus in, quo laboretur. Habuerint sanè Romani Orbiculata delicatissima, habuerint Melimela, Mattiana, Scadiana, Picena, Amerina, Syriaca, Pelusiaca, Quiriniana, Sertania, Platania, Mustea, & si feminis placet, etiam Pannacea, nunquid ideo nobis ob hanc diuersitatem, laboradum? Scimus Sestiana Poma, siue, vt Columella habet Sextiana, non verò Cestiana, vt malè apud Galenum vocantur, inter ea numerari quæ alstringendi vi magnam vtilitatem habent. Ea tamen de caulaminimè nobis disputandum, quæ sint Sestiana Poma, ne nobis vana quærentibus, illud quod Cornario (nisi memoria fallat) in hoc Pomo accidat, vt Sestiana Hesperidum Mala credamus, & tandem cum Matthianis etiam confundamus, à quibus credi posset Hispanos hoc tempore omnibus, Malis nomen mutuari. Hoc agendum, vt inueniamus Mala, quæ alstringendi facultate non cedant Sestianis, qualia quamplurima reperiuntur, & nos mox describimus quædam appositis picturis: & nisi inuenirentur, aliis Malis Cotoneo infitis fieri possent. Equam ergo nos sportulam aduchemus ad istud Malorum Empiorum? enimvero sanè; talia qualia accepimus, decerpimus, vidimus, gustauimus, partim etiam coluimus ipsi, conferemus, breui, sed exacto singulis appposito lumine, & eicône ex ipsomet prototypo ad lingulorum magnitudinem parato, ne nostro nos, qui nunc hoc agimus, officio defuisse videamur. Placebit, speramus, non heubarum tantum studiofis, sed & Pharnacopœis (quorum etiam hæc nouisse interest) & hortorum cultoribus, & omnibus denique bonis Oeconomis.

Ergo & nostras Pomonæ Vertumnique opes, quas partim ex ducato VVirttembergico, partim ex agro Basiliensi, Burgundico atque Aliatico, quarum haud temerè alia loca maiorem suppeditent varietatem, conquisiimus, tandem promamus.

Malum VVirttembergicum Wettich siffianum.



Magnitudinem figura docet, vt & reliquorū quæ sequuntur, sicut & formam extrinsecam, quam figuram vocant. Est ex albo luteolum, pediculo satis longo. Sept. 20. nondum perfectè maturum: carne tamen iam subluta, dura, acida. Delatum Montbelgardum ad Febr. durauit.

Malum Wettich 2.



Septembris 20. carne erat alba satis tenera, acida, grata. Diu durare aiunt, nec grandescere, fragran-

temque matura spirare odorem. Montbelgardum delatum, mense Febr. integrum adhuc fuit, & spem exhibuit longioris durationis.

Malum Wettich 3.



pago Bollenfi vicino. Sept. 20. carne erat alba, satis dura, sapore acido, nec dum maturum videbatur.

Malum Wettich Italicum maius & minus.



Ex eorum quoque genere est, quæ Wettich vernaculo idiomaticè dicuntur, durans ad Ianuariam vsque: planè album, præcedenti non maius, breui pediculo. Datum in Pfliden

MALA Wettich Wettich Wettich dicta, tres.

quasi Italica, pulchra sunt, in Febr. & post nonnihil angulosa: colore alba, superne pulchrè rubentia, in medio punctata: aliquando nonnihil luteola:



pediculo longiusculo, quem non exprimunt picturæ. Durare aiunt ad Aprilem. Sept. 20. Caro intus alba, tenera, acida, sapida, dicuntur diu durare, etiam per totam Hyemè. Montbelgardum translata bona aduc fuerunt Maij medio sequentis anni. Magnitudinem figura exprimit.

Oenomelum VVirttembergicum.



Wetnapffel, Pomum vinosum vulgè dictum, elegans, candidum, umbilico tenus parum angulosum

Wetnapffel.

Pomorum  
rici aut  
eap. nula-  
no.

Pom. nota-  
ur.  
felpcri-  
um mala.

Anonibus  
obscuatur.  
Pomorum  
differentia.

Wettich.

Wettich.

Durare perhibent v[er]que ad Aprilem. Coluntur in  
Vante & alibi. Multum habet similitudinis cum  
præcedenti, minori præsertim, quo tamen pau-  
lò habitius est, colore albo, ad pediculum non-  
nihil luteolo.

*Duracinum album Bollenfe.*

*Malum Weiss viridans.*


Crimmrich



Grünweissch ex  
Werte, in lu-  
teolo sub-  
viride, pedi-  
culo satis  
lògo. Mom-  
pelgardù de-  
latum, inte-  
grum adhuc  
Maij medio.  
Vnicum tã-  
tùm nacti

sutius, quod adferuatum dau, sed negociis impediti,  
nec Pomi, nec saporis designandi meminimus. No-  
rint id incolæ. Verisimile tamen est, prioribus gustu  
non multum esse dissimile, siquidem communi  
conueniat nomine.

*Malum Virgineum, acidum.*



De Warte.  
apfel.


Sunt freunt apfel, quasi dicas Virgineum po-  
mum, fessile, colore ex albo subluteo, aliquot striis  
& maculis rubentibus decoratum, pediculo satis  
longo, tenui. Caro alba, dura, acida nondum edulis  
Sept. 20. grata tamen, etiam ante perfectam maturi-  
tatem.

*Duracinum album, Z. A. - G.*




Deß  
Hartling.

Deß Hartling, Duracinum album, ex Zell, medio-  
cre Pomum, album cum luteolo intermixto, parte  
præsertim superiore ad umbilicum, ad pedicu-  
lum verò rubello. Angulosum est, carne du-  
riuscula & firma, (vnde nomen) sapida. Aiunt  
durare ad Pascha ac etiam v[er]que ad oporan. Nobis  
adferuata, integra adhuc fuerunt medio Maio, se-  
quentis anni.



Deß Hartling Apfel, quasi duraciunculum album Bol-  
lensibus dictum, quoddam diu duret, v[er]o iterulerunt, qui  
in g[ra] obtulerunt: nonnihil angulosum, coloris  
albi subulei. Accepimus ex Warte paulò ma-  
iora. Sed hoc idem existimamus cum præce-  
denti, & bis pictum, aut certe quàm minimum  
variare. Hortulanus Ill. E. C. Montbelgar-  
densis eadem significatione *blanc-dure* vocat Gal-  
lico idiomate, & in horto E. C. Montbelgardi  
prouenit ait.

*Pomum Pentagonum perelegans, acido  
dulce, vtrinque fessile.*



Elegas hoc ratum. Pomum Pen-  
tagonum.  
Ducilla V Vittem-  
bergica, Principilla  
nenta Clementif-  
sima millum, cum  
aliis quibusdã exo-  
ticiæ elegantie na-  
turalibus dono ac-  
cepimus. Medio cre  
est, & figura magni-  
tudinem non adæ-  
quat: quippe trium  
aut quatuor vnci-  
arum latum, sese un-  
cia nō altius com-  
pressum, vtrinque  
fessile. Parte super-  
na, quæ Pythmene,  
impressum. Angu-  
lis quinque protu-  
berantibus conspi-

cuum est, maiori parte luteis, reliqua eleganter rubi-  
cunda, punctis tamen luteis notata. Februario  
sectum carne satis molli erat, acidodulce, ac  
penè vinoso. Surculos ab eadem E. C. missos in  
horto E. C. quem Montbelgardi colimus, inferi  
curauimus. Figura v[er]amque faciem oppositam  
exprimit.

Poma quadrata vulgò dicuntur Montbelgardi  
*Pommes carrees*, propter angulos. Sunt tamen com-  
muniter pentagona, interdum Hexagona aut He-  
ptagona, angulis nimirum per longitudinem protu-  
berantibus, quorum pars suprema, propter umbili-  
cum, in gibbos & tubercula eleuatur: totumque  
adèò Pomum angulis scatet. Quatuor vncias alta,  
tres lata, fessilis, pediculo breui, flaua, punctis  
araneosis nigricantibus conspersa. Mense Oct.  
lecta, odorata sunt, sapore vinoso, acidulo, gra-  
to: carne tamen adhuc duriuscula. Ex horto E. C.  
Montbelgard.

Pomum  
quadratum  
Montb. acti-  
dum, flauū.

*Malum*



# DE MALIS.

11

*Malum Orbiculatum Bollenſe album, acidum.*

pauciſſimo robore ab vna parte, in ambuſum ven-  
trioſa ſunt, vnde forte Orbiculata dicta, pcciole



161mg. In Ducatu VVirtēbergico propē Bol & Zell Scheibling  
vocatur, ac ſi dicas orbiculare, modicē tamen depref-  
ſum eſt ac ſeſſile; colore albo ſubluteo cum aliquo  
rubore conſperſo: anguloſum eſt, pediculo breui.  
Sept. 20. caro non omnino alba, ſed ſabluteola, tene-  
ra: ſapor acidus, gratus, viuoſus, Bona adhuc Oct. 14.

breui, craſſiuſculo, durant ad Ianuarium. Sept. 20.  
guſtata, carne ſublutea, acidula atque eduli. Obla-  
tum etiam in Zell, ſub eodem nomine, cuiusdem ſa-  
poris teſtimonia dedere. Montbelgardum delatum  
Maij medio incorruptum adhuc erat.

*Oen. mela Bollenſia alba.*

*Oen. melum magnū m Blienſpachianum.*



Wieling Vinofum Blienſpachianis dictum in Du-  
catu VVirtēbergico: Elegans & magnū, anguloſū,  
album, pcciole breui. Sept. 20. erat maturum, carne  
candida, tenera, ſubacida, etiam ad Oct. 14. vſque ſe-  
mina tamen quę inerat, caſſa, & m: dulla vacua.

*Malum turbinatum album.*

Wien apfel, Poma Vinofa Bollenſibus & VVal-  
denſibus dicta quibuſdam Scheibling. Altera parte al-  
bicant, altera rubent, ea nimirum, quā ſolem ſpe-  
ctabant. Sēp. initio nondum matura ſatis, ideoque  
eſui minus apta: ſucco tamen viuoſo. Ad Aprilē  
vſque durare ferunt. Guſtata Sept. ſine, ſapore acido,  
grato, vt & demum Nouem. 23. Habentur & in Zell,  
eodem nomine. Montbelgardum delata, integra ad-  
huc erant medio Maio ſequentibus anni.

*Orbiculatum aliud quibuſdam.*

Wienſcheibling, Quidam & hoc Orbiculatum vocant, germanico  
idiomate Scheibling, communiter tamen Bollenſibus  
& VValdenſibus Wiedenbrunner quali Fontiphagia di-  
cas. Elegans Pomi genus, ex albo luteolum, cum



Montbelgardum integrum adhuc Februatio.

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

Wienſcheibling, Witenſcheibling quali


Wienſcheibling, Witenſcheibling quali

*Salum turbinatum ex flavo virescens, punctatum.*



*Lind. raphet*      *Lind. raphet*      *Bollenfibus & Vvaldensibus* dictum  
*Quin raphet*      simile satis *Quin raphet* à pileo turbinato vocato. Ea-  
 dem enim forma fere colorque, sed minus hoc. Ei-  
 colore tamen hoc discriminis animadvertimus,  
 quod licet sit ex albo subluteus & virescens, multa  
 tamen habet puncta candida. Quædam etiam ali-  
 quid ruboris habent diffusi. Pediculus quidem bre-  
 vis est, sed crassior. Videntur & angustiora, quam ex-  
 primat eicon. Aiunt durare vsque ad Ver, interdum  
 etiam vsque ad æstatem. Septis, nondum erant esui  
 apta, carne dura, sapore vinoso austero, luteola. Tali  
 adhuc erat Octob. Montebelgardum delatum, in-  
 tegrum adhuc Maij medio.

*Malum turbinatum* minus, virescens.



*Syltino*      *Syltino* afflicti, iisdem nuncupatum, quod Pileum  
affl.      turbinata formā referat, quibusdam & *undecapaffi*, quasi  
*undecapaffi*      Pralina dicta, forte à colore. Pomum oblongum, basi  
latiore, in angustum fastigium exeunte, peciolo bre-  
ui, crassiusculo. Durant vig. re ad Febr. vi aiunt. Sept.  
r8. nondum erant esui apta. Sapor vinosus, Color ex  
albo lubrutescens & virescens. Quædam etiam aliquid  
viroris habent versus basim. Zellænes hemyalia vo-  
cāt. *Winterapaffi*, vernacula lingua. Aiunt & *undecapaffi*  
*Winterapaffi*      dici, hoc est, exarcta. Oct. 25. carne adhuc dura, aci-  
fel.      dum, necdum esui apta.      *Ewigapaffi*.      Suspicamus effici, quod

Suckardiz Hammerapfel, & Bafilæ, Epithymigen vom Ham-  
cant, quasi naturæ acutæ dicas quod delatum apfel.  
Montelgardum, Decemb. 13. carne dura ad Epithym.  
huc & acida deprehensum. At Hantingoapfel in-  
tegrum adhuc erat Febr. carne duriuscula, subaci-  
dula, vinosâ. Ad medium Maij esui aptum, cum  
aliqua aciditate.

*Malum turbinatum, lactescentibus  
punctulis conspersum.*



*Weising ex Walden.* Pomum album, superne turbinatum, inferne lesile. Diuturne aiat. Punctulis lacteis paste asperum est. Eiusdem generis aliud *ex Bell* accepimus. sed fido multo maius, & supra quinque digitos altum, quinque crassum in ceteris simile, acidum est. Provenit etiam in Nor., & aliis malis in locis, ut aiunt. Bonum adhuc & sapidum Montbeliard i. s. Febr.

*Malum Vlnense.*



*Umer* a: *fet*, *Vlmenſia* poma, ex luteo ſubalbida, *Umer* app-  
*fci*.  
 vna parte ſtrias aliquas rubentes habent. Eadem fe-  
 rē latitudo quē longitudo: pediculus longiuſculus  
 craſſus. Pomum hoc quod vnicum accepiſimus con-  
 tortum erat & veluti in medio bipartitum, neſci-  
 mus an cætera talia.

*Mala speciosa alba Fontis Admir.*

Magna hæc & speciosa Mala in Ducatu VVirtab.  
circa fontem Adm. proueniunt. Figura variant,  
iccirco



iccirco binæ eicones appositæ, varietatem ostendentes. Alba sunt & angulis eminentibus inæqualia,

Wachsmeyer quasi Fixoria dicas, quod fixa sint optima. Habentur in 3<sup>ta</sup>. Cuius generis data nobis duo maxima, quorum altitudo excedebat sex digitos: crassitudo ferè septem. Color vniformis ex albo subluteus, raris lacteis maculis resperis. Aiunt multò etiam maiora reperiri, esse subacida, diu durare. Figura hæc magnitudinem haud æquat. Hæc spes noster Bollenis in discernendis fructibus peritus, noluit diuersum dicere, & Gering vocata, quasi luteola dicas, in 2<sup>da</sup> oppido, se eadem suspicari cum his. Sept. 20. caro non omninò candida, sed ferè sublutea, duriuscula, sapore non admodum acido, grato. Sept. 30. degustatis vtriusque iam descriptis, manifestè deprehendimus verum esse, quod hospes monuerat, non differre: sed esse tantum figuræ aliquam varietatem. Ergo tres propositæ figuræ vnus sunt & eiusdem speciei, licet non parua diuersitas inter duo appareat, vti dictum. Huius generis pulchrum & insignis magnitudinis Montbelgardum delatum, ad medium Maij integrum adhuc erat.



*Erythromelon, seu P'mum magnum, rubrum, striatum.*



præsertim rotundiora, alterum magis turbinatum est. Acida sunt, & diu durant. Hæc duo eadem esse videntur cum sequenti, vti patebit.

*Aliaeicon prædictorum.*



Wachsmeyer, quasi rubrum fixorium dicas, vachsmeyer, magna ex parte rubrum, variis intercur- applet.



fructibus striis. Sed & l'edinis luteo commixta habet: Vmbilicus profundus, speciolus brevis: nonnihil quoque angulosum est. Sæui est & vinoso acore, ob id lautioribus mensis expetitur ad fixa, ad quem usum etiam à Basiliensibus hoc ipso nomine, nisi multum fallimur, celebrantur. Montbelgardum delatum, integrum adhuc Decembri. Aiunt in 2<sup>da</sup> ad Quadragesimam usque durare.

*Eribromelon, seu Malum rubrum  
magnum, fugax.*

Nosch Wett. Koster Wettling & Nffel ex Orbing & Wäite/ vnde etiam  
aus dyffel. accepimus sub nomine Taurischer, Tauricum, his val-



dè similia, attamen maiora, sessilia, quædam rubra,  
nec ita striata. Partes quædam albæ ex luteolo, mix-  
to sparsim rubore. Sed & infuso apparet differentia,  
quod multa puncta habeant alba. Pediculi non ad-  
modum crassi, nec breues. Alterum, quod oblatum  
fuit, altitudinis erat quatuor digitorum, crassitudi-  
nis sex; alterum quinque, totidem crassum. Sept. 17.  
incipiebant putrescere. Caro haud ita candida, te-  
nera tamen, acida, grata. Tauricum tamen sapore  
videbatur gratus. Fugax est Pomum.

*Eribromelon magnum Parisiacum.*

Paris apud  
G.

In oppido Paris præmagnum & elegans hoc Po-  
mum oblatum Romæ: Græci Paris, & quædam Parisia.



cum dictis, mense Octobri. Hospes idè indicat cum  
precedenti. Rubris striis pulchrè picturatum est, asper-  
sis hinc inde punctis albis, non sine luteolo colore.  
Pediculus brevis. Caro tenera, acida, vinosa. Bo-  
num adhuc Octobr. 17. Eiconem exhibuimus pro-  
pter formam à superiori diuersam: an differat etiam  
specie, incolæ viderint. Sanè ita videtur.

*Malum Tauricum æstiuum, rubrum.*

Sommer  
Taurisch

Sommer Taurisch: Pulchrum, magnum, rubens valdè  
allatum Vrachio. Sept. 7. Striatæ rubedini luteum &

albedo permixta. Caro alba, tenera, subacida, sapore  
vinoso, grato. Haud durabilia esse perhibent, idco,




que æstiva vocant. Et vel Sept. 19. iam quædam pu-  
trescebant. Eadem sub eodem nomine vidimus in  
Diet. Kirchen & in Wäiten; quæ etsi minus rubra, tamen  
erant magis striata. Putamus cum Plinio ruborem  
& strias à Sole fieri, prout magis aprico sunt exposi-  
ta, quod & rustici obseruatione quotidiana asseue-  
rant. Etenim Sept. fine eadem allata ex Blienspach,  
non rubra erant, vt Vrachiana, sed multa albedine  
perflua. Tribuendum tamen etiam aliquid formæ  
specificæ, & generum proprietati. Sept. 12. iam trans-  
ierant in æst. Vnum tamen nobis in Octobr. vsque  
integrum perstitit.

Vnde Pomu-  
rum striæ &  
rubedo.

*Malum Tauricum Hyemale.*

Winter Taurisch in Wot & Wäite, pagis Virtemb. id est,  
Tauricum hyemale dictum, pulchrum magnumque



Pomum simile Taurico æstiuo: quedam rubra valdè,  
alicubi alba, sublutea, striata: quædam minus rubra,  
diuersæ magnitudinis. In genere tamen, omnia hu-  
ius generis videntur prædictis minus sessilia, & pau-  
lo magis angulosa. Pecioli etiam videntur longio-  
res. Alij durare vsque ad Aprilem. Sept. 19. nondum  
erant esui apta, sed carne dura, sapore tamen acido,  
non ingrato. Nacti sumus etiam eodem nomine ex  
gen/ insigniter vna parte rubens, turbinatum. Perhi-  
bent diu durare, & acido esse sapore. Octob. 25. gustu  
erant acida, nec dum esui prorsus apta, carne solida,  
luteola. Montbelg. delata, Maij medio nulla adhuc  
putredine inquinata, saporis iucundi, vinosi.

*Eribromelon acidum, subastringens.*

Scemappset ex Blienspach: prædicto Taurico æstiuo.  
apprimè



apprimè simile. Schmetzer dicta putamus, quasi pudoris Poma, quòd rubedo faciei pudoris

*Malum Tigurinum minus.*

Hoc genus Bollenfes & VValdenses simpliciter Sirt applet vocant; hoc est, Tigurinum Pomum. Minus Sirt applet.



figum esse soleat iuxta illud; Erubuit, salua res est. Rubens enim hæc Poma, sed dilutiùs, ac minus quàm prædicta. Sunt & quædam alba tantùm, alia mixta, quasi & ipsa facierum humanarum instar, colorem mutarent. Puncta alba nulla. Pediculi breuissimi. Sept. 20. Caro dura fatis, nec dum perfectè matura, saporis acidi, non nihil astringentis. Sunt & parùm angulosa. Decemb. 13. Pomum delatum Montbelgardum ex Witten nomine Schmetzer Taurich, carne erat alba, duriuscula, vinoso gratoque sapore.

dici potest, quia priori magnitudine cedit. Ex albo subluteum est, paucis stinis, non multùm angulosum, pediculo breui, crasso. Ad Aprilem durare narrant. Septembr. sine nondum esui erant apta, sed carne dura, acida. Eadem eodem nomine habentur in Ruten, ubi aiunt fixa perquam esse iucunda. Montb. delata Febr. medio acidula, grata.

*Malum striatum, Balnei Adm. perelegans.*

Stretting applet / accolis Balnei Admir. dictum, quasi Stretting striatum nomine sumpto ex argumento: pulchrum applet

*Malum Tigurinum maius, seu album VVirtembergensibus.*

Alb. Tigurinum Pomum, Weis Sirtich applet, oblatum hoc nomine in Zell, fortè quòd Tiguro in agri



est Pomum, non nihil angulosum, multis stiris & punctis rubens, ac veluti picturatum. Parte superna albet, inferna propè pediculum breuem, valdè rubet: & in rubro colore striae saturatiores. Sunt etiam minora quàm figura exhibet, & valdè durabilia, vt aiunt. Delatum Montb. exeunte Maio nihil penitus vitij contraxerat. Carne est firmiuscula, gustu acido.

*Duracium striatum, seu Malum D. Mart hia.*

Stretting applet quasi duracium seu duriusculum Quatinge dicas, prælibato striato aliquatenus simile. Habet enim & hoc striae, sed dissimiles. Rubor etiam diuersus, cui puncta passim inspersa. Pediculus, quàm dicti longè breuior, & crassiusculus. Superne etiam angulosum conspicitur, diu durat, vt perhibent, & acidum est. Suspiciamur idem Pomi genus non Weis Sirtich bisoblatum in Witten sub nomine Weis Sirtich, quod ad applet.

# LIBER PRIMVS

16  
Aprilē vsque durare aiunt. Idem Pomum datum  
in Betū nomine *Matthias* est, hoc est, *Matthias* Pomum, aci-


*Matthias*  
april.



dum quoque, & durabile, quod & ipsum erat per rubedinem punctatum. Decembr. 12. cum iam putredinis nota adesset, durum adhuc carnem, albā, acidamque deprehendimus. Durauit tamen ad Maij mediam vi 10.

*Malum; ubellum VV. Ald. affe.*

*Malum*



*Malum; ubellum VV. Ald. affe.*  
dicitur quod in Rebus dictum, in *Matthias*. Pulchellū Pomum, cuius superior pars valde rubet, inferior hinc inde albicat, cum pulchris striis, & vultu guttis rubris. Pediculus medio, et alio loco. Vnicum tantum accepimus ex illo loco, quod nonnihil erat angulosum. Aiunt durare diu, vsque ad Quadragesimam. Datum nobis in Betū eodem nomine Pomum, sed maius, quatuor digitos altum, crassitudine eadem: Color idem, nisi quod non tantum rubebat: pediculo paulo longiori. Hic tamen prius exhibemus. Quædam etiam ex iis, quæ in Betū nacti sumus, minora sunt. In *Matthias* eadem vidimus, nisi fallimur nomine gentium: quæ Montbelgardum delata, durarunt vsque ad finem Febr. carne tenera, saporis subacidi, valde grati.

*Phrygomelon striatum.*

*Phrygomelon*

*Phrygomelon* quasi fixationi opportunum aptum-



que, Bollenfibus dictum. Simillimum est *Streptum*

dicto. Duo accepimus, quorum alterum quatuor ferè vncias altum, crassum totidem, alterum depressius, ad tres tantum vncias, quatuor ferè crassum. Parte altera rubet, cum striis item saturatius rubentibus: altera sublutea est, intercurrentibus quoque striis rubentibus. Durum est Pomum, pediculo crasso admodum & breui. Montbelgardum delatum integrum adhuc Febr. quo tempore adhuc carne erat dura, acida, grata.

*Malum Bollenfibus Zellenfibus.*

*Bollenfibus Zellenfibus* dictum, durabile Pomum *Bollenfibus* est, vt aiunt, mediocte. Vna parte rubet intercurrentibus




tibus striis, magis rubentibus: cetera luteum. Pediculo est satis breui. Admodum simile est hoc Pomum paulo ante descripto, quod & strias rubras habet, sed oles noster, in dicendis fructibus toleris, diuersum ait. Montbelgardum delatum, integrum ad Februariū vsque, putredinem non sensit.

*Malum Bollenfibus dictum.*

*Malum Bollenfibus*

Ita Bollenfibus & Zellenfibus appellat apud quos preuenit. Pulchrum genus est, multumque rubens, striatum



tum: intercurrentibus nonnullis partibus luteolis & virefcentibus. Multum habent similitudinis cum *Streptum* & cum *Phrygomelon* striatis & cum *Streptum*. Pediculo sunt longiusculo: carne acida, durabilia. Variant inter se. Alia virefcent sine multo rubore: alia parua, pediculis ipso ferè Pomum longioribus. Viros quidam distinguunt à *Streptum*. Septembr. 20. nondum edulia, carne alba duraque, acida valde. Circa Pascha primum maturantur, cuiusque sunt apta. Montbelgardum delata, mense Maio, integra adhuc & abundè grata erant.

*Rubellum*



# DE MALIS.

*Rubellum Bienenpachianum.*


*Duracium VValdenfe, auidodulce.*

*Stetting.*

*Stetting*, hoc est Rubellum ex *Bienenpach*; co-  
rum ferè rubrum est, parum angulosum, pediculo

*Stetting* nomine data in *Walden*; quasi durabile, vel *Stetting*.  
prædurū dicas: Et *Stetting*; quali corticis instar

*ling.*



tenui, satis longo. Medio Martio integrum adhuc,  
saporis grati, subacidi.

*Malum Heinigium Bollenfe.*

*Heinigungs  
apfel.*

*Heinigungs apfel* in *Boll* Latiusculum, sessile, superne  
nonnihil turbinatum: colore ex albo luteolo, & sub-



vircente, vna parte cum striis nonnihil rubentibus.  
Aug. 26. nondum maturum: colligi tamen potest &  
reponi. Bona sunt circa ferias Natalitias, durantque  
vsque ad Quadragesimam. Mentb. delatum integrū  
adhuc medio Maio, acidulum.

*Malum Tröbling dictum.*

*Tröbling  
apfel.*

*Tröbling apfel* in *Boll*. Hospes noster se solu n habere  
dicebat hoc Pomi genus, saltē eo in loco. Durare



vsque ad Aprilem. Mediocre Pomum, sessile inferna  
parte, superiore turbinatum. Maxima parte rubet,  
interiectis multis striis: reliqua pallida subluteaq;  
pediculo satis longo, carne subacida. Vnicum dela-  
tum Montbelgardum Febr. 22. durauit adhuc.



durum dicas. Et sanè ad duos annos durare perhi-  
bent, aut etiam ad triennium. Altera parte rubento  
striata: altera sublutea, pediculo longiusculo ad vn-  
ciam vnam.



Ex *Bienenpach* simile Pomum allatum nomine  
*Stetting*, quasi testacium dicas, aut quodd non sunt  
comedenda nisi decorticata, propter duritiē: Decori-  
ticare enim *Stetting* est) sed maius. Delatum Montbel-  
gardum, Maij medio carne dura, ex dulci acta.

*Duracium latum VValdenfe, seu rubrum.*

*Wentharting*, quibusdam etiam *Wentharting* ex *Walden* *Wenthart*.  
pulchellum, sessile, multumque durabile, vt aiunt, *ling*.  
*Wenthart*.  
*ling.*




Colore vna partē  
subluteo, altera ru-  
bente, vtriusque  
disperlis maculis  
albis, seu lacteis  
quibusdam veluti  
punctis; pediculo  
satis longo. In  
post intensius ru-  
bent, & minora  
sunt: dura admo-  
dum carne. Sept. 20.  
acida, albā, cui nondum apta. Perhibent durare ad  
Oporam vsque.


*Praefomelon Bollenfe, Fontis Adm.*

quibusdam: pediculo breui, crasso. Videtur idem genus esse Pomi quod Sturgardiae Weßling vocant, sed Weßling.

Grüniger  
opff.




Grüniger aest in Boll, quasi viride Pomum. Nam colore maximè omnium est virecente, punctis albis aspersum, angulolum: pediculo vnciali, acidum. Montbelgardum delatum ad medium Maium vsque integrum permansit.



maius, & maculis pulchrioribus. Vtrumque Montbelg. translatum integrum Nouemb. fine. Sturgardianum ad medium Maij vsque durauit, carne valde candida ex dulci subacidula, vinosa.

Zappen-  
fonten

*Malum Zappensfonten Bollenfibus dictum.*



Sic in Boll vocant & circa Fontem Admirabilem, æque mirabili profectò nomine, ut patet idioma intelligentibus. Pomum est acidum durabile ad Oportum vsque. Color virefcens cum luteolo, subinde stris & veluti guttis rubentibus aspersum, pediculo sesquiuinciam longo.

*Malum longipediculum Zellenfibus dictum.*

Langstet-  
fonten



Langstet: quasi longo pediculo Pomum ex durabile: prædicto hand multum abimile, differre tamen videtur diligentiùs cõferenti. Neque enim tam viride est hoc, & per album luteas strías habet intercurrentes: ad hæc

angulosum est: Pediculum vnciam longum habens, & in umbilico cavitatem profundiorē.

*Malum Concharum Venerarum modo macularum, dulci acidum.*

Concharum

Circa Balneum Admirabile Ducatus V Vittembergensis hoc genus pomi separaffet, satiuum Pomu quibusdam etiam Stern-Appfel, quasi granatum Pomu nuncupatur, quod ex granis & semine proueniat. Pulchellum est vna parte album, altera rubellum cum maculis rubentibus, ut in conchis Venergis

*Mala Loracina Bollenfa Font. Adm.*



Sonne-Appfel, Loracina (forte quod Loram portionis genus, *Paradisi* Græcis dictum, ingrediantur, quod ferè à Germanis ex vindemiae fratribus & reliquiis fieri solet adiectis Pomis

& aliis quibusdam) in Boll & Mante, accedunt aliquatenus ad *Späpfel*, rubore multo perfusa, per quem veluti stris guttaeque magis rubentes discurrunt: In vna etiam parte ex luteo virefcunt. Pediculus tenuis, longus.



Variante & magnitudine, & colore: quædam enint magis rubra, quædam lutea magis. Alia magis striata, aliaminus. Diu durare dicuntur. Caro alba, dulcis, grata, Sept. 20. nondum tamen edulis. Montbelatum Maij medio integrum adhuc.

Paradis-Appfel vel Paratissier Vulgò Bassiliensibus dicta, prima sunt Poma, lunio matura & Iulio, in parvis arboribus prouenientia, omnium vrbiorum Pomorum minima, quæ quidem hætenus viderimus, iucundi odoris & saporis, dulcis, suauitateque quadam propria ori blandientia, exteriùs candida, carne tenera. Habentur & Lugduni & Genueæ & Montepesuli, lunio tempestiuè matura. Putamus eadem

Mala Paradiacina. Ientibus dicta, præcoctia.



# DE MALIS.

19

d. m. alio, & inter Ruelios sub eodem nomine descri-  
ptus ante Oct. Parat. afficit. iisdem Basilensibus  
vocata, prædictis paulò maiora, paulò tardiùs  
quoque maturescunt; Colore rubra, pediculo  
satis longo. Caro firmiuscula, & quàm prædicto-  
rum solidior: sapore admodum dulci, & propemo-  
dum melleo.

tiore magis etiam rubens, & angulosum, gustu dul-  
ci. Delatum Montbelgardum incorruptum erat ex-  
ante Februario.


*Malum dulcacidum album dura-  
bile, & aliud dulce.*

Quædam vocantur in eadem pagina D. ut in V. Virtem-  
bergi. hanc a sunt cum vinea, & clatis veluti oblon-



*Malum granosum Zellenz.*


Kendzset in Zell & circa fontem Adm. quæsi grano-  
rum Pomum, vel granatum Pomum, ex albo sublu-



tum, ad virorem aliquatenus tendens, pediculi  
longitudine & crassitudine mediocri. Hæc in fe-  
gmæta cæsa repolitæque diutissimè asseruari solent.  
Sept. 20 carne erant alba, duriuscula, dulci tamen, &  
elui grata. Aiunt in Zell vocari Kendzset.

gis maculis: Pediculi brevès. Idem Pomum eodem  
nomine habent in Zell. Dulce tamen esse aiunt. Sunt  
& magis albicantia, aliqua etiam aspera viridiaque.  
Hassengrubbing in Waite vocantur, quo fit, ut non tam  
nominis, quàm formæ varietate moti, duas figuras  
demus. Sunt verò posteriora colore albò cum luteo  
palescenti, pediculo brevi tenuique, durabilia.  
Aiunt vocari etiam Hassengrubbing. Accipimus etiam no-  
mine Schmetsing. Oct. 20. in Kerschen carne dulci, soli-  
diore. Hospes errorem esse ait in nomine, & ipsum  
met esse Guntmaedelatum, Montbelgardum medio  
Maio adhuc durabat vtrumque.

*Poma sacerdotum dicta  
quibusdam.*



*Malum turbinatum dulce.*

Oct. 20. Hassengrubbing in Zell, & circa fontem Ad-  
mirabilem. Turbinatum est ut Hassengrubbing (à pileo  
turbinato dictum Pomum, de quo supra) sed bati la-

Hassengrubbing, (id est Sacèdotum Poma) nomine no-  
bis data in Hassengrubbing, eiusdem ferè cum præcedenti afficit.

# LIBER PRIMVS

magnitudinis : colore alba, & quibusdam partibus sub-lutea. Sept. 20. Caro alba, dura, dulcis, necdum tamen perfectè matura. In gæ nobis datum nomine *Gemmitung*, quod idem esse putant. Dulce erat, & duriusculum minis

valdè magna inueniri aiunt. In *Rachen* oppido *Scherfing* vocant, alias *Rennapfel*, à sonantibus granis, & durare aiunt ad Quadragesimam. Quidam etiam *Rennapfel* vocant.



Rachen

precedenti, pediculo longiori. Aiunt durare. Vtrumque expressimus.

Malum preciosum dictum.



Rachen



*Rachen* id est, preciosum Pomum in Ducatu VVirttembergico vocant circa fontem Adm.

Angulosum est, ex luteo albidu, quædam etiam vna parte rubent, pediculo breui. Durant vsque ad Aprilis, carne

*Rachen* vocat à latitudine, ita vt prædicta nomina omnia sint Synonyma vnius Pom. Varietas tamen nominum & aliqua etiam formæ mouit, vt duas figuras fieri curauimus. Ac posterius, quod *Rennapfel* vocant, denud ita describerimus. Magnum est, latu, depressum, pediculo breui, nonnihil angulosum, ex pallore luteo albicans. Sept. 20. gustatum sapore dulci, grati, tenerum. Quidam vocant *Scherfing*. Delata Montbelgardum ad finem Ianuar. nondum putrida erant : carne tenera, dulci. Quod verò *Rennapfel* nomine datum in gæ, Montb. aduectū ad Febr. medium durauit, carne dulci.

fatis tenera, dulci. Ex horto nostri hospitis, qui se solum habere putabat. Habentur tamen etiam in *Wâlde*, vbi *Scherfing*, & *Scherfing*, id est, dulciuscula vocant. Hospes ille noster rapaces veritas manus, paulo tempelinius sub Augusti finem collegit. Illud autem quod ex *Wâlde* accepimus maius fuit isto, nimium vncias quatuor altum, crassum quatuor & semissem. Octob. 4. adhuc bona : & Montbelgardum delata integritatem suam seruabant vltius.

Pomum Orbiculatum VValdensium.

*Scherfing* id est, rotundum Pomum, ex *Wâlde*, ex *Scherfing* albo luteolum, aspectu elegans. Sept. 20. carne tenera, alba, dulci. Habentur etiam in *Wâlde*, & ad Ianua-

Mala liquefcentia & sonora dicta dulcia.

Scherfing

*Scherfing*, quali dicas, facillè liquefcentia Poma, fortè quòd ob carnis teneritudinem facillè in ore dissoluant, ex *Wâlde* & *Wâlde*, nonnihil sunt angulosa, ex



rium durare aiunt. Montbelgardum delatum ad medium Febr. vsque durauit.

albo & luteo pallida: pediculus non ita brevis. Aliquando dicuntur durare. Sept. 20. gustata, dulcia quidem, sed non ita grata, carne tenera, alba. Eiusdem generis datum etiam in gæ nomine *Rennapfel*, id est, sonorum, dulce quoque & durabile. Interdum

Fragrantis odoris præcox Pomum angulosum dixit vulgi consensus, quod sub Augusti mensis principium maturum, Montbelgard mensis inferri consuevit, quod vola interdum comprehendas, alias altero tanto grandius, thorulis ab umbilico secundum

Rachen

Malum preciosum dictum.



dum longitudinem decurrentibus, angulosum, quæ solem sentit, confusa flauit rubescens, cætera ex herbaceo pallescens: carne tenera, sapida, acorem temperante, sufficiente dulcedine.

Speciosum Mali genus, quod conculsa strepitum intus contentis feminibus efficit. Quinque vel sex vncias longam, quatuor latam, vndique ferè angulosum & inæquale, modicè sessile, striis rubris passim decoratum, quædam vna tantum parva. Sunt & quædam, minora. Item quæ vno latere tota ferè rubra, opposito flaua, mediū striis & sanguineis veluti guttis nibilo minus decorantibus. Umbilicus profundus est, angulus vndique ceu monticulis obuallatus. Pecioli tenuis, brevis, & non vnciam longus. Adaperit Pomum, vel per medium sectum cauitatem ostendit amplitudine notabilem: fornicatam dicas concamerationem, in qua, Pomò commoto, semina strepitant, vt dictum. Decuplo plus seminum caperet, quam cõtinet. Caro Hymem demum mollis, dulcis, grata. Aprili adhuc durans, sapidum, edule tamè Sept. licet cære durum. Quædam etiam ritè lecta & adseruata durant in Æstatem. Montbelg. & Burgund. *Crillaut*, Lothar. *Pomme Loquerte* vocant, omnes à sonitu. Montb. etiam dicuntur *Pommes de Charenton*, Legantur Septembr. Montbelg. in Pomatio Principis.

*Pomum angulosum, albocitrinum, fugax.*

Trientem aut quincuncem altum, tribus vix latius, angulosum: cute albocitrina luteum, odoris gratissimâ fragrantia commendatum, qua vel vestes & reliqua interpositum afflat: carne molli, sapidâ vinosâ. Pediculo breuissimo, & penitus serobiculo immerso: Umbilico profundo sauis. Montbelgardi mensè Augusto matura, diu non durat, cauitate magnâ, grana multa, hinc sonora, si separetur agitatione, à suis pediculis albis, vel vbi exsicantur.

*Malum ænematum, à talo grand talon dictum.*

Elegans aspectu Pomum, ea parte, quâ adhæsit, veluti mammam habet, aliâ rectâ protuberantem, aliâ incuruam & veluti pendulum. Immediatè suo hæret ramo, absque pediculo. rubris striis variegatâ parte vna, opposita flauum, figura subouatâ, si mammam demas. Acidulo & vinoso gustu. Matura Sept. vix durant vitula solstitium hybernum. In horto Montbelg.

*Cambony* in Lotharingia dicta poma Præmagna & pulchra, ex flauo viridantia, absque vlla vel striâ, vel rubedinis nota: sed punctis quibusdam fuscis & araneosis conspersa, subrotunda, sed latiora, quàm altiora. Caro vinosâ, grata. In horto prædicto.

*Aestua dulcis* vulgò dicta, tota flauent, si elegantem illam purpurissimâ, quâ vt plurimum circa pediculum donata sunt, adimas. Sessilia sunt, ex rotundo leuiter compressa, mediocriâ magnitudine, cute læuissima. Breui & tenui hærent petiolo. Gustu dulcissimo, ac melleo, succoso. Matura Sept. non durant. Ideo *Aestua* dicta. Sunt enim horaria. Vt auiulâ, vt manducari solita.

*Pomum cristatum* nobis dictum, magnitudinis mediæ, sublongum, vncias circiter quatuor latum, tres crassum, cute flaua, plurimis punctis & maculis nigricantibus notata, cui in vno latere crista plerumque parua, secundum longitudinem donata: pediculus cõortus, brevis vnciam ferè semis longus: Caro sublutea firmiuscula, grati, acidi saporis: Decembri erant esu bona, durabilia videntur. Helicitiâ nobis delata fuere.

Celeberrimum hoc Pomum genus est totius Europæ, sic dicta, quod ex cursu admodum pendeant pe-

diculo. Iam supra ex Ruellio descriptum est nomine Capenduorum: sed minus tantum. Nam apud nos Mörbelgardi duo habemus genera: Maius & minus. Maius tres vncias latum, duas altum, sessile, sed non ita compressum, vt minus. Cutis subcrocea tota maculis paruis ac verrucosis leatet. Odore sunt præluau, carne quoque fumiufcula, sed minus, quàm minor, flauescens, saporis præcipui & maximè commendabilis. Facile durant in Oporam vsque, si diligenter legantur & adseruentur. Quosdam etiam ad biennium diligenti cura seruasse nouimus, quod Basilienensibus haud aded insolens. Minora sunt ea ipsa, quæ Curtius Capendina vocauit, & apud Gallos in maximo honore esse testatur. Quidam esse volunt Mattianâ illâ Romanorum, vt annotat Dalapud. Athæneum. Alij Cestiana esse putant, vt & supra monuimus. Coluntur Montbelgardi diligenter in hortis, præcipuè Illustissimi Principis, & Basilicæ sunt frequentissima. Habentur etiam Monspelij & in Italia. Sed arboris summitates facile congelantur asperiore hyeme. Habetur etiam præmagna & speciosa in Megni-Danigon Ill. Ducis V Vir. arce.

Curtipendulorum faciem Medici sagaci iudicio in Syrrupum ad Melancholicos & Cordiacos affectus concinnare præcipiunt. Eorandem vsus est ad nobilem & preciosam illam confectionem Alkerkes, quam Monspeluli parari vidimus, & alibi Pharmacopœi quoque diligentiores eorum segmèta decorata saccharo vel melle coniunt, delicatis & ærotantibus expetita, horumque vsus præ aliis omnibus præstat. Nostri Capanistræpsit vocant. Galli *Capendu* vel *Carpendu*.

*Epamanduoduri*, (qui nunc vicus est è vetustissimæ vrbis reliquiis exortus, sub dominio Ducis V Vir. tēb. in Comitatu Montb.) Pomi quoddam genus habetur, *Courseque*, quasi curtipedaneum, aut curta cauda dicas, forè ex insitione, Curtipendulæ Mali cum alia quadam, comparata, cum & facie & gustu quodammodo ad ea accedant: Speciosiora tamen, & altero tanto maiora, quædam vndique flaua, aliâ rubella arca decorata, quod in Curtipendulis nunquâ obseruauimus, punctis aculeolis relecta. Umbilico sunt magno & profundo, petiolo breuissimo, vt apprehendere manibus non sit. Durant ad Martium & Aprilem vsque, quo tempore satis integra ac vegeta nobis exhibita, nomine prædicto. Sapor acidulus, vinosus, gratus, & à Curtipendulorum, quæ proprium quendam habent vix exprimentum, diuersus. Substantia carnis flauescens, æqualis, minus dura, quæ illorum. Ipsum verò Pomum odore fragrantiss. est.

*Malus non florida dicta.*



Elegans hoc Mali genus è Regio illo Illust. E.C. V Virtembergicæ horto Sturgardiano, à radice (quibus abundare solet) auulsiis furculis & stolonibus, in E.C. hortum Montbelgardensem transplantauimus. Et iam in pulchras arbutulas excreuerunt, quæ quarto anno, loco florum, in fine Aprilis & initio Maij, protulerunt foliaceâ & muscosam quandam congeriem viridem, vel florum vel rudij.

Mali sine floribus putatas

mentum quoddam, vel sanè distinctum à reliquis floribus Pomorum omnibus, viridans & calyculo longo quinquepartito subhirsuto, vt eleganter in figura expressum. His inter folia constitutis, & velut è sinu eorum emeritis, succedunt singulis ferè annis fructus seu Poma duas vncias alta, totidem lata, angulosa, vt quædam penè quadrata videantur, pediculo breuissimo, colore luteolo, carne tenera, acidula, sapida admodum, quod norunt & vespæ, & aliæ muscæ, quæ Iulio & Augusto, quo tempore apud nos matura sunt, ea arrodunt. Solent carere seminibus. Meminit Theophrastus in tertio de Caus. huiusmodi fructus, quæ tunc huiusmodi floribus & semine gignunt, hoc est, Mali Vernæ, quæ aqua feruente rigata melior euadit, & fructum edat sine nucleo. Ac hæc nostra sanè inter vernas haud temerè recenseri queat, quod vel in frigido hoc climate ante alias plerasque, nempe Iulio, fructum perficiat, quid fiat in regione calidior? Et Theophrastus quoque alibi Mali Vernæ meminit, quæ Iunio fructum perficiat. Et habuisset hinc Scaliger, in quo subtilissimum ingenium suum exerceret, cur melior fiat calentis asperitione: cur fructum edat sine nucleo? Sed prudens euitauit hos scopulos. Quid si semen non ferat, aut saltem non integrum atque perfectum, quod neque florem integram vel reliquarum Malorum more, formatum, edat? Hæc causa ex interiore principio desumpta. Est enim flos fructus principium, & præuia quædam dispositio. Sed cur non fert florem? aut talem, qualem cæteræ? Dic tu, qui es Philosophus. Non autem florere ipse Gesnerus, quoque in appendice fatetur. Malus, inquit, prope vibem nostram (Tigurum) non floret, & fructificat tamen. Eiusdem & Camerarius in horto videtur meminisse, quando ait: Malus arbor exiguis admodum & pallidis floribus prædita: fructum fert, quæ vocantur Poma nana, id est, pumila. Habentur etiam sine semine interius in fructu. Sed huius nostræ Mali fructus non adeo exiguus est, vt patet ex descriptione. Fortè arbor ipsa, quæ exigua, rectius diceretur nana.

Malus Vernæ Theop.

Malus sine flore Gein.

Camer. Poma nana foliis natis.

#### Malum paruum Italicum.

Malum paruum Italicum.

Malicorium.

Allatus nobis ex Italia fructus exsiccat, Sorti domesticæ fructum magnitudine æquans, colore foris partim puniceo, partim glauco, perquam rugosus, umbilico paruo, pediculo gracili, consistentiâ solidâ, sapore dulci, subacido, cum astrictione quadam. Transuersus sectus, quinque loculos membranosos radiatæ stellæ instar ostendit, quam notam, si cum gustu coniungas, faciliè coniciet Malorum genus quoddam esse paruum. Et iam ex aliis, & potissimum ex Thoma Platero, sagaci Medico, intelleximus talia in Italia exsiccati, & ad externos etiam exportari, qualia & nos accepimus Monspeßuli inde importata, quæ etiamnum inter naturalia nostra adseruamus. De hoc Pomo fortè scribit Amat. Comment. in Diosc. Malicorium Granatorum putamen est, siue cortex, quanquam recentiores, Malicorium tantum parua illa Poma rubricantia esse velint, quæ & ipsa astringendi vires habet. Hæc ille. Breuius & obscurius, quam vt aliquid asserere audeamus. Suboritur enim dubium, an de nostris paruis Pomis loquatur, vel de paruis Pomis Granatorum?

Habet præterea cæteræ regiones quamplurima & præstantissima Pomorum genera, quorum quædam vt nomine ita & specie, à prædictis nostris indubiè distincta sunt: verum quoniam cum iis nondum diligenter fuerunt collata, ne confusio fortè, & lectori oriantur redi, de iis nunc tradere superfedemus. Atq; hæc sunt Pomorum differentiz, non quidem omnes, sed hæcenus à nobis obseruatæ. Quis enim possit omnes? cum tanta sit hodie hortulanorum industria,

& curiositas habendi, vt non solum aliunde passim translatis, nouis numerum adaugcant, sed varia illa & multiplicium inter se specierum mangonio, infectione atque commixtione hodie effectum sit, vt nunc non tantum secundum diuersas regiones euariant, sed & oppidatim & vicatim iisdem regionibus, dixerimus propè etiam per hortos ac domos, vt nullus ferè hodie sit, qui non suâ curâ esse velit sibi, quod desit alteri.

Dicamus nunc de tempore & loco. Florent Mali diuersimodè, pro speciei & regionis varietate. Vernæ & præcoces citius, tardiùs ferotina. Similiter & de fructuum maturitate censendum. Florent apud nos & in Germania ferè sub finem Aprilis, & initio Maij. Et quod tarum sit, in his præsertim regionibus, Aëstibus longioribus, quadam his florent, quod anno 1599 & 1603 euenit, & speciosè in horto E. C. Montbelgardenf. in quem varias & multiplices, ex Gallia, Germania, Lotharingia, aliisque regionibus conquisitos flores & furculos transplantari curauimus, magnam etiamnum spem facientes copiosæ messis futuræ. Ita posteritati studendum, etiam in istis. Maturant fructus suos Poma, ac Vernæ quidem seu præcocia, apud nos Iulio & Augusto mensibus, tardiùs, citius, reliqua Septembri, aut etiam tardiùs. Scitotina ad Hyemem vsque ad matrem pendunt gelu maturescantia, vt de Amerinis & Scantianis scribit Plinius. Immo quædam sunt, quæ ne in arboribus quidem maturantur, sed in hyeme demum posita, & diligenter in cella aut alio loco frigidiore adseruata, in stramine, vt solent nostri.

Amat quævis ferè loca Malus, si feruentiora eximas, sed maxime temperata, aut etiam humidiora: non tamen frigidissima, qualia sunt montium celsa, niue magna anni parte operta. Non amant à procellis & ventis vehementioribus percelli, sed statu tepido, præsertim Zephyro, aut etiam paullo frigidiore assenti. Et quæ loca eis conuenientia sunt colles depressiores, & prata rigua, quibus in locis passim in toto Gallico & Germanico tractu conspiciuntur. Rariùs in interiore Italia, & Galloprovincia, ob celi feruorem. Abhorrent etiam loca matima, nec vsquam nobis visa in eiusmodi locis: ac ne in vicinis quidem commodè coluntur. Iam supra ex Theophrasto diximus, montibus & planis gaudere. Lob. & Pena volunt lapidiosa Poma nasci in locis siccoribus. Tamen adhibendus modus. Nam vt Poma non amant imbrim vberterant, ita sanè nec loca calida, vt annotat Scal. apud Theoph. Sunt quidem, inquit idem, Mali in Ægypto, sed nihil melius. Ergo temperata loca querunt, quæ tamen non nihil ad calorem & siccitatem vergant, vt nascantur sapidiora.

Lyb. Ro. m. Nauig. l. c. 6. f. 191. Damasci sunt Poma omne genus suauissima.

Pomis nostris haud absimilis fructus ferunt arua virbis Indiæ Tarnasari. Lyb. Ro. m. l. 6. Nauic. c. 6. p. 255.

F. Broch. In locis ter. sanct. disc. p. 322. In terra sancta inueniuntur rarè Poma, sed à Damasco illuc deferuntur; quæ tamen adeo Solis ardore decocta sunt, vt diu conseruari nequeant.

P. Martyn. l. 4. Ocean. dec. 3. p. 50. vniuersa terra Taja & Maja appellata, est arborifera, vbiue herbida ac perpetuo Vere Autumnoque gaudet. Arboribus toto anno frondet, & Pomifera est.

Io. Bauh. In Burgundia oua Pomaque ne à frigore congelentur, vt audio, in stramen aucuncum recondunt.

Porro quod vires attinet. Hippocrates in secundo de dicta scribit: Mala dulcia ægrè concoqui, acida verò, cæque matura, citius. Succus cori m. sicut vomitum, & vrinam citè: ante vomitum odor ipsorum eundem prohibet. Mala syluestria (de quibus postea specialius agetur) aluum sistunt. Reliqua

Tempus & Locus Malorum in genere.

Vt Poma non congelentur.

Malorum vires & vici.



verò cocta, comesta, magis aluum mouent. Verùm ad Orthopneam, hoc est, respirationem, quæ erecta ceruice fit, & succi ipsorum, & ipsa quoque hausta profunt. Hæc Hipp. Nos verò in tali casu dulcibus malinus vi, quam acidis. Mali omnis folia, auctore Diosc. & flores, & germina, astringunt, maxime Cydoniæ. Et ipse fructus crudus quidem astringit, maturus autem non similiter. Quæ verò per Ver in vigore sunt Mala, bilem inducunt, & etiam neuroso generi incommoda sunt, ac inflant. Melimela aluum molliunt, & lumbricos expellunt, sed stomacho incommoda sunt, & ardorem inducunt. Appellantur ab aliquibus Mala dulcia. Quæ Epitroica appellantur Mala & Romanis orbiculata, stomacho commoda sunt, aluum fiunt, vinam præuocant. Debiliora tamen Cydoniis sunt. Porro ad id, quod Diosc. ait, lumbricos expellere, Marcellus in Græco vitium latitare putat, quando ait, *Dugia demones*, & à Barbaro, & à nobis ad ventris animalia & lumbricos pertinere creditum, parum felici, vt credimus, interpretatione, si rem & vocem æstimemus. Nam (inquit ille) dulcia hæc Mala sunt, mellisq; sapore, à quo nomen inuenerunt, nec videntur posse ventris animalia facile pellere: nisi forte deiectam hoc cibo aluum ea etiam sequuntur. Illud Dioscoridi & aliis scriptoribus omnino non conuenit, quod ventris animalia *Dugia* appellantur, qua voce nunquam veteres vsi sunt, præterquam in bestiis & venenatis illis, quæ iusto morsu venenum relinquunt: Serapionis ætate tamen, hæc erat etiam eius loci lectio & intellectus. Sed cur non conueniat (vt Marcellus putat) Dioscoridi *Dugia* vocare *Dugia*, cum idem fecerit Hippocrates, vt testatur Galenus in Glossis. Sar veneni inferunt, quando putridas febres accendunt, & per eas interficiunt hominem. Deinde per acedens Poma dulcia interanea eiciunt, aluum nimium laxando, vt ipsemet fateatur Marcellus. Quid si descendente Pomorum dulcedinem sequantur odore illeæti vermes, & deinde mutata sede, à natura promptius eiciantur. Quid si & serpentis specie quidam in homine nascantur, quales & Paruæ depinxit? Sed ad Galenum accedamus. Malus, inquit ille, non omnis eiusdem est naturæ, veluti nec eiusdem fructus: quippe quædam Mala dulcia sunt, quædam austera, nonnulla acida, alia extremè exoluta & aquea, & sanè in istis aqueum exsuperat, vt temperies eorum fit tum humidior, tum frigidiore: in acerbis autem terrenum frigidum: in austervis verò tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices foliaque inter se dissident. Itaque si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio influxionem repercutere, ac stomachum, ventremque exolutum ac languidum roborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & gliscientes remittere. Porro quod plurima Pomis omnibus excrementitia frigidaque insit humiditas, vel hinc liqueat, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac vetustatem ferre possit, verum acescant corruptanturque vniuersi. Qua de re prout in alimenta veniunt Poma, perspicue quid iudicandum sit, docet idem in secundo de Alim. Genus Malorum non est simplex, quomodo neque Pyrorum, neque Punicorum. Quædam enim sunt, quæ saporem habent austerrum, alia acidum, alia dulcem, nonnulla etiam ex iis mistum, apparentque & dulcia simul & astringentia. Præterea alia quædam cum dulcedine manifestum habent acorem. Ad hæc, alia cum acore acerbitem. Inuenias autem interdum, & quæ hos tres saporibus simul habeant euidenter, adeo vt acida appareant & dulcia, acerbitateque habeant nonnihil. Perspicuum autem est, quod adstringens, austerrum & acerbum,

tria hæc nomina saporis, qualitatem vnicam significant. Quod verò acerba quidem in eo ab austervis differant, quod valentius adstringant (commune autem ipsorum genus est adstringens) ex 4. l. de simpl. facult. didicisti. Memor igitur illorum scito, Mala quidem quæ adstringunt, succum habere frigidum & terreum: quæ verò acida apparent, frigidum quidem, verum tenuium esse partium: mediâ autem temperaturâ esse dulcia, quæ tamen ad calidius vergunt: quemadmodum, quæ omnis qualitatis sunt expertia, ac velut aquosa, ad frigidus inclinant. His igitur vtæris pro vincenti in saporibus facultate: austeris quidem Pomis cum venterculus vel propter calidam intemperiem, vel mukam humiditatem fuerit imbecillus; acerbis autem, cum duo hæc aucta admodum fuerint: acidis, quando succum crassum, qui non magnopere frigidus sit, suspicaberis in ipso esse collectum, quando quidem succus frigidus non acida, sed acria postulat. Vtraque certe, & acria & acida succos crassos incidunt: in eo tamen differunt, quod illa quidem cum calfactione: hæc autem cum refrigeratione id præstent. Perspicuum quod astringentia quidem, quantum in ipsis est, alui deiectiones semper cohærent: acida verò, cum succum crassum in ventre inueniunt, ipsum incidunt, ac deorsum subducunt, eoque deiectiones humectant. Quod si ventrem purum inuenierint, ipsum magis sistunt. Porro succus dulcis, cum sine acrimonia & crassitie, hoc est, cum solus planè fuerit, celerius quantum in ipso est, distribuitur: quod si acrimoniam aut crassitiam habuerit, citius subducitur. Est autem & aliud succi genus, non in Pomis modò, verum etiam in aliis omnibus, quod aqueum & qualitatis experti appellant, vt ante a quoque diximus. quod stomachum quidem minimum iuuat, in medio autem est memoratarum facultatum, quemadmodum & aqua ipsa. Inest autem Pomis, cuiusmodi id vitium, quod, cum ad mandendum ipsum aut volupitate, aut vilitate adducantur, quando neque gustu iucundum ipsum, neque, quemadmodum astringentia, robur ventri inducere, neque fluentem ipsum sistere compariunt, merito contemnunt: quemadmodum & apud nos quidem in multis Asiæ locis, suisbus ipsis proicimus, *μαλακιστον* appellantes, quod tænera Plantanorum folia (vt iam supra dictum in differentis) gustu quodammodo præstent. Cæterum optima genere Poma non sunt ante colligenda, quam in arboribus maturuerint: concoctu enim sunt difficilia & frigida, tardeque permeant, & prauis sunt succi: vt interim omittam, quod succum etiam habent frigidum ac leuiter crassum. Quæ verò bellè matura in Hyemem & Ver proximum adferunt; ea sæpe in morbis maximum afferunt præsidium, vel cataplasma matris modò cum farina admota, aut in calidis cineribus mediocriter affata, aut pulchre in aquæ bullientis vaporibus percocta. A cibo præterea statim dare ipsa conueniet, nonnunquam autem & cum pane ad venterculum & stomachum roborandum iis, qui deiecti sunt appetitui, tardeque concoquunt, quique vomitu, diarrhoea ac dysenteria infestantur. In hunc vsum acerba sunt apta. Parata enim, vt iam iam præcepi, mediocrem retinent adstrictionem, cum si mediocriter austera fuissent, in eiusmodi apparatus adstrictionem omnem deposuissent, ob idque similia iis euadunt, quæ ab initio sunt aquea. Hæcenus Galenus. De qua re paulò aliter sentire & consilere videtur Aristoteles. Querit namque cur Poma pitius citata non ita reptetionis mole respondeant, quam si possit? An quod cæteris efeculentis, grauius Pomorum genus sit? Idcirco ante cibum ingesta, suo pondere in imum delapsa, superne loci capacitatem desumpturis cibis relinquunt? At contra si possit edantur, innatant, & partem inanem occupant

Dulcia.

Venterculus calidus.

Acida.

Alui deiectio.

Aquea.

Plantanifolia.

Poma immatura notia.

Cataplasma.

A cibo dantur.

Vomitus, Diarrhoea, Dysenteria.

Quæstio.

pant, quoniam promptè dorsum ferri haud possunt. Videtur igitur Aristoteles probare, ut ante cibum s. mantui. Et sanè ipse respondet effectus. Sumpta enim Poma ante cibum, facillimè aluum solunt: at si post cibum, nihil ferè aliud quàm inflant, & status excitando molestiam pariu: stomacho, ut proprio periculo didicimus. Poma sanè sunt fungola & spongiosa, quæ injecta aquæ innatant, contra Pyra r. fidunt, vnde Poma difficulter in ventriculo concoquuntur. Et Hippocrates: Solum (inquit) & languentem vexant Poma: quoniam his deuoratis, corpus humorem haurit. In Autumno verò repleri noxium est, non ob satietatem tantum, verum etiam quòd vitiosi humores inde nascantur, atque flatum quoque excitent.

Paulus quoque Aegineta non omnino consentit Galeno. Is enim vult Mala omnia frigida esse, atque in his exuperare humiditatem, multoque magis illa, quæ suapte naturâ huius habitus sint. Nempe & ceteris omnibus magis præstare, ac in eis aquam minime nocere, quia subtilior, citiusque excernatur, quo fiat, ut minus noceant, nec vique ad eorum particulas tentent. Querit autem Alex.

Aphrodisius, cur Poma noceant? quoniam, inquit, frigida sunt, & humida. Ergo dicere debuisset tantum Philo sophus, non simpliciter nocere, sed frigido tantum, humidoque ventriculo. Calculum etiam gignere prohibentur, si ad satietatem edantur. Ad animi verò deliquia vilia sunt, & cordis debilitatem. Quæ autem nondum ad maturitatem perueniunt, noxium pariu: succum, morbos creant, & horticis causas adferunt. Melioris autem succi, qui maturitatem induerint, ex eodem Paulo. Columella præter vilitatem æconomicam nihil habet.

Mala siccata Mala, aut, in duas vel tres partes diuisa, & in Sole posita, donec alescant, non minimam partem cibariarum per Hyemem rusticis vendicant: nam pro pulmentario cedit sicuti ficus. Istud verò diligenter apud nos præstant attentiores ad rem: & decidua quæque Poma Piræque in segmenta confecant, ad Solem aut in furno torrent, & in aliquot etiam annos adferuant, non sine rei familiaris compendio, si sequenti anno frugum non sit prouentus & quæ vocant Germ. & *quartiers* Galli. Plinius de Malorum vitibus sic habet. Mala verna, acerbis, stomacho inuulsa sunt: alium cogunt, & vesicam circummagunt: neruos lædunt. Cocta meliora. Melimela & reliqua dulcia, stomachum (vexant, adde ex Diosc.) & ventrem solvunt, siccata, æstuosa, sed neruos non lædunt. Valeriana non parum commendatur ad pulmonis & iccinotis affectiones: quæ Domitianus etiam se fertur, de quo supra. Orbiculata sistant alium & vomitiones, vrinæ cient. Sylvestria Mala similia sunt vernis acerbis, aliumque sistant. Sanè ad hunc usum immaturis opus est. Fit vinum è Malorum omnibus generibus. Diphilus apud Athen.

inquit, rec. ncia & immatura Mala prauum succum generate, offendere ventriculum, reliquis cibis innatant, procreare bilem, morbos inuicere, horrores efficere. Ex iis quæ matura sunt, succi laudabilioris esse dulcia, externique minori negotio, quia nihil adstringant: acida succi deterioris esse, aliumque magis tardare. Quorum autem remissior dulcedo est, illa sanè ori placere cum edantur, & ob aliquantulum afflictionem ventriculo prodesse. Orbicata (sic enim vocat, quibus adstrictio iucunda est cum dulcedine, ventriculo conferre, Setania, & Platania quæ nominant, succi bonitate commendari, & propterea quòd excernuntur facili: sed ventriculum nihil iuuare. Philonimus quoque scribit, verna Mala Piræ ægris coqui, siue vtraque nondum matura sint, siue iam ad maturitatem peruenierint. Quod ad facultatem spectat, acidorum & immaturorum

succum reliquis acerbiorè esse, & aliquantulum æqui, id est, mordacem, illaque succum præstare corpori, quem radentem aut lancinantem (*Exradit*) vocant. Itaque Mala Piræ in totum difficili: coqui, & si quis pauciora Mala comedat, in illis conficiendis plus laborare: si plura idem Pira sumpserit, minus. Radentem, qui ex ipsis gignitur, Praxagoras succum appellat. Quæ quidem à ventriculo tum Pira, tum Mala percocta non fuerint, ea crassiores succum præbent. Est igitur à nobis demonstratum, in vniuersum coqui difficultis Mala, quàm Pira: tum etiam quæ acerbis sunt, solere crassiores succos gignere.

Ceteris stomacho aptissima ex Pomis, dicit Malum Orbiculatum, aut Scandianum vel Amerinulum. Ex recentioribus probatur nobis Tragæ diligentia, ipsis etiam Medicis phaleratis annularisque imitanda, qui è vinosis Pomis Eleusiarum non aliter atque è Cydoniis præstantissimum conficit, quod & palato quàm gratissimum est, & in ardentibus febribus quàm accommodatissimum. Nam sitim restinguit, & languescentem appetitum inuitat, ægris quandoque gratius, quàm alia quæcumque leplasiariorum confectio. Acida (inquit ille) Poma ventrem inhihent, vrinam pellunt, vomitiones eructationesque stomachi cohibent, id quod sylvestribus potissimum adscribendum fuerit. Omnis generis Poma in classes, sapores secutus, digerit. Dulcia Poma, ut scribit Dod. minus frigida sunt ac humida, carnis suæ soliditatem hæc cocta retinent, alimentum conferunt amplius, ac minus humidum, quàm cætera Poma: minus faciliè per ventrem etiam descendunt: Acida frigidiora sunt, tum & humidiora. Horum coctorum substantia diffiluit, nec soliditatem suam retinet: alimentum parcius subministrant, idque erudum ac frigidum. Ita verò & faciliè & citò delabuntur, ut etiam remorantem alium promoueant, præsertim ante alium cibum assumptum. Acerba aut austera Poma, ut sunt sylvestria, ac immatura, frigidiora sunt: succum ingenerant crassiorum, ac omnino flatulentum. Minus nocent, si citò ac velociter deciderint. Si hæserint, status gignunt, ac colicos adferunt dolores. Quæ inter hæc medijs sunt saporis Poma, ac non raro duarum aut trium qualitatium gustum referunt, vincentis saporis facultates præcipue obtinent, aliarum verò particeps sunt. Præstant autem semper crudis Poma cocta, quorum malignitas sæpè numero non modò per ignem emendatur, sed & additis vel aromatis, vel aliis corrigi potest. Prodesse autem possunt Poma ventriculo calido: austera verò etiam calore languentem ac resolutum roborare. Succus Pomorum odoratorum, ac medijs saporis, compositionibus nonnullorum medicamentorum impensius rescantium inditur ad eorum nimiam qualitatem remittendam, ut sunt Serapium ex Pomis Regis saporis, Antidotum ex granis Cocci baphici, & si quæ sunt alia. De Serapij conficiendi ratione & vsu, multa habes apud Practicos, speciatim etiam apud Amatum Lusit. Conficitur verò & cum ejusmodi Pomis vnguentum ex adipè porcina & aqua rosacea, cuius ad nitorem faciei & aduersus cutis asperitatem vsus est. Etiam si autè facilius concoquuntur dulcia Poma, si tamè, ait Matth. in calidiori temperamētū ventriculi ingerantur, faciliè in biliosos conuertuntur humores. Succus è dulcibus Pomis expressus cum liquore stillatitio Buglosi mistus, contra melancholicam prodesse, sanguinem obsecrum clariorem reddit.

GESN. l. 3, ep. ad Contr. Forerum p. 127. 6. Poma non nisi dulcia & cocta edat interdum mulier melancholica. Acidodulcia bene matura, per Hyemem & in vernum vsque tempus conseruata, non improbantur: ægrotis quoque vilia, tum elixa, tum assa. Omnibus autem ferè Pomis commune est, quòd succus

Eleusiarum  
Pomis.

Acida.

Dulcia.

Acerba &  
austera.  
Sylvestria

Medij saporis.

Correctio.

Ventriculi  
calor.

Serapium  
de Pomis.

Vnguentum  
ad faciem.

Melischolla.

Acidodulcia.



# LIBER PRIMVS

succus expressus admisto pauxillo Croci ebibitus, veneno aduersatur, & ventris animalia pellit. Pūctiōibus lateris Camerarius Cataplasma inducit ex pomo dulci, cui thus contusum inditur, vt simul assentur. Idem ad pulueris Pyrii empyreuma ex tinguendum, pomum dulce in Plantaginis latifolia aqua coquit ad tabitudinem, dein cum lacte factō cataplasmate vulnere inducit. Parci experimentum est, si Fullo vermiculus (quem Ohrenmittel siue Ohrengrübel Germ. vocant, Galli *perce-oreille*) intrepit in aurem, applicetur media pars Pomi dulcis, cuius odore ille cūus pro dicit vt rodatur, & auris liberabitur vermiculo. Nos in quotidiano vsu habemus, & magni facinus experimētum quod ē pomis in aqua coctis paratur, & pulmenti specie oculorum inflammationibus imponitur. Possunt & ex lacte coqui vel caprino vel muliebri, vel ex aqua rose, euphrat. aut alia aqua frigida. Cuius rei testis est Arnold. de cur. morb. ad dolorem, inquit, oculorum, cū dorem, ardorem, & ex calida causa humorem, Malum bene maturum adiectis feminibus in aqua diligenter coquatur, tundatur, & addito lacte mulieris supra pannum lineum extendatur, clausisque palpebris supra oculos ponatur. Ego tamen feliciter sapidius hoc medicamentum in experitis sum etiam sine lacte. Hydropicus Afciticus corripiebatur anhelandi difficultate, suffocationis periculum præ se ferente, eaque non tam inter comedendum, quàm per somnum, vel dum obdormiscere conaretur: at is sedari sibi [ex Schenck. Obs.] itatum symptomata hoc affumabat, quamprimum crudi Pomi frustulum vnum atque alterum deuorat. Hinc Gess. in vitis pulmonis, & dyspnoe Malum assum, excavatum & drachma Thuris repletum fœtus cū succellu comendendi dicit. Cōmenduntur & Pomorum cortices sicari & accensi ad corrigendum acrem tempore pellis. Ipsius verò arboris folia cūm altitngendi & refrigerandi dote polleant, incipientibus inflammationibus cataplasmati specie confusa atque concessa vtiliter adhiberi possunt. E floribus aqua stilliticia elici potest, quæ bluta sapiculè ac in multis dies facies, à rubedine & maculis rubris seu pustulis liberatur, vt scribit Tabernamontan. Paratur etiam eadem arte aqua ex ipsis pomis ad Colicacos & Dysentericos affectus vitis. Tragus quoque annotat è cereo cortice Malurum cocto, addito alumine colorem leuitem confici ad tincturas. Rustica gens Silesiaca è tuis & aqua persufus pomis, atque expressis potum conficit, quem *Apffeltranc* vocat: Schvvenckfeldius. Idem & in aliis locis parari solet, & apud Helucios nostros, etiam sine aqua. Et quod ad Malorum quoque historiam faciat, mirum quod annotat Curtius audiuissē se à præclaris viris, apud Tholofates hominem non plebeium fuisse, coram quo si poma cruda apponerentur, statim deficere solitum: nonnunquam etiam cum vite periculo, ni illi extemplò succurreretur. Nos quoque quibus afferrent Mala fastidium plures nouimus. Sed harum rerum causas neque nos scimus, neque scire labores tu. Insignem antipathiam aduersus Poma obseruauimus in Nobili Ill. E. C. V Virtemb. Alſato. Ita enim horrebat Pomorum odoratum, vt ne ferre quidem posset habentes: qua arte speciatim ego [Bauhini] vt eluderem casci amorem, quo ipse delectabatur: ego verò horreo simili antipathia Poma postulatam, illo petēte caſeo. Ita mutua vtriusque cautela res cuique aduersaria denitata. E contra tam mirè delectatur Pomis, Medicus quidam haud vulgaris, iam

Tom. I.

sexagenatis & amicis singularis, vt singulis partibus, quotiescunque offerebantur, aliquot mēſa innoxie voraret. Ast meo sanè periculo didici fungosam pomorum substantiam ventriculo frigidiore atque etiam intestinis haud esse commodam, nam præterquam quod diu in ventriculo obhæſcit, flatus excitat atque dolores. Quæ res tandem effecit, vs & coctus, & crudus in totum abſtinerem. Pyra siue cruda siue cocta facilius fero, meliusque digero. Summè recrebatur pomis Domitianus Imperator. Ad satietatem enim pransus non temerè quicquam super cenâ præter Martianum Malum, teste Suetonio, & modicam in ampulla potiunculam sumpſit. Monendi principes, ii præsertim qui infidius obnoxii, ne temerè & inconsideratè comedant Pomi, ne illis eueniat, quod Clarindæ quondam Principissæ Mantuanæ. Quippe Adilon Princeps Italianæ nescio qua zelotypia commotus erga D. d. d. legres Gallum, diu multumque, maximèque sumptibus modum intoxicandi hunc querens, tandè hunc inuenit, vt per pediculum Pomi virus imperceptibile inderet, Pomumque præcipuè elegantè offerret. At is Pomi venustate potius, quàm dolo commotus abstinit ab eius morsu ac prædictæ principissæ offert. Illa subito comes les paulo post oculis cruciatibus fatigata, facieque miserè interit. Fertur sanè Ill. Chriſtoph. V. Virtembergicum fuisse Pomo intoxicatum. Modum iusserendi venena Pomis vel adhuc arboribus suis hærentibus, nec annotare lubet, nec scriptis prodere integrum. Facile inueniet modum indendi cui venen: parandi virus notum, nec odore, nec sapore aut colore se prodens &c.

Nunc quod reliquum est, si velimus iudicium ferre de vino Pomorum, [Cidre] habenda (teste Nic. Abr. è Framboſiere) ratio gustus, ætatis, & compositionis. Gustus non solum pender à Pomis ex quibus paratur, dulcibus, aut acilibus: verum etiam ab ætate. Succus enim confusus mutat cum tempore laporem, postquam defæcatus acquirit alium, quàm habebat primum. Vinum Pomorum dulce, propter dulcedinem, quæ provenit à colore temperato, modicèriter caleſcit, & minus cæteris refrigerat, plus nutrit, estq; salubrius, potissimè in his, quibus ventriculus frigidus est & siccus. Acidum verò siue confectum sit ex Pomis acidis, siue succellu temporis acidum redditum sit, quia valde aquosum & nonnihil terreste, adtingens & corroborans, nihilominus tamen tenue & penetrans, singulare est pro temperando calore ventriculi & hepatis & sanguine feruido & bilioso: ad vomitum compescendum & defluxiones bilioſas, ad sedendam sitim, ad incidendum humores crassos & viscidos. Asperum, quia valdè frigidum, & siccum non vtile nisi cum succellu temporis, vbi acerbitatē derelinquit, & magna frigiditas & siccitas, mutata in minorè frigiditatem cum aliqua humiditate mixta, vt dulcedine aut aciditate. Roborat quodammodo ventriculum languidum & relaxatum, compescit nimium vomitum, & omnes alui fluores, sedat palpitationem cordis & lipothymiam, concoctionem iuuat potum in fine pastus, dilutum pauca aqua, vt minuatur pondus & distributionis tarditas. Quod ætatem attinet Vini Pomorum. Insalubre nuper paratum, adhuc turbidum & non defæcatum: laedit ventriculum, excitat dolores capitis, obstructions generat. Ventum & acellens non minus nocuum prædicto, id igitur bibendum, quod repurgatum & medicosis ætatis. Compositionis habitū consideratione, id semper

Malum  
Martianum  
Domitianus  
Cario.

Historia  
data Venen  
in poma

Vina pomorum.  
Cidre.

Pomorum  
succus.

Vinum  
Pomorum  
dulce.  
Vires  
Acidum.  
Vires.

Vinum  
asperum.

Vires.

Actas  
Recenti  
nocuum.  
Potissimum  
nocuum  
Delectus  
Vini pomorum.





quàm montosis, & tam montanis atque syluosis, quàm campestribus, & frequenter secus vias & sornitas. Thomas Hariot in historia Virginie insula scribit, Poma syluestria, seu vtilē vocat *Pomes sauvages*, similia Anglicis ibi nasci.

Etiā de syluestrium viribus inter satiuā quædam sparsim dicta sint, tamen libet hic specialiora quædam assignare. Syluestria Mala, autore Theophr. odoratissima sunt & acerbissima, cui ex parte etiam subscribit Hermolaus, qui odore acutiora dicit vrbis, quod concessimus quidem, sed non odoratiora, nisi per syluestria Poma, montana intelligas, vt Theophrast. intelligi posse videtur, cum non erunt simpliciter syluestria. Dioscor. syluestria Mala vernis similia scribit, & astringere. Et addit, oportere ad ea, quæ adstrictione opus habent, omnibus immaturioribus vti, quasi insinuare velit, immatura syluestribus esse vi & facultate succedanea, vt reuerse res habet, Omnibus porro syluestribus succus vehementer austerus est & acidus, ex quo & hic Montbelgardi & passim in Gallis, vbi pioeuunt, succum Omphacinum prælis expriment, quem repositum per annum aut etiam plures asservant: nam vim acquirit acis, quo in cibis vtuntur, eius loco, existimantes speciatim pisces ex eo coctos firmiores fieri & lapidiores, quod & nobis probatur. Verdius vocant. Picardi etiam potionis genus ex iis parant, quo vtuntur vini loco. *Piquette* vocant. tale parant etiam Montbelgardenes & Vicini Burgundi, vocant *Picasse*, magnos vsus habens in re coquinaria ad *epibazum* & intinctus varios, potissim ad coquendos pisces, quos sua adstrictione & aciditate firmiuscula carne reddere nouimus. Ipsa autem Poma aluum sistant immatura, cocta verò mouent, vt scribit Curius: quorum succi si sumantur, rectam spiritus angustiam leuant. Stomacho inutilia, aluū & vesicam circumagunt, neruos ledunt. Vtilia sunt ad impinguandos fues, quod in defectu gladium apud nostros fieri solet.

Superesset, ne alicuius obliti videremur quod ad Malorum historiam pertineret, vt aliquid etiā addideremus de Mali morbis, vt vermiculatione, & aliis: vt & earum purgatione, & situ, de quibus Theophrastus, & ex eo Plinius satis copiose scripsit, & Scaliger suis annotationibus illustrauit. Mali etiam quomodo inferenda, & quando, quomodo putanda, colenda, quā ratione cauendum ne fiant caduce. Sed ne in immensum nostra excreseat historia, & vt Lectoris compendio consulamus, eundem ad Plin. Colum. Pallad. Petrum de crescentiis, Conradum Herespach, Ruellium, & alios, qui de hac re scripserunt ablegamus. Apud eosdem inuenias, Mala quomodo colligenda, reponenda & conseruanda, aut etiam condenda.

Car. Stephanus speciatim aceti rationem parandi docet ex malis syluestribus. Item quā ratione Mala rubra facias. Item dulcia quomodo fructifera reddenda, & inferenda: ut Malus in Cotoneam, satiuā in satiuā, syluestris in syluestrem: vt Mala saporem quatuor diuersorum habeant Malorum: ut fiant dulcia & acida: Pyra & Mala in eadem arbore: quæ omnia diligentissimè persequitur. Denique Colerus quoque magna diligentia in suo diario Oeconomico, & quædam etiam mirabilia prodidit. Quomodo curandus Morbus Germ. *Vitæ* dictus, id est, vipera, qui Malos infestat. Vt Mala fiant rubra cum sanguine Lupi piscis: Quomodo Mali inferenda Alno, Sorbo aucupariæ, Ceraso, Salici, Populis: Pyrum & Malum inserta eidem trunco, v-

Tom. I.

namquamque suum ferre fructum, sed Mali fructum non diu suum ferre. Item inferi Malum in Brassicam & Vitem, & alia multa, vtilitatis & iucunditatis plena, quæ hic curiosius persequi non est nostri instituti, quod in alio Opere fortè agemus. Varios modos recondendi & referuandi Poma habes in cap. de Pyris, quos & ad Malos referre possis, Aug. Gallus censet non prius colligenda Poma vel Pyra, quàm ter aut quater priuam senserint, q̄ de hyemalibus intelligendum.

## DE MALIS SYRIÆ ET GOMORRHÆ

### CAP. II.

Magnum quidem & admirandum, quod auctores nonnulli, inter quos Iulius Solinus, grauis certè autor, de Pomo quod in sinu Iudeæ Gomorrhæ gignitur, memorant: quod licet maturitatis præ se gerat speciem, mandati tamen non possit. Nam fauillaceam intrinsecus fuliginem, ambitio tantum extimæ cutis cohibet, quæ vel leui tactu pressa, fumum exhalat, & in vagum puluerem fatiscit, & cinerefcit, vt oculis tenus placeat. Id verò multi è nostris Theologis, in memoriam & vltionem criminis posticæ Veneris, quo incolæ regionis, Pentapoleos tam fediter & communiter laborarunt, esse arbitrantur.

## DE MALO COTONEA. CAP. III.

### COTONEA MALVS.



MALVM COTONEVM.



C 1

descriptio  
Lignum.Cortex.  
Folia.

Flos.

Fructum.

Semina.

Radix.

Sap.

Cotonea et  
Saurina si-  
gnaturae as-  
signant.Nomina.  
Arbor.  
Cotonia.  
Cydonia.

Fructus.

Malum a-  
stiumum.  
Malum  
caninum.

**M**alus Cotonea, pusilla arbor est, ligno con-  
torto, intus pallente & albicante firmo fa-  
tis & aequabili, cortice obrecto mediocri non ri-  
moso nec valde scabro, infernâ parte suffulco, su-  
perne subcinereo, lauiore atque glabro. Folia ge-  
rit Malo vulgari aequalia, nulla in ambitu crenâ  
incisurâve dissecta, pronâ parte cana lanugine v-  
bertim obstita, supina verò viridantia & laui fe-  
rè, rariùs [ & non nisi tenellis foliis ] lanuginosa,  
quæ lanugo facilè affricu digiti deraditur : flo-  
res non multi simul vt in Malis, sed in furculis  
singulares, Rosis sylvestribus per similes, quin-  
que foliis subrotundis, ac semuncia latoribus,  
carneo colore præditis constantes, in quorum  
medio stamina multa purpurascencia apicibus  
luteolis : flori autem toti sub sunt quina folia ex  
viridi canescencia, villosa, quæ postmodum fru-  
ctuum pythmenâ foliatum efficiunt. Sub illis la-  
nuginosum quid extuberat, futuri fructus rudi-  
mentum, quod cadentibus florum foliolis incre-  
mentum capeffit, donec fructus perficiatur, ma-  
gnitudine Mali, figura varius, turbinatus, & to-  
tulus eminentibus tuberosus, paruius, magnus,  
mediocris, densa lanugine rasili obductus : pul-  
melina, odora, adstringente, & subacida. Semina  
in ipso Pomi centro, quinque cellulis distinctis  
continentur, cortice spadiceo, medulla alba, Pyri  
seminibus non multum dissimilia, viscido qua-  
dam lentore lubrica, quem in aquam deiecta de-  
ponunt, & ipsam mucilaginosam reddunt. Ra-  
dix copiosa, fusco cortice vestita, aliâ recta, aliâ  
obliquè acta, è cuius summo multi stolones vir-  
gati sese exerunt.

Scrutur auulsiōne, insitione, viuiradice, ramu-  
lis & taleis. Ipse verò fructus ex arbore pendens,  
incuratus trahit ramos, prohibetque crescere  
parentem, vt Plin. ait : habetque hæc arbor om-  
nium Malorum infima, omnium Malorum maxi-  
ma, vt Gotopius annotat. Democritus Cotoneū  
cuiusvis animantis effigiem representare promit-  
tit, si in formulis insculptis clausum adolescat. Dif-  
ferentias postea describemus.

*Malus Cotonea*, quo nomine primus Cato ap-  
pellasse traditur, & *Cotonea* simpliciter, aliis *Cydo-  
nia* à Cydone Crete oppido, vnde primum adue-  
cta putatur, vnde Serenus :

*Aut qua poma Cydon Creteais misit ab oris.*

De qua re postea fusius agitur. Platina etiam Co-  
ctonia vocat. In officinis *Citonia*. Græcis *κυδωνία* vt  
Theophr. & *κυδωνία* *μηλιά*, cæteris. Germ.  
Quitten, oder Kittenbaum / Belg. Cucappelboom  
Cucperreboom. Gal. Coingier, Coignacier. It. Co-  
cognaro. Hisp. Cod. nero. Ang. Quince tree. Fructus

*κυδωνίου μήλου*, Cotoneum & Cydonium malum.  
Lonic. putat Cotonea dici, quia lanugine [ quæ,  
vt ille ait, Coton Græcis est ] tecta sint : [ & vt C.  
Bauh. scribit, ] quia Cotonè seu lanâ tecta videan-  
tus. Verùm apud nullum hætenus probatum  
Authorem legimus, Coton vel Cotonem, aut  
Cotonea esse Lanuginem, sed barbarismo eâ voces  
ex Gallico & Italico mutuata videntur, quibus  
Coton gossipium est, quod nec ipsum quidem  
quis propriè lanam dixerit. Aliis Codymalum, si-  
ue Cydomalum, vt Cretensibus, vt dicitur postea,  
quod Galeno *κρτ' ἑρχλιδ*, & per excellentiam di-  
citur *μήλον χρ' ὀπίου* c. i. & apud Diosc. *μηλίον*, meli-  
num vnguentum Plinio, quod ex Cotoneis pa-  
ratur, & vinum quod *μηλίον*, & *κυδωνίον* vocat. Iu-  
lius Pollux æstiumum Malum. Virgil. Malum canum  
*ἀειθαλές*. Eclog. 2.

*Ipse ego cana legam tenera lanugine mala.*

Et alibi: Aurea Mala:

-- Aurea dura,

Mala ferant Quercus, &c.

Et Eclog. 3.

*Quod potui puer, syluestri ex arbore lecta,  
Aurea mala decem misit, cras altera mittam.*

Et rursus. roscida Mala: Eclog. 8.

*Sepibus in nostris, parum te roscida Mala  
(Dux ego vester eram) vidi cum matre legentem.*

*Alter ab undecimo tum me iam ceperat annus.*

*Iam fragiles poteram à terra contingere ramos.*

Quæ quidem Virgiliana nobis videntur de Malo  
Cotoneo intelligenda, & perperam à nonnullis  
ad Mala Punica referri.

*Aurea poma manu, &c.*

dicit Ouid. Metam. 10. *μήλα δὲ χρυσά τ' ἄρα*. Mala au-  
rea & coloris aurei dicit Seruius, vnde Martia-  
lis:

*Cecropio saturata Cydonia melle.*

Friscus ad Eclogas addit: Græcis *χρυσά μήλα*, aurea  
Mala, & citra Mala esse ein Art der Füttenen/  
schön Goldgecl. *μήλα χρυσά* Diosc. Ob huius fru-  
ctus & formosam speciem, & amplitudinem in  
arbore tam parua nascentis, ac tenui, Tryphon  
Medicus apud Plutarch. 5. Sympo. Malum ab Ho-  
mero dictam fuisse *ἀνδρόκαρπον* commemorat, tam-  
erit de Mali Citreæ fructu id potius explicandum  
putet Dal. Quodd autem Mala aurea, Cydonia  
sint, multi probare satagunt, ex Herculis signo,  
ante ætatem nostram Romæ desosso, manu tria  
mala cotonea tenente: videntur nunc Romæ in cu-  
ria Conseruatorum. Curtius. Nota autem est fa-  
bula de Hesperidum hortis ab Hercule spoliatis.  
Herbarii ferè omnes prædictis vulgaris nomini-  
bus tam Græcis quam Latinis vocant: Sed in de-  
signandis distinguendisque Veterum differentiis  
non benè conueniunt, vt patebit. Arab. *Saffar-  
Saffargel*, vt est apud Serap. Germ. Quitten / Fütten-  
n / Quittenapfel oder Füttenapfel. Qui-  
buldam etiam Goldapfel, quasi aurea mala. Gal.  
Coing, & Pomme de Coing. Ital. Pomo d' Melo Cotogno.  
Hisp. Coloyas, Membrillos & Marmellos. Anglic.  
Quince / Quintette, quæ tamen posteriori no-  
mine appellantur. Pyris similia dicit Turne-  
rus, quàm Malis Cydonia. Belg. Cucappel / &  
Cucper / quod posterius cotoneum Pyrum de-  
notat. Bohem. Föaule.

Porro de aureis & Hesperidum malis multi  
multa. Doctissimus Goropius vult nihil esse aliud  
quàm Cydonia Mala. Quæ igitur Aurea mala  
sint ex Plinio discamus, qui inter Cydonia & la-  
Chrysoloma vocat, quæ cæteris colore præstant.  
Satis perspicuum esse puto Cydoniorum genus il-  
lud, quod aureo colore maximè est insigne, aurea  
Mala esse, idcirco Mala Hesperidum, ostendam  
tamen quid Propertius de Virgili aureis Malis  
fenserit: cuius iudicio qui stare nolet, is cadat in  
quot velit errores. Eius versus sunt ad Lycen:

*Vtque decem possent corrumpere Mala puellam, &c.*

Felix qui vilis Pomis mercaris amres.  
Quis hinc non videt, vilia Poma fuisse, quæ aurea  
Virgilius vocauit. Minimè verò ex Assyria vlque  
& Media aduecta. Non esse autem Scandiana, aut  
Matiana, aut Melimela, idem in eo carmine clarè  
demonstrat, dicens:

*Illu pompa fuit, decussa Cydonia ramo, &c.*

Succinat Propertio Palladius.  
Cum præstet cunctis se iulua Cydonia pomis, &c.  
Eadem & Columella habet, qui Plinium præcel-  
serat, & Chrysoloma vocat, vt iam dictum. His  
igitur autoribus qui nondum credit aurea He-  
speridum mala, magnum inter cætera Herculis  
ornamentum, Cotonea mala esse, eum dignum  
iudi-

Mala au-  
rea.

Aglacar-  
po.

Mala au-  
rea & He-  
speridum.  
Chrysoloma.

Mala He-  
speridum.

Vilia Pomæ

Mala He-  
speridum  
aurea.



iudico, quem Pomona pascit. Sic legimus Poma Veneris donum esse gratissimum. Hinc Philotas:

Μῦθα Διόνυσον δίδωμι ἀπὸ τροπαίων:

Quā de causā Theocritus:

Μῦθα μὲν τὸν ὑλοποιεῖ Διόνυσος φυλάσσων.

Hinc & illud *παρὰ πλουτίης δὲ μάλα* &c: Ad quem locum interpres Malum Veneri Sacrum dicit. Hinc & illud apud Eustachium, nescio an ex Anacreonte:

Μῦθα ἱέρως ἰδὲ στυγῶσι &c:

Et illud Aristophonis ex Nephel.

Μὴ φέσω παρὶς τοῦ βληθῆς &c:

Quamobrem non otiose ab Homero factum, quod in Phæacum hortis dixit *μὴ εἶναι ἀγροκότες*, vitiam supradiximus: & iccirco Malum à Paride datum pulcherimū. Quod verò non generatim quavis Mala Veneri aequè grata fuerint, sed Cydonia, præ cæteris omnibus Stethichorum fati indicat in Helena, ubi commemorat in regis Currū, multa quoque Cydonia coniecta fuisse. Ita Antiphyli epigramma quo Struthion (Cydonii species, de qua mox) ad Venerem suam fuit, sic incipit: *μήλας ἐν γὰρ σφύρακι* &c: Item Zonar in Epigrammate quodā *ἀντιχρον τὸ δὲ μήλας*. Philippus *μήλας δὲ ἡδύστενον* &c: Virgilius eadem ipsa cana dixit, id est albā lanugine vestita, vitiam dictum. In Saxonum verò historia legitur, Veneris in ipsorum regione simulachrum fuisse, quod tria aurea Poma teneret; quæ res cum Cypria Malo ab Ovidio descripta egregiè consentit. Porro Cydonia & Citria nomina nec Græca nec Latina videntur.

Nam quod à Cydone Creta vrbē deriuat, id faciunt non tam quod ita sit, quā quod, nisi id ex allusione vocum inuenissent, nihil haberent, quod nomen referrent. Quod si à Cydone nomen traxisset, nemo putō id melius scire potuisset, quā ipsi Cretenses. At hi hæc Poma non Cydonia sed Codymala vocant: cuius rei testis est Hermon in linguis Creticis. Apollodorus item & Sosibius Codymali nomine Cydonium intelligunt. Nec Veneris apud Ouidium narrationi conuenit aurea Mala primū ē Cydone Cretica venisse: Alamanis hoc *Βύττε* vocatur, & eodem nomine apud Cymbros membrū muliebri intelligitur. Iam quicquid de Veneris Malis apud Antiquos legimus, id ad Cotonea Mala referendum, ut modo ostensum. Et *μαροβολέον* apud Græcos, non, ut vulgus Grammaticorum opinatur, à quouis Malo traxit originem: sed à Cotoneo.

Theocritus, & Aristophanes vocant *μήλα* & *μήλα*, uti & Virgilius, quod Cydonium dicitur.

Vidimus Mala Veneris pudicæ Symbolum principiò fuisse. Quid quod ipsa tellus, fecunda omnium mater, Mala aurea pro nuptialibus donis Ioui & Iunoni contrahentibus protulerit, ut in Aegyptiacis suis Asclepiades prodit. Cydonei & Cotonei, inquit Goropius, nomenclaturā ab eo vocabulo, quo nobis muliebri membrum notatur, deriuantur. Item: Malum quoduis Pomum dici potest: sed dum solum ponitur pro Cydonio maxime accipitur. Hinc oleum Melinum. Item: Hemolus, si rectè memini Nerantii nomen deducit à Narantia, è qua vult Herculem aurea Mala portasse, quod quia Virgilio & veritati repugnat qui Cotonea docet aurea Mala vocari, vanum exitum. Haecenus ex Goropio. Transcamus ad differentias, non idēd omittentes, si quid occurrat quod ad nomen, & differentiarum, ipsūque adeo rei intelligentiam faciat.

Tom. I.

Theophrast. Cydonii meminit quidem, verūm non distinguit, sed ait Cydonium Malum aliquādo fieri ex struthia. lib. 2. hist. pl. cap. 3. *ἐκ στρυθίας καὶ δάφνης*. Sed ex ipsius verbis faciliè colligere est, eum struthia pro nobiliori, & satia habere, Cotonium verò quasi ab ea degenerare. Dioscor. expresse Cydoniorum duo genera facit: Vera [ *ἀληθινά* ] rotunda, parua & odorata: quæ verò Struthia [ seu ut alii legunt Struthea ] dicuntur magna quidem sunt, sed minis vitia. Columella tria: *Struthia*, *Chrysmela*, [ quidam perperam Chrylomeliana legunt ] & *Mislea*: quæ omnia non solum voluptatem, sed etiam salubritatē adferunt. Plinius: Cydonia incuruatos trahunt ramos, prohibentque crescere parentem. Pluracorum genera: Chrysmela incisuris distincta, colore ad aurum inclinante. Quæ candidiora, nostratia cognominata, odoris præstantissimi. Est & Neapolitanis suis honos. Minora (leg. Maiora ex Gal. & Dioscor.) ex eodem genere Struthia, odoratius vibrant, ferotina proventu: præcoci verò Muslea. Struthis autem cotonea infita suum genus facere Mulianum: quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua Syluestria, à Struthis odoratissima, in sepibus nascentia. Galenus quædam Cotoneorum dulcora, ac minis acerbā esse scribit, quæ in Asia Struthia vocantur. Idem alibi Cydonia à Struthis, quæ etiam Struthiomela vocant, manifestè distinguit: Cydoniorumque succum nuncius esse suauē asserit, & maxime adstringentem. Athen. Struthiorum meminit & Phaulorum, & Cydoniorum, horum genus quoddam Struthia esse inueniens, & Phaulia. Nicander Thyateirensis, ut idem scribit, Cydonia Mala Struthia vocari tradit, sed ignoranter. Refragatur enim quod Glaucus memorat, dum ait: esse præstantissima Cydonia mala, Phaulia, & Struthia. Cydoniorum malorum Stethichorum in Helena meminit.

Multa Cydonia tum mala iaciebant in sellam regi.

Multa etiam Myrti folia, rosarūque ac Violarum elegantes coronas.

Alcman:

Cydonia Mala Cantharus asserunt, quæ magnitudine sunt mammis paria. Philemon in Rustico, Cydonia mala Struthia vocat. Hermon in Glossis iudiciariis Codymala vocari tradit mala Cydonia. Polemon libro quinto vii operis ad Timæum [ alii Contra Timæum Dal. ] huius genus esse Codymalon ait. Alcman verò cum inquit, Struthium minus, vel Codymalum: Apollodorus & Sosibius Cydonium malum interpretantur. A Struthio differre malum Cydonium Theophrast. historia libro secundo palam facit. Hæc Athenæus, qui paulo post addit, Androtonem in Georgico Malos Phaulias, Struthias etiam vocare: non enim malum in Struthis decidere à pediculo ( Phaulis namque ac Struthis id commune fuit, quod fructus à suo pediculo non discederet. Dal.) Vernas autē Malos Laconicas & Siduntias lanuginosas appellare, quod earum vel fructus, vel folium lanugine pubesceret, ut annotat Dalech. Ergo habes ex Athenæo, *καὶ δάφνη, φαυλία, στρυθία*, & quomodo Veterum quidam has voces acceperint.

Sed in designandis differentiarum nominibus non consentiunt. Dioscor. enim Struthia vocat illa quæ sunt magna. Plinius verò minora, nisi mendolosus sit codex, & pro minora legendum sit maiora. Nam & Galenus maiora Struthia dixit. Ex Athenæo verò nihil certi colligas, qui aliorum

17. J. J. J.

Cydonia Vera. Columella correxit Struthia.

Chrysmela.

Candidiora. Neapolitanis suis honos. Minora (leg. Maiora ex Gal. & Dioscor.) ex eodem genere Struthia, odoratius vibrant, ferotina proventu: præcoci verò Muslea. Struthis autem cotonea infita suum genus facere Mulianum: quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parua Syluestria, à Struthis odoratissima, in sepibus nascentia. Galenus quædam Cotoneorum dulcora, ac minis acerbā esse scribit, quæ in Asia Struthia vocantur. Idem alibi Cydonia à Struthis, quæ etiam Struthiomela vocant, manifestè distinguit: Cydoniorumque succum nuncius esse suauē asserit, & maxime adstringentem. Athen. Struthiorum meminit & Phaulorum, & Cydoniorum, horum genus quoddam Struthia esse inueniens, & Phaulia. Nicander Thyateirensis, ut idem scribit, Cydonia Mala Struthia vocari tradit, sed ignoranter. Refragatur enim quod Glaucus memorat, dum ait: esse præstantissima Cydonia mala, Phaulia, & Struthia. Cydoniorum malorum Stethichorum in Helena meminit.

Struthiomela.

Struthia. Phaulia.

Codymala.

Struthium.

Phaulia.

Mala Laconica Siduntias lanuginosas.

tantum placita recenset. Notat tamen Alamanum Struthium minus dixisse, ex sententia Apollodori & Sosibii. Hermol. sic habet: Genera eorum Chrysomela, hoc est aurea mala, incisuris distincta. Nostra candidiora sunt, odoris praestantissimi. Neapolitana ex eodem genere minor, odore vibrantia, prouentu serotino, quae Struthea nuncupentur, sicut quae celeriter mitescunt & praecocia sunt multa. Vides cum Plinii lectionem & sententiam secutum. Aëcius: Struthea, inquit, dicuntur, quae magna sunt & suauiora, minusque acerba. Eiusdem sententiae & Theophrastus fuisse videtur ante hos omnes. Nam ubi de arborum degeneratione scribit, ait ex Struthiis fieri Cotonea, quemadmodum Pyrum vitatum migrat in Pyrastrum. Eiusdem sententiae & Mar. Virg. est. Nam postquam Herm. Barbarum reprehendisset, quod τὰ ἀγρία, id est, quae vera Cotonea sunt [id enim ἀγρία significationem] verisisset Alerchina, quasi genus quoddam prauitatem indicaret, ait: nullibi haecenus id à se inuentum, quod nec ipse inuenisse se testetur: Nos [addit] ex communi eius vocis in Graecis significatione vertimus: probari quae vera Cotonea sunt: nam Struthia cognata magis, quam eadem sunt. Nec aliud inter Cotonea vera & Struthia discrimen esse ostendit, quam ex forma, magnitudine & odore. Meturia Pyri & Mali discretis appellationibus indicat: quae rotundiora & minora sunt, à consimili figura, Mala: quae verò maiora & oblongiora, Pyra appellans. Licetque in his variare Antiqui Scriptores videantur, vna tamen omnium ratio est, & quae tota huc refertur: indicatque id Theophr. lib. 2. de Plant. hist. qui cum de plantarum degeneratione in aliud genus ageret, inter cetera dixit Pyrum in Pyrastrum degenerare, & dulce M. l. in acitum, & ex Struthio, id est, maiore & oblongiore Cotoneo, Cydonium fieri minus, & sessilibus rotundatis Pomum, quale Dioscorides ἀγρία dixit, & in medicina vfu magis probat. Hæc itaque Marcelli sententia est. Sed mirum quomodo satium, aut nobilius in verum degenerare possit. Aut cur verum dicatur id, in quod aliud nobilius aut praestantius degenerat: Dicendum: Dioscoridem ad vires maxime respexisse: ideoque verum appellasse id quod minus est, quia maiorem habeat adstrictionem, quæ in hoc pomo desideratur, & cuius etiam nomine in medicina celebratur: inde quod acutorem vibret odorem, uti putatur. Porro in differentiis designandis non conuenit inter Neotericos.

Ruellius tria apud se inueniri genera scribit: quædam minora, rotunditatis in orbem circinata, odoratius spirantia, quæ peculiariter *cognea* vocat. Alia grandiora, amplitudine pinearum nunc, pauciori lanugine canescentia, colore tam intus, quam exterius aureo, odorem non tam latè iactantia, quæ *cognæa* quasi Cotonea vulgò vocari tradit. Alia medio habitu, sibi Cotoneorum nomen detorquentia.

Cordus in assignandis Cotoneorum differentiis à seipso diffinit. Nam apud Diosc. ait: quædam maiora & Malis similia esse: quædam verò minora, & Pyri modo turbinate, maioraque etiam *scabiora* dici. At in Historia sua sic habet: Cotoneum, siue Malus Cydonia siue Cotonea, vnum maius, alterum minus, id est Struthium.

Tragus Cydonia, Cotonea & Chrysomela idem dicit, Struthia verò vult esse maiora, *Grosf. furen* apud Aëcium: alia dici Multea Miscella, *Melimita*, & Melimela in Diosc. quæ intelligit de

melle conditis, quomodo condienda docent Columella, & Palladius. Quod verò Cydonii genus sit Phaulium Athenæo, ingenue fatetur se nescire. Mirum tamen quod idem scribit, Cydoniorum genus vnum tantum in Germania extare, & id passim vulgatum, quod & nullo negotio prouenire soleat. Fortè eius tempore maiora nondum erant conquisita. Vt & ea hodie habentur in lautionibus Germaniarum hortis, ut postea specialius docebimus appositis descriptionibus.

Curtius sic distinguit: Struthia, siue vt alii volunt Struthea, Dioscoridi, Galeno & I. quacibus magna sunt, & suauiora. Nam minori placent acerbitate, minus tamen vilia, serotino prouentu. At ex hoc genere sunt Sylvestria, odoratissima, in sepibus crescentia. Chrysomeliana siue Chrysomela, incisuris sunt distincta, colore in aurum inclinant, vnde illis nomen, de quibus Virgilium intellexisse vult, aurea Mala vocitantem. Cydoniorum Malorum tria in Italia inueniuntur genera. Palma illis quæ peculiariter Mala Cotonea cognominantur, preffa, incisuris intersecta Melopeponum modo, colore ad aurum inclinata, lanuginosa & longè ceteris odoratio- ra. Proximum locum fortuntur, quæ maiore admodum corporis mole proueniunt, Dioscor. & Gal. Struthia vocata. Hetrufci hæc Pyra Cotonea vocant: quippe quod formâ magis Pyra, quam Mala referant. Pulpa ac succo ceteris praevalent, colore tamen, suauolentia ac viribus cedunt. Postremò Plinio Miluiana sunt, quæ nonnullis notha dicuntur, quod tantum proueniunt ex Cotoneis Malis, quæ Struthis insertæ fuerint, vel ex Struthis, quæ Cotonearum surculos receperint. Hæc Malis grandiora, Pyris verò siue Struthis minora videntur: formâ verò, ac facultate inter vtrumque media.

Castor. Durantes: Tres species in Italia, Melecotogne, Pere cogne, Bastarde, orbiculata. Secunda Struthia & Pere Cotogne, maiora minus efficacia. Tertia, Miluiana & Bastarde. Castalpino Cotoneorum duo genera: quædam orbiculata, & vtrinque depressa, Mala cotonea dicta: Quædam oblonga, vt plurimum in vertice tenuiora, quasi figura mammæ amplioris molis, Pyra cotonea vocantur. Piora Dioscor. vera: posteriora Struthia.

Satis confidenter Anguill. scribit, omnes species à Plin. traditas, nostro adhuc seculo cognosci in Italia, ea quæ costis distincta Melonum modo, Græcorum esse Chrysomela, & Latinorum Aurea mala. At aliter Lacuna, qui Membrilos vocat: Legitima Dioscor. aut Chrysomela Plin. vult esse parua lutea, rotunda, valdè odorata. Aliam differentiam esse Pyris similia, Tertia dictam Plinio cotonea Miluiana. Hæc esse Cydonia spuria, nasci ex infestatione veræ Cydoniæ insertæ in Struthia, aut ex contrario.

Gesnerus quoque Plin. secutus Struthia dicit ea, quæ minori sint amplitudine, serotino prouentu, & odoratius vibrant. Maiora verò esse ea, quæ Struthia dicuntur des Coignasses. Malum Musteum est Cotoneorum genere praecocius & celeriter mitescens, vnde & Melimela appellentur ab Atheniensibus, hoc est mellita & dulcia Mala, itremque Miscella, quod fiant ex infestatione furenti Mali dulcis & communis in Malo cydonia & ab his distinctum ponit μύλον φανίον etiam de genere cydoniorum apud Athen.

At in horto idem Gesnerus Magna VVoisello dicit esse Pyra cotonea Struthia. Galeni videri ait, pulcherrima & maxima, Camei. Cydoniæ Mali sit.

Chrysomela.

Neapolitana Struthia. Multea.

Barb. not.

Discrimen inter cotonea &amp; Struthia. Cotonea Malala. Cotonea Pyra.

Cur Gerum distum cotoneum?

Cognea.

Cognæa. Cotonea simpliciter.

Corda eror.

Melimela.

Phaulium.

In Germ. Snam.

Struthia.

Sylvestria. Chrysomela.

Cotonea preffa.

Struthia.

Pyra cotonea.

Miluiana.

Melecotogne.

Pere cogne.

Bastarde.

Orbiculata.

Caigna.

Melimela.

Miscella.

φανίον.



fructus varii generis esse ait. Sed qualia sint ea genera non explicat. Tabern. præter vulgata etiam *Miliana* habet, & *Basfart* fürten vocat, hoc est, *puria* Cotonea: Item in Icon. & hist. Pyra Cydonia, *Büthenbiren*: Ac secundum quidem genus pingit fructu ad pediculum lato & ventricoso, & qui desinatur in obusam pyramidem, sed nihil deficit, aut docet. Deinde inter Pyra refert Pyra cydonia, quæ tamen à Cydoniorum historia nequiquam fuissent separanda. Icon. Tabern. quæ & in vltima edit. Matthioli. appositâ falsâ est: non enim plures flores simul fert Cotonea, vtin ea affictum. Melior erat Matthioli prior. Nihil melius Gerardus Anglus Pyrorum Cydoniorum Tabern. figuram capite proprio habet, & postea Malum Cydonium Tabernamontani ponit pro Pyro Cydonio. Sic boni isti viri post tot Herbariorum descriptiones, distinctiones, repetitiones & dixerimus ferè inculcationes, adhuc nesciunt sub quo versentur Cælo, & qui lucem afferre huic difficultati debuissent, miscunt quadrata rotundis. Explicemus rem paucis, & quid nobis videatur de Cydoniorum distinctione & differentiis. Ergo *Cydoniorum duo genera summa: hortense & sylvestre*: hoc suæ spontis est, nullo fructus cultu, de quo mox.

Hortensium alia maiora, alia minora, & tertiū quod Miscellaneum vocant. Nam *quævis* hodie non videtur cognitum. Miscellanea verò nihil aliud existimamus esse, quàm ex variorum surculorum de Maiorum aut Pyrorum genere insitione prognata Poma, siue iam Melimela dicas, siue Multea, siue quouis alio nomine vocites. Solerij sanè opinio fuit Multea Cotonea, siue præcocia, in Delphinatu vix cognosci. Reliqua duo tantum hodie in nostris regionibus coluntur, etiamque à nobis, quorum talis forma.

Minora quæ omnium vulgatissima, pugnum vix æquant, nam quatuor vncias raro superant, circa pediculum turbinata, iuxta Pythmenalatio- ra & quodammodo sessilia, angulis torosis inæqualia, & veluti per longitudinem sulcata, colore primum quidem virente, sed mox maturata latiore aureolo, copiosa lanugine obducta, odore grati quidem, sed vehementi, & qui quorundam capita ita procellit, vt ipsi dolore moueat, præsertim si conclui aut Mæso inclusa habeantur. Caro flaua, firma atque quouis Pyro compactor.

Maiora verò, vt prædicta tantum magnitudine superant, ita & figura variant ab iis, & inter se quoque. Omnia verò circa pythmenalatio- nem angustiora, circa pediculum verò aliàs acuta, aliàs sessilia, immò & vtrinque sessilia vidimus, vt in figuris insinuarhus. Porro Cortice hæc longè lauiori contexta, exiguo, aut ferè nullo cotone obducta: dilutior etiam eorum color, siue flauum spectes, siue ex flauo viridantem: Caro minus firma, quàm minorum, nec tam vehementem, vt illa, de se odorem spirant. Hæc struthæa putamus Veterum, illa verò Cydonea simplicitate dicta, & *αὐθιγνὴ* Dioscoridis, si modò nobis sint ea ipsa vera genera Cydoniorum quæ à Veteribus descripta sunt. Cordus ait maiora iuxta pediculum latiora esse, circa pythmenalatio- nem angustiora, quod non semper respondet, nam etiam contrarium obseruimus uti dictum. Hæc Delphinatibus dicuntur *gros Perus Coings*: Prouincialibus, *gros Cordons*.

Hæc duo genera, quæ modò descripsimus hodie in vñ sunt: & minora quidem per totâ Germaniam sæpe frequenter habentur, in hortis, præ-

tis, & vinetis quoque. Neque vllis defunt insititionibus hortis, vt Gesner. annotauit. Habentur & in Italia & Gallia, aliisque circumiacentibus locis. At vt Tragus ait, vnum tantum genus Cydoniorum in Germania extat, & id passim vulgatum, quod & nullo negotio apud eos prouenire solet, licet iis quoque aliquando peregrinum fuerit. Intelligit autem parua, struthæa verò seu maiora haud ita vbiuis obuiam sunt, & primum quidem in principum tantum hortis habita, inde postea ad alios quoque dimanarunt. Camer. scribit Lugduno delata in Germaniam, & ex Heluetia. Nos vtrumque colimus in horto E. C. Month. Habentur & Basilea. Sed præcipue magnitudinis & elegantie habetur in horto E. C. Stuckardiano, item in horto arcis Göppingen, turbinata & non turbinata, vnde copiosè mittuntur Stuckardiam in aulam. Obseruauimus etiam vtrumque genus Patauii, Monspeßli, Nemausi, Geneuæ & alibi. Amant in genere loca frigidiuscula tam plana, quàm decliua: humidiora, quàm sicciiora.

Florent Sole ab Ariete ad Taurum properate, Tempus hoc est circa Non April. & Kalenda Maii, variant etiam florum, sicut & maturarum tempore pro natura loci. Poma maturascunt Septembri & Octobri mensibus: quæ si cruda quis per hymem affertuare velit, seorsim à pensilibus vni reponat, nam vvas aceruimo suo sapore aded vitiunt, ut ex statim marcore conficiantur, vt scribit Camerarius. Palladius putauit Cydonium malum nullam insitionem admittere: sic enim canit.

Cum præstet cunctis se sua Cydonia pomis, Alterius nullo creditur hospitio.

Rob. ru externi librum aspernat a superbit:

Sic tantum nullo crescere posse decus.

Sed propriis pandens cognat a cubilia ramis

Stat, contenta suum nubilare bonum.

Posteris tamen obseruatum & aliorum coniugium ferre. Monardus scribit, Persica arbore in Cydoniam inserta, Cydoniam enasci. Hæc vtique miscella distinctam à prædictis omnibus efficiet speciem. Malus item, Pyrus, Prunus, Armeniaca, & aliæ quæ similes Cydoniis insint, deliciores euadunt, teste nostri seculi diligentissimo Itatorum Geoponico, Aug. Gallo. Sed an Cydonis surculi prædictis arboribus inserti ad frugem perueniant, nondum obseruatum. Rami recentes, vel bimuli Nouembri vel Februario Luna crescente depacti, breui tempore fructus ferunt, eodem teste. Id apud nos fieri posset Martio. Rami inserti possunt excindi primo vel secundo anno, & plantari Februario vel Martio Luna noua, & fructus suo tempore ferent gratos. Cydonia frigida & terrestri temperamento prædicta sunt, ac propter vincentem adstrictionem minus cæteris Malis humectant.

Dioscor. Mali omnis folia & flores, & germinia adstringunt, maximè Cydoniæ. Ergo fructus gida sunt primo ordine, & sicca secundo. Cydonia verò Mala stomacho commoda sunt, & vinâ cient. Assata miuora sunt. Vtilia sunt cæliacis, dysentericis, pectore suppuratis, vel potius sanguinem spuentibus, (vt mox declarabitur) bilem cæliacis, superne ac inferne excernentibus, maximè crudæ. Sed & cremor isporum, in stomachi aut alui fluxionibus commodè bibitur. At crudorum succus potus, orthopnoicis prodest. [ορθοπνοικός Diosc. corr.] malimus legi *αὐθιγνὴ*: quamuis Serap. quoque priore modo legisse videatur, cum ait: Succus cōfert asthmati: ac Plin. quoque scribat succum Orthopnoicis.

thopnoicis conferte, qui tamen prius dixerat, cruda prodesse sanguinem excreantibus.] decocto fouentur vuluæ & sedes, si procidant. Quæ melle conduntur vrinam mouent, mel autem sibi constringentem illorum vim, & spissantem adfiscit. Quæ cum melle coquantur, stomacho atque ori gratiora sunt, sed minus adstringunt. Cruda cataplasmatibus addiuntur ad cohibendam aluum, aut si stomachus æstuet, aut in vomitiones effundatur, ad mammarum inflammationes, prædutos lienes, & condylomata. Fit vinum ex ipsius tuis atque expressis: Sed quod perduret, quindecim sextariis succi, vnus mellis ad ungitur, alioquin acorem degenerat. Fit oleum ex his, id Melinum vocant, quo vrimur quoties adstringente oleo est opus. Flos & viridis & siccus cataplasmatibus additur, & his conuenit, quæ adstrictionem desiderant, inflammationibus oculorum, reiectionibusque sanguinis: contra citam aluum, & mensium impetus in vino bibatur. Porro ad illud quod Diosc. ait: vtilis est: pectore suppuratis seu vti in Græco legitur *ἐν πυρρῇ*, quæ vox purulenta excretionis denotat: annotat Marcellus Virg. in Antiquioribus & melioribus Græcis non *ἐν πυρρῇ*, sed *ἀδυστῆρας*, id est, sanguinem expuentibus legi, quemadmodum & vertendum est: cur lectioni & Plinius subscribit, qui ait: Matura prodesse sanguinem excreantibus, & c. vt dicitur mox. Atque hoc non idem est, vt Barbarus existimauit. Ad intestinorum difficultatem [ *δυσπνοίαν* ] Mala cydonia Hipp. dissecat, dissecat aqua macerat, cumque aqua colorem habuerit, potui exhibet. Galenus: ex omnibus [ inquit ] Malis, solus Cydoniorum & Struthiorum [ vtpote quæ propter vincentem adstrictionem minus exterius sunt humida ] succus coctus cum melle durare potest, tamen ipse per se non ita durare queat. Item alibi: Coronea cinixum quiddam, quod in aliis non inuenitur habent. Nam præterquam quod adstrictionem sortita sunt copiosiorum, succus etiam eorum diu durat, si quis ipsum cum melle coctum asseruet: cum aliorum Pomorum succus, si reponatur, acescat, quia multam habet humiditatem. Permanet & Struthiorum succus, quando paratus rectè fuerit, quemadmodum & Cydoniorum. Verùm hic minus est suauis & lumine perè adstringens. Quare ad ventriculi maximè exoluti robur vti eo aliquando possis. Plinio Coronea cocta suauiora, cruda tamen duntaxat matura profunt sanguinem excreantibus, ac dysentericis, cholericis, cæliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt constringentem illam vim succi, Imponuntur & pectori in febris ardoribus, & cum decoquantur in aqua, ad eadem, quæ supra scripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decocta venterati modò imponuntur. Langugo eorum carbunculos sanat. Cocta in vino, & illita cum cera alopecis capillum reddunt. Quæ ex iis cruda melle conduntur, vrinam mouent. Mellis autem suauitati multum adiciunt, stomachoque id vtilius faciunt. Quæ verò in melle conduntur cocta, quidam ad stomachi vitia trita cum rosaceo folijs decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienis, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item marinis, condylomatibus, varicibus. Flos & viridis & siccus inflammationibus oculorum, excretionibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex his mixtis cum vino dulci, vtilis & cæliacis & cæcotori. Decocto quoque eorum fouentur, si procidant vuluæ & interanea. Fit & oleum ex his, quod Melinum vocamus, quoties non frue-

runt in humidis nata. Minus vtilia Struthia, quamuis cognata: vtilissima verò quæ ex Sicilia veniunt. Nunc consideratione dignum, an cocta cotonea, vt vult Plin. amittant constringentem facultatem: quemadmodum & matura, quod Serap. ex Diosc. scribit, quod tamen nusquam apud Diosc. scriptum legimus. Remitti adstrictionem concedimus: amitti, nequaquam. Quod Plinius quoque tradit Hydropicis prodesse, quomodo id præsent, nisi roborando, non videmus. Potiorum eorum vsum dixerimus ante hydropem, nisi quis vereatur, ne augeant sua adstrictione obstructiones, quod Medicis diligentius examinandum relinquimus. Eluchales ex versione Heronis Tab. 2. Cotonea tradit, sumpta à cibo consistare, nocere partibus, præterquam si inungantur in balneo cum oleo, vrinam mouere. Et Tabern. 30. ait, odorem eorum refrigerare & cerebrum roborare.

Phylarchus [ vt scribit Athen. ] memoriz prodidit lethaliū medicamentorum vim Cydoniorum Malorum odore iucundo hebetari, Pharia- cumque venenum [ pharicum Diosc. ] iniectum canistro [ *τῷ ψάλλῳ* ] adhuc olente cydonia Mala in eo reposita, euaniū factum, maleficam vim suam amisisse: itaque mixtum & in potu exhibitum, quibus inhærebat, nihil attulisse noxæ: causamque postea eius rei cognitam fuisse illius inquisitione & inuestigatione, qui venderat. Competit enim hoc accidisse, propterea quod condita in eo calathio Mala fuissent. Celtiberi Veratrum succum, quo sagittis illitis feras immedicabili vulnere conficiunt, si vbi cydonia Mala fuerint, reponatur, elanguescere, & maleficam vim suam exuere vñ deprehenderunt, eamque recuperari, si venenum per aliquot dies suspensum maneat, vbi alui excrementa egeruntur. Ex hiernis malis cydonia succum acerbiorum generant, Struthia pauciorum minūque acerbiorum, & ad ventriculo superantur facilius. Plutarchus verò in suis præceptis conubialibus tradit, Malum cydonium plurimum ad odoris suauitatem conferre, vt antiquis, spongia cum sponso non prius includeretur, quam Malum cotoneum delibasset. Innuens primam gratiam, ab ore, vñque sponse demanare oportere, & bene compositam, aptamque & suauem esse debere: & videmus in Problematis scripsit, primus horum complexus nihil triste, aut iniucundum habere debet. Adhuc etiam nostra tempestate quibusdam locis obseruatum est, vt vir nouus, & noua spongia ante primos congressus bellariis ex cotone malo vtantur, auctore Curcio, addit etiam hic suo præstanti odore lethaliū venenorum vires retundere, & eorum vehementia hebetare, sicut [ vt ipse ait ] venenum uidentes rem ita se habere deprehendunt. Ad narium etiam odorem Mala cydonia olfacere bonum, vt ait Aesculap. gineta. Celsus cydonia stomacho idonea dicit, quod eum adstringant atque corroborent. Vrinam sistunt, aluum adstringunt, quod quidam interpretantur, [ vt inquit idem Curtius, ] si ante cibum sumantur. Si verò post, ventrem ciunt, maxime dulcia, quæ minus adstringunt, & vomitum magis compescunt. Credibile tamen, aluum ciere per accidens, adstrictione sua & mole cibos detrudendo, & promouendo ad exitum. Alioqui si ad fatiuitatem edantur difficilis concoctionis sunt. Si autem dentibus terantur, & manducantur, vini sumum compescunt, vt illius vaporem caput lædatur minimè.

Mirum est, quod multi referunt, mulierem præ-

Alui flu-  
xus.  
Ardor sto-  
machi.  
Vrinam cy-  
don.

Ol. Meli-  
num.  
Inflam-  
matio.  
Sang. reie-  
ctio.  
Menstr.

Diosc. lectio  
ex Hermol.  
Scribit cor-  
rigitur.

Dysenteria.

Succus co-  
ctus.

Ventricu-  
lus.

Febris.  
Stomachi  
dolor.  
Langugo  
Carbuncu-  
lus.  
Alopecia.  
Vrina dif-  
ficilis.

Lien.  
Orthopnea.  
Hydrops.  
Mamma.  
Condyloma-  
ta.  
Varices.  
Spus sang.  
Menstr. mu-  
ter.

Siciliama.

Venenum.

Aduerfus  
Veratrum  
malignum.  
sem.

Atos Pel-  
rum.

Venenum.

Narium.

Contra e-  
briem.

pra-



prægnantem quæ Cydonia mala crebrius elitaue-  
rit, parituram quæ infantem & industrium atque  
ingeniosum, vti refert Simeon Sethi; qui & ipse  
scribit, post cibum sumpta ventrem mouere: sed  
quibus sit imbecilla facultas ventris retentrix &  
excretrix valida, eos plus cibi inde capere.

Matth. de Gradibus in ardore vrinæ cum vlce-  
re, & sine eo à Cydoniis cauendum suadet, quod  
inter diuretica ab authoribus [vt Io. Mich. Palcha-  
sio, qui ex eorum elu Regem Neapol. Alphonsu-  
m in diabetem incidisse scribit] referantur.

Diosc. lanè *supernus* dicit. At quidem & *seynus*  
& *supernus* dicit, quæ contraria sunt. Nisi quis fortè  
nobis hic obtrudat proprietatem aliquâ occultâ.  
Videndum igitur, an effectus respondeat. Quan-  
quam non videamus quid præstare queat occulta  
illa facultas, cui contrariæ sint qualitates manife-  
ste. Mahmus ius vti in Diabete ac fluxu seu mictu  
sanguinolento. Interim perpendant etiam docti,  
qua ratione Cotonea recta ceruice spirantibus &  
hydropicis conferre queant, vt Brunsfels. ex aliis  
sublegens prodidit.

Hollerius lanuginem Cotoneorum ad hæmor-  
rhagiam commendat.

Est & feminibus sua præstantia. Ea siquidem  
cum aqua rosacea madefacta ac mollita, lento  
crasôque humore ambustis igni, & linguæ gu-  
leque ardori [Germani dicē *Brēne* vocant] illu-  
tu medentur, quod remediū genus vel vulgo  
hodie cognitum nouimus, & Tragus quoque in  
scripta retulit. Succum ex optimis Cydoniis ex-  
pressum bibunt manē Hispani ad pestis præser-  
uationem, & quod admiratione non caret, sud-  
orem præsertim senibus prouocat. Potest idem  
contra anginas Gargarizari.

Ex Cydoniis quoque, destillatur aqua cuius, non  
vt vulgò fit, in quibusvis febribus vltus esse debet,  
obseruatione Camerarii.

Porrò quamplurima ex Cydoniis tam à Vete-  
ribus, quam à Recentioribus parantur, & ad me-  
dendi vsum, & ad palatum. Veteres vinum para-  
bant, quod Melinum siue Cydonites vocabant:  
Melomeli siue Cydonomeli, quasi vel Cotonea-  
tum dicas: hydromelum, Cydonites siue pulme-  
ta à Cydonio, Melinum oleum, Melina Empla-  
stra, & vnguentum Melinum dictum, quorum  
quædam hodie ex vltu recesserunt, vt Vinum Cy-  
donites seu Melites, cuius parandi rationem Dios-  
cor. hanc præscribit. Ex Malis Cotoneis exem-  
pto semine concisis, minas duodecim in musti  
metretæ ad dies triginta immittito. Deinde ex-  
colatum reponito. Paratur & sic. Post contula &  
expressa mala Cydonia, ad duodecim sextarios suc-  
ci ipsorum, mellis sextarius vnus admiscetur, &  
sic reponitur. Adstringit, stomacho commodum  
est, dysætericis prodest, hepaticis, nephriticis, & in  
vrinæ difficultate. Palladius duos alios modos pa-  
râdi vini Cydonitis habet, hos. Abiecto corio ma-  
la Cydonia matura in breuissimas ac tenuissimas  
particulas recides, & proicias durum, quod ha-  
betur interius: dehinc in melle decoques, donec  
ad mensuram mediam reuertatur, & coquendo Pi-  
per subtile consperges. Aliter. Succu Cydoniorum  
sextarios duos, acetu sextarium vnum semis, &  
mellis duos sextarios miscbis & decoques, donec  
tota permixtio pinguedinem puri mellis imite-  
tur. Tunc triti Piperis atque Zinziberis binas  
vncias admiscebis. Plinius vini è Cydoniis me-  
minit quidem, sed modum parandi non tradit.  
Hydromelum Dioscor. quoque, quomodo fiat,  
docet. Melomelitis ex Cydoniis parati metreta  
vna (Plin. Cadum vocat: sunt Congii decem)  
ad duas metretas aquæ decoctæ admisceatur, & in

ardoribus sub cane insoleatur. Et huius vis eadem,  
quæ superiorum est. Duos etiam preparationis  
modos tradit Paulus quos ex eius scriptis peten-  
dos Lectori relinquimus.

Melomeli seu Cydonomeli parat Dioscor. Malis  
Cotoneis exemptis feminibus in mel plurimum  
coniectis, vt planè coarctentur. Fit gratum post  
annum, vino mulso simile, conueniens ad eadem,  
ad quæ Vinum Cydonites. Columella scribit, Mel  
in quo condita fuere Cydonia, Melomeli appella-  
tum sine noxa posse interdum dari fabricanti-  
bus: intellige à pituita corrupta, aut in quibus  
metus est defluxionis in nobile aliquid viscus.  
Sed placet etiam eiusdem Columellæ descrip-  
tionem adicere. Nihil cetius, inquit, aut melius  
expertis sumus, quam vt Cydonia maturissima, in-  
tegra, sine macula, & sereno cælo decrefcente  
luna legantur, & in lagena noua, quæ sit pater-  
nissimi otis, deterat lanugine, quæ Malis incit, cõ-  
ponantur leuiter, & laxè, ne collidi possint. Dein-  
de quum ad fauces vsque fuerint compesita, vimi-  
neis furculis sic transuerfis arctentur, vt modicè  
mala comprimant, nec patiantur ea, quum liquo-  
rem acceperint, subleuari. Tum quum optimo  
& liquidissimo melle vas vsque ad summum ita  
repleatur, vt pomum submersum sit. Hæc ratio  
non solum ipsa Mala custodit, sed etiam liquorem  
mullæ saporis præbet. Possit & hodie parari, &  
Quitten honig / mel Cydoniatum appellari, que-  
mad. & mel colatum.

Melini olei atque vnguenti confectiones habes  
apud eundem Dioscor. & Aetium, & Melinum  
Emplastrum apud Galenum: quæ cum ad Medicos  
& pharmacopæos potissimum pertineant, exinde  
desumi possunt. Nam & compendii nobis ratio  
habenda, & ea interim exhibenda, quæ & rei  
Medicæ, & æconomice ex equo prodesse possint.  
Præscripta igitur etiam multas maximasque vtilita-  
tes habeant, tamen hodie pleraque ab vltu recess-  
sisse videntur: Et eorum loco à Recentioribus re-  
seruata sequentia, vt melius Cydoniorum, quæ ni-  
hil aliud est, quam decorticatorum Cydoniorum,  
& ex aqua & melle vel Saccharo, addita etiam par-  
te vini, ad suauitatem decocta caro, atque Con-  
dita. Vex ex succo fit Cydoniorum cum vino co-  
cto, addito melle optimo, despumato.

Domestici nostri Cydoniorum & malorū car-  
tipendulorum partes æquales sumunt: decortica-  
ta, & in frusta confecta ex aqua addito melle vel  
saccharo & modico vini in crassam & suauissi-  
mam consistentiam decoquunt, & in scatulis vel  
siccilibus vitreatis adseruant, magno vltu ad ple-  
raque prædicta, potissimum alui fluxiones diuer-  
sas, & ventriculi robur. Alii ex mero vino deco-  
quant, & addito Saccharo vel Melle ita pa-  
rant.

Condiuntur & segmenta integra, Cydonia Con-  
dita in officinis vocant, ad eoldem vltus. Segmenta  
ex aqua pura coquunt, coctæ reponunt: aqua  
verò quæ eorum vim magnam exorspit, cum  
melle vel Saccharo in syrupo consistentiam deco-  
quant: tum prædicta segmenta cinnamomi fru-  
stulis in ea defixis in eo syrupo condiunt. Dia-  
cydonium Officinis dictum sic paratur. Cydonia  
recens ab arbore decerpta [vt vult Math.] de-  
corticata & à feminibus repurgata atque concisa  
in aqua coquuntur, in qua solutæ fuerint Saccha-  
ri libræ tres, agitantur contenturque pistillo  
ligneo inter coquendum, quoad spissitudinem  
mediocrem acquirant: tum demum ab igne re-  
mota decoctio in fornulas effunditur. Vel Sac-  
chari albi lib. ij. Succu Cydon. depurati lib. iij. si-  
mul decoquuntur ad spissitudinem, posteaque in

Diacyd.  
lucidum.

pyxides effundantur: hanc vulgò Gelatinam vocant & diacydonium lucidum. Aut sic melius. Segmenta diutius ex aqua elixa, donec tabescant, per linteum colentur, sine compressione: (vt clarius fiat) dein cum Saccharo coquatur in syrupo crassioris consistentiâ, vt in scutulas effusum & formulas melius coctat. Res est visu pulcherrima, & præcipue suauitatis, apud præcipuas totius Europæ nationes haud in postremis deliciis habita.

4. Suauius effeceris, si succi Pomorum Curtipendulorum depuratorum aliquid addideris cum modico vini albi: aut si ipsa Pomorum segmenta decorticata cum Cydoniis decoxeris, & vt prius perfecteris. Ex eo quod reliquum est, attentiores ad rem, fortius cochleari expresso, cum Saccharo aut melle crassius & vilius Cydoniatum cõficiunt: sin vero tam lucidum illud, quàm crassum simul misceantur, & cum saccharo, vt prædictum, percoquantur, Cydoniatum vulgare dictum, quod Galis in frequentissimo vsu, fit: quod ante cibum nucis magnitudine sumptum, alium cohibet, post cibum verò soluit, & nihilominus ventriculum roborat, & vapores caput petentes cohibet. Hi ferè simpliciter sunt modi parandi cydoniati.

Vires.

Diacyd.  
Vires.Placenta  
ex Malis  
CotonCydonia  
tum albi.

Galenus quoque temporibus in vsu fuisse videtur, qui in Syria edulium componi tradit, quod *μαροπαζον*, id est, placenta ex Malis cotoneis appellant. Id adeò durare vt patinâ recantes ipsio plenâ Romam adferrentur. Componebatur autem ex melle, & carne cydoniorum læuigata simul coctis. Illustr. noster Princeps Dux V. Virt. aliquando dedit Cydoniatum album *Maro malada* dictum, in Lusitania factum.

Diacyd.  
comp.

Vires

Mina comp.  
pos.Compof.  
aliens.

Fur.

Compof.  
aliens.

Vires.

Medicorum verò, quorum est ad multa respicere, fuit aliquid in hoc genere supra vulgus sapere. Ideò diacydonium compositum, vel diacydonites cum speciebus, vt vocant, excogitarunt. Paratur autem ex segmentis Cydoniorum in vino coctis, & melle despumato igne lento denuò percoctis, additisque cinnamomo, caryophyllis, pipere, galanga, aliisque aromatibus, pro diuersa ventionum intentione, ad roborandum ventriculum, appetitum promouendum, coctionem iuuandam, vomitum biliosum, pituitosumque nimium sistendum, ad pristinum calorem colorémque corpori restituendum, dissipandos flatus, & alia eiusmodi, si à frigida causa oriuntur: sin verò à calida, Cydonia cum aceto decoquant, additis iis quæ refrigerant, vt præter succum pomorum, ea quoque refrigerent. Ita Mesues docet ad stomachi & Hepatis robur, & ad vtriusque vim reuoluentem confirmandam eiusmodi diacydonium cum variis aromatibus parare. Paratur & Miua composita seu aromatica, ratione præscripta, iniectis tantum aromatibus: Alii sacculo excepta aromata in ea tantum macerant, cuius idem vsus qui prædictorum. Galenus quoque meminit alicuius medicamenti, quod non ex Malorum succo solo & Melle constat, sed & pipetis albi quippiam habet, & zingiberis & acetis: quod & alibi fusiùs describit, & post ipsum Aetius, quod tum ad appetentiam excitandam his, quibus ea languet, tum ad concoctionem iis, qui parum felicitur concoquunt, præstat, quod denique ventri robur conciliat. Nec inconueniens est illa compositio, quam Matth. habet, si demas rhabarbarum. Ad quid enim rhabarbarum miscebimus cum vehementer adstringentibus: erit tantum ægris molestum irritando ad expulsiõnem vi sua purgant. Cydoniorum succus libræ pondere, in quo corall. rub. feminis rosar. rub. & rhabarb. cuiusque drachma, cum Hypocistidis & Acacia bi-

nis scrupulis ad tertias bullierint, magno est ad biliosas vomitiones, & ad dysenteriam auxilio. Datur bis quotidie, manè & vespere, horis duabus ante cibum, sed ægriam purgatis frequens quoque hodie est vsus syrapi, qui è succo Cydoniorum in Pharmacopæorum officinis paratus habetur, aut si non habetur eidem substitui potest Gelatina, in aqua, vel vino dissoluta, pro ratione scopi.

Nec his contenta Medicorum industria: cum enim viderent alterando & roborando se plurimum hoc medicinæ genere præstare, & insuper etiam morosiorum palato blandiri, vltius progressi, ibi etiam placendum existimant, in quibus nihil minus, quàm placendum, si necessitas non compellat. Huic igitur, aut ægotantium genio cedentes, quòd Cydoniorum succum atque substantiam familiarissimam stomacho aduerterent, qui ferè purgantibus ledi solet, medicinas purgantes adiecerunt, & diacydonium laxatiuum dictum, seu purgans confecerunt: cuius diuersæ habentur descriptiones apud Recentiores, aliis scammonium tantum addentibus, vt Chologogum, & turberthum cum Cnicò, vt phlegmagogum reddatur: aliis omnia simul, vt vtrumque præstet: ex quibus nobis maximè probatur Ferneliana, quæ talis est. Pulpæ Cydon. expurg. coctæ & cribro transmissæ lib. j. sem. succi Cydon. lib. sem. sacchari albi lib. ii. Coquantur in mellis crassitiem, inspergendo sub finem cinamomi triti vnc. j. zinzib. maceris, caryophyll. singulorum drach. ii. diagyridi vnc. ii. dosis à drach. iii. ad vnc. sem. Tenuis aquosusque humores paulò moderatius atque faciliùs à distantioribus locis prolucit: his vtile ac tutum, qui articulari morbo laborant, nec admodum vehementi febre iactantur. In secretis hodie secretorum suorum buccinatores vtriusque, quàm gratiosi Medici (quibus nihil secreti esse par est, quod non in communem veniat vsum non tantum *χρησι*, sed & *κρησι*) habent diacydonium purgans lucidum & non lucidum, vtrumque sapore & suauitate commendabile, & nihiloties sufficienter suo fungens munere, quæ in gratiam studiosorum medicinæ libenter communicabimus, ne posthac præ illis habeant saltem in hoc isti ampullatores, quod coram iis, de istis gloriætur, quasi illis solis, ceu alia quædam Helenæ Nepenthes contigerit.

Accipe Elect. diacyd. lucidi, vt prius docuimus parati vnc. xx. scammon. vnc. ii. vel eius loco diacyd. paulò magis infundatur scammonii bis in spiritu vini: deinde coquatur spiritus collectus cum præscripto electuario ad consumptionem spiritus vini. Vltimò adde Aq. ros. vnc. x. vel xii. Coquantur ad iustam consistentiam. Possis, si aromaticum voles efficere, eadè opera cum Scammonio, aliquid cinamomi, piperis, & caryophyllorum confusorum infundere, aliâve pro vltimo scopo, si loco Electuarii diacydonii lucidi, sumas idem cum corticibus citri, aut cum carne cydon. vel malorum curtipendulorum, vel vtrorumque paratum, & procedas, vt iam dictum, fiet id quod non lucidum vocant, claritate prædicto inferius, non suauitate. Possit etiam qui volet radicem Mechoacam, aut Turberthum confusum simul infundere: ut sit simul etiam reddatur phlegmagogum. Dosis prædictorum drach. ii. Sed vt ingenue fateamur, eorum vsus non in omnibus tutus: tantòque magis ridendi, uel potius deplorandi magni aliqui nominis Medici visi, qui illud in dysenteris exhibere sunt ausi, sed quali cum successu & illi norunt & nos. Sunt etiam qui Antimonii

Syrup. Cydon.

Diacyd. purgans.

Diacyd. purg. lucidum &amp; non lucidum.



monii vitrum in succo macerare audent, vt reddatur purgans, & ita in Diacydonium coquere cum Saccharo, quod eius gustus magis celetur, quam scammonii, & hoc pro insigni secreto habent. Sed habeant quantum velint: non inuidemus. Fuimus prolixiores in exaggerandis Cydoniorum viribus diuersisque eorum praparandis modis, cum ob eorum præstantiam atque nobilitatem, tum verò ob communem eorum vsum, quem habent & in arte, & in vita æconomica.

## DE COTONEA SYLVESTRI.

**C**otonea Malus sylvestris, satiuæ per omnia similis existit, à qua ramis distat minoribus tantum, caudice assurgens magis recto, iuxta terram minus fruticoso, sed singulari frequentius: eadem numerosioribus scaturit floribus, & largius fruticat. Fructus serò perficit, qui etiam satiuæ fructibus multò sunt minores. Nascuntur in Danubii Petros ripis, & collibus, plurimumque supra Ratisbonam & Keilheyminum oppidum, vsque ad Petras fauces, per quas Danubius labitur: frequenter inter petras atque in vinearum sepius, autore Cordo.

Mala Cydonia sylvestria, odoratissima, in sepius nascuntur, Plinio. Atque de his Virgilium quoque intellexisse, sunt qui putent. Curtius scribit, sylvestria esse de genere *Struthium*, quod mirum est, si *Struthia* sint maiora, vt ex Dioscor. & Galeno ostendimus, atque Sylvestria vel ipsis paruis & vulgarissimis magnitudine cedant. Cordus Cydonii tertium genus, sua sponte proveniens vocat apud Dioscor. Et in hist. *Cotoneam Malum sylvestrem*. Cam. Struthia & Cotonea sylvestris. *Malum sylvestre*. Germ. Wild. *Bärenten*. Gal. *Coinis fauagier*. It. *Gorogno saluatico*.

Est adstringendi vimultò efficacius cæteris Cotoneis. Cordus.

Quomodo Malus Cotonea ferenda sit, & quando: quomodo colenda, putanda, inferenda habes apud Plinium lib. 17. cap. 19. Colum. de arb. cap. 25. & de re rust. lib. 2. cap. 45. Multa præclare quoque de his scripsit: Car. Stephanus in sua Agricultura: & Collerus in suo diario æconomico: & nos antea quadam annotauimus.

## DE PYRIS.

## CAP. IV.

**P**yrus satiuæ crasso còque recto & simplici assurgit caudice, & altius quam Malus, sed minus fit patula, ramisisque plurimis, surrectis potius quam laterosum extensis: Cortice quam Mali scabriore, materie firma, satique tractabili, præsertim ad typos & sculpturas apta, (ex qua & nostrarum harum figurarum pars maior parata, item ad tornum & alia, ex pallida rufescente, que siccata magis etiam rutila fit. Folia circinata ferè vel ex circinato oblonga, eorum figurà pro specierum diuersitate variante, longiunculo pediculo hærentia, supernè læuia, virentia, infernè asperiuscula, albicantia. Flores ferè, quales Malo, Pentaphyllis albicantes apices purpurei. Fructus, hoc est, Pyra, penè omnia turbinata, circa Pythymena crassiora, iuxta pediculum tenuiora, & ve-



& sapore. In gēhere, nō tam viuudus his color vt Malis: neque cuti tam læui contecta, sed aliàs virenti, aliàs araneosa, aliàs viridi aut subflaua, rarius rufescente, vt plurimum obfolata & leuiter scabra. Sapor vel dulcis, vel acidus, vel austerus, vel acerbus. Arbor caret spinis. Radicem habet profundè actam, vt scribit Theophrastus, qui de Pyro diffusè hæc ferè habet.

Pyrus in senectute fecundior redditur. Minus diu tamen viuit quam Piræster seu Pyrus sylvestris. Flores profert foliatos: folia orbiculata: fructum succo aquoso constantem, semina congesta, putamine inclusa. Corticem habet ex neruo carne & humore constantem. Rarè ex ramis crescit. Facile amittit fructum, ob molem & pediculi tenuitatem. Plagis debilitatur, idèoque minus recidi postulat. Vermibus obnoxia est. Reliqua quæ Theophrastus habet, suis quoque locis dicentur.

Pyrus, vt annotat Scaliger, interdum pullulat ab imo: verum ex eadem radice nullis prognatis radicibus, sed radicis brachiata promotione que brachia serò tandem radicales emittunt. Dicta est quidem *monophis*, hoc est, vnistipes, sed *monophis*, id est à radice emittens pullum: huic enim longè etiam subter terram productis radicibus, stolones enascuntur. Cultura gaudet, & si ne ea nequit proficere. Salsis offenditur. Fructus verò eius habet quod elui sit aptum & generationi: illi pulpa, huic semen. Ac pulpa quidem non tantum ob cibum data est, sed etiam ad seminum præsidium: quæ elsi coriaceo amictu donata sint, melius tamen & felicius intra pulpam vel putridam etiam, totà conseruantur hyeme, quam exempta. Eadèque ratio valet, & in Malis, & in Pomis, & in vniuersum in fructibus omnibus quibus Pulpa data est, vel aliud quoduis operimentum ad seminis tutelam. Porro eidem Theophrasto frutificat Pyrus ex annottinis surculis, germinat ex cacumine & latere: serotina est, quippe quæ hyeme magna ex parte sua perficiat Poma: quoddam genus Autumnio. In trimatu ferè incipit, & interdum antè, autore Plinio. Dioscor. scribit Mali Medici semen simile esse semini Pyri, vel vt Sarracenus reddit, Pyri semen habere: Græcum habet, *σπέρμα του άμνίου έσπερος*, quod consideratione dignum. Nostrorum enim Pyrorum semina non multum nobis respōdere videntur seminibus Malorum Medicorum vel Citriorum.

lut in Pyramidem fastigiata, in qua tamen figura multum euariant, carne quam Malorum densiori, satis succosa, sed plerumque acerosa, præsertim circa media: vbi semina foris nigra, intus alba qualia Mali, cellularis coriaceis distincta continentur: pediculo ferè quam Pomorum longiori. Colore multum variant, quemadmodum

Sententia Theophr. de Pyro.

Pyrus pululul.

Cultura gaudet.

Cur pulpa Pyra data?

Mali Medici semen.

*Ve Pyra  
differant à  
Pomis.*

*Etymon.*

*Peloponnesus  
dicitur à  
Pyra dicta*

*Adipion.*

*Ochne.*

*Eggas.  
Fic.*

*Nomencla-  
tur.*

Pyra, inquit Plin. à Pomis hoc differunt tantum, quod vsque adeo orbiculata non sunt, neque perfectè rotunditatis, sed turbinatoris & oblongioris formæ ac figuræ: quod mihi non satisfacit quum plura genera Pyrorum non sint minus orbiculata Pomis. Pirus, vel Pyrus, vtrum rectius scribatur, nondum conuenit inter auctores. Qui Pyrum scribunt, à Pyramidis figura deriuatum volunt, quod in exacutum fastigietur, cuius sententiæ quamplurimos eosque grauissimos in lingua Latina videmus esse auctores. Ita apud Poetas legas, & apud Herbarios plerosque, immò apud ipsum quoque emunctissimæ naris in lingua Latina Scaligerum. Columella & ceteri Geoponici modò Pirum habent, modò Pirum, sed Gaza homo Græcus passim & semper Pyrum & nostri seculi doctissimus Latinus Hadrianus Lunius. In Pyramide nihil ventriosi, sicut in Pyris omnibus. Adhæc in veten nostro Plinii codice, semper Pir m legitur. Et omnis literaturæ gnarus Hermolaus vbique etiam ita scribit. Si tamen quis à Meæ similitudine, quod è lato in acutum spectet, & in mucrone turbinetur, tractum vult Pyrum, per nos licet. Quid si Pirum à Græco deductum sit dempta litera A & interposito R, & ex hoc factum sit Pirum. Ita multas voces Latinas mirabili transpositione aut mutilatione à Græco deductas esse, norunt docti, & summus ille Scaliger abundè docuisset in Originibus, nisi fata diuinum illud opus posteritati inuidissent. Gropius à Germanico tractum vult, Pyri nomen, inquit, quasi à πῶρ deriuaretur, per s. l. ad scribunt, sed mea sententia aliunde nomen duxit. Nos Peer vocamus, à VPeer, propter priam syluestriam naturam. Pyrus vrbana dicitur, & cultiua, hortenlis, edomita Hermolaus, ad differentiam syluestris, quam quidam volunt culta miscere, le quo poltea. & πῶρ Græcis, & Theophrasto & Diosc. Athen. Theocrito & aliis plerisque & ἄπιν ipse fructus, à quorum prouentu copioso Peloponnesus quoque ipsa quandoque dicebatur Apia, ut Ilter assentit in rebus Argolicis, hæc quidam ab Apia Phoronei filia terram eam ita nominatam putent. Apud Athen. dicitur & τὸ ἄπιν & ἄπιν, pro eodem, nempe pro fructu. Et apud Plutarchi in Problem. dicitur & ἄπιν, quæ tamen vox propriè Pyrum syluestrem denotat Theophrasto. Curtius & Dodon. arborem ἄπιν quoque Græcis dici scribunt. Scribitur & ἄπιν & ἄπιν. Dodonæo, A Tarentino in Geoponicis, ἄπιν. Hermol. ait fructum quoque Adipion vocitari, quam tamen vocem nusquam inuenimus, fortè Apidion dicere voluit. Poeta sunt, inquit Hermol. qui Pyrum Ochne vocant, syluestrem Achradæ. Et Had. Iunio quoque ὄχνη Pyrus est quemadmodum & ὄχνη: quæ tamen vtræque vox Theophrasto Pyrum agrestem denotat, ut dictum ἄπιν enim & ὄχνη apud eundem simuliunguntur, quamuis Gaza Pirum solum reponat. Constantino quoque in Lexico ὄχνη Pyrus agrestis est. Est igitur ἄπιν omnium Pyrorum hortensium nomen generale: vnde tractum adagium ἄπιν men dicitur, Apio mollior, vel, ut alii vertunt, Pyro maturior, quamuis aliqui de Raphano intelligi velint, minus scitè. Hebræi t. ste Eliæ Leuitæ nomenclatura, Eggas vocant. Sclauon. Rshstsa fruschiyo. Arab. Humech te sunt Pyra, ut est apud Serap. Cirmetre, seu kemerri. German. Biren & Biren. Burenbaum. Gall. Poirier, Poire. Ital. Pero. Hisp. Castil. & Portug. Pera & Pyras. Catal. Peres. Angl. Pear. Belg. Perre & Peere. Bohem. Krusty. Vngar. Bortnclysa. Fructus Herbarius

quoque omnibus Pirum dicitur & Pyrum, ut dictum, de quibus Virgil.

Inferè Daphni Pyros carpent tua Poma nepotes. Item:

Orniſque incanuit albo flore Pyri. Multiplex Pirorum differentia, atque nomenclatura varia, qua Malis neuitquam cedunt. Theophrastus duo Pyrorum summa genera agnoscit, fatiuam & agrestem, ἄπιν, & ὄχνη: Gaza Pyrum reddit & Pyraltrum. Verba sunt: τὸ ὄχνη, τὸ ἄπιν, hoc est, syluestria longioris sunt vitæ hortenſibus, velut Pyrus syluestris, quàm fatiua. Idem ἄπιν latius dicit, & ὄχνη syluestres intelligit, quamuis vtrumque a libi Pyrum sine discrimine lignificet, ut annotat Scaliger. Inter Pyri fatiua species Theophrastus habet, Pyrum Phocenſem, quam ait mutilatione fieri meliorem: & Pyrum Caryæ, quod domesticum esse ſcribit, & lanugine tam ſaſſa obductum, ut niſi abluatur aqua, edi neuitquam poſſit. Dioſcorid. quoque aliam fatiuam facit, aliam ſylueſtrem, quod ſacilè ex iis verbis colligere eſt, quando ait: ὁ ὄχνης ἔδος: ὅτι ὄχνη ἄπιν, ὅτι ὄχνης ἄπιν. ὁ ὄχνης ἄπιν, hoc eſt, Acharas Pyri ſylueſtis ſpecies eſt, quæ tardè matureſcit. Vim habet adtingentiorem Pyro. Idem tradit, multa Pyri eſſe genera, ſed omnia adſtringere.

Duſcile verò iudicare eſt, an vtramque intellexerit Ariſtoteles, aut qualem, quando ait: ὁ ὄχνης ἄπιν: ſus Pyris pingueſcit. Videtur tamen intellexiſſe ſylueſtria Pyra, quibus etiam nun hodie in defectu glandium ſues ſaginari ſolent. Quando verò idem præcipit ὄχνης ἄπιν ſeri iuxta apum aluearia, videtur ſauas intellexiſſe, atque ita Græci in voce πῶρ, nuncuè vtriusque: quamuis vtriusque ſlos apibus gratiſſimus ſit, neque multum reſtat, vtiam vtriusque intelligas, nam & ſauis Pyris egregiè laginabuntur ſues, ſi quis dare volet, & hactenus Pyrum agreſtem iuxta aluearia ſerere, ſi quis non magis delectetur ſatiuis. Non dubium tamen Ariſtotelem vtramque agnouiſſe.

Cato nominat Volema, Aniciana, Tarentina, Sementina, Muſtea, Cucurbitina. Idem quoque inter prædicta Sementinorum meminit, & M. Varro, & Macrobius, quæ ſic vocat à ſemere arbitrat Cur- tius, quod per ſementem matureſcant. Columella multiplices differentias recenſet. Curandum eſt inquit, ut quàm generoſiſſimis Pyris pomaria conſeramus. Ea ſunt Crutumina, Reg. a Signina, Tarentina, quæ Syria dicuntur, purpurea, lupet- ba, hordeacea, (Plin. hordearia vocat) Aniciana, Tarentina, Neuiana, Fauoniana, Lateritana, [aliu Lateriſia, na, alii Laterana] Dolabeliana, Turra- ſuperba, Aniciana, Volema, Mulla, Præcocia, Venerica, & quædam alia, quorum enumerationem ait eſſe longam. Virgil. hæc celebrat.

Crutiſſimis Syriſque Pyris, granibſque V. lemia. Macrobius ut Mala, ita & Pyra diuerſorum quidem nominum eſſe dixit: ſed qualia quæque eſſent, non adiecit. Seruius Crutimia ab oppido nominata, rubere quadam parte: Syria, nigra: Volema Gallica lingua bona & grandia interpretatur: quod ſi verum eſt, inſit Gotopius, vox composita eſt, à Voſheim, id eſt, à plena domo. Alii Volema dicta volunt, quod Volam impleant, vulgò Libralia: de quibus, ut & ceteris differentiis, ſic Pinus. Quadam è Pyris libralia appellata, am- plitudinem ſibi ponderis nomine alleunt. Et Libralia paulò poſt alio capite. Eadem cauſa [nempe cele- ritatis, quod præcocia ſint & æcerpi propere] in

*Differentia  
Theoph.*

*Pyrus Phoc-  
cenſis.  
Pyrus Ca-  
ryæ.*

*Calum aſ-  
ſerentia.*

*Crutumi-  
na. Regia.  
Signina.  
Tarentina.  
Purpurea  
Fauonia-  
na. Lateri-  
ana. etc.  
Virg. diſſe-  
rentia.  
Crutumina.  
Syria.  
Volema  
Gadæ.*

*Differentia  
Plin.  
Libralia.*



in Pyris taxatur superbiæ cognomine. Parua hæc, sed ocysissima. Cunctis autem Crustumina gratissima. Proxima his Falerna, à potu, quoniam tanta vis succi abundat. Lactea hæc vocantur: in iisque alia colore nigro donantur, Syria. Reliquorum nomina aliter in aliis atq; aliis locis appellantur. Sed confessis vrbis vocabulis autores suos nobilitante Decimiana, & ex eo tractum quod Pseudodecimianum vocant. Dolabelliana longissimi pediculi. Pompeiana cognomine Mammosa, Liceriana, Seneriana: & quæ ex his nata sunt Tyranniana, (Turrana Colum.) longitudine pediculi distantia. Fauniana rubra, paulo superbis maiora. Lateriana, Anitiana Postautumnalia acidulo sapore iucunda. Tiberiana appellantur, quæ maxime Tiberio principi placere. Colorantur magis Sole, grandescuntque: alioquin eadem essent, quæ Liceriana. Patriæ nomina habent, ferissima omnium Amygdina, Picentina, Numantina, Alexandrina, Numidiana, Græca, & in his Tarantina Signina, quæ alii à colore Testacea appellant, sicut Onychina, purpurea. Ab odore, Myrapiæ, Laureæ, Nardina. A tempore, Hordearia: à collo, Ampullacea: & à Corio, Coriollana. Brutæ gentilitatis Cucurbitina, aciduli succi. Incerta nominum causa est Barbaricis Venerisque, quæ Colorata dicunt. Regiis quæ minimo pediculo scissilia, Patricius, Vocomis, viridibus oblongisque. Præterea dixit Volema Virgilius à Catone sumpta: quæ & Sementina & Mustea (Malfa Colum.) nominat. Pars hæc vitæ iam pridem peruenit ad culmen, expertis cuncta hominibus. Turbinator Pyris figura. In his ferotina ad hyemem vsque ad natem pendent, quæ mature scientia, Græca, Ampullacea, Laureæ.

His Plinii Pyrorum differentis Dalechampiis & Had. Iunius curiosâ diligentia huius seculi quædam Pyra accommodare studuerunt. Sunt & nunc (inquit Dalech.) quoque variis Pyrorum generibus sua hæc nostratibus nomina. Superba, petite Muscadelle. At Hadrianus Iunius Muscatellinum vult esse Plinii Hordearium, ab odoris fragrantia Muscatellinum recentioribus dictum, quod perperam [ait] Superbum vocat Grapaldus. *Superba*. G. Moscatellum. B. Moscatellum. G. Poire muscatelle. Superbum vero idem H. Iun. vult esse id Pyri genus, quod Belgæ Wasserpeere / waterpeeren / diercken / appellat. Basileæ sanè Wasserpeeren, id est aquosa Pyra vocant Pyri genus paruum, & ocysimum, quale Plinius ait esse Superbum. Crustumeniana, Gal. Poire perle, gratissimum, & ex parte rubet, Seruio teste. Belg. Sint Jacobs peere. Falerna à potu sic dicta, quoniam vuarum modo magna succi vi abundant, quæ apud Falernum proueniant, vnde Vinum Falernum olim celebratissimum. Gal. Bergamotte. Belg. Srafsche Bangevelen. Pyra Lactea, Gall. Blanches. Pyra Dolabelliana, Gal. Poire nusse, Belg. Engelsche bratpeere. Hæc longitudine pedali Hermodius dicit. Pyra Pompeiana, vel Pomponiana, Gall. Bonchrestien. B. Tafelpeere. Fauniana Gal. Grosse Muscadelle, id est, Muscatellina maiora, dicta putant, quod Faunio flante statim formetur. Lateriana, Poire preuss. Tiberiana, Gal. Poirer forés. Signina, Gall. Poire chat. B. Riepeere. Myrapiæ, Gal. Caluan rosat. (Hæc Had. Iun. vult esse Muscatellina vulgo dicta, vt modò antè dictum.) Nardina, Gall. Poire d'argent. Hordearia, G. Poire de S. Jean: Dalech. At H. Iunio quæ sint, paulò prius dictum. Ampullacea, Poire d'anguisse, B. Engelsche tafeltee. Coriollana, G. Poire de ialouffe. Cucurbitina, ab oblonga cucur-

bitæ figura, G. Poire Courge: Dal. At Had. Iun. G. Poire de farreau, ou de Campanie. Venerca G. Poire Acciole. B. Venus peere. Regia, G. Poire Carmaigne. B. Ofspeerden / mispelpeere. Voconia, G. Poire farreau. Onychina, G. Poire cuisse Madamé, quasi femur muliebri dicas. Hæc Plin. purpurea interpretari videtur, quod onyx tegumentum conchylia sit, vt ait Dioscor. purpurarum operculo simile. Præterea onychina Columella sic purpurea exponunt. Ego verò, inquit Dalechamp. quia Alabastrices lapis, Onyx dictus est, onychinum hic interpretor Pyrum, alabastro colore simile, vulgò Poire cuisse Madamé: purpureum hic genus ab Onychino diuersum esse reor, non autem Onychini vel epitheton, vel interpretationem. Eodem modo apud Columellam Onychinon exponendū arbitror. Scaurianorum mentionem facit Marcellus, vt aut illic ex Plinio legendum sit Severiana, aut ex eo apud Plinium Scautiana, Postautumnalia. Daleadem suspicatur, quæ & acidula post memorata ab eodem Plinio. Eiusdem sententiæ H. Iun. acidulo sapore iucunda. B. Deboute. Volema, Macrobio Volumia, quod volam manus impleant, Virgilio & Plinio dicta putantur, vt ait Seruius. Virgilius etiam Grauiæ vocat. Dale. eadem putat quæ & Libralia paulò antè dixerat Plinius. H. Iun. vult esse Sementina Catonis, vel Mustea. *Sementina*. Placmische smoutpeere. Sementina à Sementinis feris [qua voce Varro vitur lib. 1. c. 2.] quæ inclinante æstate fationis causâ celebrantur. Pirum verò Librale H. Iun. est *Librale*. B. Linguisse peere. Gal. Poire de bon Chrestien: Poire de l'ours, Butte. Pyrum Americum, ferissimum omnium maximeque durans. Belg. Sint Thomas peere.

Lubrica sanè res est, huius seculi fructus, post tot temporum intervalla, in tantal eorum diuersa, post tot rerum mutationes, insitionumque vicissitudines, referre ad prisci illius æui fructus, aut eadem putare. Laudanda tamen eorum diligentia & conatus eorum, qui ista tentant, vt si non eadem, at sanè non planè dissimilia hodie nobis esse constet, vel specie, vel gustus suauitate: qualia nos infra, partim ex aliorum, partim ex nostra obseruatione specialius describemus, & eorum quidem plurima, quorum modò facta est mentio & his etiam longè plura, & Plinii fortè seculo nondum cognita. Vt ceteris idè suo ceu editis proclamare, partem hanc vitæ iam pridem peruenisse ad culmen, expertis cuncta hominibus, nec quicquam amplius excogitari possit.

Memorable verò quod idem tradit: tot se modis insitam arborem vidisse iuxta Tiburtes Tulas [Tiburtes Tiliam Vet.] omni genere Pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, ficis, Pyris, Punicis, malorumque generibus. Sed huic breuem vitam fuisse.

Crustumia, siue Crustumina à Crustumio Thuf. Crustumina oppido dicta sūt. Ex parte enim rubet. Glatiola nunc in Italia vocari existimantur. Picentina olim Romæ celebratissima, quibus contenderet Signina & Syria, si Iunen ali credatur Satyr. 11.

Signinum, Syrinumque Pyrum de corbis isidem:

Acumula Picenis. Syria nunc apud Italos creduntur, quæ Corela Corocela. Tarentina vocantur: alii putant dici Tarentina. Nonnulli etiam à Colore testacea: iam supra diximus Sernigra. Graecula, Lalliana, Meuiatitia, Septimiana, Tulliana, [fortè Neuiana Colum.] Tulliana, Septimiana

*Titiana.*  
*Turrana.*  
*Antiana.*  
*Praciana.*  
*Valeriana.*  
*Turbinata.*  
*Calculosa.*  
*Pholidia.*  
*Apembla.*  
*da.*

*Macrobij*  
*differentia*

*Non omnia*  
*Veterum*  
*Pyra inter-*  
*esse, aut*  
*forte nulla.*

*Fontes Gn-*  
*de Pyra*  
*et reliqua*  
*rum fru-*  
*ctuum no-*  
*mina in ca-*  
*prompta.*  
*Curtio Py-*  
*rum dif-*  
*ferentia.*

*Ioannina.*

*Lauren-*  
*tiana.*  
*Martiniana.*  
*Bergoma-*  
*tia.*

*Dameiana.*

*Mariana.*  
*Vbertina.*

*Rubellina.*

*Rosata.*  
*Calliana.*  
*Bucipia.*

*Strangulo-*  
*nea.*

na: fera sunt. Idem habet, Titiana, Turrana, [Turrana forte Colum.] Antiana, [Aniciana, Cato.] Praciana, Valeriana & turbinata. A causa calculosa dicta, quod vitium est huius generis. Solus, quod sciam, Citorum, Ceruiscorum, Timosorum, meminit Macrobius. Antiphon in libris de Agricultura, Phocidas quoque inter Pyrorum genera recenset, ut refert Athen. Reliqua quæ idem Pyrorum nomine proponit, Amalides & Epimelides, Pyra non sunt, sed illud Amelanchier Herbariorum, hoc Mespili genus, de quibus suo loco. Quæ verò Aristoteles Apembloadas nominat, insitui generis intelliguntur, inquit Hermolaus. Quæ Catoni, Virg. & Plinio Volema dicuntur, Macrobius, Volema dicit, qui & Ceritia & Ceruiscia, & Calculosa, & Lolliana, & Lauinia & Melfia & Myrtea & Orbiculata & Piciana, & Rubilia, Tulliana, Titianaque nominat. Item Mespilaceum & Valenianum indicant, Chouum securus.

Hæc ferè sunt, quæ de Pyrorum genibus differentis & appellationibus ex Antiquis Scriptoris promere debuiimus, & quæ ratione Recentiorum quidam huius seculi Pyra vel eadem cum eis esse putauerint, vel saltem ad ea referre studuerint, quamvis nullum Veterum nomen, quod equidem sciamus, apud nos remanserit, quod & Curtius facit. Genera tamen aliqua superesse minimè ambigendum putat, nec interisse: forsitan etiam nulla, sicut nec alias arbores, verum tantum nomina immutata, quæ non prætereunda, vt non tam antiquitatis obseruatores, quam nostræ ætatis amatores esse videamus.

Neque prætereundum est, Pyrorum genera, nunc quoque nomina ex eisdem causis, vt antiqua, accepisse. A tempore, ab autore vel cultore, à loco, odore, colore, sapore, figura & similibus. Ergo & nostratum, hoc est, nostri seculi Pyrorum vindemiam celebremus, primam sportulam importante Curtio. A tempore enim vel præcocia vel serotina appellantur, addit interdum cuiusdam diui appellatione, quæ ex tempore solet celebrari, vt Ioannina, quæ festinantius, & in festiuitate natiuitatis Diui Iohannis Baptiste matura sunt. Huius autem generis plures differentia, quæ omnia persequi difficile. Sequuntur & Laurentiana, & serius Martiniana. Bergomatia verò Bergamum Italiz oppidum insigniuit sua peregrinatione. Nunc in Gallia in pretio habita, succo saporeque egregia, rotundior forma, colore herbaceo, qui nec dotem referat. Per Autumnum siue cruda, siue cocta eduntur, vtrique elui præstantissima. Ab autore dicta Dameiana: præcocta hæc, colore ex parte altera rubeo, ex altera croceo. Mariana, aquosa & dulcissima, tenerimæque, sed fugacia. Vbertina apud Belgas, & tota Gallia, pretiosa, & præcocia, satis grandia, à colore iucunda croceo. A colore rubeo, nunc etiam Rubellina dicta, & ab auro Aurea, asperiore carne, duriorque, nec priusquam gelu experiantur, edomit duritie, mitescunt: serissima hæc sunt. Rosatis rosæ odor nomen dedit. Callianis odor præcipuus, orbiculata, ex parte rubentia, & ex alia viridia, molli carne. A figura bicipitia, quod gemino capite videntur. Singulari sunt commendatione, succo grato, qui etiam palatum morosum recreet, minimè calculosa. A natura verò Strangulonea. Hæc enim mansa, tantà acerbitate dupliciter, vt deusari nequeant, & strangulare videantur, vnde sic dicta: pulchritudine tamen prædita, colore rubro, & maturitatis indicium præbentia, vt prætereuntes ad legendum

inuitent. Sunt Romæ & in ipsa Italia, quæ Papa-  
lia vulgus vocat, ampla, succo suauissimo, à quibus dōibus sic cognominata, non alia ratione, quam in cæteris fructibus Regia. Christiana in Gallia celebrantur, serotina hæc, vt in annum durent, amplissima, cucurbitæ figura, herbaceo colore, sub nigro, succo dulcissimo, vt etiam cum senuerint, cruda per orbiculos in latum tenuiores dissecta, addita aqua rosacea, & saccharo edantur. Per summos enim calores refrigerare perhibentur, vt æris etiam contra ardores præbeantur. Pretiosissimi apud Turones nascuntur, vt non ingrato munere aliis elargiantur. Setana etiam in Gallia laudatissima, præsertim verò apud Belgas. Parua hæc sunt, oblonga, colore rubro & albo, serens eduntur. Edua etiam & Pseudodua item satis clara, ab vrbe Galliz sic cognominata: serotina sunt, satis ampla, colore nigro, non nisi sub cineribus cocta eduntur: succo abundant. Ab amore verò dicta, quæ, si maui, Amabilia vocabo, vt cæteris acerbiore sint, si cruda edantur: visu quoque minimè iucunda, sed esu omni alio iucundiora, si decoquantur. Durant & in alterum annum. Apud Hispanos verò, pretiosa sunt, quæ regia & comelea vocantur. Vno etiam generi interdu plures appellationes, etiam sub vno idiomate per plura loca indite sunt, quod in vno genere ostendisse latet. In Gallia propè Lugdunum ager Forensis dictus est. In eo vicus Verrianus, ditionis equitum diui Ioannis Hierosolymitani, siue Rhodiorum. Eques autem huiusce religionis, & vici, dum viveret, dominus, è Rhodo aliquod insitui Pyri genus illuc deportat, primum apud Forenses Pyra Verriana vocari cepit, apud exteros, ab agro Forensia. A Burgundis verò Lugdunensis à loci vicinitate. Neque dubitandum est, aliam apud Rhodum sortiri denominationem. Hæc enim odoratissima, & succo suauiora, præcocia, & citò fugacia, forma cucurbitina, rubeo & albo coloribus.

In villa Iacobi Regii, inquit Dalechamp, [pa-  
gi quem Fontaines vocant, haud procul Lugduno  
siti, Pyra nascuntur, è quorum medio corpore  
folium exierit, ea simili ratione Pyrophylla  
vocari possent, quæ Melophylla apud Plin. cap. de  
Malis. Nec prætereundum, quod Scaliger [qui  
& ipse in Gallia vixit] scribit, in Vasconia Pyrum  
se vidisse, tam bellè humanam faciem represen-  
tans, vt pro humano capite allatum sit à pastori-  
bus ad eius loci Regulum, de quo autem genere  
Pyrorum fuerit, aut qualis saporis vel coloris, ne  
verbulo quidem docet, quod sanè tam sagacem  
& curiosum scriptorem deceisset. Idem alicubi re-  
fert, in suo suburbano Pyri quandam esse spe-  
ciem, cuius fructus non à floribus parte incipiat ma-  
turecere, sed à pediculo, contrà quàm fiat in a-  
liis. Pulchra mehercle & subtilis obseruatio, quæ  
deprehenditur, quæ parte Pyrum maturecere in-  
cipiat. Sed quale & hoc fuerit Pyri genus, ne  
verbulo quidem docet. Fortè illud accidenta-  
rium fuit, in vnicò illo Pyro, aut quod magis ob-  
uersum fuerit Soli, aut quod Vespæ vel musca quæ-  
dam ea parte subintravit, qua Sol postea melius  
penetrare atque aded ad maturitatem promoue-  
re potuerit, vt in Fico fieri videmus.

Ruellius quoque quædam in Gallia prouenientia describit, quorum partem iam supra meminimus. Quia tamen ea exactius paulò describit, ne ipsius diligentiam, vel spreuisse vel neglexisse videamur, cum aliis ab eo obseruatis sub-  
ticere placet.

Francis gratissima Bonchrestiana, [Bonchrestien]  
cogna.

*Papa*

*Christiana*

*vsu contra*  
*ardores.*

*Turoni.*  
*Sertana.*

*Edua.*  
*Pseudodua.*

*Amabilia.*

*Comeslea.*

*Verriana.*  
*Forensia.*  
*Lugdunensis.*

*Pyrophylla.*

*Pyrum bu-*  
*manam fa-*  
*ciem repræ-*  
*sentans.*

*Pyrum à*  
*floribus parte*  
*maturecere*  
*incipiens.*



cognominē, non ob hoc solum, quod in eximia suauitate librale pondus æquent, sed quia in tenuitate tanta, vt à gustatu vel ipso ore statim eliquescant, & perennent, gestatūque tolerant, ad Neapolim vsque delata, Carolo octauo ibi res gerente, à felici illa Campania his dotibus adoptata. Proxima magnitudine pinitiis *Mariana*, vulgò dicitur *Maria Pyra dicta*, [ *Poires de nostre Dame* ] a quosda dulcedine suauia, miraque teneritudine placent, sed fugaciora multò. Minima omnium sunt *Muscata*, quæ nomine alio *Chia*, *Poires muscadelles*, *poires de Chio* vulgò dicuntur, baccas corporis mole non excedentia, quina, senave, sæpè plura, ab vtriusque origine longis dependent pediculis, odorata, molli iucunditate, ob hoc non contraxerunt. Condiuntur saccharo à *Salgamaris*, vt in sequentem annum pioregenerent. Media magnitudine pinis *Callionis*, [ *Poires de callion* ] carne iucunda, dulci, odorata, friabili, à præstantia Pyri, Græcum nomen vulgus emendicauit, quasi dixerit meliora. *R. furis* odor nomen dedit quoddam Rosas oleant [ *poires d'eau rose* ]. Bicipitia, [ *poires à deux testes* ] quod gemino capite videntur, singularem sunt commendatione, corpore suauis, non lapidoso, succi grati, palatum etiam morosum recreant. Turbinatiora omnibus *Cerrallina*, quæ *Campanica* alio nomine dicuntur. Ea in metæ forma mucronantur, hyeme non tolerant, durior corporis callo, mira suauitate, succo paucio. Ea prunis tota fugacium, ad veris exitum suppleant inopiam. Conducuntur & saccharo adiecta Cinnamomi portu uicula, vt cœnas claudant. Alia item *Martiniana* [ *poires de S. Martin* ] quæ ad hyemem vsque in parente propendunt, suauis gustu, firmiuscula carne, quæ non nisi cocta ferè manduntur. Vbi geliditas densior, teneriora multè : a etiam hybernas mensas funt. Quæ *Finia*, [ *poires de pin* ] Gallicè nominantur, quod antri puri colorem referant, asperiore carne, duriorèque, nam prius quàm gelu experiantur, edomita duritie miscunt. Ea diuè simè durant, quamuis in eo genere æstiu inueniantur & præcocia. Magnopere commendantur *Bergamota*, feri patrum nostros memoria cepta, & sapore & succo præstantia. Non sunt omittenda Pyra quæ vt pulchritudine & rubro colore & luteo, quasi maturitatis indice, prætereuntes inuitant ad captum, manifesta tamen tanta displicent acerbitate, vt deuorari nequeant, sed demorsa protinus respuant, ob id *Serrangulana* vulgò dicuntur. [ *poires d'estranguln* ]. Carol. Steph. pyrorum de *paris*. *Rionle main*, & de *Rionle* [ præter citata ] Galis dictorum, meminit.

Matthiolus Italia Pyra recensens, Hetrusci nostri inquit, Antiquorum confutudinem secuti, variis nominibus, à diuersis inditis causis sua Pyra vulgò appellant. 1. *Muscarello*, 2. *Guignole*, 3. *Ciamopoline*. 4. *Roggie*. 5. *Ghiaccinole*. 6. *Spinole*. 7. *Quadrane*. 8. *Carouelle*. 9. *Papali*. 10. *San. Nicolo*. 11. *Durelle*. 12. *Zuccaie*. 13. *Campane*. 14. *Vernareccie*. 15. *Gentili*. 16. *Porcine*. 17. *Sementine*.

Horum quædam & Cæsalpinus habet, & quædam alia, sed breuiter describit, & Pliniani accommodare conatur. Inter æstiu, inquit, sunt *Moscata*, alia odore Moschi appellata, pauca & dulcia, ex viridi flauescunt : fortè apud Plin. Superba cognomine : pauca hæc sed ocysissima. Paulò post succedunt *Iunila* appellata, quia mense Iunio maturantur, paulò *Moscatalis* maiora, colore virentia, succosissima multum, quæ videtur Plinius Falerna vocallè à potu : quoniam tanta vis succi abundat. Hinc turba sequitur, sed in iis *Glaciola*

præferuntur in acutum longius producta pyramide, lacteo intus colore : vnde lactea vocat Plinius. Et *Rudia*, turpi quidem colore, sed sapore cæteris dulciori, Glaciolis crassiora, breuioraque. In genere Autumnalium *Sementina* vocamus ci alia & breuia, rubentia, præfertim quæ Sol aspicit, sapore subacida, quæ appellatio etiam apud Catonem & Plinium reperitur, quia in tempore lementis maturantur. *Tiberiana* eadem, quod Tiberio principi placuerunt. *Hyemal* a magna ex parte crassiora sunt, cæteris vtiliora, quia per totam hyemem asseruantur, & pleraque gratiori etiam succo constant, quàm fugacia. In his *Carouella* crassa, & oblonga, breui pediculo, colore ferrugineo : quæ Plinius *Tessacea* à colore appellata scribit, vt nos in genere malorum *Testa* vocamus, colore simili. Sunt *Papalia* grandia, & breui pediculo sessilia : qualia Plinius Regia vocat. Sunt *Bergamota*, magis depressa & Branchia, oblonga, omnia colore viridi. Sunt *Cucurbitina* sic etiam à Plinio appellata, ingentia, sed ignauia. Multa alia sunt nomina apud nos, quemadmodum apud Art quos, &c. Hæcenus Cæsalpinus. Ex quibus constat Plinii & antiquitatis nomina apud Italos & Hetrucos [ ubi hæc scribit Cæsalp. ] nondum esse deleta, sed in hanc vsque diem permansisse, etiam apud vulgus. Fortè & eam, sunt Pyra, ab Antiquis celebrata. Nam si Fœniculum, Napus, Morus & si vilius Antiquis celebrata perpetua successione ad nos petiere, & quidem ea ipsa specie, vt à nemine dubitatur, cur non & eadem specie Mala vel Pyra ? Sed pergamus.

Aug. Gilius, natione Italus, in opusculo suo Geoponico Italicè conscripto, hæc Italiae & Lombardie Pyra refert. *peri vi. fiteolus*, matura Mai fine : quæ licet gustui valde grata sint, Medici tamen spernunt, quia vix collecti statim corrumpuntur. 2. *pericaualleri*, Pyra Equestris, Iunij principio matura : digna hoc nomine, quia & gustui grata, & nihil insulubre habent. 3. *peri ghiacciuoli*, prædicta sequuntur, cruda elui gratissima. 4. His prætereuntibus sequuntur, *peri ciconini*, Pyra ciconiarum, pulchra quidem, sed non bona. 5. Paulò post his similia, sed minus pulchra, verum suauitate gustus & odoris, qui moschum refert præstantia. 6. Mox Pyra dicta *peri de gramella*, magna, copioso grato succo abundantia. 7. Pyra moschatellina maiora, non minora equestribus, quibus sapor & odor moschi, & suauissimus. 8. Pyra Autumnalia, dicta *peri Bergamoti*, quæ saporis iucunditate, fortè omnia alia superant, verum diu non reseruantur, nisi colligantur nonnihil immatura, & commodè reponantur. 9. Pyra Autumnalia dicta *peri garauelli*, pretiosa cruda, & cocta post natalitia, verum arbori infesti vermes, qui subili ferro perquirendi. 10. Pyra Autumnalia dicta *bazanarechis*, magna sunt, grati saporis, durabilia. 11. Pyra Autumn. *b. m. Christiani*, quia bona cruda & cocta, hortis vulgaria. 12. *peri garagnuoli*, omnibus placent, quia grata cruda, & durant adhuc toto mense Martio. Hæc sunt Pyra laudata Venetiis, & vicinis vrbibus. 13. Pyra spinula, *peri di spina*, magnifacio, quia quotannis abundant : grata cocta & condita melle vel saccharo. Earum arbores præ cæteris excrescunt, & tinctu turgent. Hæcenus de Pyris Italici.

Nec suæ Germaniæ deesse voluit Cordus, quominus eam à variorum Pyrorum prouentu celebraret. Eius igitur diligentia sequentia debentur. Ipsorum fructuum, quæ Pyra nuncupa-

D. a.

Sementina.

Tiberiana.

Hyemal.

Carouella.

Tessacea.

Papalia.

Regia.

Bergamota.

Branchia.

Cucurbitina.

Antiquorum.

Pyra erianum.

exa.

Aug. Gilius.

Pyrorum.

italicè.

Moscata.

Equestris.

Ghiacciuoli.

Ciconini.

Ciconini.

Moscata.

Pera.

Gramella.

Moscata.

Bergamoti.

Pera.

Garauelli.

Pera.

Bazanarechis.

Pera.

Christiani.

Pera.

Garagnuoli.

Pera.

Spina.

Prouentu.

diff. Cordus.

mas infinita sunt genera, ex quibus aliquot in Germania prouenientia describemus: adiectis etiam Germanicis eorum nominibus, quæ tamen secundum diuersas Prouincias variant.

*Præpositana.*

1. *Præpositana*, id est, Præpositana ex lata basi, iuxta pediculum in obtusum mucronem desinunt, longitudinem habent quadrantalem, latitudinem verò paulò minorem, color iis est in viridi pallescens, viridibus maculis ceu punctis conspersus: gustu adstringunt, & succi abundantia sitim extinguunt, maturescunt Autumni initio, & citò putrescunt, propter frigidiore & aquei succi abundantiam. Habentur copiosè Islebii propè Herciniam Saxoniz.

*Laridina.*

2. *Specfbiirn*, id est, Lardina, in medio crasso ventre intumescunt, à quo subitò in mucronem desinunt, longitudinem habent tribus vnciis maiorem, latitudinem verò quadrante paulò minorem, colore sunt pallido, & Præpositanorum modo, viridibus punctis conspersa, gustu admodum muci & suauis, & porcini adipis modo in ore liquecunt, vnde etiam nomen inuenerunt, atque succi abundantia sitim restringunt, cum excorticantur suauem spirant odorem, maturescunt Autumni initio, & Præpositanorum modo faciliè putrescunt.

*Globosa.*

3. *Baalbirn*, id est, Globosa, globi ferè rotunditatem habent, nisi iuxta pediculum in obtusum & vix euidenter turbinem fastigiarentur, longitudine duas vncias vix, & rarò excedunt, latitudine verò longitudinem modicè superant, colore sunt in viridi pallescens, sapore & odore Laridina æmulantur, cum quibus etiam maturescunt: faciliè & hæc putrescunt. Habentur Islebii.

*Cannabina.*

4. *Banffbiirn*, id est, Cannabina, Globosis similia sunt, sed paulò maiora, colorem habent viridem, maculis ceu punctis distinctum, sapore globosis respondent, non tamen adeò in ore liquecunt, simul cum illis maturescunt, & faciliè putredine corripuntur. Habentur & hæc Islebii.

*Campana Pyra.*

5. *Glocken birn*, id est, Campana, à sessili basi in angustum veluti collum coarctantur, à quo deinde in obtusum ceu caput desinunt, hæc itaque omninò campanæ figuram, vnde etiam nomen inuenerunt. Colore sunt omninò flauo, punctisque maculoso, longitudine quadrante paulò minora, latitudinè verò duas vncias non assequuntur, odorem spirant non insuauem, maximè excorticata, gustu Cannabinis respondent, patèrque cum eis maturitatem consequuntur, & faciliè putrescunt. Islebii proueniunt copiosè.

*Regalia.*

6. *Bünigsbirn*, vel *Regelbirn*, id est, Regalia, grandia sunt & ventrosa, longitudinem habent interdum quatuor vnciarum, latitudinem verò paulò minorem, colore sunt casto, eà autem parte, quæ Solem acceperunt, leuiter rubescunt. Gustu adstringunt, & copioso succo eoque succo, & aliquantulum vinoso sitim sedant. Maturescunt Sole in libram ingressi, nec adeò faciliè putrescunt.

*Turgida.*

7. *Klunfbiirn*, id est, turgida, duplicis sunt differentia, vtrumque tamen genus Regalibus proportionaliter forma respondet, sed quantitate illis cedunt, differentia in colore est: vnum siquidem genus, castum habet colorem, alterum in casto rubentem, succum habent Regalibus gustu similem, fortius tamen adstringunt. Maturescunt cum Regalibus. In Saxonia magnus eorum est prouentus, maximè Hildesheimi.

*Bonnana.*

8. *Bonnabirn*, id est, Bonnana, à Bonna op-

pido, Rheno imposito sic appellata, vnde in alias regiones translata sunt, figuram habent ferè globosam, nisi modicè in obtusum mucronem iuxta pediculum desinunt, longitudine sunt quadrantali, latitudine paulò minore. Coloriis ab vna parte viridis aut pallescens, ab altera, quæ Sole tacta fuerunt, rubens: gustu modicè adstringunt, succo abundanter copioso, eoque ferè aqueo, actu vehementer os refrigerante. Maturescunt Sole ad Scorpionem properante. Abundant Marpurgi in Hassia.

9. *Schmalgsbirn*, id est, *sear-tia*, sic dicta, quod adipis aut liquaminis cuiusdam instar, in ore liquecunt, fructus sunt ferè in ima parte tumidi, ac paulatim iuxta pediculum in angustum collum desinunt, vt cucurbita: longitudine quadrantali, aut plerumque maiori, latitudine verò sextantem excedunt semuncia. Colorem habent in pallido flauum, odorem spirant iucundam: gustu autem strenuè adstringunt, non sine admixtione præcipui & vinosi saporis, non satis matura, nec bene confecta dentibus, & nimis auidè deuorata, in faucibus aliquandiu manent & anhelitus remouantur, alioquin matura ac bene mansa in ore adipis modò liquecunt. Maturescunt antequam Sol in Libram transeat. Habentur in Hassia, præsertim Francoberge, vbi magnus est eorum prouentus.

10. *Jungfrawenbirn groß*, id est, Virginea maiora, turgidis similia sunt odore & formâ, quantitate verò paulò minora. Gustu efficacissimè adstringunt, adeò vt fauces exasperent, atque labra in angustum, instar virginei osculi contrahant, succum habent aqueum, veluti vino austero mixtum, Maturescunt æstatis exitu. Brunsvici in Saxonia copiosè proueniunt.

11. *Jungfrawenbirn klein*, id est, Virginea minora, à tumido ventre in angustum collum desinunt, longitudinem habent quadrante paulò breviorè, latitudinè verò sesquinciā aliquantulum excedunt: colore sunt pulchro, veluti si quis cereum rubentis ac puniceo misceat: in super et ampundis conspersa sunt, gustu adstringunt, simulque faciliè in ore resoluuntur. Maturescunt Autumni initio. Islebii maximè coluntur.

12. *Bamelßwenste*, id est, *sear-tia*, nomen ab eo inuenerunt, quod veruecum ventriculos tumore æmulantur, & crasso veluti ventre turgent, longitudine quadrantem æquant, & sæpè etiam excedunt, latitudine verò quadrante minora sunt. Colore sunt casto, eo autem latere, quo Solem aspexerunt, subrubente, Saporem habent valdè cum gratia quadam & vino succo adstringentem. Maturescunt æstatis exitu. Habentur Simelsus in Hassia, & vicinis pagis, ibique reliquis Pyris præferuntur.

13. *Löwenbirn*, id est, Leonina, à præstantia sic appellata, ea in Turingia & vicinis locis Hassiatica nominantur, insignes sunt fructus, inter omnes Autumni dotes principatum, propter durationem & saporis succique bonitatem, obtinentes. Sunt autem inferius tumida & plerumque inæqualia, longitudinem habent quadrantalem & frequenter maiorem, latitudine verò sextantem non rarò excedunt. Colore sunt casto sub viridi & modicè rufo. Saporem habent adstringentem, cum præcipua suauitate. Succo abundant, copioso, vinoso, odore, & actu refrigerante: vnde sitim confestim sedant, quin & ipsa Pyra vehementi & aromatico odore mirum in modum agros recreant. Maturescunt Sole in Libram ingressi. Reposita in longum tempus durant,



rant, abundant in Hassia, maximè Marpurgi, Eadem Francobergæ; Schærßbirn / id est, Tonforiana vocantur, à tonfore quodam qui ea primus edidit.

14. Bangelbirn / id est, pendula, Steatapiis figura, colore, & quantitate aequalia sunt, pediculo depèdunt longo, vnde etiam nomen sortita sunt, gustu à Steatapiis differunt, non enim ita vinoso constant succo, nec aded adstringunt, nam simpliciores saporem habent, nec ex tot qualitatibus compositum, cum iisdem tamen simul maturescunt. Coluntur & hæc in Hassia.

15. Margarethbirn / id est, Margarethana, sic dicta sunt, quòd circa festum diæ Margarethæ maturescunt, Sole in Leonem ingrediente in oblongum collum fatigiantur, longitudine quadrante in latitudine verò uix sextantem assequuntur. Colorem habent in cereo rubentem. Carne constant tenera, succosæque, gustu vehementer suauis, & in ore faciliè resolubilis, odore sunt admodum grato. Abundant Brunsvici in Saxonia.

16. Winterbirn / id est, Hyemalis, ex rotundo modicè turbinatur, longitudine quadrante minora sunt, latitudine verò sextantem parum superant. Colorem habent viridem, substantiam verò durissimam, vt vix dentibus cedant. Gustu strenuè adstringunt & refrigerant, succo aqueo simulque austero sunt sedant. Maturescunt serò in autumnum, post omnes alios fructus, postquam prunis & gylu tacta fuerint. Habentur Francobergæ in Hassia.

17. Knochenbirn / id est, ossæ, à duritie nomen inueniunt, ex tumido ventre paulatim in breue & angustum collum desinunt, longitudine sextantem, latitudine verò sesquiuicem rarè excedunt. Colorem habent subrubentem, substantia sunt aded dura, vt eruda mandi non queant, sed cocta tantum. Gustu valdè adstringunt, maturescunt autumnii initio. Coluntur Francobergæ in Hassia.

18. Augstbirn / id est, Augustana, ferè rotunda est, nisi in breuem mucronem desinerent. Longitudine sextantem parum excedunt, latitudine verò paulò minora sunt. Colorem habent flauum interdum in pallido rubentem; gustu adstringunt: cum peculiari succi suauitate, maturescunt tempestiue Augusto mense, vnde etiam nomen inueniunt. Eadem fugacia sunt nec diu durant. Abundant in Hassia vbique.

19. Bonigbirn groß / id est, Mellea maiora, in oblongum desinunt turbinem, longitudine quadrante semuncia minora sunt: latitudine verò sextantem ferè assequuntur. Colorem habent in flauo cæsum, & superficiem non aded glabram, gustu adstringunt, succo que abundat suauis, maturescunt Autumnii initio, aliquandiu durantes. Habentur V Vittembergæ in superiori Saxonia.

20. Bonigbirn klein / id est, Mellea minora, turbinata sunt, longitudine sesquiuicem non excedunt, latitudine verò paulò minora sunt, colore habent subrubentem, saporem valdè dulcem & suauem, vnde nomen inueniunt. Liquefunt faciliè in ore gustantium, maturefunt paulò post Augustana. Abundant in Hassia.

21. Muscatelbirn / id est, Muscatellina, parua admodum sunt & turbinata, longitudine vnciam paululum excedunt, latitudine verò vnciam paulò minora. Colore in viridi rubente, saporem habet suauissimum & aromaticum, veluti modico musco condita essent, vnde etiam nomen sortita sunt. Faciliè in ore liquefunt, odorem quoque incun-

dum spirant. Maturefunt Iunio mense. Coluntur studiosè in Misnia.

22. Schaffbirn / Melleis maioribus similia sunt quantitate, figura & colore, paulò tamen oblongiora & angustiora. Saporem verò habent vehementer suauem, modicè adstringentem, facilièque propter carnis & succi tenebram molliem in ore resoluuntur. Maturefunt Sole ad Libram properante. Habentur Francobergæ in Hassia.

23. Warbirn / id est, Cereæ, inferiùs ventrosa sunt, superiùs in turbinem desinunt: longitudine quadrante paululum interdum superant, latitudine verò sextantem rarè excedunt. Colorem habent flauum aut cereum, vnde nomen illis inditum: ab ea etiam parte, quæ Solem receperunt, grato & maculoso rubore intuentes ad comedendum seiniunt. Saporem habent suauem modicè adstringentem: carne constant miti, & faciliè in ore liquefunt. Maturefunt Sole in Virginem ingressa, fugacia sunt, nec diu durant. Habentur Marpurgi in Hassia.

24. Rosibirn / id est, Rostia, in medio ventrosa sunt, & vtrique in angustum desinunt, longitudine quadrante semuncia excedunt, latitudine verò sextantem cum semuncia æquant. Colorem habent flauum, cæuis punctis conspersum: gustu sunt admodum miti & suauis, ac faciliè in ore liquefunt: eadem propter nimiam molliem minime durant. Maturefunt autumnii initio. Coluntur Ilsebi & vicinis oppidis.

25. Aschenbirn / id est, cinerea, nomen habent quòd cineris in modò mollia sint, & faciliè in ore dissoluant. Rostia, figura, colore carnis, substantia & sapore, æmulantur, paulò tamen minora sunt, magisque in vnam partem versus pediculum turbinata, quamvis interdum Rostiorum modò in medio ventrosa sunt. Maturefunt cum Rostiis, coluntur Ilsebi.

26. Orindebirn / id est, *πινευ*, sic dicta sunt, quòd alicuius potus instar sitim arceant, in medio tumet & in obtusum mucronem desinunt, longitudine sextantem parum superant, latitudine verò sextantem ferè æquant. Colore sunt omnino flauo, rubescunt tamen ea parte, quæ Soli exposita fuit. Saporem habent suauem, carnemque teneram & largo potabilem succo abundantem, maturefunt cum Rostiis, & similiter vt illa, citò putrescunt. Coluntur in agro Islebia.

27. Eyrbirn / id est, Ouata, à figura nomen inueniunt, quæ illis est vtrique, brevis oui instar turbinata, alioquin etiam à potimis proportionem & forma non multum differunt, paulò tamen minora existunt: colorem habent flauum, punctis conspersum sapore Rostia æmulantur, simulque modicè adstringunt: odorem spirant admodum suauem, maturefunt cum potimis, citòque putrescunt. Habentur & hæc Islebi & vicinis oppidis.

28. Pfalzgrävisch birn / id est, Palatina, quæ in Hassia Noebirn vocantur, fugacium omnium generosissima sunt, æqualiter plerumque in turbinem desinunt, longitudine quadrante, semuncia demptæ æquant, latitudine verò sextantem rarè excedunt. Colore sunt inter croceum, puniceum & rubentem medio, carne tenera, succosa, sapore supra modum suauis, & veluti aromatica. Odorem habent tam integram, quam incisa suauissimum, quem nullum Pyrorum genus bonitate superet. Maturefunt Augusti

# HISTORIAE PLANTARVM

42

exitu, Sole in Virginem ingreffo. Habentur in Rheno tractu, Francia, Haffia, & multis alijs regionibus.

*Rombacea*

29. *Spindelbirn* / siue *Kantenbirn* / id est, Rombacea, Rostis figura, colore, & magnitudine similia sunt, paulò tamen angustiora, substantia verò & sapore ab illis differunt, duriore siquidem carne constant, ideoque diutius durant: saporem habent adstringentem simulque suauem. Maturescunt cum Rostis. In agro Islebiano coluntur.

*Zucharina*

30. *Zuckerbirn* / id est, Zucharina, longitudine sextantem paululum excedunt, latitudine verò eundem vix aut rarò attingunt; colore sunt viridi. Carne constant tenera, facili, instar Zucharin ore liquefcente, gustu suauis & dulci. Maturescunt cum ouatis nec diu durant. Coluntur in agro Islebiano.

*Pachlemiana*

31. *Pachlemisch birn* / id est, *Pachlemiana*. Zucharinis quantitate & figura similia sunt, colorem habent viridem & caesium, superficie aliquantulum sunt scabra, carne constant dura, succosa & adstringente, maturescunt cum Zucharinis, & si iniuria ablit, non facile putrescunt, sed aliquandiu durare possunt, sicut pleraque alia, quæ dura carne & adstringente succo constant. Coluntur agro Islebiano.

*Kirchmeßbirn*

32. *Kirchmeßbirn* / rotunda & ventrosa sunt, & versus pediculum in longum, angustum & valde attenuatum mucronem desinunt; longitudine triente semuncia breuiora sunt, latitudinis verò diametro sextantem excedunt, quamuis etiam minora nascantur, colore sunt flauo, carne constant tenera succosæque, gustu simul Palatina & Pomacea tenent. Maturescunt cum Ananar, durantque ferè donec Sol Sagittarium ingreditur. Habentur V Vintbergæ.

*Tumida*  
*als iede*  
*frucht*

33. *Bnausbirn* / siue *Gelbe honigbirn* / id est, Tumida, & Mellea flaua, latam habent basin, atque Turgidorum instar tumida & subrotunda sunt, iuxta pediculum in breuem, obtusum ac rotundum mucronem desinunt, tam longitudine, quam latitudine, sextantem cum semuncia interdu excedunt, sed raro. colore sunt flauo at punctato, circa Pythmena plerumque Melleorum maiorum colorem & asperitatem affectant; carne constant subdura, succosa, & circa seminum receptacula lapidosa. Saporem habent inter Mellea maiora, & Leonina medium, estque hic admodum gratus. Maturescunt Autumno, & nonnunquam ferè vsque ad hyemale Solstitium durant. Coluntur V Vintbergæ vicinis locis.

*Cornubiana*

34. *Bloßer birn* / id est, Cornubiana, inæquali ventre turgent, & iuxta pediculum turbinantur, longitudine quadrantem attingunt, ac latitudine quoque non multum cedunt, colorem habent flauum, & viridibus punctis conspersum, substantia eis est subdura, & aliquantulum lapidosa. Gustu mediocriter adstringunt, & modicè glutinosa cum suauitate existunt. Maturescunt cum tumidis, illisque similiter durant. Habentur in agro V Vintbergensi.

*Vitreæ*

35. *Glaß birn* / id est, vitrea, rotunda sunt, & modicè turbinata, longitudine sextantem cum tertia plerumque vncie parte æquant, latitudine verò sextantem paululum excedunt, colorem habent in flauo modicè virescentem: caro iis est tenera, succosa, gustu adstringens, suauis & vinosa. Maturescunt cum Rostis, paulò ante Autumni initium. Islebii copiosius eorum est prouentus, vicinisque oppidis: durant vsque quò Sol Sagittarium ingreditur.

36. *Kirchbirn*, id est, Templaria, oblongam & ouatam habent figuram, magis tamen quam ouum in turbinem desinunt, longitudine sextantem æquant, latitudine verò sesquiquintam aliquantulum excedunt. Colore sunt ab vna parte in flauo viridi, ab altera autem, quæ Solem receperunt, rubente. Carnem habent duram, modicè acetosam, ac vehementer adstringentem. Maturescunt æstatis exitu, diuque durant. Horum quoque magnus est Islebii prouentus.

37. *Guttenbirn*, id est, Cotonearia, Cornubiana

notam modo inæquali ventre tument, iuxta pediculum in breuem mucronem, veluti turbinata Cotonea, desinunt, parietique tuberosa existunt. Vnde etiam nomen illis factum est: sextantem cum tertia vncie parte, tam latitudine quam longitudine excedunt. Colorem habent viridem, carnem verò duram, succosam, gustu modicè vinosam & mediocriter adstringentem. Maturescunt Autumni initio, durantque vsque in hyemem. Habentur Islebii.

*Parisiensis*

38. *Pariß birn*, id est, Parisiana, inferius rotunda sunt, & sæpius in mucronem desinunt. Longitudine sextantem cum semuncia æquant, Latitudine verò sextantem non excedunt, aut rarò. Colorem habent ab vna parte flauum, ab altera autem, quæ Solem senserunt, puniceum. Caro iis est succosa, gustu cum suauitate adstringens. Maturescunt cum prædictis, durantque in hyemem vsque. Copiosius eorum est in agro Islebiano prouentus.

*Thelyphona*

39. *Weyßer birn*, id est, Thelyphona, rotunda essent, nisi iuxta pediculum in breuem obtusumque mucronem fastigiarentur, sextantem tam latitudine, quam longitudine plerumque excedunt. Colorem habent flauum, & iuxta basim croceum, & puniceis punctis conspersum. Carne constant dura, aliquantulum lapidosa, succo, gustu modicè acetoso & valde adstringenti, quemadmodum Templaria, cum quibus etiam maturescunt. Durant in hyemem vsque. Coluntur in agro Islebiano.

*Brassicana*

40. *Kölbirn* / id est, Brassicana, magna, subrotunda & turbinata sunt, longitudine quadrantem æquant, cui etiam latitudo eorum respondet, si semuncia, aut tertia vncie pars detrahatur. Colorem habent in viridi pallidum, ab altera parte modicè rubentem & punctis conspersum. Carne constant duriuscula, succosa, gustu aliquantulum acetoso & fortiter adstringente: quemadmodum Thelyphona, cum quibus etiam maturescunt, & similiter durant. Islebii coluntur.

*Vastia*

41. *Bölpener*, id est, vasta: magna, ventrosa, inæqualia & turbinata sunt, longitudine quadrantem cum semuncia interdum excedunt, latitudine autem longitudinem ferè æquant. Color iis est viridis. Carnem verò habent succosam, gustu vinosam, modicè acetosam, & Brassicanis fortius adstringentem. Maturescunt Autumni initio, diuque vsque in hyemem durant. Frequens est eorum in agro Islebiano prouentus.

*Succulenta*

42. *Saffbirn* / id est, Succulenta, vastis similia sunt, paulò tamen minora, minisque inæqualia, colore in viridi flauo, carne constant solida, quæ incisa copioso succo manet, eadem manducata ferè tota in succum transit, nimium enim quiddam remanet siccum, cum deglutitur succus, qui gustu frigidus, subacidus, vinosus, & adstringens est. Maturescunt Autumni initio, diuque durant. Habentur V Vintbergæ.

*Oualia*

43. *Kierlinge* / id est, Oualia, à forma ovali nomen acceperunt, mediam habent inter Potima

&



& ouata figuram ac magnitudinem, color nō est flauus punctisque lubrissus in fulco confpersus. Carne constant dura, succosa, gustu acida, vinosa & astringēte. Maturescunt autumnū initio diūque durant. Proueniunt V Vittemberge.

44. *Bruselbirn* / id est, Turbinata, figura turbinem, quem pueri funiculo inuolutum in terram proiciunt ut vertatur, & mutantur: longitudine quadrantem attingunt, latitudine autem sextantem semuncia excedunt. Color iis est in viridi pallidus, multis viridib. maculis seu punctis confpersus, carne constant solida, succosa, gustu valde adstringenti, aliquantulum acetosa & suauis. Durant vsque Sol Aquarium aut Pisces superauerit. Abundant in Misnia.

45. *Braburn groß* / quae etiam *Fregelbirn* / id est, quae frigendo sunt, omnium ferē maxima sunt, nonnunquam enim minam cum dimidia pendēt, figura sunt globosa, interimque turbinata, & frequenter inaequalia, colore inter viridem, pallidum rufumque medio, & ex altera parte magis ruffo. Carne constant cum suauitate succi adstringente, aliquid acetosi participant. Proueniunt in Misnia, praesertim Leisnichen & Coldicii.

46. *Grawchen* / à colore nomen inueniunt, siquidem cineracea simulque subviridia sunt, figurā globosa paruaque, vnciam tam latitudine quam longitudine exquantia, aspectu à syluestriū quibusdam nihil differunt, gustu sunt tenera, mitia, dulcia & suauia cum adstrictione aliqua durat post Solstitium hyemale. Proueniunt in Misnia Lipsensi agro.

47. *Gelbrotebirn* / id est, Punicea oblongam pyramidalem figuram habent, quadrantem longitudine paulo minus quam semper attingentes, latitudine uerō sextantem. Colore sunt ab vna parte citrino, ab altera croceo & puniceo. Carne constant tenera, gustu adstringente, suauis, subacido & aequoso, maturescunt autumnū initio, & vsque ad Solstitium hyemale durant. Proueniunt Hildesheimii in Saxonia.

48. *Grinlingen* / id est, Prasina, satis magna sunt, siquidem quadrantem nonnunquam longitudine excedunt, latitudine uerō sextantem, figuram habent oblongam & pyramidalem, colorem viridem, carnem succosam, non segniter gustu adstringentem. Maturescunt autumnū ineunte, & vsque post Solstitium durant: prouentus eorum Hildesheimii magnus.

49. *Wassernbirn* / id est, Hydrapia, quantitate Prasina emulantur, figuram habent ventrosam in medio, & vtrinque in mucronem desinunt, iuxta pediculum oblongiorem acutioremque, propē pythmenā uerō breviorē & obtusiorē, Colorem ab una parte pallidum, punctisque confpersum, ab altera rubentem, & per oram pallore dilutum. Carne constant succosa, gustu aquea, cum suauitate aliqua. Matura fiunt, cum Prasinis ne vsque aded durant. Proueniunt Hildesheimii.

50. *Regelbirn* / id est, Conaria pinei coni figuram habent, & lauiuscula enim basi in mucronem desinunt, longitudo eis quadrantalī, latitudo autem sextantalī, colore sunt ex vna parte viuidi, ex altera uerō rubescente. Carne constant succosa, gustu auftera, matutinis eis contingit Autumnū initio, à quo tempore vsque ad hyemale Solstitium durare possunt. Nascuntur Hildesheimii. *Haftenus Cordus.*

Tragus item apud Germanos nascentium horum meminit. Pira inquit, quae Germ. *Niescherling* / *Schmalgbirn* / *Heißbirn* / *Bockbirn*

aut *Bengenbirn* vocant fortē ad *Crußamina* & *Falerna Barbari* referri poterunt. Sunt enim saporis iucundissimi succosa admodum & fugacia. At *Pira* praecocia seu aestiua quae & ipsa non vnius sunt generis, cum in illis succosa, alia exueta reperias, ad *Superba Barbari* pertinent, quo loco & ea habenda sunt, quae Germani *Berzen oder Pfaffenbirn* / hoc est, *Pira* dominorum aut sacrificiorum vocant. Inter ea uerō quae Autumnū proueniunt, *Regelbirn* uocata primas obtinent. Hec fortē *Dolabelliana* Veterum fuerint. Sunt & quae Latini *Pomponiana* & *Mammosa* vocant, ut inter ea praeteream, quae Germ. *Frausenbirn* / *Birchbirn* / *Winterbirn* / *Leonhartsbirn* / *Schiffersbirn* / *Waltenbirn* / *Mullingsbirn* / *Lennlosen* / *Muscatelebirn* &c. At uerō *Pirum* illarū nomenclaturae, quas *Hermol. Barbari* putat *Tragus*, *Barbari* non sunt, sed *Plinii*, ex quo *Barbarus* transepsit, more suo, non citato *Plinio*.

*Gesnerus* in horto, *Pirorum* genera diuersa dicit *Lindauia*, & quibus praecipue commendatur *Muscateulina*. Maturescunt in fine Iulii, *Superba*, *Chia*, *Myrapidia*, praecocia. Item *Virginea* [*Jungfräwenbirn*] grato & dulci sapore, quae siccata placent, & maiora quae *Regulana* (*Regelbirn*) est *Curia Rhætorum* aduecta. Hæc quidem apud se [*Tiguri*] rara esse, sicut & *Libralia* à pondere vnciam xiv. & amplius quandoque inaequalia, tuberosa, succi plena. Sed hæc diu seruari non possunt. Item alibi *Pira* à *fœni*, *Bengenbirn* dicta, *Berzenbirn* / *Schürbirn* / & quae *Tigurinæ* *Brauwengiesler* / *Pira* *Stranguinea*, & *sylu.* strin, matura Octobri. Sunt & *Tellbirn* / *Winterbirn* / *Marmesbirn* / *Steinbirn* / *Claßbirn* / à *Sebiz* o *Medico Argentinenſi* nominata apud *Carol. Steph.*

*Tabernamontanus* ista recenset. 1. *Pira Regalia*, *Regalbirn*. 2. *Palatina*, *Mandbirn*. 3. *Præcocia*, *Frühbirn*. 4. *Jacobæa*, *Jacobebirn*. 5. *Cydonia*, *Bütenbirn*. 6. *Rotunda*, *Scheibebirn*. 7. *Superba*, *Brägelbirn*. 8. *Prasina*, *Brauling*. 9. *Prasina hyemalis*, *Winterbirn*. 10. *Muscatelebirn*, *Muscateulina*. 11. *Sueharapi*, *Sueharbirn*. 12. *Trochia*, *Heßgarrebirn*. 13. *Beeßbirn*. 14. *Kochelbirn*. 15. *Serdlinger*. 16. *Pedicularia*, *Leißbirn*. 17. *Strangulatoria*, *Strengeling* aut *Ritterebirn*. Sed quis ex totis & nudis istis nominibus intelligit, quæ & qualia sint illa *Pira*, & num redē suas huius accommodant. Inquinis ista non traduntur, Sed peregrinis. Notas igitur breuiter apponi par fuit.

Catalogū *Pirorū* *Silesiacorū* hunc dat *Schueckf.* 1. *Silesiaca* *Pira* praecocia, *Frühbirn*. 2. *Auenaria*, *Baberbirn*. 3. *Farinacea*, *Nicelbirn*. 4. *Mariana*, *Margenbirn*. 5. *Muscateulina*, *Muscatelebirn*. 6. *Mellea*, *Melapia*, *Böngbirn*. 7. *Saccharia*, *Zuckerbirn*. 8. *Lardina*, *Speckbirn*. 9. *Nobilium* *Junderebirn*. 10. *Hyemalis* *serotina*, *Winterbirn*. 11. *Strangulatoria*, *Strengeling* / *würgende Birn* / *Ritterbirn*. 12. *Aliposa*, *Schmierzbirn*. 13. *Hydrapia*, *Wasserbirn*. 14. *Pira* *Coccineo* succo & aspectu, *Blutbirn* / quorum postremorum ante ipsum meminit *Camer* qui praeter alias *Pirorum* differentias quas *Noimbergæ* habeant, esse etiam scribit, quæ elegantī rubore carnis interioris placeant. Item, quæ comesta ventrem subducunt. Ex dictis quadam in horto *Lusatiae* coluntur, & praeterea ista, nisi nominibus tantum euariant. 1. *Nöthsbirn*, id est, *Monachorum Pira*. 2. *Zapfelbun*. 3. *Keller*

*Dolabel*  
*lunap*  
*1300*  
*Pomponiana*  
*na*  
*Mammosa*  
*etc*  
*Herm. &*  
*Tragus*  
*tabern.*

*Gesneri*  
*diff.*  
*Muscate.*  
*la*  
*Superba*  
*Chia*  
*Myrapidia*  
*Præcocia*  
*Regulana*  
*Pirafœni*

*Tabern*  
*differentia*

*Tabern*  
*ex*  
*notatur.*

*Silesia*  
*Pi-*  
*rorum*  
*ren*  
*causis.*

*Pira*  
*Coc-*  
*cinea*  
*car-*  
*ne*  
*Pira*  
*Sem-*  
*irem*  
*laxa-*  
*tia.*

biurn/Scholzenbiurn/qua & Parisiana vocat, quorum & supra mentio facta. 5. burgbiurn. 6. römischebiurn. 7. bachbiurn. 8. Sapperzenbiurn. 9. Schönbirgerbiurn. 10. faulbiurn. Rotunda, &c.

Colerus inter alia, nondum dicta, Waldbiurn/häfenbiurn/zappenbiurn habet.

*Pira Gentrem latrans.*  
*Turneri Anglia Pirra Superba.*

*Dolabelliana.*  
*Fauonia Autumnalis.*

Turnerus Anglus non modò suæ Prouinciæ Pyra quædam celebrare voluit, sed & Priscis restituere nominibus conatus est, sic pote. 1. Pyra superba Plinii, id est Proud pears / parua celerimè maturescunt. 2. Falerna alicubi Anglis water pears / aut woyfipears vocantur. Dolabelliana longo sunt pediculo, non memini quo nomine apud Anglos appellentur. Fauonia rubent, paulò maiora superbis. Autumnalia, Septembri primùm maturantur, gustu suauis, acido. Angl. Pears of the autumn. Volema, Anglis vulgò mardens, si adstrictionem habeant, & tosta rubent, durèntque in Febr. aut Martium vsque. Nomen videntur adeptæ à duratione: id enim Germania warten vocat, vnde nostrum derivatur. Serotina ad hyemem vsque in arborè sua pendet, gelu maturatur. Ea sunt partim mardens nobis dicta, partim Germanis winterbiurn nominata, quæ & Anglicè winterpears appellate ceret.

*Gerardi Pirorum Anglice nomenclatio.*

Gerardus itidem Anglus tutius vulgi appellationibus hærendum existimauit, & in Anglia hæc prouenire tradit. 1. Pyra precocia. Thegemmeting pear. 2. Jacobæa. S. James pear. 3. Regale. The pear Royall. 4. Palatinum. The Burgomot pear. 5. Pyrum Cydonium, The Quince pear. [hoc Tabern. p. 997. Malus Cydonia dictum.] 6. Pyrum Episcopatum, the Bishop's pear. [Tabern. Fochelbiurn.] 7. Superba, siue Catharina, the Katherine pear tree. 8. Pyrus Hyemalis, the winter pear tree. 9. Pyrum strangulatorum malus. the gear choke pear. 10. Pyrus pedicularia, the Lowie wilde pear. 11. Pyrus Cornuta, the Crow pear tree. [Tabern. Scidinger] Nihil hic quoque describit, figuras ex Tabern. habet, nec tamen omnes. Mirum verò cur tres ex his species syluestres dicat.

*Gerard. not.*

Habes Pyrorum differentias tam à Priscis quàm à Recentioribus [quos quidem nos inspeximus] propositas, & non pauca annotata, quæ ad Priscorum cum nostris collationem illustrationemque faciant: æquum est, vt & à nobis obseruatorum Pyrorum syluulæ prodamus, quamvis quædam fortè & ab aliis iam priùs dicta sint: dicenda tamen, vt constet, & nostris regionibus ea largitam naturam, & vtspecialiori lemmate adhibito, Lectori clariùs pateant, exorssi à Moscatellorum genere, quòd odore, suauitate gustus atque proventus prioritate præ aliis superbiant. Hactenus vnicum eorum genus tantùm dictum à singulis qui de iis tradiderunt, nos eorum aliquot differentias obseruauimus.

*Authoribus obseruata Pyrorum differentia.*

*Pira Moscatellina minima.*

*Moscatellina rubra.*

1. Pira Moscatellina minima, valdè parua, cærsa domestica vix superant, rotunda, longiusculo pediculo, odore præsuauis, sapore vino Moscatellino seu Apiano simili. Basileæ muscateller biurn vocantur. Abundant Lugduni, vbi pires muscades petites vocantur: vnde etiam Guil. Rouilius, Typographus insignis aliquando furculos ad nos misit, quos Genex inferendo curauimus: Item Montbelgardi in horto E. C. Vescuntio missos ab amicis. Habentur & in Alfatia, speciatim in Gebviller.

2. Clareuallæ ad Dubim, oppido Excels. C. VVirt. principio Augusti gustauimus. Pira admodum sapida & Moschum haud obscurè redolen-

tia, prædictis maiora, vncias duas ferè longa, turbinata, parte Soli obuerfa saturè rubentia, altera flauentia, pediculo vncia longiore, carna tenera, alba & nonnihil flauescente. Pira Iesu vulgò vocant. Montbelgardi iidem figuræ & magnitudine similia habent, sed non sunt rubra, verùm albicant potiùs, gustu suauis, & dictis non admodum dissimili, sicut nec odore.

*Pires de Iesu. Horum varietas.*

3. Maiora Moscatellina in horto E. C. VVirt. quem Montbelgardi celebramus, habentur nonnisi à cùrà inserta.

*Moscatellina maiora Autumnales.*

4. Serotinum Moscatellinum genus, magnitudine variat, aliàs tres vncias altum, & plusquam duas crassum, aliàs vix duas vncias altum, fescunciam crassum, pediculo vnciali, cortice ex leui rubore flauescente, punctato, carne mediocriter solidà, ex albo in buxum vergente, grumosa, odore moschi fragrantissimo, sapore dulci, vinoso. Tugax est hoc genus, neque diu asseruari potest. Habentur in pretio in horto arcis Granduillæ, Montbelgardo vicinæ. Mignotus Medicus Burgundus dicebat in Burgundia, speciatim oppido Villafan dicto, pires d'or vocari, id est Pira aureola: & Lutetia pires d'amydon, id est, Pira Amyli. Esui gratissima sunt, Septembri matura.

*Pira amyda aureola.*

5. Habetur Piri genus Montbelgardi, quod Calueium vocant: rotundum est, satis magnum, minime fugax, molchum redolens, quod manibus contrectatum etiam odorem ingeminat, suauis & sapidum. Nostrà cùrà inserti furtuli in horto E. C. quorum partem quoque illustr. Principi Landgrauio Hassiæ, omnis virtutis, & rerum etiam naturæ studiosissimo milimus. Vocant vulgò pires caluiet, & pires à vin. Aiunt durare vsque ad Maium, nec ante commodè edi, cocta tamen esui esse suauissima. Duo horum genera descripta. Aliud enim quod non ita Moschum redolet, sed maius, tenerius, quod commodiùs edi potest crudum, rotundum & sessile, colore ferè cum picro Campanaceo: Mense Nouembri mihi non inuicundus elus. Hoc majus vocant Caluiet basileard.

*Pira rotunda Moschum redolentia, vulgo Calueia.*

6. Basileæ & in Alfatia paruum quoddam Pirigenus satis frequens est, quod heurburle / hoc est, Fœnaria Pira, si dicta, quo ipso Fœniscio maturescant, nempe Iulio mense. Moscatellinis quodammodo similia, sed in oblongum vergentia, cute luteola, pediculo longo, carne dulci, solida, sicatis. Variant hæc eodem nomine. Alia parua, crocea, pediculo breui, odorata, iucundi saporis, carne solida. Alia carne molliore, in ore liquefcente, lutea, prædictis maiora, minime odorata. Alia denique longo pediculo, carne grandinosa, externè flaya. Considerandum an aliquod horum genus sit id, quod Lugdunenses Pira Sancti Ioannis vocant, de quibus etiam supra.

*Pira Fœnaria.*

*Varietas.*

7. Verdette Burgundis Pira obseruata nobis in Dampierre arce Montbelgardo non longè distante: matura Septembris initio, viridia, vnde nomen, non pulchra, suauis tamen, & odore & sapore, & aliquid etiam Moschi inter comedendum redolentia.

*Pira Verdettiana.*

8. Vinofum dictum nonnullis Pirum elegans est, paruum, non totas duas vncias altum, paulò magis vnci crassum, cortice partem maximam ex flauo rutilante, cæteroquin flauescente, carne sapida, vinosà, mediocriter firma, & circa membranosum seminum loculos, granulis multis grumosa. In horto Montbelgardi matura Augusto. Quiddam vineæ vocant, à vino sapore. Germ. weinbiurn dicere possis.

*Pira Vinofum parua VVintum.*



Hydrapia.



Augusto diuisum. Quia eundem planè putamus fructum què Vniuersitater Berni vocant in Ducatu VVirtemb. idè ex his patetam figuram hic addicere placuit.

Pirum Ouatim.

Elegans hoc Piri genus in deliciis habent Basilienses, & totus ferè tractus Alsaticus, quod à figuræ Erythreæ id est, ouatum Pirum vulgò nuncupant. Oui enim speciem utriusque turbinatum, & in medio ventricosum. Maiora autem nuncupantur, facile æquant. Cortex ex viridi siue chloro flavescent, punctis araneosis & ferrugineis conspersus, umbilico prominulo, pediculo longo. Carnis substantia mollis, succosa, spid, ex dulci vinosa, & veluti in ore colliquefens, non sine præcipua, & ipsius propria quadam suauitate. Sub Iulii mensis vel Aug. initium matura. Facile fracescunt, & tandem putrescunt. Rariùs hæc occurrunt apud Montbelgardeenses habentur tamen. Argentinenses etiam Besleburn appellant, quo nomine tamen aliud Piri genus habetur Basileæ, quod iam describemus.

Pira optima Basiliensium.

ii. Haud temerè optima Basiliensibus vulgò dicuntur Pira, quemadmodum & Argentinensibus eorundemque vicinis, quod gustu suauissimo esse putentur. Carne quippe sunt molli in ore facile dissolubili: & quamvis aliquid granulosi habeant: nihilo tamen minus gustu, (nescio quid commendationis præ reliquis Piris præ se ferente) magis quàm moscatellina quadam dulcedine fauces delectat. Magnitudo iis penè oui maioris vel anserini, sed umbilico tenuis sessilia ferè, opposita parte turbinata, pediculo vnciali vel maiori. Aestiuæ sunt, & fugaciæ. In Vineis Basiliensibus habentur, haud alibi temerè ita obuia. Maturefcunt Iulio, & Augusti medium vix attingunt.

Vuarum Pira Basili.

iii. Treubelbiri/ Basil. id est, vuarum Pira vulgò dicta videntur à tempore, quo matura sunt. Cum vis enim maturefcunt circa umbilicum angulosa, ventre subrotundo, superne leuiter turbinata: cute tecta flaua, & ut alia multa, stigmatibus crebris

punctata, pediculo ipsius Piri longitudine facile æquante: Fragrans odoris gustus spidi, dulcis, carne primùm firma, succosa tamen, & quæ mox in molliem illam abeat, putrilagini præuiat: obque talia eò magis à vulgò in deliciis haberi solita. Vix Nonas Septembris attingunt, aut certè cum iis euanescent.

13. Lugdunensibus Poires Brachmari dicta, medicis sunt magnitudinis, longa, ventre circa medium protuberante, parte inferna quodammodo turbinata, aut certè minus sessili, tota lutea cute, pauca tamen aliquid habent rubedinis, carne constant satis odorata, dulci, tenera, in qua sunt quædam fibre luteæ, & circa seminum loculos nonnihil granulosi. Matura sunt Iulio mense.

Pira Brachmariensis Lugdun.

14. In Masinustro oppido, vbi prænotabile Monialu nuncupant vel Abbatia, quam vocant, Pira habentur vulgò Benschelbiri / quasi Chirothecarum Pira dicis, fortè quod Chirothecarum o-loratarum instar, ob elegantium odoris, suauitatem manibus gestiri tractarique soleant. Pediculo hærent vel ipso Piro longiori, circa quæ turbinata parte opposita, alia sessilia, alia in gibbum protuberant a. Tam altitudo, quàm latitudo lvarum ferè vnciarum. Ceterum saturationi ac quodammodo sanguinea rubedine magna ex parte tincta, non sine granulosis punctis, odorata, sapore grato cum quadam adstrictione. Augufti fructus est, sub cuius fine mollescit: sed mox corrumpuntur ob carnis teneatū lineam.

Pira Chirothecalis.

15. Meminimus iam suprà huius Piri ex Dalech. Ruellio & Curcio, qui posterior (solus descriptionem posuit, Suspicamur tamen idem esse: cum Bergamotis antè descriptis. Et sanè, si quod aliud Piri genus, hoc odoris fragrantis præcipua narius pla. et. Mediocra sunt, eò uero diu ferè, tantum turbinata, circa pediculum impressi & ferè umbilicata, corne tenuissimo, stigmatibus punctato, alioqui viridi, etiam si matura sunt. Pediculo hærent vnciæ longiore, satis fitmo. Caro tenerissima, grata, succulenta, sapore quodam modo, muscatellino. Octob. medio gratissima, & cruda & cocta: verum sub cineribus calis tantum coquenda, alioqui gratiam amittere putantur. Metis Gallorum in agrum Montbelgardeensem transplantata ferunt. Habentur etiam in orto E. C. Mense Martio etiam gelu etiam passæ, erant adhuc bona. Surculos Epamanduro & ex Lotharingia importatos in hostio Montbelg. interi curauimus.

Pira Bergamotis Gallis.

16. Colmarisibus vulgò nota, Germ. Pfaffenbiri dicta, præcocia, Iulii principio maturefcunt. Ex longo satisque gracili hæret petiolo. Ipsa verò inferiore parte sessilia, superiore turbinata duas vncias longa, totidem lata, vnâ parte maculis rubris eiusdemque coloris striis saturationibus intercurrentibus donata, altera luteola. suauissimè olent, & carne sunt præsuauis, dulci, ac molli: verum circa seminum loculos aliquantum acerofa. Fugacia. Nunc ducatus VVirttembergici & circa Fontem Admirabilem, locisque vicinis Pira teplebremus.

Pira Regia Bollenfium.

Bönnigbiri / id est, Regia Pira in agro Bollenfi Ducatus VVirtemb. dicta, fortè à gustu gratia, pauca globosa ferè, ex viridi rubentia, punctis notata. Magnitudinem figura exprimit. quemadmodum & sequentium ferè. Sept. 17. non-

dum erant matu-  
ra, sed dura valdè  
lapidosa. Intra o-  
cto dies mature-  
scunt, & breui  
mollescunt. Oct.  
25. adhuc bona &  
sapida. Sed No-  
uemb. fine mol-  
lescere & fracida  
esse incipiebant.



Pira Angelica.



Engelßbirn in Boll, parua sessilia, crassiora,  
quàm altiora; coloris obscuri, pallidi, & nonni-  
hil inæqualia. Mollescunt faciliè, & citò facessunt.  
Gustu sunt sapido. Medio Septembri adhuc inte-  
gra.

Pira Brumaliæ



Reiffacherbirn, quasi Brumalia, quodd non  
priùs maturescant. Minus sunt præcedentibus  
sessilia, lutea, alicubi rubentia cum punctis & a-  
spersitate quadam ad tactum. Durant vsque ad  
Ianuarium. Medio Septemb. gustu valdè aspero,  
intus lapidea. Sunt quædam picturâ matura.  
subrotunda. In VValdc & in Zell, & in P...

spach etiam maxima obseruauimus; ad tres vn-  
cias alta, totidem crassa. Oct. 14. lapida, dulcia, &  
quæ cruda edi possent. Putamus idem quod Baß-  
lex & Reinfeldæ Staffelbirn vocant. Durant  
adhuc Ianuar. gustu dulci succulento.

Pira Bohemica.



Böhemisch. Bohemica Pira, turbinatâ, ventrio-  
sa, luteola, & albicantia, punctis notata. Matura  
fine Aug. Sept. medio fracida, dulcia, sapida, odo-  
rata, etiam fine seminibus, sapore aromatico ferè,  
Sept. fine incipiunt mollescere.

Pira decerpta.



fracida; bona, sic fatis.

Brechbirn, quasi  
decerpta dicas:  
Parua, ex luteo ni-  
tida, & altera par-  
te rubore multo  
perfusa, infernè  
sessilia, supernè  
turbinata. Diu du-  
rant. Sept. 17. licet  
femina nigra, car-  
ne tamen dura  
valdè, sicca, sapore  
aspero, non ingra-  
to tamen. Oct. 17.  
data in Boll lutea  
iam erant, sed po-  
stea licet, lapido-  
sa. Month. delata  
Decemb. medio,

Pira Coriacea.

Lederbirn/Coriacea, in Boll, haud durabilia  
nec admodum grata, nisi sint mollia, faciliè autem  
mollescunt, Lutea vna parte, ab altera rubent.  
18. Sept. gustati quadam mollescebant, austerâ ta-  
men cum aliqua dulcedine, vtcunque grata, gra-  
ntiosa. Month. delata ad finem Nouemb. integra  
adhuc.

Pira Leyuuarne dißa.

Leyuuarnebirn in Boll. Figura ferè sunt ouali,  
supernè tamen magis turbinata: lutea, carne satis  
solida, dulci. Septemb. 17. bona adhuc, necdum  
mollia.


Pira La-



*Pira Laterum.**Pira Herilia.*

*Berrenbirn/*  
Herilia à gustus  
fortè præstan-  
tia, in Boll, eâ-  
dè cum Speck-  
birn formâ, sed  
media parte  
minora. Color  
quibuskam vni-  
formis, luteo-  
lus: aliis alterâ  
parte rubens,  
intercurrenti-  
bus striis. Caro  
mollis saporis  
aciduli, grati.  
Facile molles-  
cunt. Matura  
Aug. fine. Inte-  
gra adhuc Sept.  
16. Fortè eadem  
quæ supra ex

Trago citauimus, qui & Berrenbirn & Pfaffen-  
birn / id est, dominorum & sacrorum Pira vo-  
cat, & ad superba Antiquorum refert. Sed quia  
non describis, difficile est iudicare.

*Pira Cydoniata.*

*Siegelbirn/Pira laterum*, à colore lateritio, &  
quod diu durent ita dicta, ad oualem accedunt  
figuram alterâ tamen parte magis turbinata, alte-  
râ ferè sessili. Magnitudine variant, vti figuræ do-  
cent, maxima & minima exprimentes. Aiuunt du-  
rare ad Oporan vsque. Oâ. 25. gustu adhuc auste-  
ra. Month. delata, sub Ian. finem integra, austera  
carne, durâque: subdulci.

*Pira Picea globosa.*

*Pechfuglen* (quasi piceos globos dicas) vocan-  
tur in Schierbach pago Vvirstemb. Globi figuram  
quàm proximè emulantur, interdum etiam nō ni-  
hil torosa: ex luteo virefcentia, insigniter ab y-  
na parte rubentia, punctis albicanibus multif-  
que etiam striis rubentibus intercurrentibus.  
Month. delata Ian. exeunte adhuc inuictæ duri-  
tici. Aiuunt durare vsque ad quadragesimam, nec  
edulia fieri priusquam nigrescant. In Kirchen etiâ  
*Winterbiren* vocant, id est, hyemalia pira, & no-  
mine prædicto.



*Tütschenbirn* / id est cydoniata Pira, quòd obferuata cydonii odorem spirent, quorum etiam formam quodammodo referunt. Ex wälde. Aliàs *ringiffier*, quasi vinum veneno inficientia dicas, incognita ratione nominis cydonii more nonnihil largulosum, coloris aurei, altera parte rutilo tinctum. Aunt garò durare ad Nouembrem. Septimo. herè maturum, carne tenera & granulosa tamen, dulci gratòque sapore. Potterius adpiciunt altero tantum maius, eodem nomine oblatum in Zell. Aunt & maiora reperiri, cotoneòque perquam simili, & aliquando ad Ian. durare.

Pira Hyemalia.




*Winterbirn* / Hyemalia Pira, rubra, subinde etiam alicubi lutea. Aunt durare vsque ad Aprilem. Maius hic depictum est ex Boll, ab vna parte pulchrè rubens cum punctis albis. Aunt etiam eo maiora haberi. In firden vocant *frawenbirn* / quasi muliebria dicas : Elui iucunda, odorata, sapida, Stutgardiae *paradiesbirn* / paradisi Pira. Ex Montb. delatis quædam mollia Nou. exeunte redita : alia in Febr. finem integra incorruptaque permanebant, frasca, carne granulosa. Non videntur eadem, quæ supra ex Cordo descripta, vt facillè patebit descriptiones diligenter consideranti.

Pira Fræfortiana.



*Fræforter birn*, *Franckfortiana* in Boll & Zell, turbinata ventriosa, valdè rubra : matura Aug. fine & Septemb. principio, oblongo petiolo. Facillè mollescunt, boni odoris & saporis, velut aromatici cum dulcedine, nonnihil etiam sunt granulosa. Octob. 14. adhuc sapida, licet frasca. Idem genus Piri habetur etiam in Wälde, vbi cum prædicto nomine etiam *Kottbirn*, rubra Pira vocant. Habetur & eodem nomine Montb. nuper ex Germania importatis furculis insita.

Pira quædam fugacia.





29. *Reindelfernbirn* / quod non faciliè Latine exprimas, ex *Arnheim*: parùm turbinata, sessilia, lutea. Sept. 8. Caro satis dura & granulosa, sapore cum dulcedine nonnihil austero, sed aromatico. Alia etiam erant molliora in *Boll*, & dulciora valdè. Fugacia sunt *Pira*.

*Pira Angelica magna.*



30. *Angelica*, seu *Angelorum Pira* *Böllensibus* dicta, supra descriptis longè maiora, superne turbinata, & interdum nonnihil reflexa: basi lata, sessilia, alioquin ventricosa. Lutea sunt, sapore aromatico, subaustero, grato tamen. Durare aiunt ad Ian. Nobis integra adhuc 25. Octob.

*Pira ferotina VValdensium.*



31. *Spähtbrechern* / quasi serò decerpta, vel decerpi solita *VValdensibus* dicta, inaequaliter angulosa, lutea, vna parte subentia. *Bollenses* & *Zellenses Wildbrechernbirn* vocant, ac si è sylvestribus decerpta dicas. Aiunt ad Feb. durare. De latum Montb. durant ad Febr. Sed fracidum.

*Pira ferotina viridis*

32. *Spähtig Grünbirn* / Serotina viridia *Pira* iisdem *VValdensibus*, pulchra, magna, ventricosa, sessilia, leuiter turbinata, turbine nonnihil nutante, vel ad latus inclinante. Colore virescente. Videntur aucubi veluti in duas partes diuidi.

Tom. I.



*Pira domestica.*




33. *Gausßbirn* / domestica *Pira Bollensium*. Mediocria, turbinata, sed inaequaliter, ventre in vna parte magis protuberante, sessilia, in torulos vel costas elenata, lutea. Matura fine Aug. & principio Sept. Citò fracescunt. Sept. 17. Saporis boni, subdulcis, carne non admodum molli. Similitudinem habent cum *Fausßbirn*, sed meliora

E

hæc dicunt. Septemb. 8. oblata in Wälde maiora, quædam ad p. dum. sed minus tuberosa, nec ita inclinante turbine, ab vna parte pulchre rubentia, asperis punctis. Referuari posse aiebant adhuc quindæcim dies. Huius generis maximum integrum adhuc Septemb. 7. quod nondum fractum erat. Alaudinis crassitudinisque erat quatuor digitorum & fenus, atque ad finem Octob. usque mansit incorruptum.

Posterior eston eiusdem generis Piri est, licet nonnulli iunguntur buri dixerint, sed falsò. Nam & in Wälde superscripto nomine nobis exhibitum, atque planè idem est cum eo. Durant usque ad Ian.

*Pira Pugillaria Bollensum.*



34. Fausbirn, Pugillaria Bollenibus dicta, ad modò descripta domestica accedunt, sed duplo sunt maiora, magnitudine pugni, unde nomen. Sessilia sunt, nec multum turbinata: paulò tamen magis, quam figura exhibet: valdè ventricosa, & ventri quibusdam ab vna parte magis prominulo, quædam tuberosa & angulosa ferè vt cotonea: quædam videntur velut bipartita, vt figura ostendit. Color ex luteo pallescens, ad virorem inclinans. Vbi maturuerunt, magis luteus, facillè fracescunt. Aug. sine maturescere incipiunt. Sapida sunt carne, cum leui austeritate, molli, valdeque dulci. Septemb. 17. Pulchra nobis oblata ex orto P. f. & p. G. & r. dicti, in Ducatu V. Vir. sit. sub nomine Bachosen Biren/ id est, Cliban Pira, à precedentibus haud absimilia sed maiora. Oct. 14. integra adhuc.


*Pira Zellenia dicta.*

35. Felnerbürn / quasi Zellenia. Ex Gröbbling/ pago V. Virtemberg. magna, inæqualia, tuberosa, cute tenui, lucida, polita, lutea, vna parte etiam rubente cum punctis, non multum turbinata, turbine parum inclinato, valdè ventricosa. Carne satis molli, sapida, dulci, & nonnihil etiam aqueo sapore. Bona Octob. 14. Eodem nomine in Zell data, vbi fructum fugacem esse perhibebant. Apta quæ in segmenta caesa, siccataque in vasis reponantur. Anno 1600. ibidem eodem nomine oblata sed maiora. Octob. principio carne adhuc satis firma, sapore dulci cum austerita-

te. Verùm Autumnus eius anni erat tardior.



*Pira aquosa maiora.*



36. Wasserbirn, aquosa Pira in Kirchen, oppido V. Virtemberg. ita vocata, sicque & alibi appellari ferunt, Piris Spectbirn dictis æqualia: turbinata vna parte, altera sessili, ventricosa, satis æqualia, lutea. Septemb. 17. nondum erant mollia. Aunt depicto hoc longè etiam reperiiti maiora. Durant ad Septemb. finem, carne dulci, grata.

*Pira decorricata V. Valdensium.*

37. Schelbörn V. Valdensibus dicta, quasi decorricata, decorticare enim Schelen est, fortè à cutis teneritudine, quòd quasi nullam cutim habere, & decorticata esse videantur. Ouata ferè sunt, & nonnihil angulosa, lutea, cute tenera. Differunt à supra descriptis Aquosis Basiliensibus & Vlmenibus dictis, quòd hæc maiora sint, magisque angulosa. Sed non diu quoque durant. Sept. 16. caro satis tenera, succulenta, dulcis, sapida. Sept. fine omninò fraccida.

Pera





adstringente, cum modica & obscura quadam dulcedine. Cocta tamen vel per se, vel in iure, mollescunt, & acceptabili gratia in mensis comeduntur. Proueniant Montb. in horto Principis. Leguntur post Autumnum.

Pira Canina.

42. Leitschbirn in Boll, & Wälde & Zell, quasi Canina dicas: [Leitsch enim quibusdam Germanis capis est] pulchra Pira, longa, turbinata, infernè sessilia, non vndique aequalia, luteola, alicubi, & viridia cum quadam asperitate, pediculo aliàs longo, aliàs breui. Figura longum exhibet. Aiunt & maiora reperi, & ad hyemem durare. Torrent integra in fornace. Segmenta etiam concisa siccant. Sept. 18. Sapore grato, licet adhuc subaspero, semina tamen vel tum matura, nigra. Oct. medio admodum sapida. Videntur potius putrescere, quam frascere: Nam ex Montbelg. delatis 23. Octob. vix integri quicquam restabat, adeò euaserant putrida interim tamen sapida.

Pira longo pediculo.



43. Pira à pediculo longo nomen indepta, Langsler VVittembergenfis, in Boll, Zell & Wälde, & locis vicinis propè fontem Adm. & versùs Vrachum dicuntur. Quata ferè sunt, sed inæquali & tuberosa superficie; colore viridi, palliscente. Pediculus non rarò longitudine ipsa Pira superat. Sept. 17. nondum erant matura, arbor etiamnum harentia, acerba valdè, lapillisque duriusculis farcta. Integra manere perhibent vsque ad Ianuar. In Wälde & Kirchen Octob. 22. lapida erant. Montb. delata, durarunt ad Ian. sineq. Friburgi Brisgoie, Katten & Meussbirn / à pediculis caudam muris referentibus, appellantur. Matura erant Septembri. Eadem exultimamus, quæ Pendula Montbelgardenfes indigitant, Pira pugillaria, minora tamen Lardinis dictis, longo pe-

38. Perelegans Piri genus, & magnitudine præstans, in lautioribus quibusdam superioris Altitæ hortis, speciatim in illustri illa Massouienfium Abbatia habetur, quod pentagonum à figura, quæ ferè donata sunt pleræque, libuit appellare. Aug. maturum, magnitudinè pugni, circumscriptuone penè ouata, si angulos demas, Pediculus vncias duas longus, tenuis pro fructus magnitudine, cutis flaua, & qua parte Solem respexit, ruffa. Caro alpèra sauis & granulosa, gustu subadstringens, dulcis, & quæ paucis diebus mollescit. Odore præstat. Lautiora perhibentur cocta, quàm cruda. Suspicio est, idem esse posse cum præcedenti, quod depictum apud fontem Adm.

39. In Strenui & Nobiliss. D. à Richach horto Montbelgardenfi habentur Pira, sex vncias alta, utrinque turbinata, in medio ventriosa, sic satis. Media parte obscurè ruffiscentia, reliqua obsoleto colore ex flauo luteo & suffusco mixto. Tota cæterum maculis lenticulatis obsita. Septembri lecta dura adhuc, Sapore acidulo, adstringente. Fugacia tamen sunt: quædam enim paucis diebus computruerunt.

40. Hoc nomine (Speckbiren / id est, Lardina Pira) iam supra descripta sunt ex Cordo, quæ etiam descriptio Lardinis Basiliensibus dictis Pius satis conuenit, nisi quod apud nos non Autumni, vtille ait, initio, maturefcent, sed Iulio aut certè Aug. principio, vnde etiam Montbelgardenfisbus *Poires de Moissen* hoc est, Meiss Pira dicta, à tempore, quo matura sunt. Alioqui celeriter frascunt, & Autumno iam euanescere apud nos.

41. Pira Serotina ruffa pediculo harent sessili, mediocriter crassa. Magnitudo ferè qualis Angelorum Pirus, vna parte turbinata & nutante, altera quæ circa umbilicum, qui profundus satis, sessilis. Tota vel ruffa sunt, & quasi ferruginea, vel in pallido virore rubris maculis densè oblecta, inæqualia, dura, sapore acerbo. Mense Februarii adhuc illata, dura, rugosa, carne acerba,

diculo, quæque surculo committuntur, crasso harentia, cortice ex viridanti fusco, rugoso, carne dura, austera & subdulci, candida, nondum omnino matura Septembri.

*Pira longo pediculo flava.*



Gelblangstlerbirn, hoc est, Lutea, longoque pediculo Pira Bollenfisbus dicta, satis accedunt ad formam Schlesischbirn / nisi quod pediculi longiores: odor etiam differt, tardius maturefcunt, alioqui ovalia ferè. Color ex albo subluteus, non virefcens, vt in aliis, à longo pediculo Langstler vocatis: alioqui nonnihil angulosa, vt illa. Pediculus Piri ferè longitudinem æquare solet. Montb. delata, grati adhuc saporis, licet iam fragescerent.

*Pira Regalia, seu Magnatum.*

Et si Pira Regalia dicta iam suprâ ex Cordo descripta sint, quia tamen figuras paratas habebamus, placuit & nostram descriptionem apponere. Regelsbirn Bollenfisbus & Valdensibus, quemadmodum & Basiliensibus, & passim vbi obseruauimus dicta magni sunt: Nam & carè venduntur, & ad Aprilem, & quorundam diligentia etiam ad oporan vsque durant. Magnitudinem vulgatam maior icon ostendit, rariùs minora videntur, videntur tamen, vt prior figura docet. Supernè turbinata sunt, infernè sessilia, ventricosa, nonnihil angulosa. Sunt & quædam non ita longa, interim tamen crassiora. Colore sunt subuindi, & ex præsino ad cæsiu vergente, gustu dulci & præsuaui Septemb. fine, quo tamen nondum perfectè erant matura. Pulcherrima habentur in Zirkelheim, oppido & pictis maioribus. Ioh. Lutz Pharmacopæus Kirchenfis illustrat. Exc. Celsit. nulli secundus, ex ho-

rum Piorum succo Ele&. elegantissimum suauissimūque, & ad modum eius quod ex succo Cydoniorum paratur, confecit, elegantibusque figuris effigiatum Abietinis exceptis scatulis. O& fine valdè sapida sunt & succulenta. Montbelg. delata, sub finem Februarii nullam expecta erant corruptionem.

*Pira boni Christiani.*

His valdè accedunt Pira Boni Christiani dicta, [nam vtrique habemus in horto Montbel. Principis, & distinctis hisce nominibus] quæ demum circa Festum Pentecostes cruda esui apta: de quibus suprâ.

Ex Regalibus sunt quædam serotina dicta, Spahr Regelsbirn vulgò dicta, quod tardius adhuc maturefcant, sunt angulosa valdè & inqualia. In cæteris ferè conuertunt cum præcedentibus. Labet & horum geminam [quæ cum aliis quibusdam Piorum & Pomorum iconibus Ill. E. C. V. Virt. liberalitate paratæ erant] figuram subiicere.

*Pira Regalia Serotina. Spahr Regelsbirn.*





*Pira dorsalia, eademque Libralia dicta.*

48. Pira Bollenfibus & circa fontem Adm. Rusefbern & Arebaefbern / à dorfo & natibus, quorum mulculos & lacertos aliqua parte referunt) id est, dorsalia & natium Pira dicta, pramagna sunt & speciosa, vt ex figuris facile deprehendi potest. Tota sunt inaequalia, & quodammodo tuberosa, colore obfcuro, virenti ferè. Aiunt ad lun. durare. Aliis etiam vocantur Dle

Tom, 1

merbern / alijs Pfundebirn : Prius Vlmensia sonat, postèriùs libram pendentia : sunt enim ponderosa. Alijs etiam Bùrbabirn / Cucurbitina rectè dicas. Octob. 14. sapore adhuc aultero. Montbelg. delata ad finem anni durauere. Eadem nisi fallimur, in Brisgoia in splendida illa arce Ill. Equitum Rhodienium nobis vocata Zapsfenbern / & Pira S. Catharina.

49. His affinia sunt Pramagna illa Pira, quæ à pondere libralia Burgundi vocant. Pleraque enim libram pendunt, & interdum etiam magis. Crassa sunt, Ventricosa, sessilia, umbilico profundo, vix altiora, quàm crassa. Diameter est sex vel septem vnciarum. Cute quoque sunt crassa, vndeque maculis pullis obfita. Octob. lecta sapore sunt austero, cum quadam dulcedine, nondum tamen cibo apta : Carne firma, succulenta. Habentur in horto Montb. Principis, ex furculis è Burgundia accersitis infusione comparata, de quibus etiam Ill. Principi VVilhelmo Landgrauio Hessie misimus. Eadem postea in horto egregii viri Io. Vvild Tabellionis E. C. Vvitt. comparata. In Lotharingia vt aiunt, Pires de 16. onces vocantur, id est, sedecim vnciarum Pira. Durant ad oporan vsquè rectè reposita, & suauitas eorum sequenti decem mense præcipua.

50. Anlibralia Plinii Pomi quodammodo figuram habent, aded rotunda sunt & sessilia ; E' magnorum Pirorum numero, Aurantii mali maioris magnitudine, vt quædam inter ea libram ferè pendeant, communiter mediam. Tota angulosa sunt, & lenticulatis guttulis vndique aspersa, vna parte rubra, reliqua flaua, non sine punctis viridantibus. Umbilicum profundum habent, cui anguli torosi eminent, sicut in malis Cydoniis. opposita pars, quæ pediculus breuis & crassus est. Fragrantissimo ore nares percellunt. Mòrbelg. in horto nobiliss. D. à Rysbach Septembri leguntur. Sapore sunt prædulci, grato. Carne duruscula, neuiquam tamen lapidosa.

*Pira Strangulataria.*

E 7

51. Valida aded his adstringendi vis, vt cruda comesta, praesertim à delicatioribus, eos in strangulationis metum coniciant: quapropter cruda vix possant, absque molestia. Optima tamen sunt cocta & exsiccata. Bollenfes Eufelbiri vocant. Non diu durant. Sub finem Aug. maturescunt. Quidam vocant *Mansbiri*, id est, vitilia Pira. Reperiuntur & maiora, vt alibi, tum Basilae, vbi *Dannenbiri*, [quali Canthari Pira dicuntur] vocantur, à figura. Ibidem in segmenta concidunt Oeconomiae rei studiose matronae, atque sicant vel torrefaciunt etiamque integra, & interdum in aliquot annos asseruant. Habentur enim hac Pira torrefacta prae aliis optima. Tubingae quoque proueniunt. Eleganti flauedine placent. An verò sint Strangulanea supra ex Curo & Ruellio descripta, difficile iudicare est. quod figuram non doceant. Sed quia rubrum colorem in his commendat, fortè ab his diuersa, quae omnia aut certè magna ex parte lutea sunt.


Eufelbiri.

Mansbiri.

Ransbiri.

## 52. Pira acuminata.

Spizbiri.



Pira Campanacea Montbelg.

Spizbiri VVirttembergensibus, id est, Acuminata Pira, ex figurae ratione vocata videntur. Etenim si quod aliud Piri genus, certè hoc ad Pyramidis figuram accedere, non obsecrum. Lutea sunt, habentur & hac figura maiora. Praecocia sunt, & fugacia. Septemb. 17. mollescent Caro alioqui satistenera, lapida, dulcis.

Pira Campanacea Montbelg.

53. Sunt & nostris aequae Burgundis sua Campanacea, à Campanis [Cordo dictis] Piris, vt nobis quidem videtur diuersa, licet figura & nomine conueniant. Ille enim sua omnino flaua dicitur & facile putrescere nostra obsoleto coloris sunt, & ad aridorum foliorum, essicant tamen viridi, non parum accedentia. Diceret viridem ferrugineo conspersum. A pediculo longiusculo & parte turbinate ita in latum se pandunt, vt manifesto argumento nomen indepta videantur. Quinque vel sex vncias altitudine aequant, latitudine vix quatuor. Nec facile putrescunt hac nostra, vt illa Cordi, sed diu durant, & demum mense Nouembri eduluantia: alioqui hyeme cocta fugacium vices supplere possunt, cum Certolinis vel Campanicis Ruellii. Leguntur ex horto Montbelg. Principis, Septemb. fine, quo tempore, carne firma, non multum succosa, astringente, cum quadam dulcedine, quae omnia spem faciunt longioris durationis. Poire cloche vulgò vocant.

Poire Cloche.

Pira curta. Stumpf ling.

54. In Than & Entzen Alsatiae superioris oppidis, habentur Pira, quae Stumpf ling vocant, quasi, curta vel manca dicas: volam quaedam impleant, alia etiam minora sunt, aliquid commune habent cum ouatis dictis Eyerbiri, aded carne sunt molli, dulci, atque suauis: verum non vtriusque turbinate sunt vitilla, sed ad pediculum

tantum, vt circa Pythmema lata & testilia, rubentia, punctata, pediculo aliàs breui, aliàs longiusculo. Ex his maiora pauca aut nulla habent semina, quasi horum materia in Pira alumentum & accrementum esset absumpta.

55. Rouge Vacon Lotharingi Pirum vocant, nobis ab horulano radicatum, speciosum magnitudine & figura, quatuor ad minus vncias altum, duabus lauius, turbinatum, sed turbine obtusiori, pediculo laterosum [quod peculiare huius Piri esse videtur] inserto, cortice scabro, dilute croceo, sed vna parte saturè rubro, ac quasi sanguineo. Carie firma admodum est, succo dulci, odorato, subadstringente: Nouembri nondum edule, est enim hybernium Pirum diuque durans. Decembri gustui apta cocta, mollescebant, sapore & odore suauissimo, verum granosa lapillive abundantia. In hort. Ill. E. Cell. V. Vitr. Montb. inserta.

Rubra Equina.

56. Pira saccharina dicta, zucferbiren oriuntur Leoberge Silesiorum vrbe, in praedio suburbano, aspectu non iniucundo, stolis sanguineis cum virore aspersa, Pira Spectibiren dicta magnitudine referentia, arbore decetpta lapidis paulo acerbioris, lapidosa, quatuor verò decinceps, vel quinque dierum spatio ita miscelant, vt Sacchari instar commansa in ore liquefiant, à sapore nomen indepta. Surculi alio translati infusione nulla traducuntur, quae causa subit, vetustitine? an alia ratio ex Sole petenda? an verò prima plantatio artificiosa, naturalive, in dubio est. Hoc genus Piri tradere videtur Schvvenckfeldius inter Serpes Silesiacas sine descriptione his verbis: Saccharina zucferbiren.

Saccharina Pira.

In nomine sunt & alia multa apud Alsatos, vt Creuselbium Mallocoqui, Pira Riparum [fortè à figura] Rübörin, & alia quae nondum à nobis descripta sunt: item Schilbiri, Geigelsbiri, Grammen oder Giesbiri, Flugbiri, weisförselbiri, &c.

Saccharina Pira.

Creuselbiri Rubra.

In Burgundicis oris ferè hac habentur, de quibus omnibus accersitos surculos etiam in hortum Montb. Ill. E. C. mercuramus, vt constet posteritati, potissimum Montbelgardiacae, de nostra diligentia & iuuant studio. Nomina sunt hac. Pira nigra, poires noires, Pira dicta de Roussel, optima cocta. 3. Pira S. Laurentii. 4. Pira Augusti mensis, poires d'août, ex Barmont arce Burgundica, 5. Pira Saccharina vitidia: poires verdes succres: ex Barmont. 6. Pira poma, poires pommies: ex Barmont: fortè eadem cum Poma-Piris. 7. Pira magna dicta d'arbo: ex Barmont. 8. Alia magna dicta poires magniers: ex Barmont. 9. Pira hortensis, poires de courtil, ex Grange, arce Exc. Celsitud. VVirtemb. 10. Pira operaria, poires ouvrieres: ex Grange. 11. Pira Charie: ex Gr. 12. poires de Gramont: ex Gr. 13. Pira Germanica, poires d'Allemagne. 14. Pira Campanae similia, poires comme cloche. 15. Pira campanacea alia, poires de cloche, vitraque ex Gr. fortè alterutrum horum est id quod paulo ante descriptum. 16. Pira dicta poires de parent, quasi apparentia dicas ex Gr. 17. Pira strangulatoria, poires d'angoisse, fortè eadem cum antea descriptis. 18. Pira domini, poires Monsieur: ex Clareuallae oppido Exc. Celsitud. delata ex Taranais, & alia multa aliunde illata, praeter supra descripta. Faxit Deus Opt. Max. vt posteritas admirandis istis illius operibus aliquando cum gratiarum actione fruatur.

Pira Burgundica. Varii generis in hortis transplacata.

Chr. antea res in Pira enumerata.

Sed satis iam satis Pirorum ostentationi indulgendum, nec tamen omnia dicta: Equis enim possit in



in tanta nominum infusionumque confusione? Hoc tantum volumus, ut Germanix opulentiam cum Italia, Gallia (quas & ipsi aliquando suis passim locis vidimus, & gustauimus) atque Angliæ Gazis cōferremus, & curiosis ingeniis, quibus anguli illustrium harum nationum hodie perstreperunt, etiam hac in re satisfiat. Nunt ad reliqua pergamus.

Sativa Pirus auctore Theophrasto, pauca admodum in locis calidis, ut in Aegypto, & vitata ob temperamenti contrarietatem. Eadem in plano melior prouenit tam materie, quam fructu. Loca specialia ex supradictis satis patent. In genere omnes latam solum amant. Gaudet iis Italia. Nihil frequentius Germaniæ, Galliæ, & præsertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmanniæ, Angliæ, ubi Cidre & Pere admodum suas potiones vini vicarias faciunt, ut annotat Lobelius. Florent mensibus Aprilis & Maio: Aestate & Autumno fructus maturefcit. Quæ tardè floret, tardè fructificat, Pirus Trago ante Malum cum Ceraso plerumque & Pruno florem fert. Pirus etiam si non plantat, sed fiat Austrinum cœlum, aut nubilum, amittit florem & primos fructus, si cum deflorescentes tales dies fuerint, ex Theophrasto. & Pinio. Item: quæ citò occidunt, velocia sunt, & tamen antecedunt diuitiis, ut Malus & Pirus, Magog apud Plin.

Pira non eodem tempore omnia feri iubet, quoniam non æquè florent. Eadem oblonga, aut rotunda ab occasu [ab ortu Dal.] Vergiliarum ad brumam. Reliqua genere media; hyeme, ab occasu Sagittæ, Subiolanum aut Septentrionem spectantia. Serendi vel inferendi tempus, & cultum habes apud Geoponicos, potissimum apud Carol. Stephanum, qui docet quomodo inferenda ut citius vel tardius proueniant, ut fructifera reddantur, & acquirant odorem, aliæque multa præclara. Communis quidem Italiæ ratio serendi vel inferendi Pirus autumnum tribuit, ita ut brumam in xv. nec minus diebus antecedant, ut tradit Plinius. Et Scaliger Pireum & Malum Autemnon potius feri suadet, quod hybernas impressiones melius tolerare valeant, quam æstiuas. Hæcque fortè ratio cur Pirus calidis regionibus, ut Aegypto malè habeat.

Denique Pirus, ut & Malus, in montibus breuius, nodosa, spinosaque: in planis amplior, pulchrior visu, meliorque tam materie, quam fructibus. In Calabria tamen, regione calidissima copiosam haberi Pirum vel ex Horatio discimus, ut dicitur in insula. In historiis Indicis legimus, in insula Palmæ ita proficere Pira, ut à sedecim ad triginta uncias ponderent: Eorundem etiam meminit Cardanus, sed quod genus Pirosum sit, non docent.

Dioscoridi Piorum genera adstringunt. Quare conuenienti adduntur Cataplasmatibus repellentibus. Decoctum siccatorum, & ipsa cruda, alium sistent: ieiunos tamen esitata lædunt. Quam sententiam & Plinius confirmat. Piorum omnium, inquit, cibis etiam valentibus onerosus, agris quoque vini modo negatur. Decocta eadem mirè salubria & grata, præcipuè Crustumina. Quæcunque verò cum melle decocta, stomachum adiuvant. Fiunt Cataplasmata à Piris, ad discutienda [leg. repellenda, ex Dioscor.] corporum vitia: & decocto eorumque duritas vituntur. Ipsa aduersantur Boletis atque fungis, pelluntque pondere, & pugnante succo. Quod postorius Dioscor. de Piris syluestribus scribit, (de quibus infra) quemadmodum & hæc. Piorum ligni

cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit. Mala, Piræque portatu iumentis mirè graui sunt, vel pauca. Remedio aiunt esse, si prius edenda dentur aliqua, aut utique ostendantur. Conduuntur verò Pira, ut vix, ac totidem modis. Pitis ut & Pomis, proprietates vini, similiterque in ægris medentes cauent: Hæc Plin. Idem & Plutarchus refert, & Lucianus in Aîno aureo. Quod verò de iumentis ait, consideret lector, an rationi & experientia sit consentaneum: nisi fortè inde molestia sint, quod ferant id, quo frui nequeant, odorque identidem illiciat ea, etiam ad molestiam vsque. Neque enim facile crediderimus odorem per se iis molestum.

Galeno Pira esu stomacho grata sunt: quin & vinum habent exiccandi: atqui syluestribus magis exiccandi vis inest. Quæ de Malis diximus, si omnia ad Pira & Punica transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus erit. Nam in iis quæque alia austerata tantum, vel acerbata apparent, veluti quedam acida, quedam dulcia, quedam denique ex horum mixtione composita: sunt quæ nullam penitus huiusmodi qualitatem exuperantem habent: quo fit: ut cum aqua sine aciebetia, nulla roborandi vi polleant. Talisigitur omnino Piorum usus, qualis Malorum. At Pitis, præsertimque grandibus, quæ apud nos Menitæ vocantur, aliqua alendi facultas donata est. Proinde ea facta in tenues orbiculos, sicaræque reponunt. Quibus coctis per hyemem & Ver, cum fames est, ciborum parum nutrimentum vice vescuntur. Et in libris simplicium: Piri folia, inquit, pariter ac turtiones austerata sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinent aquare: ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes: Nam pars vna terrea est, alia aquea, cetera vtraque frigida, tum alia temperata. Proinde Pira esu stomacho grata sunt, & si in prohibent. Illa autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse memini.

Serapio ex Aben Mesuâ. Proprietas Piti tam domestici quam syluestris est, ut si coquatur quodcunque eorum cum fungis, emittent illorum malignitatem. Maioribus vis potior, quam parvis, magisque nutriunt Pira quam Cydonia. Succus Piorum inspissatus cohibet fluxus biliosos, & ventriculum sanat, sed colicam causare solet. Remedio est, si potest, hauriatur vinum mellis paratum cum aromatibus.

Albertus scribit Piri radicem à muliere portatam Conceptum impedire: Fructum idem posse, si iuxta, vel supra se habeat. Id etiam à nonnullis creditum: à latentibus in parturientis lecto Piris, aut illuc transportatis, partum tardari, aut difficiliorem fieri. Sed hæc fabulis, quam experimentis sunt similia, quibus Alberti scripta sciant. Illud verò similius, quod alicubi Plinius ait: iis qui bupestrem hauserint, prodesse Piorum genus omne comedisse.

Sant, inquit Curtius, qui absolute, primo ordine refrigerare Pira dicant, & secundo desiccare: alii verò matura calefacere, humectare & mouere. Quod sanè intelligendum erit ex saporum vi, ac natura, ut dulciora calefaciant. Quæ autem inter dulcorem & aciditatem nature sunt compositæ, parum caliditatis & siccitatis habent, ut omnium denique vires ex saporum generibus metiri sit. Ante cibum verò sumpta, ventrem sistunt, maxime cruda. Grana, quæ in illis sunt, peculiari quadam proprietate pulmonis vitis medentur, sed renibus officiant.

Ligni cinis.  
Pira iumentis molestia.

Stomacho grata.  
Piorum qualitates.

Mentia.

Folia.

Stomacho.

Pulvis.

Succus.  
Colica.

Radix.

Conceptum.

Partum.

Albertus notatur.

Pira: Piorum ex sapore metiri.

Inter Pira, v t Celso placet, potissimum fragilia conferunt Stomacho, qualia sunt Crustumina, vel Meuana, & Tarentina & Signina. Sitim reprimunt. Quæ Pira, quia nobis defunt, substituemus alia, eadem dote donata. Pirorum succus atque dilutus sitim sedat. Eorum folia & rami pariter austeri sunt. Nam arboris partes omnes, non eiusdem temperiei sunt, vt alie terrestres, alie verò aqueæ, vtæque enim frigida.

Succus.  
Folia &  
rami.

Moschatel-  
lina.

Sylvestria.  
Pomeri-  
ana.  
Cor.

Pomina.  
Electaria.

Vetri pro-  
cid.  
Dylent.  
Calista.  
Sang. juu-  
u.

Floren.

Cor.

Elia.

Sapa è Pi-  
ra.

Matthiolo Pira acerba torrea sunt natura, acida frigida & aquea: dulcia medio modo se habent. Moschatellina aliæque odorata, ad modicam caliditatem inclinant, parumque admodum adstringunt. Quæcunque autem dulcia non sunt, adstringunt & obstruunt: & sylvestria quidem magis satinis: acida & acerba dulcibus: siccata recentibus. Ventrículo vtilia sunt Pira, si postrema in pasta comedantur. Cocta crudis prestant. Cordi robur addunt: sitim extinguunt. Ad ventriculum imbecillum vomitionibus obnoxium fit Electarium ex Pira quibusdam, illi simile, quod ex cydoniis conficitur, de quo satis multa diximus in capite de Cydoniis. Vulnere conglutinant, sylvestria potissimum, & cocta. Ex foliis Piri vel Pirastrii inlessis apparatur ad vteri & ani prociuentiam vtilis. Dysentericis & coliacis in cibo conueniunt. Arida ac resiccata Pira, siue cocta siue cruda edantur, ventris fluxus sedant, & sanguinis quoque fluxus sistunt: ad mulierum profluvia accommodari possunt, dulcia & vniuersi saporis plus quam cætera nutriunt: a quousa exigui sunt alimenti, parè etiam alunt acerba & austera, velut & acidiora. Crudis semper cocta vtiliora, & ad corporis nutritionem meliora. Quædam verò & adeo acerba & austera sunt vt non nisi cocta edi queant. Horum autem & nonnullis tam copiosa humiditas, vt super prunas, vel sub ipsi coqui expediat. Alimentum denique Pira omnia amplius & copiosius, quam Mala siue Roma conferunt, sed hoc ipsum frigidum quidem ac reprobum: ex Dodonzo.

Pira flores, inquit Porta Neap. frigida sunt & humidæ natura, quia albi: quod si verum, ex iis aqua destillari potest, conueniens ad effectus à causis contrariis. Idem scribit Pira quemadmodum & Cydonia, quia Cordis figuram expriment, misce auxiliari affectibus cordis, quæ verò flaua sunt, aut coloris crocei, qualia ferè sunt yerna, bilem generare, ob coloris signaturam, ex qua rerum causas atque vires dependere novus ille Philosophus opinatur, de qua re nunc non est disputandi locus.

Cæterum errant Medici cum Pyra febricitantibus vtilia iudicant. Febres namque omnes putridæ ex obstructione ortum ducentes, adstrictionem habentia Pyra, Aug. Ferrar. testis, reculant.

Suprà dictum, ex Serapione Pira cruda choliam causare solere, atq; hoc euenire videtur propter flatum, quos ingenerant: idèò consultum, vt iis haustus meri superbibatur, quod flatum dissipet, & Pitiorum frigiditatem emendet. Huc spectat antiquum illud Dyfichon:

Fert Pira nostra Pirus, sine vino sunt Pira virum:  
Si Pira sunt virum, si maledicta Pirum.

Pinguedinem quandam corpori, præsertim odorata atque cocta conciliare, sunt qui scribant.

Nostri sub cineribus coctis & decorticatis, aliquid fœniculi inspergunt, vt sic cænas claudant. Idem quoque ex maturis, siue deciduis siue collectis: sed bonè mundis succum exprimunt, & ad saporem consistentiam decoquant, quæ etiam stomacho ad suprà scriptos vsus sit gravior, si aliquid

coriandri aut fœniculi addas. Possunt & condiri, vt Cydonia, in segmenta concisa & Electaria ex succo parari, haud secus ac de Cydoniis dictum, cuiusmodi perelegans industrium Pharmacopœum parasse suprâ retulimus.

Veeres & vinum è Pira parabant, quod à Græca Pirorum denominatione, Apites vocatur, Apites & Latine Piratum. Palladius sic. Contusa in sacco rasilissimo, ponderibus vel prælis comprimuntur. In hyemem durat, sed prima estate accedit. Acerbum est, stomacho tamen accommodatum, intestinæque destillationes compescit. Multis etiamnum hodie locis, in primis verò in Valconia, Anglia, Northmanica, ex Pira, selectis potum confici Cidre & Pere illis nominatum sapore suavi, quem vini loco bibere iam antea retulimus, & Camerarius in scripta retulit.

Fiebat olim & acetum è Pira austeri saporis, vel sylvestribus. Matura in cumulo per triduum adseruantur, deinde in vasculum mittuntur, cui pluvialis, fontanæ aqua infunditur. Apertum vas per triginta dies relinquit, deinde quantum ad usum sublatum fuerit, tantum ad copiam quæ redditur. Vides quàm ad rem attentis fuerint Veteres; nos ista hodie omittimus, nec aliud sapit nobis, quàm quod à vino.

E Pira quoque, vt refert Hermolus, antiquitus liquamen ad feminarum ieiunia, quod Castimoniale dicebatur, fieri solitum, hac ratione: Pira maturissima cum sale integra calcantur, & vbi carnes resolutæ fuerint, in capulis vel vasculis picatis condiuntur. Post mensem verò tertium ea suspensa liquamen fundunt, non iniucundi saporis, & albi coloris. Tradunt & Nigellam, cum saliantur, addi solitam. Quæ verò possit esse saporis suauitas salis cum Piro: fatemur nullà cupidità eius habere palatus nostros illectos.

Aliud præsidium, & in contrarios planè vsus, nempe ad sedandam immodicam famem, qua aliquot milia hominum miserè perierunt, quæsiuerunt in obsequio sua, Lugdunenses Bataui ex foliis Pirorum aliisque, quæ variè preparabant, vt refert Strabius in Historia tumultuum Belgicorum.

In conuiuiis Græcorum Pira secundis mensibus inferebantur, aqua mersa, vt mitissima quæque legi possent. Quin & Calabri, qui (vt scribit Curtius) Pira abundanti, Pira hospitibus apponere consueverant, deinde saturos, bellatorum vice, domum auferre iubeant. Quod si recusassent, eadem porcis obiciebant, vnde Horatius in Epistolis:

Non quo more Pira vestri Calaber inbet hospes,  
Tu me fecisti, quocumque, vesere fides.  
Iam sacu est, at tu quam vni tolli benignè:  
Nun iniqua feret pueris munuscula paruis.

Tam tene, et dono, quàm si dimittat vniuersus.  
Seruari Pira Democritus adfirmat, quæ illitis pice furculis suspendantur. Alii in sapa, vel passio, vel dulci vino, vel multo mersa custodiunt cadis plenius. Plurimi inter scobem obruta seruantur. Alii siccatis frondibus luglandis involuta recondunt. Alii in vitreis fistilibus in vino vel multo demergunt, & operculato vase reponunt. Alii vinacais discretæ, ne se contingant, obruunt. Pira seruantur in fistilibus picatis inuersis obruta inter scobes. Alii Pira singula vasa fistilia assignant, & operecula eorum picta, doho iterum includunt. Aliqui arena in scrobe subiecta ita sicca operiunt, mox terra. Alii in floecis, caplis condunt, quas luto paleato illeuerint. Plurimi Pira inter paleas aut frumenta obruta seruantur, quæ ferè ratione hodie

Elect. e  
Pira.

Apites.

Pira.

Cidre  
Pere.

Acetum  
Pira.

Liquamen  
Castimoniale.

Cibus è  
Pira.

Mor Gra-  
corum ex  
Calabrorum.

Pira ser-  
uandi ra-  
tione Gra-  
ria.



In eos enim dicitur, qui rem perdifficilem aggrediuntur, vt annotat Curtius.

## DE PIRASTRO SEV PIRO

SYLVESTRI.

**P**irus Sylvestris minus procera ferè est arbor, quam satua: verùm furculosa admodum & ramorum extremis spinosis, caudice rimoso, & hiulco cortice, materie rutila, & quàm sapiez duriore, ideòque dīcos & tabellas ex ea conficiunt, quoniam vt in molli retunditur, ita in duro ferrū acuitur, vt scribit Theophrastus. Prīmū emergunt flores, instar vmbellæ, ex eodem furculo multi, lanuginosis pediculis insidentes, quinque foliolis constantes, albis, rotundis, cochlearis modo concavis, inter quorum singula intercedit subiecti hirsuti vmbilici radius, in viridi canescens: apices in medio multi, purpurei. Folia florente arbore subtilis & in ambitu canā lanugine obfita, foliorum Cotonei instar, superne virentia, splendida: aliās vtrinque glabra, lucida, subrotunda, crassiuscula. Fructus non vniiformes, sed aliās rotundi & modicè compressi, aliās ex rotundo leuiter turbinati & longiusculi, austeri & acerbī valdè, nec edules, donec frascant, quod ferè fit Octobri, semen intus continentes Pomorum seminibus simillimum. Extima aliqui facie Piri speciem facillè representat. Verùm à radice statim numerosè emittit stolonēs valdè spinosos, cortice rubicundo vestitos: Copia & rigiditate spinarum facillè discernuntur à stolonibus Malorum sylvestrium.

Theophrasto Piraster, quàm Achirada vocat, aculeos fert in ramis: facilius germinat, quàm satua: cūm enim pluribus minoribūque internodiis diuidatur, principia illa germinandi agiliora, propensioraque ad germen, opera celi ambientis redduntur. Nec non & siccitas nonnihil cōferre videtur: sic enim minus humoris relinquitur. Quod autem minus est humidū, ad motum promptius: quapropter & germinatio sylvestrium citior, quēmadmodum satuarum melior. Pirastro longior vita, quàm Piro. Tarde admodum maturitatis est: prius amittit folia, quàm fructum percoquat.

Relistit frigori propter densitatem. Domestica ex semine lata, vitium oritur Pirastrum. Pirastrum autem Pirus fieri non potest. Cui postrema sententia contradicere videtur Scaliger, qui scribit Pirum sylvestrem è syluis in hortos aut viridaria cultu mīscere. Theophrasto subscibit Ruelius, Pirastrum, inquit, Pirum fieri proflus reculare. Scaligero verò Porta Neapolitanus: Pirus, inquit, feris translata locis adhibito cultu deponit agrestem illum habitum simul cum aculeis, quos adulta tulisset, sumisque & laxatur illa densitas, quæ verba ex Scaligero transcripsit: nec tamen omnia: nam addit Scal. quæ videtur in eius popularibus, vnde transportata fuit, ad naturam meliorem. Porro Pirastrum mīscere duobus modis intelligi potest: vel in siupone satua in sylvestrem, qua ratione ex sylvestri mitem fieri apud hortulanos translaticium est: vel ex ipsa met arbore culta: absq; in siupone alterius, quod voluisse videtur Scaliger, de qua re amplius cogitandum.

Pirus sylvestris seu Piraster, *ἄχιδά* Aristotelis, *ἄχιδά* Nomina & Synonyma

hodie à nostris seruari solent in cella vinaria, vel conclauis fornicato reposita. Diutius adseruabis, si mutud sibi non incumbant, ac se ne contingant quidem. Adhuc diutius si ex filo suspensa pendcant. Alii statim lecta cūm tenacibus suis picatis vrceis condiderunt, & oribus vasculorum gypso vel pice clausis, ipsa sub dio obruta sabulone tegunt, quem modum hodie quidam pro secreto habent. Alii Pira quæ se non contingere in melle seruauit. Aliqui aquam saltam cūm coeperit vndare calfacta, despumant: & ei post iam frigida Pira seruanda demergunt: tunc exempta post tempus exiguum condunt vrceis, & eius lito ore custodiunt: vel diu noctūque in frigida salsa manere patiuntur, post in aqua pura biduo macerant, deinde sapa vel passio, vel dulci vino mersa seruant. Sed Pira quæ huic negotio destinantur, à cadiis diligenter electa integra debent esse, placido die, crescente luna, manu decerpta, vegeto Solis calore. Dura tunc & aliquantūm viridia vase claudantur, quod tegatur operculo: & inclinato deorsum ore, breui obruta ur scrobe, loco iuxta quem perennis aqua defluit. Item quæ dura sunt in carne & cute prius in acerio posita, vbi se molire coeperunt, in fistile picatum ponuntur, & operculo superueniente gypso linuntur: vas breui scrobe demergitur, loco qui quotidie Sole tangatur. Ex Plin. o. Nostris isto conseruationis apparatu non egent, sed ferotina & hyemalia dicta, iam dicta ratione facillè adseruant, ita vt quouis ferè anni tempore haberi possint & soleant integra. At vel integra vel in fragmenta concisa & granis purgata Sole siccantur: vel si non sufficiat, in furno, postquam exempti fuerint panes, deinde facies aut cedis excepta in sicco loco, ne fiant mucida, in annos etiam adseruant, non sine compendio æconomico.

Pira verò vel ante Columellæ tempora conseruatum erat, vt ex eo patet sic scribente: Pira cūm immatura; non tamen percurda legeris, diligenter inspicio, vt sint integra, sine viuo aut vetriculo, tum in fistili picata fidelia composito, & aut passio, aut defructo completo, ita vt omnepomum submersum sit, operculo deinde imposito, gypso.

Illud in totum præcipiendum existimaui, nullum esse pomigenus, quod non possit melle seruari. Itaque cūm sit hæc res salutaris ægrotantibus, censco vel pauca poma Piraque in melle custodiri, sed separatò generatim: nam si commisceas, alterum ab altero genere corrumpitur.

Qui plura de hac re, quēmadmodum & de Piri cultu, in genere, & in specie volet, Consulat Columellam, Constantinum, Palladium, Petrum de Crescent. Conradum Herespach, & Carol. Stephanum, & Colerum in suo Diario æconomico. Vnicum illud Grataroli quondam Medici Basilensis haud ignobilis experimentum addamus. Si, inquit, suspicio est ne vinum aqua dilutum sit, Pirus in vino impositum indicabit: nam si supernatauerit, merum est vinum, si fundum petat, mixtum aqua est.

Memorable est & illud, quod est apud Suet. de Claudio Cæs. Drusum filium Pōpei impuberem amisisse Piro per lufum in sablino iactato, & hiatu oris excepto frangulatum. Nec prætereundum & illud quod de Vulpe traditur, cūm Pirum, nisi carnes cibis defuerit, non edere, atque illud difficulter, & non nisi in fame. Vnde apud Plautum à Tranione dictum, idque adagaliter in Mustellaria.

Tam facillè vinces, quàm Pirum vulpes comest.

Theophrasto & plerisque Græcis. Etsi verò Dioscoridi *ἀχράς* species est *ἀχράς* vel *ἀχράς αἰνός*, tamen Theophrastus multis in locis simpliciter Pirastrum Achradam appellat. Cordus quoque Achradis vocabulo quemcunque Pirastrum significari censet: sunt enim diuersæ eius differentie. Et tam Pirus arbor, quàm fructus *ἀχράς* est Cornario. Dicitur & *ἀχράς*, vt scribit Curtius: & Colum. alpera syluis Achrados, cuius etiam meminit Achirades. Aristophanes. Quid autem Achirades Aliano, quas in cibo primum Tyrinthios habuisse memorat, nondum compertum, [inquit Hermol.] Nisi quis non Achirades sed Achradas, hoc est, Pira syluestria in eo legat. Nam, idem author inquit: ante Panis vsum Argiuos esitasse Pira, vt Athenienses Ficos: Glandem Arcades: Indi Arundinem: Carmani Palmulas: Milium Sarmate: Terbinthum Nasturtiumque Persæ. Achyra certè paleam significat: nec video quàm sit verisimile paleam quemquam vesci potuisse, quasi veterinum, etiam si Arcadas radicibus herbarum & arborum foliis recentibus ante glandis Fagineæ vsum à Pelago traditum, victitasse creditur. Idem Herm. Achradon Pirus syluaticam, Achrada dicit, & apud quosdam, vt & apud vrbana fertiliorum prædicari Nicandro *ἀχράς*, vt citat H. Iun. quo nomine putatur vñs fuisse Virgilius in 3. Aeneid. *Vitum infelicem baccas lapidosæque corna.*

*Αχράς* Theocr. Schol. quomodo in *ἀχράς* pro syluestri Piro accipitur, apud eundem & apud Poetas quosdam alios, atque ad eundem ipsum quoque Theophrastum, vt iam supra dictum. Had. Iun. in suo Nomenclatore mutato *π* in *λ* scribit dici. [nisi sit mendum scripturæ, nam ita scriptum apud nulum alium inuenimus: dixerat tamen idem iam prius *ἀχράς*, vt hac ratione ipsum legisse haud vana sit coniectura] Aliis *ἀχράς*. Ita *ἀχράς*, *ἀχράς* in *ἀχράς*, in Epigram. Græcorum. Vtraque vox *ἀχράς* *ἀχράς*, vt idem Theocr. annotat, hoc est, à suffocando. Vnde fortè nostrum *Angst*, & Latinorum *angustia*, qualis euenit iis, qui Pira syluestria comedunt & strangulatoria. Goropius diceret vtramque vocem tractam à Germanico. Sic Thra-sylbulus cum deberet sententiam de re consulta suam dicere, à Lacedæmoniorum legatis munere corruptus, simulauit se Pira syluestria comedis-se, & præ angustia oris non posse loqui, vt refert Zvingerus in suo Theatro.

Nomina linguar. Germ. Ein wilder burnbaum, mildebirn, holz-birn, & selb-birn. Lonicero. Feldbirn. Silesiæ. Belg. wildepecreboom, wildepeeren. Gall. Poirier ha-sard, ou sauuage. Ital. pero seluatico. Hisp. Guadapero, de pero errant. Angl. wild pear tree. Chouffe pere tree, woody pear tree.

Differetia. Ex Diosc. verbis faciliè est colligere ipsum plures Piri syluestris species agnouisse, quando ci *ἀχράς* species tantum *ἀχράς* est. Trago Pira syluestria vni generis sunt, inter quæ minutissima quæ dura & lipidosa sunt. Germ. Gessboren.

Tab. Pira sylu. trium generum facit. 1. Pira syluestria simpliciter, holz-birn. 2. Pira sylu. maiora, großholz-birn. 3. Pira sylu. minima, kleinholz-birn, Gessboren.

Gerardus Anglus ita distinguit. 1. Pirus strangulatorium minus the small cheffe pear. 2. Pirus sylu. the wilde chesse pear tree. 3. Pirus sylu. minima, the wilde ceab pear tree. Cur autem tres figuras Piorum satiuorum T. Bernamontani posuerit inter syluestres, & sex faciat, non indicata vel differentia, vel causa, ipsi excusandum relin-quimus.

In Silesia quoq. duo genera obseruata Schvveik-

feldio, maiora & minima. Apud nos Mont-beldardi in syluis aliquot differentie obseruan-tur, potissimum in fructibus conspicuæ, maiores, mediæ, paruæ, rotundæ, turbinatæ: pediculo longo & breuiori: sapore etiam differunt, quidam acerbiores, quidam magis edules.

Passim occurrunt in Germania, & locis circum-iacentibus, præsertim in syluis, sepibus, & ad ar-uorum margines. Item in montosis. Neque his caret Gallia & Italia. Quin & in regione Græciæ Apia dicta nasci Achrades, vnde & Apii vocen-tur, Scaliger scribit. Et ex Theophrasto, Pirus sylu. in calidis malè haberi, vt in Ægypto, vbi etiam mites Piri & Mali nihilo meliùs. Nullam proflus syluestrem ibi in Piorum genere, quod germen nequeant emittere: mitem autem raram. In Heluetiæ montosis & asperis frequentes ad-modum sunt. Vix ante Octobrem fructum per-ficiunt. Florent cum cæteris, & plerumque etiam ante. Diosc. & Plin. tardissimè eius fructum matu-rescere scribunt.

Pirus syluestris auctore Theophrasto natura est terrena, acerba, solida. Dioscor. Achras syl-uestris, vim Piro satiuâ adstringentiorum ha-bet, & ad eadem conducit. Adtingunt & fo-lia eius. Ligni verò ipsorum cinis efficacissimè his auxiliatur, quos fungi strangulant. Aiunt Fungos, si syluestria Pira cum eis coquantur, in-noxios fieri. Pirus syluestre, inquit Plin. conciditur, suspensumque succatur ad sistendam al-uum, quod & decoctum eius potum præstat. De-coquantur & folia cum pomo ad eisdem vsus. Galeno quoque Pira syluestria magis, quàm reli-qua adstringunt & desiccant: & proinde sanè maiora vulnera glutinant, fluxusque repellunt.

Folia Piri syluestris, æquè ac domestici, ad vuluæ proci-dentias, aliæque mala vilia sunt, notante Trago. Pirastrer, teste Curtio, eadem cum Piro satiuâ vires habet, verum longè efficaciores. Fun-gi quoque innocentes tutiorisque sient, si in Pirastris vel fructu vel folio cocti fuerint. Pro-sunt etiam contra eisdem Pira confectum sumptâ, nec non etiam lixiua ex cinere eius arboris facta, & cum sale, posca, vel nitro epota.

Sed eruditus atque in arte versatis hoc loco con-siderandum relinquimus, antutis sit vñs Piro-rum sylu. cum Fungis, vt non noceant, vel vt no-cumentum tollant. Nam quis credat ab iis vene-natam qualitatem in Fungis malignis retuadi-mò censemus Pira eorundem folia, etiam cum sa-lubribus fungis proflus inutilia. Quippe Fungi cuiuscunque tandem generis sint, quod citiùs à natura deiciuntur & extra corpus pelluntur, eò salubriùs, quum ventriculùm grauent, aut lani-ent venenivæ, ac vt Diosc. ait, *ἐν τῇ κοιλίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἀχράς*, omnes spiritus via quasi la-queo interclusa præfocant. At Pira & eorum folia, potissimum syluestrium, cum polleant adstrictio-ne non parua, ac certè ne modicâ quidem, sed magna, superius ventriculi os coarctant, quom-odò per vomitum reiciantur, similiter & aluum constringendo eorundem expulsiorem difficilio-rem reddunt, contra Aph. Hippoc. Quod natura vergit, eò ducere oportet. Atqui natura in iis, qui assumpserunt venenatos Fungos, vel etiam non venenatos copiosius, conatur eos per vomitum vel aluum renecare. Enimvero sanè si aliquis Piro-rum syluestrium eorundem vel foliorum ad assumptos fungos vsus esse possit, hunc potissimum esse pu-tamus in iis, qui fortè ad eorum esu in *ἀχράς* in-ciderint. Voni tum tamen præferimus que *π* ipe quoque Diosc. præfinit, dicens: *Corfektina* succur.

Locus & tempus.

Virces & vsus.

Folia. Ligni cinis.

Alii flu-xus.

Vulua præ-cid.

Ad fungos.

Pira silu. At fungos nihil con-ferre con-tentum tollant. Nam quis credat ab iis vene-natam qua-litatem in Fungis malignis retuadi-mò censemus Pira eorundem folia, etiam cum sa-lubribus fungis proflus inutilia. Quippe Fungi cuiuscunque tandem generis sint, quod citiùs à natura deiciuntur & extra corpus pelluntur, eò salubriùs, quum ventriculùm grauent, aut lani-ent venenivæ, ac vt Diosc. ait, *ἐν τῇ κοιλίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἀχράς*, omnes spiritus via quasi la-queo interclusa præfocant. At Pira & eorum folia, potissimum syluestrium, cum polleant adstrictio-ne non parua, ac certè ne modicâ quidem, sed magna, superius ventriculi os coarctant, quom-odò per vomitum reiciantur, similiter & aluum constringendo eorundem expulsiorem difficilio-rem reddunt, contra Aph. Hippoc. Quod natura vergit, eò ducere oportet. Atqui natura in iis, qui assumpserunt venenatos Fungos, vel etiam non venenatos copiosius, conatur eos per vomitum vel aluum renecare. Enimvero sanè si aliquis Piro-rum syluestrium eorundem vel foliorum ad assumptos fungos vsus esse possit, hunc potissimum esse pu-tamus in iis, qui fortè ad eorum esu in *ἀχράς* in-ciderint. Voni tum tamen præferimus que *π* ipe quoque Diosc. præfinit, dicens: *Corfektina* succur.

ἀχράς.

ἀχράς.

Achirades.

Coniectura in Achra-da.

Achradon.

Coniectura.

Coniectura.

Thra-sylbulus.

Assinus.

Nomina.

linguar.

Differetia.

Gerardus.

Angl.



fuccurrendum oleo citatâ vomitione. Mirificè etiam iuuare lixiuia fermentitia, aut è Piraſtri ligno parata. Vnde miramur Matth. in hac verba prorumpere auſum: poſtquàm tantam cum palato fungi gratiam iniere, vt ab his abſtinere hominès non poſſint, ſaltem diſcant velim, vt ſeipſos à morte vindicent, Fungos nunquam eſſe ſumendos, niſi priùs cum ſylueſtr. Piriſ decocti fuerint. Quod ſi ſylueſtria deſiderentur, ex domeſticis ea ſupplere poſſe, quæ cæteris auſteriora habentur. Hæc ille. Qua verò ratione, quæue temeritate hoc dicat, iudicent docti. Nos tutiora certioræque ſectamur. Ad dignoſcendum autem, an muſtum aquam habeat, Pirus ſylui in hoc conſiſtunt quod ſi aquam habuerit, in profundum demergitur, quod antea de Pito domeſtico ex cratorolo diximus. Res in vtroque experimèto eſt facilis. Aqua ſtillatitia è Piriſ ſylueſtribus, ſæpè bibita facit ad fluorem immodicum hamorrhoidum: Cammer. E ſucco in dysenteria vtiliſſimam credit Geſn. Fit & Potiois genus ex Piriſ ſylueſtribus additis etiam Malis & pruniſ ſylueſtribus, omnibus conuſis, per ſe expreſſis, aut aſſuſi aqua, muſto ſimilem potum parant ruſtici in Haſſia, autore Cordo. Nec in Haſſia modo, ſed & alibi locorum parari ſolet, quemadmodum & hoc. Prædicta contuſa, additis etiam granis Berberis in doſiolum coiciunt, aquam aſſundunt, vt bulliat. Tum vini loco bibunt, præſertim pauperes. Sed iis, qui ad Colicum dolorem procliuiſ ſunt miniùs conducit cuiuſmodi potus. Præſtat virum Gallicum, Burgundicum vel Rhenanum. Noſtri etiam ex ſylueſtri Piro ſapam faciunt, cuius vſus vaiuiſ ad condiendum, loco mellis & Sacchari.

## PIRVS POLVILLERIANÆ.



Piri genus pulcherrimum, & rariſſimum habent. Generuſi D. Barones à Pollviller, quod Rot hſile vocat, cuius arbor eſt proceræ, vt Piri magnæ, ramis ad cælum ſurcatis cortice ceu cæterarum Piorum veſtitis. Folia Piorum foliis diſſimilia, intus Piri & Mali media, ad Mali tamen magis accedentia, vel potiùs Sorbi Alpini, ſed minora, oblonga, inſiſſa incana denſaque lanugine pubeſcentia, ſuprà quoque piloſa, ſeminibus multo, atrouirentia, ſplendida, ferrata flores è ſurculis, vt in Sorbo Alpina, craſſis, multiſimul iuncti, ad 40. vſque interdum, umbellam æmulantes, odore ſatis iucundo, ex pediculis, partim longis, quadrantalibus, ex oculis prodeuntibus, partim breuib, vncialibus, ſemuncialibus, ex longioribus exortis. Flores ſinguli quiniſ conſtant foliis, vt in Piro, ſed minoribus, nec ita candidis, ad luteum inclinantibus: apices, vt in Piriſ, rubentes. Fructus

ſunt Piorum formâ, ſic vt non immeritò Pira dici poſſint: parui vt Pira moſchatella, nec maiores, nonnunquam etiam minores extremo pollicis articulo, ſi ad vnguè m reſecetur, externè rubèſcentes, interdum punctulis albis notati, internè lutei: in quibus ſemina eadem quæ Piriſ, iucundi ſaporis. Vbi matura ſunt, facilè decidunt, agitâtâ arbore. Aliquandiu à collectione aſſeruantur, deinde, vt cætera pleraque Pira, ſcæſcunt. Arbores has vidimus primùm Polluillæ in Aſſatia, deinde etiam VVatuilla in horto D. à Flachſlander, præterea Maſſocouii in horto Baronum à Polluiller, vbi inſerta etiam ſunt Piriſ ſylueſtribus, ne hanc alibi notam comperimus, licèt quamplurimis demonſtratam. Inde accepimus dono ſurculos, quos Montb. in horto Principis inferendos curauimus, & etiam aliquot arbuſculas habemus, quæ tamen nondum floruerunt. Floret Aprilis fine & ad Maii medium vſque. Anno 1579. Ex inopinatò ventuſta & elata cuiuſmodi Pira potulit in horto E. C. VVirt. prædicto, quæ matura Iunio. Magna ei ſimilitudo cum Sorbo alpina, ex qua fortè per inſiſtentionem eius origo.

## PIRVM LANVGINE SALSA THEOPH.

Meminit Theophrast. Piri cuiuſdam generis in Caria naſcentis, quod lanugine tam ſalfa obductum dicit, [χρυσὴ ἀντὶ τῆς λανυγῆς] vt niſi aqua ablutum & abſterſum, edi non poſſit. Piro autem extra inſidet hæc lanugo: non verò intus naſcitur: (quod & in ſiliquis quibuſdam fieri Ruell. ait, quæ falſe ſuperficiè tenus apparent, & ſint.) alioqui ne poſt ablutionem quidam edulia futura.

## DE SORBO.

## CAP. V.



Sorbus proceræ eſt arbor & ramoſa, cortice rugoſo, vel vt ait Matthiol. ſcabriuſculo, colore ex flauo albicante, radice rara; craſſa, ſolida atque deſcendente. materie rubente; ſolidiſſima atque compacta. Folia pinata pediculo vnciali, ſeptena, aut nouena, foliorum vncialium; anguſtorum, in ambitu ferratorum, coſta per longitudinem decurrente, hirtutorum, ſupina parte virescentium, pronâ caneſcentium, conuagiatione, imparique vno reliquis conſimili alam claudente, omnibus ad coſtam incanam villoſamque alligatis conſtantia, facie quodammodo Rhois, ſapore acerbo. Flores eidem ſurculo cum foliis

Deſcriptio

Folia.

Flores.

Fructus.

insident ex pediculis vncialibus & sextantalibus, simul multi iuncti, quasi in umbellæ formam, albidus. Fructus Plum moschatellinum paruum equat, turbinatus, umbilicatus, magis minuscule rubens, prout Solem sensit, Scal. rubiginosum dicit, carne flauescente & ante maturitatem adeo austero succo, ut strangulet. [teste Casalp.] colore in rutum transeunte, at ubi veluti fermentatione quadam emollita fuerit, [vix mutato interim colore, quod tamen in Piri sit] dulci satis & vesca non sine adstrictione. Semina Piri sunt compressa latiora, medullâ albâ, eiusdem saporis, folliculis membranis inclusa, tria numerauimus.

Zoon.

Theoph. de-

serprio.

Materies.

Folia.

Flos.

Fructus.

Vermes.

Theoph. re-

lit.

Figuram optasemus aptiorem, sed iam coempta erat cum Fuchsiar. Theophrasto Sorbi arbor procera est, recta, concinna coma, ouata: quippe quæ magna ex parte nucis Pineæ figuram referat, nisi quod impediatur vertice suo caput. Materies solida, spissa, colorata, valida. Radices haud multas, nec altè descendentes habet, validas tamen, crassas & incorruptas. Nascitur radice, auulsione, semine. Folia Lauri tenuifolia figuram imitantur, sed ambitu serrata, sed non multum, nec in extremum tam acutè mucronata, verum rotundius orbiculata: prolixo, nervosque pediculo dependent, singulaque in versum condita, alæ modo, tanquam ex omnibus vnum sit, ad nervosum vsque pediculum, velut in lacinias diuisa. Ea verò licet densa, & se inuicem distantia, singillatim tamen non decidunt, sed simul tota illa pinnata congeries: minor quidem & pauciorum foliorum, in recentioribus, quæ per summa sunt: Omnibus in extremo pediculi folium est impar, ita ut cuncta dispari numero absoluat. Flos candidus, parvus, racematim è pediculo dependens. Fructus quoque, cum copiosus eius prouentus, velut in racemum coit, quod plures Sorbi ex eodem pendant petiolo, ut faui quodammodo effigiem imitentur. Fructus immaturus adhuc à vernibus eroditur, & magis quam Mespila, Pira, & Pirastru fructus, quamuis sit omnium acerbissimus. (Hæc verior est Theoph. lectio.) Ipsa quoque arbor vermibus infestatur, atque ita senescens arefcit. Vermis ei peccilians est, rufus, pilosus, (de quo specialiter agitur in opere de insectis &c.) Noua mediocriter fructificat: nam trima continuò parit. Autumno, cum folia amiserit, germinandum quiddam protrudit, pingue & turgidum, quasi ram parturiat germina, atque ita per hyemem durat. Caret aculeis Sorbus ut & Mespilus, Adolefcentior cortice vestitur læui, subpingui, colore ex flauo albicante. Annosa verò scabio, nigroque.

Aristoph.

In montibus sunt Sorba [μυρσάρα] spontè plurima nascentia.

Theopomp.

Matura Sorba [μυρσάρα] Myrti baccas, edunt & plurimos fructus.

Crates,

Certe sunt rompesiua maxima, velut Malum & Sorba.

Amphis,

Ut Mora Morus fert, vides ut Robora

Sorbus.

Glandes, Comarumque Sorba.

Miramur autem Natalem de Comitibus apud Athenæum conuertisse μυρσάρα in Sorbum.

Nomina

Synonyma

differetia.

Arborem Græci μύρσα, fructum verò μύρσα & μύρσα. Apud Theophrastum enim & μύρσα & μύρσα. Sorbus est arbor, quemadmodum μύρσα Sorbum, id est fructus: & μύρσα μύρσα, Sorbi Fructus. Dicitur etiam μύρσα, ei-

dem Diof. quoque μύρσα Sorba nominat, quæ Hipp. & etiam Gal. Ex quo authorum consensu innotebit Pollucis error, qui μύρσα & μύρσα idem esse credidit, ut annotat Constant. Had. Iun. quoque utramque vocem, hoc est, μύρσα & μύρσα pro fructu ponit, & eam quoque pro arbore. At qui distinctè loqui malunt, μύρσα & μύρσα arbor est: μύρσα verò & μύρσα fructus, sicut dictum. Sic Hermol. Sorbi arborem, inquit, i, Græci Oen & Oien: Fructus Oa & Va vocant. Latinis tam Geoponiis, ut Catoni, Varroni, Columellæ, Palladio, quam Herbariis Sorbus de arbore, & Sorbum de fructu. Mo-nachi in Mesuen haud inconcinne à sorbendo dicta putant, quod caro matura sorbetur. Et sanè fracidiorum illa pulpa vix commodius, quam sorbenda assuitur, ne simul cutim, & si quid intus, seminum aut calculosi, deglutias. Goropius verò, Sorbus, inquit, Latini nostro quoque nomine hæctenus appellant. Nam Sarwyn, acidum vinum notat, è quo Sorbum. Melius fortè à German. Surpen, quod sorbere est, deduci possit. Guiland. ad Gesnerum in epist. Poma inquit mortis in Prouincia Peru Occidentalis, an Sorba esse ignoras? At Garcias & Acosta negant Sorba prouenire in India, quicquid dicat Rhafis. Gudura ex Rhafi apud Serapionem de Lacca, id est, Sorba, aut Soruas, aut Sorbe, ut Itali dicunt: ex eodem Acosta. Ruell. Oe Græcis, dicta Gallis Corma vel Sorba. Idem & Tragus. Dicuntur iisdem etiam Sorbes. Sorbus domestica, Cast. Dur. & Lob. qui dubitat, an fortè sit Ostria Theoph. Sorbus legitur Clus. Ioh. Ioh. Iusticiac. Berceynæ fa. Hungar. Sorbus esculenta Camer. Sorbum ouatum, Anglic. Sorbappel Turci. qui Fructum Pirastri conferens copiosè prouenire ait in Germania superiore, ubi fructum vocant Sorbere, Sorbopfel / Sperlein: nos (addit) ab iis nomen mutuabimur, dicemusque Sorbappel. Germanis etiam Sporöpfel / & Espröglein / Sporbiern / & Speierling / auctore Cordo. Et Corn. Sorba Germ. nota sunt, & Malorum & Pitorum generis esse censentur, alii Sporöpfel / alii Sporbiern / quasi Mala aut Pira Sorborum. Trag. Spervetbaum: fructus Sperivel / Sperling. Idem scribit Hebræis, teste Aruph Monstern, Tolefch dicit. Fuchl. Sporöpfel ceptum apud Germ. vocem putat pro Sorböpfel. Eius pictura turbinatum fructum exhibet, quem ait Germ. Sporbiern corrupta voce dici, pro sorbbirn / vel saurbirn / ut sit quasi austerum Pirum. Io. Agric. Vulgares Sorba quibusdam Islesbeec. Lonic. præter prædicta nomina Germ. etiam Malgennafen dici tradit, quasi Elephantium seu leprosum natum. Delphinatibus & Prouinc. Cormiere, Solerius. Ital. Sorbe, Sorbo, Sorbolero, Anguill. tamen scribit in Italia communes esse sub nomine Sorbole. Hisp. Serual, Sorbas. Lacuna distinctus: Sorbus Serual Castil. Serua & Seruas, Catal. Serues, Portug. Sorba & Sorbe. Bohem. Zsarbny. Belg. Scharbenboom. Supra scriptis tam Græcis quam Latinis reliquiferè Merba i omnia variantur.

Sorborum genera duo facit Theoph. lib. 3. c. 12. Differentia 12 Theoph. Fæcinam fructiferam, & marem sterilem. Cæterum si fructus ad hunc modum orbiculatus, et oblongum, alia ouatum ferant. Sed & succo ipso differunt, quod orbiculata magna ferè ex parte sunt odoratoria, dulcioraque, ouata sæpè acida, minuscule odorata. Sunt ergo μύρσα & μύρσα idem. Idem & tyliaticam agnoscat, & quæ maturitatem adeptæ, vibanæ sit suauior, cultum verò admittere negat. Sorbis Phinio quadruplex differentia: Aliis enim rotunditas mali, aliis turbi-

Mespila. Pollucis error.

Sorba domestica.

Poma mortis.

Gudura.

Corma.

Ostria Theoph.

Mala. Pira. Tolefch. Fuchl.

Differentia 12 Theoph.

Phia.

nate.



natio Piri, aliis ouata species, ceu malorum aliquibus. Hæc obnoxia acori, odore & suauitate rotunda præcellunt: cæteris vini fapor. Generosissima, quibus circa pediculos tenera folia. Quartum genus Torminale appellant, remedio tantum probabile. Matthiol. Sorba alia stæua esse tradit, alia syluestria. Satinorum duo esse genera, marem & fœminam, Hisque differentiis plerique, qui de Sorbo aliquid tradiderunt, distingunt. At nos præter prædictas differentias etiam alias Sorbi nomine circumferri deprehendimus: *Sorbus Aucuparia* dicta, *Sorbus torminalis*, & *Sorbus Alpina*, de quibus infra ordine agetur. Hic tantum de verè dictis Sorbi differentiis agimus, quamvis Plinius eidem adiecerit *Torminalis*, Lacuna duas tantum differentias dicit, *rotunda* aliis *Sapidiora*, & *longa*: Matthiolus quoque orbiculata, succo odoratiore, ouata verò & Piri faciem referentia, gustu esse asperiore: Hæc maris, illa fœminæ arboris credi tradit. Nostrata Sorba (inquit Io. Bruyer.) ante maturitatem Malorum colorem reпреrepresentant: quibus & ouata species aliquando, & aliquando turbinata: sed odor nullus. Lugdunenses nomen Sorborum retinuerunt, Gallia verò maxima pars Coronas appellat. Copiosissimè proueniunt in quibusdam Gallia tractibus. Nam & eorum arboribus siluæ scætant.

Sorbus ut scribit Theophrast. solum frigidum amat & humectum, in quo est viuacior sit, & difficilè perdat, tamen etiam in montibus nascitur. Plinio teste, aquosis montibus gaudet Sorbus, itemque frigidis. Matthiol. Sorba fructus in Italia vulgarissimè habentur ferè vbique locorum in campis, vineis & viridariis. Decerpuntur immatura, & in manipulos colligata suspēduntur, aut supra stramen reponuntur, donec mollescant, ut Mespila, non autè non possunt comedì propter eorum asperitatem. Gaudet Sorbus, teste Trago aliois montibus & lapidosa terrâ, tractu Rhēni, nec non syluis Mediomastricū ad fluuios Saram & Blifam dictos, satis admodū familiaris, ut vel hinc luce clariùs fiat, Sorbum frigidis tractus naturâ suâ magis amare, quàm feruentia loca. In montibus Helueticis frequens occurrit, etiâque circa Tigurum ut scribit Gesnerus. Amat loca humida, montana, & frigidis proxima, & solum pinguisimum. Colitur & in hortis viridariis & vineis. Nos in hortu Montbelg. plantandam curauimus allatam Horburgo, Richenuillâ & VVattwillâ. Basileam venalia important ex Alsatia, mense Octobri. In sylua Hard dicta prope Omerfani cum fructu subcroco obseruauimus mense Sept. Magne conspiciuntur arbores inter VVattwillâ & Polluillâ. Vidimus & Lugduni in hortis quibusdam. Non ferunt Sorba, si Plinio credimus ante trimatum, ex vilo genere. Floret mense Martio, Septembri maturat fructum, Aprili florentem vidimus Montspeli. Sapidâ & bonâ ex Lothar. delata degustauimus Nouembri Montbelgardii.

Sorbus feri posset, sed Tragus in sitionem magis probat. Inferunt autem, inquit, Malo Cydonia, Piro, Cynosbato seu spina alba, & Sorbo torminali. At Gesnerus, Sorbos tradit, & Cornos in meliores arbores sui generis inferi posse, quosdam credidisse. Item in Piro, Pomo, & Cydonia: sed id nunquam verum esse, aut posse iure fieri, comprehendere potuisse. Rectiusque, inferi posse aut debere putari in Oxyacantha (id est, spina alba) quemadmodum & Mespila. Mense Ianuar. Feb. & Martio, locis frigidis: calidis verò

Tom. I.

Octob. & Nouemb. Sorba feruntur egregiè, ita ut matura in seminario ipsa poma pangantur: autore Palladio, qui testatur se expertum multas arbores ex Pomis spontè progenitas, & in crescendo, & in ferendo extitisse felices. Colum. post mediam mensem vsque ad Idus Feb. feri præcipit. At Palladius Ian. & Feb. mensibus, Idemque mense Aprili Sorba in se: & in Cydonia, spino alba, vel trunco vel cortice: de cuius insitione ita canit.

Sorba suos paruos merito maiorū hñstant  
Seminu, & pulchro curua labore nitent.  
Hæc arbor spina duos mucronibus artus  
Exiit, ac libra miribus arma tegit.  
Antræque amplexu miscere Cydonia festu,  
Gaudet, & externi dona coloris amat.

Insitionis  
modi.Sorbus spi-  
nosus.

Considerandum quam arborem Palladius per Sorbum spinosam intelligat: talis enim nulla hætenus nobis obseruata, nec est, qui se vidisse prodiderit. Suspiciamur quidem Sorbum spinosam Palladii esse Mespilum nostram vulgarem, nisi hæc potius videretur Hypomelis eiusdem, de quo amplius inquirendum. Per Mespilum verò apud Palladium intelligimus Aroniam. Idem & alibi agrestibus Piris Sorba inferi posse monent.

Fuerunt Sorba olim in gratiâ, qualem his cum Armeniacis & Persicis non minimam tribuit Colum. Ideò Cato villicam iubet cibū sibi & familiæ curare, ut Pira arida: itemque Sorba: eadem quoque in sapa sic Varro Sorba dissecit, & in Sole macerata, sicut Pira, vbicumque posita fuerint in arido, facillè durare scribit. Lecta duriora, ac posita, vbi miscere cœperint, siccilibus vsque ad plenum claudantur viceolis, gypso desuper tectis, & bipedanea scrobo loco sicco merguntur, ore peruerlo, & desuper spissius terra calcatur. Item lecta per partes siccantur in Sole & ferantur in vasculis in hybernū. Cūm voluerimus vi, aquâ feruenti macerata reuifescant sapore iucundo. Aliqui cūm pediculis suis viridia lecta suspēdunt locis opacis & siccis. Alii Sorba in sapa asserunt diu posse seruari, notante Palladio. Possint & reposita atque siccata in vino ebulliri, & ad vsum conuerri.

Vt recentia  
fiant  
Sorba sic-  
ca.

Dioscor. Sorba dum luteus color est, antequam matura planè sint dissecit, & Sole siccata mandu-  
vius.  
Alui flu-  
xus  
Tempera-  
mentum  
quàm Mespilus: proinde sanè etiam esui iucunda est, minùsque quàm Mespilus ventrem constri-  
gens. Iis parè est escendo non autem affluenter. Non enim iis ut alimento, sed potius ut medicamento indigemus. Siftunt alium Sorba sicca, Plinio nam recentia stomacho & alio citæ  
Stomachus  
profunt. Vnde Martialis.

Sorba sumus, molles nimium durantiâ ven-  
tres:

Aprius hæc puero, quàm tibi, Poma dabū.

Nam (quod ad interpretationem huius Distichi faciat) solent ferè puerorum ventres esse molliores, idè puero potius, quàm seni Sorba deuoranda suadet. Palladius: Fit è maturis & vinum, & acetum. Hinc Virgil.

Vinum  
Sorbi.

Hic noctem ludo dubunt & pocula lati  
Fermēto atque acidis imitantur Vi-  
rea Sorbi.

Ac nobis quidem narratum bonum parari acetū, iniectis Sorbis immaturis in vinum. Q. Serenus

F

quoque ad puerorum firmendam aluum Sorba commendat: cum ob dentitionem laxior est,

*Alij pomel  
dentes  
Sorba con-  
dunt.*

*Pruderit & pueri, quos hucus origo fatigat*

*Castaneas coxisse naces, & Sorba versuta.*

Clem. Clement. Sorba condita confortant stomachum, excitant gustum, & frequenter compescunt fluxum, & vomitum. Accipe Sorborum ferè maturorum sine cortice & ossibus lib. 4. coq. in suff. aqua, in qua bullierint Rosæ & Balaustra. Postea accipe huius pulpæ lib. 3. mellis vel sacchari lib. 1. sem. coquantur ad spissitudinem. Sorba, inquit Tragus, quocunque modo præparata, medicinis aluum sistentibus adhiberi possunt. Quidam

*Elect.  
Sorba ad  
vomitum.*

*Siccata.*

*Et confer-  
uanda.*

*Alus pro-  
flusum.*

*Ampru-  
ci.*

*Dysent.  
Tenesmus.*

*Lignum*

*Virga.*

Autumno in Clibano, instar Pirorum hos fructus torrent: alij in quatuor partes dissecant, quas in aëre siccandas suspendunt. Nonnulli melle condunt. Alii recentia in vino dulci cocto seu sapa conficiunt. Particulæ arefactæ vel in puluerem rediguntur, aut calida aqua molliuntur, vel denique vino decoquuntur. Tusa & cum foliis suis aqua decocta, alui profluuiis, & sedi procidentij profunt in folio aut deflectionibus. Balneum paratum ex Sorbis immaturis, contulis cum foliis & in aqua coctis, compescit Dysenteriam, Tenesmum & alios consimiles morbos. Sorbum immaturum apprimè constat, maturum verò, vt scribit Amatus, adeò parum, vt meritò Sorbum maturum non constingere aut constipare sit dicendum. Dod. tamen adstringentem eis tribuit facultatem, sed validiorem duris quam mollibus. Porta idem Sorbum adstringere vult, quòd fronde sit dura, vires ex signatis quibusdam colligens. Ipsa quoque ligni materies solidissima ac compacta: ut huc ad mentas parandas, lignariis Fabricis præsertim libenter expetitur, quemadmodum & virgæ à bubulcis ad stimulos parandos, teste Matthiolo.

## SORBUS AUCUPARIA.

### CAP. VI.

Descriptio

Folia.



lola, vt illa, sed glabra, suprà virentia, infrà candidantia, hec ita variè ludunt, vt aliquando existimauerimus diuersas plantas, donec in eadem arbore diuersitas nobis agnita. Sunt enim ei interdum quidam folia, nonnihil vtrinque hirsuta, & vtrinque eiusdem coloris ferè, mollia, profun-

dius incisa, potissimum in arbutulis adulescentibus, sapore amaricante. Flores umbellatum coherere multi, candidi, odori: quibus succedunt bacce, acinis Sambuci aquaticæ pares, ex flavo miniatæ, sapore acido insuauis, in quibus semina aliquot oblonga. Oculi huic magni, longi, atropurpurei, quorum squammis intertexta est incana lanugo.

Sorbum aucuparium vocitauimus, quòd ad aucupia conferat, illucendis auibus.

Ruellius, nostra, inquit, Fraxinus magna ex parte flore caret & fructu. Vidimus tamen frequenter baccas ex quadam Fraxinea arbore ex rubro nigricantes, quibus per inopiam frugum annonæ rura vescantur. Ea arbor est Fraxino aliquid humilior. Item alibi: Ornus Gallicum nomen non inuenit, vulgò tantum Frefnæ campestris voce cognita arbor. Lucio Columellæ Orniflycites Fraxini sunt. Idem ait Lenticum Schinon esse arborem Sorbi folio. Sed planè reicienda opinio Ruellii. Frefna enim eius campestris nec Ornus est, nec Fraxini species, tantòque inconfutit ab eo factum, quòd ei vires & vltus attribuat alterius arboris: neque placet duas ab eo descriptiones vnius plantæ propositas, quasi essent diuersæ. Lenticum Ruellij meritò reicit Matth. Quæ autem Ruellio sit Lenticus illa ignota, ignoramus, nisi sit Sorbus aucuparia, quam forte Dodon. confundit cum Lenticis in Histor. Gallica, Lenticis tribuens folia Fraxini. Cordus Quintum Sorbi genus dicit aucuparium cognominatum, pmo gustu austero. Aucupes Germani Vogelbeer vocant, & addit: Ruellius Ornum esse credit, sed alia ab hac est Ornus. In margine: Sorbus aucuparia, & Eberast & Quischeder Stolbergæ. Et alibi: Ruellius Ornum putat: sed ad nullum aliud genus arboris, quàm Sorbi meritò referri debet, acerbæ vi. Tragus: Großer Nalbaum: An Melus aut Fraxini species arbor cuius meminit Ruellius: Michael Hern in Columella Lenticum vertit Nalbaum, sed Lenticus cum hac arbore non conuenit. Folia Sorbo magis exigua. Soluti iudicio Sorbus humilis Venterbus incognita, Fraxinea arbor Trago & Ruellio, ad Fraxinum non est referenda. In Sabaudia dicitur Timel, & Timelle. Matth. Sorbus sylvestris & propriè Dod. Hist. Gal. Fraxini secunda species, Theophr. Quercus: Gazæ Fraxinus bubula: Plin. & Colum. Ornus & Fraxinus sylvest. German. Nalbaum. Belg. Laneressen & Qualsier. Idem in Hist. Lat. ad Sorbi sylvestris genus refert. Et alibi & eodem opere. Ornus Lat. & non rarè syl. Fraxinus. Plin. & Theophr. Fraxinus humilior, Ornus & Germani paria, siue montana Fraxinus. Sed hæc Dod. opiniones minimè placent, ob rationes paulò pòst dicendas. Turner. Sorbus prima. Angl. Northumbria Rowne tree / vel whetfen tree: Anglis mendon. Querc. beame tree. Idem cap. de Orno, negat Ornum esse. Et alibi: de Orno inquit controuersum est: Aliis est Sorbus aucuparia: aliis Ornus quidem est, sed non Fraxinus montana, vt Trago, qui Germ. vocat Sambüchen / vel Bagenbüch. Alii Germani, [ & quidem Iac. Deter Pharmacopæus V Vitzburgensis ] referunt Ornum, Germanicè propriè appellati waldescheren / aut wildescherenbaum. At [ inquit ] meo iudicio Ornus non est Sorbus aucuparia, sed Fraxinus montana. Lonic. Neelsbaum / Grostweelbaum / Fraxino similis, sic dicta, quia folia asperfa farina aut puluere. Idem duas eius proponit figuras, vnam nomine Eschenbaum siue Fraxini, alteram titulo Metelbaum.

Verum



Verum non bene Fraxini loco posita. Nec quicquam nos fatinacci aut puluerulenti obseruauimus in Sorbo aucuparia. Rectius ab altera parte candidantibus foliis nomen tractum putasset, quod tamen nondum asserimus. Gesnero ornus, grosser Nalbaum / Wielestb / uelle interpretatur, Ornus aucuparia. Eidem alibi Fraxinus aucuparia qui & Sorbum aucup. Bellonii vocare solebat. Lob. & Penz Sorbus sylu. alpina: Gall. Cormer Sauage. Cast. Dur. idem. Hist. Lugd. Sorbus Torminalis, syluestris arbor à sequanis Tormigne nominatur, magna nonnunquam spectatur: & addit, Plinium quartum hoc Sorborum genus constituere. Et alio loco eidem: Sorbus sylu. Matthiol. Torminalis vera. Arque sic, ne careret multitudine, duas icones posuit unius arboris, & quidem locis diuersis: nec videmus cur veram dicat Torminalem, & Plinium quartum genus: quandoquidem Plinius eam dicit foliis penè Platani, à quo folio hæc, de qua & illa, & nos agimus, multum diuersa: vt suspitionem nobis inuiciat, ei nec Platanum nec Sorbum Torminalem probè fuisse cognitam. Cuius Sorbus aucuparia. Germ. Vogelbeer / vel Vlasbeer dicta. Vngaris Dorosberfinye. Nec (addit idem) cur Dalechamp. Torminalem censeat. viliam video causam, cum eius rubris baccis nemo Veleatur, sed folis Turdis aliis que syluiculis aubus, Gallinagine præsertim expectatur. Casalp. Sorbus sylu. in Alpibus, baccas ferens reberentes, similes Sorbo Torminali. Calceolar. Sorbus racemosa. Camer. Sorbus aucupalis: & aucuparia Thalia. Tabern. in Icon. Sorbus sylu. Wildsporbiurn / Wilsperwerbaum: Et in hist. Sorbus 2. sylu. Schvenckf. Sorbus montana aucuparia. Ebersydenbaum. In ductu VVirtemb. & circa Boll. vocant Adelsbeer / & Sperbeeren: Quidam & Stindbeer. In Rhætia vocant Wielestbe. Burgundi, Agnillon.

Crescit Viginolis & opacis syluis, & in vallibus, & secus ripas torrentium, quibus maximè locis gaudet. Thalius scribit passim in Marcyria Saxonthoringia provenire. Prouenit etiam in altissimis montibus, vt in monte Baldo quem & Fractum vocant auctoribus Gesnero & Calceolario. Floret Maio & Iunio. In Silesia quoque (vt annotat Schvenckf.) arbor notissima, montibus propria: vbi flos in Corymbis Iulio, fructus sequitur primum viridis, deinde ruber, qui perficitur Septembri. Colitur etiam Goppingæ in horto Ill. E. C. V. Virt. Iacobus Cargillus Medicus doctissimus & aliquando conuictor noster & amanuensis, testatur in Scotia insigniter proceras arbores adolere: baccas venales nonnunquam in forum adferri. Prouenit etiam in montibus Alsatice, Burgundicis, in monte Saleue, propè Geneuam: circa fontes acidis Griesbachianis, in Mündenstein propè Basileam. Nostra cura etiam plantata fuit in hortum Month.

Aucupes Germaniffructu eius aubus insidiantur. Baccæ à Merulis, Turdis & eiusmodi aubus hyeme magnopere quaruntur: nos etiam baccas eius inuenimus in ingluvie Attagenis [Baselhus vocat] & Turdi viciniori, quem Trosteln vocat, itemque Merule, quæ Bergamfel dicitur. Sapor tamen earum tam ingratus est, vt gustantem capere frontem cogant: vnde in morosos & quibus frons nubila, dietherum vulgi apud Scotos, ingratiore esse quam sint Sorbi aucupariæ baccæ, vt referebat D. Cargillus. Aiunt lignum vile ad clauos, qui rotarum molarum alas retinent. Failuntur, inquit Turnerus, Londinenses qui pro corticibus Tamaricis, Sorbi dictæ Whickentree

Tom. I.

corticibus vtuntur. Baccæ Matthiolo adstringunt, siccant & repellunt, quæ per hyemem ad aucupia asseruantur: ea enim Turdis gratissima sunt, vt dictum. Villicis virgæ eius, quoddam solidè robustæque sint materiæ, pro stimulis bouum expetuntur.

## DE SORBO TORMINALI, ET CRATÆGO THEOPHRASTI.

## CAP. VII.



**T**orminalis autem Sorbus figurâ differt à vulgari: siquidem folia, sambuci aquatice folia æmulatur: acutiùs tamen & argutiùs incisa atque serrata, pedis anserini formâ; excurrente in singulos angulos nervo, vtirque penè glabra, potissimum autumnum apparent tamen pili in pediculis vncialibus & lequincialibus.

Descriptio

Folia.

Flores.

Fructus.

Semina.

Cortex.

Materies. Oculi.

Cratægo Theophr. Descriptio Theophr.

Theophr. rest.

Cotinus.

sapore subadstringente, interdum etiam in iis quedam tubercula. Florum dispositio, quæ in vulgari, ex pallido candidi, Cordo fauacæ, candidi quibus succrescunt fructus rotundi vmbilicati, quales Oxyacanthæ vulgaris, coloris ferruginei, punctulis albidis notati, cum sunt molles saporis primum austeri, tandem vbi mollescunt acidulo, grato: in quibus callus vel crusta bina vel terna semina continens. Piri feminibus similia, minora, penè triangula, coloris ferè castaneæ, nonnihil subaustera, medullâ albâ. Cortice teguntur rami spadiceo subluteo, adstringente; amaricante: caudex verò albicante, læui: Cordus flauo cortice vestitam, & Piro æqualem arborem dicit Materies alba, durâque. Oculi imbricatas conorum scandulas æmulantur, rotundi ferè, non acuti, vt in Sorbo Alpina.

Hanc arborem quidam Cratægum Theophrasti dicunt: quapropter quæ ad eius descriptionem faciant, ex eo hic consignanda. Cratægus inquit, quam & Cratægona vocant, folium habet Mespili, (μειλίαν) nempe Atronæ Dioscor. Anthedonis Theophrasti. [eius enim solidè folia descripsit Theophrasti. non aliarum. Dal.] rigidum, [τεταννόν] quam vocem & de Anthedonis folio usurpat] sed maius, latius, longius, eius modo laciniatum: [legendum enim: τὸ δὲ χαραγμὸν ἔχει ἀσπρὴν αὐτὴν: non verò τὸ δὲ χαραγμὸν οὐκ ἔχει: &c: vt vulgati codices habent.] Arbor ipsa, haud valde procerâ, nec crassa. Materies varia, solida, flaua, cortice testâ læui, sicut Mespilus. Communiter vnicam radicem in profundum agit. Fructum habet rotundum, magnitudine Coui [Athen. κόνι] habet: vulgati codices, κόλιν[ο] qui maturescens flauescit, [καρδὸς γίνεται, non vt Ath. ἐνερὲς] & quodammodo nigrescit: [καρμυλίσθηται] succo

F 2

*Mesp. filu.* & gustu, qualis Mespili. Vt proinde Mespilus syluestris videri possit.

*Nomina & synonyma,* Magna est authorum diuersitas de hac arbore aliquid scribentium, in nominibus. Theophrastum

*Genus 4. torminale* cians Arhæh. in mendosis exemplaribus *κράταγος* habet. Est verò idem Theoph. *κράταγος* vel *κράταγος*, vti patet ex loco citato, Porro Sorbum de qua hic agimus Plin. quartum genus torminale appellat, re medio tantum probabile, assiduum prouentum minimamque pino, arbore à reliquis Sorbis dissimili, foliis penè [planè alti.] Platani. Plinius [inquit Dal.] Sorbi syluestris, quam Aucupariam Herbarii vocant, Sequant verò lignatores Tormi-

*Torminalis* que, & que vera Torminalis est, nequam meminit: Cratægi verò tota eadem fortè vidisset, eam stricte & negligenter descripsit, Torminalisque Sorbi esse credidit, namquam alibi facti Cratægi mentione, præterquam cap. 8. lib. 27. vbi Cratægoni, que in Cratægo non seu Cratægona vocat, inconsideratè Aquifoliam [πυλὸς ἀγίας] Itolorum esse tradit. Genus id Sorborum Andromacho dictum volunt *κράταγος* [vini cohibendi habens] quamuis nonnulli legant *κράταγος* lib. 9. *κράταγος* Galeni in curatione dysenteriae. Idq; à Plauto significatum volunt in Pænulo.

*Plin. nos.* Hem mihi tam uideo propter te visitandum Sorbi.

*Cratægoni* Nempe Torminali: tormenta scilicet multa, & cruciatus esse perferendos. Quo etiam significato vulgò Gall. *poires d'angisses*, id est, Pira anxietatis dicunt.

*Adag. de Sorbo.* Cordo Sorbi torminalis, qui addit Romana auctoritate Plinium quartum statuere Sorbi genus, quod torminale vocat. Theoph. è Mespilorum genere putat, nec immeritò: æmulator folio veram Mespilum, proprio nomine eam *κράταγος* Theophrast. appellat. Germ. *Elgenbaum*: fructus *Elgenbeere*.

*Sorbus torminalis* Tiago in Hist. Germ. *Treisel* / *Eschrösel*, est, [Sorbus syluestris] wild *Sperwerbaum*, videlicet quartum genus Torminale. Et in Hist. Lat. idem dicit, & Ruellium suæ sententiæ suffragari testatur. Ac neminit quidem Ruellius Sorbi Torminalis ex Veterum sententiâ, verum an hanc arborem, de qua hic agimus, vel aliam intellexerit, nescimus, nec apparet ex loco à Tiago citato.

*Mespili generis* Anguil. *κράταγος*, Cratægus eadem planta est cum Sorbo Torminali Plinii. An Bellonio Sorbus torminalis, quam Galli *Alisier*, nominant? Solentius: Cratægus Theophrast. Prouincialibus *Aligiers*, Delphi. *Aliser*, est Plin. Aquifolia folio deciduo. Cratægi Theoph. fructus dicitur à Diof. Epimelis. Idem Soler. putabat Sorbum torminali Plin. esse Phyliram femininam Theophr. addeus dei Delphinaubus *Terkier*, de qua postea. Atheni verba de Cratægone sunt cap. de Ceraso, quia eandem existimauit cum Theoph. Ceraso. Rob. Const. dicit Cratægonem vulgò dici *Magaler*: quam autem plantam intelligat eo nomine, nondum nobis constat. Vix putamus ipsum Machaleb putasse. Gualth. Rys. Epimelis, Vnedo: *κράταγος*, Cornar. Mespili 2. genus & Epimelis Diof. & Gal. cui & Vnedo dicitur. Galenum secutus Paulus. Sed Plin. Vnedonem, quæ Gal. & Paulo Epimelis est, cum Memecylo Arbuti fructu confundit. Gal. in glossis notat, Hipp. *κράταγος* de visse Epimelidas à Diof. appellatas. Hipp. de morbo. mul. *κράταγος*. Verum Cornar. opinio nobis non placet, vt apparebit suis locis.

*Sorbus filu.* Turneb. Sorbus Torminalis Plin. folio Platani: Angl. est *setuse tree*, quasi dicas *forbus tree*. Qui

*Torminalis* rei herbaria studiosi sunt, [vt scribit Bruet.] apud Gallos Lugdunenses Loton eam esse arborem existimant, quam vulgus Alyfiam cognominant.

*Cratægoni* Matth. in Diof. Sorbus sylu. altera. Sorbus Torminalis Plin. non est [aut ille] Cratægus Theoph. vt existimauit Anguillara: Cratægo folium Mespili prolixum, maius, latius, oblongius, nec ferratum: huic Sorbo ligni materies nec versicolor, nec valida, nec flaua, qualis Cratægo esse debet. Miramur verò apud quem Theophrastum vel alium quemuis authorem Matthiol. legit Cratægon.

*Sorbus torminalis* Du Choul nascitur ad latera montis Pilati, Treilly vulgò dicta arbor, quam Tiliam feminam nonnulli vocant, alij Sorbum Torminalem, alij Loti speciem esse dicunt.

*Cratægoni* Gesnero Sorbus torminalis, in diuersis locis. Item in Cat. Pl. Vnedo Epimelidis fructus est, diuersus à Memecylo Arbuti fructu.

*Cratægoni* Lonice. Sorbum torminale dictum putat: quia medetur torminibus, dicitur *das Crinmen* / vti ait: Verum leiori considerandum relinquimus, an intellexerit Lonicerus, quid sint tormina, quasi vel Colicæ medeantur Sorba, & non potius Dysenteriae. Cast. Dur. Sorbi sylu. alia species. Dod. Sorbus sylu. & Plin. torminalis. Lob. & Pen. Sorbus torminalis, folio Aceris, vitis, aut Populi alba. Clus. Sorbus torm. Plin. & Herbariorum vulgò, Germ. *Idlaaber*: Vngar. *Barocza* fa.

*Sorbus torminalis* Hist. Lugd. Cratægus Theophr. Hypomelides Palladii quidam esse opinantur. Arborem hanc Cratægum esse Theophrasti non obscure quis existimauerit, et re clamante Matthiolo: oratio namque Theophrasti satis aptè exprimit plantam hic adpictam. Mutchiolus Sorbum torminale esse putat, cui Plinii auctoritas vti que facere videtur. At Plinius hic dormitasse videri possit, nusquam enim is alibi neque Sorbi sylu. quæ proculdubio torminalis est, meminit, neque Cratægi, arboris vtriusque crebrò ab authoribus memoratæ, præterquam eo loco, in quo Theophrasti Cratægoni, quæ Cratægonum siue Cratægoni [vt iam prius dictum] vocat, Aquifoliam esse Italorum perperam scribit. Quare facile fuit Plinium pro Cratægo, Sorbum Torminalem nominasse. S. de leu. in Hist. Lugd. alio loco eiusdem arboris aliam figuram, & sic duas vnius, proponit, Sorbum syluestrem siue Torminalem Matth. & Cratægum Theoph. vocitans.

*Sorbus torminalis* Cæsalp. quoque Sorbum torminale ait videri esse Cratægum Theophr. folio Mespili, id est, *Azaro* Italorum: & cum Mespilo magis conuenire, quàm cum Sorbo, quod fructus officulum habeat.

*Sorbus torminalis* Camerar. Sorbus torminalis siue Cratægus Theophr. vt petitiissimi quique volunt. Goropius in Sorborum genere ait esse torminalia dicta, quod torminibus siue Dysenteriae medeantur.

*Sorbus torminalis* Tabern. in Icon. Sorbum torminale: in Hist. Sorbum torminale tertiam vocat.

*Sorbus torminalis* C. Bauh. subscribitis qui Cratægum Theophr. dicunt. Basileæ & locis vicinis *Eschbirle*, alii delabrie vocant. Burgundi & Montbel. arborem *Vifcum Anier* & *Sigrier* fructum verò *Anores*. Fert & Vifcum, vbi obseruauimus.

*Sorbus torminalis* Nascitur vt plurimum in locis montanis, solo pingui, aut interdum etiam saxoso, inter Fagos locis syluestribus, quamuis in hortos transplantata nullo negotio proueniat. Plurima prouenit ad Hercyniam syluam, & circa Ienam autore Cordo. Frequens

rei herbaria studiosi sunt, [vt scribit Bruet.] apud Gallos Lugdunenses Loton eam esse arborem existimant, quam vulgus Alyfiam cognominant.

Matth. in Diof. Sorbus sylu. altera. Sorbus Torminalis Plin. non est [aut ille] Cratægus Theoph. vt existimauit Anguillara: Cratægo folium Mespili prolixum, maius, latius, oblongius, nec ferratum: huic Sorbo ligni materies nec versicolor, nec valida, nec flaua, qualis Cratægo esse debet. Miramur verò apud quem Theophrastum vel alium quemuis authorem Matthiol. legit Cratægon.

Du Choul nascitur ad latera montis Pilati, Treilly vulgò dicta arbor, quam Tiliam feminam nonnulli vocant, alij Sorbum Torminalem, alij Loti speciem esse dicunt.

Gesnero Sorbus torminalis, in diuersis locis. Item in Cat. Pl. Vnedo Epimelidis fructus est, diuersus à Memecylo Arbuti fructu.

Lonice. Sorbum torminale dictum putat: quia medetur torminibus, dicitur *das Crinmen* / vti ait: Verum leiori considerandum relinquimus, an intellexerit Lonicerus, quid sint tormina, quasi vel Colicæ medeantur Sorba, & non potius Dysenteriae. Cast. Dur. Sorbi sylu. alia species. Dod. Sorbus sylu. & Plin. torminalis. Lob. & Pen. Sorbus torminalis, folio Aceris, vitis, aut Populi alba. Clus. Sorbus torm. Plin. & Herbariorum vulgò, Germ. *Idlaaber*: Vngar. *Barocza* fa.

Hist. Lugd. Cratægus Theophr. Hypomelides Palladii quidam esse opinantur. Arborem hanc Cratægum esse Theophrasti non obscure quis existimauerit, et re clamante Matthiolo: oratio namque Theophrasti satis aptè exprimit plantam hic adpictam. Mutchiolus Sorbum torminale esse putat, cui Plinii auctoritas vti que facere videtur.

At Plinius hic dormitasse videri possit, nusquam enim is alibi neque Sorbi sylu. quæ proculdubio torminalis est, meminit, neque Cratægi, arboris vtriusque crebrò ab authoribus memoratæ, præterquam eo loco, in quo Theophrasti Cratægoni, quæ Cratægonum siue Cratægoni [vt iam prius dictum] vocat, Aquifoliam esse Italorum perperam scribit.

Quare facile fuit Plinium pro Cratægo, Sorbum Torminalem nominasse. S. de leu. in Hist. Lugd. alio loco eiusdem arboris aliam figuram, & sic duas vnius, proponit, Sorbum syluestrem siue Torminalem Matth. & Cratægum Theoph. vocitans.

Cæsalp. quoque Sorbum torminale ait videri esse Cratægum Theophr. folio Mespili, id est, *Azaro* Italorum: & cum Mespilo magis conuenire, quàm cum Sorbo, quod fructus officulum habeat.

Camerar. Sorbus torminalis siue Cratægus Theophr. vt petitiissimi quique volunt. Goropius in Sorborum genere ait esse torminalia dicta, quod torminibus siue Dysenteriae medeantur.

Tabern. in Icon. Sorbum torminale: in Hist. Sorbum torminale tertiam vocat.

C. Bauh. subscribitis qui Cratægum Theophr. dicunt. Basileæ & locis vicinis *Eschbirle*, alii delabrie vocant. Burgundi & Montbel. arborem *Vifcum Anier* & *Sigrier* fructum verò *Anores*. Fert & Vifcum, vbi obseruauimus.

Nascitur vt plurimum in locis montanis, solo pingui, aut interdum etiam saxoso, inter Fagos locis syluestribus, quamuis in hortos transplantata nullo negotio proueniat. Plurima prouenit ad Hercyniam syluam, & circa Ienam autore Cordo.

Frequens



Frequens in Heluetia. Viennensi saltui & plerifque Austriz & Pannoniz syluestribus frequens: teste Clusio, Fructus maturus Sept. Basilean copiosè ex vicinis sylvis importatur, pueris & mulierculis expetitus cibus, vbi mollis, satis suavis. In Burgundia quoque & Comitatu Montb. multis locis prouenit, quemadmodum & in illis Principis nostra cura fata: adferuntur Montbelgardū maturi fructus Septembri, racematum dispositi & colligati in filis Corylli baculis.

Maturi fructus & tam fracidi eam acerbiteratem, quam crudi habebāt ex parte deponunt, & subacidam acquirunt, nec iniucundam, relictā tamen etiamnum aliqua adfectione in callo, qui eis inest. Alium adstantum, sicut Mespila: eo tanquam singulari & presens remediū contra tormina (Dysenteriam) vtuntur, qui Hercynios montes accolunt iusticij, vbi testatur Gordus. Eadem vim eis & Match. off. tribuit, additque eadem posse omnia quæ Sorba domestica, sed thesauriora haberi. In Comitatu Montb. lg. fusos ex ligno pātant optimos, & quanto possunt studio arbores conquirunt, ad eum vltimū. Retulit Mercator quidam Gallus, pectines quos elegantes & magnos venales habebat, fieri ex ligno arboris *Alistier* in Yurt oppido Normandiz. Erant inter eos quidam albi, & alij quā parte iussilci, quos ex ligno propè rad. cem confectus dicebat: Alii subflauī, & quodammodo ad Buxum accedentes, sed tincturæ mangoniæ. Verū cūm *Alistier* vox sit equiuoca, tam ad Sorbum Tormalē, quā ad Aloriam, (de qua mox) cuius lignum teste Anguillara, est durissimū, notamus pro certo asserere ex vtrā illarum sian pectines: fortè ex ambabus.

dari, in quibus semina aliquot spadicea, Pīriferè, minora, medullā albā, eodem penè sapore, cortice quodam duriculo obiecta, vtrū Sorbo torminali.

Anguillara haud indiligens Botanicus, hanc putat esse *delar*, seu Ariam: additque eius lignum adeo esse durum, vt in Apennino dicatur Metallo, quasi Metalle. Sed non placet hanc Arborem pro Ariā Theophrast. sumi, quæ eadem videtur cum Phellodij, de qua suo loco. Perperam in hist. Fontis admir. impressum est Acer pro Ariā. Ariam Theophrast. quoque potat Lob & Pena, nisi quod addant effigie Alni: quorum tamen figurā non placet nec non Camerarius & Tabern. Verū quicquid dicant Ariā Theophr. esse non potest. Nec Clusius, doctissimus Herbarius, eorum sententiæ sublethere ausus, qui Sorbi genus dicit, nonnulli Ariam Theophr. putant. Sorbus Alpina vel pilosa Italis dēta, G. In. Gall. *Tralier*: Heluetis *Elzburle*, *Thelsburle* / vnter *Frantz* vnter *Wilder*: aliquibus *Albbaum*. Austriacis *Melzberbaum*, *Chuf. Wilder* *Sperbaum*, Tab. cuius figurā non placet. Sequamus & Auernis *Alistier*: Nantatensis Gallis *Crisp* vocabulo ex Ariā detorto, *Hist. Lugd. Burgund.* & *Anat.* vocant. Sorbi torminalis alterum genus in Alpibus, Celsus. Bruennus scribit, in tractu Sigotonio Annelis contemnitio Alysiā vltari. In annotationibus nostris inuenimus, à quibuldam Oenaciā dici. Conferant *Sirpiani* parū Sorbum hanc Alpinam cum ficulideā Theophrasti, quā postea posuimus cap. de Diospyro: *libron*.

Gaudet praevalis frigidis montibus iisdemque syluosis vt in monte *Maielle* in Abrezzo teste Anguill. In Anpha fugidioribus syluosis frequentem videas: in Viennensi talia & plerisque aliis Austriz & Pannoniz locis inter saxa & rupes: in montibus Norimbergenlibus, rariis calidioribus, nec nisi Alpiū rigis Narbonensis, Seuenig & Sabaudiz, vt tradunt Lob. & Clus. Nobis feliciter prouenit & etiamnum viget in horto Montb. quicquid dicat *Hist. Lugd.* culum omnino designare ac respicere, nec in hortos translatam proficere. Occurrit etiam haud infrequens in Helueticis & Burgundicis montibus & non longe interdum à pagis. Celebratur quoque in horto Patavino. Florete solet Maio, & fructum perficit Sept. & Octob.

Sapor mollium fructuum non ingratus, nec perinde astringens vti Tormalibus immaturis Montbelgardenes & Burgundi auidè, elscurpt vbi mollis euasit fructus. Legunt maturum rustici, & condunt. Neque enim fugax nimis est, sed in hyemem vsque durat si bene asseruetur: Suauit dulcedine gratus Thiles non aliter quam *Zarzi* phi bacca lenit, spiritum adiuvat, crudos humores pulmōni infarctos coquit. E ligno firmi & solidi sunt bacculi; Dal. teste. Fiant & optimi Carbones ex ligno, & qui diu retineant ignem, vt aiunt, quod sine dubio ligni duritiei ascribendum.

## DE SORBO ALPINA.

C A R. VIII.



**F**rigida cœli amassia egregiè adolefcit, recto & robusto caudice atq; cortice rubente, potissimum extremorum remorum, materie alba & firma. Oculi primum emergunt sublutei, acuti, squammati cū similitudine nigricante. Folia Alni, ex oblongo rotundata, rugosa, pron. parte incana supina viridia, serrata, sapore

astringente, pediculis breuibus, lanuginosis. Flores conferti, Sorbi torminalis modo, umbellæ quodammodo instar, candidi, odorati: quibus succedunt Poma parua Auellana minora, rubra, pauca quadam lanugine obducta, vmbilicata, pulpa luteola, sapore acerbo primum, quæ tamen mollia reddita gratiore sapore incipiant commē-

Tom.



F

DE MESPILO, EPIMELIDE, VNE-  
DONT, AMAMELIDE, HOMOMELIDE, ORO-  
malide & Hypomelide: Veterum des-  
criptiones differentie & sententie, & Re-  
centiorum in genere.

ET DE MESPILO ARONIA IN  
SPECIE, QUAM VERAM MESPILYM  
Veterum esse censuimus.

## CAP. IX.

Cur Veterum  
sententia præ-  
mittantur  
Theoph.  
Mespilorum  
differentia  
& des-  
criptiones.

Quia plurima dubia de istis Veterum appel-  
lationibus passim apud auctores occur-  
runt, in diuersas sententias distractos, consilium  
nobis visum, eorundem & Recentiorum, quo-  
rundam sententias primùm proponere: sed in ge-  
nere, ne cogamur multoties eadem repetere,  
quæ tamen specialius suis explicabuntur locis, vt  
& constet Lectori, sub qua cælo [quod aiunt]  
versetur.

Setanios.

Theophrastia Mespili facit genera, ex sententia  
Idæorum, Satapios, [Plin. Setanios  
habet] & Anthenoides: Hist. Lugd. Anthedon-  
eoides, quasi legisset *ad in diuersis*, Setanios fru-  
ctum fert maiorem, candidiorem, laxiorem, &  
nucleos intus molliores, continentem. Reliqua  
minorem, odoratioremque, gustuque magis ad-  
stringentem, vt diutius adseruari possint, Mate-  
ries quoque his densior & flauior: cetera similes.

Anthedon.  
Theoph.  
cui correct.

Flos omnibus Amygdala, non tamen ruber, vt  
illi, sed propemodum viridans. Anthedon haud  
procreta est arbor, (legendum enim, *ad in diuersis*)

Alius  
reptat.

Arbor enim, non *ad in diuersis*, vt Gaza, qui amplissimam & magnitudine præcullen-  
tem arborem dicunt, in orbem comata, folio

Alius.

multis fissatis diuiso [melior enim lectio *ad in diuersis*,  
non vt vulgata habent, *ad in diuersis*, & pelius quo-  
que Gaza *ad in diuersis*] quod Apium circa extremam mi-  
tam, sed diutius maioribus [etiam, non *ad in diuersis*]

Formes  
Mespilis.

[etiam] rigidum, nervosum, Apio magis scabrum,  
[etiam, non *ad in diuersis*, vt Gaza.] oblongius, &  
vndique laciniis sinuatum. Fructus autem tenui  
& longo haret pediculo, qui antequam folia de-  
cidant, vehementer rubet [hæc namque melior

Formes  
Mespilis.

lectio, Gaza omnia peruenit.] Radice nititur nu-  
merosa profundaque, ideòque diuturna & non  
cunctumaci. Ligno est spisso, solido, minisque  
putredini obnoxio. Nascitur & semine & auul-  
sione. Morbus harum arborum, vt senescentes  
a vermibus epodantur: qui grandes, & reliquarum  
arborum, vermibus dissimiles. Minus, tamen eo-  
rum fructus vermibus obnoxii; quam Sorba aut  
Pira. Caret aculeis Mespilus. Flos candidus & Ce-  
raso proximus. Hæc ferè Theophr. de Mespilo  
habet.

Diose dif-  
fer. ex de-  
scrip. Mesp.  
Aronia  
Spinosa.

1. Diosc. verò, Mespilus arbor, inquit, quæ a qui-  
busdam Aronia vocatur, spinosa est, foliis Oxa-  
canthe: [sic enim legimus ex Vetusto quodam  
codice cum Laetia *μελακων*, alii etiam *μυρακων*]

Mespili  
coccos  
Epimelis.  
Setanios.

habent.] fructum fert exiguo malo similem, sua-  
uem, tria intus continentem ossicula, vnde qui-  
dam *τριπικρον*, id est, triplici grano præditum nun-  
cupant, serò maturescit. 2. Est & alterum Mespili  
genus in Italia nascens, quod Epimelida nonnul-  
li, alii Setanium vocant. Arbor est Malo similis  
foliis, nisi quod minor est. Habet autem & hæc  
fructum rotundum, esculentum, vmbilico latiore  
præditum, quique tardè maturescit. Cratægi  
Theoph. folio Mespili dicit, cuius [Cratægi] de-  
scriptionem posuimus cap. de Sorbo torminali.

Cratægi.

Idem ait Mespila esse terrenæ acerbæ & solidæ  
naturæ, ideòque Hyemæ maxime posse resistere,

Idem ait  
temperata.

demum arbore sua decrepta maturescere, et si  
non eadem maturitate, quam in arbore acqui-  
runt. Sed aliâ, quæ cibo reddantur idonea, siue  
putredinem maturitatis hoc genus liceat appella-  
re, vt in Drupis aut Oliis, siue alio aliquo modo.  
Et alibi: ex toto penè fructus, qui gustu suauis  
sunt, benè olent, vt Mespilum, Pirum, &c.

Plinius Mespilorum differentias ex Theophras-  
ti verbis supra scriptis transcripsisse videtur. Ma-  
lorum Pirorumque generi [inquit] iure adnu-  
merentur Mespila atque Sorba. Mespili triagene-  
ra, Anthedon, Setania, tertium degenerat: tam-  
en Anthedoni similis est, quod Gallicum vo-  
cant. Setania maioris pomum candidiusque, acini  
molliore ligno: ceteris minus pomum, sed odo-  
re præstantius, & quod diutius feruatur. Arbor i-  
pla de amplissimis [suspecta hæc videtur lectio,  
vt patet ex supra citato loco Theoph.] folia ante-  
quam decidant, rubescunt, radices melleæ atque  
altæ, & ideò inextirpabiles. Non fuit hæc arbor  
in Italia Catonis ævo. Item Putamen Nucibus &  
Castaneæ detrahitur: at in Mespilis manditur.

Galenus de obsoleto Hipp. vocibus, *αμαλιδι-  
ας*, inquit genus quoddam esse Mespili, pluri-  
mum in Italia nascentis, vt Diosc. ait: quidam au-  
tem *αμαλιδι* aiunt esse Poma parua syluestria.

Item: Mespilum alii trioccon nominant, quod  
tria inquis in vniuersum gerat grana, quorum v-  
num quodque arboris est semen, cetera quæ in  
Malis inueniuntur, ipsius Mali & vineæ ipsius  
vitis, Et in simpl. Epimelis acerba planta est, vt  
que dixerit quipiam, Poma syluestria. Vocatur  
autem ab Italicis *υπιελιδας* Vædon. Ingens eius in  
Calabrya proventus. Fructus eius acerbus quidem  
est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & ca-  
pitis mouens dolores. A huius liquidum ei est  
aliena quæpiam qualitas. Et alibi: ex plantarum  
agrestium genere est frutex qui *αμαλιδι* fert.

Appellatur autem ista fructus in Italia Vnedo, sto-  
macho que nocet, & capiti dolorem affert, acer-  
busque est admodum, cum exigua quadam dul-  
cedine. Cornis quidem & Canrubi fructu, &  
glandibus, & *αμαλιδι* [sic autem Coman fructus  
appellatur] rusticis passim veltuntur, reli-  
quarum autem arborum aut fruticum fructibus  
non admodum vtuntur. Cùm tamen fames regio-  
nem nostram aliquando inuasisset, elictique ma-  
gnus glandium ac Mespilorum proventus rusticis  
in fossis ipsa condentes, hyeme tota & Vere pri-  
mo cito frumentaceis edulus sunt vti.

Athenæus scribit, Pira non esse Amamalides  
[vulgò *αμαλιδι* & *αμβροζι* Gall. Dal.] vt  
quidam arbitrantur, sed alterum genus fructus  
suauioris, absque nucleo. [Nuclei vice semina  
habet Pira omnino similia, quæ fortassis causa  
fuit, cur quidam Pirum esse crediderint.] Aristoteli  
in Baccho:

An nescis, inquit, in Chio generari Amamalidas?  
A Piris has discrepare, & suauiores esse. Eschylides  
lib. 3. Georg. monstrat, cùm de insula Ceo loqui-  
tur, quam ait optima Pira educare, & quas in Io-  
nia vocant Amamalidas, carentes nucleo, grati  
saporis, dulces. Eschylus lib. 5. de limitibus Samio-  
rum, si modo verè illius est hoc opus, Omomeli-  
das ipsas nominat. Pamphilus libro de linguis &  
nominibus Epimelidas, Piri genus [Epimelis  
Diosc. Mespili genus est, vt patet ex supra loco  
cit.] esse tradit. Antiphan in libris de Agricul-  
tura, Phocidas quoque inter Pistorum genera re-  
centat. Hæc Athen.

Palladio Hypomelides Poma sunt [vt Martia-  
lis asserit] Sorbo similia. Medocni arbore nascun-  
tur,

Memorabile  
Comans  
fructus.

Mespila.

Amamalides.

Epimelis.

Setanios.

Anthedon.

Calabrya.

Epimelis.

Amamalides.

Eschylides.

Eschylus.

Pamphilus.

Antiphan.

Phocidas.

Medocni.

Martialis.



*Hypomelidis.*  
*Cultura.*  
tur, & flore candidulo. Dulcedo huius fructui cum acuto sapore commista est. Scribitur mense Decembri, nucleis in vaseculis positus. Mense autem Feb. Hypomelidis planta, sed pollicis magnitudine robusta transferetur breuissimo Scrobe, soluta terra, plurimo stercore, sed munda est, quia cito arefcit, si radices eius ventus afflauerit. Terram qualemcunque non respuit. Amat loca tepida, aprica, maritima, & sæpe saxosa. Poma eius aut in Picatis, & minutis vireolis, aut Scrobe Populi, aut in ollis inter vvas vinaceis obruta seruabuntur.

*Arbor.*  
*cap. in-*  
*pres no-*  
*strum.*  
*Triconium.*  
Serapio: Zarar, id est, faciens appetitum. Interpretes Sorba vertit: sed perperam. Nam de Mespilo ibyloquitur adducens Dioscor. & Gal. verba, arborem dicens spinosam, Pomum nominari Triconium, additque, in Italia aliam esse speciem Zarar, quam multi vocent Epimelida.

*Hermol.*  
*in Dioscor.*  
*Alii [infic] Homomelidas*  
*vocat, vt Alcibiades, non Pira, sed mala*  
*syuestria & montana: quæ Theocritus Omalidas*  
*appellauerit, cum sic maturefcant.*

*Dubitati non debet, [vt scribit Corn.] quin*  
*alia arbor sit Epimelidis, quæ vna cum fructu suo in*  
*Italia Vnedo appellatur, & alia Arbutus, cuius*  
*fructus Memecylon Græcis dicitur, atque hoc*  
*propterea, quod diuersis locis eorundem mentio*  
*fit, & hoc ab alijs Autoribus, nempe Gal. & Paulo*  
*qui æquæ ac Plin. in Italia vixerunt: quanquã*  
*Plinius inauat potius, quam exprimat, duo Vnedonis*  
*genera esse, vt videlicet alterum de Vnedone*  
*accipi possit. Sed tamen, mox leuiter satis*  
*dictum confundi, quum ait: alio nomine Arbutus*  
*vocatur. Quare certum est ipsum existimasse*  
*Arbutum & Vnedonem Latinis esse, quod Comarus*  
*& Memecylon Græcis, atque id, vt opinor,*  
*ob similem vim, quæ de Memecylo & Vnedone*  
*procedit. Verum ex Galeni verbis ostenditur*  
*Vnedonem Epimelidis fructum esse, Memecylon*  
*autem Arbuti. Neque refert fructuum & arborum*  
*appellationes singulatim inter se in suo*  
*genere confundi. Quin & lib. 2. de alim. idem*  
*Galenus manifestè inter Comarum arborem, cuius*  
*fructus Memecylon appellatur, & inter arbutum*  
*aut sentim potius, quæ Epimelidas fert, & in*  
*Italia Vnedo appellatur, distinguit: vt certum*  
*fit duo diuersa genera Vnedonem & Memecylon*  
*esse, quorum alterum Galenum fuisse credo: Plinium*  
*verò, vt non adèd circa has res curiosum, ex*  
*Græcis tantum transcripisse, & in his, velut mul-*  
*ta alijs, eos non assequutum esse.*


*Porro Dioscor. alterum genus Mespili in Italia*  
*nasci prodidit, quod ab aliquibus Epimelidis vocetur,*  
*vt ex eius verbis Epimelis & Vnedo de genere*  
*Mespilorum sint, Arbutus verò & Comarus*  
*ac Memecylon sui generis, & ab eis diuersa.*

*Quid verò sit Epimelis Cornario dictum capi-*  
*te de Sorbo torminali. Pollux. Mespila & Zarar*  
*vocari scribit, vt annotat Rob. Const. reperitur &*  
*ea vox apud Platonem, teste Curtio.*

*Ergo ex dictis patet Mespilorum tria genera esse*  
*Theophrasto, Anthedon, Setaneios, (vel Setanios)*  
*& Anthedonides: Dioscoridi duo, Aronia quæ*  
*Anthedon esse Theophrast. vt vult Dalech. Setanum*  
*sive Epimelis: Antenoides is non meminit, quanquam*  
*in exemplaribus m. f. legatur in hunc sensum: Mespili*  
*generis in Italia nascitur quod nonnulli Epimelida*  
*vocant: atque adèd alterum quod Setanion, vt hæc tria*  
*sint Mespilorum genera Diosc. Aronia quæ Anthedon est*  
*Theophr. vt dictum: Epimelis quæ Antenoides, &*  
*Setanios. Quoniam igitur Aroniam Veterum Me-*

*spilum esse, nostra est sententia, placet de ea primo*  
*loco agere.*

## MESPILVS ARONIA VETERVM.



**M**espilus Aronia fo- Descript.  
liis ad spinum albam accedit, sunt ea tamen maiora, crassiora, in tria plerumque segmenta primaria diuisa, aliquando in plura, profunda, altioribus incisuris & rarioribus subdiuisa, quam vt serrate dici possint. Ramus & folia nonnihil pilosa sunt, magis tamè his, illi. Fructus fert rotundum, rubrum, umbilica-

tum, Mespilo vulgati minorem, in quo nucleis terni, Cerasi nucleis paulò maiores triquetri, duriusculi, oblongi. Fructus (Curtio) longiori pediculo pendet, qui antequam decidat, rubet, suauis est & exiguus, vno intus osse. Arbor ipsa, teste Matthiol. mediocriter proceritas, cortice ac materia Prupo haud absimilis: spinis horrida, non tamen admodum acutis, floribus albicanibus, racematum coherentibus. Fructus sibi orbem crassitudinis, oblongi, rubentes, vulgaris Mespilis æquales, sed arctiore umbilico. Pluribus hac de planta egit Cordus, diligentissimus sua ætate Botanicus in iuuentute Romæ mortuus, cuius, qui vult consulere poterit annotat. in Dioscor. lib. 1. cap. 170. & 171. de Mespilo. Mespilus Aronia, quod ab aliquibus dicitur *Aronia*, Dioscor. Theophrasto *Anthedon*, & *Setaneios*, quodammodo Sic enim legendum esse, iam supra dictum. Mespilus Gal. qui alijs Tricocum appellari ait. Mespili genus Anthedon Plinio. Serap. Zaror, & Pomorum triconium. Nos apud Eluchastem Tab. 2. per voces Dacrie & Zarole Mesp. Tricoccon intelligimus. Auicenna, vt tradunt Monachi apud Mesuen, confundit duo capita Dioscor. de Mespilis. Zaror & Zarur equiuocè dicitur de Lazarolo, & de Mespilo, quod probatur per Serapionem & per Hali, cui Zaurum rubrum est Mespilum tricoccon. Absolutè verò per Zaror intelligitur Lazarolum dictum, siue Alzarolum tam Arabibus quam Italis, quibus & Lazarolum.

Mespilo Aronio, Alzarolo, Tricocco, & Pomio Imperiale, teste Anguillara: quæ voces omnes Tricocco Dioscor. cennuunt: Cuius sententia quoque sunt Monachi & Cordus, qui propriè Mespilum dici ait, eandemque Anthedona, Solelerius. Mespilus Tricoccia Syluio. Hunc consensum Marcellus quoque confirmat, dicens: quam Dioscor. genere nutro Mespilum arborem fecit, Theophrast. femino descripsit. Primum verò Mespili genus Dioscor. arbor peregrina & incognita Italiz Marcello videtur, & sui generis arbor spinosa. Sed, vt Marcello fortè incognita fuerit & peregrina, non idèd toti Italiz. Gallic tamè tempore Ruellii fortè primum innotuit. Eadem enim esse videtur, quam sic describit. Apud Gal.

los paucis ante annis frutex inuenitur, qui etiam arborefcere poffit, folio per ambitum laciniatum finuato, rotundo, molli, ramis Spini, quem album cognominant, modo aculeatis: baccis rotundis, rubris, Myrteis, longè maioribus, guftu iucundo, qui & vinum fua fuauiitate commendat, coniundtur, & grato ori cibo. Cæpit mea memoria propagari, infita quantum reor, albo Spino. Qui colunt in hortis velut alienigenam, & aduenam arborem, Myrobalanum appellant: hanc effe putauerunt inquit idem nullis ferè notis reclamantibus, Paliurum Africanam, eam præfertim quæ non filiquetur. Hæc ille. At quid per Paliurum quæ filiquetur, vel non filiquetur intelligat, non dum agnofcimus: neque cur Galli Myrobalanum vocent. Tanto imprudentius sibi confultuit Gulth. Ryffidum in fuo ad Dioscor. eadem Ruellii verba fuo nomine de verbo ad verbum repetit, additque sibi videri Paliurum Africanam. Certè neutram nouerat: additque nescio quam ineptam figuram, quæ nulla fui parte responderet descriptioni Diosc. vel Ruellii, cuius verba tantæ securitate pro fuis recitatæ. Sic Lonic. etiam ineptam prædictam iconem ponit pro Paliuro Africanæ & Myrobalano Ruellii. Sed videamus quid Manardus in epist. lib. 10. de hac tradat. Poma [infita] quæ miffis peregrina funt, nec in nostro hoc climate [Ferracienfi] hæcenus, quod fciam inuenta: vulgò Azarola dicta: quæ Antiquos vocasse Mespila colligo, ac ad Mespili genus i. Diosc. pertinere, quod Anthedon vocat Theophrast. & Plin. Diosc. Aronium, [nili fortè codicum vitio vel in Diosc. Anthedon, vel in illis Aronium legendum] Azarolum verè rubens est, benè denubus autium vix succum emittit. Malè Auicenn. *Zarur* & *alzarur* appellat Triangulum Latini, cum ita nullo modo dici poffit, sed potius Triganium. Azaroli nomen deriuatum videtur, quod arbor Neapolim ex Hispania transportata, in qua longo tempore Punico idiomate Philoſophiæ & Medicinæ studia vixerunt. Dicta igitur primò Alzaror: deinde addita Italica pronuntiatione Lazarola vel Azarola fuit denominata.

Matth. pro Mespilo Diosc. agnofcit quæ folijs fit Pyracantha, siue Oxyacantha, & Azaroli vocatos fructus nullis fortius notis reclamare ſcribit, i. deoque eodẽ effe cum Aronia, Azarolum verò ex Arabico idiomate Zaror detortum putat. Curtius quoque Diosc. primi generis Aroniam facit, & Arab. *Zazum* Recentioribus quibusdam, alijs Azarolantibam dici, cui descriptio Theoph. aptumè conueniat, vno intus offe. Quia verò, ex Diosc. tantus ſint offacula, idẽ Tricocon, quaſi trigranium, autrioflum dici.

Amatus *μεισμαλον* & *αρόνια* diſtinctè. Dod. verò *μεισμαλον* & *αρόνια* dicit: Lat. Aronia & Trigrania. Et alibi Græcis *μεισμαλον* & *μεισμαλον* eidem. Galen. quoque *μεισμαλον* nominat, nec alterius mentionem facit. Ad hanc referendæ *αρόνια* & *αρόνια* Theoph. Amatus præter prædicta Arabibus etiam Alzarum dici ait: Italis *azarolo* fructo, *Poma di rege* id est Poma Regalia Gal. Neſſes. Ger. *Mespel*. Sed in Gallica & Germanica appellatione errat, non enim huic Mespilo conueniunt. Aronia duris spinis armata, etiamque Diosc. Lacunæ. Mespilus Tricocon eiusdem Diosc. Lonicero. Agricola Tricocon quidem Diosc. dici fatetur, verum addit eundem fructum, in plenisque locis quinque habere grana. Sed fallitur, quod Aroniam vel Tricocon non diſtinguat à vulgari. Non igitur temerè miratur Goropius tricoeca Mespila,

& noſtratia ſub eodem nomine comprehendere, quum quamplurimum diſſerant.

Gefnerus Mespilum Aroniam vel tricocon eandem putat cum Conatio Athenæi, idẽque ait effe Paliurum Affric. Ruellii. Mespilus Aronia vulgò *Monſp. Pomer.* Ital. *Aſaides*: Oxyacantha perquam ſimilis arbuſcula in ſylua Valena, vt deſcribit Aduerſ. tribus à Monſpelio leucis ſpontè orta, folia edens ſimilima, ſed latiora, fructum rubrum, quadruplè, triplè maiorem, Auellanae parem: ſuauiem guſtanti: nucleis ternis, durisculis, Septembris initio maturis. Caſt. Durant. Mespilus prima. Caſalp. Azarolus vulgò apud Theophrast. & Plinium Anthedon, eadẽque Aronia Diosc. Noſtra tamen, vtpote magis domeſtica, spinis caret, vt teſtatur quoque Theoph. vbi de Sorbo loquitur, quod quidem huic generi conuenit non vulgari Mespilo. Conſiderandum tamen an vulgari Mespilus maiori fructu non careat etiam ſpinis.

Hiſt. Lugd. Mespilum Aroniam ſiue Tricocon ſiue Anthedonem Theophr. ex ſententia Dalech. dicit graphicè depiſam à Theophr. eius quoque præcipuas notas Diosc. eidem literis mandaffe. Illud tamen obſeruandum à Theophr. non ſpinolaſam dici, à Diosc. verò ſpinolaſam. Fortè hæc diſſerentia à cultura: ita vt cultam fortè tradat Theophrast. & cum eo Caſalp. Spontaneam verò & incultam Diosc. & Matth.

An Pirus illa ſatiua Hiſt. Lugd. ſpinis armata, Lugduni ſatis frequens, quam idẽ *Poirier d'Espine* vocat; & fructum *Poire espine*, qui magnus eſt, vitidis, qui ia ſeram hyemem prorogatur & durat, guſtus ſuauiſſimi, præſertim cum in pruna coctus apponitur, inſperſo ſaccharo. Surculos ex Neapoli eo delatos fuiſſe olitores aiunt. Hæc proſectò Pirus eſt, cuius ſpinas cum aculeis Oxyacantha comparat Theophr. nec immeritò: ſunt enim inter ſe proriſ ſimiles. Verum quia fructum magnum dicit & videm, eo ipſo ad Aronia hæc noſtra diuerſam eſſe fortè concludendum. Mespilus folio Apii C. Bauh. Cæteri ſerè Herbarii omnes Mespilum Aroniam vocant. Germ. *Welſch Meſſeln*.

Mespilus Aronia in Italia Matthiolo auctore Neapoli vbi copioſè ſeritur, in hortis, viridarijs ac vineis. In Sicilia copioſius habetur, vnde Romanam delata, vbi nunc pluribus Cardinalium & nobilium hortis colitur. In Italia quoque & quidem non ita pridem apud Lugdunenſes peregrinari cepit, nec dum omnibus adhuc notæ, Neapoli proſectæ, vt ſcribit Curtius. Germaniæ hæcenus ſerè incognita, quemadmodum & in Hispania vniuerſa, quantum quidem Amato cognitum. Etiam paulò antè dictum in ſylua Valena propè Monſpeliū provenire. Sita in horto Montb. non ad frugem peruenit. Palladius Februatio inferere præcipit, de cuius inſitione ſic ſcribit:

*Aemula diuæ Piri deſpecti mala ſaporis*

*Mespilus admiſſo germine rursu ſubit.*

*Et geminis ſeſe violentior inferis armis,*

*Atque auidas rerrent robora ſæua manus.*

Septembris initio fructus eius maturus, vt iam dictum. Ramum & ſemina habemus inter noſtra naturalia.

Mespilus Aronia Diosc. & Plin. adſtringentis eſt ſaculatis, idẽque ſtomachum adſtringunt fructus eius ſiſtuntque alium. Hippocr. eandem vim tribuit, & acerboſ dicit. Idem Amamelida cum hordeo timeſtū tritas, in vino nigro bibendas dat, in affeſibus muliebribus. Arboris huius

[Aro-

*Myrobalanum.*

*Paliurus Africanus.*

*Ryffidum argenteum.*

*Azarola.*

*Mespilus i. Diosc.*

*Anthedon.*

*Aronium.*

*Triangulum.*

*Triganium.*

*Azarola vnde.*

*Aronia.*

*Azarola, alba.*

*Triangulum.*

*Triganium.*

*Poma Regalia.*

*Amatus.*

*Aronia spinosa.*

*Mespilus.*

*Tricocon.*

*Agriopis.*

*Paliurus.*  
*Conarius.*  
*Locus.*  
*Descriptio.*  
*Lob.*

*Mespilus i. Azarolus.*  
*Anthedon.*

*An Pirus.*  
*ſatiua quædam spinosa armata.*

*Locus.*

*Pirus spinosa.*  
*ſa Theoph.*

*Aronia.*

*Locus & tempus.*

*Inſtitio.*

*vires.*  
*& vſus.*  
*ſtomachum.*  
*alium ſiſtunt.*



[Aronia] fructus admodum acerbis est, inquit Gal. vixque edi potest, ventrem strenuè coercens. Quin & in germinibus & folio acerba hæc qualitas non pauca reperitur. Item : Mespila multò valentiùs adstringunt quàm Sorba. Proinde ventri fluenti cibus sunt viliſſimus. Sed his parcè velleſſum, non affluenter, vt Vitis ac ficibus. Porro vbi maturitatem ſenſerint, guſtui haud parum placent, quo ſit vt ab Italis pro deliciis non ſolùm cruda expetantur in cibis, ſed iis etiam Saccharo mellèque adſeruata edantur. Eadem etiam gratiſſimus ſunt cibus vtero gerentibus, earumque maliciæ ſubueniunt, teſte Matthiolo.

## DE MESPILO VVLGARI.

## CAP. X.

## Mespilus.



**M**ESPILVS vulgaris parua eſt arbor, foliis quàm Pomi longioribus, angulioribus, Laurinis ferè parib; [Matthiolo Ceraſorum] infernè incana lanugine pubeſcentibus, ſuperiùs quoque nonnihil piloſis, ſed ſaturatiùs virentibus, aliàs ferratis, aliàs non ferratis. Flores ſingulati nonſcuntur candidi, ex ruſſo pallescentes.

Cæſalpino. Cotoneæ mali: quibus ſuccedunt poma exigua, ſulua, perquàm acerbis ſaporis, Piriſ ſylveſtribus paria, hircuta, ex anguſto principio in vmbilicum latum excauatūque deſinentia, ex cuius ſupercilio emicant quina folia oblonga, anguſta, acuminata, quæ ſtremam antea tegebant. In ſingulis autem Pomis quina ferè officiula compreſſa, triangula. Caro dura, alba, adſtringens valdè, quæ tamen ſtatica reddita acidulum ſuauèque acquirit ſaporem. Matthiolus figuram habet cuius folia ferrata, breuiora, rariora: rami albi lanugine pubeſcunt.

Videamus quid de hac noſtra vulgata dicant autores. *Μεσπίλος* arbor plerique Herbariis vocatur, ſi modò ſit hæc, aut rectè referri poſſit, vt pleroſque hac appellatione quaſi præſupponere videmus: aliquibus etiam *μεσπίλος* vocatur: ſed quò autore. Had. Iun. *μεσπίλος*, *δ. ονιον μεσπίλος* & *μεσπίλος* indiſſerenter pro Mespilo ponat, non addit. Sunt tamen quibus Mespilus Anthoenoides Theophrast. eſſe putatur, & Plinii Gallica vt Soterio, & aliis multis, atque adeò Scetaniis & Epimeliis Dioſcor. plerique vti patebit in progreſſu.

Hebræi Mespilum teſte Elia Gamſchiot vocat, à quinque nimirum officiulis, vt ſcribit Tragus. Et apud Eluchafen Guilbraita Arab. nobis Mespilus eſt, quorum figura malè poſitur pro Nabach.

Dubitat Hermol. an Mespilum Veteres cum Sorbis Sorbi arbore confuderint, quandoquidem altisſimis connumerat Theophrast. quod certè Sorbo quàm Mespilo nunc vocatæ magis conuenit, niſi quis noſtram Mespilum, non tam Mespilum quàm Chamæmepilum appellandam forte cenſeat. Certè Iulius Pollux Mespila ait & Sorba quoque appellari. Noſtrates Mespili inquit Mar. Virg. quinque nucleis ſarctæ & nullis ſpinis armatæ, Epimelides idè nos credimus à Grecis dici, quòd felicisſimè in Malo inferantur: videnturque eandè habere cauſam: Similes huic in aliis Scriptoris in hac aut ſimili arbore aliquot appellationes, vt Epimelides, Hypomelides, Hamamelides & Omomelides.

Ruellius Mespilum Græcorum, ait eſſe *Mespilum* & *Nesfium* Gallorum: dubitari tamen an cum Sorbo Veteres confuderint. Nos quidem iam capite de Sorbo mouimus dubium, an Palladii Sorbus de qua ſcribit libro de inſitionibus, poſſit eſſe noſtra Mespilus vulgaris nec quiequã adhuc inuenimus, quod repugnet. Scetapionis enim interpres Zaror Sorbum interpretatus eſt, addens interim verba Dioſcor. & Gal. de Mespilis, vt dictum de Sorbis. Suſpicionem auget, quod ſpinola ſua Sorbum facit Palladius, qualem ſanè nullam nouimus. Sed ruſus ab eadem ſuſpicionem nos retrahunt, quæ de Hypomelide ſcribit in Decembris: quæ noſtræ Mespilo vulgari conueniunt.

Mespilum Tragus Cætagum ſeu Cætagona Theophrasti putat: & pingit foliis non ferratis: addens longiora eſſe foliis Lauri, minime ferrata. Cornar. primam Dioſc. Verùm ea molitum à noſtrate diſſert, in qua ſemina non ſunt ſimilia ſeminiſ Mali, vt de priori ſua Mespilo ſcribit Dioſcor.

Altera Mespili ſpecies Cordo: Grecis Epimelis & Hamamelis quòd iuxta Malos ſoleat naſci. Gal. Epimelida Vnedonem ab Italis ruſticis appellari teſtatur, ſed malè illi Arbuti vitia aſſignat: Cùm conſtet experientià Epimelida [quæ Mespilus in Germania etiam vocatur] ſtomachum non inimicam eſſe, neque capitis dolores facere: fructum interim nemo comedere aut deglutire poſſit, antequàm molleſcat: adeò enim ſauces adſtringit.

Porro quæ Germ. *Wefpeln* vocantur, vnedones ſunt Cordo, hoc eſt, [vtille interpretatur] Epimelides fructus non propriè vocatæ Mespili, vt hæcenus omnes credunt. Eum errorem non putat alium ante ſe deprehendiſſe.

Porro ſi ſecunda Mespili Dioſc. ſpecies, noſtrū erit Mespilum, vt Marcellus, Manardus & Braſanola ſentiunt, neque contradicit Mundella, reſtabit tamen [inquit hic] nobis adhuc incognitū quid Epimelis Gal. fuerit. Ipſe enim in 7. ſimpl. Memecylum, Arbuti, quæ à Græcis *χμυρα* dicitur, ſuū eſſe ſcribit: Vnedonem verd Epimelidis: de quibus ſanè & Plinium diuerſis locis conſuſe locutum fuiſſe apparet, vt rectè Cornarius in primo de Comp. med. annotauit. Illud etiā nobis non conſtat, quonam in loco Galenus Pauluſque Arbutum ſine Comarum, quod idem eſt, rem ſanè Mespili vtroque genere diſtinctam, nomine verd & effigie ſimilem, Epimelidis voce appellauerint, vt Manardus voluit, cùm aliter potius ſentire videantur.

Curtius quoque fatetur. Ex deſcriptione omniū tam Theophrast. quàm Dioſcor. aut Plinii, nullam noſtrati Mespilo conuenire, maxime verd cùm Plin. ex ampliſſimis arborem dicat. E' con-

Chama  
mepilum  
Spinus.  
Surba.

Epimelis.

Hypomelides.  
Hamamelides.

Nesfium.

An Sorbus  
Palladii?

Cætagona.

Cornar. not.

Mespilus?

Epimelis.

Hamamelis.

Italis ruſticis.

Valens ep.

vir.

Epimelis.

Gal.

Vnedo.

Plin. not.

Manar.

repreh.

Mespilum.

noſtratum.

ſe veteris.

*Epimelis.*  
*Nespilum.*

*Zarur.*  
*Epimelis.*  
*Zaurum.*  
*Nespilum.*  
*Vulgare.*

*Setania.*  
*Epimelis.*

*Vnedo.*

*Matth. not.*

*Penticoccus.*

*Epimelis.*

*Gal. not.*  
*Nespilum.*  
*Alba.*

*S. setonium.*

*21 off. Gal.*  
*luc.*

*Nespilum.*  
*ferrato fo-*  
*lio.*  
*Epimelis.*

trà Monachis in Mesfien, Mespilus Setania siue Epimelis est vulgare Nespilum, scilicet vt illi aiunt, Nespilum Italicum de quo Dioscor. Serapioni alia species Zarur, quam multi vocant Epimelidem. Hali Abbatis filio Zaurum vel Zarura citrinum, est vulgare Nespilum Italicum. Per Nespilum in Italia, absolute intelligitur Nespilum vulgare. Anguil. Nespolo Setaneæ & simpliciter Nespolo, in Italia vulgarissimus.

Matthioli: Nostrates Nespili non sunt Dioscori prima Nespilus. Quæ verò Mespili aliquibus Setaniæ & Epimelides appellantur, vulgaribus nostratibus collata, nihil inter se dissentire comperiuntur. Quapropter nihil mirum Dioscor. alterum hoc Mespili genus, copiose in Italia nasci. Verumtamen Galenum Epimelidis appellationem aliam arborem à nostratibus Mespilis diuersam fuisse, liquidò constat, quoniam lib. 6. simpl. scribit eius fructum acerbum esse, & ventriculo noxium. Epimelida autem à rusticis Italia: Vnedonem nominari. Hoc insuper illud confirmat, quòd Gal. de vtroque Mespilorum genere seorsum diuersis capitibus tradiderit. Hæc Matthiol. Nec tamen citat Galeni verba de secundo, nec vbi existeret ille locus hætenus nobis constare potuit præter locum de Epimelide & Vnedone, alim pinxit Mespilum folio ferrato: nunc non serratum pingit, quasi non vtrique specie habeatur.

Amatus in Diosc. Mespilum secundum genus vbiq; inquit, vulgatum est, Penticoccus dictum, Setanum. Epimelis à Diosc. dicitur, quam Epimelis apud Gal. Vnedo sit fructus Comari. Io. Agric. Mespilus cui quinque lapidibus est fortassis secundum genus Mespili, Epimelis, & apud Hip. & Gal. Amamelides nuncupatum. Comarum & Memecylon Theophrasti, Galenus falsò Epimelida vocat: Est enim Arbutus, de qua suo loco. Idem scribit in Corcopal India: Prouincia Mespilum esse colore albo, Mali magnitudine, de quo nos cap. de Guaiacua.

Dodon. Mespilus 2. Græcè ὀνηλιδες, eadèmq; Diosc. quibusdam Ἐρμύων, Sitanum aut Setanium: Maior species Gallicè *Nesle cultinée*: Brabantis potent *Nesplen*, *setanion* Theoph. eidem. Sub Mespili voce haud alterius quàm Tricocci meminit: atque Sitanion Theophr. conuenire cum Mespilo vulgari.

Goropius in Vertamno. Mespila nostratia eo sunt sapore vt non vnum tantum sed complura etiam edere soleamus.

Lob. & Pen. Mespilus Diosc. de qua cecinit Politianus:

*Regum imit at a coronas Mespila, &c.*

Item Mespilus domestica in idem, edit. Belgica, ac vtroque folio non ferrato pingunt, sicut & Camer. qui & ὀνηλιδες & ὀνηλιδες dici ait, & eam, quæ maioribus est fructibus, Gallicam.

Cæsalpinus verò aliam plantam Gallicam facit, in cæteris cum Dod. consentit, sicut & Clus. & alii. Quidam tamen cautiore Mespilum nostratem seu vulgarem appellare maluerunt, metuentes forte ne quid temerè in re dubia pronuntiarent.

C. Bauh. Mespilum folio ferrato cum hoc titulo ad nos misit. Sorbus ex qua Epimelis: Epimelis Galeni, Mespilus 2. Diosc. Vnedo rusticorum Italicorum. Idem in Animaduers. in Hist. Lugd. Mespilum Setaniam itauit nostram esse vulgarem, cui folia nonnihil per ambitum serrata tribuit. Tragus tamen minime serrata dicit: & sanè Germanica serratis foliis non est. Quare Matthioli in maioribus icon. Trag. Lob. & Dod. foliis integris

pingunt. At in epitome sua exhibet Matth. foliis serratis qualem & nos in Italia collegimus. Dal. ab his dissentit, qui vulgarem Mespilum existimant Setaniam siue Epimelidem Diosc. folia ait non habere Mali similia, nec minora, qualia Epimelidis esse dicit Diosc. quin potius Lauro similia, & foliis Mali maiora, fructum non rotundum esse, vt Epimelidis, sed oblongum, infernè graciliorem, supernè latiorè siue turbinatum, ex rufo liuescere. Ex vnica autem lacunosi umbilici nota in Mespilo nostrate valdè perspicua, quam etiam Epimelidi Dioscorides assignat, indubios fuisse Herbarios, verisimile esse, vt crederent Epimelidem esse. Epimelis autem siue Setanios Diosc. & Gal. siue Mespilus Athenoides Theophr. alia est arbor Dalech. de qua pòst. Clus. contrà asserit, vulgarem nostratem Mespilum esse Diosc. Epimelidem quam & ὀνηλιδες appellari ait.

Lubet subnectere quæ olim Manardus de Mespilo vulgò vocata scripsit. Pomum id, inquit, continetur sub secundo Mespili genere, Setanion & Epimelis vocato: de quo fortè ait Theoph. Setania fructum grandiorè, candidiorè, lignumque intus mollius habentem, &c. Mespilum nostram magnitudine ita superat Azarolum, vt ad iusti Mali crassitudinem aliquando accedat: colorèq; est, si non plenè candido, ad candorem tamen plus quàm Azarolum deurgente, maturum facilius soluitur, vt fructu etiam ab edentulis succus eius possit forberi: ligum intus mollius.

Marcellus Hermolaum carpit, quòd *πυλβος* Marcellus *μαλακώτερος*, acinos molliore ligno conuerterit, *not.* quum *πυλβος* nucleum, non acinum significet. Sod. *Hermol. ex.* *cul.* Hermol. taxari in hoc non potest, nisi pariter & Plin. acculetur, qui lib. 15. c. 20. eidem omnino verbis locum illum Theoph. in suam transcripsit historiam. Avic. lib. 2. cap. 15. Zarur siue Alzarur secundum genus vocari à Græcis dicit Tescelinon & Sentalium pro Setanio & Epimelide, facere capitis dolorem & esse malum stomacho: quæ ratione carent, bonis Authoribus aduersantur, nec experimento comprobantur. Ea enim quæ addungunt, quum vapores deprimunt, caput potius iuuant, & vi illa adstringente ventriculum roborant. Caula erroris Avic. fuisse putat Monar, quòd Comari vel Arbuti fructum, rem quidem à Mespili vtroque genere diuersam, nomine verò similem [nam & ipsa Epimelis à Galen. & Paulo dicta est] cum Mespilo confundit. Cur verò Comarum siue Arbutum Manardus effigie quoque cum vtroque Mespili genere similem dicat, non videmus: nobis plurimum differre videtur. Illud etiam considerandum an Gal. & Paul. non malè Epimelidis nomen applicuerint Comaro, [si modò idem esse voluerint: nondum enim planè constat nobis.] Et cur non potius secuti sint Dioscoridem. Quo etiam loco Paulus meminerit Setaneæ, si id non fiat lib. 7. sub Epimelide, sub litera E. nondum inuenimus. Idem dicimus de Galeno à quo Paulus desumpsit. Vt apertè quòd sentimus exponamus. Existimamus sanè cum Cordo, Epimelidi siue Setaneæ, nescio quā incuriā attribui vires quibus caret, nempe Arbuti siue Comari, quæ fortè melius Latinè dicta Vnedo à Plin. quàm Mespilus Setanea, vt quidam volunt. Non propterea excusamus Avic. qui perpendere debebat vires Mespili Setaneæ siue Epimelidis. Illud addimus, si Comarus à Gal. & Paulo Epimelis dicta est, vt vult Manardus, ad quid illa repetitio in vtroque, vnius plantæ duobus locis, nempe sub K. & sub E. Paulus quoque non magis quàm Avic. excusari potest. Apud Gal. fortè irre-

*Manardus.*  
*not.*

*Gal. correct.*  
*plic*



psit error culpa transcribentium, apud quem de-  
leri velimus, quæ de Vnedone scribit, de dolore  
stomachi, capitis, & qualitate aliena. Marcellus vi-  
detur *πυλίσκος* quæ non *πυλίσκος*, hoc est nucleos mollio-  
res apud Diosc. tribuere priori Mespilo, præter  
nostram & Manardi sententiam. Præterea no-  
stram Mespilum dicit nullis spinis armatum, quod  
tamen Theoph. suæ Anthedoni suæ primæ Mes-  
pilo tribuit.

E *πυλίσκος* à Græcis dicta videtur, quod feliciter  
in Malo inferitur, & quasi *ἐν τῷ μάλῳ*, id est, in  
Malo adoptata creuerit, vt annotat Marcel.

Lat. Mespilus G. *Maspelbaum* / *Mespelbaum* /  
fructus *Maspelen* & *Mespeln*. Hung. *Maspulya*,  
Belg. *Mispelboom* / *Mispel*. Gal. *Nespler*, *Nesplier*.  
Nesple. Ital. *Nesplaro*, *Nespolo*. Aliud verò est *Azaro*  
Neapolit. & Italis plerisque, vt liquet ex superio-  
ribus, et nonnulli confundant, atque ipse aded  
Had. Jun. Hisp. *Calbl. Mespers* aut *Nespero*. Catal.  
*Nesple*. Portug. *Nespeya*. In Hispania vulgò vo-  
cant *Nesperas* à similitudine campanularum; qui-  
bus vtuntur ad nocturnas vigilas, teste Lacuna.  
Bohem. *Myspule*. Angl. *Nesbler tree*, vel *open ar-  
tree*.

Nomenclator Tubing. Aesculeum *Maspel-  
baum* vertit: sed vnde istud nominis sublegerit,  
nescimus.

Potèd vt de specialioribus etiam huius diffe-  
rentiis distinctius aliquid dicamus, annotat Ruel.  
in Gallia duo genera Mespili obseruari, vnum,  
quod rarioribus homoet spinis, pomo paruo: Al-  
terum grandiore pome, ita vt Mala reliqua ma-  
gnitudine peraxquet, sine spinis, quam mutatio-  
nem videtur crebro insituta in hortis subiisse. Nos  
quoque & vtramque agnoscimus, & colimus. Et  
in minore vtriusque generis folia nuper admodum  
obseruauimus, serrata & non serrata, quod non-  
dum annotaueramus.

Gefnerus distinguit inter Vrbanam atque Syl-  
uestrem, huiusque fructum at esse odoratiorem.  
Vnicum tantum genus putat Triagus, sed culta  
differre. Matthiolus scribit Franciscum Calceola-  
rium Mespila ad se misisse: nulla intus ossicula cõ-  
tinentia. Fab. Columna quoque meminit mino-  
ris Mespili ex genere Setanæ, quam Neapoli  
exossem appellat: de qua capite præceden-  
ti.

Mespilus vulgò dicta passim hodie colitur in  
hortis Germaniæ, Galliæ, Italiæ, etiamque Anglæ.  
Nos & maiora & minora habemus in horto E. C.  
etiamque insitas in Oxyacantha, [spino alba di-  
cta] fructu amplo, cuius folia partim non serrata,  
partim serrata. Quæ non insita sunt, spinosæ se-  
ræ sunt, & paruos edunt fructus. In Germania  
etiam spontè prouenit, sed semper vicinam habet  
Malum, autore Cordo. Floret Aprilis & Maio. Fru-  
ctum perficit Sept. sine, aut etiam tardiùs: decer-  
ptaque demum mollescent, & elui sunt grata.  
Non magna alioqui indiget cura in plantando,  
nam asperis & incultis locis gaudet. Sic inter Ar-  
gentinam & Badenses thermas inferiores in syl-  
uis sua spontè luxuriat, ac omnino eos ferè tra-  
ctus amat, quos & Sorbus quærit. Sed maior &  
præstantior, non nisi cultura comparatur, inseri-  
turque aptè Piro sylu. aut Cynosbato [id est spi-  
no albe] vt annotat Triagus. Basileam ex Alsatia  
maiора importari solent Nouembri adhuc integra  
& edulia. Obseruatum est sapidiorem melioraque  
futura si legantur, postquam pruinam vnam aut  
alteram senserint.

Theophrastus Mespila terrestria dicit, ideò.

que ferè maturari, quod ob duritiem ferè fiat æ-  
quabilis eorum caro ad succi repræsentationem,  
vt ex eo his nostris accommodare videtur Scalig.  
Et sunt sanè etiam Mespila nostra (quemadmo-  
dum & Sorba) vtriusque generis frigida & sicca  
ferè qualitatis, alio ideo sistendæ vitia. Eiusdem-  
que temperamenti sunt folia. Et quæcumque de  
Sorbis dicta sunt, de Mespilis quoque intelligi  
possunt, autore Trago. Comesta Mespila vulga-  
ria conferunt vomitui, dysentericæ & omni flu-  
xioni ventris. Si decocto immaturorum colluan-  
tur os & fauces, reprimunt fluxiones in fauces den-  
tes atque gigivas. Infessus reprimunt menses mu-  
lierum. Paratur quoque ex Mespilis siccis, succo  
rosarum, Giryophyllis, pauco corallo, & nuce  
moschata, cataplasma quod applicatum regioni  
orificii ventriculi, potenter compescit vomitum  
c. borum. Pulvis glutinat vulnera recentia, repri-  
mit fluxorem sanguinis: denique, constringunt, cor-  
roborant, cõstipant, fructus & folia. Nuclei pulue-  
risati & poti cum vino albo in quo decoxerint rad.  
apii satui, mirabiliter pellunt calculos renū, vt  
scribit Matthiolus. Nec Mat. tantum, sed & Corn.

in puluere in detrita ossicula, tam ad renū quam ad  
vesicæ lapidem atterendum commendat. Et Agri-  
cola, licet (inquit) fructus astringat, seminum ta-  
men pulvis lapillos vehementer ex renibus eiicit,  
vrinam cit, & vesicæ lapidem comminuit. Bras-  
sauolus solo huius pulueris auxilio magnam vim  
lapidum è renibus cuiusdam calculosi de expulsi-  
se gloriatur. In altero verò aded renum lapillos  
comminuisse, vt in puluerem redacti sine dolore  
exierint. Ex Herbariorum cætu quamplurimi,  
easdem eis vires attribuunt, calculos conterendi.

Nec Herbatii modò, sed Practicorum pars maior  
eadem commendant & passim in suis libris calcu-  
losis præscribunt, atque ita quæ primum data por-  
ta est, ceu impetu quodam, ruunt omnes, magno,  
mehercle, & artis & rationis ludibrio. Nam cedò,  
det aliquis lapillos contritos, vel per se vel cum a-  
liis adstringentibus, quis credat qualitatem ad-  
stringentem quæ manifestè in iis est, tale quiddam  
præstare posse, cum potius constet talia nephriti-  
cis & calculosis valde esse contraria? Rursus de-  
tur cum aliis non adstringentibus, sed aperientibus  
& diureticis, vt [Matthiol. imitatione] cum  
decocto Apii, quis rationis compos non videat  
contrariæ qualitatis mixta, sibi iniucem obesse, &  
se mutuo retundere? At inquit experientia hoc  
docet, quæ rerum magistra, vel decem refutandi  
dis rationibus sufficiat. At quotusquisque quæso  
mortalium sit, aut prudens esse possit, qui pro ve-  
ro & indubitato asserere audeat euenisse illud (Si  
fortè contingat iis sumptis reuici) vi & virtute nu-  
cleorum Mespili? Quid si fortè fortuna calculi  
reiciantur paulò antè assumpto caseo, num pro-  
pterea ei hanc vim tribuimus? licet fortè magis  
rationi consentaneum hoc esset, quippe in quo  
propter sal partes quædam sint attenuantes & ab-  
stergentes. Sed quid oclamatur vulgo, cui nec  
in decernendo nec iudicando modus. Aliter do-  
ctis & peritis Medicis persuasum nouimus. Agry-  
tis & gloriosis hominibus, talia sua secreta & ne-  
scio quæ talia (quibus ferè hodie scætant practica-  
tium libri) fabulosa relinquamus, se digna. Eni-  
muerò sanè pluri fecerimus ad calculum api ra-  
diculas vel fœniculi semina ex vino albo decocta,  
& epota, quàm immensani nucleorum Mespiloriū  
vim. Dodonæus fructum ipsum Mespili  
vulgati ob nimiam acerbicatem *χρηστέον* dicit,  
ac ventriculo ingratum, ideòque capitis mouere  
dolores, vt Gal. scribit: quod quidem verum, si

adhuc durus & priusquam mollis tenetque reddatur, edatur. Mollior factus minus adstringit, nec ventriculo æquè molestus est: citò tamen corrumpitur, ut qui iam semicorruptus existat, quamobrem & parçè admodum hoc fructu vtendum.

*Mespila*

Hæc ille. Nostræ ea cruda adhuc, necdum fracidæ, sed maturitati proxima coniungunt, quo modo parata stomachicis, & calidis ventris in ætate profusius conducunt. Eadem per gelicidia, non condita quidem, sed acerbitate domita in passo vel mulso coquantur, adiecto Cinamomi momento, cibatu vscenibus gratissimo. Sunt qui patinis ex aqua decoquant, alii ex vino. Omnium vscus ad coercendum alui ruentis impetum. Aqua in qua cocta quatuor aut quinque Mespila maturæ, grato est sapore, & colore similis aque ex Cinnamomo paratæ, roborat mirabiliter relaxatum ventriculum, teste, Lacuna. Galli, inquit

*Decoſum.*

*Lignum.*

Ruell. plurimum ligno ad venabula & aurigarum flagella vtuntur. Opalssemus tandem Petrum Pigray in Chir. dixisse, an de maturo, vel potius immaturo Mespili, vel ut ipse legere videtur Mespidi fructu intellexerit, quod scribit, fructus frigidus & siccus tertio cum adstrictione.

### LATA GVINEÆ, MESPILVM

OSSICVLO LEVI, SPADICEI coloris.

#### CAP. XI.

*Officulum  
Mespila  
Descriptio*

Fructus exoticus quem VVilhelmus Pardiunus è VValachia misit, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 22. ex Guinea allatus est, quo se à nauta donatum scribebat officuli Mespili appellatione: quod sanè ab illius forma non erat valdè ab simile, præsertim prægrandium Mespilorum, & leuic, & spadicei coloris, in medio nonnihil tumens, & paululum ab vno latere scabrum & subalbidum. Honestissimus vir Franciscus Peninus similia etiam mittebat anno 1598. recens allata ex Guinea ab ipsius folio Petro, asserente mali, eui apti semina esse. Is autem in sequente anno Guineam denudè profectus, paulò diligentius hunc fructum obseruabat, ut ineunte anno 1600. intelligebam. Porro, ipso referente Lata [sic illum fructum appellabat] exigui Pyri est magnitudine, magis tamen rotundus coloris ex aureo flauo, interdum etiam rubentis instar pomi, tenui cortice præditus, qui detractus, in tenuia stamina filimodo abit: sapor cum dulcedine adstringens, ita vt os valdè refrigeret: eam ob causam Lusitani istic degentes in febribus ardentibus exhibebant: ipsam pulpam esse dicebat, coloris aurei Saturi ad rubrum inclinantis, lentam nonnihil & viscidam. Singulos autem fructus, quina officula continere furecta, quemadmodum Mespila, eaque separatim tenui inuolucro testæ, Serico crudo candido simili. Nasci in arboribus Pyro similibus, humanam tamen altitudinem non superantibus, cuius folia ex atro viridia essent, pyrique foliis magis orbiculata.

MESPILO NON VALDE ABSIMILIS FRVCTVS, OSSICVLIS SPADICEI coloris splendens.

#### CAP. XII.

*Descriptio*

Aud Clusium Exot. lib. 2. c. 14. fructus depictus tertio loco, missus à Petro Careto, de

quo scribit: Mespilo Setanio non erat valdè ab similis, eiusdemque penè magnitudinis, capite tamen non plano, vt illud, sed in angustum contracto, veritate rugas contraxerat, & satis fragili cortice consistabat, fusco, nullius ferè saporis, qui tamen ore retentus, nonnihil adstrictionis cum pauca ætymonia coniuncta possidere videbatur: quina introrsum officula Mespili instar continebat: sed maiora, & non rugosa vt illa, verum valdè leuia, & splendentia, spadiceique coloris, & nucleum continentia.

### MESPILO VALDE SIMILIS FRVCTVS SINE GRANIS.

Fructus Exoticus per Mercatores Amstelredamenses delatus in Iauana nauigatione, quem Clus. Exot. lib. 2. c. 15. iconè exhibet sub numero 8. ac scribit. Mespilo valdè similis erat Octauus fructus, vncialis magnitudinis, terfusus, & politus, fusci coloris, ad eò autem fragilis, vt paululum compressus disrumperetur, valdè leuis, matotiam continens fragilem & spongiosam, valdè fassi saporis, in qua nulla grana obseruare poteram: corona autem illa superna summum fructum occupans, alis carebat, quibus Mespilum est præditum. Huius icon cum præcedenti est num. 2.

### MESPILO SIMILIS FRVCTVS AMERICANVS.

Obsenuit LER in Brasilia in maris ripa multas arbutulas fructus ferentes Mespilis nostris similes, quorum esus perniciosissimus. Syluestres si videant Gallos & alios peregrinos, movent vt hos fructus vident, dicentes *ipuchi*, id est, non sunt boni.

### CHAMÆMESPILOS.

#### CAP. XIII.



Inter siccas Descriptio. In nostras plantas, Chamæmespili nomine ramos habemus fruticis cuiusdam, crassiores quàm vel Cotonastri vel Diospyri, cortice nigricante striato obductos: folia ple-

semunciam lata, vt albet in acumen desinentia, per ambitum serrata, vtrinque glabra, nervosa, atrouitenta, pediculo satis breui hærentia. Flores densi velut in umbellam, Sorbi alpinæ more, digesti, pediculis lanuginosis, modò breuibus, modò



## DE COTONEASTRO.

## CAP. XIV.



**C**otoneaster Gesneri frut-  
tex est ramulosus, cultu tamen ar-  
borefcens, cui fo-  
lia Mali Cydonig,  
auersâ parte can-  
dicantia & lanu-  
ginosa, aduersâ  
verò neruosa &  
virentia, minime  
per ambitum fer-  
rata sinuatâue,  
pediculo breui  
appenda. Flores  
concaui, herba-  
cei plures iuncti  
coherent, quibus  
succedunt fru-  
ctus in extremis  
ramulis, veluti in  
oxyacantha Mat-  
thiol. siue spino

Descriptio

Folia.

Flores.

Fructus

Officula.

alba, bini, terni, vel plures, parui, compressi, ex  
rotundo oblongi, in vmbilico quinque partibus  
segiunculis insigniti, cortice vbi maturefcunt  
primò rubefcente, cui tamen obducta est lanugo  
cineracea: sapor iis acerbus, officula intus conti-  
nentur terna, aut quaterna, oblonga, hinc angu-  
losa, illinc plana, duriuscula, quæ tamen denti-  
bus faciliè conteruntur, medullam claudentes al-  
bam. Fructum Clusius dicere colore foris initio  
subflauescente, deinde rubro, carne intus pallida,  
fungosa, oxyacantha ferè sapore, quina officula  
siue semina continente.

An Bellon. Malancier Sabaudia, & Cretensium  
Codomalo?

Cotoneaster vel Cydonago Gesner. quodd folia  
sint Cotoneæ Mali ferè. Fructus, baccæ Cotona-  
stri idem. Alibi tamen sui oblitus: Baccæ illæ  
rubræ, inquit, vmbilico quinquepartito non sunt  
Cotoneastri sed Chamæmepili, quam ego sic vo-  
caui & descripsi in operibus Cordi. Verum Coto-  
nastrum ipsemet Gesnerus mihi [Bauh.] aliquan-  
do demonstrauit, nec dum video, neciple docet,  
quâ in re differat à suo Chamæmepilo. Diligen-  
tiores rem inuestigent. Descriptio sanè & figu-  
ra Chamæmepili optime conuenit cum Coto-  
astro: quod vt pateat clariùs, placet eius descrip-  
tionem in medium adferre. Chamæmepilum

Nomina  
& Synony-  
ma.  
Mela-  
cier.  
Codomalo;  
Cotona-  
stri  
Cydonago;  
Gelsu mte.  
Chamæspi-  
lus.

Chama-  
mepilus  
Gelsu mte.  
scriptio.

Tempus.

Locus.

Mespilus  
terrestris.

dò longis, in extremis ramorum harent: quibus  
fructus succrescunt eodem dispositi ordine, Sorbi  
terminalis fructibus similes, oblongi, rubri, quâ-  
tùm fici offendant, vmbilico mediocri: in qui-  
bus bina grana continentur oblonga.

Huius fructus & fruticis primus, quod equidem  
sciamus, meminit Gesnerus in epist. ad Fabricium,  
sic scribens: Baccæ illæ rubræ rotundæ vmbilico  
quinquepartito insignes, quas misisti non sunt  
Cotoneastri sed Chamæmepili, quam ego sic vo-  
caui & descripsi cum operibus Cordi. Quæ eius  
verba hic posita benè conueniunt cum Chamæ-  
mepilo: non item ea quæ apud Cordam, vbi Co-  
toneastri descriptio. Clus. in Pann. scribit: quam  
Gesnerus Cotonastrum vel Cydonaginem &  
Diospyron, & Wildkitten (quasi dicas Cotonea  
fylu. in epistolis appellat, à Vite 3. Idæa Theoph.  
quæ Penæ & Lob. Amelanchier, distinguere vide-  
tur, cum illius baccas rutilas esse ait siccas, carne  
& succo nullas, feminibus intus quaternis, trian-  
gulis. Eum fruticem legisse arbitror in Snealben  
iugis, Iulio florentem, & fructus rudimentum ef-  
formantem cubitalibus ramis, lentis, nigro corti-  
ce tectis & nudis, quorum summitates desinebant  
in breuia germina incana, quinis aut senis foliis  
predicta, Malo similibus, superius virentibus, in-  
ferius nonnihil candicantibus, in ambitu ferratis,  
gustus amaranthinis: inter quæ veluti vmbella flos-  
culorum occultabatur quinque foliis constatum;  
coloris purpureascentis, quorum deinde sedes in  
exigua mala extuberabat. Illum ipsum quem le-  
gebat ramum depictum exhibet, hoc titulo Co-  
toneaster fortè Gesneri. In post. hist. retinet  
hunc titulum, & addit: An verò Agriomelea Bel-  
lonii, quam lib. 1. cap. 17. in Cretæ montibus in-  
uenisse scribit, exiguius malorum, Piri forma  
similium feracem? Et sanè diuiculis Athenæi quo-  
dammodo conuenire videtur. Et ipse Bellonius  
eodem loco, Allobrogi Amelanchier, siue Cre-  
tensium Codomalo, ab Agriomelea distinguit. Hec  
ille.

Figura Clusii respondet Chamæmepilo nostro,  
non item Cotoneastro Gesneri, cui folia non fer-  
rata. Conuenit etiam nostræ Chamæmepilo,  
quod ait, folia in ambitu ferrata, cum tota adeo  
descriptione: quæ item cap. 22. in Pannonicis: Cha-  
mæmepili in epistolis aperte à Cotoneastro dif-  
ferre docet Gesner. Si tamen quod res est, fateri li-  
ceat, suspicamur non benè notam Gesner. Chamæ-  
mepilum: & plantæ, quam pingit Clusius haud  
conuenire possunt Cotonastrum, Cydonaginis &  
Wildkitten nomina: nec etiam Diospyri, quæ  
est iuxta Idæa 3. ipsius Clusii. Agriomelem diuer-  
sam suspicamur, nempe eandem cum Vite Idæa  
tertia. Amelanchier verò, vel, vt habet Bellon. Ma-  
lancier est fortè Cotonaster.

Porrò eiusdem à nobis depictæ Chamæmepi-  
li ramos perelegantes habet D. Casp. Bauh. Mi-  
sit ad nos quoque D. Rentzius Medicus  
Fontis admi. doctiss. amicus noster sin-  
gularis pulchrum ramum, nomi-  
ne Vuz Vrsi Cortusi in monte  
Baldo collectum, vt  
ille asserit.





superius virente, simbria alba, latitudine & proportionem quam icon representat, quæ & vtramque folii faciem ostendit, cum costâ diuisurâ.

Diligens Philatrios D. Ioan. Henricus Frolich. Basil. anno 1608. duo mihi folia obtulit. Vnum magnitudine nostræ iconis, cum pediculo longitudinis vncie vnius & semis. Alterum in omnibus erat multò maius.

Periti considerent, quantum à modò descripta differat, planta ab Hon. Bello ex Creta missa Clusio, quam sic describit: pulcherrimus frutex, cuius femina etiam mitto, ad duorum cubitorum altitudinem assurgit, in orbem diffunditur, perpetuòque viret. Folia habet longa, rotundiuscula tamen instar foliorum Mali, firmiora, latissimè virentia supernè, inferius verò alba quadam lanugine obducta, vt argentea videantur, cauliculos albos, lanuginosos, quos folia vtrinque ambiunt, in quorumque extremitate flores cernuntur specie thyræ, vt in Saponaria vulgari dispositi, sed figura Cyani, colore phœniceo, calyce tamen longiore quam Cyani, squammatò, albo & rubro colore prædito. Flores in pappos resoluuntur. Semen longius quam Cymini, calicisque sunt perennies. In altissimis præcipitiis inter faxa prouenit. Quo nomine autem vocetur, nondum se scire potuisset ait.

## DE DIOSPYRO.

## CAP. XVI.

**P**ulcher est frutex, & qui multos à radice statim folones edat, homine etiam proceriores, còsque ramosos, cortice intactos spadiceo. Folia primo pullulatu ex oculis plura simul proueniunt, incanà lanugine subtes pubescentia, supernè viridia, quæ adultiora decussa, penitus vtrinque glabra sunt, Piri foliis similia, magnitudine varia, vinctiam aut fescunciam longa, latitudine femuncialis, aut etiam plusquam vinctialis, per extremum rotunda, circumquaque crenata, pulchris frequentioribus neruulis obliquis à medio recto donata. Flores inter lanuginosorum foliorum rudimenta oriuntur plures iuncti, candidi, è quinque foliolis longiusculis compositi, in odori ferè: quos bacca excipiunt violacei vel nigri coloris, vmbilicatis, quique lacinis coronata, sapore dulci, suauis, in quibus semina plura [dena aut interdum plura Clus.] oblonga, nigricantia, Pirorū seminibus similia.

An Ficus Idæa Theophrasti? Quam sic describit: Ficus Idæa fruticosa est, nec procera sed crassa, vt vel cubiti spatium in ambitu habeant fruticantes rami, ligno contorto, lento, inferius læui, enodi, superius in orbem comoso, colore tam folii, quàm corticis liuido, figurâ foliis Tiliæ simili, molli, latòque, magnitudine pari. Flos Mespili, & cum Mespilo floret. Fructus quem Ficum vocant, ruber, magnitudine Oliuæ, sed rotundior, gustu Mespili. Crassas agit radices, vt Ficus vrbana, lentisque: Arbor hæc non putret, cui cor solidum, & absque medulla. Hæc ille.

Flos & fructus satis accedunt. Folia potissimum difficultatem iniiciunt. At docti norunt, Theophrastum plerique sua ex relatu aliorum de plantis prodidisse: vt tantò facilius cum ratione coniectantibus venia sit danda. Non enim statuimus, sed considerandum relinquimus Doctioribus.

Conferant etiam periti adductam Theophrasti.

Tom. I.

descriptionem cum Sorbo Alpina, de qua superius traditum.

Athen. Ficus Idæa meminit ex Theophrasti de Ficorum generibus loquens: Idæa inquit, ruber, oliuæ magnitudine, rotundior tantum, sapore Mespili, Alexandrinam hancibi vocant (at hoc Theophrasti non de Ficu, sed de Lauro) crassitudine cubitali ramosam, materie validam, lentam, sine lacte (hoc de suo addit) cortice viridi (at

χρυσία τὴν φανερὰν εἶναι ἐκεῖναι) folio Tiliæ, sed molli. Profectò (inquit Scal.) vanos mortales. Nihil Ficus obtinet, non colorem, non folium, non fructum. Floret hæc: non floret Ficus: postremò lignum dissimile tum constitutione, tum natura. Bellon. Agriomelea: in Creta fert parua Poma, Piri similia: in Gallia reperitur tantum in rupibus Fontainebleau, Regiæ arcis dictæ. Ges. Diospyros eruditorum circa Riuarium lacum Pira S. Ioannis: Bernenses Flübiren: Videtur aut Sorborum aut Mespilorum genus pertinere. Sic describit: Arbutula foliis fermè Rosæ, venosis, fructu rubente, vmbilicato, magnitudine & figura Cerasi, per maturitatem ad subcæreuleum primum, deinde nigri coloris tendente, floribus albis. Cubitos alta quatuor aut quinque: quanquam etiam octo cubitos proceræ inueniatur, trunco non crassiori baculo. Idem alibi: Sorbis etiam cognata videtur Diospyros, si fructum respicias, nam foliis plurimum differt. Et alibi specie & figura omnino vitis Idæa dicit, aded vt vel

Lotus Alpina dici mereatur. A Germanico Flübirtle / etiam Pyrastrum Idæam, vel petream vocare poterimus. Et rursus alibi: Fruticem quem Chamæmepilum nomino, Itali, ni fallor, Pirum Ceruinam (vulgò Pero Ceruino) vocant: vt ex ramulo quem Aldron ad me misit facile concipio, etsi Bellonius cum apud me Chamæmepilum hæc videret, similem potius Piro Ceruinæ, quam eandem existimabat. Nascitur & Italorum Pirus ceruina in Alpibus. Bellon. Chamæpirtum nominabat, quam vocem non probo. Chamæpirtum potius dixerim. Verum existimamus Gesnerum tunc cum suam describeret Chamæmepilum, quæ eadem facinus cum Cotoneastro (vt iam diximus in præcedentibus) non distinxisse benè Diospyron quorundam, seu Pirum ceruinam, à suo Chamæmepilo: & rectè monitum fuisse à Bellonio.

Erroris causam diximus cap. de Cotoneastro. Et alibi: [in epist. vt præcedentia pleraque.] Quem Itali fruticem Pirum ceruinum vocant, ego quia antiquum nomen non intuenio, Myrtomelidem, aut Petroemelidè tantisper nominabo: Idem scribit Diospyron in Creta Codimalon, Bernensibus Flübirtle, Tigurinis Wildfüttenen dici. Sed posterius hoc nomen, quod cotoneam syluestrem sonat, nequitiam probamus, quod nec folia, nec florem fructumve similem habeat Cotoneæ. An verò sit Codimalon Cretensium, nos latet: & Gesnerum tamen non esse existimauerimus. Si considerentur Bellonii verba, fortè apparebit non esse. Neque iis assentiri possumus, qui Diospyron Theophrasti faciunt. Bacca sunt potius Myrto similes, quàm Ceraso, vmbilicatis: nec durum continent nucleum, quæ duo requirit Theophr. in sua Diospyro.

Cum essemus Patauli, Nobilis Botanicus Cortusius appellabat Vitim Idæam Anguillaræ. Quidam circa Lugdunum Meleques vocant. Ben. Aretius, Pyrastrum. Lob. & Pena Amelanchier Galloprovinciæ montanæ: An eadem Alifler Gallorum sit dubitant. Amelanchos vulgò, quasi mel-leas dici bacças, propter saporem. Auelanques

Agriomelea.

Diospyros.

Pira S.

leap.

Sorbi ceruini.

Descriptio.

Gea.

Diospyros.

Lotus Alpina.

Pyrastrum.

Idæa.

Chamæmepilum.

Pirus Ceruina.

Chamæpirtum.

Chamæpirtum.

Chamæpirtum.

Gesnerus.

Pirus Ceruina.

Idæa.

Myrtomelidem.

Petroemelidem.

Codimalon.

Gesnerus.

repreh.

Diospyros.

non est.

Idæa.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

Amelanchier.

CAP. XVII.

Malus Punica Theophrasto non bene proe-  
nit femine, sed ex virga, quin & cultura vno cau-  
dice, cæteris abicissis felicibus adolescit. Aucula-  
facilis est: Innocentissima arbor, quia paucam nec  
numerolam agit radicem, paucoque eger nutri-  
mento, citò fenescit: rigationes tamen amat, &  
umbras. Caudice est breui atque contorto, me-  
dulla carnosa, ramis aculeatis, folus angustis. Fa-  
culæ amittit flores, quod tenui ac debili petiolo  
appendi fuit: supra debilitatem fertilissima arbor  
est: inulta tamen sustinet, nec *κατὰ* tantum, sed  
& *διὰ* *αὐτῆς* diffusionem inquam, & fissionem. Mu-  
tilatione durior redditur. Fructum fert, ex liquo-  
re & cortice constantem; semina congesi, puta-  
mine inclusa: succo acido, alias dulci. Flos huic  
foli Puniceus, fructui insidens. Ex dulcibus aci-  
nis vilis producit, [legendum enim ἐν *ῥιζαῖς*, non  
*ῥιζαῖς*], non enim glaucis acinis reperitur, vt &  
Cæsalp. annotat] ex enucleatis dura, & plerum-  
que acida. Huic frigus non nocet: dulcescunt suil-  
lo ster.



hæretore. Punica Aegypti & Ciliciæ mutato solo meliora redduntur: Euadunt enim alteræ dulces & vinosæ, alteræ sine nucleo, magnôque acino apud Pinarum amnem fructificant.

Potèrò vt & de dignitate huius arboris aliquid dicamus, fuit olim Malum Punicum in sacris Hæbæorum cæremoniis, lege etiam plurimùm honoratum. Nam sacerdos sacrum tabernaculum ingressurus, vestem gestabat, in cuius imo margine, atque per ambitum alternatim Mala Punica, & tintinnabula pendebant, non sine mystica ratione, vt nos docuerunt sacri interpretes. Fuit etiam apud Ethnicos in illorum diuinis percelebre. Celebre fuit & eo ipso Hæreum templum insula Eubœæ, in quo Iunonis simulacrum ex auro & chore, Polydæti arte factum, altera manu Punicum, sceptrum alterâ gestabat: quam Punice gestatorem Paulânias secretiorem dicit, quàm vt illius sermone explicari debeat, Historiis quoque præcipuè ætimationis vel apud ipsos etiam Reges fuisse docetur. Darius rex, cum ingens Punicum gestaret, rogatus, cuiusnam rei granorum illius numerum desideraret, respondit tot Zopyros, hoc est, tot viros probos, qualis fuit Zopyrus Darius filius huiusmodi, qui multis hæc historiam paulè aliter recitet Herodotus. Eñis, inquit, Darius mala Punica, simul ac primum Malum spectant, hæc Arabano percunctatus, nuncquid incensum hominum sibi optaret, quantum illis acinorum esset? respondit, sed malle tot sibi fore Megabylos, quàm Græciam subditam. Is enim eius exercitus dux fuit. Milonem Crotoniatem ferunt inter ea, quæ fortitudinis egregia facinora peregit, malum Punicum manu ita continuisse, vt nec villo conatu eripere permiscuit, nec possumus ipsum prehendere, & sibi in sit: quod tamen amantem cum eo colludentem nullo negotio fecisse perhibent: equid enim non possit amor?

Nota est Græcorum fabula, quâ Iupiter Cereri à Plutone rapta, restitutionem promiserat, sed ea lege ac ompe, vt si nihil apud Inferos illa degustasset: sed huiusmodi conditionis haud recepta, tribus (vt Ouid. ait in 4. Fastor.) vel septenis (videm aut in 4. Metam.) Punici granis se unum soluerat. Hoc autem detexit Alcálahus Orphanes & Acherontis, vel, vt alii volunt, Stygis filius quare in Auen Bubonem mutatus. Ad multas autem matris querelas, illi postremum indultum est, vt sex menses cum illa esset, totidem cum viro Plutone. Sed id non sine quadam mythologica ratione fictum, vt alia pleraque Græcorum figmenta. Proserpina enim ipsa, Luna est: quæ toto anno sex mensibus crecit, sex etiam deficit: videlicet vt per singulos menses quindecim diebus crescens apud superos, apud inferos autem deficiens esse videatur. Sed cum Punicum malum introducitur potius præ aliis: An quia acini eius, quamminimùm nutrientes, ieiunio tamè caterorū aborū ferendo sufficere queant, saltem ad tempus ita laudatissimum probamus motem Italorum, suis egrotantibus, quibus quidem ieiunium prodesse possit, vix aliud vulgencium præscribentū, quàm Punici acinorum cum aqua solutorum, vel eorum tantum liquorem, quo simulac famem & sitim egrotantis salant, atque aded causæ morbificæ, calidæ quidem alterando, frigida & crassa, incidendo, attenuando, & nutrimenti defectu, consumendo resistit.

Non referemus hîc fabulam ex Arnobio, quomodo & ælestis viriū membro se purantis est.

Tom. I.

fluente multo sanguine, quem terra ebibit, nata sit arbor mali Punice cum Pomis, quæ cum Natâ tegisset, ac in sinu reposuisset, conceperit Atum, si credere fas est. Nos vtiliora se sciamur, & quæ ad Punici naturam declarandam propius accedant.

Punica malus flos Theophrasto. & Dioscor. vel vtili malant flos: quibuldam & flos. Flores vltimor: Pomi cortex Sida Dioscor. & Malicorium Latinis. Sylvestris Punica flos, Balaustion eidem. Balaustium Lat. de quo postea. Arbor ipsa dicitur & Sida nonnullis: Sida acinorosa dicit Hipp. Alibi tamen proinde punicum habet. Nicandro quoque Sida dicitur.

Ipsam verò Malum à Carthagine, vbi laudatissimum proueniat, nomen accepisse volunt: à granis verò quæ intus continentur, Granatum, quatuor alii Granata etiam à regione Hispaniæ dicta velint, alii ab vrbe Granata: sed malè, inquit Lacuna, ab ea vrbe Granata dicta putantur, in cuius finibus pauca proueniunt: vt videant quid faciât, qui temerè ex mera coniectura de sibi ignotis & peregrinis tradunt vel docuerunt. Vt tamen dicamus obiter: potuisset & fructus sola bonitas, non multitudo, homini originem dedisse à loco, si modò talia ibi nascerentur quod obicerent diligentiores. Sed quid inquit nominis originem aliunde expiscari, cum imbecillima suppetat in ipso Pomo, & iam ante Catonis & Varonis tempora ita inde fuerit nuncupatum? Nempe Granatum à granorum sacro dictum putamus.

Rhodia & Apyena mala Thales in lib. qui Rhodia dicitur, insculptum, vti et S. obars. Boetius autem Sida. Nam & Sida terra Boetica dicitur. Quo argumento Athenienses ab Epaminonda in Sida regionis quæstione victi memorantur. Nempe referente Atheno, orta inter eos contentione, quid Sidan appellarent: Epaminondas à dextra protinus conditum depromens malum seiscitatus quoniam modo malum hoc vocitarent: responderunt Rhodam. Sed nos, inquit, Sidan. In eo tractu, de quo fuit contentio, plurimæ sunt Mali Punice, indeque pricipio nomen est inditū. Sic Epaminondas causam obtinuit. Pro Sidas tamen aliqui Sidam legunt: Sic Athenienses regionum fines appellabant. Epaminondas ita causam suam obtinuit. Sida verò Dioscori est mali Puniceorum, & putamen. Sida & Balaustion quoque Punica Sidas nominantur eidem Athen. scribit. Est & Rhoidion, exiguum Punicum apud eundem. Empedocles Obliqua vocabat: Sida & Sida & Sida & Sida: tardam ea voce maturitatem indicans. Nam nisi frigus, Solis feruorem vim, humectam & imbecilem reddiderit, eius fructum haud commodè concoqui tradunt. Et Theophrast. hanc arborem melius ac celerius factam suam in vmbra maturare prodidit: Sida & Sida verò dicta quidam volunt, à florida & viuida vi: alii à cortice crasso de quo nunc non est disputandi locus: Geoponicæ aliàs Mala Granata aliàs Punica Mala vocant.

Plinius quoque Punicam Malum quibuldam Granatum appellari scribit. Quæ posterior sanè appellatio hodie frequentior est, tam apud vulgus, quàm apud officinas, atque in ipsis aded Practicorum libris. Quas ambas tamen indifferenter vsurpant Herbarii. Punicum tamen frequenter appellantes. Notandum verò apud Theophrast. vbi agit de Sida [quam Dalechamps. Nymphaeam putat] eiusque caput Malo Punico confert, semina verò dissimilia dicit, pro punicis legendum esse punicis, non punicis, in Gaza

M. Mus. Punicum ex sanguine nata.

Nomina & Synonyma. Malus Punica

Granatum

Rhodia & Sida.

Rhoda.

Obliqua.

Hyperphloia.

Granatum

Theophrastus & Dioscorus.





has sit Samiorum & Aegyptiorum Punica alia rutilis esse granis, alia candidantibus vel albis.

Athen. Punica sic distinguit: Ex Punicis grana sunt albis dura, albis tenella & mollifcula, quæ Apyrena vocant, quorum & Aristoph. meminit in Agriolis, & in Non senescente. Apyrena Plinius dulcia dicit lib. 23. At in 13. *apryrena* vocat, non quidem dulcia, sed quibus blandiores sunt acini, natura candidiore, minisque amaris distincti membranis: talia fieri ait Celiciana, mutato solo, qui eiusdem mutatione dulcia in acida, & vicissim, hæc in illa transmutari scribit. Seneca autem apyrinon dici vult, non cui nulla sit nucleci dunties, sed quibus minima, de quibus Martialis.

Non tibi de Lybiis tuberes, & Apyrina ramis: De Nomentanis sed damus arboribus.

Amatus Poma Granata lignoso acino carentia Hispanis Capraria, Italis Alusi vocari scribit, per quæ nos Apyrena intelligimus.

Cæsalp. tradit in dulcium genere reperiri Punica adeo paruo osse, vt eo carere videantur, quæ fortè & ipsa ad Apyrena referri queant. Seneca in epistolis: sic sapiens imperturbatus dicitur, quo modo Apyrena dicitur: non quibus nulla inest duritia granorum, sed quibus minor.

Non prætereunda hoc loco Pūnica apyrena Scaligeri. In Agro Babylonio sunt Punica Mala, non magna, cortice valde tenui. Quo ablato manduntur, vt Pira. Non enim velut nostra distinguuntur carnis dissipationis, nisi perquam parum osse, vt eo carere videantur, quæ fortè & ipsa ad Apyrena referri queant. Seneca in epistolis: sic sapiens imperturbatus dicitur, quo modo Apyrena dicitur: non quibus nulla inest duritia granorum, sed quibus minor.

Amathæa carbor solum Cretosum, macilentum: sed in pingui quoque provenit. Regio ei est apta, quæ calida est. Et tamen umbras amat, rigationes, & frigus non nocet, vt ait Theophrast. Sed intelligendus de frigore moderato. Nam si intensum frigus non noceret, etiam in Germania & Septentrionalibus regionibus proveniret, quemadmodum in calidis. In Germania non nisi magnatum hortos nobilitat, & id ratio, hyeme curiosè reponenda ne vi frigoris lædatur. In parte Africæ, quæ Antiquis dicebatur Punica, sub qua comprehenditur Carthago & Tuncelius finctus optimus & copiosissimus provenit: in finibus Granatæ paræ, quicquid scribat Matthiol. nam hac in parte maiorem fidem habemus Lacine Hispano. Optima habentur in Regno Neapolitano & Valentino. Et hodie quoque Malograna suppetunt in Brastia, ex orbe nostro illata, vt ex historiis Indicis discimus. Coluntur in hortis Italicæ & Gallicæ Narbonensis omnia tria genera, sapore differentia: speciatim Patau, & Veronæ perelegantes vidimus, à *Erati di S. Ioanne de Monte*. Genue in hortis colunt, vbi facillè à trigoris vi deperditur, quemadmodum & apud nos, nisi caueatur. Pulchellam tamen arborem in multos iam annos colimus, vix floris gemmas protudentem æstatibus calidioribus. Stuckardia in E.C. horto pulcherrimè florent Iunio & Iulio, inter quas quedam flores pluvialis foliis constantes exerunt, vt perhibet hortulanus, In ca-

lidioribus regionibus citius floret. Platero magis nominis Medico, amico nostro, etiam fructum ad notabilem magnitudinem producit Basilicæ. Fructum maturant tardè & vix ante Autumnum: fortè citius in regionibus calidioribus.

Græci fabulantur & hic, more suo: fati nempe primum Punicam à Venere, in Cypro.

Sylvestre genus in planis & maritimis provenit, in Gallia Narbonensi & Prouinciâ passim, gustu valde acerbo vt Monspelii in sepibus. Non temerè in montibus visa est arbor Punica: colles tamen non planè respuit. Patau, etiam ad aquas crescit. Perdit facillè ante maturitatem fructum, & florem quoque roribus nimis atque pruinis: quæ de causa infleunt ramos eius, ne subrecti humorem insectum excipiant atque contineant.

Malum Panicum autore Palladio, vtere, vsque in Calendas Apriles rectè feritur: Locis quidem temperatis, Martio vel April: calidis verò & siccis, Nouembri. Seritur plantis de matrum radice, de uulsis. Sed quamuis multis generibus feratur, melius ramus eius cubitalis incisus manubrii crassitudine, & capite utroque, puta falcè leuigatus, serobi velut obliquus immergitur, prius tamen porcino stercore & in capite, & in imo oblinatur, vel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora desigi. Melius proveniet, si ponendus ramulus gemmatè iam matre sumatur. Sed qui in scrobo deponit, si tres apillos in ipsa radice constituat, prouidebit, ne oma findantur.

Lemnos incolæ, teste Bellon. Nerii flores spargunt & obligant ramis Granatorum, sibi persuadentes vim esse iis floribus impediendum de fluxum florum: affirmant etiam impedire, ne findatur poma. Nos ista vix superstitione carere putamus. Sanè perhibenter hic aliquem Philosophum hariolantem audiremus.

Curandum in primis virgulta innerfa deponas: Nobis etiam ex semine provenit in horto Montebelgard. Creduntur acida fieri, si rigentur assidue: nam siccitas in iis suauitatem præstat ac copiam. Circumsodi autumno & verè debet. si dum pendent in matre Poma, furculos semel vel iterum intorseris, ad ver vsque integritate vegeta custodiantur.

Diophanes in suis Georgicis scriptum reliquit, rubra creati Mala, si glandium cinere radices aspergantur.

Democritus testatur Punicam Myrtumque mutua consuetudine mirum in modum oblectari quod si inter se societate ac consortio fruuntur, fertiliores reddi: radices quoque etiam aliquanto distent intervallo, mutuo complexu exhalari.

Sine nucleis nasci scribit Africanus, si dempta, vt in vite, medulla, furculus adobruatur, & dum comprehenderit, amputetur quod emergit. Cinis cum lixurio circa Punici truncum frequenter infusus, lata & fructuota reddit arbuta.

Asserit Martialis, candida in his grana fieri, si argilla, & creta quancumque partem gypti miscas, & toto trienio hoc genus terræ radicibus eius adiungas.

Idem tradit mixæ magnitudinis poma protuberare, si olla scibilis obruatur circum arborem, in eaque ramus cum flore claudatur, ne resiliat ad palum ligatus: tum operata olla contra incursum aquæ muniat, autumno patefacta suæ magnitudinis poma exhibebit.

Multa in punico ipse asserit Punica nasci, si Tithymali & Portulacæ succus benè commixtus

Satio.

Vt melius proveniat.

Ne poma findantur.

Vt sunt acida.

Vt Vegeta seruantur poma.

Vt rubra creantur punica.

Punica & Myrti Sympathia.

Vt Punica sine nucleis nascantur.

Vt lara fiant Punice arbuta.

Vt Punica fiant candida.

Vt Punica fiant magna.

Vt Punica fiant magna.

arboris trunco antequàm germinet adlinatur.

*In singulis* Acinos totidem granatis numero in singulis  
*Punicis* affirmat Aphricanus, etiam si magnitudo variet,  
*is equalis* modò ex eadem arbore legantur.

Vare, vt Græci produnt, inferitur, in fe, & aliis arboribus. Martialis inferi poffe affirmat de ramorum connexione, vt medulla vtrinq; diuifa fe iungat. Caudex itaque flexilis, qui poffit a terram vſque deducere, obtruit, ita vt ramulorum connexione medulla vtrinq; diuifa fe iungat: deinde vinculis diſtinctis ligatur, ne poſſit in ſuam ſeſem reſilire, demum a nuciſ ſuffunditur. Sed infecto trunco ſurculus quom recentiffimus ſtatim debet inſigri, ne mora exiguum, qui eſt, ſiccet humorem, alia tamen ſcitu non indigna quàm cæteris, ratione. Nam in Punica ſurculus iam oculiſ gemmæ ſcens accipi debet, in aliis verò puds quo præuenit re. Latrare debet Myrtus. Onagrus, vt reſert Didymus: ideo inſerta Myrto Punica, multò plurima pomalargietur. Sacki item & Citio, vtdem teſtatur inter conſueat. At huc & Græciſ contradicit Palladius, qui ſcribit, in t, tantum interſe pſſe circa Apriles Calendas. Vnde hi eius verſe:

non enim alicuiusquam dignitas apud res

*Mala, nec extremis associata comis.*

*Ipsa suas argenti mutato semine gemmas,*

Et sibi cognato picta rubore placent.

Qui plura de his vult, legat Palladium ex quo hæc pleraque delumpta, & Columellam. Item Ruellium, qui de his multa præclara ex Veterum monumentis congeffit. Consultat etiam Plinium, & reliquos Geoponicos, tam Pisos quàm Neo-

Nunc vires perpendamus ex Diosc. Gal. Plinio  
Scelus, Punicum malum refrigerandi atque exsic-  
candi secundo ordine facultatem habet. Quare o-  
mnia Venetis impetus excidunt, eorum inprimis,  
que frigida temperatura sunt. Nam non eadem  
in omnibus visceratur. Nempe ex sapo-

tu in corpus excruciant, & ad oculorum inflam.

mationes. Nam vlcera coleritius ad cicatricem ad-  
ducit. Acidorum nucleus in Sole ficcatus, & ob-  
soniis inſperſus, ac cum iis etiam decoctus, aluum

Stomachique fluxionem sistit. Aqua verò cœle-  
sti maceratus, sanguinem excreantes potu inuat,  
scilicet affuso defœcescentium profusione labo-

& ad morbos dyentericorum, prout utique laborantium accommodatur. Porro succus ex acinis ipsis, ut Diosc. ex acerbis ut Plin. expressus si coquatur melli admixtus, perutilis fuerit ad oris,

NHCL 8.

*Stomach*  
148.

Dysentery

Ulcra o

Et genus  
luna

Pierzia  
Norma  
Acras

dolor.  
Narissm

VIII.4  
Stomachic  
medic

77C 77E 14 77A

Contra  
porcra m

17218773.

Sedis  
prudens

Ulcers.  
 Aures pa  
 rulentae

*Euphorbia*  
*maculata*.

*Adversus  
serpentes*

Боттис со

100

Inflammation  
e. s.

Ave Pu  
cmt.

Ad Gifu

Cardinal

Наусеа  
Г. м. м. м.  
Лесотрава



[illegible]

organs.  
of alp.  
physiatur.

Page 208.

Lucy

*Trupis*  
*ramator*

Syrupũ  
dulcissimũ  
granato-  
rum Viresc.  
Viresacidi

Vires Cyp-  
tini sem.  
Floris Gra-  
natorum.  
Vulnera.  
dentes.  
Ruptura.

Succus Cy-  
tini.  
Hypocisti-  
dis Succe-  
daneum.  
Plin super-  
stiriosus.

Gingiva.  
Ulcer.  
Inflammation.  
Scorpion.

Malicoria  
(en Corticia  
granatorum  
vis et visum

Plin. 24. 2.

Malacca.

*Permianae,*  
*Culices.*

Nucleorū  
Gis.  
Stomachū

Hydrops.  
Radici.  
Ussu

*Radici*  
*glu.*


Термины  
и/или

# HISTORIAE PLANTARVM;

## BALAVSTIA HISPANICA.

PRO Hispanicis importantur plurimum Balau-  
stia, quæ Punica cuiusdam flores sunt ampli,  
densissimo foliorum purpurascens sætæ sti-  
pati, gustu adstringentes, non Cythino oblongo,  
vt in satia pomifera Punica, aut etiam Stutgar-  
diana, flore multiplicato insidentes, sed compres-  
so lato suffulti, cui color ex flauo purpurascens,  
corum durum lignosum, in lacinias quoque di-  
uisum. Sicca Balaustia nonnihil simile habent  
cum Rosarum spongiosis.

De his vtiq; intelligendus Theophrastus in  
primo historæ scribens: esse ge-  
nus quoddam & vitis & Punica, quod fru-  
ctum perficere nequeat, sed cuius ad florem vs-  
que tantum generatio perueniat: qui densus  
& plenus, & amplitudinem quodammodo  
Pomi amulatur.



Italia, [ at non est peregrina sylvestris commu-  
nis ] flores tantum ferens, aded multiplici folio  
constantes, vt Rosæ videantur centifolia, colore  
latuato.

Eiusdem Helychius meminit, ita scribens:  
Βαλαύστια δὲ τῆς γῆς οὐκ ἔστιν ἀλλὰ τῆς θαλάσσης. Vbi  
miramur quid in mentem venerit Constantino in  
lexico hunc citanti locum, dicentique Helychium  
nugari. Iplemet potius nugatur Constantinus,  
cui Syriacum Balaustium incognitum, nihilomi-  
nis animo sugillandi prurit. Rectè dictum δὲ τῆς  
θάλασσης, vt distinctum ostendat à vulgatis Punicis.

Incogitant verò Plinius [ & merito à Dalec.  
reprehensus ] scribit: Cythini flosculos alibi à se  
balaustia vocatos. Nam tam satia, quàm sylue-  
stris Punica florere incipientis, [ delincentis le-  
gendum suspicatur Coanar. ] primum partum,  
Cythinum vocare videtur: balaustium verò floscu-  
lum vtriusque, antequam malum prodeat, in ipso  
erumpentem Cythino. Confundit igitur Balau-  
stium cum Cythino, hic enim flos est satia: Puni-  
cæ: Balaustium sylvestris ex Dioscoride. Nam si  
quis Balaustiorum figuram considerauerit, depre-  
hendet, ea non Cythino aut oblongo vasculo si-  
mili tuberculo, vt satia flos, sed dilatata veluti  
suâ basi foliola sua complexi, atque in eo rosæ  
non admodum dissimilia.

Cordus quoque simili errore lapsus, quando  
ait: Punica sylvestris, satia per omnia similis est, in-  
cultior tamen, spinisque horridior, cuius Balau-  
stia ac Cythini in satia Punica natis efficaciora  
sunt: Punicam, inquam, malum, ferentem Balau-  
stia non distinguere videtur à sylvestri vulgata.

Monspeli sylvestris frequens, & tamen fructi-  
fera: sed Balaustia non fert. Stutgardia in horto  
Ill.E.C. est malus Punica infructifera, cui flores  
sunt

Et

putant vindicari. Ex Plinio & Curtio. Scribit  
Cornelius in libris de cognosc. morb. Malicorium vi-  
no decoctum ac potum omnes ventris tinea e-  
necare, maxime eas, quas Ascanidas nominant,  
addens omnibus malis Punicis peculiarem vim  
tinea ventris enecandi inesse. Idem contulos  
flores, & in puluerem redactos acieiuno stoma-  
cho sumptos, vnicè ad frigidam facere tussim, &  
catarrhum asserit. Corticis cum ipsis granis con-  
tuli succus, si inspissetur, Polypum narium delet:  
reprimat enim carnem supercrescentem, & tene-  
lam absumentem in cortice cum adstrictio-  
ne amaritudo quædam, vt annotat Casalp.

Nec dubium foliorum contusorum, aut deco-  
ctorum magnam quoque esse vim ad multa præ-  
dicta, præsertim ad lotiones, infusos, infusiones,  
vbi adstrictio opus. Ast illud nobis nemo per-  
suadebit, quod Euchar. notat, Granatorum ma-  
lorum cortices, si edantur, cor roborare & palpi-  
tationem eius tollere.

Porro vt & in Pharmacopolarum gratiam ali-  
quid addamus, qui in multos dies Punica asseruare  
conantur: Punica mala, vt Græci tradunt, ad hy-  
bernos vsus seruanda leni manu, ne tactu aspe-  
riore vitentur, aut vulnus sentiant; interlegi de-  
bent, nam illa putrilaginis origine non adferunt, &  
in cocta pice mergi, refrigerataque suspendi. Co-  
lumbella suadet Punica & in genere omne Po-  
mum, quod in vetustatem reponitur, cum pedi-  
culis suis legendum esse, & si sine arboris noxa  
fieri possit, etiam cum ramulis, nam ea res pluri-  
mum ad perennitatem confert. Multi cum ramu-  
lis suis arbori detrahunt, & creta figulari cum di-  
ligenter mala obruerunt, in Sole siccant: deinde  
si rimam creta facit, luto linunt, & assiccata frigi-  
do loco suspendunt. Palladio Punica seruantur, si  
picatis pediculis ordinata suspendas. Longo cu-  
stodiuntur tempore, si in feruentem aquam intin-  
gantur, & protinus erepta, in arena sicca compo-  
nantur, aut Tritici cumulo in umbra dum rugas  
contraxerint recondantur. Aliter. Lecta integra  
in aqua marina, vel maria feruente mergantur,  
vt combibant. Post triduum Sole siccantur, vt  
sub dio nocte non maneant, post in loco frigido  
suspendantur. Cum volueris vt aqua dulci pridie  
macerabis. Feruntur hæc poma recentia æ-  
mulari. Item si tactu inuicem separata paleis ob-  
ruantur. Plures modos habes apud Palladium &  
Columellam, qui & cultum Punicæ diligentissimè  
describit lib. 12. de re rustica cap. 44. quem consule.

Acida Punica mitescere & dulcia fieri, scribit  
Matth. si suillo, aut humano stercore foueantur  
arboris radices, & vetere vrina lapsus irrigentur.  
Si florem arbor non continet, vinam veterem  
cum pari aquæ mensura temperare, & ter per an-  
num radicibus infundere efficacissimum est re-  
medium.

## DE PVNICA BALAVSTI- FERA.

PLacet de hac specialius agere, tum quodd di-  
uersa sit à vulgata, & nunquam fructum ferat,  
tum quodd à Theophrasto Botanicorum Pon-  
tificis maximo & vetustissimo manifestè distin-  
guatur, vt patebit: tum denique quodd à Diosc.  
Balaustia sylvestris Punicæ esse dicantur,  
quæ tamen à nostris sylvestribus  
differunt.

Tinea.

Ascarides.

Tussis.

Catarrhus.

Polypus.

Foliorum.

Grana.

Euchar.

Rosæ not.

Vt Punica.

mala le-

genda vt

adjuvanda.

Poma cum

suis pedicu-

lis vt ra-

mis legen-

da.

Vt diu cu-

stodiuntur.

Vt vulgata

recentibus

fiant simi-

lia.

Vt acida

mitescant.

Vt flores

non decedat.

Descriptio  
Balaustia-  
rum.

Descriptio  
Theophr.

Punica fe-  
ritis pere-  
grina.

Constat.  
not.

Plin. not.

Cordus  
ait, not.



sunt quidem pleni, sed non tales nec tali figura aut specie, quales Balaustiorum. Nam & Cytinum habent, seu Calycem oblongum, de quo supra.

Gal. quoque licenter, vtriusque florem Balaustia dicit cum Plinio, qui tamen ferendus, quod ex professo de iis non egerit, potuisset tamen distinguere ex Dioscoride.

Matthioli. scribit Laudatissimos latinarum flores, colore perquam rubro ex Creta & Cypro hoc anno Venetias importari, aspectu quidem specioso, & viribus ceteris praestantiores. Sed & mangonio fieri in Italia peregrinis non dissimiles, non tamen usque adeo praestantes. At sane non videmus quomodo ex Cytinis fieri possint Balaustia: debebat Matthioli demonstrare discrimen inter vera & mangonio facta, si talia nouerat, aut fiant: suspicamus enim ei non fuisse nota, quia non descriptit, aut certe non esse Balaustia.

Balaustia *Bardania* Dioscor. & Graecis: à *Caddo* verbo tractum nomen putat Cordus. *Balaustia* Colum. Inuenimus & *Balaustia* scribi. Quidam simpliciter *Balaustia* dicunt, alii flores Balaustiorum: quibus nominibus omnes Herbarii vtuntur. G. wild Granatöpfel blühe: vel vt alii, simpliciter Granatblüth. Belg. de bloem oft bloeyfel van eenen wilden Granatappelboom. It. Fior di pomo granato: Sed Doctis à Graeco mutuato nomine, *Balausti*. Hisp. *Flor del granado*. Angl. The flowers of the wilde Pomegranate tree.

Balaustii differentiarum solus, quod equidem sciamus, neminit Dioscor. colore discrepantium: Balaustiorum inquit, complura sunt genera: reperitur enim candidum; rutilum & colore rosaceo: *indigæna* Graecam habet: Orib. *pergrana*: alii vtrunque legunt. Quae ad nos importantur sunt ferè colore roseo: candida nondum vidimus nec est inter Herbarios qui se vidisse scribat.

Rauv. filius scribit circa Tripolim prouenire in sepibus Granatos sylvestres cum pulchris floribus plenis. Proueniunt, inquit Anguill. & in Syria circa Alepum in sylvestribus spontè: non crescit in Italia. In hortis quibudam plantata visitur, vt Ferrarii in Nigrololi, Armini, Pharmacopaei Iulii Moderati. Venetias magna copia ex Syria, Cypro & Creta importantur. Cordus tradit, nasci in Aphrica ac in Hispania fere tota spontè, Regno hoc ob id Granati cognomento gaudente. Nos sicca habemus elegantia & è multis selecta. Habentur & in plerisque Pharmacopoliis. Siccum tantum Patani vidimus apud Cortusum, vulgato non valdè ab similem. Hortus Stutgardianus, pulchras alit Punicas malos, & inter eas nonnullas flore pleno, minus tamen, quam Hispanicas: ex Hispanica Balaustifera lata, nescimus.

Balaustia Mali Punice cytino similia sunt, & ex iis quoque succus elicitur hypocistidis modo. Vis ei adstrictoria, eadem efficiens, quae hypocistis & Cytinus, autore Dioscoride.

Curtius tradit & potenter adstringere, mirè exsiccare & refrigerandi facultate. Vnde arefactum & contritum, & in certriginibus reliquisque viceribus infectum, celerim ad cicatricem absque erosione perducit, & destillationes cohibet: quo praesidio ad sanguinis excreationes, ad Dysenterias, & ventris profluvia, & vteri nemo ferè medicus est, qui iugiter non viatur. Plin. medicis idonea sunt Balaustia. Sunt, & tingedis vestibis, quorum color inde nomen accepit: nempe puniceus, qui & Balaustinus Scaligero. Aduersantur Scorpionibus. Sistant poro menses femi-

narum: sanant oris vlcera, (vlcera capitis Dioscor. *αχάρας*) tonsillas, vnam, stomachi solutiones, gentialia, vlcera quacunque in parte manantia. Siccavere etiam experti, vt sic quoque experientur, inueneruntque tumorum farinā dyentericos à morte reuocari, & aluum fisti. Possint & plerisque antè dictis de Granatorum vltibus accommodari, cum eadem facultate polleant ferè, quae illorum Cortex.

*Tinctoria*,  
*Adnerius*  
*Scorp.*  
*Menses*,  
*Tonilla*  
*Vna*,  
*Stomachus*,  
*Dysent.*

## DE ARBUTO.

## CAP. XVIII.

*Arbutus*: *Comarus* Theophr.



Vix aliò cōmodius Descriptio referas Arbutū quam quidam arborem dicūt: plurimū tamen est frutex, quatenus obseruauimus, cōtortis stolonibus scabro cortice interitis: in quibus perpetui vitoris fo-  
*Folia*  
lia, Laurini similia, & paria sepe, crassa, virentia, per eternum tantillum purpurascētia, circūquaque crenata.

Flores tanquam ex amento racematim penduli, pulchri similes ferè floribus Lili conuallii, concaui, albi, odoris iucundi: hos excipiunt fructus, Fagis, similes, sed multo maiores, exactè rotundi, acorosi, antè maturitatem lutei, maturi autem rubentes, sapore valdè grato & dulci praediti. Semen non benè obseruauimus. Clāusū ait Miliò non multò esse maius, inque fructus medinillio contentum, nihilominus tenui obductum esse membranā.

Hanc Theophrastus Comari nomine sic describit. Comarus, quæ Memacylon fert esculentum, non est admodum magna arbor. Corticem habet tenuem, Tamarici similem: folium inter Illi-  
*Descriptio*  
*Theophr.*  
*Memacy-*  
*lon.*  
*Gaza Corni*,  
*& Dal.*  
*repreh.*  
cem & Laurum medium. Floret mense Pyanep-  
sione [quem Gaza Cornar. & Dalec. Iulium vertunt, cum potius Nouember sit aut October: Cæfelp.] Flores prodeunt ab vna appendice extrema parte racematim, & quisque similis est Myrti bacce oblonge forma & magnitudine, non foliatus, sed velut ouum exalptum, ore aperto. Quum desloruit, etiam retinaculum, [ *αποσπασ* ] quo adhæret perforatum est. Quod desloruit, tenue est, sicut verticillum circa fūsum aut Doricæ columnæ capitulum. Fructus annuo spatio maturefcit, vt simul contingat & hunc haberi, & alterum flore sponderi. Idem alibi dicit eius corticem radicis speciem habere, & perpetuò virere. Sed quando ait: *ἐναρ* - folia inferiora dimittit, cuminumibus perpetuò virentibus. Gaza vnedinem reddit: fortè legit *ἐναρ* - . Porro tria habet nomina Theophrastus, quasi tria essent genera di-

*stineta*, vt Scaliger & Cæfalp. aiunt: *κίμωες*, quæ Arbutus est nostra: *ἀδράχην*, de qua postea, & *κοιμωχίαν*, vt acutissime legunt Ruell. & Scal. vel Coggygian, quæ tamen parum commune habet cum prædictis, & folia demas, de qua sub capite de Cotino.

*Differen-*  
*tiz.* Cæfalpinus etiam modicam quandam differentiam obseruauit in fructu: nam quidam parum mali amplitudinem implet, rubore magis nigricante: mollior & suauior, in mediterraneis proueniens: quidam Auellanzæ magnitudinem non excedit, flauior & asperior, in maritimis tractibus magis. Virgil. horridam arbutum dixit.

*Diosc de-*  
*forpito.* Dioscoridi Comarus seu Arbutus, arbor est, Cotoneæ malo affinis, tenui cortice, sic enim legendum, nempe *λεπτόκοιτος*, non *λεπτόφυλλος*: non enim folia Arbuti sunt tenuia, sed cortex fructum proferens Plani magnitudine, nucleo carentem [ *ἀπὸ φύλλου* ] quem Memecylon vocant, quique ubi maturus subfuluus aut rubicundus conspicitur: in eis acerolus. Patet inque satis liquidè, vt equidem arbitramur, Arbutum esse Veterum *κίμωες*.

Qui Arbutu mali Cotenci assignant folia, inquit Scal. non norunt alterutrum. Etenim à Lauro ad Illicem si transeas, Arbutum inuenies, & Suber. Rectius Theoph. Lauro & Illici contulit. Dioscorides verò illi sua collatione quosdam in suspensionem coniecit, quæ crederent Arbutum eius & Theoph. d. ferre.

*Nomina &*  
*synonyma,*  
*authori-*  
*que sen-*  
*tentiæ.*  
*Comarum*  
*Arbutus.*  
*Memecyl.* Ergo *κίμωες* Theoph. Diosc. Gal. cæterorumque Græcorum. Lat. Arbutus. Fructus eius *μυμάκωνος*, vel vt alii legunt *μυμακλόνος*, alii *μυμάκωνος*. Sarrac. apud Diosc. *μυμάκωνος* legit, & memacylum veruit, sed quo auctore non addit. Diciturque *κίμωες*, & in masc. genere apud Ach. cum sit fæmin. apud Theoph. Hinc *κίμωες* apud Arist. ph. in A. ubi, vt annotat Const. Scal. legit *μυμάκωνος*. Athen. ex variorum Scriptorum autoritate *μυμάκωνος*. Sunt denique tam è Græcis, quam Latinis, qui fructum & Memacylum, & Comarum, & Vnedonem vocitent. Fructum verò Virg. Arbutum in neutro, vt Georg. i.

---Cum iam glandes, acque Arbuta sacra  
Deserunt syluæ.

Et in secundo:

---Dant Arbuta syluæ.

Et de arbore:

Et quæ nos rara viridū tegit Arbutus umbra.

Horatium tamen Arbutum fæm. gen. posuisse volunt, hoc carmine:

Impune et urum per nemus Arbutos  
Querunt latentes

Arbuta pascuntur apes dixit Virgil. 4. Georg.

Arbuta matura Lucretius.

Ouidius:

Arbutos satius montanaque fraga legabant.

Idem de arbore:

Pomæque onerata rubenti arbutus.

Vallæ Arbutus ea est arbor, quæ Poma instat Cerasorum seu Fragorum fert. Plinius de ea tradit diuersis locis: Alia, inquit, acinis caro, alia Moris: alia Vnedonibus. Aliud corpus est terrestribus fragis, aliud congeneri eorum Vnedonit: quod solum Pomum simile fructui terræ gignitur. Arbor ipsa fruticosa: fructus anno maturefcit: pariterque floret subnascens, & prior cogitur [ coquitur M. colligitur Vet. ] Mas sit an fæmina stelligis, inter auctores non constat. Pomum inhonorum, vt cui nomen ex argumento sit vnum tantum edendi. Duobus tamen hoc nominibus appellant Græci, Comarum & Memecylon: quo ap-

paret totidem esse genera & apud nos. Alio nomine Arbutus vocatur. Iuba auctor est, quinquagenum cubitorum altitudine in Arabia esse eas. Hac Plin. Verùm quando ait: solum hoc Pomum simile fructui terræ gigni, non recordabatur [ inquit Dal. ] Adrachnes fructum, quem similem Memecylo Theoph. esse tradit, fructui quoque terræ nempe Frago similem esse. Idem Plinius Vnedoni folium mali Assyriæ seu Medicæ tribuit, eandemque inter syluestres arbores Græciæ cum Akrachne recensens, perpetuifoliam dicit. Ergo Plin. quatuor has voces, Vnedonem, Comarum, Memecylon, Arbutum, vni arbori ac fructui tribuit. At verò Vnedonem fructum Arbuti non esse, sed Epimelidis arboris Gal. scribit his verbis: ex syluestrium plantarum genere est, & frutex qui *ἐπιμυμάκωνος* fert. Appellatur autem is fructus in Italia Vnedo, stomachoque nocet, & capiti dolorem adfert, acerbisque est admodum, cum exigua quadam dulcedine. Cortis quidem, & Canirubi fructus, & glandibus, & *μυμακλόνος* [ sic autem Comari fructus appellatur. ] rutilici pulsim vescuntur: reliquarum autem arborum aut fructuum fructibus non admodum vtuntur. Ex quo Galeni loco apparet eum diuersum esse à Plinio, cui Vnedo, vni d. dum, Comari fructus est: Galeo autem Epimelidis, vt & in sexto de simplicibus tradit, licet easdem vires attribuat vtrique, hoc est, & Comaro & Epimelidi: eundemque secutus est Paulus.

Quorum fortè autoritate motus Dalech. apud Plinium scribit hunc incitè & negligenter *μυμάκωνος* fructum Arbuti *πρὸς κίμωες*, cum Vnedone fructu Epimelidis confudisse binis locis: negligentius etiam Memacylum fructum cum Comaro, siue Arbutu arbore sua. Et addit Dalech. Vnedonem fructum esse Epimelidis. Nec tamen sibi constat. Sed huius suæ opinionis oblitus, aut fortè Palamedium canens apud Athen. in notis suis marginalibus annotat Arbuti fructus esse Vnedones.

Sed ante ipsum dixerat Cornarius, Plinium Vnedonem, quæ Galeo & Paulo Epimelis est cum Memecylo Arbuti fructu confundere, & addit alibi: Galenum manifestè inter Comarum arborem, cuius fructus Memecylon appellatur, & inter Arbutum aut Sentem potius, quæ Epimelidis fert, & in Italia Vnedo appellatur, distinguere: vt certum sit duo diuersa genera Vnedonem & Memecylon esse, sed tamen iisdem viribus prædita. Fateretur tamen, haud facile esse pronunciare quid sit fructus Arbuti, Memecylo dictus, & quæ arbor illum proferat: non dubitare tamen se hanc in Germania nasci, & iis, qui sylvas scrutantur, notam, & fructum adeo in vsu esse: sibi tamen nucleo carentem nullum talem fructum cognitum. Sic de ignotis decernit bonus ille vir, & Cornarius nullius auctoritate motus, Plinii reicit sententiam, approbans Galeni.

Eidem subscribit Lonicerus, nec alia fultus ratione. Quin & Constantinus, hisque subscribit & Sarracenus in suis Scholiis ad Diosc. atque falli Plinium quando ait, Memecylon Vnedonem vocari.

At verò ne Plinio quidem sui desunt adstipulatores, ique viri maximi, & in re Herbaria non contemnendi Scriptores. Hermolaus sanè omnis fensit. bonæ literaturæ alumnus Pomum huius arboris [ Arbuti ] & Comaron & Mimecylon Græcis dici ait: Latinos Pomum & arborem quoque ipsam Vnedonem & Arbutum. Sūntque, inquit, qui duo genera constituant, Theophrastum fortè secuti.

Arbuti fructus.  
Comari.  
Memecyl.  
Arbutus maxima Arabica.  
Plin. not.

Folio mali Medica.

Epimelidis.  
meda.

Memecylon.

Plin. repræ-

Epimelidis.

Cornarius.

Comaron.

Mimecylon.

Arbuti duo.



enti: Comarum, id est Arbutum, & Mimcydon,  
id est, Vnedonem, à Theophrasto Neliam voca-  
tum: desuū & hoc cortice: foliis quoque.  
inā tantū parte deciduis, virente perpetuū  
comā. Montana fraga nominantur à Poëtis, vt à  
reſtibus diſtinguerent. Diſſert Comarus à Co-  
maro: vt in Paliuri mentione diximus. Teſtan-  
dum eſt & illud, Grammaticos Græcos eſſe, qui  
fructum Arbuti, Acylon vocari tradant falſo, cum  
Memcydon cum dici conſtet: Acylon verò il-  
lignans ſit. Hæc Hermol. Sed Cordus liberè,  
nullaque circūſione vſus, Galeo inquit, non  
aſſentimur, Epimelidi, Memçeli vitia adſcriben-  
ti: proculdubio inſinuare volens vel diuerſa eſſe,  
vel ſaltem non iſdem præditi viribus, de qua re  
infrā. Amatus quoque, nonnulli (inſit) diſſe-  
rentiam faciunt inter plantam iſtam quā fruteſ-  
cit, & eam quæ in arbore creſcit, in quam ſen-  
tentiam Theophrastus nire & animaduertit, cum  
Comaron, id eſt, Arbutum ab Vnedone arbore,  
lib. de hiſt. Plant. vbi corticum diſſerentias enar-  
rat, diuerſas facit: quā tamen idem Theo-  
phraſt. nunquam de Vnedone ſermonem priu-  
atum, quod equidem oblerauerim, habuerit:  
Gal. tamen illum imitatus, vno in capite de Vne-  
done fructu ſermonē fecit: alio verò de Arbutu ſi-  
ne Comaro, vt lib. 7. videre eſt. Poſtea addit: Mea  
tamen ſententia, Vnedo ab Arbutu ſiue Comaro  
in nulla re diſſert, quā eadem ſit arbor ſpecie,  
& vtrique fructus Vnedo, ſiue Memcydon di-  
citur. Sed in eo tamen ſaliſtur Amatus, quod ait,  
Theophrastum de Vnedone priuatiſſe egiſſe, &  
Arbutum ab Vnedone arbore facere diuerſam:  
Nam ne meminit quidem vnquam Vnedonis  
Theophrastus, ſed Gaza, illuſ interpres, Vne-  
donem dicit vnclay, & arbutum vnclay. Vnde  
Scal. Habes, inquit, eiſdem generis vnclay vnclay.  
Arbutus Latine arbor eſt, fructus autem  
Vnedo. Ac Neleiam apud Theophr. Vnedonem  
verit quidem Gaza, ſed an benè neſcimus: Et  
cur Neleia ſit Arbutus, aut eiſus ſpecies, nondum  
nobis conſtat, nec nullus eſt, qui explicet, quam-  
vis Cluſ. etiam dicat vnclay apud Theophrast. enā  
ſignificare Vnedonem ſi dicit hoc dicit: aut cui-  
us autoritate? aut quid eſt vnclay Theophrasti?  
Fortè rectius legas vnclay, id eſt, Malum cum  
Coſtiſ.

Porrò Gazam reprehendens Scaliger, quod apud  
Theophrast. vnclay vnclay Pomum, nimis com-  
muni appellatiue ſit interpretatus, addit: Vne-  
do eſt. Et in exerc. Cardanum reprehendens,  
quod putat Ederam & Arbutum eſſe idem poſſe  
ſubdit: Eſt Arbutus ſatis grandis, folio Lau-  
ri, criſpiore, & ad Suberinum haud ita parum ac-  
cedente, A' Calabris, niſi me fallit memoria, Ce-  
raſus Marina dicitur. Huius Vnedo fructus, Co-  
maron & Memcydon audis apud Theophrast.  
apud Gal. falſo Epimelida. Arbore vocatur à Py-  
renæis.

Eandem ſententiam ſequuntur Lob. & Pena  
in adu. Camer. & alii. Dod. veluti fluctuans ex  
aliorum potius ſententia loquitur quā declarat  
ſuam: Arbutus, inquit, quibusdam Vnedo Gal.  
ſubdit tamen: fructus quibusdam vnclay vnclay, Lat.  
Vnedo & Memcydon Gal. ſed proſectò ſuſpecta  
nobis videtur Galeni ſententia, quæ ſcimus in  
Italia fuiſſe peregrinam, ideòque Plinio qui Italus  
fuit, citius falſi poſuiſſe. Si autoritatem ſpectes,  
vtrique ſerè par pondus: At proſectò, non  
placet Galenus Epimelidi Vnedonis facultates &  
vitia tribuens. Nam ſi Epimelis ſit Meſpilus, vt

plerique doctis perſuaſum ſcimus; quis dicat  
eiſus fructum noxam afferre capiti? aut ſitomacho  
eſſe moleſtum, quem tamen plerique Medici  
ſitomacho familiarem dicunt?

Non prætereunda opinio Conſtantini, qui  
peritionibus conſiderandum proponit, quæ ſit ea  
arbor, de qua ſic ſcribit Palladius in Decemb. Hy-  
pomelides Poma ſunt (vt Martialis alteriſ) Sorbo  
ſimilia: [intelligit Conſt. magnitudine] medio-  
cri arbore naſcuntur, & flore candidulo. Dulcedo  
huius fructui cum acuto ſapore commiſta eſt. Om-  
nia hæc probè Arbuto conueniunt. Repugnat  
verò quod inſtrā ait: nucleis ſeri, & Poma alter-  
uari. Denique etiam Solerio Arbui fructus nunc  
Vnedo, nunc Memcydon, nunc Comarum vo-  
catur. Quid verò Ruell. ſcribit, Galenum & Pau-  
lum, Arbutum, Comarum, Vnedonem à ruſtiſ  
Italia, ſcripiſſe, neuquam verum: quin potius  
illi clariſ & maniſeſtis verbis Arbutum ab Epime-  
lide, cuius fructum Vnedonem dixere, diſtinxer-  
unt, vt liquet in præcedentibus: ſed an benè do-  
ctiorum iudicium eſto. Nec placet quod eadem  
putet, quamuis eandem Galenus & Paulus illi  
vim reddiderint: diſſicile ſiquidem probare à ſo-  
lis viribus. Multa ſunt viribus ſimilia, quæ tamen  
nec forma, nec genere eadem.

Sed quid de Arbutu Arhæneus? nimirum ceu  
in alium nos ducens hortum. Aſclepiades, inquit,  
Myſtlenus arborem quandam Chamæcedum  
nominans, in agro Bithyniæ gigni ait, radice par-  
ua: quin & arborem ipſam non magnam, ſed Ro-  
ſarum arbori parem: (ſic enim legit Natalis de  
Comitibus, & in ſuâ ſynonyma, pro eo quod in noſtro  
& vulgariſ codicibus mendosè legitur, & in ſuâ ſynonyma  
quā priorē lectionem etiam Dalechamp. ſequi-  
tur) cætera fructum omnino Ceraſo ſimilem, quo  
largiore ſi quis vſatur, non aliter quā vini potu  
caput dolore, & graue eſſe. Hæc quidem Aſcle-  
piadem ſcripiſſe putat de Memcydon, id eſt Ar-  
buti fructu: (non de Sorbi fructu, vt Nat. de co-  
mitibus verit) Talem enim fructum, addit, arbo-  
rem illam gignere, & qui plura ſeptem ex ea po-  
ma comedere, capitis dolore vexari.

Theopompus huius fructus meminit hoc verſu.

Myrti bacis veſcuntur, maturiſque Mem- Memcylo  
glyſi.

Et Crates:

Longè ſompoſiſſimæ ſunt mammae, quale eſt  
Malum, aut Memcydon: nimirum rotundæ,  
globosæ, paruulæ, colore ſubruſto nitentes, qua-  
lis eſt Memcyli. Amphis: Quid vides, Morus  
Mora fert, illex acylos, Arbutus Memcyli. Mira-  
ramur quā confidentiā Natalis de Comitibus  
his locis citatis apud Athen. vnclay vnclay in Sorbum  
cenuerit. Præſtititſe reuulſe Græcam vo-  
cem.

Porrò Arbutus omnibus ſerè Herbariis recen-  
tioribus diſta: Arab. Hnūladib: vel vt alii ſcri-  
bunt, diuſim, Hnūl Adib. Qui Germananicè  
Gagapfelbaum / & Belg. Gagapfelboom  
vocat, vt Helſtricus & alii, ſatis id licenter faciunt:  
non enim ſunt Poma vel Mala ſepium, vt illis no-  
mina ſonant: nec in Germania proueniunt. Præ-  
ſtaret nominare Erdbeerbaum / id eſt Fragorum  
arborem. Goropius ſcribit Comarum dictam  
à Cumborum Com-ar. Sed quæ Etymologiæ  
ratio: Gal. Albonſier, fructus Arboux: Ital. Alba-  
tro: & Roſſello de ſecretis teſte, Arbatri alias Romori-  
ni. Hiſp. Caſtil. Madronno: Catal. Arbus: Portug.  
Medronheyo aut Medronho. Angl. Arbutree / vel  
Strawberrytree / quaſi dicas Fragum arbo-  
ream.

Arbutus.  
Vnedo.  
Comarum

Ruell. re-  
preh.

Chamae-  
cedum.

Ath locuſ  
emend.

Memaci-  
lon.  
Natalis  
error.

Nat de co-  
mit. reprob.

Linguaſ.  
nomina.

Fragum  
arbutum.

Turnerus putat Onidium saprà citato versu Fraga arborea & terrestria coniunxisse, sed fallitur, ut nobis quidem videtur: Existimamus enim Arbutos fructus, & montana Fraga esse Synonyma.

*Turner.* Sed nouas turbas nobis mouet Anguillara, qui putat Arbutum à Theoph. descriptam à Dioscor. Arbuto differre, quòd Theoph. dicat, folium Arbuti inter Ilicem & Laurum: Dioscor. verò arborem similem Cotoneæ, foliis paruis. Ostendit [inquit] hic Diosc. non esse dissimilem arborem, foliis, ramis, & trunco malo Cotoneæ. Itaque fortè intellexit de Portulaca Theophr. quæ folia habet minora, & similia folio Cotoneæ, nec non reliqua. Quamobrem dici posset, Arbutum Theoph. ac eam quæ hodie Ilicis familiarissima est, vocaturque *Arbuti* & *Comari* in ditione Patruina, ac Portulacam esse Arbutum Diosc. quæ hodie vocatur in Græcia Andracos.

Huius sententiæ, inquit Clusius, non possum non subscribere, cum hæcenus mihi obseruata Arbutus nihil cum Cotonea malo similitudinis habeat. Sic bonus interdum etiam dormitat Homerus. Nec animaduertunt hi viri, alioqui stirpium peritissimi, Dioscoridem, dum Arbutum Cotoneæ malo comparat, non de foliis, sed de cæcis modo, arborisque forma in elligendum esse. Dicit *αὐτὸν ὅτι*, quod folii angustiam denotare videtur, non paruitatem: quamvis non desint, qui *αὐτὸν ὅτι* legèdū censeat, ut specialius dicitur postea. Præterea non dicit Diosc. folia Arbuti esse similia Cotoneæ, sed arborem, cum teste Theophr.

Adrachne sit folio Arbuti simili, nec vllam similitudinem Cotoneæ folii attribuit. Diosc. autem dicit arborem esse similem Cotoneæ, non mirum: solet enim interdum similitudines minus proprias habere: quamquam si nulla esset alia similitudo, hæc esse posset, quòd utraq; arbores ut plurimum parue maneat, ac à radice multos emittant stiones, ita ut speciem ferè fruticis præbeant utraq;. Certum est Theoph. & Diosc. in descriptione fructus, quem uterque Memacylon vocat, licet & Plin. conuenire: ut sit in eo nulla etiam experitorum iudicio, sententiâ, Arbutum Theophr. & Diosc. vnam planè eandemque esse Arborem. Rectè igitur Matth. Etsi [ait] Arbutus Diosc. reddatur malo Cotoneæ adsimilis, magis tamen putauerim ab eo arboris proceritatem repræsentari Cotoneæ, quàm folia & caudicis corticem. Vel deprauatus fortasse [ut magis suspicatur] est hoc in loco Diosc. codex: quandoquidem Serapio, Diosc. ipsius testimonio, Arbutum non describit in vniuersum Cotoneæ malo similem, sed eam tantum præferre folia malo Cotoneæ minora: Nec scribit tenuia habere folia, *λεπτοφύλλα*, ut vulgata habet Diosc. lectio. Siquidem, ut palam est, Arbuti folia insunt Laurinis & Ilicis crassiora. Probat igitur Matthiolo *λεπτοφύλλων* legi tum apud Diosc. tum apud Orisabium: cui adspulatur etiam Sarracenus, idque ex lectione & authoritate Theophrasti manifestè dictum.

*Diosc. & Theoph.* Amat Arbutus loca montana: Hinc Aristoph. apud Athen.

*Diosc. & Theoph.* In montibus spontè Memacyla nascuntur permulta. Crescit & in syluis Italiæ & Gallicæ Narb. Abundat Pisis, Siennæ, & Genue, circa Neapolim & in montibus Euganiis. Copiosè, inquit Clusius, in insulis Bæticæ & Lusitanicæ inter Myrtum, Cistum, & alios frutices, semperque ferè, aut florens, aut fructu abundans: solet enim decido flore novum germen extremis ramis pro-

ferre, in sponsonem alterius floris. Idem testatur apud se [in Belgio] creuisse ex semine, & nonnullis in siccilibus aliis, & cum aliis perpetua fronde virentibus diligentissimè seruati. Scribit Bellonius in montis Achos, tantopere præcis celebrati, vallibus vicinis, Arbutos [qui ut plurimum aliis locis fruticent] in vastè magnitudinis arbores euadere. Speciatim etiam prouenit in ylua Aigremont dicta, propè Monspelium, in montibus Calcaris fructum ferentem & florentem simul obseruauimus mense Septemb. & Oct. Lugduno, & Monspelio, accersitas arbutulas in hortos Stutgardianum & Montb. E.C. VVitem. plantandas curauimus. Lutetiæ & Bononiæ quidam magnates in hortis aliquando colebant. Creuit Camerario ex semine insatiente, in ipso fructu, non ex paruis granis, quæ fructui, uti Fragis exterius adherent. Floret potissimum mensibus Iulio & Aug.

Obseruata etiam florere Septembri, aut etiam tardius: postquam integrum annum fructum detinuit atque concoxit, tandem maturat.

Arbuti fructus Diosc. *αὐτὸν ὅτι* est, hoc est, in esu acerofus, vel, ut alii vertunt, velut paleas linguæ offert, ventriculo incommodus, & capitis dolorem inducens. Plinius ait Arbutum fructum ferè difficilem concoctioni, & stomacho inutilem. Gal. eadem dicit quæ Diosc. & præterea, arborem cum fructu qualitatis esse acerbæ. Et alibi: vitare oportet non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto, sed omnibus etiam aliis, circa caput obortis affectionibus, Arbuti fructus Memacyla dictos. Et rursum alibi *αὐτὸν ὅτι* glande Querna ad omnia est deterius, exiguum quidem habent alimentum, verùm pauci sunt succi, & stomachum ledunt, ob id suum sunt pabulum, & eorum quidem non domesticorum, sed qui vitam in montibus degunt: his enim nutrimentum ab his & similibus, fructibus plurimum accedit. Iam supra ex Atheniensi sententiâ diximus, eum qui plures septem Arbuti fructibus comederit, capitis dolore vexari. Mihi sæpe speciatim [Bauhino] quoties comedi, dolorem causerunt ventriculi, Clusius annotat se longè plures quàm septem ab aliis deuorari obseruasse, cum per Bæticam & Lusitaniam proficisceretur, & semel multos edisse sine vlla noxa. Verùm quidem est non esse adeò grati saporis velut fraga, sed interim dulci, cum proprio & peculiari quodam gustu acerbo, quem vix exprimas. Quod si vim habeant capitis dolores mouendi, necesse fuerit eam esse ab occulta aliqua proprietate potius quàm manifestâ: nisi fortè quibusdam ventriculum molestando etiam caput in consensum rapiant per accidens. Scribit tamen Amatus, hunc fructum non ita noxium in Hispania prouenire, quum eum multi auidius, quàm pat fit, comedant, & tamen in nullum corporis detrimentum incurrant: idèd & à tenuis fortunæ hominibus admodum expectatus, Vlyssipone, & aliis quibusdam locis venalis à mulierculis in foro proponitur. Idem Amatus ex Arbuti foliis & floribus aquam vitreis organis elici tradit, eamque seruati tanquam sacraussum aduersus pestem & venena antidotum. Et Rosellus præscribit radices Arbuti aduersus pestem. Eam verò aquam statim ipso morbi initio propinandam. Curtio adstringendi vi pollet & arbor & fructus. Folia etiam Corticis expectantur, & hædis quoque teste Virgilio. Fructu etiam delectantur Turdi, & Merula, quo fit, ut hoc illicio, hyome visco, retibus, aut aliis decipulis facillè capiuntur. Ex ligno carbonibus optimi sunt, quip-

Tempus.

Temperamentum &amp; vires.

Stomachus.

Cap. dolor.

Sui cibum.

Dolor &amp; irritatio.

Folia. Flores. Aqua. Pissina. Venena. Radix. Corticis. Aues. Lignum. Carbo. nec.


pe



pe solidissimi, viles ad argentum excoquendum. Arbutio pasci apes suprà ex Virgil. dictum. Apud eundem discimus Crates olim ex Arbuto fieri solitas cum ait : *Arbutæ Crates & Myrica Van. nnae tachi*. Alii legunt Vallus.

## ADRACHNE THEOPHR.

## CAP. XIX.



Comaro facime accedit Adrachne, ideo eundem historiarum immediate subiicienda imitatione Theophrasti. Nobis verò quia foliū tantū est, & ramul<sup>o</sup> visus apud D.C. Bauh. inseruit hoc loco descriptio Doctissimi Medici Hon. Belli, apud Cretenses Celeberrimi, quam Clusius proponit his ferè verbis. Potulaca seu Adra-

chne Theophrasti, fruticis potius, quàm arboris modo prouenit: perpetuà fronde vires, foliaque habet Laurinis adeò similia, ut solo odore dignoscantur: nam Adrachnes folium odore caret: caudicis & ramorum omnium cortex adeò laevis, rubens & splendens est, vt corallii rami esse videantur. Aestate rumpitur cortex, & in tenuissimas bracteas decedit, quo tempore neque rubens, neque splendens cernitur, sed medium quendam inter pallidum & cineraceum colorem acquirit. Florem & fructum bis, vt Arbutus profert, & hunc quidem adeò similem, vt alterum ab altero nullo modo dignoscere queas. Differt tamen arbutus hæc ab Arbuto: quoniam tantum prouenit in montibus, neque folium ferratum habet, neque corticem caudicis scabrum. Ligni materies durissima est, fragilis tamen, quia flecti non potest. Folium verò quod habemus, substantia quidem ipsa Lauri folio simile est, sed figura subrotunda, & altera parte, nempe dorso scabra, & quodammodo ad incanum vergente, oppositè leui & splendente. Nervi medium ceu costam fibræ utrinque laterorum ordine quodam stipat, nec tamen ad folii ambitum vsque excurrunt. Pediculus longiusculum habet, & veluti ex prædicta costâ atque fibrarum concursu compactilem. Sed operapretiu est eius potissimum audire verba, qui primus hanc arborem descripsit. Sic autem ait Theophrast. Virent perpetuè ex syluestribus Adrachne, [vulgata exemplaria *ἀνδράχνη* habent: priorem tamen lectionem etiam probant Hon. Bellus & Clus.] Arbutus &c. Et mox: Adrachne & *βίνα* [Gaza veritè Vnedo, fortè legit *βίνα* &] folia inferiora amittunt, summi autem rami (nam assidue ramos gignunt) semper virent. Adrachne quoque folio Arbuto [ *αρβυτο* ] similis est, magnitudine haud procerâ, cortice albo, & circumrupti folio. (*ἀνδράχνη*) Fructum Arbuto similem

parit: maturatur primò cum vîa dulcescit, postèrior cum floret. Bis enim fructum dare videtur, excepta Adrachne, quæ tamen & ipsa, vehementius pressa, aut germine luxato, moritur. Itaque verius fortè, excepto Subere, dixerim: hanc enim & iuuari potius, cortice detractò, affleuerant, scilicet tam externo, quàm carni proximo, sicut etiam Adrachnem. Germinare incipit cum Vrbanis arboribus, folium habet simile Malo Medicæ, & penè æquale. Plin. verò sic de ea tradit. Adrachnen omnes ferè Græci portulacæ nomine interpretantur, cum illa sit herba, & Adrachne vocetur, vnus literæ diuersitate. Ceterum Adrachne, est Sylvestris arbor, neque in planis nascens, similis Vnedoni, folio tantum minore, & nunquam decedente: cortice non scabro quidem, sed folio, qui circumgelatus videri possit, tam tristis aspectu est. Bifera est æquè ac Apharce. Quando autem ait circumgelatus, apparet cum legisse *ἀνδράχνη*, cum potius legendum sit ex Theophr. *ἀνδράχνη*, circumruptum: quam etiam lectionem Gaza sequitur & Hon. Belli observatio confirmat.

Idem Plin. alibi: Corticē in orbem detractò, non offenditur Adrachne, si non simul incidatur & corpus. Hermol. liberè tradit falsò Adrachnen Portulacæ nomine quosdam interpretari, cum illa sit herba & Adrachne vocetur. Idem tamen Hermol. lectionem Plinii, quæ legit *ἀνδράχνη* hoc est, circumgelatum veriorum putat. Sed non est amplius putandum, quando experientia Theophrasti veriorum dicit, vt patet ex observatione Belli. Corticem quoque candidum Gaza ei reddidit, quia *λευκόν*, vt existimat Hermol. legesset. Hermol. verò *λευκόν*, id est, squarosum, scabrumque legit, Plinium secutus. Nec omittenda hoc loco alterius loci apud Theophrast. corrupti emendatio: quo loco legitur, *τὸ δὲ ἔργον αὐτῆς, ὅτι ἀνδράχνη, ἡνελία ἀνδράχνη* &c: emendandum *τὸν ἄνθρωπον*, vt intelligatur *πρὸς τὸν*: vel in dandi casu sequentes voces legendæ, & ita scribendæ: *ὅτι ἀνδράχνη ἡνελία, καὶ αὐτὴ*. nam ex eo loco & de cortice loquens Plin. dixit: Quibusdam etiam cadit, vt Malo Vnedoni: quare malè transtulit Gaza inquit, Quibusdam etiam cadit, vt Portulacæ, Vnedoni, Arbuto. Vbi verò Theophrast. habet Malum Medicam siue Persicam [quam & Plin. Alsyriam] folio esse *τὸ δὲ ἀνδράχνης*, vel vt in vulgatis legitur, *ἀνδράχνης*: Plin. lib. 12. cap. 13. habet Vnedonis. Et quid quæso Portulacæ (quæ *ἀνδράχνη* est) vel cum Malo Medica, vel cum hac arbore commune? Quod aduertens Gaza Adrachnen apud Theophrast. Portulacem reddidit, eruditius, vt decernit Hermol. quàm felicius: quanquam equidem non videamus quid eruditionis in ea voce esse possit, quæ nuspiam apud nullum mortalium scriptorem extet, nisi quis dicere velit iuris retributionē Pythagoricam Gazæ fuisse cordi. Etenim quia in Adrachne τὸ N demptū anuaduerit, quod habet Adrachne: [Portulacæ ab ipso conuersa, nec malè] æquum duxit, vt seruata legationis etiam literulâ aliquâ careret dictio Latina. Ideò Portulacam dixit Adrachnen: Portulacam, Adrachnen. Adeò Pythagoreorum illud *ἀνταρκαδίας* seruare nouerat Gaza, etiam in vocabulorum dispensatione. Magis nobis placet vox Adrachne, cuius specimen quoddam etiam nunc hodie extat in Creta, vbi Andrecies vocant, si Dalechamp. credendum, & *ἀνδράχνη* tūm Cretensibus tūm Vniuersæ ferè Græciæ, & Bello, vt equidem par est. Sic & apud Theophrast. vbiique de arbore agit, pro *ἀνδράχνη*, legendum *ἀνδράχνη*.

*Portulaca arbor.*  
*Andrachne*  
*Anguill. par.*  
xiii. Quam lectionem etiam sequuntur, Ruellius; Curtius, Cornar. Constant. Scalig. Dalech. Gorræus, Bellonius, Clusius, & Bellus. Quamvis Anguillan epist. scribat Andrachnen siue Portulacam arborem Theophrasti, quæ hodiè in Græcia corrupto vocabulo dicatur *αἰδραχνη*, eandem esse cum Arbuto, Dioscor. duertiam facit ab Arbuto Theoph.

Verùm cum ex præcedentibus satis pateat quid sit Arbutus Diosc. quæ eadem cum Arbuto Theophrasti. non opus hic pluribus Anguillaram conuellere, si rectè legeretur apud Theoph. Andrachne, etiam ille ferti posset, dicens Arborem Portulacam.

Dodon. *Arbutus* quadam arbor sylvestris est: nondum enim ei innotuerat. Ex Plinio tamen facile didicisset non temerè Gazam quoque Adrachnen legisse, ut neque locis, ubi Portulacam reddidit. Ceteris Europæis linguis, hæcenus ferè incognita arbor.

*Locus.*  
*Sapor.*  
Frequens provenit Andrachne in Creta, montibus Leucis, & alibi inter saxa, teste Bellon. In Helicone etiam frequentem esse Pausanias tradit, ubi suauissimum pomum ferunt. Eandem multis locis in sua peregrinatione observauit Bellonius: scribitque iter facientem Halepo Antiochiam, in tumulis nascentem sibi conspectam, cuius ramos suo fructu onustos, quilibet eorum, qui comitabantur, abstulerit, ut in itinere ederet: maturus enim erat, elegantique suo colore singulos ad edendum inuitabat. Racematis autem coherebat, magnitudine & colore fructus Rubi Idæi, mollisque, ut Arbuti fructus. Eadem, ut & Apharca, anno bifera, priorem fructum perficit [inquit Theophrastus] cum variat vna, [ *αἰδραχνη*, Plinius, cum pubescit] alterum cum floret vna.

*Vius.*  
Lignum eius mulieribus ad opus textorium utile, auctore Theophrasti. H. Bello verè teste, rusticis Cretensibus igni struendo seruit, & ad verticilla conficienda mulierum fufis appendenda. Eiconem eiusdem diligentè debemus Clusio transmissam.

CHARAMEI ACOSTÆ FOLIO PIRI.

CAP. XX.



*Genera duo Descriptio*

*Folia Piri.*

*Sapor.*

grata aciditate, quem vel immaturum vel matu-

rum, vel sale conditum vulgariter edunt. *Alte- Descriptio.*  
rum genus eiusdem est magnitudinis, foliaque habet Malo minora, fructum verò priore maiorem: cuius decocto cum fantalis aduersus febres vtuntur Canarici Medici. Crescit in syluis & locis montibus procul à Mari diffusus.

Charameis vulgò, vocantur in Canara, Decan, Arazauali, Arab. Persis & Turcis *Ambela*, auctore Acosta: ex quo & Hist. Lugd. habet nomine *Charamei*.

E primi generis, quòd secundum aquas nascitur, arboribus, seligunt Decanini & Canarini eam, quæ longius à marinis abest. Huius radices corticem [ cui lacteus succus inest ] quatuor digitorum longitudine sumentes cum drachma sinapi probè terunt, & asthmaticis exhibent: valenter enim purgat per aluum, & vomitum. Quod si immodica subsequatur euacuatio, Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel acetum Canarini haustum sumunt [ quod nihil aliud est, quàm aqua decoctionis orizæ vno aut altero die reservata, donec acescat, Canarinis acetum vices præbens, & medicum vsum præstans. ] & si profluuium non cessat, ægris caput frigida ablunt. Magnus est horum Charameis vsus in illis Prouinciis, & ad orexim ciendam edere solent immaturos, maturos, saltos, vel sale & aceto conditos, ut antè dictum, aut aliis edulis quibus aciditatem conciliare volunt, admiscere. Sed quis nostris delicatulis in nimio profluuiò ausit caput frigida lauare. Aut quæ huius medela possit esse ratio?

IAMBOLOINS INDICA. FOLIO ARBVTI.

CAP. XXI.

Iambolins incolis [ inquit Garcias ] nascitur *Descriptio.*  
[ spontè frutex quidem in agris Indici, Myrti effigie, sed foliis Arbuti. Ferti si fructum maioribus Sapor.  
Oliui persimilem. Sed gustu admodum adstringentem. Muria conditur Oliuarum modo. Cæterum neque hic fructus, neque Iaca admodum salubres ab eius regionis incolis æstimantur. Eiusdem arboris historiam & Acosta refert. Huius arboris materies, inquit, cortice integitur ferè eiusdem cum Lentisci cortice, folia Arbuti similia habet, sed Myrti virentis foliorum sapore: fructus Cordubensis Oliui maturis similes, adstringentis gustus, & fauces contrahentis. Nulum vsum in medicina obtinent, sed eduntur cum Oriza costæ: nam appetentiam excitant. Vulgus Iambolins appellat, quo nomine & Hist. Lugd. ex Acosta proponit. Clus. Iambolines vertit.

CARANDAS INDICA, ARBVTI FACIE.

CAP. XXII.

Carandas dicta Indici Arbucula est *Descriptio.*  
Arbutum magnitudine, foliis similibus, copioso flore, odore Peridymeni: fructu exiguis Malis persimili, nigricante per maturitatem, gratissimo vuarum sapore, ex quo à nonnullis vinosus succus exprimitur. Fructus autem virens magnitudine nuxus, est nucis Ponticæ cum suo putamine, interdum maior, succum nonnunquam exillans vitidum & lacteum. Editur à nonnullis fructus maturus cum sale. Solet tamen, cum vindis est, muria aut aceto

*Succus*

*ex nuxu.*

*Vius.*

*acetum*



aceto condiri, & ita adseruari, ad excitandam e-  
languecentem appetentiam. Nalcitur tum in  
continenti, tum in Balagate, vocaturque *CANARICA*.  
Auctor Garcias.

M. Fumee in hist. gen. Ind. occid. meminit ar-  
boris cuiusdam *Azubar* incolis dicta: consideran-  
dum an hæc eadem?

Clus. sanè annotat Carandas ferè similem de-  
scribere Ouedum, Auzuba dictam, in hunc mo-  
dum. In Hispaniola insula, vasta est arbor pul-  
chrâque, materia firma & virili, Auzuba nomine,  
fructu quidem longè suauissimo, vt sunt Pira A-  
piana, (muscatellina vocant) sed qui lacteo suc-  
co eoque viscido & glutinoso abundet, qualis est,  
qui in ficubus inmaris, iccirco molestus his, qui  
eo vescuntur, nisi prius fructum in aquam ini-  
ciant, & lacteum succum digitis exprimant, qui in  
aqua fidit. Arborum proceritas differt. Ergo in  
eadem sit vel diuersa arbor, illarum regionum ve-  
figationibus decernendum relinquitur.

# CORV CANARICA, ARBUTO VEL MALO AUREÆ SIMILIS.

## C A P. XX.

**C**ORU, auctore Garcîa, frutex est in Arbuti alti-  
tudinem assurgens, aut paulò minor: folius  
Mali Persicæ, floribus candidis, Perclymeni odo-  
rem æmulantibus.

Acosta ferè paulò specialius describit, his ferè  
a. verbis: In Prouinciis China, Iapan, Malaca, &  
Bengala, præter Macer arborem, [de qua nos suo  
loc.] nascitur & Coruuslem cum Mære faculte-  
ribus. Est verò hæc arbor paulatim Malo aureæ si-  
milis cui etiam persimilia habet folia, sed quæ me-  
dium neruum crassiorẽ habeant, alius octo aut  
nouem in latera excurrentibus. Flos luteus est,  
odoris ferè expers: radice cortex diluto vitore  
prælitus est, leuis & tenuis, qui si frangatur aut  
vulneretur, nullo lacteo succo manat, lentiore  
& magis viscido, quàm qui ex superiore fluit, gu-  
stu insipido, amaritudinis tamen alicuius partici-  
pe, frigidas & siccas, plus tamen siccitatis, quàm  
frigiditatis possidens, in quo ordine Medici illius  
prouinciæ etiam constituunt.

Garcias: Coru lingua Canarica dictus. Lusita-  
ni Indiani incolentes Herbam Maluaticam no-  
minant, quoniam Maluarense eius vsum primi  
docuerunt. Acosta: In Malabar Corodapala &  
Curo: In Canaria Coru: Brachmanis Cura. Hist.  
Lugd. Coru. Cast. Dur. Coru Canariæ: Portugal.  
Herba Maluatica.

Hæc plantâ, vt scribit Garcias, cuiuscunque  
generis dysenterias præsentissimè curant Malu-  
arense, euacuata primum magna ex parte peccan-  
te materia, alioqui faciliè in eundem morbum  
rursus incidunt. Vtus est corticis radicem primum  
exsiccat, quoniam recens lacteum hq̃torem ex-  
sillat, quem inuito calidum putauit: sed degusta-  
tum: insipidum & frigidum inuenit. Quamobrè  
ob eas effectus frigidum & siccum cõstituit, plus  
tamen siccitatis, quàm frigiditatis obinentem.  
Puluerem huius radicis conuulsum in ollulam destil-  
latorium imponunt, ac sero lactis macerant: de-  
inde additis Ammeos, Apii, Coriandri sicci, &  
cumini nigri feminibus tritis & torrefactis, vnciâ  
que vna butyri non saliti, ignis calore eliciunt  
aquam stillantiam, cuius quatuor vnciæ, cum a  
quâ ros. aut aq. è pedic. ros. aut plantag. duabus  
vnciis ægro propinant. Quod si opus est, adiu-

ciunt puluerem pastillorum ex herba Maluatica  
confectorum. Formantur autem ex eiusdem rebus,  
è quibus sit aqua, dempto butyro. Iniciuntur  
etiam clysteres ex hac aqua confecti, magno cum  
succesfu: sed frigidi, quoniam regio calida est.  
Quod si necesse sit, eam aquam bis singulis die-  
bus propinant, manè videlicet hora sexta, & à  
meridie hora secunda. Tamen si verò Garziæ  
semper benè successerit huius aquæ vsus, fatetur  
tamen Maluaticam herbam ab ipsis Maluarensi-  
bus præparatam, magis presentaneam opem ad-  
ferre. Ea verò paratur ex iisdem, è quibus dicta  
aqua, rebus tenuissimè tritis, & sero, aut iusculo  
orizz probè coctæ maceratis. Sunt qui succum  
ex planta virente exprimant, cuius septem vncias  
manè exhibent, & toudem sub vespere, si ne-  
cessitas urgeat. Sed quoniam amarus est succus  
& ingratus, ab eius potu serum propinare ad os  
eludendum solent. Quod si Maluarense fortiori  
adhuc remedio opus esse vident, Opium admi-  
cere solent tamen si id semper strenuè negent. Sa-  
lutare est item hoc medicamentum stomachi de-  
bilitati: tùm etiam vomitus compefcit, cum aqua  
Mentha & Maltiches puluere sumptum.

Porrò de eiusdem viribus, & præparationis  
modo, paulò specialius Acosta quoque sic scri-  
bit. Huius virentis corticis succo, licet admodum  
ingrato, plurimum vtuntur incolæ cum Gentiles,  
tum Christiani, ob admirandos, quos præbet ef-  
fectus, in omni genere profluuii, cum in Liencie-  
ria, tùm in Diarrhœa & Dysenteria à quacunque  
causâ prognata. Lusitani tamen Medici metho-  
dum in eo exhibendo seruant. Vtuntur etiam eo  
succo veluti priore: sed prioris cortex longè præ-  
stat. Distillant verò atque vtuntur in hunc mo-  
dum. Corticis in puluerem triti, unc. octo: am-  
meos, apii, coriandri sicci, cumini nigri nonnihil  
tostorum & in puluerem redactorum, sing. drach.  
tres: Corticum Myrobal. chebul. drach. septem:  
butyri vaccini non saliti vnc. duas: lactis acidi,  
q. suff. ad pulueres istos excipiendum, sumunt, in  
destillatorium ollam vitream [si delicatioribus  
paratur] aut in vulgarem [vt maxima ex parte  
fit] imponunt, & stillatitium liquorem eliciunt,  
cuius quatuor vel quinque vncias cum aque  
Auellanæ Indicæ, vulgò Areca nominatæ, aut aque  
è pedic. ros. vnc. duabus propinant alui profluui-  
laborantibus, (interdum, si necessitas urgeat,  
trochiscos de charabe, vel de Lemnia terra admi-  
cent) semel in die, vel bis, si opus sit: illicò au-  
tem post eius sumptionem, Orizam cum oxyga-  
la exhibere solent. Clysteres etiam ex eo confe-  
cti, præsertim sub noctem iniiciuntur. Licet ve-  
rò hic liquor admodum commendabilis sit, longè  
tamen præstantior est Maceris cortex viridis, licet  
multò ingratior, & sumptu difficilior. Vtilis etiâ  
hæc est radix Coru seu cum Orizâ decocto sumpta,  
siue inuncta aduersus hæmorrhoidas & ani-  
scissuras. Foliorum eius cum Tamarindorum fo-  
lis decoctorum vapore crura tumescunt vtiliter  
foventur: ipso autem decocto madentes panni  
commodè in tympanite applicantur.

# BRINDONES INDICI, FRVCTVS RVBENTES, ACIDI.

## C A P. XXIV.

**I**N Goa Indiz, vt refert Garcias, est fructus qui-  
dam, Brindones vocatus. Is foris aliquantulum  
rubicat, intus verò sanguinis modo rubet: gustu





le his, vt inuenirem, totis eius Commentariis: cum ex amicis quispiam alius ita se habere affirmaret, cuiusdam scriptoris non incelebris adnotationibus & scholiis adductus: quare iam tēpus est, testem alium tibi, o Myrtilē, perquirere. Tum Amilianus, Iubam, dixit, Mauritaniz regē, virum doctissimum, suis de Libya cōm. facta citi mentionē, scripsisse apud Lybias id vocatū *μυρτιλον* *ορσιεντον*, [Medica & Persica Mala hęc Theophrast. vocat; Medica Virg. Dal.] inde Herculem in Graciam transulisse, aureāque vocata eius arboris Mala, ob coloris speciem. Alcēpiades lib. 60. Rerum Aegyptiarum memoriā prodidit in Iouis & Iunonis nuptiis arborem illam à terra editā fuisse. Hos sic loquentes Democritus cōmodum inuēnit: si quid horum, inquit, Iuba narrat, valeto, cum libris suis Libycis, præterea que Hannonis erroribus, (Carthaginensium Dacis, iussu ambitum Africæ explorare Punicis rebus florentibus suā nauigationis Commentaria ille scripta reliquit: Dalechampius) ego verò pernego Citriū extare apud Veteres: at ipsa res descripta prorsus ab Eresio Theophrasto in plantarum historiis, credere me cōgit, Citrium esse quod oratione sua ille significat: Verba Theophrasti, antea citata sunt. Variat verò Athen. in eo à vulgata lēctione, quod folium Mali Medicæ non tantūm folio Adrache, sed etiam Lauri & Nucis Similidicit, quod apud Theophr. non legitur. Præterea Athen. rationem reddit, cur veneno haustū conferat, quia potus ē vino succus, alium deturbat, & venenum exigit, quod & ipsum non habetur in Theophrasto. His subdit Athen. Theophrasti verbis impulsus, & ea perpendens, quæ scripsit de odore, & foliis, designatum ab eo fuisse reor malum, quod Citrium vocamus. Vetrum autem nomen in a. l. a. u. a. tionem trahat, quod ille prodidit, potius non mandū, quando quidem adusque in ueniam auro- rum nostrorum nullus comedit, sed cum vestibus in arcis reponchatur, vt res quedam ingentis pretii, & thesauro digna. Quod autem ex Asia superiore (Media, Persia,) plaga in Græciam reuēta stirps ea descendit, scriptum à Comicis Poëtis inuenitur, qui de ipsius Pomis, cum aliquid dicunt, de Citrii Malis videntur id tradere. Antiphanes in Bæotio:

A. De opsinio quidem stultum est quidquam apud vos dicere, Tanquam infirmitates: sed hæc accipe, o virgo, Mala. B. Pulchra sanè A. Pulchra quidem, diu boni. Nuper semen hoc peruenit Athenas, à magnæ Persarum rege. B. Ab Hesperidibus credidi, sic mihi Lucifera propitia sit: Aurea hæc Mala tria esse inquit. Tantummodò. A. Paucum est quid pulchrum, & vbiuis in honore.

Eriphus in Melibœa præpositis iambicis illis versibus, Antiphanis stylo ac elegantie maximè proprius, subdit: Et vbiuis.

In honore: prohiù obolum, quod multum non est.

Impensum numero: Rationes pōst ego suppūabo.

His si quis reluctetur, & quod Citrium vocamus, locis à me citatis indicatum minimè fuisse contēdat, clariora testimonia proferto, quibus sententiam suam tueatur. Phaniās tamen Eresius inicit nobis suspicionem, Citrium à Cedro [από τῆς κείνης τοῦ κείνου] tanquam Cedrium, nominatum fuisse. Cedrus enim, vt ille scribit, libro 5. de plantis, circa folia spinas exerit: id autem in Citria malo videri, nemo est qui ignoret. Athenæum tamen putant quidam apud Phaniā hęc rectè non le-

gisse, idēque futilem esse cōiecturam illius: melioremque esse hanc lēctionem, ἀποτὸ τοῦ κείνου, nō autem ἀπὸ τοῦ κείνου τοῦ κείνου: vt sensus sit, foliorum loco spinas habere Cedrum, quod est de oxycedro verissimum. Sed si nostra Citrus vel Malus Citria est genuina antiquorum, rectè ab Athenæo dictum ἀπὸ τῆς κείνης τοῦ κείνου, hoc enim (vt rectè Dalechamp. & alicubi Scal. annotant) propriè significat, folis minimè aculeatis, spinas in ramis aculeculis exerere, quod de Cappari & Tribolo dixit Theophrastus, & nos æquè in Citriis, Medicis ac Aurantiis malis nostris videmus. Quid si quis dicat Citrium rectius deductam à Cedro, propter odorem, in dēque dictam Cedrium? Sed nihil altius.

Videamus potius quid Plinius de his tradat. Peregrinæ [inquit] & Cerasi Persicæque, & omnes quarum Græca nomina aut aliena in præsentia externas persequemur, à salutari maximè orsi. Malus Assyria, quam alii vocant Medicam, venenis medetur. Folium eius est Vnedenis, intercurrentibus spinis. Pomum ipsum aliās non manditur: odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestis vnā conditus, arētque animalū noxas. Arbor ipsa omnibus horis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturefcentibus, aliis verò subnascentibus. Tentauere gentes transferre ad sese propter remediū præstantiam fistilibus in vasis, dato per cauernas radicibus spiramento: qualiter omnia transfusa longius, scilicet æthiisimè transferique meminisse cōfuerit, vt semel quæque dicantur. Sed non nisi apud Medos, & in Perside, nasci noluit. Hęc est autem, cuius gena (corticem Dalechamp. & rectius.) Parthorum proceres incoquere diximus esulentis, commendandi halitus gratiā. Nec alia arbor laudatur in Medis: & Citrus arbor, à Græcis Medica dicitur. Mirum tamen cum Plinius iam adducto loco salutarem maximè dicat Medicam arborem, (Citriam siue Assyriam vtiq̃ue intelligens, vt & iudicat Dal. & verborum series ipsa satis insinuat) dicere Malum ferre execratum aliquibus odore & amaritudine, aliis etiam expetitum, domos etiam decorans, nisi eadem id licentiā fecerit quā Virg. de eadem dixit: Media fert tristes succos & c. vt paulo antè dictum. De eadem quoque scribit. Macrobius ex Oppio, in libro de syluestribus arboribus, his verbis: Citrea item Malus, & Persica altera generantur in Italia, & in Media. Et paulo post, de Citro loquens, ait: Est autem odoratissimum, ex quo interiectum vesti, tinea necat. Fertur autem venenis contrarium, quod tritum cum vino purgatione virum suarum bibentes seruat.

Vides hīc [vt ille ait] & Citreum vocari, & omnia signa pomi, quæ de eo Virgilius dixit, licet nomen citri ille non dixerit. Seruus tamen, Apuleium in libris, quos de arboribus scripsit, citans, aliud arboris genus citrum esse ait. Nec Solino indicat citrium.

Et Galenus: *μυρτιά, ὡς ὁ ὄν*, inquit, Malus Medica, cuius fructus non amplius Malum Medicū, sed ab omnibus citrium nuncupari adsolet. Narrat Pamphilus in linguis, citrum apud Romanos appellari.

Haecenus Veterum placita de Medica, Assyria & Citra Malo, earūque fructu potissimum, uerūm quamnam intelligant ex citriis aut Medicis hodie nobis vocatis, nondum quis temerè concludat, quāuis ad nostra citria magna satis benè accedant, quæ tantūm abest, vt hodie non comedantur, vt de suis tradunt Veteres, vt ea hodie præ cæteris omnibus in maximis deliciis habeantur: vt illi, si

Malus Assyria & Medica.

Citrus arbor.

Citrea Malus, Persica Malus.

Citreum.

Malus Medica, Malum Medicum, Citrium.

Autorum iudiciū de Veterum placitis.

ad hoc respiciamus, de Aurantiis Pomis videantur intelligenda, nisi quis malit probare rationem Athenæi, non idē abstinuisse Veteres à Citriorum esu, quod non fuerint edulia, sed quia in alium vsum, tanquam rem magni pretii, potius adseruanda duxerint. Hodie faucibus & stomacho omnia prostituta, etiāque margaritæ & aurum, si modò sufficerent. Minet tamen ea difficultas ex Diosc. quā semen Piri Citromelis inesse scribit: in qua comparatione vel falli, vel sanè licentiosius pronunciare potuit, nisi mendum sit in Codice.

Diosc.

An verò Aurea vel Hesperica mala cognita fuerint Columellæ & quo nomine haud obuium iudicatu, meminit ille quidem Aureorum malorum ad Hesperidas in 1. cap. lib. 2. de re rust. Sed longè alio significatu per aurea enim mala secundum antiquam consuetudinem, Capras & Oves quas Hercules in Græciam exportauit intelligi scribit. Ea enim inquit, sua voce Græci appellatur *μῆλα*. Habes ergo Aurea mala quaternis incedentia pedibus.

Sed quid Recentiores quoque scribant nunc videamus.

Hespericū  
malumAureum  
malum  
Hespericū  
Nuptiale  
pomum.  
Non mani-  
dantur.

Ac Helmolauus quidem nouas nobis iniicit difficultates. Namis, postquam ex Iuba dixisset, primum Hesperidum & Hespericum malum ab Hercule translatum in Græciam, & Aureum malum vocatum, addit: sibi videri de iis Virgilium intellexisse, cum dixit. Aurea mala decem: [ sed hæc opinio refutatur cap. de malis Cydoniis. ] Nuptiale pomum intelligi hoc volunt, qui editum à tellure fabulantur, nuntiato Iouis & Iunonis connubio. Non mandebatur [ inquit idem ] pomum Theophr. ætate, sed ne Plinii quoque, [ vt arbitror. ] Plutarchi certè aorum memoria gultabat nemo, [ vt iam ex Athen. dictum. ] Nunc à Palladii ferè temporibus promiscuum expetimus cœnis.

Apulei opi-  
nis.Citrium.  
Pamph. not.

Locus.

Citromela.  
Atropa ci-  
trica.Grammat.  
error.Citrus a-  
lia Plin.Malus  
Medica.  
Atropi.Malus me-  
dica.Cedromela.  
Citro-  
mela. Ci-  
trina mala.  
Citria.

Arantia.

Quamquam Apuleus negauit eandem esse malum Assyriam siue Medicam, quod Citrus exiguum esset genus arboris, Medica verò, vt Maro scribit, ingens.

Pamphilus Citrum Citium à Romanis etiam dici parum peritus homo scripsit.

Nunc translatitia & triuialis ferè arbor, vt pluribus generibus Citrea Italiæ ferè totā germi-  
nant feliciter, quamcunque imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt Citromela propriè dicuntur ab aliquibus.

Mensæ Citreæ Veteribus & Plinio decantatz, præsertim Ciceroniana, non fuerant ex hac Citrio: decipiuntur Grammatici, quicunque id arbitrantur.

Plinius: Alia, inquit, [ Citri ] est arbor eodem nomine malum ferens, exeatatum aliquibus. Quod & sensisse Macrobius videtur: hodièque Mauritani malum Medicam, & pomum eius Atropi vocant, à Troge vocabulo parum deflexo: alioquin *ἡρώδης*, non, quia mandi posset, sed *ἡρώδης*, quia mandi non possit, appellatum censuerim. Malum quoque Medicam in Mauritania fuisse certum est, cum plena sint Poëtarum omnia volumina.

Marcellus apud Antiquos non Cedromela sed Citromela, quasi Citrea mala legendum esse vult: nihil enim Citro esse cum Cedro: & à Romanis Citria hæc vocari, iam pridem receptum esse.

Non sine ratione dubitat Manardus, an Theophrast. per mali Persicæ & Medicæ arborem Citra ferentem intellexerit, an vocata Arantia: nec scilicet hoc posse ait, quia procrentatus arboris non

meminit, quæ his magna, illis ita parua, vt arbuti potius videri possint, quàm iustæ arbores. Sed nec figuram pomō dedit, quæ in Arantio orbicularis in Citro oblonga est.

Virg. in Georg. & versibus quidem suprā propositis, sub Medicæ arboris nomine ferentem Arantia descripsisse videtur. At Diosc. eodem nomine vsus, non eadem cum Virgilio, hoc est, Arantium, sed Citrium intellexit. Gal. proculdubio intelligit quod Diosc. catenem quippe edi dicit, sicuti corticem, quod de Arantio intelligi nequam potest, carnem vel non habente, vel si habet, non talem, quæ inandi possit.

Auicenna de Citro eadem scribens, quæ Dioscor. & Gal. ostendit, non de alia re scripsisse, quàm de qua illi.

Ruellius Virgiliana & Pliniana de malo Medicæ scripta, omnia cum Theophrasto conuenire tradit.

Palladii diligentia in Italia primum coaluit: hunc solers imitatus posteritas eam Galliæ Hispaniæque communicauit.

Differen-  
tiæ.

Cultus [ vt idem ait ] mangonium in plures digesti formas, ita vt remissiori sapore vehementiorique item diluitori saturatioreque colore differrent. 1. Quæ aut colore relucent Poma Aurægia vulgus appellata. Quæ ex viridi in luteum languescunt Citreola & tandem Citrula nominantur. Quæ ouata specie turbinatur & luteo colore nitent Citrangula, priuatim Citrea vocant. 4. Si herbaceo colore virent Limones dicunt. 5. Si prægrandia modo Melonum orbiculata facie turgent Poncezia vulgò, quæ citrea, vel potius Citrea poma dicunt. Citrium porò duobus generum idem scribit: vnum Cedri, ex qua mensæ dedolantur: alterum Citri eius ex qua malum Medicum prodit.

Aurægia.

Citræola.

Citrangula.  
Limonis.Poncezia.  
Citrida.

At paulò antè ostensum, Cedro vel Cedrio nihil cum Citrio esse com mune, & ex illa, non ex hac tabulas parari, vt specialius docebitur suo loco. Quæ verò Veteres de malo Medico seu Persico scribant, odorata esse, vestes conferuare, venenis resistere, perpetuā vicissitudine florere, atque succrescere, de nobilitate Citri dici, eundem tūc esse ait Ruellius quàm vt probati desideret. Porro sæpius iam citata illa nomina, Medicum malum, Assyrium, Persicum, Citrium, Cedromalum, & Citrinum grande & oblongum &c. promiscuè ab authoribus Recentioribus vsurpantur. Sic Cordus, præmissis his nominibus: sunt huius generis, [ inquit ] Limones, Poma Adami & Aurægia. Habetur ænigmaticum de his malis catmen, quod est:

Medica mala quidem nec mala, nec medica.

Botanicorum diligentissimus Clusius ex Hispanorum sententia sic tradit. Medicorum malorum sunt varia genera: Alia enim Hispanis Citras dicuntur, alia Limones, alia Limas, alia Naraniæ, alia Teranias.

Malorum  
Medico-  
rum diffi-  
centia  
Clusio.

Quæ Citria siue Cidras fert, Cidreira dicta, breui truncato est, longis ramis firmis, crassis & acutis spinis, foliis magnis, latis, & per ambitum serratis aliquantulum. Fructum ferè magnū & oblongum, Melopeponis amplitudinem interdum æquantem, cortice per maturitatem flauescente, densa carne, candida, firma & eduli, nullo ferè interiore succo: odor mali fragrantissimus: flores sunt candidi, sæpiusculè forinsecus purpurascētes, odorati. Semper hæc aut floret vel fructu onusta est. Sunt qui fructum nascentem figulinis formis varias figuras exprimentibus includunt, atque ita elinquunt donec fructus maturitatem

Citria de-  
scripta.

tatem



tatem consequatur : tum demum formas auferūt, vt malum natium colorem adsciscat, iucundo sane spectaculo.

Citrix ferē similis est, quam ipsi *Limonerā* appellant, cuius fructus minoribus citriis pares, oblongi, satis densa carne & multo succo acido præditi, nullis aut perpaucis intus acinis : folia citrii breuiora, flos purpurascens foris, spinæ minores & breuiores, quā in *Limera*. Huius generis reperiuntur etiam dulces, minores tamen, & oblongis *Limis* similes. Audio & eius genus prægnans reperiri, alium fructum minorem in se continens, incolæ sua lingua *Limones* preñados vocant, verū id genus non est mihi conspectum. Doctiss. vir S. de Tovar ex Fortunatis Insulis delatum scribebat in Indice sui horti, quem ad me mittebat anno M.D.CXCV. & aliud genus se alere totum ferē carneum, quod varias figuras representat, eam ob causam ab Hispanis *Limones de figuras* appellari. Quatum autem genus omnium maximum conspicebam Haga Comitum apud Batavos anno M.D.XCIII. Ill. Harolinæ Principi de Chimay, à Doctiss. viro Bernardo Paludano Medico missum : id enim citrii mali grandioris magnitudinem æquabat, corticem verò minus densum, & auri instar fulgentem habebat : grumos etiam interiores minus acidos, quā reliqua genera.

Quam ipsi *Limeram* nuncupant, magno caudice assurgit, grumōque habet tenuiores, longos, fitinis, longis, virentibus spinis armatos, folia per ambitum nonnihil serrata, florem candidum, fructum paulo minorem *Limonera*, oblongiusculum, vbi maturat flauescens, cortice tenui, vt nil nisi succum ferē contineat, eūque acidissimum. Semper flore & fructu onusta conspicitur. Aliud porro eius est genus per omnia ferē simile, nisi spinis careret, vel eas perquam exiguas haberet & illius fructus rotundus esset, summa parte quasi corona aut umbilico insignitus. Vtutiusque acini sui grana oblonga sunt.

Aurea Malus reliquis huius generis magnitudine superat, Malo vulgari non inferior feruli solo, tametsi humilis interdum reperitur : firmos habet ramos, spinas paucas & breues, folia viridia, minimè per ambitum serrata, flores candidos odoratissimos : fructum, *Naranias* Hispani vocant, maturitate aurei coloris, succo præditum aut dulci, aut vinoso, aut acido, in quo grana frequentia, rotundiora, quā in Limonibus. Habet etiam hæc arbor sui generis pumilionem, qui insitione vel inoculatione propagatur. Liberalior est hæc ferendis floribus & malis etiam in frigidis regionibus, modò ritè curetur.

Ex eo genere, quod dulci est succo, Hispani apud Charustianos (Hispani *las cuevas* nominant) trās Bætium flumen, binas arbores conspexi, quæ fructum ferebant carne multo firmiter præditum, Armeniacorum ferē modò, licet similiter Camerulis distinctum & succulentum, vt reliquorum, cuius cortex vnā cum carne & succosa substantia mandebatur : corticis color insigniter aureus est. Hispani *Naranias axel* vocant. Aliud insuper genus, cuius succus acidus, vnicum granum continebat.

Quæ vulgò Pomā Adami dicuntur, ea Galli *Poncires*, Bæti *Toronias*, Lusitani *Zambas* appellant. Arbor ipsa interdum humilior est, citrix perquam similis, magna tamen ex parte celsiorem Malum auream æquat : breues habet spinas, folia *Limonea* : florem candidum, odoratum : fructū rotundum, triplo maiorem Aurea malo, maturitate flauescens, cortice inequali, denso, crassa

& fungosa carne, quæ à nonnullis cum cortice simul editur, succo breuibz folliculis vt & mali Aureæ comprehenso, (in reliquis enim generibus folliculi siue vesiculæ succum continentes oblongiusculæ sunt) granis subrotundis. Nonnulli *Affyrum malum* vocant.

Cæterum præter *Aurantiam malum* eduli cortice, decem mali Medici genera apud Hispanenses inueniri ex altero Indice, quem anno M.D.XCVI. eruditissimus vir de Simon de Tovar mittebat, intelligebam : accipiebam enim ab illo semina illius quod Hispani *Zamboas* appellant, deinde *Limones de carne*, *Limones de figura*, *Limones preñados*, *Limones poncires*, *Limonis centies*, *Limones dulces*, *Limas dulces*, *Limas agrias*, *Limones de Yulre*, vel *Limas del Emperador*, quoniam, inquit, ab Imperatore Carolo v. ex Vngaria in Hispaniam primò delata hæc planta fertur, cuius quidem opinionis fidem augere videtur, quod vltra cætera mali Medici genera, hæc frigoris patientissima existat. Est autem eius fructus edulis multo suauiore gustu præditus quā *Anarantia caxel*, succus verò eius maximè ad acidum dulcem accedens, ideoque omnium mali Medici generum acidorum suauissimum. Omnium porro folia perpetuò viridia sunt, multisque veluti foraminibus, si soli obiciantur pertusa, instar foliorum Hyperici, iuncturā quadam pediculo in hærentia : folia mali aureæ folia secundum iuncturam tanquam appendices habent.

Corn. Citriorum generis esse & Poma Arantia statuit. Eiusdem generis & Limones siue *Limonia mala*, omnibus ferē persuasum esse, ipsaque adeo citrii hispanos *Limones* appellare. Suspicio tamen est, cum citrum & Limonem vulgò dicta Poma confundere, tantum abest ne differentias tradat, quod se fecisse putat.

Monardes putat Aurantia & Citria, primum acri vel acida, atque adeo inculta, peramaros & acetosos fructus proferente, prognata : sicque & alia citriorum genera insitione multiplicata fuisse, vnde reperias tot genera Limonum & alia, quæ citro nec Limonibus conueniant, *Zambas*, *Toronias*, *Limas*, *Limonas*, (Nebrissenfis vocat cidras, *Naranias*, *Toronias*, *Limas*, *Limonas*,) quæ omnia, inquit, nec Prisci cognouerunt.

Et Lacuna : Mancana Medica hisp. quæ sub se comprehendunt *Cidras*, *Limonas*, *Limas*, *Toronias* & *Naranias*. Dioscor. cognouit tantum Citrum : *Limon*, *Tima*, & *Toronia* : carent propriis nominibus Græcis & Latinis. Valentini vocant *Naranias*, id est *Aurantia*, *Toronia*, licet *Toronia* sit species diuersa, & *Cidra* satis similis.

Raimundus à Vinario, Malorum Medicorum nomine Arantia, Limones & citria comprehendit. Sic Turn. Malus Medica, quæ & Affyria, & Citrus. Angl. Citron tree : sub qua comprehenduntur & Arantia, Angl. Orange tree / & Limonia Angl. Lemon tree.

Doct. ita distinguit. 1. Malum Medicum ac citriū. 2. Medici alterum genus Limonium. 3. Anarantium aut Anarantium. 4. Affyrium vulgò Ital. *Lo-Limonium*. Arantium, Affyrium.

Lob. & Penz. *Cedrus* Theophrasti. Dioscor. Medica Mala, siue *Cidromela* : Arantia, Citria, Lima & Pomum Affyrium. Antiqui (inquit) à solo Medo Medicum, ab odoris fragrantia Cedrum & Citriū dixerunt, quasi Cūhyon odoramentum Diuili-Sylvestris bandum : tametsi hæc in Africā sit sylvestris & Olbiæ Galloprovinciæ adeo familiaris in afflatu oræ maritimæ : vt semperulentium lacorum amenitate & Pomorum fætura perenni nequius quā inquilina videatur.

Affyrium malum.

Medici mali decem genera.

Arantia.

Limonas.

Citria. Corn. nup.

Aurantia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

Citrorum differentia.

*Citrus.*  
*Limon.*  
*Aranci.*

Casalp. sic distinguit. Citrus fructu grandissimo, quem Citrium vocant, aliquando magnitudine Meloepontis. Limon Citro similis. Aurantia arbor Limone maior. Melangula, quam alii Citraugulam vocant, fructu & fructu similior Citro.

Ponzirus ambigit inter Limonem & Aurantiam.

*Limonocitrum.*

Aug. Gallo, Congenerum fructuum quinque species. Cedri, Limoni, Aranci, Pomi d'Adamo, Limone fructus minor vulgaris, medius inter Limonem & Pomum Adami. Meminit & Limonocitri, seu Limoni cedromali, prognati ex infusione citriæ in Limonia: peritiores tamen inserunt Limonias citris, vt specialius docebitur postea. Etiamnum alterius generis *Staffeggiati* dicti, figura mirabilis, arbore minùs frugifera, de quo etiam mox.

*Citrus mirabilis.*

Hæc sunt Veterum & Recentiorum de Malis Medicis, citris, atque Assyriis placita, & differentia, confusè potius, quàm exactè distincta [excepto Clus. qui omnium distinctissimè de iis prodidisse videtur] cum omnes à plerisque sub Medicorum nomine & titulo comprehendantur, neque tamen hæcenus pro certo constet, quòdnam eorum sit Medicum Theoph. aut citrium Diosc. & Gal.

Proponamus nobis obseruatas differentias ordine quodam, vulgi nominibus, vt hodie in vsu sunt, insignitas: de quarum cum Prætorum collatione quibbet statuat prout libuerit.

#### CITRIA MALVS CVM FRVCTV MAGNO ET MEDIOCR.

*Def. citio*



*Co. rex.*  
*Succo.*

*Arbor.*  
*Pulch.*  
*Elor.*

*Descriptio*  
*Aleandrus.*

hodie apud ple-  
rosque Citrio  
malo dignatio,  
quòd alias tur-  
binata Limonis  
forma, sed mole  
multò maius, a-  
lias figuram lo-  
nis, ac vel maiori  
etiam par, dilu-  
tè aureo cortice  
tuberculis aspe-  
rato tectū. Suc-  
cus hanc quàm  
Limoni paucior,  
nobilioꝝ, acidus:  
pulvinatus cor-  
tex, carne multà  
albida, nullo pe-  
regino sapore

ingrata. Arbor ipsa haud magna, folio Laurino,  
odorato, foraminulento. Ramis rigidis, uul-  
lis, flexilibus tamen, & non valde infestis armati.  
Flos albidus, odoratus, perpetuus, duobus mo-  
dis progeneratus, cum colo, qui fecundus: qui  
colo caret, infecundus. Rarè hæc arbor fructu  
caret etiam apud Magnates Germaniæ, vbi colit-  
or. Talem & Cl. Felix Plat. aliquando coluit, qui  
& fructus maturos, & alios subnascetes, & flores  
nouam prolem sponſantes ostentabat.

Citrus, inquit Monard. l. in cist. ad Quad. ]  
quæ mala Citria ferebat. Veteribus humilis est,  
omnibus nota, omni tempore pomifera, semper  
pregnans fecundaque, vt trium annorum fru-

ctum habeat: Flores emittit iucundissimos, po-  
mum oblongum, interdum rotundum, aliquan-  
tulū rugolū, colore aureum, odore gratum.  
Arbor non multæ proceritatis, folio Lauri con-  
similis, aculeos habet acutos, vehementes & ri-  
gidos.

Cutrosius descripsit Cordus his verbis. Citrus  
arbor est fruticosa, veluti Cotoneus, ramos habet  
viridi glabròque velutis cortice, ferendæ for-  
tuum moli valde impares & ad terram pronos,  
ideòque subiectis per transuersum hastilibus, fur-  
cisque fulciendos. Folia Laureis similia, densio-  
ra tamen, multoque maiora, & ad luglandis ma-  
gnitudinem accedentia, oblonga, vtrinq̃ue acu-  
minata, egregè viriditatis splendorisq̃ue, præ-  
sertim supernè, infernè enim pallidiora existunt.

Tota hyme arborem suam exornantia, odoris  
acerri, latè spirantis, qualis in Melissophyllo  
sentitur, cum grauitate quadam cimicem imitan-  
te. Spinis armator sub omnium foliorum anne-  
xibus, longitudine vncialibus, rectis, acutis, ac  
viridibus. Flores, vrientes gemmarum calculi  
emittunt oblongos, candicantes, & quorum du-  
plex est genus, videlicet sterile & fructiferum.

Sterile nullum post se tuberculum producit. Fru-  
ctiferum verò, præterquam quòd à tergo fructus  
rudimento sibi annexo comitetur, etiam in me-  
dio aliud insigne exerit pensum colo innolatum  
emulans, quod Theophr. quoque nouit. Fructus  
flore sequuntur singuli, longitudine non rarè  
dodrantali, figura ouata, superlicè rugosa tube-  
rosaq̃ue, colore primū viridi, in maturitate ve-  
lò aureo seu citrino: nec solum ouata nascantur  
figura, tum etiam globosum consequuntur habi-  
tum, vtrumque eiusdem est odoris ac foliorum si-  
milis. Cortice ambiuntur gustu amaro, seruido,

simulq̃ue tenui, cui subest caro certilaginea du-  
raque consistentiæ, colore candido aspectu, at-  
que acetoso sapore, condita capitata Brassica  
truncos referens: In medio malo cauitas quedam  
est, fucco vehementer acetoso, luis membranæ  
contento plena, cui immixta sunt oblonga & se-  
muncialia semina, vtrinq̃ue ferè acuminata, cute  
foris flaua striatq̃ue, intus candido duplique  
nucleo constantia: quibus amarus, tenuis & me-  
diocriter feruens est sapor præsertim utris: nu-  
cleus enim dulcedinem quandam admixtam ha-  
bet. Radicibus nititur copiosis & tenuibus.

Latina & Græca Synonyma Citri mali supra  
plerique dicta sunt: Annotat tamen Hlad. lun.  
πικριον κοκκινωδον φραγδι quibusdam dici. Particu-  
lariter verò quæ huius species sint nomina viden-  
dum.

Serap. Atrog. id est, Citrium. Gal. Fructus huius  
arboris nominatur Græcè Pomum aquæ. Auic. Ci-  
trum, id est, malum Medicum. Bellunenſis in marg.  
Alarrungi, seu Arrugi, vel Arrangi. Scalig. malum  
Medicum Theophr. & Citrium præter semen to-  
tum efculentum. Cur autem Scal. citria potius ad  
mala Medica referat, quàm Aurantiæ, vide cap.  
de Aurantiis ex Scaligeri verbis, cuius tamen ra-  
tio non vique quaque nobis satisfaci. Citria mi-  
nora videntur respondere descriptioni Dioscor.  
quamuis similitudo seminis cum semine Piri non-  
nihil claudicare videatur, vt antè dictum. Manard.  
citrium Diosc. Gal. Serap. & Auic. & Eluchas. Citria  
mala.

Cord. medicum malum, Assyrium, Persicum, Ci-  
trum, Cedromalum, & Citrinum à colore corticis:  
in cedro non nascitur arbor. Citriu eadem.

Trag. eadem nomina dat, & præterea addit,  
esse Plin. Theoph. & Virg. & conicit ex Assyria ad  
Iudæos

*Descriptio*  
*Cord.*

*Odor.*

*Spina.*

*Sterile ex*  
*Fructiferum*

*Fructu.*

*Caro cap.*  
*Eff.*

*Semina.*

*Radix.*  
*Nomina*  
*Synonyma*

*Atrog.*  
*Pomum*  
*qua.*  
*Citrus*  
*Malu Me-*  
*dicum A-*  
*larrangi.*  
*Citrium*  
*efculentum*

*Citria*  
*Disq.*



Iudeos Mala citria fuisse olim allata. Variat, nonnunquam (inquit) grandius, quandoque magis exiguum apparet, effigies operata rugis, prælonga interdum rotundior: odor plusquam incundus, & qui Martias Violas ferè referat.

Hebræi Hadar arborem esse volunt citius fructus *Ethrogim*, vulgò *Citra* dicuntur, quam vocem Paraphrastes posuit. Hadar autem propriè pulchrum, formosum & decorum significat, sicut & septuaginta verterunt *ἡδάρ ἀειδωρ*, id fructum arboris pulcherrimæ. Similiter & vulgata editio habet: sumetisque vobis die primo fructum arboris pulcherrimæ. Quia autem citrium speciosissimum fructus est, idè pro citro arbore Hadar interpretatur, atque eo fructu citriarum hodie Iudei in suo festo celebrando vtuntur, & ex Massilia Prouinciæ accerunt. Celebratur autem octaua Septembris ea dies cum magnis solemnibus, vocaturque *Chag Arafæ*, id est *Festum Palmarum*, in quo sumuntur fructus quos *Ethrogim*, id est, *Citra* vocant, & spatulæ Palmarum ad inuendum, quod Deus deduxerat eos per desertum in deliciosa terram. Circumuenit etiam septimo dies septies altare, portantes Palmas, in memotiam depopulatæ Hiericho ex annotat. Pauli Fagii. Ex his (addit Kyberus) facile liquet Hebræis *Ethhadar* Citream arborem, fructum verò eius Chaldæis *Ethrog* seu *Ethrog* significare, quæ vox nihil, quod ad substantiales literas attinet, (nam in punctis tantum, quæ Hebræis, Chaldæis & Arabibus vice vocalium inferuunt, apparet, sed leuis mutatio,) ab *Atrog* Serapionis Arabico nomine differt. Vnde cum Arabica & Chaldaica lingua (quæ Iudeorum à reditu ex Babilone vernacula fuit, vt multis noui testamenti vobis patet) in hac voce cõsentiant, nemo in posterum dubitare debet, quin *Ethrog* Chaldæorum citrum sit, maximè cum Serapio sub voce *Atrog* ea dicat, quæ Gal. & Diosc. de citro iam ante eum scripserant. Decuit hæc adduci hoc loco, quodd & ad historiam & dignitatem citri facerent, ne tantopere in sacris celebratum literis, in sua historia quæ debuit esse amplissima, suo honore priuaretur.

Cæterum quæ Cornarius de Malis Medicis tradit, ad Citria Mala, de quibus hoc loco agimus, potiss. referenda videntur: suspicamus tamen ei non cognitum descimen inter citrium minus & Limonem.

Anguil. quoque eius sententiæ est, citria hodie dicta *Citron*, esse *ῥευθιμα* Grecorum & *Aucea* Mala Athen. Medica Dioscor. Medica & Persica Theophrast. Assyria Plin. & hespericum Veterum.

Agricola ad Theophrast. Amatus ad Virg. refert, & ait: eum exactè & arborem & fructum citri supra allegatis verbis descripsisse. Prioribus etiam subtribit Lonic.

G Ryff. & Cesp. Dod. Medicum & hesperidum dicit. Antiquorum plus satis citata nomina huic tribuunt quoque Tab. Cesp. Bauh. & plerique alii herbarii qui id nominibus Veterum diuersis decorare studuerunt.

Vulgata nomina sunt, *Citria*, *Citrea*, *Citromela*. Germ. *Citronspffel* / *Citronen* / *Citrimen*, *Citronen*, *Citronen* & *Judenapffel* id est, Iudeorum Poma, qui quotannis in festo Palmæ tenentur habere. Belg. *Citroen* / *Citroten*. Gal. *Citron*. It. *Cedri* & *Citroni*. Hisp. *Cidra*. Ang. *Citron*. Bohem. *Citronne* / *Jablska*.

Huius obferuatur quædam differentia: Nonnulla enim, inquit Matthioli in tantum excrecunt magnitudinem, vt Melopepones adæquent, cu-

iufmodi sunt quæ ex Liguria Hadriatici Aegeique pelagi insulis adferuntur. Alia his paulò minor: alia verò Limonum magnitudine, at paulò maiora, cuiusmodi quæ in lacu Benaco comportantur. Hæc principem in cibis locum obtinent: Nam et si cæteris pumiliora sunt, maiorem reliquis in ore ineunt gratiam. Atqui quæ grandiora sunt, et si speciosa magnitudine excellant, cum tamen insipida gustu non multum placeant, in cibis recentia non æquè atque illa præstant: verum, quod pulpa copiosiore consent. officinis expetuntur, Saccharo vel melle adseruanda.

Cardanus scribit in Lombardia ad pondus librarum decem quandoque prouenire, licet rarò. Sunt qui existimant magnitudine potius & loco natali variare, quam genere, quod his considerandum relinquimus qui ea loca, vbi proueniunt, inhabitant.

Quicquid sit, earum differentiam perspicuè docent Pena & Lob. in Citri tribu [aiunt] Medicum Dioscor. Malum tres amplexum est varietates: vulgatus est similis Limorio, oblonga effigie: sed maiore, cute rugosiore, magisque caperata, odoratus est, medicatus, antidotis commendatus: Pulpâ & succo in acetariis multò gratius. *Limo* autem quæ dicuntur, illis duplo ferè maiores sunt, calloso carnoso corio, pollicem interdum, crasso, oblonga cucumeris aut Melonis effigie, superficie concolore Limonio aut citrio: puluillis & torulis rugosis papillatim extuberante, vt citri sapore condito, & crudo grato. Tertium *Assyrium*, Adami vocatum, de quo postea.

Aug. Gallus has differentias facit. Primum Pulchrum Lombardum. Magnum Germanense cum glande. Primum genus delicatius & magis cardiacum, inter omnia quæ in Europa nouimus pluris sit, quò maius, longius, costis elatioribus. Arbor eius fructus fert modò paucos, modò plures, interdum forma rotunda, interdum sine costa, interdum diuersarum & monstrofarum figurarum. Germanense genus valde grande est, & sponis dulcioris, sed non ita iucundi, nec tam grati odoris. Citrium cum glande præstantissimum omnium, sed minus: ideo minus vulgare: quasi vtilitas in magnitudine posita sit vel numero.

Si citria hæc sint illa Antiquorum, iâ supra satis indicatum, in quibus proueniât regionibus. An autem verò Cœlum calidum, hibernis iniuriis minimè obnoxium, quod si nactum fuerint, aut sub paulò tolerabiliorem etiam diligenter colatur, flores, adolecentes, maturescences, maturòque fructus simul producant, non solum æstate, verum hyeme. Magnus est huius arboris malorumque eius in regno Neapolitano & Hispania prouentus. Seritur etiam in Germania, sed frustra, nihil enim præter folia producit, vt testatur Cordus. Vidimus & florentem, & fructus ferentem Basilæ in horto D. adfinis nostri & eiusdem vrbis consulis primarii, Hieremix Felschii, in pulchra & pereleganti arbore, de cuius fructu maturo decerpit etiam comedimus. Erant magnitudine Limonibus similia, videbanturque primi generis Matthioli. & Penæ. Gustus tamen suauitate Italici & Prouincialibus cedebant, quemadmodum & cæcis tenetudine. Alioqui in Germania frigore siderata facile perit, ideoque diligenti cura à Principibus à frigore custodiri solet præsertim Stuckardiz & Castellis, in verè Regis & qui nec Italicis quidem illis cedant, hortis, si plantarum cultum, copiam, artificium topiarium, & ediciorumque magnificentiæ spectes: non item si agris & cœ-

Citra 10. l.

Citra tres varietates

Vulgatus.

Delectus.

Limo.

Assyrium.

Pulchrum Lombardum. Magnum Germanense. Citrium cum glande.

Locus.

genium. Quapropter illata in cauzdia aut cellaria, vel studio ad hoc extructa ex lignis ædificia, in multos annos viuunt: qualia sanè vel Ferraria & alibi circumiacentium locorum in eundem vsum, ipsi etiam Italici erigi solitis nouimus.

Cùm fructificat substructis iugis hastilibus, furcisque fulciendam suadet Cordus, ne malorum pondere inrescente detracta succumbat, ac fracta prosteratur. Verùm hoc in Germania timendum minimè est, in qua vix frondes ab hyemis sæuitia vindicari queunt, quantumuis tepidis specubus foueantur.

Porrò in Galloprovinciæ quibusdam tractibus maritimis, tam frequentem obseruauimus, vt integra Citreæ potiùs eaque peramœna iudicauerimus, quàm multo studio vel cura conquisitas vel custoditas malos citrias.

Tempus.

Floret diuersimodè Patavii, Februario florentem vidimus, & quidem cum floribus purpureiscentibus in ædibus nobilis altius. Item Romæ tam flore quàm fructu stipatam Maio. Denique in calidioribus regionibus rarò floribus aut fructu viduam videas: nobis sanè talis nunquam visa, quæ non vtrumque iugiter ostentaret.

### CITRVM MONSTROSV

DE MAXIMIS.

Descriptio



Citri maioris Carboem vidimus Stutgardia in horto Ill. Duc. V. Virtemb. qui hyeme tegitur, & cum hypocausto calefit, eamque florentem Anno 1599. Ex qua arbore postea Montbelgardum vsque ad nos misit Ill. E. C. decerptum fructum, monstrofaritatis, torulis cannulatum, calceum Polonicum aut Turcicum referentem: in acumen enim desinens, aduncum,

superius recuruum, lacunam largiorem ostendit, paricibus vtrinque prominentibus, à media lacuna costa longa surgitque elatiuscula, declinibus in parietes circumiectos lateribus. Merebatur figuræ monstrofaritatis ciconem, quæ eleganter & picta & sculpta.

Fortè huius aut consimilis alicuius varietatis meminisse Aug. Gallus in suo lib. de Agric. cult. Italici conscripto. Memini [inquit] vidisse Citrii alterum genus, quod prouenit Staffegiati, quod propter diuersas formas visu mirabile: æquè bonum atque præcedentia genera: verùm cùm arbor paucos fructus producat, rarò plantatur. Nostrium hic depictum fructum integrum excicatum adscriptum inter nostra naturalia.

Marantha quoque hic silentio prætereundus non est, qui multas ex Theophrasto plantarum differentias enumerat, quæ cultu vel adhibito, vel neglecto non faciem solam variant, sed in aliis etiam species permutantur. Tradit enim hæc

inter alia lib. 2. Meth. cognosc. simpl. c. 11. quod mala Medica operoso cultu ita efformant, vt & moris & femine sexu distinguant: rem certè admirabilem, & visu iucundissimam. Maris enim pomum adnatum habet quoddam veluti infantis genitale, eiusdem cum pomo corticis & coloris: femina muliebri pudendum ad veram eius effigiem efformatum videtur, quo simile magis sculptor non fingat. Mala citria ad formam peponis, aut cucumeris, aut cydoniæ, aliordumque quorundam fructuum ita effingunt, vt nihil amplius pristinae figuræ, præter colorem & substantiam retinere videantur. Mala etiam Medica & Limunculos vocatos & dulces & mediū saporis ex acidis conficiunt.

### LIMONIA MALVS.



Im verò Limoniibus facies paulò alia quàm Aurantiis, ad Citria in specie dicta propius accedentibus, color pallidior languidior croco tingitur. Forma Pomum oblonga, turbinata, rugosa & tuberculis inæqualis, sed minis quàm Citria, minori quoque, à quibus & in eo differunt, quòd cortice pulposo tenuiore nrisq; carnoso, succo au-

tem vberiore donantur, eoque acidior: semen non multum ab simile amaricat: folium autem non gemellum, vt Aurantiis, sed simplex, longius, latiusque, crenatum, serratumve, foraminulentum tamen illis consimiliter. Spinæ & hic quoque reperiuntur, viròque ille perpetuus. At flores purpurei sunt.

Cordus paulò specialius sic describit. Limon ex Citri est genere multò tamen minore ac fruticosiore arbusto, pluribus ab vna radice virgis excurrentibus, cùm largè fructificat, subiectis hastilibus ac furcis fulcienda est. Arbusto, cortices ramos, vestium priorum instar virides. Folia multò minora producit, Piti cotoneique foliis æqualia, rotundiora tantùm, densa, viridia ac glabra. Spinis armatur veluti Citrius atque Arangius, minimè tamen rectis, sed aliquantulum hamatis, multoque pluribus quàm illæ, quo fit vt eius virgæ ac ramuli aduncis aculeis quandam Rubi imaginem referant. Flores Citrio figura non dissimiles proferit, paulò tamen minores. Fructus verò Citreis ac Arangiis aspectu, odore ac sapore non dissimiles.

Eorum quadruplex ad nos peruenit genus. 1. Primum asserini oui formam ac magnitudinem habet, odore inter Citriam atque Arangiam medium. 2. Secundum globosum, vniuersè prædicto, vtròque capite velut, eundem vmbilico insigni, cæterà sui parte tuberosum. 3. Tertium oblongum est, gallinarum oui quantitate, & figura. 4. Quartum tertio æquale est. Sed globosum,

Descriptio fructus.

Quo differt a Citria.

Semen.

Folia.

Flores.

Descriptio Cordi.

Differen-

tia.

Oblongum

maius

globosum

oblongum

maius

globosum

oblongum

maius



hosiū, & superficie magis æquali. Omnibus crassior, ac aurei palloris cortex, qualis Arangiis: odore vehemens, gustu amarus, feruidus ac tenuis. Reliquum corpus caro est, rara cauernosaque per longitudinem membranis quibundam intersepta, cui mixta sunt citris similia, figura, odore aut gustu semina, minora tantum. Succus per totam carnem diffusus est largus, saporis vehementer acetosi, ac dentes hebetantis. Radicibus nititur qualibus Citrus ac Arangius.

Matthiol. maiora & minora facit, succi suauitate differentia, & corticis crassitudine. Nam quæ grandiora sunt, & succo & cortice carnèque longè sunt crassiora.

Amatus scribit, Hispania ferre Limonia acida, dulcia, & medii saporis: figura item varia: quædam enim, vel Cæsalp. teste, cortice sunt crassiori, oblongiora asperioraque, citris magis similia, vt quæ in Gaieta nascuntur: alia leuiori cortice tenuiorique, succo acidiori.

Probantur quæ crasso cortice constant, teneriorique, succo dulciori, quos dulces Limones vocant.

Quoddam præterea genus in Hispania habetur minimo fructu, vix nucis amplitudine, odore cæteris præstantiori, excellens arbore.

Aug. Gilo, Limones quidam communes, qui tamen & ipsi variant pulchritudine & bonitate: quidam dicuntur cedronati, quia pulchra cedrorum forma, sed minores, quamvis in citris arbores inferti. Genus est quoddam. Genus nascens, delicatissimum, dulcedinis Arantiorum, cum soleant Limones esse acidi. Arbor multis producit spinas, potissimum iunior. Inuenitur tamen in Maderno non spinosa, quorum magna commoditas. Præterquam enim quod spinæ acerrimè pungerent, habent aliquid venenati aut maligni, præ aliarum arborum spinis. Limones meliores, quod maturiores ac teneriores succulentioresque. Hinc cæteris, etiamque reliquis Italiæ Lombardiæ Limonibus præstant Genuenses, quia diutius relinquuntur supra arbores, nec ita citò colliguntur, non nocente frigore, vt in Lombardia. Limones quamuis eisdem bonitatis cum Limonibus, rarior tamen earum vltus, quia pulchritudo minor.

Limonia [vox hanc arborem aut fructum denotans,] haud temerè apud vltum probatum autorem vel Græcum vel Lat. num inuenias, videturque posterioris seculi esse inuentum: tantòque magis mirari subit quâ autoritate Matthiol. Græcè *λίμονα* dici scribat, nisi fortè hodie in Græcia ita vocentur, quod tamen ille non docet. Plurique & hanc ad Veterum Malum Medicam referunt. Medici Mali genus, *Limones* Cordo: Limon ex citri genere eidem. Limones & Limonia omnes penè Herbarii cum vulgo & Pharmacopœorum officinis vocant. Citreæ speciem dicit Amatus, & Ryff. Mali Medicæ & citreæ secunda species Dod. Ant. Musa ait, Italos vocare Citrium Malum. Cæsalp. verò & Aug. Gall. non citrium, sed Limoniam Citrio similem dicunt. Et sanè Limones hodie dicti fructus, vel à Priscis non describuntur, vel sub nomine citri comprehenduntur, vt æstimat Agricola. Germ. *Limonen* / *Limon*. Belg. *Limoen*. Gal. *Limone*. It. *Limone*. Hisp. *Limonzas*. Angl. *Limontree*. Boh. *Limnauy*. Porro Limones hos propè dictos non esse posse Medicæ vel Persicæ Theophrasti. & antiquorum, ex eo satis patere arbitramur, quod facillimè putrescunt, idèoque vestibus interferi ad arcendas tineas commodè non posse, quod tamen in Medico Malo Vegetum.

Tom. I.

terum apprimè desideratur.

Gaudent Limones eodem cælo calido cura, ac Locus. cultu. Quapropter in Hispania, Italia & Galloprouincia frequentes habentur, & ad Lacum Benacum ferè vbique viridari habentur, tam his, quam reliquis Malorum Med. corū arboribus conlita, vbi in eam sese attollunt proceritatem, quæ aliis in locis Salices & Vlmis, vt Cæzolarius testatur: totòque ferè anno fructibus onusta spectantur. Ex prædictis locis terra marique vehuntur in Germaniam, partim recentia, partim muria condita. Coluntur & Stutgardia in E. C. horto, vbi Nouembri fructibus onusta vidimus, & nos ipsi aliquando arbuticulum colummus in horto. Pulcherrimas colit & suamet manu magnâ industria inserit D. Fel. Platerus Basilea. In ruderibus Cairi propè Bouldas, Limones syluestres, fructu nunquam maiore ouo columbino meminit esse Bellon. In Zeilam Limones proueniunt sua specie, pusilli, qui nullum propè capiunt incrementum, sapore dulcissimo. Syluestrium Limonum arbores in Syria, Aegypto, Africa frequentes, pomis admodum exiguis, acidissimis, vt refert Scal. Meminerunt quidem Amatus, Cæsalp. & A. Gallus, vt antè demonstratum, Limonia videri in Cilicum, verò non paruos non tradunt. Cæsalp. minimos scribit in Hispania prouenire, verum quo sapore sint non indicat.

An huius generis parui Limones, qui in doliosis interdum importantur ad nos muria conditi, cum carnibus & piscibus coquendi, iucundi saporis.

## ARANTIA MALVS.



Notissima verò reliquisque; vulgatiora sunt Aurantia dicta, quibus aureus ille & rufulus cortici s. fulgor nomen dedisse potuit. Hæc aliis magis orbiculata, non nihil compressa, parum rugosa & foraminulento luteo cortice, interius tamen albicante, non multum spisso, (fœminas vocant) vel crasso, (mares dicunt) amarissimo & euidenter calido teguntur, quæ tamen antè maturitatem viridis tegit cortex. Sapor succo pro maturatōnis progressu aut generis varietate, acidus, dulcis, aut medius, seminibus æqualibus multa medulla factis, amarus. Folio peculiaris forma, temper videnti, & hyperici instar infinitis propemodum

Limones.  
Pusilli dicitur.

Pusilli dicitur.  
Hispanici.

Aurantia  
Gnd.  
Descriptio

Mali  
Cg  
Sapori.

Zila.

Eler.

foraminulis peruis, quippe quo-l gemellum videri possit, maiori Laureo, acuminato, nec crenato, alio ceu corculo subiecto. Flos vt & fructus fragrantis odoris, [ qui Cordo cimicum virus nonnihil redolere videtur ] coloris candidi, staminulis multis medium obdidentibus, pulchrior quàm in citro, & odorator, intus subcitrinus, per oram verò limbi purpurascens. Arbori quæ multò maior quàm citri, cortex viridis, spinæ rigide sed rare. Monstrosa naturæ ludentis in Aurantis nobis obseruata luxuries, quæ tantarum deliciarum conscia non sat habuit spinis arborem armasse, nisi & fructui cornuum terramentum adiungeret. Solet & hæc superferre, quemadmodum & malus citria & Limonia.

Nomina & synonyma.

Aurantia dicta volunt ab auri colore: alii ab oppido, in quo abundant: Orange sanè Gallorum æquiuocum est & ad Pomum hoc, & ad oppidum Galloprovinciæ. Sed aliud est oppidum Achaia, Arantium à quo dicta volunt: vel Arania à Gente eius nominis in Persia. In officinis tamen Arantia dicuntur. Hæc Manardus putat esse Virgili Medica mala & Auic. citrangulum. Hier. Brank. h. citranguli. Brunfel. citria, Arantia dicta. Cordo Medici mali genus Arangia, ab Italis Naranzia: & arbor Arangis eadem. Trago dicuntur etiam Citria, Medica, Aurea, & Hesperica mala: In Nicand. Alexiph. *μῆλον ἄνθρον* τὸ ὑνδρὶ: τὸ νερὰν τῆς, eadem: à qua voce Germanica appellatio Pomerangien quasi Poma nerantzia deriuata videtur. Amatus etiam Rancidum vocat: & Auic. citrangulum dicit: Alii & huius & Meluei citrangulum. Cornarius ceu pratorio quodam edicto de citriorum genere Poma Arantia vulgò dicta, Matiana, & Cestiana mala à Plinio & Galeno dici, in comment. med. à se ostensum tradit. Motus autem hic maxime ad hanc opinionem capessendam, quòd ea frequenter Galenum cum malis Punicis coniungere animaduertit.

Corn. mor.

Ast verò, cùm Theoph. & Plin. dicant malum Medium non comedi, quòd vel maxime de Aurantis dici posset, quæ non comeduntur nisi in condimentis, ex Suetonio verò constat T. Fl. Domitianum non temerè super cœnam præter Martianum malum sumpsisse, non sit verisimile, fuisse malum Aurantium, nisi fortè habuerit dulcia, aut tota edula, de quibus mox dicemus. Sed Plinius ipse eam opinionem ei eximere debuit, qui ait, à Cestio Cestiana, sicut à Matio Matiana, quemadmodum & alia, ab inuentoribus, à Romanis fuisse cognominata. Quare Gal. cum ex auctoritate Apollonii tradit in capitis dolore ex ebrietate cestiana mala Romæ sic appellata, in cibis cocta conferre, Aurantia intelligere non potuit, tum quòd Apollonio & Galeno incognita fuisse censetur, tum quòd ea nunquam cocta exhibentur, [ vt Dalech. annotat ] saltem non per se, & quatenus cibus, sed quatenus *ἐνδύμνα* seu condimentum. Eandem tamen opinionem Cornarii & Montui secutus videtur, & Agricola.

Chrysomelam. aurum malum.

Inter Citria referunt Fuch. Manard. Ryff. Ioubertus, Saracenus & alii multi. At Dodonæo Antiquis *χρυσόμηλον*, Autum malum, & malum Hespericum, & Neoterici Anarantium & Arantium, ab aliis *Ανθρον*.

Malum Hespericum Aurantium.

Lonicero Poma nerantzia, genus Citri, Pomum aureum Hesperidum Poëtarum.

Loebel. & Pen. Citri & Cedri Theoph. species. Had. Iun. *χρυσόν* Athen. & *ὑνδρὶ* Nicand. Schol. & Turn. Qui adèd [ inquit ] Aurantia volunt differre à citris, legant illud Nicandi in Alexiph.

*τὸ ὑνδρὶ μῆλον, τὸ νερὰν* *Neralia* etiam, Saraceno, quæ eadem Aurea vel Hesperica. Arangia quibsdam, aliis chrysea: Pomum Arangie Hist. Lugd. Aurea Virgih C. Bauh. de quibus nos supra alio loco. Idem suspicatur esse Martianum Siretonii in Domitiano. Cæterum plarique Herbarii & Practici Arantii vel Aurantii nomine designant. Germ. Pomerangen. Gal. orange, pomme d'orange. Belg. Aranie appel/ appel van aranen. Ital. Arancio. H. sp. Naranzus, naranjas, melaranzo. Angl. Orange tree.

Sed dubium hoc loco ventilandum ex Scaliger. Medici mali Theophr. vsum nullum scribit inter cibos: iccirco [ inquit ille ] quæsiuere doctiores, vtrum esset de quo scriberet, Arantiumne an citrium. Nam citrium præter semen totum esculentum est. Non animaduertè [ addit ] folii figura tolli respondendi cunctationem. Non enim est Arantio Lauri folium, sed peculiare quoddam, nempe duplex. *Hæc ille*. Quasi verò appendix ille folii impediatur, quominus folium dicatur Laurino simile, quemadmodum reuera est: non quòd inde velimus astruere, esse reuera Medica Theophr. mala, quæ nobis Aurantia dicuntur: nam & reliqua citriorum genera folia Lauri similia habent, si d vt constat Scaligerianà subtilitate nondum sublatam tempo: dei di: cunctationem. Et iam rursus Scalgerum vel illum aliquem subtilitatis professorem sine cunctatione respondentem perlibenter audigemus: Aurantia vel in multos annos exiccata, suum tamen odorem non amittere, non faciliè corrumpi, & vel corrupta, tamen tandem sicari, & odorem seruare, idè quæ vestibus interponendis ad arcenda noxia aptissima esse. Citria verò etsi siccantur quoque, qualia & nos habemus, esse tamen euania, idè quæ nec odore nec vñ commendabilia.

Porrò plerique Herbarii duas Aranciorum differentias agnoscunt, acida & dulcia. Matth. tria in Italia genera nati tradit: acida, dulcia, & vinolenta siue musta, quæ & Calsp. & Aug. Gallus referunt, & vinolenta medi saporis vel mediocritia nuncupant: hincque addit, non dignosci posse nisi comedendo. Periti tamen Medici & Hortulani optimè discernunt ex foliis & corticibus fructuum. Semper verò meliora sunt Genuensium Lombardici: quanquam hæc si non colligerentur propter frigus antè perfectam maturitatem non differrent, quemadmodum nec Limones. Prouinciales ad Genuenses bonitate quàm proximè accedunt. Scal. scribit se in Prouincia Narbonensi, eiusdem arboris Arantia nonnulla acida, quædam dulcia degustasse, eodem tempore, quibus tamen nihil defuerit ad perfectionem. Et quamuis iam alibi scripserat, neque Arantium, neque citrium, neque Limonium dissimiles fructus edere in eadem arbore, nisi illud fiat per institutionem, ne utique verò per propria & connata principia: hic tamen rationem tribuit materiei diuersitati, quæ non æqualiter coqui potuerit. At qui si non æqualiter coqui potuit, quomodo alterutro nihil deesse potuit ad perfectionem? Si diuersi fructus non nascuntur in eadem arbore, nisi per institutionem, [ quod faciliè concedimus ] quid opus ex coctionis gradu rationem petere, quæ nulla est in hoc negotio, cùm abundè suppetat ex mixto & gemino ex eadem arbore diuersorum fructuum principio. Dicamus itaque diuersi saporis Arantia, quæ Scaliger ex eadem arbore gustauit, aut ex insita fuisse, aut cadere illam *scilicet* non posse diuersos fructus ex eadem specie arbore prognasci: cuius sententia & nos sumus.

Neralia, Arangia, Chrysea.

Nationalium nomina.

An Arantia sit medicum Theophr.

Scal. not.

Arantia cur possint esse medica mala Theophr.?

Auranciorum differentia. Acida, Dulcia, Vinolenta.

Acida & Dulcia ex eadem arbore.

Scal. præf.



mus: id eoque ex insita arbore diuersa decerpisse Scaliger. quamuis illud neuiquam insinuet, minus verò etiam sic intelligere videatur.

Græci, autore Monarde, Aurantias *Poma aurea* vocant. Persusum est habet per insitionem aduenisse complura genera, & sic magnificatum esse insitionis usum, vt aliquæ corticem habeant dulcem, quæ totæ comedi possint. Quanta diuersitas saporum in eis degustetur communi relinquit iudicio, sat esse concludens, constare multa fieri posse per insitionem, quæ in monumentis Antiquorum non memorentur. Enatam esse Aurantiam ex insitione Citri arboris in Malo punica idem asserit. Et hinc Aurantiam Malo Citrio non absumilem scribit, & cum Malis Punicis in rotunditate & colore, corticē vè satis conuenire tradit, quinimò Malis Punicis virgente necessitate in eorum penuria substituendam censet. Id nondum constare ait a Aurantiæ sint Citranguli ab Avicenna. & Mesue commemorati.

Gaudent Aurantia insitem locis & regionibus, quibus Mala medica vbi passim abundant in viciariis & hortis, tantum præsertim tractibus. Abundant in tota Campania, Apulia, Calabria, & aliis regni Neapolitani locis, quemadmodum in Germania arbores domifera. Iidem scatur & Liguria, Galloprovincia, & totus Benaci lacus tractus vbi paulò curiosius coluntur, quam locis prædictis: parcius etiam fundit Gallia Narbonensis, præsertim superior. Frequentius verò hodie etiam in Gallia Septentrionalis & Germaniæ magnarum hortis colitur, quam vllum reliquorum Citriorum genus, vel quod communiores sint, vel quod cæli mitoris genium paulò facilius tollerent. Quapropter Sturgardie in horto Ill. C. V. V. magna copia præ aliis exoticis arboribus coluntur, vbi mense Nouemb. pomis grauidas, tam maturis, quam immaturis, magnâ copâ, iucundissimo spectaculo, dulcibus, acidis, subacidis, magnitudine variantibus, cortice tenui, crasso, amaro, eduli, magis & minus acis, vidimus & gustauimus, vbi & toto anno abundant. Acco vsque eas habendi cupiditas excreuit, vt & nobilitas, Doctores plerique, ipsique adeo pharmaceutici colere incipiunt, in multis Germaniæ & Galliarum locis. Nos etiam plures columus, insitione & fatu, nam ex semine facili nobis proveniunt, tam dulci, quam acido. Sed hic Montbelgardii ad fugem nondum peruenire. Doctor Platerus Basilicæ plurimas habet fructiferas, & infructiferas, quas sylvestres vocat ex semine natas, & suamet manu (quâ industriâ eximie pollet) inserit, & fructiferas reddit, quæstumque haud contemnendum inde facit. In horto Principis in Heistercheim aurea mala pulchra, rugosa & polita matura Septembri obseruauimus. Scribit Lobel in Africa sylvestrem & Olbiæ Galloprovinciæ adeo familiarem in afflatu otæ maritimæ, vt temperarentur lucorum amœnitate & Pomorum sæturi perenni, neuiquam iniquina videatur. Recordamur sanè doctum & insignem Pharmacopæum Io. Rosellor Montbelgardii Ill. C. V. V. interuenientem narrasse nobis, se in adolescentia sua penè fame perussisse quondam in hispaniis agentē, inter sylvas Arantiorum sylvestrium. Tantam enim earum fuisse aciditatem vt in plures dies offensus auidius seu stupore dētes masticationē omnino ineptos haberet. Sed vt hoc obiter moneamus, facile mēderi potuisset mansu Portulacæ, id sua dente Arist. & plerique Medicis. Aut si hæc defuit panis calidus, caseus, nuxes Pineæ, Aucellana, Iuglandes, sal aut mel calefactū affricarum, amur.

Tom. I.

ca in æneo vase cocta ad mellis spissitudinem, oleum immaturæ oliuæ infricatum, vices eius suppleuissent.

Floret Arantia Aprili, Maio, tardiùs aut citiùs pro loci conditione, præcipue commendationis odore. Flores decerpi etiam per maria in longinquas regiones perferuntur: & aqua quoque quam *Nassam* vocant, fragrantissimi odoris, ex iis parata arte destillatoriâ. Apud Germanos hyeme diligenter contendenda, & extractis in eam rem ædificiis atque hypocaustis fouendæ aduersus hyemis iniurias.

Non tacendum hoc loco, quod mirifica subtilitate, acutissimus prædicat Scaliger. Arantii, inquit, quod gelu perisset, triennio post effossi radicem mirati sumus, non solum viuere, sed etiam latissimam. Sed si superuixit, & quidem læta, ergone perierat? Atqui, dicit ille, arbor perierat, hoc est, truncus cum ramis & foliis, non item radix. Atqui, inquam non igitur perierat, superstitie vitæ etiamnum fonte, ex quo pristinus vigor promanare possit. Nondum igitur tota perierat arbor. Sic bonus quoque interdum dormitat Homerus.

Tempus:

Aqua  
Nassa.

Mirabilis!  
Scaligeri  
abstrusio.

## POMA ADAMI.



**P**roxima Aurantia sunt quæ Adami nuncupant poma, si fructum spectes orbiculatum illum quidem & autem æquabili Aurantiorum superficie, sed multis numeris maiorem, & nonnunquam ad umbilicum velati ambeum, colore magis fuluo, quam Aurantia, & odore ignauiori, carne Citri simili, sed gustu insuauis, multo interim succo pragnantem, sapore Aurantis affini. At verò folium in Limonum aut Citriorum familiam cooptare iubet, vt cui nulla subiecta pinnula: nam poti, quibus pertunditur, omnibus communes sunt, veluti & spinæ, vi orque pertinacis vitæ folii. Flores Citri, Omnes partes satis bene & eleganter expressit pictor.

Descriptio

Quo differat ab Aurantia.

Catv

Sapor.

Foliorum

Flores.

Medica  
antiquorum  
Etymon

Hanc & plerique ad Medica Antiquorum referunt. Pomum verò Adami dictum voluit, quod in superficie ceu infixorum dentium vestigia habere videatur, quasi ab Adamo primo homine commorsum fuisset, quo nomine & ab Italis agnoscitur.

Sic Matthiol. Adami poma vulgò vocata, nos *Lomie* dicimus, & *Poma d'Adamo*. Aurantius duplo triploque maius, rotundum, cortice non admodum crasso, inæquali fissuris quibusdam apparentibus, perinde ac si dentibus demorsum esset, vnde illi nomen, quod putet ignarum vulgus, hoc illud esse pomum, quod ab Adamo in Paradiso demorsum fuit. Medici mali genus, Poma

Nomen  
& Synonyma.  
Adami poma Lomie.

Medici  
mali genus

Adam, Cordo. Amatus quoque Cuius speciem facit. *Pomum Assyrium* quatum, etiamque Medicum Dod. Pomum Assyrium, Adami vocatum, Mal: mediet Diofcoria *varietas* Pen. & Lob. Malus Assyria Tabern. & Gerard. Poma Adami Hist. Lugd. & Neoterics plerisque. Sollerius Limes vocabat. An Celsalp. *Melanguia*, quam alii *Citrangula* vocant: frutice & fructu similior Citro, ingenti fructu, omnium maximè tuberoso & crispo: colore pallido, sed rotunditate & succo interno Aurantia: cortice quoque similiter fungoso, sed tenero & dulci, cum leui quadam amaritudine. Ponzirus ambigit inter Limonem & Aurantium: non enim oblongus, vt Limon, nec omnino rotundus, vt Aurantium: vtrique amplior: cortice crasso & leui, cortice ad Aurantium vergente, dulci cum quadam amaritudine, succo intus Limonis. Considerent periti an citrangula Celsalpini, non sint poma, quæ vocant Adam: & Ponzirus differentia quadam citri maioris. Ita saltem descriptio insinuare videtur.

Nomina Gerin. Adamsöppfel. Gall. *pommes d'Adam* &  
linguar. *poncyres* idem teste Lob. Hisp. & Lusit. *Azamboa*.  
Loc. Angl. *The Assyrian Apple tree* Gerardo.

Non vbiq; hæc obuia, in Lusitania tamen & Hispania colitur: item in Calabria, authoribus Amato & Cordo. Ad Benacum lacum toto anno ferè perpetuè fronde virent & florent, testis Calzolari. Vidimus nos Lugduni aliquando, & in horto Ill. C. V. Viri. Stutgardiano, vbi arbor pulcherrima, magna ferens poma, nec pauca.

*Lacus maior* veldiorum in genere.

Quod in genere de loco omnium malorum Medicorum dictum fit, abundant ea hodie *Al-Gilff* Antogii, ubi multo maiora, quam in Lusitania item in insula S. Helenæ. In Brasilia & aliis nouiorbis partibus, à Lusitanis ex nostro orbe illata, multiformia mala Medica hodie luppetunt, vtdictum est ex historiis & navigationibus Indicis Hulfii, Muffei, & aliorum. Citrus apud Medos & Perlas inprimis frequens, deinde Palladii diligentia in Italiam translata fuit: postea vbi in vsum deuenit, vt nemora & campos occupa-

Medicam  
malum  
Græcia non  
Gnâ, &

Mitum, quod scribit Scaliger apud Theophras-  
tum: Arbor Medica tota Græcia [scimus enim]  
nulla viuit. Hæc enim eius sunt verba. Et in In-  
dice in eius annotationes in Theophr. his repeti-  
tur, insum Medicam in Græcia non videri. Quod  
si verum est [de quo tamen vehementer dubita-  
mus] frustra sanè à pœtâ in Græciam inuecta  
creditur, vt in præcedentibus dictum. Mirari  
porro subit, quare non sintibi, aut esse possint,  
præsertim cùm nec terræ fertilitas, nec cœli re-  
pugnet temperies. Sed iudicium penes eos esto,  
qui Græciam incolunt, aut perlustrant. Illi  
fortè barbaries Turcica, quæ iam ante Scaligeri  
secula in Græciam irreperat, eadem vel negle-  
xerit, vel penitus exterminat. In Creta sanè  
teste Bellonio, maximæ sunt arbores Arantio-  
rum, citiorum, pomorum Adami & Poncezio-  
rum. Græci, eodem referente, succum expri-  
munt, doliâ eo replent, vendunt Turcis Con-  
stantinopoli & aliis locis, quod deuchunt. Eo enim  
Turcæ frequenter vtuntur loco Omphaci.

In Creta.

Succi Gfau

Operepretium nos facituros existimamus [ si  
antequam de viribus malorum Medicorum ag-  
noscamus, aliquid dicamus de eorum statu, cultu, in-  
finitum, & si qua talia sunt, quae ad eorum con-  
servationem facere possint, idque in Germano-  
rum & Septentrionalium potissimum gratiam,  
quos hodie tanto studio acres arbores colendi &  
propagandi ardere videmus. Preceperat igitur da-

bimus ex probatissimis & diligentissimis earum  
cultoribus, potissimum, Varrone, Palladio, Aug.  
Gallo, & observatione nostra.

Erigo mense Martio citri arbor quatuor modis  
 scriitur, femine, ramo, talea, clauā. Amat terram  
 rarioris nature, calum calidum, humorūque  
 continuum. De Medica inprimis obserues, ne in  
 terram nimium aridam, sed temperatam semen  
 demittas. In iugerum vnum, si est naturā tempe-  
 rata terra, scribunt opus esse Medice selsquimo-  
 dio. Id scribitur ita, vt semen iacetur, quemad-  
 modum scribitur etiam pabulum et frumentum fe-  
 ritur. Si igitur granis velis ferere, ita facies: ter-  
 ram in duos pedes fodies, cinerem miscebis, bre-  
 ues areas facies, vt vtrinq; per canales aqua dis-  
 currat. In his areis palmarem scrobem manibus  
 aperies, & tria grana deorum verso cacumine  
 iuncta constitues, & obruta quotidie rigabis, vt a-  
 nimata femina melius adolescant. Cuius proce-  
 dent, si beneficio aquae tepentis vtaris. Natis  
 germinibus semper proxima herba runcetur. Po-  
 test hinc triua planta transferri. Acres medul-  
 las mutant, si femina per biduum mulsā mace-  
 rantur. Si ramum velis ponere, non amplius  
 selsquiped debebis immergere, ne putrescat.  
 Clauā feri commodius est, longitudine cubita-  
 li, vtraque parte leuigata, nodis & aculeis re-  
 cis: sed integra summitate gemmarum, per quas  
 spes futuri germinis erumpat. Diligentiores & fi-  
 mo bubulo adlinunt vtrinq; quod summum  
 est, vel marina Alga vestiunt, vel argilla subacta  
 vtriusque extrema cooperiunt, atque ita pastina-  
 to solo deponunt. Talea & gracilior & breuior  
 esse potest, quae similiter vt claua mergetur. Sed

talea palmis duobus superfit, claua omnis obui-  
 tur. Non debet alii arboribus annecti. In ſpa-  
 tio non deſiderat interualla maiora. Caldis, ſed  
 irriguis & maritimis maxime gaudet locis. Sed ſi  
 quis hoc genus, vt in regione frigida nutriatur,  
 exorquet, loco vel parietibus munito, vel in me-  
 dianam partem diſponat hanc arborem. Sed hy-  
 bernis menſibus teſtam ſtramine velet agreſcit,  
 aut aliis regetibus vel ſportulis muniat à frigore.  
 Inuari creditur maxime circumſiſte eucurtibz ſa-  
 gellis, quarum cineres vtilem quoque citri arbo-  
 ribus materiam præbent. Gaudet aſſiduâ folioſi-  
 tate, hinc proueniunt Poma maior. Niſi qua ari-  
 da ſunt, rariſſime debemus abſcindere. Illud quo-  
 que ſcitu dignum, quod arbor citri ſimilis erit,  
 quæ beneficio inoculationis coaleſcit. Diuites,  
 & qui dant operam genio, ſonnicibus concame-  
 ratis ad Solem ſpectantibus, reponunt, aut etiam  
 fornice intus exſtruſta, ſouent. Vbi æſtas reſul-  
 ſcit, fornice apertos, Sole ſunt inſtruſtri, &  
 eius tepore foueri : omnino æræ nuda & libera  
 reddenda, ſed eatenus vt ſecuta ſit. Nam hæc ar-  
 bor, poſſiſſimâ citrus, vt ipſe ſuapte natura te-  
 nerior, ſi paucam glaciem experiat, ſyderata  
 contabefeſcit. Talea, ſive claua cuius calidiſſimis re-  
 gionibus, & per Autumnum ponitur. Frigidifſi-  
 miſi Iulio & Auguſto poſitas, & quotidianis ri-  
 gationibus animatas, vique ad poma & magna  
 incrementa perducet.

*As-  
 syriacum.  
 Melicicum.  
 Melus As-  
 syria.  
 Limes Me-  
 langula  
 Cstrangu-  
 la.*

POZZI, IRMA.

Nomina  
linguar.

Locus.

Locus ma-  
lorum ve-  
dierum in  
genere.

Medicamentum  
minimū  
Græcæ reser-  
vatum.

In Cresta

Sacri Glau

Infisso in  
cultura ma  
lorum Me  
dicerum.

Quadratus  
sationem  
mias.  
Locus

SATO  
730716773

Ramus  
tim.  
Classa  
sic

Valca

*Sims?*

Vs perma  
masera  
fiunt.

*lafric*



quendam continuæ fecunditatis sibi ministrante natura, quæ hanc fecuram non interpellat.

Inferuntur etiam ex Piro, vt quidem volunt, & Moro & Punice Malo: sed insiti fureuli qualo desuper omnino muniendi sunt, vel fictili vasculo: De satiu & infusione hos versus condidit Palladius.

*Nec non & Citris patiuntur mutua rami  
Pignora, quæ grauidæ Cortice Morus alit.  
Pomaque passuri blandi redolentia succo  
Armatis mutant spicula nitæ Piris.*

Posteritas quoque semine serit, sed voluptatis potius gratia, quam vtilitatis: tardè quippe fructus producunt. Plantandi potius bacelli cuiuscunque prædictarum specierum, longitudine palmi, politi. Ad quatuor digitos deradenda exterior cuticula, & terra iuglondi, præseruanda à magno æstu & frigore. Spatium sit palmi inter singulos, quos oportet extra terræ ad duos aut tres digitos eminere: sæpius circumfodiendi. Facilius proueniunt, si propagentur. Arantia tamen minus feliciter, quia ligno sunt fixæ, quod non facile radicat. Eæ igitur seminandæ, & quia tardiùs fructificant, inferendæ Pomis Adami, Citri, Limonia: ita & plures proferunt fructus, & citius, & meliores.

Hortulani Italique nunc diligenter defigant bacillos Pomorum Adami propter infestationem, quia commodè prouenit, earumque fructus cæteris hodie ferè rarior. Qui Citriam insere vult, melius faciet, si uobilioribus ignobilioribus inferat. Sunt qui Citrias Limonibus inferant: petiores tamen inferant Limonias Citius, quia sic fructus nascuntur pulchriores, quos Limonia vocant Itali, quique ventriculo melius conueniunt, quam Limones, qui vehementer refrigerant. Inferuntur etiam Citri & Limones Arantia: sicque, lures ferunt fructus quam in propriis truncis, & frigori magis resistent. Ad Lacum Bennacum in parte S. I. diana Arantia arbores ferunt hyemem non tectæ. Archipresbyter de Madernum Citris suis arborem habet Arantiorum magnorum, ex vitis fistula infusione comparatam. Habet etiam Limonias quamplurimas, quæ aquæ & Arantia etiam non tectæ per hyemem frigus ferunt. Fructus tamen eius loci ad bonitatem Genuensium & reliquorum locorum maritimarum Italiae ne utiquam accedunt, ubi haud ita frigoris iniurias pati solent. In deliciis habentur præcelsis Arantia mediisaporis, quocirca hodie sæpius inferuntur, quam dulcia & acida. Quoniam verò Aranciorum & Pomorum Adami arbores fructiferos flores copiosos ferunt, Citriorum autem multos infructiferos, Limones etiam plures, ideo hæc duæ inferi solent Arantia, & Pomis Adami.

Inferuntur autem per scutum, olearum modo: nimirum non sub cortice, sed fisco trunco. Diligenter inferos furculos cera diligenter oblinunt, ne aer aut humiditas aliqua penetrare possit. Verùm adimendi omnes oculi superflui, etiamque superuenientia Germina. Sic relinquatur ramus supra in oculationem, ei appendatur vasculum terra plenum, ita adaptatum vt radices agere possit in eo, & sequenti anno plantari.

Infectiones autem fieri par est interlunio, mensibus prædictis, aut etiam tardiùs, dummodò lignum sit succulentum. Mundandæ arbores sine Martii & principio Aprilis, ubi frigus cessauit. Tum defiguntur baculi seu clauæ: & ramis vascula applicantur cum terra, parte per vasculum erant missa. priùs scarificata vt promptius radiceatur.

Tom. I.

Quæ granis sit satio, tardissimè ad frugem peruenit, speciatim Aranciorum, non ante duodecimum annum, etsi rectè curentur. Citri & bacculis uel taleis satè fructum ferunt tertio aut quarto anno. Limones quinto.

Terra sit pinguis, petis vacua. Locus ubi conflat: sunt à Boreæ afflatu sit immuni. Ex his præstat equinum, & uinum, sed benè putridum, quo obruantur & muniantur contra frigus. Aestiuo tempore sæpius rigandæ, singulis mensibus circumfodiendæ: Magna diligentia putandæ tollendæque spinæ, ne arbóri noceatur. Hieme siccas esse oportet, antequam recondantur.

Periti hortulani, & ad rem attentiores, metuentes ne flores hyeme pereant, priusquam Citros tegant, vt quæ frigoris magis impatientes, flores, fructuum rudimenta & teneras summitates tollunt, & sale condiant atque aceto, ad cibum tempore quadragesimali, & toto anno.

Cauendum ne villo stillitadio rami inadescant: virgente frigore, accendatur ignis in loco ubi repositæ sunt, ex lignis siccis, aut carbonibus, nisi adsit hypocaulum. Interdum mitiori cælo existente aperiendæ fenestræ, vt fruantur in aliquot horulas, potissimum circa meridiem, radis Solaribus. Ex Limonia rariùs & minus decerpuntur flores quia plerumque fructifera: Aranciorum verò & Pomorum Adami semper. Arbores hæc supra fidem durare putantur, aiunt in vallis Salodiana & in elacu i. Ben. ac uenire nonaginta & centum: Rome quoque Aranciorum arborem in templo S. Sabine ad D. Dominico sacam tradunt quæ erit minimum de huiusmodi ferat poma: Possent ergo esse 400. circiter annorum. Fructus ite demum n perfecti credantur, qui per annum durant in arbore, & qui nullam sentierunt frigus. Minus probantur qui in ripone cadunt. Arantia arbores vix amittunt folia, reliqua faciliùs, potissimum Citrus quæ cæteris delicatior. Verum primo vere faciliè recuperant noua ac etiam flores & fructus.

Vt caueas ne flores ferant inanes, præcidendi rami superflui, canendæque ne vltra modum excreuant: ita copiosos edent, & fecundos. Digitis tenuissimè ramulorum multitudinem decerpes potissimum vere, & interlunio, idque ordine quodam, quo apparent: ipsas etiam gemmas abundantiores demes.

Quum transplantandæ aut transferendæ, Vere quoque faciendum, considerato etiam situ eodem, quo erant antea positæ, singulis partibus, sibi consuetas cæli plagas respicientibus.

Magnè sanè harum arborum damno, præsertim in vasis, repositarum, negligitur situs ratio cum educuntur. Si tamen Septentrionales rami cæteris essent teneriores, etiam consuetum situm mutari, haud improbaucimus. Transplantatio fiat potissimum circa vespæram in bona terra, quo etiam tempore probatur rigatio, si sit opus: In Brixiano agro quidam meridie plantant & Soli etià expositis locis, non tamen mutato situ, in vasis ligneis aut terreis, qui etsi non tam mihi fruantur Cælo vt Riueriani, culturâ tamen & diligentia interdum meliores pulchriorèsq; habent fructus. sunt qui capsis videntur de ligno Lariceo, quod melius resistat aquæ, suffultus altitudine palmi, ne terræ corruptelâ aut situ inficiantur. Latitudo & longitudo capsarum ferè vix vnus & semis esse solet: terram quotannis renouant, admixto stercore columbino, gallinarum, equino aut etiam cloacarum. Circa D. Martinum sub porticibus & tectis collocant, ne pennis lædantur, ita tamen,

Tempor  
satura.

Qualis  
terra deli  
genda.

Flores ex  
rudimenta  
fructuum  
quando col  
legendæ.

Actas ari  
borum Ci  
triarum  
& Medi  
catum  
Arantia  
ad Do  
minico fuit

Ne flores  
ferant inane  
nes.

Transpl  
ratio.

Situs.

Flores trans  
plantatio  
nes.  
Modus  
Braxiensis  
exempli  
gratia pro  
ponitur.  
Cultura  
diligentia  
multum  
parit.  
V. alia.

vt Sole fruantur. Ad diem D. Catharinæ reponunt in domos, vt à frigore conferuentur per hyemem. Vigente fummo frigore accenditur ignis carbonum; cùm opus est etiam rigantur, Mense Martio paulatim educuntur, vt aëre fruantur libiore & Sole etiam. Circa D. Georgium omaino aëri exponuntur, similiterque rigantur, si videatur opus. Eductis aut educendis ad quatuor digitos superficie tenus detegitur terra, & radicum superficiæ fibræ excinduntur. Arborès quas colunt in vasis terreis, sunt præcipuè pulchritudinis, & aspectu mirabiles ob insignem fecunditatem.

In Salsis  
terreis col-  
antur.

Vitis stupendum, arbasculum, cubito aut sesquicubito non altiore, in vase cubito non altiori, cuius fundum palmo non latius, cum maximis Citris onustam, tantæque copia, vt plures sint fructus quàm folia. Citrii itaque, Limones, Arantii, Limonii, ponendæ in parua vasa terrea, sed profunda, cum pauca terra valdè pingui, & arcendæ à Boreali vento. Sic fructum ferent intra triennium, exceptis Aranciis, quæ diuiori liguo.

Vt autem citius ferant, inferuntur Citriis vel Aranciis potius Adami pomis, sicque ipsa etiam Arantia euadent maiora.

Vt diu co-  
feruentur

Vt diu conferuentur, tertio vel quarto quoque anno eximendæ, & tollendæ terra, secandæ radices, vt ad tres vel quatuor digitos tantum relinquantur longæ: detur terra noua, qualem aristæ diximus: diligenter præcindantur ramuli luxuriantes: arceantur à nimia siccitate & calore, & statim temporibus rigentur. Sic & bonas & diuturnas efficiet, neque spem sui fallent Agricola. Dicamus etiam aliquid de Mangoniis.

De Man-  
goniis ad-  
lorem Me-  
dicorum  
tunc  
sunt dulces

Feruntur acres medullas mutare dulcibus, si per tiduum aqua multa semina pene ad mare ferantur, vel ouillo lacte, quod præstat. Aliqui mense Februarii truncum vel quatuor foramine ab uno terebrant, ita vt altera parte non exeat: ex hoc humorem fluere permittunt, donec poma formentur: tunc foramen tunc replent, Sic quod est medium sicut dulce confirmant. Citreum & cin arbore potest per totam aëriam propemodum custodiri. Melius si vasculis quibuscunque claudatur. Si pubescens malum fictili vel vitro claudatur, per incrementa formam vasis contrahet, & tanta magnitudine, quanta vas, extuberabit. Ad hoc autem Pomum videtur incumbere: sed cauetur foramen, per quod aër inspirat, si subactò gypso pomum oblinas, noxis omnino non patebit.

Vt Saria  
figura cre-  
ant.

Vt non pa-  
teat inu-  
bit.

Vt homini  
aut aupa-  
la induant  
imaginem.

Africanus scriptum reliquit modum, quo vel humanam, vel animalis alterius induet imaginem, si gypso vel luto siccificante hanc obducens, mucronis acie bipertito, videlicet in anteriis & posterius dissecueris, vt ea iterum aptè possint coniungi, postea in fictilia posueris: cùmque pomum ad dimidium peculiaris incrementi peruenit, iis formulis clandes, diligenterque vinculis distingues, ne obuoluti pomi peractum fictiles typi diuellantur: & siue Citrium, siue aliud quoduis mali genus fuerit, breui has exprimet effigies, nec non has animalium figuras representabit, quorum & habitum & imaginem mentiri placeat.

Vt rubra  
fiunt Citria

Repositio

Si rubra Citri poma voles efficere, surculum Moro inserto, & malum rubrum dabit. De Citiorum & Limonum cultu consule etiam Iouianum Pontanum in hortis Hesperidum.

Si velis legere atque feruare mala Medica omnis generis, nocte Luna latente debebis cum ra-

mis foliatis carpere, & secreta à se inuicem disponere. Diu integra à putredine præseruantur, præsertim Citria, si reponantur loco non nimium frigidò aut calidò, in vas in quo hordeum benè excitatum. Cauendum tamen ne se mutuo contingant. Sotion rei rusticæ celebris author, iubet poma Citri subacta gypso studiosè perlini, vt toto anni curriculo, inoffensa integritate, illa omni vitio feruentur. Citria mala non putrescere promittit, quæ aceris Hordei fuerint obruta. Alii singula vasis singulis claudunt, vel gypso adlinunt, & opaco loco ordinata custodiunt. Plerique in Cedri serobe, vel in straminibus minutis, vel in paleis testæ feruant.

Vt diu co-  
feruentur

Notanda & hæc antipathia, quam Citriis accidere scribit Fracast. quod scilicet inperso in eorum cumulum pane putrescant. Attrahere enim panem eorum humiditatem, quæ de causâ fæcidiorè paulatim flaccescant.

Sed quæ vtilitas tam diligentis cultura redundat in cultorem? Maxima sanè: Nam etsi delectatio ipsa, & tam saluberrimarum arborum cultus, pro vtilitate sit habendus, vsura tamen inde diligentioribus & copiosas colentibus redit non contemnenda. Multa primum acquiruntur pecuniæ ex venditione arborum, quæ multiplicari possunt: florum Citri pro acetariis, pro condendis aceto, melle, & saccharo: florum Aranciorum, pro pretiosissima aqua Naphæ, quam vocant: fructuum immaturorum, pro conditis: Aranciorum pro globulis & corollis, quæ grati admodum odoris: maturorum pro conuiuiis, pro ægrotis & medicamentis: corticum Aranciorum pro bona sinapi confectura, & aliis conditis, vt pane aromatico, etiamque corruptorum propter succum & semina: Aranciorum seminantur, Citiorum venduntur Pharmacopæis. Solent verò Mercatores emere hos fructus mense Septembri & Octobri. Separant maturos ab immaturis. Immaturus vehunt in Germaniam, Hungariam, Poloniam, ac etiam Moscouiam, qui suam interea acquirunt maturitatem, & crudi edi possunt, in quibus locis magni venduntur. Et hæc ipsamet die [Octobr. 14.] qua hæc commentamur huc Montebelgaidum attulerunt geminæ differentie Arantia. Italica non perfecte matura, & Prouincialia suis matura: hæc citius, illa Pharmacopæi [maturiora respuentes, quòd diu feruari non possint] coemebant, dicentes maturitatem acquisitione suo tempore rectè custodita. Tum sibi futura Aurancia, cùm defuerint aliis. Maturos, quàm certissimè possunt, diuendunt Itali hortulani Pharmacariis ad condituras. Vidimus vnicam arborem Citri, satis tamen elegantem, Basileæ centum florentes diuenditam. Ipsa etiam folia quibusdam in locis venduntur, quæ cum cibis decoquant ad odoris gratiam. Denique nihil hic quòd non vile & frugiferum suo cultori, quouis modo esse possit. Scribit Calzolarius, ex vno tantum terræ iugero malorum Medicorum circa Lacum Benacum diuersi generis arboribus confito, centum & quinquaginta, & quandoque plures etiam ducatos, annuatim colonos recipere.

Iam quis vsus in Medicina, quanta commoditas, quæ gratia? Charta prius deficeret, quàm omnia persequi possemus. Fas sit tamen, institutæ nostræ Methodo satisfaciens, ex probatissimis quibusque authoribus malorum Medicorum omnium vires & vsus recitare.

Iam supræ ex Theoph. diximus, quæ sit Malorum eius Medicorum vtilitas. Diolc. malum Medicum in vino bibitur venenis resistit, aluum lubdu-

Vtilitas  
cultura

vires & vsus.  
Malorum  
medicorum  
in genere  
et specie  
& eorum  
lubdu-



subducit decocto aut succo colluto suauitatem oris facit: estur verò maximè à mulieribus contra maliciam, quam picam vocant. Arcis quoque uestiarii impostum eas ab erosione vitio vindicare creditur.

Galenò Mala medica in semine (*ἡ δὲ τὸ σπέρμα*) succolam medullam, semina ambientem intelligimus) quidem vincentem habent qualitatem acidam & siccam, vt ipsum tertii sit ordinis desiccantium refrigerantiumque: in cortice verò itidè desiccationem temperiem sunt fortita, non parum tamen habentem acrimoniæ: Proinde desiccant hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infus.

Cortex Aëtio in tertio excessu excalescit, desiccaturque in secundo. Variat tamen calor corticum pro ratione amaritudinis: estque Aranciorum ceteris calidior: Citriorum temperatior.

Porro cato Mali medici, Galenò crassi succi est, & pituitosa [id est pituitosum humorem generans] frigidaque. Nam & ipsa editur sicut & cortex. Semen omne edineptum est, tum humidum illud & acidum, de quo modò dictum, & nucleus qui in eo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet siccandique facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia denique exiccandi ac digerendi vim obtinent.

Plinio Citrea contra venenum in vino bibuntur, vel ipsa vel semen. Faciunt oris suauitatem decocto eorum colluto, aut succo expresso. Horum semen edendum præcipiunt in malacia prægnantibus: ipsa verò contra infirmitatem stomachi, sed non nisi ex aceto facillè manduntur. Item alibi: Citreis odor acerrimus, sapor asperimus. Rursus alibi: Malum execratum aliquibus odore & amaritudine, aliis expetitum, quod sanè verissimè esse, Nobiliss. matrone à Ryschach exemplo nobis compertum, quippe quæ diuturna ventriculi imbecillitate & nauæa vexata, pro remedio, quod illi opportunum & salutare (nec sine ratione & experimento quotidiano) putabamus, corticis citri vel crudi vel conditi, non aliud ei præstantius vomitorium fuit: quippe cuius vel odore solo nauæa concepta, paulò post multoties erupit in vomitum. Quod de semine ait Plin. aduersus Maliciam: id de succo potius aut cortice intelligendum, ex Diosc.

Scrap. ex Ahen: Magna vis carnis citri ad restringendum calorem stomachi: succi illitu, impetigo tollitur. Eiusdem decoctum cardiacæ confert, appetitum excitat, incidit bilem flauam & crassam, vomitum compescit, fluxumque ventris. Calorem hepatis restringit, & à proprietate quadam tristitiam abigit, præsertim eius syrupus. At succus eius pulmone nocet & nervis, propter nimiam suam aciditatem. Grana resistunt venenis drachmæ pondere sumpta ex aqua tepida, & loco infecto imposita. Ventrem etiam emolliunt.

Porro de Citri seminis temperamento sibi neutriquam constare videtur Auic. quod lib. 2. suæ medicinæ, calidum: ad in comment. de viribus cordis frigidum & quidem in tertio ordine facit. Dicendum: illum priore loco locutum de seminis inuolucro: posteriore de nucleo quem tamen non temerè frigidum dixerimus tantò minùs ordine tertio. Atiamen sic quidam euadendum censet Auicennastis, quos vocant. Alii Corticem Citri calidum dicunt ordine primo, siccum in fine secundum, in quo à Gal. dissentiant, qui temperatum dicit, aut certè temperato proximum. Monard.

sanè semen calidum dicit in tertio gradu, & commune theriacam aduersus venena, acidum verò succum frigidum & siccum in tertio: robur addere Cordi, & scorpionum, serpentumque ictibus & morsui resistere. Cum lingua in tantam molem increuerit, vt ore retineri nequeat, fricanda est citriorum acido succo, aut Malo punice, donec multa salua defluerit. Citri cortex est ex veris theriacalibus & & lætificantibus, cui accedit flos & folium, sed subtilioris sunt substantia: Caro Citrorum inflat, sed folia inflammationem compescunt. Quare cum paulò tardioris sit digestionis, facilius conditam sumere: Esti verò cortex quoque difficilius coquatur ob suam duritiæ, additus tamen cibariis cōcoctionem adiuvat. Qui citrum deuorare vult, solum comedat per se, & extra alios cibos. Qui ad colicum dolorem proclues sunt, caueant ab eius succo. Ex eodem factum Collyrium Icterus oculorum obstergit. Acidus eius succus nocet quidem sed in syrupum concinnatus, prodest gutturi & pulmonibus: subaudi, pituitoso infarctu oppressis. Incidendo enim sputum & blennam excretu faciliorem reddit. Succus acidus Citri Ictero confert, & choleram morbum sedat. Semen hæmorrhoidibus confert, in quo etiam est vis purgantia: succus corticis viperæ moribus aduersatur bibitus: ipse verò etiam cortex emplastri forma impositus.

Athen. experimento iam dudum innotuit, sumptum Citrium antè quoduis alimentum, siccum pariter & humidum omnibus venenis resistere, quemadmodum se satis nouisse scribit, à suo ciue id edoctum, cui Aegypti mandata fuerat administratio. In maleficio deprehensos quosdam ille id serpentum morsus damnauerat, quos oportebat eiusmodi bestias obici. Productis illis, & ad theatrum eurybas delinatum latronum supplicio, in via fortè euphona quædam misericordia commota, quod in manibus tum habebat, Malum Citrium dedit. Acceptum verò illi comederunt: & nautè post ingentibus ac ferocissimis anguibus oblari, commorsique ab aspidibus, nihil læsi sunt: qui tandem cum illorum custodem militem interrogasset, num quid bibissent aut edissent, vt id compertit quod acciderat, nimirum abique dolo Citrium illis traditum fuisse, postredie alteri rursus dari iussit, alteri minime: percussus hic confestim periiit, illo altero qui Citrium comederat. Indeque multis & expertis cognitū est Citriū aduersari venenis omnibus. Quod si quis Citrium integrū, & quale naturā est, cum semine, in Attico melle coquat, donec liquatum tabescat, & eius liquoris matutino tempore haustulum sumat, tutus erit à venenatis omnibus medicamentis.

Scribit etiam Theopompus Clearchum Heraclæotum Ponti tyrannum infinitos veneno sustulisse, sed longè plures, si populum præstantis Citri vis latuisset. Ex quibus patet Citrio præcipuam esse ad arcendam venena facultatem, quod ad futura, non etiam iam sumpta quidam arbitrantur: alii contrā: vt perspicuum sit amuletum, & præsentissimum contraiam ebibita. Rei veritas solo constare potest experimento.

Igitur cum vino contra venena bibitur, vel semen ipsum, præsertim verò contra scorpionum ictus, & etiam appositum, vt dictum. Per se mens es educit, sed embryonem in matrice enecare creditur. In aqua decoctus cortex, pedibus in tumore vtiliter additur. Arcet pestilentia contagia omnia quocunque modo vsurpatus. Proinde recentiores medici ad febres pestilentes syrupis ex iis confectis, præsertim ex Citrio, feliciter

Caliculi  
dolor  
Icterus  
oculorum,  
Pulmones.

Icterus  
Hæmorrhoides,  
purgans.

Historiam  
experimentum  
Citri  
aduersus  
Venena.

Aduersus  
Venena  
medicamentum.

Scorpionū  
ictus  
Menfes.  
Embryo  
Feb. pestilis.

Syrup. 4.  
ce. of. Citri  
& sic.  
Syr de cor-  
rice Citri.

vtuntur, syrupus de acetositate Citri inflamma-  
tionibus & æstibus succurrit, & valet ad omnes  
morbos biliosos, & qui aliquam malignitatem  
præferunt, & ad sitim extinguendam. Est etiam  
alter non incelebris syrupus qui è corticibus Ci-  
triorum aut Limonum conficitur, cuius vsus est  
ad cerebri & cordis affectus frigidos & pituitosas  
ægritudines. Pro quo, si desit, Citriorum condi-  
tura vti poteris, quæ & facilius stomacho obedit  
quàm cruda, ventriculūque nihilominus corro-  
borat, quamuis in cibo Itali cruda præferant, præ-  
sertim cum carnibus assatis esitata. Condiendi  
modum cortices postea docebinus.

Citriorum  
conditura.

Limonia-  
rum temp.

Limonia verò cum gustu omnibus reliquis spe-  
ciebus viri acidiora, idè succo & frigidiora &  
siciora esse probabile est. Valent ad eisdem vs-  
us, ad venena tamen, vt minus efficacia, ita ad  
astuantes morbos potentiora habentur. Et hos  
quidam comedunt, sed integra & asperso multo  
saccharo, sed neque hæc faciliè obediunt coctioni,  
quia cortice quàm ipsa Citria sunt duriore, licet  
multò tenuiore. Condiuntur & parua integra ad  
varios vsus, etiam medicinales.

Conditio.

Syrupus.

Syrupus de succo Limonum magni fit ad cal-  
culum & obstructionem renum, item ad sitim &  
æstus, in febribus ardentibus. Cordi robur ad-  
dit, præsertim verò officio ventriculi, bile qua-  
cunque obfesso: idèoque haud infeliciter imbe-  
cillitates, lipothymias, fluctuationes, vomitus &  
singultus, febribus ardentibus superuenire solitis  
curat.

Arancio-  
rum temp.

Arantia, quia diuersi sunt gustus, diuersarum  
quoque esse virium censendum: dulcia in omni-  
bus partibus excalefaciunt, cæterorum verò suc-  
cus refrigerat: acidum non editur. Paulus ta-  
men, & Aetius Antiquos succum tantum deglu-  
tere, & corticem ore solum detinere, & carne ves-  
ci solitos, scribunt. Nos verò hodie acidorum  
succo tantum vtimur ad delicias, cortice verò ad  
obsonia.

Syrup. 4.  
tani &  
condit. citri.

Tantò calidiorem corticem Aranciorum esse  
statuendum, quantò cæteris gustu amancantior  
deprehenditur. Paratur & ex horum succo syru-  
pus: & cortices condiuntur, verminantibus pue-  
ris optimi futuri, nisi amarorem respuerent. Se-  
mina quoque vt vtiliter iisdem dantur. Ex semine  
terre commisso arbusculæ primo anno prodeunt,  
quæ in acetani modum comestæ, admodum pala-  
to sunt gratæ, ventriculū in super corroborant,  
& appetitum excitant, auctore Dod.

Vermei.

Acetaria  
ex fa-  
lis.  
Pleuriti-  
dis.  
Ad hamor-  
rhoïd.

Ad acerbissimos hamorrhoidum dolores mi-  
rabile est experimentum Amati, & est tale. Aran-  
cium excautum oleo rosaceo & pseudonardi seu  
lauendulæ dictæ semine reple, & ad cineres cali-  
dos tepesactum applica, & sæpè innoua, & est  
mirum. Succus ex Aranciis dulcibus expressus,  
potu somnum prouocat, potissimum verò cum  
succo violarum in Pleuritide & similibus morbis  
calidis.

Somnus.

Florum  
Sui & qu-  
lit.

Sillastius quoque liquor ex floribus Arancio-  
rum paratur, rard aut nunquam ferè ex aliis. Aran-  
tiorum quippe flores odore primi, pomorum A-  
dani secundi, Limonum tertii, Citriorum sem-  
per vltimi, vt scribit Aug. Gall. quod mirum. An  
quia nobilior pars abit in fructum? nam & Citria  
cæteris odoratiora, si recentia. Ea multò suauis-  
simæ fragrantia, & præcipua diligentia fit Neapo-  
li & Lucæ, vt testatur Camerarius, vbi Nampha &  
Angelica aqua nuncupatur, aliis Naphæ. In offi-  
cinis & à Medicis communiter aqua florum Ci-  
trangulorum appellatur, Lacunæ de Azahar. Ad  
multa vtilis propter odoris fragrantiam. Hispani

Aqua Na-  
pha.

infantariis in graui partu propinant, maximè cum  
pauillo aquæ Pulegii. Sed in hunc vsum longè  
efficacius est oleum è corticibus confectum, quod  
& cordi amicum est, & in multis morbis vtilis-  
imum compertum. Pestis tempore, vtile est ab-  
luere faciem, manus, axillas, pudenda, aqua flo-  
rum Citrangulorum: eadem & sudores mouet,  
auctore Platero.

Partis.  
Oleum è  
corticibus.

Destillatur etiam aqua ex ipso Citrio pomo to-  
to, gustu suauis, admodum cordi & cerebri con-  
ferens, cuius vsus est in febribus putridis & mali-  
gnis cum conferua acetositate Citri.

Aqua Ci-  
tri.

Huius semina vt & Arantiorum & Limonum  
cum cortice ad 40. vel plura comesta aluum sol-  
uunt, quod & Dioscor. notauit: & Brassauola in tra-  
ctatu de purg. med. verum esse alicui.

Purganti.

Aqua verò quæ è Limonum sicut & Citrio-  
rum succo per B.M. vitreis organis elicitur, excel-  
lens est ad decorandam mulierum faciem, quæ  
plurimum vtuntur in Italia, in potu exhibitæ pue-  
ris lumbricos perimit, sed & extrinsecus vitulipi-  
pes, vbicunque sint, & totius corporis maculas  
emendat, varos delet, & acaros interimit.

Aqua Li-  
monum.  
Lucis.

Imperigo-  
s. acule.  
Febres.

Syrupis admixta in febribus acutis & contagio-  
sis mirè succurrit, id quod etiam præstat succus  
recenter expressus, vnicui pondere potus, auctor  
Math.

Flores Arantiorum sedulò decerpuntur ab vn-  
guentariis ad varia odoramenta conficienda. A-  
qua verò, inquit Dalec. quæ inde elicitur ad pest-  
lentes febres cum exanthematibus corpus obli-  
dentibus. Nam sexunciarum pondere hausta,  
putres humores ab internis ad exteriora attrahit,  
per sudores, quos valenter euocat, cordique plu-  
rimum confert. Succus Limonum ex vino Creti-  
co haustus misce calculos pellit. Alqui succum  
Arantiorum vino commiscunt, ita citius inebriare  
credentes.

Exanthema-  
mata.

Sudorificum.

Calculus.  
Ebricitas.

Potè ex historiis Nauigationum discimus ad  
Scorbutum hodie in Indiam nauigantibus nul-  
lum præstantius remedium malis Aurantiis & Ci-  
trius, vt quidam etiam solo esu crudorum diutur-  
no curati perhibeantur. Quidam cortices Aran-  
tiorum præserunt ad furfures & lendes. Mo-  
nard. Nonnulli tanquam magnum arcanum, a-  
urantiæ stillatiæ florum mali Aurantii tepidæ qua-  
drantem præbent: nam vomitum prouocat, &  
occulta facultate veneni vim extinguit. Insigni-  
ter vtile aduersus venena Arantiorum in Citro  
insettorum semen.

Scorbutus.

Furfures.

Auranti-  
orum aqua  
vomitum  
mouet.

Semen ad-  
uersus ven-  
ena.

Porta Neapol. noua sua philosophandi ratio-  
ne, vult mala Medica, potissimum Citrium idè  
potissimum ad cordis ægritudines prodesse, quod  
eiusdem figuram representet: Item quod imite-  
tur superfectiones leporum, idè eorum virtu-  
tes esse mutuas: denique quia flauū sint cortices  
Citriorum & Arantiorum, idè flauam bilem res-  
tinguere. At melièrcule, si quia flauus est res-  
tinguit cortex, ipsa eiusdem pars, quæ maximè  
flaua, maximè restringet, quæ cum sit acris &  
amara, non nobis persuadebit Porta bilem res-  
tinguere.

Porta not.

Oleum quod ex Citriorum & Aurantiorum  
corticibus exprimitur forte est, vt Auic. scribit,  
nos igne penè qualitatibus esse comperti sumus,  
quod facillè patebit ei qui corticem recentem  
iuxta candulam presserit, vt exiliant guttulæ in-  
starroris, videbit, strepitum & scintillas flam-  
meas excitari ac si puluerem sulphureum adhi-  
bisset. Sunt qui existiment eodem modo expres-  
sos cortices in oculis, clarificare visum. Sequi-  
tur quidem dolor brevis, sed mox oculi clari-  
res,

Oleum cor-  
ticum.

Claritas  
visus.



res, & visus penetrantior reddi videtur. Oleum factum ex floribus debilius est ad omnia, ex eodem Auic. quod tamen hodie ferè non est in vsu: At oleum ex corticibus Arantiorum extortum, & Citriis stillatum necandis lumbricis & teredinibus idoneum, teste Olio in Musæo Calceolarii.

Fiunt & ex tenellis deciduisque Arantiis globuli, qui vel ornatus vel odoris gratia de collo suspenduntur, quod frequens hodie in Gallia, vbi à feminis omnis penè conditionis gestantur. Scribit tamen Dalechamp. Pomorum Adami succum ad ea omnia valere, ad quæ Limonia, quâvis minore efficaciâ. Peculiariter autem valent ad Scabiem, si per medium secta, & tenuissimo pulvere aspersa, deinde cinere feruente calefacta, corpori scabioso affricentur.

Folia Malorum Medicorum siccandi discutientique vim obtinent: quamobrem variis medicinis addi possunt, vel per se vsurpari, vbi tales vires postulantur.

Palladius Rosatum fieri docet sine rosa, hoc modo. Folia citri viridia sporta palmea missa in multi nondum feruentis vase depones, & claudes, & exemptis quadraginta diebus melle addito, ad modum rosati, cum placebit, vtèris.

Restat vt modum condiendi Citria breuiter doceamus. Condiuntur autem Limones ferè integri, sed minores: Caro Citri: Cortices Citri, & Arantiorum: Arantia integra: flores Citri & Arantiorum, sed hi praualent. Citrium exempli gratia fieri conditur. Recens per longitudinem in quatuor partes sectum, mundetur ab acetolitate & semine. Cortices macerentur in aqua addito sale crasso, per dies septem: ita salis vi & acrimonia quasi constrictiones apparebunt: hinc demta omni faldedine & abluus, affundatur alia limpida & dulcis, sepe mutando, & gustando donec perfectè dulcorentur, omnisque faldedo abierit. Tum accipe mellis boni, part. j. aquæ, part. ij. eâ quantitate vt cooperiantur cortices, & in vase terreo, sed vitreato docoquantur, igni lento, horis duabus: deinde eximantur cortices & refrigerentur. Sequenti die ebullito & despumato prius molli prædicto inciantur rursus, & ferueant bullitione vna & recondantur in vasa cum suo Syrupo, qui ad perfectionem eorûd esse debet. Hunc modum præscribit Auicenna, & etiam aromata addit: habetque etiam alium modum, isto laboriosiore, cum Saccharo & melle, prius in aqua à frigore hyemis aliquandiu gelatis corticibus, quem consulat Lector, si volet. Commendat ad debilitatem stomachi, & ad iuuandam digestionem. Hodie ferè condiuntur Saccharo clarificato, cum Syrupo & absque eo: priores cortices conditi simpliciter: posteriores, Cortices conditi succi à seplasiariis appellantur, eodemque modo & Limones, & Arantiorum cortices condiuntur. Horum speciatim vsus præstantissimus ad quasvis frigidas affectiones stomachi.

Cum Monspelii ageremus, obseruauimus naues Aurantiis onustas aduectas, & multò minori pretio diuenditas, quàm vulgaris Mala. Aliquando 24. pro vno asse regio coemimus. Lugdunum quoque tanquam ad celeberrimum totius Gallie Emporium magna copia conuehantur ac inde in varias provincias distribuuntur. Quum redundat vel corrupti incipiunt: cortices detrahunt pro bellariis saccharatis: succum diuendunt in cistoribus ferici: eo enim vtuntur. sicut & succo Limonum. Huic tanta vis, vt corallum etiam dissoluat.

Succo Arantiorum scribuntur literæ occultæ, quæ igni adnotæ manifestantur. Limonum acido

succo tam elegantem purpuram conseruæ rosarum conciliabis, vt nihil supra. Variat & in eandem elegantiam conseruam florum Violarum, aliorumque diuersorum, vt quisque pro libitu experiri poterit.

Cum ego [Bauh.] iam ante 40. annos in dira & feruissima illa peste quæ Lugduni 5000. hominum extinxit, publico stipendio medicinam facerem, & frequentissimè Mala Aurantia præberem, horumque succum, tanta eorum annonæ caritas oborta, vt singula testili caritis, terena aut bina etiam non rarò aureo diuenderentur.

Vidit Ioach. Cureus Venetiis succo Limonum, <sup>Limonium succus dicitur</sup> lignum Indicum, Guaiacum appellatum, emolli, vt ex Saccharo deinde condiri posset. Idem quoque succus calculos renum potenter frangit. Antiquitas (ex sententia Manard.) non vescebatur Citro, sed odoris causa in vsu erat, & magnâ hominum curâ ex acri dulcem cibum fieri docuit. Alexipharmacâ etiam virtute pollet, quamquam Marcellus dubitet an semen, aut pomum sit: quoniam Dioscor. relatiuum, tam ad semen, quàm ad pomum refertur, sed Plinii doctrinâ monitus, tam semini, quàm pomo attribuit virtutem. Theophr. verò totam vim integro pomo assignauit, cuius vestigia Paulus secutus est: Contra omnia venena est præsentaneum remedium, & contraictus animalium venenatorum. Ad diuersas regiones propter remedi præstantiam deuenerant Citria, & cum non vescerentur propter odorem, medicamenta tantum erant in vsu, quod Plutarchus retulit & Athenæus affirmat. Tunc enim inculta erat arbor & maximam amaritudinem & acerolitatem Citria habebat, vt non absque ratione Solinus Plinii simia, miræ amaritudinis esse scribat, quod homines magna cura peruerterunt, & Constantinus Cæsar docuit: nam in ouillo lacte semina, priusquam ponerentur, maduerunt, sic autem ad dulcedinem mutata sunt. Et non amiserunt in totum suam amaritudinem, nam cortices huius primi, intensam amaritudinem adhuc possident. Non autem omnia Citriorum genera amaritudinem intensam nobis habere videntur, quinimò scribunt de Arantiis, quibus cortex dulcis in Zelim Insula.

## DE CARCAPVLI.

## CAP. XXIX.



Egressi ex Descrip<sup>te</sup> hortis & vridariis Europæis, Exotica Pomaria quoque spectemus. Primò sese similitudinis cuiusdam prærogatiuâ offert Carcapuli, quæ (autore Acoſta) vastæ magnitudinis arbor, fructum ferès Malo aureo, cui cortex exemptus sit, magnitudine & forma simplex, ex grumis omni

Cortex.  
Sapor.

conitantem, [ sed non separabilibus ab inuicem, vt in malo Aureo ] tenui, lauique & splendenti cortice tectum, non admodum sicco, colore palido, at vbi maturuit aureo: gustu admodum austero, sed quadam adstrictione grato.

Carcapuli Malabaribus, Garcapuli Canarinis, Costæ ex quo & Hist. Lugdun. habet, in appendice.

Nomina &  
Synonyma

Bry fratres in iconibus Indiarum Or. Carcapuli, inquit, in Insula Sunda crescit, fructus est suauis, magnitudine Cerasi. Ergo differt Carcapuli eorum ab hac, in eo, quod fructus dicat magnitudine tantum Cerasi: verum figura eorum quam proponunt, non multum differt ab hac.

Vires. &  
Vfus.

Eo vtuntur [ addit Acofta ] in cibis, magnaque apud incolas illius est laus in curationibus: sed inter omnes, quæ experientia comprobata sunt, primas obtinet profluuii alui cuiuscunque generis constrictio, in iis præsertim qui nimio Veneris vfu hoc malum contraxerunt. Editur verò aut ipse fructus maturus, aut eius fructus cum oxygala sumitur, aut illius exiccati puluis. Cum oxygala autem mixtus & coctus oryza, mirifice appetitum deiectum reuocat. Vtilis etiam est eius succus, & exsiccati puluis, in oculorum caliginibus & suffusionibus. Familiaris est fructus puluis obstetricibus, puerperis enim exhibere solent ad pellendas secundas, & ad purgationes, atque lactis vbertatem præstandam: tum etiam ad facilitandum partum, magnâ, vt aiunt, efficaciam. Succus eius cum aliis plantis mixtus, vngui maioris digiti pedis imponitur, eodem latere quo quis aut caliginem, aut suffusionis initium in oculo habet, vtilèmq; esse perhibent. Transfertur hic fructus sicus ex Malabar in alias Prouincias.

Appetitur.  
Ad oculos.  
Ad secundas.  
Ad generat. lactis

Partus.

Suffusio.

Locus.

Arbor.

Differentiæ.

Carcapuli fructus, teste Linschott. in Iaua ad litus Sunda crescit, aliquot intus continens lapillos. Gustu est admodum austero, magnitudine Cerasi. Ipsa etiam arbor Ceraso nostro similis est. Huius fructus, eodem authore, variae sunt species & differentiæ. Aliqui enim sunt albi, aliqui spadicei, aliqui incarnati, qui præ cæteris gustu sunt commendabiles.

#### MELO CORCOPALI: ARBOR CYDONII FACIE.

CAP. XXX.

Descriptio

Grana.

Cercopal.

Vfus

Corcopal Indiarum Prouinciæ est, in qua Cydonii magnitudine & foliis arbor prægnantem gerit fructum, Melonis figura, eodemque sulcatum modo. Intra quem terna quaternave grana acinorum vix facie, acore Cerasi. Melo hic & edendo est, & ad medicinas vtilis.

Theuetus in Promontorio Comari fertilissimo tradit arborem Malo Cydoniæ magnitudine & foliis similem, cuius fructum *Corcopal* vocant, esu gratissimum, gustu suauissimum, quo etiam ægrotantes vtuntur, quia prauos humores per aluum expurgat. Hist. Lugd. Melocorcopali Scaligeri vocat. Verum considerandum relinquimus an hæc arbor non sit eadem cum prædictis.

#### ARACYNAPPIL, AVRANTIIS PARVIS SIMILIS FRVCTVS.

CAP. XXXI.

Descriptio

Inter fructus Exoticos Ill. C. V. Virt. fel. record. Stutgard. 1708. fuerunt duo fructus vterque

perforatus, transmissumque filum, appendebat scheda, cui erat inscriptum nomen manu D. Paludani *Aracynappil*, quod si non fuisset appensum, ego nihil aliud iudicasset, quam parua mala *Auraatia*, sunt enim eo modo orbiculares rugosi & nigricantes, sapore eodem. Maiorem referuau, minorem reliqui Ill. Principis.

#### AVRANTIO SIMILI FRVCTV ARBOR.

CAP. XXXII.



Palmaris [ teste Clusio Exot. ] ramulus anno 1595. vifus apud C.V. Paludanum, è regione Nigritarum allatus, quadrangulus, rugosus nodis distinctus fragilibus, bini semper ex aduerso innascebantur huic ramulo furculi, sustinentes breui crassoque petiolo fructus è calyce veluti quatuor squamis cõstante prodeuntes, vncialis vt plurimum magnitudinis, orbiculatæ formæ, rugosos, nigros, instar Aurantii parui reficcati: intus plenos fungosâ quadam pulpâ [ cui commixta parua nonnulla grana penè vt in ficibus ] adstringentis initio saporis. Nulla porro in eo ramulo foliorum vestigia apparebant, vt dubitari possit an hæc arbor ex illarum sit numero, quæ pediculo siue ramulo *apil* suos flores & fructus profert, vt aromatici caryophylli.

Sarculi.

Fructus.

Sapor.  
Pulpa.

#### FRVCTVS BRAS. OVALIS FIGV- RÆ INSTAR LIMONIS.

CAP. XXXIII.

Fructum ex Brasilia allatum asserebat Paludan, vt testatur Clusius Exot. l. 2. c. 7. penè ovali figura, instar mali Citrii seu Limonis. Superina tamen parte magis mucronatus, tres vncias longus, eius ambitus sex vnciarum erat: duro lento tamen cortice præditus, intus verò pulpa nigra continebatur, quæ propter vetustatem in pollinem prorsus resoluta erat. Cæterum hunc fructum lectum fuisse arbitror, antequam maturitatem adeptus esset, quandoquidem rugoso erat cortice, plerisque locis veluti in lacunas contracto.

Descriptio

#### CITRA INDIS LIGNVM.

CAP. XXXIV.

Frustula olim ad nos misit Coldenbergius, ligni arboris, quæ *Citra* Indis nominetur, pecti-

Descriptio  
nibus



nibus contexta Faginis, transfueris micis interlucentibus, odora, colore subrubente, sapore non-nihil aromatico, cum quadam falfedine, quam accidentatiam suspicamur.

Idem Coldenbergius disquirendum proposuit, num esset Veterum Citrus arbor, qua mense parabantur, de qua nos infra suo loco. Huius verò odor & nomen hunc locum flagitabat.

## PIRI FACIE AGNACAT.

**I**n ea India provincia, quæ sub terra Laboratoris est versus Isthmum Dariem, arbor est Pyri facie & magnitudine perpetuo folio viridissima, nitidissimaque superficie. Fructus quoque Pyri specie, sed colore viridi, etiam cum maturus est, medulla intus concolor, dulcis, pinguis, butyri sapore. Validos ad eum efficit ad coitum, ut propius miraculo sit eius efficacia. *Agnacat* illi nomen est. Scalig. exerc. 135.

## MANGOSTANS.

CAP. XXXV.

**I**nter celeberrimos fructus India recensent incolæ quendam *Mangostans* nuncupatum, gustus suauitate commendabilem. Eum exigui mali aurei magnitudine esse ferunt, cortice cinereo, [alii è viridi nigricante] pulpâ, quæ Malorum aureorum pulpæ similis sit, sed quæ cortici non adhareat. Nascitur hic fructus in pusilla arbore, Malo vulgari simili. Foliis est Laurinis, floribus luteis. Hunc fructum dulcissimum esse perhibent, non tamen adeo ut sua dulcedine nauseam moueat. Garcias & Clusius.

## MOGORI FLORES, ODORIS

FLOR. MALI AUREÆ.

CAP. XXXVI.

**C**lassi suæ quoque debentur, quæ respectum & cognatione habent. Tales sunt flores Mogori dicti Indis Mali aureæ floribus multo odoratiores, quorum stillatitius liquor eundem apud istos vsum obtinuit, quem apud Hispanos florum Mali aureæ aquæ.

## CHAMPE FLORES INDICI.

CAP. XXXVII.

**E**t quoniam florum incidit mentio, dicantur & hi: quorum in Indiis magnus vsum, Champe vocantur, odore grauiori quam Liliū album, ex eodem: qui forma aut stirpem cui innascitur non describit. Sunt verò odoribus adeo dediti illius regionis incolæ, ut plerumque cibo abstineant, quod habeant unde odores sibi comparare possint: idèoque non immerito, inquit Garcias, proniores in venerem esse censetur. Munera quæ à tenuioribus offerri solent Regibus, prædicti sunt flores, & Ros nostrates, quibus solent cubacula Regis inspernere.

## TIANCHE FLOSCVLI INDICI.

CAP. XXXVIII.

**F**losculi autore Clus. Exot. delati per Batauos ex navigatione prima in laurum, qui in arbore nati essent, an in aliqua alia planta me latet: sed charta, in qua inuoluti erant, *Tianche* inscriptionem habebat: candidus ne verò an flauus fuerit flos, dubium, nam ex rescicato difficilis erat dignotio, præsertim tam breui momento pereunte natiuo colore: calycem autem habebat è quatuor veluti squamis compactum & breui petiolo præditum, in quo flos erat quatuor foliis longioribus & calycem superantibus constans, angustioribusque quam calycis squamæ, decussatim compositis, protuberante in medio umbone, ut in malorum aureorum & citriorum floribus: odor [si quem habuerat] euanidus, quemadmodum & sapor, propter ficitatem: ab incolis tamen in aliquem vsum adseruatos fuisse, verisimile est.

Descriptio

## ARBOR VIOLARVM INDICA.

CAP. XXXIX.

**A**rbor est Indica, & flores fert, exoticis itaque, coronariis accensenda, ex Garcia. In India Pharmacopolæ Violarum loco vtuntur floribus cuiusdam Arboris diuersæ planè facultatis à nostris violis, quorum tamen vsum non admittit Garcias, nisi in iis medicamentis, quæ foris applicantur. Syrupum verò violaceum eorum loco confici iubebat è violis conditis ex Ormuz aut Lusitania delatis. Plura de iis nondum comperrimus.

vsum  
succedaneum.

## DE BELI SEV SIRIFOLE BENGALENSIVM: CYDONIA EORVM-

dem Garcie.

CAP. XL.

**F**ructuum ita Bengalensibus dictorum arbor, est magnitudine Oleæ, aut amplior, foliis Persicæ mali eiusdemque odoris, floribus paucis & statim deciduis: fructu perinitia tenero, colore ex viridi nigricante, cortice tenui, magnitudine exigui Mali aurei: sensim verò maturefcens fructus auctior fit, donec plenam iam maturitatem consecutus, in Cydonii mali magnitudinem euadat. Cortex autem densatur, exiccaturque, & indurefcit, veluti putamen Nucis Indicæ, quam Coccum vocant. Garcias.

Descriptio  
Folia.  
Flores.  
Fructus.

Appellauimus, inquit idem, hunc fructum Lusitanica Lingua, *Marmelos de Bengala*, id est, Mala Cydonia è Bengala: quoniam saccharo condita primum ad me perlata sunt è Bengala, cum hac inscriptione: Vitilia sunt aduersus alui profluvia. Ceterum legitimum huius fructus nomen tum in Bengala, tum in reliquis, ubi prouenit regionibus, est Sirifole & Beli: Sirifole quidem nomine vulgo cognitus est: Beli verò appellatione medicis duntaxat, qui in suis scriptis hoc vocabulum sese inuenire aiunt. Intellexi autem ab amico qui frequenter in proximas sylvas venationis causâ excurrit, hunc fructum non modò in Bengala nasci, sed eius multas arbores in continenti huius provincie inueniri. C. Durante quoque Mal-

Nomina  
synonyma:  
*Marmelos*  
*de Benga-*  
*la*  
*Mala Cy-*  
*donia.*  
*Alui pro-*  
*fluvia.*  
*Sirifole.*  
*Beli.*  
Locus.

*Crissif. os.* melos de Bengala, Benificios & Cotognos Ben.  
galenses vocat.

*Vires & vrus.* Fructu maturo pulpa sue medulla eximitur,

quam in taleolis sectam saccharo coniunt. Aut  
tener adhuc & immaturus nuria adseruatur in v-  
sum. Solent Guzaratenses Medici uti hoc fructu

tenero adhuc & immaturo, aceto vel saccharo  
condito, in inueteratis alui profluvii sisilendis:  
adstrictionem enim illam semper conferunt  
tamen maturi. Retulit mihi: [Garcia verba sunt.]

clarissimus vir Dymas Boique, Valentinus Me-  
dicus, rei herbarie peritus, se, cum castra illustr.

Principis D. Constantini in India pro Rege se-  
queretur in Isanapatan, magno & admirabili  
successu vsum esse in profliganda dysenteria, quæ  
vniuersum eius exercitum affligebat, cum ad ma-  
num non essent visitata remedia. Etenim nunc ex

huius fructu & saccharo, miuam parabat, quam  
ægris daret, nunc pulpam eius emplastri modo  
ventriculo & aluo applicabat: modò pulpam  
saccharo exceptam, ut in Cydoniis solet, ægris  
exhibebat: interdum fructum assum in persico saccha-  
ro: nonnunquam cortices exempta pulpa deco-  
quebat, atque id decoctum per clysteres iniicie-  
bat. Similem verò effectum præbebant, qualem  
balauftiorum aliorumque adstringentium medi-  
camentorum, quibus ut solemus, decocta præsta-  
re solent.

*Dysenteria.* At silentio prætersundum non est, quod ead-  
em castra sequenti contigisse refert. Dederat  
Seruo Aethiopi bina eiusmodi Mala assanda, ut  
euidam militi dysenteria laboranti edenda præ-  
beret: verum dum assantur, creperunt: itaque  
pulpam Aethiopis faciem, pectus & brachia sic ad-  
fudit, ut puluere tormentario vtilatus videretur:  
quod contigisse puto ob pulpæ lentorem & visci-  
ditatem simili & adstrictionem quæ seculi accen-  
sa vehementius vrit, quàm si sicca aliqua materia,  
quemadmodum ferrum incensum magis, quàm  
lignum aut stupam vire videamus.

#### ARBOR FRVCTVM MELONIS FACIE PROFERENS.

##### CAP. XL.

*Descriptio.* Celsa hæc est Arbor, in Insula S. Mariæ Indica  
proueniens, ex qua crescunt fructus, Melo-  
nis facie, cortice duro atque lignoso, plurima in-  
tus continens grana, viscida, lata, aluum ciencia.  
Linschott.

#### GVAYAVA INDICA; FRVCTV MALI FACIE.

##### CAP. XLI.

*Descriptio.* GVayanas fructus, inquit Monardes, quem  
Indi & Hispani ita vocant, arbor est me-  
diocritas magnitudinis, ramis sparsis, folio Lau-  
tino, flore candido, Auræ mali floribus simi-  
li, aliquantò tamen maiore, odorato. Facile  
nascitur quocumque loco feratur, adeoque lu-  
xuriat & serpit, ut in terra vitiorum numero  
habeatur, nam plurimorum agrotum gramen  
quod depasturum essent greges corrumpit, nimio,  
vbi Rubi, implexu. Fructus nostris Malis simi-  
lis est, eorum magnitudine, quæ ab Hispanis Ca-  
muefas vocantur, viridis initio, & per maturita-  
tem aureus, pulpa interiore alba, interdum etiam



si notam habuisses. Est enim arbor, tunc fru-  
ctus, Mali facie: sed color fructui candus, in  
quo semen nigrum, minutum, rotundum, exiit  
ipsum ex illarum natura.

Considerandum quantum differat etiam ab  
his fructibus, Mespilum Indicum Scalig. de quo  
ait: Corcopal Indicæ Prouincia est, in qua Mespil-  
um colore a bo, Mali magnitudine. Quicquid et-  
iam quadam describitur, quæ eadem videtur cum  
Guaiava, ut & Hist. Lugd. censet.

Varia, inquit Gomara, Guayauanos genera, ea-  
demque varietas est in fructu, qui plerumque  
Pomis Hispanicis, Camuefas appellatis, similis  
est, modò rotundus, modò alia forma, omnino  
viridis, foris coronatus ut Mespila, intus albus  
aut rubescens, in quatuor partibus diuisus quem-  
admodum Iuglandes, & in singulis partibus multa  
grana continens. Maturus s. pidus est, immat-  
urus verò asper & adstringens Sorborum modo.  
In nimium maturo color perit & sapor, vermef-  
que generantur. Clus. scribit Guaiava arboris  
ramulum ad semisisse eruditissimum Simonem de  
Touar, addito ipsius arboris fructu, sed profus  
rugoso, & vtilis putat, immaturo, quem pluribus  
describit.

Idem Clus. apud Garciam. Fragosus tradit in  
sua Rhaphodia [ & alii ante eum ] in Guatimala  
fructum nasci Guayauas ab incolis nuncupatum,  
non minus adstringentem, quàm prædicta Cy-  
donia Bengalenfis, eumque ad similem morbum  
[nempe dysenteriam, qui in colis eius regionis ad-  
modum familiaris est] propinari solere, sed prius  
tostum.

Petrus Martyr de rebus Oceani & noui orbis  
tradit Guaiavam Darienses colere, arborem quæ  
fructum ferat Citriorum generi, quos vulgò Li-  
mones appellant, simili sapore, acri, dulci com-  
mixto. Dubitamus an Scaligeri sit Guaiava, quòd  
minutum semen dicit in sua: An fortè eiusdem  
Mespilum sit album, iam supra dubitatum. Gua-  
yauos Gomar. Guayauas Monar. Guaiabos M.  
Fumece. Guaiuanus Benzoni, qui arborem tradit  
Persici aut Armeniæ specie, foliis ut Lauri, sed  
crassius & longioribus, celeritè senescere.  
Fructum eius Mespili similitudine, sed multò cras-  
siorem, pendente in arbore maturefcere, nisi  
maturus decerpatur, vermes gignere. Hos fru-  
ctus multa semina & grana claua habere. Pur-  
pureos candidos præstare, & optimi saporis  
esse.

Linschott. refert, crescere in Insula Iauæ, S. Ma.



rix dicta, fructum quendam nostris Pomis similem, colore aureo, lapides intus continetem qualis Mespilorum.

Hist. Lugd. bis habet locis diuersis. Primò sub nomine Guaiava Scalig. secundo in app. nomine Guaiuas Indorum & Hispanorum.

Vulgaris est pet totam Indiam: fructus tam Indis: quam Hispanis celebrati.

Fructus edi solet, prius dempto cortice palato gratus est, sanus & facilis concoctionis. Viridis in alui profuonis utilis est, nam valdè adstringit. Præmaturus alium soluit, At medius, hoc est, neque immaturus neque præmaturus, si assetur, valentibus & ægris confert: nam ea ratione paratus sanior est, gratiorisque saporis. Præstantior autem is est, quem domestica & cultæ arbores ferunt. Foliorum decocto Indi vultu tumentia crura laniant: eodem Lienis obstructions tolluntur. Fructus frigidus esse videtur: Propterea febricitantibus assatus datur. Monardus.

## DE GVANABANO SCALIG.

## CAP. XLII.

**G**uanabanus, qualem vidimus apud Ill. nostrum Princ. V virt. fructus est Cucurbitæ forma, cubitalis ferè longitudinis, pugillaris crassitudinis, cuius cortice Cucurbitino minimum durò detracto, medulla in conspectum se dat, ex albo tantillim pallefcens, non ingrata aciditate prædita, in puluisculum vetustate fatiscens, cui semina immerguntur pertinaciter hærentia, turgidula, renum figuram imitata, cortice si vngue radatur obducta nitidissimo, coloris nigri, quibus nucleis insunt candidi, callosi, saporis strobili dulcis, tenui pellicula obuoluti. Cæterum grana adhuc medulla inuoluta, filis appenduntur tenuibus, quanquam semina sola nequaquam obseruimus fibrillis annexa.

Arborem, inquit Alpinus de Baobab, quæ hos fructus fert, vidi in quodam vicinariorum, foliis magnitudine ac figura Arantis valdè similibus.

Scalig. ait suam Guanabanum arborem Pini stipite, proceram, folio magno, oblongo. Fructum Melonis magnitudine, Cortice coloris viridis, splendore Cydonii, digitalis crassitudinis: Carnem intus candidam, dulcedine lactis coacti, semina continere fæseolea.

Bern. Paludanus, Medicus insignis, & omnis naturæ sine æmulo persecutor sagax, fructum hunc misit Ill. E. C. V virt. cum hac inscriptione: Guanaban, Alpino dictus Baobab. Alpinus etiam Bahobab dicit tradit, fructum magnitudine Citri.

An Cucurbita arbor Petro Martini lib. de reb. ocean. & noui orbis de qua ait: In Xaquara habet cucurbitæ arbores ad potus ferendi vsum. Eas vocant H-buero. Benzo [inquit] in Nicaragua, quæ Cucurbitæ specie à certis arboribus per omnem Indiam enascuntur: in salationibus gestant cucurbitam lapillis plenam.

Tradit Osorius in sua Hist. Portug. Brasilienses piscatores pellere pisces in magnas cucurbitas causas. Brasilianorum diuinatores ferre cucurbitam cui facies humana: imponere ignem: herbarum vaporem excipere naribus, vnde quasi e-bui reddantur. De qua re vide plura in historia Nicotianæ. Considerandum verò an illæ cucurbitæ ad Guaiabanum sint referendæ.

Scaliger Guanabanum vocians, Cardanum Tom. I

reprehendit, quòd non in duodecimum librum cum Mammei fructu retulerit: item quòd eius pulpa liquorem appellarit, fædo errore.

Gesnero. *Guanabanus fructus* forsan Scaligeri Coldenbergio. Scaligeri Guanabanum dicunt Lobel. Hist. Lugd. Scholasticæ historiæ arom. Ind. *Guanabani medulla & semina* Clusio, Ico. Plant. Idem Clus. apud Garciam, *Guanabanum* inquit, cuius meminit Scal. puto esse eum qui superioribus annis ex Aethiopiæ Mozambique Antuerpiam allatus est, fructus crassus &c.

Huic simillimum fructum describit Theuet. c. 10. lib. singul. America, foliis tamen ab hoc diuersis. Sed & alium fructum apud Canibales Theuetus & alii tradunt, cuius historia non malè nostro (inquit Clus.) fructui quadrare videtur. *Marakæ & Tomarakæ* nuncupant de quibus nos posita.

An M. Fumee hist. gen. Ind. Gallicæ: Cucurbitæ in Nicaragua quæ maturescunt 40. diebus, quarum magnus vsus viatoribus ad ferendam aquam?

Porro Guauabanum ab Ill. nostro Principe E. C. V virt. cum aliis quibusdam exoticis dono accepimus. Item à Peritissimo stirpium Robino hortulano Regio, Lutetiâ. Alpinus scribit in Aethiopia nasci. Seuius aliquoties, sed frustra. Clus. tamen ex tatis plantulas foliis Laurinis similibus Antuerpiæ produisse scribit, quæ tamen subiequente hyeme perierint.

Bahobab fructus, Alpino, recenter ab arbore excisus, gustui admodum gratus est, in Aethiopiæ inflammatis locis, acido sapore, quem contemperant diuites saccharo: sitim valenter extinguit, multumque refrigerat. Ibi eo vtuntur ad omnes calidos effectus, febrileque omnes putridas, præcipueque ad pestilentes, tum eius pulpa cum saccharo comedentes, tum succum expressum cum saccharo potantes, vel ex eo paratum syrupum accipientes. Cayi etiam quo loco recentes fructus non habentur eius pulpâ in puluerem redacta vtuntur, quæ est veluti terra rubra, adstringenti acidoque sapore, gustum ferens qualis in terra Lemnia obseruatur: estque apud multos familiarissimus illius vsus ad pestiferas febres, tum ad sputum sanguinis, ad Lienteriam, Dysenteriam, cruentumque hepaticum fluorem, nec non ad vteri menses firmandos. Alii eiuscæ terræ in subtilissimum puluerem redactæ drachmâ cum aq. plantag. dissolutam, ad eadem exhibent, alii decocto, alii infuso vtentes. De eius succo eadem ferè scribit Paludanus in suis obseruationibus.

ABAVVS AETHIOPICVS FRV-  
CTVS BELLO.  
CAP. XLIII.

**F**ructum quemdam peregrinum nomine Abatio famicus Cayro misit è Zeila Aethiopiæ emporio, extra Erythraum mare sito allatum: magnitudine mali Citrii mediocris, denso duroque cortice vt Cucurbita vestitus, nullis excurrentibus sulcis, sed tantum extremâ eius parte mucronatâ, quâ arbori adhæret pediculo crasso & firmo, sulcorum rudimentum cernitur, in quibus lanugo quædam inest, quemadmodum in Cydoniis malis videre licet, reliquo corpore læuis: alterâ non in mucrone, sed in obtusam rotunditatem desinit, vt primo aspectu Cucurbita sicca appareat colore fusco: pulpa continet subrubram, friabilem, vt faciliè in pollinem resoluatur, acidam, ori gratam, adstrictionis expertem, per quam sparsa sunt semina renibus animalium similia, seminum An-

Locus

Marakæ  
TomarakæCucurbita  
arbor.Locus &  
Tempus.Vires &  
Tempera-  
mentum.

Syrupus

Pulvis.

Sputum  
sanguinis  
Lienteria  
Dysenteria  
Menses.Correa  
Cucurbita

Lanugo.

Pulpa.

Semina


K

gyridis æmula, duro cortice, qui rubente quadam membranâ tegitur, quâ dempta, semina fusca, ad nigrum inclinantia, & splendentia cernuntur, intus medullam albam continentia, edulem, Avel-lanæ gustu: verum semina ex umbilico fibrâ non suspenduntur [licet per pulpam multæ fibræ rectæ excurrant] vt semina fructus, quem tu Clusi [inquit Honor. Bell.] Guanabano Scaligeri similem ex Mozambique allatum spectandum proponis. Conuenire autem multum mihi videtur cum fructu, quem Guanabano similem ex Theueti America describis folio Fici: sed hic longè minor est. Affinitatem etiam habet cum *Bahobab* ab Alpino de scripto partibus internis, sed forma differt: nam *Bahobab* vtrinque mucronatus est, pulpamque continet [vt ille scribit] non acida tantum, vt hic, sed adstringentem Lemniæ terræ instar, quæ nota in hoc desideratur. Plantæ ex semine enatæ descriptionem graphicam secundum omnes eius partes habet idem Honorius Bellus ex quo petenda.

Differentia  
inter A-  
baviam &  
Bahobab.

## BAOBAB, SIVE ABAMI CLVS.

## CAP. XLII.



*Bahobab.*



*Alpinus  
not.*

Descript.

Hic autem quem à perito p[er]itore exprimi curabam, maior eo quæ exhibet videbatur, vt qui pedem Romanum longus esset, decem & sex vnciis in ambitu crassus, sulcis quibusdam, sed vix

apparentibus, secundum longitudinem distinctus, iuxta pediculum minus crassus, & in extimo mucronatus, cortice denso & crasso præditus, fragili tamen, si nimium comprimitur, & breui quadam lanugine, seu flore virescente [nisi ubi deterfus erat] obfuso, triunciali pediculo, interdum tamen [quemadmodum in alio fructu longè meo minore obseuabam] cubitali, crassitudine digitali, valdè fibroso. Multos habebat hic fructus interna parte neruos, ab infimo, siue à parte quæ pediculo inhaerarat, ad summam fructus partem excurrentes, & fibras in latera sparsas, inter quas pulpa siue substantia satis friabilis, alba, gustu acido, in qua latebant semina exilium renum formam referentia, duro fuscòque putamine tecta, nucleo albo, non ingrati saporis, prædita: sed & tenues quadam fibræ veluti cincinni per albam illam pulpam sparsæ erant, etiam nonnullæ ipsorum seminum umbilico inhaerebant, vt ex eis suspensa viderentur, quemadmodum in binis aut ternis huiusmodi fructibus obseruabam. An verò substantia illa siue pulpa quam continet, humida sit dum recens est, vt Alpinus suo *Bahobab* tribuit, me latet, siquidem nullum recentem fructum conspiceret mihi hætenus contigerit: certè rubram esse non arbitror, cum in binis quos habui fructibus candidam & valdè friabilem reperirerim: verum quidem est, in vetustis magis fuscam esse, qualem in eo fructu quem C.L.V. Honorius Bellus *Abauo* nomine ad me postea mittebat, deprehendebam, sed omnium pulpa vt est friabilis, non lenta, sic etiam acida est. Itaque nihil mirum, si Æthiopes vtuntur ad extinguendam sitim, sitque utilis ad ea quæ Alpinus c. de *Bahobab*, lib. de plantis Ægypti tradit.

Pulpa  
ad  
sem  
v  
b  
sim

Ad sitim

Alpinus  
fallitur

Terra  
Lemniæ

Folia.

Sed in eo quod pulpæ saporem, quem ipse acidum fatetur, cum tenax Lemniæ sapore comparat, fallitur, meâ quidem sententiâ: adstringit certè illa habetque omnes eas facultates quas ipse illi tribuit, aciditatem tamen nunquam in illa deprehendi, tametsi selectissimum, ab aliquot Cæsareis Legatis, quos Turcarum Imperator, tali munere atque aliis, finitâ legatione discedentes prosequi solet, dum in Cæsaris aula viuere aliquoties acceperim, Augerio Brlbequoio videlicet, Cardo Rimio, Davide Vngnadio, & Sifuido Praynæo Friderici, [qui suæ legationis tempore Constantinopoli obiit] fratre, cum eius sarcinas recepisset: nec etiam villam adstrictionem in huius fructus & *Abauo* pulpæ percipiebam. Cuiusmodi porro foliis sit prædita illa arbor in qua hic fructus natus, ignoro: diuersa tamen esse ab iis arbitror, quæ Alpinus suæ *Bahobabifera* arbori tribuit & adpingit, nisi recens semine natam conspexerit. Nam Bellus *Abauo* plantas habuit semine natas, vt ex quarta epistola ad me data, apparet, quarum prima folia mali quidem Citrii foliis similia fuisse scribebat, nullo pediculo subnixâ, at ubi caudex pedalem altitudinem nactus fuisset, in ramos spargi cœpisse, foliaque adquisiisse longiore pediculo prædita, & illa non singularia, sed initio bina, deinde terna, quaterna, & tandem quina ex eodem pediculo prodeuntia, quemadmodum in Pentaphylli, Lupini, Castanæ equinæ foliis videre licet, quorum medium folium reliquis maius est, deinde illi vtrinque proxima, reliquas notas ex prædicta eius epistola petere ne sit graue.

Et sanè, eius *Abauo*, ab hoc, quem exhibeo, fructu differre non arbitror, tametsi is quem illa appellatione ad me mittebat, extinam partem non mucronatam vt meus sed obtusam haberet: pulpa



pulpa tamē præter colorem [quia fortē vetustior] similis substantiæ, friabilis, & semina prorsus similia nec dissimili nucleo prædita: eius autem longitudo vncie octo cum semisse, crassitudo vncie duodecim.


Sed alium eiusmodi fructum, quadriennio aut quinquentio post à iam dicto Careto accipiebā, cuius longitudo vncie decem, crassitudinis ambitus vncie nouem duntaxat, vt etiam in eadem arbore fructuum magnitudo sæpe dispar: hic pulpa omnium candidissimam habebat, semina aliis similia pleraque [pulpa attrita & in pollinem comminuta] ad umbilicū à fibris dependentia.

Similem præterea fructum apud amicum conspicebam ē Gorgadibus anno à Christi natiuitate 1600. allatum, & à Lusitanis istic habitantibus, vt intelligebam, Calabacera appellatum, propter similitudinē quā cū cucurbita habet, sed is minis crassus erat illo, quem propono, & graciliore mucrone præditus, non dissimilis illi qui in scholio ad caput 2. lib. 2. Historiæ aromatatum Garcie ab orta pro Guanabano Scaligeri fortē positus: pediculi autem longitudo binos pedes Romanos æquabat.

An porro affinis non est fructui eius arboris cuius Theuetus cap. 10. lib. Singularium Americæ meminit his verbis: Tres sunt insulæ ad Aethiopum promontorium, Caput viride vulgò appellat, in quarum vna, arbor inuenitur folio nostratis fici (an rectè obseruari foli formam nescio) fructu Cyprii cucurbitis haud absimili, duorum fere pedum longitudine, & crasso. Nonnulli eo fructu videntur vt Melonibus: continet verò semina sibi magnitudine, leporinis renibus similia. His quidam simias alunt, alii monilia ex iis collo aptanda faciunt: siccata enim & bene matura aspectu pulcherrima sunt. Ceterum Abauo folia, quæ in plantis semine adquisitis, sibi nata, Bullus cum fructu ad me mitebat, in adposita tabella exprimerda curabam, singularia, gemina, quina, & illa quidem contractiore formâ, quàm natiua quæ accipiebam.

## SAMACA.

CAP. XLIV.



rem hanc eidem descriptionem tantisper subire placuit, donec aliquid specialius de eadem addicamus. Folia sunt arboris ludæ foliis similia,

Tom. I.

quinque, sex, septem, plus, minusque ramis hærent, ad quorum exortum flos singularis breuissimo pediculo hæret, quadrifolius. Succedit fructus instar Cucumeris, sed ventriosior. Alpinus habet iconem satis similem plantæ nomine Babab, de qua nos cap. de Guanabano egimus. Samacæ tamen folia rotundiora.

## ARBOR CUCURBITIFERA.

FICUS NIGRITARVM.

CAP. XLV.

In insula quadam inhabitata, prope Caput viride dictum, arbor quædam crescit, folia habens no-



stratis Ficus similia, fructum longum, bipedaneum, antea dicitur, crassum ad proportionem, vt ad magnas longasque Cypri Cucurbitas accedere videatur. Quidam hunc edunt, haud secus ac nos Melones nostros. Intus semen est, reni leporino figuræ simile, magnitudine tabæ: Theuetus de Francia Antartica. Hist. Lugd.

Descriptio  
Folia.

Fructus.

Semen.

Synonyma

Ficus Nigritarum Theueti in Americæ singularitatibus, & Cosmographia: cui arbori similis fere, sed folio valde diuerso. Quidam Higuero. Eadem cap. de Guanabano Ouiedi, hanc Guanabano Scaligeri simillimam dicit, foliis tamen diuersam: eademque & Clusius dicit, ante ipsam.

Quidam auctore Theueti simias hoc fructu nutriunt: alii ex eo probè maturo ritèque siccata monilia collo appendenda faciunt, præcipuè elegantia.

Ficus Nigritarum.  
Higuero  
Guanab.  
Scelig. f. milia.  
Vjus.

## HIGVERO OVIEDI.

CAP. XLVI.



Higuero Oviedo arbor est prægradis, veluti Morus nigra fructu ferens Cucurbitæ rotundæ, interdum verò oblongæ similem. Ex eo patenter & alterius generis vasa cōficiunt. Materie est robusta, atque apta sedibus, sublellis, ephippis aliisque operibus fabricandis: Mali etenim Medicæ aut Punice

Descriptio

Fructus.

Vjus.

Materie.

K 2

# HISTORIAE PLANTARVM:

materiam esse dicetes: cortice facile deliberatur. Folio est longo, angusto, per extremum latiore, à quo ad pediculum usque paulatim angustius fit. Indi nonnunquam prae aliorum fructuum penuria hoc vescuntur, hoc est, eius carne, quae cucurbitae carni, cum adhuc viret, similis est. Corticis color & forma cucurbitae. Maximus eius fructus libram aequae continere potest. Minimus verò pugnum non excedit in magnitudine. Vulgaris est haec arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & Indiae Americae continente.

In hac tabella exhibetur vna Mamei arbor, de qua dicebamus H. a. g. lib. de q.

## CHIVEF THEVETI.

### CAP. XLVII.

Descript.

**N**igritarum sicuti similiorum, [ ut scribit Hist. Lugd. ] non tamen eandem, memorat Thevetus. Fructus a. h. in Insula Zipangu provenit, magno Meloni par, cui nomen *Chivef*, quod Syriacè Frum significat. Suavissimus est, cum manditur Manna modo in ore liquefcens. Semina intus continet, qualia in cucumere nostro reperitur, cortice cum maturuit croceo, folio arboris eximie vici, exquisitè rotundo, aureo numero Gallico pari.

## ANON OVIEDI.

### CAP. XLVIII.

Descript.

**A**non Oviedi arbor est, cuius fructus magnam cum *Guanabano* similitudinem habet, eum forma, tum carne & semine. Sed & ipsa Anonis arbor *Guanabani* arbori similissima est, cum magnitudine tum forma & folio. Duabus verò in rebus differunt: primum quòd huius fructus minor sit *Guanabano*, corticis color luteus, qui in *Guanabano* viridis est, deinde, quòd meo quidem iudicio gravior sit palato Anon, quàm *Guanabano*, utpote firmiore carne. Vtrumque magno in pretio habent Indici Americi, & diligenter in suis praedibus colunt. Ex Oviedo.

Locus.

Clusio Mangas plus similitudinis habet cum Anon Oviedi: Latama eiusdem.

## CHOYNE AMERICANA.

### CAP. XLIX.

Descript.

**E**st Americana Morpionem regionem incolentibus arbor, ipsorum lingua *Choyne* dicta, fructum ferens magnitudine mediocri citrulli, formà oui struthiocamel: folia Launni similia: Thevetus.

Locus.

Leius eadem de hac arbore & fructu tradit, & addit fructum esse magnitudine capitis infantis, non edulem, cortice duro, quem perforant, & ex eo faciunt instrumentum, eis dictum Maraca, & pterea ad potandum, utque vascula.

Vitus

Clusius fructus huius apud Canibales à Thevetis & aliis traditam historiam, non malè *Guanabano* quadrare videtur tradit, praesertim si interiora, quae à nemine [ inquit ] describantur, de mas: idcirco num semina contineat Phaeolacea ipertum: ipsa arbor folio Lauri est: fructum

excautum Mayzo aliisve seminibus aut lapillis replent: Maraka & Tamaraka nuncupant. Arborem Hist. Lugd. *Choyne*.

Nomi

Frequens est in regione Americanorum, quam Morpionem vocant.

Fructus *Choyne*, auctore Thevetis, non est odul, quantumvis aspectu elegans. Americi, praeterquam quòd ex eo pocula conficiunt, ad praestigias minificas utuntur. Excautum enim fructum repletum semine Milii, aut aliis, bacillo affigunt in terram adacto, circumquaque plumis ornatum. Quo modo singulae familiae duos aut tres referunt, idque magna cum veneratione, rati miseri idololatæ, ubi fructum hunc pullaverint, *Toupan* [ id est sui Dei: Sic à suis Paygi, seu diuinatoribus persuasi ] colloquio sese frui, qui arcana reuelet. Potissimum verò eam in eodem errore versantur eorum dicti Prophetae. Vnde & diuinitatem quandam fructui attribuerunt, nec quicquam quod in sensus incurrat, adorant, quàm tinnulum hoc instrumentum.

Præst

Ameri

NOTAM

## BRYATHAER CHINÆ.

### CAP. L.


**A**D Chinarum sinum marinae arbores stupenda sunt vastitate: tantà, inquam, ut in eis imense magnitudinis aubus stabulari liceat. Etenim tam grandes sunt, ut eis etiam grauiora animalia integra sustollantur, atque auferantur. Has arbores vocant incolæ *Bryathaer*. Fructus ferunt Augustis non minores: auctor Scaliger: eademque etiam scripsit M. Ant. Pigafetta in itinerratio suo, teste Hist. Lugd.

Descript

Fructu

## VHEBEHASOV THEVETI.

### CAP. LI.



**V**hebehasou mira altitudinis est arbor, cuius rami alii alios subeunt, folia habet Brassicæ: singulos ramos onerant fructus, pedem longi, fert & eadem gummi rubrum.

Descript

Folia

Fructu

Gumi r

Hist. Lugd. quoque Vhebehasou vocat, ex Thevetis.

Synony

Melliss

arbor.

An Higueto in nauigationum historiis Arbores circa Peru, quæ mel adeo refert,

Locus

ut pertuso cortice aut trunco quinque aut sex exstillent mensuræ mellis limpidissimi & optimi? Dum in America esset Thevetus, sex milliaibus ab eo loco quo subsistebat, obseruatam sibi hanc arborem tradit, quam eminus artificio potiùs quàm natura arbitraretur quispiam effictam.

Ad




Ad huius fructum (refert idem) quem ego quidem viridem vidi, innumera apes conuolant, ex eo alimentum petentes: receperat se in foramen eiusdem arboris, vbi mellificio & ceræ incumbant. Harum genera duo talia nostris magnitudine sunt pares, quæ non nisi ex sua uolentibus floribus victum quarunt, & mel quidem optimæ notæ faciunt: Ceram verò non vsque adeo flauam ac nostram. Aliud genus dimidio minus, quarum mel bonitate superat: iam dictum, quod syluestres illi *Hira* vocant. Et dissimili ab aliis victu utuntur, quæ meo quidem iudicio causa est, quod ceram carbonis instar nigram faciunt, & quidem copiosè, præsertim ad flumen *Vases & Platee*: vbi animal quoddam inuenitur, *Heyrat* nomine, hoc est bestia mellis, quod vndique has arbores quatit, vt mel quod apes digne faciunt depopuletur. Est autem coloris ferruginei, magnitudine Aeluri, & quod vnguibus mel notit extrahere, ita quidem ne ipsum apes, nec ipse has contingat.

Magno istic in pretio est hoc mel, vt quod soleant syluestres egrotantibus exhibere, mistum fatine recenti, quam è radicibus confueverunt facere. Ceræ verò apud illos nullus alius est vsus, nisi ad conglutinandas pennas, quibus capita coronant: aut ad obstruendas arundines magnas, quibus plumas suas inferunt, qui maximus est Syluestrium illorum thesaurus. Fructus verò *Vhebebasu*, quantumvis ab apibus frequenteretur, non tamen est edulis: propterea quod non facile maturecat, sed apibus solis, quantum quidem ego animaduertere potui, in alimentum cedit.

ARBOR FOFIO LAVRI, FRV-  
CTV CUCURBITÆ EX GYNEA.

## CAP. LII



**A**Rborem (inquit Clus. Exot.) cuius iconem damus ab honestissimo viro Petro Garetto acceptam cum eiusdem fructu anno 1602. Iuglandis arboris celsitudine equare nec dissimili cortice tectam esse ferebant, Folia Laurinis habere similia, ad quorum exitum fructus in ramis nascere, inuicem qui-

dem viridis, deinde vbi maturitatem adeptus, eius coloris quem in eius historia dicam. Erat porò fructus Magni mali instar, & orbicularis penè formæ: nam ducta à pediculo per longitudinem fructus mensurâ ad alteram partem pediculo proximam, decem vnciarum fuisse reperta est, quam, ea quæ fructum transuersim per medium ambi-

læui & splendente, ex flauo spadicei coloris, interdum etiam nigris maculis consperso, interna autem parte fuliginosa, & nihil continens præter nigrum quendam pollinem. Certè quum illum inuicem conspicebam (mittebatur enim primum solus nulla addita icone) Cucurbitæ genus quoddam peregrinum esse censebam, præsertim ob corticem Cucurbitæ cortici non valde dissimilem, tum etiam propter leuitatem: sed conspecta icone suis coloribus expressa, in qua arboris ramus, cum fructu & foliis, opinionem mutare non piguit. Hæc sunt quæ de ista arbore & eius fructu intelligere potui post longam disquisitionem: quæ beneuolum lectorem boni consultorum arbitror.

*Cucurbita  
familia fructuosa.*

## LAGENVLAE AMERICAE.

## CAP. LIII.

**C**Vius arboris esset hic fructus Exoticus, quæ nomine diceretur Clusium latet. Erat autem orbicularis penè formæ, binas vncias longus, tantumdem ferè crassus, duro, læui, spadicei coloris cortice præditus: an nucleum aut semina contineret ignorat, sin autem habuerit, exempta fuisse oportet: Quia binos accipiebat à Iacobo Garetto exima parte funiculo traiectionis & quodammodo con-

Descriptio



nexos, foraminibus per quæ funiculus, qui eos connectebat, traiectionis erat, nigra cerâ obturatis, & infima similiter parte, quæ videlicet pulvis quidam ex albidis ad cineraceum tendens (quo pleni erant) iniectionis fuerat: salus eius sapor & linguam vellens, quo verisimile est incolas vsos ad


sua edulia condienda, propterea secum circumtulisse, Garetus significabat, è mari Australi, quod pacificum appellant Hispani vulgò *Mar del sur*, allatos esse. Et ipse aliquot annis antè, cum adhuc Clus. Viennæ viueret, similem miserat, sed singularem, & longè maiorem, eumque inanem, summa parte apertum & funiculo traiectionis. Sibi porò persuadet, has lanegulas iis cucurbitulis, esse persimiles, quarum Americus Vesputius Navigatione secunda meminit agens de moribus eius gentis ad quam appulerat. Ait enim singulos viros ex collo pèdentes pusillas siccatasque binas cucurbitas gestasse vnam plenâ herbâ quam mandebant, alteram farinâ quadam candicante gypso còminuto simili, è bacillo quodam in ore madefacto, atque in cucurbitam farinâ plenam immisso, farinam exemisse, quâ herbam quam manducabant aspergebant, subinde id repetentes: illudque facere existimasse, vt sitim fedarent, quia aquâ recenti quam bibere possent, penitus erant destituti.

*Cucurbitula  
Americana  
Vesputii*

FRUCTVS INDICVS PYRIFORMIS  
GRANIS INTVS NIGRIS,  
Cucurbitani generis.

CAP. LIV.

Dilectus



\*

Fructus

Cortex.  
Pulpa.

Grana.

Cucurbita  
genus.

**R**edimebat inquit Clusius Exot. ] Franciscus Peninius, cuius & Pharmacopæus Amstelredamensis, fructum quandam exoticum anno reparatæ salutis humanæ 1601. ex India, vt aiebant, relatum, cuius nec nomē nec in quo arboris genere natus esset, intelligere potuerat: quia tamen eius formæ erat, qualem antè

vidisse non memineram, pro ea quæ mihi cum illo est vetere amicitia, commodatò impetrabam, vt breuem illius historiam concinnare possem, quam in Exoticorum librum inferrem, & eius iconem, in tabella exprimi curarem. Erat hic fructus penè quinque vnciarum longitudinis à pediculo ad summum mucronem, ambitus qua parte crassior fructus nouem vncias cum semisse explebat, à pediculo satis crasso sensim tumescens, deinde à medio corpore paulatim in obtusum mucronem desinens [ vt ex icone faciliùs obseruari potest ] fusco duròque cortice constans, & nucleum aut pulpam, cum seminibus in globum congestam continens, strepitum enim agitatus edebat: qualis autem inesset nucleus aut pulpa, ignorabam cum hæc scriberem, quandoquidem illum aperire verebar, quòd meus non esset, propterea integrum illi restituebam. Post aliquot tamen dies fructum ad me remittebat in binas partes transuersim sectum, vt internam partem etiam describere possem, quam valdè leuem & exigui esse ponderis comperiebam, cineracique ex fusco coloris, continentem pulpam spongiosam, nigram, mollem, acidiusculi saporis, in globum compactam, in qua latebant aliquot grana, nigra, penè orbiculata, compressa tamen, & magis lata quàm longa, in binas partes sectilia, quemadmodum Cucurbitarum & similium semina, sic vt Cucurbitacei generis alicuius plantæ fructum esse mihi persuadeam.

GVANABANVS OVIEDI, FRVCTV  
SQVAMMATO.

CAP. LV.

Descriptio  
Folia.  
Fructus.

**G**uanabanus Ouiedi procera arbor est, & formosa, folio ferè Mali Medicæ, quam Limonian vocant, virente: fructu pulcherrimo, mediocri Melonis magnitudine, qui tamen interdum in capitis pueri magnitudinem excrescat. Cortex huic fructui vitidis, & qui certis quibusdam squa-

mis distinctus videatur, & strobilus, lauioribus tamen, neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior, quàm in Piri. Caro candidissima saporisque delicatissimi, quæ faciliè pinguedinis lactis instar in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna.

Frigidus est hic fructus, & per æstus vitilis. Nam tameti quis integrum Guanabanum deuoret, nullum inde sentiet nocumentum. In firma est ligni materies.

Clusius ait, cum Dorionibus planè conuenire Guanabanum Ouiedi, quem per vniuersam ferè Americam, siue Nouum Orbem nasci tradunt. Diuersus est ab eo cuius Scaliger meminit, de quo paulò antè.

Generalis Histor. Indic. author tradit Guanabani fructus corticem viridem & tenuem esse, vt Piri, superficièq; squamulis distincta.

Hic Guanabanus, inquit Hist. Synonym.

Lugd. planè conuenire videtur cum Ouiedi Guanabano & vterque diuersus esse à Scaligeri.

M. Fumeæ, Guanabani, & Guanabano, pulchra arbor, fructus crassus vt humanum caput, cutis squammata &c. Guanabanus Ouiedi Clusio.

An Benzoni Guanabanus arbor modica & gracilis, fructum ferens cordis effigie, cortio viridi & subtili, squamarum in morem vestitum, introitus candidum.

Extant etiam paulò diuersæ ab his formæ orbiculares eius arboris fructus, crocei coloris & prioribus illis longè meliores, omnes verò intus acinos exiles spadice coloris gerunt. Videntur quidem nobis hæc, præsertim prioris varietatis descriptio, huic Guanabano Ouiedi satis bene conuenire.

## DVRIONES ACOSTÆ CAP. LIV.




Inter celeberrimos, inquit Garcias ] Indici fructus recensentur à plebique Doriones in Malaca vocati: fructus Melopeponis magnitudine, densò cortice rostratisque tuberculis plurimis obductus, veluti is quem Iacca Goa vocant, [ de quo suo loco ] foris virentis, intus verò concameratus: seminàq; exigui oui gal-

Semina.



Alia Icon Bry fratrum.



medium palmum oblonga, acuta, falso gustu, colore viridi dilutior parte auersa, interna vero parte admodum virefcentia. Flos è candido flauescens. Arborem Iuglandis modo prægrandem esse aiunt, foliis Laurinis.

Calidus, inquit Acoſta, & humidus est hic fructus, & qui edere volunt, pede leuiter comprimere & frangere solent, propter spinas quibus oblitus est. Qui nunquam hos fructus ederunt cum primum illos olſaciunt, videntur putridas Capas odorari: sed postquam deguſtarunt, per reliquis cibis bene olere & ſapere cenſent. Est vero in tanta exiſtimatione apud eos, qui gulæ dediti ſunt, hic fructus, vt putent neminem eo poſſe ſaturari, propterea varia dant illi epitheta. Tanta tamen eſt huius fructus in Malaca abundantia, vt ſinguli nō pluriſ, quā quatuor marauedis veniat præſertim menſibus Iunio, Iulio & Auguſto: nam reliquis pretium intenditur pro hominum arbitrio. Admiratione porro digna eſt Betele, cū hoc fructu antipathia, quæ proſectō tanta eſt, vt ſiquis in nauem Durionibus plenam, ædeſve aut concamerationem, vbi obſeruentur, aliquot Betele folia reponat, corrumpantur & putrefcant omnes. Et ſi cui ex Durionum immodico eſu ventriculus inflammatur & grauatur, folio Betele ſupra ventriculum poſito, ſubito mitigatur inflammatio, tumorque tollitur. Et, ſi à Durionum eſu ingerantur aliquot Betele folia, nullam noxam ſentiet, quantumuis multos ederit. Inde fit, tūc etiam ob eiuſ guſtum ſauem, vt vulgō dicatur, neminem eorum eſu poſſe ſatiari.

Eiuſdem fructus & Linſchottanus meminit, Duriacon vocitans, in Iaua creſcere, magnis arboribus, quales apud nos Pomi arbores. Guſtu quidem ſuauiſſimo, ſed in aſuetis primum aduerſo, ob odoris cepacei, aduſti aut putridi vehementiam. Extimam faciē Caſtaneæ cortici aſſimilat, ſed aculeis hunc eſſe paulō maioribus & quadrangulis, Alueos communiter intus habere tres, parietibus intergerinis diſſectos, in quorum ſingulo tria grana cepacea ſaciē, & horum vnum quodque ruriſ alios tres nucleos contineat. Habet inter meliores, ſalubriores, ſuauiorēque totius Indiæ, ſed non diu durare. Reperiti etiam copioſe in Baly & Malacca.

Vocantur Duriones in Malaca, Garciz: cum quibus Cluſait, Guanabanum Ouiedi planē con-

uenire. At ex vtriuſque hiſtoria facile patet rectē intuenti, reſ eſſe diuerſas. Caſt. Dur. Iacca magiore, vt vult C. Bauh. Durio Coſte: in Malayo (quæ eſt provincia vbi gignitur) Duriaon: ipſius floſ Buaa: ipſa arbor Buitan. Durines Linſchottano. Hiſt. Lugd. Duriones Acoſte, & fortē Darian Scaligeri eidem, An Scal. Durian? Meloni & Corcopali ſimilis, Taprobanæ fructus, qui Durian dicitur. An Duriaon Bry fratrum in Icon. Ind. Oriēt. qui addunt hos fructus totius orbis exiſtimari optimos, & in ſola Malacca reperiri.

Durionē.

## ERINACEVS FRVCTVS INDICVS

## CAP. LVII.




rum commodum ſubſidium. Diu durat. Creſcit in celſis arboribus, racematim coherens, vt bacca in racemis vitium. Ex hiſtoriis Indicis.

Fructus quidam naſcitur in Inſula Baly, Deſcripti: magna, copia, magnitudine Pomi noſtratiſ, vel potiùs Piri, liquidem infernè rotundus ſuperne turbina-tus, cortice munitus aſpero & echinato, vnde ab Holandis Schveingel id eſt, Echinus portucinus vel ſuillus Porcinus, vocatur. Conditus hic fructus dulciſ eſt, ſapidus, & nauigationum Indicarum commodum ſubſidium. Diu durat. Creſcit in celſis arboribus, racematim coherens, vt bacca in racemis vitium. Ex hiſtoriis Indicis.

## IACA INDICA.

## CAP. LVIII.



Iaca arbor eſt Deſcriptiō in India prægrandis, fructū Fruſus. in ſummo caudice non in ramis ferens, prægrandem, magni Melonis effigie interdum maiorem, virentem foris, intus verò flauſcentem, multis ſpinulis inſtar erinacei, ſed mollibus, obſeptum. Continet autem hic fructus in ſe magnas qualdam nuceſ, duro putamine teſtas. Cortex fructus

guſtu Meloniſ, ſed diffiſſimè concoctioniſ, ſtempe qui plerumque ſolet, ita vt ſumitur, excet-

ni. Nuces verò intus natæ torrentur aut elixantur, abiectione putamine [qui nullus est usus] Castanearum modo, quibus sunt perfimiles eduntur. Nascitur duntaxat in maritimis. *Garcia.*

Locus.  
Alia descriptio.

Fructus.

Cucurbit.  
magnitud.

Locus.

Differentia.  
Barca.  
Papa.  
Girafal.  
Patrium.

Castanea.  
Sapor.

Vitis.  
Ad Venerem.

Durionis  
pulpa.

Descriptio  
Linschot.

Melopeponis  
forma.  
Ananas  
similis.

Girafal.  
Chambafal.

Cachi Scab.  
Caccaria.

Pineæ nucis  
forma.

Acosta verò paulò aliter sic: Vasta est arbor, foliis palmaris amplitudinis prædita, dilute virentibus, neruo crasso & duro per longitudinem excurrente. Malum fert non è germinibus, aut foliorum sede, quemadmodum alia arbores, sed ex ipso trunco maioribusque tamis nascens, longum, crassum, obscurius virens, crasso duroque cortice tectum, omni ex parte culpidibus lepto, quæ in spinam breuem, viridem, nigroque aculeo præditam desinunt, admodum similem Durionis spinæ, sed minimè acutam aut pungentem, tametsi minitari videatur. Horum fructuum minimus est maximæ cucurbitæ amplitudine atque etiam maior, præsertim in Malabar, ubi præstantiores nascuntur. Nam qui in Goa proueniunt, minores & peiores sunt, atque magis insipidi. Cùm maturus est hic fructus, bonum odorem spirat. Eiusque duas differentias constituunt. Vnum *Barca* appellatum, & præstantiorem: alterum *Papa* aut *Girafal* dictum, minusque bonum: præprehenditur postremus ex mollitie: quoniam si manu apprehendas, digitis cedit. Præstantissimi verò fructus pretium quadraginta marcedis non excedit, hoc est, paulò plus regali Castellano. Per longitudinem secti hi fructus, intus candidi, & densa carne præditi apparent, ac veluti in capsulas aut receptacula diuisi, plena Castaneis longioribus & crassioribus quàm sint *Dactyli* siue *Palmulæ*, cinerea tunica tectis, & intus albis Castanearum vulgarium modo, gustu terrestri & asperio, si virides edantur, multoque status generantibus. At si uti Hispanicæ Castaneæ, assentur, gustu sapido & Venerem excitantibus, ob quam solum rem plebs frequentius uti solet. Sunt autem singulæ hæ Castaneæ pulpa flauescente, & aliquantulum lenta inuolutæ, & pulpam Durionis nonnihil referente, tametsi ab eo differat. Grati saporis est, præsertim quæ in *Laca Barca* cognominata continetur, optimi Melonis pulpæ admodum similis.

Describitur etiam paulò aliter à Linschottano apud figuras aeneas, his verbis: Iacæ mirabilis naturæ ex trunco altissimæ arboris nascuntur fructus, ad litus maris: Vbi arbor in folia & ramos se fundit, nulli sunt fructus. Magnitudine autem & forma *Melopeponis* ferè sunt, ad *Ananas* accedunt, colore tamen subviridi. Tunicis autem distinctus est interior nucleus, colore inter albedinem & flauedinem, sapore mellis. Tales ferè tunica centum numero in vno pomio reperiuntur. Est autem duplex genus: optimum vocatur *Girafal*, illud quod est simplicius est *Chambafal*. Arboribus & fructibus eadem forma est, sed ex gustus suauitate discernuntur. Hæc ille. Vtramque figuram ponimus ut non parùm variantes iudicent qui arborem ipsam cominus inspexerunt.

Scaliger videtur de eadem planta & fructu scribere, his verbis: Spinosa est arbor in Malabar, cuius folium non pingunt. Ipla *Cachi*, eius fructus *Caccaria* dicitur; longitudine pedali, humanæ coræ crassitudine. Pondus fidem superat. Cortici color primùm viridis: maturefcens in luteo fuscescit: corpus firmiusculum, compressioni tamen ita cedit, ut frangatur. Temporis quoque suapte natura impatiens. Haud enim ita multò post, quàm detractus sit, fit rugosum. Totius forma, ut *Pineæ nucis*. Intus enim Camerulæ membranis distinguuntur, ut in *Punica*. Pulpa odor suauissi-

mus. Sapor mistus ex *Melone Moschato*, *Perfico*, *Arancio dulci*, & melle. Intus poma ducenta quinquaginta ad trecenta vsque, Ficorum tum specie, tum dulcedine, sine cortice, ut aiunt. Membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregentur: ut odorum vitella: In his pomis fructiculus est alius, figura castaneæ. Qui ad eundem, quo castanea, modum inter coquendum crepitat: esculentusque est. Etiam bobus in pastum datur. Exit è trunco fructus, sicut & *lumeiz*, id est, *Sycomor*, inter spinas, & frondes. Interdum, quod magis mirum est, è radice, subtus terra, vnde prodit. Hic longè præstantior, regibus dono datur. Legitur mensè Decembri.

In *Calecut*, inquit *Ludouicus Romanus*, reperiuntur nonnulli fructus quos cultores *Laceros* appellant. Idem vult eundem fructum idem esse cum *Laca*, atque eo nullum præstantiorem dignioreque scribit, eiusque descriptionem fusè tradit.

Vocatur hic fructus in *Malauar Laca*: in *Canara* & *Guzarate Pana*?: intus nuce velut castaneæ: *Garcias*. *Lacera* *Lud. Romani*, eadèque *Laca Clusio*. *Laca* *Malabarensis*. *Guzaraten* sibus *Panax*, *Canarinis*, *Panassa*. Arabibus, *Panax*, & *Laca*. *Perlis Funax*: Eius duæ species, vna dicta *Barca*, altera *Papa* vel *Girafal*, *Acosta Laca minor*, in *Canara* *Panax*, *Durant*.

An *Scal. arbor Cachi*, fructus *Cicara*. *Historia* sanè *Lugd.* huius sententiæ est, & addit, eadem proflus scriptis *Lud. Bonon.* in *Itiner. suo*, quæ *Scaliger*, ac nasci in *Calicut*.


Eadem *Nic. Costin.* in *Itine.* nisi quod non fructus ait bubus pro cibo præberi, sed eorum cortices. Præterea arborem grandi *Fico* similem esse, foliis diuisi *Palmæ* modo, ligno buxæ, ad multa vtili. Eadem *Hist. Lugd.* & alibi de hac arbore tractat, sub titulo, *Laca Acosta*, vique hanc diuersam putans, à *Cachi Scaligeri*.

Iam suprà dictum, quæ ratione Castaneæ intus latitantes, grauiter comedentes excident ad *Venerem*. Scribit tamen *Costa*, nullum vsum medicum præbere: duræ esse concoctionis, & admodum grauare ventriculum atque ut illarum *Indiæ Prouinciæ* *Medici* dicunt, si in ventriculo corumpatur, noxios & venenosos humores generare: quæ frequentius hoc fructu vescantur, facile in pestilentem illum morbum, atque funestum *Morxi* incolis vocatum incidere.

IAMBOS.

CAP. LIX.

Iambos Acosta.



Magna, ut scribit *Garcias*, apud *Indos* in estimatione est is fructus, cuius nunc mentione facturi sumus, primùm è *Malaca* [vbi plurimus nascitur] paucos ante annos illuc translatus. Est autem is fructus oui asneris magnitudine, aut paulò maior, colore ex candido purpurascens, pulcherrimo odore rosaceo. Vel,



Iambos Linschottan.



Vel, vt verius dicam, similis est hic fructus magnis Gallis recentib. [ quas poma de Cuique nuncupamus ] cum in odore, tum in colore: gustu suauissimo, sed humido. Nisi verb (annotat Clus.) Garcias gallas istas maiores, quæ in Robore passim per Hispaniâ & Lusitaniâ, nascuntur, intelligat per Bugualbas grandes quid sibi velit ignorare me facior. Caterum eas

exigua pila palmaria maiores nunquam vidi, colore pulcherrimo rubicantes, dum recentes sunt, & odoratas. Vel fortè prægrandes illas Iuglandes vult, quæ vulgaribus duplo maiores sunt: quemadmodum vulgares suo operimento nudatas Bugalho appellare videtur.

Potè ipsa Iambos Arbutula, ex eodem Garcîa, in Pruni magnitudinem assurgit, folia ferens magnam similitudinem habentia cum cuspidate ferrea maioris alicuius lanceæ, viridia, aspectu pulcherrima. Flos ruber, odoratissimus, gustu acido. Fumis nititur radicibus hæc arbor, quoniam admodum fertilis est. Post quartum enim annum fructifera, nec semel duntaxat fert in anno vt pleræque omnes ferè arbores, sed pluries singulis annis nouos edit fructus.

Arbor, inquit Acosta, quæ Iambos fructum præbet, vasta est, maximam Malum auream quæ in Hispaniis nascitur æquans, multis ramis in latum expansis multamque umbram præbentibus brachiata, aspectuque pulcherrima: caudex maiorisque rami cinereo cortice læuiguntur; folia pulcherrima sunt, læuia, palmum aut amplius longa, crassiora verb per longitudinem, multis autem obliquis venis in latera excurrentibus, parte supernâ saturatis, infernâ dilutius virentia: flores ex rubro purpureascentes, viuidi admodum coloris, multis staminibus in medio præditi, aspectu pulcherrimi, gustu capreolorum vitis simili. Fructus magnitudinis est Piri, quod à Rege cognomen accepit, cuiusque duo sunt genera: vniu enim aded obscure rubet, vt niger videatur, magnique ex parte officulo caret, & sui bonitate præstat: alter ex candido rubescit, & officulum continet album, durum, non admodum rotundum, officuli quod in Persico malo est, magnitudinis, læue, & candida hirsutaque membrana tectum: qui licet superiori bonitate cedat, dignus tamen est hominum etiam delicatissimorum palato: vtiusque odor suauissimam rosam refert, frigidus & humidus est, & admodum tener, cortice aded tenui & molli tectus, vt cultello auferri non queat. Altè suas radices terræ infigit hæc arbor, & post quartum annum fit fructifera. Fructum sapiens eodem anno perficit, & nonnunquam sine flore & fructu conspicitur, cum iidem rami floribus, fructu viridi & maturo semper ferè

onusti sint, decidentibusque quotidie floribus [ sic vt solum rubro colore tinctum quandoque videatur ] noui subnascantur, fructusque alii primum enascantur, alii maturecant, alii iam maturi colligantur, succosa arbore maturi facile decidunt, comprehensi verb rami ad fructus colligendos facillimè ab arbore reuelluntur.

Linschottanus ad figuram ære exculptam annotat Iambos officulum habere, vt fructus Cyparissii: sed quid sibi velit faciemur nos ignorare. Cyparissii fructus nullum habet officulum, nisi fortè ipsam intelligat nucem: præterea quia eius figura non parum differt ab Acostæ, vtramque Synonyma proponimus.

Iambos in Malaca dicitur etiamque Hispanis, Garciz. Iambos fructum Malabares & Canarini Iamboli vocant. Lusitani istic habitantes Iambos: Arabes Tupha: Indi Peric Tuphar: Turci Alma: Lusitani arborem Iambeiro, Acosta. Hist. Lugd. quoque & Linschott. Iambos vocant.


Fructus ante reliquos cibos initio mensæ edi solent, atque interdiu. Condiuntur etiam tum fructus tum flores, atque ita afferuntur.

Officulum  
Cyparissii.

Iambos.  
Iamboli.  
Tupha.  
Tuphar.  
Alma.  
Iambeiro.  
Pine.

## CARAMBOLAS ACOSTAE.

CAP. LX.



Carambolas, auctore Garciz, fructus est in Goa magnitudinis minoris ouis galinaceæ, in qua tuor vt videntur, partes distinctus, flauescens.

Pleniùs describit Acosta. Arbor Cotonææ magnitudinis folijs Malis paulo longioribus, coloris viridis saturatioris, & gustus amaricatis, floribus parvis quinque foliolis consti-

Descriptio  
fructus.

Descriptio  
arboris.  
Cotonææ  
magna.

Malis folio.

Floribus.

Fructus.

tibus, ex albo rubescentibus, nullo quidem odore gratis, sed aspectu elegantibus, & gustu oxalidis acetoso. Iple verb fructus mausculi ouis galinaceæ magnitudinem æquat oblongus, flauescens, atque veluti in quatuor partes diuisus, sulcis illis paulo altius impressis, magnam gratiam addentibus. In medullis continet semina tenera saporis aciditate palato grata.

In Maluac Carambolas vocatur, in Canara & Decan Camariz: in Malao Balmiba. Garcias.

Acosta verb Carambole Lusitanis: Decaminis & Canarinis Camarix: Persianis, Chamaroch: in Malayo, Balmiba: Caramboles Acostæ H. Lugdunen.

Nullus eius in medicina vsus, præterquam quod in febribus quotidianis exhibetur, & ex eius succo, cum aliis idoneis, sunt Collyria ad oculorum lippitudines utilia: plerisque benè sapit hic fructus, præsertim qui vinosus est saccharo conditur, gratissimisque est Palato. Eò verb utor syrupi acetosi loco. Garcias: Costa verb scribit multi usui esse in medicina & cibis: namque matutum exhibere in biliosis febribus & lachrya

Synonyma  
Carambolas.  
Gamarix.  
Balmiba  
Carambole  
Chamaroch.  
Balmiba.  
Vices.

Febres.  
ad oculos.

herbes bi-  
sy a.

Ad secun-  
dum mor-  
tum  
Cibue.

conditum syrapi acetosi loco præbere: Canari-  
nos eius succo cum aliis medicamentis isthic na-  
scentibus, collyria parare, ad oculorum nubecu-  
las tollendas: Obstetricem (quæ illis *Daya* dici-  
tur) vidit fructu sicco & in puluerem contrito,  
& foliis *Betele* virentem ad secundinas à partu ex-  
pellendas, foetumque mortuum educendum. E-  
ius etiam muria conditi frequentem esse usum,  
cum gratissimi sit saporis & appetentiam ex-  
citet.

## AMBARE INDICA.

## CAP. LXI.

Descriptio

Folia.

Flores



**A**mbare Indis  
dicta, crassa  
magnaque est  
arbor, folia ha-  
bet Inglandis fo-  
lis magnitudine  
respondentia, sed  
non eius forme,  
dilutis virentia  
& multis venis  
elaborata, quæ  
illis magnâ gra-  
tiam addit. Flo-  
res exiguos can-  
ditos, Fructus  
nucis Inglandis  
magnitudine, di-  
lutius virentes,  
& cortice quàm  
illa leuiore: o-  
doris grauis &  
gustus acerbi,

dum adhuc virent: coloris verò flauo in maturo,  
gratioris odoris & gustus grata aciditate com-  
mendabilis, medullam continentes cartilagi-  
nosam & duram, è duris rerbis oblique inter-  
textis constantem: Hæc *Acosta*. Breuiter *Garcias*:  
Fructus in India nucis magnitudine, maturus o-  
doratus, fulvus: immaturus cartilagineo quo-  
dam integritur cortice virente.

Synonyma

*Ambare*,  
*Amba*,  
*Clul* not.  
*Ambares*  
*Ambaresch*,  
*Amb*,  
*Ambre*.

Vires & v-  
sus.

*Ambare* Indis, *Garcia*. *Clulius* annotat *Lud.*  
*Romanum* hunc fructum *Amba* nominare,  
& caudicem *Manga*. At *Acosta* distinguit *Amba*  
ab *Ambare*, ideo nos *Ludouici Romani*  
*Ambam* non huc reducimur, sed ad *mangam* siue  
*Ambam* de qua sequenti libro. *Acosta*, *Amba*-  
*re* arbor *Canariis*: & fructus *Ambares*, *Per-*  
*sis Ambereth*: *Turcis Harb*. *Lusitanis Amba-*  
*res*. *Cast. dur*. In *Canaria Ambre*, & fructus  
*Ambares*. Indis *Ambare*, *H. Lugdunens.* *Ambare A-*  
*costæ*.

Propter fructus gratam aciditatem cum *Omp-*  
*hacii* seu agrestæ modo cibus admiscet: matu-  
rum ex sale & aceto edunt: excitat enim edendi  
appetitum Indi aduersus biliolos humores uti-  
lem esse perhibent, Sale & aceto conditus diu  
conseruari potest.

## CACHOS.

## CAP. LXII.

Descriptio  
Mali insa-

**C**achos nascitur arbusculi modo: insigni viro-  
re prædita est, folio rotundo & tenui: fru-  
ctum fert *Malo insano* similem, altera parte lesi-

lem, altera turbinatum, cinerei coloris, grati sapo-  
ris, & acrimoniæ expertis, minutum admodum  
semen continens. Inuenitur duntaxat in *Pe-*  
*ruuanis* montibus: *Monardes*: qui sibi huius  
plantæ semen apud *Indos Cachos* vocatæ nullum  
testatur.

*H. Lugd.* *Cachos*: Magnæ est apud *Indos* æ-  
stimationis, ob insignes eius facultates. Nam  
vrinas cit, calculum è renibus pellit, quodque  
præstantius est, illius usu calculum in vesica com-  
minui ferunt, si mollis adhuc sit, vllisque medica-  
mentis comminui queat, eiusque rei tam multa  
proferunt exempla, vt admirationem pariant.  
Nam ea est mea opinio (inquit *Monardes*) vesicæ  
calculum haudquaquam expelli posse, solamque ex-  
ceptionem illius remedium esse, nullum autem medica-  
mentum adeo efficax esse, vt eum infringere valeat.  
Aiunt tamen illius semen tritum, ex aqua aliqua  
ad eam rem vtili sumptum, calculum in lutum  
dissolueret, quod excretum denuò concrescat, &  
in lapideam duritiem conuertatur. Adolescen-  
tem vidi, cui hoc obigisse scio. Is cum vesicæ,  
calculo torqueretur, idque à lithotomis, qui cal-  
culum deprehenderant, intellexisset, & ex sym-  
ptomatis quæ patiebatur agnoscerem, hominem  
veris initio ad fontem, qui de petra cognomina-  
tur, ablegauit: vbi cum duos menses hæsisset, à  
calculo liber rediit, & omne lutum, quod paula-  
tim eiecerat, denuò in lapidea fragmenta con-  
cretum secum in charta detulit.

## DE MORO.

## CAP. LXIII.

**H**is indicis Pomis inferenda fuit *Morus*, & ip-  
sa *Pomifera*, sed quæ vt vulgatio, alijs *Po-*  
*miferis* sequentibus, ob affinitatem nominis fuit  
præmittenda.

## MORVS NIGRA.



**M**oro dici-  
tur cau-  
dex fatiscrassus,  
contortus ac  
nodosus: alti-  
tudo iuxta ar-  
boris, rami pa-  
tuli, cortex ru-  
gosis, crassus,  
lentus. Mate-  
ries robusta, &  
medullitius  
flaua. Radices  
numerosæ, ma-  
gæ ac robustæ,  
non tamen altè  
descendentes,  
sed sese diffun-  
dentes, si *March*.  
credimus. Folia  
ex rotunditate  
in acumen desin-  
nentia, inter-  
dum virginea, sinuata, per ambitum serrata, ta-  
ctu non nihil alpera, hirsuta, sapore subdulci &  
viscido. Pro floribus *Dod.* autore Iuli sunt, vi-  
rentes, lanuginosi: Fructum fert breuissimo pe-  
diculo hærentem, maiorem & longiorem quàm  
*Rubus*, glomeratum similiter, sed acinis minis  
rotundis, primum quidem virentem & austerum,  
post

Locus

Nomin

Vires.

Vrina.

Calculu.

Opinio

naris

Vesica

calo.

Historia

Materie

Radix.

Folia.

Flores.

Fructus.



pōst rubentem, acidum & adstringentem, per maturitatem nigrum, sanguineo dulci succo madidum, manus & os inficientem. Matth. ait, modicam vbi maturuerit remanere austeritatem.

*Morus alba* tota delicatior est, vt à nobis quidem obseruatum, quàm nigra, eaque propter bombycibus salendis magis expetita: folia teneriora, angustiora, firmaque, oblonga magis, non minùs Nigræ folijs serrata: aliquando vitiginea, sed tam concinnâ dimisurâ, vt Gallici sepe tria artificij pictoris manu ficta ad certamen prouocent. Iulos longiusculis pediculis hærentes, plures sæpè simul profert, vt in ramo spontaneæ Mori ex Italia delato obseruauimus. Fructus, non, vt præcedentis, niger, sed per maturitatem albus, sapore (Matth. teste) mellæ dulcedinis, quo fit vt minimè cum nigro facultate conueniat, minor etiam: antè maturitatem viridis & subuitidis, austeriusculo sapore. Radix in ingentem sese diffundit longitudinem magis quàm nigra, fortasse quoniam amplior, altior, proceriorque semper quàm nigra habeatur.

*Sycamore* Theophr. vocat, nomine à Ficu derivatò, quàm similem dicit Egyptiæ, folio, magnitudine, totaque facie: materie spissam & lentam, validam, ad opera facilem, quæ vetustate nigrescat, vt lotus: medullam eius nigram & duram: tardè germinare, citòque amittere folia: fructu esse paruo pro magnitudine arboris, læui, diluto, ex humore & cuticula constante, succo vinoso: flore lanugineo, fructibus insidente. Fructum, quia nudus, humidus, tenuique textus sit cuticula, promptè vel leuiter à sole tepescitum perfici, quippe qui ad sui perfectionem minimo eget calore. Valida namque vis quadam confertim & celeriter prorumpere solita, fructum percoquit, sicut & in germinando fit. Longa enim prorogatio ac velut cunctatio germinis collectum maximum facit. Hinc fit, vt germina congesta magno cum impetu prorumpant, etiam cum sterpiti quodam, vt quidam perhibent. Ita concitatio eius celeriter perfici solet. Eodem namque huiusmodi euenit, sicut frumenti, quæ hyems diu retinuit. Quæ ubi semel laxata fuerint, celeriter auferant. Adde, quòd Morus fructum non vniuerfum, sed particulatim percoquere solet. Idèd & longo tempore in arbore manet, [alijs nimirum transeuntibus aut cadentibus, alijs maturefcentibus] & maximè cum ijs humiditas illa tenuis & aquea. His igitur de causis præcox Mori fructus. Caterùm vt Mnesitor tradit, serò germinat hæc arbor, ob frigiditatem loci: Citò maturat, propter tenuitatem: *διὰ τὴν ἀσθενειαν*. Placuit ita reddere, non propter suam imbecillitatem, sicut Gaza, quamuis eundem secutus sit Scaliger. Nam quid hoc est dicere, debilitatem esse causam citæ maturationis: quàm rectius causam dixerimus serotinæ germinationis. Et res ipsa respondet. Succus tenuitas præpotioris maturationis causa, quemadmodum crassitudo tardioris, vt in Cidonijs, Piris hyemilibus, Prunis siluestribus, Mespilis & alijs id genus videmus. Neque repugnat vocabuli significatio, quam, si lubet Grammaticis, huc vsque extendent vt & tenuitatem denotet.

Diofcor. *μορὰ ἢ Συκαμινθα*, arbor nota: alijs tamen legunt *μορὰ ἢ Συκαμινθα*, Morus Sycaminea, vel Morus simpliciter.

*Sycam* Hipp. vt explicat Gal. in eius vocibus: Cui & *Συκαμινθα* id est *μορὰ*. Fructus ipse *δὲ Συκαμινθ* Theophr. quod & *μορὸν*, Morum.

Morus Palladio & Plin. ipsa arbor, qui fructum

inter carnosâ Poma refert: Moris, inquit hic, succus in carne vinosus: trini colores, candidus primò, mox rubens, maturis niger. In nouissimis florent, inter prima maturefcent. Tingunt manus succo matura, eluunt acerba. Minimum in hac arbore ingenia profecerunt, nec omnibus, nec insitu: (aliàs infitis.) Nec alio modo, quàm Pomi magnitudine. Differunt Ostensis & Tusculana Roma. Nascuntur & in Rubis, multum differente callo. At nos parum differente callo, ad rem accommodatius legi censemus, licet nec Hermol. nasutissimus alioqui Plinij lector, nec ipse adeò Dalech. eius commentator alijs veterem corrigant lectionem. Idem Plin. Moro vinosum succum tribuit. Et alibi: Pro cute in animalibus, cortex in arboribus est. Mirum, his in Moro medicis succum querentibus, serè hora diei secunda, lapide incussus [incisus, alijs] manat, altius fructus siccus videtur (nempe cortex) quanquam hoc Plin. non de Moro, sed de lycomoro tradere debuisset, vt sentit Corn. de qua re plura suo loco. Ad Rubi Mororum differentiam Officinæ hodie serè Mori arboris fructus Mora Celsi vocant.

Morum arborem, vt scribit Curtius, non nulli à Græco nomine deriuant, propter fructus nigritiem: *μαύρον* enim nigrum est. Græcis præter prædicta nomina, & *Συκα* & *Συκῆ*, Moros, ab Hippocrate, nisi mendum sit, Poma Sycaminon: Aetio fructus Sycamina & Sycomora. Aeschylus tamen, autore Iulio Polluce, Sycamina ea vocauit, quæ tantum ex Rubo colligerentur.

Primas fructus germinationes, seu futura poma, Ricinos, vel, vt alijs malunt Cytnos, Græci vocant. Alij Mora oblonga, vel Iulos teretes arbitrantur. Nigram celebrat Virg. Eclog. 6.

*Sanguineis fontem Moris, & temporis pingit.* Fabulantur Poetæ, Mori fructus prius albos tantum fuisse: postea verò Pyrami & Thisbes tantum sanguine tinctos, ac rubeum colorem mutatos, dum vterque sibi ipsi sub Moro apud fontem & Nini sepulchrum, propè Babylonem inanus consueuissent. Sic enim Quid. Metamorph. 4. Canit:

Arbor ibi nitens uberrima pomis  
Ardua Morus erat, gelido contermina fonti.

Et pōst:

Arboris fortis aspergine cadus in atram  
Vertuntur faciem, malefactaque sanguine radix  
Purpureo tingit pendentia Mora calore.

Pōst Thisbe ad Morum:

Signa tene cadus, pullosque & luctibus aptos  
Semper habet fortis, gemini monumenta cruoris;  
Dixit: & aprato pectus mucrone sub imum,  
Incubuit ferro, quod adhuc à cade tepebat.  
Vota tamen tetigere Deos, tetigere parentes.  
Nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater.

Athen. Sycamina, inquit, cum simpliciter omnes appellent Mori fructum, Alexandrini soli Mora nominant. Sycamina quidem, non intelligo fructum Egyptiæ ficus, quem nonnulli Sycomorum vocant. Apud Aeschylum in Phrygibus Hæctor. Sycamina mora vocat:

*ἦν γὰρ ἡ ἰσὶς τῆς Μορᾶς μακρὴ.*

Idem in Cressis sic nominat: & in Camicis:

Candidum enim Morum, ac nigrum succum sum-  
dentibus,  
Venusque rubrica colore tinctus onusta sunt  
eius regionis arbores.

Sophocles:

Primum quidem cernes candidam quæ flores spiciat  
Deinde teres atque puniceum Morum,

*Mora Celsi*

*Mori etymon.*

*Sycam. Moros.*

*Ricini. Cytni.*

*Pyrami & Thisbes fabula de Metamorphosis Mori.*

*Mora nigræ.*

*Sycamina & Mora.*

*Candida Mora.*

*Spica.* Spicam autem vocat fructus arboris Mori rudimentum spica simile.  
Nicander in Georgicis tam arborem ipsam vocat semper *Morcam*, vt & Alexandrini, tum etiam declarat, eius fructum priusquam reliquarum omnium conspicit.

*Morca.* Ac *Morca* pueri oblectamenta tenellis,  
Qua primam suauem fructum mortalibus offert.  
Parthenius Sycamina, quæ Mora vocant nonnulli, Abryna (*Ἀβρύνα*) nominat. Demetrius Ixion (vel in *ἑρμολόγῳ* *ἡρώδῃ*, vel *ἐν διαλέκτῳ* *ἡρώδῃ* *ἀνέκῳ* *ἡρώδῃ*) Sycamina & Mora eadem esse voluit his verbis: Veluti *Mora*, quæ sanguine manant, & Ficis meliora sunt.

*An Morus alba antiqui ignota*  
An verò Morus alba antiquis incognita fuerit, vt quidam suspicantur ex iam citatis aliquot locis, maxime Ouidii, & ex Athen. facile diiudicari potest, quamuis apud reliquos Veteres, maxime Theophrast. Dioscor. Gal. & Plin. & Geoponicos nihil de ea haud minus obseruauerimus.

*Syr.* Hermol. Syen apud Hipp. Morum arborem denotare aperte testatur.

*Sycaminon.* Media Comedia Sycaminon vocat & pomum & arborem: sed pomum neutro, arborem masculino genere, vt apud Iul. Pollucem notatum legitur.

*Modon.* Inuenias & *Modon* scriptum in Hipp. pro Moro, sed id culpabiliorum, vt idem Hermol. autumat. De Syce autem Hippocratis infra inter vires. Amatus non miri aut Morum albam antiquis (excepit Ouidio) incognitam, quum postero seculo ex nigra Moro Populo inserta alba effecta sit, cui & subscribere videtur Lacuna: qui & Morum hominum amicam dicit, ac locis delectari quæ homines frequentant. Idem Mora alba vulgo Mora Celli dici scribit, quæ aliis (vt Isidoro) Mora excelsa. Mefues verò pro Moris Celli, habet *Mora de feni*.

*Hominum amica, Mora Celli, Mora excelsa, Mora de feni.*  
Differentias duas tantum plerique faciunt, *Nigram* & *Albam*: vttramque descripsimus. Cæsalpinus putat, Plinium candidam & nigram eandem accepisse: quasi candida quæ hodie frequentissima est, & optima ad Sericum præstandum, peregrina quondam fuerit in Italia, vt etiam bestiola, quæ eius frondis pastu fericum reddit. Idem annotat Moro lignum flauum, aliquando & *Buxum* esse: folia Fico minora, rotundioraque, minusque sinuata. In tenellis quoque germinibus lætem, nescire succum quamuis parciorem, quam in Fico. Non florere euidenter, sed fructum nascentem binis squamis tegi, quibus decidentibus, veluti flosculorum apices totis fructibus insidere: quæ sanè obseruationem merentur.

*Morus nigra Morus alba Chamæmorus.*  
Camer. quemadmodum & Pena & Lob. tres differentias agnouere, Nigram, Albam, & Chamæmorum, quam Camer. scribit in duodecimum annum in horto cultam, nec vntquam tamen fructum protulisse. Sed non placent Pen. & Lob. in suis descriptionibus, quando sic tradunt: Vulgatio Morus, Serotinos flores edit catulos, hirsutos & folia Alni, maiora, rotundiora, nigriora. In alba, minora, imbecilliora, ambitu sinuata, albæ Populi, aut Sambuci montanæ, albidæ, flaccidæ, gratiora, sed Mora multò insipidiora, candida nitentia, ad nauseam potius quam ad alendū nata, caduca, fatiè dulcia, tota arbore minore, quam tamen pluris faciunt coloni ad velleris opus. Idem in margine: *Pumila*, quam vocant Chamæmorum, non nisi modo, magnitudine, pro totius rata parte distat. Sed valde claudicant eorum similitudines, quas Populum albam & Sambucum montanum cum Moro alba habere tradunt, cum

longissimè petiæ videantur, maxime Sambuci mont. ex qua vix vllam animaduertimus similitudinem. Deinde Albam minorem dicunt vulgata. Matth. contra, alioem, procerioremque semper albam dicit: Et sanè fateri non est vidisse nos nigras eius proceritatis, quales magno agmine serie quadam positas vidimus extra nobile Nemaulum.

*Morus arbor, morum fructus, vtrumque à Græco deductum apparet: nam μῆρος Ἀλκυλο & Eustath. Ibid. & fructus dicitur, μῆρος arbor: apud Pollucem etiam pro μῆρος scriptum μῆρος, vt annotat Conft. Dictum igitur μῆρος, ἀπὸ τοῦ μῆρος, id est, exitio, infortunio, vel supplicio, quoddam exitii quondam caussa fuerit illis qui excindebant. Non defuere tamen Grammatici, quibus [literam pro litera ponendo] *μῆρος*, vel Atticè *μῆρος* *ἡρώδῃ* *ἀνέκῳ* *ἡρώδῃ* dicta putabatur Morus, quasi minime fatua, quod diu morari consueverit, antequam germinum protrudat, metu frigoris rediit: quapropter & *sapiens arbor* dicta. *Bacha* Hebrais Samuelis 5. [licet] Pirus transtulerit vulgatus Bibliorum interpres, sed reclamant omnes Hebraei aut *Schickmah*, vt alii sentiunt, teste Trago. Serap. & Arab. *Thut*, qui & *Thut* vtrumque nominant tam arborem, quam fructum. Germ. *Nausbeerebaum*: *Nausbeer*, forte quia *quæritur* *τοῦ μῆρος*, oris affectibus commodus sit fructus ex cuius sanè succo conuenientissima parantur *quæritur*. Scimus tamen alicubi & *Norbere* dici, à quo forte & ab vtendi modo illud *Nausbeere* detortum. Belg. *Noerbeseboom*: *Noerbese*. Gal. *Murier*, *meurc*. Ital. *mors-gelsa*, & *gelsa mora*. Hisp. Castil. *moral* & fructus *moras*. Catal. *mora* & *mora*. Portug. *mora* & *mora*. Angl. *Nausbeere*. Boem. *Noruss*. Hung. *Gedersyfa*.*

Amat Morus calida loca, sabulosa, & plerumque maritima. Inuit Morum temperies calis moderatio, & locus planior, qualis est ager Narbonensis, Italia Lombardia: nec temerè in Montibus vllam Morum Plin. scribit. Annotat Tragus vtrumque genus, in Rhætiis Alpibus inueniri, quorum alterum atros, alterum candidos ferat fructus. In regionibus verò quæ Rheno adiacent, vnum duntaxat reperiri, nimirum nigrum. Alba vbiq; scater in Italia ac etiam Hispania ad alendos bombyces tantum sita. Nigra etiam vbiq; aut in hortis aut viridariis, ac in genere amœno amat tractus. Humor assiduus Moris prodesse non creditur. Frigida etiam valde abhorret. Basileæ & in Alsaux oppidis nigras colunt in ædium arcus, proceras, opulas & elegantes: sed albæ multò rariores In tractu Germanico, nuper tamen Illustriss. Ducis VVittemb. &c. mandato in Ducatum VVittembergicum magna copia ex Italia inferri & propagari, bombycum nutriendorum causa, cœptæ. Aded flagrat sapientissimi huius Principis indefessum studium, in ornando suo Ducatu, vt ne desit suis quod adest aliis, eoque eius magnificentia ferè res redacta, vt ad sit illis, quod abest multis, & vix paucis aliis nationibus concessum, vti passim in huius historię serie patet. Nos quoque vtramque colimus iam à multis annis in E. Choro Montbelg.

Serotino germinatu floret maturaque celeriter fructum Morus, quæ nouissima vrbanaum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Magna & in hanc vis Soli, nam cum cœpit, in tantum vniuersa germinatio erumpit, vt vna nocte peragat, etiam cum strepit, vt post Theoph. Plinius quoque scriptum reliquit. Sed cum primis folia dimittit. Trago non tan-

Synon.  
ling.  
Egmi

Sapien.  
bor.  
Bacha.

Thut.  
Elymon.  
Germ.

Locus.

Ducis  
VVit  
studium  
manu.

Tempu



tantum ob tardum illum ortum, sed quod folia sua tenella ab ortu statim rugosa producat, *Sapientia* symbolo notatam putat hanc arborem, seque observasse scribit, non protrudere folia, nisi exacto iam frigore & pruinis, iis maxime quæ perniciem adferre possent. Quod sanè vel ætati non indiget intelligendum, vel in locis temperatis. Alioqui apud nos & contrarium evenisse observatum, & pruinæ superuentu folia iam emissa contabuisse. Sed hoc rarit. Ergo vix plurimum mense demum Maio, germina emittunt: Fructum maturant Augusto, vt Dod. observavit. At nos citius, nempe Julio Basileæ, immò medio etiam Iunii matura legimus Monspelii, nec tardius in Austrâ Italici locis pleq̃q̃ Auenionensi & Veronensi agro plurimum gaudent. Cæterum hanc arborem tardissimè senescere Veteres prodiderunt.

Morus, inquit Plin. talea tantum feritur, quoniam ramo eam (in Vltimo seri alii: vet. inseri) religio fulgurum prohibet. Servandum in eo ante omnia, vt taleæ ex feracibus fiant arboribus: ne curdæ, nèue scabraz, aut bifurcæ: nèue teniores, (quod & Theophrast. & Colum. de arboribus talea ferendis in genere præcipiunt) quàm vt manû impleant: nèue minores pedalibus: vt illibato cortice: atque vt sectura inferior ponatur semper, & quod erit ab radice: accumbet utque geminatio terrâ, donec robur planta capiat: quæ conditiones & leges vniuersaliter arborû talea ferendarum sunt. Mororum sationis tempus ab Idibus Feb. usque ad æquinoctium vernum Columella designat. Vt Berytius auctor est, feritur autumnum ramulis scilicet modò terræ defixis, etiamque vere. Habitiora sunt terra ipsi circumstanti assidue sarcinata, non in profundum, sed vsque ad superficiem radicum. Mora etiam semine plantari possunt, si quis ipsum Morum prius dissoluerit, & grana eius electa in terram demiserit ac sigaverit. Præstat tamen plantari à claua & talea nam ex semine nata degenerant. Quidam taleis & cacuminibus sesquipedalibus, vtraque parte lævigatis, melius provenire tradunt, si fimo oblinantur. Locum in quem palum demerferunt, cinere terris admixto tegunt, sed non amplius quatuor digitis operiunt.

Fossione gaudet & stercore. Putria in iis & arida post triennium sunt putanda.

Plantam si robusta, transferes mense Octob. si tenera, Feb. & Martio. Scrobes desiderant altiores intervalla maiora, ne altera umbris prematur alterius. Circa Cal. Octob. Morus ablaqueanda est, & radicibus vini veteris recentissimæ feces in spargendæ. Amica est Morus & Vitis.

Feraciorum præciorumque fieri arborem tradiderunt, si perforato hinc inde trunco, singuli cunei Terebinthi vel Lentisci adigantur.

Inserunt, si priscis Geoponicis credendum, Castaneæ & Fago. Item Fico sub Cortice. Inseta Vltimo comprehendit, sed parit magnæ infelicitatis argumenta vt iisdem persuasum. Berytius apud Const. Cæsarem scribit, si Populus alba inseratur autinoculetur in Morum nigram, alba Mora nascitur. Sed Quiqueranus de laudibus Prouinciæ ait, si quis Morum nigram Populo albæ inserat, in Morum albam facere. Quin & Io. Agric. vulgò Mora alba fieri tradit per insitionem supra populum albam, nouumque esse inuentum, cuius Antiquiores non meminerint, in quo fallitur. Sed quicquid sit, tam Veterum, quàm Recentiorum fabulam putamus, neque est, qui se expertum tradat. Et Geoponicorum Clariss. scriptor Palladius, qui de Mori insitionibus sequentes versus com-

posuit, huius rei & Populi albæ ne verbulo quidem meminit: refert verò & alias quædam arbores, quarum coniugium admittat.

Morus quin etiam Mori commercia Ficus præstat, & oblarum Robore germen alit. Fraxinus huic auide confert sua membra furori, Ermetus sternis sparsa cruore moros. Proceræ Fagus, & poma hirsuta virentis Castaneæ, duræ aspera mala comu Inficiens monstrat piceo nigrescere partu, Et succopas iturgida poma nouo. Obsequitur Mori blando Terebinthus odore, Et geminis veniunt munera mista bonis.

Res est experimenti: experiatur qui volet. Morus si tardiùs folia producat pro bombycum alimento, nouilunio finum radicibus eius adhibeatur.

Mori foliis deficientibus Vlmi folia & Vriticæ germina substituenda suadet Car. Steph. Quidam & Lactucæ folia præbent & Endiuia, sed iunioribus tantum, nam egregiè depascuntur: sed si nimium des, aut paulò maioribus, aluo fluida facillè dissoluntur ac pereunt, vt ipsimet experti sumus. Quidam & Rubi folia tenella dare suadent, sed his neutiquam delectantur. Mori abq̃ foliis nos nigra substituiimus, nec sine succellu. Hæc eadem quoque, vtpote magis pulposa conueniunt adultis: sic etiam serico pondus maius acquiritur & crassities, vt annotat Cæsalp.

Colligenda priùs vetera folia, quàm noua, manè ubi ros deciderit: aut si madida fuerint diligenter priùs abstergenda, aut ad ignem siccanda: Nam nimia humiditas obest bombycibus.

Cæterum Mori culturam, administrandi modum, quemadmodum & bombycum serici architectum curiosè & diligenter descripserunt Car. Steph. & Hieron. Vida Cremonensis elegantissimo carmine. Sed his adhuc specialius & curiosius Aug. Gallus in opere suo Geoponico Italicæ conscripto.

Mora in vitreo vase diligenter condita plurimo tempore durant, proprio suo vino demersa diligenterque operta, auctore Constantino. Morus semper maximi fit, in iis regionibus ubi sericum paratur, vt Lucæ, Genuæ, Granatæ, in tota penè Lombardia, Auenioni, nuper Turoni Gallorum, & hodiè Stuckardæ quoque.

Qui mulcas vitare volunt, non plantent iuxta domos.

Hipp. auctore, sanien cruentam ex vtero educit *ovis* (Mori, gal. & Cornar.) radix cum melle subdita, & postea rosaceo illinita. Sanè nisi inuenerit autoritas galeni, (quem meritò tantam fidem Hipp. interpretem suspicere debemus) *ovis* voce malleus Ficum intelligerè, quàm Morum. Ficus enim à Dioscor. & aliis *ovis* dicitur. Et si reim & rationem ipsam inspicias non temerè nostram reiicias coniecturam. Ficus quippe nostro iudicio, melius fortè id præstabit lactis sui acrimonia, quàm Morus. Videtur & ipse Hipp. propter radicis acrimoniam illitum, postea præscribere ex oleo rosaceo. Et galenus asserit, in radice Mori restringendi partes vincere. Quod si ita est, vt reuera esse censemus, quæ questio ratione proluciat vteri sordes purulentas? Sed hanc nostram sententiam libenter doctiorum subiiciamus censuræ. Hoc saltem præstitisse putamus, si Hipp. non Ficum intellexisse videatur, id tamen, quod intendit, eius radice vel ramo haud inefficacius præstari posse, quàm Mori. Is præterea si prægnantes bilis vexet, pisanæ succum dat Rheo rubro insperso, aut eo qui ex Moris paratur

Succeda-  
nea.

Delectus

Repositio

Vires &  
vius.  
Sanien  
vi.

Coniectu-  
ra in Hipp.

Idem ad faciei maculas helidas dictas inter alia, Mori folia admovent. Vlcenibus, si sordida fuerint infusum & fomentum ex Mori radice adhibet. Apud Nicandrum in Antidoto Aconiti, Mori radicula mortario tusa vino ac melle cocta praefruntur aduersus Aconitum. M. eitor apud Theophrast. calidam esse Morum prodidit.

*Eignis suis.* Materia vilis operibus, quae flexu constant, aut flexi postulant: eique hac in re primatus datur. Aeternam, idem Theoph. tradit esse arbitrantur ac validam, ac vetustate Loti modo nigrescere: ideo furculas ex ea circosque faciunt: item naubus tornacula: similiter & auriculas Liburnicis, & testudines atque firmamenta.

*Præparat. V. suis.* Mori succus, ut scribit Diosc. aluum soluit, facit corruptionem sentit, & ventriculo inimicus est. Hac eadem ipsius succus praestat. Decoctus autem arceo vase, aut insolutus, adstringentior redditur. Admisit pellis exigua, facit ad fluxiones, nomas & tonsillarum inflammationes. Sed augetur eius vis adiectis, Alumine scissili Galla, Myrrha & Croco: insuperque fructu Tamariacis, Iride ac Thure. Immatura autem Mora siccata contusaque, Rhois vice obsoniis ad miscetur, Caliacisq; nuant.

*Caliacis.* Radix verò cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit, latas ventris tinea expellit, & his auxiliatur qui Aconitum hauserint.

*Purgant.* Folia trita cum Oleo imposita, ambustis igni madentur. Cocta verò in aqua pluua cum Vitis Ficiq; nigra foliis, capillum tingunt. Succu foliorum Cyathi mensura potus, à phalangio de moris opitulatur. Corticis autem in foliorum decocto dentes aptissimè in dolore colluuntur.

*Morsus p. v. Dolor dentium.* Ceterum radix circa mensem circumfossa & incisa dat succum, qui quodammodo concretu postridie reperitur. Is ad dentium dolores efficax est: tubercula d. scuit, aluumque purgat.

*Succus cyn. dicit.* Quod hoc in loco Diosc. succu dentium dolor cōferre scribit, id Montanus, & post eum Schenck ita tradere videtur. Ut dens putris sine ferro citra dolorem eruat, capsulam ex gummi arboris Mori imponit.

*Tubercula.* Galenus eadem ferè cum Dioscoride habet sed specialius diducta, & aliis quibusdam adacta: ex cuius etiam verbis perspicue est intelligere, quomodo *κατασκευα* sint & quomodo non sint: Mori, inquit, fructus, maturus quidem ventrem subducit, immaturus verò ubi auerit, admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est, & affectiones caliacas, & quasunque alias fluentes. Contunditur autem ac obsoniis commiscetur, veluti Rhois, fructus: aut si cui ita videatur, ex aqua aut vino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomachicā medicamentā sit vilis propter eam videlicet quæ illi inest, adstrictionē neminē lateat.

*Dysenteria.* Præterea ad alia complura particula quæ medicorum possunt adstitutionem, competit. At immatura Mora, præter acerbiteriam, etiam aciditatem fortita sunt, & tota adeo arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam vim obtinere videtur ex restringente & purgante compositam. At tamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exsuperat, adeo ut & huius lumbicū interficiat, in aliis autem partibus restringens vincat: in foliis tamen & germinibus quodammodo media vtriusque temperies est. Ipsa porro Sycamina celerimè pertranseunt, cibisq; aliis præeunt, si in ventriculum purum in-

*Admini. stranda mor. dicit.* ciderint & sumpta primis epulis fuerint. Quod si sumpta post alios cibos fuerint, aut etiam prauum succum in ventriculo offenderint, celerimè vnā cum aliis cibis corrumpuntur nouo quodam corruptionis genere & quod verbis explicari nequeat, ut in cucurbitis accidit. Omnia enim hac, si modò celeriter incorrupta sub-

*Stomatica.* federint cibis fugacibus minis sunt noxia: sin minus, corrumpuntur non aliter, quàm Pepones, quanquam hi quoque, si celeriter subducantur, nullam magnam noxam adferunt. Tempus autem vtendi, ut Peponibus, ita & Moris est, cum corpus ventriculi squalore æstuat, quo tempore necesse est quodammodo hepatis quoque idem accidere. Cucurbita quidem & Cucumeri tum maturo, tum ante maturitatem, adhuc & Meloeponi, nulla adstringens qualitas inest: sycaminis verò, & potissimum, cum nondum admodum maturuerint, qualitas eiusmodi conspicuè inest: immaturioribus autem inest simul & acida. Proinde nonnulli ipsa ab arbore detrahentes ac siccantes reponunt, medicamentum ad dysenteria ac diuturnā Diarrheā curationem utile sibi futurum. Quod verò celeriter subducantur fortè accidit propter solam substantiam humiditatem ac lubricitatem, fortè etiam propter admissam qualitatem quandam acriorem, quæ deiectioni excitanda satis esse possit, quantoquidē qualitas adstringens non modò ad subductionem nihil confert, verum etiam suapte astra ventrem constipat. Coniectura itaque est, Mora exiguum in seipsis habere facultatem eiusmodi, qualis magna medicamentis purgantibus inest, cuius beneficio non modò facile sed edunt: sed corrumpuntur etiam si diu in ventre manserint. Quod si corrupta non fuerint, omnino quidem humectant, non tamen omnino refrigerant, nisi sumpta fuerint frigida: alimentum autem corpori præbent minimum, quomodo Pepones, non tamen, ut ii, vomitum excitant, nec stomachum lædunt: *Hætenus Gal.*

*Radices purgantes.* Audiamus & Pin. qui postquam de Mori Aegypti viribus egisset subdit: Nec apud nos siccior vltus minor. Aduersatur aconito & araneis, in vino potus. Aluum soluit, pituitasque ac tænia & similia ventris animalia extrahit. Hoc idem præstat & cortex tritus. Folia tingunt capillum cum Fici nigra & vitis corticibus simul coctis in aqua caelesti. Pomo ipsius succus aluum soluit protinus. Ipsa poma ad præsens stomacho vtilia, [Dioscoridius dixit] refrigerant, sitim faciunt. Si non superueniat alius cibus, intumescunt. Ex immaturis succus sistit aluum. Fit ex pomo pancrestos stomatice, eadem arteriace appellata, hoc modo: sextarii tres succi ex Pomo, leni vapore ad crassitudinem mellis rediguntur: Post additur Omphacii auti pondus denarii. Myrrhæ denarii. Croci vnius, simul trita miscentur decocto: sic enim legendum ex vetustiss. codicis auctoritate, teste Corn. Neque est aliud oris, arteria, vix, stomachi iucundius remedium. Fit & alio modo. Succus sextarii duo, mellis Artici sextarius, decoquantur ut supra diximus.

Huiusmodi Galeni Hiere similis est ex Moris compositio. Succu Mororum heminas sex ad stringentiam spissitudinem coquito. Deinde tritis Croci drach. j. Myrrhæ drach. ij. Omphacii drach. j. Alum. fissi obolos iij. Mellis heminam vnā addito. Hæc ad vnas, tonsillas, ac omnes, quæ repente oriuntur in ore inflammationes conueniunt.

Aliam ex Moro stomachicā idem Gal. ex An-

dro.

Quem-  
cui  
sumpt  
fructu  
neutri

Temp  
renda

Siccat  
Dysen  
Diarrh

Cura  
libric  
reddat

Patru  
fruent

Aduer  
arane  
Tania

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos

Alum  
fissi  
obolos



dromacho reconfer. Caterum Plinio nequitiam consentit Horatius, iniquenti, intumescere Mora comesta, nisi alius superueniat cibus, vt his declarat versibus:

*— ille salubris  
Aestas peraget, nigra qui prandia Moris  
Finiet, ante grauem que legerit arbore Solem.*

Nec Dioscoridi consentit Diphilus Siphnius Medicus apud Athen. sic scribens: Sycamina, quæ & Mora nuncupant, succum mediocriter bonum generant, parum alunt, celeriter excernuntur, *Sycamina*, hoc est, ventriculo grata sunt. Peculiari verò facultate ante maturitatem lumbricos expellunt [hoc Dioscorides de cortice radice scribit.]

Pythermus, vt inquit Hegesander, memorie tradidit, æuo suo Moros annis viginti fructum non edidisse, & popularem viginti podagram ita fuisse grauatam, vt non solum viros, sed etiam pueros, virgines, eunuchos, mulieres is morbus corripuerit: quin & eam egritudinem adeo vehementer traxisse in greges, vt ouium partes duas ille morbus affligerit.

Mita sunt præterea, inquit Plin. quæ produntur. Mori germinatione, prius quam in folia exeant, sinistri decerpitubentur futura poma: ricanos Græci vocant [Cytinos Hermodol.] Hi terram si non attingere, sanguinem sistunt adalligati, siue ex vulnere fluat, siue ore, siue naribus, siue hæmorrhoidibus: ad hoc feruantur repositi. Idem prætere & ramus dicitur, Lunâ plenâ defractus, incipiens fructum habere. Si terram non attingit, priuatim mulieribus adalligatus lacero contra abundantiam mensum. *Sed veremur ne superstitionis eius diu remedi generibus sit profascutate.*

Vuliora sunt quæ sequuntur. Folia Mori trita, aut arida decocta, serpentium ictibus imponuntur. Ad idemque potu proficitur. Scorpionibus aduerfatur è radice corticis succus ex vino aut poculo potus. Succum expressum maturi pomi immaturique mistum coquebant Antiqui in vase æreo ad mellis crassitudinem. Aliqui myrrha adiecta & cupresso: vel, vt alii malunt, passo, præducentes, vas Sole torreat permiscentes spatha terdie. Hæc erat stomatice, quæ & vulnera ad cicatricem perducebant.

2. Alia ratio: immaturi succum exprimebant, siccatò Pomo multum saporis obfionorum conferente. In medicina verò contra nomas, & pectoris pituitas, & vbicunque opus esset adstringi viscera. Dentes quoque colluabant eo. 3. Tertium genus succi, foliis & radice decoctis, ad ambusta ex oleo illinenda: imponuntur & per se folia. Radix per messes incisa, succum dat apertissimum dentium dolori, collectionibusque & suppurationibus. Aluum purgat. Folia Mori in vina madefacta, pilum coris detrahunt. Placuit hæc ex Plinio ad verbum transcribere, quamvis pleraque & à Diosc. tradita videantur, sicut & ipse Veteres citat Plinius: sunt tamen & quædam à Plinio superaddita, quæ excindere ex Plinii verborum serie nolimus. Et quoniam iam aliquot Diamori descriptiones ex Diosc. Gal. & Plinio proposuimus, meritò & eam adscribendam censuimus, quæ hodie in Pharmacopæorum Officinis parari solet ex descriptione Nic. Florentini.

Succi Moror. Celsi lib. sem. Succus Moror. Rub. lib. j. Mell. opt. despum. Sap. vnc. iij. Cordus loco sap. succos Mori Rubi Idei & Fragor, pari singulorum cum succo Mororum pondere addit. Vius ad depascencia oris viscera, ad dentium affectus & gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia

Tom. I.

cum, aq. conuenienti succo vel decocto gargarizatus non sine magno profectu. Potest etiam omnibus ferè supra scriptis morbis diuersimodè accommodari.

Aegineta autor est, Mora impensè humectare & mediocriter refrigerare: Neque tamen hæc facultates acerbitati & aciditati, vt Curtius putat, eorum tribuendæ, cum vtraque illa facultas terrestris alicuius naturæ potius sit focia, quàm humiditatis. At immaturis vtramque inesse non negamus. Succus illorum, Cyathi pondere contra phalangiorum morbus auxilio est. Subdico verò in vino decoctus & bibitus, ventris defluuia compescit, vel Sereno hoc testante his versibus.

*Arbre pyramée cortex direpta liquetur*

*Axe sub æthereo, sic nigro mixta Lyas,*

*Immensum poterit potu retinere fluorem.*

Bayrus ad defluuium capillorum radices Celsi ex corticatis atque combustis coquit cum oleo ros. & vngit.

Constat (inquit Matth.) alba Mororum astringentem facultatem longè minorem, quàm nigra esse adepta (et si Diosc. & Gal. alborum non meminissent) & multa & perspicua, sed paululè insipida dulcedine: in maturis nulla adstringendi vis planè percipi potest. Quare nec ita vt nigra in medicos usus assumuntur, quamquam magis nigris alvum subducant.

Schuenckfeld. annotat folia x aceto ambustis mederi Camer. Anno 1559. tantam annonæ penuriam Italix loca quædam pressisse, vt pauperioribus curiones Mororum in alimentum cesserint.

Ex Mori etiam materia, autore Marcello, paratur Italici igniarii, si, (vt ferè matutino tempore fit) extinctis ignis hæsterni reliquijs omnibus, instaurandus iterum focus sit. In quem vsum mutuo eius ligni attritu flammam excitari dixerunt. Eandem vim Mnestor apud Theophrastum Moror tribuit, quòd ad excipiendum ignem apertissima videtur ob materię lentorem.

Tradunt & pastorum religione olim consecratam, nunquam nisi sanguineo eius Pomi succo tinctis corporibus, Pana numen suum precibus & votis ad suam sui que gregis opem inuocantium. Superest insignis illè foliorum usus, quibus quadraginta ferè diebus à vergiliarum exortu vsque ad solstitiū passi vermes serici plasat, velletis nunc omnibus notissimi quo principes quondam & magistratus ornabantur, vt esset potestatis & honoris insigne: nunc autem promiscuo vsu ad plebem, & vti nam non ad meretricium luxum pellucentem translatum, vel in agris etiam forde re cæperit.

Plinius id vestimenti genus sceminis olim tantum in delicijs habitum haud obscure insinuat: nec puduit tamen has vestes vsurpare etiam viros, leuitatem propter æstiuam. In tantum à lorica gerenda discessere mores, vt oneri sint etiam vestes, vt meritò cum Seneca rogemus: nonne videntur tibi contra naturam viuere, qui commutant, cum sceminis vestem? Nec sine ratione Tiberius olim, vt refert Tacitus, promiscuas virorum & sceminarum vestes accusabat.

Porro siue nendi, siue texendi varium serici artificium, immò si ipsam animalculorum adnuandam inspicias naturam & varietatem tam vitæ, quàm operis, nullibi sagaciorem naturam, industriam magis deprehendas artem: at si vsum & reditus, qui inde manant species, haud vanè tantoperè Italici atque Hispanici hodiè etiam Gallis atq; Germanis optabilem haberi ceptam, vt sint, qui in re rustica Morum etiam vitibus &

L. 2

Oleis aded præferendam censuerint, quoniam in Italia vestigial præcipuum iamdudum esse cæperit, annonamque nihilo hercle mundis, quam vitis & Olea augeant.

Præfertur tamen ab omnibus, copia & teneritudine foliorum magis [vt inquit Marcellus] quam bonitate Morus candida, præcis naturæ cultoribus atque historiographis, vti videtur, ignota, & in Italiam non nisi serò translata, quando, [vt iam prius monuimus] nec Theoph. aut Plin. nec in disciplina turis tot Latini auctores aliquid de ea tradiderint: non relicti in augenda domini re tam facilem simul & honestam quæstus rationem, si quod tam latè nunc patet tractare & exercere, eà quàm nunc exercetur ratione, & ipsi quoque didicissent. Fuisse tamen serici, & quidem bombycum opera facti, apud ipsos vsum maximum, vel ex Plinij historijs abundè patet, sed longè differente

ab hodierno conficiendi modo, de quo ipsemet consuli potest. De bombycum historia, & foliorum administrandi ratione specialiori hic tractare super sedemus, cum breuitatis causa, tùm verò quòd istud negocij iamdudum mihi [Cherlero] datum nouerim in historia mea Insectorum.

Non omittendum quod Porta in noua sua Philosophandi ratione, à signaturis petita, annotat, Mora in somnijs visa vulnera portendere ob colorem. Immatürum, hoc est, nondum perfectè maturum, quia rubeus sit, tunc præcipuè astringere ac sanguinem reprimere: maturum verò, quia nigrescat, soluere aluum: quos effectus vt concedimus, ab ijs coloribus tanquam causis produci: immò nec requirere. quidem censemus vel signa infallibilia. Dicemus & hæc ne auctores quidem verè ac propriè censerì possè, quibus temerè fides in arte sit habèda. Sed hæc alteri\* sunt tractationis.

## DE SYCOMORO ET FICV CYPRIA.

## CAP. LXIIII.

Sycomorus Matth.



Cypria Alp.



Cypria.



Descriptio  
Folium.

IN sicco nostro Herbario folium habemus Sycomori, paulò palmà latius, longitudine aliquatò maiore, in obtusum mucronem desinens, nonnihil sinuatum, quod secundum longitudinem percurrit nervus, vnde oblique in latera venæ, propaginis suis quoque donatæ, porriguntur, quale ad figuram Ficus Cypriæ adpingi curauimus. Sycomorù siccam præterea vidimus apud Celeberrimum Virum D. Vlysses Aldroandum, Professorem doctiss. & rerum naturalium peritissimum, Medicum Bononiensem, cuius figuram exhibent Bry Fratres in æneis tabellis effigiatam.

Rauvolfij  
descriptio.

Ex totius arboris inspectione descriptionem dedit Rauuolfij. vt sequitur. Tam Cypria quam Aegyptia Ficus sylvestris, seu Sycomorus, proceritate crassitieque Morum albam adequat folijs quoque consimilibus donata, paulò tamen magis rotundatis, in ambitu nullis incisuris crenata, serrataue: Fructus ferunt nostris Ficibus non ablimiles, dulciores tamen, cenchramidum expertes, bonitateque inferiores: quò sit vt minoris estimantur, magnæque ex parte in pauperum vsum cedunt. Vnde. Veraque species caudice, folijs, structura admodum est similis: abique eo quod

vt huic fructus inferius potius est in ramis maioribus ipsòque etiam caudice, ita illi, iidem nascuntur non in ipsis ramis, sed in priuatis furculis, foliorum expertibus, spithamam longis, plerumque admodum conferti. Fructus ferunt hæc arbores ter quaterue quotannis, paruos, ad cinereum colorem vergentes, ex oblongo rotundos, Prunorum instar, toto ferè anno in arbore sua inueniendos.

Alpinus sic describit. Maxima arbor ramos latissimè spargens, folijs Mori crassioribus, candidioribus atque asperioribus. Inhibitionem Fici supra Morum plures Aegyptij afferunt. Truncus, ramus, cortexque, fructus, lac, foliorum asperitas colorque Fici apparet: foliorum figura & magnitudo Moro respondet. Fructus tardè, neque perfectè maturefcit, atque saporem aqueum & iucundum habet: nunquam multis fructibus caret, qui caudici adnascuntur, minimeque ramis: neque fructum producit hæc arbor, nisi priùs multis verberibus sæpè lacereur, sic vt caudicis cortex vulneretur, vnde exiguis furculis Ficus fert modò ternos, modò quinos, modò septenos & plures etiam. Ex feminibus non nascitur, sed ramis propagatur.

Ad huc



Ad hæc Leo Aphric. lib. 9. Ficus Aegyptia, incolis dicta *Giametz*, arbor & folia similia cæteris ficibus: Verum arbor est insignis altitudinis & crassitudinis: fructus non fert supra ramos nec in extremitate eorum, sed tantum ad radicem arboris, ubi nulla folia: saporem, qui ficibus vulgaribus, crassi & violaci odoris. Considerandum an bene describatur Ficus Aegyptia à Leone foliis similibus Ficibus, quandoquidem alii aliter tradunt.

*Συγγράμῳ* Aegypti propriam, & Ficem Cypriam describit Theophrast. & ex eo ad verbum penè Plinius in hunc modum. Et in Aegypto multa genera, quæ non alibi. Ante omnia Ficus, ob id Aegyptia cognominata. Arbor Moro similis folio, magnitudine, aspectu. Pomum fert notissimis, sed caudice ipso. Idque ipsum Ficus est prædulcis, sine granis interioribus, perquam secundo proeunt, scalpendo tantum ferreis vnguibus: aliter non maturefcit. Sed cum factum est, quarto die demittitur, alio subnascente &c: In Theophrast. autem quædam emendanda: nam pro *ἐν τῇ* leg. *ἰδίᾳ* *διόδοτος* ex Plin. & ad *τὸ φύλλον*, addendum *ἕν*, ex ipso sensu.

Quod verò Theophrast. ait Ficum Aegyptiam fructum ferre non furculis, non ramis, sed caudice ipso: quàmque sententiam & Dioscor. sequitur: Athen. aliter habet, sic: *φέρει καρπὸν ἀπὸ τῆς ῥίζης ἐν τῇ ἀπὸ τῆς ῥίζης καρπὸν*. vbi, *ἐν τῇ ῥίζῃ*, teneros ramos vocat. Gal. verò in 2. de alim. fac. cap. 35. omnia hæc aliter, & fortè corruptus codex est.

Testatur Galenus se arborescē vñā cum fructu in Alexandria vidisse, fructum quidem consimilem Fici paræ albe, cūmque in medio Mororū a cicuum locari posse ait. Vnde etiam nomen sitūdeptus, à similitudine videlicet, quam ad utrumque fructum habet, vnde Sycomorus dicitur. Insuper etiam ridiculos eos esse ait, qui Sycomora dicta putant, quòd fatuis Ficibus, hoc est, *τῶν μωρῶν σῆκας* similia existant. Quibus verbis palmam est Dioscor. ab eo notari, quem & ipsum de Sycomoro tradente audiuisse par est.

Sycomorum, inquit ille, aliqui etiam Sycaminum vocant: cuius fructus Sycomoron quoque propter ignauium infirmūque saporem appellatur. Est autem arbor magna, Fico similis, largo succo abundans: (*πολύτοι ἢ πολὺχυλον* ex Theophrast. vulgata quædam *πολύχυλον* habent. & Sarrac. testatur, in vetustis codicibus *πολύχυλον* legi, sicque & Serap. & Ruell. legisse videntur: & id ipsum etiam Plin. innuit, quando aliàs multo lacte, aliàs largo succo abundare Ficem Aegyptiā dixit) foliis Mori. Fructum & ter quaterūe anno profert, non ē summis ramis, vñ Ficus, sed ē caudice ipso, caprifisco similem, grossi dulciorem, sine granis interioribus: quique non maturefcit, nisi vngue ferroque scalpatur.

Athen. Sycomori seu Ficus Aegyptiæ fructum indigenæ, vbi ferro leuiter scalperint, in ipsa plāta relinquunt: tandem verò vento iactatus, eā curā intra triduum maturefcit, odorūque fit ac esu iucundus, præterūque si Faunii spirauerint. Et ante Dioscor. Athen. & Plin. dixit Theophrast. maturefcere nequit, quin scalpatus fuerit, id quod ferreis præstat vnguibus.

Cur verò citra scalpaturam eius fructus maturefcere vix queat idem Theophr. declarat alibi, sed oleo quoque petungi debere ait pōst scalpaturam, idque nisi fiat maturitatem adipisci non posse, propter affluētiā pabulī: siquidem scalpū aliquid humoris prolicuit.

Quod ad scalpendi modum, Theophrast. Plin.

Tom. I

& Athen. ferri tantum meminerunt, vel vnguibus ferrei: at Dioscor. & vnguibus simpliciter, & ferri. (*ῥαχὶ ἢ σιδῆρῳ*) sed parum referre videtur, siue humano, siue ferreo scalpatur vngue, modò scalpatur, quod id & alio instrumenti genere fieri queat. Sed sola scalpura non sufficit, sed & oleo inungi oportere aliquoties inculcat Theophrast. quod Plin. non obseruauit, ita parum consideratē scribens: scalpendo tantum ferreis vnguibus &c: quamvis nec ipse etiam Dioscor. vel verbulo solo meminerit olei, nec Atheni qui tamen pleraque ex Theophrast. mutuati videntur, aut certè omnes hi ex aliquo vetustiore.

Cæterum Dioscor. eam Ficem quæ in Cypro nascitur, (quam Cypriam vocauimus) ab Aegyptia specie differre ait: quippe, inquit, quæ Vlmus (*ῥαχία*) cum sit, folia Sycamini [Sycomori Corn. vertit] refert: fructum verò Prunorum magnitudine [*τὸ μέγεθος κοκκυμῆδον*] & quàm Pruna ipsa dulciorem. Cætera omnia antedictis similia sunt. At Theophrast. hanc Cypriam Ficem paulò aliter describit. Nam arboris caudicem, cui fructus adnascitur, Populo albæ (*τῇ λευκῇ*) similem facit: folium (*τῇ πτελίᾳ*) Vlmō. At Plin. in hoc tantum à Theophrast. discrepat, quòd non Pruni sed Sorbi fructum dicat esse magnitudine. Sed à magnitudine exigua differentia, modò paruum, aut mediocriter tantum Prunum cum Sorbo confetas maiusculo.

Vides itaque Dioscor. cum Theophrast. Cypriam Ficem à Sycomoro diuersam facere, hancque inter Vlmorum genera referre. Plinius distinguere videtur, quando ait: Mora in Aegypto & Cypro sui generis, vt diximus, largo succo abundans summo cortice desquamato, altiore plaga siccantur, mirabili natura. Athen. quoque separatim de Cypria Fico agit, lib. 3. qui iam de Aegypto lib. 2. tradiderat. Nihil verò aliud, quàm Theophrast. citat verba, quæ cum iis, quæ suprà ex Plinio adduximus penè coincidunt. Verum Athen. cum Theophr. in hoc tantum differt à Diosc. quòd hic arborem Vlmō similem esse tradat, ille solum tantum. Sunt tamen qui apud Theophr. pro *ῥαχία* legendum censeant *ῥαχία*, eo sensu, adultam Populo similem esse. Lectionem tamen vulgatam Diosc. confirmare ait Dalech. quod non simpliciter verum, quippe qui arborem ipsam, non folium, vt illi, similem Vlmō dicat esse, sicut dictum.

Cæterum haud supinè hoc loco prætereundum, quod & cap. superiori de Moro obiter monuimus, Plin. lib. 16. c. 38. Moro tribuere, quæ Sycomoro competunt, quando sic inest: Mirum, hinc in Moro Medicis succum quærentibus, ferè [verè M.] hora diei secunda lapide incussus [incisus M. incusso vet.] manat, alius fractus cortex siccus videtur. Quod sanè Dioscor. manifestè de Sycomoro refert, his verbis: Liquorem verò fundit arbor [Sycomorus] primo Vere, priusquàm fructum proferat, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim frangatur aliud, nihil quicquam emittit. Spongia aut vellere lachryma colligitur, quæ siccata & in pastillos coacta, fistili vase reponitur, ex quibus Diosc. verbis facillè Plin. restitui potest. Sed diuersimodè hic locus apud ipsum quoque Diosc. legitur. *κατὰ τὸν δὲ περὶ πτελὶς κατὰ τὸν δὲ περὶ πτελὶς* Dalech. nempe lacteum succum ex arbore tenella colligitur priusquàm fructum ferat. Plin. pro *κατὰ*, aut *ἐκ* *κατὰ* seu *ἐκ* *κατὰ*, aut tale quid legisse videtur, quando diei horæ secundæ mentionem facit, quæ in matutinum tempus inciderat, vt classici Scriptores anno-

L 3

Ficus Cypria ex Diosc.

Theoph. Ficus Cypria

Vlmi genu

Mora Aegypti Plinio Mora Cypria

Plin. nat.

Succum emittit Sycomorus.

Modus legendi Diosc.





Ficus Cy-  
prica

Segeſten.  
Rubi Moru

*Ficus agre-*  
*stis.*  
*Ficus Ae-*  
*gypti.*

Az. ad-  
rachs.

Laurocera-  
fus.  
Acer miner  
G. minor.  
Arbor Inda  
Locus.

Arbor Inda  
Locus.

Tempe-  
ram.

ceps, estque facultate, vt Mora, humidior quodammodo ac frigidior. Quin potius in medio Mororum ac Ficum iure quis ipsum collocarit, indeque nomen ipsi arbitror esse positum. Et in 14. meth. K. T. in curatione tumoris ex crasso vaporosoque spiritu, mitum in modum commendat Emplastrum dicitur *Ευκράδης*, cuius descriptio est apud Paulum Aeginetam.

Athen. Sycomori fructum probè maturum, odoratum, ac esu iucundum dicit. Eundem ob lenem refrigerandi vim, eorum quos febris vrit stomacho impositum cum rosaceo, non parum ardorem agrotantium mitigare.

Ardor stomachi cum febre.

Paulus de fructu & lachryma eadem tradit quæ Diosc.

Aduersus serpentes.  
Dysenteria.  
Pani & tumores.  
Vulnera.  
Capitis dolores & animum.

Succus Mori Aegyptiæ & Cypriæ, vt tradit Plin. aduersatur venenis serpentum, prodest dysentericis, ducit panos, omnisque collectiones: vulnera conglutinat, capitis dolores sedat, item aurium: splenicis bibitur. Illinitur & contra perfrictiones. Idem Plin. fructum prædulcem dicit: Et Cyprio suauitatem Fici tribuit.

At Bellon. vtiam prius monuimus ingratum potius dicit, nec maximè expectandum, fortè quòd fatua illa dulcitudine sensum non excitet, eademque fastidio magis quàm nouæ voluptatis titillatione edentes impleat, adeoque inersis laporis esse videatur. Vtinunc sensum trahendum videatur quod Plutarchus de Sylla & ab eo obsessis Atheniensibus ait: qui intra vibem clausi, & muris hominis ignauia maledicentes ac irridentes, nunc metellam quasi mulierem appellabant, nunc, hoc scomunate impetebant *συγκομις* id est, Sylla Sycomorus est polenta maceratus: ignauore adiuncto alio, hominis ignauiam ingeminatam insinuare volentes.

Scoma in Syllam.

Sylla Sycomorus.

Theuetus scribit Fructus Photol siue Ficus Pharaonis præter ceteras dotes ad sedandam sitim & februm ardentium estus refrigerandos peritiles esse: ac folia arthritidi mirè conferre.

Febris.  
Situ.  
Arthritis.  
Nosa.

Vfus figum, teste Alpino, in cibo stomacho est noxius, ipsumque laxat, labefactat atque subuertit. Li verò Ficus vtiliter comedunt, qui vel itinere, vel Sole incaluerint, refrigerationeque opus habent, & humectatione: fructus siquidem hi frigidi temperatè existunt, multumque humidi: alium faciliè lubricant, atque relaxant: tumores omnes calidos atque duros, emplastri modo impositi sanant.

Temperam.  
Aluum laxant.  
Tumores.

Idem Alp. ait Dioscotidem tradere, succum Sycomori non ignobilem ad pestem vsum habere. Necessè est igitur alio loco hoc scribere Dioscor. quàm capite de Sycomoro vel Ficu Cypria, nam hæc verba, hancque verborum sensum apud eum hæcenus non legimus, qui Sycomori fructum aduersus pestem deprædicet.

Vinum Sycomorum.

Fit & vinum è Sycomoris (*συκμορέων* dictum) eodem modo quo Catorchites, de quo cap. de Ficu: sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita praualet vis eorum, vt manantis liquoris dulcedo retineri possit. Dioscor. Eiusdem aceti meminuit & Plin. qui postquam de Sycite vino locutus fuisset, subdit: E Cypria Fico & acetum fit præcellens, atque Alexandrino quoque melius. Per Alexandrinum autem acetum non aliud intelligit, quàm id quod ex Sycomoro paratur, quæ Alexandria plurima est, vt vel ex Diosc. lectione patet.

Plin. idios.

Iamen, inquit Rhazes, calidi sunt ventriculo mali, nauseam excitant, subtilioris naturæ quàm Ficus, citiusque descendunt. Per Iamen Sycomorum intelligimus apud Rhazem.

Digrum certè notari, quod D. Augustinus de

ciuitate Dei ad Marcellum libro. 21. capite 5. perscribit. Lignum cuiusdam Ficus Aegyptiæ tradunt, non vt ligna cætera in aquis natate, sed mergi, & quod est mirabilis cùm in imo aliquandiu fuerit, inde ad aquæ superficiem rursus emergere, quando madefactum debuit humoris pondere grauari.

### SYCOMORO SIMILIS.

In insula Mayo, (quæ vna est Viridum, graduum quindecim eleuationis poli versus Septentrionem) multæ arbores patulæ & longiusculæ à se inuicem distantes conspiciuntur. Similitudinem quandam habent cum Sycomoro, foliis velliuntur paulò minoribus quàm Ficus: fructus fuerunt Ficubus adsimiles, paruos, luteos, sine granulis aut semine. Trunco, ramis, cortice, fructu, succo lacteo & foliorum acrimonia planè similes sunt Ficubus. Fructus earum nunquam ad perfectam maturitatem peruenit. Arbor est admodum fructifera, vt haud faciliè inueniatur absque fructu. Non provenit ex semine seu fructu, sed ex surculis aut taleis in terram depactis, vt Mori nostrates. Liaschottanus.

Locus.

Descriptio.  
Folia.  
Fructus.

### FICVS. CAP. LVI.



Chamaeficus.



Morus Sycomori, hæc Ficum familiæ nexu post se trahit. Huius caudex licet sit vbi grandescat & contortus videatur, patrum tamen est firmus, vt qui tum vitigineo, lzui tamen cortice, infernè cineraceo, in ramulis viridi sit vestitus, tùm ligni parum, medullæ verò fungosæ plurimum obtineat. Materie namque constat molli, rara, ampla intus cavitæ, cuius inane crassa fungosæque medulla, sicut in Sambuco ferè, refertum est. Ipsa alioqui arbor mediocri Sambuci magnitudinem nonnùmquam superat, pluresq; ab vna eademque radice inittit stolonnes crassitudine variantes & præcitate. Raricibus inciter multis, longis, firmis, lentis, euulsi contumacibus, multis capillamentis fibratis, colore fla-

Descriptio.



vis atque Rutæ radicibus similibus, maioribus ta-  
men multò, vt Cordus annotat: Abundant cor-  
tices sicut & folia adeoque fructus ipsi nondum  
maturi læteo copiosòque fatis succo, glutinoso,  
odore ad Rutam accedente, quemadmodum &  
reliquæ eius partes, sapore subacri, qui tamen  
in fructu paulatim in dulcem excoquitur succum.  
Folia conspicua sunt latitudinis, crassa, in lacinias  
plerumque quintas profundas diuisa, minùs acut-  
a, quàm Platanî, alpera, pediculo mediocri-  
ter longo, qui abruptus lac fundit. Flores, vt  
omnes hæcenus tradiderunt, non fert, sed statim  
parua fructuum rudimenta, quos *græssilis* aut  
*græssus* Latini vocant, Piso aut Fabe æqualia, ea  
paulatim increſcunt, donec Piri medicris figure  
& magnitudinem consequantur. Cùm ad mediam  
magnitudinem peruenerint, intra se flores (quod  
fortasse mirans) concepit figura confertis flami-  
nibus similes, colore in candido purpurascetes,  
vndique è carne exeuntes, atque ad mediam fru-  
ctus cauitatem fe dirigentes: quam florum ob-  
seruationem atque descriptionem primò Cordo  
diligentiſſimo naturæ botanice veltigatori accep-  
tamentum referimus, ac nos ipsi aliquando rem ita  
fe habere, obseruauimus. Vt in hac planta, duo  
ſpectanda veluti miracula euenerint nature ſtudio-  
ſiſſe obseruandum ſit: vnum, florem intra fructum  
recondi: alterum, maturitatis cauſam ipſum fru-  
ctum meditari, interuentu caprificationis, de qua  
infra.

Fructus ex furculis, Piriformes nascuntur, basi latiore cœlum spectante, pulposi & molles, virides, sed vitoris quodammodo obsoleti, aut ex viridi rubentes, fuscæ, quidam etiam per maturitatem ad flauum inclinantes, mellæ dulcedinis, carne pallida aut subrubra, innumereis granis luteolis quæ *xyroxyridis* vocant repleta, ex quibus seminibus nihil producitur, autore Camerario odorem etiam spargit haud inuicundum, sibiq; peculiatem.

Est & humilis, sesquicubitalis altitudinis in  
caeteris priori similis: Chamæficum vocant.

Videntur itaque auctores, cum Philosophi & Geoponicæ, & innumerum nature plantarum confules Scriptores, humanitatis item cultores, quos vocant, ac ipsi adeo Poetæ de hac planta veluti certam ingenii sui dotes posteritati reliquisse. ut vnde ritè ordiaris, vel non ordiaris eorum placita proposituro dubitare facilius sit, quàm decernere. Conandum tamen, ne hæc Autorum multitudo materieque cum messis & *Δωρεας*, in ipso narrationis prociuitate habitationem amittat ipsam adeo *Δωρεας* peperisse videatur. Sinque igitur veluti *περὶ ἑκαστου* quedam Poetarum signenda.

Fingunt hi Syceam aliquem à Titanibus fuisse, quem quum Iupiter infeceretur, Terra mater suæ proles misera, intra se occidit: ac in eius gratiam in Syceam arborem, hoc est Ficum commutat. In cuius rei memoriam, vrbis in Sicilia Syceæ nomen inditum volunt. Sic ipsa antiquitas non potuit alio magis munere ipsam plantam commendare, quàm ipsius à suis Diis origine.

Lacedæmonios Sosibius tradit, Dionysium colere Syriten cognomento, Milichius etiam dicitur quandoque: nam Milicha pro Ficis usurpari animaduertimus, & Melichen pro ipsa planta.

Apud Naxios certè simulachrorum facies nunc vitiginea conformatur, nunc Ficulnea, prout vel Bacchus dicitur, vel Milichius, vt testantur Athen.& Cæl.Rhod. Ali de eius inuentione aliter arbitrantur,vt tamen semper ad Deos suos referant.

Locum ubi primum inuenta visâque fuit, Greci Σάρον vocant, & Athenienses ὄρεος ἰσχυροῦ ὄρεος, Ficum sacram vocant, & hinc fructus Hegeretia-  
lictus) quæ Eleusinem ducit, in qua Phycalum,  
angusti agelli, iuxta Marathonem, domum, Cete-  
rem apud Cephalum hospitio benignissime re-  
cepisse ferunt. In cuius gratiam, & accepti benefi-  
cii non immerito, illum furculo sceulneo donar-  
unt, qui primum in Attica coalescit. In cuius  
rei memoriam, ad eius tumulum prædarium stat  
elogium, omnia referente Paulania, quod ex  
Grecis ita conuertit Calderinus:

*Hic situs est Heros, Cercrem qui in recta recepit*

Phylalus: hic quondam primus ea dulcia poma

*Monstravit, Ficos nomen dixere priores,*

*Phytalus aeternos inde sortitus honores.*

Sed utiliora sectemur, ipsam naturam eius propius contemplantes.

Theoph. ipsam Ficus neminit, quæ tamen vox apud eundem anceps & multiplex est, & non tantum in diuersas Ficus differentias, loco, tactu, aut quævis alia nota differentes complectitur. Sed tales etiam, quæ nihil minus ferè, quam Ficum representant, vt ex ipsiusmet verbis ac descriptionibus colligere est.

De Ficis autem simpliciter dicta, eiusque fructificatione, implicata sanè, præsertim rem pluri non cognitam habenti, recensionem agit, quam tam facilius intelligit qui totum eiusdem variationis decursum perlegerit causasque diligenter perpendit ex cap. i. lib. 5. caus. & diuersis eiusdem operis locis. Nos rem paucis ex nostra & summi Scaligeri obseruatione sic explicabimus.

Tria Ficuum genera fert Ficus. Vnum valde præcox quod idcirco vocantur Græci *αἰδοειός*, quasi præcox, præcurrens, præcoquum Gaza. Atque is quidem edendo est: *Bolas* vocant Veneti: *Vascones Flores*: *Colum*, communis vocis, priorem fructum: *Plin. præcoques*. Aliud genus postea prodit, cuius duæ sunt species: una quæ maturatur, Ficum dicimus, *Græci σῆκος*: altera quæ semper cruda est, & prius cadit, quam absoluta.

temperantia eius, & a pibus canis, quam adhibetur  
vocaturque Plinio *abusus*. Alio nomine &  
Grossius dicitur. Græci, quia referunt indomita  
natura sua Caprifici fructum, eadem qua illum  
donatur appellatione: *δανιδας* dicunt, cum quib-  
us apud Theoph. *ἐσσυιδες* idem sunt, ex sententia  
Scaligeri. *Ὀλυνθιδας* vero propriè est *σύναν θάρον* ἢ  
*δὲ ἐπὶ πεπρωμένῳ* huc *πτερεσι*, Ficus immatura, Lat-  
inis hic vel hæc Grossius: efferturque propriè de  
Fico domestica vix utraque tam Græca quam Lat-  
ina simpliciter: alioqui cum adiectione, vt gros-  
si Caprifici, *πῆς ἀγρίας συνῆς δανιδας*. Tamen ple-  
rumque confundunt Authores differentiam, in-  
differentèrque ab ipsis usurpantur *ἐσσυιδας* & *δανι-*

*Ολυνθιδας*  
*Caprica accen-*  
*prio.*  
*Ficus im-*  
*matura,*

*Erinæ.*  
*Erinæces.*  
*Ficus syl-*  
*vestris.*

δοι qui & ἱερῶντες dicuntur, ut multis testimoniois confirmat Conſtan Lex. Alti quī ἑλαιοῖς, etiam ficum ſylueſtrem, ἀγρία ἐστιν αὐτή, Lat. Caprificum a-  
pud Autores ſignificat : quæ nominum & vo-  
cum conſuſio magnam huic hiftoria peperit ob-  
ſcuritatem, quam nos partim iam dictis, partim  
ſcitendis pro vili diſcuſſile ſperamus. Ipſe, verò  
tiam Theophr. inter Ficum ſylueſtrem & Capri-  
ficum manifèſte diſtinguit in Hiſtor. 2. quando ait  
ἢ ἑλαιοῖς καὶ ἀγρία αὐτῇ &c. Caterùm idem groſſi, ſi  
ſcalpantur, aliquando matureſcunt, admiſſo Sole:  
quemadmodum è legitimis non pauci manent  
crudi, neque perſciantur præſenti frigore. Rurſus  
ex Ficibus, quædam Ficos propriè dictos  
[οἶκα] tantùm ferunt : quædam groſſiſſi ſeu O-  
lynthos tantùm: [ἐλαιώεις, qui nubil aliud funt,  
quam Fic immaturi, groſſuli dicti, qui ad matu-

Differt Fi-  
cum ſy-  
luæ a Capri-  
ficis.

*Ficus sacra*  
И дубина.

Theoph.

Tris Fir  
cum genera  
Prodromus  
Bole.

- Ficus.  
e Abortu  
- Größe.

2 Olynthi  
Varia acci-  
ptio.  
Ficus im-  
matura.

Erinei.  
Erinaces.  
Ficus sylv.  
Caprificus.

Differt F:  
ca. 3/4  
à Capricorn

ritatem non pettingunt: Gaza Caprificos penè  
semper vertit, Olynthos nimirum cum *leuotis*,  
quos caprificos propriè vocat Theophr. confun-  
dens, non sine plurimorum tamen autoritate  
vt dictum priùs: quædam vtrumque: quædam  
etiam Prodromos: [ præcoquos vocant ] quæ-  
dam non. Deinde variant fructum: vt quarundam  
grossi etiam sint esculenti. Variant item in officio  
seu ferendi modo. Nam nonnullæ constanter  
tales sunt: aliquæ non, sed mutant. Mutant au-  
tem vel quia nunc ferunt esculentum, aliàs non.  
Notat etiam à calore fructuum differentias, & à  
loco natalium, vel situ. Quosdam supra folium,  
quosdam post, quosdam subtus nasci. *Hæc est vultu-  
lus* implicatæ Theophrasticæ recensionis. Quæ  
grossos ferunt [ *δυστροφος* ] tres faciunt differen-  
tias: non ferunt nisi grossos: ferunt albos: fer-  
runt esculentos. Aliæ verò quatuor: ferunt Fic-  
cus: ferunt grossos: ferunt nigros: ferunt gros-  
sum esculentos tum non esculentos. Ac sanè  
sua natura esculenti non sunt grossi, sed sunt vi-  
les per accidens, quoniam, nascuntur in ipsis  
culcibus, de qua re suo loco. Notabis præterea dif-  
ferentiam variationis in ferendo duplicem: vel  
enim non ferunt aliquando, vel non bonos fer-  
runt. Item triplicem differentiam sitis: secun-  
dum frondes, & infra, & ex ramis valdè crassis:  
*in his præterea coloribus*. Ergo ex ficibus priùs gignun-  
tur Prodromi, deinde grossi, tum Ficci, vbi &  
temporis differentia consideratur.

Ficorum itaque differentias ex ipsa natura, na-  
scendi modo atque tempore desumpsisse Theo-  
phrastum apertum est. Cæteri verò Authores  
tam Græci, quàm Latini generum Ficorum in-  
gentem recensuerunt numerum, quantum in alia  
arbore reperire vix sit. Respexerunt autem præ-  
ter prædicta etiam vel ad diuersitatem figuræ, co-  
loris & magnitudinis: vel ad regionum, in qui-  
bus nascuntur, varietatem, vel denique ad Au-  
thores ipsos. M. Cato habet *Africanas, Herculanæ,*  
*Saguntinas, hybernas, Telianæ, Telsianæ atque Plin.]*  
*pediculo longo: quibus omnibus præmittit Ficos*  
*mariscas.* His adiecit Varro *Chias, Calcidicas &*  
*Lydias:* Item alibi & *Sabinas* memorat. Columel-  
la Ficorum genera sapore atque habitu distare  
ait, & præter dicta habet *Lisianas, Sulcas, Calli-*  
*strutias, Topias, Rhodias, Libycas, Hybernas:* omnes  
etiam biferas & triferas flosculos. Quid autem si-  
bi velit Columella cum hæc voce [ flosculos ] non-  
dum omninò percipimus.

Idem tradit Fici corticem seu librum (vt ille  
vocat) humidum, succosum & validum esse, &  
laetis plurimum fundere.

Ficum differentias varias tradit Plinius libri.  
15. c. 18. Inibi enim meminit *Ægyptiæ: Cypriæ:*  
*Lydiæ: Callistruthiæ: Africanæ: Alexandrinæ,*  
*Nigræ: Rhodiæ: Tiburtinæ: Liuiæ: Pompeiæ:*  
*Herculanæ: Albiceratæ: Aratiæ albæ: Porphy-*  
*ritidis: Popularis, Chelidonis* quam Athenien-  
ses *Erythromelanzam* vocant: *Serotinæ: Omæ,*  
&c. super quibus Plinium ipsum consulere, haud  
grauè erit.

Meminit Cato *Africanarum, Herculanearum,*  
*Saguntinarum, Hybernarum & Telianarum.*  
Sed à Catone, inquit Plinius, appellata iam tum  
*Africana,* admonet & *Aphicæ,* ad ingens docu-  
mentum vso eo pomo. Namque perniciosi odio  
Carthaginiis flagrans, nepotumque securitatis an-  
xius, cum clamaret omni Senatu Carthaginem  
delendam, attulit quodam die in Curiam præco-  
cem ex ea prouincia Ficum ostendensque Patri-  
bus. Interrogo vos, inquit, quando hoc po-

sum demptum putetis ex arbore? Cum inter  
omnes recentem esse constaret. Atqui tertium,  
inquit, ante diem scitote decreptum Carthagine:  
tam propè à muris habemus hostem: statimque  
sumptum est Punicum tertium bellum, quo Car-  
thago deleta est: quanquam Catone anno se-  
quente raptò. Quid primum in eo miremur?  
Curam ingenii, an occasionem fortuitam, cele-  
ritatemque cursus, an vehementiam viri? Su-  
pra omnia quiddam est, quo nihil equidem duco  
mirabilius, tantam illam urbem, & de terrarum  
orbe per cxx. annos æmulam (urbis æmulam  
vet.) vnus pomi argumento euerfam: quod  
non Trebia aut Tralymenus, non Cannæ busto  
insignes Romani nominis perficere potuerunt:  
non castra Punica ad tertium lapidem vallata, *Ficus*  
portæque collinæ adequitans ipse Annibal. Tan-  
tò propius Carthaginem pomo Cato admouit:  
(adiit D. adiri monuit. Vet.)

Prolixus Idem, nec non parum perturbatus in  
Historica relatione Ficuum duarum Romanis sa-  
crarum: Quarum alteram *Ruminalem* appellatam  
dicit, eò quòd sub ea arbore Lupa Rumam, id est  
mamam Romulo & Romo dederit: Alteram ve-  
rò *Nauiam,* quæ ab augure Attio Natio Romæ  
in comitio quidem nata: sed ibi spontè nata, vel  
illuc spontè transisse credebatur.

Quidam existimant Ruminalem Ficum dictam  
quod sub ea pecudes æstatis tempore, frigora ca-  
ptantes: herbas ruminare consueuerunt: An Tac-  
itus per ruminalem arborem intellexerit, consi-  
derandum: quando quidem longæua fuit arbor. Fic-  
cus autem breuissimæ vitæ, Theophrasto autore.  
De Ruminali Ficu hæc Ouidius.

*Arbor erat, remanent vestigia: quæque vocatur*  
*Romula nunc Ficus, Rumina Ficus erat.*

Cæterum Fici (Plinio) succus dulcis: odor nul-  
lus: [quem reprehendens Scal. malè eum ait ne-  
gare Fici odorem: est sanè etiam ficis odor,  
quamuis tenuis atque exiguus] folia latissima,  
maxima & vmbrosissima, & idèd supra id po-  
mum, eidemque feris folium nascitur quàm po-  
mum. Insigne prodit in quodam genere Cili-  
cia, Cyprii Helladis, ficos sub folio, grossos verò  
post folium nasci. In Laconico genere maximæ  
sunt. Inferiore sui parte fertiliores sunt Fici, ma-  
niscæ, Quæ sitius tradit in Hircania fertiles admo-  
dum esse Ficos, vt sint quæ modios cclxx. singulæ  
ferant prægrandes. Nullo flore exhalantur, na-  
talèsq; pomorum recensibus annuos versicolori  
nuncio neque Fici neque Caprifici promittunt.  
Dixit tamen Plin. loco iam supra citato præcoces  
ficos cum venientium flore maturefcere. Nos  
flore, vel fiori respondens aut analogum, ex  
Cordo prodimus.

Difficile autem fuerit, simul & inutile, vt Cæ-  
sarp. æstimat Plinianus Ficorum appellationes,  
nostris, hoc est, huius seculi Italicis accommoda-  
re, vt *Africanas* iis, quos vulgò *Hetruria, Bru-*  
*sciottos* vocat, inter *nigras: Aratias,* seu potius  
*Auratias* à colore aureo, inter *albas* iis, quas qui-  
dam *Citreas* cognominant, inter *præcoces:* nam  
post grossos primæ maturantur.

Diosc. prædictarum differentiarum nullas no-  
mine tenus tradit, sed *σύνταξιν*, hoc est, Ficorum in  
in genere, *ἀγέλας συντάξις*, Ficus syluestris, & *ὄνηδος* *Ficus*  
*ὄνηδος* *ἑλληνική* *ἡγεμονία*, Grossorum, inquam, quæ  
à nonnullis Etineci nominantur, vires tradit.

De Ficu inter alia habet Athenæus lib. iij. Di-  
pnosoph. cap. 3. Nulli quicquam concederem in  
sermonibus ad Ficum pertinentibus, etiam si su-  
spendi oporteret, quoniam Ficubus murum in mo-  
dum

Grossi sunt  
Olynthi.

Culcitr.

Ficus dif-  
ferentia Ca-  
tonis Var-  
ronis & Co-  
lum.

Differentia  
Plinio.

Idem.

Historia de  
Catone &  
Ficu Car-  
thaginensi.

Carthagi-  
Ficus an-  
tiqua

Ficus  
cultiva.

Ficus  
munda.

Ficus  
ma.

Rumina-  
lem.

Plin. m.  
Scalig.  
repr.

Cur. sup.  
foun. sic  
na. can.

Laconico  
maximæ

Non flo-

Cæsulp.

Brusciap.

ficus.

Disceat.

Ficus.

Ficus syl-

Grossi.

modum.



dum sum amicus, quare diuine de his quæ mihi  
inciderint edisseram. Ficus, ò viti amici, simplicis  
vitæ principium extitit, quod attestari videtur  
locus qui ab Atheniensibus Sacra ficus nomina-  
tus, in quo primum Ficus inuenta fuit, atque fructus  
hinc didici Hegetoria, quia primus ad victum  
mansuetum inuentus fuit. Ficuum multa sunt  
Genera, de quo Antiphanes in Homonymis. Lau-  
dans enim agrum Atticum inquit:

Qualia fert, ò Hippomice, ista regio,  
Excellentiora quam vniuersus orbis, mel,  
Panem, Ficus. Ficus enim, ita me amet Iuppiter,  
Abundè gignit.

Istrus in Atticis prodidit, vetitum fuisse Caricas  
exportare in Attica nascentes, his indigenæ vt  
foli fruerentur. Cum verò multi furtim auferre  
deprenderentur, delatores qui apud iudices il-  
los accusarent, vocatos principio fuisse Syco-  
phantas. Alexis in poeta:

Sycophanta nomen prauis viris  
Decenter haud nunc ponitur:  
Nam qui foret bonus, & urbanus, is debuit  
Indicatis Ficubus mores approbare suos.  
Nunc autem flagitiosos cum sic nomenent,  
Dubitare id cogit, cur id factum sit.

Indicatis ficubus, inquit, nempe quæ contra le-  
gum auctoritatem clanculum affortabantur: mo-  
res suos probabant, id est, fidem suam, probita-  
tem, integritatem. Philomnestus lib. de Smin-  
thiis Rhodius scribit, Sycophantam inde nuncu-  
patum fuisse, quòd illis temporibus è ficuum mer-  
catum, vini, olei, tributa colligerentur, ac portio-  
ria, & multarentur qui ea non soluissent, è qui-  
bus in administratione Reipub. sumptus fieret,  
itaque coactores qui exigent, & eorum pro-  
uentum suis rationibus ostenderent, vt credibile  
est, appellatos fuisse Sycophantas, ad idque mu-  
nus delectos fuisse ciues spectatissimos ac optima  
fidei. Latonicæ ficus meminit Aristophanes in A-  
griolis his verbis:

Ficus omnes ego seram præter Laconicas.  
Infeste namque sunt illæ, ac tyrannicæ:  
Nec enim pusilla forent, si animus è plehem odio non  
prospicerentur.

Vel, nisi plebi odiosa foret ea Ficus, id est, domi-  
nandi ratio: Sic Dal. explicat. Ficum scilicet eam  
pusillam vocat poeta, quòd exigua & humilis  
planta sit. Significat & Lacedæmoniorum hos-  
tilem animum erga Athenienses, ac eorum domi-  
natus crudelitatem, & summum abolendæ popu-  
laris potestatis studium. Alexis in Olynthio, cum  
Phrygiæ ficus mentionem facit, ait:

Et diuinus cibus, à matre datus mihi delicia,  
Carica ficus,  
Phrygia munus.

Phibalearum Ficuum meminere Comici multi:  
quoniam & Pherecrates in Crapattalis:

Febricitas, ò miser, nulla de re sollicitus:  
Et nunc per æstas Phibaleas ficus comedere:  
Illisque satur meridianor.

Deinde Sphacelum expectato, ardeto, vociferator  
Teleclides in Amphichionibus:

Quam pulchra Ficus, Phibalea quidem sunt.

Est autem Phibaleos, Atticæ locus.  
Chelidoniarum meminit Epigenes in Branchia:  
[Rauedisono.]

Deinde paulò post aduenit Chelidoniis  
-icibus onusta confertim quadra.

Androntion, siue Philippus, siue Hegemon in  
Georgico, hæc Ficuum genera sic recenset: In pla-  
nis & campestribus ferere Chelidoniæ Ficus ex-  
pedit, Capusicos, Leucericas, Phibaleas: at quo-

uis loco Oporobasidas [Monspel. hodie vocant  
Ficus regias D.] Horum enim generum cuique  
sua est vilitas, maxima verò Coluris, & Phory-  
niis. Fructuosæ sunt & in primis viles, bifera, La-  
conica, Megarica, si rigentur. Rhodiorum me-  
minit Lynceus in Epistolis, ea comparans quæ  
proueniunt Athenis præstantissima cum Rho-  
diacis. Eius hæc est oratio: Atheniensium [scilicet,  
syluestres ficus] certare de bonitate sic videntur  
cum Laconicis Rhodiis, vt Mora cum Ficubus.  
Id ego, non cœnatus, vt Athenis sit, peruerso  
iam gustu ob satietatem, sed ante cœnam, cum  
appetentia intacta & nondum occupata est, com-  
paratione facta perspexi. At quas in pulchra Ro-  
ma Callistruchias vocant, si quemadmodum ego,  
Lynceus gustasset, bestia eiudem nominis longè  
fuisse perspicacior in huius contentionis iudi-  
cio, adèd Ficus illæ antecellunt omnes quæ in  
vniuerso terrarum orbe generantur. In prædio sunt  
& alia Ficuum genera Romæ nascentium, nempe  
Chizæ, Liuianæ, [fortè Liuiæ vel Lydiæ: amba-  
rum meminit Plin.] ex quas Chalcidicas vocant  
[Plinio Duracinæ à duro Corio D.] & Aphrica-  
næ, vt testatur Herodotus Lycius in opere de  
Ficubus. Parmeno Byzantius in Iambis, è Cauno,  
quod oppidum Asiicum est, laudans, vt excel-  
lentes, ait,

Per longa mari spatia ego accessi, nec tamen ficuum  
Cauniarum salsum [quod erat: batuli unus] aduexi.

Caunias è Caria ficus celebrari peruulgatum est.  
Toxaliarum ficuum meminere Heracleon E-  
phesius, & Nicander Thyatireus, citatis versi-  
bus ex fabula Apollodori Carystii, cuius est titu-  
lus, Mendica veltiaria.

Ceterum villi: in admodum suis

Ita d. m. & impr. b. m. adeo vt me pueret:

Alia quidem regiones Toxalias ferunt

Ficus mea verò etiam vites.

In insula Paro eximia gignuntur Ficus, Harmo-  
nias [dichonia, tanquam infectas sanguine: san-  
guineas] incolæ nominant: congeneres Lydiis,  
quas ob rubrum colorem [Plinio Lydiæ purpu-  
ræ sunt] eodem quoque nomine vocant. Earum  
sic meminit Alchylus:

Paron missam facito, & Ficus illas, & marinam  
Vitam. [assiduas navigationes.]

Hæc certè Ficus tantum à reliquis vulgaribus dif-  
crepant, quantum apri caro ab altis porci & vil-  
latici pulpa. Leucericas Ficus species est, illa  
fortassis cuius albus est fructus. Eius sic meminit  
Hermippus in Iambis:

Scorsim verò è Leucericas Caricas.

Hermonax in Glossis Cretensibus genera Fi-  
cium enumerat, Amadea, & Nicylea. Philemon  
in Atticis vocabulis quasdam Ficus Regias voca-  
ri tradit, & ab illis regias caricas nominatas fuisse.  
Huic idem narrationi addidit maturas Ficus voca-  
ri Colytia [fortassis quasi *καυώπη*, id est, leues:

sunt enim maturæ Ficus immaturis seipsum leui-  
ores D.] Seleucus in Glossis refert, Glycididen  
quandam vocari, figura perquam similem Fico,  
[Præonia Glycidide est fico similis, vel siliquis,  
quæ semen continent, vel appendicibus glandi  
similibus in radice feminæ. Emendatus locus ex  
Plin. & Diosc. D.] à Medicis quoque obseruatum fuisse,  
in cibo sumptam, rubra feminarum proflauia  
sistere, ac valere contra malum mentis, & infan-  
tuationes: id quod Plato Comicus ait in Cleo-  
phonte. Pamphilus hybernas Ficus vocari tradit  
ab Achuis Cydonæa, idque scriptum ab Aristo-  
phane in Glossis Laconicis. Hermippus in Militi-  
bus Coracæa Ficus: [tanquam Coruinæ: ob ni-

Oporobasidas  
des.  
Coluris  
Phoryniis  
Megarica.  
Rhodia  
Athenienses  
Erinea.

Callistruchias.

Ficuum  
præstantis-  
sima.

Chizæ.  
Liuianæ.  
Chalcidicæ.  
Duracinæ.

Caunias  
Toxalias.

Harmonias.

Lydiæ.

Amadea  
Nicylea  
Regia.  
Colytia.

Glycididen.

Hybernas.

Coracæa.





das.  
neN  
tsai.

HERÉ

cent  
H.A.

Heat

prop  
081677

5.

28.

Marcel.

*Sacris pa-  
ginis ele-  
brata Es-  
cus.*

*Ficmum in-*  
*terpretatio,*  
*Mystica.*

*Ficmum in-*  
*terpretatio,*  
*Mystica.*

Fig. 3.1

Fig. 3.1

Synon.  
ling.

M

Veneris. Hisp. *Pigo auno maduro.*

*Chare-  
cus.  
Humilis  
ficus.*

*Ficus Na-  
na.*

*Folium  
Tritum.*

*Adagium.*

*Frondes.*

*Ramis*

*Crade.*

*Frondes.*

*Folliculus*

*Cruma.*

*Frumentum*

Eiusdem arboris nominibus insignitur *Chama-  
ficus* dicta cum eius fructibus, quæ & humilis ficus,  
quam in collis & hortulis pensilibus alunt. An  
verò à vulgata differat alter, quàm magnitudine,  
nondum asserimus. Doctiss. Medicus Chiffletius,  
apud quem in horto Vespertini vidimus [ & apud  
D. Abbatem de pulchro fonte] *Ficum nana* voca-  
tur. Denique taret. fent apud Aruquos commen-  
datione Ficus, vt & secundum locum habuerit à  
vite: Et eius partes omnes peculiaribus sint  
nominibus designata. Ipsum solum *Ficus* prisca  
Graeci vocarunt propter eius asperitatem quo  
convulso anguilla piscis faciliè detineri queat:  
vnde adagium, *τὸ θῆρ τὸν ἐξ ἑσπερίδων*, id est, Folio  
fisculo anguillam, nempe tenes, dirigendum in  
versutum aut versatilem hominem, quem alius  
arctiore nodo retinet atque contrahit. Sunt  
qui existiment frondes etiam ficorum ea voce in-  
signiri. Ficulnus ramus, *καδὺς*, & *καδὺς* Θ. Pomi  
fundu vmbilicem. *ἡ δὲ ἀρκυὶς ἡ τῆς σκῆπης τὰ ῥαχὶς*  
*ἐκ παλαιῶν*. Folliculus Fici, sicuti frumenti Varro  
*Cruma* dicitur. Granum Ficarium, Frumentum  
Plinio, *καρχαίς* Theoph. & Gal. Germanis qui-  
busdam *Lusen* dicuntur, quasi pediculi, à soni-  
tu, quem eundem cum pediculis pressi effi-  
ciunt.

*Proverbia  
de ficu.*

Produntur & proverbia de Ficu. *Ficum post pi-  
scem: Legumina post carnem*: alii tamen pro Ficu,  
Nucem dicunt, *Gallinae aures amantibus ficum ne feri-  
to, Assentari nescio, Ficum, Ficum: panem, panem*  
dico.

*Ficus atra.*

Ficum atram infœlicem pontifices putabant,  
fœlicem, albam: teste Hermolao.

Sed antequam reliquam historiam pertexamus  
de Caprifico, prius specialitèr quædam tradenda.

## DE CAPRIFICO.

*Quomodo  
differant  
Caprificus  
et  
Sylvestris.*

**C**aprificum, Sylvestrem Ficum tradunt,  
quamvis [inquit Cam.] non immeritò docti  
quidam discrimen faciant inter Ficum sylv. & Ca-  
prificum. Nos ita censemus. Sylvestrem esse  
incultam, & vel natura, vel neglectu sterilem, aut  
eatenus saltem, quatenus fructum non perficiat:  
Caprificum verò eam, quæ Caprificatur, quæ ta-  
men & ipsa sylvestris sit, ita vt re ipsa quidem  
conueniant, sed ratione tantum fructus & cul-  
tus differant. Quid? quod ne à sativa quoque  
specie differat Caprificus vel ficus, sylv. quod  
ex grano sativæ nascatur Caprificus: vt dicitur in  
progressu. Hæc verò sententia distinctionis Ca-  
prifici, à ficu sylvestri ipsius etiam Theophr. est,  
qui in 2. de caus. c. 3. de Caprificatione & Capri-  
co [quam *ἑρπύς* vocat, & Gaza semper Caprificum  
reddidit] locutus, ait: esse verò quædam loca quæ  
Caprificatione non egent, absurdum non est,  
quippe quæ temperiem idoneam (*σωφροσύνη*) ha-  
beant tam alimenti quàm aeris. At humorem  
totum hoc genus (sub eorum quæ caprificatione  
egeant) nimium esse, vel ex ipsis sylvestribus, (*ἡ δὲ  
αὐτῶν τῶν ἀγρίων*): ex ipsis erraticis vertit Gaza)  
constat. Cruditas (*ἀσυνέτης*) enim illa non nisi ea  
de causa sit, [nempe ob alimenti copiam] & eas  
ergo solent caprificare, vt possint permanere.  
Vides vt *ἡ δὲ ἀσυνέτης* intelligat incultas ficus non  
autem Caprificas. Idò dixit *ἡ δὲ ἀσυνέτης ἀγρία*.  
Quæ sententia & doctissimè Scaligeri est & verò  
Theophr. huiusmodi quæ ita sententia statuit, quam-  
vis eandem *ἑρπύς* in sequentibus *ἑρπύς* quoque

videatur appellare: vt non temerè Scaliger, quo-  
nam igitur modo *ἑρπύς*?

Porò Caprificum longè validiorem tradunt,  
quàm ficum: nullis ferè vitis obnoxiam, vt et-  
iam fico insita grossos suas ueri credatur: mate-  
rie flexibili: nunquam vt in ea maturefcere pomum.

Cordus Caprificum vrbane per omnia similem  
dicit: incultiore tamen, duriori quæque: grossos  
ferre, quales vrbana, sed nunquam maturescen-  
tes: liquore manare, quàm sativa actiore, tam  
gustu, quàm odore. De ea Theophrasti. passim  
multa: ex quibus præcipua hæc sunt: *ἑρπύς*,  
Caprificus seu ficus sylvestris ineunte vere ger-  
minat, montibus propria est, fructus suos non  
maturat nec perficit, sed ex putredine in iis parui  
gignuntur culices, qui alimenti gratiã aduolantes  
alios ficus appetunt, & crebro morsu aperiunt:  
hinc fit vt superfluo humore absumpto, adaper-  
tisque fructibus faciliùs Solis admittatur vis, vnde  
melius & à Sole, & à propriâ naturâ vegetante  
percoquantur: quòd nisi fiat, grossi earum deci-  
dunt, nec ad maturitatem perueniunt. Atque  
hæc ipsa quoque ratio cur culices gignantur: nena-  
pe quia fructus maturari nequeunt: Ergo inter-  
uentu putredinis culices in iis gigni, vt & in ceteris  
putrescentibus solent. In hunc finem caprifici  
rami cum ipsis Olynthis ficis appenduntur, vt  
culicum opera ficus tueantur, ne decendant, sed  
maturentur, eo quo diximus modo. Aut etiam  
iuxta ficos caprificos conferunt, vt culices inde  
prognati promptè & faciliè aduolare & ingredi  
queant. In summo autem ficeti limite conferende,  
vnde culices ad ficos secundo vêtò defertur queant.  
In Italia autem non egent ea Caprificatione, quia  
spontè ficus maturantur.

Laudantur potissimum Caprifici nigra, & lo-  
cis ortæ saxosis, quòd tales per multa contineant  
grana Culicibus gignendis aptiores habentur ru-  
bia, vericcolores & robusti: quæ minis aptæ,  
alba sunt & imbecilles. Vbi plurimus est pulvis,  
ibi & plurimæ validissimæque Caprificus ex-  
eunt.

Hæc ferè summa est historię Theophrasti de  
Caprifico & Caprificatione (quamvis multus sit  
& copiosus, in causam eius perutiligatione,  
eamque passim inculcet.) quam & Plin. perele-  
ganter tradidit his verbis: Caprificus vocatur à  
sylvestri genere ficus, nunquam maturefcens, sed  
quod ipsa non habet, aliis tribuens: quoniam est  
naturalis transitus, atque è putrescentibus iden-  
tèdem generatur aliquid. Ergo culices parit: hi  
fraudati alimento in matre, putri eius tabe, ad co-  
gntam volant: morsuque ficum crebro, hoc  
est, anidiore passu aperientes ora earum, atque ita  
penetrantes, intus Solem primò secum indu-  
cunt, cerealesque (fecundas) auras immitunt  
foribus apertis. Mox lacteum humorem, hoc est,  
infantiam pomi, absumunt: quod fit & spontè.  
(naturæ vi, sed longiore temporis spatio) Ideo-  
que Fictis caprificus permittitur (permittetur  
D.) ad rationem venti, vt status euolantes in fi-  
custerat. Inde repertum, vt illatæ quoque a-  
lunde, & inter se colligatæ iniicerentur Fico:  
quod in macis solo & aquilonio non desiderat-  
ur: quoniam spontè arelcunt loci situ, rimisque  
eadem, quæ culicum opera, causa perficitur: nec non  
vbi multus pulvis, quòd euenit maximè frequen-  
ti via appollita. Namque & pulueri vis ticcandis,  
succumque lactis absorbentis: quæ tanto pulueri  
& caprificatione hoc quoque praestat, ne deci-  
dant, absumpto humore tetro, & cum quadam  
fragilitate ponderoso,



philiger  
gnus  
philosophum.

aprasini  
f. 2. a.

*electus.*

перінак/

Caprificā-  
tionis succo-  
daneum,

Erinima?  
Ериница.  
Caprificum  
profructu.

Caprificus  
magne  
Etymon.

Erinaceus.

Erinaceus.

Tragos,

de Degeboom. Gal. *Figuer saunage*. It. *Ficinia sal-*  
*matica*, *Fichi saluaticchi*. Hulp. *Cabrahigo*.  
 Caprificatio *caprificatio* etiam dixit Theo-  
 phrast. propterea quod *caprificatio* sit capri-  
 fici. Caprificatio *caprificatio*.  
 Ipsos etiam grossos siue grossulos *caprificatio* & *cap-*  
*rificatio* vocant, de quibus in præcedentibus abunde  
 dictum: nimirum grossos propriè Olyntkos esse,  
 hoc est, primitivas Ficus.

*Craffa*. Apud Macrob. Grossos legas, Ficos esse quæ  
 nunquam maturescunt. Alii sic distinguunt, vt  
 Ficus primò sit *caprificatio*, deinde *caprificatio*, postea Sy-  
 con, postremò Ichas, vt annotat Hermol.

*Phœcia*. Nicol. Nicolai lib. 2. c. 8. nauig. narrat in Chio  
 Ficus diuersæ & contrariæ esse naturæ, quas ta-  
 men oporteat habere, & Ficus inutiles reddere,  
 alias viles, mirabili modo qui ibi narratur.

*Seycon t-*  
*felas*. Ficus in toto Euro pro tractu temperatiore ca-  
 lidiorie obuia, ne Germaniæ quidem vsq; adeò  
 insolens habetur, quippe quæ & in lautioribus  
 magnatum hortis colatur, & non tarò fructum ad  
 magnitudinem perducit locis etiam plusculum ad  
 Septentrionem vergentibus. In Hispania, Italia  
 & Gallia Narbonensi copiosè nec sine subsidio  
 vite provenit, vbi sylulas vernæ & autumnali for-  
 turâ bifera Ficus perelegantes videas. In Brasilia  
 quoque, illata ex nostro orbe, autore Masseo. Le-  
 uin. Hullius scribit se in insula S. Helenæ Indiæ, vi-  
 disse in Ficuum arboribus nomina inscripta An-  
 no 1570. & 1575. Ficus autem ibi satas per Lusita-  
 nos.

Quod Ficus omen fecisse ait Plinius. M. Crasso  
 in Parthos exercitû mouenti, id ita se habet. Cras-  
 so nauem expeditione illa conscendenti, cum  
*Cauneas* Ficus venales quidam vociferaretur, di-  
 xisse visus est, *Caue ne eas*. Romani enim olim, vt  
 auruncate pro aueruncate, doctum pro diuor-  
 tium dixerunt, sic & *Cauneas*, pro *caue ne eas*.  
 Cic. de diuin. vt supra monuitur: Cum M. Cras-  
 sus, inquit, exercitum Brundisij imposteret,  
 quidam in portu caricas cauno aduectas vendēs,  
*Cauneas* clamitabat. Dicamus, si placet, moni-  
 tum ab eo Crassum *caueret ne irret.* &c. Vid. Scal. in  
 Festum, voce Aurum: & Ioach. Camer. in Plau-  
 tum.

Cæterum Stuckardix in horto principis ma-  
 gnæ coluntur arbores ficus magnas purpureas ad  
 maturitatem gustumque suasas perducentes,  
 quemadmodum & Heidelbergæ in horto Elecko-  
 ris: Item Basileæ in priuatorum quibusdam præ-  
 sertim D. Plateri hortis, sed vtroque hyeme cõ-  
 duntur. Apud Mompelgardenses rariùs perfi-  
 ciunt fructum. Fructus in his partibus, maiores  
 Mompeliensibus, sed suauitate inferiores. Exstitit  
 in horto Montbelgardensi inter alias etiam veta-  
 tula iam ante multos annos lata ab Ill. Georgio  
 & c. E. C. V. Virtemb. Patre f. m. quæ iam sæpiùs  
 frigore perempta, à radice tamen stolones emit-  
 tens semper reuiuifcebat. Caprificus Germaniæ  
 incognita, inquit Cordus, Romæ frequens pro-  
 uenit in vetustorum ædificiorum ruinis & muris.  
 Mompessuli & in agro Narbonensi passim proue-  
 nit Caprificus totòque særè anno abundat grossis:  
 in Italia item multis locis crescit. Horat. lib. 1.  
 sepulchris Caprificos erutas, flammis aduri Col-  
 chicus.

Est porò breuissimæ vitæ Ficus, longioris ca-  
 prificus, auctore Theoph. causam tribuit fecun-  
 ditati eius: vnde & Plin. citò occidunt, quia ve-  
 loces, & tamen abundant diuitiis: omnia autem  
 celerius senescunt præfecunda. Quin & protius  
 moriuntur aliqua, cælo omnem fecundita-

tem eblandito, quod & maximè vitibus euenit.  
 In trimatu ferre incipiunt, ostendentes & *cap-*  
 Særius folium nascitur, quàm fructus. Serotina  
 Fici antè quàm fructum petcoquant, folia depet-  
 dunt. Germinat sub arctum post Ver, quod  
 tempus commune omnibus est, præsertim edo-  
 mitis, ac præcipuè Fico & Viti. Eò melior futu-  
 rus intelligitur fructus, quòlatus germen ante-  
 cesserit, contra quàm cæteris arboribus. Fructus  
 omnis ferè vrbana Ficus, vt & Cordus testatur,  
 bis producit: æstatis initio vnum: autumnò ve-  
 rò alterum, vtrosque simul fonsens, sed diuerso  
 tempore perficiens. Mompessuli Iunio & Iulio  
 maturas comedimus, Iulio etiam Basileæ. Romæ  
 Maio. Qua ratione floreat, suprà dictum.

Ficos maritimas M. Cato in loco cretoso & aprico  
 feri præcipit: Africanas & Herculanæ, Sagun-  
 tinas, Hybernas, Telanas, attas pediculo longo,  
 in loco crasso & stercoreo. Loca calida amat,  
 quia densa eius materia non est: hincque sit, vt,  
 in locis frigidis [intellige valdè frigidis] sicca fi-  
 ri non possint, teste Varro. Ficum, inquit Co-  
 lum, frigonibus ne ferito: loca aprica, calculosa,  
 glareosa interdum & saxosa amat. Eiusmodi a-  
 gro citò conualefcit, si serobes amplos & ido-  
 neos feceris. Ficorum genera etiam sapore &  
 habitu differunt, tamen vno modo, sed dispari  
 differentia agri feruntur. Locis frigidis & Au-  
 tumni temporibus aquosis, præcoctis ferito, vt  
 ante pluuia fructum deligas. Locis calidis hy-  
 bernas serotinas ferito. At si voles Ficum quam-  
 uis non natura seram facere, cum grossuli minuti  
 erunt, fructum decutito. Item alterum edet  
 fructum, & in hyemem seram differet maturita-  
 tem. Nonnunquam etiam, cum frondere cœpe-  
 rint arbores, cacumina Fici acutissimo ferramen-  
 to summa amputare prodest. Sic firmiores arbo-  
 res & feraciores fiunt: ac semper conueniet si-  
 mul ac folia agere cœperit Ficus, rubricam amur-  
 ca diluere, & cum stercore humano ad radicem  
 infundere: ea res efficit vberiorem fructum, &  
 fardum Fici pleniorum meliorumque. De Fici fa-  
 ctione controuersia orta est. Theoph. ex eius se-  
 mine interiore, id est, minutis eius granis [vt  
 Ruell. vocat] diuisis in capitula, sic & *cap-*  
 plerique Geoponici Scriptores tradunt, ex semi-  
 ne satam omnino degenerare. Cicero fatetur ex  
 semine nasci, in Catone maiore. Ex Fici, inquit,  
 tantulo grano tantos truncos procreat. Et Cossil.  
 C. sat. Plantatur in portu Ficus, tummodò & fructus  
 ipsius granis. Alii vt Plin. & Ruell. Ficum omni-  
 bus emergere modis, præterquam ex talea seu  
 ramo & furculo. M. Varro ex semine vix nasci pos-  
 se scribit, his verbis: Fici semen naturale intus in  
 ea Fico, quam edimus, quæ sunt minuta grana, è  
 quibus paruis, enasci coliculi vix queunt. Omnia  
 enim minuta & arida, ad crescendo tarda. Qua-  
 re furculis potius viuendum, quàm semine ad sic-  
 ca faciendâ terræque obruendâ, præter si aliter  
 nequeas, vt quando quis trans mare semina  
 mittere, aut inde petere vult, tum enim resticu-  
 las per Ficos, quas edimus maturas perferunt, &  
 eas cum inauerint, complicant, ac quò volunt  
 mittunt, vbi obruta in seminario pariant. Sic ge-  
 nera ficorum Chææ ac Chalcidicæ & Lydiæ & A-  
 fricanæ. Item cætera transmarina in Italiam per-  
 lata. Hæc Varro. Colum. Ficulnea cacumina iam  
 tumentia locis frigidis & humidis à Calendis  
 Martii vsque in decimum Calend. April. vtilissi-  
 mè poni tradit.

Specialius de Ficorum satû & cultura differit  
 Pelladius in hunc modum. Calidis locis Fici plan-  
 ta

Tempus  
 & zias

Ex semine  
 vix nasci

Quomodo  
 A-Fici in  
 per-  
 tam



taradicata N. membri mense, temperatis Februario, frigidis melius Martio vel Aprili ponenda est. Si taleam vel cacumina ponas, vltimo Aprili, cum eis vici dior succus infunderit: Plantæ in scrobe depositæ, lapides substituendi sunt, ad radicem firmo terra m. scendi est. Si loca frigida sunt, plantarum cacumina diuiss canaz internodiis defendantur a frigore. Si cacumen velis ponere, trifolium cum ramum binum vel primum ab australi parte decidas, & sic obtues, vt diuiss cacumina terra interiacciente velut tres surculos reddant.

Taleam sic ponemus vt cætera, cui leuiter ab infima parte diuiss lapidem mergemus in fissio. Ego, inquit Pallad. mense Feb. vltimo, vel Martio in Italia plantas grandes ricorum per pastinatum solum disposui, & eo anno poma peperere supra comprehendendi felicitatem, velut tributa reddentes.

Legendæ sunt plantæ, in quibus frequens nodus exuberat. Steriles creduntur, quæ nitidæ sunt, & oculos suos per longa internodia distulerunt.

Si plantam fici prius nutrias in seminario, & maturam transferas in scrobem, poma generosiora producet. Aliqui multum prodesse confirmant, si plantam fici diuiss Squillæ bulbo intersitam, stricquamque vinculis collocemus. Scrobes amat altas, interualla maiora, terra genus durum & gracile & siccum pro vili sapore pomorum. Prouenit & petrosis & asperis, tamen potest locus propè omnibus feri.

Quæ in montanis & frigidis locis nascuntur, quia minus lactis habent, ad siccitatem durare non possunt. Vfus illis in viridi est, melioris magnitudinis & saporis arguti. Quæ nascuntur in campis, & locis calidis, & pinguioribus sunt, & in siccitate durabiles.

Si genera numerare velimus, immensum est: sufficit, quod omnibus æqua cultura est. Illa distantia est, quod in caricis melius alba feruatur. In locis nimis frigidis præcoquas ficas seramus, quæ citò veniant, vt antè imbres genus hoc possit occurrere: calidis verò, & estuosis eas, quæ serò maturant.

Gaudet ædua fossione. Per Autumnum proderit, si sterus admoucas, præcipue de auiaris. Recidenda sunt in ea, quæ aut putria aut male nata reperies, & e aratione putanda est, vt inclinata per latera possit expandi.

In locis humectis fici saporis obtusi est, cui circumcisus contra hoc radicibus aliquantus cinis debet affundi. Aliqui inter ficarias caprifici arborem serunt, vt non sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi.

Mense Iunio, circa solstitium caprificandæ sunt arbores fici, id est, suspendendi grossi ex caprifico, lino, velut ferra, pertusi. Si hoc desit Abrotani virga suspendatur, aut callum, quod in Vlmeis foliis inuenitur, aut arietina cornua circa radices arboris obruuntur, vel truncus arboris: quo loco turget, scarificandus est, vt possit humor effluere. Cum folia incipiunt producere fici, vt fructum multum & pinguem ferant, in principio germinis cacumina summa decutimus, vel illud tantum cacumen, quod ex arboris medietate procedit.

Vt Ficus citò maturet, succo cepæ longioris cum oleo, & Pipere mixto vnge poma, quando grossi incipiunt sububere.

Ficus ex Didymi traditione, referente Constantino Cæsare, duobus annis temporibus, Vere & autumno commodissime feritur: Vernam ta-

men sationem magis desiderat, quippe cum arbor omnium serè tenerima & delicatissima sit, gelcidia & glacies horret, ventis que mirum in modum formidat, quod cum ruunt aut leuunt flatus rūpatur. Ego tamen, inquit, Iulio mense toto platas disposui rigans, & transferens, & poma in arborem magnam adolecentes peperere. Calidioribus tamen locis solo pastinato neque admodum irrigato pangi debent: siquidem aquarum copia genitium earum pulchritudinem natūmque; decorem tollit, & corruptioni reddit opportuniores.

Plantatur & alio modo. Si quis maceratas ficos resti obducatur, frequentique riget rore, complures emergent arbuticula, quas oportet transferre in scrobes, vbi in hoc seminario nutrueris. Si verò viuiradices quis deponat, eas scillæ immixtas plantare oportet.

Quidam muria macerantes plantam pangunt. Præstat autem, si ramos plantaturus es, vitipfos in bubulo stercore riges.

Alii cum planta calcem viyam iniiciunt, & non fallit neque frustratur ipsos plantatum.

Alii rubricam oblaqueatis radicibus iniiciunt. Si in altitudine luxuriari nolis, clauam in caput ferito. Scire expedit senescentem Ficam fertilior rem euadere.

Ficam Plin. omnia infitionis genera admittere scribit. Inferitur in Morum & in Plantanum, teste Leontio. Inferitur autem non solum vere, quemadmodum aliæ arbores, sed etiam æstate vique ad solstitium hyemale; velut etiam Florentinus prodit. Aprili mense, tradente Palladio. Ficus cum inferere debemus inter corticem, vel si nouellæ arbores sunt, fissio ligno, quod statim operiendum est & ligandum ne ventus introeat. Melius comprehendunt, si circa teram recisam inferantur arbuta. Aliqui & Iunio mense inferunt. Varro circa solstitium.

Surculus legendus est anniculus, inutilis enim creditur maioris vel minoris ætatis. Inoculari Ficus solet locis siccis Aprili, sed humidis melius Iunio mediante, Octobri mense locis tepidis. Propagari & ramis potest. Inferitur autem in Caprifico, in Moro, in Platano, & oculis & surculis. Idem Pallad. de infitionibus.

*Persuadet Moris tetrum mutare colorem  
Ficus; & inuasis dat sua iura Comis.  
Se quoque miratur pingui grandescere succo,  
Et solitum gaudet vincere poma modum.  
Insignes foliis Platanus felicia mensis  
Brachia gaudentes ortis honore C. mas.  
Ingrediens pingui se cortice maxima Ficus  
Seruat, & optatos impler adepta sinus.*

Nunt ficulnea cacumina obruuntur vtiliter, cum tumescunt, vt plantas faciant, si earum copia non abundat.

Vt etiam varios fructus vna Ficus exhibeat, ramos duos nigra, & albæ arborum inter se ita vinculo stringes atque torquebis, vt germina miscere cogantur, sic vt obruti & scicorati, & humoris rigatu iuti, vbi prodire ceperint, germinantes oculi aliquo inter se annexu conglutinentur, & compactum germen in vnum caudicem coalescat, qui bicolores fructus pariet: sed bimam transferre plantulam melius, autore Leontino qui eundem modum præscribit. Quidam tunc eiusmodi coitum moluntur. Ficaria grana ex diuersi coloris ficibus linteolo illigata serunt, & deinde suo tempore transplantant.

Si in oculo, Fici quid scribatur, Ficus scriptas germinaturas dicit Democritus.

*vt fructum  
non abig-  
eant.*

Vt fructus non abiciant idem caueri spondet, si caudex eorum Mororum succo sit illitus: nec amittere velut agrum pomum, si radix eius sale & algis marinis obducta sit, aut si grossi ex ipsa amuleti vice suspendantur: aut si quadrantibus Lunæ rubrica caudix oblinantur, vel intorta ex caprificis ferta suspendantur. Quapropter aliqui in singulos ramos ipsos inferunt, ne illud singulis annis facere cogantur. Continet etiam fructum ficus, si circa Pleiadas scrobes circumfoderis, & amurca cum aqua æqualiter mixta truncum perfuderis.

*Vt ficus  
sila, man-  
suescat.  
Vt grossi  
non decer-  
dant.*

Ficum syluestrem mansuesfacies affirmante id Africano, si putatos ramos vino & oleo madesce-  
ceris, & rigaueris per septem dies. Grossi seu im-  
maturæ ficus non decidunt, si arboris radice inci-  
sa, quater nos salis sextarius inieceris, & terram in-  
super aggesseris.

*Vt ficus  
purgantes  
fructus se-  
rat.*

Democritus tradit si quis Fici esu, alio deie-  
ctionem moliri cupiat, Elleborum nigrum cum  
Tithymalo tritum, radicibus arboris, quæ depou-  
nunt inferi debere, sic enim inde enatas Ficus  
purgatrices futuras.

*Vt praeoces  
fiant.*

Præoces Ficos, hoc est, ante tempus mature-  
scentes idem fieri promittit, si columbarum ster-  
cus & Piper & oleum iuxta adieceris.

Florentinus in Georgiis suis, præcocem &  
Theriacam Ficum fieri ait, fructu ex antidoto Theri-  
aci illito. Pollere idem affirmat aduersum  
ferarum morsus pomum, quod antidoto Theri-  
ace pubescens fuerit delibutum. Si verò ante  
tempus Ficus edere velis, columbinum stercus &  
Piper oleo mixta olynthis & grossis idem circum-  
linenda suadet.

*Vt ficus Ci-  
ruides con-  
seruanda.*

Ficus post maturitatem in arboribus manere  
non possunt, quemadmodum alij pomorum fru-  
ctus, sed spontè cadunt: possunt tamen, si  
Africano credimus recentes seruari, quales in ar-  
bore erant, hac arte. Quum opercula vini dolis  
obditurus es, ollam nouam accipito, aut aliud  
vas non rotundum & oblongum, sed potius, ex  
arbitrio quadratum, fundoque sultum. Huic  
immitte recentes ficus minis maturas, cum suis  
pediculis umbilicisue, hoc est, particula qua ar-  
boribus suis dependent lectas, sed leui manu, at-  
que ita vt distent inter se, ollamque diligenter  
obtuta, & in dolum vino plenum vt innatet im-  
mitte, tum dolum tege & occlude. Hæ Ficus  
permanent quales fuerunt iniectæ, nisi vinum a-  
cescat. Conseruantur recentes Ficus etiam hoc  
modo. Ex recentibus cucurbitis eximere oportet  
ex lateribus, eas partes quæ splenis similes  
existunt, easque excuare velut thecas aut vagi-  
nas. Deinde in singulas, singulas ficus impo-  
nes, Cucurbitamque exemptis splenis obturabis,  
& in loco umbrato suspendes, vbi nec ignis in-  
spiret nec fumus. Sed, vt antè dictum, legendæ  
cum petiolis, quippe quæ diutius durent inte-  
græ. Alii sic in melle disponunt ficus, vt neque  
se inuicem: neque vas tangerent, dein indito o-  
perculo sinunt. Atque vitreum poculum, aut  
aliud quodnis pellucens, ficubus leniter immer-  
tum super imponunt, & obducto cera spiramen-  
to ita relinquunt, sicque immarcescibiles manere  
promittunt.

*Alius mo-  
dus in cu-  
cubitis.*

*Alius.*

*Vt carica  
conser-  
uanda.*

Si in tegete, qualo vel cratibus indita: Fici cal-  
facto furno post exemptum panem propendeant,  
& in sicilem & bene picatam fideliam cordan-  
tur, diu seruantur illæ. Sed eas cum pediculo  
ex quo dependent decerpere conuenit, & mu-  
riam cum oleo seruata in Sole irrorare, & in  
vas mittere, idque luto oblinere, noctem tamen

vinam antea tori exponere, ac postea vasi com-  
mittere. Alii cratibus expandunt, toto Sole sic-  
candas, & recipiunt nocte sub terra. Alii pin-  
guissimam quamque viridem Ficorum eligunt, &  
arundine vel digitis diuisam dilatant, atque ita in  
Sole arescere patiuntur, quas deinde bene sicca-  
tas meridianis teporibus, cum calore Solis emol-  
litæ sunt, colligunt: & vt est mos Afiris atque Hi-  
spanis, inter se compositas comprimunt in for-  
mam panis redigentes: tum rursus in Sole assic-  
cant, & ita in vasis recondunt.

*Alius  
dur.  
alius.*

Modum Campaniæ consuetum tradit Palladius:  
ac varios etiam habet Columella, quos breuitati  
consalentes hic prætermittimus. Ex dictis au-  
tem patet, ficus olim in iuncea capsis, arcis &  
cadis reueruatas fuisse: hodie [vt ad nos impor-  
tantur ex Galloprovincia & Italia] in iuncea spor-  
tis reponuntur.

Sed & de Ficus morbis quædam diximus conue-  
niet, vt & huic rei cultura modus præscribatur.  
Est itaque ei, authoribus Theoph. Plin. & Geop-  
onicis tam Græcis quam Latinis, peculiaris Verm-  
iculario. Bestiolas istas vocant Ceraftas, stridul-  
um animalculum, de quo fusius alio opere. Præ-  
terea ægædæ, scabies, cochleæ. Crados est, cum  
marcescunt rami, quos priuatim Cradas in ficu  
vocari, supra diximus. Item parælla, sed aliter  
quam in Olea, quoties videlicet radices imbrum  
superuentu quasi deglabrantur. Eandem & vredo  
afficit rarbore: & tabes & Theoph. dicta, est-  
que quasi quidam stupor rigorque. Frigore &  
gelu aliosis annis contrahitur. Illi etiam vt &  
plerique aliis arboribus infestæ sunt formicæ &  
Sideratio.

*Fici m.*

*Verm-  
iculario.*

*Crado  
Scabi  
Cochle  
Patele*

*Vredo*

Dicamus & remedia quædam. Ergo ne ve-  
mes patiat, suadente Palladio ramum Terebin-  
thi vel Lentisci taleam cum plantis Fici cacumine  
ponemus inuerso. Vincinis areis tollendi vermes  
ex Fico. Alii amurcam, alii veterem vinam ab-  
laqueatis radicibus miscent. Alii bitumen & o-  
leum, aut solam calcem viam latebris vermium  
linunt. Si formicæ molestæ sunt, rubrica, butyro,  
& pice liquida mista circa truncum debet induci.  
Alii Coracinum pilcem contra formicas in arbore  
suspendendum suadent. Si fructus suos velut æ-  
græ proiciet, alii rubrica aut amurca insulsa mista  
aqua arborem linunt, vel cancrum fluuialem  
cum ramo Ruta suspendunt, vel algam marinam,  
vel fascem Lupinorum, vel radici terebratæ cu-  
neum figunt vel securi arboris corium sepius pro-  
sciunt. Quædam etiam ad idem diximus su-  
pra. Scabiosam ficum curabis scilla iuxta radices  
cuius plan-ata, aut rubrica aqua diluta circum trun-  
cum ipsius oblita.

*Remed.*

*Ad fel-  
casum*

Ficus arbores vt perquam pumila habeantur,  
& in vasculis super fenestris spectentur à viatori-  
bus ita docuere mangones referente Matth. Ab-  
scindito fici furculum verno tempore, paulò an-  
te germinationem, prominente iam corculo, &  
subinde contorto manibus cacumine, in quo vis  
vase terra resecto furculum ipsum ferito cacumi-  
ne inuerso, circa quem hordei miliique non nihil  
inspergito, & terra deinde obruito, demissa ex-  
tra tellurem resecta parte. fit enim hoc mango-  
nio, vt inde ramuli enascantur paruu, qui cir-  
cum vas sese fundentes, breui admodum tempo-  
re ficus optimos edant, pumila perpetuò manen-  
te arbore.

*Ficus  
misa  
fiant.*

*Vires  
vires.*

Sed tandem ad vires. Sunt qui huic fructui  
præcipuum honorem, inter eos, quos horarios di-  
cimus, debere assenserent, vt pote cuius succus mi-  
nus vitiosus sit, & qui magis alar equam quam  
vua,



vua, succo etiam præstantior. Vique adeo apud  
priscos existimata, vt Ananius, *ἡ δὲ τῆς χυμῶν χρεώ-  
Νησα*, id est, ficos auro vtiliores meliorisque di-  
xerit: Et Homero ingeniorum fonti, *οὐρανὸς  
χρυσοῦν ποταμὸν ἀνὰ δόρυ ἀκκάρηται*. Sic & Tryphon ficum  
magnopere laudauit. Atque adeo ficum in maxi-  
ma admiratione fuisse apud Græcos argumento  
est, quod & hi, & maximi quique viti eandem &  
scriptis, & appetitus famulatio profecuti sint.  
Hercules virides ficos ac recentes cum bubula e-  
disse fertur. Plato Philosophorum ille trimegi-  
stus & Philosophus, sed ne mireris, & *φιλόσοφος* τε-  
que ac *φιλόσοφος*, haud minus, inquam, ficum,  
quàm vuarum amator, cognominatus fuit.

Sed, vt specialius eius vires inspicimus, Hipp.  
cùm contingit, vt menses diu retenti dererpent  
affatim prorumpant, tunc huic ita se habenti  
Grossum ficum [*ἐλκυστον ἑρπιδίον*] contusam & cri-  
bratam, in linteo ligatam in subditiō apponit, &  
imo ventri refrigerantia admouet, ea cautione,  
ne inhorrescat. A medicamenti etiam potione v-  
teros Grossorum decocto, postea etiam acerbis  
colluit. Grossos quoque hybernas in aquam in-  
iectas lento igne coquit, deinde percolat, & af-  
fuso oleo, vteros colluit. Idem per subditiō  
purgante & emolliente caricam coquit, donec  
grana interiora [*παύροις χυμῶν*] deponat, id ex-  
pressum læuissimè tritum in vellere [*ἐν εἰς*] cum  
unguento rosaceo subdit. Si tandem ex partu,  
aut inflammatione exulcerati fuerint vteri, Gros-  
sos hybernas [*ἐλκυστον χυμῶν*] manducata de-  
coctas excolat & deponit, deinde oleum tepi-  
dum affundit & permiscet. Diabasi ad summum  
hemini colluit, & purgat. Vlceribus autem pur-  
gatis eisdem ita corroborat. Grossos hybernas  
terit & affusis aquâ per diem totum macerat, & o-  
leo affuso colluit. *Sed hæc collegisse hic sufficiat, qui  
plura vult, apud Hipp. legat.*

Fici maturæ, autore Diosc. recentes ventricu-  
lum lædunt, aluumque solunt: vt et si hic fructus  
in maxima sententiarū autoritate sit, nihilominus  
peculiare ac commune ferè pomorum omnium  
probum hoc effugere minimè poterit. Sed  
contracta ab his alui fluxio faciliè cohibetur: pa-  
pulas euocant, sudorēque mouent: sitim sed-  
dant, calorēque restringunt: Sicca verò sunt  
alibiles & exaltatorię: sitim magis afferunt, al-  
uūque sunt viles: at alui ventriculique fluxio-  
nibus [*συμπτωτικῶν*] contraria: gutturi autem arte-  
ria, vesicæ ac renibus peritiles: nec non & iis  
qui ex longa valetudine decolorati sunt, Anela-  
toribus, Comitialibus atque Hydropicis. Fer-  
uefactæ cum hyssopo & pota, quæ pectore con-  
tinentur expurgant: veteris tussis ac diuturnis pul-  
monum vitii conueniunt, aluūque molliunt  
cum nitro & cnico tuse, deinde manducata. Ipsa-  
rum decoctum arteriæ ac tonsillarum inflamma-  
tionibus gargarizatu prodest. Quin & Cataplas-  
matis ex hordeacea farina misceatur, itēque in  
mulieribus sotos cum Fœnugræco aut pisanā.  
Ceterum cum Ruta coctæ, ad torsiones colicas  
infunduntur. Coctæ, deinde tritæ ac impositæ,  
duritias discutiunt: parotidas & furunculos e-  
molliunt, panos maturant, efficaciusque addita  
Iride, nitro aut calce viuā. Crudæ quoque si cum  
antedictis tundantur eadem efficiunt. Cum malico-  
rio: pterygia repurgant. Cum atramento su-  
torio, medentur agrè sanabilibus malignisque ti-  
biarum fluxionibus, (Vlcerebus Pl.) Quin & in vi-  
no defervefactæ, addito absinthio & hordeacea  
farina, vtiliter hydropicis illinuntur. Crematæ &  
cerato admixtæ perniones sanant. Quod si crudæ

terantur, & liquido sinapi exceptæ auribus indan-  
tur, sonitus tinnitūque sanant. Porro tam syl-  
uestris, quàm satiuæ Fici lacteus succus coaguli  
modo lac contrahit, coagulatimque aceti modo  
dissoluit. Idem corpora exulcerat, ora vasorum  
referat, aluum soluit & vterum relaxat cum trito  
amylō potus: [*παύροις χυμῶν*] ita & Plin. legisse vide-  
tur. Melius *ἢ δὲ αὐτῶν δὲ αὐτῶν*, rationabiliūque. Menses  
quoque ciet appositus cum oui luteo aut cera Tyr-  
rhenica: Podagricorum cataplasmatibus cum farina  
Fœnugræci & aceto vtilis: Lepras verò, Lichenas,  
maculas à Solis ardore cōtractas, vitilignes, plo-  
rias, vlceraque capitis manantia cum polenta ex-  
purgat. Instillatur plagæ, percussis à scorpione,  
venenatorum ictibus & canis moribus auxilia-  
tur: dentium dolori prodest lana exceptus, & in  
eorum cauis additus: denique formicolas verru-  
cam tollit, carne quæ in ambitu est adipe circum-  
lita.

Hæc eadem præstat succus à teheris syluestris  
Fici cauliculis, quandiu lacteo liquore prægnans  
est, nec dum ocul⁹ egerminauit. Tū enim hi rufi  
exprimuntur, & succus siccatus in vmbra reponi-  
tur. Porro & liquor & succus ad exulceratoria  
medicamenta vsurpantur. Decocti verò cum bu-  
bulis carnibus ficulnei furculi efficiunt, vt hæ fa-  
cilitus percoquantur. Lac quoque si dum coqui-  
tur, spathæ vice ficulneo eiusmodi furculo mouea-  
tur, maiore illud vi præditum efficiunt.

Grossi, quæ & Egin ei quibusdam dicuntur, co-  
ctæ & illitæ, collectionem omnem, strumāsque  
emolliunt. Crudæ verò cum nitro & farina impo-  
sitæ, formicationes thymūque tollunt. Quin &  
hæc eadem ipsa folia possunt. Cum aceto autem &  
sale illita, vlcera in capite manantia, furfures &  
epinyctidas sanant. Iis quoque ficolæ scabraque  
genæ perficiantur. At nigra Ficus foliis ramulif.  
que vitilignes albæ perunguntur. Faciunt quo-  
que aduersus canum morsus cum melle, & ad vl-  
cera quæ saui, Græcis *αἰνεία* vocantur. Grossi cum  
papaueris syluestris foliis ossa extrahunt: furuncu-  
lōisque cum cera discutiunt. Ceterum cum eruo ac  
vino impositæ, contra muris aranæ morsus &  
scelopendræ venena possunt. Fit & è cremato-  
rum tam syluestris quàm satiuæ Ficus caliculorum  
cinere lixiuium. Sed cinerem plurimum discissi-  
mēque macerari oportet. Vile porro est ad me-  
dicamenta caustica, & partibus prodest gangræna  
tentatis. Nam expurgat & consumit quæ excre-  
scunt: Vfus est, vt eo imbuta subinde spongia  
superponatur. Interdum & infunditur, quemad-  
modum dysentericis, & in vetustis fluxionibus, nec non  
& sinubus cuniculatum depascētib⁹ iisq; magnis  
Etenim purgat, conglutinat, carne replet & oras  
committit, æquē ac emplastra quæ cruentis vul-  
neribus imponuntur. Propinatur & ad san-  
guinem in grumos coarctatum itēque contra  
precipitationes, rupta atque conuulsa cum aqua  
cyatho recens excolatum, admisto olei exiguo.  
Coeliaci, ac dysenteris per se Cyathi mensura da-  
tum auxiliatur. Nervorum vitii & conuulsis ex  
oleo conuenienter illinitur: quippe quod sudo-  
res moueat. Bibitur & aduersus gypsi potum,  
phalangiorumque morsus. Eisdem porro effi-  
cūs exhibent lixiua reliqua, præsertimque quer-  
num: omnia verò astringendi vi possent. Hæste-  
nus Diosc. De qua postrema eius sententia infid., larg  
post vites ex Galeno specialius trademus. Plin. Vires ex  
quoque testatur, Ficus succum lacteum coaguli  
vlum præbere acetique naturam habere, & plera-  
que alia Diosc. de Ficu placita confirmat diuersis  
locis, additque Lac eius pilos detrahare, palpe-

Tinnitus.

Lactis Sili.

Aluus.

Vterus.

Menses.

Podagra.

Lepra.

Lichena.

Vitiligo.

Piora.

Vlcera capi.

Eti.

Ictus Genet.

Dentium

dolor.

Verruca.

Exulcerat.

Grossorum

vis.

Struma.

Formicatio.

Folia.

Vlcera cap.

Sabritia.

Lac.

Vitiligo.

Canis mor.

Ficus.

Vlcera ce-

pau.

Folia

rallura.

Ictus Genet.

Lixiuum

Causticum

Gangrana.

Dysenteria

Fluxiones

Scurra.

Vlcera ca-

na.

Facultates.

Sanguis co-

cretus.

Cafus ex

alio.

Colica.

Dysenteria.

Nervus com-

nuus.

Sudorificum

Cancer cy-

plum

Morsus phæ-

luis.

Vires ex

pluribus

brarum scabiem emendare. Fici maturæ, eodem teste, urinam cient, aluum soluunt, sudorem movent papulæque. Ob id autumno insalubres, quoniam sudantia huius cibi opera corpora perfri-  
*Plin illust.*  
 gesunt. Nec stomacho viles: sed ad breue tem-  
*Medicata*  
 pus & voci contrariæ intelliguntur. (Dali. nec sto-  
*ius.*  
 macho contrariæ legitur) rectius fortè, inutiles: Voci autem contrarias esse, experimento repu-  
 gnat: fortè, nec voci legendum. (Medicatas vocat, quarum maturitas, ut sint præciores, capri-  
 ficatione acceleratur, de qua re in superioribus plus satis.) Iuuenum vires augent: senibus me-  
 liorem valetudinem faciunt, minisque rugarum. Sitim sedant: calorem refrigerant: ob id non ne-  
 gandæ in febribus constrictis, quæ *stegnis* vocant. Sicca Fici stomachum laedunt: gutturi & faucibus magnificè viles. Natura his excofaciendi. Si-  
 tim adferunt. Aluum mollunt: rheumatismis eius & stomacho contrariæ. Vesicæ semper viles & anhelatoribus ac suspitiosis. Iocinosis ære-  
*Febres.*  
 um, lienis vitii. Corpus & vires adiuvant: ob id antè athletæ hoc cibo pascébantur: Pytha-  
*Athletarum*  
 goras exercitator, primus ad carnes eas transtulit, cibis.  
 illarumque esu carnem & habitum corporis au-  
 geri docuit. Recolligentibus se à longa valetudi-  
 ne vtilissimæ: omnib. quæ maturata aut discutien-  
 da sunt imponitur: efficacius calce aut nitro admi-  
 sto. Coctæ cum Hysso po pectus purgant, pitui-  
 tam, tussim veterem. Cum vino autem ad sedem  
 & tumorem maxillarum, & furunculos, pa-  
 nos, parotidas decoctæ illinuntur. Vtile & deco-  
 cto earum fouere scæminas. Decoctæ quoque  
 eadem cum scænogæco viles sunt pleuritici-  
*Pellus.*  
 bus, tussis, *Pleuritis.*  
 Picuita, *Peripneumonia.*  
 Tumores. *Vlcera ti-*  
*lurum.*  
*Pterygia.*  
*Hydrops.*  
*Plin not.*  
*Corrodit.*  
 Caribuncu-  
 lus  
 Carcinoma  
 phagedæna  
 Cicatrice.  
 Lusciosis.  
 Superflum.  
 Verris  
 Vlcera  
 Spodii sub-  
 stitutum.  
 Vlcera ocu-  
 lorum.  
 Caprificus.  
 Dentium  
 ascor-  
 tibile  
 et nri  
 pendium.

mollissima sunt ex his, cum aceto vlcera man-  
 nantia, & epynididas & furfures sanant. Grossi  
 Caprifici inflammationes (inflationes. ch.) discu-  
 tiunt suffito. Resistant & sanguini taurino potio,  
 & psimythio, & lacti coagulato potæ. Item in  
 aqua decoctæ atque illitæ parotidas sanant. Cau-  
 liculi aut grossi eius quàm minutissima ad scor-  
 pionum ictus è vino bibuntur. Lac quoque infil-  
 latur plagæ, & folia imponuntur. Item aduersus  
 murem araneum. Cauliculorum cinis uiam fau-  
 diam sedat. Arboris ipsius cinis ex melle, rhaga-  
 dia. Radix deseruetæ & ipino, dentium dolo-  
 res. Hyberna caprificus in aceto coctæ & trita,  
 impetigines tollit. Illinuntur ramenta ramorum  
 sine cortice quàm minutissima ad scobis modum.  
 Caprifico quoque medicina vnius miraculum ad-  
 ditur. Corticem eius iam pubescentem (impub-  
 centem. alij) puer impubis si defraeto ramo detra-  
 hat dentibus, medullam ipsam adalligatam antè  
 Solis ortum prohibere strumas. Caprificus tauros  
 quamlibet feroces, collo eorum circumdata, in  
 tantum mirabili naturâ compescit, ut immobiles  
 præstet. Quæ sanè duo prodigiosa sunt miracula,  
 si euentus respondeat, quemadmodum illud antè di-  
 dum casorum animalium carnes perquam cele-  
 riter tenerescere, & fragiles effici, quæ in Fico  
 penderint. Quorum rationem inuiri Plutarchus  
 in Sympliciis. Quum inter obsonia Aristionis  
 Coquus immolatum Herculi gallinaceum gallum  
 recentem, tenerum & penè friabilem obulisset,  
 tam citam teneritudinem fico acceptam referebat  
 Aristio, contendens iugulatas aues etiam prædu-  
 ras teneritatem contrahere, quæ pensiles adha-  
 lere Fico.

Causam adfert Plutarchus: namque quoddam au-  
 rana halitumque vehementem ac validum expiret, tenerescit  
 ficus, visus satis testatur. Fidem quoque facit quod  
 uulgo de tauris proditur & modò ex Plin. relatu-  
 m, quamvis alio modo: ferocissimus quisque  
 huic alligatus arbori, misceat, tangique manu ac  
 subigi tolerat, & efflans iram, animumque veluti  
 flaccidum deponit, tantis viribus pollet ea  
 spiritus acrimonia, ut, ruat licet læuiusque taurus  
 imperet furori. Siquidem arbor Fici plus ceteris  
 lacte copioso prægnans est, sic ut & lignum, ra-  
 mi, pomum eo planè referantur. Quapropter  
 cum amburitur, fumus, quem eructat, & maximè  
 mordet & vellicat. Ita Theophrasto, Aristopha-  
 ni in Vespis, & in Aululariis, & in Equitibus.  
 An verò, quoddam Plutarchus putat, causa, cur cicur  
 fiat Taurus, Fico alligatus, (si modo sit) sit tri-  
 buenda acrimoniæ arboris spiritus, nondum con-  
 cedimus. Qualem enim & quàm vehementem o-  
 portet esse in taurum illum spiritum, quem inno-  
 xium non ferat modò, sed nec ullum sentiat, aut  
 saltem non patiat vel homo, vel animal quod-  
 vis aliud? Causam igitur potius (si res sit experi-  
 menti indubitata) ad occultam quandam pro-  
 prietatem, & cuius alia manifestior in obscura &  
 miserabili hac nostra literaria peregrinatione,  
 nulla reddi queat, quemadmodum nec aliarum  
 plurimarum in eiusmodi occultis naturæ mira-  
 culis.

Sed quam dicemus rationem, cur gallus iugu-  
 latus si in Fici arbore penderit, tenerescat,  
 quod alii non tantum de gallinacea, sed de omni  
 alia carne tradunt, vel Curtio teste. Plutarchus  
 videtur, rationem reddidit auram acrem & vali-  
 dam, ideòque consequentem: additque Equos &  
 asinos tum maximè bulimo affici, cum aut Ficus  
 recentes, aut mala baiulant. Sed hæc ratio non  
 faustacit priori questionem. Est hæc aperta & ma-  
 nifesta

Vlcera  
 nantia  
 Sangui-  
 tauri  
 med.

Corticem  
 Aluum  
 ram.  
 Vlcera  
 dolor.

Ficus  
 m.  
 racula.

Cur ex  
 carnes.

Cur mi-  
 fiat ab-  
 dem tau-  
 rus.

Requirit  
 opus. Plu-  
 tarcho.

Alia.

Cur gau-  
 tenerese.



nifesta ad suum effectum. Acimonia nimirum la-  
ctis ficulnei, quale in ficu immatura deprehendi-  
tur, eam vorandi cupiditatem inducit. Mala ve-  
rò id duplici ratione efficiunt, vel propter frigi-  
ditatem & adstrictiōnem, si immatura sūt: (vtra-  
que enim harum facultatum famem & appetitum  
ciere potis est) vel quia citò descendunt, & ven-  
triculum vacuum relinquunt, si lapida sint, tene-  
ra atque dulcia. At non est aperta illa vis Ficus  
ad appensam tantummodò carnem? Quod si  
paulò diutius ex ea penderet, temporis potius  
spatio causam acceptam ferremus, quippe quo  
vel ablique Ficu carnes, & potissimum gallina-  
ceas, tam nostratium quàm Indicorum Gallorum  
tenerescere atque adeò friabiles reddi, tam certò  
scimus, quàm huius cogitationis optatam inter-  
dum ferimus appetitus coniuualis gratiam. Quo-  
modo enim id à spiritu vel halitu arboris simplici  
euenire queat, (nisi quis fortè & hic occultum a-  
liquam vim causari velit) fatemur ingenua illa,  
sed fragilitatis interim suæ confessionis formula:  
nos nescire.

Idem Plutarchus & alii plures, Ficum fulmine  
non citò exsiliant: causam tribunt idem amarum  
& trunci vitio, vt talia fulgure non percellantur.  
Quod si verum sit, multiplex profectò, cōtra rem  
tam horridam, tamque pertimescendam, & tantum  
naturæ periculum remedium iam nobis innouit,  
cū tot res amaras inuenire sit obuium. Aliud  
de hac re iuberum in superioribus exposuimus.  
*Hæc Philosophica sunt.*

Magis etiam ad artem accedit, quod ille ipse  
autor quatit in Symplocis: cur Ficus non & gū-  
stus & odor, & natiuitas & diuersitas magis? Cur,  
inquam, cū Fici arbor amarissima sit, fructum  
tamen ferat dulcissimum. Et sanè haud parum  
toris hæc quaestio Plutarchum, vltro citroque in-  
geniū pendente vela pro consequendo cursu ra-  
tionis & veritatis. At non vidit ille disputator  
idem euenire in aliis plerisque arboribus. Amar-  
us luccus Preni potissimum syluestri, ac fructū  
maturatione tandem ad gratiam redigit atq; dul-  
corem. In Cerasi nihil dulce. Ad fructus pleri-  
que dulces nascuntur. Amaricans, austerus vel  
insuauis Piti non succus insidit, sed pars eius  
omnes pluraq; videas Pira dulcia, quàm non dul-  
cia, præsertim probè matura. Concludamus cum  
summo disputatore Aristotele, omnia coctione  
dulcescere. Quantò magis geminā internā, in-  
quam, à forma & calore animæ Fici, Cerasi, Piti  
&c. & externā à colore Solis. Egedem rationes, cur  
Fici arbor amarissima Plutarcho fructus ferat dul-  
cissimos quod nobis fuit demonstrandum. Et de-  
cuit fortassis lectorum in tam longa Ficuum tra-  
ctatione, aliquot quaestiuularum ventilatione  
recreare.

Nunc & cæterorum autorum placita de Fici vi-  
ribus persequamur, vbi prius quædam de Sycte  
vino adiecerimus.

Obscurè de eo Plinius: Id verò tenuium esse  
partium, status gignere, stomacho aduersari, fasti-  
dium creare, bonam tamen facere alium, vinum  
ciere, mensas trahere, lactis vbertatem præstare, at  
vitiosum sanguinem creare. Elephantiasimque &  
zythum inferre tradit Dioscorides, modum pa-  
randi addens.

Aceti fycinis seu ficulnei parandi modum hunc  
docet Columella. Sunt quædam regiones, in qui-  
bus vini, idèoque etiam acetici penuria est. Itaque  
Ficus viridis quàm maturissima legenda est, vtique  
etiam si iam pluuiz incescerunt, & propter im-  
bres in terram decidit; quæ cū subiecta est, in

dolium vel in amphoras conditur, & ibi sinitur  
fermentari: deinde cū exaruit, & remisit liquo-  
rem, quicquid est acetici, diligenter colatur, & in  
vasa picata benè olida diffunditur: hoc primè notè  
acerrimi acetici vsum præbet, nec vnquam situm  
vel mucorem contrahit, si non humido loco  
positum est. Sunt qui multitudini studentes a-  
quam Ficus permisceant, & subinde maturissimas  
Ficus recentes adiciant, & patiantur in eo iure  
tabescere donec satis actis acetici sapor fiat. Postea  
in iuncis fuscillis, vel sparteis saccis percolent, li-  
quatimque acetum feruificent, dum spumam,  
& omnem spurcitiam eximant, aut torridi salis  
aliquid adiciant, quæ res prohibet vetuniculos a-  
liaque innasci animalia.

Cæterum Ficus arida, ex traditione Galeni, vim  
habent exalfaciendi ordine primo completo aut  
secundo incipiente: habent verò etiam partium  
tenuitatem quandam. Ex istis duabus idoneæ  
sunt, quæ duos tumores concoquant: itatim ve-  
rò etiam eos digerunt atque ipsæ per se illitas eius-  
modi vim obtinent. Sed & decoctum earum eius-  
dem vtique naturæ est. Verum vbi magis conco-  
quere consilium est, miscenda est farina triticea  
vbi verò plus digerere, hordeacea: panis horum in  
medio. Porro scire oportet, quòd quæ pinguio-  
res sunt, magis possunt concoquere: quæ verò  
gustu actiores, magis tamen extergere, tum digere-  
re. Cæterum quod ex his plurimum in aqua co-  
ctis efficitur, simile est meli non solum consili-  
tia, sed & facultate. At Ficus virides comestæ, pro-  
pter admixtam humiditatem, sunt vbi magis  
ciliolis: subducunt tamen alium vitæque tum  
humide, tum siccat. Ficus verò Caprifici actis &  
digerentis facultatis sunt. Sic etiam domesticarum  
grossi, quas & *grosos* vocari diximus: inest enim il-  
lis non nihil etiam succi ex Ficu arbore. Ipsa Ficus  
arbor calidæ tenuiumque partium temperaturæ  
est, vt indicant & liquor eius & foliorum succus.

Valenter vtique calidus est: quare non mordi-  
cat tantum aut vehementer abtergit, sed & vlce-  
rat & ora valorum refert, & verrucas quas myr-  
mecias vocant elicit. Sed & purgare potest. Ficus  
agressis, tum liquor tum succus ad omnia quàm  
satius valentior est. Sed & crasse caumadeo sunt  
calidæ tenuiumque partium, vt carnes bubulas  
duras, si coquendis adiciantur, friabiles ac tene-  
ras efficiant. *Hæc Gal. in 8. simpli.*

Idem lib. de alim. Ficus, inquit, tametsi minùs  
prauis succi gignant, quàm cæteri omnes non mo-  
dò fugaces sed & autumnales fructus, non tamen  
propterea id vitium effugere potuerunt. Cæterum  
hæc ipsi insunt bona, nempe quòd commeabi-  
les sint, & faciliè in totum corpus peruadant pe-  
netrentque. Nam & abstergendi vi pollent haud  
obscurè: cuius gratia post ipsarum esum nephritici  
multas arenulas excreant. Cum porò omnes  
autumnales fructus exiguum corpori alimentum  
præbeant, minimè omnium Ficibus id vfu venit:  
carnem tamen non compactam neque firmam  
generant, ceu panis & fulla cato, sed turgidulam  
& subinanem, veluti Fabæ. Quin ventrem fla-  
tibus implent & ipsæ, nec mediocrem profectò  
humorosi sunt: intulissent, si etiam celatè de-  
scensus essent adeptæ, cuius beneficio cū ce-  
lenter peruadant, status quem excitant non diu  
manet, atque ob id minùs cæteri autumnii fructi-  
bus lædere consueverunt. Naturæ Ficus imma-  
turas non mediocriter antecellunt, quod & in a-  
liis omnibus cernitur fructibus, quanquam non  
tantum in illis discrimen existat. Siquidem ad  
plenum maturæ Ficus paulò minùs omni prorsus

Alitatio.

Caricarum  
tempera-  
mentum  
in Gal.

Decoctum.

Ficus Cap-  
rifici.Taxant  
alium.  
Ficus Ca-  
prifici.  
calidæ  
temperaturæ.Succi tem-  
perant.Ad Ger-  
m.Tempe-  
ram crasse.

Nephritis.

noxa vacant. Ficus & Vitis, quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, nubimūque pravi fucci habent, præsertim cum exactam maturitatem fuerint adepti. Quodque nutriant, maximo argumento sunt ii, qui vinearum fructum custodiunt: siquidem cum duos menses solis vis ac Ficus, quarum custodia præfunt, vescantur (nisi forte panis quippiam cum illis addant) obesi tamen ac pingues fiunt. At caro quæ ex ipsis gignitur, haudquaquam est firma ac densa, quemadmodum ea quæ ex carnibus fit, sed laxa ac præhumida: ob id celeriter etiam cum velsi ipsis desierint, contrahitur ac confidet.

Caricæ quidem multiplicem habent utilitatem, si quis tamen largitus est auctori, ab eis offenditur: non admodum enim probum sanguinem gignit: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, quæ & ventrem ad excretionem irritant & renes expurgant. Pecori autem Lienique in inflammatione obfessi sunt noxiæ quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum ac potuum. Obstruēt illis aut scirrhus tentatis ex se se nihil profunt aut obstant, sed medicamentis incidentibus ac extenuantibus & extergentibus mixta non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis Lienis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè antè cibum cum Thymo aut Piperi, aut Zingibere aut Pulegio, aut satyria, aut Calamintha aut Origano, aut hyssopo: ad eundem etiam modum si caricæ cum alio quopiam illorum quæ facultatem habent a crem aut omnino incidendi assumantur, non solum sic affectus, sed sanis quoque viles erunt: siquidem iccoris meatus, per quos festur alimentum, apertos esse non ægotantibus modò, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante aceto & garo præparatas vulgò comedunt, quod id utile esse experientiâ didicerint. Verissimile est, ipsorum nonnullos Medici cuiusdam consilio adductos, Ficus hoc modo primum comedis, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus & Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Hæcenus Gal. qui vt salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit ab xxviii. anno ætat. ad senectam vsque exceptis exactè maturis Ficibus, ac quæ vis, quæ minus inutilia esse existimavit, vt ex modò dictis abundè patet. Idem ait quod quicquid amicorum suæ parvè ad monitionem, vt ab omni fructibus abstineret, sine morbis fuisse.

Martialis Epigram. 13. traditum Distychon non malè & huc quadrare videtur: quamvis ille ad Ficedulam referat, aut alluisse videatur.

Cum me Ficus alar, cum pasciar dulcibus visis,  
Cur potius n. men n. dedit vna mihi?

Est autem Ficedula M. Varroni dicta auicula, quod scibus vescatur, ob quam rem etiam *auicula*, aliis *auiculis* dicitur, & *auicula*, id est, vuedula, ab visis quas etiam pascitur, quibus murum in modum pinguescere creditur. Hanc Recentiores falsò putant esse quamcumque Autumnalem auiculam ob pinguetudinem expeditam: certa enim species est, corpore grandiusculo quàm Luscinia, oblongo, colore misto ex rano, cinereo, pallido, Pellagiam Falcones vocant; quod ex Scalig. observationibus hic annotare placuit, sed ea lege ac omine, vti nobis non sit fraudi materias commi-

guisse.

Observatio. Caricæ quidem multiplicem habent utilitatem, si quis tamen largitus est auctori, ab eis offenditur: non admodum enim probum sanguinem gignit: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, quæ & ventrem ad excretionem irritant & renes expurgant. Pecori autem Lienique in inflammatione obfessi sunt noxiæ quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum ac potuum. Obstruēt illis aut scirrhus tentatis ex se se nihil profunt aut obstant, sed medicamentis incidentibus ac extenuantibus & extergentibus mixta non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis Lienis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè antè cibum cum Thymo aut Piperi, aut Zingibere aut Pulegio, aut satyria, aut Calamintha aut Origano, aut hyssopo: ad eundem etiam modum si caricæ cum alio quopiam illorum quæ facultatem habent a crem aut omnino incidendi assumantur, non solum sic affectus, sed sanis quoque viles erunt: siquidem iccoris meatus, per quos festur alimentum, apertos esse non ægotantibus modò, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante aceto & garo præparatas vulgò comedunt, quod id utile esse experientiâ didicerint. Verissimile est, ipsorum nonnullos Medici cuiusdam consilio adductos, Ficus hoc modo primum comedis, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus & Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Hæcenus Gal. qui vt salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit ab xxviii. anno ætat. ad senectam vsque exceptis exactè maturis Ficibus, ac quæ vis, quæ minus inutilia esse existimavit, vt ex modò dictis abundè patet. Idem ait quod quicquid amicorum suæ parvè ad monitionem, vt ab omni fructibus abstineret, sine morbis fuisse.

Martialis Epigram. 13. traditum Distychon non malè & huc quadrare videtur: quamvis ille ad Ficedulam referat, aut alluisse videatur.

Cum me Ficus alar, cum pasciar dulcibus visis,  
Cur potius n. men n. dedit vna mihi?

Est autem Ficedula M. Varroni dicta auicula, quod scibus vescatur, ob quam rem etiam *auicula*, aliis *auiculis* dicitur, & *auicula*, id est, vuedula, ab visis quas etiam pascitur, quibus murum in modum pinguescere creditur. Hanc Recentiores falsò putant esse quamcumque Autumnalem auiculam ob pinguetudinem expeditam: certa enim species est, corpore grandiusculo quàm Luscinia, oblongo, colore misto ex rano, cinereo, pallido, Pellagiam Falcones vocant; quod ex Scalig. observationibus hic annotare placuit, sed ea lege ac omine, vti nobis non sit fraudi materias commi-

guisse.

Observatio. Caricæ quidem multiplicem habent utilitatem, si quis tamen largitus est auctori, ab eis offenditur: non admodum enim probum sanguinem gignit: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, quæ & ventrem ad excretionem irritant & renes expurgant. Pecori autem Lienique in inflammatione obfessi sunt noxiæ quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum ac potuum. Obstruēt illis aut scirrhus tentatis ex se se nihil profunt aut obstant, sed medicamentis incidentibus ac extenuantibus & extergentibus mixta non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis Lienis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longè antè cibum cum Thymo aut Piperi, aut Zingibere aut Pulegio, aut satyria, aut Calamintha aut Origano, aut hyssopo: ad eundem etiam modum si caricæ cum alio quopiam illorum quæ facultatem habent a crem aut omnino incidendi assumantur, non solum sic affectus, sed sanis quoque viles erunt: siquidem iccoris meatus, per quos festur alimentum, apertos esse non ægotantibus modò, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante aceto & garo præparatas vulgò comedunt, quod id utile esse experientiâ didicerint. Verissimile est, ipsorum nonnullos Medici cuiusdam consilio adductos, Ficus hoc modo primum comedis, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus & Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. Hæcenus Gal. qui vt salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit ab xxviii. anno ætat. ad senectam vsque exceptis exactè maturis Ficibus, ac quæ vis, quæ minus inutilia esse existimavit, vt ex modò dictis abundè patet. Idem ait quod quicquid amicorum suæ parvè ad monitionem, vt ab omni fructibus abstineret, sine morbis fuisse.

Martialis Epigram. 13. traditum Distychon non malè & huc quadrare videtur: quamvis ille ad Ficedulam referat, aut alluisse videatur.

Cum me Ficus alar, cum pasciar dulcibus visis,  
Cur potius n. men n. dedit vna mihi?

Est autem Ficedula M. Varroni dicta auicula, quod scibus vescatur, ob quam rem etiam *auicula*, aliis *auiculis* dicitur, & *auicula*, id est, vuedula, ab visis quas etiam pascitur, quibus murum in modum pinguescere creditur. Hanc Recentiores falsò putant esse quamcumque Autumnalem auiculam ob pinguetudinem expeditam: certa enim species est, corpore grandiusculo quàm Luscinia, oblongo, colore misto ex rano, cinereo, pallido, Pellagiam Falcones vocant; quod ex Scalig. observationibus hic annotare placuit, sed ea lege ac omine, vti nobis non sit fraudi materias commi-

guisse.

Porro Gal. lib. 8. simpl. cap. de Cinere. Dioscoridem haud iniuria reprehendisse videtur, quod lixiua omnia adstringendi vim habere prodiderit, inter quæ & ficulneum connumeravit. Nam cum Lixivium vt Gal. verbis utamur, sit tantummodò *ἀλγιστὸν τέρας*, id est, cineris lotura: id certè cinctis, è quo fit, naturam respere consentaneum fuit. Porro cum cinerum natura non vna sit & eadem, sed pro materiæ combustæ diversitate diversa, aliorum quidem adstrictoria, aliorum verò acris & absterforia, & ipsa quoque lixiua pro cineris, è quo facta fuerint, varietate varia esse necesse fuerit. Quapropter doctiss. Sarrac. vt ne Galeni reprehensioni locus esset vllus, suprâ adducto loco apud Dioscor. mendum subesse haud malè suspicatur, & *ἀντὶ τῆς ἐν τῇ γῇ, καὶ οὐκ ἐν τῇ γῇ* legendum esse iudicat.

Non abs re fuisset Simeonis Sethi paucis verbis & velui compendio, tradita de Ficuum viribus adscribere, nisi pleraque ex Gal. essent desumpta. Dicamus quædam ex eo. Fici inquit, primo ordine calefaciunt intenso: deficiant verò medio primo, nutriuntque abundè, sed vento ventriculum complent nisi probè concoquantur. A Nephriticis comestæ, multas areulas educunt. Pectus & pulmones iuvant: aiunt insuper contra venena medicamentum ficos esse, eos singulis diebus seivnus si quis sumat.

Sed vt de Ficorum erga venena vi magis conflet, nota est Mithridatis compositio, tantopere à multis celebrata, de qua etiam Iuvenalis. Satyra 14.

Atque eme quod Mithridates  
Composuit si vis aliam decerpere Ficum.

Quippe caricæ cum Inglandium nucibus com-manducata, egregiè venenorum maleficia hebetare creduntur. De Mithridatis antidoto plura habes in historia Nucis Inglandis. Denique omnium fructuum quæ *ἐν τῇ γῇ*, id est, Ligneos, [quoniam è materiâ stirpium lignea oriuntur, à quibus diversi cereales, *σπέρμα*] appellant, vtilissimos esse ficos etiam Herodotus Lycius in opere suo de ficibus] vt scribit Athen. ] planum facit multis verbis, ac Ficum succo recens natos puellulos optimè ali, vegetosque fieri, si illis nutrantur, affirmat. Pherecrates, qui Perlas edidit, inquit:

Affexit nostrum si quispiam aliquando Ficum ferentem,  
Cum tempestiva esset,

Puellulæ, vt nunciat, obtricam in cibum dat, eam-  
quam

medicamentum non vulgare Ficus sit.

Herodotus in primis admirandus & mellifluus lib. 1. hit. ingens bonum mortalitati ficos esse, ad hunc modum scribit: Adversus illos homines, ò rex, exercitum comparas, qui anaxyride [semo-rali seu subligaculo] & reliquo vestitu coriaceo vtuntur: cibantur verò non iis quæ cupiunt, sed iis quæ suppetunt, regionem asperam incolunt: vinum, per locum, non bibunt, nec ficos nec aliis lautis cibis vescuntur.

Polybius Megalopolites lib. 2. narrat, Philip-pum Persici patrem, cum incurtionibus Asiam vastaret, comæatus inopiâ, quia frumentum deesse, in cibaria militum à Magnesium Ficus accepisse, idèque potitum Myunte, ac pro datis ficos eum locum tribuisse Magnesium. Ananias Iambicus:

In adibus auri multum si quis conluserit,  
Et paucas Ficos, etc.

Quandò Ficus auro sunt præstantiores intelligit.  
Tam prolixè Magnus de Ficibus cum tractasset, ad



ad hunc modum locutus est Daphnus medicus Philotimus lib. 3. de alimentis, recentium Ficum ait plures esse inuicem differentias, nempe generis, temporis quo proueniunt, & facultatis: ceterum in vniuersum, humidam & maturam ocysimè dissolui ex omnibus, & quomodo alio fructu celerius coqui, nec alius impedire cibi coctionem: humidam facultatem glutinosam esse ac dulcem, subnitrosam tamen: (ob lactis exiguam acrimoniam) deiectiones moliri largiores, liquidiores, promptiores, minimèque molestas: succum salum & subacré corpi suppeditare cum sale denotatas: at quod præbent alimentum citò dissipari. Itaque multis Ficum mesu valdè auctam molem corporis, breui post tempore gracilescere ac extenuari supra modum: quod profectò non accideret, si perstaret alimentum & Ficu perceptum, & statim discuteretur.

Reliquis porò fugacibus fructibus à ventriculo facilis superari hoc arguit, quòd non solum citra noxam copiosius aliis fructibus ingerimus, sed etiam quòd illis præsumptis si consuetum & parèni cibi modum addamus id nihil incommodet: vnde manifestum est, vtrumque cibum à ventriculo confici, & minore negotio Ficus vinci quàm alios fructus, nec obstat quominus alius cibus coquatur. Facultas quidem eà Ficus est, quam propolisimus. Glutinosa & salina, ex eo deprehendimus, quòd ob lentorem manibus inhaerescit, & illas tamen absterget: dulcem linguæ & oris iudicio cognoscimus; Quòd autem sine torminibus & perturbatione alui deiectionem moueat celeriter, copiosior, mollior, vt probemus, verbis haud multis fuerit opus. At verò in ventriculo Ficus parum immutatur seu alteratur, non quia difficilis sit earum coctio, sed quia confestim deglutimus dentibus nondum extritas & comminutas: qua de causa promptior est earum excretio.

Salsum quidem succum à Ficis procreari, & in corpus diuici indicamus, quoniam, vt est demonstratum, nitrosi sunt: augeret salis additio sale, quo cum ferè recentes comedit solent etiam hodie in Italia & Galloprovincia. Ita augebatur olim acrimonia etiam adiecto vel Thymo, vel reliquis supradictis herbis, vel aceto. Ac veteres esitasse Ficum cum sale, i Thymo atque aceto, abunde colligere licet ex Athenæo.

Heraclides Tarentinus in Conuiuiis ( vt idem refert) dubita & percontatur, post esum Ficum an aqua gelida bibenda sit, an calida. Qui calidam maluit, illos inquit hoc suadere, quod animaduertant fordidas manus aqua calida lotas confestim purgari, & hoc exemplo credibile putent in ventriculo Ficus è vestigio dissolui, præsertim cum extra corpus nostrum aqua calida ficum continentes partes distrahant, & in tenues portiunculas liquatas diuidat, frigida verò illas contrahat, & cogat. E diuerso, qui frigidam bibendam sentiunt, sic ratiocinantur: frigida potione ob eius gravitatem, quæ insident ventriculo deorsum protrudi: non admodum bellè ventriculum habere post esum Ficum, quia estuosus & imbecillus reddatur: quamobrem quidam exemplò merum bibunt: aquam porò frigidam in ventriculum acceptas illas depellere.

Est autem post sumptas Ficus largius & assatim bibendum, ne in ventriculo subsistant, sed ad inferiorum intestinorum partem delabantur.

Quidam Ficus aiunt edendas meride non esse, quia tum morbose sint, id quod etiam in Crapattalis Pherecrates dixit. Aristophanes in Proagone.

Aegrotantem verò aliquando ipsum æstate cum vidisset.

Vt aggraret etiam ipse, meridia Ficus comedat.

Eubulus in Sphingocratione:

Per Iouem ita egi: Etenim rectè non valebam, si vir oprime,

Vt quæ nuper Ficus edissem meridie.

Nicophon in Sirenibus:

Vestrum si quis Ficus meridie

Recentes, posteaquam esitaret, obdormisset, febri cauto à prorsus.

Cursu aduenit.

Diphilus Siphnius inquit, recentes ficus & prauum & paucum alimentum præbere, egeri facile, innatare ventriculo, & citius in habitum corporis distribui, quàm siccas.

Demetrius Scepius lib. 15. Troiani apparatus scribit, eos qui ficis abstinent, esse vocaliores, ideòque Hegesivæ acta ciuem Alexandrinum, qui historias composuit, cum initio pauper esset, eximium Tragædiarum actorem & histrionem euasisse, vocèque mirum in modum sonora, quia per annos octodecim ficum non esitasset: ideo studiis vocis abstinere ficu Græci iubent.

Notum est quod de ficis iactatur proverbiū.

Post piscem Ficus, post carnem legumina.

De quo, quia extat apud Eras. in adagiis, plura non dicemus.

Baptista fierus vitæ qualdam ficum breui nec ineleganti carmine complexus est:

De illis etiam Eob. Hellus:

Ergo tot inter opes regnantis fructibus anni,

Prima locum merito Ficus & vna tenent.

Veraque nam succia implet melioribus, & nil

Quæ nocent viriis damna ferentis habent.

Decoctum, inquit Paulus, siccorum, plerique Siran appellauere: quod & destruto quoque nomen est.

Hippocrates Sycon.

Posteritatis obseruationi tribuendum, ficos cum fermento tritas, admixto sale, pestem aliaque vlcera vel tumores emollire adè vt intra paucos dies abscessus rumpatur. Eodem tamen medicamento Regem Ezechiam vsum fuisse (2. Reg. c. 20.) existimat Tragus.

Matthioli sibi experimento compertum esse tradit caricæ duas aut tres nocte vna in aqua vitæ maceratas Asthmaticos iuuare, qui manè eas deuorauerint. Ad nephritidem & dolorem colicum experimentum excellens & præsentaneum eiusdem, vt ille ait: Caricarum albi, Græci ana M. i. coquantur in lib. 1. f. vini ad consumptionem tertie partis, cum sale paucò iniciatur per clysterem, sordes multas ad flauas educit. Ficum decoctum calidum infantibus propinatum, ethymata & exanthemata protrudit.

Ficulneo lacte vermiculosa, sanantur aures: & ficulneis foliis facillè affricu citantur hemorrhoides, qui hodie vulgò facillimus & tutissimus habetur hemorrhoides excitandi modus. Practici quoque & ad promptè maturandos panos caricis decoctis (quibus tamen vel solis magnam in eo casu tribuunt vim) addunt radices Lilii, Altheæ, cæparum &c.

Si quis ictus, vel demorsus ab animali venenoso, is insillat tres, vel quatuor guttas lactis ficulneæ supra vulnus, & mirum, teste Mizaldo, inueniet picidium.

Ron delectus in sua praxi de calculo renum non vult in Enemate addi ficus, quia inquit vesicæ nocent: quæ verò possit esse ratio nec addit ille, nec nouimus ipsi. Arenulis expellendis opportunas

Qui ficis abstinent, vocaliores

Abstinentia à ficibus. Proverbiū de ficu.

Siran, Sycon.

Experimentum ad Asthma.

Aliud ad Nephritidem & colicam.

Exanthemata Hemorrhoides.

Ad ictus animalium Generatorem

*Pediculi.*

teprā diximus ex Galeno. Ficuum frequentem v-  
sum pedunculos generare prater Galenum, &  
Paulus Aegineta, & Oribasius, & posteriorum  
quamplurimi, ipsēque adeo vulgus, persuasum  
habēt, causamque referunt, quod malum generent  
sanguinem. Quod si certum sit eas pediculos  
causare, (nondum enim hoc omnino nobis com-  
pertum) malum equidem causam referre ad id  
quod nimis impingunt, vti dictum, & quod vi  
sua Diaphoretica, quā & exanthemata protru-  
dunt, carne molis & cutis excrementa in cor-  
poris superficiem expellunt, sicque occasione  
præbeant generationi pediculorum.

*Superstio-  
sus Carda-  
nus.*

Hactenus abunde de feriis, nunc ex aliis enu-  
meranda naturæ aliquot miracula, si non potius  
figmenta. Referunt nonnulli apud Cardanum  
expertumque esse dicunt, folio Ficulneo conta-  
ctas verrucas aboleri, si folium ipsum sepeliatur.  
Sed quid sepultura hæc soliorum? forsitan etiam  
insepulta idem efficiunt. Ficus albas in somniis  
boni quid denotare, nigras verò inopportuno  
tempore, calumnias & detractiones Porta scri-  
bit. Hem somniorum prudentem! Ait idem Phi-  
lus quia habent frondes nervis conspicuas, idē  
earum cinis nervorum vitii & convulsionibus  
illinitur ex oleo. O diuinatorem egregium! Co-  
chlearia ex ficulno ligno facta, hoc habent pecu-  
liare, inquit Keckerman. ex Mizaldo] quod car-  
nes ad celerem concoctionem adigant, si elixatio-  
ni earum sapidus admoveatur. Cur tantus Philo-  
sophus vocabulum *Quia* non adiunxit?

*Philemon  
ceffus  
asinum fi-  
cium re-  
ficientem  
mortuus.*

Lepidum, quamvis sinistri euentus est, quod  
Cicero alicubi de Philemone poeta refert: is  
conspicatus ficibus velementem asinum, quæ in  
prandium paratæ erant, tanta vehementia cepit  
ridere, vt statim emoreretur.

*Talaks de  
Coruo A-  
pollinis.*

Non infusidē nunc fabulam Corui Apollinis  
& alias quasdam Coronidis loco subiiciemus.  
Tradunt, aut potius fabulantur Poetæ, sacrifi-  
cante Apolline, coruum, qui in eius tutelā esse  
dicitur, ad fontis puram aquam aportandam mis-  
sum. Vidit hic ficorum plures arbores, & in his  
fructus nondum maturos: ac in earum aliqua  
confedit, expectaturus nimirum, dum eius fru-  
ctus maturefcerent: quod ubi euenit, plures à  
Coruo ad sacritatem vsque comestæ sunt. Cuius  
moram, tam esus quàm maturitatis, utpote non  
parvam, pertæsus Apollo, quum etiam re alia  
ad sacrificandum vti necessarium fuisset, Coruum  
hæc pœna atque ignominia ultus, vt quoad Fici  
maturefcerent, bibere posset nequaquam. Per  
illud enim tempus guttur pertusum habet, vt  
propterea aquam minimè haurire possit. Aliter  
alii: vt Ouid. in secundo Fastorum. Dum Iupiter  
festum solempne appareret, coruum, vt aquam  
ferret, misit: qui, vt iam dictum, dum Ficus ma-  
turandas expectasset, quas prius rostro immatu-  
ras deprehendisset, diu immoratus, & Ioui mo-  
ræ causam mentitus, [Nam illi aquarum obsessio-  
nem hydram affirmat] Ob quod mendacium in  
tydus cœleste commutatus, si credere fas est.

*Form ca m  
juu m o-  
mne mu-  
rata.*

Eadem aut simili incude & hæc fabricata fabu-  
la. Ficus arbor fuit in qua Æacus Iouis & Ægi-  
na filius formicas vidit, quas in fociorum ob pe-  
sistentiam amissorum, solatium, in homines con-  
uerti desiderauit. Quod it. tim euenit: qui deinde  
Myrmidones dicti. Iuxta Eleusinem Atticæ cini-  
tatem, & propè Cephisum fluvium fons est, quem  
Caprificum appellant, quo Plutonem, raptā  
Proterpina, ad inferos descendisse fama est. Pau-  
sanias in Atticis. Nondum innotuit nobis ex quo  
fonte habeat hoc Curtius, quod tam categoricè

nullaque habitatione scribat Adamum & Eua  
post in Deum præparationem factam, cum se  
nudos cognouissent, sicut ac huius quidem fici de  
qua ibi tractat] folia consuisse, & sibi ipsi penzo-  
mata confecisse.

## ARBOR PEREGRINA, FRUCTVM FICVI SIMILEM GERENS.

CAP. LXVI.



**C**ivis arbor. Descri-  
tis sit hic  
ramulus & Clu-  
sium & Paluda-  
num, qui ramu-  
lum describen-  
dum Clusio de-  
dit, latet. Erat  
autem cum suo  
fructu in vuz  
modum quasi  
congesto, resce-  
catus, durus,  
crasso cortice  
tectus, gracilis,  
& digitalis lon-  
gitudinis, colo-  
ris ex fusco ci-  
neracei, octo  
fructus exiguos  
Ficuum instar,  
crasso bre-

uique pediculo subnixos summo fastigio susti-  
nens, fuliginosi coloris, cineraceis maculis con-  
spersos, duos, & satis solidos: vt quandam affi-  
nitatem habere viderentur cum Sycomori circa  
Tripolim Syriæ nascentis fructu, descripto à  
Rauvolfio, nisi ipse Paludanus, qui Sycomoros  
in Ægypto & Syria viderat, Clusium ab ea sen-  
tentia submoueret. Ceterum, similem fructum à  
Iac. Gareto missum Londino, Francofurti ad Ma-  
num accipiebat Exoticorum author, non tamen  
tam copiosè ramo inhaerentem, sed singularem  
duntaxat, vel interdum geminum, suis pediculis  
simul connexum.

Quum porrò hic fructus ficui vulgari valde  
sit similis figurā, & nonnunquam etiam adeo pu-  
sillus, vt Ciceris magnitudinem non multum ex-  
cedat: an ad ficus Indicas circa Acesinem amnem  
nascentes referri non possit, cuius Theoph. Hist.  
plant. lib. 1. cap. 12. & lib. 4. cap. 5. mentionem facit?  
Verum is negat copiosum fructum ferre, & ex  
Fabriciana relatione, singulares inter folia, vulga-  
rium ficuum instar, nasci deberent. An verò fru-  
ctus arboris *Gagney*, quam describit Ferd. Ouid.  
cap. 13. lib. 8. 1. part. general. & nat. Historiæ.

## FICVI SIMILIS FRUCTVS..

CAP. LXVII.

**F**ructus exoticus, quem Clusio misit Iac. Pla-  
teau, non valde abhincilis erat fructui, qui im-  
maturæ ficui similis esse scribitur, cum forma,  
tum magnitudine, & colore: etenim durus erat  
& solidus, levis tamen: eius color ex fusco cine-  
raceus, albis maculis aspersus, nec alia ratione  
ab illo differre videtur Clusio, nisi quod hic gra-  
uiore pediculo esset præditus: an verò plures in  
vno



veneratulo hæferint, vt illi, ignoratidem, quia singularem accipiebat.

## PIMPINICHI ARBOR

LACTESCENS.

CAP. LXVIII.

IN omnibus continentis Indiæ oris, inquit Mo-  
hardes, lacteus quidam succus elicitur ex arbu-  
sculis Malorum similitudine: Indi Pimpinichi  
vocant: è cuius tamis rectis lacteus humor illicò  
emanat, aliquantulum densus & viscosus.

Huius succi tres aut quatuor guttæ sumptæ,  
validissimè per alium purgant bilem & aquas.  
Bibitur ex vino, aut deficcato pulvis deglutitur  
pauca quantitate propter nimiam vehementiam.  
Illud autem peculiare habet, quòd si quis illo  
sumpto iuculium, vinum, aut aliud quid iniciat,  
subitò eius operatio infringitur & cessat. Sed eo  
sumpto, à somno abstinendum. Calidus est &  
siccus hic liquor in tertio gradu: ideòque vali-  
dum nimis & perperitiosum medicamentum, quo  
etiam sicut & aliis eiusdem generis, vt desitum  
est, adueto Mechoacam, de quo suo loco.

## FICVS INDICA.

CAP. LXIX.



**F**icus Indica  
auctore Clu-  
sio in magnam  
altitudinē vni-  
co trunco eo-  
que admodum  
crasso assurge-  
re solet: ramos  
deinde in om-  
nia circumlate-  
ra expandit, qui  
tenues quas-  
dam fibras siue  
filamenta (qua-  
lia in Cuscuta  
vulgò nuncu-  
pata consueui-  
mus) coloris  
dum recentia  
sunt, ærei siue  
aurei demittit  
his vbi terram

attigerint firmantur, nonnàmque quasi sobolè ge-  
nerant: etenim magnam crassitudinem paulatim  
acquirunt, & veluti in nouos arborum caudices  
transcunt, qui nouos rursus summa sui parte in  
latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deor-  
sum missis se se propagant. Sic alii deinceps rami  
in infinitum, vt interdum vnica arbor suis pro-  
paginibus integrum ferè miliare Italicum in am-  
bitu occupet, sitque difficilè, quæ primaria sit ar-  
bor, siue omnium istarum prolium parens diui-  
dicare, præterquam ex trunci amplitudine, quæ  
nonnàmquam in matre tanta est, vt trium viro-  
rum vlnis vix apprehendi queat. Verùm non  
modò inferiores rami similes fibras spargunt, sed

Tom. I.

etiam in arbore summi: ideòque vnica arbor  
densissimam syluam efficit. Sub eas autem ar-  
bores aditum sibi paraturi incolæ fibras iam in  
truncos conuerfas, tenuiores scilicet, excindere  
solent, atque ea ratione veluti concamerationes,  
& vmbracula facere, arcendi caloris gratia: adeò  
enim densis ramulis reliqui maiores rami luxu-  
riant, vt Solis radij nulla ratione penetrare queat:  
immò concavi istarum fornicum multiplicisque  
sinus scindunt inæqualiter inde resultantem aëra,  
quæ causa est, vt Echo multis in locis ter atque  
etiam sepiùs humanas voces reddat. Vidit verò  
qui hæc retulit D. Fabricius Salernitanus, qui ali-  
quot annis in Indiis vixit: Interdum octingentos  
aut mille viros, quo in numero & ipse fuit, vnus  
huiusmodi arboris vmbrà regi: atque affirmabat  
terna etiam hominū millia sub tali arbore latere  
posse. Folia fertin nouellis ramis Mali cotonei fo-  
liis similia, supernè viridia, infernè candicantia,  
& lanugine, vt illa, pubescentia, quæ murum in  
modum ab Elephantis expetuntur, ideòque in eo-  
rum pabulum cedere solent. Fructus extremi pol-  
licis articuli magnitudine, ficibus exiguis similis,  
colore foris & intus sanguineo, granisque, vt  
vulgares Ficus, plenus, dulcis quidem & edulis,  
verùm saporis minis grati quàm illæ. Nascitur  
autem inter folia, quemadmodum vulgares Ficus;  
hoc est, in nouellis ramis, qua parte folia illis in-  
hærent.

Ioan. Hugo Linschot, qui ante paucos Annos  
Goā rediit, eius iconem exprimit, sed logè ab hac  
nostra diuertam: etenim non singulares radices  
è ramis dependentes, verùm innumeras, illasque  
adeò multifidas, vt vix arborem aut fruticem tam  
variè multipliciterque sectas radices habere pu-  
tem: hanc ob causam valde suspecta ea est.

Garciam huius arboris nullam mentionem fa-  
cere, satis mirari nequeo.

Indica regio inquit Theophrastus arborē Ficū  
appellatā gignit, quæ è ramis radices demittit sin-  
gulis annis. Demittit autem non ex nouellis, sed  
ex anniculis, atque etiā vetustioribus. Illæ se  
terre inferentes veluti septem circum arborem ef-  
ficiunt, vt fiat veluti tabernaculum quoddam,  
sub quo & homines degere solent. Radices autem  
enascantes manifestè à ramis discernuntur: sunt  
enim candidiores, hirtæ, [δυσκία.] & tortuosæ, bi-  
næque fronde foliatæ. [δυσκία.] Ipsa arbor co-  
main supernè lasciuam gerit, [ἔχει δὲ τὴν ἀπὸ τοῦ  
πολλῆς] totaque fornicato ambitu pulchrè orbi-  
culatur, & magnitudine vehemèter excellit, quip-  
pe vmbram bino stadio facere fertur: & crassitu-  
dine caudicis pleræque ultra quàm sexaginta gra-  
dium [ἑξατάων] pedis vestigiorum. Plin. passuum  
orbem colligere, magna verò ex parte quadra-  
ginta. Folium pelta non minus habet: [potius ad  
similitudinem quàm ad amplitudinem referenda  
hæc comparatio. Clus.] fructum admodum par-  
uum magnitudine Ciceris, Ficui similem: quam-  
obrem Græci Ficū eam arborem appellabant.  
Paucos verò admodum fructus fert: non tantum  
pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus re-  
bus. Cur autem adeò exiguum & paucum ferat  
fructum, idem Theophrast. causam reddit hanc,  
nempe quòd ad germinum efformationem to-  
tum penè absumat alimentum: nam cum folio  
amplissimo sit, etiam radicem ab eius foliis demis-  
sarum generatio, nutrimenti causā videtur acce-  
dere. Sed fortè è diuerso, vt quoniam in ea quo-  
que pabulum dispensatur, ideò fructus exiliores  
atque parcius proferat.

Nec à Strabone ommissa fuit hæc arbor, quam si

N

non nomine expresso at lemmate manifesto describit, tali India multas quidem admirabiles arbores fert, è quibus vna ramos ad terram pronos habet, frondes [alii folia vertunt] non minores clypeo.

Oncifitatus, qui curiosus ea persequitur, quæ sunt in Musicana terra, Indiæ australissima, refert arbores qualdam ingentes esse, quarum rami, cum ad duodenos cubitos creuerint, reliquum incrementum pronum faciunt, deflexi, quousque terram contingant. Deinde terram ingressi radices agunt veluti propagines: mox rursus in truncum exeunt, à quo postquam aucti fuerint, inde flectuntur, & aliam propaginem efficiunt, & deinde aliam, & sic deinceps, vt ab vna arbore vmbra culum fiat, tabernaculo multicolunio simile. Narrat præterea miras arborum quarundam magnitudines, quarum stipitem vix quinque homines complecti queant.

Aristobolus vbi Accesins Hyarotidi permiscetur, de arboribus dicit, quæ ramos deflexos habent, & de earum magnitudine, vt sub vna arbore quinquaginta equites meridari possint. Nearcus verò quadringentos ait.

Ficum Indicam mirata est & Alexandri victoria, eo orbe patefacto, digna quidem, quam non solum ipse Alexander, ingenii sui nobilitate & sagacitate, atque omnis eius ingens exercitus demiraretur, sed ceteri quoque quotquot mortales sunt, de qua Q. Curtius in Historiam ab Alexandro gestarum tradit [licet Fici nomenclaturæ non meminerit.] Alexandrum Poro rege, & Hydaspæ amne superato, ad interiora Indiæ processisse. Sylvas autem propè in immensum spatium fuisse diffusas, procerisque & in eximiam altitudinem editis arboribus: plerosque ramos instar ingenitum stipitem flexos in humum, rursus quæ se curuauerant erigi, adeo vt species esset non rami refurgentis, sed arboris ex sua radice generata.

Plinius verò hanc arborem ex Theophrasti placitis [qui Alexandri coætaneus fuit, eique adiutorum hominum narrationes haud dubiè magna diligentia excepit] descripsisse videtur, sed tam eleganter, vt, quod Scal. ait, sub ea æstiuare potius, quàm eius historiam legere videaris. Ficus, inquit, ibi [in India] exilia poma habet. Ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis: quorum imi adeo in terram curuantur, vt annuo spatio insistant, nouamque sibi propaginem faciant circa parentem in orbem, quodam opere topiario. Intra septem eam æstiuant pastores, opacam pariter & munitam vallo arboris, decora specie subter intuenti, proculve fornicato ambitu. Superiores eius rami in excelsum emicant, siluosa multitudine, vasto matris corpore, vt LXX. pleraque orbe colligant, vmbra verò bina stadia operiant. Foliorum latitudo peltæ effigiem Amazonicæ habet: quæ fuit, auctore Xenophonte, Hederæ folio consimilis, vt sub ea equitum turmæ condantur] ea causa fructum integens, crescere prohibet. Rariorque est, nec Fabæ [Ciceris Theophr.] magnitudinem excedens: sed per folia Solibus coctus, prædulci sapore, dignus miraculo arboris. Dixerat autem iam prius, arbores in India tantæ proceritatis gigni, vt sagittis superari nequeant. Hæc [addit] facit vbertas Soli, temperies cœli, aquarum abundantia [si libeat credere] vt sub vna ficu turmæ condantur equitum. Vt deinceps nemini amplius dispiciendum dubitandumque videatur, num arbor hæc Veteribus cognita fuerit, quorum iam tot descriptiones, & vix in pauculis dissentientes produximus.

Folia.

Pelta Amazonica.

Cursus.

Æstiuant.

Eiuldem meminit Athen. sed paucis duntaxat verbis ex Theophr. mutatis.

Ceterum propositarum descriptionum vnus eiusdemque arboris collatio, perspicuum reddit, qualis & quanta sit Ficus Indica. Vnum relictum nobis est & Theophr. dubium, qui arboris trunco LX. Chæta adscripsit, quæ gradus Gaza vertit, quæ vox & fellam, suggestum, pulpitem & subfellum denotat, vt annotat Scal. Sed & passus mensuram denotat apud Plutarch. in Demetr. Vulgata significatio gradus est, quem Boëtius gradum inter mensuras numerauit duobus pedibus & dimidia to definiens, quo videtur Chæta Euclidis interpretari. Georgius nullum scriptorem inuenit qui gradus vel Chætas mensuræ vltus sit, & ea loca quæ obici posse videt, aliter exponit, qui tamen Goropio minimè probatur hac parte. Si de Plinio Theophrastus intelligi possit, Chæta non gradus sed pedes essent vertendi.

Est & alia difficultas, nam Theophr. folia, & qui horum meminerunt amplissima dicunt, atque adeo pelta seu clypeo non minora esse. Clusius verò ex supra dicta Fabricii relatione, Mali Cidonix vel Cotonæ foliis similia dicit, peltæ verò similitudinis potius quàm amplitudinis gratiâ conferri.

Linschottanus qui ex postremis Ficum Indicam describere videtur nomine Arboris radicem, foliorum ne verbulo quidem meminit, videtur de descriptionis suæ membra quædam, aut qui eius obseruata Latio reddidit, ex Plinio sublegisse: sic enim habet. India arborem fert multiplici radice, mirabili aspectu. Crescit enim è terra vt cæteræ arbores, ac spargendo ramos radices iis adiicit, quibus denud sua sponte terræ infixis, ingentem serie numerosa subolem trahit, cù vramus vnus arbori recenti, facundo euentu, Labyrinthoque similis, vagis vique itineribus sufficiat. Ita triginta aliquando passus vna arbor implet, in summam crassitiem productus ramis, vt mater eademque genitrix omnium arbor vix agnoscat, ex omni parte copia radicum funium more primo aspectu dependente. Fructum vltibus humanis aptum non fert. Nam is qui Oliuarum formâ excreuit, volucres tantum delectat. Hac ille.

An verò vnicum Clusium vel eius recitatorem Fabricium tam spectat antiquitati, Theophr. inquam, Straboni & Plinio. opponere debeamus, sola vnus testis relatio id haud ita temerè persuadebit. Goropius verò tantum abest, vt credat, folia eius exigua esse, vt planè sit in ea opinione, Ficum Indicam eam esse arborem, cuius fructum vetium primi parentes comederunt, & sub qua se absconderunt, cuiusque ingentibus foliis (sic ille ait) perizomata sibi consuerunt, atque fecerunt. Vides (inquit) quàm omnia inter se consentiant? Nomen ipsum Ficus cum Mose consentit. Impia est illorum cogitatio, qui arborem hanc symbolicâs duntaxat intelligunt, in quorum numero præcipuus Philo Iudæus Cosmopæa. Lege quæ de ea re scripsit Corn. Agrippa, & opinionis nouitatem prauitatemque miraberis, fortè & ridebis.

Idem Gorop. in Vertumno. Primi nostri, inquit, parentes, cum serpentis fraude seducti vetium pomum comedisissent: nomen ei dederunt, quo eius abominatio indicaretur. Fyg enim dicitur per Apocopen Fyghy, (Cimbris) id est, tu abominande. Hinc Latini Ficum ferè, & Græci corruptè σῖκος nominarunt. Hi Goropii conceptus sunt & opiniones, quæ si vera esset Clusii de foliorum magnitudine sententia, per se ipsæ facile in nihilum abirent.

Dicta



ma. Didā itaque est hæc arbor *Σουρὶνδία* Græcis & Theophrast. cuius nomen vulgare sibi excidisse sēdō dicit Fabricius, quoniam verò ab eo visam & descriptam cum veterum Fico Indica perbellè consentire videret. Clusius, eò audaciùs illi Ficus Indicæ non nō indidit, prælestim cū illam ipsam esse certò sibi persuadeat, id quod & nos facimus.

Garcia naute illius nullam mentionem facit, inter tot exoticas arbores in locis Goanæ insulæ vicinis nascentes, quarum descriptiones in Aromaticum historia aspersit, non sine ratione profecto miratur Clusius. Et utique suam iconem ex Fabricii narratione, quàm concinnè ex ipsius etiam iudicio fieri potuit, adumbrari curasse in studio forū rei herbariæ gratiam. Extat & alia in diario nautico itineris Batavi in Ind. Orient. in tabella *Lanuarum*, quæ ad ipsam arborem facta, si autoribus credendum, ex qua & nostra desumpta. Annotata sunt hæc *Arbor admiranda*: Ficum Indicam vocant: *Arb. re de Ratia*: *Arbor radicum India*. *Wortboom*. B. 12. Germ. *Indiansch saigenbaum* / vii Gesn. & Taber. appellant.

Nascitur, vti dictum, in India, circa Acesnem amnem. Theoph. Plinius circa Acesnē amnē maxime nasci tradit, hæc loquendi ratione vique insinuans & alibi provenire. Nam Strabo & in Musicana terra India australissima crescere scribit, vti dictum. Clus. in insula Goa locūque vicinis, idque ex relatione Fabricii.

De virtutibus nihil aliud hæc nos tradidit, quàm filia earum Elephantis expegi: fructus non edulis esse, maturiores tamen aviis cibo esse.

Ceterum quamvis *M. ngle* Ouiedi non exiguā cognationem habere videatur cum Fico Indica quod multi eius tamen deorsum quoque vergere videantur, & postea radices figere, alioque rursus ramos suum vergentes producere: verum quia arbor siliquata est, magnas & speciosas proficiens siliquas, nostri memores ordinis instituti cum nobis de ei tradit perit. Calliam solutuan, in lib. 6. si quod a n, quamvis Hist. Lugd. eodemque capite huius & Ficus Indicæ historiam commixtat quæ admodum Clusius. recte andi Lopez Mangiu nos relegamus ad caput de Mangle quod est in lib. 30. nostri. hister.

## ENSENDA FICVS INDICAE MODO NASCENS.

CAP. LXX.

criptio. IN regno Congi mirabilis arbor crescit *Ensenda* dicta perpetuo vires, virtutibus mirandis inclita: ramos proceris incrementis extendit, ij filia quedam te. uia denuntiant, quæ tenæ contactu radices item generant, in aliarum arborum perpetuam seriem sobole minùs quàm multiplici. Priori huius arboris cortici lintheaminis quadam subest species quæ mundati plebæ in vestimentorum usus seruit. De hac eadem scribit Clus. Nec etiam ab similibus [Fici Indicæ] ea videtur arbor, cuius, ex relatione Odoardi Lopez Lusitani, Philippus Pigafetta c. 4. lib. 1. Descriptionis regni Congo, meminit his verbis. In Loanda insula, ad ostia fluminis Coanzæ, Regni Congo partem perluentis sita, nascitur arbor, *Exxanda* ab incolis nuncupata, celsa & semper vires &c.

Tom. I.

## PAPAIE PERUVIANIS.

CAP. LXXI.

ANnotat Benzo hist. suæ lib. 3. cap. 13. Apud Peruvensium Mantam, peculiare quoddam fructuum genus (indigenæ *Papae* vocant) sicuum specie modicorum, magnorumque, quale nusquā in India, præterquam in eo regno vidi. Arbor, quæ illud Pomorum gignit, procera & gracilis, fructus sapore dulci est.

Descriptio

## FICO SIMILIS ARBOR VENENATA.

CAP. LXXII.

ARtemidoro, vt prodidit Strabo, fides est adhibenda, Arborem in Gallia Transalpina nasci. Fico simillimam, fructum autem Corno similem gignere, vnde pharetre fabricantur. Eam si incidas, lathalem succum effundere, ad inungendas sagittas vtilem. Meminit sanè & Theophrastus arboris cuiusdam, cuius fructus sit similis cornis. *inquit* *ἡμεῖς δὲ λέγομεν ὅτι οὗτος οὐκ ἐστὶν ἀνθρώπινη*. Sed nomen non addit, & inter Indicas recenset. At quotusquisque ex tam paucis statuat aut colligat, quam is intelligat? Deista verò Corni fructu arbore, capite de Corno lidequēti. Hermol. & Ruell. qui eundem Strabonem de hac arbore tradentē citant, fructum eius scribunt capitulum Corinthiacæ Columnæ referre: cuius lacte mortifero sagittas suas illinant.

Descriptio

v. su

Cornis similis fructus.

## ARBORES INDICÆ THEOPHRAST. TRES.

CAP. XLV.

POSTquam Theophrast. arborem Indicam descripsisset, subdit aliarum trium Indiarum arborum descriptiones, his verbis: Est & alia arbor, & magnitudine insignis, & suavitatem fructus amplitudine æque mirum in modum præcellens. Eo videntur Sapientes Indorum. [*ἡ χερσὶν γεσσημένη* in *ἰσχυρὴ ἀσπίς* & *ἀσπίς* habent vulg. exemplaria: *Gaza* l. gisse videtur: *ἡ γὰρ ἀσπίς* & vertit: hoc Sapientes Indorum, qui nudi degunt cibo videntur. Non possunt vesci & abstinere, vt rectè Scal. annotat. Tantò plausibilior lectio *Gaze*. Videbis Herodotum in Thalia.]

Theophrast. v. 1. &amp; 2.

Pergit Theophrast. Alia item, cui folium figurâ pice longum, simile pennis Struthierum, (*οὐκ ἐστὶν ἀσπίς*) quæq. l. is imponenter, longitudine duorum cubitorum.

Alia rursus fructu longo, non recto, sed contorto aut flexuoso, (*οὐκ ἐστὶν ἀσπίς*) in cibo suavi. Hic in ventre morsum excitat atque Dyfenteriam: ideo Alexander, ne quis manderet, edicto cauit. Nomina verò his arboribus, nulla tribuit Theoph. Immo paulò post Indiarum arborum dicit.

Plinius tamen nomina habet primæ: nam postquam & ipse de Fico Indica tradidisset, ita subdit: Maior alia, pomo & suavitatem præcellenti, quo Sapientes Indorū viuunt. Folium alas auiū imitatur, (videtur Plinius primā & secundam Theoph. confundere.) longitudine trium cubitorum, latitudine duum. Fructum cortice emittit, admirabi-

Plin. v. 1.

N 2

*Tala arbor Ariana*  
indm.

lem succi dulcedine, vt vno quaternos satiet. Arbori nomen *Pala*, pomo *Ariana*. Plurima est in Sydracis, expeditionum Alexandri termino. Est & alia similis huic, dulcior pomo, sed interaneorum valetudini infesta. Edixerat Alexander, ne quis agminis sui id pomum attingeret. Vbi vides Plinium sapientem quidem, sed non Nudorum, quod Gaza fecit, meminisse.

*Tala*.

*Pala*, inquit Curtius, siue vt alii volunt, *Tala*, licet Theophrastus nominis non meminerit, Arbor Indica est, Fico Indica maior, pomi suauitate præcellentior. Indos *Pala* folijs velci Arrianus refert, in quorum fastigio quoddam pingue, Palmarum instar, gignant.

*Quercus*  
*dam errat*.

Dalech. arborem *Palam* Plinii ait esse, qui Tamarindos nostros purent. Qui verò ijs sint, qui istud putent, nondum occurrunt: neque sanè videmus quomodo conuenire possit. Dicit Plin. dulci pomo: Theophr. cibo dulci: [id est] quod neutquam videtur conuenire cum Tamarindis, qui ob summam aciditatem commodè edi nequeunt. Quidam Musam esse putant. Quiesus Platanos vocat. Theuetus arborem vocari ait *Paguer*: fructum *Pacoma*. Verumque nomen ad *Palam* quodammodo accedit. Alium huic similem & vsus frequentissimi Theuetus scribit vocari *Hoyriti*. Quiesus *Iaiama*. Sed de Hoyriti inter carduos de *Musa* qua propius ad prædictas arbores accedere videtur, nunc trademus.

*Tacoma*  
*racoma*.

## M V S A.

## CAP. LXXIV.

*De Musa*  
*fragaria*.

EX folii Musæ fragmento, quod adseruamus, E apparet esse amplissimum: nam & latitudo cubitum facile æquat, cuius medium costâ crassiusculâ striatâ fungosâ fulcitur, à qua vtrinque exporrigitur folii tenuis lauisque inoffensam æquor, fibris teneris transuersis contextum: colore rano altera facie, altera ferè fusco, quod fibrarum ductus secutus, facile diuidas.

*Descriptio*  
*Quiesus arboris*.

Musam Quiesus in hist. Indica sic describit. Inuenitur, inquit, hic fructus Platanis nomine. tamen neque arbor dici possit, neque vera sit Platanus: sed planta quædam huic Indicæ haudquaquam peculiaris, & aliunde translata sub Platanis nomine. Interdum autem hæc impropiè dicta Platanus in arboris celsitudine excreuit, & ad hominis crassitudinem intumescit: aliàs verò coxæ humanæ crassitie conspicitur, pro soli natura & vbertate augescens. Ab infimo ad summum folia fert amplissima, interdum duodecim palmos longa, ternos aut quaternos lata, plerumque minora. Hæc ventorum flatibus facile mulsiaria

*Musa arbor.*

*Arboris*  
*crassitudo*.



*Musa cum fructu.*



pro plantæ ipsius & soli fertilitate. Cortex huic latis crassus, sed qui facile eximatur, continens pulpam siue carnem bubulæ medullæ persimilem. Caudex qui vnam profert, annuus est, & semel duntaxat in vita fructus gignit: verum ad radices conflunt quinque, sex, aut plures surculi, qui parentem renouant, & subsequente anno fructum perficiunt. Aded verò sæcunda est hæc planta, vt nunquam intercidat, sed subinde nouas proles gignat, vt fructus toto anno vberimè legereliccat.

Arbor, quæ poma fert Paradisi [inquit Cardan.] breuissima est vite: anno enim secundo truncus arefcit, fructus fert in botris, vt sunt acini vuar, sed mali magnitudine, ac in botro vno quandoque centenos, vnde cistæ magnitudinem refert botrus: croceo verò velatur amictu, quo detracto fructus prædulcis, ac suauis subest. Folium tam longum fert, vt hominem stantem æquet: latum non parum.

Theuetus in Cosmographia arborem Mauze in Ægypto vocatam describit non maiorem ficu mediocri, cuius folia quinque aut sex pedes longa sunt, duos lata: fructus in caule coaceruatus, non secus ac dactyli in Palma, crassus & longus, mediocri cucumeris instar, delicatissimus atque suauissimus, quem domi suspendunt, vt nos vuar pensiles, eoque sæpè soli tanquam optimo vtuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, aded vt nisi maxima truncum haberet coxæ hominis crassitudine parem, minima tibiæ in cæmiorum, non in arborum numero, recensenda foret. Truncus, auctore Garcia, ex squamoso foliorum corice constat: nullis constat ramis, sed è germine flores quosdam coniunctim profert, subrufo; oui effigie, & palmi longitudine: circumeminent pediculi, centum, interdum ducentos aut plures ficus sustinentes.

Describit & Acosta in hunc modum, Musam seu Ficum Indicam vocans: decem & octo aut viginti (inquit) palmorum magnitudine attollitur hæc pulchra & elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticum sibi mutuo incumbentium coniunctione constat, & humani cruris crassitiem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorum grato pabulo: folijs nouem palmorum longitudine, duorum cum sensu latitudine

*Cori*

*Surca*  
*folium*

*voma*  
*radix*  
*dani*

*Theuet*  
*Mauze*

*Flora*

*Musa*  
*Indica*

*Radix*



dine, neruo satis crasso per longitudinem excurrente, & transuersis fibris in latera sparsis, parte superiore saturis, inferiore dilutioribus. Ex huius arboris fastigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congestorum in modum Pinei strobili, coloris rufi: deinde vnicum ramum fert humani brachii crassitie in multos nodos diuisum, e quorum singulis decem aut quatuordecim dependentibus, ita vt nonnunquam ramus centenis aut ducentis ficibus onustus conspiciatur. Hos diuersas species distinguunt Lusitani. Illi enim primò *Cenorios* appellant qui admodum flauent, læues, longiuique, gratieque saporis sunt, & odoratiores: 2. *Chincapnoes*, verò, qui virescunt nonnihil, longiorisque sunt, iisque etiam grati saporis. 3. Laudantur præterea qui in Cosala nascuntur, *Æthiopibus* *Innigæ* dicti. Legitimam nomen apud Arabes & Persas (vt è præstante Medico Persa in Ormuz nato intellexisse testatur idem Costa) est *Mom*, non autem *Musa* aut *Amusa*: arboris verò *Daracht Mom*. Rhafis *Musam* vocat: Serap. *Mamm*, id est, *Musam*. Sic & *Auic.* apud quem in margine *Mauzi* vel *Muzi* annotauit Bellunenensis. Verum neuter horum describit. Sed nostro iudicio, recentiorumque consensu, hanc ipsam intelligunt, de qua hic agimus.

Ex prædictis si Clus. iudicio aliquid tribuimus, nemo accuratius hanc stirpem descripsit, quam Quedus sub Platani nomine. Acosta peculiarem habet iconem, quæ variat à Matthioli (quam & nos proponimus, cui nostrum solum egregiè respondet) & Linschottani iconem, & à Paquonere figura Theu. ti.

Hist. Lugdun. tres icones proponit: primam, eamque geminam, ex Matth. nomine *Musa* arboris & fructus: secundam, titulo *Musa Pacouera* Theu. ti: tertiam pro *Musa* seu Ficu Indica Aco. ste, qui ait Musæ fructus neminiisse Ruell. ex auctoritate Theoph. & Strabonis.

Nordum tamen pro certo asserere ausimus, an Veteres Græci Musæ meminerint: consideranda quæ Theoph. lib. 2. hist. plant. c. 9. tradit inter Palmas, his verbis: Est & aliud Palmæ genus in Cypro, quod & folium latius habet seu amplius, & fructum multò maiorem: peculiaris quoque formæ, magnitudine Mali Punici, figura oblongum, succo munitis grato [sic luxa] quàm in cæteris, sed radicibus similem [sic luxa] Dal. vult legendum *rais foais*, id est, Punico simili. Sed ferri potest antiqua lectio, si modò de hac arbore, de qua hic agimus, intelligendus sit Theophrast. Nam & antè dictum eius radicem rotundam esse & crassam. Itaque non deuotatur, sed communis expuitur. Consideret etiam lector quæ paulò antè scripsimus ex Theophrast. de *Arboribus Indicis*, & ex Plin. de *Pala*. Quæ verò ex modò citato Theophrast. loco verba agant scripsit Plinius, eacipite de *Palma* [quod & ipse fecit] retulimus.

Matthiol. in *Diocor.* Sunt, inquit, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto Cyproque nascentem, quam Veneti inde redeuntes *Musam* appellant, & *Musas* similiter fructus. Inclinat animus eam esse quæ Theophrasto in *Palmarum* genere recensetur folio cæteris ampliore & c: vtiam modò citatum. Idem tradit ex quorundam relatione solia arundinea esse, torrefecere a calore sui natura, vel etiam fortasse Solis ardore, aded vt mensè Septembri eorum costæ prorsus nudæ cernantur, decedente foliorum materia, quod admodum fit tenuis. Caudex [addit idem] squamoso foliorum cortice vestitur, Palmæ aut Arundinis ferè

Tom. I.

modo. Ramos habet nullos, sed caudice tantum constat. E vertice germen emergit materie molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine ad summum prodeunt germina ternum, quaternumve digitorum inuicem distantia: è quibus circumeminent fructus parui, cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flauescunt, cortice Fici, qui eodem modo digitis detrahitur. Substantia pulpæ consistit Melo pepo- num modo, nullo intus osse neque semine: sapore cum quadam insipiditate dulci. Primum gustibus fructus insipiditatem quandam præ se forte videntur, aded vt primo statim gustu non placeat: verum qui esui adulescent, ij indies magis delectantur: quippe qui quadam occultâ saporis suauitate allecti, quæ nisi tractu temporis cum palato init gratiam, nunquam saturi videantur.

Ita sibi Musam descripsisse tradit Matthiol. qui ex Aegypto & Cypro ad nos reuertuntur. Sed quænam antiquis Musâ fuerit planta quid referat non habere: sibi tamen videri eam esse Theoph. Plantam, quam paulò antè diximus, adductis eiusdem verbis.

Matthiolo more suo contradicens Guilandinus in suo Theone: Musam, inquit, recto à Theophrasto inter Cyprias Palmas loco describi, malè coniicit, quod fructus huius sapidus non sit, sed, radicibus similis, vt non deuotetur, sed succo tantum expresso, expuatur. Musæ verè, vel ipsomet [Matthiol.] teste, longè omnium suauissimus est lapidissimisque.

Idem Guiland. plantæ huius tribus tantum in locis vniuersis Bibliis, sub nomine *Budaim*, inentionem haberi animaduertit: & ab Aeschilo, antiquissimo Tragico, *Phryximi* dici: à cæteris ferè Græcis iuxta atque Latinis *Margaritam*: à Mauritanis *Muz* & *Gemez*. Qui Cyprum incolunt, *uirta*, *la ti mardelion* vocant, argumento à vulgari Asiaticorum opinione ducto, qui Musam esse contendunt eam plantam, quæ hominum omnium protoplasto, diuino olim mandato in cibis interdicta fuit: quod imitati nostrorum temporum scriptores, Pomum Paradisi nominant. Rhafis Ficem Pharaonis dici memorat, vt idem Guil. censet. Indi, qui in orientem protenduntur, *Melapolandam* nuncupant: qui in occasum, *Platanum*. Denique in quilibet insula D. Thomæ, *Abellanam*.

Camer. annotat, Aegypti, apud quos copiosè inuenitur, hodiè *Maus* vocari. Antonii Musæ coniectura est, Elatem Plinii esse fructum illum dulcissimum, quem vocant Musam, vel vt Mauritanii loquuntur Muzam, hoc est, mitem, qui habet Prunorum crassorem similitudinem.

Curtius annotat Syriæ accolis [apud quos gi- gnuntur] Poma Paradisiaca vocitari, satis admirandaque esse.

Non abs re fuerit & Bonzonem Indicarum rerum historiographum non contemnendum, de hac arbore sub Platani nomine tradita referre. Platani, ait, longiores quàm crassiores sunt: minores multum maioribus præstant. Arbor ipsa folia selquialmi latitudine, quatuor palmorum longitudine porrigit, inter quæ ramus enascitur, qui centum ac plures Platanos minores fundit: sin verò maiores, vigintiquinque aut paulò amplius. Tenera est hæc arbor, nec nisi semel fructum fert, qui annuo spatio perficitur, & ex ipsis radicibus alii stolones fruticant. Vbi maturuit fructus, leuissimus immaturum adhuc & acerbum non decerunt: sed exissam arborem loco calido reponunt: ibi Platani celeriter maturefcunt flauescuntque. Corio vè siuntur obtusa cultelli partis crassitudi-

N 3

ne: quod superest, pulpa est, sapore in dulcedinem vergens.

De eadem peculiana quidam Rauwolfius & ipse illarum regionum oculatus scriptor refert, his verbis: Intra Tripolim inter alias, arbores peregrinae, Musa dicta, crescunt, trunco v-nius & semis, aut duorum virorum altitudine, extrinsecus glabro, nisi quod multiplici foliorum incubitu, arundinum ferè in morem, inuestitus sit. Pulchrè virent. In caudicis cacumine latè expansa folia veluti pennaceum fertum aut cristam præmagnam referunt. Eius enim longitudinis sunt atque latitudinis, vt hominem in longum procumbentem in plenum comprehendant. Fructus Citrulli formam referunt, nisi quod paulò sint maiores, extrinsecus leues, cortice crasso testè, primò flauescente, mox paucis diebus post reposui nigricante, qui facillè, vt in recentibus Ficibus, detrahitur. Interior substantia candida, referta, absque granis aut semine dulcis & sapida: sed facillè & citò satietatem inducant, mórque & nauseam pariunt magnam, & vehementes cruciatus colicos: ob id ab Alexandro exercitui suo ab eorum esu interdictum. Hæc Rauwolf. Ex quibus patet eum hanc, quam hoc loco describit, eandem putare cum ea quam præcedenti capite arboris Indicæ nomine ex Theophrasto tertio loco posuimus, cuiusque verba adduximus: Nobis verò Musa de qua hic agimus, potius consuetudine videtur cum secunda cuius folium puelorum dicit, simile pennis Struthiorum, vt dictum. De Musæ enim fructu, nemo, præter Rauwolfium, aut vllam præteritarum notarum patere, vt ab eius esu sit vel fuerit interdicendum.

Fructus  
Musa descriptus.

Nota

Rauwolf.

Dodon.  
Musa.

Lab. & Tex.  
Arbor. A.  
damo pro-  
hibita.  
Folia Can-  
nae

Pala. Pa-  
gonæ.

Musa Sul-  
go. Musa  
vulgaris.

Discrimen  
inter Musa  
latissimam  
Aculei.

Musa A-  
rabum  
Clusij.

Pala.

Figura  
Banana.

cedenti capite arboris Indicæ nomine ex Theophrasto tertio loco posuimus, cuiusque verba adduximus: Nobis verò Musa de qua hic agimus, potius consuetudine videtur cum secunda cuius folium puelorum dicit, simile pennis Struthiorum, vt dictum. De Musæ enim fructu, nemo, præter Rauwolfium, aut vllam præteritarum notarum patere, vt ab eius esu sit vel fuerit interdicendum.

Dodon. scribit Musum nunc in Syria Musa vocari, additque Græcis & incolis Christianis ac Indis arborem censeri, de qua à Deo sibi prohibita comedit Adam.

Lob. & Pena in Aduers. testantur folia Musæ portentoſæ magnitudinis se habuisse: eūq; effigiem, suūctum, florēque affabrè d-lineare esse apud Math. I. Item in O. sern. quidam foliū esse Cannæ Indicæ not. bus, quibus Ginnam Elemi inuoluitur sesquipedalibus, duos pedes longis, infernè compressis. Jam supra annotatum: Palam quosdam Musum exiit, quam Theophrastus Pagonere vocari dixit: fructum Pagonæ: Onied. Plantanus: quæ omnia nomina ad Palam vtcunque accedunt.

Musa vulgò dicta, vt scribit Cæsalp. inter Palmas videtur recenseri posse: oritur in Aegypto & Cypro, cuius folia in Italia videntur sacchari panes conueltentia: distinguuntur ab Algæ latifolia, qua similiter saccharum condunt in Occidente, quod Algæ folia nulla media costa donentur. Musæ autem folia costam perpetuam & crassam habent, per medium folium discurrentem, aliquando aculeis quibusdam à tergo armatam.

Clusius aliquot annis in ea se fuisse opinione tradit, vt existimaret Musam Arabum eam esse plantam cuius Plinius meminit his verbis: Maior alia pomo, & suauitate præcellenti, quo Sapientes Indorum viuunt &c. Nam ferè omnia pulcherrimè ad Musæ descriptionem quadrant. Huc accedit, quod in Prouincia Malauar, quæ supra Indum flumen est, intra Gangem, Palam nomen adhuc retinet, à quo Latini suum Pala mutuū videntur. Vlyssibone, vbi aliquot plantas vidi [addit idem] minimè tamen fructiferas, nomen hoc retinet, vocant enim etiamnum Figuera Banana, id est, sicuta Bananas ferentem.

Meminit huius fructus Lud. Rem. M. R. ac tria eius genera [Malapolanda, Cianchapalon, & Cadelapalon] constituit, de quibus paulò antè.

Meminit item F. Brocardus qui Terram sanctam descripsit, sub nomine pomorum Paradisi, quem per omnia seculis est Cardan. lib. de subtilit. & Theuet. lib. singularium Americæ.

Lerius verò in hist. sua fructum Pace, & arborem Pace dire nominat.

Quid si Palma genus illud sit, ait Clus. quod Theophr. in Cypro nasci prodidit. An verò eadem arbor, quam idem folium prælongum habere ait, simile pennis Struthiorum?

Ridiculum autem, inquit Garcias, est quod scripsit quidam Franciscanus. Appellatur, inquit, hic laudabilis fructus Musa, quod dignus sit Musis, aut quod earum sit cibus. Addit præterea eum esse fructum quem degustauerit Adam in Paradiso terrestri.

Alpino auctore, Mauz seu Muza dicta Aegyptiis. Vocatur nunc Ficus Martabanis. In Malauar Chincapalones: Meliores Cenorins. Aethiopicus Iminga: sed hæc differentie eius sunt, quas mox in viribus specialius designabimus.

Esi ex prædictis satis pateat de locis, vbi nascuntur, tamē & hæc specialius addenda, propter nomina. Nascentur in Canara, Decan, Guzarate, & Bengala: vocaturque illis Quelli. Nascentur etiam in Malauar. vbi Palma: & in Malayo, vbi Pican dicitur. Provenit etiam plerisque aliis locis, & in ea Africa parte quæ in Guineam appellatur, vbi Bananas nuncupatur, teste Garcias. Pauci cresunt Tripoli, sed ex vicinis locis satis copiosè inuehuntur, vt scribit Rauwolfius. Itaque ex Orientali in Occiduas Indicas insulas, adeoque in Portugalliam translata Musa iamdiu multis innotuit. Eandem vidimus Patani in Arabibus Pruli, sed emortuam ob præcedentis hyemis frigiditatem.

Hæc planta non nisi semel feritur. Nam semel sata, extrunco pede multos stolonos emittit, qui sauo in arbusculas euadunt. His itaque stolonibus propagatur. In America semel aut summum bis fructus fert. In Aethiopia & Arabia vicinisque insulis etiam cetera est. Ex Garcias & Theuet.

Integrè vuā ante maturitatem colligendam Collet præcipit Oniedus, cum videlicet aliquis fructus flauescere incipit, deinde in aribus suspendendam, illic enim plenam maturitatem consequuntur. Formicæ huic plantæ admodum infestæ sunt, idēque plerumque inuicem perierunt, antequam aduersus eas inuenta essent remedia.

Musa, vt scribit Rhales, calida est, stomacho noxia, fastidium & nauseam inducens, & promptè in bilem fluxum conuertitur: sed alium seducit, & guttibus asperationes lenit. At Serapio ex aliorum authoritate Musam in medio pami calefacientiam, & in fine humectantium ordinis ponit, parum nutrire, & vtilem esse aduersus pectoris, pulmonis & vesicæ ardores: lenire alium, sed granitatem stomacho parere iis, qui eius fructu multum vtantur, hepaticque obstructions parere. Idè si complexio sit frigida, eius qui fructu, superbiendum melleicatum, aut oximel, aut Zingiber conditum. Augere tamen sœctum in vtero, renibus conferre, vrinæ ciere, & ad Venetæ incitare. At ex Auic. sententia, paucum præbet alimentum, bilem generat & pituitam: prodest tamen aduersus pectoris & pulmonum incendia, stomachum verò offendit. Idèque biliosis ab eius esu, oxymel cum feminibus propian.



nandum: picatosis mel. Idem & renibus opitulati tradit vinnasque prouocare.

Garcia teste commendantur ii fructus, qui in Martaban proueniunt: primum enim è Bengala edelati sunt, deinde latii vt grandiores euaderent. Sed quos *Cenoris* appellant, laues, flauis, & pleni, odorati, & palato gratiores. *Chinapalane* Maluanus dicti sunt quoque sunt & palato grati, pleni, colore virescentes. Laudantur etiam in Sophala nati, quos *Æthiopibus* *Iminga* vocari diximus. Inuenitur etiam in Bagaim aliisque prouinciis, genus quoddam amplum, plenum, palmi longitudine. Id assatum & vino deinde maceratum inperfo Cinnamomo, multò melius sapit, quàm malum Cidonium assatum. Idem fructus per medium sectus, & in sartagine cum saccharo probè fuscus, inperfo cinnamomo, gratissimus est cibus. Idem in duas partes per longitudinem apertus, & vtriusque incisus, deinde insolatus, gratissimi est saporis, & caricas succi bonitate superat. Tegula item impositus & in clibano coctus, cor reficit, & suauissimus est. Sunt qui cum carnibus elixent, cortice exempto ollæ imponentes cum carnes ferè coctæ sunt, diuinam enim coctionem non fert: neque maturus nimium, neque omninò acerbus diligendus est. Sunt qui crudum edunt, at maturum, sine pane aliòve aliquo condimento, gratissimi enim est saporis, nec minis salubris & facilis concoctionis, vt testatur Ouidius. Plantam ipsam collecti fructu, spontè exco in sinu, tanquam in posterum inutilem: aut amputant, in domesticorum Elephantorum pabulum. Nonnulli interea tenerioraque, interquam explicentur folia, floribus, thyrsum Piperis Zingiber recentis, alio, sale, & aceto coniungunt, & Capparium modo edunt. Folia verò quoniam amplissima, mollia, frigidaque sunt, subternere ad accumbendum in aestu solent: & ambubis non nunquam imponunt, autore Celsa.

Alpinus refert huius fructus substantiam mollem esse, pinguem, lentam, dulcem, atque appropinquare, tam condece assuetis, sed stomachum grauari, difficulter concoqui, multum nutrire, succum generare crassum ac lectum, quo viscera obstruuntur, præsertim hepatis. Opitulari tamen sufflentibus, & salpionis ex calore factis: eius decocto vtiliter vti in colas ad tussim ex calidum humorum, desillatione generum, atque ad pleuræ & pulmonum inflammationem, ad inflammatos renes, & ad vrinæ difficultatem. Atque etiam idem fructum commenducatum, vel decoctum assumptum Venereum incendere. Fructuum cortices exsiccatos multam vim habere ad roboranda omnia viscera iidem affirmant, eodem Alpino referente, cordque opem ferre ex ipsis paratum decoctum in aqua *Calaf*. Vfusque huius decocti ad febres pestilentes apud eosdem dicitur valde vtilis. Puluerem quoque ipsorum corticum in cordis passionibus cum aqua *Calaf* dissolutam hauriunt.

## ARBOR POMIFERA.

AN MVSA.

CAP. LXXV.

IN Aegypto abundant, inquit Gabriel Girauder in Iun. Hierosolym. boni fructus. Sunt ibi arbores pomiferae, magnæ altitudinis, foliis cubitum longis, & pedem latis, ferunt poma longæ, similia cucumeribus. Pomum secatur per me-

dium, vel quocunque modo, reperitur in medio sectionis figura nucis, eius sunt optima: alibi non possunt ferre bonum fructum, intra verò 7. dies putrescunt. Sunt & alia pomifera arbores quæ ab vna parte morfuram habent vocantur; Poma Adami, parua sunt & similia nothraubus & eius commoda.

## FICVS INDICA LINSCHOTTANI.

CAP. LXXVI.



Facile concessimus hanc Ficum Indicam Linschottano dictam, vel ad Musam antè dictam quoque referendam, vel certè eius aliquam speciem esse aut varietatem: quia tamen icon hæc, vti videre est, euariatur, & ipse quoque Linschottanus peculiaribus quædam de hac tradit, placet ex eius obseruationibus historiam paucis contexere.

Ad figuram itaque ære exsculptam hæc tradit. Descriptio Ficus Indicæ præstantissima ad hominis magnitudinè crescit, foliis longis ad stuporem, & in varios vsus commodissimis. Fructus vuarum specie in magnitudinem Cucumeris multiplices caulibus adherent. Racemum duntaxat vnum quæque arbor fert, & detrunctur tum arbor, quæ continuo breui spatio excreuit, & novos fert fructus: communis Indorum cibus, & sunt præstantissimi ex Cononor. Racemus aliquando duorum virorum vices implet, vt & S. scriptura testatur. *Indica nishche Dyghe*: Ficus Indicæ.

Idem in historis nauig. specialis de ea scribit, in hunc modum Ficus Indicæ multiplex est, modò crassiore, modò tenuiore forma, diuersis præstantiæ notis. Verùm eadem omnibus imago ac color idem, arboreque ipsa eodem modo viti statutam æquat. Folia habet vlnæ magnitudine tres dodrantes lata, iis Turcæ vtuntur chartæ bibulæ vice ad cucullos. Lignum arbor non habet, sed similitudine arundinis truncum. Quod senescente arbore exteriorem corticis partem tegit, in modum cribri ex pilo facti figuratur, aspectu tamen crassius aliquantùm: intorsum eadem folia cucullata ac clausa apparent, in medijs hominis altitudinem tum explicant sese ac per vices excreunt: ita vt vetera à recentioribus successione quadam expellantur, donec arbor iusto incremento steterit, fructumque maturum protulerit. Folia in medio crassiore quo diuiduntur, nervum habent. Inter folia ex arbore surgentia flos nascitur, magnitudine oui Struthionis, colore purpureo, ex eo longiore incremento ramus prodiit, non ligni quidem materiæ, sed caulis brassicæ, Ficus coaceruatos abundè proferens. Primò quidem Fabarum formam habent, cùm adhuc voluulis includuntur, magnitudine medijs palmi, pol-

licetque tres aut quatuor latz, Cucumeris crassitiei nar ciscuntur. Ramus hic ferè semper C. ficus habet, plus minusve, quæ vt vix in nodum coguntur. Racemi inde quidam ita magni, vt duorum virorum baculo baulantium onus ampleant. Nondum planè mutui scinduntur, cum inter viriditatem & haedinem etiamnum hæret, cum alibi à trabe suspensi, intra 4. aut 5. dies commodè maturefcunt. Arbor siue planta vnicum duntaxat racemum fert, quæ mox tota detruncatur, & ac mensis spatio iustis denud incrementis adolefcit, & fructum toto anno ita perpetuum fert, tantq; abundantia, vt communiter Indis in cibi vsus seruiat, gustu sanè bono. Decorticantur autem, folliculis instar Fabarum existentibus, licet aliqui tenuiori sint tegmine: interius albescent, ac morlu farinam & butyrum dulci mixtionē representant, ideo panis ac lacticiui loco seruiunt, simplici victu, quo corpus hominis absq; alio cibo facilè posset sustentari, vt in India multi sunt, quibus toto vitæ tempore particularis cibi ex ficu est.

Plurimas ac communiore Lusitani *Figos d'orta* vocant, quasi hortenles diceret, suntque aliquantulum crassiores. Aliæ quas *Seroninas* dicunt minores ac extrinsecus læuiores, velut optimæ notæ, suauī odore pollent, ac gustu percommendo. *Cadolina* ficus etiam in pretio sunt.

Ceterum maxima laus *Chimapolina* est, regionis Malabar. Flauescunt illæ parùm, viriditate exteriore maximâ, largæ ac proceræ, odore suauī, ac aquæ rosacæ æmulo. Sunt & alia genera. Quæ in Canonor reperiuntur palmi longitudine, & ac crassitudine pro rata, ob magnam ibi copiam siccantur, ac demptis folliculis per Indiam, mercaturæ quidam gerere h' trahuntur. Quando maturefcunt, assantur plurimùm, quodd' crude ob acrimoniam, quam in deglutiendo adferunt, non perinde gratæ sint. Colore introsum rubescunt. Ceterum assatæ decorticantur, ac in orbes scinduntur, adiecto vino cassiæque contusâ, præstantia cibi suauissimâ, etiam supra Cidonii mali assatâ excellentiam. Vt ceteræ oblongâ scissione finduntur, saccharoque iniecto tostæ, condimento probò, ab Indis summopere expectantur. Ex ficibus quippe præcipua plebi sustentatio.

Ex omnibus Indiæ ac Orientis locis inuehiuntur, vt & Mosambicæ, Ormuntii, ad oram Abex, Malabar, Malacca, Bengalæ, &c. Gufaratæ, Decanini, Canarini, Bengalenles eas *Quelli* nominant, Malabares *Palan*: Malacitani *Pyfan*. Etiam in Arabiâ reperiuntur, quas *Musa* vocant: Hierosolymis, Damasci, Cayri item habentur, vt ab iis accepisse se testatur L'inchottanus, qui istis in locis negotiantur: persusum inde quibusdam, primum patrem Adamum ex hoc genere fructum cum peccato gustasse.

Verùm cum in Testamenti Veteris historia legimus, exploratores Terræ sanctæ racemum vuarum retulisse, cui gestando vix duo homines sufficerent, mihi, inquit idem, huius fructus recordatio sæpè incidit: num talis ille racemus extitisset, qui eodem more ab Indis ad domum Archiepiscopi Domini mei translatus, haud falsa illius historię imagine apparebat. *Hædennu L'inchottanus*.

Annotat Paludanus Ficus Indicas apud Arabes, non *Musam* aut *Amusam*, sed *Mori* vocari, arborem verò *Darab* illam. A Brasiliensis *Pacona* & arborem *Pagouer*: in Guinea *Banani*, in Malabar *Palan*, in Malacca *Quelli*, in Canara, *Decan*, Gufaratæ & Bengala *Quelli*: quæ nomina plera-

que & *Musa* tribui præcedenti capite dicunt. Quin & idem Paludanus addit à Brocardo in Terræ sanctæ descriptione, Paradisi Malum ab Ouidio *Platanum* vocari, atque vires supra *Musa* dicatas ex Arabibus etiam huic tribuit, quasi eadem hæc cum illa sit, aut certè aliqua eius species supra dicta.

*Paradisi* autem *Mal* idèd vocata putat, quod amœno & suauī sint gustu, odore item ac colore probentur, gustum quippe acidum dulcedinem habere adiunctam: odorem velut rosarum nares afficere: colorem flauum, pulchrè item viridem oculos pascere. Accedere ad prædictas rationes figuras Crucis, quæ obliqua fructus scissione apparent, de quibus Syriæ Christiani varia referunt, eadem peregrinis ostendentes.

# PACOVERA AMERICANA, MV-SÆ, VT VIDETVR, SPECIES.



Arborem hanc, authore Theueto, syluestres Americani *Pagouer* suo idiomate vocant, quæ nec in Europa, nec in Asia vel Africa proueniat, quæq; fortè non temerè præ aliis omnibus mirabilissimâ dicas. Caudicem emittit homine non altiore, crassitudine ea, quam ambæ hominis adulti manus ex æquo capiunt & am-

plectantur, substantia adeò tenera, vt cultri acies facillimè penetret. Folia latitudine bipedanea, homine seculquodrantè longiora aut amplius. Eiusdem speciei vidisse se, aut idem in Aegypto & Damasco, Hierosolymâ redeuntem, sed folia ad ista vix mediæ esse longitudinis. Magna quoque differentia est in fructu: nam huius arboris, de qua hic loquimur, fructus maximus pedalis est, crassitudine cucumeris, ad quem etiam figurâ factis bene accedit. Hunc fructum incolæ suo idiomate *Pacona* vocant, qui probè maturus præcipuè est suauitatis facinque digestioris. Colligunt ante perfectam maturitatem, & in suis calis recondunt, vti nos fructus nostrates. Crescit in arbore in glomerem seu racemum congestus, triginta aut quadraginta simul proximè sibi iniuncti ex turculis è stipite emerfis, vt in figura apposita videre est. Et quod in hac arbore mirabilis, semel tantum fructum fert, qui magnæ parti incolarum cedit in nutrimentum. Hæc Theuetus.

Lerius *Paco-aire* tradit esse foliis *Lapathia* aquatici, longitudine sepdedali, latitudine bipedali aut latiori, nec putat tantæ magnitudinis folia vspiam extare in Europa, Asia vel Africa: tenuia esse, ventuque agitata ita discindi in partes vt primo obtutu quis Struthiorum pennas existimet. Matthiol. addit idem, meminit *Musa*, quæ bene



benè picta est, & aliquatenus similis *Paco-are* Brasilianorum.

*Infra Pa-*  
*ners.*  
Hist. Lugd. Musam Pacoueram Theueti vocat. Patet verò tam ex Theueti quam Letii verbis nò eandem hanc esse cum Mula ex Matthioli. depicta. Quin & ipsa quoque icon non parum differt tam à Mula quam à Linchottani Ficu Indica proximè precedentibus capitibus propositis. Peritis tamè diiudicandum relinquimus, an diuersarum plantarum sint icones, vel vnius plantæ figuræ diuerse.



fuit, quemadmodum ex Coccyo arbore.

## MALVS AVREA, FOLIIS

PRÆGRANDIBVS.

CAP. LXXVII.

*criptio*  
Foliorum amplitudo, & quod Dodon. qui solus (quod quidem sciamus) exoticæ huius arboris historiam tradit, *Palam* Plinii [de qua paulò antè] huius quoque historiam hic pom. postulabant. Ergo *Mali aureæ* Dod. dicte, velle scribit, ad *Mali Punici* formam accedit, Pomum & ipsum cognomento aureum: sed magna & propterea hæc arbor est, longis ramis valdè patula: folia etiam prægrandia, tres subinde cubitos longa & diuisa, in quibus crassiores venæ secundum longitudinem productæ, veluti in *Cinara* foliis. ructus permagnus est, ad instar humani capiti, forma & colore *Malo Punico* similis: habet verò & intus recondita complurima lucci plena grana, sed oblongiora & maiora, quam *Punici mali*, & colore non rubentia, sed auri luteo splendens, sapore subacidulo, ori grata. A quo huius descriptionem habuimus (inquit idem) sibi hanc *Panotmi* in *Siciliâ* visum esse in horto excellentissim. cuiusdam Medici: haud dubium autem, quin peregrina sit, & ex India vel aliunde illuc olim aduecta. Nomen autem hic vel ab *iris* vel fructus huius nullum sibi aliud cognitum affirmabat, quam *Mali turei*: atque hoc nomine fructum appellari. Potest autem hoc nomen accepisse, quòd grana auri luteum colorem referant. Plinius hu. us, vt idem Dod. putat, meminit lib. 12. cap. 6. vbi arborem hanc *Palam*: fructum vero *Arienam* dici refert. Plinii verba inueniet lector paulò ante capite de arboribus Indici Theophrasti. Habet verò huius arboris descriptio à Dod. proposita quædam quæ cum Mula continentur, sed plura quæ discrepant, vt conferenti patebit. De facultatibus verò (addit. Dod.) nihil quoque aliud accepimus, quam quòd ipsa auri colore succulenta grana valdè acutè febricitantibus admodum essent & grata & vtilia: vt pote quæ calorem magnum contemperarent, ac siuum vehementer sedarent.

## PALMITES.

CAP. LXXVIII.

*criptio*  
Palmitis nomine arborem depictam, & tabulis æneis Iconum parte 4. sculptam exhibent Bry fratres in historia India Orientalis, de qua scribunt. Palmities arbor est trunco crasso, è quo folia longissima nullo pediculo hærent. Idem in itinere Holandico anni 1599. auit. In insula Don Galopes, vel D. Mauriti prope Madagascari inuenimus multas Palmities arbores, ex quibus vinum

## ARBORES ALTISSIMÆ PALMITIS SIMILIS.

CAP. LXXIX.

In insula parua S. Mariæ altissimæ arbores cre-  
scent absque ramis, arboribus similes, quas *Palmitas* vocant. Hæ fructum ferant, qui externâ facie fructui *Anathæ* quodammodo similis est, aureo nitore conspicuum. Intus grana parua latent qualia *Mali Granati*, quæ parte dulcissimi sunt saporis: reliquæ duri atque inuiles. Linchottanus.

## BENIOINO OBVOLVTVM

FOLIVM MAXIMUM.

CAP. LXXX.



*Descriptio*  
B Benioino ali-  
quando folium Lugduni detaximus, quo obuoluta erat maxima gleba. Illud quidem arboris nescit an herbarum nihil certi habemus: apparet tamen ex eo fragmento, quod penes nos habemus, & hic depictum damus, maximum fuisse, adeoque & Musæ fortè folio maius. Est autem colore rufescente, costa

elata posteriorem folii partem secundum longitudinem percurrente, à qua nervi elati & ipsi, latius oppositi, aliquando inæquali ortu, omnes obliqui prodeunt, inter quos spatium intercedens, vnciam vnum latum est, interdum tres, subinde palmare: aque nervi obliqui vtrò citròque discurrunt venulæ transuersæ, semantia aut paulò

plus inter se distantes, aliquando brevioribus interuallis distita: quo nomine à Musæ quoque foliis distat, quæ à costâ quidem longitudinem percurrente, cû huius illis nervis carent, transuersisq; de quibus diximus, venulis destituuntur.

OPUNTIA VVLGO HERBARIORVM.

CAP. LXXXI.

Descriptio



Folia.

Succus.

Floris.

Fructus.

Prima folia.

Inter naturæ miracula hæc planta merito accensenda, quibusdam fides Indica appellata, ob quædam fructus similitudinem, ceteris plurimam non solum à Ficis, sed à cæteris quoque arboribus mirabili modo differat. Ipsa verò quoque in magnam euadit arborem, cuius folia magna longitudine interdum plusquam pedali, latitudine sesquipalmari, ex

oblongo rotundata, pollicem crassa, infima etiam crassiora, et totaque supremis, toris membrana tecta, plurimis tuberculis asperata, è quibus spinulæ alba acutæ facili contrectanti adherentes, infixoque aculeo stationem natiuam deferentes, [Matth. etiam sine spinulis visa testatur] succo intus turgentia colore herbaceo, tactu viscido, saluoso, qui exsiccat, granuloso arenæ tenuissimæ instar attritu digitorum dissoluitur: per quem discurrunt neruorum plurimorum medicriter crassorum reticulati plexus, atque hæc quidem folia ex aliis foliis iuncto connexu succescunt, quibus etiam plurimum pro caudice vtitur, & in brachia diducitur, ut in apposita figura aperit demonstratur. Folia hæc cum tempore incassantur magis, & fiunt rotundiora, immò ligneam tandem substantiam acquirunt, præsertim inferiora, tumque & spinas magna ex parte amittunt. Femoris crassitudine obferuatum fuisse Gesnerus monet. Foliolorum pinnis insident fructuum rudimenta multa, similiter spinosa, è quorum umbilico flores emicant Calathi Balauitii quadantenus effigie, succulentiore magnitudine, multi, lutei, multis foliis vngue laticibus, rosarum foliis similibus constantes, quibus matrescentibus fructus maturatur Ficem magnam adæquans, lupernè umbilicatus, pulpa sanguineo rubore manus tingente infecta, gustu subdulci, sed quàm ficum insuauiore, [serinum quiddam præ se ferenti Cæsalpin.] granulis farcta lentis ferè magnitudine, sed sinuatis & inæquali ambitu donatis, isidæque concoloribus in sinu, ut cur ficulis granis quidam contulerint, non videamus, sapore quodam peculiari, non tamen ingrato. Gesn. in fructu grauem quandam odorem esse annotat. Cùm primum exit hæc planta [nam creuit nobis Montbelgardii, ex semine Romæ in diligentissimi Pharmacopœi horto

lecto] foliola duo emittit crassa, succulenta [aliquod Sedi genus emergere dices] mucronata, è quorum sinu coniugali ceu pili quidam candicantes & purpurantes, futurarum spinularum primordia, simul exeruntur, quos non multò post folium sequitur isidem vestitum, & hirsutum totum, nec latum, sed teres ferè, quod tamen temporis progressu paulatim in latitudinem compimitur, fiuntque aculei cum tempore etiam firmiusculi. Radicula nouella plantulæ simplex & albicans est. Eandem cum primis foliis iconi nostræ adiungi curauimus.

Tradit Matth. parere hanc plantam in Indis regionibus, foliorum summitatibus fractus Ficibus nostratibus similes, sed crassiores, & qui anteriore parte in coronæ speciem desinant, colore ex viridi purpurascente. Interiorem pulpam perinde esse ac in nostratibus: verum adeo succosam sæcundamque, ut sanguineo succo Mororum modo manus inficiat. Exstillat & gummi hæc arbor, succino flauo colore & substantia, si duritiem eximas lapidosam, admodum simile, & glebulis concretum & Tragacanthi ferè in modum vermiculatum, adeo durum ut dentibus comminere vis sit. Car. dicit admodum flammam non concepit sed comburit, nec tamen ullam odoris spirat fragrantiam: masticatum quoque nullum saporem effatu dignum exhibet. Tab. 1. 1. Hæc arbor, inductio Pharmacopœo Basilienfi accepimus.

Et si verò facile in eorum eamus sententiam, qui negant plantam modò à nobis descriptam, veram esse Veterum Opuntiam, nihilominus tamen hic proponemus, quæ à Veteribus de Opuntia tradita, quia nondum planè constat nobis, si ad aliam, ad quam tamen plantam sint referenda.

De ea Theophr. sic tradit. Fico Indica [cuius rami in terram cinguntur, ei que se inferentes rursus radicanter, de qua supra] simile quiddam est, vel potius quodammodo mirabilis, si qua ex foliis radicem mittat, qualem aiunt circa Opuntiam esse herbulam, quæ & cibo grata sit, & suauis gustu. Malè verò habet Scaligerum, quod tamen claram tamque singularem herbam quæ & vsui & miraculo sit, non nominari Theophr. mittendumque potius fuisse curatorem quod à se non semel factum testatur.

Plinius eadem pauis repetit, sic: circa Opuntiam Opuntia est herba, etiam homini dulcis. Mirumque, è folio eius radicem fieri, ac sic eam nasci.

Ficus hæc est in Indica, inquit Cardanus, quoriam fructu & foliorum magnitudine Ficem refert: Eam Mexicani, apud quos frequens est, vocant Nuhiti, atque in Nopal: Indi autem insula Hispanæ arborem vocant & fructum Tunas: alii verò Pitahaya etiam huic generi adnumerant. Minus autem diligenter describit Tunam, non semel fallens nos, aut superficiali inspectione falsus ipse, nec eam exactè distinguit à Pitahaya, de qua inter Carduos.

Plinii Opuntiam plerisque Ficem Indicam nominari Matthioli testatur, & Indis suo idiomate Tune vocari, censetque eandem esse cum Opuntia Plinii & planta illa Theophrasti circa Opuntiam crescente. Hispani Higuera de la India vocant. Quidam, inquit Lacuna, Palam Plinii existimant, quod affirmare non auesim. Nobis sanè descriptio Palæ Plinii, Opuntia dicta, minime conuenire videtur. Benzo notat Pecuaniis aliisque Ame-

Matth.

Sanguis  
nisi in  
Gummi

Opuntia

Theophr.

Scaliger

Opuntia

Nudi  
Nopal  
Tunas  
Pitahaya

Alique  
Card.  
errore  
tegun  
Opuntia  
licus  
ca mu  
dem.  
Tune  
Opuntia  
Pala.



Americæ præuineæ incolis *Tuma* appellari. At Guiland. in epistol. ad Langium, Opuntia non Carduus est, ait, cui Tuna nomen, sed herba esui apta.

Erin Theone: magnus, inquit, error Matth. apparet in Opuntia, quod Theophrasti testimonio *πρόειον*, non autem arbor, utiple falsò adstruit, cui vulgus perperam Fici Indicæ nomen imposuit. Ea Theophrasto *δ' ἀγρία* est: Plinio alioqui Palæ, & Ariano hist. Alex. lib. 8. Talæ nominibus celebrata, ut alterutrum ferè locum mēdolum esse necesse sit.

Gesner. liberè dicit Ficum hanc Indicam aliquibus ridiculè Opuntiam nominari: ineptè verò ab alijs *Cardium indicum* propter spinularum in folijs cœu penicillos.

Idem fructum dodrantem ferè, verrucosum, ut Cucumis & Pomum mirabile, cui etiam ferè colore similis sit in maturitate ex Clusio annotat: qui coniicit hoc esse Euphorbium quod Io. Leo in descriptione Africæ describit, id quod Gesner. diligentius considerandum monet. Verùm Clusij opinio nobis non probatur: non enim est Euphorbium Leonis Africani, nec est Ficus Indica Veterum: hæc planta de qua agimus, licet Clusius Cardanus & alij Ficum Indicam & Carduum Indicum vocitent, quod nomen prius etiam Pena & Lob. ei tribuunt in observationibus: rectius in Aduersarijs Ficiferam Tuncem Indorum appellant, ad euitandam homonymiam huius nominis, *Ficue Indica*, quod alius arboribus tam à Veteribus quam à Neotericis tribui in superioribus patet.

Cæterum peculiaris est observatio Dodon. vel potius error de huius plantæ flore: sic ait. in extremis folijs primum flores erumpunt oblongi, deinde fructus subsequuntur: quorum fastigia foliosa quædam instar coronæ ambiunt, veluti ostendit icon quam Jac. Ant. Cortusio acceptam ferimus. Hæcille. Vides quid sit plantæ vel partis aliquam eius descriptionem ex iconè condere: melius Atinum effingeres ex eius vmbra, si icon licet. salutar Dod. qui iuxta iconem suam appingit florem separatim calyculo longo, qui videtur esse flos Mexicanus, seu Idmini Indici vocati, cui nihil forè simile cum flore huius plantæ. Si hunc ei misit Cortusius pro eius flore, sanè imposuit ipsi. Non sunt oblongi flores Ficiferæ huius arboris, sed tales quales suprà diximus: quales & ipse Dod. in sua iconè à Cortusio missa adpictos foliorum pinnis ostendit quamvis non florem, sed foliosa quædam instar Coronæ vocitet nesciens eum esse florem, & coniectura sua vmbrauli vti malens quam de re sibi ignota scripsisse videri.

Cæsalp. hanc à Ficu Indica Theophrasti non valdè abumilem dicit, & ab ea nequaquam genere differe: Nos planè contrarium dicimus: vter veriora tradat patebit vtriusque historiam diligenter consideranti.

Hist. Lugd. aiti: Opuntiam esse non sine ratione quis suspicetur. Camer. Opuntiam vulgò habitam diuersam à Theophrast. Opuntia, Anapallum dici à Bellonio. Legimus quidem apud Bellon. lib. 1. cap. 44. Arborem dictam, Anapala, semper vivere in Creta: an verò intelligat plantam à nobis descriptam, in tanta breuitate dubitare rationabilius quam asserere. Lob. & Pen. in Aduers. dicitur Muha seu Opuntia. Tabern. Ficum Indicam spinosam: Germ. *Strachlicht* Indianisch Feigen appellat. Schwenckfeld licentiosè simpliciter Anapallum Bellonii, & Indianisch Feigen vocat, ab incerto nomine Latino.

In Americæ insulis Peruvianis, Hispaniola, Nicaragua, Guatimalæ, & toto Nouæ Hispaniæ regno, ruri ac spontè abundè arborefcit, teste Benzoni. Peregrina in Europa est arbor, sed in Italia, Hispania Galliis atque etiam Germania iam ante multos annos in magnatum hortis & atrijs potissimum in pensilibus Adonis coli cœpta.

In Monachorum Galliæ Narbonensis Paradisis multis & suburbanis ad Monspelium, non modò elegantes cultæ, sed etiam neglectæ plantæ multos annos viruerunt, ut annotant Aduersaria. Et Camer. testatur Neapoli in Monasterio pone Castellum nouū vidisse altero tantò maiorem quam hominem, caudice duro ac lignoso. Tales & nos vidimus Romæ in Belvedere dicto Paradiso, Pontificis Vaticano, alibique passim Italiæ & Galliæ lautoribus hortis. Sed quid calidiora illa loca dicimus: Coluit iam dudum & etiamnum colit in instructissimo suo horto plures arbores Basileæ Cl. D. Platerus, quouis homine altiores, cui etià floruit vti vidimus. Coluimus & nos Montebgardia elegantes, tam ex femine quam ex folijs defixis natas. Basileæ gummi profudit planta supradicti pharmacopœi, quod antea descripsimus. Rariùs etiam fructum ferunt in Gallia, qui ad maturitatem perueniat. Maturum vidimus & legimus Romæ in horto Cornini peritissimi pharmacopœi, vbi florēt aliquot obseruauimus Maii fine: Monspelii, Iunio.

Apud nos in hypocausta & conclauia reponebat tempore hyemis, & à frigore magna cura præseruanda: loqui facillè putrescunt, & fignoris sunt impatientissima: attamen & loca nimis occlusa rectè.

Tam viuax est hæc planta, ut tum semiculo satiat, tum folio humi medio tenus defosso crescat facillimè. Vtroque enim nobis prouenit modo & alijs prouenisse scimus. Semine paucis interiectis diebus creuit: quamvis Camer. 16. demum à satū die alterum, alterum verò etiam tertio demum mense sibi produisse tradat, causatus fauile sine hyemis reliquias, alioqui maturus fortè proditura.

In Italia & calidioribus Galliæ locis feliciter crescit, & hyeme etiam in hortis sub dio relinquuntur: sed vndique stupis inuolutam induunt, & rigatione abstinent. In Gallia Cisalpina non fructificat, ut narrant, ne Patauii quidem aut Ferrariæ. Facillè tamen crediderimus vel ibi diligenti cultu ad frugem peruenire posse. Locis namque calidioribus, ut Romæ (ut diximus) alibique & in Græcia, fructum perficit, quem aiunt longum esse digitoz ferè octo, graui quodam odore. Superiobus annis, cum diuersis in locis Germaniæ hanc plantam seruare aliqui conarentur, in cellis vinarijs nimirum (vbi solent) omnibus perire. Septimo aut octauo anno fructu profert, qui maturescit autumno.

Sapor plantæ, quem Sedi maioris similem exhibet, satis apertè, vel Lacuna iudice, ostendit frigidam & humidam esse. Experientia constare idem tradit, vulueta recentia mirabiliter glutinare. Aliquot Ficus comestæ tingunt vinū rubro sanguineo colore. Vrina sanguinea aignatibus causam insignem terrorem attulit non sine consociorum & medicorum risu. Cautio itaque sit non edendum alioqui vrinam cruentam ex plurimorum Autorum obseruatione causaturum. Etenim hoc & Matth. & Pena cum Lobel. Cardanus, Gesnerus, Camer. aliique plures qui fortè autodidacti hoc ipsis retulerunt, hoc testantur. Referunt hoc idem qui Orientales insulas sunt

Tempus

Culm:

Satis

Odor fr

tus.

Tempus

Vires &amp; v

sus.

Temp

ram.

Vulnera

Vrina

quædam

peruagati. Folio dissecto multus & tenacissimus humor emanat, iuxta albuminis oui conuulsam, quem vlcibus antiquis vtiliter adhiberi tradunt. Ipsi fructus refrigerant: succo quoque foliorum pro aqua vtuntur Indi. Granorum quæ fructibus illis continentur ad sericum tingendum vtilis est auctore Gesnero & Cardano.

Plera.

Tinctura.

Sed max. l. b. de var. rer. subdit idem Cardanus: Ceterum an omnino ex granis illis sericum tingatur, haud multum refert quandoquidem æternas res, non quæ mutantur edocemus: singula enim cursu temporum & multa cum regione mutantur: at ratio perpetua manet, velut si quid colorem hunc rubeum splendens retineat: substantia verò & tenui & densa mediocriter prædictum fuerit, tunc cum vires habeat efficares, tinctura serici vel lanarum erit idoneum. Quod si hæc (Mediolani) planta hæc posset propagari, melior esset hæc Chymica quam metallorum: nam non solum sericum, verum & lanam hoc medicamento inficiunt, purpuramque seu Chermesinum vocant. Hæc ille. Sanè verò, Oedipo vel Delio aliquo natatore opus esset, qui edoceret, quid prioribus illis suis verbis vellet: vel potius Scaligero aliquo magistro, qui vel male sentientem exploderet, vel ineptè loquentem castigaret. Quid enim hoc ad rem, querere an granis sericum tingatur: tum dicere, parum referre, quoniam res æternas docere propositum habeat, non mutabiles: subsequentibus verbis quid sibi velit, subolfacimus tantum. Granis inest quædam adstrictio, quibus color à succo in rem tingendam manans firmatur & quasi ne euascat aut alienetur, coercetur. Perinde ac alumen, galla aliæque eiusmodi, diuersis coloribus saturandis & figendis (vri liceat hac voce Chymicis consueta) accommoda. Nobis ita visum: succum fructus, colorem, granatè administrata, coloris firmationem, fixationemque subministrare. In succulenta namque fructus substantia cruentum illum colorem in semine nullum, atque verò nullum, præter leuem quandam adstrictionem, hæcenus deprehendimus. Meliora certioraque docenti libenter herbam porrigemus. De tingendi enim modo ex hac planta hæcenus nihil certi & definiti nobis compertum.

Purpura  
Chermesi-  
num.  
Cardan.  
not.

## OPUNTIA VULGO DICTÆ

COGNATA FERRUMINA-  
tix Indorum.



Arbutuli in Deset India sponte natam, & (Ficus Indica vulgo dicta) admodum cognatam, vocant incolæ Ferruminatricem, arbutum fructus & luxationib. peramicam. Perpetuo viret, & foliorum sobole successiva arboream magnitudinē adipiscitur: iisdemque planè foliis [cum Opuntia dicta] sed fructu minore & spinosiore, purpureum viciū

succum remittente, adque imbuendos pannos infecturæ tenacissima. De eadem & Histor. Lugd. tradit: Indis Ferruminatrix nobis Opuntia Ostocellos dici potest. Ramos profert foliis refertos aspectu deformibus, admodum spissis & spinosis, Tunc foliis similibus, vt describit autor generalis Indiarum historiz. Rami isti folia primum fuere, ex singulis singula oriuntur, atque ex his alia, quæ demum indurantur, & mutuo sibi succedente foliorum sobole in ramos abeunt, ac tandem arboris magnitudinem adipiscuntur, quæ perpetuo viret caudice in imo & ramis cinericiis, asperis.

Succus fructus ad inficiendos pannos infecturæ tenacissime: vt dictum folia spinis exemptis trita & cataplasmatim modo imposita fracta ossa mirè glutinant, sed illa prius locis suis aptissime reponi oportet. Nam admotum Cataplasma cum agere in partem cepit? ita hæret, vt auulsi perdifficile sit. Ea verò sanata sponte excidit.

Tinctura

Opuntia  
fructuVfus  
minif

FINIS LIBRI PRIMI.







# HISTORIAE

## GENERALIS

### STIRPIVM

#### LIBER SECVNDVS.

EARVM EST ARBORVM ET FRVCTVVM  
QVI POMI QVOQVE VOCE GENERALIORI COMPRA-  
HENDVNTVR: SED EORVM POTISSIMVM, QVI OSSEAM NV-  
cem carne obiectam habent, esculentā, vel non esculentā:  
& quorum aliqua cum his affinitas.



**M**ALORVM natura, quæ vel carne constant pulposā & edulī, vel tādī aliquā substantiā, quamvis heterogeneā, quæ tamen: aut certē magnā ex parte, sit edendā, hæc tēnu dīctā: etsi externarum quadam mixta conditionis irrepsisse videantur. Equū enim omnia ita exaltē velut in cancellos quosdam cogat, quod ipsi n. n. datū natura? Pari nunc diligentē persequamur, quorum ossa visceribus comprehensa, nobilīus & vegetius propagandis principium claudunt: seu, ut Plin. ait, vitumque cinctum fructu, cum fructus alibi monstratur vitio: nempe putamine offeo. Quorum natura trigemina est, corpus, deinde lignum, rursusque semen in ligno, ut Persico, & quæ mox eradicantur.

### MALVS PERSICA.

#### CAPVT I.



berculis adnati, calycibus rubentibus in quinque foliola acuta scide, explicantibus. Po. na nonnihil rotunda, denso villo tomentosa, ex luteo herbacea, aliās pulchrē flaua, aliās puniceā arca decorata, carne alba vel pallida, interdum flaua, rariū ru-  
Tom. I.

**I**USTA magnitudinis arbor sit Persica, caudice satis crasso, ramis brachiata, cortice rubente & suffulco. Flores profert pulchros dilutē rubescentes, odoris exigui, ē quinque folijs latis compositos. Medium occupant stamina multa, longiuscula, purpurantia, aut alba, cum parvis magnitudinis stylo. Insident autem flores sine pediculis, ramorum tubente penitus, aut sanguineis guttis cruentata, sapore dulciusculo, pertinaci adhæsu officulum vix deferente, in quibusdam tamen speciebus facillē solubili (quæ bonitatis nota habetur) cuius profundis sulcis & scrobiculis passim se insinuat. Est autem officulo crassities insignis, durities ferē inuicta, sed interna facie leuor politus, externa multis sulcis profundiusculis nullo ordine canaliculata, binis valuis constans: in quo nucleus callosus, oblongus, exacutus, albus, flauescēte cuticula vestitus, qua detracta geminus conspicitur, amaricans, non tamen gustu insuaui. Folia oblonga, Salicis, acuminata, crenata, Amygdalinis, quibus persimilia, maiora, sapore amaro, qualis in Persicorum nucleis, ingratiore tamen. Materies ruffa, & circa media ferē punicea, satis firma, ob id ad torni artificium præ alijs expetita.

Hæc arbor non multam ætatem acquirit, ut e. Actæ: nim citō & promptē adolefcit, & ad frugem peruenit, ita non multis annis post senescens tendit ad interitum.

Porrō an de hac arbore aliquid Theophr. proderit, haud ita facillē iudicari. Persica [verit Gaza apud Theophr. lib. 3, c. 5.] in Ægypto & locis proximis fructificat, quanquam in Rhodo usque ad florem duntaxat deuenit. Quæ verba Daicē. citans de Persico hac nostra vult esse in-

Officulum

Nucleus.

Materies!

An Theophr. de Persico egerit.

On. ner.

Tres arbo-  
res Perficæ  
nominibus  
præhensæ

Theophrastus  
circa.

Dal. & H.  
buzg. ner.

Plin. ner.

Synonyma  
autorum  
sententiz.  
Shouch.  
Perficæ  
Marpurati  
sacra.

Rhodacin a.  
Duracina.  
Cocymala

Oxymala.  
Adria Per-  
fica.

Theophr.  
corr.

telligenda, addens: aliquos perperam pro Persica legere Perica n. Nosti exemplaria *pericas* habent. Ita & Scaliger legit, & male ait verti à Gaza Persicum. Vult enim duas esse *pericas*. Videtur itaque non agnouisse etud esse *pericas* aliud *perica*: *pericas* sanè apud Athen. legitur pro Persica alicubi. Monendus est autem Lector, tres esse arbores, vnam Nucem Persicam quæ nostra est Iuglās: alteram Mālum Persicam, de qua hic agimus, quam fortè non male *pericas* nomine exprimas: & tertiam veram *pericas* Theophrasti, de qua suo loco. Diosc. sanè manifestè distinguit Persicam, à Malo Persica, diuersis locis de ijs tractans. Et Corna. suprà citato loco Theophrasti, *pericas* legi vult: Et rectè, ita enim quoque habetur lib. 1. caus. c. 4. vbi Theophr. eadem repetit: vt Theophrastus nihil de hac nostra Persico egisse videatur, quantum quidem nobis hæcenus constat: Et locus citatus de Persica intelligendus videtur: neque quicquam exprimit, quod nostra Persici speciem aut naturam declaret, vt mirum sit Dalechampii ex Plinii sola versione [deprauata tamen] iudicasse ex Plinio apud Theophr. *pericas* vel *pericula* legendum. Theophrastumq; de nostra Persico locutum. Nam quod Plinius, lib. 15. c. 13. scribit: Intorum quidem Persica peregrina etiam Asia Græciæque esse, ex nomine ipso apparet, atque ex Perside aduecta. Persicæ arbores serb, & cum difficultate transire, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat hospitium. Fallum est, venenata cum cruciati in Persis gigni, & pernarum causa à regibus translata in Ægyptum, terra mitigata. Id enim de Persica diligentiores tradunt, quæ in totum alia est &c. Hæc inquam verba tota, non postrema tantum, vt Plinius ait, sed priora quoque de Persica intelligenda, et Theophrasto. Teste etiam Euriçio Cordo Persica & Persicæ, diuersa sunt diuersarum arborum mala.

Diosc. *περικέληρα*: Serap. *Shouch*, id est, Persicum. Auic. Persica. Bellunensis ponit in margine *Chouch*. Matth. *Shouch* habet.

Harpocrati taciturnitatis Deo Persicam sacram esse tradit Plutarchus lib. de Iside & Osiride, quoniam huius arboris folium lingue simile sit, fructus cordi.

Persica mala, à Græcis nonnulli *ποδύρα* quasi Duracina appellant: nonnulli, vt Aristophanes Grammaticus, in Glossis Laconicis vocari dicunt, (vt Atheistus tradit) Cocymala, & oxymala Persica, & Adria.

Idem Athen. tradit Theophrastum de Persica agere, quando sic ait: Theophr. libro secundo historiz plant. de ijs tractans, quorum fructus non est conspicuus, ita scribit. Manifestum quidem est maiorum omnium plantarum principium, vt Amygdali, Noci, & aliarum huiusmodi, itemque Punice mali, Piri, Mali, excepto Persico, cuius obscurum est, ac minimè tale. Atqui hunc locum nec Dalechamp. neque nos hæcenus quamuis diu & diligenter quæritum inuenimus. Placet itaque Dalechamp. sententia, locum hunc corruptum esse, & ex alijs locis eiusdem autoris ita restituendum. Manifestum quidem est maiorum omnium plantarum principium modis pluribus, veluti Nucis, Amygdali, & aliarum huiusmodi: item Punice Mali, Piri, excepta Malo Persica (*περὶ τὴν περικήρα*). Hæc enim pluribus modis minimè gignitur. Persicam malum scilicet intelligit Citriam, quam is & Persicam & Medicam vocat, vt in superiori libro patet, quæ semine tantum nascitur, non autem Persicam nostram, vt Athenæus videtur existimasse.

Quidam Nucem Molluscam putant, sed malè, vt postea docebitur *μηλὴν ποσειδῶν* Galeno, qui iam suo tempore vulgò ab omnibus Persice tantum appellari tradit, videlicet omiſſa voce *μηλὴν*. Idem etiam nunc eius fructum plerique *περικήρα* & Persicum simpliciter vocant. Paulus & Accius, *αδρία*, *νιρί*, vel, vt alij volunt, *δεδύρα*. Sed vix autorum placita atque synonyma ritè exequemur nisi prius eorundem differentias assignemus, ne diuersam nomenclaturæ lectori pariant confusionem, ijs non præmissis, & quomodoocunque explicatis.

Palladius itaque Persicorum genera hæc posuit: duracina, præcoqua, persica armeniaca, vel vt alij volunt Armenia. Galenus tamen vnum tantum præcocium, & Armeniacum genus esse voluit. Nam Armeniaca vocitatur, iam delitum est, de quibus Martialis:

*Præcocius fuerit, præcoqua tamen:*

Epigr. lib. 15.

*Nunc in adoprinis, Persica cara sumus,*

Actius hoc genus etiam Bericocum vocat: quod Pomo cæteris minimum est: sunt tamen Neoterici plures, qui hoc genus ad Pruna Armeniaca referant, quibus Curtius neuitquam ad stipulatur. Neque sanè putandum Dioscoridem ita confusè hoc genus Prunorum cum Persicis Malis miscuisse, cum alibi Prunorum meminerit.

Plinius autem regionum habere cognomina prodidit: Gallica, Asiatica, & Supernatia. Sed Persicorum (inquit) palma duracinis. [Rhodacenis Cornar.] Nationum habent cognomen, Gallica & Asiatica. Post autumnum matureſcunt: citate præcocia intra xxx. annos reperta, & primo denariis singulis venundata. Supernatia è fabinis veniunt, popularia vndique. Pomum innocuum expetit ægris: pretiumque iam singulis tricenis nummi fuisse, [aliter tricenis, nummi fuisse.] nullius maiore: quod miremur, quia non aliud fugacius. Longissima namque decerpro bidui mora est: cogitque se vendendi.

Sostratus *ἐν τῇ ἀπὸ Ἀθηνῶν ἐξ ὀκτώων*, Persicam Rhodacineam vocari ait, translataque ex Æthiopia in Ægyptum: Nicander in Alexiph. Perseum Mycenis leuillè, à Cæpheo Andromedes patre dono acceptam: eiusque nucleos ceruissæ veneno auxiliari. Vterque scilicet, quamuis classicus & verus scriptor Persicam cum Persica confundit, vt doctissimus annotat Dalech. Neque verò etiam placet eiusdem Nicandri interpretis in hunc modum scribens: sciendum est Socratem in comment. de reptilibus testari, Persicam quam Rhodacineam dicunt: hac voce autem Græci Persica nunc etiam appellant: ex Æthiopia in Ægyptum translata fuisse. Et Rhodolus Democriteus in Comment. de his quæ ἀντιπαθὴν & συμπαθὴν dicuntur Persas (ait) lethalem arborem habentes in Ægyptum misisse credentes perituros multos ab ea esse utilem cōtrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc videntur: Non placet inquam interpretati Scholiastis Nicandri, existimantis Persicam & Persicæ nucs idem esse cum Rhodacenis siue Persicis Nicandri, de qua re specialius cap. de Persica.

Paulus *τὴν ποσειδῶν* his verbis distinguit: *τὴν δὲ ποσειδῶν τὴν καὶ δὲ ἄλιν α* [alij legunt *δὲ ἄλιν*] *αὶ ἀρηνία* *κρίτῃνα τὸν ποσειδῶν* &c. Corn. verit: præcocia & Rhodacena & Armenia meliora sunt Persicis, neque enim acescunt, neque similiter corumpuntur: sunt autem & iucunda. Verum non præbatur nobis Cornarius, reponens vocem Rhoda-



cena pro Duracena: quandoquidem ipse etiam Palladius, probatus Latinus & Geoponicus, eo modo nominavit, differentialiaque similes posuit ante Paulum in Nouembri cap. 6. quas paulo ante adduximus. Merito igitur reprehensus fuit à Matthiolo, ut particularius dicitur cap. de Armeniacis.

Mirum quod Plin. lib. xv. cap. xxxix scribit, nullum succum Persicis, cum præsertim duracina succo abundant. Quis verò dicat nullum succum esse Persicis, quorum omnia genera, quæ hodie quidem habentur, nemo est qui non fateatur succulentia, licet alia magis, alia minus qualia fortè sua duracina intelligit Plinius: quamvis fortassis Duracina latinis dicta quis putare possit, quòd solidiori sint carnis duritie cæteris quorum substantia tenera & mollis, ut quid de eo Plinij loco statueramus vix occurrat.

Addit idem alia quædam ad persicorum explanationem facientia his verbis: sua & in odore miracula: Malis acutus, Persicis dilutus, dulcibus nullus. Sed quid? dulcibus nullus? Intelligat licet vel Poma vel Persica, non stabunt eius verba. Non meminerat Plin. (inquit Scal.) cum hæc diceretur, naturalium, quæ vel quodotidiano in usu sunt. Vel enim & valde dulcia, & valde odoratum est: & probum mel quod dulcius, odoratius Dioscor. Male igitur dulcia ab odoratis excludit.

Pergit Plin. Alijs foris corpus, intus lignum, ut Persicis & Prunis. Quædam statim à ligno recedunt, ut Nuces & Palma: quædam adherent, ut Oliuæ, Laurique. Quorundam generi utraque est natura, ut Persicis. Etenim Duracina adhæret corpus, est lignoque auelli nequit, cum in cæteris facile separatur. Quorundam natura trigemina est, Corpus, deinde lignum, tumulose semina in ligno, ut Persicis.

Porro Rhodacena Pauli, Dalech. dicitur quæ Galii Anberges. Mirettons & Presses vocant, sic dicta quòd vel rosam oleant, vel rosca & rubro colore picturata ferè conspiciantur. Duracina verò, quorum caro sit durior. Per Præcoia item intelligit magna & ampla: sic dicta, quòd è montanis & luperinis locis aducherentur: Vulgò Abricis. Alex. ab Alexandro Gen. Dicuntur Nuces ocellatas, quibus auctore Tranquillo Augusto cum pueris lusit, probabilius nucleos putat quos in Persicis Pomis lutos inspicimus, quibus peripet ludere, nostros pueros hodie videmus. Et Gels. in Catal. Idem comprobatur, dum ait: Nux persica, hanc aliqui Ocellatam apud Suetoniū accipiunt. Ein Persichstein. Dalechampi probat eam opinionem, quæ vult nucleos Ocellatas esse Auellanas, ut licet videre l. 3. H. n. g. Aliam verò longè differentem opinionem habet Rob. Const. qui Ocellatis, vel ocellulis nucibusque existimat legendum, ut demonstratur c. denuce juglande.

Simeon Sethi. podaklun. & anaklun. habet. Persica, inquit Hermol. ex Perside aduecta in Rhodo ad florere vsque perueniens. Inde Rhodacina fortasse vernaculo Græcorum sermone dicta, nisi quis inuicem nomen putet, quasi Doracina: sic enim Persica ipsa nominantur à Græcis recentioribus Paulo & Actio, quasi Duracina.

Molluscum nucem sunt qui Persicum interpretati falsò fuerint.

Persica sine suis ossibus & inscripta quemadmodum nascantur, docebit Palladius.

Mirari verò subit cur Hermol. scribat, Palladium tria tantum genera Persicorum enumerare, cum manifestè quatuor habeat, ut supra ostendimus, quorum Hermol. præcoia omittit. Sint hæc Armenia, quæ Prunorum generis quidam volunt, an

diuersa, studiosi salgamorum dijudicent. Hermolao eadem videri placet.

Macrobius qui Persicum vulgò dictam Molluscum Nucem esse putat, apertè hallucinatus est, inquit idem. Molluscum autem Nucem dictam putabat Macrobius, quòd cæteris generibus mollior esset, cuius putamen facillè rumpatur, de qua Plautus in calceolo:

*Molluscum Nucem super eius dixit impendere regulas.*

Suetij testimonio fretus, in Idyllio, quod inscribitur Moretum, ita putauit Macrobius. Ertorilque causa fuit quòd ipse existimauerit idem esse Malum Persicum & Nucem Persicam. Sic enim hic Idyllio seu Edulio, quod Moretum inscribi diximus:

*Admisse tu Arca Basilicæ hæc, Nux partim;  
Partim Persica, quod nomen denique fertur:  
Propterea quòd qui quondam cum rege Ponti  
Nominè Alexandro Magno sera prælia bello  
In Persas retulere suo, inde retentum  
Hoc genus arborum in prælati sinibus Graijs  
Disseruere, nouos fructus mort alibus dantes;  
Mollusca hæc Nux est, ne quis fortè inscius erret.*

Non enim hic, ut hic arbitrat de Persico teneniori Pomo agit, sed de Nuce Persica. In Moreto enim poma tenera poni non solebant, sed Persicæ nucs. Hæc fuit Perotti sententia, qui Macrobiū reprehendere voluit, in eam ita, inquit Curtius, si eiusdem classici auctoris monumentis me doceret, in Moreto non poma tenera, sed persicas tantum Nucs, id est, Englande, in Asia, quod ex Vergiliano Moreto non probatur. Ad Hermolai auctoritatem accedit quoque Ruellij, idem dicentis, nimirum Macrobiū Mali persici & Nuclei persice confusione lapsū.

Marcellus norum, quidem Persicorum genus omne & formam tradit, nondum tamen in Antiquioribus satis patere, an huius pomi arbor sit, quam D. C. pluresque alij Persici dicunt, in Ethiopia lethalem, in Aegypto autem salubrem, de qua in hortulo cecinit Colum. an quæ malus Persica ubique nascitur? Ex Nicandri (addit ille) interprete in Theriacis credi potest eandem esse. Poeta ubi de Cersula agit, præcipit duras Persicæ nucs: Nucèque appellat Persicorum ossa soliditate sua nucibus similia: Quas hic ipse in remedijs cerussam præparandam ossa appellauit. Ex quibus manifestè patere putat Marcellus, quam alij Persicorum dicunt, Poeticè à Nicandro interpretèque eius præcoia vocari. In hanc enim ait inclinare animum eius, etsi id Plinius negauerit, & aliorum multorum auctoritati obstat. Et alibi: In Persica Theoph. plura sunt quæ nostrati Persicæ eadem sunt: aliqua nihil nostris idem aut simile habent: inclinat animus genere eandem, specie diuersam nostratam ab Aegypto esse, de qua tantum Veteres egerunt. Huic rei testis Columella est.

Considerandum an idem senserit Nicander quod eius interpretes scholiastæ, & ex eo Marcellus. Fortè Nicander de Persica tantum scribit & nò de Persicis. Columellam de persicis scribere existimamus: Marcello assentiri non possumus: persicam diuersam à persica statuimus.

Ruellius putat Theophrasto non indicta Persica, quod colligimus ex his verbis, quando ait: Persica Theophrasti temporibus in Aegypto & vicinis locis ferebat &c. Sed an de Persica intelligendus sit ex præcedentibus patet.

De differentijs idem sic ait: Tria Pomorum obseruant genera: (Verum ex Palladio & Plinio satis patuit quatuor ipsis obseruata) politeritas innu-

*Molluscum  
nucem non  
esse Persicam.*

*Persica.*

*Nuces Persicae.*

*Persica:*

*Marcellus  
putant Persi-  
ca & Persi-  
ca idem  
esse.*

*Persicorum  
ossa.*

*Persica.*

*Marcellus  
not.*





ab osse suo diuellitur: sunt tamen nonnulla premollia Persica in Italia, intus rubra, quæ Duracina non cedunt, grata sapore, stomacho accommodata. Hæc vero omnia Persica poma in Persia lethalia & venenosa erant, in Ægypto postea mitia facta & suauissima, quilibet nunc videntur.

Quid sibi velint tum hi, tum antea citati auctores, quando vno quasi ore omnes dicunt Duracina difficulter separari ab osse, scimus quidem, sed rem ipsam intuentes, contrarium, vtpurimum deprehendimus. Enimvero sanè hæcenus in Italia, Gallia atque Germania obseruamus magna ex parte persica, quibus pulpa hæret, ossibus cæteris ferè esse mollia, ac interdum penitis mucosa & succulenta: firmiori verò pulpa cui non adheret.

Verfatur vero Amarus quoque in ea hæret, Persicam arborem eandem esse cum Persica, etiã apud Dioscoridem, vanitatis insinulans eos qui contrarium statuunt. At sanè vanissima est eius ratio qua ad suam opinionem defendendam nititur: quum (inquit) de Malis omnibus egit, (sub. Diosc.) sermonem habuit de Pomis arboris Persicæ: nunc vero (sub finem lib. i.) de ipsa arbore: & addit, suo iudicio subscribere Io. Agricola, & Ammonium. Subscribant sanè quotquot velint, nobis post hæc non persuadebunt, vel plurium auctoritates. Neque verò consuetum Dioscoridi, hic de fructu, illic de eius arbore agere, vt ipse in exemplum trahere conatur. Sed quid opus rationibus, vbi ipsa rei suppetit veritas?

Anguil. Persica notissima dicit, tam Duracina Durasse. Italis dicta, quàm, atque Nucipersica (Persiche noci) quæ Auerrhoes Antipersica vocauit.

Gesnerus ex Vuoyssello Silesio has differentias ponit. *Maiores & odoratiora*, quæ circa Lacum Verbanum proueniunt: *Persica Hungarica*, quæ trium generum: quædam magnitudine pugni: alia intus & foris colore aureo: alia intus sanguineo succo, *Duracina & ferotina*.

Persicæ arbore in Malum Cydoniam inserta Cydoniam malum enasci videmus, inquit Monardes.

Est & species quædam Italica, fructus maiores proferens, in horto patricij Tigurini, eidem Gesnero.

Lob. & Penæ Vulgaris Persica, sole mutato & venenata vi, patrio nomine notissima.

Rob. Const. existimat Theoph. lib. 3. c. 7. de Persica loqui, quod nobis non videtur. *iodenrha*. Nicandri Scholiastæ eidem & *iodenrha* Constantino, Paulo, Aetio & Simeoni Sethi. Dioscori. Diof. & Theoph. l. 4. c. 4. hist. (in quo fallitur, si de his intelligit, vt intelligere videtur: nam hæc est Malus Medica, quæ & Persica dicitur Theophrasto) sive *diogeni* Alexand. Aphrodisæo in problem. recentioribus Græcis *iodenrha* aut *iodenrha*. Auctores Persicarum nomina alibi distinxerunt, alibi verò confuderunt, cum tamen diuersas plâtas pingerent. Persicam ipsam sub Persicæ arboris nomine voces ipsas commiscens depingit Plin. lib. 9. c. 13. Persicæ arbori tribuit Plin. quæ Theoph. de Persica prodidit. *Hec Cnfl.*

Cæsalpino Persica arbor est parua, citissimè omnium senescens. Eius genera plura: quædam os habent à pericarpio explicabile: quædam id pertinaciter adharens, quod genus *Duracinum* appellatur. Figurâ quoque differunt: nam quædam orbiculata, stimula quædam in latere: quædam in rotunditate oblonga, quod genus *Cariota* cognominatur.

Colore alia candicant: alia modico rubore aspersa sunt, præcipuè quæ Solè spectant, & intus in ossis contactu: alia Buxea ex toto, quæ à Cotoneis cognominata omnium tardissimè maturantur: quædam enim præcocia sunt, insita super Amygdalam, *Nucipersica* vocant, nucleo etiã grato. Aliud est genus Persicorum quod recensuit Plin. inter Pruna: Græci quidam Rhodacena appellant, fortè à roseo floris colore.

Io. Agricola quoque ex iis est qui Pomum Persicum in sua terra lethale dicit, quod aliò transplantatum admodum suaue & ventriculo gratum reddatur, licet succus eius valdè corruptioni obnoxius sit, atque ob id initio mensis expetendus.

Dod, qui Malum Persicam *περιπυρριχέον* vocat eadem ferè de differentiis habet quæ Cæsalp. Persica (addit) nullam ferentia lanuginem, sed glabra, laeua, exterius interiore carne virentia, aliis duriora: nucleus Amygdalo persimilis, medium quoddam genus inter Persicum & Amygdalum videtur: vulgò *Persicix*, aut *Persicæ* appellant: Latine id *Nucipersicam* sonat.

Camer. Genuensia cæteris omnibus præfert, eosque taxat qui Persicam & Persicam malum confundunt. Sed specialius H. Lugd. illud docet his verbis Nicander aduersus Cerasiæ venenum remedia docens Persicæ nuces pro Persicorum nucleis intelligere videtur: nam Dioscor. exhibet. (Quid si apud Diosc. legendum sit *περιπυρριχέον*?) Paulus verò sicut & Nicander *περιπυρριχέον* ad id laudat, ut ipse Nicander inter Persicam malum nihil discriminis nouisse videatur, & contra ipsum imprimis dictum esse credibile sit, quod Plinius dixit: Nicander in Theriacis dixit Phalangij genus Persicæ folijs innutriti. Scholiastæ Solstratum citat, qui scribit, Persicam Rhodacenam vocari, & ex Æthiopia in Ægyptum translata fuisse, vt iam aliquoties ex diuersis autoribus inculcatum. At Rhodacena nihil aliud est, quàm Malus Persica & Rhodacena Persica mala.

Nicandri interpres, inquit Gorreus, Nicandri versibus subiungit. Persicæ ossa, Persicorum ossa, siue nuclei euidentem habent amaritudinem. Proinde calciant & detergunt. Est autem Persicæ arbor à Persicæ dicta. Ex quibus intelligitur Nicandri interpretem aperto errore Persicam & Malum Persicam eandem arborem putasse.

Scribit Rauuoltius ex relatu cuiusdā mercatoris Persæ, Persica Persianis nota esse, & nominari *Hel*, quæ vt quidam volunt, non ita venenata vt Persicæ fructus. Laudant enim nucleos pro antidoto venenorum. Quod autem parui fiant, accidit quia sibi persuadent Nimrod Persica mala sua magia ita intoxicasse, vt ab eo tempore non sint edendo.

Persica Malus Germ. *Pfersichbaum*, & *Pfersingbaum*. Fructus, *Pfersing* / *Pfersifen*: & Silesiis, *Pfersen*. Taber. quatuor differentias proponit. 1. Persica Mala, *Pfersingbaum*. 2. S. Johans *Pfersing* / Persica præcocia. 3. *Korpsersing*. Persica rubra. 4. Persica Cydoniata *Quittenpersing*. Totidem quoque figuras habet. Primi Persici colorem non tradit. Secundo tribuit colorem luteum, ac minorem dicit. Præcox sanè genus nondum vidimus luteum. Persica nouimus lutea, parua & magna. Sed nec quarto suo assignat colorem. Turn. Angl. *Pechetree*. Gerardus Anglus qui Taber. quatuor habet figuras sic distinguit & nominat. 1. Persica alba, *The wyte peach*. 2. Persica rubra, *The red peach*. 3. Persica præcocia, *The*

*Cariota*.  
C. d. d. d.  
Rubentia.  
Buxea.  
Cotonea.  
Nucipersica.  
Rhodacena.

*Persica Glabra.*

*Genuensia.*

*Nicandri.*

*Rhodacena*  
*Rhodacena.*

*Persica Persica*.  
*Persica nota*  
*nomine Hel.*

*Cur persica*  
*parui sunt*  
*peris.*

*Nomina*  
*linguarum*  
*eum differe-*  
*ntijs.*

d'aurant peach. 4. Persica lutea. The yellow peach. Belg. *Persich* / *Peevse*. Gal. *Un Perscher*, *pesche*. It. *Persic* & *Persiche*. Hilp. *Pexerg*, *Ducasi*. Castil. *Persic*. Catal. *Persichs*. Portug. *Pessig*. Hung. *Savarska*.

Restat ut nobis observatarum differentiarum lemmata subnectamus.

Autoribus  
obseruata  
Persicorum  
differentia.  
Persica mi-  
nima præ-  
coc. alb. 1.

Persica minima, magnitudinis paruorum Malorum Armeniacorum, alba, hirsuta, pulpâ albâ, adherente ossi: matura Augusto in Allatia, potissimum horto Nobilissimi Reguli Waldner à Freudenstein. Eadem nobis obseruata Lugduni matura fine Iulij, gustu sapida. Ossa sunt valde parua, oculata tamē. De his scripsisse videtur Cordus his verbis. Persica minora ab Armeniacis differunt, nostratibus per omnia respondent, multo tamen minora sunt, ut ex nucibus æstimare facile quis potest: quæ cum à vulgariis nucibus lignosa substantia, & scabro cauernofoque habitu nihil discrepent, duplo tamen aut triplo minores sunt paruis, & ex Asia venientibus Amygdalis. Saporem & qualitates vulgaribus easdem habent. Considerandum an sit id quod Ruell. vocat Præcox, Antepersicum, quod dicit gustu non discedere à vulgari: vulgò *Trecacinum*, & *Gesin*, in Catal. Præcocia seu præcoqua Persica, *πρόκοκα*, *πρόκοκα*, *die früzeitigen persich*: *aurant-peschis*, *pesches de Troye*. Malum præcoquum ex Persicorum genere, *πρόκοκκον*: ab urbe Treceis, Trecacinum. An item Camerario Persica pumila, fructu præcoci, dulci admodum & paruo, apud Norimbergenses *Johannes Persich* / admodum suauis. Casp. Bauh. apud Matth. ait: Præcocia dici Persica S. Iohannis parua, instar Armeniacorum, eiusque ferè saporis. Nostra Persica non habent eum saporem, nec etiam qui de paruis Persicis scribunt, talem tradunt, quod adhuc obseruauerimus.

Præcox.  
Antepersicum.  
Trecacinum.

Præcoquum  
Persica S.  
Iohannis.

C. Bauh.  
not.

Persica præ-  
coc. alb. 1.

Alud genus est carne facile separabili à nucleis, sapore commendabili. In ipsis ossibus quoque conspicua differentia, quæ non ita profundè, nec tam frequenter sulcata, sed frequentibus punctis & foraminulis referta. Ex pago Valentini, Comitatus Montbelg. matura Septembri.

Persica mediocria al-  
bida. 3.

Persica mediocria, tunica vestiuntur ex luteo pallescente, carne alba, facile ab ossibus separabili, prædictis magnitudine superiora. Ex Epamanduro.

Persica al-  
ba maxima. 4.

Est & alborum maximum genus, carne sapida, nucleis non multum adherente. Habetur in horto Principis Iohannitarum in *Heiserschen* Briscoia.

Persica lutea medio-  
cra. 5.

Montbelgardi habentur Persica mediocria externè lutea, quibus pulpa firmiuscula facile abscedit ab ossè, saporis grati. Figurâ etiam nonnihil differunt à cæteris, nec ita rotunda sunt ut illa, præsertim mediocria alba. Profundiore adhuc sinu sulcata. Abundat hoc genus Epamandoduri. Habetur etiam in horto E. C. Montbelg.

Persica maxima lutea. 6.

Ex flauis maximum genus habent Basilienses & Burgundi, sapida & duriuscula pulpa, quæ facile recedit ab ossè. Ipsa saturâ flauedine & propemodum crocea, & magnitudine insigni, quæ coronæ ferè æquant, à cæteris flauis mediocribus facile discernitur.

Persica al-  
bi nucleosa  
& succulent-  
ia. 7.

Est & Persicorum genus quoddam æqueum & succulentum, & quod adaperitum & leuiter pressum facile in liquorem diluatur, ex acido ac vinoso aliquid amaricatis habens, præsertim circa exteriora. Pulpa mordicus ossibus adheret, vinica notè

non probata bonitate. Horum alia mediocria sunt, alia paulo minora: Basilienses *Wasserpersich* / *aquea Persica* vocant. Meminimus nobis alicubi *Sauwpersich* / *Persica porcina* vocitata, quod plerumque subibus proiciit soleant. Non probantur hæc in cibis, & infimæ sortis hominibus, (ut fieri solet) relinquuntur. Prædicta omnia cure sunt tomentosa, quamvis alia minùs.

## PERSICA HISPANICA: MELOCOTONEA QVORVNDAM.

**M**elocotoneam vocant quidam arbore, cuius flores & folia Persicæ, à qua tamen nonnihil differre videtur. Fructus autè maiores, tardius maturescentes, sed diuturniores, puluinato calyce foris rubente, atque ex vna parte maculis nigris notato: pulpâ intus Pomi, difficulter os derelente, quomodo nobis Vespuntione missa descriptio. Idem fructus nobis provenit, pugno maior, sublongus, albidus, officulo in ipso sæpius dehiscente, in quibusdâ etiam ita in frustula diffracto, ac si id malleo esset factum, quod aspectu mirabile, quomodo id euenerit, fructu nondum aperto: carne ipsâ testaceo nucamento adherente, & purpurea atque sanguinea, eâ ipsa parte, quâ adheret. Os ipsum compressius, quam cæterorum Persicorum, altera præsertim parte, adeoque figurâ ipsâ euarians, fragilius quoque, si integrum sit, nucleum continens qualem cæteri, iuxta quem viscosum quidam lentor interdum deprehenditur. Et hoc notabile quod aliquando obseruatur carnem circa pediculum ita abscedere, ut cum ipsi ossis substantiæ insertum, fructu etiam nondum aperto, contueri sit facile, ipsaque etiam animalcula insecta, per eam apertionem subeuntia, intus stabulentur. Caro firma & quæ dentibus trita, strepiter, sicut Pomorum, alba, & circa extrema subuindis interdum gustu suauis, lapida, vinosa: Cure dura villosa viridante, & altera parte purpurea, punctis suffusis maculata.

Totius pomi figura sublonga, & quam reliquorum angulosior. Primum hæc nobis visa Montbelgardi, ex Burgundia missa, ab amicis, nomine Melocoton: quæ in hortum E. C. plantata in arborem excreuit, quæ iam sæpius pulcherrima poma protulit ipsi etiam Principi peculiariter expetita. Diutius incorrupta seruantur cæteris. Matura tunc Septembri.

An Gesnero Cydonipersica mala ex insitione nata: priscis incognita. Montbelgardi habentur quedam glabra parua, carne quoque nucleo adherente quæ non admodum sapida. Fortè ad idem genus pertinent, quod antea succulentum appellauimus, nisi cutis leuor impediatur.

Colmarie tandem obseruauimus Persica magna & speciosa, carne visque aded rubra, ut Carotum instar tingant, vnde arbusculas & nucleos importatos transplantauimus in hortum Il. E. C. Helicurie etiam habentur in horto præfecti. Item, Massioij: sed minora Colmarienibus, adhærescente pulpâ ossibus. Huius iconem ex Camerario, quam & ipse pro Persica rubra exhibet, desumpsimus, eamque quod pluribus (si arboris & florum speciem spectes) accommodari possit Persicorum generibus, in principio huius capituli posuimus. In qua iconem partes oēs affabre expressæ sunt. Non sunt silentio prætereunda quæ faciem parentis succumque adoptionis exhibent, appellata ab vtroque Nucipersica, quæ & Martialis (ut vult Ruellius) ditycho superius adductæ cōmendantur.

Namque



Namque ut idem Ruell. tradit, Nuciperfica arbor est humilis, præcoci Perfici proceritate, folio Amygdalæ, sed maiori: flore puniceo. Pomum emicat viride, Carnosum, succulentum, nulla exterius lanugine pubescens, medio inter lugandem & Persicum malum sapore, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus, qualis Amygdali, aut Persici Pom. Maturefcit autumnii exitu, diutiusque Persicis ætatem prorogat, non tam celeriter marcescens, sed multò Nuce fugacius est. Iucundo placet sapore, leuiter amaro atque innocenti gustu.

Sciant hac arbore Galliarum plerique tractus, rura nostra Persiconucem, aut potiùs curtato nomine Persiconucem vocant. Ea folioles mediam inter utrumque progenitorem naturam, ut spero, contraxit: attulitque insitionis, ut arbitror, diligentia, aut satorum mistio nouum adulterij genus, ita ut ex Amygdalo seu Nuce Græca & Persico progenies inuisa prioribus seculis exoriretur, vtriusque parentis ingenium referens, & effigiem simul adoptans: hoc est Malum quod foris æmula facie Persicum pomum mentitur, intus dulcem Amygdalam & facie & gustu representat, ipsum recte vterque parens Amygdalopersicum nominabit.

Recordamur nos aliquando hos fructus Auenioni in Gallia degustasse, videnturque iidem esse fructus, quorum mentionem fecimus inter Persicorum differentias, nempe Matthiolo Nuciperfica & Persica Amygdala, Anguil. *Persiche noci*, quæ vocantur ab Aucrhoc *Aucrperfica*: Cæsalp. *Nuciperfica*: Dod. *Nucipersicum*, *Personaux* & *persenix*.

Nos & aliam nouimus mediam inter Persicum & Amygdalum, fructu hirsuto, ab hac non parùm differentem, de qua post Amygdalum nomine Amygdalopersici. Porro quia præci illi scriptores Columella, maximèque Palladius *Tuberes* multoties persicis annuerant, hisque nucleos tribuunt: verisimile est *Tuberes* esse de genere Persicorum. Hanc nostram coniecturam etiamnum magis firmant Ruellius & Dalechampius, viri doctissimi, & in naturalibus haud vulgariter versati: ille Nuciperfica Gallis vulgò Persiconucem (*Pershenix* vocari tradit: At hic etiam specialius apud Plin. lib. 15. c. 12. tradit *Tuberes* vulgò dici *Peshes noix*, ut quo commodius loco antiquorum *Tuberes* pertractentur, præ isto, non videamus. His alij viri doctissimi subscribunt, ut patebit, & res ipsa satis aperit declarabit: quamvis interim non nesciamus, quosdam aliter de ijs statuere, ut suis quibusque patebit locis. Ad id verò ieiunè & breuiter de his agunt, cum iam citati Auctores tum etiam Plinius (ut in alijs multis, quorum negligentia in describendis stirpibus posteritatem in eas turbas & controuersias coniecit) ut nec quid velint ipsi clarè doceant, nec quid intelligere debeamus instruant nos. Videamus tamen paucis quid de ijs tractent, ne vel in hoc lectori curioso, porissimum herbariarum studiosis, quantum quidem in nobis est, defuisse videamur.

Ergo Tuber priore correpta arboris genus est & fructus. Arboris vtiq; quoniam Colum. scribit: possunt etiam his diebus Cerasi, & Tuberes, & Armeniacæ, atque Amygdala, cæteræque arbores, quæ primæ florent, inferi commodè. Nota: quæ primæ florent dicit.

Palladius quoque Tuberes feri præcipit & inferi, & (mox immèdiatè) addit, oïlla duraciorum (quod persicorum genus (se ex præced. pater) vel

plantas eiuscem generis poni &c. Et alibi: Mense Septembri circa Cal. Oct. vel Februatio Tuberes feremus sobole, vel nucleis. Rursus alibi: Ianuario Tuberes inferuntur Cydoneo: nunc locis temperatis persica ossa ponuntur. Vbi rursus notandum, inferi Cydoneo.

Inter differentias habuimus Melocotonea (quæ fortassis non incognita fuerunt Antiquis, ut Lacuna existimauit) ex insitione duracina & Cotoneæ comparata. De iisdem sic Plin. Acquæ peregrina (ac Medica) sunt zizipha & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venere in Italiam, hæc ex Africa, illa ex Syria. Sext. Papinius, quem Consulem vidimus, primus vtraque attulit, Diui Aug. nouissimis temporibus, in castrorum aggeribus fata, baccis similia (de ziziphis, non Tubericibus, hoc audiendum Dal.) quàm Malis, sed aggeribus præcipuè decora, quoniam & in recta iam syluæ scandunt.

Tuberum duo genera eidem: candidum, & à colore Sericum dictum. Penè peregrina sunt in vno Italig agro Veronenfî nascencia, quæ Lanata appellantur. Lanugo ea obducit, Strutheis Persicis quæ plurima: his tamen peculiare nomen dedit, nulla alia commendatione insignibus. Ab Amygdala proximè florent Armeniacæ dein Tuberes, & Præcoci: illæ Pregrine, hæc coactæ, hoc est, (ut Dal. annotat) hominis industria & cultura effectæ. Tuberes melius inferuntur in Pruno syluestri, & Malo cotoneo, & in Calabrice: ea est spina syluestris.

H. Lugd. Plinius inter Malorum genera, & Tuberes, vulgò reschenoiæ [Nuciperfica] in agro Veronenfî nascencia lanata [Mala] à lanugine obducente nuncupata numerat. At Nuciperfica vti glabra, quomodo igitur possunt dici lanata Mala? Et alibi, Tuberum, inquit, quos Nuciperfica vulgus appellat, duo genera cunctis ferè nota sunt: alterum etiam cum maturuit, ex albo subiretices, eodem in toto pomo colore: alterum, fructu rubro, vel qua parte Solem spectat, rubescente, altera sublauro, quem esse credunt suauioris & delicatioris gustus. Hoc videlicet esse putatur Sericum Plinij, vel ut Dal. apud eundem legere videtur Syricum, quamuis ipse Plin. suam lectionem abundè confirmet, quando ait à colore sic dictum, hoc nempe candido opponens: Tuberis huius meminit Petronius his lepidissimis versiculis:

Infelix mudò crinibus nitetas,  
Phoebo pulchrior & sorore Phæbi.  
At nunc lanior ære, vel rotundo  
Horti Tuberè, quem riganis vnda,  
Ridentes fugis & times puellas.

Tuber itaque in malæ genere à Petronio pro fructu huius arboris ponitur. Martial. lib. 13.

Lecta suburbanis, mittunt Apyrina ramis  
Et Verne Tuberes, quid tibi cum Libycis?

Vernæ, id est domi nostræ natæ. Et rursus idem, de arbore:

Non tibi de Libycis Tuberes, & Apyrina ramis,  
De Nomentanis, sed damus arboribus.

Suet. in Domitiano cap. 16. Oblatos Tuberes seruari iussit in crastinum. *Napumponi*, id est Nuciperfica Martiali atque Palladio, Constantino apud Theophrastum: nosque inquit, vocamus *Noix peshes*, quas arbores Tuberes à Plinio dici nonnulli arbitrantur. Dalech. sanè non semel Tuberes apud Plin. *Peshenoiæ* interpretatur, sicut dictum.

Gelsus arbores peregrinas dicit, fortasse quia ipsi non erat cognita. At nimia profectò securitate MATTH. cap. de Ziziphis negat Columellam scripsisse de Tubericibus, cuius locum paulò antè citauimus: fortè Plinij imitatione i-

*Tuberis* 110.

*Zizipha*,  
*Tuberes*.

*Tuberum*  
*differentia*  
*Sericum*,  
*Locus*.

*Tempus*,  
*Tuberes in*  
*sitione effe*  
*cta*.

*Nuciperfica*  
*ca*.

*Differentia*  
*rum desir*  
*prones*,  
*Synonima*,  
*Sericum*  
*Plin*,  
*Syricum*,  
*Dalecham*.

*Retinudi*  
*Tuber*.

*Verna Tuber*,  
*res*.

*Caryopersi*  
*ca*,  
*Nuciperfica*.

*Arbor pere*  
*grina*,  
*Matth. not*.

Aud facere voluit, qui miratur, Persici Pomi mentionem à Catone non habitum.

*Tuberis diff-  
sere à casta-  
pia.*

Porrò à Tuberibus diuersam Ziziphum esse, vel ipsa cultura vtrarumque diuerso loco & tempore à Palladio tradita videtur demonstrare. Ziziphi autem culturam, quæ est in Aprili c. 4. referemus in eius historia l. 6. sub titulo de Iuiubis.

*Tuberum  
satio & cul-  
tura.*

Tuberum autem, quæ est in Septembri, eiusmodi est. Circa Cal. Octob. vel Februario Tuberes feremus sobole, vel nucleis, cuius tenera diligenter nutrirì debet infantia. Sumatur cum radicibus planta diuulsa, bubulo fimo linatur ac luto, statuatur pingui terra & subacta, subditis conchis & marina Alga, terris magna sui parte condatur. Alij pomis statim grana decussa, & Sole siccata, pingui & propè cribata terra autumnò tria simul ponunt, quæ feruntur in vnum coire virgultum, quod assidua rigatione iuuandum est, atque fossura quæ solum leuiter scalpens teneritudini robur inducat. Post annum deinde, vel aliquantò tardius, quæ fuerit de semine planta transfertur, & hoc genere fructus efficit dulciores. Mense Ian. vltimo vel Feb. Tuberum furculus mirabiliter proficit Cydonio insitus. Inferitur autem Malis omnibus, & Piris, & Prunis: & Calabricis, melius trunco fillo, quàm cortice: de super squalo, vel fictili vase munitur, repletis propè summitatem furculis terra subacta cum stercore. Profunt Tuberibus, quæ Malis profuisse memorauì. Tuberes seruabuntur, si obruantur in Milio vel vrcolis picatis & oblitis. Sed ad Persica reuertamur.

*Inferitur Tu-  
berum.*

*Reposicio.*

*persicorum  
locus in  
genere.*

Persica qualibuscunque locis proueniunt, vt tradit Palladius: sed & Pomis & frondibus & durabilitate præcipua sunt, si cælum calidum, solum arenosum & humidum fortiuntur. Frigidis verò & maximè ventosis, nisi obiectu aliquo defendantur, intereunt. Plin. Romanâ grauitate: quid attinet, inquit, in Pontum abire? Iuxta Romam ipsam Persica agrè proueniunt in Tulculano. Item, Peregrinæ & Cerae, Persicæque, & omnes, quarum Græca nomina aut aliena. Scatent sanè Persicis tam Germaniæ quàm Galliæ, etiamque loci paulò magis frigidiusculi. In Anglia verò in magnas arbores non excreverunt, teste Turnero. In Italia vbique copiosa, sed in Apulia (regione calidissima) copiosius: proueniunt, teste Marth. Et Porta Neapolitanus, Persica, inquit, tara apud nos fecunda sunt, & læta prosiliunt, vt potius Persæ à nobis petiisse, quàm ad nos misisse videantur. Ex quo patet, calidis regionibus hanc arborem non minù lætam, quàm paulò frigidioribus spectari. In Germaniæ & Galliæ sanè, etiam paulò frigidioribus locis, vt hortis ac vinetis, vel planis, vel in collem clatis, passim videas, diuersi generis, vt ferè nulla hodie apud nos vinea conspicitur, quæ ea crearet. In monte Pannoniæ Zysenberg diuersi generis quoque, præstantissimi, maximæque arbores, autore Clusio. Nos quoque aliquot differentias colimus in E. C. orto Montb. sed faciliè apud nos gelu conficiuntur, & difficulter in magnas arbores adolefcunt, ob frigiditatem loci.

*Tempus.*

Florant paulò post erumpentibus folijs, Martio, Aprili, tardius aut citius pro natura loci. Fructus magna ex parte Septembri perscitur: Basileæ tamen vbi magnus diuersorum generum prouentus, etiam Augusto matura habentur. Præcocia passim Augusto maturantur, & in calidis regionibus etiam citius, vt Monspelij.

*Satio.*

Persica ante brumam per autumnum feri iubet Columella. Nouembri mense, autore Palladio, locis calidis, ceteris verò Ianuario Persici ossa in

pastinatis areis sunt ponenda. Sed ossa ponantur acumine dorsum versò, & non amplius, quàm duobus aut tribus digitis obruantur. Ossa verò, quæ ponenda sunt, aliqui siccata priùs paucis diebus cineris mistione terra soluta referuant, alij sine vlla cura.

Dum tenera sunt germina, sæpè herbis circumfossa liberentur. Bimam plantam rectè transferemus scròbe breui. Nec à se longè statuendæ sunt, vt inuicem se à calore Solis exculant. Ablaqueandæ sunt per autumnum, & suis stercoreandæ folijs. Puranda Persicus in autumnò est, vt arida & putrida tantum virgulta tollantur. Nam si quid viride resecemus, arefcit. Languenti arbori veteris vini feces aquæ mistas oportet infundas. Si arbor ardore Solis siccata contabescat, frequenter aggestione cumuletur. Vespertino iuuetur humore: obiectis defendatur vmbraculis. Iuuat in ea & spoliū serpentis appendi. Contra pruinas stercore ingeratur Persico, vel facies vini, cum aqua permixta, vel, quod magis prodest, aqua in qua faba decocta est. Si vermes arborem infestent, eos cinis amurcæ mistus extinguit, vel bouis vrina, cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca sunt, nudatæ radici eius, vel trunco Lentifici, aut Terebinthi caneus affigitur, vel terebratæ in medio, palus Salicis imprimetur.

Si Poma rugosa creabit aut putrida, circa imum truncum cortex recidatur, & cum inde modicus humor effluerit, argillâ, vel paleato luto plaga retegatur.

Magna Poma Persicus affert, si florenti, per triiduum ternos sextarios caprini lactis ingereris.

Contra vitia persici proficit Spartum ligatum, vel sparrea suspensa de ramis.

Mense Ianuario vel Februario, locis frigidis, Nouembri calidis persicus inferatur, maximè circa terram furculis plenioribus, & propè arborem natis: nam acumina vel non tenebunt, vel diu durare non poterunt. Inferitur in se, in Amygdalo, in pruno: sed Armenia vel præcoqua, prunis, Duracina Amygdalis, melius adhærescunt, & tempus ætatis acquirunt.

Mense Aprili vel Maio locis calidis, in Italia verò vtroque exeunte, vel Iunio persicus inoculari potest (quod Emplastri dicitur) præcilo superius trunco, & emplastatis pluribus gemmis.

persicus rubescit, si platano inserta figatur. Arbor etiam in herbam inferitur, teste Costæo, vt persicus in Brassicam, quam rationem inferendi (inquit) ætas nostra inuenit. Nostra sanè ætate incognita videtur, aut saltem non in vsu. Nam de ea nihil Herbarij nostri. Et difficilis videtur apprehensio arboris in herbam. Experiantur curiosi.

Adfirmantibus Græcis persicus scripta nascetur, si ossa eius obruas, & post dies septem, vbi patet fieri cæperint, apertis his nucleos tollas, & his cinnabari quod libebit inscribas. Mox ligatos simul cum suis ossibus obruas diligentius adherentes. Inscipta persica nasci putat Democritus, si ex eo corpore internum os tridui madescat in aqua, dein aperto sensim ligno, nucleus intus inuentus cortice tenui æneo stylo non altè, quibus placebit literis, exareatur: dein papyro vel charta inuolutus, commissis catinis feratur: quod enim in eo Amygdalo depinxeris, hoc enarum inde pomum repræsentabit.

Rubra nascuntur persica, eodem tradente, si Rosas sub arbore conferas. Altera ratione rubra creati promittit, si post septem dies, quàm patet fieri cæperunt, (nam spontè totidem ferè diebus

Cultura.

Cultura  
nas,  
aduersa  
Germer.

Ne eadè  
fiat poma.

Ne persi-  
rugosa  
aut putri-  
da.

Vt persi-  
nascantur  
magna.  
Contra  
tia.  
Iperio.

Inferio.

Vt Persi-  
rubescat.

Vt inferio-  
pra nasci-  
tur.

Vt persi-  
nascantur  
rubra  
Alius mo-  
do.



bus aperta fatiscunt) in ossum internis ventris sinus cinnabarin infundas, mox vt cohaereant, stricthim obligata simul cum suis nucibus adobruas: Sic rubra daturas arbores perisica. Si alium quemvis infilles colorem, in talem enatam progeniem degeneraturam. perisica sine ossibus nasci tradit Africanus, si in perforatum truncum extrusa medulla, Salicis vel Corni palum adegeris. perisici poma & hac arte sine suis ossibus nasci voluit, qui sese afferunt expertos. Brachij crassitudine ramum Salicis solidum, longum cubitis duobus iubent perforari in medio: plantam perisici ramis omnibus spoliata solo capite relicto, per impressum foramen induci loco in quo confilit. Tunc eundem salicis ramum Capite vtroque demerso in arcus similitudinem incuruari, foramen luto, musco, vinclisq; astringi: anno deinde exacto, vbi infra medullam, Salicis caput plantulae sic cohaerit, vt vnitas ex duobus mista corporibus contrahatur, plantam subter incidi atque transferri, terramq; aggerari, quae Salicis arcum cum perisici cacumine possit operire: sed hoc locis humidis vel riguis conuenire. Salices aquatilibus iuuandas, vt tigni naturā vigeat, quae humore delectatur, & copiam succi germinibus minustret alienis. Sed satis de Mangonio. Quomodo Duracina & Tuberes inferantur, supra dictum. De periscorum insitione sic casit palladius:

*Ipsa suos onerat meliori germine ramis*

*Periscus, & Pruna seu sociare genus.*

*Imponique lenes in stipite phyllidis umbras,*

*Et tui desit siccior s. p. l.*

Difficulus adferuantur perisica, quia non aliud pomum fugacius, vt plinius ait: Duracina tamen palladio feruantur, condita muria & oxiaelle, vel detractis ossibus: sicorum more in Sole siccantur, ac pendunt. Idem saepe de vidisse testatur, detractis ossibus Duracina melle conditi, & saporis esse iucundi. Item bene feruantur, si vmbilicum pomi gutta picis calentis opplexeris, vt sic saepe innatare cogantur, vase concluso. Tuberes feruantur, si obruantur in milio, vel vireolis picatis & oblitris, quemadmodum & in superioribus docuimus.

perisica mala secundo excessu refrigerant & humectant, nonnullis tertio, alijs etiam quarto: vt Curtius scribit, quamvis auctores non citet. Verum in secundo Galenus & sequaces sentiunt. Dioscor. perisica Mala ventriculo vtilia sunt, & alium quoque bonam praestant, si matura fuerint. Immaturo verò eandem cohibent, sed siccata vehementius. Sumptum corundem sicorum decoctum, in stomachum ventremque decumbentes fluxiones sistit. Galenus verò tradit arborem ipsam in germinibus & folijs vincentem habere amaram qualitatem, ideoque folia eius trita, & vmbilico inposita lumbrosos necare, & alioqui sanè etiam discutiens medicamen esse. Fructum eius esculentum, ipsum videl. periscum, humidius esse & frigidius temperie. Idem alibi scribit, pomorum periscorum succum, & veluti carnem facile corrumpi, omninoq; noxam inferre. Quam obrem non post alios cibos, vltimamque, vt nonnulli solent, illa offerri oportere, quod in summo nantantia corrumpantur. Hoc verò quod omnibus commune est, memoria tenendum, quacumque vitiosi succi, humiditatis & lubrica sunt, facileque descendunt ac fecedunt, ante alios cibos assumenda esse. Ita enim fit vt & ipsi citius subducantur, & alijs praecedendo ipsis quali viam praeparant. Quod si verò postremo sumantur, vna secum alia quoque corruptioni reddunt obnoxia.

Valerianus de iisdem perisicis sic scribit. periscum in cibo est quidē stomacho inutile, eò quod succus eius cito marcescit, & caro aequè per concoctionem vitatur, verum minime graue, dummodò non diu in intestinis moretur, & ad ima semper exitu celeri festinet. perisica in cibo negant medici membra nutrire. Folia periscorum sicca & in puluerem trita, recentes plagas vulnerum cruentorum claudunt. Gummi seu gutta, quam periscorum truncus illacrymat, fluenti aluo medetur: eadem mixta cum vino, etiam in vesica lapillos frangit; (vt ille ait) Trita cum aceto imperigines reprimunt: decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperum arteriae canalem lauiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus refert, vitia pulmonis expurgat.

Plin. praeclearius sentire videtur de perisicis, quam Gal. & Valerianus. Is enim postquam dixerat: pruna alium mollire, stomacho verò vtilissima esse, sed breui momento: mox subdit: Vtiliora perisica, succusque eorum etiamnum in vino aut in aceto expressus. Nec est alius eis pomis innocentior cibus. Nusquam minus odoris, succi plus, qui tamen sitim stimulet. Folia eius trita illita, hamorrhagiam sistunt. Nuclei in aceto & oleo capitis doloribus illinuntur.

Plinio verò refragari Galenum ex supra citatis eius verbis liquet: nimirum periscorum omne genus damnavit vt prauis succi, & quae facile corrumpantur, ac noxam ventriculo inferant. Quare mirari subit, ex quorum scriptis deprompserit plinius, quod inuocua expectantur aegris. Nisi fortasse & ipse pro perisco periscam deceptus accepit, vt suspexit M. C. H. quod ad. & de periscorum nonnulli fecero. Quinquam, quod apud Diosc. dicitur de perisica, fructum cibo idoneum & stomacho vtilem, ab eodem etiam Diosc. dicitur de perisicis. Nos tamen plus tribuimus sententiae Galeni ac rauli ei subscribenti, quam Diosc. & plinij, hac quidem in re.

porro tam Diosc. quam raulus pro remedio aduersus Ceruicam praestantibus ossi periscorum rectè legatur in codicibus Dioscoridis, qui habent *periscorum ossa*: fortasse melius *periscorum ossa* legas. raulus & Nicander habent *periscorum ossa*.

Diphilus Siphnius (vt refert Athen.) libro de iis quae vescenda bene valentibus & aegris dantur, ita scribit: Quae perisica mala vulgò nuncupantur, & à quibusdam perisica pruna, succi sunt medicocriter boni, & plus nutriunt quam mala.

Philotimus libro de alimentis scribit, perisici mali nucleum pinguiorem esse, laxiorem, rufum olei multum reddere, raucedinem, stertoremque excitare: Deuocata nimirum pituita è Cerebro, exasperatisque amarore suo faucibus, vt Dalanotat. Oleum nucleorum periscorum confert dolori aurium frigido, & morbillis si illinatur. Folia trita etiam cum floribus, & expressorum succus haustus ascarides expellit purgandò. Eodem succo si linatur pecten factorem emendat. Succus foliorum instillatus in aurem vermes e- necat: ex Serapione.

Auicenna. Perisica sunt frigida in fine secundi gradus, humida in primo. Leniunt, sed cum aliqua adstrictione. Siccata magis adstringunt, & alium cohibent, quemad. & immatura. Oleum nucleorum ait conferre hemiparæ, & doloribus aurium tam calidis, quam frigidis. Matura bona esse stomacho, & excitare appetitum, modò non post alium cibum comedantur. Siccata tardius concoqui, minusque boni esse putrimenti, quam-

Folia.

Tubera.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

et omni.

uis plurimi. Vt matura leniunt aluum, ita immatura restringere. Addit, ex quorundam sententia, excitare libidinem, sibi autem videri illud verum tantum in corporibus ficis & calidis. An potius ob flatum, quos ingenerant.

Corru.

Persicorum  
novaAppeten-  
tia  
Corruentis  
Inflammatio.Cautio  
Delectum.Febres  
Corruen-  
tia  
Dolor Cap.

Quartana.

Persici flo-  
res purgas.  
Vomito-  
rium.  
Hæmops.Dysente-  
ria.  
Tussis.

Calculus.

Termina.

Alopecia.

Hæmorrhæ-  
ma.

Simeon Sethi testatur, Persica quosdam in tertio ordine refrigerantium humectantiumque posuisse: alios in primo, alios in secundo, quod exactius factum dicit. In cæteris eadem penè quæ Gal. dicit, & addit: eos qui crebrius ijs ad satietatem ventunt, febre corripitur, nempe quod celeriter in ventriculo concoquantur. Ledere & nervos proprietate quadam. Suadet itaque ut & ante cibum sumantur, & insuper meracum superbibatur. Rhodacina cibi appetentiam excitare, prodesse ventriculo inflammato, & genitali semini adijcere: sanguini tamen seroso quid putredini obnoxium preparare, sepiusque post vnum vel alterum mensem ob putredinem febres gignere, non quales sunt ex ijs, quæ Armeniaca dicuntur: illa etenim breviores, & quæ faciliè solvantur, febres facere: hæc verò longiores, & quæ difficilius solvantur. Illud etiam obseruare præcipit, ne super hæc aqua bibatur, vel cibaria acida superingerantur.

Paulus Duracena & Armeniaca, quemadmodum & præcocia meliora dicit persicis. Neque enim acescere, neque similiter corrumpi sunt autem & iucunda. E Contra Eluchastes, persica inquit, (Pferich) meliora sunt Armeniacis (Malestin) quia non ita faciliè corrumpuntur: crassiorum etiam sunt partium, tardius febrem generant, fortè intra mensem aut duos: odoratiore sunt & ventriculo gratiora quàm Armeniaca, eis alioqui similia: meliora quæ faciliè ab oculis separantur, facilius concoquantur: conferunt iuuenibus, calidis, & subtilis naturam habentibus, & in febribus ardentibus.

Arnoldus scribit, quemdam diu laborasse dolore frontis vehementi quotidie ad vespertam, frustra varijs vsu remedijs, tandem illum & alios multos curatos cataplasmate ex nucleis persicorum optimè tritorum.

Vittembergicus quoque Cento Medicus eodem varijs modis adhibitis commendat in doloribus capitis, ut contusos cum telis araneorum & oleo rosaceo.

Auicenna in quartana permittit persica: melius fuerit, ex sententia Hollerij, uti conditis. Coquantur si recentia sint, nec condita, & saccharum inspergitur: ita præbescere possunt nec nocent. Vino quoque contra errorem multorum persica infundi possunt.

Persici flores recentes autore Matthiolo esu alium deiciunt, itemque vomitiones cient. Hydropicorum aquas pellunt, si recentes in acetarijs edantur, sed non absque ægotantium labore. Arboris lachryma datur ex aqua plantaginis, aut portulacæ succo vtiliter ad cruentas deiectiones: tussientibus verò & anhelosis, ex mulla, aut tussilaginis decocto, addito croci momento.

Datur calculosis cum succo raphani, aut Limonium, ex vino duarum ritæ pondere. Nuclej tormina ventris tollunt, si deuorentur: quinetiam potantes inebriari prohibent, si seni septeniue præsumantur. Tunduntur iidem & decoquantur in aceto, quousque liquecant, pulticuli modo, ad alopeciam: namque illi mirum in modum capillos replicant. Oleum contusorum somnum conciliat cum aqua Verbenacæ, & fricti atque temporibus illitis dolores capitis ipsamque ad hæmorrhæam sedat, id quod & cremor facit. Idem oleum tam potum, quam Clysteribus

infusum Coli dolores à flatu genitos, ac etiam à facibus exiccaris, perbellè mulcet: datur pariter potandum Iliacis & Calculosis quatuor vnciarum pondere. Atque maximè calculosis auxiliatur hoc modo: sumito nucleos ossium persicorum L. nucl. ossium ceraforum C. florum sambuci manipulum, vini Cretici lib. tres: excipiantur hæc omnia fictili nouo, & sepeliantur in simo, diebus decem, deinde destillentur vitreis organis. Aqua quæ inde fluxerit, pota ante cibum, quatuor vnciarum pondere, mirum in modum rentum calculos pellit. Contusa folia recentia illinuntur vtiliter ventri ex aceto, ad interaneorum vermes. Vlceri vermifugo canum injiciunt quidam succu foliorum Persici.

Nuclei persicorum autore Dodon. calidi sunt ac sicci, aperiunt & extergunt, aduersus lignis & hepatis obstructions conducunt: breuiter Amygdalis amaris facultate ac viribus similes.

A prandij initio memineris (inquit Gesn.) ut plurimum nucleos persicor. sex aut septem deuorare, nam & lumbrices eliminant, & alijs vtilis sunt valetudini. Ebrietatem arcent præ sumptis persicorum nucleis, sicut & foliorum expressus succus jejuno assumptus cyathi mensura. Extrahitur verò ex his cum aqua rulgij succus lacti similis, quem in ore frequenter contineri Apoplecticis prodest, saluum elicit, & linguam expedit: folia persicæ amara exalfaciunt quoque ac rescitant: viscerum obstructions aperiunt, ac purgandi potentiam obtinent, quâ biliosos ac pituitosos humores per alium detrahunt. Decoquantur in aqua, sero lactis aut vino diluto. Feruntur & flores saccharo potissimum conditi ad alui expurgationem quoque facere. Gummi temperamento mediocri est: sed substantia lentum & glutinosum, cuius beneficio tenuium humorum acrimoniam obundat: phtisicis ac tussientibus in Elegante conducit, & ad omnes sanguinis excretiones, alioque fluores accommodatur.

Potè quæcunque supra ex Gal. & Simeone Sethi de noxa persicorum dicta sunt, ea Amatus de præmolibus intelligenda esse credit: secus enim ait esse de Duracenis, ex quibus optimus spirat odor, suavis, gratus, & spiritum recreans: nam eorum sapor delicatissimus est, cum quadam austeritate perceptibilis, qua mediante stomacho conducit, & ipsum roborat: quibus de causis post victum accipi possunt. Imò omnes principes Hispaniarum, & viri delicatissimi ea post victum comedunt, non nisi prius vino infusa, & nullam inde noxiam euenire persciant.

Brafaula sub cineribus coctum vnum vel alterum persicum ægotantibus suis, quum eorum instat tempus, offert, maximè saccharo aspersa, quod à nullo alio nec Hispano, nec Gallo, nec Germano medico, cum quibus abundè versatus est, vquam id animaduertisse idem Amatus testatur. Cibum verò delicatissimum esse & ægris perquam gratum & iam ab alijs quoque medicis Hispanis, viris insignibus in vsum trahi cepisse.

Siccata persica vbique ferè adseruantur. Condita ut idem testatur nuspam clariùs aut sapidiùs, quàm Genæ parantur, quanquam & apud Ferrarienses non postremè notè concinnentur, quod conditum Abinzoar libro sui Theisr maximè laudasse videtur.

Persica ad condituram laudatissima putantur præcocia & duracina. Ritè lecta manu, decorticata tenuiter cum aqua & saccharo vel melle ad consistentiam decoquantur syrupo debitam, ut supra in romis & Coroneis docuimus. Mirificè placent ægotantibus, præsertim siti & lingue aridita.



ditate vexatis, refrigerando corroborant, & in omnibus calidis morbis apprimè conducunt. Sed antequàm coquas dissecanda & nux eximenda optimeque purganda.

Condies & sic, præsertim rubra. Decorticata, vt prius, & concisa in ollam vitreâ pone & depuratum & sufficienter coctum mel affunde, vt supereminat, & adserua. Eadem ratione ex saccharo affuso syrupo parare possis. Si cui mellis sapor molestus, prius lauentur aqua fontana, antequàm ego exhibeantur. vesica quæ conditurus fructuacula esse oportet, & paullo infra perfectam maturitatem.

Mefues conditum ex persicis præscribit tale. persicorum maturorum intus & foris purgatorum, & succi persicorum aliorum suæ lingui: lib. tres sacch. alb. lib. duas: tere persica in medullæ consistentiam coque cum syrupo, secundum artem. possunt aspergi aromata, vt lignum aloës, santalum, cinnam. cubebe, macis &c. sed sine aromatibus admodum salubre est, & expertum, nam ventriculi ardorem mitigando ipsum roborat, sitim extinguit, tærum oris halitum emendat: odore præterea cor ipsum spiritumque vitalem recreat, persica aliqui in vino macerant, in fructu dissecta, atque decorticata, existimantes ita citius in venas deduci, minus asserre noxæ, ac sanguinem nihilominus refrigerare: simili ratione vitur in cibis.

Flores quoque persicorum quemad. Rosarum flores, saccharo condiuntur, pueris res vtilissima aduersus vermes & omnes putredines, quominus illi generentur. Hac confectura malis potissimum reuinis exhibenda. Ex ipsâ acetarium cum sale, aceto, & oleo parantur, quod est pacto gratissimum, aliuu leuiter leniens, bis terque purgans.

Oleum ex nucleis expressione conficitur, vt oleum Amygdalarum. Ex quo Tabern. tale remedium parat non contemnendum ad tustiores hemorroidum quos nicos & Mariscas appellant. Acc. Ol. nucleor. persicor. & Amygdal. amar. sing. vnc. j. styrcis liquide, Bdellij, sing. drach. j. Misce & locum illine.

Quæ ex floribus persicorum destillatur aqua, si eâ manè & vespèri abluatur facies, maculas delet, eamque splendidiâ reddit. auctor Rôls. in secretis.

Sed & syrupus è floribus persicorum à posteris inuentus hodie in benè institutis pharmacopolijs paratur, ad plures prædictorû effectû aptissimus. purgat n. trium vnciarum dosi, putredines arceat, ossæctus liberat diuturnus eius vsus, & in primis vermes enecat ac exterminat. paratur infusione multiplici, vt syrupus infusionis Rosarum.

Fontanonus ex ipsis persicis expressis ingeniosè satis parauit hunc syrupum. Acc. succi persicorum non absolutè maturorum, lib. duas, coque ad dimidiâ, sine vt feces subsideant. Colato adde succi Malorum Granatorum vnc. iij. sacch. q. l. coque in syrupum & clarificetur suff. quantitate santali citrini. Hunc industrius medicus probè accommodare nouit in vni præsentem.

Nec sua quoque vtilitate carent ipsa nucamenta ossæ. Nam, vt nobis pro certo asseruit industrius & ingeniosus Ill. ducis Wirtemberg. Architectus Hen. Schickart, ex ijs in carbonem redactis laustissimum & præstantissimum paratur atramentum pro impressione figurarum èr insculptarum.

Iam supra diximus, ligni materiem præ alijs ad tornum ab artificibus probari.

# DE ARMENIACIS, SEV MALIS PRÆCOCIBVS PRISCORVM.

## CAP. II.

### Armeniaca Mala minor.



Descript.

MAGNA est Arbor, quæ Armeniaca dicta Mala fert, peritæ aliquatenus a limis, cortice nigriore, caudice crassiore, firmo, ramis magis patulis brachiata.

Folia habet persicæ folijs latiora, breuiora, ad Populnea aut Betulaea quodammodo accedèria, autem subinæquata, nonnulla respectu, acuminata, denticulata, & pinnulis subtide ad pediculi amplexum, sapore acidulo. Flores ex roseo rubore pallent, Persica floribus persicæ: Fructus vero præcocior: citius maturatur, pruno æqualis, intus forisque luteus, carne solidiore sicciorque quàm persica, nec non magis lipida, quamvis aliqui diuersum statuere videantur: gustu vinoso, quæ ab officulo facillè abscedit, non ita rugoso vt persicorum, compresso modicè, vt nihilominus vrinæque protuberet, nucleum claudente ad officuli proportionem, sed minùs longum, quàm persica, & pro proportionem crassiorè, sapore inuicis amaro, quàm illius, & nonnihil ad Amygdala accedente non sine impressione aromatica. Est nobis inter naturalia nostra geminum officulum indissolubili coalitu monitosum.

Folia.

Flores.

Fructus.

Officulum.

Officulum præparatum.

### Armeniaca Mala maior.



ARMENIACA maior. Descriptio cognominatur, quæ paulò minoræ Persicæ, saltem vt plurimum, impressa lacuna sulcata, altera parte nonnihil interduca videntia & maculosa, altera ex luteo pallida, carne tenera, sed callosiore quàm Armeniacis minoribus, dulciore, grata, odorata, quæ officulum facillè relinquit, Amygdalino æquale, latius, lenius,

compressum, ab vno latere cristatum, fractu haudquaquam facile.





Schwenckf. scribit in Silesia dici: *Hein Noel* sen. Hort. Lusat. *The lesser Apricot tree* / alijs *apricotier* aut *baeuckin* Gerardo. Armeniaca maiora: *Gross Marillen* / *Gross Malleyen* / persica pauciora: *Sommerpersenen* / *Goldsperfsing* / *Malhlen* de genere sunt persicorum Schwenckf. *The greater Apricot tree* Gerardo. Hungar. *Tongari barack* / h. e. *Marinum persicum*. Sed differentia satis explicata in superioribus. Linguarum dialecti, istam nominum multitudinem inuenerunt, quas placuit in Nationum gratiam hic assignare.

Coluntur in viridariis & hortis Italiae & Gallicae. Minora etiam in Germania haud infrequentia sunt, sed maiora multò rariora. Scribit tamen Turn. se multas huius generis arbores in Germania vidisse: aliquas etiam in Anglia. Maiora in Hetruria cum ipsis etiam persicis magnitudine certant teste Matth. Eadem Luetia abundant, ubi magnae arbores: item Argentina. Minora frequentia sunt Basileae. Apud nos Montbelgardi utrumque genus vix immune, quin singulis ferè annis aliquid patiat, praesertim maius cuius summitates vtpotimum gelu marcescunt, & infructifera redduntur. Tam minora, quam maiora habentur in Asia, sed haec in hortis paucorum nobilium.

Montpelij Martio florescentes vidimus cum fructu satis iam magno, Basileae fructus maturefcit Iulij principio aliquando etiam Iulio, praesertim maiorum, vt Genea & Lugduni. In Hispania matura Maio: autore Lacina. Vidimus etiam Romae Maio, optima & sapidissima.

Inferuntur optimè in prunum. *Albercocoli* Italia dicta, quorum fructus Armeniacis ferè similis, & partim Persicis, non autem foliis. Autore Aug. Gallo, inferuntur prunis & Malis Armeniacis. Fructus qui inde emergunt admodum delicati sunt dicti *Albergeft*: qui licet possint inferi persicis & prunis, melius proveniunt ex ossibus autumno plantatis potius quam vere.

Transferri etiam gaudet. Nam vt Gesner. scribit, Persicus praecox vel Armenia cum femoris crassitudine truncum haberet, effossa & translata pulchrè crevit, & Vere floruit. De cultura plura habes capite praecedenti.

Armeniaca autore Dioscor. stomacho utiliora sunt quam Persica. Galeno verò, fructus humidus est, & frigidus, utrumque in secundo excessu. Sunt enim haec quoque ex genere Persicorum, bonitate tamen nonnihil illa superantia. Neque enim in ventriculo, vt illa, corrumpuntur, neque acescunt, vulgò autem suaviora apparent, vnde etiam stomacho sunt gratiora: cetera enim illis sunt similia. Praecocia tamen quae vocant Armeniacis sunt praestantiora. Quidam recentiores medici Dioscoridis & Galeni dicta sententia refragantur, & ea magis quam persica in stomacho corrumpi putant, vt tradunt Matth. & Dalech. quod nos vniuscuiusque experientia dijudicandum relinquitur.

Oleum è nucleis Armeniacorum expressum, mirificè valere tradunt inunctum ad inflammatas hemorroidas, & ad vlcerum tumores, ac linguae impedimentum, & pariter ad aurium dolores. Item potum vniarum quinque pondere, cum vini Cretici vncia, calculus pellit, & colicos iuuat. Reliqua vide in viribus Persicorum.

Tom. I.

## MYNIACVS ARBOR.

**M**Vniacus arbor quaedam (inquit Petr. Cresc. l. 5. agricultura) similis ferè pruno, verum magis nodosa, cuiusque fructus est magnitudinis communium prunorum, similis fructuum Persicorum in forma, valde tamen odoriferum, & in colore aureum eius po. nu. n. aërem & terram desiderat, vt prunus, solum tamen solum desiderat, non argillam, vel cretam. Scribitur semine, mense Februario, & Murtio: transplantatur in se verò, pruno & persico, & forsan Amygdalo potest inferi. Circumfodi debet assidue, & siccis temporibus irrigari, atque putrida & arida in ea recidi, atque vt prunus formari. Minus sunt humida poma eius quam persica, aut pruna, magis tamen ito. n. cho & cerebri confortatiua, cum optimè matura existunt, quod eorum color, sapor & odor aperte demonstrat.

Nos tolerissimis naturalium indagatoribus considerandum relinquitur: An Armeniaca Malus?

## PERSEA.

## CAP. III.



**P**ersea arbor Descript.

est Piro similis, in latum diffusa, perpetuaque Coma virens, ramulis ex viridi pallescētibus. Folia Lauri latifoliae habet, parte superna viuentia, inferiore verò cinerei coloris, firma, nervis aliquot per obliquū discurrentibus, odore & sapore commendata, cum adstrictione linguam mordicantia. Flos Lauri ferè copiosus, racematim compa-

ctus, pallidus, sex foliolis constans. Fructus per initia pruno similis: deinde successu temporis piri in modum oblongus, nigro colore, succundoque sapore: nucleum cordis effigie continet, gustu Castaneae aut dulci Amygdalae haud absumili. Clus.

De Persia Theoph. in quarto hist. sic scribit. Arbor est in Aegypto Persea dicta, aspectu procera pulchraque: folijs floribus & ramis totaque adeo figura Piro similis, nisi quoddam altera perpetuo, (nèpe Persea) altera decidua sit foliò. Fructus copiosus profert, omnique tempore maturum edit, nouo semper veteri subnascente. Maturat perfectè sub Etesiarum flarum: reliquum cruditiorem tollunt & reponunt. Est magnitudine Piri, figura oblongus, Amygdali speciei, colore herbida, nucem intus quemadmodum Pruni continens, sed multò minore mollioremq. Caro ei dulcis admodum & iucunda, & concoctu facilis. Nihil enim molestiarum affert iis, qui multum comedunt. Arbor ipsa radicum tum longitudine, tum

*Muniacus*  
arbor  
Pruno si-  
milis.

*Persica.*

*Satur.*

*Insura.*

*Folia.*

*Sapor.*

*Flos.*

*Fructus*  
Pruni et  
Piri facie.

*Nucleum*  
cordis effi-  
gie

*Synonyma*  
autouique  
placita.

*Piro simili-*  
lus.  
*Fructus.*

*Amygdali*  
specie  
*Nux Pru-*  
ni.

*Radix.*

*Legnum.*

*Leaves.*

Persea.  
Ph. & T. in  
Cranocolo-  
penn.  
Quibredana  
ter. al.

Nican der  
explicetur.

Perfume.

Strabo e-  
mend.

*Perleux.*

*Persia.*

Решена.

Fructus Pi-  
ri.

*Materieb.*

*Plus, eméd*

Plin. re-  
prob.

*Nax.*

311.

cum hinc et thymum. Idem facit quoque alibi,  
quando ait; perlicae arbores in Rhodo florent  
tantum. Nunc et hoc Theophrastus ait, si patet  
in praecedentibus. Verum quando idem Plin. ait,  
alibi in Rhodo, et hoc est, in Rhodo, quod  
mere illa Theophr. verbatim dicitur, et hoc est, in  
κακκαυαλον. Nunc quemad. prius, intrus habet

Alias  
error.

21; 218  
21; 218  
21; 218

*A quo.*

Nicaragua

Parleat

Решеніе  
подписано

fore fi  
the

Alabama

Alfred.

Persecution

Perficiamur

Perjica.  
solis.

Verſa  
Verſa

Verf. d.  
Verf. d.  
Verf. d.

confession  
N 16.

Cornell  
univ.

2

1



nenata, & non venenata queat esse. Quo persuaderent nobis, Perseam dictam, cum esset Venenata, & Perficum, ubi non esset. Nam si Alexandrinus in agro tantum vidit Perseam Galenus, quo tempore Perficus esset in Græcia & in Italia plurima: quid actum agant? vel Plinium legissem, qui aperto bello impugnat hanc incertiam. Nam quod affectum est Dioscor. tam Perseæ quam Perficis fructum esse ventriculo commodum, tantum adest ut eorum foueat pertinaciam, ut ijs ipsam quoque subruat occasionem desipiendi: quando illi duas, non vnam esse vident arbores. Sed quid opus est verbis: Perseæ Piro similis: Perficus Amygdalo. Perseæ semperuirens, Perficus non. Perseæ *πέρσαι ὅπως περ αἰγύπτου*. Perficus autumno tantum. Perseæ Pomum oblongum: Perficus rotundum. Illi colore viridis: huic aureus aut flauus: Illi nucleus intus minor Pruno & mollior: huic maior, ac duritia penè inuicta. Illius materia valida: huius mollis, & nullius usus. Illi nigra: huic uulgaris, ut alias multas differentias prætereamus.

Bellum verò subterfugium Agricola iniquitatis: Perseam nemo mirabitur à nobis ignorari, qui apud Galen. legerit, nullibi sub Romanorum imperio eam arborem præterquam in Alexandria à se visam.

G. Scilicet medicus Augustanus, inquit Agricola, Perficum & Perseam eandem arborem adnoscitur adstruere: postquam eandem sententiam adferre deprehendi Io. Rodericum Lusitanum, subscribere placet. Idem præterea existimat Columellam in hortulo de Perseæ scripsisse, verum nec hic in hortulo de Perseæ scripsit, nec ille cum suo Roderico rectè sentit.

Rectius Scaliger cum nondum sciret quid esset perseæ: Necessè est, ait, aliud esse perseam, quam nostratam perficam, contra Nouatorum temeritatem: nam & is aliquando dubitauerat an possit non esse diuersa. Postquam verò rationes, quas suprà diximus insexpesset in sententiam abiit.

Gesner. in epist. ad Occonem scribit nescire se quo nomine vernaculo Aegyptijs vocetur perseæ, audiuisse tamen *Amygdain* vocari.

Hadr. Jun. in emblematicis ex Theophr. perseæ descriptione (inquit) deprehendere licet perficam nostræ perfico esse congenerem, specie tamen dissidentem. Sed non placet idem perseæ arboris figuram ponens quam qui videat, & perseam norit, aut descriptionem Veterum consideret ad libitum factam liberè dicat.

Sic & Porta Neapol. cum sua cordis signatura picturam nobis dat plantæ nunquam visæ: si rem ipsam nouisset, aut Veterum credidisset placitis, non tam ex figura aucupari tentasset naturalium vires, quam ipsarum vel qualitate, vnicæ rerum actrice, vel, si quæ esset, proprietate occulta. Voluit nimirum, hoc sibi nouum tribui aucupium in naturæ factis: quantitati, vel infimæ ad eodè qualitatis speciej, figuræ, vel proportioni deberi, quod alij quæsiuissent in patibili qualitate, vel manifestas, vel sanè nec ipsi quidem manifesta.

Suam quoque hic agat personam Matthiolus. dum in Marcellum sibi vix alium quam popularem inuehitur, sic pote: Perseæ arbor Aegyptia est, (ut putat Marcellus Virgilius Florentinus) nostras Italica malus Perseica, sed planta plurimum. Olim in suis primogeniis operibus, non annotauerat ubi vidisset suam Perseam: tandem vero prodit & imaginem suis coloribus ornatam sibi dono datam fatetur Tridenti, per Odoardum Polanum medicum: qui Syrium & Aegyptum peragrastet.

Sed si vera & genuina ejus icon Perseæ, quam proponit: cur olim inuentorem vel obseruatorem suo fraudauit honore ac merito? Merebatur sine tam rara planta, & confessionem veri & indignem vltiore, propter eius difficultates, quibus Matth. seculo obruta doctilimis quibusque videbatur, sed habear ille suam figuram, & quidem eam solam, solus: quippe quam puram imaginariam existimamus: & ad descriptionem Theophrasti (atque vti bene efficitur, nobis nullatenus acceperandam, donec prodeat nouus quidam patronus, qui nos doceat contrarium.

Aliam iconem exhibuit C. Bauh. excluso nomine Perseæ secundæ & Plinij, qualis & nostra.

Rob. Const. in Lex. annotat *περσαι* siue *περσαι* *Rhod. m. Suidæ* *περσαι* dici, etiamque Aristoteli *περσαι*, lib. de Mundo.

Lob. & Penæ Perseæ, qui diuersam quoque à Perseica agnoscunt. Hist. Lugd. Perseæ America Matth. Et alibi Perseica America Clus. cum fructu. Sed prior figura nihil est aliud quam merum figmentum Matthioli: proinde ad eam nihil attinent, quæ ibi Perseæ nomine traduntur. Posterior figura quæ Clusij est, Perseam quidem refert, sed applictus Cucophoræ fructus Perseæ non est, ut ibi significatur, sed peculiaris, atque distinctus etiam ab ipso Theoph. factus, de quo nos capite proprio.

Gesl. in epist. ad Occon. Perseam inquit, arborem nostri vernaculam esse Aegypti: sed quo illis nomine vocetur nescio. Audiui tamen Amygdalam vocari. Fructus dicitur Piro similis, & os habere intus & prunum. Ioan. Placa Medicus, ut testatur Clusius, incolis regni Valentini *Mammy* dici asserbat, tamen qui nobis Americam descripserunt Hispani, aliam ab hac diuersam arborem hoc nomine insigniant. Multis post annis à Simone de Tovar Medico Hispanensi non *Mammy*, sed *Aquacate* vocari edoctus sum.

An verò, addit Clus. hac arbor Veterum Perseica sit nec ne, dispiciendum est. Plinius Perseam simili modo, iisdemque ferè verbis describit, voces ipsas commiscens, quas tamen alio loco apertissime distinguit: qui sanè locus eorum sententiæ apertissime refellit, qui Perseam cum Perseica malo eandem esse volunt. Arbor quam exhibeo flore & folio Laurum magis refert quam Pirum, fructu etiam oblongo est, qui Myxis (qualem illi Plinius tribuit) aut oblongis Prunis similior sit, quam Amygdalis, & colore (ut Placa referebat) nigro, non herbido. Itaque, ut verum fatear, tamen nonnullis cum Perseæ Theoph. descripta notis hæc nostra conueniat, mihi tamen ea aptius quadrare videtur ei, quam Plinius describit, & Plutarch. in Aegypto natæ testatur fidi gratissimam, quod fructum ferat Cordis æmulum, folio linguæ. Quibus verbis Clusius videtur velle distinguere inter Perseam Theophrasti, & eam quam Plin. & Plutarch. descripserunt, de quo iudicium esto peritotum.

Lectores quoque Solerij considerent opinionem, qui uult *Mammy* siue *Amba* esse Veterum Perseam, de qua re capite proprio. Inter eius verò scripta hæc legimus, perseam cum perficis confundit Columella. Plinius siue sua, siue typographi culpa, malè legit Perseica. Matth. Perseam sibi non visam figuram eimentur.

Dicta iam sunt, loca ex Veteribus in superioribus. Clusius scribit, valde raram esse hanc arborem: nam solo Valentino regno vnicam arborem vidisse, in monasterio D. Virginis cui cognomen

*Rhod. m.*

*na.*

*H. Th. m.*

*na.*

*Cucoph.*

*ron*

*Amygd.*

*Mammy.*

*Aquacate.*

*Solerij ep.*

*na.*

*Matth. r.*

*na.*

*Lecut.*

*1*

de Iesu, primo ab vrbe Valentia lapide, ex Armenia, vt ferebatur, edelata.

mpus.

Vere florentem confpexit idem. Autumno maturum fructum ferre intellexit à D. Io. Placa Medico & profeflore Valentino, qui ei loco dicto com-  
monftrabat. Simon de Touro Med. Hifpal. fimilem arborem in fuo horro alit. Perfion, inquit Athen. gignit Arabia.

Vires & Vius.

fructus  
ang.

Perfæ fructus, autore Diofc. cibo idoneus eft, & ftomacho vilis. Arida folia trita & infperfa fanguinis eruptionem fiftendi vim habent. Perfæ folia, vt fcribit Gal. adftingentem vim modicè participant, adèd vt queant etiam nonnunquam vtilliter fanguinis eruptione affectis partibus imponi. Paulus perfæ radicem inter menses ducentia recenfet. Apud neotericos, Europæos saltem, quantum nobis conftat, nullo adhuc experimento celebratur.

# PERSICÆ NVCI SIMILIS FRV- CTVS NVCLEO venenato.

## CAP. IV.

Vires & Vius.

fructus

Locus.

Perfæ nuci  
ei fimilis.

Nucleus  
venenatus.  
Pulpa edulis.

Cathartica, vel, vt verius loquamur, feptica. Cest huius fructus facultas, quo Indus quidam Æthiopiffam (vt refert Monardes) cuius crura malignis & inueteratis vlcibus fceabant, in puluerem redacta atque infperfo curabat, exela carne putrida. Eundem puluerem cum elychnio ifdem impofuit vlcibus, ad generandâ carnem, & vlcus ad cicatricè perducendum. Est is fructus in infula Margarita dicta admodum vulgaris, quo etiam in cibo frequenter vtuntur, magnitudine Mali Affyrij vel Arantij, nucem Perfici mali officulo fimilem continens, cuius concremati puluis (nam ob duritiem cremandum, alioqui difficile attritu) ad ea quæ modò dicta vilis eft. Nucleus qui intus continetur adèd noxius eft & deleteria facultate præditus, vt fuae homo, fuae beftia eo vefcatur, præfentaneam mortem fibi moliat, cui nullo remedio occurrì poteft, tanquam fublimatum aut corrodens aliud medicamentum fump-  
fiffet.

Hæc pauca à Monardes prodita reuocant nobis in memoriam, quæ Diofc. Plin. & Gal. fcribunt de Perfæa venenata vel lathali, quæ adhuc pauciora & dubij plena.

Huc fortè etiam referenda quæ Rauuolf. fcribit: Perfianum quemdam mercatorem indicaffe fibi de venenato fructu Perfæ, eis noto nomine Sephæ: propterea ab ijs negligi. Confer etiam quæ dicuntur de Manga venenata.

## MAMAY ARBOR.

### CAP. V

Descript.  
Folium  
Lignum.  
Fructus.  
Ossa amara.  
Custanea  
facies, Ma-  
mei.  
Exaltat fructus  
dele-  
pno.

Mamay ab Hifpanicis hiftoricis defcripta (cuius iconem lib. præcedenti cap. 45. sub titulo, Guanabano fortè fimilis Higuero, damus) arbor eft formofa, fimili modo virens vt Iuglans, alta lataque coma, fed quæ aliquantulum in pyramidem definat, Cupreffii modo, Folium longius quam latum: materies ligni fungofa: fructus rotundus & magnus, carne Malum coroneum referens, fed fapore Perfici duracini: huic infunt terna quaternaque offa, interdum plura fimul iuncta, valde amara: Gottard.

Vt Scaliger verò tradit, Mamei Castaneæ tum facies tota, tum magnitudo. Idem folium, fed maximum. Fructus non folum ingentis Perfici, fed etiam maximi Cidonij fuperat globum. Nucleus duas habemus, quas intus fert: quarum altera penè æquat Perficum, altera longè maior. Ex qua potes, addita, aut circumiecta pulpæ corpulentia, totum ambitum animo metiri. Pulpa rubro colore eft: Corium fructui fuluum. Sapor Perfici, non, vt Cardanus fcribit, Piri. Quod & testatur nucleus. Olet enim Perfici nucleum. Quod verò Cardanus ait: Nuculam effe triangularem: verum quidem eft, fed minùs accuratè piftum. Vnum enim è lateribus adèd eft obtufum, vt dorsum potiùs, quam anguli acies effe videatur. Vna planities illa, non duæ: Læuiffima, fplendidiffimæque pars hæc, colore ferrugineo. Tertium latus planius, & ad vttrumque caput cuneatum. Rostellum quoque alteri prominere geminum: fed infernè producit magis. Eius figuram quod referret, nauigium prifcum fculptum vidimus. Quod verò idem Card. fcribit, in nucula nucleum ferruginei coloris, verum non eft. Potiùs ruber eft. Eius nempe coloris, cuius vel China, vel Air, vel Ben rubrum. Odor, qualem diximus, Perfici nucleo proximùs: item fapor, verum longè dilutior. Vbi gultaris: tandem, licet lentè, ac fero, palatum acuit, ac pungit parum. Intra medullam hanc, quam alteram medullam amariffimam Card. proferunt, nullam inueni, nec vero fimile eft. Si verum eft, hæc ætatem eft. Hæc Scal.

Ouiedus tam arborem quam fructum paulò aliter defcribit, fic: Mamei arbor eft fpeciofiffima, magnæ Nucis iuglandis proceritate, folijs paribus aut maioribus craffioribus, altera parte viridioribus, palmum longis & ad proportionem latis. Huius fructus eft omnium qui in infula Hifpaniola dicta proveniunt gultui fuaiffimus, quandoque perfectè, quandoque imperfèctè rotundus, pugnos duos magnitudine æquans, aliquando minor, cortice contegitur fuluo, modicè alpero, Pirorum fylueftrium ritu, nifi durior craffiorque effet. Sunt qui vnum, alij duos tresque concludunt nucleos, in pomi medio, interftitiis diftinctos, acinorum ritu membranula tenui opertos, delibratæ castaneæ colore, quorum pulpam, fi fecueris, iudicabis castaneæ, præterquam fapore fimilem, fed interior acinus fellis eft amaritudine, delicata tunica contectus, quam inter & priorem illam membranulam caro fuae pulpa intercedit ferè fulua, Perfici Duracini gultu, aut meliori, non tamen tam succulenta eft, neque tam odora. pulpa ifti digitalis eft craffitudo in maioribus, minor in minoribus pomis.

Benzo huius fructus lemma & varietatem pauciffimis verbis comprehendit. Mamei arbor mediocris Nucis magnitudine, longiore quam latiore folio. Fructus eius in Hifpaniola infula rotundi, in continenti verò longi & craffiores, & gultu iucundiores funt, tres quatuor acinos feu interiora ligna habent pulpa in fpadiceum colorem vergente, tenui tunica, fapore aliquantum dulci.

Mamay, Gomaræ in hiftor. gen. Indiar. Item Clusio. Mamei Scalig. Ouied. Hift. Lugd. Figuram quam exhibemus ex Hift. Lugd. delumpta eft, nec videmus magnam fimilitudinem cum Castaneæ folio, quale ei Scaliger tribuit: Gomara autem & Ouiedus tribuunt Iuglandis. Haud multò felicids, fi figuram fpecies, qualem tamen illi circumfcribunt. Quod fi etiam vera dicit Ouiedus interiorem acinum effe fellis amaritudine, etiam-

Cardanus.

Alimus error.

Sapor.

Arbor  
ita dicitur.

Fructus  
fere piri.

Fructus  
aut piri  
bues.  
Castanea  
fuit  
porci  
inter  
cin  
rifi  
pulp.


Fructus.

Synonyma.



estamnum stabit Cardani sententia, alteram medellam interius luitare amarissimi nam: nec recte à Scaligero reprobentis, dicente vero id non esse fructu. Tunc in hist. Ind. O. ad Gallicè *Mangas* dici fructum cum nucleo scribit. Item Ma-

may arbor viridis ut iuglans, fructus bonus in Dariem, eadem, alio loco, p. *Mangas*. Ocean. *Mangas* est arbor alia apud Dariennenses, quæ fructum producit aurei mali magnitudine: sapore, melone optimo, haud infuauiore.



## MANGAS SIVE

AMB A.

CAP. VI.

Descriptio

*Mangas Acofta. Mangas alia Icon, Linfchortann.*

SCalig. autore: Est in Malabat Magna dicta arbor, Piri facies, cuius fructus Perfico par, aut maior: corticis color viridis immaturo. Augusto mense cum maturitate recipit luteum: simul acquirit splendorem nitorem. Caro, ut Pruno, mellei saporis. Os intus sicut Amygdalo. Immaturo condunt, ut oliuas. Amba nomen.

Acofta verò, qui Mangas siue Ambam nequitiam Piri folio depingit, ex quo nostra prior Icon de-

Arbor Piri  
facies  
Fructus  
Gercifcar.  
Tempus  
Caroli-  
clius in Pru-  
no.

Tempus &  
locus.

Maturisatis tempus à quadragesima illis ad Augustum durat ingenti passim numero & vili pretio. Ludouicus Bononiensis in Ipin. Quo etiam in Calicut nasci tradit, sicut & Munsterus in sua Cosmographia.

Amba dicitur fructus: Caudex Magna, (forte Manga legendum) Lugd. Romano. Clusius verò non refert, ad Manga siue Ambam arborem hanc Lugd. Romani, sed ad Ambare. Manga arbor Scaliger. Fructus conditus Amba, Mangas Indis, Garcie, & Castori dur. Clus. in annotat. ad Garciam: Mangas fructus in memoriam mihi reuocat Isaiama Ouedi, quam lib. 2. lux historie describit, cap. 13. tamen plus similitudinis habere videatur cum eius Anon de quo lib. 8. cap. 18. Costæ Mangas, in Cantrin Ambo: à Perfis & Turcis Amba: huius aliud genus sine officulo: & tertium sylvestre Manga brauas. Hist. Lugd. distinctis capitibus longè distitis locis de hac agit. Primum sub nomine Manga & Amba. Secundo sub titulo Mangas, cum figura Acoftæ, quasi diuerse essent arbores, & prioris loci ne verbulo quidem meminit.

Synonyma  
Clim. nota-  
tur  
Ambo.  
Mangas.  
Mangas.  
Ambo.

Mangas.  
Ambo.

Hist. Lugd.  
not.

Perseam ef-  
se Magam  
putat Sele-  
rius.  
Locus &  
tempus  
Fructus  
summis.

Noua nec hacten<sup>o</sup> dicta sua opinione prodit Sollerius. quid autem Perseam, inquit, in Calecur Magam dici & fructu Amba, descripta à Lud. Barth. lib. 3. tamè à nobis dubitatur sint ne idè. posteri nostri inuestigent. Porro quod locum & tempus attinet, Garcias vtrumque luculenter explicat, his verbis. Tanta est huius fructus suauitas, ut cum in foro prostat, Ormuz incolæ, apud quos frequens est cum aliis plurimis fructibus, reliquis neglectis, hunc sibi emant.

Colligendi tempus est in regionibus calidioribus mense Aprilis: aliis regionibus serotinis, Maio & Iunio: Interdum tamen Octobri (quem ipsi Rodolph vocant) & Nouembri.

Caterum pro regionum natura & diuersitate, variat etiam saporis bonitate hic fructus. Primas tenet is qui in Ormuz nascitur. Secundum locum obtinet, qui in Guzarate provenit, præsertim is, qui per excellentiam Guzarateus nuncupatur, magnitudine quidem reliquis cedens, saporis tamen & odoris gratia iis superior, exiguo intus osse vel nucleo. Tertium bonitatis gradum

Varietas  
delectus.  
Guzaratis  
tem.

P 3

sumpta, sic describit. Veta hæc est arbor, & multis ramis prædita, fructuque fert magna ex parte asperso ouo maiore, nonnullis interdum Indis locis binas libras aut amplius pendente: in eadem verò arborè per se colore differentes isti fructus conspiciuntur: alij enim dilati virent, alij fluent, quidam etiam ex viridi rubescunt: grati admodum saporis odorisque est: & quando non est corruptus, Duracinis Perficis (quæ a carne firmiore flauaque Melocotonea vulgò appellatur) præstat. Antequam probè maturus sit gustu adstringente est, ut ea pars quæ officulo viciniore est, accibior: sed maturus dulcis & sapidus. Prædaro putamine, vndiqueque tomento aut duris fibris transuersim & oblique excurrentibus operto tegitur nucleus longiusculus & crassiusculus, magnitudine lignæ glandis, candidus, & candida cute reclusus, gustu amaro, dum crudus est. Inuenitur etiam huius generis sine officulo, palato admodum gratum. Aliud eius generis sylvestre reperitur, Mangas brauas nuncupatum: dilute viret, aliquantulum splendet, lacteo succo abundat, paucaeque carne præditum est: nam crasso cortice solummodò intus gignitur, officulum prædurum & cartilagineum, Cotocci tamè mali magnitudine est.

Per uniuersam prouinciā Malabar, copiose provenit hæc arbor, domestica siue sativa minor, breuioribus & crassioribus foliis. Pueri his fructibus, aureorum Malorum loco, sese mutuò perere consueverunt.

Io. Linfchortannus ad suam figuram ære exculptam hæc annotat. Manga ex arboribus dependens, ad similitudinem arborum Iacæ, magnitudine Perfici sunt, colore viridi, & ad ruborem accedente. Officulum habent maius, sed ad esum nullo vsu. Interior Mægæ color ad flauedinem accedit, magni in India vsus, ut oliuarum in Hispania. Post Ananas gustu sunt maxime suauis: orizam cum hisce fructibus coquant, estque quotidianus mancipiorum cibus.

Amba, inquit Lugd. Romanus simillima est arbor frequentesque ut piro fructus: qui intra corticem occultantur ut amygdale amaræ. Condiuntur in Cadis ut apud nos Oliuæ: sed sunt longè meliores.

Tom. I.

obinet, quem Balagare gignit, maior in vniuersum supra dictis. Memini enim duos vidisse, qui quatuor libras cum dimidia penderent. Sed inter eos suauior mihi visus est, quem proferunt Chacanna. Quondor, Maduager & Daltabado, primariæ vrbes Regis Nizamoxa. Boni sunt item ij fructus, qui in Bengala, Pegu & Malaca proueniunt. Habeo in meo prædio, quod est in Bombana arborem huiusmodi fructus proferentem, quæ bifera est. Nam Maio mense fructum fert, saporis quidem & odoris gratia excellentiorem. Autumni verò sub finem aliam superiori eo ipso cõmendabiliorem, quoniam præter tempus solitum nascatur. Hæc Garcias. Costa quoque autor est, in multis prouincijs nasci, vti in Balabæ, Goa, Gazarate, Balagate, Bengala, Pegu, Malaca, aliisque Indiæ locis: at in Ormuz reliquis præcellens. In Persia sunt fructus *Uar* dicti illis, inquit Rauuolf. rotundi, rubetes, magnitudinis ferè Indicorum Melonum. Considerandum peritis relinquimus, an Mangas tantopere ob suam bonitatem commendata possit esse Wac Persis dictus, per mare delatus in Persiam.

Garcias autor est, colore hunc fructum esse ex vitidi rubefcente, & odore gratissimo. Exempto cortice editur, aut sine vino, aut generoso aliquo vino maceratus, veluti Persica Duracina. Conditur etiam saccharo, interdum & aceto, & oleo, & sale, inspersis in eius medullis Zingibere & aliis. Interdum editur cum sale, & nonnunquam elixus. Frigidus verò est & humidus, quemadmodum Persica. Eius officulis assatis alui profusua sisti aiunt, quod verum eis deprehendi. Nuclei verò recentes lumbicos, & ventris tinea necare dicuntur, quod rationi consonum esse puro ob eorum amarorem.


Vt verò Costa tradit, editur hic fructus in laminas sectus, aut sine vino aut cum vino maceratus. Conditus etiam saccharo, vt commodius adseruari possit, atque interdum cultello aperitur, & in eius medullis Zingiber recens, Allia, sinapi, sal cum oleo & aceto interperguntur, vt vel cum oriza edant, vel oliuarum conditarum modo.

Saliunt etiam, & elixant, atq; in forum venalem proferunt. Frigidus & humidus est, tamen vulgus calidum constituit, & multas mordicationes in eorum, qui vescuntur, ventriculo parere affert. Quin & indigenæ medici calidum faciunt, & vituperant, dicentes serpiginem, Erysipelas, biliosas febres, phlegmonas, & scabiem generare: quod fortè accidit ab eius in ventriculo corruptione: sed eo tempore quo inuenitur hic fructus, propter immoderatam æstum, in similes morbos incidunt, etiam nonnulli qui illo abstinent. Tostus llignas glandes sapit.

Genus syluestre *Mangra brava*, ad eod præsentis est veneni, vt indigenæ illis sese mutuo perimant. Nam si quis paululum ediderit, illico moritur. Interdum oleum admiscunt, ad exacuendam eius vim, vt ceteriorem perniciem adferat. Sed quocunque tandem modo sumptum, ad eod celeriter perimit, vt hactenus nullum sit repertum antidotum ad illius vim compescendam. Cum venenata *Mangra* conferri possunt, quæ antè dicta sunt, de Persica Pomo, simili fructu venenato, & Persica Vetrum & Rauuolij venenata.

# AMYGDALVS, DVLCIS ET AMARA.

## CAP. VII.



**T**A M arcta Defoliis Amygdali est cum Persicæ foliis similitudo, vt difficulter distingui possint: oblonga, angusta, acuminata, crenata, valdè obscura, maior autem lentore prædita. Flos quoque non abominis, nisi maiore candore participaret, folia præit: magna quoque eorum similitudo cum floribus Malorū. Poinum Persico

non ineptè compares, sed compressum & in arcum tensum, puluinato callo, minus spisso, eduli, acidulæque dum tener est, spontè, in maturitate tendente fructu dehiscente, & facile officulum læue superficialibus serobiculis peritiam relincente: putamini aliàs fragili, aliàs duro, nucleus inest dulcis, cucicula tenui ruffa, veluti puluisculo resperst obductus, tam in culinæ quàm scplasiæ vsu: vel amarus officinis magis expetitus. Lachrymam quoque plorat in gummi in crescentem arboris pla. Gemellum nobis obseruatum Amygdali officulum, quod inter naturalia nostra adseruamus. Radix quæ ex medio trunco descendit, autore Theoph. pargrandis est, & alè demissa citò germinat.

*Αμυγδαλή & Αμυγδαλή* Diosc. pro arbore, & *αμυγδαλή γλυκύτης, & ἐπιδυμένη*, Amygdalæ dulces & esculentæ, vt Interpretes vertunt numero plurali. Hippocrati antiquissimo Medico fructus dicuntur *αἱ αμυγδαλῆαι* l. 2. de Diata. Item l. 2. de morb. in febrī singultiente, Amygdalæ. Lib. verò tertio de Ictero: *καρπὸν θάσσου κασιδιάρδα*: Nuces Thassie decorticatæ habentur: ex quo loco videtur apparere Hippocrati Amygdalæ & Nuces Thassias differre. Idem l. 2. de morb. mul. Amygdala præscribit: & l. 2. Amygdala amara depurgata, aliquoties. Apud Theophrast. quoque passim *αμυγδαλή* legitur pro eadem. Ab aliis tamen *αμυγδαλή* tam pro arbore quàm pro fructu scribitur: aliis pro fructu tantum, qui & *αμυγδαλον* dicitur. Et *ἡ αμυγδαλή* pro eodem apud Lucianum. Amygdalus arbor, *Νυξ* pluralitè dicitur: Vocatur & *Νυξ Græca*, & *Νυξ Ἰθαία*, & similiter *Thassia*. Amara verò etiam *καρπὸν πικρὸν* id est, Nuces amaræ Archigene autore apud Gal. *κασιδιάρδα* fit mentio apud eundem. Ita & Cloarius voluit Amygdalam eandem esse cum *Νυξ* Græca & Thassia. Amerias verò Amygdalum Myserum vocari tradit.

Porrò, Theophr. de Amygdalo multa sparsim tradidit. Abundè fructificare, ideoque citò senescere: sed ætate grandiore reddi fecundiorè: Non plagam tantum sed & scissionem ferre: Stilarè

Esfera.

An Vtue  
Persarum  
Fauisvoss.  
Vires &  
Vius.

Cibus.

Tempe-  
ram.  
Officula ad  
alui pro-  
flumum.

Vermes.

Qualitas.

Nocumen-  
ta.Mangas  
brava  
Ученый  
журналист.Persica po-  
mum Scia-  
naron  
L'orga.

Defol.

Folia.

Flos.

Fruct.

Officu.

Liber.

Synor.

que p.

Amyg.

Amyg.

Amyg.

Nux p.

Nux p.

Capit.

Crisi.



lare gummi, interdum copiosius fructificare, quam producere folia, quæ etiam nonnunquam ob fructuum multitudinem cerni non possint, quoniâ natura se totam ad fructuum generationem direxerit. Damnosam esse arborem, quoniam & viribus sit robustis, & radicem habeat numerosam. Culeu transire ex amara in dalem, idque triennio post: tardè folia amittere, florem foliarum, quarundam subrufum: fructificare ex annotinis fuculis: Eit. & extreme germinare non posse, nisi id raro & præter naturæ consuetudinem eueniat. Quin & rami prægrandis eiusdem germen raro erumpere. Amittere maxime suos fructus antequam maturescant, quod & neu debili hæreat, & mole grandiuscula sit vt faciliè à ventis decutiat. Quandiu vires ac recens est Amygdala, aquosa sentitur, siccescens autem pinguiscula redditur. Non diu durat quemad, nec luglandes, quia raro minimeque compacto putamine obecta. Seritur avulsione, semine degenerat: cultu miscet.

Idem auctor Amygdalæ Corni tribuit folium, nisi quodd pinguis crassiusque sit; Et alibi scribit, fructum Therebinthi in India similem esse Amygdalis, etiam magnitudine. Dioscori, Pæoniæ filiquas, [ *λεβέ* ] *ἀμυγδαλίας* similes dicit.

Corn. Celsus Amygdala amara, nuces amaras generatiori voce nuncupat: sic enim Pantinus eius Commentator explicat.

De Amygdalis sic Plinius. Tertia ab his [ auelanis ] natura Amygdalis, tenuiore sed simili luglandium summo operimento: item secundo putaminis. Nucleus dissimilis latitudine, & acriore callo. [ de amaris hoc verum, non de dulcibus, dal. ] Nec arbor an fuerit in Italia Catonis ætate, dubitatur, quoniam Græcos nominat, quas quidam & in luglandibus, præterea in *λεβέ*, *ἀμυγδαλίας* verò Nucum Caro meminit c. 8. Per quas Varro l. 1. c. 6. Amygdala intelligit, vt faciliè colligimus ex diuersis locis alijs, præterea l. 2. c. 9. cum ait: Quidam Nucibus Græcis in aqua tritis perungunt canum aures, & inter digitos, quodd muscæ & ricini, & pulices solcant (h hoc unguine non sis vltus) eos exulcerare. Item l. 1. c. 16. Apes morbidas fieri tradit, propter primores vernos passus, vt florum Nucis Græcæ atque Corni, indeque Catenis fieri, atque vltima pota refici.

Miramur verò Dalechampium in suis ad Plin. annot. ad l. 23. c. 9. hac Varonis loca citata ad Nuces luglandes referre. Nam per nuces Græcas neutiquam luglandes esse intelligendas ex ipso apparet Varrone, qui l. 1. c. 16. eas nominat luglandes, & quid per eas intelligat satis aperte demonstrat, vt ostendimus in luglandis historia. Locus ubi melius prouenit ait Nuces Græcas, optimè cõuenit Amygdalis. Præterea Amygdala vltima esse aduersus muscas ricinos & pulices, verisimile est. Luglandes sanè non florent vel flos ferunt cum Corno: Amygdalus autem est prima quæ floret post Cornum, & sepe simul cum ea. Idem tamen Plin. manifestè, vbi de Amygdalarum viribus agit, nuces Græcas nuncupat.

Ceterum non minor nobis occasio dubitandi quæ fuerint nuces Græcæ Columellæ, quam Plinio, quæ Catoni. Colum. de re rust. l. 5. vno & eodem capite, nempe nono, meminit Nucis Græcæ simpliciter: & Nucis Græcæ ac Auellanæ Tarentinæ (qua ratione nimirum tales facere oporteat) luglandis & Castaneæ: & in fine eiusdem cap. Amygdalæ. Item lib. arborum c. 22. eadem scribit quemad. & de Amygdala c. 25. Columellam tamen per Nuces Græcas intelligere Amygdala id fortè

demonstrat, quodd Palladius, qui Nucis Græcæ non meminit, in Ianuar. tradit de Amygdalis, quæ Colum. de Nuce Græcæ: nempe de maceratione faciendâ in mulla, & de faciendis Amygdalis nucibus teneribus. Repugnare tamen videtur, quodd hic eodem cap. scribat de Nucibus Græcis & Amygdalis, quodd tamen, vt ipsi non insolens, fortassis excusari posset, si exculationem non respueret notitiam diuersitatis. Item quodd Palladius, vbi scribit de teneribus Amygdalis, non eundem doceat modum faciendi, nec nominet Tarentinam, ac omittat Auellanam Tarentinam. Item quodd postea alio capite nempe de Nuce luglandæ doceat, quomodo Nux luglans faciendâ Tarentina. Sed rursus, quæ antea ex Varrone adduximus loca facere videntur pro ea sententia, quæ statuit, Nuces Græcas Columellæ esse Amygdala. Sed de hac re doctorum esto iudicium.

Consulamus Athenæum. Carya [inquit] id est, Nuces, & Attici, & alij Scriptores communi vocabulo fructus omnes operimento duro rectos appellant: Epicharmus verò, vt nos per excellentiam Amygdalas vocat *καρυοειδὴν κάρνα*, [ quidam calidas nuces interpretantur ] id est, Nuces quæ pro bellarijs tostæ mensis apponantur. Philyllius:

*Sorba, Nux, Amygdala.*

Heracleon Ephesius scribit, & Amygdalas, & quas nunc Castaneas appellant, Nuces vocatas fuisse. Carya, id est, Nux arbor, legitur apud Sophoclem. Amygdalas Navias Veteres celebrant: nec immeritò: quandoquidem in ea insula gignuntur egregiæ, vt mihi persuadeo, inquit Athenæus, l. 11, c. 1.

*Dentes molares omnes rupi: ita vt*

*Nec Naxiam quidem Amygdalam frangere possim.*

Herodianus Alexandrinus auctor est Amygdalas dictas fuisse, quodd sub virenti cortice illarum putamen *τὸ κατὰ τὸν ἄνθος*, i. e. mulco sanctificatu & vultu discissum atque fissum. Neutro genere Amygdalum etiam dicitur Diphilus,

*Bellaria, Myrti bacæ, placentæ, Amygdala.*

Sed de vocis tono atque accentu, vbi statuendus sit, ambigitur. Pamphilus quidem censet, cum fructum significat, vltimam syllabam graui norandam esse, vt in hoc dandi casu *ἀμυγδαλῶν*: at cum pro arbore usurpatur, eam syllabam circumflexam ligandam esse, *ἀμυγδαλῶν*. Aristarchus æquè fructum & arborem cum acuto in penultima profert. Philoxenus in vtroque significato circumflexum addit. Eupolis:

*Ναὶ μὰ τὸν ἀμυγδαλῶν*: id est, Per Amygdalam tu me perdisti.

Aristophanes. Agedum, has *ἀμυγδαλῶν* sume, caputque tuum saxo frangito.

Phrynici: *ἀμυγδαλῶν* tussis remedium optimum est.

Quidam in vltima cum graui *ἀμυγδαλῶν* pronunciant. Typhon in opere de Atticis accentibus, fructum *ἀμυγδαλῶν* cum graui tono in vltima; & genere foem. dixit, quodd neutro *τὸ ἀμυγδαλῶν* nos efferimus: arborem autem *ἀμυγδαλῶν*, vltimæ syllabæ circumflexo tono adiecto, quia præter fructus intellectum, ea vox possessionem demonstrat, cum illa nota & specie. *ἀμυγδαλῶν* namque arbor Amygdalas fructum parit, alit, fouet, & tanquam sobolem suam habet & tuetur.

Porro huic tam anxie accentus & scriptio inquisitioni Athenæi optimè quadrat quodd Galenus de alimentis alicubi scribit: Qui se Atticos appellant, alij fructum genere fœminino Amyg-

*Nuces.*

*Caryotro-*  
*gonia nuc-*  
*Calidanus*

*Nuces:*  
*Nux arbori*  
*Naxia.*

*Amygdala*  
*unde dicta.*  
*Amygdal.*

*Tussis rea*  
*medicam.*

*Amygdalæ*

*Athen. not.*

dalas enunciarī oportere contendunt: alij neutro Amygdala: ne id ipsum quidem, de quo tanto pe-  
re contendunt, intelligentes, utroque nomine apud viros Atticos scriptum esse.

Pamphilus in glossis apud eundem Arthen. ait: *μυγδαλὴν* à Laconibus vocari *καρυοκατάκτυλο* (Nucifrangulum: qua voce vsus est Plautus, nimirum instrumentum, quo franguntur nuces Amygdalæ, & reliquæ) pro Amygdalocatacte, quia Lacedæmonij *καρυόκτυλος* vocant Amygdalas.

Magna verò huius arboris æstimatio, etiam in sacris literis, & apud populum Iſraeliticum, quod in hanc ipsam, Aaronis virgam siccam, ineffabili metamorphosi permutari rerum Creator summus, vt Num. 17. legimus. Quam virgam ita floridam, Iudaicus postea populus in suis nummis, quos *ſilos* vocant, designari curauit. De qua re eleganter D. Augustinus, vt omnia, in opere suo de mirabilibus sacre Scripturæ. Aaron, inquit, virgam inserto nomine acceperat. Crastino manè Aaron virga gemmulas Amygdalini floris ostendit, quo patebat Aaron præ omnibus in sacerdotium Dominum elegisse: nec tamen in hoc contra naturam virga monstratur aliquid effecisse. Sicut itaque virga Aaron genuit in populo Iudæorum, ita crux Christi floruit in populo Gentium. Quis autem iste est fructus quem attulit?

Amygdalas, inquit. Amygdalæ fratres, nuces sunt. Qui fructus primo quidem indumento amarus est, sequenti munitur ac tegitur, tertio tumentem pascit ac nutrit. Nam quia sacramentum sacerdotale est virga nucis: iccirco arbitror etiam Hieremiam, qui vnus erat ex sacerdotibus ex Anoth vidisse virgam Nuceam.

In Canticis Canticorum, sponsa dicitur descendisse in hortum Nucis, vbi etiam pariter cum Nucibus sacerdotalium quodammodo pomorum copiam perscribitur inuenisse. Ait scriptura: Ecce genuit virga Aaron in domo Leui, &c. produxit frondes & protulit flores & genuit nucas. Et alibi, de vnitatis trinitatis & incarnatione Verbi. Virga Aaron post alterum diem inuenitur subito produxisse flores & frondes & peperisse Nucas, &c. Virga ergo potuit contra naturam Nuces educere, Virgo non potuit contra nature iura Dei filium generare? Dicit igitur mihi Iudæus incredulus, quemadmodum arida virga floruit & fronduit, & Nuces protulit? Virga Aaron, Virgo Maria fuit, &c. Nux trinam habet in suo corpore substantiæ vnionem, corium, testam & nucleum, &c. Non autem intelligimus, quid velit D. Augustinus, quum ait: qui fructus primo quidem indumento amarus est, & postea lignum in testa: nam ista Nuci iuglandi potius conueniunt quam Amygdalo. Nisi per amarum intelligamus non edulem corticem acerbum, quem ille *καρυόκτυλος* amarum dixerit, tanquam non edulem: quanquam & tota Amygdala tenella comedatur, etiam cum extimo cortice. Sed in Theologo de de re medica aut herbaria non nisi *καρυόκτυλος* tradente, *καρυόκτυλος* exacta non postulanda.

Sciendum porro ex D. Hieronymo quod vbi nunc 70. Interpretes posuerunt *καρυόκτυλος*, ipsum verbum sit *σώκεδ*, quod in Hieremias principio est: sed ibi in Nucem versum est, hic Amygdalum, &c. vide Saced. Et placuit quidem paucula hæc & ad Amygdali encomium atque historiam facientia hoc loco in medium adferre: qui plura vult, consulat ea de re Theologos: nos quæ nature sunt hic potissimum perscrutemur.

Arabes *Λαυζ* vocant tam dulcia quam amara

Amygdala, vt est apud Serapionem. Bellun. apud Auic. *Λαυζ* Amygdala conuertit: quidam etiam *Λαυζ* scribunt.

Ceterum quod supra de Nuce Græca obiter attigimus, hic denud in quæstionem venit. Nam est Columella videatur diuersa statuisse genera, Nuci Græcæ, Iuglandis, Amygdalæ, & libro 5. scorsim Amygdalæ feracitatem profecutus sit, per Græcam tamen Nucem tantum Amaram Amygdalem eum intellexisse suspicatur Ruellius: Num primam (inquit) Nucem Græcam gemmascere fateatur, quod Plin. de Amygdala confirmat: qui ex iis quæ in hyeme Aquila exoriēte concipiunt, florere primam omnium Amygdalam mense Ianuario prodidit. Martio verò poma maturescere. Eandem antequam deponatur, in aqua mulsâ nec minus dulci maceradam Lucius censet, vt iucundioris saporis fructum, quum adoleuerit, præbeat, & interim melius atque celerius frondeat, quod de amara Nuce vt amarorem extat intellexisse Columella facili crederetur: nisi diuersis locis rem eandem reperat, & quidem tunc vsurpatis. Nam nisi Nuci Græcæ vocabulo Amygdalum complexus fuisset, prætermisissæ eius ratione non explicuisset, quomodo fertilis redderetur, inquitens: Amygdala si parum ferax fuerit forata arbore lapidem adigito, & ita librum inolescere finit.

*Κάουον* *μυγδαλὴν* Nux amara Celso, id est, amarum Amygdalum, siue Amygdala amara Rob. Const. Placotomus apud Eob. Hessum de valet. tractada, Amygdala amara, tradit alias Nuces amaras dici. David Kyberus in Lexico Nucem Græcam siue Thasiam Amygdalum interpretatur.

Amygdala dicitur *Σαβὰδ* Hieremiæ, id est, Hebræis, autore Trago: qui addit, Catonem Amygdala Græcas nuces vocasse. Verum ex loco supra à nobis citato vix elicias Catonem per Nuces Græcas Amygdala intellexisse, nisi aliam habeas coniecturam. Addit verò Trago eius verba aliquos priuatim de amaris intelligere.

Quin & Cordus & Lonicerus apertè dicunt Amara Amygdala alio nomine Græcas nuces appellari.

Anguillara verò scribit per Nuces Græcas intelligi oportere Amygdala cum suo cortice, quum virent. Mirabilis verò est cum sua censura, quando ait in epistola quadam: de Amygdala Dioscoridem agere capite proprio, cap. verò de Præonia Nuces Græcas dici: quod nec vllus vnquam ex eo nos docebit capite. Fieri potest, vt interprete priore loco Amygdala, posteriori Nuces Græcas conuerterit: Verum quid hoc ad Dioscoridem? Posteriori loco nihil aliud de Amygdalis habet, quam hæc verba *καρυόκτυλος* *καρυόκτυλος*. I nunc, & interpretibus fide, sua licentia eandem vocem diuersimodè conuerteribus, præsertim propriam, & hoc tale significantem.

Goropius in Vertumno scribit nomen etiam Amygdalis commune esse: Iuglandes non magis nocere capiti, quam Amygdala: qua ratione, indagari poterit inter vires Nuci Iuglandis.

Monachi apud Mesuem de re medica & Pharmaceutica statuunt: Vbi quæ simpliciter scribitur Amygdala, intelligendas esse dulces: ad compositionem autem Diaphanici amaras esse capiendas. Levin. de Biblicis plantis: Amygdali, inquit, fructus Zirzais Amandel *Amandel*: Dulcium Amygdalarum comæatu Iacob Patriarcha filios instruxit. De Amygdalo Salomon in Ecclesiaste. Idem Iacob virgas ex Amygdalo posuit ante ouium oculos. De Aaron Virga supra. Denique Herbarij

*Macerab-*  
*cor*  
*C. amygdala-*  
*c.*  
*Amygdala-*  
*c. sacre.*  
*A. u. eros*  
*Magna A.*  
*amygdali in*  
*ſacra. & apud*  
*populu*  
*Iſraeliticu.*  
*æſtimatio.*

*Amygdala*  
*nux.*

*Virga nu-*  
*cea.*

*Pulchra cō-*  
*paratio.*

*Alia com-*  
*paratio*

*Saced*  
*Abbr.*

*Arab.*  
*rab.*

*Laure*

*Nux*  
*ca for*  
*mygdala*  
*Alatru*

*Nux*  
*ra.*

*Amygdala*  
*amara*  
*Nux*  
*ca*  
*ſacra*  
*ſchab*  
*Hebr.*

*Nux*  
*ca.*

*Amygdala*  
*nos.*

*Interp*  
*lucen*

*Garyal*

*Amygdala*  
*luc in*  
*erit lita*



Herbarij omnes Amygdali vulgato nomine tam ad designandam arborem, quam fructum ipsum veniunt.

Germ. Mandelbaum: Mandlen & Mandelfern. Belg. Amandelboom, Amandel. Gal. Amandrier, Amandres, & Amende. Ital. Mandola. Mandole. Hisp. Castil. Almendra, Almondas: Catal. Amellos: Portug. Amendoas. Anglic. The Almond tree. Bohem. Mandlij. Vngaric, vt refert Clus. Mondola / amygdalus dicitur.

Quoad differentias: autores penè omnes suprà citati, tam Græci quàm Latini, alique dulces agnoscunt & amaras, tanquam præcipuas differentias. Aliquorum tamen diligentia etiam aliæ obseruatæ sunt, qualis est illa de qua Athen. scribit, præstantes nasci in insula Cypri, diuersi ab ijs quæ alibi proueniunt figurâ: sunt enim (inquit) & oblongæ, & in summo reſcæxæ.

Seleucus in Linguis scribit dulces Amygdalas à Lacedæmonijs vocari Tenios: ampliores verò nuces, Myceros: At Amerias, Myceros Amygdalas dicit tradit. Gesnerus tradit, esse etiam Amygdalum, nuces rotundas ferentem: & aliam Peritico insitam, (de qua nos postea) in horto Matthiæ Curtij.

Tragus tria facit genera: putamine duro: alia molliore: tertia amara.

Matth. dulciam plures facit differentias: magnas, paruas, mediocres, compressas, rotundiores: quarum nonnullæ durissimæ, no integuntur operimento: aliæ fragili: sunt item quæ duplici constant nucleo. Nos & omnes has differentias obseruauimus, & in naturalium nostro thesauro etiamnum adseruamus: His adde Amygdala lanugine carentia, de quibus postea. Amygdalæ minores vulgaribus per omnia similes sunt, quibus etiam sapore & facultatibus respondent: multò tamen, hoc est, triplo aut quadruplo minores & ad proportionem gracilem continent nucleum. Hæ, ex obseruatione Cordi, quoque duum sunt generum: vna enim amara, altera dulces producit. Adferuntur adhuc putaminibus suis incluse cum Gallicis Atitacis alijsque medicamentis ex Asia aduehi solitis.

Amygdalæ fragili & flexili putamine multiplici ratione à vulgatis differunt. Primò putamen nullis foraminulis habent punctatum aut scarificatum, sed quodammodo sulcatum potius, cui extrinsecus venulæ albæ ex carne separata residuæ adherent. Latitudo vncialis ferè, longitudo vncia maior, cortex quauis luglande aut Amygdala fragilior, cæteris tenuior, nihilominus pulchros & benè succulentos intus continet nucleos, nescio quid in ipso etiam gustu, si rectè iudicamus, à vulgatis discriminis, habentes. Leuissimo digitorum pressu vel quamuis huius generis puer decennis facile frangat, quod in cæteris vis mallei vi præster. An hæc fortè sit Nux Græca Tarentina Columellæ: Nux tenera Amygdali Palladio. Amygdala putamine molliore dentibusq; fragili, Trago.

Lanugine carentium Amygdalorum meminit Cæsalpinus, his verbis: Amygdalorum fructus tenellus, antequam os induruerit, cibus gratus est, subacidus: laudantur in hunc vfum, qui lanugine carent & grandiores sunt: huius gratia inferere solent super Prunum

At maximi generis nuces quas habemus, duas vncias longæ, vnciâ latiores, sed ad proportionem compressæ conspiciuntur, tales quoque nucleos, nempe longos & compressos continentes. Extrin-

secus alicubi striata testa apparet, crista per ambitum eminenti & acuta.

Mediocria vncia longiora, latitudine inferiora, leuiori prædictis putamine, crista minori, obtusiorique, minùs frequentibus punctis notata, interrim ventriosiora, eius generis putamus, cuius nucleï passim in officinis prostant. Huius generis geminam habemus, tam fabrè vinctam, vt nates puerili pulchrè repræsentent.

Minimi generis Amygdala, minùs reliquis omnibus compressa, sed ferè ad Cylindri rotunditatem accedentia, triplo longiora quàm lata, mediocribus quàm maximis putaminis leuore similiora, pulchellum sui generis nucleum continent.

Post differentias locum teneat delectus. Amygdalæ tam dulces quàm amaræ probantur flauissimæ, plenæ, integræ, non contractæ nec erosæ, tamen leues, duræ & siccæ, quantum illis datum est, ob id fragiles, intus albidissimæ. Ex his dulces, sapore delicatæ, propè indicibili in Castaneam roſtam & panis purissimi benè cocti qualitatem inclinantes, odore ante esum nullo, aut perquam exiguo, inter edendum autem iucundo, quales Venetis omni penè tempore, potissimum circa Autumnum habentur: quo tempore nos ibi comedisse meminimus. Tales aut his fortè meliores adhuc, Monachi celebrant apud Mesuen, quando aiunt, ex dulcibus meliores esse Apulienſes, quæ Ambrosinæ cognominantur, fortassis à saporis suauitate. Ex amaris, magna, succulentæ, integræ atque recentes præferuntur.

Amygdalis, vt scribit Theoph. locus gracilis, serenus atque apricus longè commodior est, (seu, vt ait Palladius, durum, sicum, calculosumque solum, coelumque calidissimum) quàm humidus, ad alendum & augendum comparatus: nam si altus sit atque pinguis, nimia pabuli vbertate lasciuientes sterilesunt: sunt tamen qui inter vites serendas censcant, tanquam innoxiam & alimento mediocri contentam, & simul quod maturè fructificet, nec latè inumbret, minimè grauem. Sed hi non rectè existimant. Vmbra enim, & serus fructuum prouentus, non tam infestant, quàm radicem vires: rapiunt enim alimentum suo amplo discursu, implexuque enecant.

Porro in Creta horri abundanti Amygdalis: In Italia familiaris est: In Galloprovincia Delphinatque consistunt planities patentissimæ: Ex quibus dulce illud oleum, quod & nobis interdum, in mensa buryi vice crudum experitur, Lugdunum, & inde in diuersas prouincias importatur. In genere dicendo, Loca amat Amygdalus regionisque calidiores, atque iccirco vberior adoleſcit in insulis: præsertim quæ pluuijs intempestiuis non infestantur: & ob hanc & frigidam coeli temperiem, difficulter nascitur aut fructum facit in Belgio, teste Dod. In Anglia maturant interdum nuces, autore Lob. Circa Argentinam complures sunt. Reperiuntur in tractu Rheni non paucis locis: sed primas in Germania nascentibus tribuunt in Spirenſi agro natis. Camerario teste, in Germania hodie copiosè proueniunt, Laudatissimæque Landauienſes. Turnerus scribit in Anglia quidem esse, sed nullo fructuum memorabili prouentu. In Alſatia haud infeliciter benè cultam prouenire nouimus. Quicquid sit præstantiores semper Germanicis Prouinciales & Narbonenſes, quæ Lugduno ad nos aduehuntur, solidiores & minùs rugosæ. Sic videas Genueæ prouenientes Prouincialibus multò esse rugosiores. Basileæ paucis hortis colitur, sed tamen ad frugem interdum prouenit

Amygdala  
mediocria.

Delectus.

Ambrosinæ.

Locus.

Amygdalas  
non inter  
vites serenda.

Delectus à  
regione.

*Amygdalus  
Glabrescens.*

*Amygdala  
runcra cor-  
tico.*

Tempus.

Satio.

*Et Reg-  
neret na-  
scantur.*

Rauwolf. tradit circa Tripolim in sepibus syl-  
uestres prouenire Amygdalas, quarum fructus  
copiosè circumferant Mauri pauperibus diuen-  
dendos. Nos quoque Amygdalas aliquot colim-  
mus Montbelgardi sed facile gelu caſtigantur,  
quominus ad perfectam frugem perueniant. Ar-  
gentinæ vidimus apud insignem mercatorem A-  
mygdala ex Italiæ Genua delata ita tenero corti-  
ce, vt facile digitis attererentur: nos nuces plan-  
tauimus Montb. in hort. Il. E. C.

Ex his quæ hyme, Aquila exoriente concipi-  
unt, florēt omnium prima (autore Plinio) A-  
mygdala, mense Ianuario. Martio verò Pomum  
maturat. Sed de Italia sua loquitur. Sic Cæ-  
ſalpinus & ipſe Italus. Floret inquit, Ianuario:  
Martio fert matura, id est, eſui apta. Mirum  
intra mensem matura fieri Amygdala. Placet  
ſectio Plinij, non maturat, ſcribentis. Palladio  
& Columellæ maturant muria Oliuæ. Ma-  
tura eſſe aliud eſt, teſte Cic. qui lib. de ſeneſc.  
ſcribit, Poma ex arboribus ſi matura decidunt. Si  
quæ tamen dicat tenellos fructus qui eſui apti, di-  
ci poſſe maturos, per nos licet: modò concedat  
improprie id dici. Si autem Plin. & Cæſalp. per  
maturat & matura fert, intelligat ita matura  
Martio, vt decendant, id notatu dignum, præſer-  
tim quod Marth. tradit. In Apuleia Siciliæque  
optimè copioſiſſimæque florere vere, legi Augu-  
ſto. Eſto, Ver ſit in Apulia Ianuario, vt poret  
regione calidiſſima: at Auguſto demum legi ibi,  
cui regioni nulla Roma vel quævis alia Italiæ ci-  
uitas comparari queat cœli calore, nihil aliud eſt,  
quàm dicere, citius Romæ maturari non poſ-  
ſe.

Circumſpectè Do donæus: Floret, inquit, eod-  
em quo Perſica tempore: ſubinde Iulio ad  
perfectiorem perueniunt Amygdala. Florentem  
nos vidimus Monſpelij Ian. & Feb. vbi abundant  
dulces pariter ac amara: Parauij & Lugduni  
Feb. & Martio: Geneuæ April. principio: & ita Ba-  
ſilæ, aut Martio, ſi citius ſit cœlum veris: aut  
Aprilis, ſi ſecus. Ita vides pro climatum diuer-  
ſitate variare florendi tempora, quod nunc ſemel  
pro ſemper (vt aiunt) dictum eſto. Flores Para-  
uij vſque adeò Pomorum floribus ſimiles obſer-  
uauimus, vt facile eis, qui prius non viderint,  
imponent, niſi tempus florendi diuerſum, & cor-  
tex Perſicorum cortici ſimilis, diſcriminarent.  
Omnia verò Amygdala puluinati calycis operi-  
mento tamdiu obſecta manent, quoad matureſ-  
cant: tum demum abiciunt, haud ſecus ac Iu-  
glandes, id quod Autumno locis minùs calidis  
fieri ſolet. Florem paulò poſt excipiunt folia,  
Salicis haud admodum diſſimilia.

Porro Amygdalæ, etiam ſi non pluât, dummodo  
aër Auſtrinus nubiſque ſit, amittunt & flores, &  
primos fructus, ſi in flore vel poſt inciderit, auto-  
ribus Theoph. & Plinio.

Nunc de ſatione & cultu aliquid dicendum.  
Magus apud Plinium Amygdalas ab occaſu arcu-  
ri ad brumam ſeri iubet. Idem & Græci tradunt:  
nam verno ſatu diſſiciliùs comprehendit, quod ar-  
bos ea præcoci partu germinet. Pangitur auulſo  
ramulo, viuiradice, & ſemine. At autore Palladio,  
ſeritur Ian. & Feb. Item locis calidis Octobri &  
Noſembri, ſemine & plantis, quæ de maiori rade-  
ce tolluntur. Sed in hoc genere arboris nihil vti-  
liſ eſt, quàm ſeminarium facere. Nuces verò quæ  
ſeri debent, pridè liquido ſumo macerantur: alij  
aqua mulſa madefaciunt, in eaque noctem ſolam  
eſſe patiuntur, ne germen exſtinguat mellis morda-  
citas. Cacumina in terram rectè figuntur, ſic vt

lignoſior pars ſuſum ſpectet. Tradunt vegetiores  
enafci, ſi in ſcrobiculos, quibus obuiantur, Ferula  
coniſciatur. Sed ipſa Amygdala, ad ponendum, &  
noua legamus, & grandia. Surculos qui vel arbori  
vel terræ credatur, præcipit Paxamūs è media ar-  
bore, non ſummatim legendos nonnulli tamen ra-  
mulos qui de cacumine ſumerentur, non infelici  
ſuccedeſe depoſuerunt.

Nucem græcam Columella circa Calendas Fe-  
bruarias, quæ prima gemmaſcit, ſeri iubet, in a-  
gro duro, calido, ſiccoque: nam in locis diuerſis ſi  
nucem depoſueris inquit, putreſcit. Antequam  
nucem deponas, in aqua mulſa, nec nimis dulci  
macerabis, ita iucundioris ſaporis fructum, cum  
adoleuerit præbebit, & interim meliùs ac celeriùs  
frondebit. Ternas nuces in trigonum ſtatuito, &  
nux à nuce minimè palmo abſit, & anceps ad Fa-  
uonium ſpectet. Omnis autem nux vnam radicem  
mittit, & ſimplici ſtylo prorepiſt. Cum ad ſcrobis  
ſolùm radix peruenit, duritia humi coercita re-  
curuatur, & ex ſummo duorum ramorum ambas  
radices emittit. Nucem Græcam aut Auellanam  
Tarentinam hoc modo facere poteris. In quo  
ſcrobe deſtinaueris Nuces ſerere, in eo terram  
minutam pro modo ſemipedis ponito, ibique ſe-  
men Ferulæ repangito. Cum Ferula fuerit enata,  
eam ſindito, & in medulla eius ſine putamine  
Nucem Græcam aut Auellanam abſcondito, & ita  
adobruito. Hoc ante Cal. Mart. facito vel etiam  
inter Non. & Id. Martii.

Magus, autore Plinio, operoſus eſt. Amygdala  
in argilla molli meridie ſpectante ſeri iubet:  
gaudere & dura calidaque terra: in pingui aut hu-  
mida mori, ac ſterileſcere. Serendas quàm maxi-  
mè falcatas & è nouella, ſimoque diluto macera-  
tas per triduum, aut pridè quàm ſerantur, aqua  
mulſa. Mucrone deſigi, aciem lateris in Aquilo-  
nem ſpectante: Ternas ſimul ſerendas triangula  
ratione, palmo inter ſe diſtantes: denis diebus (de-  
cimo quoque die) ad aquari donec grandæcant.

Cæterùm nihil aquè degenerat quàm Amyg-  
dalis: nam neglecta, amara efficitur: nam princi-  
pio alterato, ſinis quoque alteratio ſequitur: hinc  
quoque ſit vt neglecta in ſylueſtrem tranſeat, au-  
tore Theophrasto. Hoc cauebis ſi paxillum (mæra-  
lon) vel clauum ligneum potius adigas, lachry-  
mamque diutiùs deſluentem auferas reliquumque  
cultum impendas.

Amygdalam etiam, dum fructum parit, neque  
rigandam, neque ſtercorandam, præterquam aſi-  
dis, neque purgandam, neque vlla cura tractan-  
dam exiſtiant, ſed ab omnibus iis abſtinent, ne  
plus æquo validior reddita fructum in flore amit-  
tat. Quamobrem agrum quoque minùs pin-  
guem quærent, & ſi poſt hæc fructum parere non  
poſſit, radices nudas ac detectas hybernis frigori-  
bus abiciunt, & reliqua coercendi (x. mæd. as. no-  
ndum) genera, ac imminutiones, quas diximus,  
adhibent. Bonum erit in hoc caſu interdum  
nimiam quoque nutrimenti vbertatem detrahi:  
Nam omnino his ſerè duobus remedij generibus  
indigent Amygdali, vt vel detracto nutrimento,  
vel ablauatione caſtigentur.

Alij quoque ne degeneret Amygdalus, ſæpiùs  
transferri, aut adultam inferi præcipiunt. Nam  
vt idem Theoph. prodidit Thaſij Amygdalas a-  
dulcas inoculant. Ex mollibus enim præduræ  
poſt ſatum redduntur: quod idem vel in reliquis  
Nucibus fieri poſſeſt.

Menſe Decembri, vel Ianuario, circa Idus A-  
mygdalus inferitur, locis verò frigidis & Februa-  
rio, autore Palladio. Si tamen ſurculos condias,  
ante-

*Nux Græca  
quando  
renda.*

*Ve quæ  
dior ſus  
fructus,  
Serenda  
modus.*

*Nux Græca  
et Tarentina.*

*Ne ſtereſcat.  
Cultum.*

*Ne Amygdalus  
fructus  
amittat.*

*Nec degeneret.*

*Inoculan-  
ne cau-  
Ne ex-  
libus ſus-  
dura.*



antequam germinet, viles sunt, qui de summitate lumuntur. Inferuntur & sub cortice, & in trunco. Inferuntur in se, & in Persico: quidam & Pruno inferunt. Palladius.

*Philis odoratos primævis floribus artus.*

*Defixi Prun cortice fixa regi.*

*Pomaque permixta velamine Persica misce,*  
*Duritiemque docet regiminis esse loco.*

*Id medicam cornat siliqua tendente figuram*  
*Et frondes pulchro dirat odore feras.*

*Castaneamque truncem depulsi cogit echinis*  
*Mirari fructus, leuia poma suis.*

Amygdalus si parum ferax erit, forata arbore lapideum additico, & ita librum arboris inolescere finito Columella. Copiosiores fructum dari adfirmat Theophrastus, si ferreus palus adigatur arbori, impressioque foramini quereus inferatur paxillus quo modo in eam animadverti volunt, perinde quasi arbor iniuria lasciviat. Palladius tederæ cuneum terebratæ radici immergere suadet, in eundem finem.

Locus frigidus ubi metus est de pruina, Martialis dicit hoc remedium subueniri. Antequam floreat radices nudatæ, & albi lapides minutissimi mistis arenis congeriuntur, & ubi iam tempus videbitur, ut debeant germinare, effossi iterum lapides submouentur.

Teneras nunc Amygdalus creabit si ante flores radicibus ablaqueatis per dies aliquot calida aqua ingeratur. Ex amaris dulces sunt, si circumfoso stipite tribus digitis a radice fiat cauerna, per quam noxium defudet humorem: vel medius truncus terebretur, & cuneus ligni melle oblitus imprimatur: vel si circa radices suillum stercus, vel vinum affundas. Idem tradit Africanus. Theophrastus verò palo densò humorem nimium & abundantem educi iubet, sed ea lege ac omne ex amaris dulces euasuras, si id biennio aut triennio facias. Plinius circumfodi tantum iubet, & ab ima parte circumforari, ut defluens pituita abstergeatur.

Amarefcent si à pecore rodantur, idè ab iis seruandæ, qui istud nolit.

Cum in seminario Amygdala disponimus, si siccitas intercesserit, ter in mense rigemus, & herbis nascentibus circumfodiendo sæpè purgemus. Terra feminarij latamen debet habere admissum.

Putandæ sunt Nouembri mense, ut superflua & arida, & densa tollamus.

Democritus alium modum præcipit, si ferax non sit Amygdalus, nempe tederæ præpinguis adactum terebratæ radici cuneum, insulo prius humano lotio mergere.

Greci asserunt, & inter eos idem Democritus nasci Amygdala inscripta, si aperta testa nucleum sanum eximas, & in eo quodlibet scribas, & inuolucrum luto & suillo stercore charta reponas. Sed satis de Cultura & Mangonio.

Amygdala, ut Florentinus & Palladius tradunt ad legendum maturitatem fatentur, cum fuerint apoliata corticibus. Hæc sine cura hominis feruantur in longum: si difficulter corium dimittet, paleis obruta continuò relaxabunt. Item decorticata, si aqua marina lanctus, aut salis, & candida sient, & plurimum durabunt.

Amygdalæ, auctore Hippocrate, æstuosæ sunt, verum probè nutriunt. Astuosa quidem sunt propter pinguedinem: nutriunt autem propter carnositatem.

Dioscorides: Amygdalæ amaræ radix, si trita

decoquatur maculas in facie à Solis ardore contritas tollit. Ipsa quoque Amygdala illita eadem præstant: apposita verò mentes cient, & capitis doloribus auxiliantur, fronti temporibusque inducunt cum aceto & rosaceo. Valent & ad epinyctidas (seu pustulas nocturnas) ex vino, itemque ad putrescencia vlcera, herpetas cananque mortuus cum melle. Porro comesta dolores adimunt, aluum emolliunt, somnum faciunt, vitium precient. Profunt etiam annu ad sanguinis reiectionem, si cum Amylo & mentha fumantur. Ex renibus verò & pulmonum inflammatione laborantibus, conferunt cum aqua pota, aut in eclegmate cum resina terebinthina. Vinum diuturnum affectis atque calculosis in passio opitulatur: itemque eclegmate cum melle & lacte hepaticis, tussi, & coli inflationibus, Nucis auellanae magnitudine. Quinæ sentæ si præsumantur, ebrietatem arcent. Enecant & vulpes cum quapiam esca deuorate.

At gummi ipsius arboris adstringit, calcacit, & contra sanguinis reiectionem potum auxilio est: cum aceto verò illitum, impetigines in summa cure tollit. Tussi diuturnæ cum vino diluto potum medetur: calculosis verò cum passio bibicum prodest. Ceterum dulcis & cibo idonea Amygdala, quantum ad efficaciam spectat, multò quam amara est inferior: attamen & ipsa extenuandi, vrinæque ciendi vi pollent. Amygdalæ verò quæ virides cum suo putamine deglutiuntur, humida stomachi vitia emendant.

Olei Amygdalini parandi ratione idem Dioscorides hanc tradit, quod aliqui Metopion vocant: Amygdalarum amararum repurgatarum & arefactarum choenices quatuor in pila ligneo pistillo leuiter in offam contundito, assutisque aquæ feruentis heminis duabus finito semihora spatio humorem imbibere, tuncque postea maiore vi terito, ac deinde tabellis comprimens exprimito, quodque digitis hæserit concha excipito. Tandem magnatiterum aspersa aquæ hemina, quam combibere fueris, idem facito. Singulas porro heminas reddunt quaterni choenices. Est autem efficax contra vultuarum dolores & strangilens, ac eorundem locorum tum conuersiones tum etiam inflammationes: itemque ad capitis dolores, auriumque ægritudines, sonos incertos atque tinnitus, iuuat & vitij renum laborantes, agrè meientes atque calculosos, suspitiosis item lienosisque prodest. Quin & maculas tollit à facie, à Sole vltis medetur, & cutem erugat, admixtum melli, Lilij radici, ac Cyprino rosaceo cerato. Hebetem etiam oculorum aciem emendat: denique vlcera quoque manantia & furfures cum vino expurgat.

Plinius ferè eadem tradit quæ Dioscorides. addit tamen quædã vel de suo, vel ex alijs excerpta. Amygdalæ (inquit) amaræ radicem decoctam colorem hilariorem facit. Noces ipsæ somnam faciunt & ariditatem. Vrinam & menses cient. Capitis dolori illinuntur, maximeque, in febris: Si ab ebrietate ex aceto & rosaceo & aquæ sextario. Et sanguinem sistunt cum Amylo & Mentha. Lethargicis comitialibusque profunt capite peruncto. Epinyctidas sanant: è vino veteri vlcera putrescentia. Canum morsus cum melle. Et furfures ex facie, ante fotu preparata. Item iocinoris & reni dolores ex aqua pota: & sæpè ex eclegmate cum resina terebinthina. Calculosis & dimicili vrinæ in passio, & ad purgandam cutem in aqua multa trita, sunt efficaces. Profunt eclegmate iocinori, tussi, & colo cum Eleliphico modicè addico. In melle sumitur Nucis auellanae magnitudo. Aiunt,

*Menses.*  
*Cap. dolor.*

*Epinyctides*

*Vlcera.*

*Herpetas.*

*Canum morsus.*

*Dolor.*

*Massa somnus.*

*Vrina.*

*Sanguinis reiectione.*

*Pulmonum inflammatio.*

*Vrina difficul.*

*Calculus.*

*Hepatica.*

*Tussis.*

*Colica.*

*Adiutus ebrietate.*

*Senenium.*

*Gummi resina.*

*Perum.*

*Languinis reiectione.*

*Imperigo.*

*Tussis.*

*Calculus.*

*Dulcis vicia.*

*Vrina.*

*Amygdala.*

*Sordium cum putamine.*

*Amygdalus olei amari parandi ratio.*

*Olei Amygdali res.*

*Dolor vultuarum.*

*Dolor capitis.*

*Aurium me.*

*bi.*

*Vrina difficul.*

*Calculus.*

*Asphina.*

*Lenis ob.*

*Brusio.*

*Macula faciei.*

*Vitis.*

*Vlcera.*

*Furfures.*

*Radices ad faciem.*

*Somnus.*

*Capitis dolor.*

*Lethargus.*

*Epilepsia.*

*Vlcera.*

*Canis morsus.*

*fat.*

*Cutis.*

*Vulpiam*  
*Genonium*  
*Dandelion*  
*N. 1*  
*po. ant.*  
*N. 1. et Gra.*  
*co.*  
*Amorbus re-*  
*gion.*  
*Vitis sedis.*  
*Oles Sires.*  
*Purgat.*  
*V. 1.*  
*Vermiculus*  
*aurum.*

*Dolor cap.*  
*Ex oculorum*  
*Vitæ.*  
*Condyloma*  
*ta*  
*Ad somnia*  
*An Amygd.*  
*amaræ jam*  
*guinem se-*  
*stant.*  
*Citra Plin.*  
*Ex Diof.*

*Vitæ pu-*  
*denda.*

*Tussis ex*  
*pro. Sires*

*Ephelis.*

*Obstr. 110*  
*secoris.*  
*Laternum*  
*dolor.*

*Et dulcia a-*  
*liqua habere*  
*amarissimam*  
*amem.*

*Nulla ad-*  
*fructu.*

*Ventr. non*  
*solum.*  
*Non multum*  
*nutritum.*  
*spiritum.*

quibus ferè præsumptis, ebrietatem non sentire potiores: vulpesque, si cederint eas, nec contingat è vicino aquam lambere, mori. Minus valent in remedijs dulces, & hæc tamen purgant, & vrinam cient. Recentes stomachum implent. Nucleus Græcis cum Absinthij semine ex aceto sumptis, morbus regius sanari dicitur: item illitis per se vitia sedis & priuatim condylomata. Idem tussis & sanguinis et vomitus profunt.

Idem Plin. de Oleo Amygdalino has tradit vires. Oleum Amygd. purgat, mollit corpora, cutem erugat, nitorem commendat, varos cum melle tollit & facie. Prodi. si & auribus, cum rosacco & melle, & Mali Punici germine decoctum, Vermiculósque in his necat, & grauitatem auditus discutit, sonos incertos & tinnitus, obiter capitis dolores & oculorum. Medetur suenentibus, & à Sole vltis cum cera. Hæc manantia & furfures cum vino expurgat: Condylomata cum meliloro. Per se verò capiti illitum, somnum allicit.

Vt verum fateamur, non placet, quod scribit Plin. Amygdalas amaras sanguinem sistere: quod multò minus existimamus fieri addita Mentha, vt ille vult, quamuis idem quoque sentiat Diof. In vtrisque enim nulla astrictio aut frigidas, sed calor & facultas aperienti. Quod si sanguinem sifterent, reprobanda essent in canum moribus: nec viles essent in obstructionibus.

Hippoc. l. 1. de morb. mul. Si prægnanti pudenta superficiali ac feruido vlcere affecta sint, Amygdalas tritas & medullam bubulam cum aqua coquere præcipit, & modica farina addita pudenta illinire, & aqua coctis Myrti baccis perluere. Idem l. 2. ad tussim ex præfocatione vteri præscribit Amygdalas amaras depurgatas.

Amygdala inquit Gal. que palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, Ephelin expurgant & excretionibus ex pectore pulmoneque crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. In icore crassorum viscosorumque humorum in extremis vasis impactorum obstructiones abundè expurgant expeditaque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & Lienis, & Coli & Renum. Porro & ipsa arbor vniuersa similem sortita vim est. Nam huius radices coctæ atque illitæ ephelides purgant. Quotquot verò sunt Amygdala dulcia, & ipsa leuicula amaritudinem possident, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum id temporis spatio clarum fit. Qualitas autem dulcis moderatè calida est.

Idem alibi, Amygdalæ, inquit nihil prorsus habent facultatis adstringentis: sola enim tenuandi facultas ac detergendi in eis præpoller, quâ tum viscera purgant, tum humores è pulmonibus ac thorace sputis expectorant. Quædam autem ipsarum facultatem habent succos crassos ac lentos incidendi adè exuperantem, vt mandî præ amore nequeant: oleosæ tamen ac pinguis qualitatibus, vt Nuclei, participes: cuius causa, & ipsæ procedente tempore fluat, vt illæ oleosæ. Minor tamen eis inest hæc qualitas, quàm in Nucibus: quo fit vt tardius, quàm Nuclei, oleosæ fieri cernantur. Ex ijs sanè intelligi potest, quod neque ventri subducendo coferunt, neque corpus multum nutriunt. Quæ verò qualitatem amarâ habent præpollentem, eæ ad pus & succos crassos ac lentos ex thorace & pulmonibus expuendos plurimum conferunt.

Rursus alibi: Amygdalæ amaræ Mundificant & tenuant, & aperiunt oppilationes hepatis, & adiuvant ad speiendam humiditatem ex pectore & pulmone.

Et de simpl. med. Galeno attributo opusculo hæc leguntur: Amygdala est & suavis & amara, & vtraque viribus simplicia: magis tamen sunt in vlti medicina, & aptiores amara, è quod habiles magis. At paulò antè ex eodem Galeno traditum plerique fultò sibi persuadent Amygdala: ex quo patet librum hunc esse spurium, non gentium Galenij. Hunc posteriorem locum sequenti Germani planè adstrictionis habere Amygdala: vntem stringere. Eoque res venit vt mulierculæ medicastæ, quæ hoc à non multò se doctioribus hauserunt annulatis rogatisque pectoribus, ignorantia arant insuauæ ipsius contraria persuadere conantes: sed mundus vult decipi, decipiatur ergo.

Porro quod de facultate Amygdalarum aduersus ebrietatem suprà ex Plinio & Diof. adduximus, quia id non parum momenti apud quosdam potatores habere videtur, sciunt, si in sua arte confirmari velint, eiusmodi effectus causam esse amaritudinis vim exicantem, & humiditatem discutientem, vt vult Plutarchus in sympos. lib. 1. quæst. 6. quo loco refert apud Drusum Tiberij Cæsaris filium Medicum quendam, (nimirum voluit ex arte bibere) qui alios omnes subinde bibendo vincere solitus erat, antequam potaret, quinque sextæ Amygdalas edentem fuisse deprehensum: ac deinceps id facere prohibitum, à vino facillimè superatum fuisse, immò ne tantillum quidem ad computationem præferendam valuisse. Bellum verò mehercle Medicum, qui quod naturæ contrarium deprehendit, ne arte desitutus videretur, arte comparandum, vel sanitatis morumque adè iacturâ, non dubitauit. Vtinam non essent hodie, qui ne Amygdalis quidem ad eam rem egerent. Eandem historiam ex Plutarcho citat quoque Athen. qui tradit præsumptas Amygdalas bibendi appetentiam summopere excitare. Eupolis:

*Da quas manducem Naxia Amygdalas:*

*Da vinum quod bibam è vlti Naxia.*

Ipse quoque Diof. in Eupor. multum Amygdal. amararum Cyathi vnius mensura ebrietatem arcere tradit. Nouimus tamen, qui amuletum illud aduersus ebrietatem in vltu habentes, nihilo fecius à Baccho obruantur, ac nimia sui remedij fiducia decepti, ita prosternuntur, vt nec manus nec pedes suo amplius fungi possint officio: vt cogitare necesse sit:

*Vicisti tandem Bacche, Vicisti.*

Diocles apud eundem Athen. scribit nutrimenti multum Amygdalas suppeditare, hoc sup. Galenus negauit) iucundas esse ventriculo, calfacere, quia oleosum quippiam habeant: πῶλον δὲ. Sic legit Ruellius. Quidem legunt πῶλον δὲ: alij κρημνῶδες: alij ἐσσυγῶδες. Ruellium sequitur Dalech. quamuis certum sit, vt idem quoque annotat, illos qui plurimum nucibus vtantur, rauescere, humectata illarum pingui liquore tunica interiore gutturis. Amygdalarum tamen minus operosa coctio est. Quamobrem citra noxam multas edimus.

Diphilus scribit, Amygdalas attenuare, prouocare locum, purgare, parum nutrire: recentes ac virides prauum succum gignere, & eum pauciorum: siccas autem inflare & innatare magis: teneras, plenas, albas, lacteas meliorem succum gignere: ex siccis Thasias & Cyprias, quia sunt teneriores promptius externi.

Mnesitheus Atheniensis libro de edulijs, scribit: Amygdalas & Nucleos Perlicas castaneis esse deteriores, ex his tamen & cæteris cunctis nucum generibus in vniuersum edendum nihil esse quod



quod non sit igne coctum; præter virides Amygdalas. Siccas enim pingues esse, quarum nocentissimam pinguedinem absumat ignis. Cæterum Diocles scribens nutrimenti multum Amygdalas suppeditare, cum Galeno, dicente, non multum nutrire, sic conciliari potest. Parum nutriunt, si comedantur cruda cum cute nucleum immediate integre, & non optime masticata: vsque adeo compacta & densa eorum substantia est, ut obseruauerimus in multis portiones Amygdalarum deuoratarum, ac dentibus non bene attritarum, integras reiectas. Optime verò tritas, ut teruntur pro lacte Amygdalino & aliis cibis ac *medicamentis*, facile crediderimus cum Diole posse multum alimenti suppeditare.

Mnesitheus quoque fortassis considerans incoctas reici Amygdalas, dixit eas, & Nuces Persicas Castaneis esse deteriores. In Castaneis sanè pulpa non ita solida & còpacta: nec obseruauimus vnquam incoctas frustulatim reiectas vt Amygdala.

Simæon Sethi eadem ferè de viribus quæ Dioscor. & Plin. habet: Is tradit modicè calidas esse, satis nutrire, attenuare & incidere. Amaras dulcibus esse calidiores: ebrietatem eius dici auertere. Oleum Amygdalarum dulcium, quod eadem ratione vt amararum exprimi potest: (modi familiarem docebimus postea) modicè & temperatè calidum esse: iecoris obstructions aperire & auertere: Pulmoni etiam & pectori vtile esse, quod postremo nostra experientia multorum commodo sæpissimè exploratum.

Serapio ex Aben Meshai, foliorum & florum Amygdalæ expressorum succum epotum ascarides cum purgatione deturbare scribit. Eodem colluta inguina fatorem amittere, iniectum auribus necare vermes. Oleum nucleorum (subaudi amararum) conferre dolori aurium frigido, & morbillis conferre illitu.

Mesues Oleum Amygdalarum dulcium magnis extollit laudibus, asperitatem gutturis, pulmonis, & partium cæterarum etiam externarum lenire, duriciem omnem ac siccitatem iuncturarum & partium aliarum emendare: impinguare, conferre hæcicis, semen augere, ardorūque vulvæ & vrinæ iniectum commodare. Et est sanè medicamentum verè *inhibens*, & ad multa efficax, blandum, gratum, & velut quidam typus aliorum oleorū generis eiusdem: scimus quid possit in colico dolore, ab induratis facibus, ab humore acris, in quibus tuto & maximo successu multoties exhibuimus. Sed recentior oportet esse expressum: datur ab vncius tribus ad libram semis plus minus, vel per se, vel cum iure carniū. In conspata aluo, mite, tutum & probatum experientium, etiam renum dolore diuexatis. Est etiam insigne anodynum, & vnicū propemodū infantium medicamen.

Idem Mesues oleum Amygdalarum amararum tradit obstructa aperire, fluxus resoluerè & dissipare, etiam in aurium tinnitu, & eiusmodi aurium morbis, asperitates lenire, neruorum mulcere dolores, duricies mollire, panum faciei delere. Auicenna scribit pilulas fieri ex Amygdalis & oleo Amygdalino ad famem diu tolerandam. Illud consideratione dignum, quod apud Auic. legitur gummi Amygdalæ adstringere & calefacere, quod nobis quidem vero minus consentaneum videtur, quamuis in eo ipsum adeo Dioscoridem secutus videatur. Facile concesserimus adstringere per accidens, nempe glucinando, viscido liquamine in humore aliquo dissolutum,

Tome. I.

qua ratione dysentericis quoque prodesse putamus. Sed de hac re doctiorum esto iudicium, aut quibus est in hac re aliqua experientia.

Non omittendum quod Trallianus tradit Amygdala & Pistacia in hepaticis dysentericis caueri debere, eò quod faciliè corrumpantur, & oleosa sint, proutque in bilem mutantur, & excrementum asperius reddant, vt hinc venter magis, crebriusque irriteretur. Idem alibi præcipit de purulentis: si aluus non sit citata succum Amygdalarum, sin autem sit citata nihil prorsus de iis exhibendū. Quo sanè loco, (quamuis & alios iam supra ex Diosc. & Plinio citauerimus huc facientes) faciliè refutare possis nostrorum Germanorū,

opinionē qui existimant adstringi aluum vlu lactis Amygdalini. At nos vix existimamus concedendum Tralliano in hepaticis Dysentericis caueri debere Amygdalas, eò quod faciliè corrumpantur & oleosa sint, proutque in bilem mutantur. Nobis enim videtur ea quæ difficultè concoquantur, non faciliè corrumpi & in bilem mutari. Nec oleositas tanta est in Amygdalis non rancidis, quæ id præstare possit. Cremor quidem eorum faciliè acescit, si loco reponatur calido: non propterea in bilem vertitur. Sunt tamen qui moti autoritate Auic. dicentis Amygdalas ob suam vinctuositatem commouere choleram, sibi persuadent non tutum cremoris Amygdalini vsum febricitantibus, & iis qui stomachum biliosum habent, faciliè inflammari, mittere ad caput vapores, vulnerato capite iis non vitendum, excitare dolorem capitis. Nos in cremore vinctuositatem illam non obseruauimus, nec quicquam nocuentorum iam dictorum, licet in febris & calidis morbis sæpè vli simus, & vtamur ipsi in dies, etiam in nostro corpore. Quod si etiam vel tantillum eiusmodi vitiorum iis inesset, aqua vel simplex, vel hordei decoctum, quo cum parari iubemus, id faciliè emendat. Sed diligentibus medicis ista deinceps curiosius examinada relinquimus: quæ ipsi obseruauimus, annotamus & in publicum conferimus: aliorum obseruationes non spernentes, si ratione & experientia confirmantur. Ridenda profecto & coram sitientia, qui lactem cremorem è dulcibus Amygdalis parari solitum dari minima debere anhelosis cæterisque pectoris & pulmonum vitii laborantibus contendunt, quòd falsò sibi persuadent cremorem hunc omnino adstrictoriæ facultatis non obscure esse participem. Amygdalarum in cibis vsum genitale augere semen volunt, quod profecto vix alia fieri queant ratione, quàm quòd multum nutrant ea quæ supra dictum ratione est. Etenim semen excrementum benignum vltimi alimenti. Nam nec magno acris calore, nec flatulenta qualitate (quæ duæ etiam causæ semen excitare & stimulare solent) illud præstari certum est.

Tragus Amygdalis adstrictionem non tribuit quidem, sed tamen addit. Amygdalæ in cibo vsum patet præsertim si pultes ex iis conficiantur, adhibita aqua, in qua candens Chalybs extinctus fuerit, aluum lubricam adstringunt. At id nos Chalybi tribuimus non Amygdalis. Succus Amygdalæ amare expressus coxendicum dolores lenit, teste Sereno.

Amygdalis, inquit Matth. plerique vtuntur & ad roborandam venere, & ad reficiendas vires, quamuis Galenus non multum alimenti suppeditare scribat. Egrotantibus nutritibus, Amygdalino lacte, cum aqua cardui benedicti extracto dies aliquot infantes sustentari possunt. Amyg-

Q

Caurio,  
Alia Cau-

Germano-  
rum: et  
denuò re-  
fucatur.

Cur Amyg-  
dala semen  
augeant.

Qua ratio-  
ne adstrin-  
gunt Amyg-  
dala.

Ad Generis,  
Ad Sires.

dalæ dulces masticatæ gingivarum dolores tollunt.

*Virides Amygdalæ.*  
*Viridæque*  
*et*

*Cautio.*

Virides Amygdalæ, suo integro operimento, commestæ, vt tradit Amarus, bonum faciunt stomachû, & illû ab humiditate emendant. Quia verò Hipp. ætulos dicit ob pinguedinem, ideo Auic. dixit sanie earum commouere Cholera[m] ob suam vntuositatem: ad quod aduertant (inquit Amarus) qui indiscretè febricitantibus Amygdalatum porrigunt, aut saltem ijs qui stomachum biliosum habent, ne magnum adferant ægris nocumentum. Sed de hac re paulû antè iudicium nostrum diximus.

*Dulces Amygdalæ.*  
*Oleum.*

*Aurum obfructio.*  
*Tinnitûs.*

Dulces Amygdalæ, teste Turnero, cerebri substantiam augere creduntur, macilentis viles. Earum oleum ad Conuulsionem à siccitate laudatur: amatarum verò oleum, vno gradu, eo quod ex dulcibus exprimitur, calidius est, accommodum auribus obstruētis, flatu distentis crassiusculis, tinnientibus, surdastis, verminantibus. Experimentâ compertum est, hoc oleum præ cæteris omnibus oleis, auribus esse convenientissimum: Amygdala amara, sumpta cum vino dulci, vt muscatellino, aut arte factis, quod *Desbard* Galli vocant, vrinam prouocat, ac vrinæ difficultatem tollunt, profunt laborantibus calculo & arenulis, teste Dod.

*Vrina difficilis.*  
*calculus.*

*Quorundam error.*

Lactina refert Amygdala dulcia difficulter coqui à ventriculis debilibus, mittere ad caput vapores, ideoque reprehensione dignos esse medicos, qui in omnibus naturis & morbis ægris præscribunt Amygdalatum, quòd facile inflammantur, nisi admisceantur semina Melonum aut Cucurbitarum & papaueris. Nos verò Lactis seu emulsionis Amygdalarum dulcium ex decocto Hordei deglubiti, in calidioribus affectibus pro potu vitimur: Addimus etiam interdum semina Cucurbitæ ac Melonum, etiamque papaueris albi & lactucæ, si vigilæ vrgeant.

Bruerinus de re cibaria: Mitum, ait, cur obesiores fieri videntur. Amygdalis nonnullis sit traditum, càm leuiter alant. Sed mirari desinet, si cogitauerit tales vel esse famelicos & proinde firmo stomacho, vel sanè in questione adhuc esse verumque ab eo positum: vel denique Amygdalas non primariam esse impinguationis causam, neque simpliciter verum esse, leuiter alere, quamuis Gal. id scribat. Sunt enim & multi alij, qui contrarium sentiunt.

*Paræus.*

Paræus in sua Chirurgia, in fractura capitis non vult læsos vti Amygdalæ, dicens Amygdala excitare dolorem capitis. De hoc quoque antè dictum. Nec videmus, quæ id ratione fieri queat. Sæpe accidenti alicui hec vel illa assignatur causa, quæ nihil minùs quàm eius causa est. Ratio inspicienda, non negligenda experientia, si cum aliqua ratione coniuncta sit. Alioquin ne experientia quidem fuerit.

Hartorius in suo Enchiridio Amygdalarum vires quasdam paucis versu culis complectitur:

*Decoctum faciem decorat capitisque dolores sanat, at infesse menstrua pigra ciet:*  
*et morientis seminis fructus.*

Quoniam verò compositionum aliquot in his Amygdalarum viribus meminimus, placet præcipuas aliquot hic in gratiam studiosorum adijcere.

*Eclegma ex Amygdalæ, cuiusque vires.*

Prima sit Eclegma illud Mesuici, phthisicis saluberrimum: sed etiam hecticis & aliter consumptis, quod, & tussim lenit, ac intemperiem multam siccam pulmonis & thoracis, & tussim inde siccam. Recipit autem Amygd. dulcium & amar. feminis lini torrefacti, nucleorum pineo-

rum, anisi, trigacanthi, gummi Arab. sicci & rad. glycyrrhizæ ana drach. vnam & dimid. sacchari, penidior. ana drach. tres: excipiuntur mellis & succi fœniculi simul coctorum quantitate sufficienti.

Ex Amygdalis & Amylo Sepiasij hodie delicatis, & deliciarum mancipijs placentas, Marcipan vulgò vocant, conficiunt, quas consultius erat ægris exhiberi, quàm nocturnis computationibus, quod ferè fieri solet, insperire. Meliores his delicatiorisque sunt ex Amygdalis cum saccharo & aqua rosata. Tabidis conuenientissimum est sequens.

Amygd. dulcium extorcit. vnc. ij. pinearum vnc. ij. passul. enucleat. & decorticat. pulpæ dactyl. ana vnc. j. & f. gummi arab. & trag. ana drach. j. Amyli vnc. ij. pulpæ capi elixi vnc. iij: fructus macerati cum aqua cum reliquis tundantur, & saccharo paulatim asperso fiat massa: indeque cuiusq; figuræ panes sensum siccandi. Addere potes & semina cucurb. & melonum cum semine papaueris si magis refrigerare voles. Præstans quoque est Pasta regia Mesuici ex iisdem parata: Nec tamen dicenda, ne potius ad pompam, quàm ad studiosorum compendii & historiæ huius gratiam id præstitisse videamur. Videat apud ipsum, qui vult. Luber tamen Lactis Amygdalini modum docere, propter exoticos, ad quos fortè hæc nostræ lucubrations, si Deo ita visum fuerit, vt mereantur, peruenient, apud quosque fortè non est in visum.

Amygdal. dulcium à cuticula purgatarum, (quod sit aqua tepida, non feruente, ne oleola substantia prouocetur in actum, sique lac non benè album feret) quantum voles, vnc. iij. vel iij: addi possunt semina melonum & cucurbitarum, iridem decorticata ad vnc. j. sem. lactuc. & papau. albi (præsertim si refrigerare magis voles, somnue placidum, non violentum, quod sit opiatissimum, accipere,) singul. drach. j. vel ij. contundantur in mortario marmoreo, quod omnium optimum ad hæc rem, sensum assuam aqua coctâ, aut decoctionis hordei, vel etiam sero lactis, pro ratione scopi, traice per lineum, & in loco frigidiusculo reueria: nam citò accescit. Possis & cū solo hordeato & Amygdalis parare.

Hæc quæ sequuntur desumpta ex Gesn. libello de lacte & operibus lactariis obliuioni tradenda non sunt. Naturæ lac imitatur Amygdalarum, quod tum ad delicias, tum ad sanitatis beneficium ætas nostra frequentissimè parat. Amygdalæ circiter libræ pondere calidâ resoluuntur, vt facilius cortice spoliuntur, deinde cum pane excavato tunduntur. Tussæ ac dissolutæ recentî aqua in cacabum per seraceum funditur, & procul flammâ in carbonibus agitatur cochleari, propter fumum; coquantur. Sacchari adijcitur sēlibra. Parum cocturæ amant, liquidum enim hoc ferculum magis quàm spissum placet. Sunt qui & aquam rosaceam addant. Idem ibid. Causæ ex Amygdalino lacte. Amygdalinum lac omni temperato, salitum decoquito, & si liber crocum adijce, aut alia quælibet aromata: tum densatum igne cochleari diligenter permiscebis, & impones sētaeco, vt quod liquidius est defluat, tandem saccharatum conuiuijs appones.

Si etiam lac cæruleum facere volueris, Amygdalinum cū cyani floris succo para loco aquæ. Huic deinde oryzam aut far incoquere licebit. Aliud cibarium ex Amygdalis, lac coagularum referens. Amygdala tusa per seraceum transferes cum aqua, deinde calfacies ad ignem semper agitando.



gitando rude, miscebaturque ius piscium, siue de pedibus vitulinis aut ouinis gelatum, ac vteris refrigerato. Nos non possumus nobis persuadere ex floribus cyani tantum succi posse extrahi. Colerus in libris de coquinaria multa praeclare parare docet ex Amygdalis, quem consulte.

Nec tacendum quod Theoph. scribit Amygdalae arboris cinerem lixiuque vt acerrima, ad fornaces arteque aliquas commoda materie viles esse. Dalech. quoque annotat, Gummi Amygd. in vsu multo esse ad pannos sericeos oblinendos (vulgò artifices id aiunt, *damer l'eau*, dare lustrum) firmiores vt sint, ac minùs corrugari laciniatique, & minùs obterantur.

Dictae sunt vires, dicantur & noxae. Tradit Marcellus Virgil. selem non vltra septem aut octo Amygdalis amaris haustis torqueri coepisse, & velut furiosum circumactum, toto tandem corpore dissentum periisse, non vltra horam à cibo illo protracta vita.

Matth. quoque non solum Diosc. sententiam confirmat de Amygdalis amaris lethalibus vulpeculis: Sed nos idem quoque accepimus verum esse, ab industrio Io. Lutzio; pharmacopæo Kircheni in Ducat. Wirtemb. qui narrabat ex magmate expressionis olei Amygdalarum amararum in plateas eiecto, mortuas aliquot gallinas, quae id comedisent, quod olim quoque monuerat Matth. in historia Germanica. Melius itaque posthac suis rebus consulent, si istud magna mulierculis & delicis deditis virginibus aut adolescentibus dono dent, quod est praestantius ad extersionem manuum & faciei, loco saponis, tam ex dulcibus, quam ex amaris:

## AMYGDALOPERSICVM

## CAP. VIII.

Arbor est inter Amygdalum & Persicum ambigens, materie; folio; fructu. Folia enim oblonga, serrata, pediculo plusquam semunciali, virentia, sapote amaro. Flos quinque constat foliolis rotundis, colore carneo; vngue sanguineo, staminibus multis purpurantibus; ex umbilico caliceque quinquepartito rubente. Carnis pulvinus, densior & copiosior quam Amygdalis: minùs copiosus quam Persicis. Os licet Amygdalarum, vt persicis tamen rugosum: nucleus qualis Amygdalis. Teneriorem fructum, antequam duret putamen; condiunt. Nucleus verò edulis vt Amygdalarum, à quibus vix gustu discerni queat.

Visa nobis primum haec arbor in horto nobilissimi Viri Iacobi Waldner à Freundstein in Hattenschuiler superioris Alsatie, ex qua officula plantauimus Montbelgardi. Noua progenies, quae ex Amygdalo seu nuce Graeca & Persica facta, seu Amygdalopersicum, Carol. Steph. Amygdalo Persicum arbor Graecis haud nominata Gesnero. Consideret tamen Lector quae de Nucleo persico dicta sunt in superioribus. Amygdalopersicus, cuius exterior pulpa Persicum pomum sapit, nucleus interior Amygdalū Camer. Amygdalopersicum nunc in Alsatia frequens, cuius oleus cortex persici instar rugosus, & nucleum Persicum solet, grati saporis: fortè Persico primò in ista. C. Bauh. Germ. Ein baum halb Mandel vndt persich. Cal. Amande Pershier. It. Mandola Persico, Mero Mandiola Mero Persi-

co, &amp;c.

Tom. I.

## AMYGDALAM REFERENS

FRUCTUS HIRSVIUS.

## CAP. IX.

Scribit Clus. in Exot. A Jac. Gareto accepimus Amygdalae fructum qui ita Amygdalam referebat vt primo aspectu Amygdala esse videretur: sed longi villi quibus erat oblitus; diuersum esse ostendebant.

Huius exhibet figuram in tabella sub numero quarto. Erat autem inquit, vicia paulò longior, minùs vnciat latus, fuscus, vndique villis oblitus (nisi vbi attriti & dereti etant) in dorso autem longioribus, eboris inter fuscum & spadiceum mixti, cortice verò adeò tenaci, licet tenti, praeditus; vt magna difficultate aperire possemus: nucleum enim continere, ex spiritu quem motus agebat; intelligebam: erat verò Amygdalae suo putamine exemptae par magnitudine; vno tamen latere sinuolus aliquantulum, vt Phaeoli formam verius exprimeret, quam Amygdalae, quaeque in binas partes separari poterat, tenui candicante membrana tectus, ob vetustatem cariosus; vt quis esset eius sapor discernere nequirem. Solet verò interdum is fructus adferri muria conditus, formam penè exigui cucumeris; sed multò satutiore viriditate praeditus, qui mutia exemptus, paulatim floccescit, & pulpa tandem in pollinem cum cute resoluta nucem relinquit, eiusmodi villis tectam, vt obseruabam in ea quam ab ipso accipiebam anno 1602. binas vncias cum semisse longam, vnciam aut paulò amplius latam: illum autem fructum anno insequente Mangas esse deprehendebam: de quo consulendi Garcias cap. 9. lib. II. Christophorus à Costa cap. 43. & meum in illud caput scholium:

Adferebat mihi Anno 1599: Franciscus Rodriguez, Bengalae regno oriundus, ex Bantam laue imperio, Mangas arboris istius nascentis aliquot folia, cum fructus eiusdem arboris nucleis. Erant verò ea folia densa, & quodammodo cutacea, instar annotinorum Laurocerasi foliorum, nouem, decem interdum plures vncias longa, binas cum semisse vel rtes lata, in ambitu non serrata, oblongiusculoque mucrone praedita, crassiore nervo illa per medium secundum longitudinem secante, à quo vtrinque sedecim vel septendecim crassiusculae venae in latera excutebant, tenuioribus aliquot venulis vix apparentibus intersepta: ea manducata acrimoniam habere deprehendebantur, quia forsitan resiccata.

Miror autem neque Garciam, qui hanc arborem in suo praedio habuisse scribit; neque Christophorum à Costa, qui plura eius genera facit, & plantas ipsas ad viuum expressisse non vno loco gloriatur, foliorum formam declarasse.

Nucleus porro longioris Amygdalae suo crasso operimento repurgatè magnitudinem habebat, membrana tectus, cinerei coloris, substantia autem penè instar nucis Fausel siue Arca constans, in qua nullam amaritudinem, imò ne alium quidem manifestum saporem deprehendebam, nisi in resiccato (qualem accipiebam) euenisset. Ad scriptum erat valde commendari ab incolis.

Eiusmodi autem fructus immaturos & adhuc tenellos, muria conditos, postea adferebant quotquot navigationem instituebant in Indiam, quibus in reditu cum aliis cibis vescerentur, teneriorum cucumerum mutia etiam conditorum loco, vt in-

Descriptio.

Nucleus.

Phaeoli forma.

Muria condita.

Mangas.

Locus.

Mangas. Folia laue.

recreati.

Garcias à Costa r. tancus.

Amygdalae forma nucleum.

Fructus muria condita.

Q. 2.

us est pletisq; Germanica locis, similes cucumeres mentis adponere, atque etiam in Vngaria, cum affis carnibus. Mihi autem donabantur similes bini fructus ex illis quos Iacobus van Neck anno 1603. referebat, erantque diuersæ magnitudinis: vnus enim quatuor vicias Inogus aut amplior, totidè ambitu complectens, qua parte crassior: Alter paulò minor: vterque tamen eiusdem formæ breuique & crasso pediculo præditus, crassior finima parte pediculo proxima, gracilior infima, & mucrone nonnulli curuo: aperti membranaceum inuolutum cent nere deprehenduntur oblongum, longiori Amygdalæ suo puluino liberatæ penè simile, quo nucleus eiusdè formæ tectus erat. Retinebat adhuc hic fructus, licet muria conditus, tantoque tempore adscruatus, satis gratum odorem.

Sapor.

AMYGDALI FACIE FRUCTVS  
EXOTICVS HIRSVTVS.

C A P. X.

Descriptio.

**P**eregina raritate perelegans hic fructus Amygdali suo puluino non exuri speciem facie externa haud obscure representant, cui & figura sic satis conuenit: quippe quæ oblonga, compressa, altero latere modicè sinuato, ex quo tuberculum barbatum eminet, opposito arcuatum gibbo. Nucamento cateroqui est firmo, duro, foris villis densè obfito, pallidis & subfirmis, quales ferè pili porculorum, umbilico quo adhæsit conspicuo latis, & Persicorum simili, à quo per fructus longitudinem sulcatæ lineæ protenduntur. Fructu aperto, corticis facies interna penitus glabra, lauis & churneo nitore conspicua. Sed nucleus qui intus latet, figura phascolacea est cauitatem adimplens, proportionè nucamento respondens, qui geminus membranula quadam per media displicitur, seu pariete intergerino: membrana tamen communi & nigricante connectitur. Nuclei substantia subdura qualis glandium verustiorum, extrinsecus coloris fulci, interius fului: sapore, medullosò, subdulci. Exhibuit nobis frater C. Bauh.

Relle.

Nucleus.

Membrana

Sapor.

Hunc eundem fructum anno 1608. accepi ab Illustr. Principe Sibylla Anhaltina Wirtemb. quem tunc sic descripsi: erant autem duo: vnus villosus Amygdalæ similis, compressus, sonorus, sonus appropinquat committens, nec est idem, ni fallor, cum præcedenti, cinereus, pilosus nonnulli, à quo erant detracti pili, vel villi porius, cortice sulcato, fragili, sub quo erat tenuis membrana, qualis in ovis, ex albo cinerea, separata à cortice, modo dicto, & à nucleo contento: nucleus, ni fallor, erat compressus, phasiolum aliquo modo exprimens, partim nigricans, partim rubescens, qui in duas partes diuidebatur, videbatur durus, qui tamen facile deraderetur, saporem nullum manifestum animaduerti. Hi mihi videntur idem esse, cum *Manga*, siue *Amba* antè dictis.

DE PRVNIS

C A P. XI.

Descriptio

**N**otior est Prunus, quàm vt longa serie verborum sit copiose describenda. Dicamus



tamen, Mediocris est altitudinis: folia pomi nigriora glabra, crenata: flores vt in syluestri, cædidi, maiores: caudex satis crassus, firmus, materie rubelescente aliquatùm, sed pulchre rutila circa interna, præfenti v. r. r. r. dura mediocriter & tractabilis. Salsp. materie fragilem dicit, quàm bonè, norant qui lignum hoc sepius tractant, nisi fortè ramos extremos intelligat.

cortice fusco, scabro: ex quo residat gummi fuluum, pellucidum, ori gratum. Fructus nihil aliud sunt, quàm succulenta quadam pulpa, tenui tunica obducta, magnitudine, colore, callo, sapore, infinitè propemodum variantes: Os compressum, magna parte oblongum, dentibus fragile, nucleum subanatum guttu continet. Pruni autem Theophrasto radice nituntur longa, rupeola, robusta ac mori contumaci.

Prunus *καρυμνία* Diof. arbor nota est: is meminit Syriacarum, & maxime quæ in Damasco nascuntur, & syluestrium ac gummi arboris Pruni.

Est & sua Prunus, seu *καρυμνία* Egypto, quàm Theoph. sic describit. Alia quædam Arbor [Ægypti] Prunus est, protera, fructu, natura & magnitudine Mespilis. similis, nisi quod nucleum rotundum habet. Florere incipit mense Iulio, fructum maturat circa brumam. Folia non amittit: [in vulgaris legitur *κάρυον* dicitur, quàm lectionem Cornarius sequitur, veritque, folium ipsi manet. Sed hic sensus ex Græcis verbis extorqueri commodè nequit: sequimur itaque Plinij & Gaza lectionem, quàm & Diosc. approbat, sic *καρυμνία* dicitur] Qui circa Thebaidem habitant, ob luculentam huius arboris copiam, fructum siccant, & exempta nuclea tundunt & in massis cogunt. Idem Theoph. de Pruno spartum dicit, super fructum ipsum florem indidem emittere, semen habere signo opertum vel cruita. Hæc Theoph. de Coccymela nunc Pruno, qui & l. 9. meminit *πρόπυς*, in qua humor in lachrymæ modum gignatur de qua voce infra copiosius hoc ipso capite.

Plinius de Pruno Egyptia paulò aliter scribit, sic: ibi [scilicet Thebas] & Prunus Egyptia, non dissimilis spinæ proximè dictæ, [Ægypti] pomo Mespili, maturescens bruma, nec folia dimittens. Lignum in Pomo grande, sed corpus ipsum natura copiosa meum instar incolis. Purgatum enim tundunt, seruantque eius otias. Vt mirum nobis videatur quid Dalechampio viro doctissimo venerit in mentem, quod ad hunc Plinij locum citatum adnotaret hæc verba. Vide Theoph. cap. 1. l. 4. hist. qui natalibus cum Plinio conuenit, alia re nulla profus. Quæ hæc quæso oscitantia est: Tantum melius est, vt nulla profus re conueniat præterquam natalibus, vt Plinium hunc locum ex ipso Theophrasto



ho transcripisse indubie ad ar nare ausinus. In hoc tamen curat Plinius à Theophrasto. Hic Mespilo comprat: ille spinæ Egyptiæ: hic nucleum rotundum, ille lignum grande dicit: reliqua re ipsa eadem, verbis tantum discrepantia. An verò Coccynelea Plinii seu Theophrasti Myrobalaris emblica officinarum, vt & Chrylobalanus Galeni statua, vt ex quorundam sententia annotat Dalech. suo loco parebit. Prunis, inquit Plin. succus aquosus: foris corpus, intus lignum.

Alibi verò diligenter persequitur differentias his verbis. Ingens turba Prunorum, versicolor, nigra, candicans. Hordearia appellata, à comitatu frugis eius, (quod cum Hordeum meritis ea maturefcent.) Alia eodem colore feriora maioriq; Atinina cognominata à vilitate. Sunc & nigra, ac laudatiora cerina atque Purpurea. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendatur. Peculiaris impudentia est Nucibus insitorum, quæ faciem parentis succumque adoptionis exhibent, appellata ab vitroque Nucipruna. Et hæc autem, & Persica, & Cerina, ac sylvestris, vt Vuæ, autumnio cadis condita, vique ad alia nascens ætatem libi prorogant. Reliquorum velocitas citò mitescentium (maturescentium Dal.) transuolat. Nuper in Bœtica Malina appellari cæperunt Malis insita, & alia Amygdalina, Amygdalis. His intus in ligno nucleus Amygdalæ est: nec aliud Pomum ingeniosius geminarum est. In peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, à Syriæ Damasco cognominata, iam pridem in Italia nascentia, grandiore quamquam ligno, & exiliore carne, nec vquam in rugas siccata, quoniam Soles sui defunt: (quamquam Soles sui non defunt: sed Pruna omnia post Catonem cæpisse manifestum est. Cereæ quoque Virgil. celebrat vnice.

Sunt autem malis Cereæ Pruna die.

Et in Eclogæ 2.

Add. in Cereæ Pruna, & hanc erit huic quoque P. m.

Columella:

Armenisique & Cereolis Prunisque Damasci.

Et Ouid. in sua Metamorphosi,

Prunaque non solum nigro lucentia succo,  
Verum etiam generosa, nouasque imitantia  
ceras.

Galenus Iberia & Damascena celebrat, vti patebit in vitibus. Palladius ea Damascena dicit, quæ suo seculo siccabantur in sole per crates loco sicciorè disposita. Talia etiamnum hodiè in officinis Damascena dicta sunt: Δαμασκήνη κοκκίμηλον Athenæo tamquam ab alijs diuersum (alijs tamquam cæteris præstantiorè) quæ gignuntur in alijs regionibus. Pruna igitur hæc sunt & alijs & Hipponacti memorata, vt refert idem Athen.

Coronam habui è Prunis atque Mentha.

A lexix;

A. Quin & in somnis videre visus s. mibi  
Premium victoria. B. Quale id erat dicto.

A. Aduerte iam animum.

In stadio concurretorum me quispiam  
Nudus accedens coronare visus est corona tortili  
Prunorum. B. Dij boni. A. Maturorum.

Idem rursus

Vidisti vquam omasum paratum, aut splenem  
inquinarum condimento, maturorumque Prunorum sportam?

Tom. I.

Talis est prunus eius facies.

Nicander:

μῆλον ὁ κόκκινος καὶ λεῖος.

Malum quid, Cucullus vocant.

Ita vertunt. Annotat Dal. κοκκίμηλον: quod grana descendibus cucullus è suis latebris prodeat & conspiciatur: sed quid commune aut simile Pruno cum cucullo? Clearchus Peripureticus scribit, Rhodijs & siculis Pruna vocari βράβυλα, vt apud Theophrastum Syracusium?

Ramos Brabylis grames & in terram cithnos.

Et alibi:

Quandò Malum Brabylon suauis.

Est autem Brabylon fructus, Pruno vulgari ambitu minor, eodem sapore, sed paulò acrius. Hæc quidam referunt ad Prunum Damascenum. Dalechamp. reprehendit Athen. quod τὸ δρεχόντεον inceptè vsurpet, pro σερφόντεον, vel δρεχόντεον. Acerbius est Prunum syl. acidius Damasc. Seleucus in linguis, vt idem tradit Athen. eadem esse ait μεδρὺνα βράβυλα, κοκκίμηλον καὶ τὰ ἄλλα. Dicta porò sunt μεδρὺνα velut μεδρὺνα: βράβυλα verò quia ducunt aluum, quasi βορὰ βράβυλον id est, cibos depellentia & ἄλλα quasi μήλα, id est, Mala, vt Demetrius Ixion prodidit in Etymologia. Theophrastus, Prunus inquit, & spodiis, quæ veluti Prunus sylvestris est. Araros Coccyneleam vocat ipsam arborem: Coccynealium verò eius fructum. Aristophanes Grammaticus in Glossis Laconicis scribit à Laconibus Pruna vocari ὀξύμηλα περσικά, id est, acida Poma Persica, & à quibusdam Adria. Nec solum κοκκίμηλα arbor dicitur, sed & κοκκίμηλον, autore Polluce. Suidas δὲ κοκκίμηλα tradit vocari βερικοκκία, quæ tamen rectius dicas Armeniaca, de quibus suo loco.

Pruna multi, vt testatur Curtius ὀξυρά Græcè vocari arbitrantur. Nos verò eam vocem in hac significatione apud nullum probatam autorem inuenimus. Onychinæ autem ab vnguis colore vocantur eadem. οὐγὲ enim vnguis est. Sunt & versicoloria, & inter has differentias quædam præcocia, alia serotina: quædam item lignum statim dimitunt, & hæc inter pretiosiora habentur, & huius dotis in multis generibus nomine est: Cæteris verò carne lignum adhæret.

Goropius è Peni suo Cymbrio nobis aliquid noui importat. Pruna nos (inquit) Pruinnen vocamus, quasi Πυρ-πρυνnen id est, Moxa euacuantia. Latini itaque Prunorum nomen nostrati linguæ acceptum ferre debent. Hermolao teste: κοκκίμηλον & κοκκίμηλα, seu ut ille scribit, Coccomelea & Coccomelos Græcè dicta: Pomum ipsum neutro genere, arborem masculino media comedia pronuntiat. Folio Arbuti describitur, si Theodorus Gaza audiatur: sed hoc Plinius Theophrastum secutus, non Pruno sed Coggieryæ vocatæ tribuit. Decepit hominem, vel corrupta lectio, vel nomenclaturæ affinitas. sunt Pruna onychina Columellæ, nigris laudatiora.

Et quia Pruni Ecyimi mentio incidit non inusulè nobis Lonicerus in κοκκίμηλον derivationem originem inquirere videtur. Equidem, inquit, haud satis indagare huius vocis, κοκκίμηλον, etymon possum, vt rei respondeat. Ex compositione certè, κοκκίμηλον granum est, μήλον Malus, aut μήλα Malum, vnde Pomum potius Granatum erit. Verum historia & natura eius non responderet. Aliud enim est οὐγὲ id est Malum Punicum, aliud Prunum. Propemodum eò inclinatur animus, vt per barbaralexin putem κοκκίμηλον factum esse ex latine coquendj vocabulo, vt supra contigit in Armeniacis

C. 179.

Brabyla.

Brabylon.

Athen. not.

Sylvestre

Damascen

Madia.

Brabyla.

Prunus

Spodiis.

Coccynelea

Coccynelea

Oxyrhina

Perjica

Adria.

Coccynelea

lusi

Bericokea

Suidas not.

Ochra.

Glychima.

Versicoloria

etiam eorum

que differunt

in a

Pruni etymon.

Coccomelea.

lea.

Coccomelos

Gaza not.

Onychina.

κοκκίμηλον

lea.

Etymon.





figura, plurimo succo, si quod aliud genus abundantia, quare *Mithra* vulgus vocat, ac si succum meire videantur. Alia quædam vique adeo parua sunt, vt magnitudine Pruni sylvestris fructum parum excedunt, nigra, rotunda & feriora. Sunt & Acidula, nigro colore, succo etiam abundantia verum non iactantidem. In extremum Autumnum durant, vt hyemem attingant.

Clearchus Rhodius & Siculus, Theocritum Syracusanum *Brayla* pruna appellasse scribunt, quæ & *Madrya* & *Badria* Athenæo dicuntur, vt dictum supra. Fructus quidem hic minor, gustus verò idem, ni aliquantò esset asperior.

Ioubertus *Pruna Pertigonia*, *Prunaditila*, *Damascena* & *Imperialia* vocata præ cæteris commendat.

Solerius *Afinina* seu *Pedicularia* Plin. Gallis *Delphinatibus* *Prunes Bonitæ* dici scribit, esseque fortè *Hiberica*. Idem *Pertigonia* Ruellij, suspicatur esse magna Galeni.

Nicol. Abr. à Framboisere de sanitate tuenda: In Francia excellentiora Pruna sunt *Damascena* trium generum. Nigra, rubea, & violacea. Secundum locum obtinent *Dactyla* ob suauitatem. Magni sunt in Provincia pruna ex *Briognes*: multi etiam sunt *Pruna Pardygoia* ob magnitudinem & gratum saporem. Pruna *Reimense* æstimantur ob pulchritudinem potius, quam bonitatem: color enim cæruleus visu delectabilius, quam sapor gustui gratus: eis inest minimum aciditatis & adstrictiois, incolis dicuntur *N.berre*.

Sunt etiam apud Reimenses alia Pruna, dicta *des Vignus*, quæ comeduntur pterque priusquam maturecant. Propter insignem austeritatem & acerbicatem illi iis tantopere delectantur, vt soleant ponere in iuleulis, loco vuarum acerbatur.

Hispaniæ celebrata pruna, vt tradit Amatus, hodie Pruna *Damascena* præcipua habentur, Syracusana ab Hispanis nominata, nigra, rubentia, vel in totum alba, ad citrinum tendentia, oblonga, boni saporis: Citrina multi Cereia appellare non dubitant. Multi quoque ex omnibus Pruni speciebus præcipuè laudant, quam *Sal. naticenses Andrinæ* ob colorem nigrum vocant: rotunda sunt, sapore acido, ori gratissima, quæ matura febricitantibus apud *Salmaticenses* D. Alteretis non sine optimo successu concedebat. Lacuna verò scribit inter Pruna Hispanica præcipuè commendari dicta *De Monte*. Secundum locum obtinere quæ deferuntur ex S. Michaële. Inter ista sequi rotunda, quas vocant *Andrinæ*. Ab omnibus laudari *Damascena*.

*Perlustremus* nunc *Italica*.

Prunorum, inquit Cæsalp. rotundorum quædam mali amplitudine, flaua, dulcia, odorata, quæ primò maturantur: cognominantur autem à Malis. Iis minora, & austeriora, quæ Augusto maturantur, Pruna *Augustana* vocata: & *Albanula* inter pretiosas. Alia nigra, durior carne, sed gratissimo sapore, vulgò *Perdicoma* cognominant. Grandiora iis sunt *M. simiana*, ac succi bonitate præcellunt. Simili specie constant aria quædam, vt etiam fallant, sed in suauitate saporis quamprimum discernuntur, vt quæ *Afinaria*, & quæ *Gubia* alicubi vocantur ingustabilia. Paulo minora iis & oblongiora *Viridacea*, sic appellata, quia dulcia sunt antè perfectam maturitatem, dum adhuc viridia sunt. Hæc maturitate perfecta ad rufum tendunt, sed dulcedine minùs grata. Alia in longitudinem extenuantur iuxta

pediculum, vt *Damascena* colore flauo: *Catellana* colore subuiridi, alia colore nigro. Multæ alix sunt inexplicabiles differentiæ, vario cultu, & studio inferendi inuentæ. Est & sylvestris *Prunus*, &c.

Peculiare (addit idem Cæsalp.) in fructu Pruni, quod deflorescens, si multi umbres contigerint, conuertitur in longum quoddam corpus inanè quod *Turca* vocant. Idem ex Theoph. dicit Pruno foliū esse Arbuti: ac peculiare ei fructū in *pappum* perire: quæ Prunis nostris conueniant, si *pappus* hic non Lanuginem, sed inanè corpus significet, *Turcam* dictum. Quod ad primum, vel non rectè nouit Cæsalp. Arbuti folium, vel certè non benè contulit, atque adeò hac collatione alique n in suspicionem conijcere possit, ipsi neutrum probè cognitum. Quod posterius: bellam sanè verò interpretationem vocis *pappi*, quam Theoph. per τὸ ἀνυμνῶν ἑστὶν τὸν καὶ expressit. Si Cæsalpinus annotasset obseruationem doctissimi Hermolaj, comperisset id à Theophrasto de Pruno non dici sed de alia arbore. *Turcam* sapius obseruauimus, sed quo iure is vel alius quouis *pappum* vocet, nondum agnoscimus. Vitium est fructus *Turca*. non illi par nec ordinariè omni fructui enenit, vt de fructu eius arboris, de qua Theoph. scribit eum in *pappum* abire, tradit. Quod si verum esset de Prunis, ille sua *Perdicoma* non tantopere commendasset.

Sed persequamur reliqua Pruna Italica ab Aug. Gallo obseruata. Pruna, *Br. que* vel *si. sine* dicta Lombardis optima sunt, & bonitate *Damascenis* succedunt, quæ quamuis cæteris minora, pulchra tamen sunt, supida & sana, tam cruda quam cocta, potissimū n si cum pullis & auiculis decoquantur. Aluum soluunt cocta parum in aqua, & ita mollia comesta, cum multo saccharo. Sunt & alia magna, & dulcia admodum, quæ probè matura aluum magis lubricant. omnia cruda vel cocta in aqua tepida macerata sitim restingunt. His succedunt dicta *Brogne Agostane*, quæ non pulchra, longa tamen & crassa: sana sunt cruda, & cocta, & licca. Pruna dicta *Brogne grossi*, rotunda non postremas tenent, si præsertim benè matura & decocta sub cineribus folijs inuoluta, decorticataque & saccharo aspersa comedantur: vel etiam & melius, cruda decorticata, & in patella cum saccharo lentè cocta. Inter Pruna, quæ dicuntur *Brogne Myrabolani*, alba, nigra & lutea salubria esu sunt, non cocta. *Brogne Catellane* dicta, benè matura præferuntur cruda, cæteris omnibus, albis, nigris, viridibus aut rubellis, dulcedine & succi gratia præstant: corroborant magis, & præ alijs sitim extinguunt, decorticata à febricitantibus in ore retenta singulari sunt solatio, mitigant summum ardorem, & restitunt non nihil appetitum. Sunt etiam alia Pruna Italix vulgò dicta *Agostane bianche*, *Settembrine*, *Maff. miane*, *pernicine*, *Gierusalemæ*, & alia multa suauitatis & salubritatis non contemnenda.

His addamus quorum meminit Alpinus, (nisi iam suprà scriptorum aliquo nomine dicta sint) & cum dactylo oblongo, magno & crasso confert, *Pruna alba*, quæ Iulio mense in agro *Bassanensi* maturantur.

Mathiolus quem, velut Italum, decebat pulchras istas merces Italicas nobis Germanis præ alijs celebrare, ne quidquid de ijs habet: sed postquam palmam tribuisset *Damascenis*, quæ liccæ ex Syria Venetias importantur: secundas tenent (addit) in Germania quæ ex *Pannonia* & *Transsylvania* conuehantur in quorum genere

*Catellana*,  
*Nigra*

*Turca pruni*  
*vitium*

*Cæsalp. rap*  
*prehen.*

*Alia. era*  
*rer*

*Lombard*  
*c. p. pruna*  
*Syrna*

*Magna*  
*dulcia*

*Pruna Am*  
*gustane*

*Pruna*  
*crassa*

*Pruna my*  
*rabolana*

*Catellana*

*Alba Rossa*  
*nanja*  
*Damascena*  
*na vnde*  
*adu eda*  
*Pannonica*

quæ minuscule sunt, maiorem cum palato ineunt gratiam in vino decocta, & saccharo aspersa: hoc enim modo parata primisque mensis sumpta, & ori grata sunt & aluum commodissime citant, nam dulcia sunt & sine adstrictione. Verum si nō gustarit aut nouerit alia, quæ ex Germania prædicaret, deinceps Germani ipsi audiendi sunt, ut quàm Germania hoc fructu ditescat, intelligant etiam exteri: Matthiolumque interim excusent, qui Prunorum differentias inexplicabiles ferè dixit, quod non aegrè confitemur si intellexerit omnes.

Pruna  
Germaniæ

Damascena

Damascena Hungarica.

Pertigiana.  
Cereæ.

Prunida.  
Sylva.

Parua Autumnalis.  
Nigra.  
Rotunda.

Differentia

Dodon.

Had.

Iun.

Brabyla

Damascena

Pruna

Sylva ruffa

Luteola

Rubra aspinina

Minima seu nana.

Pruna quædam Belgiz.

Hordearia

Decumanum.

Damascena Ital.

Pruna scito Hispan.

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Pruna scito

Dodonæus quoque addit: Theophr. & Plinij Ægyptiam Prunum incognitam esse: nōtiam atatem in Germania, circa Damalcum Syriæ vibem natis Prunis carere. Pannonica siue Hungarica laudat oblonga & dulcia, sed magis tamen Moraica, ad aluum leniendam commendat, præsertim Branz nata, quæ Morauiæ olim Marcomannorum Prouinciæ, vrbs est primaria: hæc etenim ubi resiccata fuerint, ori suauia palatogue gratissima, aluum citra molestiam ita faciunt, ut deiectoria vi Cassiam & Mannam post se relinquunt, ut Thomas Iordanus affirmat. Nostra ætas quædam Gallia à patria appellat.

Persequamur cæterorum Germanorum differentias. Gelsnerus itaque has habet. Prunum quæ fructus magnos, purpureos & acidis sapore fert, Lindauia Bengi vocant, Tigurini Bockshoden (quasi capri testiculos dicas) vel Pflaumen. His similia etiam cerei coloris minus frequentia apud Tigrinos reperiuntur. Pruna Cereæ vel Cercola magna subdulcia. Pruna parua, ferotina, cercola, quæ Tigrini & Heluetij nescio unde Siparten appellant: Inter vibana minima, tardissime cerea ferè maturefcunt Septembri. Pruna præcociora parua, versicoloria, à tempore quo Avena metitur apud Tigrinos dicta Bockshoden, passim illis abundat. Pruna Neapolitana, oblonga, dulcia (ni fallor) alba & Punicea, Lindauia. Pruna Hungarica, quæ vulgo Tuucha vocant, Zwetschen, duorum generum: maiora & oblongiora: & alia minora, rotundiora, dulciora Lindauia: Basilæ probè perficit fructum. (Sanderfied en vocent Pruna Hungarica præstantissima, Damascena fortè Vvoissello. Eiusmodi Venetiis mittuntur aliquando Augustam magno pretio, crassa & carnosa, subacida. Hæc vel oblonga Neapolitana, aliqui Imperatoria siue Augusta cognominant, quod iis Imperator Augustus oblectetur. (Itali sua ab Augusto mens, quo maturefcunt, Augusta dicunt, de quibus suprâ.) Augustæ Pruna alia Hungarica, aurei vel cerei coloris: magnitudine otii gallinæ: aut etiam Anatinis, carnosa, gratissima saporis. Aliud pruni genus, maturefcit circa finem Iulij, cui fructus parui cerulei, dulces: Blawfrieschen. Pruna minima, subcerulea, acida, parum humida, Weinfrischen, maturefcunt Augusto. Weinfrischen, Pruna alba, tardius aliquando maturata minùs alba. Bockshoden, partim candida, partim rubella, aluum puto magis solunt: & hæc aliqui alba vocant, sed minus propriè. Hæc Gelsnerus.

Tabernamontanus quatuor summa Prunorum facit genera: 1. Vulgata, quorum quatuor differentias constituit, nigra, rubella, alba, vitidilla, quædam etiam flaua & rubra. 2. Pruna Myrobalana, quæ antequam maturefcunt sunt viridilla, postea rubescunt, tandem perfectè maturata atropurpurea sunt: succulenta, odorata, nucleo paruo. 3. Auenaria Haberschiehen vulgò dicta, primo generi similia, sed fructu paruo acidulo, substringente sapore, grato tamen. 4. Flaua, oblonga, nucleo exacuto, vulgò cerea, wachsgelbe Pflaumen oder Spilting dicta. His addit quædam alia sed iam dicta: quamuis & hæc fortè iam magna ex parte memorata sint, nec vltus sit iam didicorum, dicendorumque autorum, qui non alterius quædam habeat, etiamque diuersarum regionum. Scopos tamen noster est, uti suprâ quoque in Pomis diximus, non tam nationum quam ipsorummet autorum, quæ tamen feri

Agg  
Prun  
Pann  
Moi  
Prun

Gallia  
Gels  
diff  
M u  
Cere  
gna  
Cere  
par

Prun  
par  
Nec  
na  
Prun  
maio  
Mm

Hun

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na

Prun

na



id possit breuitate, differentias referre quæ eti-  
 sic, pñs incedu n repretatur, nullus tamen est, qui  
 non sui idio natis appellitiones addat, & deuersi  
 aliqua annotatiuncula illustret: simulac, vt con-  
 sensus & dissensus auctorum circa eas lectos ob  
 faciem positus, melius innotescat: nec desit no-  
 bis in Vniuersali, atque adeo specialissima hac  
 historia, quod adit alteri: Adit verò etiam nobis,  
 quod desit aliis ne quis deinceps aliquis nobis  
 veteratorie obiciat *mutasias*, quam tamen  
 etiam facile euasare possit, qui omnia exactè co-  
 gnita haberet. Alioqui lectori fraudem, sibi dede-  
 cus parabit, quisquis hoc tentauerit. Quod si  
 placuimus huic vel illi nationi, cur non æquè pla-  
 ceamus & alteri?

Sed pergamus, & lectori æquè rerum diuer-  
 sitates, quàm auctorum placita ob oculos ponamus:  
 ita enim demum hoc opus omnium *Herbariorum* (qui  
 nobis propofitus est scopus,) quantum quidem fieri possit,  
 vires supplebit.

Camer. inter Pruni genera varia, potissimum  
 Hungarica, Moranica, & quæ vulgò Myrobalanos  
 dicunt, itémque Græca, quæ potissima *Verdaria*  
 à viridi colore in Italia vocantur, & aliis præfe-  
 rentur, concelebrat.

Schwenckf. sua diligentia Silesiæ Pruna  
 vstata recenset hæc. 1. Pruna domestica.  
 2. Pruna Hungarica maiora, Pruna Brunensis,  
 Pannonica, Brunner Pfäumen/ Ungersche  
 Pfäumen. Omnium sunt præstantissima, ori-  
 grata. 3. Hungarica minora, Tzweitschfen/  
 ficine pfäumen/ dulcia sunt, & ori gratiora.  
 4. Afanaria, Rospfäumen/ magna sunt, ru-  
 bore persula, viliora. 5. Cereæ minora, præ-  
 cocia, Gele pfäumen. Gele Spillinge.  
 6. Pruna Cereæ maiora. Morannen/ Ma-  
 runcken: hortis instructioribus saltem nota:  
 maxima sunt. 1. Prunida Styla oblonga & cærulea,  
 Blawe lange pfäumen/ Bissen pfäumen/ Bla-  
 we Spillinge/ Blawe Morannen. Ex semine  
 Prunorū Cereorum maiorum hæc nasci ait, quod  
 profectò nobis nunquam persuaserit. Considerent  
 igitur Agriculturæ studiosi, an ex Prunorum Ce-  
 reorum maiorum semine, hoc est, à specie di-  
 stincta, possit nasci alia species, nempe Prunida-  
 Styla cærulea, quod nobis non sit verisimile.  
 8. Pruna canina, Hundes pfäumen/ weisse  
 pfäumen: parua sunt, pallida, nonnihil rubi-  
 cantia, dulcia. 9. Parua autumnalia, seroti-  
 na, Auenaria, Herbstpfäumen/ friechen: Sil-  
 bipparten/ minora sunt & cærulea, hortis rusti-  
 corum nihil frequentius, ex quibus additæ fa-  
 rinæ edulia parantur haud ingrata, salubria: ve-  
 rum recentium vsus nimius Dysenteriam pro-  
 create solet. 10. Pruna parua vinosa, wein-  
 pfäumen/ Tarrnischel/ vulgò viridia sunt, vinosi  
 saporis. Condiuntur saccharo febricitantibus  
 grata. Colerus annotat prunis Friedchen dictis,  
 rusticis Silesiæ liberos & familiam suam hyeme  
 alere, quorum variæ differentia æquè in syluis  
 proveniant & agris, quàm hortis, eaque adeo  
 quæ syluis nascuntur etui gratissima & saluberrima  
 esse (gar natürlich zu essen) quasi dicas  
 optimè naturæ convenire, ventricu-  
 lum claudere, bonum generare  
 sanguinem, In Misnia dici  
 Carnischel. Pruna  
 Onychina,

# PRUNVS MYROBALANVS DICTA.



Sunt quidem  
 Prunus dicta  
 Myroba-  
 lana cognomina-  
 ta, trium generū  
 nomine solo ex  
 August. Gallo,  
 qualia tamen vix  
 huc pertinere ar-  
 bitratur. Me-  
 lius respondent à  
 Gesnero citata  
 addito paruo le-  
 mate. Clusius  
 verò hæc dili-  
 gentissimè, vt  
 plerique sua,  
 describit, his  
 verbis. Facile a-  
 dolescit hæc ar-  
 bor, & in vastam  
 excrescit ampli-  
 tudinem, maiorēque eius rami subinde in alios  
 diuisi, opacam admodum præbent vimbram:  
 caudex multò lauiore gratioreque oculis cortice  
 præditus est, quàm reliqua Prunorum genera: te-  
 nuiores rami, graciles admodum, tenerimo cor-  
 tice vestiuntur.

Folia quodammodo media inter Prunum & Cera-  
 sum, tenella per ambitum serrata sunt. Flos can-  
 didus, tenuior, quàm in vulgari. Fructus, cuius  
 alternis annis feracissimus est rotundus, oblon-  
 go tenuique petiolo inter folia pendens, aspectu  
 iucundus, per initia viret, cùm maturescere in-  
 cipit, rubet: maturitatem adeptus purpura, ni-  
 gro commixta nitet, carnem succulentam & pa-  
 lato gratam ac nucleū non admodū magnum ha-  
 bet. Floret cum alijs eius generis nouo Vere, sub  
 Iulij finem & Augusto fructus maturitatem adpi-  
 scitur. Nondum vulgaris erat, cùm eam describe-  
 ret Clusius: sed qui habebant, ex Cæsarej Pala-  
 tij orto nacti erant, vbi omnium prunas conspex-  
 it eius arbores tres ingentes, vnde primū  
 eò delatas, incertum. Nonnulli è Constantino-  
 poli, alij è Gallia genus duxisse arbitrantur. Cer-  
 tē ea arbor quæ Biturigibus Gallorum Myroba-  
 lanorum Chebulorum nomine ostenditur, huic  
 persimilis esse videtur, vt ex eius folio inde dela-  
 to, & Clusio à Cl. D. Io. Polthio Palat Elect. Ar-  
 chiatro donato, æstimatum. Idem Clusius apud  
 Garciam scribit, istud folium Persice folio simi-  
 le non esse, sed Pruni aut Cerasi folium potius  
 æmulari, atque nihil aliud se comperisse quàm  
 Pruni genus. Fortè Tabern. vel is à quo accepit  
 Iconem, hanc Prunum etiam habuit pro Myroba-  
 lano, vt cap de Myrobalanis monebimus.

Nunc in eodem Cæsateo orto illius genus a-  
 litur ex superioris nucleo natum, quod minore  
 fructu & dulciore pulpa est: in cæteris nihil à su-  
 periore differt. Cur huic generi Pruni, Myroba-  
 lani sit appellatio data, fateretur se nescire, Clu-  
 sias: nam, inquit, nec fructus similis est neque  
 officula, quæ reliquis Pruni generibus similia  
 habet; licet parua, cum legitimorum Myroba-  
 lanorum officulis siue nucleis, quæ canaliculata  
 sunt & striata, quicquam commune habent.

Descriptio  
 arboris.

Folia.  
 Flos.  
 Fructus.

Tempus.

Locus.

Myrobal.  
 ni Chebuli.

Pruni M.  
 robalani.  
 Garciæ.

*Pruna Bru-*  
*scilla:* Idem Clus. inominat Prunorum Brunensium  
Morauiz eorumque pulpa cum Laurocerasforū  
pulpa conferens, vtraique dulcem & edulem di-  
cit.  
*Galatensia*  
*pruna.*  
*In Pruna*  
*daetyla.* In Pannonicis verò Galatensia siue Perana Pru-  
neola scriptis prodit, quæ oblongiuscula albique  
dicit.

AMYGDALINA PRVNA.

**A**mygdalina Pruna Lobel. in histor. Belgica  
oblonga dicit, Daetylorum aut Amygdala-  
rum instar. Amygdalina Pruna etiam in Plant. ico-  
nibus dicta Belg. *Amandel pruynen* est *Danz-*  
*pruynen*. An verò sint ea, quibus Plinius in ligno  
nucleum Amygdalæ esse dicit, & ex Pruni & A-  
mygdali infusione geminata, asserere non ausimus:  
Quemadmodum nec an Prunidaetyla Ruellij,  
Curtij, Tragi & Silestis supra dicta.

Pomaria quædam cultiora Gallica quandam  
Prunopersicum colunt, cuius fructus carne Pruni  
est, cute subuiri di Pruni, sed nucleo Persici. Pen.  
& Lob. Eiusdem meminit Cam. apud Matth. ex-  
ternè Pruno similia dicens, nucleo Persici.

*De Prunulis*  
*quibusdam*  
*Indicis*  
*scribit Benzo*  
in hist. noui orbis his verbis: Ad sinum Caraguā  
procedimus, Cercis quibusdam Prunulis velce-  
bamur, queis quum parum carnis inesset, lignum  
seu os interius simul comedebamus.

Hactenus ferè tam à prisca quam recentiori  
obseruata, & aliqua tamen parte nobis etiam co-  
gnita recensuimus, qua potuimus fide breuitatè  
que: restat vt & à nobis obiter obseruata, & for-  
tè nec alijs ignota dicamus, adiecto vnicuique  
more nostro, suo lemmate.

Solent curiosiores & lautiores Pharmaceopoi,  
pro dedicationibus, elegans nec minùs vrile ac sa-  
pidum quoddam Pruni genus ex Galloprovincia  
ad nos importare, quod *Prunes de Brignoles*,  
Briolina Pruna vocant. Ea detracta cute, & vna-  
rum passurum modo, velut in vnum glomum  
compacta, sicuum instar aduchuntur, aut in sca-  
tulis. Colore sunt dilutè rubello, ad flauedinem  
tamen accedente, carne firmiuscula, qualis corti-  
cis Citti conditi aut Cydonij mali, subacida at-  
que vinosa, febricitantibus cruda, vel ex aqua le-  
uissimè cocta, mirè expetita, nullo officulo: quip-  
pe eximunt incolæ qui reponunt. Figurà Caricas  
pingues egregiè referunt, si colorem demas. Ea-  
dem cum officulis accepimus: oblonga erant,  
sicut & officuli, qui durissimi, nucleum continen-  
tes modicè amarum, gratum tamen.

Hæc Scal. Nucipersica visus est appellare quando  
apud Theoph. alicubi sic scribit. Perseæ Pruni fa-  
cie, de qua olim dubitabam esset ne nostra Nuci-  
persica, quam Valcones Brignols vocant. Pruna  
Briolina Lob. teste hodie in Prouincia salubritatis  
& saporis ergò optima habentur. Idem cum  
Pena in Aduer. Damascenis olim omnium præ-  
stantissimis inquit, *Brign. lensia* hodie in Gal-  
laprouincia palmam præripuerunt bonitate,  
salubritate & sapiditate. Distat autem Bri-  
gnola 30. mil. Gallicis à Massilia teste Rauouillio  
qui eadem & ad sitim & ad febricitantium usum  
valdè probat.

Autor postrem. hist. Bellorum Galliz scribit,  
pro Cortice Citti condico quem peribat Dux  
Guisus, data Pruna Brignolina, ea ipsa hora, qua  
morti erat tradendus: quod ex suspitione haud  
vana necis instantis velut Lypothimiā quædam  
præstetiret.

*Quædam*  
*Indicis*  
*scribit Benzo*

*Autioribus*  
*obiter obser-*  
*uata diffu-*  
*gentia*  
*Pruna Bru-*  
*scilla.*

*Nucipersica.*

*Nucipersica.*  
*ca.*

*Brignols.*

*Brignolsen-*  
*sa.*

*Brignolina*  
*Guisus mor-*  
*ti tradendo*  
*ob suspitione*  
*hæc instantis*  
*velut Lypothimi-*  
*am quædam*  
*præstetiret.*

C. Bauh. apud Matth. eadem Pruna de Pru-  
nioles vocat.

Pruna dicta vulgò Lugdunensibus *Prune dou* satis  
magna, breui harent pediculo, orbiculata, ab  
vno latere per longitudinem sulcata, aut vesti-  
gium fissuræ habentia, rubra ac velut fulgine cœ-  
rulea aspersa, gustu dulcia, cum quadam acidi-  
tate, carne satis dura, quæ haud difficulter ab  
osse separatur, Matura Iulio.

Isidem *Prunes Armesines* appellata, prædictis  
minora, eiusdem fermè coloris, oblongiora, odo-  
rata, dulcia cum quadam aciditate, carne limi-  
niscula, ab officulis facillè separabili, quæ parua,  
compressa, læuia, dentibus facillè confringuntur  
Matura Iulio.

Sunt nobis Montbelgardi in horto E. C. Witt.  
Pruna quæ dicuntur Damascena: purpurea, val-  
dè rotunda, quibus pulpa ab officulis facillè abscē-  
dit, suntque ea ipsa, nisi fallimur quæ Lugduni  
de *Damas* vocant, maiora iam dictis Armeinis,  
purpurea, rotunda, ex breui pediculo pendentia,  
coerulea quadam nebula respersa, tota concolo-  
ria, etiam adhuc immatura, valdè acida, officu-  
la continentia parua, rotunda, similia officulis  
Ceraforum. Talia vidimus Ceuinij Pago Passa-  
uantino Septembri optima. Ex hoc genere existi-  
mamus esse, quæ sicca apud fontes acidis Græc-  
bachianis vidimus, parua, rotunda, ab officulis  
facillimè abscedente carne. Aiebant Argentinam  
Turono vrbe Galliz aduehi.

Pruna Lugd. *Damasc* dicta, Damascenis mo-  
dò dictis multò sunt maiora eiusdem tamen colo-  
ris ac formæ brevissimo adherent pediculo ipsa-  
que caro firmiter nucleis: acida sunt, nukes ob-  
longæ, satis tumide, maiores quàm Prunorum  
Dat.

*Perdigone* Gallico idiomate dicta iam modò  
descriptis minora, rubra fulgine subcærulea  
adumbrata, rotunda ferè, carne dulci, satis solida,  
officulo mediocri minime adhærente. Hæc Da-  
mascenis quodammodo similia, paulò maiora ta-  
men, nec ita rotunda, & vtrinque per longitudi-  
nem fissurâ vel sulco notata. Horum surculos  
Montbelg. in horto inferi curauimus.

Pruna *Dares* Lugdunensibus appellata, Dama-  
scenis magnis æqualia aut etiam maiora minùs  
rotunda, nec eiusdem coloris, sed rubri, nebula  
cærulea obducti, pediculo satis breui, carne fir-  
miuscula, dulci, & ab officulo promptè separabi-  
li: Tunica inuestiuntur dura & sicca. Officula  
breuiuscula, nec magna dentibus fragilia, matura  
Iulio. Missi nobis Lugduno surculi Montb.  
in horto E. C. inferendi cum hac inscriptione,  
*Prunes dures, grosses comme œufs*, id est Prunidaetyla  
magnitudine oui: possint fortè esse eadem cum  
Prunidaetylis purpureis Ruellij, Curtij, Tragi &  
Silestis.

Meretur rara hæc Pruni species Curiosior  
etiam descriptionem, siue arboris formam, aut  
fructus elegantiam præstantiūque species. Vili  
nobis in horto D. Chassignetii Adinis nostri, ve-  
sunt. Haud procera valde est, sed egregiè pa-  
tula, & in quamplurimos ramos brachiata, corti-  
ce tecta suffusco, & circa extrema ex pullo ci-  
nereo mixto. Folia lata, figura penè ouata, sed  
principio angustiore, paulatim in amplitudinem  
vergente, ambitu leuiter crenata, saturè viridia  
aduersa parte, & quasi atroviuentia, aucta dilu-  
tius. Flores denso ogmine stipati, albi, sed mi-  
nùs, quam reliquorum. Fructus digiti lon-  
gitudine, virentes ad perfectam vsque maturitatem,  
quæ vix eisæu digno momento ad citrinam quan-  
dam.

*Prunij*  
*styla*  
*junioris*  
*videmus*

*Cortice*

*Folia.*

*Flores.*

*Fructus.*



dan flauedinem inclinant, sapore præ cæteris suauiter ac dulci, cure obiecta dura & membranosa, vt melius patet in conditis, pulpa recentibus firmiuscula, & à nucce contenta libera. Nux hæc seu officulum aliquid peculiare præ cæteris habens, vicia longius, gracile, cõpessum, leuiter incuruum, vtrique acuminatum, nucleum gracilem, nec valde amaricantem continet.

Hæc arbore nihil fructuosius: fructuum numero ipsa vincente folia, inigenti nihilominus cæterua humi iacentia: nec extremis tantum furculis, sed crassioribus etiam ramis immediatè hærentes quamplurimos obseruauimus. Magna his gratia in cibis, siue crudis siue decorticatis ex saccharo & vini modico aquaue rosacea coctis. Sed modicum addi melius, quod ipsa per se calisfacta satis succi fundant, & vt natia peculiaremque suam suauitatem non amittant.

Præcipua gratia conditis. Condiuntur autem saccharo integra, etiam cum officulis: sed non perfectè matura esse oportet, maturitati tamen proxima. Sic firmiuscula caro etiam conditis, mirum quantà gratiâ atque dulcedine. Habet quidem Dactylica alba Curtius, quæ ita fortè vocat ad Purpureorum differentiam: Sed hæc eiusmodi viriditatis speciem ac colorem habent, vt alba dici non mereantur: ex viridi tamen albescunt, præsertim probè matura, sed de Curtij nobis ignotis nostrum statuere non est præsertim cum sua non describat.

Pruna dicta Lugdunensibus, *Prunes blanches*, longa sunt satis magna, lutea, cum quadam rubedine, carne satis molli, acido dulci. Officula longa, compressa, ab vna parte ad sphaericam formam tendentia, sicut & ipsa Pruna.

*Prunes de Rois*, magna quoque sunt, rubra vel potius punicea, rotunda ferè, valde odorata, carne dulci, tunica satis dura & acida. Caro facillè abscedit ab ossibus, quæ magna & aspera. Matura Iulio.

Montbelgardii habent Pruna Augusto matura, rotunda, satis magna, rubelli coloris, carne officulis hærente non ingrata. Plantari curauimus in horto Ill. E. C.

In horto iam dicto abundat Prunus, fructu purpureo, satis magno, ferotino, sublongo, acido, carne officulis adhærente, quæ nostra cura plantata. Hæc sunt ea quæ Ligd. *Prunes d'Asie* dicta ex postremis maturescunt, similia Damascenis, minora, quæ etiam viridia planè concoloria sunt, vt videantur matura.

Pruna purpurea vel coccinea magna, nonnihil sublonga, officulo nudo manente, maturescunt Augusti fine. Damascenorum generis quoddam esse videtur, officulo incuruato. Montb. in horto E. C. satis copiosè provenit. Talia obseruauimus Goepingæ in Ducatu Wirt. vbi copiosè coluntur & exicantur ad vsus medicos & culinarios. Hungaricis non cedere videntur. vocant *Zwetschen*. Eadem nobis visa in Wisensteig/ horto Ill. Comitibus.

Aliud pruni generis præcox in horto Montb. habetur, quod citò maturæscit, colore purpureo.

Pruna sublonga, parua, alba, vnicæ, digitine latitudine, interdum non maiora, facillè nucleum linquentia, acidodulcia, optima & delicatissima, cruda & exiccata. Hæc ex diuersis Burgundie locis conquisita in horto Montb. plantata sunt. Maturantur ferè Aug. principio.

Pruneolorum cereorum vulgò *Ziparten* dictorum arbor plerumque vulgaribus Prunorum arboribus minor est, siue caudice spectes, siue ramos & folia,

Præcipuè verò est fructuum discriminem, qui autumno prius maturescunt, colore cereo, cui glaucedo aliqua aspersa, non multò maiores Prunis siluestribus, pediculo sefcunciali hærentes, sapore dulci, officulo facillè à pulpa separabili, cui ab altero latere crista secundum commissuram nonnihil elata. Hæc Basileâ accersita, vbi in lautioribus horris coluntur, in horto E. C. Montb. plantari curauimus. In pago Raupach Beffordia vicino copiosè coluntur, & in magnas arbores excrescunt. Maturescunt Sept. In Ducatu quoque Wirtemb. potissimum circa fontem adu. habentur prædicto nomine.

Anno 1607. principio Septembris ostendente Char. fratre C. Bauhino vidi pruna valde speciosa, magnitudine ferè paruorum Persicorum, cum sulco in medio, qualem habent Persica, colore sunt rubra, carne firmiuscula, saporis grati, lucundi, subaciduli: pro proportionè fructus paruus, à carne separabilis, aiunt plures in hortis haberi, ac inter alios honorandum nostrum affinem Dn. Feschium Consulem meritissimum. Hoc genus Pruni existimo esse Prunidactyla Clusij. *Hæcenus de generibus & differentiis Prunorum.*

Prunus in genere, solo læto gaudet, & humido: Coelo tepidiore melius adolefcere putatur, quamuis & frigidius possit sustinere. Non temerè in montibus visa. Prunus, inquit Plin. Locis glareosis & arenosis, nisi iuuetur lætamine, caduca.

Poma & vermiculosa non grandescunt: autor Palladius. Gignuntur hodie in omnibus cogniti orbis regionibus, sed potissimum vbi terra sit soluta & hortensis. Quapropter paucos videas in Europeo tractu hortos paulù cultiores, in quibus non Pruni aliquod genus reperitur: quamuis Tragus scribat, Pruni varia genera tardè ad Gillos & Germanos commigrasse: sunt tamen hodie apud eosdem vbique ferè locorum notissima.

Pruna omnia, post Catonem cœpisse manifestum esse, ait Plinius: specialia loca in differentiis dicta sunt: Damascena tamen sicca terra & coelo calido gaudent, vt Pamphilus scriptum reliquit.

Florent plerumque cum Ceraso, Aprili, aut etiam citius. Nos Prunum etiam vidimus florentem Septembri in pago *Adincourt*, comitatus Montbelgardici, Anno 1580, & denuò non vno in loco An. 1599: quemad. & hoc quo hæc cõmentamur, 1603. quo & fructus vidimus magnitudine aulanæ: Ex quo patet promptitudo germinandi florentique huius arboris, si ultra consuetum tempus ætatem extendatur. Fructum diuersimodè maturant, Iul. Aug. & Sept. mensibus, vt particularis dictum in præcedentibus. Monspelij obseruauimus Prunum habentem magnum fructum & florem simul mense Aprili: estque contumacis vitæ Prunus.

Pruna Columella post median messem, vsque ad Idus Feb. feri præcipit. Plinius verò Italiæ ferendi tempus Prunis post median hiemem & Idus Feb. indixit: oportet autem Prunos distantiores ferere Piris, autore Theoph. si ossibus feratur, vt tradit Pallad. autumno, mense Nouembri solo putri & subacto, duobus palmis obstantur. eadè ponantur mense Feb. sed tunc priùs lixiuio sunt maceranda per triduum, vt citò germinare cogantur. Ponuntur & plantis, quis ex caudice mense Ian. exeunte, vel Feb. circa Idus sumemus radicibus fimo oblitis.

Extripandæ sunt soboles à radice, exceptis rectoribus, quæ seruabuntur ad plantam. Si lan-

*Pruna parua persici similia.*

*Locus & tempus prunorum in genere. Ne germinet culesa sunt.*

*Sationis tempus.*

guida Pruni arbor est, amurca cum aqua æqualiter temperata radicibus debet infundj, vel bubulum lotium solum, vel humanum vetus cum duabus aquæ partibus mixtum, vel cineres ex furno, maxime samentorum. Iuuantur frequenti humore, & assidua foliione.

Si poma decidant, Oleastri cuneum terebratæ infige radici. Vermes eius atque formicas rubrica cum pice liquida si adlinatur, extinguet. sed modestius propter arboris noxam, ne idem faciat remedium, quod venenum.

Si Pruni furculi in mosco intingantur, & deinde inferantur, fructus inde fieri odoratos, Coctus tradit. Mense Martio extremo Prunus inseritur, melius trunco fisso quam cortice: vel mense Ian. antè quàm incipiat germen lachrymare. Inseritur in se, & Persicum recipit uel Amygdalum vel Malum, sed eam degenerem reddit & pernam. Pruni, inquit Gesnerus, inferuntur Nucis, Malo, Amygdalo. Castaneæ etiam inferi Tadjad. tradit his versibus:

*Pruna suis addunt fælicia germina membris.*

*Donâque cognato corpore lata ferunt.*

*Exarmat fætus: sed brachia ruboris armat*

*Castaneæ Prunus inssa tenere larem.*

Nucibus iam olim inserta fuisse, ex Plinio patet: inde Nuciperfica enata. Damascena inseritur iisdem hortis vt reliqua Prunus, vt Pamphilus scriptum reliquit.

Prunorum furculi sambuco insiti, Carthartica Pruna ferunt. At nisi curam diligentem adhibueris facile pereunt.

Pruna seruantur cadis vino dulci vel nouo fluitantia, operto diligenter vase. Siccantur etiam in Sole per crates loco sicciorè disposita. Hæc sunt quæ Damascena dicuntur. Alij in aqua marina vel in muria feruente recenter lecta pruna demergunt, & inde sublata, aut in furno tepido faciunt, aut in Sole siccari.

Pruni fructus, vt tradit Diosc. esculentus est, sed ventriculum malè afficit, aluumque mollit. At Syriacarum, & earum maxime, quæ Damasci nascuntur fructus exiccatus ventriculo vilis est, aluumque adstringit. Decoctum foliorum, ex vino paratum, vnam, gingiuas, tonsillâsque fluxione laborantes ore subinde colluto reprimunt.

Ceterum gummi Prunorum agglutinandi vim habet, & in vino potum calculos comminuit. Ex aceto verò illitum lichenas infantium sanat.

Verum Galenus 8. simp. cum Diosc. non omni ex parte conuenit: ita enim scribit ille: Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus aridus minus. Ceterum haud scio cur Diosc. Pruna Damascena siccata ventrem sistere dicat, cum & ipsa palam etiam subducant, minus tamen quàm quæ importantur ex Iberia. Siquidem Damascena magis adstringuntur quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionè respondent. Minus enim adstringunt, quæ in Iberia nascuntur: magis verò quæ Damasci. Vt autem in summa dicam; quorum in foliis aut gemminibus adstrictio quadam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonæ in Columellâ aut tonsillis existentes idoneè colluuntur. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto, puerorum sanare lichenas. Ac si id præstat, (vides dubitare Galenum, quod & nos facimus: nam si manifestam glutinandi facultatem habeat, vt Diosc. fatetur, quomodo calculum comminuat)

clarum est incidendi tenuandique illi facultatem inesse. Idem de Alim. fac. l. 2. Rarè fructum hunc austerum, aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, vbi exactam fuerit confectus maturitatem. Priusquam enim eò perueniat, nullus est fæmè qui non acorem aut acerbiteriam præ se ferat: est & qui amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter ventrem statuimus, vitis erit, quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porò æquæ ac Ficibus concessum est, vt vel exiccata vitia permaneant.

Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima ijs quæ in Iberia & Hispania proueniunt. Probabilissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxaque sunt. At parua, dura, acerbique & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè ventrem molliunt, etiam si sola comedantur, multò magis si melicratum ipsum suborbeatur. Hanc vim Prunorum laxantem multi poete suis carminibus commendauerunt: quale est hoc quo Martialis laudat.

*Pruna peregrina carie rugosa senecta*

*Sume solent duri, soluere ventris onus.*

*Sæpe cibi specie, vitio vel corporis ipso:*

*Poribus aut duris, restricta morabitur aluus.*

*Vinciturque mora alis cum gramine Mercuriadis*

*Prunæ conueniunt, quæ mittit clara Damascus.*

Pruni folia, inquit Plin. decocta, tonsillis, gingiuas, vnae, profunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt, stomacho verò vtilissima, sed breui momento. Sic Apollonius apud Gal. foliorum Pruni consutorum, decoctum lacte permisto ad aphthas colluere præcipit, pueris nimirum lactis vsum cum folijs consutulis præscribens, sicut Diosc. & Plin. vini cum foliorum decocto, adultis & in grauioribus affectionibus.

Diphilus Siphnius, vt testatur Athen. Pruna succi mediocriter boni scriptis, facile corrumpi & egeri, parumque alere.

Audiamus Mesuen, distinctè admodum ac Medicè de Prunorum viribus tradentem. Pruna, inquit, aluum subducunt, & alterant: sed alba, flaua, rubra, minus sunt medicamentosa, quàm nigra: quorum quæ *µύρα*, id est dulcacida sunt, alterant magis. Dulcia verò soluunt largius: tamen vtraque alterant, & soluunt, magis scilicet & minus. Damascena verò, & Armena, vtrumque præter cætera præstant, humida tamen potius, quàm sicca corrumpuntur.

Dulcia calido frigido temperata, aut paulò frigidiora, humida ordine secundo: *µύρα*, id est, dulcacida frigida, principio secundi: omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant: bilem educunt: ob hæc duo biliosis tum febribus, tum morbis alijs sunt salubria: stomacho nocent, pauci sunt alimenti. Quia imbecilliter soluunt, eis adqueunt præsertim infusione, Tamar Indi, Cassia fistula, Manna, violæ conditæ. Ex horum succo fit Syrdus & ex carnibus Electarium in eadem salubre.

Armeni truncum Pruni arboris locis duobus vel tribus palmæ vnus intervallo tenuiter perforant: immissoque scammonio lutant, Pruna ob id purgatoria euadunt. Dantur succo seu decocto cum saccharo ad libram vnâ.

Porò Plinius tradit, tam in syluestribus quàm satiuâ Prunus esse Limum arborum, quem Græci Licheda

*Ne pruna decidant. Amersus Germes et formicas. Ut odorata nascantur Pruna. Infectio.*

*Ut purgantia Pruna nascantur.*

*Repositio.*

*Damascena*

*Vires & v. sus.*

*Stomaculum Alui fluxus*

*Defluxio.*

*Gummi. Calculus.*

*Phlegma.*

*Diosc. repreh.*

*Damascena*

*Iberia.*

*Phlegma.*

*Gummi.*



Lichena appellant, rhaadis & Condilomatibus mirèrè lem.

A Prunis, inquit, Tragus, æstate potissimum Augusto mense (quod tum Dysenteria grassari ferè solet) abstinendum fuerit. Pruna arefacta & tosta, aliquantò sunt siccioris naturæ, quam recentia, inter quæ Damascena & Cereola maxime commendantur. Quo fit vt in coquinis magnorum dominorum suum quoque iampridem obtineant locum. Ex his enim eclegmata compositionibus nocturnis conficiuntur.

Sepsisarij maiori cum emolumento illis vtuntur, vt qui ex his Electuariis Diaprunum appellatum conficiant, quod ad omnes calidas & siccas febres vnicè facit, quippe cum humectandi & refrigerandi vi polleat. Crediderim magna illa Pruna, quæ autumnò maturantur, & Germ. Schaasflaumen & Gros Rosflaumen Lat. Asinina nuncupant, arida vino bono & dulci decocta ac vsurpata, calido & sicco stomacho prodesse, eumque si durior sit emollire. Homines tenuioris fortunæ arida Pruna viua aqua molliunt, iisque in calidis affectionibus ad restringendam hñm & calorem vtuntur.

Cornarius Dioscoridis patrocinium suscepturus contra Galenum his inuit verbis: Miratur Gal. Dioscoridem dixisse quod siccata alium sũstunt, quum etiam ipsa manifestè illam subducant, sed minus, quam Hispana. Quando verò etiam ipse Gal. pruna in communi ventrem subducere dixit, recentia magis, siccata minus: potest & Diosc. Damascena siccata, id quod minus præstant, omnino non præstare dixisse, & sic contrarium eius de ipsis pronuntiasse: maxime quum Gal. Damascena magis astringere dicat, quam Hispana, quæ Catalonia hodie à regione appellantur, & ad astringendi vim insuper accesserit assiccatio. Atqui non videt Cornarius cum suo magis & minus neutiquam Galenum cum Diosc. conciliari posse: quòd ille comparatione ea vsus sit, hic nequaquam. Nec magna subtilitas in eo, dicere, id quod minus præstat, cum eo quod omnino non præstat, quomodoconque conuerti posse. Minus sic dixeris Rhabarbarum purgare, quam Turbethum aut Aloe, ideoque dici posse, omnino non purgare, quod nullus proculdubio vnquam sanæ mentis concefferit.

Matthioli Galenum tueretur contra Diosc. eiusque patronum Brassaulum de Viribus prunorum laxantibus. Refragatur namque Galeno Brassaulus, quòd non animaduertit Dioscoridem de Prunis Damascenis siccis loqui, quæ præterquam quòd sicca sint, gustu etiam acida, & adstringentia percipiuntur. Qua quidem in re Brassaulus sanè hallucinatur. Non solum enim Pruna Damascena sicca, sed plurima alia medicamenta simplicia & adstringendi & deiciende alui viribus prædita sunt, vt puta, Tamarindi, Myrobalanorum genera, Rhabarbarum, quæ primum aluum laxant, deinde adstrictam relinquunt, quam prunorum facultatem etiam Gal. agnouit. Quare cum loco citato Pruna Damascena sicca aluum ciere tradiderit, eadem tamen etiam adstrictoria vi pollere alibi falsus est. Brassaulus verò Galenum insimulare videtur, quasi hæc nescierit, quem tamen scimus in decernendis simplicium viribus, omnium quotquot de ea re aliquid prodiderunt nascitissimum fuisse. Possis & hac ratione Dioscoridem tueri, quando Damascena aluum adstringere dixit, de siccis tantum (vt ipsemet satis se explicat) ideoque ad saporem & manifestam qualitatem potius respexisse, qualis ferè

Tom. I.

adstringentis esse solet. Alioquin dicere Dioscoridem cum respectu ad alia Pruna dixisse, hoc ipsam adeò ridere est rationem: nam quòd minus laxat cæteris, & tamen laxat, quis sanus dicet adstringere? Nisi fortè id per accidens præstent, ad quam rem sola experientia diiudicandam fuit. Contra opinionem vulgi ita sentit Ioan. Iacob. Federer Chirurg. Med. Friburgi in Briegouia de Dysenteria anni 1607. Vulgaris est phantasia fructus horticorum & potissimum Pruna, copiose comesta ieiuno ventriculo, generare Dysenteriam: Quandoquidem multi Magnates, & infanti, puerperæ & alij nonnulli, qui non comederunt pruna, dysenteria corripiuntur, quinimò eorum esu curati. Clarum est diuersis temporibus & annis grassatum hunc morbum, in quibus non erant Pruna villa, & hoc anno 1607, in quo pauca fuere Pruna aut alij fructus cum nucleis. Item laudat in uictus ratione tum ad præcautionem, tum ad curationem, etiam manè ieiuno ventriculo Pruna, quæ vocat Aromatische Eperflaumen.

His subnectamus Historiam quam tradit Schenckius l. 4. Obs. 254. Mulier è pagò Berwaldt me accessit, cuius venter adeò intumuerat, ac si gestaret sobolem, aut aliquam molam diutius retentam: fluxum menstruorum per annum spatium non viderat. Ego consideratis omnibus accidentibus, crassum & compactum sanguinem monstruosum esse in causa putavi. Exhibui digestium, & pilulas purgantes tam intestina, quam vterum. Hinc illa beneficio alui tantam copiam nucleorum Prunorum domesticorum, quæ ante annum comederat, egressit, vt omnibus qui audierunt hoc impossibile visum fuerit, illam tam diu viuere potuisse: reiectis nucleis fluxus menstruorum rediit, ac tumor remisit, tandè nque benè valuit, cum antea semper cum morbo conflictaretur.

Pruni lignum vulgo operariis ad tornum, ad Scolopetarum thecas & ad cultorum maubria expetit: idque pulchello mangonio præparare norunt, vel cum lixiuo decoctum, vel cum calce viua & vrina aut lixiuo affuso maceratum, ad elegantem rubedinem, si natura non habeat, redigere. Ex tali, pulchella vtenilia parari solent ab artificibus.


Pruna non  
sunt in  
sentiam.

Historia de  
Prunorum  
osibus per  
annum re-  
tentis.

Ligni Osui.

Ligni mangonium.

# PRUNVS SYLVESTRIS.



**A**RBOR fruticosa Description: est Prunus silvestris, sepibus notissima, radicis multiplici reptante se propagans, multis ramis donata, & minacibus spinis horrens, cortice subpurpureo & cinereo.

Flores ante folia ex ramulorum tuberculis profert confertos, nullo candore insignes, teneros, amaros, odoratos si tepes ijs refer-

R





(nam ex his tribus duo intellexisse eum necesse est) Ribes figura apposta.

Quod autem *Schlehen* seu *Prunum siluestrem* quam ille *Poterion* putat *Brabyla* esse vult *Corn.* si *Dioscoridis* & *Plinij* auctoritatem recipit, opinionem suam minime veracem fateatur necesse est. Scribit enim *Diosc.* fructum *Poterij* inutilem esse, & *Plinius* *Brabyla* (in quibusdam codicibus legitur *Brabilla*) vim habere spissandi, *Cotonei* mali modo: tum fructus *Poterij* non poterunt esse *Brabyla*.

Contra *Cornarium* facit & hoc, quod de *Brabylis* scribit *Plinius* in hunc modum. Vim habent spissandi, nec amplius de ea tradunt auctores. Dubius siquidem locis amplius de *Poterio* scribit *Plinius*, *Vereres* secutus. Ex *Plinij* igitur auctoritate non idem sunt *Brabyla* & *Poteria*. Ideoque nec fructus *Schlehen* Germ. poterit esse *Poterion*, nec fructus eius *Brabyla*.

*Cronenburgius* tamē scribit *Cornarium* probabilibus coniecturis velle spinam *Schlehen* esse *Poterion* *Diosc.* sed *Tragum* contradicere. Verum siue contradicat *Tragus*, siue non contradicat, non videntur nobis probabiles coniecturæ *Cornarij* quicquid scribat *Cronenburgius*.

Idem scribit *Mathiolum* (forte legendum *Cornarium*, nam hæc apud *Matth.* non inuenimus) aduersus *Fuchium* constanter affirmare *Schlehen* neminem unquam *Latinorum* scriptorum *Prunellam* ac *Prunellam*, siue *siluestre Prunum* appellasse, immo ne *Prunorum* quidem generis existimasse, cum *Pruna* ferens planta, iusta arbor sit, non humilis spina ex *Gal.* & *Diosc.* testimonio: sed quisquis ille sit, qui hoc scripsit, parum circumspecte, quæ *Plinius* de *Prunis* tradit, perquisiuit, qui loco supra à nobis adducto, aperte *Pruni silvestris* mentionem fecit.

Cautius *Tutnerus*: *Latini* (inquit) spinum potius, quam *Prunum* nominant quantum memini: *Pruni* enim nomen apud solum *Plinium* legitur. *Palladius* *Pomum spinosum*, id est *Pruno* inferi scribit, sed cum *Spinus* à *spinis* sit, *Prunus spinosa*, siue *silu.* siue *faciua spinus* recte nuncupabitur. Vt autem *Cornarij* sententiam refutet acutè sanè *spini* seu *Pruni silvestris* differentias proponit, & alia quædam suâ, hoc est *Anglica* lingua tradit, quæ translata huc referri merentur. Quemadmodum etiam (inquit ille) *Prunorum hortensium* varia sunt genera, ita quoque *siluestrium*, quorum duas saltem noui differentias. 1. *Angl. Bulles tree* et *Bulles tree*. 2. *Angl. Slo tree* et *plackthorn tree*. Prior illa duum est generum: vnum in hortos transfertur, & in iustam *Pruni* magnitudinem excrescit: alterum in sepibus nascitur, nunquam arborefcit, sed inter arborem & fruticem magnum consistit. Minus autem genus spinosius est maiori, ideoque *spini* nomine dignius. Illud autem genus, quod *Slo tree* vocant *Angli*, longè adhuc iustius *spini* nomen ob eandem causam meretur.

At *Corn.* contra omnium doctorum sententiam negat *Slo tree* esse *Spinum* aut *Prunum silu.* quod non sit arbor magna, in quam possit fieri insitio (ex *Palladio*). Male cohæret eius ratio. Et si enim *Palladius* *Spinum* vnum aptum insitionibus censet, non tamen quemlibet idoneum facit. Nam nec ille nec *Virg.* negat *spinum* quendam minorem insitionibus ineptum. Imò videtur *Virg.* fruticem *Slo* intelligere per *Spinum siluestrem*: *Virides*, inquit, occultant spineta lacertos. Quo loco *spinetum* à *spina*, id est, *Carduo* non deducitur.

Tam. I.

citur, propterea quod sub *Carduis* non soleant esse occultare lacerta. Neque *spina* apud probatos auctores significat *Salbhorn* (id est, Germ. *Sagendorn*) nisi cum adiectione *albz*, idque in *Columella* solo, quod meminerim. Neque *spinetum* ab *hortensi Spino* neque à magno *siluestri* *spino* deductum est: non enim solent vquam tam dense tantoque numero crescere, ut *spinetum* dici possint, ideoque nec lacertos à *Sole* occultare possunt. Relinquitur ergo verisimile esse, *spinetum* à *spinis silu.* minoribus, seu Ger. *Schlehen* derivatum. Idem patet ex *Theocrito*. *Αμασας* enim, id est, sepes habet, seu concepta aut sepe menta, quæ ex *spinis silu.* minoribus sunt.

Porro quod pertinaciter defendit *Corn.* *Schlehen*, (*Prunum siluestre*) vel *Anglorum Plackthorn* esse *Poterion* *Diosc.* inferens inde non esse *Prunum silu.* ne *Dioscorides* dicatur duobus locis de eadem re agere præter consuetudinem suam, facile probauero non esse *Poterion*. Non enim habet *Schlehen* ramos longos, lentos, molles, flexiles. Etsi enim *Blackthorn* in cacumine ramos multos habeat, non sunt tamen ij longi, sed breues, duri, fragiles: fructus aut nullum aut exiguum habent odorem, tantum abest, ut suauem habeat, quæ omnia in *Poterio* requirit *Diosc.*

Ceterum quod scribit *Corn.* *Prunum Theophrasto* memoratum lib. 4. c. 3. hist. esse *Bulles tree* (quæ est *Prunus silu.* prima nostra) tam in eo errat, quam in *Pruno silu.* *Brabylis* & *Poterio*. Arbor siquidem, cuius meminit *Theoph.* insignis est magnitudinis, cui folia nunquam decidunt. Sed arbori quam nos *Bulles tree* Germani *Hells Bilsen* vocant, folia delabuntur, neque insignis est magnitudinis. Nequit igitur esse *Prunus Theophrasti*. Quare nec fidem hic merentur *Cornarij* coniecturæ. Sed illa *Plinii* verba, quibus ait, *siluestrium Prunorum* bacce & errore *Cornarij* patefaciant, negantis *Schlehen* Germ. esse fructum *Pruni silu.* Nam si in *Pruno silu.* nascerentur folium modo *Pruna* magna, nunquam eius fructum nominasset *Plinius* *baccas*, quæ uox minoribus tantum fructibus conuenit.

Nihil igitur est quod *Harchius* tam securè pronunciet in suo *Enchir.* *Schlehen* Germ. *Poteria* vulgò. Mirum verò talia pronunciare aliquem audere, non considerata prius descriptione, quæ nihil minus, quam responderet. Verum, uti fit, ut vnus error, plures post se trahat errores, ita *Cornario* euenit, existimanti, ne succum quidem ex *Prunis siluestribus* expressum ac inspissatum *Acaciæ* loco esse substituendum: quàm benè docti viderint. Sic autem inquit. Officium *Acaciam* vocant, quam ex *Pruncoli* fructu ab ipsis appellato, nostris autem *Schlehen* dicto, parauerunt, succo illius fructus vnâ cum carne in massas coacto. Nos autem fructum illum *Poterij* esse in *Comment. medicis*, & apud *Diosc.* clarè docuimus. [Sed quàm clarè ex præcedentibus patet.] Proinde ex ipsorum *Acacia* illis sperandum relinqueamus eum effectum, qui verè adscribitur. Nos autem, si sapiemus, illorum *Acaciâ* non utemur.

Sed propter suam falsam *Poterij* opinionem, ieiicit *Cornarius* *Acaciam Pruncolium*, contra plurimorum doctorum sententiam eam legitimam *Acaciâ* substituentium, ut parebit in vitibus.

Nec tamen ideo ferendus eorum error, qui existimant *Prunum siluestre* esse *Acaciam*. Ita videmus quosdam *Neotericos* *Præcticos*, qui tamen egregiè se sapere putant, in suis receptis scribere solitos: *Réc. aque florum Acaciæ*: siue enim sciant non esse *Acaciam*, siue nesciant, utroque tamen

*Spinetum*  
*Sinde.*

*Rationem*  
*Schlehen*  
*non sit*  
*Poterion.*

*Prunum*  
*Theoph.*  
*non*  
*esse*  
*Prunum*  
*Siluestre*  
*Prunum*

*Harchius*

*Corn. not.*

*Acaciæ*  
*Pruncoli*  
*receptis*

*Prunum silu.*  
*non esse*  
*Acaciâ*

*Alfordita-  
tum quatuor-  
dam causa  
decepio.*

modo peccant. Si sciunt non esse, visu tamen obstinato efficere volunt, vt securè credat posteritas, esse, quod non est. Est sane hic modus successio-  
num, vt quæ semel inoleuerint, nefas putetur immu-  
tare. Sic multa absurda in officinas irreperunt. Sin  
nesciunt, ne ea quidem sciunt, quæ suis eggris præ-  
scribunt. Sic Dod. succum exprellum, inquit, Aca-  
ciam appellam, vnde & Acaciæ Germanicæ stirpi  
nomen factum.

*Amorocci-  
mala Prū-  
na.*

Rectè Lonicerus: quidam qui non benè con-  
siderunt descriptionem Acaciæ, Agriococcinialæ &  
Prunæ Græcæ dictæ [id est, Prunum silu.] volunt  
esse Acaciam.

*Turca prū-  
na silu.*

Porro Prunum siluestrem plerique Herbarii vo-  
cant, & Spinum Virgilii dicunt, vt Hermol. Ruell.  
Dod. & alii recentiores, atque de his propriè in-  
telligendum quod Theoph. ait, contumacis esse  
vitæ Prunum.

*Linguarū  
nomina.*

In siluestri Pruno hoc peculiare quod deflores-  
cens simulatque imbres contigerint, conuertatur  
fructus in oblongum quoddam & inane corpus,  
quod in Italia *Turcas* vocant, quales se anno 1537.  
circa Norimbergam obseruasse Camer. scribit.  
Eiusdem rei & mentio facta supra in Prunis.

*Adagium*

*Pruna siluestria, Prunesla. C. Schlehen/ Dorn-  
schlehen/ Spindling/ Bilsen.* Ipsa arbor, Schle-  
henbaum/ Schlehendorn. Belg. leen: fleewen l. lā-  
dris. Gal. *Prunelles*, *Pelousses*, *Prunes sauvages*, *Fourdei-  
nes*, etiamque *Penelles* nonnullis, vt Montbelg. quæ  
vox etiam apud eosdem in opprobrium abiit a-  
dagio vulgato: *Ce sont des Penelles*: de re nihili, aut  
nullius momenti. Ital. *Pruna salutare*, & in quibus-  
dam locis Italiæ, vt in Apulia, *Trique*, siue *Atri-  
neg*, vt Pandectarius scribit, vocantur. Hisp. *Prū-  
na* Angl. *Slo tree*. Bohem. *Frsky*. Vngar. *Bofeny fa.*

*Trique.  
Atrinea.*

*Differētiz.  
Auenaria  
maia.  
Parua  
Hortensior.  
Latur.*

Prunorum silu. duas species faciunt. Maiora  
German. *Haberschlehen*, quasi dicas Auenaria:  
et liqua Schlehen simpliciter: hæc paucilla & puer-  
sunt. Ipse quoque frutex infra arboris conditio-  
nem constitutus videtur, quod fruticibus similior,  
quàm arbori videatur, licet reuera arbor sit: horri-  
dior verò priore, spinis rigidior: ex harum fructu  
fit *Prunellorum* *Acacia* dicta officinis. Letior sylue-  
stris transplantatione, insertione & cultu in gran-  
dem proceram & domesticam abit, [si Penæ &  
Lob. credendum] mitiore pomo, succulentiore,  
maiore, suauiore. Quod verò Turn. vt Prunorum  
hortensium, ita & siluestrium varia genera dicit,  
id nondum innouit nobis. Plura enim duobus  
dictis, non vidimus, nisi quis fortè cultū respiciat:  
nam alterutrum sine dubio cultu speciosius euadet &  
mitius vnde tamen non specierū numerus, sed va-  
rietas tantum oritur: At insitione multiplicari  
posse non negamus. Inter siluestria Pruna, inquit  
Cna. sunt quæ fructu duplo maiore, quàm cōmunis  
est, & admodum dulci. Huius fortè duas differē-  
tias constituit Turner. Vnum quod in hortos  
transfertur, & in arboris proceritate excrecit:  
alterum quod in sepibus maneat, nec vnquam in  
iustam arborem assurgat. Idem aut certum esse ex  
Columella dari Prunum syluestrem.

*Locus &  
tempus.*

De loco non est, quod multa dicamus: quod pas-  
sim ferè proveniant, in sepibus, silu. stribus, siluis,  
dumetis, collibus & planis. Germani ijs agros sit-  
os sepiant, & hortos. Montbelgardenis ager et-  
iam abundat: incommoda valdè in sepibus propter  
nimium reptatum: comodior multo Spinus alba,  
verum lentè crescit. Turnerus nusquam se copio-  
sius vidisse testatur, quàm in agro Sommerletheni  
Anglic. In Belgio quoque frequens.

*Repositio.*

Florent Martio & Aprili. Septembri & Octobri  
fructum maturant, quæ colligi possant, & expres-

sus succus rescicari, vel ipsamet siccata recondi.

Spino sen Pruno silu. inferitur Pomus, vel poti-  
us Pirus, si rectè inspicimus textum Palladij. Plin-  
ius scribit Tuberos melius inferi in Pruno silue-  
stri. Pruna verò eidem omnis generis inferi hodie  
translantur in est.

Prunorum siluestrium fructus, autore Diosc.  
post maturitatem exiccatus, eadem præstat, quæ  
latiuorum. Cum sapa verò decoctus virilior & ad  
cohibendam aluum aptior euadit. Siluestrium,  
Prunorum bacce, inquit Plin. vel è radice cortex,  
in vino aultero si decoquantur, ita vt triens ex he-  
mina superit, aluum & tormina sistunt. Satis est  
singulos Cyathos decocti sumi. Sic & Galeno,  
agrestium Prunorum fructus euidenter alstrictori-  
us est, ventremque sistit.

Præstantissima inter siluestria Pruna, autore  
Trago, ea sunt quæ & satis magna apparent, & Au-  
gusto mensis maturantur, quod in Pruno silu. vul-  
gari non contingit, illius namque fructus sicut &  
hos frigidibus occupatur, antequam maturetur.  
Nisi verò illa Pruna mollescant, non sunt edendo,  
propter immensam ipsorum acerbicatem. Paupe-  
res Pruna silu. igne quandoque vitulare solent, vt  
commodius illis velci queant.

Refrigerantem & adstringentem vinum habent.  
Melle condita non tantum commellationibus no-  
cturnis proponenda sunt, sed dysentericis etiam  
& alui profuuijs laborantibus exhibenda. Ad ea-  
dem facit vinum ex his fructibus confectum, quod  
ad Iulium & Augustum vique menses diligenter  
adseruare conuenit. Eiusdem facultatum est &  
decoctum. Aqua è floribus illorum destillata &  
data ad laterum dolorem singulari facit experi-  
mento. Ea verò efficacior fuerit, si flores Pruni silu.  
recentes per noctem vino forti & optimo macerati  
in balneo [vt vocant] Mariæ distillentur. Hac  
aqua multis se profuisse, Tragus scribit ea-  
que lateris, cordis & stomachi quousvis dolores  
seu compressiones & puncturas dissolui.

Aduersus vini penduli viria nihil efficacius Pru-  
nis siluestribus reperitur. Pruna antequam blauo  
tingantur colore leguntur, & in mortario tula,  
pro magnitudine & exiguitate valis multa aut  
pauca vino iniiciuntur cumque probè vina agita-  
tione crebra commixta fuerint, obturatur vas per  
dies 3 vel 10: tum intra paucos dies vinum resti-  
tuitur. Ceterum possunt Pruna silu. tula & in acre  
siccata ad eos vsus per totum annum conseruari.  
Wirsungus scribit quosdam præscribere aquam  
florum Pruni silu. ad pleuritidem, se tamen non  
animaduertere posse, quomodo prosit, cum ob-  
struat & adstringat hæc planta. Nolinus tamen  
dicere aquam florum Prunorum silu. adstringere:  
sunt enim valdè amari, in quibus nullam adstric-  
tionem animaduertimus. præterea Cordus in li-  
bello de distillatione purgantem facultatem huic  
aque tribuit. Quod verò Tragus scribit, prodesse  
puncturis cordis, de Ventriculo intelligimus, &  
per dolorem lateris, cum, qui fit à flatibus: alio-  
qui non videtur conuenire cum vino in Pleuriti-  
de cum inflammatione. Florum viridum vncj.  
per noctem in vino albo maceratorum parum mo-  
uit aluum. Exhibuimus diuersis maiori etiam  
quantitate in vino maceratos pluribus diebus, sed  
leuem euacuationem. hætenus in impuris nostro-  
rum hominum corporibus præstiterunt: fortè in  
delicationibus plus efficiant, in quem finem & le-  
uiter bulliri post aliquam macerationem possunt.  
Sudent tamen Medici Marpurgenfes in consilio  
suo de precauenda dysenteria, si quis durior stri-  
ctioreue sit aluo, capiat florum Prunellorum vnc.  
semis



dimidia me usura vni aut cereuisia maceret, sepius exprimendo, atque inde per bidduum in pastu bibat.

Wittichius ad febrem epid. cum mania pro purgatione prescribit syr. ex multiplici infusione florum Prunellorum silu. & alibi ait: bene repurgati infantes, si per aliquot dies detur serum lactis in quo per noctem infusus fuerit manipulus florum Praecellorum.

Marthiolo tota Prunorum silu. planta adstringenti facultate praestat, quemad. & baccae. He Coeliacis & Dyntericis vtiliter deuorantur. Eadem cum arbutulae radicibus ex aqua vel vino austro decoctae, sanant oris linguæ & gingivarum vlcera & fluxiones, quinque columellæ & faucium vlcera, gargarisato earum decocto. Quamobrem recreantur non parum hoc medicamento, qui hydragrgo peruncti, oris vlcibus & fluxione laborant, addito Lycio, alumine & rhodomelle: idem decoctum in defensionibus auxiliatur foeminis vteri fluxionibus obnoxii. Aqua è floribus destillata, hausta intestinorum vermes intericit. Succus baccarum ad imperigines vtilis est & inflammationes. Idem inflammationibus oculorum illitus optime refrigerat. pilos illitu prohibet nasci: & vel per se vel cum aqua Plantaginis fronti impostus & in nares, trachæas, hæmorrhagias silit. Ad prociendam ani facit illitus succus ad spissitudinem coctus.

Duo verò in Marth. obseruanda: Primum, an flores adstringendi facultate sint præditi, quod nobis non sit verisimile, vti paullo antè dictum, & aliorum experimento confirmatum contrarium potius præstare. Secundum: an Lycium nouerit Marth. quod tam confidenter prescribat: quod nec ipsum quidem nobis videtur.

Goropius in suo Vertumno hoc loco Paradoxus putatur, quando ait: Non absurdum si Prunis agrestibus quoque ventris deiectioni vis tribuatur eo tempore quo pleno autumno ad tardam deuenierit maturitatem, nihil fortè Tamar-Indis seu Daçtylis acerbis Indorum vel sapore vel facultate celsura: Atqui scire debuit Goropius purgandi facultatem non ex sapore iudicandam, & hanc rem experimento potius, quam coniecturâ decernendam. Si experientia nouit purgare, cur non dixit: sin minus, cur adstruit. sed res est expertu facilis, & pauperiores, quibus frequens eorum vsus, hoc scire possunt, ad quos lectorem relegamus.

Schunckenfeld. Prunum siluestre totam exiccantis & adstringentis esse facultatis ait, quod posterius non verum esse, in Marth. iam redarguimus. Idem ait: flores tantillum amaricare, abstergere, siccare, cohibere: resiccatos in Dynteria aliisque alui fluxionibus magni esse vsus. Nobis quidem satis amari visi sunt: an verò cohibeant, ex præcedentibus patet. Considerent etiam docti, an flores siccæ in Dynteria conueniant, vti ille vult: si intelligat abstergendo, ferri potest: si cohibendo, ipse viderit. Placet quod addit ex sua obseruatione, Fructus immaturos pueris Dynteriam conciliare sepius à se visum, quod profecto vix alia ratione euenire potuit, quam cohibendo noxios & impuros humores quibus sæpenumero scatent pueri, adstrictoria sua vi, qui alioqui fortè egererentur: nisi quis malit in eorum acerbitate qua intestina torquent & irritant culpam referre. Per maturitatem verò resiccati cocti & saccharo conditi, aluum adstringunt, & ventriculo vtiliores sunt. Dentium dolores mulcet cortex radicis niger aceto

Tom. I.

decoctus, fluxionemque inhibet. Eadem fortè vis folijs & baccis contusis, & ex eodem decoctis: si frigida sit fluxio ex uino coqui possunt.

Camer. tradit incanum muscum in vetustis Prunis siluestribus ex vino rubro decoctum, Hæmæ incrementum prohibere impostum.

Porro Prunellorum succus inspissatus, Acaciæ succedaneum hodie habetur in plerisque Europæ officinis. Acaciæ loco, inquit Sylius, ex bacculis Prunorum agrestium coctis succum expressum tessellatum, confectum insolatumque vitæpamini minimo errore, quia refrigerat, siccatur, adstringit, vt Veterum Acacia, quæ in partibus nostris ignoratur. Idem & Monachi tradunt apud Meliæ, & præferunt eam, quæ fit ex non perfectè maturis, vt adstringentior fiat: Veruntamen, hos fructus non credunt habere tantam virtutis bonitatem, quantam vera Acacia habet. Itæ eius tamen defectu possumus vti. Et Cordus Acaciæ loco succum Prunellorum silu. substituit. Idem in fine de præpar. simpl. componit succedaneum. Quam tamen rem Marth. paullo morosius interpretari videtur, satis esse dicens, Diot. vidis præceptis inherere, qui in defectu Acaciæ, Rhois arbutulæ folia, vel Lentisci foliotum succum, vel hypocistidem medicamentis immiscere præcipit, quibus potius sepius vti debere putat, quam suppositis siluestrium Prunorum succo. Eadem ferè & Apollo & Bacchanellus de succedaneo Acaciæ tradunt: sed vicit hæc consuetudo, prædicantium consensu, & non improbatu viendi felicitas.

Cæterum Germani nostri in delicijs quoque habent, præsertim nobiles & ditiores Altarie, vinum quod vocant *Schlehenwein*, ex Prunellis paratum, quale sæpe galliæ, & dulcedine aromaticoque sapore, quem à granis contusis acquirit, haud ingratum. Pruna siluestria maturâ vel gela fraccida coquunt in fornace, & contusa in multum seu vinum coniungunt. Probatur in fluxionibus, & alui profluuijs, vbi non admodum suspectus sit calor vel febris.

Pauperes quoque ex Prunellis contusis & vinædemæ expressæ residuo, additis etiam alijs quibusdam, vt Poniis & baccis berberis secundarium vinum, quod *Loram* vocant, vulgò *Leure*, parare norunt, adfula multa aqua, vt simul feruescant ac bulliant. Gratum ipsis est, quod vini quodammodo saporem æmuletur, sed delicatis & ad colicum dolorem procliuius, noxium. Parant etiâ ex folijs Prunellis, (vbi ea abundant) contusis & affusa aqua: tandem vt melius fiat, & cocta adiungunt, vt antea dictum, quale potius genus per hiemem seruatum non infuauit reddi solent.

## DE MYXIS SIVE SEBESTEN.

### C A P. XII.

IN vsu Medico *Schleena* dicta, fructus sunt Iparitis serotinis Prunis pares, nigricantes, turbidati, in acumen desinentes, (in rugas contracti quæ in offic. habentur) calyci insidentes facile cedenti, qualem in Daçtylis videmus, sed longè maiori, & acerabili instar concauo, cinerei ferè coloris. Horum pulpa atra est, viscida, dulci sapore prædita, pertinaciter ossiculo adherescens, quod aliis tribus costis donatur, aliâ compressum Pruni nostratis ossiculum imitatur: in cuius utrobique fine foraminulum apparet, atque ex inferiori quoque, qui vel in geminos, vel ternos

R. 3

Muscu  
Hæmæ

Succus m.  
Spissatus et  
Acaciæ succedaneum.  
Modus parandi.

Alui succedaneum.

Vinum Prunellorum.

Lora ex Prunellis


Descriptio fructus.

*Mixa domestica.*



நெடுச.

*Myxa flueßia.*



Flas.

maiores, melioresque.

Serapio Scheften arbutum dicit altum cortice  
albi ante, ramorum extremorum verò viridante,  
folijs rotundis, magnis : fructum racematum ma-  
gnitudine Nucis, in sapore dulci, qui glaucescar-  
cunt maturatur, intus continentem pulpa[m] vis-  
cosam, granum oliuæ.

*Myza.* Hæc etiam profert Cardan. de variet. Myxanec  
auditu olim cognita Antiquis, iam nunc in Italia,  
vicinifque regionibus colligitur, vt recentia  
de gustare liceat. Arbor est, vt Matthiolum refert,  
pruno similis, aliquando minor, cortice trunci  
subalbido, ramorum autem subviridi, folio ro-  
tundo firmoque; fructus minor pruno, viridis, fus-  
cusque cum immaturis, ossa trian gulo : gustus dul-  
cis, sed adent lenuis, vt viscum gustasse videret, nec  
ab re forsan: referunt enim, in Oriente ex his  
fructibus optimum viscum confici.

Synonyma aut eumque placita.  
Myxa Prunorum Syriae inquit Plin. dici possunt populares eorum Myxa, quæ & ipsæ nunc coepere Romæ nasci infestæ forbis, Aegypti perisæ simili colore.

De his Græci antiqui nihil prodidisse putantur  
sed posteriores tantum, veluti Paulus, Aelius,

mucrones acutos finditur, germinis ueluti rudimentum exilit: Nuclei tribus loculis scissim tres continentur, oblongi, triangulares, albi, Melonum vulgari magnitudine & sapore, quique eodem modo uterulatae rancefcunt, qui non infuantes in recentibus: alias vnicus nucleus offículo clauditur. Eligenda plena, maiora, pinguis, carnosae, quaeque situm non redolent, calyci adhaerentibus, tere dine non arrof.

Arboris ipsius  
duo (inquit Al-  
pinus) sunt ge-  
nera: alterum  
silvestre, Pruno-  
sinile: alterum  
Domesticum,  
folijs latioribus,  
ac castioribus, à  
silvestri differe-  
rens. Vtraque ar-  
bor flores fert al-  
bos, paruos, Ge-  
ranij proximos.  
Silvestris fructus  
fert minores, tar-  
de maturescen-  
tes, imperfectio-  
res ijs, quos do-  
mestica sebesten  
profert, qui sunt

Piscellus, Actuarius: *μύζα* quidem Paulo, *μύζα* Actio & Actuario. *ἀνδρὸν κενὸν ἐστὶν, μύζατος ὁ μύζης* *τοῦ κορυμβίου*: *ἀνδρὸς ἐκ παραπληροῦ*: fructus minor pruno, sed facultate similis. Dicta volunt *ἀνδρὸς τῆς μύζης*, id est, à muco lerito, & narius stilante: nam & hunc fructum simili lentore referunt esse.

Sebesten vulgò officinis, Arabicam appellationem magis quam Græcam retinere malentibus: quod nonnulli in Cæsaris honorem factum arbitrantur, qui *sebastus*, id est honorabilis dicitur. *Abrahamia* vel *Morheica*, fructus ferens dulces, quos gentes Pharas nominant sebesten, Serapion. *Mukata* Isaac apud eundem, & est *Rech* in Arabia. *Maketa*, sebesten, Abic. Myra Græci vocant non Myxas, quibus similis est persicus Aegyptia, nisi quod poma Aegyptiæ rubescunt, Hermolao. quæ posteriora verba ex Plinio sumptissime videtur, quamvis in eo non ita legatur, sed rubedine similia esse, seu, ut ille ait, Myxis rubentibus. Myxæ vel Sebestæ Cordo.

Quidam Serica Galeni putant, notante Trago Serica  
qui Arabes hunc fructum nobilitauisse, Veteribus  
minimè descriptum, tradit.

In nominibus habet Muth. *μυτή* & *sebestina* Ma  
Pruno proxima *sebesten*, id est si Lat. interprete-  
ris, *Augusta*, Amato. Aug

Sebastos Lacunæ, qui ait, posterioribus Bar-  
baris corruptè *sebesten* dici.

*Sesbifera* in Augusti honorem dictos putant Ru-  
ell. & Ryff. *Sesban* ex quibus in Syria fit Vilcum, Ruffell.  
Ryff.  
Damaſcenum dictum, Lonic. *Sesbeia* quibuldam: Ruffell.  
Ryff.  
Hanc verò eam eſſe quam *Amorpha* Matron Paro-  
dis in coena Attica ſepud Athen. appellat, ſuſpi-  
cari quidem licet, ſed adſignare non eſt promp-  
tum, præſertim cùm & exemplaria quædam *Amor-  
pha* habent: præter de fructu Dod. *Abbaſi* & My-  
xus Geſn. primum Aegyptium Theoph. & Plinij  
arboſcem quidam putant quæ Myxa gignit. Amor.  
Prun.  
Myxa.

Hist. Lugd. duas haber icones : priori titulus ,  
*Prunus sebestena* Marth. alteri *Myxus arbi*, siue *se-* *Prunus*  
*bestena* nostra. At nobis non videtur differentes *b. Stej*  
 esse arbores : altera icon est ex Trago.

Pruni Aegyptiæ Theoph. & Plin. descriptiones  
dedimus cap. præcedenti, cui Myxa non per omnia  
conuenire videntur.

Scheften Perficam vocem, Sylyaticum Mammil-  
lam canis dicit, et si <sup>MA</sup> ~~rebas~~ <sup>AM</sup> ~~Græcia~~ <sup>canis</sup> sit, ideo Portus  
scheften similitudinem tribuit mammillarum ca-  
num. Germ. Schwartzbrust Berlin. Arbor sche-  
stenbaum. Ioan. Lang. Epist. med. l. i. Epist.  
66. circa finem, Myxa à Sebasta Samarie metro-  
poli, vbi olim crescebant, patrium nomen ~~sebestæ~~  
retinere tradit.

Pruna in Damasco nata & Myxa vtraque fami-  
liaria hoc tempore Italiz ait Plinius. Alpinus au-  
tor est, nasci in Aegypto, toto autem anno in ar-  
bore fructus cerni. Vere florere, autumnum fru-  
ctum maturari. Hodie rapis admodum hortis &  
viridarijs Italiz virent: apud Syros quoque pro-  
ueniunt, æquæ ac Aegyptios, ex quibus locis ad  
nos conferri Marth. testatur. Acgrè vel solo I-  
talico vel Narbonico affluescit. Nostra ætate in  
Monfepienfis agri vrbecula, vernaculè Massil-  
larges nominata, quidam aluit sed neglecta, &  
non diu illis superfuit, & tantum arbutula fuit,  
teste Lob. Ex Alexandria Venetias deferitur Vi-  
cum: Lacuna.

Calabrice, inquit Plin. l. 17. c. 10. spina est fil-  
nestris, quæ nunc optimè & Myxas recipit. Infe-  
ritur & torbis. Vnde Idem Plinius l. 15. c. 11. My-  
xæ & ipsa nunc capere Romæ nasci, inquit Sex-  
bis.



*Em* Myxis in Ægypto & vinā sunt, auctore Plinio. Paulus tradit Myxas Prunis facultate esse similes, quod doctioribus considerandum relinquinus, cum pleraque Pruna sint acida nec ea visciditate prædita quā Myxa. Exilitinaremus Pruna frigidiora. In Pulmonum affectibus pluris facimus Myxa, quā Pruna. Myxæ, enim calore & frigore medio modo se habent. Febricitantibus ventrem laxant. Conferunt tussi cum calore & siccitate iunctæ: Pectus leniunt: catarrhos calidos sistunt. contra stranguariam quam acrior vīna concitavit, efficaces. Vermes expellunt, ex *Serap.*

Vt verò Auic. vult, Sebestena, parum abest, quin temperata sint: gutturis asperitates & pectoris leniunt: sitim sedant, potissimum verò eorum seminalium leniendo solvunt.

Ex pulpa eorum, teste Alpino, optimum viscum conficiunt Ægyptij: quippe sebesten maturos contundentes, atque lavantes. Sunt aliqui, qui masticando, pulpam ab ossē lingua expuentes, viscum parant: quantitatem horum fructuum in vase collectam, parum, quoad aqua humiditas absorbatur, bullientes. Vnde Ioub. Viscum Myxarum [sebesten] suae collam ex pulpa pro visco querno sumi posse autumat.

Visco videntur omnes emplastri modo, ad scirrhosos tumores. Ipsum quidem calidum est, in primo gradu, atque humidum in secundo, vimque habet attractoriam & resolutentem. Resolvit omnes tumores, & emollit omnem duritiem. Aliqui ad tussim ex eo paratos bolos cum saccharo candido & radicis glycyrrhizæ pulvere multis diebus sumunt.

Fructuum usus familiarissimus est ad tussim, dyspnoeam, Orthopnoeam, Pleuriticam, Peripneumoniam, & ad vocis raucedinem, parato ex ipsis decocto, quo etiam ad multas febres vti consuevit, præsertim pectore noxam aliquam patiente.

Potest Viscum illud quod ex Myxis Syri & Ægyptij conficiunt, (inquit Matth.) Venetijs Alexandrinum vocatur, aucupij commodissimum.

Pollent autem fructus teste eodem deiectoria facultate, non secus atque Pruna; tam Græcorum quā Arabum testimonio, id quod etiam comprobatur quotidiana experientia, tamen contrarium censuerit Fuchsius in paradoxis, qui nullam sebestinis deiectoriam esse facultatem contendit, quin potius ea adstrictoria vi pollere. Actuarius pluribus commisit medicamentis quæ bilem eiciunt, ut videre est in suo de comp. med. compendio. Ut millies se expertum ait idem Matth. earum pulpa drach. 10. pondere deuorata, aut ad summum 12. eosdem ferè præbet effectus, quos Cassia vocata. Vtiliter dantur ex bile febricitantibus. Amatus quoque reprehendit Fuchsiū quod restringentem vim Myxis tribuerit: deuorata 30. aut 40. ex iure carniū macerata, prima statim mensa, alium commodissimè citare. Electarium quod ex iis conficitur ad ciendam alium facile mucorem contrahit; proinde non nisi recenter parato vtendum. Mirabile est illud Porti verbum, quo faceret Myxa vel Sebesten destillationibus quidem auxiliari, sed ipsam præstare caninam cutim cuiuslibet digito circumdatam, res est experimenti. Amariora Prunis Myxa dicit Hermolaus, quem miramur, num aliquando gustauerit: neque enim vllam vnquam in ijs amantudinem deprehendimus, ut taceamus, & ipsa Pruna amara esse debere si Myxa sint amariora, amariū quippe, non nisi respectu amari verè dicitur. Non

malè consulunt, qui hos fructus pueris dandos suadent coctos ex aqua, [positis portulacæ aut aliam aliquam conuenientem sumere] aduersus vermes. Decocta cum Glycyrrhizæ, maluæ & rad. Althææ ex vino dulci, & epoca, dolores venicæ mitigant, & gonorrhæam. Eorū etiam varius est usus ad varios affectus, & multas compositiones; præsertim thoracem & pectus respicientes, ingrediuntur.

## HOBVS SEV HOVVS INDICA, PRVNI FACIE.

### CAP. XIII

Indi Occidentales abundè habent fructus *Houus* dictos, Prunorum Damascenorum crassitudine, pauca carne, grandiore ligno: vbi maturuere flauescunt, subacidi saporis. Arbor cum fructum ferens, magna est, folia verò modica: Benzo.

Caluetus apud eundem, *Hobus* seu *Houus*, inquit, procera & pulchra arbor: vimbræ quidem salubritate adeò commendata; ut quoties Indi in militiam aut peregrè euntes; aut greges in pecuarijs pascentes, cubare sub dio necesse habent. *Hobum* temper. vimbræ tantum gratia expectant & querant: quippe sub ea dormientibus caput nunquam grauati, ut aliarum arborum vimbraculis, ferunt.

Mirum præterea de hac arbore proditur. Si fortè in squalidis siccitate campis, aquarum penuria peregrè euntibus sitim accenderit, atque illi casu in Hobum inciderint, ablaqueato arboris pede è radicibus eius taleam excindunt. Mox alterum talcæ caput ori inferentes, velut gutti aut ampullæ epistomium, altero manu elato, tantam inde humoris vim exsugunt, ut facillimè sitim restinguant. Guttatim videlicet primò inde stillante aqua, mox tractim & continuo veluti filo defluente, ut quamvis sitibundos expleat: Id se expertum scribit Ouidius in hist. Ind.

Eiusdem meminit P. Martyr, de rebus Oceani & nouo orbe: L. 9. dec. 2. *Houus* arbor Prunis persimilem generat fructum, & forma & sapore, sed aliquid grandiore: hanc Myrobalanum esse pro certo habent. Est Hispaniolæ adeò peculiaris, ut eius fructibus porci saginentur.

M. Fumee. *Hobus* fructus cum nucleo, cuius arbor alta *Houus* dicta, vimbræ grata.

Refert Fragosus in noua Hispania fructum Dactylorum modo nasci Houos nomine, Myrobalanis flauis adeò similem, ut plerique eundem esse contendunt. Præalta nascitur arbore, ut vix colligi possit, nisi præmaturus spontè decider. Hæc igitur Fragosi sententia iam cadit P. Martyris aut eorum sententia, qui existimant esse Myrobalanum.

De eadem etiam tradit Goihara, in gen. sua Ind. historia. *Houus*, inquit, arbor est præalta & parula, sanam vimbram præbetis, ex cuius cacuminibus & cortice odorata fit aqua ad crura roboranda, & facandam faciem, vtilis: etenim cutem constringit & densat: in quem usum balnea fiunt ex ea etiam itinere defessis salutaria. Eius radice vulnerata, multa aqua manat potui apta, fructu flauo, paruo, & pulpæ parum habente, sed osiculū in se continente satis magnum. Salubris est is fructus, & facilis digestionis, sed dentibus molestus & noxijs, ob fibrarum copiam.

*Verisim.*

*Dolor Gesti. ca*  
*Gonorrhæa.*

*Descriptio fructus.*  
*Prunorum crassitudine.*  
*Arbor.*

*Experientia arbor pro vimbraculis.*

*Aquæ rad. dat ad sitim*

*Prunis similis fructus.*  
*Myrobalanus.*

*Hobus.*  
*Houus.*

*Myrobalanus similis.*

*P. Martyr.*  
*not.*

*Houus.*

## LANGOMAS PRVNIS SIMILIS.

## CAP. XIV

## Descriptio.

**A**rbor Pruni magnitudine, sponte nascitur in agris & etiam in hortis Bagaim, Chaul, & Barequala, multis spinis horrens, folijs itidem Pruni, floribus candidis, fructu Sorbo simili, gustu Prunorum, adstringente & acerbo. Cum primum emergit, strobilo perfimilis est. Vocatur incolis langomas: auctor Garzias, qui à fide dignis viris accepisse tradit optimam ferendi rationem esse, si fructus, postquam eum ederit certa quadam auis, excretus, vna cum excremento feratur. Facilius enim hac ratione satum emergere, citiusque fructiferam fieri arborem.

De eadem sic Acolta. *Langomas* fructus est forbis ferè similis colore, & immaturis Prunis sapore, quibus & arborem similem habet, [sed spinis oblitam] & folia & flores.

**Locus.** Nascitur sponte in agris & siluis Indiæ: sed in hortis etiam colitur.

**Vlus.** Fructus, licet maturus, digitis prius emolliendus, antequam edipossit: attamen adstrictionem illam, haud mediocrem, nequaquam adhuc deponit: eaque de causa illius vlus est, vbi adstrictione opus habent.

HYVOVRAHE AMER. PRVNI  
FRVCTV.

## CAP. XV.

## Descriptio.

**H**yuovrahe, America arbor est procerà, cortice coloris argentei, ligno rubescente, gultu ferè salso, aut ligni Glycyrrizæ, qui recens liquorem lacteum reddit. Eius maceratio aut infusio colorem vini rubelli acquirit. Fructus Pruni nostri magnitudine, auri obryzi colore, nucleis concludens mitè suauem & delicatam. Hac arbor quindeno quoque anno fructum profert, quod plerisque incredibile videri posset: id tamen adfirmare adleueratione possum, quod curiosius pericruratus sum, didicique à senioribus Americis, quorum vnus arborem mihi ostendit, & asseruit, se toto vitæ tempore ter quaterue solùm huius fructum gustasse. Theuctus.

**Synonyma.** Idem tradit, Arborem hanc Barbaris *Hynourae* dictam, idem sonare, quod rem raram. Eodem esse in pretio apud Barbaros, quo Guaiacum apud nos. Quosdam Guaiacum verum existimare, quod ille non probat. Nihilominus Christianos hoc cortice Guaiaci loco vti. Suauitas fructus [addit] mihi reuocat in memoriam fructum Loti cuius meminit Homerus in Odyss. cuius magna erat suauitas.

De eadem & Lerus *Hynouræ*, cui cortex crassitudinis dimidij digiti, esui satis gratus, possit. recenter ab arbore detractus, species Guaiaci, vt mihi affirmarunt duo Pharmacopœi, qui nobiscum fuerunt. Clus. quoque ait, non incommode referri posse ad Guaiacum Brasiliæ Theucto *Hynouræ* dictam.

Lerus scribit siluestres homines vti aduersus morbum, illis dictum *Piam*, qui non minus malus, quam Lues Venereæ in his regionibus. Vltimò verò corticis, quo Guaiaci loco vntur ad curandum illum morbum Indici Theuctus docet his verbis. Corticis huius, qui recens ab arbore sua auulsus, lacteum succum emitit, quantum satis sit, in particulas concidunt, tres quatuorue horas in a-

qua decoquant, donec vini rubelli colorem acquisuerit. Hoc decocto 15 vel 20 diebus vtuntur continuis eum tenui vidu, qua ratione, vt audio, curatur optimè morbus Indicus, nec is modò sed quibus alijs qui à frigidis & pituitosis humoribus pendet, qui huiusmodi decocto attenuantur, ac propè exsiccantur. Eundem Americi in morbis vsurpant: Etque huius potio etiam sanis suauissima.

Est & id in hac arbore præstantissimum, quod fructum fert Pruni nostri mediocris magnitudine, auri colore, nucleum suauissimum, agris & ijs quibus prorsus deiecta est appetentia, vtilissimum.

## OGEGHE INDICA.

## CAP. XVI

**I**n Congo arbores Ogeghe dictæ, quæ Prunorum flauorum forma fructus proferunt, odore & sapore amoenos admodum. Ex his arboribus ramos detruncant, quibus serie contextis scipimenta constant, vt apud nos ex spinarum virgulis: etiam ex iisdem porticus ac vindaria extruunt, vt à Sole tuti sint. Ex Historiis Indicis.

PRVNI FACIE FRVCTVS E GVINEA.  
IN QVO SEMINA.

## CAP. XVII.

**O**stendebat mihi, (inquit Clus. Exot.) Theodorus Clutius fructum quem è Guinea allatum dicebat: Pruni ferè magnitudine & forma erat, duas penè uncias longus sescunciam latus, infimâ parte mucronatus, cortice siue ipso corpore facis crasso, veluti fungosa materia constante, foris aliquantulum rugoso, subfusco colore, interne cauo & pulpam quandam continente in globum conuolutam, albicantem friabilem, insipidam, in qua tenella quadam semina.

PRVNI PARVI MAGNITVDINE  
FRVCTVS SONORVS, ACIDVS.

**F**ructus hic peregrinus datus nobis est ex singulari Ill. nostræ principis munere vaciam ferè latus, & longus itidem, cortice nigro vetustate verò puluerulento penèque cinereo, leuiter extumescente, penèque compressa superficie latiore, circumquaque rotunda, leui ferè, nisi quoddam exigua striæ hinc inde per longum discurrentes, inuicemque implicatæ occurrant visui, petiolum sustinet obliquum lateraliter infixum, cinereum, infra rotundum, superius verò post alterum internodium cinereum atque quadratum, lignosæ denticulæ: fructus cortex adeo tenuis est, vt leui compressione introcedat, fortiusque compressus diffingatur rumpaturque. Nucleus vnicus intus reconditus agitur resulat. Ex superna pediculi abrupta parte videtur colligi, hunc fructum alij sibi appensum gestasse: cortex apertus interius rubet veluti Nucleus asperiusculus, lateritiòque colore infectus, molliuscule, & digitis comprimendo cedens, eandem, quam cortex ipsius exterior, formam habet, leuiter puta compressam in se, subumidam, rotundam, latiusculamque, ad latus duas habet foveolas, maiorem, minoremque,



que, ob quedam exigentia compactaque, puluerulenta tamen, corpuscula, corticis interiori cauo ad latus adnata: nucleus vel potius pulpa in duas aequas partes diuisibilis esse videtur, non adhaerebat cortici externo, inde sonitus: huic pulposae substantiae subest tunica alba, proximè ambiens ossiculum subluteum, subrotundum, latum atque compressum, durum, ad latus exiguum foramen habet cum sulco exiguo per longum inciso, laevis est.

Fructus, inquit Clusius Exot. l. 2. c. 13. donatus à Petro Gareto, orbicularis fere formæ, vnciam videlicet longus, tantundem latus, paulò tamen

planior, vtrinque tumens puluini instar, alter omnino è tenui curuatoque oblongo petiolo pendens, tenui fragiliq[ue] cortice præditus qui pressus, illico frangebatur, & pulpa non continere deprehendebatur fungosam & friabilem, subrubentis coloris, atque valde acidi saporis. Tamarindorum penè instat (propterea valde commo- dam, meo iudicio, ad sedandam & extinguendam sitim) in cuius medullio semen planum, fulci coloris, candicante membrana inuolutum erat. Vbi natus hic fructus, quæve arbor ipsum tulisset, ipse Garetus ignorabat.

DE MYROBALANIS ARABVM.

# IN GENERE.

## CAP. XVIII.

*Myrobalani Indæ, nigri, sine nucleis*



*Myrobalani Citrini.*



*Myrobalani Chelula, citrini similes, nigricantes.*



*Myrobalani Emblica, in segmentis nucleum habentes, angulose.*



*Myrobalani Bellerice, rotundiores.*



**A**rabum seu Mauritiorum inuentum est Myrobalanus, vti putatur, quod si verum, ab ips recentiores Græcos accepisse, dicere par est. Cæterum has alij in tres, alij in quatuor, alij in quinque, vel vt alijs placet in sex genera discreuere. Sed alios alijs gigni arboribus obseruatum, licet aliqui ex eadem nasci putarint. Placet itaque in genere primum Autorum de ipsâ placita prælibare: vt innotescat lectori illorum consensus & dissensus circa eas. Videbatur enim hic locus iisdem conuenientissimus, quod ad Prunorum genera quidam docti referre non dubitarint.

Serapioni itaque Halig, id est, Halig. Ditt. Citrini. Serap. Citrini. Nigri. Cheluli. Semi.

balanorum, cortice tenui, nigro, colore ad citrinum vergente, similes Oliuis. Aben Mesu in

lib. de cibis. Mirabolani de Seni, sunt ex speciebus Oliuarum &c: It em Hunan ait: Myrobalanorum

Oliuina spe.

*Kebuli.*

species, Kebuli, Citrini, & Indi. Errant quidam, qui vendunt nigros ex Kebulis loco Myrobalanorum nigrorum, Nam Nigri reuera sunt Indi, sicut nominant omnes, & ex Kebulis quidam reperiuntur citrini coloris, & quidam nigri, quorum nigredo non ob aliam causam inest, quam propter diuturniorē moram, qua illum colorem in arbore contraxerunt, suntque Citrinis pinguiorē, magis amarificant: Citrini verō sunt acerbi.

*Colore differt.**Auc. differ.**Citrina.**Ind. &**Chebula.**Sina.**Delectus.*

Auc. quoque Myrobalanorum varia sunt genera. *Citrina* immatura: Inde Coloris nigri, immaturam maturitatem consecuta, reliquis pinguiorē: *Chebula*, omnium maximā. *Sina* denique minor, leuior. Citrina probantur maximē flaua, ad virorem declinantes, graues, magnae, durae. Chebularum laus in magnitudine, grauitate in aqua subsidente, colore ad rubedinem vergente.

*Emblicus.*

Sina optima turbinata. Emblicus conditus efficitur: cedit Myrobalanis conditis: ex eorum tamen est genere.

*Mesuei diff.*

Myrobalani, inquit Mesue, Citreae, Nigrae, Cepulae eiusdem arboris fructus quibusdam videntur, vt immaturi sunt Citreae, maturi Nigrae. Cumque arbor ea his autoribus sit bifera, primi pariter sunt Citreae & Nigrae: secundi verō Cepulae. Aliis diuersarum arborum fructus videntur, idque creditur quod eorum facultates & opera varient. Citrinae colore sunt multum citrina, in viridem inclinante: graues, quia magnae, & carne multae, densae: si frangitur, gummosa: osse exiguo.

*Citrina.*

Cepulae subnigrae in rubrum inclinantes: quod maiores eo meliores, carne multae: ob haec etiam graues, adeo vt in aqua mergantur. Inde sunt nigrae, magnae, carne densae, graues, tamen exossae, à quibus notis quod harum singulae absunt longius, eo sunt deteriores.

*Cepula.*

Emblicae pretantiores sunt magnae, carnis multae, densae, graues, ossium paruorum. Bellericae optima sunt magnae, multa & densa carne graues.

*Inda.*

Sunt qui existiment nullum veterum Graecorum de Myrobalanis aliquid prodidisse. Nam etsi Diosc. Myrobalanorum Arabum alicubi mentionem faciat, plerique tamen id de Ben seu Glau de unguentaria intelligi nolunt. Aliis contrarium magis placet, ut patebit in progressu. Videtur tamen Autor librorum de Plantis Aristoteli tributum, eorundem sub finem lib. 2. meminisse, dum eorum acerbitatis causam reddere nititur, cuius etiam sententiae fuisse aduertimus doctissimum Saracenum, & ipsum adeo summum Scaligerum, qui ad dictum locum haec annotat verba. Sic statuit autor, inquit: Arborum Myrobalanorum fructus initio dulces esse. Verum natura acerbos, & concretionē amarus. Id euenire propter ramos arboris ipsius, quorum textura sit rara. Cum ergo maturefcunt: sequitur, inquit, humorum calor, & maturantur fructus, atque initio dulces sunt. Rursus autem per eandem illam raritatem (sic enim interpretatur Scal. uerba haec corrupta *non dicuntur tunc dicitur d. an- tiqua ratio non dicitur non*) superat frigiditas, & siccitas calorem, & humiditatem. Atque inde alterantur fructus in acerbitatem. Vincit rursus calor Sol propter attractionem superfluae siccitatis in illo semine, quod est in arborum superficie: Vincitque frigus siccitatem. Et sunt fructus uehementis acerbitatis. Inde ascendit denuo naturalis calor adiutus à calore Solis exteriori: & vincit calor, ac siccitas. Atque ita euadunt amari fructus. Sat erat, addit Scal. haec recitasse tantum, ne vos diutius obtunderem. Quadam uideris ipsum quā indigna fuit, in quibus opera

*Bellerica.*

ponatur ad contradicendum. Ceterum me ut promissis libere inattingere modice. Ait, Myrobalanos amarus esse: gustum autem adstringere. Ramorum affert pro causa raritatem. Arundo tamen quae est sacchari matrix, rarissima &c: Videris etiam illum ex ueteribus Graecis, quisquis ille tandem sit, *Myrobalanum* meminisse, quamuis nihil praeterea habeat, quod ad definitionem aut historiam nostrarum, de quibus agimus, faciat. Illud scire operae pretium esset, sintne in principio Myrobalani dulces, quod apud nullum alium haecenus autorem legimus, vt ex citato loco pro certo asserere, agi de nostris Myrobalanis, nobis haud ita integrum esse videatur, quamuis Scaligerum & Saracenum viros Cel. id simpliciter atque securē credidisse certum sit. Nos interim certiora sectabimur, donec aliquis nobis prodeat Apollo, qui de ea re nos plenius edoceat.

*An veteres Graeci de Myrobalan. aliquid tradiderint.*

Inter Graecos recentiores Actuarius de iisdem sic scribit. Fructus nobiles, qui ad nos ex Aegypto Syriaque deportantur, callo corporis compacti, osse intus lignoso, quorum nonnullos vocamus flauos, alios Cepulos, (quidam magnos appellant, alij nigros.) Communi verō vocabulo haec omnia genera Myrobalana dicuntur. Eandem vim à crassitudine quod Empelicum seu Emblicum, barbara voce nominant, sortiuntur.

*Myrobalanus Aristoteli.*

Posteritas inquit Ruellius Myrobalana in noua alia quinque discreuit fastigia: ea non modò effectū differre obseruauit, sed alia alijs gigni arboribus. Quaedam dixere lutea, quae ex herbaceo colore flauescunt, spissa, ponderosa, exili nucleo, cute crassa. His succedunt quae & à colore coeruleo vulgus Inda nominat, solida, sine nucleis, oliue forma. Proximè laudant, quae vocant Cepula, ceteris ampliora grauioraque ex fusco rufescentia, carnosa. Quartum genus Empelicum vocant, cute ossibus haerente, lapillorum penè figura. Sunt qui haec cum Beletzicis Myrobalanis non adnumerent: vtique specie tota dissidere videntur, angustiora multò, colore in cinereum languente. Beletzica eadem quasi forma spectantur quae Empelica.

Porro Myrobalanum tam Graeci, quam Latini autores, vt annotat Cordus foeminino genere proferunt, cum à Balano foeminini generis nomine vocabulum hoc compositum sit. Posteriores ferè & Barbari ad hanc vique diem masculinum genus eis tribuunt, quorum tres tantum differentias ueritiores medici tradiderunt: videlicet Indos, Chebulos & Citrinos: de Bellericis & Emblicis seorsim, seu sui generis medicamentis differentes. Recentiores verò etiam hos duos fructus Myrobalanis annumerant, quinque eorum differentias colligentes, quas hoc disticho comprehendunt.

Myrobalanorum species sunt: quinque bonorum, Citrinus, Kebulus, Bellericus, Emblicus, Indus.

Quam opinionem etiam sequitur Gabr. Fallopius tract. de medic. purg. simplic. dum inquit, Myrobalanum nullus Graecorum nouit, vno excepto Actuario recentissimo & Nicolao Myrepico. Species Myrobalani plures sunt, & septem possem ex Serapione enumerare: sed quinque tantum sunt in usu in officinis, & primò sunt Myrobalani citrini vocati: secundò Chebuli: tertio Indi qui & nigri nominantur: quarto Emblici, quinto Bellerici. Hi sunt in usu ad conficiendos syrpos varios, infusiones, & ad componenda varia medicamenta Arabum.

Reuera autem neque Bellericus, neque Emblicus, ex earum numero sunt, cum nullam habeant in figura cum Balno, hoc est glande, similitudinē. At quoniam similiter Myrobalanus adstringunt,

*Aut. r. de m.**Myrobalanus 8. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.**Actu. differ.**Flauus. Nigri. Magni. Empelici. seu Emblicum. Ruellius.**Lutea. Inda.**Cepuli. Empelici.**Beletzici.**Myrobalanus 8. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.**Differ. ex ad. cutim. Cordus.**Differ. recent. à veter. in M. numer.**Species reb.*



ventremque aliquantulum comprimendo subducunt, ac lignosos, ut ipsi habent nucleos, vitum est. Recentioribus hos quoque adijcere. Vna & eadem arbor omnes tres Myrobalanorum differentias gignit.

De Acacalide verò quid sit hoc loco ambigi potest. Non cognoscitur in hisce regionibus, cum in Agypto nascatur, neque fructus eius amplius afferatur: nisi aliquis (Cordi coniectura est) ex Myrobalanis Embilicis seu Bellericis hunc esse existimet, quod, ut non adfirmamus, ita etiam nondum negamus.

Quam Myrobalanum Arabicam, (ait Syluius) intelligat Diosc. qui similem facit fructum Palmæ Aegyptiæ, planè ignoto. Nam Arabum, recentiorum Myrobalani quinque generibus distinctæ, Veteribus indicæ putantur, & Prunorum generi potius quam Balanorum, id est Glandium, adsignande sunt.

Sic Cornar. Myrobalanorum quinque genera ab Arabibus inueta, penitus à Veterum Myrobalanis diuersa esse, disertis scribit verbis.

At Monachi apud Mesuen de Myrobalanorum differentiis sistantur. Autores (inquiunt illi) non frustra scribunt Myrobalanos nigros Indos, quia ex Chebulis sunt Citrini & Nigri. Chebuli & Citrini verissime sunt ex vna & eadem arbore. Citrini sunt immaturi, Chebuli verò maturi.

Quod idem Iouib. Pharm. in Syr. de Fumar. commentio. agnoscit: fateatur enim Citrinos & Chebulos eiuſdem arboris fructus esse, & sola maturitate differre.

Absolutè igitur per Chebulos intelliguntur Chebuli citrini. Connumantur etiam inter Myrobalanos, Bellericorum & Embilicorum fructus.

Scrapionis & Auic. *semi* siue *seny* Myrob. non habentur nec cognoscuntur, nec exportantur. Myrobalanorum sunt sex genera siue species.

Gul. in 8. de med. comp. meminit Myrobalanorum citrinorum vocans Chryſobalanos ex digerebus roborantibusque.

Ryff. enumeratis quinque generibus quæ priscis indicæ putat, & ad Prunum potius quam glandes recensenda, addit sibi videt Empellica Actuario quoque, *Empellica* & *Empellica* dici, & Bellirica Bellectica vocat.

Matthiol. Quinque Myrob. genera & facie & viribus inter se distincta videns, omnino censet ea à diuersis produci arboribus, quia tamen ortus earum nobis ignotus, nihil certi adfirmare audet. Flauorum (addit) Chebulorum atque Indicorum arborum imagines excudi curauit Andr. Martinus in suis in Metuen annot. sed ignoramus an genuinæ sint, an adulterinæ, præsertim quum Mauritanorum nullus habeatur auctor, qui Myrobalanorum plantas descripserit.

Amatus in Diosc. caput de Palma, vbi Palmæ fructum Arabicæ Myrobalano comparat, annotat Hermolaum, Marcellum, Manar. Leonice. Brasau. Marth. Agric. & Fuchsum intelligere Glandem vnguentariam, quæ Myrobalanus dicitur, quæ non similis est Dactylis. Dioscoridis tamen coparationem se defendere conatur. Sunt, inquit ille, Myrobalani communes quinque ex arboribus dissimilibus scilicet. 1. Myrob. citrinus colore, oblongus, intus os habens simile quodammodo cum Dactylis paruis, ut non temerè ijs Diosc. similes dixerit: sed cito, non ita sit, qui Chebuli dicuntur ex fusco sufficentes, carnosi, pingues, semidigitales, adè Dactylis similes, ut merito ipsis Dactylos per similes fecerit. De Myrobalanis autem non scriptum quia de illis nullam penitus expe-

rientiam habuit, & vires ignorauit. 2. Indici dicti, nullum os habent. 4. Emblici, per fragmenta ferè importantur. 5. Bellerici sunt rotundi, qui, sicuti Chebuli, saccharo conditi ex India ad nos importantur, caput apprimè roborantes, veluti stomachum & reliqua viciata.

Sed sunt, ut tradit Lacuna, qui existimant quinque Myrobalanos offic. idem esse cum Nucæ vnguentaria, quæ Myrobalanos Græcis dicitur, qui error maximus, quia Myrobalanos officinarum nullus Græcorum a iugum non cogit. Existimandam quinque dictas species in diuersis arboribus nasci, quamuis sint qui putent Citrinos & Chebulos ex eadem proficisci, Solus ex recent. Græcis Actuarius scripsit de his Myrobalanis.

Inter eos verò qui censent Dioscoridis Myrobalanos fuisse notas, est etiam Saracenus ut iam supra monuimus, qui in scholijs suis in Diosc. mirari se fati non posse ut, Arabicæ Myrob. descriptionem à Diosc. prætermittam: cum tamen ex ea, tanquam suis nota & visitata temporibus, cap. de Palma, fructus eius similitudinem describat.

Lonicerus profectò consideratè, si Dijs placeat, de grano *Be* & Myrobalanis agit. Primum enim, caput facit de Ben siue Glandæ vnguentaria Græcorum, vbi de eius specie natura & viribus tractat: mox verò subsequenti capite sub titulo Myrobalani, omnia quidem Myrob. genera depingit, sed prius eodemmet capite de Balano Myrepuca Græcorum tractat, quæ præcedenti capiti erant addenda. Lectorem ignatum eò ducit ut existimet Myrobalanis Arabum competere, quæ ille confute & nullo iudicio eorundem figuris subiecit.

Cordus in com. ad Diosc. censet Arabicas Myrobalanos Diosc. esse eos fructus, qui adhuc in omnibus pharinacopolis myrobalani appellacione cognoscuntur, non tamen omnes quinque intelligit, sed tres præcipuas: videlicet Indam Citrinam & Chebulam, quas tres differentias non ita diuersas, sed vna eademque arbore nasci tradit. Indam primum fructus rudimentum esse, quam Plin. Adipſon vociter, & Citrinam, maturiscentem: Chebulam verò maturos iam fructus. Verum ei assentiri non possumus, dictasque has tres differentias nequaquam in vna arbore nasci putamus. Eiusdem quoque opinioni resistit rerum Indicarum solum interpres Garcias, ut paulò post apparebit.

Rondeletius verò Arabicam Myrobalanum illam, cum qua immaturum Palmæ fructum Dioscoridem comparare diximus, vnguentariam esse non arbitrat, sed flauam Catharticam offic. Qui peculiare quoddam Palmæ genus Adipſon vocatum à Plin. Myrobalanum offic. esse volunt, hi perspicuè à Diosc. reſelluntur inquit Dalech.

Lob. & Penæ quoque iudicio, hi Syriaci fructus, vulgariùs, quam veriùs, Myrobalani vocantur. Nam nec ipsi glandes esse volunt, sed Persici potius aut Prunis accensentes: Quorum & si coplures oriuntur differentia in Syriacis, Arabicis, & Calcutij regionibus, quibus debentur, à Græcis & à nobis tamen (inquiunt) quatuor quinque duntaxat hodiè prostant in offic. differentia: è totidem arboribus. Nam Cepulifera & Citrinifera eadem videtur arbor, prodiuturque à nuperis nauigatoribus, Persici aut Amygdali folio. Bellericæ autem latiores Laureæ sunt frondes: sed Indiciferæ salicis, cuiusmodi etiam Emblici videntur. Alioqui inter se congeneres arbores, promittunt ipsi fructus: mediam quandam naturam in-

Lonic non scripserit.

Conditi.

Myrob non esse Nucem vnguentariam Myrobalanum actuarium.

Diosc. cognitam Myrobalanum.

Lonic not.

Inda. Adipſon Pl. Citri a. Chebulam. Cordus res sui.

Myrobal. Diosc.

Adipſon.

Differ Lobelii.

Persica. Pruna.

Tot arbores quæ indicæ. Adipſon. Cepulifera. Bellerifera. Indicifera.

*Condita.*  
*Delegatus.*

*Cebula*  
*cond. alia.*

*Bellerica*  
*cond.*

*Palma.*

*Nuclei mul-*  
*ti in Indis*  
*Ex Embli-*  
*cis, Phœni-*  
*cobalanis.*

*Casalp.*  
*refut.*

*Emblia.*

*Myrob. an-*  
*uale.*

*Alii duo Ca-*  
*salp. errores.*

*Dal. not.*

*Myrob. citri-*  
*ni.*

*Diosc. Gal.*  
*ex Plin. no-*  
*stra Myro-*  
*bal. incogni-*  
*ta.*

*Prunus simi-*  
*lia*  
*Delegi.*

ter oleam & Prunum fortitæ. Horum plurimum duo genera condiuntur, aut hac condita adferuntur. Pluris institores faciunt horum alterum, qui Kebulus aut Cebulus vocatur, omnium maximus: sibi oblonga pusilli Limoni aut Persici effigie, compacta, callosa, nigraque carne, sapore luglandis conditæ. Alter minor est, rotundior, tenerior edendo, Bellericus vocatur. Kebulo sunt Citrini similiores. Indi nigri. Emblici sunt potius fragmenta quam integra Pruna.

*Casalpinus* noua opinione prodit, existimans Myrobalanos ex genere Palmarum esse, sic scribens: Quos vulgò Mirabalanos vocat, quasi Myrobalanos, vt aliquando Plinius vocat, quos fert Palma, probatissima in Ægypto, quæ ossa non habet in balanis, reliquarum modo, eundem viridem, odore Mali Cotonei tradit, vt Dioscorides: nam alibi per Myrobalanum intelligit ipsam Glandem vnguentariam. Adferuntur autem quinque Myrobalanorum genera: eorum tria os continent, solida pulpa & crustosa inclusum. Primi generis sunt cognomine Citrini: secundi Chebuli grandiores, figura Prunorum Damascenorum, saccharo conditi solent. Bellerici Gallæ modo rotundi. Duo præterea sunt nullo intus nucleo manifestos, scilicet Indi & Emblici. Quid si hos Phœnicobalanos dicamus: nam nullo intus ligno spectantur, vt Plinius testatur. Qui autem os intus habent, ad Thebæicos & Arabicos Myrobalanos reducamus: de quibus Plinius. Arbores quorundam generum describit Garcias in hunc modum. Folia Emblicorum quidem tenuiter diuisa sunt magnitudine Palmæ: Citrinorum autem vt sorbi: Indorum vt Persici. At, me hercle, videtur Casalpinus, suæ intentioni parum satisfecisse: Nam si Plin. intellexit Myrobalanos nostras per eas quas fert Palma, improprie admodum locutus est. Quorum Myrobalanorum obsecro figura vsque adeo similis Dactylis? quæ item arbor eorum similis Palmæ vt Palma dici possit, vel mereatur? Neminem hæcenus inuenimus qui dicat vllam speciem Myrobal. vulgarium similem Palmæ, aut Palmam dici posse. Quæ de Emblicis dicit Casalpinus, aliter sonant apud Garciam, ex versione Clus. dicit quidem Myrobalanum Anuale, quod Emblicum, folijs esse minutim incisis, palmum longis, non, vt ait Casalpinus. Palmæ magnitudine. Quis itidem dicat cum Casalpinus. Emblicos sine ligno esse: cum sapius ligna siue ossa inter earum sicca segmenta appareant manifestè, ac ea quæ condita sunt, sua etiam habeant ligna seu ossa, seu putamina interna: quocunque enim modo libuerit vocites, modo de ipsis constet.

Videtur tamen & Dalech. eiusdem Casalpinus. fuisse opinionis: nam ad id, quod Plin. ait Myrobalanum Palmæ ossa non habere reliquarum modo in balanis, annotat ille: Colliguntur enim virides & immaturæ balani, pomo carne sua tantum obiecto, nondum genito intus nucleo, quibus verbis Myrobalanos Citrinos intelligere vellet videtur, si modo mentem eius probe percipimus. Quod si ita est, nihilo sanè rectius opinatur, quam ipse Casalpinus.

Sed videamus tandem quid Garcias de Myrobalanis tradat. Manifestum est, inquit, neque Dioscoridem, neque Gal. neque Plin. nostra Myrobalana cognouisse, sed eorum Myrobalanum planè aliud esse. Et quoniam Auic. & Serap. interpretes vidit hæc nostra quodammodo ad glandis formam accedere, nullo iudicio Myrobalana vertit, cum mea sententia Pruna, quibus similia sunt, melius vertisset: Vocat ea Auic. *Delegi*: hic etiam Serapio,

tametsi Librariorum vitio *Halilig* corruptè legatur. Omnes enim Medici Arabes mihi adfirmarunt, Omnia Myrobalana *Delegi* vocari. Falluntur tam ij qui omnia Myrobal. genera in eadem arboris nasci putant, quam qui flaua & Chebula tantum. Nam quinque sunt diuersa arborum genera: & quod magis mireris, in regionibus sexaginta aut centum leucis inter se distantibus nascuntur. Proueniunt enim nonnulla in Goa & Barecala: alia in Maluær & Dabul. In toto regno Cambaitæ quatuor eorum genera inueniuntur: Quebula verò in Bijnager, Decan, Guzarate, & Bengala. Cæterum quæ in Lusitaniam sicca deportantur, magna ex parte sumpta sunt in regione, quæ est inter Dabul & Cambaya. Nam experientiâ conpertum habemus, hos fructus, quos regio septentrioni viciniore producit, minùs putredini obnoxios esse. Et iam longè ante Garciam Munsterus in sua Cosmogr. scripsit Myrobalanos prouenire in Cambaya.

Garcia subscribit *Acosta*, omnium quinque Myrob. genera diuersis arboribus & regionibus nasci scribens, omnesque esse Pruni magnitudinis.

Tabern. Indicis & Citrinis seu flauis duas integras arbores, absque radice tamen, apphxit, vbi videtur, aut vnde habuerit, nos later, illius folia salicis, huius Persicæ. Sed & Chepulis ramum recentem appinxit, cuius fidei acquiescentes & nostris figuris portunculæ appingi curauimus, quâuis Garcie descriptionibus & notis minùs conuenire videantur, vti patebit in progressu.

Ex dictis itaque patet, de sententiâ Arabum, Myrobalanorum [quæ à Balano myreptica Grecorum diuersa] quatuor duntaxat esse genera: posteros verò Chebulas & Citrinas differentes fecisse, quales tamen vix essentialiter differre, (saltem vt in offic. hoc nomine habentur) quis existimaue-rit, qui exactè considerauerit quæ mox tradentur. Nunc singularum, vt in offic. hodie habentur exactas descriptiones & nomina subiungamus.

# MYROBALANI INDÆ, NIGRÆ, SINE NUCLEIS.

**I**NDÆ dictæ Myrobalani dimidio minores sunt, siue Citrinis, siue Belliricis, graciliores, nec, vt illæ, ventriosæ, rugosæ, turbinate, picæ nigredinis, substantia vbi franguntur succi concreti Hypocistidis aut potius bituminis Iudaici modo nitet, sapore euidenter acido, minimè acerbo, nullo intus vel putamine, vel nucleo, vel semine. His admixta inueniuntur aliquando in officinis aliæ angulosæ magis, paulò maiores, nucleo donatæ, quæ an eadem cum Indis, non ausimus affirmare. Nos Indas nucleo cassas pingendas curauimus, & ex Tab. ramulum.

De his, inquit Cordus: Indarum Myrobalanarum Plin. in Palmularum enumeratione meminit.


Inda seu nigra, acerbus, immaturus, & adhuc adolescens fructus est, ideoque nullum intra se nucleum habet, sed quoddam cavitatis securum nucleum excepturæ rudimentum: magnitudinis est incertæ, quoniâ tam intempestiuè quam tempestiuè colligitur. Hinc est, quòd aliquæ earum vnciam, aliquæ etiam sesquiunciam longitudine excedant. Colorem habent foris in viridi fuscum & pallidescem, qui tamen non nisi in absterfa & lota apparet: nam cum copiosè affertur, inuicem confricantur & atteruntur, deterioque sibi fusco puluere, in nigrum colorem tinctæ con-



uertuntur, figuram habent oliuæ & vtrinque turbinatam. Carne constant densa, solida, ponderosa, dum confringitur splendens, colore nigra, aut fusca, gustu vehementer adstringente, aliquantulum acida, subdulci, tenui, saluam prouocant, ideoque sitim accente & oris halitum comitant. Odorem nullum fati dignum siccata spirant.

Eligito neque minimas neque maximas, sed mediocres, longitudine vniâ paulò breuiores, aut ad summum vnciales, pondere tribolares, nonnunquam excedentes, simulque densas, solidas, intus nigerrimas, & splendentes: foris autem in citrino & fusco colore, si abluantur, virefcentes, minus rugosas, nulloque aut admodum exilij & compresso cavitatis rudimento inanes.

Myrobalana Indica siue nigra Arab. *Asfar* vocantur. Quod genus quoddam Myrobalanorum Serapio Damascenum appellat, inelancholicis morbis perutile: id facit, non quòd in Damasco proueniat, sed quòd hinc ex India Myrobalana Inda exportantur. Myrobalanorum alterum genus, incolis *Rezanuale* dictum, nostra sunt Indica seu Nigra. *Rezanuale* octogonum est, & folia salici familia habet: Garcias. Myrobalanus nigra posset esse Plinij Myrobalanus, os non habens. Solorius. *Indiansisch* oder *schwarz* Myrobalanen vocant Germ. Costa prædicitis quoque Garciaz nominibus vitur. Fallop. dicit Myrobalanos Indos esse paruos, & nigros valdè. Vnde etiam Nigros esse vocatos.



## MYROBALANI CITRINÆ.

Myrobalanis Citrinis nomen videtur dedisse color flauescens, qui tum in superficie, tum in substantia penitior confpicitur. Sunt autem ex rotundo oblongæ, aut turbinatæ, Nucis Myricæ magnitudine, aut maiores, rugosæ, protrahitur subinde apophysi donatæ, qua arbori suæ videtur adhæsisse; nec non quinque costis, quas sæpè totidem aliæ intercedunt, per longum decurrentibus. Cuticulæ exteriori itatim subest pulu-natus calix, fragilis, gummosus, sapore mixto acerbis cum obscuro quodam calore & acore: sequitur deinde putamen insigniter crassum; costis donatum, per totam substantiam veluti foraminulentum, scrobiculis perpassillis, concreta quadam melligine plenis, nucleum claudens longum; purpurante pellicula rectorum, album, minus acerbum, oleaginosum.

Expendat lector aut fortè à Chebulis differant tantum maturitate vnde coloris diuersitas fortassis pendeat. Tam fructus quam putamen integrum & apertum in icone satis eleganter expressum.

Sed placet etiam Cordi diligentissimi auctoris descriptionem in medium adferre.

Myrobalanus, inquit, Citrina ex Inda fit: relicta enim in arbore sua Inda quoad increseat, & maturefcere incipiat, concepto intus lignoso semine, in eam quam Citrinam nominauimus, euadit: longitudine sesquiquintalem & nonnunquam maiorem, crassitudine verò mediâ & tumenti parte digिताlem, vtrinque in mucronem definitentem, quinque angulis per longitudinem transeuntibus inæqualem, modicè rugosum, tenui cortice, densa solidaque carne & semine constantè. Cortici color est citrinus: carni ex citrino ad rufum vergens. Semè eius lignosum, candidum, angulosum, rugosum, scabrū: valde durū, figurâ oblongū, vtrinque acumi-

Tom. I.

natum, nucleum tenui, pallidaque vetricula vestitum claudens: figura & sapore Pinco nucleo similem; caro gustu Indæ respondet. Probabilissimæ sunt maiores, maximè citrinæ, minùs rugosæ, densæ, crassæ, & in fracturis splendens fibrillisque carne minorique semine prægnantes; & pondere duas drachmas & scrupulum æquantes.

Gabr. Fallopio Citrini sunt parui, citrino colore donati & subherbaceo: habent nucleum magnum, & paruum, ac tenuem corticem.

Hanc quidam existimant esse *χρυσόβαλαν*, cuius meminit Gal. lib. 8 & 9. *αγία τήρα*. Alphar. sanè empiricus Myrobalanos citrinos siue Chrysobalanos flauos vocat. Rob. Const. in lex. *χρυσόβαλαν*, alijs Myrobalanus siue citrinus dictus. Nos Syluij quoque iudicio ac quiescimus apud Mes. annòtantis, Chrysobalanum Galeni, cum calore digerat esse non posse Myrobalanum Citrinam. Garcias scribit: Myrobalana flaua Arab. dici *Asfar*. Myrobalanorum primum genus, quod rotundum est, & bilem purgat, indigenæ inquit ille] *Arare*, medicis Aritici vocant, nobis sunt flaua. Porro *Arare* rotundum est, & forbi folia profert. Huic verò Garciaz foliorum notæ non responderet noster ramulus ex Tabern. adpictus: nec intelligimus, quod Myrobalana flaua rotunda dicit: quæ enim ad nos importantur, & officinis in vñ pharmaceutico sunt, plerumque oblonga esse solent, figura Chebulis similia, multò minùs rotunda Bellericis. Myrobalana citrina Acostræ, quæ à medicis Aritici, à plebe *Arare* dici ait, & folia forbi tribuit. Myrob. flauæ; citrinæ; luteæ Herbariorum.

Delectus.

Citrini.

Synonyma.

Chrysobalanus.  
Myrob.  
flauus.

Asfar

Arare  
Aritici  
Serbi folia

## MYROBALANI CHEBULÆ

CITRINIS SIMILES, NIGRICANTES.

Chebula Citrinis similes, maiores, magisque turbinatæ sunt, in quinque similiter costas eleuatæ, rugosæ, colore foris obscuriore, & ad fuscum inclinante, penitus ex rufo nigricante, sapore consimili, pulpa crassiore, cui putamen subest angulosum, crassum, cauerosum, ut Citrinarum, nucleum continens pinguem, oblongum sapore consimili præditum.

Delectus.

Vide lector, num forte Citrinis eadem sint, maturitate & eam consequente colore differentes. Os adpingere neglexit pictor. Ramulus exhibitus ex Tabern. non responderet descriptioni Garciaz, & Persicæ folia tribuentis.

Considerandum an non eueniret Tabern. vel illi, à quo accepit, ut eam putaret Pruni speciem, cuius meminit Clus. quàmquæ aliqui Chebulam faciebant de qua videant lectores, quæ scripsimus cap. de Prunis, sub mentione Pruni Myrobalanæ.

De nostra autem Myrobalanò Chebula appellata hæc scribit Cordus. Chebula appellatur Myrobalanus fit; cum Citrina ad consummatam maturitatem peruenit; quæ Citrine figura; carne, semine & nucleo per omnia respondet; maior tamen est, molliori, crassiori & minùs fragili carne constans, colore tamen foris quàm intus nigra, gustu Citrinæ aut Indæ simili. Eleganter maxime, ponderosissimæ: foris, cum abluantur, in citrino, puiceoque nigre, carnem crassiore nigriorem lentam, mollem, & fractu ob succi copiam difficilem habentes: ad trium drach. pondus quàm proximè accedentes. Memoratur Fallop. quòd Chebuli sunt maiores omnium longissimi: Crassi, habent paruum nucleum, Colorem habent citrinum, & qualem habent Myrobalani citrini, suntque rugoli.

Delectus.

Quebula Myrobalana, inquit Garcias, Arab.

Simony-  
na  
Pachula.  
C. indita.  
C. indita.

Chepula.

*Chebulaj* *Chepula* nostra, quæ picuram purgant, incolis *Aretca* appellantur. *Aretca* magna sunt, & rotunda, oblongiora tamen dum ad perfectam maturitatem perueniunt & angulosa: folia eius Persicis similia. Chebulorum conditorum maior est gloria: conduntur hæc in Bishnager, Bengala, & Cambaya: quæ tamen rarius ad nos adferuntur, & non nisi dura & male condita, teste Clus. *Chepula* quæ *Aretca* folijs Persicæ, *Acostæ*: qui tamen fatetur se arborem non vidisse. *Myrob.* Vel *Myrab.* *Chepula*, vel *Chebula* Herbarijs & offic. *Geum. Groß oder schwarz braun Myrebalan.*

MYROBALANI EMBLICÆ, IN  
SEGMENTIS NVCLEVM HABENTES,  
ANGVLOSÆ.

Descriptio.

*Emblicæ* sessiles sunt, puluinato calyce omnium copiosissimo, nigro, sed non nitido, more carnis Indarum striato, etiam in penitioribus substantia pro costarum ossis commissuris sponte dehiscente, qualia plurimum carnis fragmenta adferri solent: sapore Indarum acido parum acerbato: os læue, turgidum, hexagonum, substantiâ læui, solida, non foraminulenta, ut putamina Citrinarum & Chebularum, senis loculis distinctis eodem semina discluda continet Piracea, vel Pomacea, spadicea, triangularia: sponteque in partes fatiscent. Hanc crebro integræ cum nucleis pediculo donatis conditam obseruauimus, quemadmodum figura repræsentat, ut & reliqua satis eleganter.

Sapor.

Semina Py-  
raceæ Gel-  
Pomacea

De ea autem sic scribit Cordus. *Myrobalanus* appellata *Emblica* suum peculiare & proprium genus habet, etiam à *Bellirico* diuersum: magnitudine *Bellirico* cedit, eadem nunquam integra adfertur, sed in fragmina diuisa & dilapsa: habet enim eius caro sex in longitudine commissuras, quibus, cum maturuit, dehiscens, in totidem partes dilabitur, quæ singulæ adhuc in binas partes digitis findi queunt, crassitudine mediocri, habitu contracto, & aliquantulum rugoso, colore cinereo aut fusco. Totus fructus sub commissuris singulas cavitates habet, quarum vestigia in fragmentis apparent. Semen in medio est lignosum, durum, ad rotunditatem accedens, colore subrossum, æquale, minime rugosum, parua rotundeque *Auellanæ* æquale: sex angulis & commissuris compactile, & in totidem partes secundum longitudinem fissile, quibus singuli insunt nuclej figura oblongi & triquetri, ligneo, tenui, & tamen duro corrice, intus autem medulla constantes. Saporem caro eius Indæ *Myrobalano* aut *Chebulo* similem habet. Eligito fragmenta eius maiora, solidiora, crassiora, & minime rugis contracta.

Nuclei.

Delectus

Bellirico

Gabr. Fallop. notat, quod *Emblici* sunt crassiores, & constant ex pluribus partibus, ita ut videantur constare ex pluribus testellis, & semper deferuntur ad nos in frusta: raro autem poteritis uidere vnum ex his *myrobalanis* integrum: nucleus ipsorum est veluti offeus, constatque ex quatuor vel quinque partibus in quibus sunt semina.

Synonyma.

mus E.

ica

A.

Scaliger in Theoph. de Pruno, siue *corruentibus* Aegyptia? aliquid, (inquit) contemplabere super *Myrobalanis* *Emblis* aut eius nodi: multa enim conueniunt. Corrige *dequidam* non edider. Hæc est illa quæ *Empelirica* Syluio dicta, eandem putat esse cum ea quæ *Aetuario* *Myrobalanæ* & *Myrob.* quoque dicitur. *Myrobalana* *Emblica*, inquit *Canizius*, Arab. *Embl.* *Myrobalan*, sed sub nomine

*Seni*, ut patet ex *Scrapione*, qui *Seni* tenuissimo cortice prædita esse scribit: quæ nota *Emblis* conuenit. Quamuis autem *Seni* o. scribat *Seni* cognominata *Myrob.* genus esse oliuarum, tamen errat, atque erroris causam præbuisse credo, quod *Emblica* sale aut aceto condita edantur. Quanto genere *Myrob.* *Amuale* incolis nuncupato, nobis verò *Emblica*, dicto, non vtuntur, nisi densandis corijs & atramento conficiendo: sunt tamen etiam nonnulli, qui ijs viridibus, vescuntur excitandæ appetitiæ causâ. *Amuale* folijs est minutim incisus, *Palmarum* longis. *Emblica* copiose recentissima & optime condita inueniuntur *Antuerpiam*, teste Clus. *Emblica* autore *Acosta*, incolis *Amuale* dicta, folia minutim incisa habent, Filici ferè similia, sed paulo crassiora. *Eschens* fa. b. *Myrobalanen* *Græm.* *Emblis*: Herbarijs & Offic.

MIRQBALANI BELLERICÆ  
ROTVNDIORES.

*Bellericis*, quæ altera parte sessiles ferè, altera *turbinate*, & in apophylen ceu pediculi crassius desinentes, magnitudo quæ *Citrinis*, nisi magna ex parte essent rotundiores: superficies quoque leuior, minus rugosa, obiter dunaxar costarum putaminis vestigia ostentat, quæ nonnunquam terreo, aliâ ferrugineo colore, licet penitior pulpa substantia etiam hæscat, sapore *Citrinarum*. Putamen angulosum, breuius & rotundius, cauernulas non habet gumini receptices, veluti *Cietuxæ* & *Cæbala*: cauernam autem possidet longè capaciorem, triplo puta quadruploue: in qua nucleus plerumque marcidus.

De hac Cordus: *Myrobalanus* quæ *Bellericus* appellatur, à prioribus tribus differt, in alterius generis, quam illæ, arbore nascent, figuram habet rotundam, aut modicè oblongam, superficiem fulcam, æqualem in longitudine quinquè vltimum angulis distinctam, magnitudinem verò maioris gallæ, pondere quatuor aut quinque scrupulos superans aut æquans, tenui carne, & magno, lignoso, duroque semine constants, *Chebulo* semine multo maioris, drachmæ pondus leuante, & intus oblongo, acuminatum & *Auellanæ* propemodum æqualem nucleum claudente. Saporem caro eius habet proximè ad prædictarum *Myrobalanorum* qualitatem accedentem: substantiam verò illis rariorem. Eligito maiores, ponderosiores, solidiorique carne constantes.

Fallop. *Bellirici* rotundi sunt, & quasi pilosi in extrema facie: habent pediculum aliqua ex parte adactum, & corticem, ac nucleum crassum. Hi sunt *Myrobalani* qui in officinis habentur, quorum historia est penitus ignota omnibus, an scilicet omnes iste species sint ex vna eademque arbore, an ex pluribus inter se differentibus, & quales sint arborea: *Lodouicus* tamen *Barrhema* in libro navigationum inquit, quod aliqui asserunt arborem, quæ producit *Myrobalanos* esse figurâ *Pyrorum*, tamen scitis quod est omnino ignota *Mesue* & omnibus. Vnde omnia plantâ accipiamus fructus, & agamus infinitas gratias Deo quod ipsos habemus: & non curemus nunc amplius de historia. Hæc ille.

*Myrobalana* *Bellirica*, Arab. *Belerigi*: *Myrobal.* genus tertium, *Gutin* incolis nuncupatum, rotundum, Gut folijs *Lauri*, sed pallidioribus & subcinereis: *Garcias*. *Bellirica* rotunda incolis *Gotin*, folijs *Laurinis*. *Myrobalani* *Bellirica* recen-



centes & sicca apud Tabern. qui utraque pingit, & grane Bellerische Myrobalanen idas, has vero, dicitur Bellerische Myrobalanen vocat. Sepe citato no nre, Bellerice, tam Herbarij quam Practici vtantur.

De Myrobalanorum viribus ita scribit Serapio. Myrobalani teruntur, aqua calida macerantur, in colatura dissoluitur saccharum cum tereniabin: ita enim acerbitas eorum remittitur, præterquam quod saccharum etiam absterfione deiectionem adiuvat. Magis tamen earum vis intenditur, si cum Prunis, sebeitenis, velluibus decoctæ propinentur: horum enim lubricus lentor Myrobalanorum acerbicatem & adstrictionem contemperat, vt facilius per aluum secedant. Confueuerunt etiam cum Tamarindis dari: quorum facultas est bilem reprimere, nauseam & vomitum compescere, ventriculum roborare, ex vomitu laxum & imbecillum redditum: calores febriles extinguere: interrim acetositaris ratione ruffientibus obsunt. Citrinæ Myrobalani, autore Auic. Indis calidiores putantur, inde verò Chebulis: quoniam interrim omnes in primo gradu sint frigide, sicca in secundo. Bilis feruorem extinguunt omnes. Inde coloris gratiam addunt. Elephantici viles sunt omnis generis Myrobalani. At Chebulæ sensus acunt, memoriam roborant, & actiones principes, profunt in Cephalalgia. Citrinæ citæ acies sunt contra oculorum resolutiones, lachrymas eò cum impetu ruentes restringunt. Profunt ad cordis palmon & mæorem abigendum, assumpat: splenis itidem & visceribus nutritioni destinati, præsertim verò nigra ambæ: nam & ventriculo robur addunt, potill. infuse, concoctionem adiunt: ventriculi superfluos humores absorbent, tam Citrinæ, quam Nigræ minis verò efficaces sunt sinu chebulis. Cæterum Chebulæ nauseam inducunt; conferunt tamen aquæ intercuri. Chebulæ & inde ex oleo ventrem itringunt. Citrinæ bilem primariò ducunt, secundariò pituitam. Nigræ melancholicos humores euacuant, conferantque hæmorrhoidibus. Chebulæ melaneloliam & pituitam purgant, & contra colicos dolores valere creduntur, quarum infusarum dosis est, drach. v. vsque ad drach. xi. In substantia verò dantur drach. ii. & plures. Citrinari infusum propinatur interdum vsque ad drach. x. Infunduntur autem in aquam tritæ. Chebulæ in diuturnis febribus conferunt. Cæterum Emblicæ ex Iudæi sententia calidæ sunt: alijs plerisque frigida in secundo recessu. Auic. verò sicca videntur, cum pauca frigiditate. Sanguinis feruores extinguunt, capillorum radices corroborant eosque denigrant: meruis utilissimæ sunt, oculorum tonum conseruant. Cordi robur addunt ipsamque exhilarant, actiones principes intendunt. Ventriculuni roborant, sitim sedant, vomitum compescunt; cibî appetentiam excitant. Venerem vegetiorem reddunt firmioremque, & aluum, vt uolunt quidam, cohibent. Verum conditæ clementer ventrem leniunt; melancholicos humores & pituitosos subducunt, hæmorrhoidibus conferunt, spiritus inspissant, & maxime tristitiæ conferunt à resolutione spirituum. Est enim cordis confortatiuum medicamen à proprietate quadam: & quia mundificant etiam, ideo vehementer conferunt intellectui & memorie, atque de eorum numero & genere sunt, quæ omnia membra confortant.

Mefues de isdem sic tradit: Myrobalani Citræ, Nigræ, Cepulæ sunt medicamenta benigna. Tantum enim abest, vt purgando vires deiciant, vt etiam cor, ventriculuni, hepar corpusque te-

liquum confirmant; cogendoque in vnum roborant: qua re vnicæ his incommodant, qui sunt obstructionibus obnoxij, has enim excitant. Præterea medicamentis acerbis, & purgando exoluantibus, vt Scammonio, perfecte corrigendis rectè miscentur: sed huic præsertim Citrinæ sunt miscendæ. Id enim contraria, tum substantia, tum qualitate frangit, & purgationem iuuat. Hæ autem omnes sunt frigida primo gradu, sicca secundo. Siccando enim excrementa partium putrida valenter absumunt, mollesque patres, & laxas ducunt, & densant, multaque adstrictione cogunt. Cor, stomachum, reliquamque ventriculuni, & hepar roborant: quapropter exhilarant, colorem cutis, odorem oris, & sudoris commendant: corpus floridum & iuvenile diu tenent, tremori cordis conferunt, hæmorrhoidibus commodant. Purgant ventriculuni bile, ab eaque tertianam, & reliquas febres biliosas & ardorem extinguunt, præsertim Citrinæ: Hæ enim præter cæteras sunt cholagogæ: ob id calidis & biliosis naturis salubres. Eadem omphacio, vel aqua rosarum, vel succo Funiculi macerate, coarctant, oculum tergent, intemperiem eius calidam auferunt. Earum quoque puluis tenuissimus, per se quidem delachrymationem stringit, oculum ab humore multo laxiorem iuuat: cum mastiche verò, vlcera siccando sanat. Cepulæ verò sunt phlegmagogæ, ventriculuni purgant, & roborant, rationalem animæ partem vegetant, viliun (& sensus alios) acunt præsertim conditæ: hydropi & febribus diuturnis conducunt. Nigræ melancholiam purgant, & bilem viliun: non trillare, lepiæ, quartanæ, & ceteris affectibus melancholicis profunt, coloremque cutis viuidiorem efficiunt. Quia verò dicitur Myrobalani omnes obstructionem promptè excitant, in corpore obstructioni opportuno, & villis ventriculi, & intestinorum faciliè adhaerentes, seu rugis quibusdam eà exasperant, non dentur obstructioni obnoxij, alijs verò dantur cum diareticis, vel infuse sago lactis, vel succo Fumarie, vel cum Absinthio, Agarico, Rhabarbaro, Spica nardi. Oleo autem Amygdalarum dulcium, vel rosarum, vel sciamino infuse & conficcate, vel cum Amygdalis dulcibus, aut vis pastis, aut hatum melle citat, vel Manna, vel Tamar Indis vel Violis conditis, vel alio leniente medicamento sumpta, ventriculuni & intestina leniunt, & citò per ea lubricant, etiam si quibusdam aliter visum est: neque amplius his adhærent, aut rugas inducunt. Hæc verò ipsarum incommoda sic emendabis, & saporem delicatum acquiras. Tritas æstare merges oleo Amygdalarum dulcium, conficabis, & lubricas reddes in umbra, siccabis Sole, affusoque identidem oleo conficabis: idque triduo cum feceris, altero deinde triduo aqua saccharata, vel sero lactis partum saccharato, aliquandiu mersas, in Sole iterum siccabis, affusoque frequenter eodem liquore conficabis, coques in trochiscos, ac in umbra siccabis. Alii ipsarum tritarum partem vnam diebus octo marcant sero lactis caprini, in vase vitreo oris angustis: deinde semel seruefaciunt, manibus conficiant, colant, aqua deinde siccata, trochiscos, vel cataportia fingunt. Hisque addunt nonnulli medicamenta purgantia benigna. Hæc vel illa pro scopis & indicationibus variis. Datur citrinarum tritarum pulvis à drachmis duabus ad drachmas quinque: maceratarum verò expressum, à drachmis quinque, ad drach. viginti. Indatum & Cepularum pulvis à drach. duabus, ad drach. quatuor: expressum infusarum à drach. quatuor, ad drachm.

Obstructionibus obnoxij, aut

Temperam.

Principes partes roborant.

Factor oris & cutis. Tremor Cordis.

Purgant.

Citrinæ

Oculis conseruant.

Vlcera.

Cepulæ.

Nigra

Cantio.

vt præparanda.

Modus præparandi.

Trochisci.

Dosis.

*Cautio.* decem. Ne sume flante Borea: & his sumptis, pifib. abstine. Verumtamen hanc decoctum promptius & valentius obstruit, quam maceratorum expressum. Alfe item ipsa minus purgant, potentius conspant, & adstringunt, & his magis vsta. Harum quoque tritum pulvis quò tenuior, eò vehementius adstringit: maceratorum verò expressum, minus adstringit, omniumq; maximè purgat. Ob id eas infundimus, quando solam vacuatione expetimus. Cepula verò condita purgant quidem minus, partes nutritorias roborant magis: non condita contra. Condiuntur autem vel recentes, si harum est facultas: vel sicca, sed industria humectate. Recentes quidem, densa, stylo confixa, postea igni lento cocta, quantum sufficit: aqua deinde expressa, vno die super tabulam siccantur, post mulla biduo macerantur, igni lento percoquantur, vase vitreo reconduntur, post sex menses utendæ. Si verò sicca sint, aqua sub Sole dies octo macerentur: deinde in dolio, vel alio vase magno vel folia in arenis humidis tertio quoque die mutandis secretas, identidem aqua irrigabis, donec tumescant: reliqua ut prius persequere. *Emblia* parum frigent, siccant ordine primo, pituita etiam puri ventriculū purgant, eumque & cerebrum, nervos, cor, hepar, & partes laxas constringendo roborant: ob id tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt, furorē & latratus eius cohibent, vim animæ rationalem augent, calorem viscerum infirmiorē, & inde natam sitim, extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, græues, ossium parvorum. Tardius purgant, & rugis ventriculi minus incommodant, si aqua in Sole macerentur, donec humectate tumescant. Postea expressa mulla biduo macerantur, igni lento coquantur: ubi cocta refriguerint, mellis albißimi parte quarta excepta reconduntur. Aromatibus quoque, cinnamomo, xiloolo, cardamomo, croco, gallia, & similibus nonnulli condiunt. Et etiam lacte manè & vespere mutato, macerantur triduo, siccantur vento, & in umbra, & reconduntur. *Bellerica* etiam sunt benigna, & roborant: frigida primo gradu, sicca secundo, cætera Emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multa & densa carne, græues. Conditarum vires Mesues alibi persequitur, his verbis. *Cepula* Myrobalani condita stomachum & ventriculū firman, appetentiam inuitant, coctionem promouent, rationalem animæ partem vegetam reddunt, & sensuam: quapropter visum quoque clariorem, & usu crebro iuuentutem tuentur. Accipienda verò sunt ex siccis recentissimæ, & iam præscripto modo præparanda ad condituram, si recentium non a sit potestas. Hac etiam arte, quæ prius Myrobalanos condendi tradita est, possis quoque alios fructus sicciores condire & recentibus similes reddere. Vna manè ieiuno dari potest singulis aliquot diebus. Placent enim sapore austero, & per condituram dulci, & nonnihil aromatico. Quæ autem recentes sunt conditæ, sunt præstantiores: ac diutius seruantur, quam post humectationem condita, ut censet Syllius. His substitui posse idem putat, ex nostris fructibus non paucos, ut Oliuas Colimbades, Nucces conditas, Persica Corboliana, Cydonia condita, Pruna damascena & Iorrana, & dactylia dicta, quæ si condiantur, inquit, eadem præstare possint: de qua re iudicent pecciti. *Emblia* Myrobalani, eodem Mesue tradente, condita ventriculū roborant, eius substantiam & facultatem contrahendo, & intemperiem humidam corrigendo. Datur

vna semel tota diebus aliquot, ut superior. Non tamen his addo fidendum censet Syllius, ut opatione magis quam viciat adducti eas tantum faciamus, ut agros, quantumvis opulentos, sumptu parum necessario oneremus magis, quam proficiamus aliquid. Quam iun ueris, inquit, iudicare possunt qui usu harum admodum profecerunt. His autem si utendum sit, mallem confusas accutè probare, quam dentibus parum probè commansas deuorare, ne sua dura substantia uentriculolum lædant, & coctioni suæ diutius resistant adeo, ut ne horis quidem quatuor (quantum tempus harum coctioni tribuere solenne est) percoqui possint, & forsitan vix femicoqui.

Porro in iunioribus medicis quemadmodum & Actuario illud quoque forte reprehensione non carcat, quod Chelulas tantum phlegmagogas, Citrinas cholagogas duntaxat dicunt: ex Scapionis etiam & Auicennæ præ citatis verbis facile refelluntur, qui promiscuæ facultatis cathartice dilectis verbis meminerunt.

Sed Actuarium quoque ipsum & vnum inter Recentiores de earum viribus tradentem consulti par est. Perquam mediocriter, inquit, alium ciunt Myrobalana: trita duabus aut tribus drachmis purgant: peculiariter superuacuum capitis humorem exhauriunt: Flaua bilem flauam: atra nigram detrahunt: quemadmodum pituitam Cepula. Stomachum autem & interanea, sua insidente adstrictione firman, sed vsta multo magis & eluta: quæ de causa magnam purgantem facultatis iacturam faciunt, quod tenuioribus & siccioribus consistent particulis. In quibus itaque decumbens fluxio partem aliquam fatigat, aut intestina exulcerat, hæc tosta & elota repræsentamus, & mediocriter intestina subducunt. Eandem vim Emblica fortiturn, unde hæc omnia miscentes genera, sapienter barbarorum medici paruum triphalon adpellatam ex ipsis componunt.

Gabr. Thollopis tractatu de medicamentis purgantibus simpli. in genere de his hæc habet. Myrobalani in officinis sunt in usu vel quales sunt, vel conditi. Verum Auicenna non condit omnes, sed Emblicos & chebulos tantum, qui etiam nunc conditi solent: Condiuntur & alij. sed precipue ille quæ species, & ratio est: quia bene condiantur, cum habeant multam carnem: alij verò habent parum carnis: idè non bene. Condiuntur autem vel virides, vel siccati: virides conditi non deferuntur ad nos: sicci verò possunt conditi eo modo, quem docet Mesues. Illi qui redeunt ex Alexandria, dicunt, quod antequam condiantur, macerantur aqua saponis, & hinc mori aliqui nolunt vquam vti Myrobalanis conditis, quoniam, dicunt, ratione illius aque saponis, amittere totam suam vim. Sed siue macerentur aqua illa, sine non, quod nescio, nec volo inquirere: video quod habet suam vim, nam obiter quod si quis utatur frequenter ipsis, siccatur optimè caput, & reperio in ipsis astrictionem, qualem in ijs, qui non sunt conditi. Ac idè consulo vobis, ut quando volueritis roborare, & siccare caput, exhibeatis pluribus diebus a cibo vnam Myrobalanum conditam: cum verò volueritis magis euacuare quam roborare, exhibeatis vel infusionem, vel decoctum, vel substantiam Myrobalanorum: verum tamen est quod nunc non est in usu ex hibito ipforum in substantia: & nisi misceant cum aliquo pharmaco, in cuius compositione ingreditur, ut in Electuario Indo, & similibus, nunquam medici vntur ipsis in substantia: & rectè faciunt quia nimis astringunt, & idè vntur vel pluri-



plurimum eorum, decocto, vel infusione: vtuntur, inquam, ad euacuandos varios humores, nam Emblici euacuant bilem, Chebuli pituitam. Sunt etiam in vfu apud recentiores ad conficiendos fropos quosdam pro morbo Gallico, quia refrigerant, roborant & euacuant: & reuera optimi funt si morbus Gallicus fit in principio, & nondum fixerit radices.

Et, subdit, Myrobalanorum omnium vires funt, quod omnes funt frigidi in primo gradu, & ficci in fecundo: & si dicerem quod in ficcitate excedunt fecundum, non errarem: quia dum ipfis vtor in affectibus oculorum & in malignis vlcibus video maiorem ficcitatem quam poffit prouenire ex fecundo gradu. Vnde dicerem, quod omnes Myrobalani frigidi funt in primo gradu intenfio, & ficci in fecundo intenfio, vel in tertio incipiente: exceptis tamen emblicis, quos Mefues dicit refrigerare, & ficcare in primo tantum gradu: fed intelligatis in primo admodum intenfio. Myrobalani omnes astringunt validiffime: & ob id ego foleo ipsis vti foelici cum fuccelfu in defluvio capillorum, quando opus eft astringere & roborare cutim, quod eft poft euocationem humorum illorum acriorum, atque illarum fuliginum. Incommodum primum, quod eft in vfu Myrobalanorum eft, quod obftituunt vias, & meatus etiam illos, qui bilem deferunt: & idcirco non funt exhibendi illis, qui funt obnoxij obftuccionibus: corrigitur autem hoc incommodum admixtis aperientibus, acribus, & diureticis, vt ait Mefues, vt funt femina odorata. Corrigitur quoque & aufertur hoc incommodum, fi nos non exhibeamus fubftantiam Myrobalanorum, fed eorum decoctum, vel infufionem. Alterum incommodum, quod habent, eft quod hærent ventriculo, ita vt non poffint defcendere. Tertium eft, quod corrugant fubftantiam ventriculi: quæ duo incommoda corrigetis per pingua, inungendo fc. Myrobalanos ipfos oleo amygdalarum dulcium, vel butyro, dum atteruntur & comminuuntur: vel mifcendo cum ipsis paffulas aut Caffiam fifulam, vt dicit Mefues.

Aft Porta Neapol. nouo fuo Philofophandi aucupio, Myrobalanorum diuerfam purgandi vim ex ipsis coloribus depromit: Myrobalanorum inqueñs fructus quosdam luteos vel herbaceo colore flauelcentes accenfam bilem è corpore deijcere: fic qui atri funt, ad atram bilem daturbandam efficaciffimos: Genus Empeliticum albicans pituitam trahere: Chebulas verò ex fufco rufefcentes fanguinem ex melancholia repurgare. Similiter, inquit, Myrobalani quia cor referunt, & eidem conferunt. An verò color & figura funt illarum vium caufæ, & an fuos effectus præftent quatenus vel albæ, vel hoc aut illo modo figuratæ iudicent Philofophi.

Amarus fcitbit, offa chebulorum valere vice Spodij.

Maranth. Meth. cognofc. fimpl. l. 3. c. 7. paucula hæc habet. Omne Myrobalanorum genus poft longam macerationem pharmacopœi quamplurimi diutius coquant, ita vt non folum purgatricem vim in terreis eorum partibus fundatam in decoctum deducant: fed eam rufus nimia ad ignem morâ deperdant, dumque leuigare corpus credunt, illud potiùs adstringant.

Porrò Myrobalanorum præparationis modus, vt fcribit Garcias, apud Indos non inualuit, vt pote qui iis non vtantur purgationis duntaxat gratiâ. Nam fi purgare velint, eorum decocto utuntur, & maiore dofi, quàm nos in Europa. Solent au-

tem iis faccaro conditis uti magno cum fuccelfu, nec quifquam medicorum vî iftorum famâ vnquam eft periclitatus. Idem stillariorum liquorem ex immaturis elici iubet, quem poft fumptam aliquam conferuam adstringentem propinat, & fyrupis admifcet, fi quando opus eft. Flaua & Bellerica præfcribere folet initio menfæ, iis qui aut alui profluuiio, aut ftomachi relaxatione laborant. Talibus enim conuenit huiufmodi cibis propter adftrictionem cum pauca aciditate coniunctam. Præterea immaturorum Myrobalanorum fuccum, in alui profluuiis apprimè efficacem effe, experitum fe teftatur.

*Aqua fil-  
lai. Myrob.*

*Alui proflu-  
uium.*

## MYROBALANI SPECIES RAYWOLFIO:

## CAP. XIX



**H**ic fructus Descriptio  
qui Myrobalani speciem quandam præ se ferre videtur, æquat magnitudine & forma Oliuam Hispanicam, aut glâdem quernam magnam, coloris buxei, verrucis raris alperatus, alioqui laevis, nonnihil candilatus, fpiris circularibus præcinctus; qua arbori fuæ hæfit, calyculi veftigium, vt in Dactylis oftendit. Fragili huic cortici sub-

eft caro fungofa (vetuftatis, vti videtur, ratione) fapore amaricante, offi afpero & canulato adharens. Nucleus offe continetur magnus, vt in Myrobalanis Belliricis, vtrinq; turbinatus, canaliculatus, amygdalini nuclei confiftentia, pinguis, coloris melini obfcuri, pellicula intectus albicante. Hunc fructum dono acceptum à D. Rauwolfio, inter alia nofta naturalia custodimus, de quo ad nos fcripfit: Arborem videre fibi non licuiffe, reperiri in in Paleftina, quofdam cenfere Myrobalani speciem effe. In hac eadem tabella habes & Fagaras iconem, de qua agimus lib. fequenti.

*Sapor*

*Nucleus*

## MYROBALANI FACIE FRV-

## CTVS INDICVS.

## CAP. XX.

**E**x tima facie ad Myrobalanum quodammodo Locu  
accedere videbatur. Magnitudo eft penè Nucis iuglandis, figurâ, quali Myrobalanus Bellerica, aut Ficus, aut Pirum, fed paulò ventriofior, angulofus, colore ex pullo rufefcente, ea parte qua adhæfit in turbinatam apophyfen extenuatus. Pondus leue fatis, fubftantia carnofa ferè, colore cinereo, nullo fapore manifefto prædita. Quid in eius vifceribus latitet, nefcimus, cum fationi deftinauerit Ill. Duciffa Wirtembergica, cum alijs quibufdam exoticis, quæ hunc fructum aliolque

etiam pro discriptione & picturâ gratiosè nobis  
commodauit.

MYROBALANI VRENTES.

CAP. XXI.

Descriptio.  
Aretca.

In Insula S. Marię proueniunt etiam pulcherrimi Myrobalani, quos Aretca vocant. Obscurè rubent, & lapidem continent insignem. Gustati linguam & fauces adurunt, in modum vt Piper. Linchott. Bry fratres in tabulis æneis Hist. Indię Orient. magnam Myrobalanum, Aretca dictam vocant, quæ in dicta proueniat insula. Proponunt eadem pagina plures Palmas, sed paruis iconibus, similes maiori iconi quam exhibuerunt pag. xi. nomine Arequeira & Aretcæ: vnde nobis suspicio oborta, an fortè aliqua species Palmæ Myrobalaniferæ, cuius Plin. meminit, esse possit. Vtinam essent qui eadem cura vegetabiles hos Indiæ thesauros perferrentur & obseruarent quâ mineralibus vita carentibus inhiant, magno vitæ suæ (& vtinam non melioris) dispendio.

An Palma  
Myrobalanifera Plin.

MYROBALANO CITRINO

ALIQUOMODO SIMILIS FRV-  
CTVS CAVVS.

CAP. XXII

Descriptio.

A Pud Chariss. fratrem C. Bauhinum vidimus Anno 1650. fructum cui aliqua similitudo cum Myrobalano citrino, vnciam tantum longum: parui Pyri modò formatus, parte vna latiore, altera angustiore: in eo costæ notabiles sex, interpositis quibuscum aliis minoribus inæqualibus, aciculæ perforauimus, cauus compertus est. Color fordidus cum virore.

FRVCTVS PENTAGONVS VEL  
OSSICVLVM.

CAP. XXIII.

Descriptio.

Fructus Pentagonus à Paludano datus (Clus. Exot. Lib. 2. c. 20.) verius Fructus ossiculum dicendus, vncialis longitudinis, quod ex quinque veluti oblongis tessellis compactum, quibus subleuatis, longus nucleus in singulis apparebat, sed inanis & membranaceus dumtaxat: totum ossiculum tuberibus inanibus erat oblitum. Illud vnicum habebat, & quidem vetustate quasi attritum.

Nucleus.

MYROBALANI NIGRI OSSICVLO,  
NON VALDE DISSIMILIS FRV-  
CTVS EXOTICVS.

CAP. XXIV.

Descriptio.

Myrobalani nigri ossiculo non valde dissimilis fructus (per Barauos relatus in prima nauigatione in Iauam) maior tamen, inæqualis, suo externo cortice (si quem habuit) aut pulpâ nudatus, & dumtaxat, vt mihi persuadeo, fructus alicuius ossiculum, quod contractum satis crasso putamine præditum esse obseruabam, & nucleum continere subsuscum, atque in binas partes diuisum. Clus. Exot. lib. 2. cap. 15. Quale sit ossiculum Myrobalani nigri nondum nobis constat.

MYROBALANI OSSICVLO SIMILIS  
ANGVLOSVS.

Ossiculo Myrobalani, inquit Clusius Exot. lib. 2. communicatus fructus neque magnitudine, neque etiam forma dispar cum suo ossiculo, ab vna parte hexagono, vel heptagono, neruis oblique per vniuersum dispersis: is autem nigra cute veriùs quàm pulpâ rectus erat, acidi saporis: Ossiculum autem duro putamine constabat, in quo nucleus ex rubro fuluolens, non insipidi gustus, sed Amygdalam dulcem vetustam referentis.

NICARAGVÆ POMVM, NVCE  
ROTUNDA.

CAP. XXV

In Nicaragua, inquit Benzo, noui orbis prouincia, Pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolæ neque vlli alteri Indiæ parti concessum. Piri nostri specie fermè est, ligno interiore rotundo, Nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis. Arbor procera, exiguis foliis vestita. Pomum Nicaragua vocant: alij Nicaragua.

COLA FRVCTVS AD SITIM.

CAP. XXVI

Nonymus quidam ad tabulam Cosmographicam scribit: Fructus qui Cola dicitur, si manus in ore detineatur, sitim restinguit, & impositus aquæ, gratum ei saporem indit, & sanos valde confortat, atque stomachum corroborat. Imò literis proditur, quod si puluis ex hoc fructu confectus, putri ventriculo gallinæ aut alterius cuiuspiam volatilis inspergatur, putredinem discutit, & pristinam ei qualitatem restituit. Oleum inde destillatum & fantalis mixtum, febricitanti, si eo inungatur, intra horas duas vel tres sanitatem confert.

Legimus præterea in descriptione Guineæ, in regno Congi esse arbores, quæ fructum producant Cola dictum, Nucis Pineæ magnitudine, continentem alios fructus Castaneis similes: quibus quatuor rubri siue incarnati nuclei continentur, quos dentibus terunt, ac in ote versant, extringendæ sitis gratia. Fructus hi in aquam coniecti eandem acescere faciunt, ac amarescere palato: stomachum roborant, iecurque corruptum probè emendant.

DE CORNO.

CAP. XXVII.

Cornus sativa, seu domestica.

Prunus & Myrobalanis haud insubidè transimus ad Cornos & Cerasos, quæ & ipsæ carni inclusa putamina, & in iis nucleos edules magna ex parte habent.

Arbor procera satis est Cornus, & multis ramis brachiata, cortice subrubro vel cinereo, materie alba, firma, solida & dura. (cortice. n. scabrum, & adstrin-





adstringentem valde dicit Matth. Flores primum omnium profert, in ramorum furculis extremis infidentes, numerosos, brevissimo pediculo appensos, è quatuor foliolis extrà purpurantibus vel in ora, alias subluteis, intus conuexis, luteolis: intra quæ alia concoloria foliola, incerto numero, teneriora & minorâ ex quorum

concurfu apices attolluntur octoni, noueni, deni, hirsuti, qui in quaterna crocea foliola explicantur, staminula exigua lutea continentia. Subsequuntur fructus oblongi, ad Olium accedentes, graciliores, primum virides, postea rubri, sanguinei, maiores, manus purpurâ rutilâ inficientes contriti, forma sua ad Iuiuas accedentes: gustu primum acerbo, at ubi maturatione remollita fuerint, acido dulci & suau cum quadam tamen adstrictione, ossa continentes oblonga, teretia, qualia ferè in oliuis, durissima: in quorum angustis cauitatibus nuclei latitant exigui, subdulces, graciles, quique vix integri eximi queant. Folia, qualia uirgæ sanguineæ, [Coronæ Trago.] Videntur in icone paulò angustius picta esse. Reliqua pulchrè expressa.

Theophrasto Cornus [κράναια] quædam mas: quædam femina, quam & ἀνδροκρανίαν, id est, Cornifemina[m] [Gaza fæminicornum vertit] vocant. Folium habet Amygdalo [κρυνοῖ ἀνδρῶν] simile, habet textus, quem & Gaza sequitur; Dal. vertit utriusque folium Malo, aut vulgari, aut Cydoniæ ex Matthiolo] simile; nisi pinguis crassiusque esset, corticem neruosum, tenuem: caudicem haud admodum crassum. Stolonibus [ἰσθμῶν] profert femina sicut Vitex, [de utriusque hoc dicit Dal.] quæ fruticosior est. [Dal. femina quamuis fruticosior, minores.] Vtraque habet, sicut Vitex, geminos, & ex aduerso collocatos. Materies maris excors, totaque solida, coraisbus spissitate firmitateque similis. At fæminæ materies medullam habet, & mollior est, atque cauatur, ideoque ad iacula [εἰς τὰ δένδρα] inutilis. Maris altitudo duodecim ad summum cubitorum, quanta nimirum farissarum [σπυρίων, quamuis σπυρίων in vulgatis legatur] Macedoniæ [quam vocem de suo addit Gaza] longissimarum. Nunquam enim totus caudex altius assurgit, [τὸ γὰρ ὅλον ἐλάχον, ὅλως ἐν ἰσθμῶν] habet textus: legendum, ut vult Dal. τὸ θηλείας ἐλάχον &c. θηλείας corruptum est in ὅλον. Qui Idam Troianam incolunt, Marem sterilem dicunt, fæminam verò fructiferam. Nucleum fructus Oliuæ similem continet, gustu dulcem & odore: Florem Oleæ similem habet, & Floret [pro ἀπανδρῶν, ἀπανδρῶν] fructumque fert eodem modo, ex vno pediculo plura Corna proferens, atque eodem ferè tempore, quo Oleæ. At Macedones ambas fructíferas affirmant, sed fæminæ fructum haud esse esculentum. Radices Viticis modo, validæ & incorruptæ.

Idem Theoph. fæminæ fructum insuauissimum, (ἀσφῶλον) lignum infirmum fungolumque dicit: tanta est inter ambas differentia, cum mari firmissimum sit: quæ tamen postrema verba vel de suo addit Gaza, vel ex Plinio, nec in Græco extant: nostræ tamen benè conueniunt, ut ex natura ipsa deprompisse illa verba videatur, & nostram matrem exultasse. Sed & in præcoccem ac scrocinam distinguit Theoph. hancque quibusdam fæminam dici ait, & post autumum demum fructum perficere, quem modò ex eodem insuauissimum &c. diximus. Addit Theop. eodemmet cap. Cornu fæminam fructum ingustabilem cunctis animantibus gignere, de qua re in viribus. Quæ verò ratione Cornus omnem respuat cultum, & vel negligi desideret, cum silaestris lipidiorum mitiorumque proferat fructum, ex eiusdem Theoph. sententia, inferius tradetur.

Cornus ex sententia Diosc. [κράναια] arbor est fortis. [ἀσφῶν] fructum ferens Oliuæ modo, oblongum, primum quidem viridem, deinde per maturitatem flauum aut cerinum. [ἐκαστὸν ἢ κηροειδὴ: alii ἐκαστὸν ἢ κηροειδὴ, croceum: Lacuna legit in versuto codice ἐκαστὸν: & rectius, arque ad rem accommodatius.] esculentam, adstringentem &c. Plinius sanè Corno fæminæ sanguineum tribuit. Homer. *Dioc. emēd.* *Ἰλιάδ. ἰσθμῶν κρῆναια*, corticosam Cornum vocat, quæ inter se quatiat extensos ramos sono, nec sine fragore frangi EuroNotoque in montium conualibus inter ice concertantibus ipsamque concipientibus.

Ferre Pirum & Prunus lapidosa & besere Corna. Et Ancid. 3.

Forcè fuit iuxta tumulus, quo Cornæ summo Virgulta, & densis hastilibus horrida Myrtus: Acies, viridemque ab humo conuellerè siluam Conatus, ramis regetem us fructibus aras.

Ouid. *Autumnalia Corna.* Horat. *Rebicunda Corna:* & alibi *siluestria Corna.* Eiusdem meminit Colum. traditque Arbusti gallicum desiderare arborem humilem nec frondosam, cuiusmodi sit Opubiscunda. Lus, arbor Corno similis: quinetiam Cornus. Et Plin. Cornus circa solstitia reddit primo candidum, postea sanguineum fructum. Ex eo genere fæmina post autumnum baccas fert acerbas, & ingustabiles cunctis animantibus: (quod de frequentis capitis corno fæmina, si modò ea Plini] sit, intelligi debet) ligno quoque fungosa & inutilis, cuius mas è forissimis quoque sit, tanta differentia ab eodem genere sit. Item: ab his, quibus spissa est firmitas, proxima est Cornus: quamquam non potest videri materies propter exilitatem.

Crania & Cornus Gal. *ἀνδροκρανία*, Cerasa Italica, Cornus Indica Trago. Corni, addit idem, in Germania nostra vnum duntaxat genus habemus, nempe id quod fert rubras baccas, quæ Cereos ferat fructus haudum vidi.

Vera autem Cornus, autore Cordo, duplex est: Siluestris & satua. Vtraque in Germania nascitur. Nascitur siluestris Cornus pinguibus montanis locis. Distinguitur etiam alio modo, siquidem altera mas, altera fæmina existit. Mas apud nos (in Germania) montibus familiaris: quinetiam in hortis feritur. Statim Veris initio flores lutei coloris producit. Fæmina etiam in plana descendit: florem in pallido candicantem seriùs emittit, & seriùs fructum percoquit. Inuenitur fæmina Cornus, quam Græci *ἀνδροκρανία* vocant, plurima inter Danubij Vuerdam oppidum, & Augustam Vindelicorum. Cornus fæmina, masculæ Corno per omnia similis est: distat tamen ab hac, caudice minùs procero, minùsque recto flore racemoso.

Præcox  
Scrocinæ.

Fructus ingustabilis.  
Crania.

Dioc. emēd.

Synonyma.  
Lapidosa  
Corna.

Autumnalia  
Corna.  
Corna rubeicunda.  
Corna syluestria  
Cornus sanguineus  
Fructus.

Thebi crania.  
Cornus Indica.

Locus.  
In quo desit  
ferre mas & fæmina.

fo quidem sed minore, colore in viridi pallido, feruiente erumpente: baccis auterioribus & materie minus ipsa. Cordi historie addita est à Gesn. icon Tragi, quæ, vt ait, Corni maris.

*Cornus*  
*vulg.*  
*Cornus a.*  
*huic genus.*

De Corno obseruatione digna hæc scribit Clusius: Præter cornum vulgatum, quæ à cæteris, qui plantarum Historiam descriperunt, est proposita, aliud genus obseruabam Octobris initio 1593, cum Francofurti Coloniam descenderem, Andernaci ad Rhenum, in horro eius diuersorii cui symbolum S. Spiritus, monente honesto viro Hieronimo Scholier. Non minore porrò altitudine assurgebat illa arbor, quàm vulgaris mas, eiusque caudex simili cortice erat obductus: verum ramuli, illius ramulis longè fragiliores, folia ex aduerso eos amplectentia, breui pediculo, instar foliorum vulgaris, nitentia, nec illis minùs neruosa, in ambitu non serrata: sed vulgaris foliis latiora, ex quorum alis cutaceæ thecæ emergabant etiam ante brumam, in quibus florum subeunte nouo vere explicandorum gemmæ: floret enim cum vulgari, eiusque fructus cum illo maturefcit, saturatius tamen (ut intelligebam) rubens: crassiora etiam, breuioraque officula habet. Vulgaris autem Cornus, sed syluestrior & magis pumila, frequens nascitur multis Austriæ inferioris in siluis.

*Saturatius*  
*rubens*  
*Vulg. silu.*  
*pumila.*

*Cur lapido-*  
*sa Cornus.*

Curtius lapidosa corna Virgil. dicta tradit quia foris carnis parum, intus verò ossis plurimum. Mirum autem unum, ait, in hac arbore, & cæteris contrarium, vt siluestris Corni bacca suauiores sint quàm Vrbana: ut nihil hominum ingenium proferat, quinimò noceat. Omnem quidem industriam & artificium aspernatur.

*Syluestris*  
*fructus sua-*  
*uiss.*

Idem ante ipsum *Hermulius* agnouit, additque, Fructus siluestris Corni maturiores, suauiores quàm urbana, quod in hac & Sorbo peculiare ferè sit, quod non aliunde quàm ex Theoph. desumptum videtur, qui tradit Cornum cultu deteriore fieri, uti patebit infra. Ruellio cornus mas Gallis Cornelia vocatur. Circa hanc materiam quædam alia etiam habet, dum inquit. Est & in India, arbor ferens fructus similes cornis, quæ merito cornus Indica nominari possit. Hunc secuti, vt videtur, Ruellius, Gesnerus, Tragus & Curtius, eiusdem meminere; verum nihil addunt, aut docent. Diligentiore de hac cornu Indica fortè aliquando certiora, specialioraque tradent: cur Theophrastum non citant scribentem l. 4. c. 4. suæ hist. In India alia arbor, cui fructus similis cornis (*τοῖς κεραιόεις*) De simili quadam arbore videtur loqui, cuius fructu Corni ait, & venenarum: de quo præced. l. c. de Fico venenata.

*Cornelia.*  
*Cornus in-*  
*dica.*

*Cornus*  
*similis fru-*  
*ctus.*

*Resput.*  
*enitum.*  
*Cynobatus*  
*Cornar. re-*  
*prob.*

Cornario *aperta* mas Theoph. Cornus Plin. pro Cynobato agnita. Sed quis agnouit Cornum pro Cynobato nisi aut ipse, aut qui in hoc non plus ipso viderunt; Verum quidem, aliquibus spinum album, quæ, Cornar. Cynobatos est (quàm rectè, alibi ostensum) pro Corno habitum, sed perperam. *Cornus lapidosa, bastis accommoda, educa,* Guidoni de Fontaneio in Epith. Cornus Theoph. Matth. qui Theoph. lectionem deprauatam dicit, quanda ait Amygdalæ folio virefcere: sed huic rei iam supra prospectum. Dodon. Cornus mas, eademque Theoph.

*Cornus*  
*mas.*

*Cornus al-*  
*tera*  
*Cronemb.*  
*mas.*

Cronemburgius fatetur quidem Cornum Theoph. Diof. & Plin. eandem esse, in marem & feminam distinctam, sed sibi iam dudum alteram visam, in Grumnogano agro apud Abbatem Vincremenlem: sed non demonstrat quamnam aut quid intelligat per illam suam alteram.

Penà & Lob. Cornus arbor, cuius stipitis du-

ritiem plusquam corneam dicunt. In Niuernensi agro fructu albo aut ceræ colore. Idem & C. Bauh. de coloribus tradit.

Hist. Lugd: *Cornus mas.* Cæsalp: *Cornus mas.* Theoph. & Cornus Diof. Virgas fert robustissimas, fructum oblongum, specie fluiubarum, paulo tenuiorem, in maturitate rubentem intus & extra: sapore austero & dulci.

Camer. ex Hermol. annotat Corni siluestris fructus dulciores esse, quàm vrbane.

Nos quoque Basileæ diuersa obseruauimus Corna, magnitudine & colore discrepantia. Erant enim ex quadam arbore alijs altero tantò, ac ferè triplo maiora, succulentiora, saturatè colorata, & purpura sua manens inscientia, gustu minoribus non minùs sapida. Sunt & colore rubro manus non inscientia: vtrumque genus habet Basileæ, Clar. vir Dr. Felix Platerus.

Cæteris penè Herbarijs hæc arbor simpliciter *Cornus* dicitur, fructus *Cornum*, quod & Seruio placet. Maugan apud Auic.: vt lac. Manlius existimat. Germ. in alijs atque alijs prouincijs variant nomina: alijs *Cornelbaum*: alijs *Burbeeraum* / *Hornfirschen*, *welschfirschen* / *Tierlenbau* / *Tierlen* / *Herlizen* / *Eorln* / *Burbeer* / *Cornoln*. Belg. *Cornellenboom* / *Cornelienboom* / *Cornelboom* / *Cornelle*. Gal. *Cornier*, *Cornier*, *Cornellier*: *Grand Cornaillier* / *masle*, Bellon. fructus *Cornelle*. It. *Cornolo*, *Cornole*, *Cornare*. Hisp. *Cerez* / *saluage*, *Cerez* / *siluestre*, *Cornizelos*: Angl. *Cornell tree*. Bohem. *Drijnfony* / *Strom*.

Et si de loco & tempore quædam circa differentias dicta sint: id tamen obiter tantum. Cornus, autore Theoph. nascitur etiam in humidis locis, nec tantum in siccis. Seritur vel semine vel auulsiōe, seu sirculo auulso, quod & Tragus de sara ait, qui existimat in Germania vnum tantum genus corni haberi, nempe id quod baccas fert rubæ: cornus ea frequens in dumetis instar aliarum arborum siluestrium, inter Metensium & Triuerorum vrbes. At quæ ad Mosellam & Rhenum fluuios sunt sita loca, & in Alsatia, in his iniqua regionibus in hortis seritur modo iam dicto. In infertiori Germ. & apud Heluetos & locis ad Herciniam siluam sitis, ac Gallis quoque frequens inter dumeta minùs arida, aut iuxta fluentia, gustu tamen perquam austero, acore non ingrato, teste Pena & Lob. Siluestris, autore Camer. fructicat tantummodo, sed cultura in arborem pulchram redigitur. Spontè in Thuringia locis decliuibus & siluosis montium prouegit. In itinere ex Siderocapla Bucephalam, ibamus (inquit Bellon.) in siluis sub cornis. Nos Basileæ, Montbelg. & alibi locorum proceras arbores vidimus. Bessfordiz est maxima in castello, in qua viscum obseruauimus. Basileæ duorum colorum, speciatim apud D. Platerum. Item magna & parua. Obseruata etiam nobis cum essemus Patauii in montibus Euganeis inter thermas Aponenses, & Arqua, alii que in locis florentem in fine Februarii vidimus.

Scribit Theoph. Cornum tam marem quàm feminam ante Fauonium germinare; fructum circa æstiuæ solstitia reddere, præcoccem (scilicet: nam ferotinam, quam quibusdam feminam dici ait, post ipsam ætumnam demum fructificare, huiusque fructum insauissimum esse. Plinio verò, primo Fauonio germinat Cornus; Ordine naturæ siluestrium prima, sambucus, cui medulla plurima: & cui nulla, Cornus mascula. Floret in Germania antequam folia erumpant: Montbelg. mense february & Angusto, Septembri, interdum etiam octobri demum (teste Gesn.) matura. Lug-



duni deflorescentem vidimus Aprilī, quod mirum, cum calidior ea regio quam nostra. Basilicū verò anno 1609. cornum confeximus florentem, & apes supra flores, mense Ianuario. Sed multum tribuendum temperiei anni.

Scribunt, inquit Camer. arborem ē semine nasci, non furculo. Ego verò utroque provenire observavi. Semen oleum tota hyeme latet sub tellure atqueam prodeat. Theophrastus disertis verbis tradit provenire & semine & furculo, uti suprà citatum. Surculo ab radice aululo & semine plantavimus, sed irritò conatu. Non enim proveniēre.

Porro si Theophrasto credimus, Cornus non solum non defiderat cultum, verum etiam ab omni abhorret opera, cultumque respuit: atque eò deteriorem fieri ait, & egrescere. Quod si verum: *optimus illius cultus fuerit, qui vocatur nullus.* Quamquam Scaliger eam sententiam Theophrasti non plane digerere poterit, quando ait: Quædam cultu multo deteriora redduntur: nonnulla dulcescunt, cum humefcere atque succo abundare cœperint, ut Corni fructus: hic enim miscens (hys-  
pida) deterior (χείρων) redditur, atque in totum arbor ipsa humida, soluta, imbecillisque fit. At cum antea dulcedinem esse diceret fructuum perfectionem: hic in cornu damnat eam (infit Scal.) quā ex cultu capiat. Neque succum modò fieri deteriore: sed materiam ipsam quoque. Sanè queritur ad iacula. Itaque non mirum, si damnetur ob hoc cultus. Cæterum fructus eius si vescendo est,

quare factus dulciior, minùs commendetur, nescio, *Hæc ille.* Quæ eius ratio efficit ut illud *hyspida*, non miscens vertendum censimus, ut Gaza fecit, vulgatam quidem eius sequens significationem, sed, ad cultum redactam, aut, cultu cireum & domesticam: Nam quæ hæc esset simplicitas, mitiores fructus vel miscentes dicere fieri, aut factos deteriores? Sed nondum transactum cum Theophrasto. Quid enim de dulcedine dicemus? An quia dulcedinem acquirunt fiant deteriora? Ut Theophrasto consulamus, & ipsi ad eò rei veritati, vel dicendum, dulcedinem exactam & intensam illam non requiri in cornis, quæ subacidula ex dulcore quodam longè sint meliora, in sua specie, quam si nimis dulcia reddantur: vel sanè (si alicui, cui valde dulcia magis sapiunt, fortè non sapiat hæc ratio) *χείρων* non quidem deterius minùs bonum, sed, minùs, simpliciter vertendum, quæ & ipsa eius vocis significatio est: quamvis prior ratio magis arideat, ob hanc quam modò dicemus causam. Nam si cultu deterior sit, id propter fructum potissimum intelligendum: sicut ad materiam quoque trahat Scaliger, uti dictum. Si propter fructum: ergo quia hunc minùs coquit: minùs verò coquit ob humorem, quem vel cultu vel ex terra ipsa haurit culta. Quia igitur plus acquirit alimentum, quam quantum ei opus sit, non benè concoquit: ideoque neque fructum ritè ad perfectionem ducit. Vides ut à cultu hoc fiat, ab humore nimio, à terra præpingui, quam hæc arbor non postulat? Addamus & hoc, quod ad cultum requiritur ramorum & abundantium furculorum præcisio, quibus ferè neglectæ arbores scatent. Hos autem si præcidas, reliquorum nimium surgere alimentum, quam par sit. Sed vnus scrupulus adhuc nos habet. Nam si Cornus æquè humidis ac lictis proveniat, cur iam dicamus obesse ei humiditatem terræ pinguem? Solutio facilis.

Aliud enim arborem commodè hoc vel illo provenire loco: aliud hoc vel illo meliorem, lapidiorumque fructum aut materiam producere. Ac esset profectò hic latissimus Philosophandi campus, verum non sumus in Peripato. Illud reseruat Theophrasto à me Cherleto restituro, Latio reddito, commentario inactuo, & varijs ac subtilissimis disputationibus Botanicis, & ex omni natura depromptis locupletato. Nunc hoc agamus: & velut corollario disertatiunculam hanc claudamus hæc quæstioncula.

Sed cur denique respuit cultum Cornus? dicta nanque est tantummodò causa ex inco modo consequente: dicamus & ex ipsamet arboris natura, & more depromptam. Sanè verò, si arborum robustissima sit Cornus, quo epitheto & Theoph. & Scal. eam dignantur, istuc deque merito habeat nostram in ea fovenda satagentiam. Nunquid nescis homines & equos, quorum natura robustissima, & ad labores comparata, si nimio cultu & mangonio non tantum cireuntur, sed & reuera miscant vigore, hoc est, ut nos interpretamur, remittant, languescant, fieri tandem ad labores, legnes, vacordes, clumbes. Illud etiam consideratione meretur, quod Theoph. inter *ευαγέστατα* reponit *ἀγρυθα*, *εὐαγέστατα*, *πύργος* &c. Perpendendum an talis reuera dici possit Cornus: & an respondeat experientia? Nos quidem id nondum observavimus. Fortassis malleus legere *δυσανέστατα*, cum hæc omnes arbores tardioris sint incrementi, & durioris ligni. Sed siquidem tantum consellum robor cornis, nunc etiam vires earundem perpendi par est.

Corna, autore Hipp. & Mespila, & quæcunque alia huius generis poma, alium siliunt & acerba sunt. Dioic. Fructus editur & adstringit, alui profluvio ac dysenteria salutaris, siue sapa conditus, siue aliter in cibo exhibeatur. Oliæ quoque instar in muria servatur. Sanem verò etiam virentia folia dum vruntur exsulant, lichenibus convenienter illinitur. Cornarius tamen pro *γύμνα*, *γύμνα* legendum suspicatur, ut de ligni sudore, non foliorum, istud intelligatur. Nec temerè: nam huius coniectura aurorem habet Plin. qui idem remediij genus ex virgis defumi ait, quamvis diverso modo: Sudor, inquit ille, virgæ corni arboris lamina ferrea candente exceptus, non contingente ligno, illitque inde ferrugo, incipientes lichenas sanat. Condituræ cura & cornis adhibetur, ne quid non hominis ventri narum esse videatur. Miscentur sapes, & alio alius placere cogitur. Miscuntur verò & terræ cælique tractus. Sed eorum floribus læduntur apes. Cornum itaque arborem cauere oportet circa aluearia: nam flore eius degustato, aluo concita moriuntur. Hic Tabern. aues pro apibus legit, ridiculo errore. Et quis enim caueat aues, quibus nullus non tractus peruius? At apes arceri possunt, non confitæ hac arbore, prope aluearia. Corni arboris fructus, tradente Gal. admodum acerbus est, esui aptus. [experimur illam acerbiter in immaturis non in iis quæ maturitate fracidæ sunt.] Itaque mirum videri non debet, ipsam valenter restringere, sicut & Mespila. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valenterque desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum: at parvis vulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant. Induntur etiam fructus in pharmacis stomachicis. At tamen Schola Salern.

*Corna nocent stomacho bruma malè grata rigenti. Si tuus illa vorer venter, auarus eris.*

Ex ramulis Corni capiti imposita corona, sanat eius dolores, qui ex calidis vaporibus & humoribus contracti fuerint. Serenus.

Theoph. re-  
ditus in  
Corn. an-  
tici.

Quæstio cui  
respuit cor-  
nus cultum.

Arborum  
robustissima  
Cornus.  
locus Ge-  
nus.

Vires &  
vires  
alio fluxus.  
Tepetum.

Licænes.

Dioic. locu-  
s er.

Cautio.

Tabern. not.

Germina.

Stomachicis  
receptis  
Mollioribus  
poma in  
conditibus

*Alus pro-*  
*fluus.*

*Melacta.*  
*Cornato.*  
*fla.*  
*condita.*

*Elect. ex*  
*pulpa.*

*Supra.*

*Dysenteria.*

*Vinum ex*  
*Cornu.*

*Elect. parat.*  
*ad modum.*

*Cornelina.*

*Emplastrum*  
*ad vomitum*  
*et menses*  
*Alui fluxum.*  
*Causa de-*  
*monstris à ca-*  
*ne rab.*

*Observatio-*  
*nes.*

*Summ Ci-*  
*bus*  
*Ligni Sini*

Gallis, vt refert Ruell. Corna cum ematurue-  
runt in lagena patentissimi oris satis leuiter &  
lixè componuntur, ne collidi possint: deinde ad  
fauces vsque commissa vimineis furculis sic trans-  
uersis arctantur, ut modicè Corna comprimant,  
nec patiuntur ea, cum acceperint liquorem, sub-  
leuari: quamoptimo & liquidissimo melle, vel vi-  
cario eius saccharo, vas vsquead summum ita re-  
pleatur, vt Corna submersa sint. Hæc ratio non  
solum ea custodit, sed etiam liquorem mulsci sa-  
poris præbet, qui sine noxa possit interdum dari  
febricitantibus, præsertim si ventris profluuiio si-  
mul corripiantur: suoque subacido gustu, & pala-  
tam inuitante morosam abigit maliciam. Possunt  
etiam torteri, vel sale Conditi sicut oliuæ, qua  
de re vide Columellam. Quidam saccharo &  
melle condiunt Sicut Cefara & Pruna siluestria:  
quo pacto parata & elitata dysentericis magno-  
pere profunt. Et iam officinis quibusdam in usu,  
ea saccharo condire. Diligentiores etiam pul-  
pam ex iis conficiunt & in Electaria concinnant  
dysentericis efficacissima. Cornar. tradit muvia  
condita ad assatas carnes in mensa poni, velut oli-  
uæ colymbades. Fit & Lapa ex iis quemad. ex Ce-  
ratis ad prædictos usus & ad opsonia. Item ad feb-  
bres, ad fluxiones biliolis, ad scim, ad excitandam  
appetentiam. Quin & ex eorum decocto &  
saccharo ut tradit Marth. liquore ignis opere & co-  
ctura conerescit, coagulaturque, qui præterquam-  
quid gratissimo placet gustu, deest vltier dy-  
sentericis, ac foemini mensium profluuiio labo-  
rantibus.

Ex Corni fructu fit & vinum, hoc pacto. Acci-  
pe vini rubri adstringentis lib. C. cornorum ma-  
turatorum lib. x. aquæ chalybeatæ lib. xii. Commi-  
sceanur omnia in vase ligneo mundo, stent dies  
quindecim: postea in aliud vas defendatur vinum  
cuius nobilis efficacia in omni fluxu.

Electarium verò ex iisdem sic fit à pharmaco-  
polis. Cocta corna per cribrum cernunt, pulpam  
cum saccharo recoquant, quo modo cydoniatum  
fit, vocantque *cornelinam*, cuius usus in alui flu-  
ore.

Corna sicca contrita, & cum oleo Myrtino  
aut omphacio mista in Emplastri formam, præ-  
senti auxilio sunt ad vomitiones, ventriculo in-  
posita: contra fluxum autem alui, abdomini in-  
ducta: contra menses immodicos, peccini &  
coccygi applicata.

In Hetruria abstinent demorsi à cane rabido  
per integrum annum à quorundam lignorum con-  
tactu, præsertim corni arboris & sanguineæ virgæ  
vocatæ: siquidem (vt testantur ij qui rem experi-  
mento compertam habent) si harum virgæ tam-  
diu manibus teneantur, quosque concalecant,  
illico demorsi rabie exagitantur. Memini, inquit  
Marth. me vidisse in ciuitate nostra llicinenti, a-  
micum quendam meum rabie correptum, quod  
corni arboris virgis, lanam diu excussisset, qui,  
eorum oblitus, quibus sibi à medicis interdictum  
erat, rabidus interijt.

Fructibus etiâ corni, qui ad Mosellam & alia in  
quibus hæc arbor luxuriat loca incolunt, sucs sa-  
ginare consueverunt, teste Trago.

Materies validissima Theophr. censetur vt ante  
citatum ex l. 3. c. 12. vbi dicitur, id est iaculorum  
meminit. Gaza vertit venabula, vsus voce Plini-  
ana, qui l. 16. c. 39 sambuco attribuit quæ The-  
oph. de corno dixit, vt, fustius dicitur l. 5. in  
historia sambuci. Cornus igitur propter validita-  
tem iaculis experta Scaligero: & pistinarijs fa-  
bris ad parandos rotarum dentes. Virgis Lanifi-

ces ad contundendas lanas vtuntur. Bizantiū mul-  
tæ officinæ eorum, qui torrant manubria pro se-  
curibus & alijs instrumentis corni ligno p. alijs  
scatent, quod durius omnibus alijs lignis persubica-  
tur: Hocque ligno quemad. & Asphendani onulle  
naues aduehantur Bizantium in prædictos & alios  
vsus, ex regione Mengrelia, vt refert Bellon. vi-  
de pater etiam in ijs locis hanc arborem plurimâ  
abundare. Corni lignum, autore Plinio, non aliò  
pene, quàm ad radios rotarum, vtile: aut si quid  
cuneandum sit in ligno, clauisque figendum cu  
ferreis. Inter Adagia celebris est Gordij nodus,  
quem & Gordonium nodum vocant. Hic autem,  
autoribus Arriano & Plutarcho, ab Alexandro  
magno solutus è corni arboris libro, quamuis ali-  
enle dissectum scribant. Vt verò vult Io. Baptif.  
Porta quæ corni bacæ per maturitatem rubescunt,  
dysentericis valent, & muliebrium mensesum excre-  
centiis, & albæ bacæ ad rubra profluuiâ.

## CORNVS FOEMINA, PVTATA VIRGA SANGVINEA.

C A P. XXVIII.

EX Fruticum familia est, quàm Cornum femi-  
nam vulgò appellant, multis stolonibus luxuri-  
ans, ramis plurimum oppositis, cortice spadicco,  
sed ramorum linguinco, odore vniuso prædito,  
materie alba & dura. Folia ad corni satiuæ quam-  
proximè accedunt, atrouirentia, nonnunquam  
rubore asperso, bina ex opposito nascuntia. Flo-  
res in umbella gerit odoratos, candidos, quatuor  
foliis radiatis corollantes: in medio obliq. & tur-  
gunt totidem iustle. n coloris stamiq. thio recto,  
subiuridi. Bacæ Hederaceis vel Iuniperinis pa-  
res, linguineis petiolis appensæ, pri. num virides,  
per maturitatem nigricant, lacuna in umbilico  
parua perforatæ: in quibus osiculum pulpa uiren-  
te, acerba, insuauis, nec sine amarore immersum,  
striatum, nucleum continens album, a. narum. Li-  
gni materies, autore Marth. dura osseaque, corno  
minimè cedens, virgis corno tenuioribus, robustis,  
nodosis, cortice sanguinis modo rufescente.

Cæsalp. fructus niger, ut in lignistro rotundus,  
osse binas cavitates habente in quibus singula fe-  
mina continentur.

Si hæc *ἰνκορῶν* Theophr. seu cornus femina e-  
ius & Plinii, hæc pertinent quæcunque superiori  
capite de ea tradidimus. Sed an reuera ea sit, ad-  
huc sub iudice lis est: uti patebit ex autorum cõ-  
cõtrouersia. Satis accedere videtur his notis. Se-  
rò fracticar: fructus insuauissimus & ingustabilis:  
caudex non admodum extat: stolonis graciles ha-  
bet sicut vitex? & potius frutex est, quàm arbor.  
Quas omnes notas Theophr. suæ Corni foemine tri-  
buit: Sed & nodos hæc habet, quos vtrisque cornis  
cõmunes esse ait idem autor. Repugnat verò quod  
cornifera Theoph. lignum infirmum, fungolum,  
& medullam habens tribuit. Huius verò lignum  
aquè durum ac firmum sit, ex multorum autori-  
tate, quàm corni maris. Sed hanc difficultatem  
diligentiores aliquando noua quadam obseruat-  
ione conciliabunt.

Nihilo certius constat, an sit Virga sanguinea  
Plinii. Tam pauca enim de sua Virga sanguinea tra-  
dit, vt Oedipo ferè opus sit ad explicandum quâ  
describat: Imò si verum fateari velimus eam nec  
describit quidem. Hæc enim de ea tradit, Nec vir-  
ga sanguinea foliisior habetur. Cortex eius interi-



rior, quæ præsanare, & scelerius quàm opus esset sanare, & aperiri. Idem sanguineum fruticem alibi vocat, & de eius usu ac viribus diuersis locis agit, quæ infra trademus in viribus, ne ordo noster interrumpatur.

Dalech. annotat, sanguineos frutices Plinij Terragonias esse Theoph. quas Gaza Quadratarias vertit: & addit; sanguineam virgam Plinium appellare. Quæ verò ratione Dalech. dicat, fruticem sanguineum esse Terragoniam Theophrasti, nondum agnoscimus, cum docti aliam indicent Terragoniam ab ea de qua dicitur cap. de Euonymo.

An sit columellæ Opolus, ut olim existimauit Dod. considerandū sanè quæ de opulo pauca tradit Columellæ, & præcedenti cap. à nobis citata sunt, non malè videntur Virgæ sanguineæ competere. In historia Aceris & alia de opulo opinio traditur.

Bellonius eandem plantam Cornum feminam, Virgam sanguineam & sanguineos frutices videtur iudicasse, quando ita scribit: Arbor quam Macedones olim cornum feminam nominarunt, quam Galli nunc Latinos imitantes *Des Sanguins* vocant, in monte Castagna inter urbem Philippi & Bucephalum nunc *Canellam* dictam, sito, non multò minores proueniunt, quàm magnæ nostræ corni mares.

An Corn. apud Diosc. hanc intelligit, cum ait: Cornum feminam esse puto, quam Germ. Faulberbaum & Faulbertz vocant, quidam etiā Spindelholz. Sed forte Cornar. confundit duas diuersas plantas, aut saltem diuersarum nomina. Spindelholz enim Germani de Euonymo dicunt: Faulberbaum verò de Alno nigra.

Apud Cordum in Diosc. quidam hæc annotauit: cornum silu. aliqui interpretantur Faulbertz / Faulbaum: sed in aliis locis alios frutices alii.

Cornus femina, inquit Ruell. dumetis & nemoribus familiaris: Sed quod neglectas & ingustatiles ferat baccas, indignam quæ Corni nomine vocaretur, rura purauerunt.

Marth. verò, Corno, ait, haud absimilis est planta, quàm in Hetruria à sanguineo virgarum colore vulgari idiomate vocamus *sanguine* & *sanguineo*. Sunt qui velint Cornum esse feminam, sed non video [ inquit quibus argumentis hoc probare nitantur: Virgam sanguineam esse Plinii non aulim asserere.

Et alibi scribit: *Sanguino* in Tuscano, multis *Cornetis* (Cornus femina,) quorum falsa opinio. Et in Germ. *Barriegel* quidam vocant Pseudocraniam, alii osseam: Plinio est Virga sanguinea, Corniolus.

Nominis Germanici rationem reddit Tragus, quia (inquens) fruticis huius lignum, maxime cum aridum fuerit, securi & terebro, mirum in modum repugnat, ideo apud Germanos id nominis sortitus est, ut *Barriegel* vocaretur, licet ea appellatio ligustro quoque à nonnullis tribuatur, sed perperam. Quod si hic frutex arborelescens hinc folia sua non amitteret, vocarem illum Cellastrum Germanicum.

Gesnerus tamen & Cornum feminam, & Virgam sanguineam Plinij diuersis locis dicit, caprifque gratam, vnde nomen sit apud Gallos. *Sanguinum* Italis. Nor heringsten. Pseudocrania Cordi, id est, falsa Cornus. Quarendum monetur, an hæc sit arbutula seu frutex, quem à ligni duritia Germ. *Barriegel* appellant, addens Plinio virgam sanguineam esse & cruditis Cornum feminam conici, sed eum mox cap. 30. aliam Cor-

num feminam describere, cuius ipse Iconem apponat.

At verò ea icon quæ ex Trago apposta est Cordi nobis neutrum videtur respondere dicitur, prout Cordi.

Lonicera, Cornus silu. Et indelbaum Sculbeer / Cornus femina: Item alibi *Barriegel* potest dici ossea. Sed malè idem duas ponit figuras & duobus locis diuersis de eodem frutice agit.

Euchar. Roslin in suo Herbar. scribit *Phillyreum* Diosc. existimari à nonnullis *Barriegel*. Intelligit autem Cornum feminam: quo nomine vno loco depingit, & altero sub titulo *Spindelholz* / *Faulbeer* / *Cornus silu.*

Dod: hist. Gal. *Cornetier sauvage* Gallis: Theoph. *ὄνηρα*: Lat. cornus fem. Colum. Q. pulus: quibusdam Brabantis, Wilden Olier / id est, sambucus silu. ita dicta, quia nuper natos ramulos plenos medullæ habet, ut sambucus. Item: Virga sanguinea, ab Ital. dicta *sanguina*, *Sanguinell.* Petro Crescentio *Sanguinus*: Bel. Wilde cornellee, id est Cornus silu. Videtur Theoph. Cornus fem.

Valerius Cordus *ψευδοκράνιον* facit, inquit idem Dod. id est falsam seu spuriam cornum. Nobis verò non videtur Pseudocrania Cordi, licet cum Dod. idem sentiant Lob. C. Bauh. & Schuuenckf. Apud Cordum enim sunt duæ diuersæ plantæ eodem nomine, quarum neutri nobis videtur conuenire, quicquid dicat Lobel. qui sic ait: cornus fem. *Barriegel* in Cordi, Germ. *Spindelholz* & *Faulbeer*, id est, Fularia. Coriarij expetitur frutex Cordo. *Fularia*. Adhuc tamen cornum fem. Iudæorum in Cordi, & Virgam sanguineam vnum & idem faciunt: quàm rectè, ipsi viderint.

Turner. Cornus fem. Angl. quibusdam, *Dogberry tree*: alijs *corne tree* femall: alijs, quod latinionibus ad verucula conficienda in vsum, *Priest tree*.

Cautè Cæsalp. *Sanguen* inquit, vulgò, folia, subhirsuta: hanc Plin. videtur intellexisse Virgam sanguineam vocans. Hanc autem Theoph. cornū fem. videtur intelligere.

Securè Schuuenckf. corn. idus *Barriegel* in Theoph. Pseudocrania Cordi, Schuifbeeren Silesijs, Faulbaum, *Barriegel* in bel. *Spindelholz*. E nimvero qui ista nomina in vniuersis plantæ designationem concordat, is nobis egregius & subtilis Botanicus fuerit: difficultates iam in præcedentibus ex parte declarata, & suis quæque locis declarabuntur.

Camer. circumspiciens eadem ferè dicit, quæ Cæsalp. Causam reddit, Virgam sanguineam Plinij asseri non posse, quod breuis sit in ea.

*Pseudocrania* & corn. fem. H. Lugd. Tabern. & Thallio. Cornus silu. fem. Ryfio. Bohem. *Suucida* / Hung. *Gyroufa*. Reliquarum linguarum synonyma dicta sunt fult, suis quæque autoribus tributa.

Virgam sanguineam hunc dictum putamus fruticem (si coniecturæ locus est) propterea quod virgæ eius magna ex parte rubent, sanguinis instar: quamvis Veteribus & alia de causa sic dicta videatur, quod ex verberatione Parricidarum, antequàm mortu traderentur, sanguine madabant, vnde fortè, eius lignum apud Pœscos infelicissimum habitum, ut specialius dicitur in viribus.

Subeunt in montola sanguinei frutices: Plinius. Verùm non in montibus tantùm. Nam in locis sepibus, frutetis, siluestribus & saxosis locis passim Germaniæ fruticat. Vidimus etiam circa Monspelium & Patavium. Præuenit in Anglia quoque, Turn.

Tempus

Floret April. & Maio, Dod. Iunio, Trago. Iulij initio in Silef. Schuuenckfeldio: Nos Montbelg. etiam Septembri, Genevæ octob. & Nouemb. Lugduni Maio, Basil. Aug. sept. ac etiam octobri, praesertim circa Mutetum, (celebrem ob herbarum frequentiam) montem vicinū florentem observauimus. Baccæ imminente autumno magna ex parte nigrescunt, Septemb. maturantur.

Vires & vius.  
Baccarum sapor.  
Oleum è baccis.

Cane rabido demorfo.

Orbus arbor.

Turdorum cibis.  
Cæsalp. reprob.  
Baccarum Cerasi.

Cur infelix putata Virga sanguin.

Parricida Olim Virgines sanguines cadebantur.

Lex de Parricidâ exp. sita.

Legum Cerasi.

Ad frummas.

Coriarij.

Virgæ sanguineæ baccæ, gustu sunt amaro, acerbæ, adstringente, vnde necesse est consimili facultate praeditum esse earum oleum, quod Ananiasia rura in Tridentino agro conficiunt ad lucernarum vsum, expressis. forculari, decoctis prius in aqua baccis, vt tradit, Matth. Eodem teste, iam supra dictum in Hetruria demorfos à cane rabido abstinere à contactu sanguineæ virgæ: siquidem si Virgæ tamdiu manibus teneantur, quonque concalescant, illic demorfos rabie axagitant.

An de hoc frutice sequentia scribat Fracast. de contag. morbis. l. 2. in fine capit. 1. considerandum, ait: cur verò & qui sub Orbo arbore iacent, verrus in rabiem vertantur, sialias rabidi fuere, consimilem habet latentem causam si modo verum est, quod fama quadam circumfertur, nihil autem prohibet vapores, qui ex ea arbore continenter exhalant, stiptici quidem & hi licet dicere melancholicis, ad hominem delatos, & intus calefactos idem facere posse, quod & semina rabiæ, magis autem in eo, qui rursus rabidus, propter derelictam dispositionem.

Fructus à turdis multum expetitur, autore Cæsalp. Cui non consentit Dod. qui scribit: Baccas sapore ingratas & volucrum nulli desideratas esse. Partium dissimilium sunt, quasdam enim habent calidas, amaras, & exteriorias: plurimas verò frigidas, siccas, acerbæ & adstringentes. Et sanè huic Dod. sententiæ optimè quadrat quod de corno sua femina tradit Theoph. fructum eius & Buxi cunctis animantibus ingustabilem esse. An verò reipsa expertus sit Cæsalp. contrarium, nos later.

De Virgæ sanguineæ viribus sic Plin. Nec Virga sanguinea felicior habetur. Cortex eius interior cicatrices, quæ præsanauere aperit. Item: sunt qui sanguineis virgis tangunt ea, quæ nolunt his obnoxia esse; nimirum, formicis, erucis &c: Eiusdem frutices vitibus vincula suppeditant. At corticem ea præstare nec compertum, nec verisimile Dod. putat. Nobis vero haud similis putatur quod de eorum contactu infecta fugari scribit. Sed cur infelicem dicit? Modestinus in l. penult. ff. ad leg. Pomp. de Parricid. antequam sacro parricidâ inderentur, ostendit in more fuisse positum, vt virgines sanguineis caderentur: nempe ex hac arbore sumptis, non, vt quidam legunt, sagmineis, aut, vt alij interpretantur, sanguine tubentibus, ac rorantibus, quoniam hoc lignum infelicissimum haberetur, ac maxime infame. Magius, & ex eo Dal. Porro quæ ex hoc frutice vtensilia & rustica instrumenta, potissimum verò ad carpos pertinentia conficiuntur, ea diu durat, nec facile corrumpuntur, teste Trago: qui quid in medicina possit, sibi inexpertum fatetur. Camer. verò tradit Italos ex humo ligno aquam stillatitiam elicere, qua sola strumas (si qua fieri id possit ratione) penitus discutiat: sin minus, maturare partim & diminuer. Ryff. Coriarijs expeti hunc fruticem ait: sed indagandum id à coriarijs, an hic ipse sit, quem expetunt. Nobis enim de hac re nihil constat.

# CORNVS ADVLTERINA SEV PSEUDOCRANIA CORDO.

CAP. XXIX.

Pseudocrania, arbor est, quatuor, quinque aut sex cubitorum altitudine, caudicè distorto vtriusque plurimum, crassiore quàm vt manu complecti queat, cortice vestita spadiceo, ramisque pluribus brachiata. Folia habet subrotunda, ac interim in breuem mucronem desinentia, leuissimè per ambitum serrata, raro sesquialia latiora, figurà inter Tiliam, Berulam ac Pirastrum media. Flores post veris initium secus folia è furculis ramulisque profert paruos, colore propemodum in herbaceo pallentes, staminibus paucis breuibusque stipatos. In medio flore exiguum & oblongum eminet secururi fructus rudimentum, quod paulatim relicto post se flore, in oblongam excrescit baccam, vtrinque modicè turbinatam; & Corni fructus modo ouatam. Radice nititur multisida, quoquo versus distracta. Nascitur in saxosis collibus inter petras, quales sunt supra Regenspurgum vrbem (quam Ratisbonam vocant) in vtraque Danubij ripa, & circa Selhemium. Cordus.

Scimus esse qui velint plantam hanc à Cordo descriptam eandem esse cum Corno femina quorundam, seu Virgæ sanguineæ, vt Dod. Lobel. C. Bauh. Schuuenchf. Verum descriptio non videtur nobis conuenire, vt iam monuimus cap. præced.

Considerandum an affinitatem habeat cum Alno nostra baccifera altera.

## DE CERASIS IN GENERE.

CAP. XXX.

IN tanta Cerasorum varietate, primum Autorum dogmata de ijs prælibanda.

Ceraso, auctore Theoph. natura peculiaris, magnitudo excelsa, quippe quæ ad xxiv cubitorum altitudinem excrescat, admodum recta, & ab ima radice crassitudinis bicubitalis. Folium habet Mespilifed Setaniæ non Anthedonis. Conf. sed prædurum & latius. Vt vel è longinquo hæc arbor colore (& altitudine) cerni queat. Corticis leuore, colore, & crassitudine Tilig[?] similis est: ideoque cistas ex ipso conficiunt, sicut etiam è Filice corticibus. Hic cortex neque recto ductu ascendit, neque in ambitu æqualiter circumnascitur, sed volutatim (sive dicitur: in d[?] vulg. habet: quidam in[?] legendum censent.) ambit, ab inferius sursum se adducens, quemad. & foliorum descriptio. *Παραπληροῦς*: intelligimus figuram quando conuoluuntur, vtrinque adductis) cunque defquamatur, hoc eodem modo decorticatur: aliqui scissilis est, nec pars aliqua eodem filo detrahi potest. Crassitudine verò foliatam attenuatur, corticis reliqua parte æquè arborem conseruante, ac integro, quo antea vestiebatur. Cum verò & reliquæ cortex aufertur, exit humor quidam. Sin verò externa tantum tunica, reliqua pituitosa (αυτοῦ) quodam humore nigrescit. Rursus, quæ anno secundo, tunica, vice illius subnascitur, verum tenuior. Materies neruis cortici similis, tortilis ac conuoluta. Virgæ eodem omnes modo illic enascuntur. Ramis crescentibus euenit, vt inferiores assidue vergant & nutrent, alij sursum versus increscant.



crefcant. Omnino arbor hæc minus nodofa, multo tamen nodofior quam nigra Populus: radice alioqui multiplici, perquam fublimi fed non admodum crassa innititur, & conuoluta eadem radicis, & corticis radicem regentis. Flos candidus, Piro & Mespilo proximus, ex paruis floribus confians, forma fauaceus. Fructus rubet, figura Diospyro fimilis, magnitudine Fabæ. Verum Diospyri nucleus durus, Cerasi autem mollis. Nascitur vbi Tilia: omnino autem vbi amnes, & rigua. Huic arbori humor in lachryma modum densatur. *Hæc Theoph. de Cerasi verba*, aptè videntur quadrare cum nostra Ceraso, quamuis operotus admodum videatur in descriptione corticis: si quis tamen diligenter attendat, & nostræ quoque aptari posse, intelligit periti.

Flores fauaceos (κενεδρὶς Gaza legit, non κενεδρὶς vt vulg. habent) dicit, vel ob concavitates scilicet frequentes, vt Scal. censet, vel quia, vt ipsemet alibi Theoph. loquitur de re simili, est quædam πυρρὴ παχὺν κενεδρὶν ἵππου καὶ κορίθου, ex qua flores Cerasorum dependent. Istud fortè alicui difficultatem iniciat, quod Cerasi nucleus mollem dicat. Sed fiat, ipsum relatū hoc dicere: præmittit enim Diospyri durum esse. Alioqui per se & simpliciter oscillum Cerasi durum quidem est, quominus dentibus frangi conueriū possit, id quod in suis animaduertitur, qui ea veluti glandes, agminatim, nulloque negotio fracta comminuntur.

Clara sunt, quæ de Ceraso Plin. habet. Medio genere, inquit, l. 17. c. 24. inter baccas acinosque (fructus sunt) Cerasis. Pomum his primò candidum, vt ferè omnibus bacis. Mox aliis virefcit, vt Oliuis, Lauris: rubet verò Moris, Cerasis, Cornis, deinde nigrescit Moris, Cerasis, Oliuis. Notandum tamen hoc loco non omnibus Cerasis virefcere, sed quibuidam inter eas speciebus tantum. Idem Cerasum inter peregrinas (Italiæ) arbores recenset. Quando autem esse cæperint, dicitur in loco. Eidem, sanguineus succus cerasis, quorum intus lignum, extra caro: cute & succo teguntur. Ramolarum Cerasus etiam in x. l. cubitorum trabes, æquali per totum duum cubitorum crassitudine reperitur.

Athenæus Cerasi historiam potius implicat, quam explicat, quādo in hunc modum ex Theoph. tradit. De cerasis hoc Theoph. in opere de plantis scriptum reliquit. Pecuniare quoque naturam sortita est cerasus, vastæ magnitudinis, vt quæ ad cubitos x. x. v. affurgat: folijs Mespilo (Setaniæ n. Aroniæ Dal.) similibus, duris, crassioribus, cortice Tiliæ simili, flore candido, qualis est Piri & Mespili, ex parvulis floribus composito, qui ceram olet. κενεδρὶς. Apud Athen. κενεδρὶς: R. vell. fauo similis, sicut & nos antè, quam vers. & Scal. & Const. doctissimi viri admittunt. At negat Dal. hoc in flore perspicui, & odoris Cerei reddit, & omnino verum esse dicit. Et admittimus, tantquam ingeniosam interpretationem, nec reiiciamus. Sed an ad mentem hoc sit Theophrasti, valde ambigimus: cui consuetum, non vno loco flores aut fructus fauaceos seu κενεδρὶς dicere, qui in densum agmen & velut in glomerem aut umbellam fauaceo stipatu aggregati sunt. *Pergit Athen.* Fructu rubro figura, Melampyro [Theoph. Diospyro] simili, fabæ magnitudine: At Melampyri [Theoph. Diospyri] nucleus durus est, Cerasi mollis: [Theoph. Diospyri] nucleus mollis est, Cerasi durus. Diospyros autem est Guaiacana, Dal. Rursum idem Theoph. crataegus: aliis crataegum dicitur: (cratigon mendosè, legend. crataigona

Tom. I.

Const.) Folium, inquit, rigidum habet, Mespilo (Aroniæ non Setaniæ. Arbor hæc Sorbus est terminalis offic. & herbario. Dal.) simile, sed maius, latius, oblongius, & in eo scissuras Mespilo dissimiles. Arbor ipsa nec crassa est admodum, nec protera: lignum varium, flauum, firmum: cortex lævis, qualis Mespili, radix quæ vnica est, non altè descendit: fructus rotundus, Oliuæ siluestris [κένουρὸς κόνινος] magnitudine: maturus è flauo nigrescit, succo & sapore Mespili. Quamobrem aggregatis Mespilus esse potius arbor videtur. His scilicet verbis Philoſophum [Theoph.] arbitror, inquit Athenæus, quod nunc appellant Cerasion indicare. (Egregium sanè verò iudiciū in discernendis plantis: sed danda ei venia, vt parum in re herbaria exercitato. Aſclepiades (pergit Athen.) Myrleanus arborem quandam chamæcerasum nominans, ita scribit. In agro Bithyniæ chamæcerasus gignitur cuius radix non est admodum magna, nec ipsa arbor: sed par rosarum arbori &c.

Mox cerasi originem traditurus idem Athen. in Græcos inuehitur sub nomine Laurentij cuiusdam Rhetoris, his verbis: Vos quidem Græci, vobis multa vendicatis, quod ea primū vel à vobis inuenta sint, vel nominata, hoc tamen nescitis, Lucullum, Romanum Imperatorem, qui Mithridatem & Tigranem debellauit, è Cerasurte oppido Ponti, hanc plantam in Italiam primū aduexisse, eundemque nomine ciuitatis illius, fructum hunc Cerasum nuncupasse, quod proditum est à nostris Scriptoribus: (Latinis vix existimamus) *Hæc Athenæus.* Ex quibus apparet dubitasse illum quid esset cerasus apud Theoph. & an eadem quæ crategus, de qua egimus cap. de Sorbo Terminali, lib. histor. nostræ primo. Nec placet nobis à quibuidam in Græco Athen. textu antiquo & versione Lat. mutata quæ dicuntur de nucleo Diospyri & cerasi in contrarium sensum, quandoquidem ipsemet Theoph. ita habeat: aut monendum erat Athenæum habuisse Theoph. cōdicem corruptum, quod tamen diligenter confidendum, priusquam certò assintetur, nec classici Autoris textus tam facile immutandus. Non displicet quidem mutatio lectionis Melampyri in Diospyron, quia ex Theoph. delumpta, resque ipsa se ita habere videtur. Indignum profectò Athenæo iudicarem, post cerasum & crategon à cratere de comaro & Memecylo, & postea iterū de ceraso, quasi congeneres essent plantæ, nisi & alibi apud eundem obseruassemus, eiusdem plantæ historiam, interuentu alterius, & fortè nihil minus quam congenetis, diuulsam, quod in vitro docto & ordinis saltem, si non methodi studioso, nequiquam ferendum. Nos ea quæ de comaro scribit, in medio ferè illorum quæ citauimus, & in viribus citabuntur, relegauimus ad caput de Arbuto. An verò Guaiacana sit Diospyros, videntur Dal. suo loco videndum: Sic itaque de tribus distinctis arboribus vno quasi tractu agit Athen. quarum prima est cerasus Theoph. altera Arbuti: Tertia (dicenda in viribus) est cerasus vulgaris, quam nec distinguit à ceraso Theoph. nec an eadem sit docet. Quod autem de Lucullo tradit, eadem & à Plinio de ceraso vulgari tribuntur

Cerasi porrò & Diosc. meminit, præter vires, nihil habens: & Varro, & Palladius, & Galenique & Diosphyra habet. Verum quid sint Diosphyra apud Gal. considerandum, & diligentius perquirendum. Const. *Diosphyra* Galeni eadem puri

Athen. parum in re herbaria exercitato.

Græci gignunt.

Cerasi virentis non minus erigit.

Athen. nos.

Dal. nos.

Athen. nos.

Diosphyra.

quæ *diopetra* Theoph. de qua suprà mentio facta in descriptione Cerasi. Nec enim aliud tradit vel Theoph. vel Gal. de Diofpyro vel Diofpyro (si modò sint vnum) quàm quòd ille quidem nucleum habere fatetur aperte insinuat, quando cerasa osculum durius habere tradit, hic verò sua Diofpyra, quemad. & corna inter eos fructus recenset, qui exiguum quidem habeant alimentum, sed prastu succi sint omnes. Vt suspicio aliqua sit Diofpyra Vererum ad cerasorum aliquod genus accedere posse: difficile tamen, quid sint, definitè pronuntiare in tanta Auctorum breuitate.

Rob. tamen Const. in Lex. liberè dicit *δ' ἰσπου-  
εῖ* vel *διόσπουεῖ* genus est Cerasi de quo Theophr.

Nostrum  
Cerasum  
esse anti-  
quorum,  
Uaza nat

Hieromolauſ non ſeparat Ceraſum Theoph. à Plinio atque adeo noſtræ : Gazam verò redarguit, quòd apud Theoph. *ſtagnem* lous flammam interpretatus ſit, cum lous triticum interpretari debuiffet, ſi vocis vim exprimere voluiſſet. Sed nec Ruell. diſtinguit inter Theoph. Plin. & noſtram Ceraſum, quemad. nec Tragus.

McPike fol.

At Angui. in epist. Dubitas, inquit, nostra Cerasia sint ea de quibus meminit Theophr. mihi etiam res suspecta est, quia nescio quid velint hac verba: *ἐν ὧν τῶν ἑσπερίων τῶν ἑσπερίων*: quia defecundo Mespilum, dicit habere folia Apia: Postea loquens de flore ait: *ἀπὸ τῶν ἑσπερίων ἀπὸ τῶν ἑσπερίων*: *ἐν ὧν τῶν ἑσπερίων* &c. Has notas nostris Cerasis non respondere, nec in foliis nec in floribus apparet: Alioquin tamen esse iudicium. *Est ille*. De mespilo suo dictu loco, & quid de folioliuim comparatione sentiantem: nempe Setaniam intelligendam, ut & supra dictum. Quam verò de floribus adducit disciplinarem Anguil. est certe aliqua; nondum enim plantæ apertum est, quomodo flos Cerasi nostratis ex multis flosculis congeat sit. Quid sit racemosam intellexisset Theophr. Aut, quid si pro *ἀπὸ τῶν*, legendum sit *ἐν ὧν* ita ut foliola florum, intelligantur. Iudicande docti.

Coniectura  
in Theoph.

Cratæus.

Fuerunt, inquit Goropius qui putarunt cratægū à Theoph. descriptum Cerasuta nostram esse: quàm verè non indico : id interim displicet, quod siluestrem Mespilum videri dicant.

Linguar.  
Synonyma

Cerafus arbor κεράφος Græcis, & κεραυος fructus vt Conf. interpretatur: & in Geopon. κεραυος pro eadem arbore, vt idem explicat. Diosc. περι κεραρια Cerasa, pro fructu, & Cerasia, vt interpretes vertunt, pro eodem. κεραυος κορυμνι vertunt gammi Cerasomum. Had. Iunio Cerafus κεραυος Græcè est. Iudæis, teste Trago, Gudzannioch, ex nomenclatura Elia Leuita. Arab. Cerasæ & Sarasie. Germ. Birsen vel Birschenbaum: de me arboris nomen baum, & habes fructum. Belg. Kerseboom & Creenenboom / Kriechen / Kerfen / Criecken. Ital. Siegie, ceraso Gal. Ceriser, Cerise. Hisp. Castil. Cerezas aut Guindas: Catal. Cieres: Port. Cereiras, aut Gineas. Bohem. Wijnke. Hung. Cerasnyosa.

Gudgan-  
moch. Hebr

Наша.

Diffrétiæ.

Cerasorum multiplex differentia , à sapore, colore, figura , magnitudine, loco, autoribusque seu inuentoribus ipsis.

Apronsana.  
Aethia  
Caciliiana.  
Inliana  
Duracina  
sem Plumina.  
Lusitana.  
Variegata.  
Laurea.  
Macedonica.

Ceraurora, inquit Plin. Aproniana maxime rubent: nigerrima sunt Actia: Cæciliana verò & rotunda. Lufitanis gratus fœdior, sed penè tantum sub arbore sua, adeò teneris, vt gelfatum non tolerent. Principatus Duracinis, quæ Philiatua Campania appellatur: in Belgica verò Lufitanis. In ripis etiam Rheni. Tertius ijs colos è nigro ac rubenti viridique similis maturefcentibus semper. Minus quinquennio cit, quod prodire que vocant Laureæ, non fugat amaritudinis, insita in Lauro.

Sunt & Macedonica parva arboris, raroque tria <sup>Chm</sup>  
cubita excedentis: & minore etiamnum fructu <sup>rahus</sup>  
chamaerasti. Inter prima hoc è pomis colono  
gratiam annuam refert.

Mermol. etiam quardam ad differentias pertinentia tradit, his verbis: sunt & Laurea Cerasa. *Amarafia* dicuntur vulgò, quasi amara Cerasia. Etenim Pomum ipsum non Cerasum vocari Seruius precipit: Cnus & illa quoque verba sunt, Cerasum, inquit, & antequam è Ceraso vrbe Lucullus adueheret, erat in Italia, sed durum, & Cornus appellabatur, quod postea mixto nomine Cornocerasum est vocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, an verò Seruio credendum, qui Cornum in Italia Cerasum fuisse prodit, cum alia res sit Cornus, alia cerasus omnino, satis ambiguum. Cerasiorum porò diftorem alterum quod Romè Vifulum appellanti frequentiffimum in Germania & Gallia

Sed in Scythia ferè supra modum, vbi & Viscina Barbari cognominant, vt Pomponius Lætus, qui ea loca modo inuifit, conftanter affirmat. *Hec ille.* Videntur autem Viscina Barbaris dicta, eadem quæ Germ. *Wecschlen* vocantur.

Ruellius de Ceraforum differentis sic scribit: Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam inediocri arbores interdum pumila, quasi frutice (quam chameceralum dici puto) pendunt: pediculo breui, pomò rotundo, rubente, carne multa, molli, succulosa, ossis intus duro, nucleo dulci. Hoc maximè grato placet acore, moroloque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam maliciis, antequam maturetate expectium: Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias fortiturni appellationes. Quædam Pomò prodeunt proximo ex arbore grandifuscula, longiore petiolo, fructu multo acidiore & subacervo cetera simili: vulgus Meralia nominat. Ea nimio sui acremento respuunt, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, turbinatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candidantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus ossè, nucleo non infatuui. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Ceraforum genere maturitatem fœnit; vulgus nunc *Guinea*, nunc *Guindola* vocat. Sed inter ea habentur castrifera, alba carnea, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo pertinacius herente: ob hoc præarum Veteribus Duracina Cerasia nuncupata. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum vtriusque societatem ineunt. Celerit inarescunt, quæ molliori constant carne. Inveniuntur & alia in filis & cæmemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis parvis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundiore, ossibus appressis, parte Soli obversâ rubefcente, aurescâ candicante, sapore dulci quidem, sed diluitori: ruti familiaria, spontè nullo humano cultu nascientia. Alia nigerrima, quibus succus inest fuliginæus, ea uelentius manus & labra sanguine suo & Mororum modo, inficiunt: utraque Sessiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putantur, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæcilianû conciliû proferentibus.

Germaniæ vſitata Ceraſa Tragus deſcribit : In-  
ter varia, inquiring, genera vel appellationes pri-



nam locum obtinent apud Germanos, quæ punicæ sunt, seu spadiceæ coloris, acidi saporis, *Amarellen* / *Wieschlen* / *Weinstell* isdem appellata. Hæc fortè sunt, quæ nonnulli Macedonica, *Mefasia* & *Gindola* vocant. Acida verò & vulgaria *cerasia* *Emmerling* vnd *Bloderfirschen* Germ. dicta, fortè *Aproniana* appellari poterunt. Nigra, Germ. *Wildvogelfirschen* / *Cerasia Actiana* Latinis nominantur. 4. Quæ iucundissimi sunt saporis, & Germ. *Großbunderfirschen* nominantur, *Iuliana* Lat. dicuntur. Rotunda *cerasa*, *Cessiana* & *Cæciliana*: Dulcia planè; cuiusmodi sunt alba, Ger. *Wistfirschen*. *Duracina* & *Pliniana*, quæ Lauro inrita fuere & amara procul sunt *Laurea*, & *Amarasia* nuncupantur.

Fuchsius aliter distinguit, dicens: Multa *cerasorum* sunt genera: in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maxime rubent, suæque voce illis dicuntur *Amarellen*. Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore qui illis ad nigredinem accedit. Vocantur autem illorum lingua *Wieschfel*. Tertijs generis prædictis minora sunt ac longiora, partimque rubent, partim nigricant, à nonnullis priuatim *Birschen* / vel *Briesen* appellantur. Quæ in utroque genere nigra sunt, ea vescientium manus & labra succo suo, qui sanguineus est Mororum instar inficiunt.

Cordus tradit, austera & maiora; quæ non in magnis arboribus nascuntur, esse ea; quæ è Porto primum in Italiam Lucullus attulit. Quæ verò dulciora sunt & in proceris arboribus nascuntur, sponte sua vbiq; in Germania prouenire. *Duracina* Plinij autore Cornar. etiam hodie durant, suntque ea, quæ ad Rhenum Rinciana, aut etiam *Maguntina* appellantur. Hæc oblonga sunt; & cum albore rubent in perfecta maturitate quæ ipsis circa mediū ferè Maium contingit, & omnino præcocius generis sunt. *Chamaecerasa* vel scribit Alex. Bened. vulgus *Maxicas* ob morbi similitudinem fortè vocauit, aut morbum pomi nōmine: alij *Laurocerasa* vocare maluerunt.

Dod. hæc sunt *cerasorum* differentię. Prima: magna & procera arbor siluestris, cui fructus quidam rubent, alij nigricant, sapore dulces. Præcoces olim vocabat, in hist Gal. *Cerasum Theoph.* & Gallicè *Guignier* & *Guigne*. Altera: *Cerasus* magnis folijs, humilior, hortensis, *ceraso* maiore, carnosiore, dulci, & colore vel rubente; vna tantum parte albidior: vel nigro: vulgò *Hispanicum* cognominatum, fortè *Lusitanicum* Plin. quibus principatum Belgica illius ætate tribuit. Olim Dod. vocabat *chamaecerasum*; Gal. *Grosses Guignes*, *Cerises d'Espagne*. Brab. *Spanische Kirschen*. Tertia: *Cerasus* prioribus humilior ac tenerior: caudices tenuiores: *cerasum* rotundius; carnosius, sapore vinoso, acidulum; quod rarius est. Est autem & in hoc & nonnulla varietas aliarumq; etenim citra insitionem nascuntur aut in alias eiusdem generis insitæ, magna admodum *cerasa* frequenter ex breuib; pediculis dependentia gignant, quæ subinde adeo magna sunt, vt xvi. vel etiam plura suorum officulorum pendeant. Earū verò quæ in siluestre siue priore *cerasum* (quod sæpè fit) inferuntur, *Cerasa* minora sunt, & longioribus habent pediculis. Citius autem maturitatem hæc assequuntur: officula vero istorum minora sunt, quam superiorum. *Amarenas* posterior ætas huius tertiæ *cerasi* fructus nuncupat, vel etiam *Merendas*: Italicorum plerique *Marasche* & *Amerine*: alij *Marchiane* vel *Duracine*. Germ. *A-*

*marellen*: & quæ nigra sunt, *Wieschlen* / *Weinstell* Brab. *Kirschen* alibi; in Belgio etiam *Kirschen*. Ad *Duracina* Plinij videntur referenda *Cæciliana*: Item *Actia* nuncupata. Olim Dod. hæc dicebatur *Diospyros* siue Iouis flamma Theoph. interp. Gaza, Gall. *Griotier* & *Griotes*. Hæc ille, qui nobis obscurè ac intricatè facis de *cerasis* scribere videtur.

Tabern. quinque icones *cerasorum* proponit, cum his titulis. 1. *Bunderfirschen*, *Cerasia* *Pliniana*. 2. *Spanische Birschen*: *Cerasia* *Hisp.* 3. *Amarellen Birschen*: *Cerasia* *acida*. 4. *Wassersfirschen*: *Cerasia* *aquatica*. 5. *Schwartzfirschen*, *Cerasia* *nigra*.

Schauenckf. in *Silesia* prouenientia *cerasa* hæc proponit. 1. *cerasus* *sila*, *cerasa* *Cæciliana* *Plin.* *Amaralia* & *Laurea* *rubra* & *nigra*, *duriuscula*, nonnihil *amaricantia*. 2. *Cerasia* *hort. dulcia*, *rubra* seu *cæciliana*. 3. *cerasa* *nigra*, *Actiana*: 4. *Cerasia* *Hungarica*, *Hispanica*, *Iuliana* *Plin.* *Grosse Ungersche Birschen* / *Spanische Birschen*. 5. *Cerasia* *Italica*, *acidula*, *acidodulcia*; *Pliniana*, *Welsche Kirschen*: *Weisse Kirschen* / *Weinschlechte Kirschen*. Hæc omnium sunt suauissima, quæ in culinis veniunt: rubent. 6. *Cerasia* *austera*, *Amarena*, *Aproniana*, fructu acido *Amarellen*: *Weischel* vulgò. Oportet autem Schauenckf. egregiè cognita habuisse *cerasa* *Plinij*; quod tam categoricè de ijs pronuntiare audeat. Et, quod magis, differentes species ad eiusdè *cæciliana* refert, *siluestris* & *hortensis*, & tam rubra quam nigra, *amaricantiaque*; item *dulcia*. An hæc omnia ex pauculis illis *Plin.* verbis extorquere poterit, vt tam certò ipsi consistere possit, docti videant.

Sed *Matth.* consulamur, qui & *Italia* *Cerasia* & alia quædam celebrat. Inter *cerasa*, inquit principem sibi locum vetidicant; quæ *Hetruscis* vulgò *Marchiane* & *Duracine* vocantur: tamen si horum alia maiora; alia saturato colore rubeant, alia verò potius albicent. Quæ autem *Plinio* *Iuliana*; nobis verò vulgò *Aquantile*, hoc est, aquæ dicuntur, in nullo sanè habentur pretio, quandoquidem adeo sunt tenera & fragilia; vt nisi sub arbore sua comedantur, facile gestatu colliduntur; & marcescant: quin & ob aquæ partis redundantiam insipida sunt, orique ingrata. Quæ autem; quod admodum nigricent, *Corbine* nos vulgò vocamus; *Plinius* verò *Actia* & *Cæciliana*, cum sint *duriuscula* & *dulcia*, gustatu habentur non iniucunda: veruntamen quod manus, dentes ac labra atro colore inficiant, discumbentesque deturpant, mensis raro apponuntur. Sunt & *cerasa*, quæ vno tantum periculo ternas, quaternas, quinasue baccas sustinent: quinetiam quæ racematim vix modo proueniunt, quorum imagines misit ad me *Calzol.* ac quæ peculiatiter in hortis, vineis & viridarijs habentur, viribus & qualitatibus ab alijs *cerasorum* generibus non differunt. In *cerasorum* genere numerantur & illa; quæ Romæ *Visciola*, Senis *Amarine*, & in alijs compluribus *Italia* locis *Marasche* vulgò nuncupantur, à sapore (vt putò) dicta, quod non iniucundi amaroris tantillum respiciant. Horum porro varia notantur genera, quæ etsi omnia sibi acidum asciscant saporem, hæc tamen eius plus, illa verò minus habent. Rura *Tridentina* ca *Marasche* vulgò nominant, quæ minus acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam admodum gratum habetur, quippe quod in ijs acidodulce sit admixtum; ob idque illa palato maxime placeant. Quædam præterea inibi *Marine* & *Mariselle* co-

*Duracina.*  
*Cæciliana.*

*Tabern. dyl.*  
*serenica.*

*Differ.*  
*Schauenck.*  
*Cæciliana.*  
*Amaralia.*  
*Laurea.*  
*Cæcil.*  
*Actian.*  
*Hun. ar.*  
*Hispan.*  
*Iuliana.*

*Amarena.*  
*Aproniana.*

*Schauenck.*  
*feld. nos.*

*Differentia.*  
*Matth.*  
*Italia*  
*cerasa.*

*Marchiane.*  
*duracine.*  
*que*  
*Vasce.*  
*tas.*

*Iuliana.*

*Corbina.*

*Actia.*  
*Cæciliana.*

*Cerasa*  
*Gna*  
*ped. sculo*  
*plura.*

*Cerasa*  
*ra*  
*comosa.*

*Visciola.*  
*Amerine.*  
*Marasche.*

*Maris.*  
*9.*  
*Marisella.*

gnominantur, quæ & minora & rotundiora sunt, & breviori pediculo appensa, gustu nihil ferè prædictis reclamante. Est & horum tertium genus, quæ vulgus illud *Verrulen* nominat, longiore pediculo, bacca etiamnum cæteris crassiore, gustu acerbò, & admodum acido, colore perpetuò rufescente, nec vquam in atrum vergente, etsi cætera, ubi plenè maturuerint, in atrum rubescant. Est etiam *Pumilum* silvestre genus: sunt & silvestria quibus plerumque vescuntur aues.

Lacuna Hispanus *Cerasa* in dulcia, quæ in Castilia propriè *Cerezas* dicuntur, in acida siue austera, & in acidodulcia discriminat: tertij huius generis, sapore, magnitudine & colore innumeras differentias dicens: nec tamen quales eæ sint addit, nec de in Hispania nascentibus *Cerasis* specialius quicquam tradit. Eidem quoque assentiri nequiquam possumus rot acidodulcibus differentias tribuenti. In dulcium enim genere multò plures differentia, quàm in villo reliquorum.

Cæsalp. Philosophicè ac verè Methodicè *Cerasorum* differentias colligit, sic: *Cerasi* differentia, ex col.re: nam quædam in maturitate parum rubent ex candido: quædam magis: alia ex rubro nigricant, tingente succo. Ex sap.re: alia dulcia: alia amaritudinis quid retinent, non tamen ingrata, *Amarena* vocant: alia acidula, *Agriotta* appellat: alia pulpam duriorē habent, *Duracina* vocant: alia teneram & aquosam. Magni diu quoque & paritate differunt, non solum fructus, sed & arbores: nam *Amarena* & *Acidula* breues sunt, pediculo quoque brevī, licet fructus non minor sit cæteris. *Cerasus* Theoph. & c: Plin. videtur per *Laurea* significare nostrā *Amarena*: per *Macedonica* autem ipsa *Acidula*. *Chamæcerasus* incomperita adhuc. Hac ille.

Had. Iunius quoque *Neotericonum* *Cerasa* quædam Plinianis accommodare studet, & eaque nationum synonymis prodit, hac ratione. *Cerasum actium*: *Actium nigellum*. Ger. *Schwarz Birschen*. Belg. *Biercken*. / *Schwarz Birschen*. Gal. *Grinche*. It. *Corbine*. *Cerasum Apronianum* Plin. quod maximè rubet. Ger. *Amarellen*. Belg. *Rooz de Birschen*. Hisp. *Cerasa ambranesa* *Nebriensis*. *Cerasum Duracinum*. Ger. *Spanische Birschen*. Belg. *Spaensche Brieden*. It. *Marchiane*, *duracine* *Hetruscis*. Hisp. *Cereza dura* & *vesta*.

Sed restat vt & nobis obseruatas differentias graphicè depingamus, adiectis etiam differentiarum varietatibus.

### CERASVS SILVESTRE, FRUCTV RUBRO IT NIGRO.

**D**escriptio. *Cerasus* silvestris communiter dicta, vulgare notitia arbor, procera, recta, cortice obducitur exteriore spadiceo aut cinereo, maculoso, læui: interiore virente, sub quo materies firma, subruffa. Folia loti oblonga, Pruni foliis longiora, densè crenata, splendida, subamara. Flores ex eadem quasi vagina plures simul iuncti, pediculis tenuibus sequiuncialibus aut sextantilibus, nonnihil rubentibus, ex foliis quinque candidis, & vt in Piro eaulis, [quid si hæc cavititas sit illa ipsa, causa propter quam Theoph. flores fauaceos dicit? de qua re antea] in quorum medio capillamenta multa alba, apicibus Croceis donata, (quid si rursus per hæc capillamenta minuculos flosculos intelligat, ex quibus florem *Cerasi* coagmentatum dicit?) quibus longior stylus in imo calyce surrigitur, o-

ris in quinque lacinias reflexas, non nihil purpureascentes, diuisis. Ex hoc stylo obleruauimus horulanum ingeniosè prædicere solitum *Cerasorum* futuram penuriam: sub eo enim



latet fructus rudimentum, quod frigore affectum tacitè nigrescit, remanentibus nihilominus aliquandiu integris, nullaque iniuria tactis florum foliolis. Fructus succedit rotundus, unciali amplitudine inferior, dulcis, magnitudine & colore diuersus, in quo officulum, orbiculatum, læue, durum, dentibus tamen fragile, nucleum continens album, exacurum, amari-

cantem, flavescente tunica contextum. Gummi

stillar, flauum, rufum, & densum.

Ex hoc potiss. genere meliora nostri torrent, & Elethuar. conficiunt, pro puerorum cibo ac condimento: Hæc, quàm syluestrem dicimus, quadruplici varietate potissimum differentes fructus gignit: Rubrum & nigrum; & vtramque vel maiorem & carnosiorē, vel minorem & inactiorem. Maior tam ruber quàm niger dulcior est cæteris, cultu talis, vt equidem censemus, effectus. Minor, nullius vquam cultus gnarus, tam ruber quàm niger, plerumque amaricat, sed cætenus, vt præualeat dulcedine haud sit ingratus. Sunt tamen quidam horum qui in umbris proueniunt, vix vilo vquam Sole illuminatis, quorum fructus haud cuiusvis palatui sapiat. In qua quidem latitudine à perfectè dulci & carnosò, ad amaricantem & macilentum, plurimas inuenias varietates.

Monspeli rubra parua obseruauimus & alibi: sed præcipua dulcedine grata. Amaricantia, tam rubra, quàm nigra, passim circa Basileam proueniunt in Dumeris, siluis & montosis. Obseruantur etiam huius generis diuersæ varietates in valle Petrina Episcopatus Argent. Circa acidos fontes, & alibi locorum. Tam macra, quàm carnosà rubra, vulgò siluestria. Rote wilde Birschen appellantur. Nigra quoque vtriusque varietatis, Schwarzge wilde Birschen.

In hoc genere etiam *Cerasa alba*, parua dulcior in Allatia alibique obseruauimus, & in hortum Montb. E.C. seuius. Sed ex prædictis præcipua gratia videtur esse cuidam generi, cuius fructus, magnus, ac rotundus, caro satis firma, exteriùs partim albidus, partim rubens, sapore dulci quales in prædicto horto, & aliis quibusdam lautiorebus Germaniæ hortis coluntur.

Hæc videntur esse Trago Ganz süßen Birschen / Als die weißen: dulcissima sicut alba, *Daraina* & *Pliniana*. An Ruell. Guinea nunc Gundola: Tabern. *Cerasa* *Pliniana*, *Bundtirschen*. Videas & in prædictis, ipsa etiam officula, magnitudine & figura variare.



## CERASA DVRA CENA OBLONGA.



**S**peciosus hic Cerasorū fructus, magnus est, oblongus, ad cordis figuram aliquatnus accedens, carne dura, solidaque, dulci, coloris ex albo rubelli, nucleo magno. Eiusmodi Lugduni observamus Maii principio. Prius etiam videramus in Valle Thelina Rhatum, matura lunio. Item Monspelii. Sed rara ibi. Sata quoque in horto.

Hæc videntur à sequentibus auroribus sic vocari. Cerasa Hetrulcis, vulgò *Marchane* & *Duracine*, Matth. Cerasa Duracena, & Vngarica dura, Gesn. Cerasa Duracina, Ruell. Cerasa Hispanica, Spanische Hirschen Lob. & Tab. *Duracine* Lugdunensis.

## CERASA ACIDA RUBELLA.

**E**X maioribus Cerasis sunt, quæ acida, rubro colore dilutiore, carne haud admodum data vel compacta. His sapor valde gratus, præsertim probè maturis, non nimium acidus, sed quodammodo vinosus; quamvis alia aliis & in hoc genere acidiora, quod cultui dicandum iudicamus. Fructus brevis pendet pediculo, & quam reliquorum ferè, crassiore. Arbores ipsæ haud proceræ, nec rectæ, nec in multos ramos brachiatæ, vt dulci, sed humiliores multò, quorum & minimæ; atque adeò paucorum annorum; fructum ferè consueverunt. Ramuli etiam non tenues sunt & flexiles, vt in acidis nigricantibus. Ipsa quoque folia rotundiora videntur, quod Lobel. insinuassee videtur, quando satius rotundiora scribit silvestribus. Gumi ex se fundit lucidum, aurei penè coloris. Huic radix rependo latè se diffundit, areasque & vicina loca suis stipat stolonibus; qui transplantati & culti in arbores excreverunt. Lignum quoque & rami multò fragiliores minusque flexuosi, quam cæterorum: proinde periculolum, si has arbores cõscendere.

Fortè hæc sunt Macedonica Plinij, nisi quis malit eiusdem Chamæcerasum dicere, quamvis prior sententia magis ardeat. Audiamus Herbarios.

Cerasa aultera & maiora è Ponto ptimum in Italiam à Lucullo translata, Cordo. Chamæcerasus, quæ Francis tantum Cerasij nomen metuit, Ruellio. Cerasorum i. genus *Amarellen* Fuchf. *Emmerling* & *Bloderfusen*, possent esse Aproniana Trago. Cerasa acida, rubentia, dilutiora, Amarella dicta vulgò Gesn. qui iudicat esse Plinij cerasa Macedonica parvæ arboris, quas idèò & Nanas ac pumilas dicere possis.

Videtur autè Gesn. per Chamæcerasum eandem intelligere cum Ruell. quæ vt plurimum valde parva & humilis remanet, & quodammodo fruti-

Tom. I.

cat. Idem Gesn. eandem putat, quam apud Milinicos *Z. rga* colunt: nos verò illam, de qua mox, vt ex Cordo tolligi posse videbat. Cerasa furi Tridentino *Marache* dicta, minus acido gustu: quorum genus quoddam acidodulce. Quedam preterea inibi *Marme* & *Marinelle*, minora & rotundiora, Matth. Cerasa acida rubra, modò nigra, *Griocier*: fructus *Griotes*; à Theoph. *Sisomess*, Dod. in hist. Gall. Nobis tamen videntur duo genera Obsunderet neque enim descriptæ differentia vllum vquam nigrum fructum cognovimus, nec apud quenquam autorem legimus. De nigris postea dicetur. Idè in hist. Lat. De his, inquit, sub Cerasi 3. specie fructu rubente: Amarene tertie, Cerasi fructus, Italorum plerique *Marsibe* & *Amerine*: alij *Marchiane* vel *Duracine* Germ. *Amarellen* *weiche firschen* & *weichelfirschen* Lonicer. quo tamè nomine alibi nigra acida designant. Cerasa acidula, *Aigrettes* dicta; Pen. & Lob. Macedonica Cerasus Clus. Basilienses & Alati plerique *zame firschen* quasi dicas, domestica aut cicurata cerasa, vocat. Lugdunenses *Des griottes*. Montbelgardii *Cerises Prudes*, *Emmere* Tigur. autore Gesnero.

Macedonica cerasus, teste Clusio, Abundat passim in hortis. Per Paninoniam & Austriam in agrorum & vinetorum marginibus frequentissima, raro ad trium cubitorum altitudinem accedit, nihil in reliquo à vulgari, quæ acerbum & robur fert fructum, differens. Basileæ & in Alsatia alijsque multis locis abundè suppetunt. Vidimus hoc genus etiam Monspelii, sed mactius ferè & acidius, quam in his locis.

Matura sunt post dulcia; Vidimus aliquando ex folis fieri Vinum, & pulcem, quæ tamen non diu servatur. Exiccantur etiam ad usum hyemalium pro otis.

Condiuntur etiam melle vel saccharo integra, præsertim Lugd. Genevæ, etiamque à nostris, ad agrotactum, præsertim febricitantium, sitim admodum expectata.

## CERASA ACIDA NIGRICANTIA,

SOLIDIORA, TARDIVS MATV-  
RESCENTIA.

**I**nter lautiora quidam hoc Cerasi genus habent, cum ob vinosum saporem, rum ob carnis soliditatem, vt equidem censemus. Non est his ea arborum altitudo quæ silvestribus Cerasis. Ab arboribus acidorum multum quoque differunt. Non enim solent in magnos ramos diuidi & extrèdi, sed ramulis tenuioribus, quam cæteræ omnes

donatæ sunt, pendèntibus ferè, & ad Betulam quodammodo accedentibus. Fractus ex longiusculo, pediculo magni nigri aut ex nigro spadiceo, suo suo-

Farietas.

Diospyros.

Dod. nor.

Locus.

Tempus  
Vinum  
pul.

Descriptio.

Vt differat  
à cæteris.

Fructus.

T 3

eo inficientes, carne firmiore, acidâ valde, multum altringente.

Hic fructus, antequam ad perfectam maturitatem perueniat, quatuor fere colores distinctos ostendit: primò viridis est: mox rubet, quo in statu acerbus valdè & amarus est: tertio atropurpureus fit in spadiceum: & tandem ex spadiceo pleniùs nigricat, præsertim probè maturus. Is enim color maturitatis nota perhibetur. Ossiculum continet quale cæterorum, atque adeò durius esse videtur, nucleum continens minùs amaricantem. Radices arboris reptantes sunt, & ex se stolones ac prolem, vt acidâ rubræ, emittunt.

Ossiculum.

Radix.

Synonyma.  
Macedonica.  
Vitisula.

Amarena  
nigra.  
Merassa.

Lobus.

Vitis.  
Vinum Cerasinum.

Parandis  
ratio.  
optima.

Varietas  
arboris hu-  
ius fructus.

Fortè sunt Macedonica, Merassa & Guindola, *Merassa*, *Amarellen* / *Wiesfles*, & *Weinstell* Germ. Trago. Cerasa acidâ nigricantia solidiora, quæ *Vitisula* dicunt, Gesn. Cerasi 3. species fructu nigricante, *Amarena nigra*, quæ nigra sunt, *Wiesfles*, *Weinstell* Germ. Brab. *Wiesfles*: Gall. *Griotes*, Dod. Cerasa vulgò *Merassa* Ruell. Cerasor. 2. genus, Fuchf. Cerasa vulgò *Verule* Matth. An lul. Scalg. cerasum grandissimum, adeò serum vt penè cum vva maturefcat. Merasum vocant illud seriùs maturefcent cerasum, austero fructu, nigro: *Vngar. me ysa*. Clus.

Basilæ & alijs German. locis in hortis colitur haud insolens: colimus & in horto Montb. copiose, alioqui eo loco non vulgata sunt. Commodè excitantur pro siticulosis & brientibus: Pulpam etiam excoquant Basilienfes. Parant ex ijs contusis cum ipsis adeò nucleis, & mixtis cum bono vino, id vini genus, quod tempore caniculæ in delicijs habent, nomine *Wiesfleswein*. Nos etiam sapiculè parari iubemus hac ratione. Ex cerasis contusis vnâ cum nucleis succum manibus tantum exprellum vino admiscent, materiam in massas pomi magnitudine coactas in furno torrent, & demum in oblongo sacculo linteo per dolios immittunt, sed modicè refrigeratam. Sapidissimum fit, & nescio quid aromanci ex nucleis contusis atque rostis præ se ferens: siticulosis potatoribus æquè ad luxuriam quàm sitim commodissimum.

Porro huius arboris fructus pulchellam varietatem obleruauimus: quippe prædictis maiora sunt, sed pediculo breviori, minùs altringentia. in horto. Ill. C. VVirtemb.

### CERASVS PVMILA.

Descriptio.

Folia.



**P**umila Cerasus meritò vocetur, fruticulus cubitalis vel bicubitalis, aut certè non multò altior, cortice coloris ex spadiceo cineracei, ramosus. Folia Cerasi, sed multò minora, paulò semuncia latiora, vnciam longa, per ambitum crenata, mucrone obtusiore, plura ex eadem gemma prodeunt: parique pa-

cto ex eodem puncto longis pediculis hærentes flores plures, candidi, Cerasorum, minores. Fructus itidem illis similes, sed multò minores, austeri.

Clus. sic describit. Variæ altitudinis inuenitur *Chamæcerasi* frutex: nam interdum in cubitalem, bicubitalem, aut ampliore magnitudinem attollitur, vmbrosis videlicet locis & tenui solo: siccioribus autem locis, & iuxta semitas plerumque supra pedalem altitudinem non assurgit. Tenuis & lentos habet ramulos seu virgas nigricante ex cinereo cortice obductas, quæ ex interuallis quædam tubercula & veluti gemmas profert, vnde tanquam ex *cachrye*, aliquot exigua foliola Myrti Tarcentinæ folijs aquauiha prodeunt, simulque flores bini, terni, quaterni aut plures sese explicant, candidi, quinque foliolis constantes, multis in medio staminibus præditi, Cerasi vulgaris floribus persimiles, minores tamen: infra hos flores, atque etiam in extremis virgibus, ex alijs tuberculis exeunt sine floribus folia superioribus maiora, Cerasi vulgaris acerbo fructu foliorum formam imitantia, & in ambitu similiter crenata, longè tamen minora, & atra viriditate splendentia, subamarè gustus. His succedit exiguus fructus, rotundus, carnosus, maturitate ruber, exiccantis minusque grati saporis, quàm sint acidâ cerasa, osseo intus nucleo. Radix crassa, longa, duraspaucis fibris prædita, profundum petens, & quæ difficulter cui polsit.

Proueniunt, autore Cordo, spontè Saxoniarum variis locis non longè ab Hala, paruz, & binos cubitos raro excedentes cerasi, fructu mediocri magnitudinis, quas non sine causa *Chamæcerasos* illestrès appellare possumus. Et Matth. Cerasorum silu. pumilunquæ genus, inquit, nulla adhibita cultura Ananienibus & Tridentino agro ac etiam in Bohemia circa Pragam & in Austria circa Viennam secus itinera & prope sepes spontè prouenit, nihil prorsus tū colore tū etiam sapore ab illis diuisens, quæ inibi *Verule* vulgò uocantur. Hæc breui pediculo pendent in arboribus admodum pumilis, tantæque breuitatis, vt ræz, vel potius nullæ dodrantalem æquent mensuram. Quo factum est, vt crediderim (etsi id pro comperto asserere non auiam) hæc eadem esse, quæ Plinio Macedonica dicuntur. Cæterum ego horum plantam *chamæcerasum* potius vocauerim. Bacca cum cæteris austeriores habeantur, etiam cæteris sicciores iure fuerint, magisque altringentes.

Græcis *Χαμαίκερος*: It. *Ceregio nana*: Ciregie *saluatiche*. Ger. *wilde Kirschen*.

Eiusdem cum Cerasi generis (ait Lob.) *Chamæcerasus* in hortis Belgicis densè fruticosa: omnia Cerasi similia habet, sed quadruplo minora: fructus austerus est.

*Chamæcerasus* Plin. Clus. *Vngaris Vadmegy* id est, silu. Merisus. Clusij figura non respondet descriptioni: dicit enim folia serrata, qualia etiam erant pingenda, etiamque in nostra, quam ex Lob. damus, amanuensis culpa, cum potuissimus meliorem dare, ex ipsâ planta. *Chamæcerasus* Dod. Taber. *Schuenckf.* cui etiam *cerasus humilis*. Ger. *Erdbweichel*: *Wilde Kirschen* Tab. qui nihil præter iconem habet & nomen. Gal. dici possit *Cerister nain*.

Apud Gallos autore Clus. spontè non nascitur, sed passim in Pannonia, Austria inferiore, & Moravia, editioribus siccisque locis: ad vineorum etiam in collibus sitorum margines, & iuxta puplicas vias. In Bohemia videre non meminit. Habetur



bentur & in horto Stuckardiano E.C. Wirt. acidif-  
similaporis, ut ait D. Schvartz, quæ principio  
Iunij nondum erant matura. Eadem vidimus in  
horto Seb. Volmarij Esslingæ. Stugardiâ transla-  
ta in hortum Montb. D. Hochstetter Pfeitzhe-  
mia ostendit in horto. Accepimus pulchellos ra-

mos à doctiss. Medico & Botanico D. Agerio,  
Argentinenfi, nomine Chamæcerasî Pannon.  
Cluij.

Floret Aprili cum primò. n. folia germinare in-  
cipiunt. Fructus Iunio, interdum etiam Iulio de-  
mum maturat.

## CERASVS FLORE PLENO.



P Vichra cerasorum species est, si vel flores tan-  
tùm spectes, qui rosarum aut Balaustiorum  
modo pleni sunt, quales aliquando Lugduni vi-  
dimus. Ajunt minùs fecundam esse cæteris. Et  
ratio in promptu. Magna enim vis absumitur in  
flores. Considerandum an etiam fructus & arbor  
ipsa à cæteris differant. Multi quidem depingunt,  
sed nemo hactenus, quod sciamus, describit. 1. Ce-  
rasa sine foliis. 2. Cerasus vulgaris duplici fl. ror. Ce-  
rasa ultra species matur, pauciores fructus edēs. Belgi  
Crickboome pondern bladern/Droech bloyende...

Gemeine Crickboome/mett Dobbel bloemen. ;  
Crickboome met groote ende ;cerdobbel luttel  
Druckten Doortbrengfen. Figuras, uti dictum,  
proponunt floribus plenis & appictis etiã fructi-  
bus, sine descriptione. Cerasus præcox, Rurschen.  
2. Cerasus multiflora, Rurschen. 3. Cerasus ; multi-  
flora secunda Rurschen. Tabern. Sed bonus hic vit  
non docet discrimen harum differentiarum : ico-  
nes ad imitationem Lobelianarum factæ : omni-  
bus appicti flores pleni, additque fructus.

Lob. n. 1.

Tabern. n. 1.

## CERASVS VNO PEDICVLO | CERASVS RACEMOSA.

PLVRA FERENS.



I N verè regio & instructiss. no Descriptis.  
ill. Ducis Wirtemb. horto Stuc-  
gardiano dux coluntur Cerasæ  
species, rubra scilicet & nigra : quæ  
modò duos, modò tres, sæpè etiam  
quatuor aut quinque vno pedicu-  
lo proferunt fructus, & ante ipsos,  
flores vulgaris similes. Surculos  
in hortum Môtbelg. inferèdos cu-  
rauimus, & iam tractum ferunt  
nigrum. Ferunt Vintoduri Tiguri-  
norum provenire, esui iucunda.

De his & de racemosis sic  
Matth. Cerasa racemosa He-  
trufcis. Ceregia grappel se : care-  
ris verò Italis Ceregia del Grappo  
sunt Cerasa, quibus vno tantùm  
pediculo, ternæ quaternæ bac-  
tæ continentur : quibusdam etiam  
racematis in vno modum proue-  
niunt. Habentur peculiarietè in

Lob.

**Locus.** hortis, vineis ac viridarijs Italiae. Qualitatibus & viribus non differunt à ceteris generibus Cerasotum.

**Synonyma.** De ipsdē Lob. In viretis quibusdam Belgij visitur cerasus, vno pediculo plurā cerasa gerens: *Griechen viele an ein stielchen*. Cerasi species, cuius iconem Matth. exhibet, cerasa complurima racematim coherentia ferens, quam idcirco racemosam vocant.

**Icon.** Dod. Hist. Lugd. quoque vrtamque habet; prædictis nominibus. Icon cerasi vno pediculo plurā cerasa proferentis ex ipsa planta parata est. At ea quam pro ceraso racemosā exhibemus, nobis absentibus fuit desumpta ex Lob. qui proposuit pro ceraso autum racemosā: verū nobis minū placet pro ea. Quandoquidem iam sculpta erat ne otiosa maneat, locum cerasi racemosi Matth. tantisper occupet, donec aliquando succedat melior. Germ. *Viel Birschen an einem stiel*, cerasia vno pediculo plurā. Item: *Ror Fögelfirschen*: Cerasia racemosā rubra secunda Taber. qui duas habet icones; sed more suo sine descriptionibus. Germ. nomen cerasi autum facit, vt ignoremus quam intelligat Taber. Autum cerasum racemosam rubram non vidimus, nec de ea quicquam audiuius. Si colore tantum fructus differt à nigra, de qua postea, proprio capite, non erat opus iconē. *Hactenus de differentiis cerasorum.*

**Cerasorum Locus & Tempus in genere.** Cerasus, autore Plinio, Septentrione frigidissimaque gaudet, itemque aquosis montibus. Cerasi eodem tradente ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuisse in Italia. Ab vrbis anno DCLXXX. is primū vexit à Ponto: annisque CXX. trans Oceanum in Britanniam vsque peruenire. Eadem, vt diximus peregrina, in Ægypto nulla cura potuere gigni. Dixerat, quidem antea cerasos, vt & Persicos peregrinos, sed nusquam Ægypti solum dedignatas, præterquam hoc loco. Mirum tamen non est, in tam æstuosa regione, siquidem frigido gaudeant cælo. Porro Virg. ætate, & sine dubio ante eam, cerasi frequentes fuerant in Italia, vt patet ex his eius versibus, Geor. l. 2.

*Pullular ab radice aliis densissima silua:*

*Vt Cerasi, vltimique: Eriam Parnassia Laurus.*

Intelligit autem stiones, quos à radice expansa emittunt. Plinio quoque de loco ad stipulatur Palladius, sic scribens: Cerasus amat coeli statum frigidum, solum verò positionis humectat. In tepidis regionibus parua provenit, Calidum non potest sustinere. Montana vel in collibus constituta regione latatur. In Gallia, vt scribit Ruell. adeo frequens est; vt etiam silux ea scateant, sed omnino exilior humiliorque, quam Pliniana illa. Iam supra diximus ex Athen. à Cerasunte Pontico municipio, primū arborem hanc in Italiam translata, fructumque gentilitio nomine *Cerasium* appellasse. At hodie tam in Italia quam Gallia & Germania adeo frequens vbique locorum hæc arbor, nulloque negotio provenit, vt etiam silux nonnulla ea scateant, vt dictum. Nullaque arbor est, vel Matth. teste in Italia hodie, quæ vulgò notior sit. Est & frequens in omnibus hortis sed ex species, quæ magnos ferunt fructus *Guignes*, & *Grixters* dictæ cerasi, in hortis tantum plantantur. Cerasus autem ferens paruas *Grixtes* Dodonæo, quam nos siluestris generis fecimus, vt plurimum provenit iuxta agrorum & vitarum limites, itemque in siluis.

Lusitania, inquit Amatus, vt placet Plinio, bona fert cerasa: sed quod equidem meminim, nusquam meliora habentur cerasa quam Lug-

duni. Porro acida siue acria cerasa apud Salamanticam Hispaniarum gustui gratissima repetiuntur. Quod de Lugdunensibus tradit Amatus, nobis non improbat: sapidissima enim & ipsi eius loci Cerasa deprehendimus, fortè ob loci temperiem, ægrique bonitatem, & quæ non minima fortè bonitatis causa, ob diligentem cultum. Baillienfes quoque multa genera habent, & certè bona. Genere etiam vulgaria aliquot genera. In horto E.C. Monb. variā cerasorum genera colimus è varijs locis conquisita: nec de iunt nobis insitæ etiam.

Florent in Germania omnes Aprili: non dubium in Italia & calidioribus, vt aliæ pleræque arbores, citius florere. Fructus maturant Iunio & Iulio, pro specierum varietate. Maio optima comedimus Romæ: estque omnino hic fructus qui inter primos è Pomis colono gratiam annuam refert: Montpelij Martio florentem observauimus, fructus maturos Maio, qui ex vicinis montibus tamen adferebantur, alioqui circa urbem non abundant.

Facilis est cultura & plantatio cerasorum. Seruntur enim nucleis seu pomis, & inferuntur surculis. Seritur autem Malorum & Pirorum more. Infructione tamen potissimum lætatur, nec vnum bonum dulceque dabit fructum, nisi prius insita, ut Florentinus cum Theod. Dorst. tradit. At nos contra sæpius in syluis optima Cerasa dulcissima comedimus.

Cerasi plantam siluestris transferre debemus mense Octori vel Nouembri, & eam primò Ianuario, cum comprehendit, inferere, vt iudet Palladius Varro quoque brumalibus diebus Cerasum inferere præcipit. Platana, inquit, creari possunt, si prædictis menibus spargantur poma, quæ summa facilitate nascuntur. Ego huius arboris facilitatem probavi, vt virgulta ex Ceraso pro adminiculis per vineam posita in arborem profilisse confirmem. Et Ianuar. mense feri potest. Inferitur mense Nouemb. melius. Vel, si necesse sit, extreme Ian. Alij & Octobri inferendas esse dixerunt.

Martialis in trunco inferi iubet. Palladio inter corticem & lignum feliciter semper euenit: facilius namque coalescit. Qui in trunco conferunt, sicut Martialis dicit, omnem lanuginem, quæ circa est, auferre debent: quæ si remanserit, insitis nocere manifestat: nam si comprehendit insitum, putrefacit: quare emuscari & potius auferri debet, priusquam trunco conferantur surculi. In cerasis hoc seruandum est, & in omnibus gummatiss, vt tunc inferantur, quando his vel non est, vel definit gummi exfluere.

Cerasus inferitur in se, in pruno, in platano, vt alij, in populo. Sed nec Persici, nec Terebinthi respere hospitium quidam tradunt, nec contra cerasi Terebinthum & Persicum. Plinius & Lauro insitam dixit. De cuius insitione pereleganter sic canit Palladius.

*Inferitur Lauro cerasus, parique casto*

*Tingit adspicius virginis ora pudor.*

*Vibrantes Platanos, & iniquam robore Prunum*

*Compellit gemmis pingere membra suis.*

*Populeasque nouo distinguunt munere frondes.*

*Sic blandus spargit brachia cana rubor,*

Si quis [vt Flor. tradit] ceraso nigram vitem inferat, Vere feret vvas. Amat cerasus scrobes altas, spatia largiora, assiduas fossiones. Putari in ea patria & licca debent, vel quæ densius arctata protulerit, vt rareseat. Fimum non amat, atque inde degenerat. Contra proficit, si sui ipsius putamina



ramina falce concisa, circum tadicēs fepeliantur, ibique marcescant. Cerasos præcozes facit, cogitque maturefcere calx adnota: vel sæpius affusa aqua calida aut lixiuio, sed poma interuelli melius est, vt quæ relicta sunt, grandescant: autor Palladius.

Cerasa sine ossibus enasci Martialis rei rusticæ prudens promittit, si teneram arborem ad binos pedes rescissam, vique ad radicem findas, abraque ferro partis vtriusque medullâ, statim subiunctas partes vinculo perstringas, & summâ partem & diuisuras laterum oblinas fimo. Post annum ducta cicatrice diuortia coalescant. Hanc arborem furculus qui fructum adhuc non tulerunt, inseris, & sine ossibus poma (vt asserit) nascuntur.

Cardanus in opere suo de rerum varietate cerasa sine nucleis nasci generali ratione posse, statuit: postea, postquam priore Martialis modum proposuisset, addit: cum nunquam hunc fructum viderim existimo aut vix viuere posse, tot vulneribus acceptis, aut non in Italia.

Si cerasus concepto humore purificet, in trunco foramen excauetur, quo possit sanies educi.

Si formicas patitur, succum Portulacæ debebis infundere, cum aceti media parte penitus, vel vini facibus truncum arboris florentis adlinere.

Si aestu canicularum fatigatur, trium fontium singulos sextarios post solis occasum radicibus arboris iubeamus infundere, sic, ne remedium Luna deprehendat: vel Herbam symphoniacam circa arboris truncum torquebimus in coronam, vel ex ea iuxta imum codicem cubile faciemus: ex Pal-lad.

Cerasa dulcia toto anno seruare vix possis: Gene-uz tamen seruari testatur Cardanus.

Plinii tempore condebantur, vt Oliuæ, cadis. Ratio hæc à Florentino rei rusticæ autore sic docetur. Cerasia ante Solis exitum arbore sua decerpta, in vas substratâ in fundo saturatâ concijuntur: dein cerasia superponantur, iterumque alternis satueia: addicitur nonnihil acidi mellis aliquantum dulcescentis. Seruantur itidem interiectis Arundinum folijs, & in eundem modum alternatim dispositis in cado. Nostri hanc operam impendere nolunt, sed in feruenti Sole ad rugas siccata, diutissime seruant: item molliusculo turpi calore passa. Alioqui & in sapam densam excoquant in annuos vsus.

Cerasa in genere frigida & humida putantur. Ea tradente Diosc. bonam quidem aluum præstât, si recentia sumantur: at siccata, aluum sistunt. Gummi verò cerasorum cum vino dilato sumptum diuturnæ tussi medetur: colorem quoque commēdat: visum exacuat & appetentiam inuitat. Ex vino etiam porum calculosis prodest. Plinio quoque autore, cerasa aluum molliunt, sed stomacho inutilia. Eadem siccata aluum sistunt, vrinam ciunt. Inuenio (inquit ille) apud autores, si quis matutino rosida cum suis nucleis deuoret, in tantum leuari aluere, vt pedes morbo liberentur. Porro Galen. Paulus, ceterique Græci Medicinæ principes rectius & distinctius à saporum differentijs de cerasorum facultatibus videntur tradidisse. Quoniam enim triplici ferè quoad saporum differentia spectantur; nempe dulci, acerbis, & acido: dulcia statuant magis aluum soluere, & stomacho minis esse grata: acerbis & contra sistere aluum, stomachoque vtiliora esse: acida denique ob eam quam habent incendi vim, pituitoso excrementisque repleto ventriculo apprimè conuenire.

Sed interest, Galenum ipsum audiri, quem

sciinus accuratè rerum medicinalium vires æstimasse. Cerasus, scribit ille, arbor fructum fert non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & harum, sicut etiam Malorum Granatorum, & Malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam verò dulcis, non nullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium, ea quæ nondum cocta sunt ac maturata, quædam admodum sunt acerbis, quædam similiter Moris acida: sed in Moris immaturis acida qualitas acerbiam exuperat, in cerasijs non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minis grata stomacho sunt. Contrà austera & quæcunque acida pituitosis excrementosisque stomachis sunt apta: siquidem austera magis desiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis & mordacitatis expertibus medicaminibus facultatem obtrinet, quæ & ad artetias exasperatas accommodata est. Proprie autem, si quidem, quod quidam subscribunt, verum est, calculo vexatos adiuvat. (add. cum vino bibiturum.) Nam sic illi tenuium partium inest facultas quædam. Item alibi: Ex cerasis quædam sunt, quæ Moris sunt similia, cuius modi sunt ea quæ minimam habent adstrictionem: alia Ruborum fructuj, vt ea quæ euidentiùs astringunt: quædam autem sunt, quæ vel valentiùs ijs adstringant. Proinde memoratæ cuiusque speciei facultatem, ex ijs, quæ de Moris & Rubi fructibus diximus, potes colligere.

Galeno subscribit Paulus. At Simphon Seth. paucissimis rem complexus: Cerasia, inquit, frigida sunt & humida, mali que succi, ventrem subducunt, stomacho parum idonea, humidum ventriculum lædunt, præsertim cum maturata non sunt: sed calidis & siccis ventriculis & temperaturis profuant. Gummi autem arboris cum vino sumptum calculosos sanat.

Cello quoque refrigerant cerasa, aluum mouent, stomachoque idonea sunt.

Atheni referit, virum quendam illustrem Diphilum Siphniū nomine, qui sub Lysimacho rege (vno ex Alexandri successores) vixit, multis annis Lucullo antiquiorem, (quem supra ex Plin. diximus cerasa primum in Italiam importasse) Cerasorum meminisse his verbis: Cerasa stomacho grata sunt (*ἐσχατα*) parua nutriunt; bonum succum gignunt. Cum frigida sumuntur, placent ventriculo: præferuntur ceteris Melleis, & quæ magis rubent, quoniam mouent lotium.

Ita vides non inter se conuenire autores de cerasorum vi stomachica; alijs eadem (*ἐσχατα*), alijs (*χαροβατα*) facientibus. Sed facile litem compones si, vt supra fecimus, ex sapore distingues. Quid si & sic controuersiam tollamus? Cerasa quæ verè talia minis conuenire stomacho: eò quoddam dulcia sunt. At acida & austera; (vt supra alicubi monitum) ne cerasa quidem verè dici. Quidam versibus haud inconcinne eorum vires comprehendunt; vt noster ille Virgilius Germanus.

Eob. Hestus.

Noxia sunt stomacho Cerasi prædulcia poma;

Ingerat hæc eadem si quis acerbis, inuuant.

Illam mouent, hæc astringunt communiter aluum.

Vis vnas eadem rubraque Mora tenet.

Fiera:

Iam dedit è Ponto nobis eria Poma Lucullus

Vix repida & cursus, dulcia, sunt subiri.

Dulciacida, ignito, sibiunt, aprissima ventri,

Condit adusta vraz Acria Sole Coquunt:

Dulcia.  
Austera.  
Acida.

Gummi.  
Arteria af-  
ferta.

Calculosi

Temper.

Calidis præ-  
funt.

Parum nu-  
triuunt.

Melleia Ce-  
rasa.

Mouent

lotium.

An Cerasa

stomacho

grata.

Dulciacida

*Appetuum  
faciunt.*

*Hic alius fluida arceatur, famis improbus ardor  
Crescit &c.*

Schola Salernitana.

*Si Cerasum comedas, tibi confert grandia dona*

*Calculus*

*Expurgat stomachum, nucleis lapidem tibi tollit.  
Hinc melior toto corpore sanguis inest.*

*Succus Nu-  
cleorum  
Cerasi.  
Lac. ceraso-  
rum.*

*Cerasi pin-  
guiscent  
passeres.*

*Cerasorum.  
discrimen  
Scribitur ac-  
commodatū.  
dulcia ge-  
nerat & er-  
mis  
Pontica.  
Cina.  
Cina nigra*

*Obstru-  
hepat.  
Fleua bilis.  
Lichenes.*

*Condica.  
Aqua destil-  
lata.  
Ad ap-  
pium.*

*Fit biliosa.  
fuss.  
Oris insua-  
uitas  
Appetitus.*

*Vinum Ce-  
rasorum.  
Siluestria.*

*Oleum nu-  
cleis.  
Macula  
Arthritis.  
Calculus.  
Aqua Ce-  
rasorum.*

Nec reiicienda interpretatio Arnoldi. Tria inquit, his versibus enarrantur comoda ex esu Cerasorum. Primum, expurgare stomachum: quod quibusdam verum videtur, si nucleis vna contendantur, hoc enim modo abstergunt & emundant. Secundum est, nucleum cerasorum peculiarj proprietate frangere lapidem seu calculum in Vesica, si succus eius fumatur; vel lac inde fiat. Tertium est, carnem cerasorum optimum generare sanguinem, confortare & impinguare. Et hoc experientia comprobatur. Videmus enim passeres qui plurimum cerasi delectantur, eo tempore quo cerasa matura sunt, longè maiora habere hepara, quam alias. Vnde colligitur cerasa hepar augere & confortare.

Hic notandum duplicia esse cerasa, crassa scilicet & parua. Cerasa rursus duplicia, dulcia & Pontica. Dulcia omnia & parua, inlubria sunt, facile corrumpuntur in corporibus, Vermes generantia. Crassa Pontica, Cina vocata, & ipsa dulcia inueniuntur. Quaedam enim rubra sunt & mollis carnis, quæ recentia sunt edenda in principio mensæ: Vm habent adstringendi stomachum, & ciendi appetitus. Alia Cina nigra sunt & crassa, dura carnis, & maxime omnium Pontica, quæ summo loco in prandio siue cæna comedenda, quia styptica sua vi in fine mensæ claudunt orificium stomachi, quo clauso digestio melius & citius peragitur.

Ruellius acidis cerasis etiam plus tribuit, obstrukciones nempe iocinoris infarctu leuare, fluxum bilem extinguere: Gummi lichenes infantium ex aceto sanare.

Et Tragus, Cerasa, insit, acida pituitam incidunt, crassosque humores pellunt. Solent illa siccharo quandoque condiri, ægris inflammationibus & calore vehementissimo laborantibus gratissimo cibo.

Quidam è nigris siluestribus aquam destillant, quæ amissam loquelam restituere dicitur. Omnia verò cerasorum genera, inquit Matth. quæ Amarina dicuntur, aptissima sunt, vt insolentur, saccharoque condiantur. Quin & sapore commendantur ad intinctus sciendos, quibus non modo sanis edulia iucundissime condiantur, sed etiam ægrotantibus, præsertimque biliosis febribus vexatis. Siquidem illis non modo sitim extinguunt, sed oris insuauitatem emendant, & cibi appetentiam conciliant, nec ita facile deorata, vt dulcia corrumpuntur in ventriculo, ideoque ad prædictas febres facile conceduntur à Medicis Germanis. A pediculis repurgata viuis maturis admiscuntur, & deinde vinum ex his paratur, gustu gratissimum, quod in alui fluxionibus vtiliter vsurpatur.

Alium vini cerasorum modum supra docuimus, cuius vsus & in hoc casu esse possit, si vino rubro, nec forti paretur. Siluestria quibus plerumque vescuntur aues, raro in cibis admittuntur, præterquam à rusticis, tum quòd plus ossis quam carnis habeant, tum etiam quòd cum quadam acerbitate amara sentiantur. Oleum è nucleis Cerasorum, faciem abstergit, maculas & lentiginis aufert, vtile etiam arthritidi, & calculo renum & Vesicæ. Paratur sicut ex Amygdalis, expressione. Cerasorum quorumvis aqua bibitur contra nimios calores & foris imponitur: priuatim verò dulcium nigro-

rum, quæ & contra Paralyfin à multis commendatur si ori infundatur, & os inde benè colluatur, vt amissum lingue vsus restituat. Destillatur autem vel carò sola, vel viâ nucleis quoque contriti, vt calculosam renum & vesicæ materiam educat destillatus inde liquor.

Nigra & acidissima dicta, aquam reddunt salubrem in febribus, tum alijs, tum pestilentibus, refrigerantem, & confirmantem vires: vtilem quoque aduersus sitim & Dysenteriam, auctore Eubonymo. Rithus scribit Dulcium nigrorum recentium destillatam aquam quibusdam mirifice commendari ad Epilepsiam, ita vt cumprimùm in os Epileptici paroxifimo correpti infusa fuerit, dossi drachi. quatuor aut amplius, illico reuiuifcat recreatur, nec vllò amplius spasmo conuellatur, donec statuto tempore, vt fieri solet, post aliquot dies, alius paroxifimus oboritur, tumque iterum, vt prius infundendam impedire enim, auferre, atque sanare Paroxifinum. Sunt qui eandem aquam ad hydropem commendant.

Quoniam verò aquæ cerasorum itam aliquoties mentio facta, præscribamus formulam perbreuem parandi Optimam. Exempli loco sit Aq. Cerasorum acidorum. His contritis & Alembico vitro immixtis affundas bonum vinum, ac destilles in B.M. His destillatis affundas aliquid succi recentet expressi ex prædictis cerasis, vt sapore iucundior fiat efficaciorque. Cor hæc atque Ventriculum mirifice corroborat. Sicis etiam cerasis affunditur multum: hocque vinum appetitum excitat ac calculum pellit, auctore Matth. Existimauerimus, siquidem sicca cerasa, præsertim acida, adstringant, & vinum hoc modo cum ijs paratum adstrictionem induere, ideoque fluctationibus alui varijs accommodum. Aqua ex rubris acidis destillata, ad fluores mentruos expetitissima puratur, itemque ad dysenterias aliasque fluxiones diuturnas vel tritum vnciarum dossi hausta. Hepar refrigerat, & stomachi ardores compescit. Præstans hæc habetur à quibusdam aduersus pætorum consulsiones. Aquæ ceras. nigræ & fluorum Tiliæ aquas partes misce. dossi vnc.) aut ij pro ætate.

Egregia est & illa compositio Camer. ad ardorem vrinæ. Nucleorum Cerasorum siluat. vnc. ij. interioris pulpæ optimæ Melonum lib. f. addito pauco sacch. contusa destillentur. Huius aquæ stillatitiæ cochlearia aliquot ardorem vrinæ mitigant.

Nucleos Cerasorum Taber. commendat ad spleneticos, & ad difficultates vrinæ. Labiorum fissuras emendabis mucagine parata ex gummi cerasorum & aqua rosata, eaque sepiculè illita.

Nicol. Abr. à Frambois. noui aliquid adferre videtur his verbis. Cerasa [Cerasi] recentia aluum laxant, sicca restringunt. Quæ ad perfectam maturitatem peruenerunt, dulcia sunt, quæ nondum matura, austera aut acida. Dulcia alunt, soluunt, sed ventriculo minus commoda. Austera contrà. Acida vtilia ventriculo pituitoso & superfluitatibus pleno. Hæc ille quem non intelligimus in distinctione cerasorum, aciditas, austeritas & dulcedo cerasorum non pendet à maturitate: sed diuersa sunt genera, dulcia, acida & austera.

\*\*\*

CERA-



## CERASVS SILV. AMARA

MAHALEB PVTATA.

CAP. XXXI.



**M**Ahale-  
bum vo-  
cant quidam  
arborem Cera-  
sis satis similem  
ramosam & sur-  
culosam; caudi-  
ce, teste Dal.  
plerumque in-  
torto, cortice  
rimoso, scabro,  
subcinereo; ra-  
morum verò  
cortice ex coe-  
ruleo nigrican-  
te, læui, colore  
oculis non in-  
grato, radicibus  
crassis, multis,  
brachiatis. Fo-  
lia Betulaceis si-  
milis, aut Popu-

li nigra, minora, paullo minus lata, quam longa,  
concinne in ambitu crenata, Pruni silu. latius &  
pallidius virentia; venosa. Flores obtris grati, ex  
quatuor foliolis; [vt idem Dal. ait,] nobis, ex  
quinque congesti, crebrius staminibus medium  
occupantibus, filis intus candidis, apice rubro  
coronatis; cætera Ceraforum floribus similes,  
albi, minores, pediculis brevibus, vix vncialibus,  
pluribus ab vno pediculo longiore & ramoso  
propagatis: quibus succedit parvus fructus, effigie  
Cerasi, rotundus, niger, amarus; tinctura sua  
manus inficiens, oliculo Cerasi, & nucleo ama-  
ricante, eiusdemque saporis cum Cerasi nucleis.  
Baccæ, inquit idem, succo plenè purpureo, qui  
expressus linthea, coriaque munda & candilla, flor-  
idissima purpura tingit, colore nec fægaci, nec  
caduco, sed difficillimè permanente.

An *Λαυρόν* Theophrasti: de qua sic ait: Des-  
cendit in plana Lacarha; sic enim in Græco legi-  
tur, non Lacara, vti vertit Gaza: Item auctu fa-  
cilis Lacarha, vbi Gaza rursus Lacara vertit, quasi  
legisset *Λαυρόν* sapor in vulgatis posteriori loco, *Λα-  
υρόν*, prior *Λαυρόν* legitur: nullibi *Λαυρόν*. Sed dif-  
ficile est iudicare ex tam paucis verbis quid per  
Lacarham vel Lacaram intellexerit Theoph. quia  
tamen aliqui suspicati sunt Mahaleb quorundam  
esse Bacatham, hic eius meminisse deuit.

An Plin. Vaccinia? Non nisi in aquosis (inquit)  
proveniunt salices, &c: Item Vaccinia Italiæ au-  
cupis lata, Galliæ verò etiam purpura tingendi  
causa ad seruitiorum vestes. Constantinus è Tur-  
nebo legit, Italiæ mancipiis lata: quia mangonio  
Vaccinii tardatur corporis pubertas, quod erat  
venalitiis vile. Ego verò (addit Dal.) si eam le-  
ctionem probarem, rationem potius ex sequen-  
tibus verbis assererem, quia Vaccinii succo tingan-  
tur seruitiorum vestes in purpurea colorem. Præ-  
terea tardior pubertas iis viris non erat, sed do-  
minis, & mangoniibus, quod pluris eos nondum  
barbatos venderent.

An Vaccinia nigra Virgilio.

De præsentì verò arbore sic scribunt Monachi  
apud Melucn. Reperiuntur etiam & cerasi silue-  
stres, sed non sic passim, vt urbans nascuntur. In

partibus Apulie plures arbores vidimus, quæ ab  
incolis loci Nera vocantur, quarum fructus non  
est Almahaleb; vt mox patebit. Est enim fru-  
ctus Nera minor, neque nigrior Cerasio domesti-  
co, & foliū rotundius, minus ac solidius. In caudice  
autè & cæteris partibus non differt Nera à Cera-  
so. Et tam Cerasus quam Amarene inferitur in  
Nera, & optimè fit.

Prodit & guinmi Nera affluenter vt Cerasus.

An Trago siluestre cerasi genus, quam Pumulā  
cerasum aut Chamæcerasum dici posse ait: Le-  
ctorem tamen ad Ruellium remittit. At ille loco  
ab ipso citato meminit Chamæcerasi, quæ nihil  
commune habet cum Tragi siluestri Ceraso, de  
qua alibi.

Suam autem sic describit Tragus. In Rheni tra-  
ctu siluestre quoddam & humile cerasi genus re-  
peritur, ripis fluviorum potissimum gaudens, lig-  
no & fronde sativo per omnia simile. At poma  
eius longè sunt minora sativis, nec etiam vulga-  
re hortense Pisum magnitudine excédunt, colore  
serè nigricante tincta, singula singulis suffulta  
pediculis, dulci, sed ingrato; & qui nauseam vo-  
mitionesque excitet, gustu prædita.

C. Bauh. qui apud Matth. Chamæcerasum pe-  
træam vocat, satis securè Cerasum siluestrem Tra-  
gi pronunciat.

Nos dubitantes proponimus, quia folia & lo-  
cus non conveniunt cum nostra ceraso amara:  
cui folia diversa à sativa: Gaudet etiam locis sic-  
cis & petrosis. Non videtur etiam dicenda Cha-  
mæcerasis: quandèquidem loco commodo non  
exista in arborem non parvam excresecat. Quid  
fieret si multa cura etiam colectur?

An Angiul. in Epist. Arbor Mahaleb proueniens  
in Italia; Veronensi agro, itinere ad montem  
Baldum & in Sclationia: de qua plura apud Serap.  
Putauit itaque Angiul. hanc arborem de qua hic  
agimus (si modo eam intelligit) esse Mahaleb Se-  
rap. de qua nos lib. 5.

Matth. quoque sic scribit. Mahaleb dicta quibus-  
dam Neoteritis planta cuius semen in vlu, quā-  
uis non sit Phillyrea. Non desunt argumenta quæ  
inducunt, vt credat; verum & legitimum Ma-  
haleb Arabum, quia video apud Serap. facultates  
ex Arabib. desumptas vt Melue & Kasi, diuer-  
sas à Phillyreæ facultatibus: concedo errasse Se-  
rap. existimando Phillyreain & Mahaleb Arabum  
idem esse. Auic. Mahaleb abstergit &c: Matthiolo  
tamen assentiri non possumus, nec concedere Se-  
rapionem errasse. Lib. 5. ostendimus argumentū  
Matthioli nullius momenti nobis videri.

Dalechi. doctiss. Medicus, Chamæcerasum  
(vt scribit Gesn. in epist. quadam) nominat ar-  
buseulam quæ Arabicè Mahaleb dicatur. Aduchi  
ex Syria, quamvis vbique per sepes itlic (circa  
Lugdunum) nascatur, sed arbore humiliore,  
fructu minus habito, nucleo & semine tenuiore  
ac graciliore, foliis rotundiore; flore albo &c.  
Bellonij sibi retulisse seminibus eius quæ odo-  
rata sunt, vti Lugduni, illos, qui Chirothecas  
odoribus imbuunt.

Dalechampsius autem annotat apud Plin. Con-  
stantinum putare Vaccinium fuisse Hyacinthum:  
Se verò arbuseulam in sepibus frequentem, quam  
Mahaleb quidam vocant. Plinius ceterè Vacci-  
nium arbuseulam perperam Hyacinthum reddit,  
camque cum Hyacinth. bulbosa herba confundit.

Videamus & Rob. Const. verba: *Lacarha* (inquit)  
apud Theoph. retineo, quamvis alibi *Λαυρόν*  
habeatur, & Gaza *Λαυρόν* legerit: & nisi fallor est  
Mahaleb Serapionis, quæ in agro Veronensi pro-

Nera.  
Almahaleb.  
Comm.

Tragus non  
siluestre  
cerasus hu-  
milis.

Sapor.  
Chamæ-  
cerasus pe-  
træa.

Mahaleb

Almahaleb  
non esse  
Phillyrea.

Serap. non.

Plin. non.

uenit, ut etiam mihi testis locupletissimus Io. Auguil. totius nat. hist. experientissimus.

*Vaccinium*  
L. n.  
*Chamae-*  
*rasus.*  
*folia cerasus.*  
*Vaccini*  
*nuclei.*  
*Mahaleb*  
*nuclei.*

Sunt, inquit Hist. Lugd. qui Vaccinium Plin. Theophrasti verò Lacatham arborem, nonnulli chamaerasum siue silu. Cerasum esse existimant: verum à quouis id Cerasorum genere differt. Non desunt etiam qui Vaccinij nucleos ex Oriente aduectos pro nucleis Mahaleb ostendant & vendant: tamen Mahaleb alia arbor est. Vacciniura in sepibus ferè semper prouenit ad Ligustros: quam ob causam Virgil. fossasse eodem versu coniunxit.

*Hist. Lugd.*  
*mot.*

*Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur.*  
Verum Hist. Lugd. more suo frustra duas posuit figuras vnus plantæ: priorem nomine Mahaleb Matth. & multis capitibus interiectis, denudò, nomine Vaccinij Plin. & Lacathæ Theoph. quamuis eæ figura multum inter se differant.

*Chamae-*  
*rasus Pe-*  
*træ Petri-*  
*cerasus.*

Mahaleb Gesnerus, in Epist. 3. ad Zuïng. vt annotat Camer. maualt chamaerasum petræam aut Petrocerasum vocare quod in petrosis montium locis nascatur. Idem ait: non couenire plantam quam vocant nunc Macaleb cum Phillyrea Diolc. quæ videatur esse Macaleb Diolc.

*Taberni-*  
*probenus.*  
*Tilia pe-*  
*træ.*  
*Cerasi ge-*  
*nus.*  
*Vaccinium*  
*Pliny Lac-*  
*thæ*

Macaleb Gesn. & Matthioli, Lob. diuersis operibus. Macholebum Matth. Tabern. Et geschlecht der steinlindern. Verum hoc Germ. nomen Tabern. haud nobis placet, quod Tiliam petræam significat. Quid enim arbori proposcæ cum Tilia commune, aut quæ affinitas? Mahaleb à nonnullis dictum, ex sententia Cluij ad cerasi genera referendum, rusticis Austriacis steinweixel, hoc est, petriosa cerasus. Sunt (addit idem) qui Vaccinium Plin. & Lacatha, (cuius nudi nomē apud Theop.) esse censent: Plinius Vaccinia aquosis solummodo nasci tradit, tingendi causa, in quem usum nemine hunc fructicem, aut eius baccas usurpare intellexit: at palustris illa Vitis Idæa, cū ea quæ nigris baccis est tincturæ apta, vt annotaui. Ex his verbis Cluij satis apparet ei non placere opinionem de Vacciniis: quæ tamē plausibilior nobis viderut, quam noua illa de Viti Idæa. Non enim sunt arbores, Vites Idææ, nec facile feri possunt, ut fieri ait Plinius. Præterea minis comode earum baccæ pro tinctura vestium municipiorum videntur, in qua re libenter peritiorum audiemus iudicium.

*Vitis Idæa.*  
*palustris.*

*Cluij re-*  
*fus.*

*Locus.*

Gesnerus ex Dalech. testimonio tradit ubique per sepes in Gallia & circa Lugdunum nasci. Bello-nium sibi quoque retulisse, & inuenisse se in mote illo Rhetorum qui inter Curiam & Clavennam interiacet. Nascitur [addens] si bene memini copiose in mote proximo Vesæ oppido, quod ad Riuarium Lacum in Helvetia situm, exeunti Curia versus, ad sinistram, locis lapidosis. Et, ni fallor in Vallesia quoque. Calzolarius annotat prouenire in Italiæ monte Baldo. Cluij. quoque testatur nasci scopulis & saxosis Pannoniæ locis, & Collium vrbi Viennensi vicinorum radicibus: ob eam causam Steinsweixel appellari vt dictum. Hunc etiam plerisque Narbonensis Prouinciæ & Allobrogum locis, non procul à Rhodano sitis obseruare memini. Habemus in horto E. C. Month. quæ in magnam excreuit arborem. Abundat circa Clarauallum E. C. Wirt. oppidum Burgundiæ vbi Crenollier vocant. Basileæ vidimus in horto Cl. D. Zuïngeri, vt & alias multas rariore: Propè vrbem illam iuxta pagum & arcem Dornach: in Heluetia prope Bâstlar: in Alsatia prope Than: in monte Kang (in quo generosa, dulcia & Basiliensibus celebratissima vîna nascuntur) & locis vicinis.

*Crenollier.*

*Thopis*

Lugd. multis in locis, vt ad portam D. Sebast.

florentem vidimus Martio & Aprili. Multi etiam medici, quibus hæc curæ esse deberent, prætereuntes, nec obseruantes diligentius, Prunum siluestrem oscitanti quadam securitate censent. Obseruauimus etiam in Delphinatu inter Valentiam & Lugdunum, fructu paruo, nigro, maturo Iulio. Tiguri in Wese ad Riuarium eodem mense maturum Tintbeer vocabant: quasi dicas atramentorias baccas, vel potius tinctorias, quod tingant.

Nuclei plantæ, quam aliqui vocant Mahaleb, calciant, emolliunt saponarios globulos ingediunt, pilosque horridiores & duriores emolliunt, attenuant, affricu crebro, Matth. Ex nucleis teste Hist. Lugd. oleum conficitur iucundij odoris, quod ad illinendas matricas vruntur. Baccis istis maturis Turci, Merula, aliaque aucula audissimè vescuntur, quamobrem Italia ad eas alliciendas, sepes & dumeta Vaccinij conferebat. Plinio quoque, vt iam supra dictum, Vaccinia Italiæ in aucupijs fara: Galliæ verò etiam purpura tingendi causa ad seruitorum vestes. Môtbelgardj in horto Il. E. C. Ab aubus deuorantur baccæ. An horum nucleorū vsus sit, quem tradat Matth. Hist. Lugd. considerandum.

CERASVS RACEMOSA QVIBVS-  
DAM: ALIIS PADVS.

C A P. XXXII.



C Audice, rae-  
Cmis, corti-  
ce, crenatiquæ  
folijs ad Cera-  
sum quam proxi-  
mè accedit:  
verum folia ma-  
turefcente fru-  
ctu, aut eo ma-  
turo, infra red-  
duntur candi-  
diora, suprà ali-  
quantò nigro-  
ra, ut longius  
à Cerasi folijs  
abesse victi  
possint. Flores  
autem priuato  
surculo palmum  
longo racema-  
tim coherant,  
ut in Laburno,

Cerasorum floribus similes, nonnihil odorati, candidi, è quintis folijs compositi, apicibus luteis, pediculo semunciali. Fructus nigri, dulces, non tamè admodum grati, ossiculo duro, oblongo, scabro: nucleum continent. Dalech. scribit, flores suauissimè redolere, nec minis olfacienti gratos, quam Mali Citriæ flores. Fructum gustanti acerbum, Mespilaceique saporis graue quiddam, cum manditur, naribus afflantem. Id ei admirationem parere: rarè quippe accidere solere vt suauissimi floris odorem fructum molestus fætor excipiat.

An à môtbe Theophrasti: quam ait vehementer vmbrosis gaudere locis. Sanè Hist. Lugd. apertè scribit Padum esse Theophrasti, sed quis ei hoc secretum aperuerit, vt tam liberè de re tam obscura tamque dubia pronunciaret, nondū cognouimus. Circumspèctiūs doctissimus Consil. in Theopli. môtbe inquit, frutex quem vocant Purier Allo-



Allobroges, Pados esse creditur. Sed hæc coniectura incerta: alia est *Pades* apud Plin. Dicta autem *Putier*, id est, putida arbor, à graueolentia. Sequani vocant *Padis* quasi *Padis*, voce *Padæ* corrupta. Quidam cerasum silu. esse putant, verum à cerasorum natura flos distat maximè.

De eadem sic Clusius tradit. Cerasus autem aut cerasus racemosa vulgo Heibariorum: in siluis frequens: Germ. *Elax* aut *Elaxen* dicunt: Vngari *Zelnicefa*. Belgicæ officinæ pro Vitice habuerunt.

Sunt (addit idem) qui Padum Theoph. esse censent: Sed cum Theoph. eo loco Padum duntaxat retulerit inter arbores vmbrosas gaudentes, nulla addita descriptione: qua ratione suam opinionem stabiliant non video.

Arbuscula silu. cerasi folijs Gescn. Pseudoligustrum, tradente Dod. Sunt qui *zyon* siue Viticem, sed perperam vocitent, vnde & Pseudoagnos à nonnullis dictum, vulgò *Vogelsirsfen* (id est, auium cerasa) nominant.

Suspiciantur nonnulli esse Mahaleb de quo Avic. c. 478. & quod à Serapione ex Mesuæ sententia refertur: sed difficillimum fuerit asserere. Pseudoligustrum verò Dod. est hæc ipsa de qua hic agimus.

Nelcimus verò quis cerasum racemosum vocarit Mahaleb: quisquis tamen ille fuerit, suspicamur ei non fuisse notam eam plantam, quæ multis Mahaleb dicitur.

Cerasus racemosa, & Cerasus auium racemosa, Lob. & Penz. Angl. Cluster Cherries. Cerasia racemosa nigra, Schwarz Vogel Busen Ger. Tabern. qui more suo, nihil præter iconem & purum putum nomen habet. De rubra eius racemosa antè scriptum.

Doctis Herbarijs considerandum relinquimus, an Cæsalp. de hac scribat, cum ait: Est quædam cerasus silu. brevis, racemulis oblongis, fructum ferens paruum, qui in maturitate ex viridi flauescit, subaulster, nucleo subulpero:

Cerasus montana racemosa; Padius Theoph. Germ. *Olantbaum*/ *Oltfischden*, *Ohtbaum*: arbor procera valde, Schuuenkf. Sed quo fundamento, & is tam confidenter Padum Theoph. statuat, ipse viderit.

C. Bauh. nobis retulit provenientem in horto Patavino, Guilandinum vocasse Arborem Vuar Recentiorum, staphylo dendron Veterum *vepam*, & Arborem vitis.

In glareosis & arenosis locis prodit circa sepes & dumeta. H. Lugd. Sectatur ripas fluviorum in dumetis Silesiæ Schuu. Nos in horto Montb. iam dudum colimus; illam ex vicinis montibus, & ex itinere Basileam versus circa Sept dictum pagum, vbi *Schwartzbendele-holtz* vocantur. Provenit etiam in vicinis Basil. montibus; potiss. circa *Münchensheim*. Item inter Bernam & Solodurum & *Eure* oppidum: vbi fructu acerbo in principio Iunii vidimus: florentem Geneuæ Maio. In Delphinatu verò vno Miliari Lugduno; florentem April. In montibus Lontharingicis circa thermas Plumbarias quoque nascitur, & inter Bessfordiam ac Girardmegni; vbi à nobis observata, mense Septembri. Magnates quidam Bononienses in hortis colunt.

Semina Germani commendant ad Epilepsias puterorum, appensa collo & vocant *Gischbeeren*, & *Holzbeeren*. In Silesia, teste Schuuenckf. puteris nota, qui verno tempore ramos cum floribus decerpentes in conclavia transportant, odoris gratia. Fructus cibis autilis gratus quo &

pueri delectantur. Dulces sunt bacculæ; sed ingratae, & facile nauseam movent. Vehementer adstringunt, & aluum cohibent.

## CHAMÆCERASVS MONTIS GENERO SI.

CAP. XXXIII.

Misit Gesnerus ad Dalechampium fruticis effigiem, qui nascitur, vt scripsit, in montis Generosi Insubriæ crepidinibus; cuius ac præcipitijs, folio Aceris albi, quod Galli *Plane* vocant, latiore & ampliore; per ambitum valde infecto: fructu rotundo; rubro; ceraso simili, vnde Chamæcerasi nomen. Chamæcerasum montis Generosi tam Gesnerus quam Hist. Lugd. vocat.

Descriptio.  
Locus.Folia.  
Fructus.

## LOTVS ARBOR FRVCTV CERASI.

CAP. XXXIII.



Lotus dicta arbor, magna est, caudice crassissimo, ramis Cerasi instar brachiata, sed in latitudinem magis, quam in altitudinem extensis, cortice leui, subalbido, (ut Cæsalp. ait: vt Matth. in cæruleum nigrescente) folijs Vlmis longioribus, & magis in acutum disinentibus, inferiore parte nonnihil incanis, super-

Descriptio.

Correx.

Folia.

Officulum.

Floribus.

Auctorum placita ac que  
Synonyma  
Lotus Hom.

nâ viridantibus, rugosis, in ambitu serratis, in acumen desinentibus, quæ nihil nobis cum Illice videtur commune habere: Ad vnumquodque ferè folium est bacca subnigra; ceraso silu. similis; minor tamen, ex longo pediculo; pulpam paucam albam continens cum dulcedine adstringentem, gratiam: officulum, ad fructus proportionem magnû, bacca tota siccissima; vt vix ea quis satiari possit: Flosculi, teste Cæsalpino, ex binis foliolis constât summo fructui insidentibus: Baccæ nigra: officulum durum, veluti quadripartitum, intus unica seminis medulla, dulcis.

Hanc arborem, aut certè huius generis aliquâ; ob fructus gratam dulcedinem Vlyssis socij, vel ipse potius Poetarum maximus Homer. suis carminibus celebrasse videtur cui *Lotus* dicta, & *Poppuli*, qui eius fructu victitabant; *Aspidodora*, ad quos missis ex Vlyssis socijs tribus exploratoribus, qui eorum mores indagarent; fructus dulcedine illecti, ad nauem redire noluerunt; nisi verberibus compulsi: tutius esse rati apud Lotophagos subsistere, quam tot erroribus atque peticulis in mari quotidie cum Vlyse iactari: Vnde præclarè Vlysses apud Hom. *Odyss. lib. 9.*

*Homor. lo-  
cus de Loto-  
phagis.*

Τὸν δὲ τοῖς ἀποτοῖς φάρμακον μελίσθηκα χρηστὸν,  
ὅτι ἐν αὐτῷ εἶναι τὰς ἰσχυρὰς, καὶ τὰς νύκτας.  
Ἀλλ' αὐτὸ βέλαντον μὲν ἀποτοῖς καὶ φάρμακον  
καὶ τὸν ἐν αὐτῷ μελίσθηκα, γὰρ τὸ καὶ τὸν μελίσθηκα.

Sensus est: Quisquis horum, Loto mellitum fructum edisser noluit denunciare quicquam, neque redire, sed istuc cum Lotophagis permanere malebant, ut Lorum deciperent, redituque obliuiscerentur. Existimamus autem illos periculi potius (sicut dictum, & doctissimi quique sentiunt,) euitandi causæ, quàm huius fructus illicio tractos emanasse. Etenim dulcedine non careat, tam macer tamen est (si saltem hanc nostram intelligit) ut si ad voluptatem esurientibus, ad satietatem verò ipsidem nunquam fortè esse possit. Equa verò etiam ex ijs possit esse voluptas, tam exsuccis, tamque adeo [ad nobiliores sapidioreque fructus comparatis] nullis; Vemirum huius fructus aridam infocundamque dulcedinem, nomen & genti, & regioni [ut plerisque sentire videmus] dedisse, atque adeo nimis hospitali illa aduenarum obliuione, in adagium [Λωτοφάγε] abiisse. Sed fortè in ijs regionibus carnosior ac vel nostra etiam suauior, cum & esse credantur quæ nucleo carent, uti dicitur mox.

*Loto him-  
ymia.  
Loto plures  
speciei.*

Est verò Loto apud Autores varia & multiplex receptio: immò apud ipsos etiam Botanicos plures non solum plantæ, sed & arbores hac voce comprehenduntur:

Theoph. de huius differentiis & significationibus sic ait: Quædam speciebus pluribus constant, quanquam vnum nomen fortuantur, ut ita sint, quasi homonyma sicut *Lotus*. Huius enim plura genera, folio, caule, flore, fructuque ipso discrepantia. Sed de his postea, & suis quibusque locis fusiùs. Nunc de hac, & præcipua, sine dubio, inter arbores Loto, quam idem autor abundè describit, his verbis. Est autem (Λωτὸς Celtis Gaza ex Plin.) peculiare genus, procerum, magnitudine Piri, [πύλον & πύλον] aut paulò minus: folio inciso, ut Illicis: (πυρῶδες: Cornar. suspicatur legendum πρηνώδες: scirato: nec displicet lectio. Plin. paulò aliter conuertit, uti patebit mox) materie nigra. Genera eius plura, fructibus distincta. Fructui magnitudo Fabæ (πύλον) qui velut uuarum botri maturescit, colores mutans. Nascitur alternatim, ex aduerso, veluti Myrtorum baccæ, super germinibus densus. In cibo est Lotophagis dictis, dulcis, iucundus, innoxius, & stomacho gratus: πρηνὸς τῷ κοιλίῳ ἀγασθῆναι: Gaza vertit, bonæ frugis: Dal. alio ciendæ utilis: Anguil. ventriculo bonus: Scal. Ventriculo utilis. Suauior etiam qui nucleo caret (ὁ ἀπύρνος: sic & Plin. & Gaz. & Scal. Vulgar. exempl. ἄπυρνος δὲ ὁ πύρνος, suauior verò nucleus: Anguil. videtur legisse πυρῶδες, suauior autem primus:) ex quo etiam vinum conficiunt. Copiosa illic est hæc arbor, multumque fructifera. Quare Ophelli exercitum, cum Carthaginem proficisceretur in comitatus penuria, eo fructu in plures dies vitam sustentasse tradunt. Est igitur in insula Lotophagite, quam Pharidem vocant [ea nunc Gerbi dicitur. Dal.] ea Lotus frequens. Ea insula sita est, haud longè à Continenti. Cæterum non illic tantum, sed etiam in Continente multò largiùs provenit. Nam in Africa [Λιβύῃ] uti diximus, Loto ut & Paliuri maximus procreantur: sed hæc Lotus ab illa Lotophagorum differt.

*Vini magni-  
tudine, ser-  
uato folio I-  
licis.*

*Genera plu-  
ra. Fabæ ma-  
gnitud.  
fruct.  
Lotophagi.  
Apyrenus.*

*Vinum ex  
Loto.*

*Lotophagi-  
tes Lotus  
Pharidis.*

*Paliurus  
Theoph.*

Paliurus Loto fruticosior est, folio huius nostrati similis, sed fructu diuerso: non enim latum, sed rotundum & rubicundum, magnitudine quâ Cedri, aut paulò minore, cuius nucleus non

simul editur, quemadmodum acini punici. Fructus verò ipse suauis est, cuius quis vinum affundat, & ipsum suauiores fieri tradunt, & vinum ipsum quoque suauius efficere.

Referunt quidam Lorum arborem fruticosam, ramosam, caudice firmo, semine incluso nucleo, exterius non carnosio, sed magis cutaneo, in cibo non tam dulci, quàm ori grato & suauis, sed vinum quod ex eo parant minimè durabile est sed duos tresue dies tantum, dein acefcit. Fructus apud Lotophagos suauior est. Materies optima in Cyrenæa regione, calidiore Lotophagorum regione. Radix arboris, multò est ligno nigrior, minùs densa, & ad pauca commoda, nimirum & ad pugiones, & ad glutinandas affusula: Lignum ad tibias, & ad alia plura utile.

Idem Theoph. tradit Acanthum Aegyptiam ligno esse *λωτὸν* colore. Et paulò post, circa Memphis arborem tantæ esse magnitudinis, ut tres homines eius caudicem amplecti nequeant, cuius etiam materies cæla operibus sit apta, densa valde, & coloris Loto. (Λωτὸν δὲ.) In Africa verò Lotum plurimam, optimamque gigni: itemque Paliurum: quin & alijs quibusdam partibus, ut Nafamonica regione, & apud Ammonem, alijsque locis provenire.

Porrò quod Homerus & Theoph. de Lotophagis tradunt, illud & Strabo confirmat quidem, sed de diuersis nationibus id scribit, locaque quamplurima, in quibus nascitur, memorat. Æthiopes inquit, Mauritaniam accole in Occasum spectantes, Lotophagi vocitantur, loti cibos carpentes, gramen & radicem quandam, nullo indigentes potu, nec facultatem eius propter aquarum penuriam habentes. Horum Natio vique in Cyrenæorum loca extenditur. Alii rursus Lotophagi nominantur, alteram inhabitantes è regione paræ Syrtis insularum Menynge. Et alibi: Minori Cercinitii [Syrtis insula est] continua est, minor Syrtis, quam Lotophagitem Syrtim vocant. Iuxta utrumque promontorium, quæ eo efficiunt, insulæ adhærescunt continenti, Circinina scilicet, de qua diximus, & Meninx, magnitudine æquales. Meningem Lotophagorum terram putant, cuius Homerus meminit, & signa quædam extant, & Vlyssis terra, & fructus ipse. Nam Lotos multa in ea est, fructu suauissimo.

Plin. de Loto arbore quæ habet ex Theoph. transcripsisse videtur, adiectis tamen quibusdam vel de suo, vel ex alijs quibusdam etiam mutatis. Sic autem scribit. Africa quæ vergit ad nos insignem arborem Loton gignit, quam vocant Celtin, & ipsam Italiæ familiarem sed terrâ mutatam. Præcipua est circa Syrtis (Theoph. vocat Lotophagitem, & Pharidem, hodie Gerbi: Syrtis verò *los Baxos* & *Secagne* di Barbaria Hisp. Dal.) atque Nafamona. Magnitudo, quæ Piro, quam Nepos Cornelius breuem tradat Incisuræ folio crebriores: alioquin Illicis viderentur. (Plin. apud Theoph. legit *πρηνώδες*: alij verò *πρηνώδες* Dal.) Differentiæ plures eaque maximè fructibus sunt (Nam alij, quæ & suauiores, ex osses sunt, alij nucleis continent ex Theoph.) Magnitudo huic fabæ, color croci [priusquam perfectè maturescat immaturo niger, Dal.] Sed ante maturitatem alius atque alius, sicut in vuis. Nascitur densus in ramis, Myrti modo, non ut in Italiæ, Cerasi: tam dulci ibi cibo, ut nomen etiam genti terregue dederit, nimis hospitali aduenarum obliuione patriæ. Ferunt ventris non sentire morbos, qui eum mandant. Melior sine interiore nucleo, qui in altero genere osses videtur. Vinum quoque exprimitur illj, simile



miſe mülſo, quod vltra deños (duos quidem, ex Theoph.) negat durare idem Nepos: (hoc verò Theoph. de fructu Loti fruticantis) baccasque conſuſas cum alica (Zea deglubita) ad cibos doſijs condi. Quin & exercitus piſtos eo accepimus Theoph. hoc de fructu prioris Loti ] vitro citroque commeantes per Africam. Ligno colos niger. Ad tibiurum cantus expetitur. Et radice culcellis capulos, breueſque alios vſus excogitant. Hæc ibi natura arboris. Et paulò poſt. Cyrenaica regio Lotoſi ſua poſtponit Paliuro. Fruticoſior hæc, fructuque magis rubens, cuius nucleuſ non ſimul manditur, iucundus per ſe, atque ſuauiore vino: quin & vina ſucco ſuo commendans. Et alibi. In cacumine ramoſa Lotoſ, ſive Faba Græca: quam Romæ à ſuauiſſimo fructu ſilueſtris quidem, ſed ceraſorum penè natura Lotoſ appellat. Præcipuè domibus expetitur ramorum petulantia, prævi caudice, latiffima expatiantium vmbra & in vicinas domos ſæpe tranſilientium. Nulli opacitas breuior: nec aufert Solem hyeme, decidentibus foliis. Nulli cortex iucundior, aut oculos excipiens blandiùs. Nulli rami longiores validioresque, aut plures, vt diſſile totidem arbores licet. Cortice pelles tingunt, radice lanæ. Quid verò per Lotoſ ſuam tranſiſſimam intelligat Plin. cui nullum omnino eſſe caudicem dicit, nondum nobis innotuit. Dioſcoridi ſanè Lotoſ arbor, Lotoſ ſiluſ, & Lotoſ Ægyptia caulem habent.

Item alibi idem Plin. Ex reliquis ſeciſſima (materie) Lotoſ, que Romæ ita appellatur. De Lotoſ longevitate ſic ſcribit: Verba leguntur lib. xvii. c. i. & ſunt Craſſi oratoris Cn. Domitium alloquentis. An tu, inquit, qui H-S millies ſex arbores æſtims: Eæ fuerit Lotoſ, patula ramorum opacitate ſiſcua, Cecina Largo è proceribus cibus in iuventa noſtra eas in domo ſua oſtentante. Dui accituntque, quoniam & de longiſſimo reuo arborum diximus, ad Neronis principis incendia, quibus cremavit urbem, annis CLXXX. poſtea, cultu virides inuenerunt, ni Princeps ille acceleratſet etiam arborem mortem.

Item: Romæ Lotoſ in Lucina arca anno qui ſuit ſine magiſtratibus 369. vrbis æde condita: incertum ipſa quantò vetuſtiſ: eſſe quidem vetuſtiori non eſt dubiũ, cū ab eo Luco Lucina nominetur. Hæc nunc circiter annuum 450. habet. Antiquior illa eſt, ſed incerta eius ætas, que capillata dicitur, quoniam Veſtaliũ Virginum capillus ad eam deſertur. Verum altera Lotoſ in Vulcanali, quod Romulus conſtituit ex victoria de Decumis, æquæua ibi intelligitur, vt auctor eſt Maſſurius. Radices eius in forum vſque Caſaris, per ſtationes municipiorum penetrant.

Lotoſ autem baccas tribuit Plin. diuerſis locis. Hæc eius ſerè ſunt placita de Lotoſ arbore cum ijs, que in viribus traduntur.

Dioſc. *Λωτός το δένδρον*. Lotoſ arbor, ſtirps eſt bene magna: fructum ſect Piper maiorem, dulcem, edulem, ſtomacho aptum, quique aluiũ ſiſtit. Idem alio loco: Triſolij Aſphaleidis folia tribuit, Lotoſ arbori (*Λωτός το δένδρον*) in ſingulis germinibus tria.

De Lotoſ quoque ſic ſcribit Athenæus. Quæ, inquit, de Lotoſ Lybica ſcripſit Herodotus, eadè refert Polybius Megalopolitanus, oculatius teſtis libro duodecimo hitoriarum, his verbis: Eſt autem Lotoſ, *δένδρον* in Græco habetur) *δ' μίτρα, τραχὺ δὲ καὶ [δὲ] Dal.* ] *ἀκανθώδες*: ἐχει δὲ αὐτὸν παραπλήσιον τὸν κίρκον (πεῖρα iuxta Theoph. Dal.) *μυκρὸν, βυδύμενον καὶ πλεονέχον. ὁ δὲ καρπὸς τὰς αὐτὰς μο-*

*δε ὅτι καὶ τὸ μύκρον τοῦ κίρκου μωρὸν τὸ εἶναι τὸ πλεονέχον*. Dalech. vertit: minimè procera, aſpera (nōn tamen, addit Dal. aculeata folio Rhamni vel potiùs iuxta Theoph. Illici: eidem Dal. qui omittit paruo) paulo laciore & craſſiore. Fructus per initia colore & magnitudine ſimili perfectis baccis (albi. Dal. omittit.) Myrti, dum augetur, coloris phœnicei, Oleæ magnitudine, rotundus, nucleo admodum puſillo. Maturus is colligitur, & cum alica tuſus ad ſeruorum famulorumque cibum in vaſa conculcatur ac ſi patitur ingenuorum autem edulijs, detracto nucleo eodem modo reponitur, ac pro cibo eſt: guſtu caricis & palmulis non diſſimili, odore tamen ſuauiori. Fit & ex eo vinum in aqua mactiato & trito, ſaporis grati & iucundi, qualis optumũ muſũ. Merum id & ſine aqua bibunt, ſed vltra decimum diem non perdurat. Quamobrem paulatim ad vſũ tam brevis temporis conſueſcit. Fit & acetum ex eo. *Haec ille de ſua Lotoſ.*

In deſcriptione Athenæi modò citata videtur Natalis de Comitibus, qui vertit folijs craſſiore, legiſſe *παχύτερον*: quandoquidẽ *βαδύς* interdum ſignificat amplum & maius: quid ſi interpretemur paulò ampliùs vel maius ac latiùs Dalech. apud Athen. vbi ſcriptum Oleæ magnitudine, annotat: Fabæ Theoph. quæ fructum habet incluſũ nucis putamiẽ, Herod. l. 4. fructum tradit eſſe Lentico ſimilem. Hæc Dalech. à cuius opinione non parã diſſentit Anguill. Polybii Lotoſ qui diuerſa itauit à Dioſcoride, vt dicemus l. 6. in lutoria luuburũ.

Conſulamus Arabes, quorum *Nabach*, ad noſtram Lotum accedere videtur niſi ſit idem, vt quibuſdam placet.

Rhaza: Nabach frigida ſunt & ſiccæ, quæ ventrẽ adtringunt, & bilẽm ſlauam reprimunt: dulces verò ad hoc ſunt debiliores. An verò Nabach Rhazæ ſit noſtra Lotoſ, pro certo aſſerere non aademus.

Serap: *Sadar* eſt arbor cuius fructus *Nabach*. Ha bohanifæ *Sadar* ſunt duæ ſpecies: vna eſt Africana, altera Adhal: ſed Africana non habet ſpinas acutas, & folia ambarum ſpecierum ſunt lata & rotunda. Et Nabach & Adhal ſunt fructus parui, qui offeruntur regibus, alijs omnibus dulciores meſſiorẽſque, odoris ac ſaporis aromatici: odore inſciunt veſtes, velut alia aromata. Dioſcorid: arbor magna Galeno &c. Sed quæ ſcribit Serapio ex diuerſis autoribus, hæud vni plantæ nobis conuenire videntur. Conſideret lector, quæ à nobis traduntur cap. de Paliuro Athenæj.

Auic. *Nabach* id eſt Lotoſ arbor dicitur *Aſſedar*. Item alibi: de *Sadar* inquit diximus ca. de Nabach, Belluentis in margine ſcribit *Sedar*.

Actuar. inter poſteriores Græcos meminit tantũ ſcobiſ Loti (*κατὰ τὴν μορφήν* vocat) inſitũ *ἐλκύν* cõpoſitione. Sed nunc Recentiores de Lotoſ differẽtes prædicant.

Inter eos primus Hermolaus apud Dioſ. Lotoſ, inquit, arbor Latinis *Celtis* & *Faba græca*, Seruio *Faba ſyriaca*. *Anacabean* vulgò apud Græcos dici auctor Aetius, vt fructum eius Aſicabon ſcripſere Græci: vulgò Romæ *Puls ſyriaca*, Padj accole *Baciani ſyriacani* appellant, Polybius vidiffẽ ſe teſtatur ſpinis aſperam. Ludicere tibie fieri cepta ſunt è Lotoſ, quas Alexandrini Phoringas appellant: Propterea Cænoman Lotum arborem hodiẽ appellant Calamum. Spectatur Patavii antiqua Lotoſ in quodam Antoniani templi xifto. Eſt quando Hipp. Luron pro Lotoſ nomi-

er Hip.  
cha Græ.  
rbor Pon.  
ia  
fermol.  
naas.

nat. Faba Græca siue Arbor Pontica, genus diuersum est à Faba Græca, id est, Loto, magnitudine Fici, fructu Fabæ: succo vestibus expresso quem *Achy* vocant: niger autem crassiusque est: Nasctur in Scythia. *Hæc Hermol.* quem suspicamus nostram Lotum nouisse ac intelligere, quamuis, more suo, misceat quæ Theoph. Plin. & alii scripserunt de Loto, cum suis, quæ pauca sunt: eaque nostro iudicio indistinctè satis, nec clarè ad erudiendum lectorem accommodata: præstitisset eum Theoph. & Plin. aliisque autoribus suas seorsum relinquere obseruationes, iisdemque suas vel subnectere, vel si libuisset etiam præmittere, non eorum verbis quasi coalita aut coherentia sua interfecere: sic omnia apud illum essent clariora.

Lotus Ma-  
nardo.

Manardus: Fuit, inquit, Lotos quandoque Italiae familiaris, nunc adèdè rara, ut ferè pro miraculo ab aduenis spectaretur ea, quæ propè templum Diuo Antonio dicatum Patavii Hermol. viuente videbatur. Scribit de fructu eius Auic. sub grano *Anescen* non absque tamen errore: ponit calidum in secundo ordine, quum Razes & Serapio reponant inter frigida. Serapio arborem vocat *Sadar*, fructum *Nabar*, quem sequutus videtur Auic. qui de *Sadar* quoque scripsit cap. 631. nihil tamen aliud tradens, nisi quod ad caput de Nabac lectorem remittit, nulla habita ratione quæ de grano *Anescen* scripserat. *Celrus* hæc arbor Lat. dicitur & *Faba Græca* vel *Syraca*, quia autore Theoph. fructum fert magnitudine Fabæ. *Hæc Manardus.*

Anescen A-  
nic  
Poc nit  
Sadar Na-  
bar. Sera-  
pion.

Celrus.

Interpres Auic. dicit granum *Anescen* esse Lotum arborem: quanquam non existauerimus Auic. de Loto intelligere, sed *Anescen* aliam quādam plantam censemus, ut ex descriptione colligimus. Non igitur reprehendimus Auic. cum Manardo, sed eius interpretem.

Manard.  
ex Auic.  
nos  
interpre-  
tes rep-  
ben  
Anescen A-  
nicenna,  
eius uis ex  
Syrac.

Hæc autem tradit Auic. Granum *Anescen* est magnitudine Piperis, eiusdem coloris, fragilius, medulla insigniter alba, boni odoris. Hoc granum est calidum & siccum in secundo gradu: vtile ventriculo frigido & relaxato, sic ille: qui cap. de Nabach quādam habet quæ ad Lotum pertinent, cuius verba infra referemus, inter Loto vires.

Potè Loton arborem, teste Bruerio, in Africa gigni inter omnes conuenit: ideoque peregrinam. Verum & nostri orbis familiarem factam certum est. Plinius terra mutaram in Italia existimat.

Autorum  
discrepan-  
tia designa-  
do Loto.

Euariant autores, tum Græci tum Latini in arbore hac describenda. Odorem grauem baccis Diof. tribuit: Plin. nullum. Studioli rei arborariae apud nos (Lugduni) eam arborem esse existimant, quam vulgus *Alysiam* cognominat. Nos & aliam arborem vidimus, quam *Alysiam* vocant. Quæ verò sint Loto & *Alysiæ* Bruerino demonstratum cap. de Sorbo torminali, & cap. de Sorbo Alpina.

Alysiæ.

Anacabea.  
Amarenum  
Visculum  
Acrisolum.  
Ciceragum.  
Alysiæ. Aly-  
serum.

Ruell. de Loto agens, arborum agmen producit his verbis: Lotus arbor quam Aphri *Celrus*, Lat. *Faba Græcam*, Græcum vulgus *Anacabea*, ut *Actius* est autor: Italia hodiè tum *Amarenum*, tum *Visculum*, quidam *Acrisolum*, alij *Ciceragum*: Galli *Alysiæ* & *Alyserum*. Ut non teneat hoc suo nomen stipatu in dubium nos conijciat Ruellius, num cognita ei fuerit Lotus arbor, tam varium diuersarumque arborum nomina miscens, exhibensque, ac si unus eiusdemque essent.

Merito itaque eum Cordus reprehendit scribens: quid sit Lotus non conuenit inter autores. Nam quod Ruell. Hermolai fretus testimonio scribit eam esse quam Calamum Cenomani appellant, haud induci possum, ut credam. Idem,

Pongeriacum, Visculum, & Ciceraginem ab Italis vocari scribit, Galli *Alysiæ* & *Alyserum*, quod falsum. Est enim *Cerasi* species, cuius bacca Recentioribus *Visciola*, Germ. verò *IV. esseln* dicuntur. *Hæc ille.* Hermolao notam fuisse Lotum iudicamus. Non placet verò opinio Ruellij *Cerasi* speciem intelligenti. Cord. in sua Obseru. silus Loto folium describit.

Curtius quoque Lotum non agnouisse videtur, quando ait, Lotum Italis *Amarenum*, Galli *Alysiæ* & *Alyserum* vocari, quæ diuersarum stirpium nomina sunt.

Lorum Monachi apud Mesuem eam existimant arborem, quæ vulgo Romæ *Pulsarata* nuncupatur.

Quidam Siculus dixit eis vocari in Sicilia *Fabam inuerfam*, volens fortè dicere *Fabam Græcam*. Idem volunt esse Arabum *Sadar* & *Nabach*.

Anguillara putat Lotum Theoph. & Diof. esse diuersas plantas, quod Theoph. sitam folio llicis, Diof. trifolio *Alphaliti* similem dicat. Ilicini enim folia sunt dentata, Trifolio omnino æqualia. Existimat tamen apud Theoph. legendum *απριόδες* (περιόδες volebat scribere) id est, serratum. Si ita legamus, inquit, nullum dubium quin arbor dicta *Perlaro* sit Theoph. & tamblis Lotus. Plinij Lotus dicta Faba Græca esset Diof. Lotus, si Plinij Loto fructus descriptio responderet descriptioni Diof. ac etiam folia. Eadem enim vires uterque suæ tribuit Loto. Theoph. verba de Loto quidam malè vertunt. Is non errat meo iudicio, qui dicit Lotum descriptam ab Athen. ex Polybio esse Theoph. Lotum Pharisidis. Eadem etiam est Lotus olea Plin. Existimo esse hæcibus satius. *Hæc Ang. II.* De Loto autem Pharisidis plura vide cap. de Iuibus.

Matth. eam existimat arborem, Lotum, & quidem Diof. & Plin. veram, quæ in Tridentino & Goritensi agro vulgò *Rag. lar.* vocatur: in Veronensi verò & in alijs quibusdam locis Italiae, *Perlaro*, folijs llicis proximis: Galli *Alysiæ*. Lotum Polybij [de qua supra ex Athen.] existimat esse *Daçylos* ex Trapefonda. Est etiam (addit ille) Lotus Africana altera species. Qui Lotum Athen. ziziphum nostraten putant, decipiuntur. *Hæc Matth.* de Loto Polybij ex Athen. Videat lector cap. de Guaiacana & de Iuibus.

Idem Matth. Anguillara ridet diligentiam in vertenda ex Theoph. Loto historia in Italicum sermonem. Siquidem is, inquit Matth. dum nescio quos carpit, quod perperam [ut ille putat] Theoph. lectionem verterit, ipse præ cæteris dum se peritissimum eius interpretem facit, erroribus illis omnibus, quorum alios accusat, apertissime notari potest. Nam ubi Theoph. habet *απριόδες* *del Myrto intrecciari*, id est, Myrto modo triplici ordine implicitis. Deinde ubi statim Theoph. habet, *πυρρὸς ὡς τὸν βλαστόν*, manifestè declarans fructum ipsum densum provenire super ramorum germina: ille ad arborem non ad fructus respiciens, autoris sententiam destruit, his verbis: *è copioso di germogli*: id est, germinibus copiosis est: deinde ubi paulò inferius Theophrasto legitur, *ἡ δὲ ῥίζη ἔχει τὴν κατὰ τὴν ἀγρὸν ἰδίαν δὲ τὴν βλαστον*, id est, *ἡ δὲ ῥίζη ἔχει τὴν κατὰ τὴν ἀγρὸν ἰδίαν δὲ τὴν βλαστον*. Inutile admodum, & sine villo proliis sensu, vertit Anguill. hoc modo: *Ma di questo è più soave il primo, perche ve n'è una sorte così chiamata, & di questo se ne faceva vino.* id est, isto suauior est primum, quoniam genus vnum est ita vocatum, ex quo vinum parabatur. Hæc qui viderint, facillè cognoscent.



cent Anguillaræ in Græcis literis periclam. Deinde manifestò is hallucinatus deprehenditur, ubi Plin. auctoritate parari vinum dicit, ex eo Loti arboris fructu, qui nucleum habet. Siquidem contra Plinius ex ipsi Loti baccis vinum fieri scribit, qui sine interiori nucleo habetur, quemad. scribit etiam Theoph.

Annotat autem Matth. Lotum *Zurgetbaum* Germ. dici. Matthiolo applaudens Apollo: Lotum (inquit) Matthiol. Bagolarum & Perlarum esse, tam euidenticus notis delineat, ut eius opinio maximè probata videatur &c.

Verum non multum irradiat Apollo hoc loco: nam nec describit suam Lotum, nec quid sit Lotus scisse videtur, à qua multum differt Alyfia Bruyerini. Præterea tam Theoph. quam Plinio imponit bonus ille censor: Theoph. enim ne verbum quidem habet de Croci colore: sed *ἰσχυρὸν* fructum Paliuri suæ dicit, quem tamen à Loto sua utraque differentem facit. Plin. verò non dicit Loti fructum croci colore esse, dum est maturum, non enim habet hæc verba, sed illa tantum, croci colore: quod intelligendum, ut doctiss. vult Dalech. antequam maturescat, maturo verò niger: cui explanationi optimè conueniunt illa verba, quæ statim subdit Plin. sed antè maturitatem alius argue alius, sicut in viuis. Saltem in nostra Loto conspicitur fructus primùm viridis, mox flauescens; dein rufus: tandem perfectè maturescens niger aut nigricans. Melius fecissent, nostro quidem iudicio, boni isti Italiæ doctores Botanici, si illam Plinii difficultatem explicassent, quando ait: mutationem quidem terre mutatam & arborem in Italia: nosque circa eam rem docuissent: num saporem fructus, an figura foliorum, an colore fructus, an florum varietate, an denique proceritate, breuitateque arboris. Horum enim neutrum explicat Plinius. Sed hæc candidè & obiter dicta sint, ut alii quoque qui ingeniosissimè hoc studium excolunt, suam his & inutilibus difficultatibus mentem adhibeant, eaque præsent ipsi in tanta rerum & nationum frequentia, quæ ob harum carentiam aliis plerisque denegata.

Const. Lotum Theoph. & Celtin Plin. Sabaudicè tradit *Ambroselles* vocari. Lotum Diof. Italiarum esse *Bag. lar.*, siue *Perlato*, & Bergomatibus *Romiglia* sibi *Alister*. Athen. Lotum esse aliam. Esse & Loton Plin. siue Fabam Græcam Romæ, Ceraforum penè natura. Hanc *ῥόσπρον* Theoph. falso credere nonnullos: quoniam Lotus arbor, vel Plin. teste ad tibiurum cantus expectatur: *ῥόσπρον* *ἄλλος*, & apud Pollucem etiam *ῥόσπρον* dicitur unde dicti Lothages, qui Lotum exercent. Sed dubii hæremus an R. Const. Lotus, de qua potissimum hoc capite agimus fuerit nota, & an rectè distinguat. *Alister* nomen non conuenit: quam verò plātam per *Ambroselles* intelligat, inuestigandum.

Goropius more sibi solemnè noua prodit opinione, Theoph. Cerasum, Lotum suspicatus, dum ait: Theoph. sic Cerasum describit, ut prorsus maximā eam arborem depinxisse videatur, quam Bononiæ sepius sub nomine maioris Loti conspeximus.

In Insula Creta Lotus vocatur Carauia, Gallis *Micaculser*, teste Bellon.

Lacuna Lotum Arab. *Sadar* & eius fructus Nabach dictum scribit vocari, Castil. *Almez*. Ital. *Bagaloro*, aut Cerasè diuerno. Gal. *Alister*: quæ tamen postrema appellatio Gallica neutiquam Loto competere videtur, quam vel ex Ruell. vel Matth. haurire potuit, qui idem nomen tribuunt.

Amarus quoque cum Loto aliarum plantarum

nomina confundit, nec videtur Lotum probè cognitam habuisse, ut copiosius dicitur cap. de Lauroceraso.

Lotus arbor, autore Gesn. Italis vulgò vocatur Fago, Monspeliensibus *Leum. r. de arb.* Fago, inquit, arbor, Bellonii. cura Lutetiæ iam crescit: sic autem nominat Lotum forè, quæ alio nomine Faba Syriaca dicitur.

Turn. Lotum siue Celtin Angl. *Nettestree*, id est, Vrticæ arborem, & *More tree* vocari scribit. Et sanè, si quod res est, fateri velimus, haud male quadrat comparatio foliorum Vrticæ cum folijs Loti. Minus tamen placet figura Turneri, quam sibi propriam effinxit.

Seuero edicto Gallid. in satyrico illo suo scripto, cui non truculentius debet nomen quam insensuit maledicta, Arbor inquit, quæ in Tridentino agro *Bagolaras* vocatur, vel Diof. non est, vel Diof. ipsemet Lotum ignorauit.

Itali viderint, maximeque Tridentini, an suæ *Bagalaras* competat descriptio Diofcor. necne. Matth. sanè, nec ille tantum sed & alij plures eandem facere videntur, ut patet in præcedentibus.

Lotus arbor Lobelio Lotus Diofcorideæ est, *Micoconlier* Linguagottis: It. *Bagaloro*: quæ vox aptius ad Latinam derivationem accedere videtur, quam illud *Bagolaras*, aut *Bagaloro* quæ voces nobis Gymnasiorum Collegiorumque nobiles illos Baccalaureos in memoriam reuocare videntur, ex Baccho & Lauro, aut si mauelis, ex bacca & Lauro, magno interdum labore concinnatos.

Fructus *Mirocoules* dicunt Linguagotti, ut annotat Dod. qui Loto simpliciter folia illic tribuit, atque adeo suspectum se reddit, sibi neutram rectè cognitam fuisse, præsertim quum sint alia nobis recentioribus folia quibus nostram Lotum comparemus.

Hist. Lugd. putat *Mirocoules* vocem ex Loto deflectam, quasi *μικρὸν ἄλλος ἄρβον*. Sit ita. Istud potius videamus, quod addit: Lotum esse Diof. siue Celtin Dalechampij aliorumque doctissimorum sententia.

Ex Plinio corrigendus Theoph. textus. Plinius inquit eiusdem Loti lignum ad tibiurum cantus expecti, è radice cultellis capulos, breuesque alios vius excogitari scripsit, quæ Theoph. de ligno & radice Loti secundè prodidit.

Eandem Loton Plin. arborem Syrticam rectè appellat: mox velut immemor eius historię à seipso descriptæ, Fabam Græcam vocat, eique vires eas tribuit quas Loto suæ Diof. Lotum secundam Theoph. eam esse iudicauit Dalech. quam nonnulli docti Herbarii Laurocerasum nominant, de qua cap. proprio.

Lonicerus ingentem appellationum stipatum ex Hermol. & aliis subiectum eundemque diuersarum plantarum vni tribuit Loto, quem vniuersum huc referre piget, quòd nihil in eo sit, quod non dictum & reprehensum sit prius. Maioris momenti sunt quæ Cæsalpinus ait. Lotum arborem, quam & Lotum Diof. facit, & Celtin Plinii, fructu graeolentis. Hetruscis *Baggatum* vocari. Idemque putat apud Theoph. Loti fructum Diospiron appellari, quasi Iouis triticum, ideo quia in panes coquebatur more tritici, quæ nobis coniectura ingeniosa videtur, verum in Loti fructu nihil graeolentis obseruauimus, quicquid dicat Cæsalpinus, deceptus fortè versione Diof. apud Marcellum, que videtur legisse *ῥόσπρον* pro *ῥόσπρον*, i.e. edulem. Oportebat Cæsalp. fidere potius suo gustui, quam malæ versionis Marcelli.

Fago  
Ledonier.  
Favago  
Faba Sy-  
riaca.  
Vrtica ar-  
bor.

Bagolaras.

Micocon-  
lier.

locus.

Mirocoules.  
Dad. noi.

Mirocoules  
vnde.

Theoph. if-  
lustr.

Arbor Syr-  
tica  
Plin. repræh.

Lonic. re-  
preh.

Baggatum:  
Diosp. 104

\* *Linnaeus*

Locus.

Locus TOT.

NEM.

\* *Linnaeus*

Tempus

Vires &amp;

vires.

emend.

\* *Marcell.*

not.

\* *Dal. de H.*

Lugd. not.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

Dysenteria.

Menstrua.

Capillorum

vincula.

C. Bathinus apud Matth. *Fraxinagolum* Cres-

centii esse censet.  
 Lotus arbor Germaniæ hæcenus petegrina fuit:  
 hæc tamen ex Italia & Gallia, etiamque in Gre-  
 cia haud infrequens, in Cræta & non longe à Co-  
 stantinopoli, in silva mûris cincta nascitur. Item  
 Antiochiæ in vrbe & in proximis montibus copi-  
 ose teste Bellon. Multis Italiæ locis, in agro Tride-  
 tino, Goritensi, Veronensi, aliisque etiam autore  
 Matth. In tractu Tyrolensi circa partem in qua  
 sita vrbs Tramin. Coluit aliquando in hortu Gelu.  
 Circa Monspelium arbores vidimus magnas prope  
 Buttrorum pagum. Lugd. in hortis colitur,  
 vti sicut & Geneuæ, ex semine nobis aliquando  
 n. ita. Basileæ in hortu D. Plateri: Parauij: Veronæ  
 i. Theatro. Sed præcipua specie, patulaque  
 ramosorum opacitate grata spectatur in media  
 a. ca. alni Gymnasi Nemausensis, quæ mihi speciat-  
 im in Cherlero, honorifico regio stipendio Philo-  
 sophiæ professori militanti, cum ornatis, &  
 iamiam sine dubio Viris optimis & Clarissimis,  
 tum meis auditoribus non paucis, iucundum &  
 optatum præbuit Peripato nostro vmbra-  
 culum: nullibi gratiore mihi studiorum oblectamento,  
 ac vel ob id, & æternam memoriam antiquissimæ  
 nobilissimæque illius ciuitatis, prisca illa ROM.  
 COL. NEM. nunquam non celebrando. Cræ-  
 salp. testatur in Heruulia amare colles magis  
 quam plana. Turn. Clauennæ Rhætorum, quæ  
 ad Alpium radices ingrediuntur apud veterem  
 arcem se vidisse testatur. Montb. in hortu ex semi-  
 ne nata aliquot annis durauit: at cum quorundam  
 gelu conficeretur maior eius pars, remanente tan-  
 tum radice, vnde aliquoties repullulabat, tandem  
 & ipsa victa, periit.

Floret Martio mense, autumno fructum matura-  
 tat, Septembri aut etiam ante maturum in Gallia  
 Narbonensi vidimus, locis prædictis. Septembri  
 folia flaccescunt, & nouella acquirit cum floribus  
 Vere.

Diosc. Lati arboris, tradit fructum dulcem,  
 edulem (*Glossa* ut inale legisse videtur Marc. Ba-  
 rtholomæus, qui grauius odoratum verit, eoque ipso  
 ostendit sibi Lotum eiusque fructum incognitum)  
 stomacho aptum, quique aluum sistat. *zohar*  
*serapion*: ut taceat Dal. vel Hist. Lugd. deinceps  
 dicere, aluum fluidam reddere, apud Theoph. si  
 modo sit eadem Lotus Diosc. quæ Theoph. ut  
 multi docti iudicant.) Ramentorum ligni deco-  
 ctum & potum & infusum, Dysentericis foemini-  
 que fluxu nimio laborantibus confert. Rufat fla-  
 uosus etiam reddit capillos, eosdemque defluen-  
 tes continet. *zohar* & *serapion*, habet textus: in  
 antiqua interpretatione legitur, si ex eo caput la-  
 uetur, capillos cadere prohibet. Plinius: cohibet  
 & capillum. Suspiciatur Marcellus quondam aliter  
 legi potuisse, sed suspicionis *serapion*, quo Lecto-  
 rem erudiat, non præbet. Rufandi capilli vim ha-  
 bere decocta Lati ramenta, quæ Diosc. *serapion*,  
 Gal. *serapion* dicuntur, vix alibi, quam apud  
 Diosc. & Serapionem legas. Roborare quidem  
 capillos scribit Paulus: at eosdem eiusmodi deco-  
 ctio cohiberi, & Plin. & Gal. & alij produnt.  
 Quibus autoritatibus impulsus doctiss. Sarrac. &  
 ipse cum Cornar. legendum censuit, *serapion* &  
*serapion* & *serapion* a nempe *serapion*. Quam  
 lectionem & ipse adeo serapio, hæc Diosc. verba  
 reddens, secutus videtur.

Plinius parum euariat à Diosc. in Lati viribus,  
 nisi quod alia quædam addat. Hæc Lotos (inquit)  
 quæ Faba Græca appellatur à nostris, aluum bac-  
 cis sistit. Ramenta ligni decocta in vino prosunt

Dysentericis, menstruis, vertigini, Comitialibus.  
 Cohibet & capillum. Mirum, his ramentis nihil  
 esse amari, fructuque dulcius. Fit & è scobe  
 eius medicamentum, ex aqua Myrti decocta &  
 subacta & diuisa in pastillos, Dysentericis vtilissi-  
 mum; pondere Victoriat cum aqua Cyathis tri-  
 bus. Porro si Lotus Diosc. & Theoph. & Faba  
 Græca Plinii diuersæ sunt arbores ab ea, quam  
 hic tradimus, ut quidam velle videntur: Consi-  
 derandum fuerit, an vires etiam conueniant Lo-  
 to nostræ cui fructus est Cerasi: Nolumus sanè  
 quenquam decipi: nam & hoc ingenui Scriptoris  
 est, si nullus quoque inde ad nos redundaret fru-  
 ctus.

Consulamus Galenum. Lotus arbor, inquit il-  
 les non ita multæ adstrictioris qualitatis est parti-  
 ceps: Sed & tenuium partium est, & exicatoria.  
 Itaque lignorum ipsorum assale derafæ muliebris  
 acco. modantur profluuiis, & dysentericis, &  
 Coliacis affectibus. Decoquantur verò interij  
 in aqua, interim in vino, nimirum prout vltus  
 poposcerit, nec infundantur tantum, sed & bi-  
 buntur. Quinetiam, quod pilos defluentes cohi-  
 beat, non mediocriter signum est, ipsum esse ad-  
 stringentis cuiusdam, similiter mediocriter defic-  
 eantis facultatis. Acius ferè eadem dicit, nec  
 plura.

Libet & vires Nabach Serapionis adscribere, *Nabach*  
 non quod eadem nostræ Lati inesse pro certo  
 asserimus, sed ut Lector simul etiam in promp-  
 tu habeat, quid de suo *Nabach*, quod multi putat  
 esse Lotum, licet alij aliter sentiant, prodiderint  
 Arabes. sic igitur ait Mesuah apud Serap. *Nabach*  
 frigidus est & humidus, in primo gradu, fluxum  
 cohibet, & stomachi morbus sedat. Parum nutrit.  
 Siccatus, frigidior est, sicciorque, in vtraque ta-  
 men qualitate moderatus & inbecillus. Expedi-  
 antè alios cibos eum comedi: citiusque crassi succi.  
*Abengue* apud eundem: Nabach dulcis est, bi-  
 lem soluit, quæ in stomacho est, & intestinis,  
 calores reprimat. Dosis à tertia libæ parte ad libi-  
 f. cum saccharo. *Abesari*: Frigidus est licet in  
 primo ordine, ventrem adtingit, reseruat bi-  
 lem: sed digestionis grauis, & pauci alimentum. *A-  
 tabari*: Variat eius vis in recentibus & siccis: atq;  
 recentem collectus & probe maturus, minus ad-  
 stringendi vi pollet ventremque retinet quam sic-  
 catus, propter humiditatem & dulcedinem suam.  
 Maturus itaque & dulcis, minus adstringit, sic-  
 catus, qui subacidus est, in genere tamen, vete-  
 que frigidus est & siccus in primo excessu, & ad-  
 stringens. Idem & Rafis dicit. *Isaac* vero compa-  
 rat sorbis, & ante cibum conestum appetitum  
 excitare tradit. Folia Sadar, autore *Aben Mesuah*  
 tumorbis calidis impolita remolliunt & resolu-  
 unt eos.

Auicenna Nabach prohibet capillorum pro-  
 flumium, remollit eos, confirmat radices, & ni-  
 hilominus crescere facit. Gummi eius furtures  
 extergit, & capillos rufat. Folia calidis tumori-  
 bus impolita, remolliunt eos atque resoluunt.  
 Eadem Asthmatis conferunt, & ægritudinibus  
 pulmonis. Confortant fructus stomachum: a-  
 luui cohercet & fluxus, etiamque cruentos tam  
 alui, quam vuluæ, potissimum verò eius [sautch]  
 succus. Laxatum ventriculum firmant. Fiant &  
 Clysteres ex eius decocto ad prædictos morbos,  
 & ore quoque sumitur. Accedit ad naturam Cy-  
 doniorum, pomorum & Pirorum. Nam solichio-  
 eorum substantia adstringendi vi pollet. Verùm  
 consideret Lector an quod Auic. ait, conueniant  
 Asthmatis & pulmonum morbis folia Lati, quæ  
 aliter



adstringunt. Sed fortè non adeò adstringunt, quin & partes resolucentes quasdam habeant, alioqui tumores quod ille ait, neutriquam resolverent. Legat lector caput de Paliuro Athenæi. Baccas Loti maturas aucupijs vriles dicit Matth. Ligni & radicis vsum suprà diximus ex Theoph. & Plinio.

GVAIA CANA.  
CAP. XXXV.



dulci. Flores radiatis calycibus insidentes ramis apprimuntur, mari quidem maiores: feminæ non tantum minores, sed etiam calyce illo distinctis quos nullus sequitur fructus, qui tamen maris florem filis excipit, magnitudine & colore Pruni siluestris, sapore dulci, suauis, in quo femina aliquot, Pomorum seminibus paulò maiora: eiusdem cum illis coloris, tanta densitate, vt vix dentibus atteri possint. Cortice vestitur hæc arbor tenui, rugoso, fulco. Materies ei spiritus in orbem circumata, colore cineraceo vel subcoeruleo, in omnibus à Guaiaco valde diuersa.

De hac sic scribit Matth. in edit. cum magnis figuris, Lat. Misit ad me plantam, cuius imaginem damus, Constantinopoli allatam, *Augerius de Buxbecho*, cui subscriptum erat *Dactyli ex Trapezonda dulces & gustu delectabiles*: hanc ego inter Lotorum genera annumerandam censebam, & præsertim cum legerim apud Athen. eadem de Loto scripsisse Polybium quæ de Dactylis scripsit Herodotus: nec fortasse ab re fuerit inter Lotos recensere aliam quoque plantam, quam hic Pseudolotum vocauimus. Hæc Matth. qui duas exhibet icones, vnam nomine Pseudolori, cuius folia lata pictura ostendit: alteram hoc titulo: Loti Africane species, cui angustiora adpicta folia. Idem in Comment. Ital. cum magnis figuris: At in Epitome Pseudolotus, Italicis *Loro bastarde*: arbor procera, foliis latis oblongisque, firmis, ac nebulosis, fructu Sebestenorum effigie, sed longè minore: colore per maturitatem coeruleo, pluribus intus ossiculis, sapore non ingrato: Italia peregrina hæc arbor, & rarò in viridariis habetur. Non rectè sentiunt, qui Pseudolotum hanc Guaiaci plantam esse putant. Lotus Africana altera, siue Loti Africana species eidem arbor est procera, foliis alterius Loti latoribus, baccis rotundis, acuminato tantum cacumine, colore coeruleo subnigricante. Hæc pe-

diculis carè, calyculis tamen ima patre obductis, perinde ac glandes & Mixa, arboris ramis & surculis seriatim coherentibus. Habentur arbores multis in locis in Italia, è longinquis tamen regionibus allatæ. Aberrant qui hanc Loti speciem Guaiaci esse plantam contendunt.

Hæc historia Matth. satis demonstrat, quantum fidei tribuendum ipsi in Botanica, quicquid tandem de ipso eiusque scriptis sentiant eius Glossatores, & qui se eiusdem patronos profitentur. Is commentarijs editis anno 1565 & anno 1568. Lotum Africanam non describit, sed nuda icone angustifoliam facit. At anno 1581. Latifoliam pingit, parum differentem ab eius pseudoloto, atque adeò latoribus tam dicit folijs, quam Pseudolotum. Vtramque Lotum describit, ac proceras ait arbores in Italia peregrinas: differentiam nullam tradit, vt qui nec viderit, nec nouerit. In hist. Germ. quæ conscripta 1563; vnicam proponit iconem cum latoribus folijs ac rotundioribus, cui titulum fecit *Vermeinter Zurgelbaum* / Pseudolotus, de qua scribit: in Italia esse arborem, quæ existimetur Lotus vera: verum multas deesse notas, folia ferè similia Piro, firma: baccas ferè multas simul iunctas, visu pulchras, cæruleas, acuminatas, non ingratas: quosdam existimasse Guaiacum, quibus non assentiantur, quod sciat diuersam eius esse formam edoctus ab Hispanis & Lusitanis. Ecce Comicam profectò vnius arboris metamorphosin, seu diribitor quidam Botanicus pro suo arbitrio, (quod ei propemodum familiare ac solemne, vt passim hoc opere ostenditur, vni & eidem specie, nunc hanc, nunc illam tribuit figuram: fusque deque habens, quod humanæ sapientiæ antistes Arist. non contemnendo edicto cauet, *Species non esse temerè multiplicandas*.

Camer. ad epitomen Matth. duas nouas adposuit icones, eaque differentes, sed longioribus folijs vtramque. Idem id hist. Germ. vnicam ponit, scribens Pseudolotum Matth. esse, alijs Lotum Theoph. veram: in Italia viciari Guaiacanam.

Gefn.: Guaiacum arbor, quæ Patanij hoc nomine in horto medicorum ostenditur: quam audiuit scribit, nasci in montibus circa Veronam, & è ramis eius aqua materaris, rusticos viscum parare: atque idè *Viscaginem* ab exuditis quibusdam ficto nomine, quoniam Guaiacum non sit. Fructus eius immaturos adstringere, maruros verò ita dulces esse, vt ferè nauseam moueant. Est & in Córdi hist. adposita icon huius, pro Guaiaco, sed perperam. Nec vsquam legimus, nec audiuius à quoquam [quod quidem recordemur] Guaiacanam circa Veronam prouenire. Qui de ea Scribunt pro peregrina tradunt, tantum abest, vt rustici circa Veronam ex ea viscum parent. Sed fortè nominis ambiguitas decepti Gefnerum, virum alioqui diligentissimum & in tradendis suis placitis candidissimum: ex Agrifolia enim, quæ Lotus dicitur quibusdam, viscum parari solet.

Guaiacum à Fallopio fatam (Guaiacanam) & creditam in horto Patauino, quam Commentator sibi Constantinopoli missam iactat, non aliam certè esse, quam Patauinam, seu Guaiacum Patauinum, Veram Lotum Theoph. Pena & Lob: volunt.

*Ermelinus* Casalp. autòre, arbor peregrina: quidam Guaiaci lignum esse putauerunt. *Ermelina* in Herbaria.

Quid si apud Plin. dicamus inter Mala, esse Tuberum genus, quod Sericum cognominatum à colore? Gal. Serica ab insolentibus tantum cibo expeti testatur. &c.

Guaiacum  
Matth. not.

Loti Asi-  
cana  
Angustifolia  
Latifolia  
Pseudolotus.

Lotus Vera.

Guaiacana

Matth. in  
postura.

Guaiacum

Viscago.

Gefn. not.

Guaiacum

Guaiacum  
Patauinum.  
Lotus Vera  
Theoph.

Ermelini.  
Ermelina.

Tubera.  
Sericum.

Hist: Lugd: Tertia Loti species, quæ etiam (inquit) Lotus non esset, tamen in Loti generibus numerata est, eaque celebrata à Plin. Lib. 16. c. 30. Lotus & Faba Græca dicta, quam Romæ; à suauitate fructus siluestris quidem, sub Cerasorum penè natura, Loto appellauit. Hetruscis hodie vocatur *vna d'India*, præsertim Florentiæ, vnde aduehendam curauit Dalech. Fructu Cerasi non absumili, nucleo duro, qui in Ceraso tenet est ac fragilis, quod Theoph. annotauit l. 3. hist. c. 13. cortice diluto, rubore iucundo, & quo verisimile est pelles tingi posse, radice lanas; vt mirum sit Matth. suæ Loti cortici tribuisse quod Plin. de huius cortice literis prodiderat, cuius tincturâ colorem rufum fieri alibi scripsit. Ramenta ligni decocta in vino prosunt Dysentericis. Sunt qui, nec vanâ quidem ducti coniecturâ, hanc arborem Theoph. *diopryon* esse censent, fructu Ceraso simili, duro intus & solido nucleo, non vt in Ceraso fragili: maximè cum Plin. Theophrasti verba singula Latine solitus exprimere, Fabâ Græcâ descriptâ, nusquam alibi Diopryi meminerit. Plin. l. 24. c. 2: Fabam Græcam cum Loto primi generis confundens, eadem & quæ Diof. Loto suæ tribuit. Hæc est Faba Græca (addit eadem Hist. Lugd.) quam Bellon. à Constantinopol. Cerasum Trapezuntiam vocati scribit.

Porrò eadem Hist. Lug. duas habet figuras ex Matth. vni titulus Diopryos siue Faba Græca Latifolia, Pseudolotus Matth. alteri Diopryos siue Faba Græca angustif. seu Lotus Africana.

Idem tradit, Laurocerasi fructum accepisse se Byzantio, nomine *Trabizon Curmasi*, licet simili forma; colore & sapore præditum: bina aut terna habuisse sub pulpa nullo putamine inclusa semina, plana, spadicei coloris, plurimum accedentia ad Loti Africana, vulgò *Guaiacona* nuncupatæ semina. Dixerat autem iam antè in Pannonicis, Lotum Africanam vulgò esse Guaiaconam. Semina verò Clusio missa existimamus fuisse Loti Africana, & non Laurocerasi; cui ossicula singularia, multum differentia à Guaiaconæ seminibus.

Tabern. duas Loti species facit. Vnam Lotum Africanam: alteram Pseudolotum à Matth. descriptâ: *Surgelbaum*. Græcè *καλὸς δ'ιδρυς*, Arabicè *Sadur*:

Lat. *Lotus Afric.* & *Pseudolotus*. It. *Loto albero*. Item in icon. Lotus Africana, & sub altera figura, Pseudolotus Matth. Verminter *Surgelbaum*. Egregiè sanè verò, si diis placet. Ambas Matth. figuras habet Guaiaconæ, verum nomina à Matth. tributa Loto; is miscet cū Guaiacona, atque adeò huic etiâ tribuit, maiori ne ignorantia an oscitantia, Lector iudicet. Nec ullam videmus rationem, cur vna dicatur Lotus Africana; altera Pseudolotus, quum eiusdem plantæ figuræ videantur, aut saltem parum, & foliorum latitudine tantum, differentes, in quò quidem Matth. holium imitatus est, quàm rectè, norunt periti: Sic unus error plures parit errores; vt in promerbio est.

Guaiaconam iam à pluribus annis colimus in Il. E. C. horto Montb. sed hæcenus nec florem nec fructum protulit, quia quotannis ferè gelu maior ramorum pars conficitur. Prouenit nobis ex semine quod à D. C. Bauh. Patavio missum accepimus nomine Loti Africana; Matth. Misit etiâ Vespuntio ad nos Cl. D. Chiffletius, eiusdem vrbis *degiado*, titulo Guaiaconi. Argentinae in horto D. D. Melchioris Sebizzii medici & professoris; amici singularis, pulchram vidimus arborem cum fructu: In horto Patavino colitur: Basileæ, in hortis Plateri, Zuingeri, & Io. Heintzman Pharmacopæj. Lugduni etiam prouenit nobis ex semine, quæ floruit Maio: Colebant ibidem & alij in hortis; nec siluestris ibi reperiebatur, vt Pena & Lob. ex Valerandi Donrèz testimonio scribunt. In illustri illo horto Stuchardiano magnæ arbores maris & fominæ (quæ sterilis) conpiciuntur: ex quarum materie pulchella vascula tornanda curauimus.

Licet parum fidei tribuamus hoc loco Matth. adscribemus tamen vires, quas Pseudoloto tribuit, sic tradens: Qualitates eadem ferè illi sunt, quæ legitur Loto tribuuntur. Vires quoque eadem illi sunt; si rerum experimentatoribus credimus. Item sunt qui velint Lotum Africanam alteram eiusdem tum Loto pollere viribus, id quod nos quoque putamus. Sic ille. Sed quoniam sunt illi experimentatores: Mancant itaque hæc tantisper talia; qualia sunt, donec aliquid certius resciscamus.

## FINIS LIBRI SECVNDI.







# HISTORIÆ VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER TERTIVS.


QVI NVCVM EST, ET EARVM QVÆ VEL FACIE ARBORIS, AVT FRVCTVS, AVT NOMINE SOLO CVM HIS ADFINITATEM indeptæ, siue indigeat, siue peregrinæ.



**D**E Pomorum censu & Nuces sunt. Sed harum quoque acceptio ampla & multiplex. Kapa sane (Nuces) & Artici, & alij Scriptores communi vocabulo fructus omnes, operimento duro rectos appellant. Harum intus corpus, foris lignum, ut Plinius imicat. Sed sunt, quibus & extra lignum caro vel pulpa, edque vel edulis, vel cassa & magna ex parte neglecta. Prioris generis pleraque persecutus liber precedens, nimirum nubes plerasque pulpa eduli obiectas, quemadmodum primus Poma, que magna ex parte sunt edendo: Ergo eas deinceps persequemur, que ~~quædam~~ habent vel ex toto vel ex parte. Neque enim operimenti modus unus. Aliter Nux Juglans obtegitur, aliter Auellana nostrates, aliter Indica, aliter Pistachia, aliter Staphylodendros. Sunt fortè inter peregrinas quibus & nullum tegumentum ossi obductum: quedam & tota lignum, aut corpus ferè uniforme. Operimentum, vel coriaceum, vel pulpaceum: & hoc rursus vel edule, vel non. Edule dicimus ad cibum suave, non medicatum, quale Juglandis, aut Auellanis plerisque: non alicui animantium, nec homini. In Exoticis tamen nondum de istis plene innotuit, quod ea magna ex parte pulpa vel tegumento exuta ad nos importentur. Sed rem ipsam aggrediemur à Luglande Nucum vulgarissima.

## NVX IVGLANS.

### CAPVT I.



go, & in rimas altas dehiscente.

Tom. I.

**P**ROCERA arbor est Juglans, multis prelongisque nixa radicibus, trunco ad bimum tantumque cubitorum complexus sæpius crassescens, materie ampla, ruffa, vel subfusca, multis exiguis segmentis scarificata, quibusdā parvibus undulatis crispa, robusta: firmis, vastisque ramis brachiata, cortice cinereo, crasso, lævi, per senium hiul-  
disponuntur, coniugationes claudente folio impari, quorum singulāria ampla, sesquipalmeum longa, palmum ferè lata, principio & muctone angustiora, venis obliquis à medio nervo deductis, pulchrè viridantia, odore iucundo, ferè Laureo, sed grauiori & vehementi, sapore adstringente. Iulū profert longum, multiplici callo compactilem, cuius flaccescentes panicule breui decidunt: tum flos emergit herbaceus, totidemque caliculacea tegumenta, quot flores petiolo contrahuntur, quibus singulis singulae includuntur Nuces. Nucem siue fructum [quales simul multi confertim ex eodem pendent pediculo] iam perfectiorem tegit pulvinatus calyx, acerbi & amari saporis, nec sine acrimonia, nigro colore manus inficiens, cui subiectus cortex lignosus, rugosus, in duas carinas apertilis, nucleum continens in binas partes ad medium ferè fissum, & penè quadripartitum, seuolutionibus cerebri similiter inæqualem, primò mucosum, ac insipidum ferè, deinde per maturitatem calliosum, candidum, dulcem, cuticula pallida testum, exortum trahens ex candida & ex acido amari-

Iulus.

Flor.  
Fructus.

Nucleus.

X

cante quadam substantia pulposa, cuius terrestrior portio in lignea vel ex ligneo membranacea quadam nucleorum dissipatione abit, qualibus tenuioribus interior ossis cavitata magna ex parte obducta est. Integri & maturi magnitudine minoris aut mediocritatis Persici & pulpa viridi, seu integumento externo puluinato, [quem Festus vocat *Culeolum*, quasi exiguum *Culeum*] atque carnosio dempto, vicia ferè latiores, & hac ipsa latitudine longiores, ex rotundo in oblongum subumescientes, sed delumbata vtrinque quā vaiuorum commissura est circinatione rotundi. Sunt & vicia non ampliores: in figura naturali, aliæ rotundiores, longiores aliæ.

*Fructus  
varietas.*

Huius porro fructus varia & magna ex parte monstruosa est varietas. Nux enim Iuglans sua naturali & consueta constitutione bivaluis est, ex duabus carinis æqualibus commissis constituta. Nobis verò multa sunt ad manus, plures obferuatæ, vniualues, bivalues, sed non medio tenus, vti communes triualues: idque diuersa proportionem, valua maiore reliquis, vel geminæ vel tripartitæ maiori aliis æqualiter tripartita, aliis inæqualiter, vna integra, altera gemina, & hoc etiam variè.

*Nux nana*

*Gemina*

Est & quæ nulla nec valua nec commissura insignis, sed cui ferè in modum, ex integra testa constituta. Sunt & nanæ, Auellanam medietatem non excedentes. Geminas habemus, tam firmiter & pressim coalitas, vt integras separare non sit: & integra potius duplex, si figuram spectes, quàm ex duabus constituta videatur, ni in signis ille sulcus per medium ambitum speciosè diuideret.

Breui mirandâ figurâ luxuriâ vel in hoc fructu naturam lusisse certum. Reliquas differentias speciales postea dicemus, hic enim fructus tantum varietatem, magna ex parte monstruosam, paucis insinuasce sit satis.

*Autorum  
placita at-  
que Syno-  
nyma.*

Cæterum difficile est pronuntiare & pro certo adfirmare, quid sit Iuglans aut quomodo vocetur apud Theophrast. expressam enim & specialem eius descriptionem non inuenimus.

Fortè lib. 3. cap. 7. meminit, nomine *περικυβήτος*, de qua ait, earum germina in vnum foliū finiri. Et Gaza quoque Nucem Iuglandem conuerut. Scaliger tamen annotat, haud satis esse vertere, sed vertendum esse in Persica Nuce: quæ species sit in Nuce, sicut Pontica & Græca. Non repugnat tamen Scal. esse Iuglandem, alioqui refutasset: non enim mos eius præterire quicquam, quod reprehensionē mereatur: sed verbis Theophrasti auiam suam significationem relinquendam censet: & rectè. Theophrast. cap. 18. lib. 1. ait: Quorundam semen statim post inuolucrum ambiens subest, vt Palmæ, nuci: *καρύς* Græcè habetur, & Scal. vult interpretandum Iuglandis: non tamen existimamus, hunc locum posse conuenire Auellanis, ideo lectores conferent quæ paulò post de nuce Euboica Theophrast. scribemus, quæ fortè non alia, quàm Iuglans. Scimus Gazam diuersis in locis *καρύαν* interpretari Iuglandem: verum ea loca, & quæ *καρύς* *ἀντικαρυκίης* habet ad Auellanas retulimus: *διὸς ἐλάανον*, quæ quibusdam Iuglans existimatur, dicemus capite de Castanea. Nux Iuglans, *καρύς βασιλική* Dialect. c. de Centauro magno: & cap. proprio: *καρύς βασιλική*, *ἀντικαρυκίης* *καρύς*: Et cap. de Pæonia, *βασιλική καρύς*: quando ait *καρυάειν τὸ μέγα φύλλον ἔχει καρύς βασιλική* *ἴμια*. *καρύς βασιλική* Gal. Nux regia (sic interpretat reddit) eidem lib. de pond. & mens. pendet drach. quatuor.

*Nux In-  
glans.*

Cato Nuces caluas, Auellanas Prænestinas & Græcas habet: An vna harum possit esse Iuglans, incertum. Varro apertè Nuces Iuglandes appellat, quando inquit: lib. 4. de ling. Lat. Nux Iuglans, quod hæc Nux antequam purgetur, similis glandi. Hæc glans optima & maxima ab Ioue & glande Iuglans est appellata. Eadem, Nux, quod vt nox aërem, ita huius succus facit corpus atrum. Hæc ille. Ad quæ postrema Scalig. Alii, inquit, à nocendo Nucem dictam volunt, quomodo & Græcè quoque *καρύς* *ἀντικαρυκίης*. Est autem vox Syriaca *Luz* sed L. in Nabit, vt *Lympha*, *Nympha*. Idem Varro in Geop. ait: Si Iuglandes magnæ crebra, finitimæ, fundi oram faciunt sterilem. Item: Nucem Iuglandem, quæ citius promas, iucundiorē vtat, quod vetustate fiat aridior. Eadem in arena seruandam præcipit. Iuglandem & Colum. dicit & Palladius, vti suis patebit locis.

Apud hunc speciatim obseruauimus vocem Tarentinam manifestè competere Iuglandi: quia nulla ficta mentione vilius Nuci præterquam Iuglandis, dicit: Si Tarentinam facere volueris & c. Clarum quoque eandem vocem non tantum de Iuglande dici, verum etiam de aliis nucibus, vt sit epitheton diuersarum specierum, vt patet ex editione Columellæ, & dicitur quoque cap. de Auellana. Nuces Virgilius suo quoque celebravit carmine: Ecl. 8.

*Mipse nouas incide faces, tibi ducitur uxor:  
Spargere marite Nuces, tibi deserui Hesperus  
æcan.*

Spargebantur autem olim in Nuptiis boni ominis ergo, quod hæc essent in tutela Iouis, cuius felix erat cum Iunone matrimonium: Indèque & Iuglandem quasi Iouis glandem dictam volunt. Alioqui etiam Nuces spargere ad aguliter dicitur, pro relictis nugis & puerilibus exercitiis, ad grauiora se conferre, quod Persius insinuasce videtur: quando ait.

—Et Nucibus sacinus quacunque relictis  
Cum sapius patruus.

Et Catullus lepidè:

*Da nuces pueris iners  
Concubine: satis diu  
Lusuri nucibus: lubet  
Iam seruire Talasio.*

Virgilius verò etiam prædictiones ex Nuce Iuglande desumptis videtur: sic canens: Georg. 1. Contemplator item, cum se Nux plurima syluis induet in florum, & ramos curuabit olentes: Si superant satius, pariter frumenta sequentur, Magnaque cum magno veniet triuitia calore. At si luxuriâ florum exuberat ombræ, Nequiquam pinguis palea teret area culmos. Curtius Nucem interpretatur hoc loco Nucem Amygdalum: sed quæ id ratione, vel quæ saltem apparenti nondum videmus. Considerent lectores, an per florem Virg. non intellexerit Iulos Iuglandis, & an Amygdalus propriè habeat ramos olentes. Aut quis vnquam Amygdalum simpliciter vocauit Nucem? quis eam in syluis crescere dicat. Crescit sanè Nux, si rariis in syluis, in syluarum marginibus frequenter.

Sed attendamus quid Plinius de hac tradat. Ab his (Sorbis) inquit locum amplitudine vindicauerunt, quæ cessere auctoritati Noces Iuglandes: quanquam & ipse nuptialium Fecenniorum comites, multè in Piceis minores Vniuersitate, eademque portio ne ampliores nucleos. Nec non & honor his naturæ peculiaris, gemino protectis operimento, puluinati primū calycis, mox lignei putaminis. Quæ causâ eas nuptiis fecit religiofas



tot modis factu munito: quod est verisimilius, quam quia cadendo tripudium sonumve faciant. Et has è Perside à regibus translatis, indicio sunt Græca nomina. Optimum quippe genus earum Persicon atque Basilicon vocant. Et hæc fuere prima nomina. Caryon à capitis grauedine, propter odoris grauitatem conuenit dictum. Tinguunt cortice earum lanæ, & rufatur capillus, primum prædeuntibus nucalis. Id compertum infectis tractatu manibus. Pinguescunt vetustate. Sola differentia generum in putamine duro fragilive, & tenui ac crasso, loculoso & simplici. Solum hoc pomum natura compacili operimento clausit. Namque sunt bifida putaminum carinæ, nucleorumque illis quadripartita distinctio, lignea intercurrente membrana. Cæteris quicquid est, solidum est, vt in Aucellanis, & scipso Nucum genere. Cato Græcas nominat, quas quidam & in Iuglandium genere seruant. Adiecit præterea Aucellanas, & Galhas [Caluas ex Ver. gloss. Turn.] Prænestinas, quas maxime laudat, & conditas ollis, in terra seruati virides tradit. Nunc Thasias & Albenfes celebrantur. Et Tarentinorum duo genera, fragili putamine, ac duro: quæ sunt & amplissima, & minime rotundæ. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Sunt qui honoris nomen interpretentur, & louis glandem esse dicant. Nuper Consularem virum audiui, biferas & Iuglandes nûces habere se profiterentem. Hæc Plin. qui & diuersis locis de Nuce Iuglande hæc habet. Succus pinguis Nuci Iuglandis: putamine clauduntur: his intus corpus, foris lignum: iisdem putamen statim recedit à ligno, extra gemina geminantur vicia: grauis & noxia etiam capiti humano, omnibusque iuxta satis Iuglandium vmbra, quæcunque atigit, non dubiè venenum est.

Potè quod de tripudio ait Plin. id ita habet. Atresfamilias sponti cum domesticos pueros metitioros ab officio turpi dimitterent, nûces dabant, quas spargerent nuptialia fescennina cantantes.

Apud Græcos, eodem instituto nouus sponfus *ἡ νυμφόσχημα*, Iuglandes, Amygdala, & Nûces id genus alias spargebat, vt putant Grammatici, nuptæ clamor ne audiretur. Scalig. in Catul. lib.

Duras apud Festum Titinnius *moracias* vocat, unde diminutiuum *moracillum*.

In veteri glossario Calua Nux, *καρυὸν βασκικόν*. Turnebo Calua Nux alia est. Plautus in Calceolo Molluscam Nucem super eius dixit impendere tegulas, quam Iuglandem quidam interpretantur, & Plinius citato loco ad eorum genus refertur videtur.

Scaliger reprehendit Plin. quòd solius Iuglandis nucleum binis legi valuis scripserit. Nam & in Pistaciis (inquit) vestigia quæ per seipsa hiant, aliquando vetustate. Molluscæ sanè Iuglandis (addididem) omnino genus, aut cum Tarentino idem.

Illud animaduertentes ex eiusdem obseruatione, *ἡ βασκικὴ* apud Theoph. lib. i. c. 18. hist. distingui *ἡ βασκικὴ*, tanquam diuersum à Iuglande, vt intelligas errorem Gazæ, qui lib. 5. nec semel *ἡ βασκικὴ* Nucem pro Iuglande est interpretatus, dum Plinii auctoritatem nimis securus famæ sequitur. Nec temerè quis dubitauerit, an quæ Plin. de Tarentinis dixit, intelligenda de Iuglande, vt sanè intellexisse videtur Ruell. & Curtius, quorum hic ait: Est aliud nucis Iuglandis genus, quod Tarentinum dicitur, quod ita molle est, vt vix at-

tractatum frangatur: à Tarento, quod est Sabino- rum lingua molle. Ad quod alludit Horatius:

—Et molle Tarentum.

De qua in libro Fauorini, authore Macrobio, sic reperitur. Itémque quidam Tarentinas oues, vel Nûces dicunt, quæ sunt Tarentinæ. Tarentinorum tamen Plin. duo genera posuit, vt prius dictum.

Esse præterea quoddam genus Iuglandium *Iuglandei* Nûces sine putamine edentium Africanus au- *sine putamine* thor est, quamquam arte id fiat & cultura.

Rarum & propemodum ostento proximum, quod Tragus refert Valoniam, qui locus ad Rhe- num situs est, Iuglandem repertam, quæ ante diem D. Ioan. sacrum (qui non multo ante solstitium æstiuum incidere solet) neque folia, neque Nûces ostenderet. Cum verò id tempus adisset, patrem reliquis nucibus fuisse, quod ad fructum & folia attinebat, id quod singulari naturæ miraculo factum credit.

Apud eundem Tragam in margine scriptum inuenimus, eiusmodi arbores Gengenbachii binas extare. Tales sanè aliquando etiam circa Tigurum vidimus. An quia impedimentum ali- quod habeant, vel à radice, vel à solo, quo tardius germinet? An verò species quædam peculiaris naturæ, vel arte aliqua ad hoc comparata?

Cæterum quod Plin. de bifera Iuglande obiter tetigit, haud vanum videtur. Nam & H. imol. doctus & fide dignus Scriptor, biferas Iuglandes Siluatiano Patauini agri viculo prouenire, satis constare tradit.

Eiusdem obseruationis est, germinare hanc arborem, non cacumine, vt maxima pars arborum, sed lateribus, impulso priore pullulo, quæ forma & caudex totus & prægrandes rami crescunt.

Mutari in Quercum senio nonnulli produnt: quod nobis sanè fabulæ aut Græciæ mendacii specimini propius esse videtur, quam vel rationi, vel experientia, quibus non potest non perpetuò incedere stipata veritas in naturalibus. Nam de iis quæ prodigiosè transformantur eos sollicitos esse Iunamus, qui se Magos, aut Magiæ professores gloriosè buccina proclamant.

Tarentinas duriores & amplissimas, à frangendi morâ & *moracillas* à quibusdam vocari, idem Hermol. tradit. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Idè Macrobius qui Persicum vulgò dictum, Molluscam esse putat, apertè hallucinatum, cum is non de Persico, sed de Nuce Regia & Iuglande, quæ sit è Perside conuecta primum ad nos, *mollusciam* intelligat: nam à quibusdam Nucem Persicam vocari tradit, Sueui hominis doctissimi testimonio fretus.

Thasiam quoque Nucem atque Græcam Amydalarum esse generis Cloatus existimat.

Prænestinam Macrobius eandem esse cum Aucellana Vartonis & Neuii auctoritate meminit.

Iuglandem Diosbalanum Theoph. vocasse author est Cloatius. Sed certè Diosbalanos Castaneam Diosc. significat. Proinde non parcijs errauerit Non. Marcellus, qui Iuglandem pro sylvestri nuce interpretatus est.

Persicas & Regias Græci, vt tradit Marcellus: Romani verò Iuglandes in genere Nucum eas dixerunt, quas nunc priuatim Hetrucia gentisque aliæ multæ Nûces nominant. Nûces Ponticæ, siue vt Theoph. ab Heraclea Ponti ciuitate semper appellat, Heracleoticæ.

Iuglans, (tradente Ruell.) Græcis Caryon Basilicon, id est, Regia Nux, interdum Persica, Euboi-

*Iuglandei sine putamine.*

*Iuglandis rari.*

*Bifera.*

*Mutatio in Quercum, excluditur.*

*Moracia Molluscæ Macrobi error.*

*Thasiam Nux. Nux Græca. Prænestina.*

*Diosbala. mos Theoph.*

*Nonij error. Persica. Regia.*

*Nûces. Caryon Basilicon. Persica. Euboi-*

câque, Gallis *Noierus* dictam. Nucis callosum herbaceumque corticem *Gullocam* dicunt: Tenuis tunica, *Nauci*, vt quidam volunt, nominatur. Inferiori sui parte fertiliores sunt *Iuglandes*. Sed mirum est, quod prodiit, *Quercum* & *Iuglandem* tam pertinaci odio diffidere, vt iuxta *Nucem Iuglandem* depacta moriatur, quâ mutari in *Quercum* senio nonnulli tradant. Eandem esse *Nucem Persicam*, *Regiam*, *Iuglandem*, fatebitur, qui bonos autores euoluerit. Optimum earum genus *Pericum* atque *Basilicon*, in eo genere, quæ mollior sit, & putamen frangat, *Mollusca* dicitur, vt *Tarentina* quæ nuda cortice, vel molli & fragili prodeat putamine.

Nos quod de odio inter *Iuglandem* & *Quercum* scribit *Ruellius*, facile credimus. *Iuglans* enim citò crescit, & magna sua umbra *Quercui* officit, amplissimisque radicibus vicinæ cunctabundæ tardius crescenti alimentum subripit. Sed alterius in alteram mutationem, tanquam fabulosam respicimus. Erroris autem *Macrobi* causa fuit, quod ipse putauerit idem esse *Malum Persicam* & *Nucem Persicam*.

*Brueyus* Nuces à nocendo ideo dictas putat, quod frangendo dentibus noceant: quasi verò huius noxæ causa primariò ab ipsa depêdeat. Nuce, & non ab homine, qui sud in morem dentibus conterere velit, quod possit alia ratione. Magis aridet illa medicorum, quod edendo aut nimio vsu noceat, vt patebit in viribus: maximè verò, quod satis nocere credatur, quod certè sensisse videtur *Ouid.* in *Eleg.* de Nuce, cum ait.

Quoniam sat a ledere credor

Cultus in extremo margine fundus habet.

*Non. Marcellus* vt annotat *Curtius*, *Iuglandes* Nuces agrestes interpretatur: Sed hoc quidem minus bene, si vocis etymon consideretur. *Maurem* *Varroni* dicitur, quod hæc antequam purgetur, glandi similis sit: *Macrobio* autem à luuando & glande. C. enim *Basilus*, vt hic scribit in lib. qui de verb. signif. inscriptus, *Iuglans* perinde ac *Iouis glans*. Græcè autem *Cloatio* *Verrio* in lib. à Græcis tract. *ἡ δὲ βάλανος*, vt etiam *Theophr.* ait. Græcorum enim nonnulli imitationē *ἡ δὲ βάλανος* *ἡ δὲ βάλανος*, id est, capitis grauedine. *Plutarch.* in *Sympo.* quod ipiritu graui & capiti nociuo sit. Ab hac voce *Caryatides* (de quibus *Vitruuius* lib. 1.) dicitur, *Luctatius*, vt aliis placet *Lactantius*, apud *Stapum* in *Thebaide* à Nuce arbore nominatas scribit. *Philostatus* in iconibus *Iuglandes* *Castaneas* appellasse videtur. *Pontica* Nux etiam & *Heracleotica* dicitur. *Plin.* verò earum optimum genus *Basilicum* & *Pericum* esse dicit. Hoc autem vltimum *Mollusca* Nux dicitur, quod cæteris generibus mollior sit, vt voluit *Macrobius*, cuius putamen faciliè rumpatur, de qua *Plautus* in *Calceolo*: *Molluscam nucem* &c. Hanc verò ille errore, vt *Nicolaus Perotto* episcopo *Sypontino* placet, putat dici ex *Sueui* autoritate, quæ *Malum Persicum* est. Sic enim hic in *edulio* quod *Moretum* inscribitur.

*Mollusca* hac Nux est, ne quis fortè inscius erret.

*Malum Persicum*. Non enim his, vt hic arbitrat, de *Persico* teneriori *Pomo* agit, sed de Nuce *Persica*. In *Moreto* enim *Poma* tenera poni non solebant, sed *Persica* Nuces. In *Perotti* sententiam irem, si cuiusdam classici autoris monumentis doceret, in *Moreto* non *Poma* tenera, sed *Persicas* solum Nuces, id est, *Iuglandes*, poni solitas, quod ex *Virgiliano* *Moreto* non probatur. *Aufonio* Nux simpliciter dicitur:

Nux

Et duplici defensa putamine quinque genus Nux.

*Culeola* *Festo* cortices *Nucum* viridum sunt, dicta à similitudine *Culeorum*, quibus vinum sine oleum continetur, cuius diminutium videtur *culeocæ*. Eidem verò auctori *Iuglandium* *Nucum* summa & viridantia putamina sunt.

*Nace* *Festo*, vel *Nauci* *Pompeio*, nucis putamen est, aut oliuæ nucleus, vel medium *Nucum* dissepimentum, id est, membranula illa, quæ in medio *Nucis* interstita visitur: denique cuiusvis putamen *ἡ δὲ βάλανος*, nauci vocatum ex illi manet. Quidam à voce Græca *νύξ*, quod pellem caprinam declarat. *Sosipatro* fabæ granum est, cum se aperit. *Nauci* enim facere & nauci esse deriuantur, quod esse nihil esse, & nihil facere. *Plautus* etiam protulit: *Vitam suam vitiosa Nuce non emam*, quod prouerbialiter dicitur, nec minime quidem. Apud *Aristoph.* *unica* Nux emere dicitur.

*Regia* *Nux Caryon*, ed quod, [vt scribit *Goropius*] *Car-bur* ad vnguem *Cimbris* designet ipsius quod earum est, custodiam, ideo tessera matrimonii. *Nucleum* *Carn* vocamus.

*Iniurius* est *Plinius* *Iouis glandi*, dum à capitis grauedine, quam inducat, nomen accepisse dicit, quod tantum abest, vt verum sit, vt ne hoc quidem ipsi demus, hoc nomen esse peculiare: imò commune non cæteris modò *Nucibus*: sed etiam *Amygdalis* esse asseramus. Neque verò *Iuglandes* magis capiti nocent, quàm *Amygdala*. Quid dico nocent? Cum vtrumque genus robur capiti addat, vt in medicorum scholis nemini dubium esse credo.

*Latinis* (ait idem) ratio nominis *Nucum* ignota, tamen & ab horum quibundam ed ventum sit, vt à nocendo *Nucem* deriuent, quoniam satis noxiam esse dicant. Absit omen, vt fructus dulcissimus tam inauspicato nomine à vetustissimis fuerit vocatus. *Nuces* teneræ non parum *Myrobalanis* omnibus præstantiores. *Nux* *Cimbris* *Nor* vel *Nut*, à quo non mirum est *Latinos* *Nux* fecisse, cum *Alemanis* quoque *Nuß* inde fomentum dicitur à *Nort*, quod necessitatem significare scimus. Hæc *Goropius*, cui facile concedimus fructum *Iuglandis*, siue *nucis* nucleum esse innocuum, non tamen idè concluderimus, vt malè *Goropius*, *Plinium* scilicet *Iouis glandi* fore iniurium: is enim, nostro iudicio, non intelligit per *Caryon* fructum, siue *nucem* à suis putaminibus separatam (que non habet odoris grauitatem) sed *Caryon* cum suis putaminibus, vel ipsam potiùs *Iuglandem* arborem cum suis frondibus, quibus vtriusque gravis odor inest.

*Monachis* in *Mes.* *Nux Alexandrina* est *Nux Iuglans*.

*Corn.* *Nuces regias*, inquit, nostri [Germani] *Nuces Italicas* nominant. *Placotomus* annotat, absolūtè, pro *Iuglande* sumi, vt ab *Ouid.* de *Nuce*. *Baptista Fiera* in *Cœna*:

Mille Nuces poterat dixisse, sed unica Iuglans Nux dicta est, lingue tam noxiosa sua.

*Et Rob. Const.* *Latini* cum *Nucem* simpliciter s. licent, *Iuglandem* intelligunt, *ἡ δὲ βάλανος*, *ἡ δὲ βάλανος* arbor ipsa, id est, *Iuglans*. *Macrobius* ementita *Theophrasti* autoritate, *Iuglans* inquit, quasi *Diuglans*, id est, *ἡ δὲ βάλανος*, sicut *Theophrast.* ait. *Trago* *Nux Persica*, *Nux regia*, Græca, *Enboica*, *Caryon*, *Iuglans*, *Iouis glans*, aut *Diuglans*: *Nux*, & *Nux Iuglans* plerisque hebraicis. *Hebr.* *Acggos*, *Cantia. 6.* In *Hierem.* principio [vt *Diu. Hieron.* in *Ecclef.* caput 12. scribit] *Baculus Nuceus* s. *Saced* si varietur accentus & *Nucem*, significat & Vi-



& Vigiliis in Ecclef. 70. Interpretes pofuerunt *ἡ δὲ ὕλη* idem verbum *Saccæ*, quod, in Hierem. principio eft: fed ibi in Nucem verfum eft, hic in Amygdalum: de qua etiam cap. de Amygdalo. Arab. *leuz*, *Leuz*, aut *Giauzi*. Serap. cap. 162. *Leum*, id eft, Nux. Germ. *Nußbaum*: Fructus, *Baumnuß*, *Welfchnuß*, *Nuß*. Gal. *Ἰοίς* fieri, *Ἰοίς*. Belg. *Vloetboom*, *Vloetler*: *Ofenore*, *Walnere*, *Walfchenore*: Iuli nucum, *Cattens*. Hifp. *N. gal.*, *Nuez*. Catal. *Nous*: Portug. *Noz* & *No-guerra* arbor. Bohem. *Wlafky Orecy*. Angl. *Walnut tree*. fructus *Walnut*. Hung. *dio*.

Diximus quafdam fuperius Prifcorum ex Plinio differentias: Pofteritas etiam fuas obferuauit, & Nucis iuglandis proprias. Tragus in teneras & duras diftinguit: quæ tenerum corticem habet, *Tarentinas Noces* dici ait: quæ durum, Germ. *Grüßelnuß*. Lonicer<sup>us</sup> triplici magnitudine diftinguit. Primæ magnitudine pugni, *Pferdnuß*, aut *Roffnuß*: Lat. *Nuces equinae*. Secundæ mediæ: *gemeine Nuß*: Tertiæ minores, valde duræ, *Stein nuß*, quæ pofteræ fortaffe illæ funt, de quibus Cæfalpinus ait, quæ purgari vix à putamine poffint, *Surdas* vocari. At fanè qui ad figuræ, magnitudinis, duritiæ atque adeo faporis varietates refpicere vult, innumeras propemodum deprehendet Nucum iuglandium differentias. Nam & earum, quas medias facit Lonicerus, & teneras Tragus, diuerfa & magnitudo, & figura, & durities. Sic & duras feu *Surdas*, & figura & magnitudine variare nouimus, quarum tamen nucleï, etiam difticultè eximantur, lapidiffimi funt. Inter vulgatas feu medias præftant, oblongæ, albican-tes ac fragiles, ponderofæ ac plenæ, albo intus nucleo, putamini non tenaciùs adherente, gultu dulci & fuaui. At magnum iftud Nucum genus, quas *Caballinas* vocant, bonitate & pondere, ad proportionem reliquis cedunt, non enim intus oppleta, fed magna ex parte vacuæ funt, minùs fapidæ: hæc Malis ferè magnitudine æquales, ex quarum cuppis feu valuis mafpua pueris geftanda funt. Nectacendum quod Thomas Hartot in hiftor. Virgineæ infule tradit: 1. Nucum magnatum in Virgineæ copiofè prouenire duo genera, vnum eiuſdem faporis & formæ, aut parum differentis ab Anglicis, eis tamen putamina duriora effe & craffiora. 2. Aliud genus maius & durius, nucleo magno, oleaginofo, dulci.

Nux iuglans, auctore Pallad. amat loca montana, humida, & frigida, plerùmque lapidofa. Po-teft tamen & locis temperatis iuuante humore nutriti. Exiftimauerimus tamen in Italia aliisque calidioribus regionibus frigida amare, refpectu caloris magni illarum. Aquas, fi Ruell. credimus, odore iuglandes, firi, poffitque cupidè funt. Paſſim in omnibus ferè Germaniæ hortis prouenit. In plurimis Galliæ, Germaniæ tam inferioris, quàm fuperioris, præſertim agrorum marginibus plantata. Apud nos Montbelgardi & locis vicinis fæpius gelu perduntur fummitates, quemadmodum & iuniores arbores, præſertim fi loco humidiore plantatæ fuerint. Baſileæ & in Alſatia abundanti, reperiuntur etiam in fyluis quibuſdam, vbi arborem vidimus folia cæteris multò tardiùs proferentem, fimilemque Argentiniæ, & circa Tigurum. Dalech. Noces, quæ antea velut arida ac mortuæ, pridie D. Ioannis feſtum, diem repentè germinant, & folia mittunt, in agro Lugdunenſi perquam multas obſeruaffet, id ſingulari naturæ miraculo fieri credebat. Eiuſmodi arbores Gengenbachi binas hodie etiamnum extare,

Tom. I.

iam fuprà dictum. In Sueuia Noces magnæ funt.

In Rheni tractu fæpè totos agros iis conſitos videas, vbi oleum copioſè paratur ex fructu. Omnibus vulgò in Italia nota, teſte Marth. nullumq; aërem afpernatur, fi Curtio credendum. In Heluetia paſſim obuia, fed ab hortis exulere fuadet Gefn. ob magnam & noxiam umbram, & quodd folum vicinum emaciare ſoleat, ob nutrimenti copiam quod attrahit.

Nucem Caballinam maximam in horto Exc. C. Montb. à nobis plantatam colimus, & alterius generis plures, variantefque, fructuum figura & magnitudine.

Thaliu viſcum vidit in Iuglande in horto Monafterii Ilfeldenſis.

Paniculas feu Iulos atque gemmas protrudunt Martio, fi tardiùs, Aprili, feu vt Plinius ait: germinant poſt aſſatum Fanonii, fructificat Autumnno. In noſtris regionibus Noces pleræque maturæ funt circa finem Auguſti, & Septembri magna ex parte. Habentur tamen in quibuſdam locis præcociores; fructum Aug. initio perficientes, quas *Augſtinnuß*, nox *d' Augſt* vulgò vocant. Tardæ & ſerotiinæ funt, quas à D. Ioann. vocatas diximus non enim ante Octob. maturantur, & cum aliæ defecerunt, illæ demùm recentes menſis adhibentur, quamvis putaminis duritiæ, faporifque gultu fauo minùs gratas ſint qui dicant: Ex duris tamen etiam cogitum nobis genus præcipuæ ſuauiſſimæ. Multos annos ſuperuiuit Nux, ac mirum in modum grandæſcit: Cariem (vtæ notat Tragus) vetuſtatè inque non ſentit. Tenera eſt arbor in calidioribus regionibus locifque apricis feliciter proueniens.

Seruntur Noces porreſcè commiſſuris iacentibus à Cal. Martiis ad Idus eadem. Ad Idus Martias iuglandem ſerere præcipit Colum. Iuglans, vt Damogeron, & Pallad. author eſt, nucibus ſuis eo more quo Amygdala ſeitur, & iſſdem menſibus: item auulſione & viuiradice. Sed nux quam poſiturus es, melior adoleſcet, ſi pueri impubis, vel nondum experti Venerem vinâ quinque diebus maceraueris, quod & Amygdalis commendatur. Sed quas Nouembri menſe diſponis, aliquatenus in Sole ſiccabis, vt excutatur noxium virus humoris. Quas verò menſe Ian. vel Febr. poſiturus es, aqua ſimplici pridie macerabis, Poſteritas autem tranſieras, vt latus, id eſt, Carina ipſa, ſigatur in terra. Cacumen ipſum, cum ponimus Nucem, in Aquilonis partem dirigemus. Lapis ſubter, vel teſta ponenda eſt, vt radicem non ſimpliciter, ſed reperiſſa reſpeget. Letior fiet, ſi ſapitè tranſferatur. In frigidis locis bima, in calidis trima tranſferri debet.

Radices plantarum (ſicut in aliis arboribus ſolemus) in hoc genere reſecare non debes. Fimo bubulo ima planta tingenda eſt: ſed meliùs cinis aſpergatur in ſcrobibus, ne calore ſtercoris aduratur: nam cinis creditur vel corticis teneritudinem procurare, vel fructuum denſitatem adferre. Altis ſcrobibus delectatur pro arboris magnitudine, & deſiderat intervalla maiora, quia ſiſt denſiſſiſtillicidiis foliorum ſuorum proximis vel ſui generis nocebit arboribus. Debet aliquando circumfodi, ne caua fiat vitio ſeneſcutis, quæ ſi vitietur: canalis longus à ſummo trunco ad imum debet excudi, ſic beneficio Solis, & venti dureſcunt, quæ in putredinem tranſibant.

Poſteritatis memoriæ mandarunt rei ruſtica periti, (vt refert Ruell.) neque iuglandem, neque reſiniſeras arbores, nullo inſitionis inter ſe,

Nux Caballina maxima.

Viſcum

Tempus

Præcoces noces Auguſti. Serotiinæ.

Vt meliùs adoleſcant.

Vt latius fiat.

Cultus

Vt cortex tenerior fiat.

Vt fructus magnitudine, &amp; deſiderat intervalla maiora, quia ſiſt denſiſſiſtillicidiis foliorum ſuorum proximis vel ſui generis nocebit arboribus.

Vt citiùs ſuccurrat.

aut cum aliis pignore iungi posse, ita vt Iuglans alteram non admittat arborem, suum etiam surculum respuēs si pangatur, nec villo fœderis nexu coalescens.

Hinc fortè Tragus commotus, (nisi peculiari vel sua vel aliorum id tradiderit experientia) Nucibus, inquit, seritur Iuglans, nec inferi vult, vt alia arbores. At Palladius contra in Ian. cap. 16. scribit: Inferitur, vt plerique asserunt, mense Feb. in Arbuto, scd melius in trunco, vt alii, & in Pruno, & in se: Deque eius infertione hos fecit verus.

*Arbutum frondes vestra Nucleus occupat umbra,  
Pomaque sub ælii cortice tutare refert.*

Et ii planè, vt Damogeronti placet, à veritate de- fecerunt, qui nullam infertionem admittere Iuglā- dem crediderunt, experientiāque docuit Iuglan- dis resinosa Terebintho aut Pistacio insitum cō- prehendiisse, & in grandiore sua sorte arborem euasisse.

Terebinthus & Iuglans surculum Pistacii reci- piunt, qui conceptus persæpe coaliuit. Et licet forsitan non facillè coeat, non idè tamen id ha- bendum neglectui, si res non semper suum sor- tiatur eff. ctum.

Sunt qui hoc infertionis vtantur genere. Nu- cem obruunt, & vbi adoleuerit, bimam aut trimā radiculis erunt, radicique surculi iuxta carnem infigunt, & iterum terræ religant. Alii ramulum anniculum legunt & inuertunt, infertumque dili- genter viminibus obligant. Vt vt res sit, nos sanè infertionis multa cura non opus esse iudicamus, si- quidem, nucum fatu facillè ac feliciter proueniāt, & iterata [ nostri sanè iterata semel atque iterum contenti serè sunt ] transplantatione breui adole- scant: nisi quis fortè infertionem Mangonii ergò tentare velit. Huic nostræ sententiæ subscribit Ouidius, quando ita canit:

*Sed putomagna mei est operosa cura colono.  
Inuenias, dederit quid mihi præter humum?  
Spore mea facilis contempro nascor in agro,  
Parque loci, quia sio, publica penè via est.*

Si dura Nux erit, vel nodosa, cortex [ præci- pallad.] circumcidendus erit, vt vitium mali de- ducat humoris. Alii radicem summa præcidunt. Alii terebratæ radici palum de Buxo imprimunt, vel Cuprinum clauum, vel ferreum, ad medullam vsque vt quidam volunt. Sic etiam lætiorē fu- turam. Si quis terebro (vt Damogeron autor est) per medullam arborem traiciat, atque foramini parem Vimeum adigat cuneum, nodosam duri- tiem Nux exuet.

Ea fructum non amittet, si Verbasci radicem vel coccinium è sterquilinio pānum amuleti vice suspendat. Cuius amuleti ratio naturalis cum nul- la sit, eius dignitatem inter venientes Græculas re- ponimus.

Cinis iugiter, vel caudici, vel radicibus offusus, & tenecitudinem adfert, & fragiliorem nuclei car- nem efficit, autore eodem.

Si Tarentinam, inquit Pallad. facere volueris, solam Nuclei carnem lana propter formicas obuol- utam in seminario debebis obruere. Si ferentem aliam in hoc genus velis mutare, lixiuio per annum continuum ter tigrabis in mense.

Nuces nudas & sine putaminibus edent Iu- glandes, vt pollicetur Africanus, si fractis vtrin- que carinis integer nucleus illeſa prorsus carne, lana vel viugineis foliis recentibus, aut Platani frondibus obuoluatur, quominus à formicis enu- cleatus erodatur fructus: dein terræ mandetur. Hoc idem Florentinus assent. Vt Tarentina fiat,

sue, quod idem esse putat Ruell. suis operimentis spoliata, solam Nuclei carnem vellere propter formicas, inuolutam in seminario obrui iubent, quod in Amygdalis quoque venturum pro- mittunt: sed cinerem scrobibus aspergendum: qui modus serè idem cum prædicto Palladii. Vt Nu- ces in proximum annum copiosius proueniant, mos est hodie apud rusticos quodam, vt Nuces perticis decutiantur. Hinc non inconcinne qui- dam alludendo cecinit:

*Nux, asinus, mulier, simili sunt lege ligata:*

*Hæc tria nil fructus faciunt, si verbera cessant.*

Credunt enim, si Nucleum glumæis vinculis obvin- ctam, sustibus tundant, reddi fecundiorē.

Democritus scriptum reliquit, si quispiam ie- iunus seorsum lentis grana mandat, atque dum adhuc mansum in ore versat, quum flore pubet Iuglans, ramum demordeat, arbor Persica dista- belcet. Item si flagrans igni Lentis granum radi- cibus imprimatur: aut si in traiectam terebra ar- borem, puerile lotium indatur: aut si quis iuxta ablaqueatam radicem diſamnum, fabas, vel pan- num menstruo sanguine mulieris imbutū depoa- nat, arborem auditate tabida conficiet. Hæc Constantinus refert, & ex eo Ruellius, sed vt li- berè dicamus quod sentiamus, eiusmodi vel su- perstitiosa, nec vlla ratione fundata putamus, quæ ex Democrito adducta sunt: vel sanè illicito quo- dam aut Diabolico condimento non vacua: vel deniq; ab impostoribus & mendaciorum man- cipis veteratione efficta & e mentita. Nostrium est, non solum non tradere talia, sed nec tradita credere, nec si opinio quædam sinistra nos tra- hat, vt credamus temerè vanæque expectati: inte- rim tamè de vanis & nulla bona ratione fundatis aut stabilitis, liberè, nullaque vſi circuitione, sen- tentiam nostram pronunciare. Sed de his satis.

Cortex Iuglandis hians, & abiectionis maturi- tatis argumentum est, quales & reponi debent. Seruantur, vt tradit Pallad. vel paleis obrutæ, vel arena, vel tolis suis aridis, vel arca ex ligno suo fa- cta inclusæ, vel Cepis mistæ, quibus hanc vicissitu- dinem reddunt, vt eis accedinem tollant. Mar- tialis assent, & expertum se ait, virides Nuclei tantum liberis putaminibus suis melle demergi, & post annum virides esse, & ipsum mella medi- cabile fieri, vt ex eo facto potio arterias curet & fauces.

Hippocrati Amygdalæ astuosæ (αμυγδαλινα) sunt, v- verum probè alunt [αμυγδαλινα]. Astuosæ quidem vſi sunt propter pinguedinem, nutriunt autem pro- pter carnositatem, & Nuclei (κλυα) calidæ similes his sunt. Nuclei regiz, aliquibus Persicæ dictæ autore Dioscor. in cibo sumptæ coctæ sunt diffi- ciles, stomacho nocent, bilem gignunt, capitis dolorem inferunt, suntque tussientibus inimicæ: viles verb in cibo ieiunis ad vomitiones concitā- das. Venenis quoque resistunt cum sicibus, & cor- ruta præsumptæ, ac etiamnum post ipsa venena du- hautila comitæ. Largius autem est itatæ, latos lū- bricos pellunt. Imponuntur & mammarum in- flammationibus, adscelsibus, luxatisque, cum mellis exiguo & ruta. Cum Cepa autem melle & sale, contra canis hominisque morsus proficiunt. Eadem cum calyce suo perustæ, & ad vmbilico admotæ, tormina sedant. Putamen ve- rō combustum, tritumque in vino & oleo, pue- rorum capite peruncto capillos condecorat, Alo- peciasque replet. At qui intra ipsum est, nucleus vſus, tritus, & cum vino appositus, menses sistit. Peruerterum autem Nucum nuclei commanduca- ti & impositi, gangrenis, carbunculis, ægilopibus

Infertionem  
necesse.

alii.

Ne dura  
vel nodosa  
sit Nux.

Fructus  
non amittit.

Fructus  
tenerior  
ascatur.

Tarentina  
fiat.

Alia mo-  
dus.

Vt Nuclei  
nuda nas-  
cantur.  
A Taren-  
tina nasce-  
tur alia  
modus.



& alopecias præfenti sunt remedio. Fit & exiis-  
dem oleum tuis, expressisque. Porro recentes,  
vtpote dulciores, stomacho sunt innocentiores:  
quapropter & Allis miscetur ad acrimoniam  
ipsum eximendam. Ex ipsa quoque impostæ  
luentia seu figillata emendant.

Nuces Iuglandes, vt scribit Plin. Græci à capi-  
tis grauedine appellauere. Etenim arborum i-  
plarum foliorumque vires in cerebrum penetrant:  
hocque minore momento; sed in cibis, nuclei faci-  
ciunt. Sunt autem recentes iucundiores, sicca  
vnguinosiores, & stomacho inutiles, difficiles  
concoctu, dolorem capitis inferentes, tussienti-  
bus inimica, (quoniam impleto vaporoso halitu  
capite, fluxionem concitant, vti putat Dal.) & vom-  
itibus ieiunis: (laxatum enim & emollitum o-  
leoso suo vngine ventriculos, ad vomitionem  
imbecillum reddunt) aptæ in Tenefino solo: tra-  
hant enim pituitam. (Conueniunt in Tenefino,  
non quia trahunt pituitam, sed quia status crassos  
recti intestini extremam oram distendentes dis-  
cutiunt, & viscidam pituitam ibi tenacius inha-  
rentem abstergunt, Dal.) Eadem præsumptæ ve-  
nena hebetant: item anginam cum ruta & oleo.  
Item aduersantur Capis (Allis Diosc.) leniunt-  
que earum saporem. Aurium inflammationi im-  
ponuntur cum mellis exguo. Item cum Ruta  
mammis & luxatis. Cum capæ autem & sale &  
melle, canis hominisque morsui. Putamine nucis  
Iuglandis densæ uis inurit. Putamen com-  
bustum tritumque in oleo aut vino, infantium  
capite peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias  
eo sic vtuntur. Quod plures nuces quis ederit,  
hoc facilius tineas (Tæniæ Vet.) pellit. Quæ per-  
veteres sunt Nuces, gangranæ & carbunculis  
medentur: item suppuratis. Cortex Iuglandium,  
lichenum vitio, & dysentericis prodest. Folia trita  
cum aceto, aurium dolori. In Sanctuarii Mi-  
thridatis maximi regis ducti, Cn. Pompeius in-  
uenit in peculiari commentario ipsius manu  
compositionem antidoti, è duabus nucibus sic-  
cis, item Ficis totidem, & Rutæ foliis viginti si-  
mul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus  
sumat, nullum venenum nociturum illo die. Con-  
tra rabiosi quoque canis morsus, nuclei è ieiuno  
homine comandanduci illiique præfenti reme-  
dio esse dicuntur.

Antidoti à Plin. memoratæ, eleganti quoque  
carmine meminit Serenus cap. 8. de venenis pro-  
hibendis:

Antidotus uero multis Mithridatica fertur  
Conferat a modis, sed magnus serinus Regis  
Cum aperer victor, uilem deprehendit in illis  
Symbesin, ut vulgata satis medicamina risit.  
His denum Ruta folium, salis breue granum,  
Iuglandis quoque duas, totidem cum corpore Ficis.  
Hac oriente die parco conspersa Lyao  
Sumbat metuens dederat quæ pocula rutor.

Accedamus ad Galenum. Is diuersis locis de  
Nucis Iuglandis viribus hæc habet. Nucis regie  
ad diuersas capitis parit dolorem. Nuces teneræ,  
rancidæ, vitæ, cinere digerunt & adstringunt.  
Quidam Nuces regias appellant eas, quæ nunc  
Nuces ab omnibus nominantur. Sunt & aliæ  
quædam, quæ æternæ uæ appellantur, prædictis  
multò minores, quas nonnulli Hornæ, id est, Pon-  
ticas seu Aucellanas vocitant. Multus autem am-  
barum est usus: alimentum corpori præbent exi-  
guum, copiosius tamen Pontica nuncupata,  
quàm Nux regia: quod ipsius substantia sit coa-  
ctior, ac minus oleosa. Regiæ autem laxior est,  
continetque in se ipsa plus pinguitudinis. Habet

tamen & adstringentis qualitatē non exiguum,  
quæ tandem procedente tempore marcescit, tota  
ipsius substantia in succum pinguem transmuta-  
ta, adeo, vt cibo prorsus sit inepta, quod sua pin-  
guedine, oleo veteri assimilis appareat. Cæterum  
quæ viridis adhuc est ac humida, neque adstrin-  
gentis qualitatē, neque oleosæ conspicuè est par-  
ticeps, sed magis quodammodo est æmia, id est,  
Qualitatē expers, quod saporis genus aqueum  
vocare consueuimus. Coquitur tamen hæc Nux  
facilius, quàm Pontica, stomachoque est gravior,  
& multò magis, quando cum Caricis manditur.

Traditum autem à plerisque Medicis est, homi-  
nem à Pharmacis lethalius nihil magnopere læ-  
sum iri, si vtrique has ante alios cibos cum Ruta  
sumpserit. Liqueat præterea, quod humida qui-  
dem apta ad deiectionem est: sicca verò minus.  
Plerique autem ventris subducendi gratia cum  
gato etiam ipsam præsumunt: in quem usum vi-  
ridis est accommodatior, vt quæ adstringentis  
qualitatē minus sit particeps. Quin & siccarum  
quoque, si prius (quod nonnulli faciunt) in a-  
qua fuerint maceratæ, facultas vitidibus est assi-  
milis. Ipsa verò Caryæ arbor tum in foliis, tum in  
germinibus adstrictionem quandam habet. Cæ-  
terum euidentem plurimamque in nucis putami-  
ne recenti pariter & sicco, proinde eo fullones  
quoque vti solent. At nos eius expressi succo, si-  
militer vt Mororum & Ruborum, in melle deco-  
cto, vice stomachi medicaminis vtuntur, & ad o-  
mnia reliqua adhibemus, ad quæ modò dicti succi  
conuenire censentur. Porro ipsius id, quod e-  
dendo est, oleosum est, & tenue: itaque etiam  
facile exprimitur: & quo diutius reconditum fue-  
rit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex  
eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè ad-  
modum fit per halitum euaporatorium. Itaque  
quidam eo gangranas, & carbunculos, & ægilo-  
pas sanant, ac nonnulli ad neruorum vulnera v-  
tuntur. Cæterum si recens sit, adstringentis non-  
nihil qualitatē etiam obtinet. At quod imperfectum  
est etiam dum, ac nondum siccum, veluti  
reliqui fructus omnes, qui virides sunt, plenum  
est semicoctæ humiditatis. Nucleus tamen eius  
(alii putamen malunt) ubi inaruit, (aridum &  
vstum) tenuium partium & exiccatorum est me-  
dicamentum, morsus expers.

Est & aliud eiusdem Gal. memorabile experi-  
mentum à nucibus, quod his tradit verbis. Ego  
quando primùm in patriam redii, agrum pertran-  
siui, & inueni quemdam hortulanum, ab vna &  
tonfillis ac glandibus ferè suffocatum. Vtebatur  
autem collutione aquæ mulsæ Rosæ in ipsa inco-  
ctis. Cùm igitur uidissem fructum nucum in vi-  
gore esse, iussi detractum ab eis extremum corti-  
cem, quo etiam tinctorios videram vtentes, sta-  
tum in mortario contundi, & succum eius per lin-  
teum excolati, nondum sciens, quomodo iuxta  
crassitiam aut tenuitatem haberet: Cùm verò re-  
perissem aquosum, & compage tenuem, garga-  
rizare eum iussi ipsum hortulanum. Postquam  
verò valde tenuis apparebat, præcoxi: & mel  
commenturatè, veluti in eo quod ex Moris fit,  
fieri sciebam, admisceri: atque ubi iam ad compa-  
gem mellis redactum esset, hortulano vtendum  
reliqui. Porro cùm viderem celerrimam viti-  
tatem ipsi inde oboriri, præstabile ratus sum in  
multis experiri: atque ex hoc sufficiente experi-  
mento accepto de facultate eius Pharmaci, sem-  
per ipso vtor. Meritò itaque mirandum, nullum  
ex prioribus Medicis aliquid de hoc Pharmaco  
mente concepissem, vt tum parabili, tum generoso

Viridis

Adversus  
Serenus.Aurum sol-  
uit.

Carya.

Putamen.

Ad stom-  
achum.

Oleum.

Gangranæ,  
Neruarum  
Vulnera.

Tonfillis

Caries.

hoc succo vterentur, maximè cum viderint, quomodo etiam manus inficiantur eorum qui virides Nuces decortificant. Ex his enim apparet, qualis sit earum succus, & quod agrè elui possit ipsarum adstringendi vis, adeò vt neq; per fortissima exterioria elui queat.

*Potius enim  
earum vim  
decortica*

Amplius autem adhuc miratus sum de medicis, quòd non cogitarent fortem esse ipsarum vim, cum etiam tinctores videant eiusmodi Nucum corticibus vti. Nisi enim in profundum manuum descenderet, & nisi per omnem substantiam lanarum penetraret, non certè agrè eluibilis esset. Cum verò descendat, indicat planè substantiam succi tenuium partium esse: rationi autem cōstanteum est, adstringendi vim maximè proficere, vbi in eiusmodi substantia contineatur. Etenim quæ exadstringentibus crassas partes habent, per adstrictionem cogunt & condensant superficiem corporum quibus adhibentur, & à progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt. Quibus enim etiam aliàs ob substantiæ crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sanè amplius impossibile fuerit, densato corpore iuuare, & quod totum est inflammatum. Optimum itaque esse Nucum succum persuasus, vt qui etiam coctum cum melle gustarim, nihil insuauæ habentem.

*Flamor-  
rhoides,  
Capitis  
grauis.*

In libello de Dynamid. Galeno attributo, in formula ad hæmorrhoides recipitur cortex virginis nucis. Perficæ nucs, ex sententia Athenapiti non minùs graues sunt quàm Heracleoticæ, magis nutriunt, os & fauces exasperant: asse verò minùs lædunt, & ex omnibus nucibus, si edantur cum melle, egeruntur promptissimè.

*Nuces per-  
ficæ.*

Diphilus Siphnius regias nucs scribit dolorem capitis excitare, innatæque stomacho, & ex iis teneras, quæ adhuc candicant, esse meliores, ac succi laudabilioris: parcius nutrire, quæ in furnis fringuntur. Perficæ nucs Castaneis esse deteriores, nec edendas, nisi igne sint coctæ ac frixæ: harum quippe vnginofam nocentissimamque pinguedinem, ignem assumere.

*Nux Viri-  
da.*

Nux viridis, vt pote adhuc aquationis humoris, vt refert Plinius Valerianus, stiptica & frigida virtute censetur. Potest eadem & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum garo sumpta mollire.

*Stomachus*

*Aluum sola-  
rit  
Tempera-  
mentum.*

Nucs virides, autore Simeone Sethi, atque recentes, calidæ prima distantia reponuntur: quæ verò siccæ sunt, secunda distantia calidæ censetur. Virides etiam ventrem ciunt. Et idè quidam antè cibum cum sapa vel defruto comedunt: concoquuntur etiam melius, quàm Amygdalæ: aridæ autem si edantur inflammationes & vlceræ efficiant. Stomacho quidem meliores sunt, si cum caricis edantur. Concoquuntur insuper Nucs probè in ventriculis frigidis, in calidis verò potius alterantur, ac in biliosum humorem vertuntur: faucium præterea & capitis dolorem adserunt, & tussis augent. Antè alios cibos sumptæ, vomitus sunt effectrices. Si ad saturitatem edantur, ventris lumbricos educunt, & ad dentium mordicationes lancinatione sive vitiles sunt. Eob. Hællus:

*Quibus co-  
medenda:  
quibus non*

*Vomitus  
Lumbrici,  
Dentium  
dolor.*

*Temperā,  
partium,  
Nucis.*

Iuglandes prodesse ferunt, nec pascere multum: Pascere Auellanas plus, valuisse minus.

Marcellus Virg. ex antiquorum decretis significat, habere arboris Iuglandis coliculos aliquid quod adstringat: summum verò Nucis operimentum, quod ea maturo decedit multa hac potestate esse. Interius deinde carinatum & bifidum putamen crematum extenuandi vim acquirere, & sine erosione siccare. Quòdque in eo clauditur

edendo aptum, oleosum quod est, facillimè bilem augere: confectumque ex eo oleum extenuandi vim habere: actumores præterea discutere.

Idem Hermol. reprehendit, quod Jussieu apud Dioscor. refides in corpore & difficilè trāsire dixerit, longiore quàm decuit verborum ductu: nec satis apto rei intellectu, quoniam aliud sit agrè concoqui aliquid, aliud residere aliquid in corpore, nec facillè transire. At vocibus iis vsus aliquando in libris de re rustica Varro est: scimus id quidem: nec Varronem in iis quæ docuit damnamus: sed quod aptius & certius in Dioscor. ad medicinam dicti debuerat, desideramus. Melius Plin. difficiles concoctu dixit.

Fuchsius Virides Nucs primo ordine sicce, secundo verò calidæ censetur. Dodonæo Nux viridis adhuc & recens frigida est & desiccatur, partēque tenues habet. Cortex nucum multum desiccatur, adstringitque. Folia eiusdem ferè sunt temperamenti. At Curtio recentes sive virides Nucs primo ordine exalfaciunt, tenuiumque partium sunt & exsiccantium.

Tragus scribit, quosdam gulioeam [sic enim callosum illum herbaceumque corticem exteriorum vocant] arefacere, inque puluerem redactū, Piperis loco in condicandis cibis vsurpare. Quod si huic pulueri folia Saluæ siccatæ ac tusa admisceantur, non contemnendū saporis condimentū futurum. Pari ratione prima ac tenera rubræque foliola siccatæ ac tusa vsurpari possent.

Nucs Iuglandes exipue immaturæ citra Festum D. Ioan. lectæ ac saccharo aut melle conditæ agris exhibentur à mulierculis, quarum confessionem ipsis relinquimus. Componitur & medicamentum ex putamine viridi Nucis, quod ore agitata prodest omnibus inflammationibus & vlceribus incipientibus in gutture, amygdalis & ore. Ad idem etiam faciem cortex decoctus. Earundem ferè Vitium sunt folia.

Dod. Theophrast. Parac. vult testam Nucis Iuglandis (quoniam cranium nostrum refert) summum à natura, vulnè, omniāque mala cranio factum esse remedium, existimat enim coeli influxu notas quasdam in singulis medicamentis simplicibus impressas reperiri, ex quibus de præcipuis singularum facultatibus iudicandum sit.

Et Gesn. in enumeratione simplicium purgantium ponit Catulos Nucis Iuglandis. Fernel. quoque Iuglandis iulos sursum purgare scribit. Mōtus ad immoderatam menstruorum purgationē hoc præscribit. Acc. flor. cucurbitæ & nucamentorum Iuglandis an. vnc. j. fiat puluis. Coneoregius dat drach. j. cum ouo fortis. Verum cum putamina seu nucamenta Nucum calida videantur Gesnero atque Fernelio atque purgent: & ipsæ nucs, autore Matthiol. menses ciunt, vix nobis probari potest in eo casu prædictū medicamentū.

Cortices Nucum recentium sæpè infusi in oleo, cum modico alumine, benè tingunt capillos, teste Bayro. Idem tradit, fricatos dentes cum radice Nucis singulo quinduoq; semel, intellectum uergetur, sensus acuerit.

Matthiolo tradente, Iuglandes virides decerpit Maio vel Iunio appetente, antequam earum putamina obdurerint, saccharo vel melle adferuatæ stomacho vitiles euadunt, & ori non ingrata.

Iuglandium Iuli, qui mense Martio prima germinatione erumpunt fici, & in puluerem contriti, & ex viro albo poti, drach. pondere feminis strangulatu vuluæ affectis mirificè profunt.

Inest quoque Iuglandibus Nucibus propria quædam, & peculiaris facultas ad remoratos menses



mensis ciendos, adeo vt facto periculo, se non parum demiratum testetur Matth. & præsertim vbi cætera medicamenta, quæ ad hoc munus ob-eundum præstantiora censentur, nihil mouerant. Macerantur itaque ad id in aqua Iuglandis nuc-es cum suis putaminibus, quousque remollitæ, atque humefactæ eorum nuclei à contegente membrana, perinde ac virides, expoliari possint: sumuntur deinde expoliati nuclei, & conduntur macerandi in aqua vitæ præstanti, & post duos dies præpuratis prius fœminis, nuclei duo vel tres integræ Nucis, quotidie dantur manè ieiun-is deuorandi, decem continuis diebus, ante tempus menstræ fluxionis.

Ad Pestem hoc præstat. Nuculorum Iuglan-dium, bacc. Iunip. Rutæ an. vnc. sem. maceren-tur in aceto, de hac miscella ieiuno ventriculo, si sumatur, quanta est nux Myristica, hominem eo die à peste tutum præstat.

Aliud ad pestis præcautionem. Acc. corticum Iuglandium virid. vnc. sem. Zedoar. drach. ii. affun-de aceti boni lib. ii. stent benè cooperta. Huius omni manè cochlearia bibantur tria quatuorve. Cum prodis in publicum, Zedoariam ore teneas licet. Aqua stillatitia è virentibus corticibus po-ta, sanguinem concretum dissoluit. Cortex arbo-ris medius, adhuc succulentus, si exiccetur, pro vomitorio est. Catuli seu iuli ex iusculo aut vino ad calculum & colicam propinquantur. Emulsio ex Iuglandibus recentibus, cum momento sem. Papau. somnum conciliat. Asparagorum Maio decoctio ex aqua ventrem emollit pota. Succus autem radicis violenter purgat, validis rusticis exhibendus.

Scaliger alicubi tradit, ferre gummi Iuglan-dem, renibus imbecillis vtile.

Et H. ft. Lugdun. Æstate, inquit, feruidissima, quod ærore ch. ruffum è celo stillat, foliis & fron-dibus Nucis Iuglandis in agis insid. re, quam vicinarum arborum, obstruunt Dalech. (eoque melle irrigata Iuglandis folia, ori indita, huius sedare,) foliis propinquarum arborum tinnucis & aridis, quali maior sit huius arboris cum cælo concordia & cognatio.

Iuglandis aquam ex immaturis Nucibus com-mendat Paræus ad dissoluendos thronbos con-creti sanguinis. Quidam vtuntur in malis vlceri-bus tibiæ, vbi caro putrida apparet, & contra Meliceria Celsi: quamvis de hoc vocabulo dubi-tetur inter doctos, ita tamen rem describit, in-quit Camer. vt cum eo affectu, quem vulgò dās Stedwasser vocant, conuenire videatur.

Sed de aquæ Iuglandium viribus Eudonymi thesaurus paulò specialius tradit, his verbis. Nu-cum Iuglandium immaturarum aqua, circa festum D. Ioan. parata, foris imposita prodest vulneribus & vlcibus calidis, & anthraci pestilenti: pota etiam ad duas aut tres vncias refrigerat, & pesti-lentiæ resistit. Ex putaminibus etiam exteriori-bus Iuglandium (siue maturis, ita vt iam à Nuce soluantur, siue nondum omnino) mensè Sept. aqua destillatur: nec refert, nigra fuerint, modò ne putredinem senserint, imò nigra præferuntur. Huius aquæ medicocris potio (cum tertia parte aceti, si cum calore morbus ingruat) vena prius sectâ, aduersus pestem, tanquam certum expeti-mentum propinatur: Laudatur & ad antrum tin-nitus, & audiendi difficultatem, & ad anginas gargantula.

Ad mouendum vomitum recipit Fel. Plat. aquæ Nucum viridum, cum aceto destillatæ vnc. iiii. Sed monendum nos ab aceto destillato gratia ali-

quando symptomata vidisse. Foliorum, si placet, vltim percipe.

Foliorum verò Iuglandis aqua circa finem Maij destillata, mirè commendatur, ad siccanda & adstringenda vlcera, & inducendam eis cicatricem, si manè & vespertini inde lauentur, & ma-didum inde linteolum imponatur: Brunluicen-sis. An verò aqua Iuglandium refrigeret, vt Euo-nymus tradit, vix adduci possumus, vt credamus. Iudicent docti atque experti. Porro multis mo-dis cibos hominum & medicinas adiuuant nuces. Nam & immatura, vt Bruyer. annòtat, & nato nu-per nucleo gulæ delicias præbent: quantò verò propius ad maturitatem accedunt, tantò cibis in-gratiores: quippe is tantum pro medicamento in esu piscium vimur. Medicorum etiam recen-tiorum schola prædicat, aduersus piscium aquo-sos & pituitosos succos, aduersari namque pu-gnante quadam vi, & quadam antipathia piscium iniquitati ac malignitati persuasissimum habet: Vnde illud tritum:

*Post pisces nuces: post carnes caseus adsit.*

Nonnulli hanc virtutem eis tribuunt ob calefa-ciendi & siccandi earum facultatem. Certum est etiam easdem venenis repugnare præsumptas in cibis, si quicquam aliud, vt iam diuersimodè o-stensum, quod & Sernus hoc versu in finu alle vi-detur.

*Ante cibos igitur Iuglandis satus edatur.*

Ceparum item & aliorum saporem lenire ac mi-tigare, inuenerunt gulæ procetes, vnde alliatum vocant vulgò quoddam condimentum, ex Allio & nucibus concinnatum, quod ad *epididymum & intinctus piscium* adhibent. Sciente pestilentia procetes pariter ac plebs infima, quin etiam rura tostas ieiuni mandunt.

Officinæ nuper natas, & virentes iam maif-culas cum puluinato calyce, & ligneo putamine nondum dantiam adepto, Garyophyllis ac Cin-nammomo confixas, saccharo coniunt seruânt-que in multos annos. Sed nostri in plufculos dies prius obiter decorticatas in aqua frigida fontis macerant, quouidiè affusâ nouâ, vt hac mace-ratione ad condituram quasi aptiores sapidio-risque reddantur. Ergo tenetæ Nucis cortex, putamenque antequam lignescant, deglubuntur cultro cuticula viuent & teneri scula tenus, è vestigioque ne nigrescant in aquam puram proii-ciuntur, vti dictum, tum vsque dum mollescant coquuntur, tum frustulis Cinnamomi, Garyo-phyllis aut etiam corticum Arantiorum segmen-tis traiectæ, saccharo aut melle in syrupum per-fectè cocto bulliunt tribus quatuorve ebullitio-nibus: tumque quò saccharum ebibant, triduo aut quatrinduo inibi sinuntur. Et quia saccharum recrudescit, propter humorem quem imbiberat, illud idem saccharum per se denud coquitur, & sic bis tæve repetitur, ex præscripto Lob. & Pe-næ. Nostri vnica coctura eleganter condituram absolunt, sed post macerationem & coctionem linteis absterfas, non diu in syrupo coqui sinunt, ne nimium mollescant, sic minis fapide palato fu-turæ, sed syrupum ad perfectam consistentiam decoquunt, condituræ complementum vltiori in syrupo macerationi committentes. Posterita-tis hoc inuentum putamus, vt eiusmodi alia mul-ta ad medicinam excogitata, sed quæ à salutari orta principio, hodie passim ad ventris ganeam rapiantur. Sic conditas ventriculo refrigerato & imbecillo, visceribusque aliis frigidioribus vtilis-simas promittunt. Senibus item & pituitosis, ma-

*Condiendi  
modus offic.*

*Conditurâ  
cives.  
ventricu-  
lus.  
Calfaciens  
Venus.*

ritiſque in Venerem pigris : calidioribus naturis ac bilioſis minus tutas eſſe.

*Schwenck.  
rat.*

Schwenck. annotat, lineam illam membranam, nucleis intercuſa ſem, Nauci vocatam, vulgò das bößlin in der Nüß, aduerſus calculum vulgi experimento laudatam eſſe. Sed veremur ne ille cum ipſo vulgo decipiatur. Multum eſt, alicui rei experimentum tribuere, cuius nec ratione ſcias, nec effectum euidentem videris vnquam. Equis enim eſt probatorum medicorum, qui eundem vnquam ſibi viſum, & apertè agnitum vilo experimento teſtetur? Non recipimus hic vaniloquos Empiricos, quibus nil aliud in bacca quam ſecreta & experimenta, tam vera, quam ipſi vires eorum, quæ tractant, medicaminum noſcunt ac intelligunt. Ecquid obſecro operari queat, inſipida, terreſtris, exucca atque aded tam Nauci illud membranaceum corpusculum, quod fortè adſtrictione, quadam non deſtituitur? Obſeſſe potius atque aded nocere calculoſis exiſtimauerimus, & quantum quidem in iis ſit, exitum calculi vel arenularum potius impedire, quam promouere. Sed mundum nolle decipi, iam aliquoties dictum, torſiſſe que dicitur, quoties eiſmodi fruſtulas opinionis in ſacraſſimæ Medicinæ Republicam irrepiſſe deprehenderimus.

*Ter. ni  
venenat  
Venenum  
Galenus pro  
pueris.*

Raimundus a Vinario, in opusculo ſuo de peſte ſcribit, Iuglandem rancidam planè venenatà & Rhaiſis teſtimonio confirmat. Idem ex Iuglandis Nucis medio glandem parat pro pueris. Rhaiſis ſcribit enim ad Alm. Si quis malè habuerit ad eſu Nucum corruptarum, vomitus excitetur, deinde exhibetur ſyrupus oñphacinus, maiorè macianorum, & ſimilia in potu, vt concoctu facilia & appetitum excitant. Haud incelebris eſt hodie apud Medicos eo in poſitu, & Graeci dicta, cuius inuentionem Galeno tribuant, noſque ſupra inuentionis occaſionem & modum iam ſuperius abundè docuimus. Lubet tamen & ex Meſue eiuſdem uſum & conſiciendi rationem ſubicere. Medicamen eſt efficax ad catharrum acie, & tenuè à capite in aſperam arteriam, pulmones, thoracem, à quo phlegmone, ſuffocatio, mors, impendent. Libræ quatuor ſucci ex corticibus Nucum viridium, diebus canicularibus extracti ſemel ſerueſunt: tunc mellis lib. ii. additis, coquantur ad mellis craſſitiem: idque medicamentum pueris mulieribus & natura humidis ſalubre eſt. Quod ſi phlegmones incipiunt, adſtringentiura aliquid admiſcendum eſt, vt Roſa, Balauſtium: ſi in ſtatu crocus & Myrrha: ſi in declinatione, nitrum & ſal ammoniacus, & ſimilia. Alioqui vires habet eandem cum diamoro ad omnes oris phlegmonas, & cynanchas, ſed efficaciores, vt ex Galeno diſcimus.

*Ligni uſus*

Iuglandis materies menſis & vtenſilibus laudatis dicatur, & operi teſtorio. In Gallie multis locis, præſertim Lugduni plurimi ſit hoc lignum pro menſis, ſcamnis, lectis, abacis, & aliis eiſmodi, quæ tela cerea fricant ſæpè: ſic egregiè poliuntur, & nitidum ſplendorem acquirunt. Talia multa ſingularis elegantiz opera videas Lugduni in tota Burgundia, etiamque Montbelgardi. Ad ſurfures V. Vurſ. comburit lignum Iuglandis, vel putamina Nucum, ſacitque ex cineribus lixiuium, quo abluit caput. Ad paroxiſmos februm medicamen ex cortice interiore Nucis ramorum parat Felix Plat. quod nigram maculam nonnihil erodit. Recipit autem corticem q. ſ. macerat in aceto, & applicat ubi pulſus arteriarum ſentitur, quo remedio feliciter vitur. Idem probat decoctum hoc. Zing. vnc. ß. piper. drach. i. membranarum

Nucum interiorum ſeu Nauci drach. ij. &c. Nos membranam Nucum inſulſam & inſipidam verè nauci facimus in hoc affectu, cætera autem non. Ex viridibus putaminibus Nucum decoctis colorem parant fabri lignarii ad mentiendum lignum quoduis eo tingunt.

Sed de olei Nucum viribus ſpeciatiim quoque tradendum, etiamſi tam ſuprà quardam attigerimus. Eodem autè modo, [ vt Dioſcor., Aetius & alii ſcribunt ] oleum Nucum [ ex vno ] Iuglandium paratur, quo Amygdalinum, Nucibus aut. tuſis & expreſſis, aut poſt contuſionem in aquam feruentem coniectis. Dioſcor. eandem ei vim tribuit quam Balaſtino: Aetius, quam Amygdalino. Inſupèrque hoc priuatim habere tradit, quod inaurantibus, aut inurentibus conducit. Siccat enim, & ad multum tempus inaurationes & inuſiones continet & adſeruat. Diſcutit hoc, (vt Curtius ex quorundam ſententia prodiit) & nonnulli ad gægrenas, carbunculos, ægyloſas, & neruorum vlcera vtuntur. Vim habet etiam tumores externos, ac putredines. Inſulſam verò aurium ſurſitati prodeſt, & idem vile calidis doloribus illitum. Cætera diuersè & graue corpori, ſapere. Enimvero ſi quid in nucleo putredinis fuerit, totus modus deperit, ſietque oleum mox rancidum. Recens verò nonnihil adſtringentis qualitatē habet. Oleum, quod de Iuglandibus Nucibus elicitur, nullius in Medicina uſus eſſe reperit Matthiol. & ſi lucernis & lampadibus, qui parſimoniz ſtudent, id maximo opere expectant, quippe ignis funiculo non tam citò conſumitur, quam id, quod ex oliuis paratur. Præfertur etiam pictoribus eo quod è Lini ſem. ne exprimitur: ſiquidem hoc ceruſæ admiſtum tractu temporis colorem immutat, illud verò in corruptum perpetuò aſſeruat. Sed quid dicit Matthiolus? Suine eſt oblitus? ut ſibi ipſi in conſtantem pro arbitrio contraria tradit: non recordari verborum ſuorum euſdem libri primi. Fit quoque de Iuglandibus nucibus oleum, quo ad lucernas vtuntur Inſubres, & ad opera ſua pictores & fabri lignarii, ubi ſplendorem ſuis operibus addere volunt. Hauiſtum hoc quinque aut ſex vnciarum pondere, ſtaſus potenter diſſipat, quo ſit, vt in coli affectibus à ſtutugentis, plurimum adferat auxilii. Illi tumores diſcutit, & contractos neruos emollit, addita præſertim calce lota: antiquam verò cabiem ſanat. Non animaduertit uſum in Medicina apud Dioſcor. quod commentatur? Nonne dicit Dioſcor. id eandem vim haberet, quam Balaſtinum? Notanda quoque autem animaduertiſſe, vtò licere vti oleo Nucum Iuglandium pro Balaſtino: Non item Balaſtino pro Iuglandium oleo. Viſmaligna nulla in nucibus, qualis in Balano Myrſifica.

Memorable experimentum eſt, quod à Regulo quodā Ducatus V. Virmbergici, optimo ac nobiliſſimo viro acceptum, perlibenter poſteritati publicamus. Is pro certo nobis affirmauit ſe oleo è Iulis Iuglandium parato, ruſticum ſurditate vnus auris egregiè atque perfectè ſanaſſe. Oleum ſic parabat. Per annum cucurbitam vitream Iulis plenam ſub ſimo condiebat, quo tranſacto, ex iis vnguinoſis, oleum expremebat. Hoc mixtum cum alio Nucum oleo expreſſione parato aliquot guttas in aurem iniiciebat. Oportere autem dicebat ægrum in ſublumi poſitum aure excipere olei guttulas, quo recepto cum impetu diſſilire, vt melius intret ac penetret.

Nec tacendum Plinii Valeriani Oleum ad Alopecia. Inter Calendas & Idus Iulii centum numero



mero Nucis statim ut arbori demptæ sunt, cortice adherente quantantur: his admiscetur aluminis scissi lib. iiii. & in nouo fictili vase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni lib. iiii. & diligenter in loco neque humido neque nimium sicco obruuntur, post x. dies dabunt oleum, quod fluctuantium capillorum damna restituit.

Iam persæpè vtilissimum in peste curanda expertus est Gēsnerus aceti stillatitium liquorem, cuius compositionem hic adscribam: Nucis Iuglandes immaturæ (in eorum defectu cortices radicis Tamarisci, vel Fraxini substituantur) circa diem S. Ioannis, numero 100. minutim contunduntur aut conciduntur. Scabiosæ, Verbenæ, Solani, Sempervivum an. lib. j. miscentur, & affuso aceto optimo bulliunt: dein manent per noctem, posttridie desillantur igne leui. Sic habet descriptio libri Germ. Augustæ olim excusit.

Restat ut & de alia è Nuce Iuglande utilitate dicamus, nempe de *Isca*. Sunt autem *Isca* [ *Isca* ] ut describit Paulus, spongiosa quædam corpora in Quercubus & Nucum regiarum arboribus nascentia, quæ Barbari magis in usu habent. His inter cætera cauteriorum genera usus fuisse Antiquos, idem Paulus testatur, quando in longis stomachi defluxionibus ad imprimendum cauterium supra os ventriculi, non ferrentis, sed *Isca* appellatis vi voluerunt. Eisdem accensas hydropicis quoque super stomachum, iecur, lienem, & vmbilicum imposuerunt, quinque crustas adhibentes. Quomodo autem *Isca* ad usum non vterentur sic demonstrat Cæl. Aurelianus. Alii fungos ligneos inferius ac superius angustos formantes patientibus apponunt locis, quos summitate accensos finunt concremari, donec cinerescant, atque sponte decident. Id hodie imitantes Turcæ fermentum vius bene aridum parti milè affectu applicant, & summitatem eius accendunt.

An verò rectè Hermol. medullam appeಲ್ಲærit, ex dictis facile lector indicabit. Sic enim scribit: medulla nucis quæ in ligno ipso continetur, *Isca* dicitur. Et ideo: forte, ut alia multa, quoque deprivatè à Latinis id acceptum, quasi *Isca*, quoniam ignis & cauterio quoque fit Medicis. Et paulo post: Fomites ex Nuce Mnestro optimas fieri cum dixit, de Iuglandis videtur intellexisse. Eius imitatione Cornarus quoque *Isca* medullam Nucis arboris non satis rectè veruisse videtur.

Eisdem Hip. nostro quidem iudicio Fungos videtur appellare, dum hæc tradit.

*Καύου αὐτῶν, τὰ πρὸ ἐσθλὰ μύκηται, τὰ δ' ἀσπιδία, &c.*

Bayrus ad denigrandos capillos, fungos, inquit, nucis combure, & in oleo solue & vnge. In Germania creber est usus Fungorum nucum sicuti & Montbelgardi: solent enim qui sclopetis iaculantur eorum segmentis sæpius uti ad conservandum ignem: ex iis confusis & suo modo præparatis donec sint molles & spongiis penè similes, sunt ignis fomites, qui facili excipiunt ignem, qui ferro & lapide excutitur: Zündell vocant Germani. Fungos integros ponunt, supra lintamina cum lixiuo mundantur, vel cum aqua & cinere præparant, deinde in partes secant, & apponunt bombardæ, meliores sunt, quàm funiculi præparati. Audiuimus Germanos in carbonibus reducere & præparare, ac modo dicto ad bombardas uti.

Claudamus Iuglandis historiam coronidis loco hac quaestione. Querit Arist. cur nucis tostæ, re-

frigeratæ deteriores reddantur, rursus calefactæ meliores. Quod in refrigeratis succus accrescat, & constet, tepefactus verò dilabatur. Etenim suauitas non nisi per succum percipi potest.

## CARYA, SEV NVX EVBOICA THEOPHRASTI.

### CAP. II.

**E**vboicæ Nucis historia cum sit obscura, cogimur Lectoribus omnia proponere, quæ Theophrastus & Interpretes de eâ scripserunt, ut facilius ad eius cognitionem pervenire possint.

Is in cur. hist. lib. 5. cap. 7. scribit: τὸ δ' ὅτι τῆς *Ἰσκάς*, καλεῖται [ Iuglandis Gaza, Plin. Castaneæ, Dalech. ] lignum frangi se sonitu pronuntiat: est enim vel

eius materies ampla, vsusque ad opus tectorum, ita ut præsentire homines possint, quod & in Antandro accidisse, omnèque è balneis terrefactos profugisse traditum est. Sed hoc in loco (inquit Scalig.) Theodorus Plinium secutus omisit cognomen *Ἰσκάς*, malè: namque si non addas: non erunt necessaria verba illa *τὴν τῆς Ἰσκάς*. Vulgaris Iuglandis nostratis non erat opus magnitudinem indicare. Lego *Ἰσκάς*. Plinius etiam aliter scribit, τὸ *πύρρον* καλεῖται. Fiant ex ea trabes. τῆς τῆς Ἰσκάς. Quod alibi *Ἰσκάς*. Theodorus ad opus tectorum malè. Vides apud Vitruvium, quid sit tectorium opus, quid trullificatio. Plinius simplicissimè: firmissima in tectum. Et hæc Scaliger, Cuius argumenti vim nondum intelligimus: cur non erat opus Iuglandis nostratis magnitudinem indicare, an quia Theophrasto vulgaris sit?

Ita ita, quoniam nomine fuit vulgaris: fortè autem nomine Euboicæ nucis fuit vulgaris, nec adhuc videmus, quid impediatur, aut cur Plinio repugnemus? non tamen asserimus, quandoquidem peculiarem arborem magnam Scaliger dicit, sed non qualem *Ἰσκάς* καλεῖται [ pergit Theoph. lib. 5. cap. 8. ] vtilis ad rem ædificatoriam, tum subdilem, tum obruendam sub terram: durat enim

immunis putredine, quinimò omnium præcipua operi subterraneo redditur. Et cap. 10. Quibusdam operibus molliores carbonibus expeti solent, ceteris ferreis metallis, τῆς καυῆς τῆς *Ἰσκάς* [ Iuglandis Gaza ] cum iam exarferit. Theodorus omisit *Ἰσκάς*, sicut sæpè hæctenus. Scalig. legit *Ἰσκάς*. Nam hoc tractat, quem ad usum ei *καυῆς* expetuntur. Narales nunc quod concernit, Solum, ut apud Theoph. lib. 3. de caus. cap. 7. videre est, nuci Euboicæ, opacum atque roscedum conuenit. Nec non & ad flatus loca situm commodè obtinere non parum prodesse animaduertimus, quamobrem id quoque considerandum est. Prorsus omnia locum spiritus placidi quæ-

runt: etenim alimenta locis eiusmodi meliora, fructusque maturiores præbentur. Ventosum & inquietum nulla penè arbor humana persequitur. Paræ namque detortæ, exigueque proueniunt ex flatuum ictu. Quibusdam etiam sylvestribus, locus eiusmodi nocet. Fructus enim suos perficere nequeunt, sicut de nuce Euboica quoque narrant ad florem vique tantummodò proficisci, cum illæ, quæ locis tranquillis stant, ampla incrementa suscipere, secundissimæque euadere possint. Omnino enim [ quod sæpè numero diximus ] temperiem suæ naturæ conuenientem, omnia desiderare videntur: pariter in cæteris rebus, & in mutationibus æris. Sed fortasse sunt etiam, quæ locorum propria poni debeant: quip-

Euboica  
cap. 1.

Lignum spon-  
taneum.

Gaza molis

Scalig. rō  
preb.

Duratio

Carbones

Locus:

Plin.

pe cū singula (vt retulimus) diuersa secundum materiam habeant: non solum, quodd eandem meliorem: deteriorēque possideant, verū etiam quodd ferant, vt Imolus, Olympūque Mysius Nucem, & Castaneam [ *ῥέοντες δὲ διὰ βάλανον*, putat legendum *ῥέοντες*. ] plurimam ferunt. In Euboea verò, & circa Magnesium Euboice, ( *Ἐβωϊκὴ πόλις* ) Peculiaris arbor, vnde & cognomen, Scal. ) multar quidem habetur, è reliquis autem nulla.

*Fossia Euboeica.*

Ceterū fossionem huic quoque vtilem esse, ostendit Theophrast. lib. 3. caus. cap. 14. his verbis: Fossio omnibus prodest: tollit enim quē impediant, vel auferat pabulum, ipsūque solum humectius atque suspensius reddit. Adhuc autē humo permixtus (permisceatur enim necesse est, cū terra agitur) præbet vaporatam quandam humorem, atque alimonium efficit. Quocirca solum fugalidum atque siticulosum, fodere, agitareque saepe oportet. Palustribus quoque, viginosisque fossio prodest: quanquam mirum appareat, solis inter se aduersus curam eandem posse conducere. Verū nihil mirandum id est: alterum enim siccit, alterum humefacit, scilicet cū vtrumque contrario adiuuari desideret. Alimento autem meliori, vberiori que, cū ipsæ arbores vigent, fructus meliores creantur. Nam & nuclei minores, & eorum quæ ligno crustæ teguntur, vt Nucis Euboicæ, tegmina tenuiora, inestina verò aliorum vti que sunt: quippe omnino alimentum copia humefacit pulpamque auget fructus. Quas ob res ratione sic euenit, quod si reliqua quoque addit cultura, magis magisque amphores, suauioresque fructus perficiuntur, quoniam & plus alimenti, & amplior excoctio foret. Nunc semen (quod autore eodem, hist. lib. 1. c. 18.) postremum in omnibus est, humoremque atque calorem in se habet: qui cū desierint, infecundum relinquitur) quorundā protinus post tegmen ambiens subest, vt Palmæ, Nucis Amygdalæ: quibus ambientia plura vti que sunt, ceu Palmæ: quibusdam caro, & nucleus interiacent, vt Olæ, Pruni, aliorūque.

*Rex Euboeica.*

*Semen.*

Pulcherrima hic de semine contemplatio, quæque mereatur esse pars nostrorum (inquit Scal. g.) librorum, quos ad hanc materiam, multis laboribus digestis numero septem. Ait Theophrastus, in omni semine & humorem, & calorē esse: diuina vox. Altera materia est: altera aut forma, aut formæ affecta, quæ instrumentum. Alterum est principium actionis, cum proportionē ad mare: alterum passionis ad semellam.

*Ἐν δὲ βάλανον*. Deficientibus calore, & humore, semina sterilesce, sicut & oua intelligemus: etiā verò alterutro tantū deficientē. Theodorus desierint. At desit, quod fuit. Philosophus autem hic profundius sentiat, vt non solum calor, qui fuerit, abeat: verū etiam, qui esse debeat non adsit, sed desit, vt in ouis hypenemiis: cū mabit calor & corrumpit, *ἐκπύει* dicitur alibi à Theophrasto: tunc desinit: in principiis constitutionis. si non inest: deest, non desinit. *ἀνύπτω* vniuersalius, quàm *ἐκπύπτω*. Sed & hæc verba [ *ἡ δὲ ῥῆσις ἔστιν ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς τὸ πρὶν ἔχειν* ] excitabant contemplationem iudicū non vulgaris. Sic enim dicit *ἔστιν*. Statim, inquit, sub tegmine est semen in quibusdam. In aliis autem *μυτῶν*, scilicet tegminis & seminis, est caro, & testa. Igitur opponit *τὸν περὶ τῆς ὀστέας*. At videamus exempla *ῥέοντες*. Oluam ponit, & Prunum, rectissime. Inter nucleum enim & cutem interest caro, & testa. Videamus exempla *ῥέοντες*. Palmulam ponit & Iuglandem, & Amygdalum: quasi verò non habeat

cutem Iuglans: deinde carnem, tum autem testā. *ῥέοντες*. Nam quid est *περὶ* in Pruno, quod non sit in Amygdalo? Neque enim semen est ipsa testa, sed quod intus. Quid quod etiam aliquid aliud præterea habet Palmula: quippe membranam inter os & carnem. Quid quod ipse, cū dicit, *ἔστιν*, sibi contradicit, atque ait: *περὶ δὲ τῶν τῶν ἐμπεριέχοντα, ὡς τὸ πρὶν ἔχειν*. Postremò in vtrāque diuisione est, & Palmula, & Oliua. Vtrāque cum carne esculenta, vtrāque cum cute, vtrāque cum testa nucleum operiente. Theodorus *καρὸν, ἔμυτον*. Nucis Amygdalæ: verū minùs cautē. *ῥέοντες*. Nam Amygdalum quoque nux est: melius Iuglandis. *περὶ* Plinius item nucleum vocat, quoniam nucis vicem gerat. Nucleum nos excoctauerimus: vt nucleus, quod intus esset esculentum tantū significaret. Est autem valde æquiuocum nomen *ῥέοντες*, si & Oliuæ nucleum significet, & ligneum Punici acini, intra quod nihil aut est, aut non apparet.

Sed quid hæc morāmur, ad negotium propius accedamus in sistitum, Arborum (pergit Theophrast.) nulla semine nudo, sed aut carne obducto, aut cute, aut crusta *τὸν περὶ σπέρματος*, *δύναμις* *τὸν δὲ ἔμπεριον* ceu Glans, & Euboicum: aut ligno, ceu Amygdala & Nux: nullum in vasculo semen arboris est, nisi conum vasculum dixeris, quod absolui de fructibus potest. Semina ipsa quibusdam protinus carnosā, feuilla, quæ nucleum, & glandium genere comprehendunt. Quibusdam caro in nucleo est, ceu Oliuæ, Lauro, & aliis. Sed quid ad hæc Scaliger. *ἡ σαρξ, ἡ δὲ ἔμυτον* aut carne semen obducitur, aut cute, ne intelligat carnē solā, etenim ipsa quoque cute ambitur, nec intelligit cutem aliter quàm solam. Cutis naturam diuidit in duo, sic: *τὸν περὶ σπέρματος*, *τὸν δὲ ἔμπεριον*. Quid sit *σπέρματος* haud satis percipio. Theodorus vertit crusta, vt sit *ἐκπύπτω*. sanè placet: verū contextus non placet. Sic enim scribit, aut cute, aut crusta. Igitur non videtur diuidere *τὸν δὲ ἔμπεριον* in crustaceum, & *ἐκπύπτω*, at Theophrastus diuidit. Sic ego diuiderem, extimum operimentum, in cutem, membranam, corium, lignum, testam, os. Cutis est, in frumento: membrana in acino Punici: corium, in Castanea: lignum, in Iuglande: testa in glante: os, in Pistacio. Notabis diligentius, si pro *σπέρματος* legas, *ἐκπύπτω*. non conuenire exempla de glante. Etiam illud animaduertes *ἔστιν* hic distingui *ῥέοντες* *τὸν περὶ σπέρματος* tanquam diuersum ab Iuglande. Itaque in 4. hist. Euboicas arbores etiam in Magnesia oriri, pro narratione minimè vulgari posuit: vt intelligas errorem Theodori, qui in 5. nec semel, *ἔστιν*, nucem pro Iuglande est interpretatus, dum Plinii auctoritatem nimis securus famæ sequitur. *Διὸ τὸν περὶ σπέρματος* Theodorus, quod absolui de fructibus potest. Non intelligi quid velint sibi verba hæc: at Græca ita interpretor: *χωρὶς τῶν ἄλλων* *ῥέοντες*: à natura fructuum segregati. *αὐτὸν δὲ περὶ σπέρματος*. Semina, inquit, protinus quadam carne, exempla ponit. Quæ in nucum: aut glandium genere censentur: alia, inquit, *ἡ περὶ τῆς σαρξὸς* intra nucleum carnem habet, vt Oliua. Quæ diligentius quidem sunt notanda. Apertā namque glandis crustā, protinus caro inuenitur: & non absimili modo, Oliua nucleo aperto statim carnem habet seminale. Videtur differentia: quia Oliuæ nucleus esculentū obducitur carne: idcirco dixit *ἔστιν*, hoc sic apparetur, vt potest. Nam sanè alterum exemplum videtur laborare: ait enim Iuglandem habere statim carnem seminalem. At enim verò eadem sede & Iuglans habet,



bet & Oliua. In vtraque primo æquale loco est caro, quanquam diuerso vfu. Verum nunc non disputatur: sed de sede, atque ordine inter se, & medullæ feminialis, & integumentorum: deinde est nucleus, tum pulpa. Præterea nulla ratione conuenit exemplum bacæ Lauri, cum Oliua. Habet enim cuticulam Oliua, quæ à carne non abscedit: habet carnem: habet os: postremò intus medullam feminalem pusillam: at Lauri bacæ os nullum, *medulla* nullum. Sed primum, atque exterum, corium, deinde membranam, intra quam caro firma ac solida: qualis Castaneæ. Ea est bipartita nihil intra se continens, tantum ad verticem ligulam habet Castaneæ modo, quam ligulam vulgus germen vocat. *Huc usque Scalig.*


Ceterò apud Théophr. nos per *capitulum* intelligimus Auellanam, quamvis Scal. Iuglandem interpretetur, magna liquidum similitudo Auellanae & Glandium. Per Euboicam autem Iuglandem potius aliter, quam Scalig. nec videmus, quod repugnet, lignolum est eius putamen: cur potius lignum sit in glande, quam in Castanea, ut scribit Scaliger, aut cur Glandis putamen non sit etiam corium, aut dici possit, non intelligimus: Nec etiam illud cur in Iuglande testis, & non etiam in Pistacio? Si de Pistacio os dici potest, poterit etiam de Iuglande, vniuersum est aliud tegumentum aut putamen carneum. Quidam porò *capitulum de Pistacio* interpretantur Castaneam, ut Athenæus, quod idem faciunt, qui eum sequuntur, inter quos Rob. Conit. qui aut Athenæum celum miscere mari, Plinium & Gazam erroris accusat, qui Iuglandem interpretati sunt, eorum tamen opinio melius nobis placet. Constantini verba recitabimus cap. de Castanea lib. 7.

dam, aut ad inuiscendos amicos, aut ad solemne aliquid, totum corpus hoc liquore madefaciunt. *Corporum emittitur.* Is quò magis in corpore exsiccat, eò magis naturam colorem acquirit, qui vix verbis exprimi potest: est enim quodammodo inter nigrum & caeruleum, siue eum colorem, qui vulgò æurus dicitur, medius. Hoc insecti Barbari incedunt, non minus ornatos sese existimantes, quam nos nostris coccineis, aut holosericeis vestimentis. In America reperitur & alia arbor *Genipat* dicta, fructu multò maiore, eoque eduli.

## IVNIPAPPEEYWA BRASILIA-

NORYM NVCVVM FOLIIS SI-  
ut: Genipat.

## CAP. V.



Arboris ramulum [in] cuius [Clus. Exot.] foliis Nucum cum fructu. Franco. *Nucum se-* *luna* furti ad Manum accipiebant anno 1545. Londono vultus à Richardo Gauth. quem illud in tibell. exprime- dum erat ad m. et eius rector cum historia lestoris oculis propone- rem. Mittebatur autem Juniperi *Juniperus* Brasiliam appel. *Brasilia*. latione, quæ vox *rim.*

statim mihi suspicionem iniecit, illius arboris esse posse, quam Brasiliam *Juniperus* nominant; teste Iano Stadio Hæsto, qui apud *Tuppin Inbatus* nouem & amplius mensibus captiuus fuerat, de- mumque non sine Dei benignitate anno 1545. liberatus est: Theuetus & eum sequutus Lærus, corrupte *Genipat* nomen indiderunt. Huius porò *Genipat* præmansit deinde expressi succo, Brasiliam corpus atro colore inficiunt. Is autem quem accipiebam, mediocriter mali magnitudine erat, orbicularis penè formæ, supernâ parte, paulò planior, & veluti exigua coronâ insignitus, denso cortice, & [quia resiccatus] duro, exterius rugoso, & fulco colore, internè læui & spadiceo: tota pulpa quasi in massulam contracta erat ob siccitatem, plurimâque grana continebat simul *Grana* iuncta, quemadmodum in stramonio conspiciuntur, plana, nigra, rugosa. Ipsam autem pulpam, *pulpa aci-* *di saporis.* licet vetustam & prorsus exsuccam, paululum tamen præmansam, nigro colore inficere, & valde acidi saporis esse deprehendebam. Summo porò ramulo terni aut quaterni fructus inhaerisse videbatur. Sed & ipse Theuetus suo *Genipat* plures fructus extremis ramis coniunctim nascentes tribuit, & Iuglandis folia, quorum Stadius non me- *Iuglandis* *folia.* minit, ut apparebit ex vtriusque descriptione, reponenda in Peregrinarum Plantarum Historia ex variis Neotericis Authoribus, qui sdas peregrinationes descripserunt, à me, Deo concedente, concinnanda & in lucem producenda.

Cæterum, an etiam *Xagua*, cuius Ouietus c.

Y

## NVX INDICA NON BIFORIS

IUGLANDI SIMILIS.

## CAP. III.

A Duchitur quidam fructus ex Occidentis, ad eum Nuci Iuglandis similis, ut nondum introspicere, sapientius putauerimus Nucem Iuglandem esse: sed effracto, caro fuit velva, intus albidâ, Castaneæ modo, sed distinctâ nucleo, putamine & *capitulum* utraque crassiore, quam Nuci Iuglandis. Hunc Rôceile sibi dono datum à D. Launzo Medico, Lob. & Penæ obseruationi debet posteris, donec quid certius de ea resciscamus.

## GENIPAT AMERICAE FRVCTVS

TINCTORIVS: ET ALIVS EDVLIS.

## CAP. IV.

Genipat dictum fructum incolis Americanis, Isthore Theueto magni faciunt, non quia edulis, sed propter vsum eius ad tincturam corporis. Hi magnitudine & colore nostris Persicis similes in ramorum extremis nascuntur, sibi mutuo incumbenibus, miranda quadam ratione. Folia Iuglandis similia sunt. Fructus huius arboris succo Americani vniuersum corpus inficiunt, hoc modo. Miseri illi & bruti homines cum succum ex hoc fructu aliter exprimere nesciant, illum mandunt, ac si voraruri essent, deinde ore reiciunt, & manibus veluti spongiam exprimunt, ut succum emittat, qui ad nodum limpidus est. Profecturi igitur illi ad stragem aliquam eden-

Tom. I.

lib. 8. Prime partis Generalis & Naturalis Historiæ meminit? Certè easdem facultates sive Xagux tribuit.

### MACOCQVER VIRGINENSIS.

SIVM.

Descriptio



pediculo ad summum : continebat verò pulpam nigram [quia non recens sed siccus & vetustus] acidæque & quodammodo salis saporis, in qua plurima grana involuta, subfulci coloris, plana, & cordis [ut vulgò pingitur formam referentia, medulla albicante prædita. Quum porò hic fructus ex Virginia relatus esse dicatur, facilè mihi persuaderi linam illum esse, quem eius regionis incolæ *Macocquer* appellant, & [magno aliquo periculo liberati, vel bello defuncti, in lætitiæ signum structo igni assidentes] pulpâ feminibusque exemptis, implevit lapillis aut crassioribus quibusdam granis, ut maiorem strepitum agitatus & commotus edat, bacilloque aptantes manu tenet, perinde ac Brasiliæ suum *Tamaraca*, sed nullis pennis ornata.

Similem deinde anno 1602. à Christi nativitate, conspiciebam apud eruditissimum Iuvenem Joannem de Laet Ioan. F. qui illo anno Amstelredamum redemerat ab iis qui in varias provincias nauigant. Orbicularis verò formæ non erat, ut meus, sed paulò oblongior, fusco colore præditus, qui me præsentè, apertus, nigram pulpam superiors pulpæ prorsus similem, quâ grana, altèius granis non dissimilia, erant involuta, continere deprehendebatur. Ceterùm hic fructus non valdè dissimilis videtur *Higuero* tetrasyllabo Ferdinandi Ouiedi.

Conferant lecores historiam huius *Macocquer* cum Arboris *Iunipappeeyuna* Brasilianorum Clusii paulò antè dicta, compertient in iconibus & descriptionibus plaraque conuenire.

### IUNIPAPPEEYVVAE SIMILIS PENIS FRUCTVS ORBICULARIS IN quo semina Staphisagriae similia.

Descriptio

Orbicularis penè fructus è Brasilia ut referebat Paludanus, allatus : forma non valdè dissimilis *Iunipappeeyuna* Brasilianorum, teneriore tamen cortice, præditus, & superna parte planus,

### PLANTARVM.

atque quodam modo in tenerum *umbilicum* denominens : continebat autem interna parte, multa semina rugosa, Staphisagriae seminibus non dissimilia, nucleum continentia in binas partes diuisum : pediculus cui inhaerebat, triuncialis longitudinis. Clus. Exot. lib. 2. c. 7.

### IUNIPAPPEEYVVAE ALIUS SIMILIS FRUCTVS.

Referente Clus. Exot. lib. 2. cap. 17. à Richardo Garth. Londino missus fructus receptus è Brasilia, prorsus confectus, ut eius forma dignoscere nequiret : nullum nomen additum : putaminis fragmenta satis fragilia erant, foris & cineracei ex fusco coloris, internè nigri, pulpa rugosa & in vnum coacta, nigra, quæ gustata, acidi saporis deprehendebatur, & nigro colore inficiens, non secus quàm *Iunipappeeyuna* Brasilianorum : huius tamen cortex *Iunipappeeyuna* cortice fragilior, & in huius pulpa nulla semina obseruabam, quemadmodum in illius fructu.

### ARBOR VINIFERA, COTTON, IUGLANDI SIMILIS.

CAP. VI.

Mirabilis est arbor, quam Theuetus Americæ suæ cap. 80. sic describit. In Canada prouenit arbor crassitudine & figura similis Iuglandi, cuius vltus diu incognitus mansit, donec quidam excindendo arborem obseruauit fluere succum boni & saporis, qualis optimi vini Aureliensis, aut Beauniensis : ita iudicarunt noster capitaneus, & alii nobiles, qui eum comitabantur. Eius succi subito collegerunt quatuor aut quinque magnas amphoras : suo idiomate hanc arborem vocant *Cotton*.

### LIGNVM COPA-V SIMILE IUGLANDIS LIGNO.

CAP. VII.

Scribit Leri in Brasilia prouenire lignum, quod nominant *Copa-u* : cuius arbor similis quodammodo Iuglandi, non tamen nuces ferens. Afferes, uti vidi pro vtenilibus, adaptati, easdem cum Iuglande venas siue fibras habent.

### ARBOR TINCTORIA.

CAP. VIII.

Ator est, Theuetus inter arbores in Regno Senegæ, ubi Aethiopes degunt, arborem esse glandiferarum nostrarum crassitudine, fructu ferentem *Dactylis* parem, ex cuius nucleo oleum exprimitur miris virtutibus præditum. Aquæ permixtum, croceo colore planè inficit, quæ tingunt pocula, ac pileos quoddam ex Iunci, vel orizæ paleis contextos. Præterea id oleum odore est Violæ Martiz, olei nostri sapore. Quamobrem multi pisces, orizam, aliòsque cibos eo condiunt.

PENO-



PENOABSOV ARBOR AMERI-  
CANA.

C A P. IX.

**E**st & in America, eodem teste, arbor Penob-  
scou dicta, cortice odoris planè admirandi, foli-  
is Portulacæ, valdè fuffis, perpetuo virentibu.  
Fructus edat magnos, & grandioris Pomi magnitu-  
dine, orbiculatos, pilæ lufuriæ modo, minimè e-  
dules, imò venenatos. Singuli fenas Nuces intus  
habent, Amygdalis nostris fimiles, nisi quòd la-  
tiusculæ sunt, & magis compressæ, in fingulis  
singuli nucleï conduntur. Hi ad sananda vulnera  
mirificè profunt, quibus etiam ventur Barbari  
sagittis idi, aut quouis alio modo in prælis vul-  
nerati, ex his contusis oleo exprimentes vul-  
num, eoque vulnera illinentes.

NVX COVLCOV L.

С А Р. X.

Constantinopoli, autore Bellonio, venduntur Nucēs duos pugnos crassī, quibus caremus, quæ plenæ sũt patris granis effusivis bonis, Avellanarum modo dulces, *Coulcoul* vocant, id est Nucēs *Coulcoul*. Qualebenus lib. 3. epist. Matth. de plantis peregrinis Constantinopoli missis. De Coulcoul & Hebulden, inquit, nihil dum certi intelligere potui, nisi quoddam Coulcoul quibuldam in delictis sint, præsertim quando recentes ex Ægypto aduehuntur. Matth. respondens Qualebeno scribit, Nucleus quem *Coulcoul* & *Hebulden* appellas, est arboris quæ Staphylodendron appellatur. Ex quibus pater Matth. sententiam multum dissidere à Bellonii: notandum quoque Bellonium scribere Constantinopoli vendi semina *Hembulden*, quibus nos non vitium: separat autem eā à Coulcoul. Nec etiam Qualebenus videtur idem dicere Coulcoul & Hebulden: de iis plura nunc non occurrunt nobis scribenda.

NVX AROMATICA, VVLGO  
MOSCHATA.

C A P. XI.

**P**ost Iuglandem *Aromaticam* dici conueniat. Nam & generis nomen, & triplex cum illa inuolutum commune habet: & folia huius à nonnullis dicuntur esse Iuglandis similia, vt taceamus has conditas cum istic ab institutoribus frequenter adulterari. Adde quod exterius eius putamen viridi Iuglandis simile dicitur.

Quam porrò

maximè generum sunt Nucem moschatam vnum figura Oliuari, alterum longius minùque rotundum. Vtrumlibet verò genus, prout conditum adfertur, Persicam malum mediocrem æquat; primumque puluinato integritur, Iuglandis vel Persici in morem, calyce: huic subest mediocris crassitudinis putamen seu cortex lignosus, furis nec sapore nec odore, intus cinereus, foris ex nigro spadiceus, valliculis hinc inde depressis inæqualis, quas extimo & huic iam dicto cortici interiecta Macis dicta explet, reticulato plexu certis locis durum illam corticem obvoluens, pertiniaciū circa pediculum adherens, aliqui liber & incabitu duntaxat leui appressus facili negotio auellendus, coloris ex rubro flauescens, saporis iucundissimi aromatici, acrisculi cum amarore quodam, velut oleagineum quandam punctura remittens, quem & acui punctus reddit nucleus, quem vulgò omnes Nucem moschatam, erudit verò etiam totius nomine nucem mysticam vocitantus, oliuæ magnitudine, vel paulò longior, Dactylum tam figura quam magnitudine æquans, [longas appellant mares: oliuæ feminas,] coloris ferè cinerei extrinsecus & rugosus, spadiceis & ex fluo albicantibus venis vndatis, vel sine vilo ordine hinc inde discursantibus, substantiā solidā. Sed in pila fragili, nec difficulter in frustula dissiliente, sapore & odore aromatico & subastringente.

Author est Garcias, arborem quæ Myriciflora Nucem & Macim profert, Piri esse magnitudine, foliis eisdem, sed brevioribus & subrotundis, seu verius Persicæ malo haud absimilem, brevioribus tamen foliis. Fructum ferre, "duro cortice munitum, quo per maturitatem dehiscente, calycem echinatum, qui Castaneas amplectuntur modo, macis appareat. Verùm in his, quæ nostro orbi conditi importantur, non observamus echinum Castaneæ, sed Persici pulvinatum calycem, vix iam dicebamus. Reperitur, sed rarissimè, gemellis quodam nucleus, facie interiore, quæ se ambo nuclei tangunt, compressim, externè gibbosus, qualem & nos inter Exotica nostra naturalia reconditum habemus.

Porro videtur nux moschata, *καμάκου* esse apud *Cotacatum*  
Theoph. Scimus alios existimare, Comacum esse *Theoph.*  
Gariophyllos, de quibus suo loco. Nobis plausibi-  
lius videtur, esse nucem aromaticam, quia fru-  
ctum dicit. Verba Theoph. sunt: τὰς ὅλκας πάντα  
τὰ ἑσμάς, αἱ περὶ τὰ ἀρώματα χρώται, τὰ μὲν ἔχοντες  
καυλόν, καμίνον ἐπὶ ὀσάκῃ κατανύσσεται, τὰς δὲ ἔχοντες  
ἀσφῆδα, αἱον περὶ τὴν καμίνον, καὶ τὴν ὀσάδα, καμάκου.  
Ἔπειτα γὰρ τὰ καμάκου, καρπὸν τὸν ἔπειτα ὀσάκου νομίζον  
εἶς τὰ σπῆδ αὐτά. ἢ μᾶλλον. Sed ὁ ἔπειτα superfluum  
censum, & legendum post καρπὸν τὸν ὀσάκου νομίζον  
in: quem modum etiam Gaza legit atque con-  
uertit, hoc sensu: Cætera autem odorata, quibus  
ad vnguentorum confectioes odoras vtuntur,  
quædam ex India aduectuntur, ac inde transmi-  
tuntur ad mare: quædam ex Arabia, vt Cinnamo-  
mum, Cassia, Comacum, atque hinc diuersum  
fructum esse, quem vnguentis sumptuosissimis  
permiscere solent. Vides ipsum Comacum aperte  
appellare fructum: Gariophylli propriè sunt  
flores. Vnguentis etiam commodior nux mos-  
chata, immo expressus eius liquor per se ipse vngue-  
ntum est, vt his notis Theophrasti Comaco  
apprimè competat.

Eundem Cinnamum & Caryopon esse cen-  
 nus apud Plinium, nisi fortè Comacum quoque  
 legendum sit. Chiffletius tanè vir doctissimus &  
 & amicus noster singularis iamdudum Comacum

Cinnamū  
 Caryopon  
 Plin.  
 Comacum



legit apud Plin. pro Caryopon, vt Dal. quoque obleruauit. Sic autem ait Plin. In Syria gignitur & Cinnamum, quod Caryopon appellant. Hic est succus nucis expressus, multum à succulo veri cinnami differens, vicina tamen gratia. Pretium in libras asses quadraginta. Vt etiam Theophrasto clarids nucem nostram moschatam Plinius insinuasle videatur. Nucem manifestè dicit, Caryopon succum ei expressum: quod oleum dicere possis, etiamnum hodiè lautioribus Pharmacopœis, pro delicatiorib<sup>9</sup> exprimi solitū, quod mox in vnguentis et in limentis concretur. Reliqua quoque non repugnant: nam & vicinam Cinnamo gratiam habet, & ab eo tamen plurimum differt. Massicus autor in hist. Ind. Ad Bandam ditionis Molucarum vicinas aliquot insulas totius orbis terrarum solas [quod conslet] spontè, lautiores in epulas & medicamenta mortalium, ex vna eademque arbore Nucem myristicam & Macim progignere. Arbor [addit] Plinius ad Pyri similitudinem accedit: fructus Mala Persica quadantenus imitatur: floret quo tempore ibidem alia quoque plantæ & herbæ varii generis: è quibus vniuersis mirificus odor, incomparabilis cuiusdam suauitatis exsistit. Vbi desoruit maturescens pomum, paulatim è viridi, tum cœruleas luteasque, tum purpureas & igneas transit in maculas, quales in arcu cœlesti: atque eo ipso tempore Phitaci & alia aues eximie pulchritudinis ad gratissimum sibi paltum aduolantes augent oblectationem, cum folia & fructus & alites ipse variis colorum puturis in certamen vlque luxurient. Lud. Rom. Nuclei Mosch. historiam sequentibus tradit: Multicæ nucis caudex Persico caudici similis, ramos foliaque consimilia producit, verum nonnihil angustiora: priusquam nuce huiusmodi percoquant, sepi arborem mastix florentis Rosæ instar: & vbi nux percoxerit, mastix eam complectitur. Ex quibus sanè verbis apparet Ludouico Romano non bene cognitum fuisse Macis crescendi modum, quem maiè vocat Masticeen: non floret Rosæ instar, latet enim sub pulpa: fortè olim Mathioli ex Lud. Rom. descriptione curarat concinnandam suā iconem. M. Fumec in hist. gen. Ind. Gallicè conscripta Moschatam arborem similem Quercui facit, ferentem Nuce ut Glandes, aut more Dactylorum, quæ habeant Macim. Sed bonus ille vir de arbore sibi incognita, neque vîta scribens, adiecit quæ omnibus qui de ea tradunt, ignota sunt atque inaudita, ne dam vîsa, nempe Quercui similem esse. E contra, & rectius Maxim. Transylu. de Moluc. insulis, Nuclei Myristicæ arborem proceram, ampliusque esse dicit, eique, quæ Nucem luglandem ferat, admodum similem. Neque hanc Nucem alior, quàm luglandem produci, gemino protectam opimento, puluinati primū calycis, sub hoc tenuem membranā, quæ reticulatim nucem amplectatur. Hanc nos Muscata florem, [inquit is], Hispani Macim vocant. Alterum opementum, ligneum esse putamen, vt Auellanz, cui ipsa nux insit Muscata. *ἡ δὲ νύχτα ἀπὸ τῆς νύκτος, ἡ δὲ νύχτα ἀπὸ τῆς νύκτος* quidam Græcè vocant: alii etiam *ἡ δὲ νύχτα ἀπὸ τῆς νύκτος*. Sed nunquid Dioscor. incognita fuit Nux moschata? Fuit: nihil enim de ea scriptum: scribit quidem de Macerem de palliolo huius, seu cuticula foliacea, Macis dicto, à quo Macer haud parum diuersus. Auc. Giuziban, Nux muschata. Serap. Iezuba ne v. Mosch. nuc. id est Nux muschata. Item Bisbese, id est, Macis. Isaac Eben amram: Est cortex Nuclei Muscatæ, qui est supra corticem crassum in-

utilem: fructus qui velis, nominatur in Oriente Adaches. Hermodol. Nux odorata, quam Græci modò Caryon myristicon appellant, hoc est, Nucem vnguentariam, quæ sanè diuersa à Glande vnguentaria. Moschocaron, teste Ruell. à Græcis recentioribus dictum, Latini occasionem dedit, vt eius imitatione Nucem moschatam nominarent: ea membranoso primū vestitur calyce, foliato, fissili, mox lignoso. Mauritania factionis principes Macis nomine extimam intelligunt membranā. Ex quibus Ruell. verbis facillè patet ei crassiorē & exteriorē corticem carnē non fuisse cognitum. Nec intelligimus quid sibi velit his verbis, quando ait: Hippocrates Aegyptiæ Balani meminit. Sed multum à veritate mihi deficere videntur, qui Nucem odoratam, quam vulgò dicunt Moschatam, hac glande vnguentaria comprehendunt, longè profectò differentem, & Veteribus, vt existimo, prorsus incognitam. Aegyptia reliquarum modo ossa non habet in balanis. Aluum & menses sistit in vino austero, & vulnera agglutinat. *ἡ δὲ νύχτα ἀπὸ τῆς νύκτος* Aetio, Veteribus ignotum, Syluius: qui ait, historiam eius graphice depingi à Ruellio. In margine: Nux moschata vulgò, etiam si moschum non oleat. At nobis non videtur graphice descriptam à Ruellio, cui non cognitum fuit exterius corpus callosum, vti patet ex eius descriptione. Tigautius quoque à veritate multum deficere tradit eos, qui Nucem odoratam, seu Muscatam vulgò sub Glande vnguentaria comprehendunt. Nux Muscata, id est, vt scribit Cordus, fructus qui totus cum ad iustum peruenit incrementum, luglandis, viride carnosiusque putamen habentis, magnitudine cernitur, triplici cortice nucleoque compositus: exterior cortex carnosa cōstiterat, cui subest tenuior, non continuus, Macis appellatur: eo detracto apparet tertius in fusco, purpureus, lignosus, intra le nucleum continens subrotundum, oblongum, longitudine vicialem. Saporem habet & odorem tenuem, suauiter acrem, iucundum valdè aromaticum & adstringentem, qui Nux muschata vocatur: decorticatus ex India adfertur. Adferantur etiam integri fructus, melle conditi, quos nuper ceperunt adulterare, eius singulis nucleis, viridi luglandi putamini diuiso impositis, & rursus composito: qui dolus facillè deprehenditur mollitia, sapore, & quā diuise erant commissura. Carnosus enim Moschate nucis cortex iucundum habet saporem, solidiorēque consistentiam: luglandis verò austeriorem & molliorem. Similiter quoque excipiuntur Limonium & Chebulorum: [quos sic vocant] conditorum carne, sed hic dolus cōmissiuis deprehendendus est, quoniam condita earum caro gustu ferè nihil à Nuclei moschate carnoso putamine differt. Est & Moschata mascula, præcedenti similis, maior tamen oblongiorque, figura atque magnitudine ferè ad vulgares Palmulas accedit, cuius pericarpium quale sit, nondum nobis constat. Saporem habet subacrem, aliquantulum tenuem & aromaticum. An Galeno Chryfobalanos, cuius meminit lib. de comp. med. loc. 8. cap. 3. in duobus pharmacis Asclepiadis stomachicis: vbi ait Chryfobalano esse ex discutientibus & corroborantibus. Item lib. 9. cap. 4. in medicam. Asclepiadis ad Coli affectus præstabitur Chryfobalanos. Glaps muscata, Bapt. Fiore in carnis cœnæ. Nux sol quam pigmentum Moschatam appellant, Platine de honesta volupt. Myristica Nux Scaliq. Cornar. in Gal. lib. 5. de comp. med. cap. 1. Quæ hodie Nux muscata seu Muschata vocatur, non alterius (inquit)

An Dief-  
encognita,  
Nux Mos-  
cata  
Cinnamo-  
ban  
lutaque.



[inquit] generis quàm Myrobalanorum Græcorum censendam puto, & fortassis ea est, quæ Chrysobalano eidem Gal. lib. 8. citati operis appellatur. N. que enim credere sustineo Veteribus ignotam fuisse, in tanta hodie frequentia. Nam quæ ab Arabibus Medicis ei adscribuntur vires, magna ex parte Diosc. *bas. ab. uys. luss.* tribuit: verum est hæc in suo genere magis aromatica, & stomacho commoda, tum corroborans ac concoctionem iuuans, quod Dioscor. de Balano Myreplica negat: videtur *χρυσόβαλον* *χρυσόβαλον*, inquit. Ad olei certè ex ea expiessionem reliquis generibus etiam accommodatior videtur. Succum autem ex Balano Myreplica expressum, olei vires in vnguentis prænotis præbuisse Diosc. lib. 4. testatur, & cum in aliis, tum in Amaracino ac Cinamomino vnguento lib. 4. meminit, idem, velut Plin. quoque facit oleum Balaninum sæpè appellans. Nol. tamen hæc parte in hac rerum obscuritate quicquam allicientius adducere. *Hæc. C. mar.*

At Matthiol. Hodie, inquit, ignorita videtur quæ *χρυσόβαλον* Græcis vocatur, digerens & corroborans Indicæ Nardi modo, ad Colicos affectus, ventriculi ardores & singultus à Gal. Aesclepiadis autoritate commendata. Non de sunt è Recentioribus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum esse Nucem myristicam: cum tamen plura sint, quæ eorum destruant sententiam, nempe cinereus color, acutus oī sapor, & quod Myristicæ nucis nusquam meminerint Veteres Græci. Nallam huiusce, quod legimus, mentionem fecit Gal. in libris simplicium medicamentorum: id quod argumento esse potest, Gal. ipsum non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanus. Verùm Matth. rationes nobis non surs. ciunt. Primum quidem certum est, nostram Nucem aromaticam esse cineritio colore: interea tamen nullus (quod æquidem sciamus) meminit coloris Chrysobalani, nisi ab etymologia nominis sumatur. Verùm quid si non à colore, sed à præstantia aurea Balanus dicatur? Vel quid si propter Macin aurea dicatur, quo fortè obducta vasa fuerit ab Aesclepiade? Secundo, quid impedit acutus oī sapor, cum dicat Gal. esse ex discituentibus. Tertio, quod Veteres nusquam Myristicæ nucis meminerint, nihil ad rem, nam etsi hoc nomine non meminerunt, non sequitur tamen non potuisse meminisse sub nomine Chrysobalani. Quarto, cuius quoque momenti hoc argumentum. Galenum de simpl. non mem. nisi Chrysobalani, propterea Galenum non habuisse compertum quid esset. Quin potius Galenum existimamus scivisse quid esset, cum dicat esse ex discituentibus & corroborantibus, quæ sanè in nucem nostram aromaticam reperiuntur, & ad eandem nos nostra utamur, ad quæ Aesclepiades sua Chrysobalano utebatur, ut videre est ex facultatibus Nucis moschatæ attributis. Ita nolumus adhuc Cornarii opinionem reicere, existimantes Aesclepiadi, Galeno, & Prisco ad eod. illi quo cognitam fuisse Nucem nostram aromaticam, donec firmiora argumenta audiamus. Nec tamen eius sumus opinionis, Nucem moschatam eandem cum Balano Myreplica Dioscoridis. Matthiolum quoque lapsam in Myristica nucem Guilandinus ait: quodque Antiquis incomperat dicit non probat. Quid enim? [inquit] An eam Theophr. Comacum & Plinio Cinnamon Caryopon appellari euerteret?

Sed audiamus ipsum Matth. de Myristica nucem scribentem. Sic autem tradit apud Diosc. Myristicæ nucis, quæ vulgò offic. ob odoris præstantiam

Tom. I.

Moschata quasi Moschata dicuntur: Hæc post foliorum germinationem florem statim emittunt, quem Micim Arabes vocant: panditur is syluestrium Rosarum modo: & ubi maturitatem senserit, expansus eam circumplectitur. Suo Maci tanquam rete comprehensa Venetiis in Officiis visuntur, duro putamine conclusa.

Idem in post. com. Lat. & Ital. cum magnis figuris, mutata icone scribit: ut referunt it, qui Indica litorea perlustrarunt, has proferunt arbores quædam nostratibus Persicis haud ab similes, angustioribus tamen foliis ac brevioribus. Fructus nostratibus Nucibus adhuc in arbore existentibus persimiles sunt. Siquidem primo crasso ac viridi cortice conteguntur, cui deinde subest Nux ipsa, duro satis putamine oclusa, nostrate tamen tenuiore, quo fracto Macis apparet, subicundus, reticulatus instar nucleum circumvestiens: id quod palam faciunt Myristicæ nuxes, quæ saccharo, aut filiquarum melle adseruatæ, integræ ex India ad nos conuehuntur.

Cæterum miramur quid cogitarit Matth. quod scripserit olim, atque adeo vñquam scribere ausus sit, Macim esse florem Nucis moschatæ, ut etiam ex sua phantasia pinxit, & postea dicere, comprehendere tanquam rete, quod pictura etiam exprimit. Miraculosa profecto metamorphosis, nuper floris arboris, iam in fructus corticem transfigurati, atque adeo maior, quàm si Rosa Hierichont amica ita se ipera in nuxa die natalicio, Siluatori Christo dicto, vel partibus mulieribus. Sed quid opus dia verbis ludere. Macim arboris florem esse, eius cerebelli figmentum est vñum ex innumeris aliis, atque adeo veterator: è ab eo factum, quod figuram ex turd. se puone imaginaria, [quod quidem attinet ad florem] pingendam curare fuerit ausus. Si Nuxes moschatas, quales in India integræ conuehantur & in Europam importantur vidisset aut diligenter considerasset, animaduertisset præter durum putamen & Macim reticulatam, aliud esse externum, crassum & carneum nucamentum, seu putamen, seu callosum earnosumve corpus licet appellare, quale ferè in Iuglande, Amygdalis, Persicis immaturis & similibus.

Dum verò in post. com. Lat. & Ital. priorem errorem emendare satagit, alio nouo & crassiore ingemurat. Nouam quippe figuram atque descriptionem excogitans, corticem appingit crassiorum, quem fatetur adesse, ut in Iuglandibus: verum Macim esse tradit sub cortice duriore, immediae supra ipsam Nucem moschatam vulgò dictam, idque a parere ait in Nucibus conditis ex India allatis, quod falsum: perinde sanè, ac si nos lulos existimasset. Proinde ex eo quoque constat, posteriorem figuram ab eo fuisse effictam: nec probè sibi visam aut cognitam æconomiam partium Nucis moschatæ.

In Hist. Germ. alium situm Micim meritò tradit: verum quid sibi volunt in descriptione hæc verba linde Holtgrinde? id est, cortex lignosus mollis. In epitome quoque bene ab eo factum, quod situm Macis aliter, & ex ipsa adeo natura, non suo ingenio declaravit, nihilominus tamen in postrema, & reformata eius editione Macis dicitur flos: ut ipso adeo Matth. red. uiuo sed melius edocto opus esse videatur, qui repetitam suam Cramben recoquat, atque adeo digerat, quàm hæcenus factum, melius.

Camer. apud Matthiol. in hist. Germ. & Epitome reiecit iconem Matthiol. subrogata alia. Nec impunè nobis abeat Tabern. qui pro nu.

Tabern. not.

ce moschata deterius etiam figmentum exhibet, quod vna icone duas falsas Matthioli complectitur: qua postea icone de nouo nouissimam Matthioli editionem mactauit eius patronus: digno mehercule patellâ operculo.

*Hist. Lugd.  
not.*

Hist. quoque Lugd. Confarcinator censura dignus qui assumpta Matthioli descriptione ac figura falsa, securè & oscitanter praeferit, non animaduerso vtriusque natu: quod tamen ei facile fuisset, quippe qui ad manus habuerit libros Atom. Garciae, quem citat in margine.

*Alter hist.  
error.  
Munsteri  
not.*

Eadem Hist. aliam praeterea nouam, sed falsam quoque iconem ex Acosta ostendat.

Facilius excusabimus Munsterum, qui vitiosam descriptionem atque figuram in sua Cosmographia. exhibet quem scimus in alieno foro hac in parte versatum: hoc tamen docet, in Insula Sumatra nasci eas.

*Euch. Ros.  
not.*

Falsam quoque iconem in suo Herbar. habet Euch. Roslin.

*Euch. Ros.  
not.*

Curtius vno eodemque loco Macim bis describit, nec videtur eius extimum putamen carnosum cognouisse.

*Lacuna  
not.*

Lacuna ex his quoque est, qui tum Nucem moschatam tum Macim antiquis Graecis incognitam putant. Is quoque iconem falsam habet, diuersam à Matthioli icone: in eo tamen cum eius prior consentientem quoddam externum crassum putamen non habeat, licet ipse scribat, deferri in Lusitaniam siue Portugalliam conditam magnitudine Persici siue Melocotonis, in eius medio tenuem esse corticem, vulgò Macis dictum, restis modo inuoluentem testam duram: mox tamen sui oblitus, contrarium dicit. Macim esse florem Nucis moschatae.

*i. m. c.  
reprob.*

Lonicerus eandem cum Lacunae fictitiam iconem habet, & praeterea perperam scribit Macim & Macerem corticem ambire Nucem Muscatam, quae esset flos eius. Neque idem Macis & Macer, vti patet postea.

Dolendum Cronemb. ita vanum & fabulosum vt cum aliis de peregrinis scribat à se nos visus: Cudit enim hic suam descriptionem ex falsa icone Matthioli, vel alius alicuius. Si is vidisset Nucleos in arbore prouenientes, vel eas, quae ex India cõditae adferuntur, aliter descripsisset. Est enim supra Macim crassus cortex vel potius caro, & in Insulis & Persicis, nec floret Rosae instar, vti d. d. d.

*Non My.  
reprob.*

Nec sapit Amato Nucem Moschatam Myristicam appellari, eiusque nomine Herimolaum & Manardum, aliòsque doctores taxat, quasi minùs bene ita ab ipsis vocaretur, quoddam nomen Glandi vnguentariae ex directo respondeat, quâ Graeci βαλάνην μυριστινὴν sua voce appellant. Et sanè si rem suo pede metiri velimus, minùs propriè ita vocari comperiemus, quod ea vox sit æquiuoca, & vtrique vnguenti significatu atque respectu competat.

*Non pro.  
prie uis  
Nucem  
Myristicâ.*

Sed quid Costa de ea, Indiarum ille explorator? nimis Piro similem facit hanc Nucem, paulò rotundiorē, externum operimentum carnosum & durum aliquantulum, à Banda incolis ferè neglectum, nisi viridi cum sale & aceto velcerentur, quoniam grati & adstringentis gustus sit. Verùm eius iconem falsam esse, vel ad libitum factam, vel ex eo apparet, quod ramum pingit cum Nuce aromatica Maci tantum obducta, sine extimo putamine, quâ formâ vtrique ramo non adhaeret.

*Corticis  
sapor.*

Cronembur. lib. i. de Comp. med. Cornarium falsi scribit, existimantem Chrysobalanon esse Ga-

leni, vt ex colore & sapore vulgaris Nucis moschatae demonstrari queat. Sed cur non refutat eundem.

Garcias quoque vult Nucem moschatam cum suo Maci veteribus Graecis incognitam. Eos qui nostram Myristicam nucem Myristicam nucem Chrysobalanum Galeni esse volunt satis conuincit cum forma, tum colore & temperamento. Sed si formam Chrysobalani tam bene nouit, cur eam non docet: ceteris rationibus responsum prius, dum nobis res esset cum Matthioli.

Dod. Nucis moschatae descriptionem paucissimis comprehendit. Primum, inquit, habet corticem viridem crassum: deinde de pellicula quâ Macis supra putamen lignosum, in quo Nuc.

Alfimen fronde & fructu Persico, esse arborem Nucis Myristicæ, quam frequentem habent insulae orientis è Moluccis, vnâ referebant, (vt tradit Pen. & Lob.) qui attulerunt easdem Nucleas decerpas suis manibus amici, & triplici cortice protectas, quales conditae possant in offic. & posse nostro coelo assuescere negabant.

Iam Casalpini, qui diuersas descriptiones opinionēque nouas habet, audatur. Nuclei multi ita ex Insulis ultra Gangem aduehantur, maior Auellana, minor Iuglande, rotunda: adfertur autem purgata à suis putaminibus: aliquæ tamen visæ cum suis corticibus, vtpote immaturæ, quarum exterior tunica dissecta magis quam Auellanae calyx, colore rufus, aromatica, totam Nucem circumplectens: sub ea cortex ossileus continetur. Tradunt eius arborem Persico Malo similem: foliis paulò angustioribus: in inculis nasci, fructum ante maturitatem circumdare instar florentis Rosae, quæ postea perfectum Nucem complectatur vndique. Incolas verò eius loci, quamprimum huiusmodi complexū viderint, certum colligere. Alii distinctius referunt, arborem specie & folio Nuci Iuglandi similem: fructum completum magnitudine Mali Cotonei, externo cortice viridi & crasso, vt in Iuglande, qui Saccharo conditus gratus est gustui, & aromaticus. Sub hoc membranam tenuem contineri, quæ Macim [sortè leg. Nucem] circumdat, rubicundam & implicatam circa duriorē corticem: intra hunc poltre. num Nucem muscatam contineri. Eius mentio repetitur apud quosdam ex Graecis recentioribus, *Muscocarpion*, & Myristicam vocantes. Fortè Aetius eandem intellexit sub nomine Nucis Indicae, quod recipit in suffimento muscato. Arabes optimè nouerunt, in medicinis expetentes & medullam internam & externum corticem tenuem, quem Macim vocant: nam medius qui ossileus est, inutilis iudicatur. Si diuinare liceat in re ad eos ipsos Autoribus incomperata, quid obstabit si dicamus extimum Nucis muscatae corticem apud Dioscor. vocatum fuisse *Narcaphthum* inter suffimēta odorata quod ex India corticosum aduehatur. Alterum autem eiusdem corticem crassiorē esse Macerem, qui ob substantiæ crassitiem acerbus sit, & minimum quid redolens: ideo inutilis iudicatur, Serapioni. Quasi putamine tantum iis temporibus afferrentur, Nuclei in patria remanente: ea tamen vt pretiosa & valde peregrina oxofculabatur antiquitas. *Hallenus Casalp.*

Ceterum fabulosam esse historiam priorem Casalp. de tunicis & flore satis superque demonstratum. Nam quando dicit, exteriorem tunicā totam Nucem circumplecti: circumnasci florentis Rosae instar: postea cõplecti vndiq; falsantur hæc omnia. Vt mirum sit tam magnū Botanicum atque Philosphum, etiam post alios Scriptores, incon-



inconsultis commentatum de re, quæ diligentem considerationem optime merebatur. Sed, iniquis, ex aliorum relatione ista magna ex parte tradidit. Sed, inquam, eius fuerat, in tanto loco, & tam famola Italæ regione constitutum aliorum errores taxare, eos præferri, qui iam ante ipsum fuerant detecti. Censuram & considerationem etiam merentur ista, quando dicit, vifas cum suis corticibus immaturas esse: folia Iuglandi similia, nec addens Authorem, qui viderit: medium verò corticem osseum esse. Qualia sint folia, Persicine, an Iuglandis, fitemur nobis nondum planè constare. Corticem extimum non esse *Narcaphthum*, satis demonstrant ea, quæ de eo dicit Acoſta, nempe ferè neglectum corticem Nucis moscatæ: neque Garcias neque Acoſta aromaticam vim ei tribuit, ut fecit Cæſalp. Cortex ille alter siue putamen nihil habet, quod respondeatis quæ Diosc. & Gal. de Macere scripsere. De Maci & Macere subsequenti bus agemus capitibus: De Narcaphtho, suo loco.

De Nuce moscata mascula dicta, vel mapre, quædam peculiaria habet. C. Bauh. eam esse gustu adstringente, odore ferè nullo, cariosam magis, minus oleosam, affectibus ventriculi & capitis commodiorem. Verùm Nucleum masculam hæcenus non obseruauimus differre à vulgari adstrictione, odore, carie & oleositate: nec etiam viribus: ex venustate aliqua possit oriri varietas à vulgatis, præter magnitudinem & figuram quam habet: nam quia rariores, dantiùs adseruari solent, vnde fit vt exoleſcant. Deinde si odore ferè nullo sint, & cariosæ magis, non videmus quomodo ad prædictos affectus possint esse commodiores. Verum quidem est, Rondeletium olim pro roborando ventriculo prætulisse eas Nuces, in quibus minus sit oleositas, sicciore & magis succas. M. hi sanè Bauhino, quæ multo oleo reſerta, ructus mouent.

Nux moscata, *καρυω μωσκατ*. Conſtin Lex. quo authore, ipſe viderit: nili quia fortè eandem vocis vim exſtimaret quæ *μωσκατ*, Arab. *Laſſibaud*, vt quidam ſcribunt, id est, nux Bauleſis, & *Seigar*: Germ. *Muſcat nuß*. Belg. *Nore moſcaer*. Gal. *Nux muſcade*, ou *muſquette*. Ital. *Nux muſcade*. H. ſp. *Nuez de eſpica*, *nuç m. ſande*. Bohem. *Kuſſi Muſſatoſe*. Perſis arbor *Drach*. Turcis *Agache*. Vngar. *Serechón* dic.

Nascitur Myrſticæ nucis arbor in inſula Banda. Inueniri etiam tradunt in Moluccis, ſed non eſt fructifera, quemadmodum nec ea quæ in Zeilan prouenit. Garcias. Acoſta tradit in Molucis humiles eſſe, & fructu puſſilo naſci. In inſula maris Indici, Banda dicta, abundant in ſyluis ſpontaneæ, vt ſcribit Lud. Romanus. Nux moscata mas ex India quoque ad nos importatur, non tamen copioſè, vt reliquæ, ſed rarò, inter reliqua aromata, præſertim inter moscatas vulgatas.

Nux moscata, vt ſcribit Auic. calida & ſicca eſt in ſine ſecundi vſque ad tertium: ſtipica eſt: conſert lentiginibus & odorem oris bonum facit: conſert paniculæ & viſum acuit: corroborat hepatis, ſplenem ventriculique, maximè verò eius officium conſtringit, prouocat, & conſert difficultati vrinæ, & cum in oleis ponitur, conſert doloribus, & ſimiliter in peſſariis, & prohibet vomitum.

Serapio ſcribit: nucem moscatam Aben Meſuio eſſe naturæ Garyophyllorum, calidam & ſiccam in tertio gradu.

Ventrem & ſtomachum & iecur firmare tradit Aëtius, cibi coctionem iuuare: longis iocinoris

valetudinibus opitulari, ſed pulmonibus officere. Singulum tollunt toſta, aut ad ignem deficcant: fluxum ventris ſanant, maximè ſi in vino rubro ſumantur. Matrici viles ſunt, renibus & veſicæ: ad difficultatem vrinæ, quæ à frigida cauſa prodeſcit, & aliis multis morbis, tam virorum quàm mulierum.

Calculum ſrangunt & pellunt, maximè ſi macerata fuerint in oleo Amygd. dulcium, auctore Dod. Verùm tam calculum ſrangere credimus, quàm cætera quæ dicuntur id præſtare ſine vlla certa ratione aut ſirma experientia. Cordus annotat, Venetas mulierculas Nucem moscatam maſculam contra difficiles partus aſſumere. Pleſtiſque exſtimatur nux moscata caput confortare præ aliis medicinis, id quod & Placot. teſtatur in lib. de tuenda bona valetudine. Immaturam, atque adeò integram nucem ſaccharo condiant Luſitani: nam præter odoris ſuauiſſimam, & ſaporis gratiam, propter quæ expetitur, Indici Medici & Brachmanes multum illa vtuntur, in omnibus frigidis cerebri morbis, Paralyſi, & aliis neruorum atque vteri affectibus. Maioris verò æſtimationis ſunt apud illos grandiores Nuces, quàm apud noſtros, teſte Acoſta.

Deiſdem conditis ſic Amatus: Eſt Pomum quod non diu ex India à nos ſaccharo confectum deſerti cæpit, magnitudine qua Pomum Perſicum, rotundum, obſcuris quibuſdam lineis interſectum, nam color illi Perſici quoque in eſſe videtur. Huius autem Pomi caro ſuauiſſima ac guſtui gratiſſima eſt, & cordalis: & ea de cauſa eius libra quatuor venditur aureis ducatis.

Nucis myrſticæ dimidium, teſte Cam. ex vino huiusmodi, facit ad citam reſpirationem. Longè rectius ad diuturnitatem conduntur vina, vna aut alia nuce myrſtica in doſiolum micta, quàm impuro ſubſt. hure.

E recentibus priùs conſuſis & in cacabo calefactis prælo exprimitur oleum ſeu liquor oleagineus, qui refrigeratus Cere nouæ inſtar concreſcit, ſaturè ſuaum, fragantiſſimum ſpirans odorem, frigidis morbis, poſſimùm neruorum articulorumque diuturnis doloribus à frigore excitatis vtiliſſimum, quin & Veneris inunctionibus maximè expetitur, vt tradit Matth. Datur ex calido iuſculo aduerſus dolores Colicos, tormina, & cruciatus nephriticos.

Ex iſdem quoque, ſicut ex aliis aromatibus, deſtillatur oleum, Gummi arboris, quæ nucem myrſticam fert, vt reſert Camer. nonnunquam inter alia aromata à Luſitanis in Italiam importata, reperitur, eximiè fragranti odore præditum, ſi accendatur: pulchrè autem rubet, cuiusmodi ſe portunculam habere teſtatur.

Cl. Medicus Bapt. Montanus ſcribit ſæpiùs ſe huius præclaras expertum eſſe vires in imbecillitate membrorum corrigenda, poſſimùm verò articulorum, & podagra. Myrſticum oleum vnguinoſum, [ ex ſententia Lob. lib. de Baſſamo ] laxando & inquinando nec quicquam vulneribus glutinandis Baſſamo ſimile habet, nec ſtomachi vires colligendo idoneum eſt. Quamobrem Rondeletius in cordis & ventriculi corroborantibus medicamentis immaturas, ſecas, leues, auſteras, aliquantulum carioſas, adſtringentes nuces moschatas ponderoſis, maturis, vnguinoſis præſtebat, coquis, culinariis blandimentis committens pingues aut præpingues. In Anglia vocatus ad generoſam matronam prægnantem, quæ cum ſummo deſiderio auide duodecim nuces moschatas tanquam panem commanduſſet, in-

*Singular.*  
*Fluxus & tri.*

*Difficilis*  
*Grina,*

*Dod. not.*

*Ad diff.*  
*partum.*

*Conditio*  
*sacchari.*

*Paralyſis.*

*Conditio de*  
*ſcriptio.*

*Æſtimationis*

*Cita reſpi-*  
*ratio.*

*Dolorum*  
*correctio.*

*Oleum ex*  
*preſſum.*

*Dolor.*

*Calica*  
*Nephritis.*

*Oleum de*  
*ſtillatum.*

*Gummi.*

*Imbecillitas membr.*

*Podagra.*

*Ventricul.*  
*lat.*

*Delirium*  
*ab eſu nu-*  
*cum moſchi.*

incidit in delirium, vel potius ebrietatem, sed post imperatam quietem & somnum copiosum, repellentibus capiti admotis conualuit.

Idē Lob. Mafculus ad affectus vetriculi & capitis commodiores & aptiores ait: de qua re paulo ante vires iudicium nostrum diximus. Praefert tamen pollet, iis rationibus, quas modò ex Rondel. attulimus: quia mares ferè vetustiores esse consueverunt in nostris officinis, si modò habeantur.

*Experimē-  
tum ad-  
uersus Co-  
licum  
flatus ex-  
aqua feru-  
pau.*

In mea iuuentute, quum ego I. Bauhin. pedes Florentia redirem, & in Apenninis montibus frigidam avidius bibissem, subito incidi in insignes ventris dolores, flatus in scroto vexantibus, accedente tumore, sine tamen villa hernia praecedente aut subsequente. Cum existimarem me in monte prae doloribus periturum, itineris socius, insignis nunc medicus Ill. mei Principis, Ducis Wirt. &c. Othaldus Gabelkouer amicè obtulit Nuces moschatas, quas secum habebat. Deuoratis 4. subito per D. G. & hoc remedio liberatus fui à doloribus, atque iter perfecti sospes & incolumis: quod perpetuae gratitudinis ergò, & in gratiam aliorum qui in idem periculum incidere possent, huc à nobis referri par fuit.

*Adulteriū  
vici*

Sciendum denique Antuerpiā, & ex aliis locis adueni ab inlitoribus oleum Nucis moschatæ, quod interdum adulteratum. Adulterari potest addita cera. Fucus deprehenditur à peritis multicatione, qua cera se dentibus prodit, & gustu languidiore minisque acri. Odor enim etiam adulterati, vix reinitur, vt dignoscio solo queat. Praestat itaque vti recentem expresse, quale nos parari curamus in vsus quotidianos.

#### DE MACI ARABVM, SEV CORTICE AROMATICI NVCIS moschatæ.

*Eusebe.*

*Delectus.*

*Talisfar.*

*Serapio il-  
lustratur.*

**P**lacet de Maci seorsim agere, tum ob nobilitatem vtilitatemque eius priuatam: tum ne mixta tractatio Lectori pariat confusionem: quamvis in praecedentibus iam satis constet, quid sit Macis. De eo autem sic scribit Serapio. *Eusebe*, id est Macis. Isaac Eben, *Amram* est cortex Nucis moscatæ, qui est supra crassum corticem alium. Praefertur qui sit coloris fuscus: deterior est niger. Crassioris corticis nulla vtilitas, sed fructus, qui in Oriente vocatur Adaches. Macim dicunt aliqui esse corticem, qui non ex Græcorū regionibus apportatur. Color eius est flauus, estque naturæ crassa & admodum stipitiæ. Galen: Talisfar est cortex qui defertur ex India. Hæc Serap. qui salutem in eo laudandus quòd nihil tradat temerè ex se, nec confundat Macim cum Macere. Quod scribit. Dicunt aliqui quod Macis &c: (sic enim in impressis legitur) & quæ subiungit de Talisfar Gal. & de Machir Dioscor. ad Macim non pertinent, sed ad Macer. Recitat enim quæ Dioscor. & Gal. scripserunt de Macere.

Macis, inquit Auic. est simile quiddam foliis geminis, duplicatis seu inuolutis fassis, vergens ad rubedinem & citrinum colorem, sicut cortex, & lignum & folia, mordicans linguam, sicut Cubebe. Filius Mesuæ testatur esse corticem Nucis moscatæ. Auicennam verò confundere Maceris vires cum vinibus Macis, patebit postea ex vinibus Maci attributis.

Hermolai scribit: Macis Græcè *μαύρο* & *μαύρο*, cortex est rubens radice magna: Recentio-

res Macis non radice, sed Nucis odorata cortice ac folliculum esse affirmant, idque verò propius est, & planè ita modò cernitur. Fallitur in eo Hermolai. quod dicit Macis, Græcis *μαύρο* &c: non enim idem sunt Macis Arabum, & *μαύρο* Græcorum, quæ tamen errorem non animaduertisse Marcellum, (acris alioqui censor Hermolai) ex eius verbis apud Dioscor. lib. 1. cap. 100. patet. Ruell. Cornar. Cordus, Bacchanell. Had. Jun. Manar. Brunfels. Brassauola, alique viri alioqui doctissimi, secuti sunt. Sic enim Ruell. De primo cortice quasi nucamento Nucem moschatam inuolvente, non conuenit inter autores antiquos & recentiores. Namque Mauritana factionis principes Macis nomine intelligunt. Macer cortex est rubens arboris magnæ. Recentiores non arboris, sed odoratæ Nucis corticem esse contendunt: nobis verò licet hanc dirimere non licet. Item alibi: *Macis*, vt alii *Macer*, offic. *Macis*, Plin. Dioscor. Galeno cortex est arboris. Recentioribus odoratæ Nucis, idque verò propius. Iniuriam facit Ruell. citatis autoribus, quibus non Macis, sed Macer, cortex est arboris.

Nihil melius Cornar. Macis inquit, Dioscoridis profectò etiam hodie tum culinis tum Offic. notissima res est: sed non arboris corticem ipsi vidimus, sed Nucis odoratæ. Vulgus tamen nostrum, *Muscatebucet*, velut Nucis moscatæ florem appellat. Quare non ambigendum esse putat Cornar. Macis appellatum officinis & barbaris idem esse cum Macere Græcorum & Plin. Sed fallitur: sunt enim diuersa.

Miramur verò Cordum diligentissimum & naturæ penitissimum hanc sententiam descendere ausum vt scriberet, conuenire inter omnes promemodum doctos, Macer, corticosum illud aroma esse, à pharm. copolis Macis appellatum, ipsi Arabibus etiam id testantibus: qui in descriptione sui Macis Dioscor. caput de Macere allegant.

Nemo autem miretur cur Dioscor. suum Macer arboribus misceat, cum potius inter aromata de eo agere debuere. Venia dignus est in hac Dioscor. cuius ætate res noua, nec penitus cognita fuit. Credebant tamen arboris corticem esse quapropter ab eo inter arbores recensetur. Nostra verò ætate quid reuera sit cognoscere incepimus. Nam Arabes clarè scribunt corticem esse Nucis moscatæ. Item alibi: Macis seu vt Veteres vocat, Macer, nequaquam exterior vt hactenus nobis traditum est, sed medius Nucis moscatæ cortex. Vides ab eo manifestè confundi, cum tamen quid reuera sit, se scire sibi planè persuadeat. Sciuit nimirum quid esset Macis: non quid Macer. Ipse verò potius venia dignus, (non Dioscor.) qui Arabum scriptis, maxime Auic. deceptus, vnum & idem esse putauit, eaque propter de Dioscor. & Græcorum Macere non diligentius perquisiuit.

Ita Bacchanellus quoque idem peccatum committit in suis consiliis.

At audaciùs etiam Amatus: non approbo, infit, illorum iudicium, qui Macerem à Maci Offic. diuersum esse statuunt, quum reuera Antiquorum Macer, Macis nostra sit. (Si diis placet.)

Monachi quoque in Mesuen lata incedentes via: Macis, inquit, cortex Nucis Myristice: apud Dioscor. aut, Gal. Paul. & Plin. Macer, seu Macis, seu Macher vocatur, vt patet ex Serap. & Auic. Arabice etiam Talisfar, vt in Auic. & in Synonymis Rhafis, legimus Macim vocari.

Auic. can. duo capitula habet de Mace: vnum nomine Macis, in quo Andreas Bellun. multa correxit: [fortè etiam corrupt] & alterum sub titulo

*Auic. not.  
Macer  
Xyloma-  
cer.*



tole Talisfar siue Talisfar, vnde probatur quod ipse Auic. sub vario nomine varia intellexerit simplicia, cum idem sit Macis & Talisfar.

Alouis Mundella, in annot. in examen Braslauolz præ aliis sapere sibi videtur, quando inquit: Macer non est radice cortex, quemadmodum hætenus videre potui, sed cortex tantum simpliciter non radice, aut alterius rei vt Hermol. voluisse videtur: verba enim illa Galeni, quæ citat, Galeni non sunt, sed Plinii esse omnibus manifestum est. Sed sapiendo facit Mundella, vt nihil sapiat: nam quid sibi vult, non est cortex radice aut alterius rei, sed cortex tantum simpliciter. Cortex sanè (si sit) esse non potest, quin sit, vel fuerit alicuius rei cortex, *φλοιός, κερκιδός*, est enim nostro quidem iudicio de genere *φλοιός*: non haud secus ac indumentum, integumentum, vel consimilis aliqua vox, quæ respectu habeat.

Quando verò Hermol. dicit, [vt Gal. inquit] intelligit de his verbis [gusta acerbis, & cum quadam acrimonia, &c.] quæ ex Galeno sunt.

Ausimus & addere, non solum Plin. dixisse esse corticem arboris, verum etiam Guleum, quamvis fortè in Gal. excusari possit (si concedamus nostrum Macim esse Macerem Veterum, quod tamen non concedimus) quod dixerit arboris, non radice arboris, vt Plin. quandoquidem Macis supra Nucem moscatam prouenit, quæ fructus arboris est, potest dici quodammodo cortex arboris. Nam siquidem fructus sit arboris, & cortex fructus: cortex vtique arboris quoque fuerit: vel iuxta illud Mathem. quæ vni tertio &c. Hac igitur in parte non errauit Hermol. sed potius Cordus, qui putauit Macerem Diosc. esse Macim, & idè Diosc. redarguit, quod Macerem inter arbores reposuerit. Consultamus acutissimum Scalig. sic tradentem. Si noster Macis non sit Antiquorum Machir, facit suspitionem, Machir inuenisse: si non interit, nominis affinitatem multum valere ad persuadendum hoc illud esse, & illud hoc. Argumenta verò si verum statuunt, Myristice nucis corium Veteribus ignoratum, fieri necesse est: quod tamen ipsa nuce longè est nobilior, ac fortasse omnium aromaticum obinet facile principatum. Ex Arabum lectione, Macis aliud, aliud Machir. Macis ab Auic. pingitur inculentè. Machir verò est, quod vocat idem Talisfar. Vides quanta cautela sua prodat Scaliger: vt si vel peccare videatur, vix tamen inuenias in eo quod reprehendas.

Apertius doctiss. Syluius: *macis & macer* res planè diuersæ, quod ex Plin. apertè patet. Macer hodie incognitum: tamen pro Nicol. Macis Actuar. *macis* reponit. Macis Arabum membrana est extima, nucem moscatam propè totam vestiens. Propè totam ait, non enim omnino extima est, sed intra eam latet, & conuexo interioris incumbit.

Sic Matth. quoque Offic. inquit Macis, quo Myristice nuce prætextus instat continguntur, à Diosc. Macere multum differt. Differentiam non ignorauit Serapio. (idem & Hist. Lugdun. dicit) Quod cum compertum haberet Auic. de vitroque seorsim traxit, & Macim ad c. 456. relegauit: Macerem cap. 694. sub titulo Thalifar descripsit. Monachi nullam inter Macin & Macerem ponendam differentiam affirmant: nullam tamen auctoritate (quod equidem sciam) aut ratione nituntur.

Item in postrema editione reformata: Hic asserere non dubitauerim Macerem Diosc. & Gal. Myristice nucis florem esse nequaquam. Nam si

ad eos floris cognitio pertenuisset, veri quidem simillimum est, quod etiam fructus notitiam habuissent. In hac eadem reformata editione, quod vocat florem, paulò antè dicit sub crasso putamine subesse nucem duro satis putamine occlusam, nostra tenuiori Maci circumuestito &c. egregium sanè florem in Pomo latitantem.

Curtio quoque Macis aliud à Macere. Et Cronemburgio: qui omnes, qui contrarium dicunt, præter Galeni doctrinam, etiam Arabum testimonio conuincantur.

Et Rob. Const. *macis*. Recentioribus Græcis est Macis Arabibus, res planè diuersa à Macere. Est aromaticus cortex ambiens inuolucrum nucis myrsicæ.

Eadem dicunt atque statuunt apertè Dodi Lacuna, Garcias, Acosta, Hist. Lugd. Musa, & Recentiorum plurimi.

Cæsalp. denique de hac ipsa re sic scribit. Arabes authores optimè nouerunt in medicinis expetentes nucis moscatæ externum corticem tenuem quem Macim vocant: Macis nomen assumptum ex Macere, cuius Diosc. & Gal. & Plin. meminerunt. Nam Serap. ex Diosc. transfert, in corticem nucis moscatæ, quæ de Macere scribuntur. Scribit Diosc. de Macere ex Barbaria aduehi, &c. Ex ieiuna Diosc. Plin. & Gil. descriptione significatur incertam illis fuisse historiam, & non esse extimam nucis moscatæ tunicam: repugnat enim eius tenuitas & acredo maior quàm adstrictio. *Hætenus de arborum consensu & dissensu circa Macim.*

Macis, *macis*, quibusdam *macis*, non tamen Synonyma Antiquorum, Offic. Macis, ab incolis *Bunapalla*, teste Gurcia, qui ait, vocis *Besbabe* Auic. designationem se nunquam scire potuisse. Arab. hodie *nisebe & Besbaca*. Macis oleum Arab. *Gensifami*: Persis *Genzi erugaur*: Turcis *Genziar* dici, testatur Acosta. Germ. *Muscabluhe* / *Muscablist*: Belg. *Macus* / *foelic* / *blocm van moscaer*. Gal. & It. *macis*. Hisp. *macas*, *macias*, *Gingibre maqui*. In lingua hodie *maca* vocari, & *Bengua* lingua Malayæ: itaque *macis* nomen est. Indicum.

De loco in præcedentibus quædam attigimus: Et cum pars nucis moscatæ integrans sit atque essentialis, ibidem prouenire certum, vbi & ipsa. Ex India autem vehitur per Syriam in Asiam superiorem, & inde in Græciam. Item ab eadem India per Assyriam in Aegyptum, atque porro in Italiam, ad hæc per Oceanum Meridionalem: de iisdem Indiæ partibus in Hispanias, Scaligero teste, & hoc seculò copiosè longa & pertinaci navigatione ex Indiis, ac ipso adeò interdum solo natali, à nuperis Belgicis nauigatoribus in Germaniam copiosè cum Nucibus moscatæ alisque aromatibus aduehitur.

Sunt qui annos decem efficacem seruari possent nostris regionibus credant, quod Syluo acutiquam placet, qui vires eius citius euanescere magna ex parte existimat.

Diligendus autem Macis integer, crassissimus, silius seu rubentior, copiosior liquorem ex impressa plaga fundens, pinguisimum & ponderosissimum.

De viribus Macis sic tradit Auic. Macis Mescha dicit facultate similem Naremesch, subtilioris tamen. Paulus ait esse æqualis temperamenti, non calidum valdè, & esse siccum in secundo gradu. Resoluit tumores in cerato, quamvis habeat adstrictionem quandam. Halitum oris commendat. Ex eo cum oleo Violato fit caput purgium ad fœdam frigidam à flatibus crassiss in capite, & ad

Matth. nō.

linguar.  
*Bunapalla*.  
*Besbabe*.  
*Nisebe*.

Locus.

Tempus  
durationis

Delectus

Vires &  
Vfus  
Temperæ  
Tumores.

Oris halitus.  
Soda.

*emera-  
ma.  
Alus flu-  
as  
Dysente-  
ria.*

*Tempera-  
mentum.*

*Macis pra-  
fici  
Nuce mos-  
chata*

*Auc. not.*

*Cordia  
pup.  
i. entrop-  
cus  
Nuc. et.*

*Dod. not.*

*Vrina sup-  
pressio  
Cerebrus.  
Hatus  
Oleum  
Macis.*

*Podagra*

*Ad Ventri-  
culi frigi-  
dos morbos*

Hemicraniam. Confortat hepar & stomachum: fluxum ventris cohibet, & Dysenteriae confert: prodest matrici. *Hac ille.* Sed quaedam harum facultatum, praeterim posteriores sunt Maceris: ita ut appareat, vel ex hoc, quod etiam ante plus fatis inculcatum, Auc. hoc cap. miscuisse vires Macis & Maceris.

Macis membrana tenuis, ruffa aut flaua, interdum nigricans, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & nimium amaro, tenuium partium, calida sicca tertio gradu, ventriculorum roborat, coctionem iuuat. Succus expressus Gummi Hederae figura, quam ipsum Macis est valentius, autore Syluio.

Macis verò ex sententia Scalig. ipsa Nuce molchata nobilior est. Si degustetur, linguam & fauces admodum vellicat: odorem iucundum profundit & leuiusculum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facile ostendit Macin tantum calidi quantum sicci temperamenti concepit se, & fortasse plus calidi, quod pleraque dicat ex Paulo Auc. aequalem esse.

Rectè itaque Matthiol. nequiquam errare eos existimat, qui dicunt Macim odoratum exalfacere & pariter siccare in fine secundi vel in principio tertii ordinis. Quamobrem Macer esse non potest, cum dicat Gal. constare Macerem essentia pleraque frigida, terrestri: paucula verò calida.

Dod. Macis ad Cordis pulpitationem facit, utilior ad omnes morbos frigidos quam ipsa Nux myristica. Oleum è Mace expressum regioni ventriculi inductum, ei robur addit, nauscam & fluctuationes tollit, appetentiam excitat, & concoctionem adiuvat. Quod verò Dod. Macim sistere ait fluores muliebres, & facere ad Dysenteriam consulto omisimus: nam in hac quidem non astringimus praeteribere, veluti nec in illis si sanguine sint. Hic error pendet ex eo, quod vires maceris confunduntur cum viribus macis, calore. n. suo & acrimonia augetur fluorem muliebrem. In dysenteria etiam non conuenit, ea enim à bile & acrimonia sanguinis exoritur: in fluore albo pituitoso mulierum & diarrha & henteria pituitosa non improbamus.

Lacuna quoque testatur, mirè roborare ventriculorum, urinam prouocare, pellere calculum, & qualescunque flatus resolvere.

Fit in insula Banda ex Maci oleum admodum comédaturum in neruorum affectibus & aliis frigidis morbis: Acosta. Hoc Wellerii mercatores Augustani aduehant, quod fragrantissimum est, & podagram, mirabile dictu, pedi oblitum sanare Cronemburgius refert. Clus. quoque testatur vidisse se aliquando Vlyssipone oleum de Maci ex India magnis scitilibus delatum, quod magno aestimabant, atque in ventriculi frigidis morbis plurimum commendabant. Id verò erat inspissatum, & saponis Gallici ferè modo in tabellas vaciam propemodum densas, tres verò latas, totidemque aut amplius longas efformatum, pingues, subflauas, odoratas. Paludan. apud Linschoten. num notat, quod macis optimo remedio infirmitates stomachi sanet, digestionem promoueat, omnéque prauos humores consumat, ventositatibus expulsi.



# MACER DIOSCOR. ET GRÆCORVM.

## CAP. XII.



EX prædictis liquet, quanta sit inter doctos dissensio de Macere & Maci, multis existimantibus esse vnum & idem. Quamobrem, quia contraria seu diuersa, iuxta se inuicem posita magis elucescunt, hoc loco de Macere agendum duximus.

Cùm ego Io. Bauhin. Lugduni medicinam facere, Antuerpiam misit insignis Pharmacopœus

Richardus Sermois Insulanus corticem sibi ignotum ut dicebat, ex India aduectum, cuius nomen rescire exoptabat: id. a. primus detexit singulari diligentia & in materiae medicae cognitione versatissimus, Valerandus Dourez Lugd. Pharmacopœus. Est autem cortex crassius admodum, crassior multò quam Guaiaci, lignosus, durus, dentibus tamen atteri potis, cuius proportio magnæ arboris esse corticem ostendit, exterius ruber: fractus interius strias ostendit pulchras, alias rubras, alias albas, alternantibus pectinibus fuscis siue rubentibus & cinereis, perinde ac si laminis aliquibus constaret: gustu primum dulci, dein manifestè adstringente. Hunc corticem, ante annos triginta, qualem scripsi Macerem Græcorum, colatus eorum descriptionibus, esse iudicavi, nechaetenus inuenimus, quod melius respondeat.

Reliquam historiam pertinet Crisoph. Acosta in hunc modum. Maceris arbor vasta est & multis ramis prædita, vltimo multò maior, cuius folia in longitudinem sex aut septem uncias longa sunt, duas lata, exteriori parte dilutius viuentia, interiore saturata. Ea non alium florem, non alium fructum habere creditur, præter semen quoddam, denarii magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flauo, sapore verò Amygdalæ aut nucleis Persicorum maiorum, t. nui & candida membrana tectum: quod vesica quadà ex tenuissimis duabus simul iunctis & transparentibus membranarum constante includitur. Ea autem vesica in medio folio nascitur, alius magnitudine non dissimili, sed cuspidè obtusiore, & circa pediculum angustiore, colore medio inter rubrum & fulvum, inæquali & multis fibris à pediculo ad extremitatem recta linea ductis, crispo & rugoso, haud absimilis illi, quæ in Vltimo nascitur, paulò tamen est planior. Succo lacteo prædita est hæc arbor ut Morus, radicemque habet illi persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas, & cortice tectas, crasso, aspero, scabro, duròque, cinereo foris colore, interius albo & lacteo, succo pregnante dum recens est, flauescente autem dum sicca est, & admodum adstringente. Et licet succus ille cum ad-

striatione



frictione nonnihil mordicet, breui tamen euascat hæc velut insensibilis mordicatio.

Quia dubitamus an Lobel. eundem corticem nobilium pro Macere intelligat, exhibemus eius iconem nostræ eadem tabella iunctam.

*Macera* Diosc. cortex est Æ Barbaria aduehi solitus, subflauus, [ *καρδαμύνη* ] crassus, fatis [ *καρδαμύνη* ] Ruell. & Sarr. perquam] adstringens. Videtur autem Dioscor. Barbariam Gangetis Indiæ fluvii insulam innuere, vt annotat Sar.

Gal. Macer cortex est, qui ex India conuehitur, gustu fatis [ *καρδαμύνη*, non multum, vt quidam vertunt: Cornar. verò qui malè Macim intelligit, multum calfaciens. ] acerbum cum leuicula quadam acrimonia, odorata, iucundum sanè redolens, vt pleraque aromata siue odorata, quæ ex India conuehantur. Item: τὸ καρδαμύνης μάκρος ἀνὰ τὴν Ἰνδὴν ἐκείνης τοῦ φαρμάκου, καὶ τῆς Ἰνδίας καλεῖται. *Macera* Diosc. cortex est Æ Barbaria aduehi solitus, subflauus, [ *καρδαμύνη* ] crassus, fatis [ *καρδαμύνη* ] Ruell. & Sarr. perquam] adstringens. Videtur autem Dioscor. Barbariam Gangetis Indiæ fluvii insulam innuere, vt annotat Sar.

Paulus & Aetius de hociopo verba facientes, καὶ τῆς Ἰνδίας seu Ἰνδίας ἀποportari solitum commemorant.

Sic Plinius. & Macir ex India aduehitur, cortex rubens radices magnæ, nomine arboris suæ. Qualis sit ea, incompertum habeo.

Serap. Dicunt aliqui Macim esse corticem qui adfertur aliud quàm ex Græcia, flauum, crassum & stypticum valdè: Galeno Talisfar: Diosc. aliter nominat, nempe Machir &c. Idem Serap. eo ipso capite statim à principio tradit Macim diuersum admodum esse à Macere.

Talisfar, cortex Indicus adstringens, Auicenn. Ex infra scriptis autem viribus fatis apparere videtur Auicenn. nomine Talisphar intellexisse Maceris corticem, quamvis cap. de Maci, vires Maceris cum eo confuderit, vt prius dictum cap. de Maci.

Porrò Sole clarius est iam Macerem & Macem inter se differre, & res planè diuersas esse. Macer enim cortex crassus est: contrà Macis tenuis. Macer perquam adstringit: Macis sapore subacris est. Macer temperatus: Macis calida: reliqua ex vtriusque descriptione facilè innoteuit, quam differetiam non ignorauit Serapio, vt Matth. censet. Nam postquam tradidisset ex autoritate Hach, Macim esse Nucis odoratæ operimentum, dixit fecus esse, de quo loquebatur Diosc. quippe quòd scriptum reliquit: Macerem esse ligni corticem siue Corium. Quod cum compertum haberet Auicenn. de vtroque seorsum tractauit.

Præterea maximo est argumento, inquit Matthiol. quòd Macis & Macer vtrique inter se differant, quòd Diosc. Gal. & Paul. de odoratis nuci- bus, quorum Macis est tegumentum, nihil scriptis memoriæ reliquerunt: quippe si Macer, qui eis conuehebatur, Macis noster vulgaris extitisset, credendum sanè, quod cum illo quoque aduectæ essent Myristicæ nutes: quarum illi historiam, & facultatem, cum sint & in viribus & in odore admirabiles, nequaquam describere prætermisissent.

Quod Macer longè differat à Maci haud obscurè ex verbis Gal. colligi potest. Namque ipse gustu non reperio hoc esse adeò acerbum, nec tam leuiscula acrimonia, quin potius si degustetur, linguam & fauces admodum vellicat: odorem iucundum perfundit, & leuisculum amarorem quadam cum siccitate relinquit, reliquæque supra scriptas qualitates possidet, quas nemo dixerit Maceri conuenire, cui Gal. essentiam frigidam atque terrestrem magna ex parte, paucam

verò calidam tribuit. Matth. sententiam sequitur Curcius.

Sed quid multis hic opus verbis? præcedenti capite auctores dicti sunt, qui Macerem à Macè differentem faciunt: nunc hoc agendum vt constet potissimum de natura & essentia Maceris.

An Lob. & Pen. cortex Xylocassia facie, idemque vt ipsi coniectantur Dioscor. & Plin. Macer? Cortex [ inquit ] cuiusdam arboris stipitis imo exemptus, interiori sui parte valdè similis & concolor xylocassia, sed mindis crassus, ferè inodorus, aut quiddam Iuglandis & Lauri redolens gustu: perparum coloris glutinique mixti adstrictioni habens: cum autem Dioscor. & Gal. adstringens sit & calefaciat, arboris cortex hic videtur. Item Hist. Belg. Cortex Xylocassia facie: an Diosc. & Plin. Macer? Belg. Baselaer.

Monar. *Arbore contra il fusto*, id est, cortex ad alui profluuium: (vt Clus. verit.) Profert ( inquit ) nouus orbis pragramdem arborem, foliis cordis effigie, nullo fructu. Eius cortex digiti crassitudine aut amplior, solidus, durus, & ponderosus, tenui candicante pellicula integitur. Similis est admodum cortici Gayacan, vt Gentiana amarus, manifestè adstringens, grati tamen seu aromatici cuiusdam odoris particeps.

Cæterum ne quis fallatur, considerent Lectores Monardem tribuere suo cortici amaritudinem, cuius alii non meminerunt quantum nobis quidem constat. An fortè ab aliis audita ille scribat, vel de cortice diuerso?

Considerandum venit, an Clus. Exot. l. 4. c. 4. nostrum Macer intelligat, cum scribit: corticis cuiusdam pedalis aut sexdecim vnciarum longitudinis fragmentum Amstelredami videbam, anno à nato Christo 1603. apud D. Stephanum Backerum illius vrbis Medicum, binas vncias aut paulò amplius latum, fatis crassum, subrubentis exterioris coloris & veluti nodosum, internè subfusci, & & multis rimis hiantem, adstringentis saporis. Si meam opinionem de hoc cortice liberè proferre licet, plurimum ad Veterum Macer accedere videtur, tameti paucas eius notas nobis illi reliquerint, è quibus exactam coniecturam facere possumus. Eadem tamen facultates, Maceri tribuunt, quibus hunc corticem prædium ferebant ii, à quibus Backerus se accipere aiebat. Et qui incolas ad alui profluuium sedanda frequenter eo vt asserebant. Idem apud Acoftam cap. 12. de Macere, procul dubio noster cortex magnam affinitatem habet cum Macere Acoftæ.

Solemand. Macer Græcorum, cortex ille crassus est, qui hoc tempore à Lusit. iterum cognitis cepit importari. Scribit autem hoc in Cons. med edit. anno 1583. eodèque opere alibi his verbis. Macer quod ex Lusitania ad nos ante aliquot annos adferri cepit.

Sic Acofta nomen vulgare huius arboris apud Lusitanos tradit, *Arbore de las Camaras*, & *Arbore Sancto*: hoc est, Arbor Dysenteria, & Arbor Sancta: ab indigenis Christianis *Arbore de Sancto senteria* Th. me. id est, Arbor D. Thomæ, & *Macruyre*: à *Arbor Sancta*, *Arbor D. Thomæ*, *Macruyre*. (addit) cui arborem ostendi, aiebat sua lingua dici, *Cura santea macre nistusa garul*, hoc est, Macre ab Angelis ostensum hominibus ad ipsorum salutem. Certissimum esse ait Græcis probè notum fuisse Macer, de quo dubitamus, & quod plerique adhuc ignorant: nesciuisse autem Macem & nucem moscatam nobis apprimè nota. Admonuisse præterea se Medicum quendam Regis Co-

*Cortex Xylocassia facie.*

*Arbor contra il fusto. Folia cordis effigie. Cortex crassus, tenui candicante pellicula integitur. Similis est admodum cortici Gayacan, vt Gentiana amarus, manifestè adstringens, grati tamen seu aromatici cuiusdam odoris particeps.*

*Descriptio*

*Macer Veterum.*

*Macer Græcorum.*

*Arbor Dysenteria. Arb. Sancta. Arb. D. Thomæ. Macruyre.*

*Macra.*

chin, ne dubitaret, quin hic cortex Auic. Macer esset. Macis & Maceris differentiam Auic. probè fuisse cognitam: quippe qui Macem odoratâ Nucis inuolucrum cap. 456. & Macerem radicis corticem cap. 695. sub titulo Talisfar descripsit. Neque ignotam etiam Serapioni, qui ex auctoritate Isaac, Macim esse Nucis odoratâ operimentum dixit: Macerem esse ligni corticem.

Hinc patet Monachos suam oscitantiam satis prodere, quando aiunt Macim & Macerem non differre.

Hist. Lugd. de ea binis locis tractat: Primo sub titulo, Monardæ Arbor foliis cordis effigie. Secundo sub ut. Macer Acofæ.

De Xylomacere nihil habemus, quod dicamus, Solum nomen apud Neotoricos nostros, ut Herimol. Ruell. Curtium &c. inuenimus. Apud Antiquos nihil hæcenus. Crediderimus ab eis fictum occasione verborum Plinii superius citatorum. Meliora tamen docentes perlibenter audiemus.

Macer, teste Cronenburgio ex India conuehitur ut Plin. & Gal. dixerunt, non ex Barbaria ut Diosc. quare rationali coniectura in eo Scriptore suppositum hoc cap. Marcellus denunciavit sed mathiol. hanc difficultatem explicare conatur hoc modo scribens haud ignorandum est, nec Galeno nec Plinio, quod dixerunt ex India aduehi Macerem Dioscoridem repugnare, qui ex Barbaria adferri dicit: quoniam [ut Ptolomæus est autor] quædam in Indo fluuio insula, vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua faciliè comportabatur Macer: vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur: Quandoquidem, [ut inquit Strabo] omnia quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Acofæ perhibet, Maceris arborem nasci quibusdam Orientalibus insulis, præsertim verò in Prouincia Malabar, in insulis S. Crucis regni Cochim, tum in ripis fluminis Mangate & apud Granganor.

Vires & Macer, auctore Dioscor. bibitur ad sputum sanguinis & Dysenterias & alui fluxus. Gal. videtur ex mista constare essentia: pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem desiccatur valenter & proinde Caliacis, & Dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens. Hæc l. 7. simpl. At in lib. qui ei tribuitur de opt. secta Empir. sic ait: Finge à me Macerem nunquàm expertum esse, qui arboris cortex est ab Arabia delatus. Hunc omnes quicunque de medica materia scripserunt alium conspire affirmant: nunquid illis credendum erit, vel non credendum? ego quidem credendum assero, cum omnes ita esse conueniant. Talisfar apud Auic. Indicus est cortex, adstringens cum acrimonia, non nihil odoratus, in quo est substantia terrea plurima & subtilis. Nulla in eo nec caliditas nec frigiditas effectui digna à Gal. memorata. Sunt tamen qui calidum & siccum faciunt in secundo gradu. Adstringit & potenter siccatur, & resolut, nam ex mixtis constat substantiis, sed terrea præualet. Consequitur Diarrhæa, Dysenteria, mensibus immodicis hæmorrhoidum nimio fluxui atque tenesmo. Hæc Auic. Verum quod antè non inuenimus, ex viribus Talisfar ab Auic. hic traditis, apparet de Macere hic propriè agi, quem & separat à Maci, licet male huic quoque illius tribuat vires, ut patet ex cap. præcedenti.

Carapotia Paulus catapotia ex Macere ad Dysenteriam

admiranda prædicat. Videtur autem ex eo solo parata intelligere, cum aliquo liquore conuenienti, nam nihil preterea addit. Reinerus. Comiti. se præscribit ad compescendum fluxum sanguinis verinum, ac dicit Lusitanos in acido lacte ad Dysenterias uti. Radicis cortice recente, ut tradit Acofæ, trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto, omnis generis Dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes medici cum Brachmanes tum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis siccæ & in pulcrem redacti semenciam per noctem macerant in quatuor vnciis feri lactis, eumque bis in die propinant manè & vespere, deinde medicamento sumpto, oryzam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinaceos coctos, maceratos & tritos in Oryzæ decoctione statim agro exhibent: interdum si necessitas urgeat, Opium admiscunt, roborandi medicamenti causa.

Solent verò etiam Arabes cuiuscunque generis alui profluvia Opio, Nuce moschata admixta curare. Huius item radicis vsus salutaris creditur, ad vomitus compescendos & ventriculum roborandum cum aqua Menthe, & Maliches puluere.

Brachmanes quidam Medicus rogatus de huius corticis, quem Macre vocant, facultatibus, in hæc verba respondit. Si vos Lusitani hunc corticem probè noleatis, multò plurius ipsum faceretis, quam Piper: sed quoniam isthic in Lusitania eius facultates ignoratus, idcirco contemnitis. Pulvis quem in omnis generis alui profluvia ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percuratis, confectus est. Rhizotomus quidam isthic mihi assererat, istius corticis apud ipsos vsus esse in compescendis vomitibus, aluique profluiis sistendis, pluriusque pollere huius radicis portunculam, quam magnam quantatem Myrbalanorum aut Atece, tamque præstantiorem esse Cori Malabarico.

Referabant præterea Macre fructum omnis generis lumbicos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo vterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus nec, inebriari posse.

Monardes quoque scribit suum corticem magnè esse apud Indos altimatione, ut qui eo vrantur aduersus omnis generis alui profluvia, huius pulueris drachmæ pondere, aut paulò amplius manè propinantes ex aqua conueniente, aut crasso vino rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruaturque in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est. Eiusdem corticis fragmento donatus sum antè paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alui profluiis inueteratis magno successu.

## NVX AROMATICA FEMINA

### CAP. XIII.

Ubet hîc Nucum Aromaticorum, descriptiones ex Clusii exoticis subicere Nucis Myristicæ inquit, vulgò appellatæ, quam feminam Myristicem, & quæ apud nos frequentius in vsu, historiâ satis persunditione tradidisse mihi videtur Garcias ab Orta cap. de Maci: nec qui hunc per omnia imitatus, Christophorus à Costa c. de Nuce moschata, multò plura attulit. Horum commentaria ante multos annos in Epitomen contrahebam & Latina faciebam, additis etiam in ea scholiis, & interdum





interdum nonnullis figuris certe in scholo ad caput de Maci Garcia, Nucis integræ per mediū sectæ iconem, eiusdem insuper suo illo crasso o-  
perimento liberatæ, vt Macis facilius conspici posset, dabam. Quia verò anno 1600. ex insula Banda, in qua sola nasci perhibet, à Batavis recentè allatas conspiciebam murâ conditas cum suis tenellis ramulis

& foliis, illius descriptionem paulò accuratiorem dare conabar, quæ in hunc pinum Exoticorum librum inferatur, & ipsius Nucis integræ cum suo ramulo & foliis expressam figuram adiucendam existimabam. Referentibus porro diis qui in Banda insula fuerant, arbor quæ Nucem myristicam fert, magnâ copiam istic spontè nascitur, & excelsa est, Pyro haud minor, perpetuò virens, & frequentibus ramis prædita, quos teneriores videlicet & virentes, alternatim, non ex aduerso, sed inæquali serie ambiunt folia, Laurinis proflus similia, minis tamen dura, & paulò interdum latiora, siue, vt verius comparem, Mali Arantii foliis propiora, ademptis appendicibus, breuique pediculo nitentia, in ambitu non serrata, sed venis quibusdam à medio nervo in latera excurrentibus insignita: fructus satis crassus est, mali Persici magnitudine, orbicularis, nisi superâ parte pediculo proximâ aliquantulum turbinatus esset: breui autem pediculo inter folia ramo non inheret, vt Matthioli & plerique alii exhibent, sed ex tenuioribus extremitatibus ramulis oblongifido crassiusculoque pediculo subnixus, pendet, singularis vt plurimum, quemadmodum ab ipsis Indis, quos Hollandi ex Iava à Antiochodam anno nonagesimo septimo supra milleimum & quingentesimum aduexerant, deinde ab ipsis Hollandis triennio post ex Iava, vtdixi, reducibus intelligebam, tum ex ipsis nucibus, suis ramulis qui folia adhuc retinebant in hærentibus, murâ conditis, ab Hollandis eo anno relatus, deprehendebam: interdum tamen binas etiam nucas coniunctim nasci, se observasse mihi afferebat Cheirurgus, qui Hollandis in ea professione comes fuerat. Constat autem is fructus denso operimento, quod veluti sulci cuiusdam, illum in binas æquales partes diidentis, formâ præditum est, eaque etiam parte maru-  
mum dehisce, Macis sub ipso latente & nucis corticem retis instar ambientem ostendens, adeò vt rubentem & elegantem initio, vt admirationem pariat, sed aëri expositus, paulatim illam elegantiam amittit, & flavescentem colorem tandem contrahit. Ex recenti autem oleum extraxerat D. Lambertus Hortensius Medicus dum in Banda erat, rubens admodum, liquidum, & magni ad pleraque usus, præsertim verò ad roborandum ventriculum.

Audio in eius Insulæ montanis illam etiam arborem nasci, sed fructum vix maturitatem conse-

Tom. I.

qui: eam ob causam illius nucem negligi, cum adseruari nequeat, sed breui terebinem sentiat & duntaxat legi, vt Macis adimatur: quæ verò ad nos aduehantur nucas, earum esse arborum, quæ in planis & cultioribus locis nascuntur.

## NVX AROMATICA.

CAP. XIV.



Quia nemo hætenus (quod equidem sciam) dicit Clusius myristicæ nucis oblongioris, quam marem censent. historiâ tradidit (nisi eam designare videtur Christ. à Costa, quum scribit grandiores nucas maioris esse pretii apud incolas, & pluris æstimari quàm apud nos) non inutile operam me sumptuum arbitratum sum, si eius breuem historiâ,

qualem videlicet ex ramo sicco sua folia & fructum retinente, donato Cl. V. Petro Passauio, concinnare potui, hic subicerem, atque ipsius etiam effigiem Lectoris oculis proponerem. Erat porro is ramus sesquipedalis longitudinis, crassitudinem autem habens tubi pennæ anserinæ, quo ad scribendum uti solemus, retinens adhuc aliquam ligni præcedente anno nati partem, cineræci coloris cortice tectam, superna autem quæ illo anno quo ramus abruptus nata erat pars, tenerior erat, & nullâ medullâ interâ partem præditâ, coloremque habebat ex fusco rufescentem, hunc ramo inæquali siue adnata erant septena aut octona folia, longè sinè maiora & crassiore pediculo prædita, quàm illius quæ nucem mofcatam vulgò notam refert: etenim illi folia sunt Mali Aurantiæ foliis non ab similia, exceptâ illâ appendice, qua Nucis folia carent, & tenuiora pediculo nituntur, gracilioribusque etiam ramulis adnascuntur: hæc verò folia, licet non rursus densiora, interdum pedis Romani longitudinem æquabant, trium aut amplius vnciarum latitudinem, magnâ autem ex parte, eorum longitudo septem aut octo vnciarum erat, latitudo duarum cum semisse, color parte prona canescens, supina viridis & splendens: à medio illo crassoque nervo folium per longitudinem medium secante, exoriebantur alii minores tenuioresque nervi, ad folii latera expansi, vtrinque quatuordecim aut quindecim, nonnunquam etiam plures, iique non pro folii amplitudine, sed indifferenter: nam in pedalis longitudinis foliis interdum tredecim aut quatuordecim duntaxat observabam, in iis verò quæ septem vncias solummodò erant longa, quindecim, sexdecim, aut plures: tenues præterea, & vix conspicuæ ob folii spissitudinem, obliquæ venule per nervorum lateraliū interstitia erant sparse, & licet ante multos menses abruptus fuisset ille ramus, atque inter chartas adser-

Rami de-  
scriptio.

Corticæ

Folii

Mali Aur.  
rami.Color fo-  
lior.Sapor &  
odor.

Nucis.

uatus, non mediocrem tamen acrimoniam, sed suauem & non valde utentem retinebant folia: Summo autem rami fastigio inhaerebant binæ Nuclei crasso breuique pediculo innixæ, in quo tamē binæ aut triæ alia coniunctim creuisse videbantur, quia adhuc apparebant vĕstigia vbi adhæserant, atque etiam in ipso rami fastigio bina alia similia pediculorum loca: vt non sine causa Abdala Guzaratenſis, qui prima illa Bataurorum in laua navigatione Amstelredamum aduectus fuerat, deinde ſecunda reuectus, mihi affirmaret Nucem myrſticam, ab illo enim percontabar an ſingulae nucleis in foliorum alis naſcerentur quemadmodum pingiſſi Matthiæolus ] Inſignis modo prouenire, vide licet ſingulares interdum, binas, ternas, et plures nonnunquam, & coniunctim in eodem crasso pediculo notas, de hac nimirum nucleæ mare ipſum voluiſſe dicere arbitror, quoniam illam quæ nobis in uſu, aliter prouenire certum eſt. Ceterum hæ nucleæ binas vncias longe erant, ſummoque ſuo operimento recte valde ruſoſo, nec illo quidem valde crasso, quia ante earum maturitatem ramis abruptus & villum ſuum Amygdalarum inſtar retinente, ferruginei hoc eſt ex ruſo fuſci coloris; in binas æquales partes ſiſſæ & hiantes, nucleumque oſtendente ſuo maci eam reticulatam amplectente ſeptam, cui ſimilem eſt ſuo operimento exemptam, ſuo tamen Maci operitam, ab eodem C. L. V. Paauio acceptam, inferiore tabellæ parte, in qua huius nucleæ ramus cum ſuo fructu immaturo expreſſus, adici curabam: Macis autem illud, etiam reſiccatum, elegantiſſi coloris quidem eſt eo quod aliam nucleam ambit, ſed multo inferioribus viribus præditum eſſe creditur.

V. C.

Vulgam. A. Nucis.

Nucis.

## ADMIRABILIS FRUCTVS INDVS.

CAP. XV.

Deſcriptio



Oculum

\*

indine continebatur, foris ſuſca, & fungoſa quadam materia obſitus, durus, vt qui reſiccatus, interne albus & coracæ duriciæ: membranacea illa ſolia, multis venis erant diſtincta, & rhomboidis formæ; atque vncialem longitudinem & latitudinem habebant. Nullum eius nomen indicare poterant Indi ab Hollandis aduerſi, quemadmodum multarum aliarum rerum: ſed quæcunque ignorabant (ignorabant autem plurima, vt qui omnes vilia mancipia fuiſſent, præter Abdalam, quæ in laua morcede conduxerant, inter-


rogati qui vocarentur; Madagaſcar reſpondebant, tanquam innuere volentes, apud ipſos non nata, ſed eſt Magaſcar, ſive D. Laurentii inſula, eſſe delata, quia nauderos Hollandos inter aliquot dies hæſiſſe non ignorabant, imò illorum natum nimum inde aduectus fuerat.

## DE CORYLO ET AVELLANIS.

CAP. XVI.

Corylus ſatīna.

Varius operimenti modus vt antè indicatum, aliter enim nux Iuglans, nux Myrſtica aliter, & aliter Auellana ex Corylo producta.



herbaceis, barbatis, hirsutis, adſtingentibus & acidis obſepti, magnitudine dimidio minores vtiplurimum Iuglandæ, oblongi vel globoli, putamine umbilicato per maturitatem ſtaveſcēte, aut ruſſo, leui, lignoſo ac duro ſatis: cui ſubeſt pellicula in domœſtici quibuldam coccinea, in aliis ſubruffa, nucleum obueſtientiſ albidum, firmiſculum ſicut Amygdali nucleis, eiuſdemque ſapore dulci, lacteum remittentem ſuccum. In auellanis nucleis, antequam nucleis formetur aut perficiatur, ambiens pulpa eſt candicans, tangola. ſaporis acidi. Ipſi verò nucleis plurimum obnoxii ſunt vermikulis, qui deficiente intus ac omni conſumpto aut in nigrum puluiſculum redacto nutrimento, ipſam etiam putamen pertundunt & protepunt. Ipſa Corylus arbor eſt, ex radice crassa latè ſe diſfundente nodola atque criſpa, caudices magna ex parte aliquot emittens, in multos ac robuſtos ſubdiuiſos ſtolones virgalesque lentas & obſequioſas, quales quotannis emittit nouas, nec ramoſas: materie candida, molli. Caudex vbi annuoſus fuerit, cortice obducitur incano, & Viſcum nonnunquam producit, teſte Trago.

Theophrastus in Coryliſeu Nucis Auellanae hiſtoria haud brevis nec ſterilis eſſe videtur, qui eius in quamplurimis locis & καρύας, & ἀραλίων καρύας nomine meminiffe videtur, quamvis circa interpretationes non conſentiant autores. Ergo eius de ea dogmata collecta, conſiderataque in lectoris Botanici gratiam hic referemus: ſic igitur ait.

Corylus ſeu vt Græcum habet ἀραλίων καρύας, (inconſideratè hic quis Nucem auellanam vertat, Conſiſt.)





ticarum & Heracleoticarum cognitio haud ita ex ipso Lectori sit obuia.

Porro Auellanam Seruius ab Auellano, Campaniæ oppido, ubi abundat, dictam putat. Ponticam Græci, quod in Euxino Ponti frequens sit. Ita & Theophrast. Heracleoticam, ab Heraclea Ponticiuitate: alii Præstantinam ab agro Prænestino atque (vt ait Macrobius) vnaquæque natio huic nomen indidit ex loco, ubi copiosè nascatur: Corylus autem a bor ἀπό τῆς κορυφῆς, autore Prisciano,

Corylus  
Snde.

& ex eo citante Curtio, quamuis ea vox (quæ locum aliquem denotare videtur) nondum planè innotuerit nobis. Platina de honesta voluptate: Nux, inquit, Auellana, seu Prænestina, quam Græci Ponticam vocant ex Corylo. Et Zuing: in Theatro ex Macrobio. Carlytani homines in agro Prænestino aluntur Nucibus Auellanis, quæ idcirco Prænestina dicuntur, & aliàs Ponticæ. Du Choul lib. de Quercu Auellana Nuci inter Glandiferas locum concedit.

Nux Auellana, quam Græci Heracleoticam appellant, nostri (Hermol. verba sunt) Prænestinam & Abellinam patriæ vocabulo: in Asiâ Græciamque venit à Ponto: propterea nunc Ponticæ nunc Heracleoticæ dicuntur: quo nomine Macrobius Castaneas intelligi falsò putat, Opium secutus. Ponticas sunt, qui & Alare ac Nuces cognominant. Inuenio & Alariam vocari arborem, vnde iacula & hastæ factitari soleant. Auellana nux, seu Corylus, vt putat Ruell. rara videtur fuisse Theophrasto, qui tam anxie singulas eius partes confectatur: apud quem eadem esset cum Al o, nisi folio esset latiore, & fructum ferret. Rura Gallica Nucellæ Coryliis vel Coryelos & Auellinas nominant. At nobis quidem præter fructum & foliū, ita videtur patere distinctiones apud Theophrast. inter Corylum & Alnum, vt ex citatis superioribus locis colligere est.

Marcell. Virg. Ponticas Nuces à Theophrast. semper Heracleoticas Nuces vocari tradit: de qua re nobis anceps iudicium. Supra in Theophrast. locis aliquot coniecturas ac difficultates motimus, an & ἡ δὲ φύς simpliciter alicubi apud Theophrast. possit esse Corylus vel Auellana.

Porro Ruellius, Fuch. alique nonnulli constanter negant Corylum florere, quod proculdubio non erant facturi, si Theophrasti codicem, vel potius, vt inquit Tragus, in naturæ libro hunc florem vquam vidissent.

Auellanae antea Abellinae, aliis Ponticæ vocitate, in magna, inquit Bruyer. nominum sunt ambage. Prænestinas enim nonnulli etiamnum dicunt, quod Prænestiniis abundent, vel quod olim à Pœnis inclusi, famem iis tolerauerint. Quidam verò & Heracleoticas. Lugdunenses nomen Auellanarum retinuerunt. Aulici & maxima Gallicæ pars, Nuculas. Galli nuptiis religiosas fecerunt, sed præsertim sponsalibus: vulgòque iactatur, in prouentu Auellanarum maximo, annum nuptiarum quoque fertilissimum fore.

Placotomus apud Eob. de tuend. valetud. inter Auellanas, ἀσπιδωτάς Græcis dictas, & Ponticas propriè dictas distinguit, hæcque ait Lampartische nussè Germ. dici, reliquique multò esse meliores, fortè intelligens eas, quæ alias rubiæ vulgò vocantur, vt patebit in differentiis.

Constant. in lex: ἡ δὲ ποικιλία, siue ποικιλία Dioscor. id est, ἡ δὲ ποικιλία διαφορῶν Polluci. Prænestina Nuces Macrobio: Auellanae siue Abellinae Plinio. Has minimas Nuces, vt Græci, Iuuen. Satir. 3. nuncupauit. Arbor quæ Virg. est Corylus, Theophrast. ἡ μικροτέρα καὶ ἡ ἑρπύλλη dicitur, & a

libi καὶ ἡ μικροτέρα, quo Atheni (apud quem Eu-  
bulum Auellanas καὶ ὅσα existimo nominasse) ex-  
ratum coarguitur, vbi inquit, πῶς δὲ ἡ μικροτέρα κα-  
ὲ ἡ ἑρπύλλη δὲς βαλάνους &c: quibus duo diuersa, distin-  
ctisque separata nominibus. Auellanas scilicet, &  
Castaneas confundit, sicut & Macrobius. Castaneam  
Nucem. Heracleoticam appellans. Tamen A-  
then. malo culpa liberare, errorè quæ depraua-  
to codici imputare: distinguendum enim pōt  
καὶ ἡ δὲ ποικιλία, substituendumque πῶς καὶ ἡ ἑρπύ-  
λλη ibi duobus locis inculcatum.

Philotimus δὲ τοῖς πλείοσι προσέθετο, προδίδωκε, λέγειν. Alex. ab Alex. non approbat eorum sen-  
tentiam, qui apud Tranquillum, vdi dicit Au-  
gustum ocellatis Nucibus fuisse intelligunt Au-  
ellanam vel oscillam. Dalechampius apud Plinium  
scribit his verbis: Ocellatas Nuces vocat Tran-  
quillus in Augusto, quod ea parte, qua barbatae  
suae cuti adherent, cum auelluntur, oculi figura  
delineata conspiciuntur, nec id in alia vlla Nuce ap-  
pareat. Alex. ab Alex. Quo loco plurima ludorum  
genera veteribus visitata commemorat: ocellatas  
Nuces dici putat Persicorū nucleos, quod crebris  
velut ocellorum foraminibus persus fuit, sed cō-  
fidenter magis, quàm rectè. Mnesitheus auto-  
re Goropio per Nuces Heracleoticas, Nuces  
Ponticas intellexisse videtur, quæ Nuculae Præ-  
nestinae dictæ. Nucula Sexto Pompeio, Nux mi-  
nima. Iuuenali Heracleotica, quamvis Castaneā  
interpretentur falsò: ἀναγὰς Hesych. teste Had-  
Jun. ἀγὰς Dalechamp. Nux parua: Nux Coryli,  
Euch. Ræss. Caspar. Bauhin. tradit Auellanam  
apud Plin. barbatam Nucem dici. Iam suprà dix-  
imus Plin. Ponticas Nuces dicere, molli protegi  
barba: Locum verò ubi expressè barbatas Nuces  
vocitè, vel Auellanas vel Ponticas, nondum in-  
uenimus. Xyli quidem fructui confert barbatas  
Nuces, vt antea diximus, quas quidam Auella-  
nas esse volunt, nec resistagamus, Corylus: Nux A-  
uellana: Pontica: Prænestina: Leptocarya: Heracleo-  
tica Carya seu Nux: Carya Pontica: apud diuersos  
Herbarios dicitur. Nucamentum eius oblongum  
Theophrast. Germ. teste Trago, & Baselgaps-  
sen oder das getreid: Cortex exterior Nucis A-  
uellanae, Calyx. Germ. die enstetste schelt / oder  
leissel. Quod circa radicem annascitur, Germ.  
Maser / Theophrast. ἀσπιδωτάς & ἀσπιδωτάς. Gaza  
circummauonem & circummagnationem inter-  
pretatus est. Hist. Lugd. frustra florem denegat:  
& floris loco iulo proferre dicit. Nos Theophr.  
Trago & Gesnero assentimur, dicentibus flores  
habere præter iulos, vt qui eos sepius obseruaue-  
rimus. Lufim Hebr. Gencl. 30. Nucem Auellanam  
vertunt, notante Trago. Agileum apud Serap. id  
est, Auellana. Agilerz seu Bindich Arab. dici tra-  
dunt. Germ. Haselbaum / Haselhaud / Hasel-  
strauch: Fruct. Haselnuss. Gal. Conidrier, Nois-  
sèr, Noislier, Auellamer, Noissette, Noissette,  
Auellme. It. Naccinole. Nuculolare, Auellane & Nocelle.  
Hispan. Auellano. Castell. & Catal. Auellanas. Por-  
tug. Auellan. Belg. Haselnore / Haselax / Has-  
selnoterboom. Arab. Hasellere / Hasel denat.  
Bohem. Worechlystow. Nux Auellana Hung-  
monyaroza & iulus coryli siue flos Monyaro bar-  
kyza.

Sed differentiæ, harumque nomina quoque  
dicenda. Carol. Steph. Nuces Auellanas, in ma-  
iores & rotundiores, des Auellmes: ac minores &  
turbinatores, des Noisilles; distinguit. Fuch. in  
syluestrem, quam priuatim Germ. Haselnuss vo-  
cat: ait: & Urbanam seu domesticam Rhotnuss  
oder Rührnuss & Lampertische nuss: Tragus v-

trantque

Minima  
Nuces.

Pontica.

Prænestina

Heracleoti-

ca

Auellana

Lugd.

Nucula

Nuptiales

Pro agum

da Auella-

na.

Alare.

Alaria.

Nucella.

Cu.

Ruell. not.

Ruell. not.

Ruell. not.



tranque subdiuidit: fatiua rubras & oblongas fert, *Rohrbafelnuß* oder *Römiſchnuß*: ſylueſtris alia magnas, alia exiguas: quædam oblongas, nonnulla rotundas largitur Noces. Turnerus potiùs differentias quàm ſpecies eſſe putat: Hortenſis, Angl. *Fylberd-tree*: ſylueſtris, *Woodnut-tree*. Duas habet figuras: quarum vna Coryli: altera Pruni, errore typographico fortè.

Dod. *Vrbanas*, Gal. *noifettes rouges*, & Germ. *Rohrbafelnuß* antè dictas veras Noces Ponticas ab antiquis deſcriptas cenſet. Lacuna in longas & rotundas diſtinguit: longas ſapidioreſ, maiores tardius maturari.

Noces Ponticæ, autore Cordo duplicis ſunt differentie: quædam ſpontè vbiq; in Corylo vulgari naſcuntur, quæ à Germ. *Bafelnuß* nominantur: quædam verò, in hortis ſeruntur arbore Coryli ſimili, ſed fructu oblongiore, & toto ceu barbato putamine veſtito: nucleus ruſſa vtplurimum membrana cogitur. Plinius has barbatas in Xyli deſcriptione appellat. Eſt & tertium *Auellanæ* genus in hortis fatum ſylueſtri ſimile, ſed maius nucleo, & guſtu ſuauius. Quartum genus eſt, quod in Macedonia naſcitur, arbore non quemadmodum apud nos multiplici, caudice fruticoſo, ſed ſingulari, procero, & iuſtam arborem æquante: foliis latis, Nucibus in grandem racemû pingui magnitudine congeſtis.

An autem Veteres hanc cognouerint, neque negare neque affirmare auiſim. Certè apud eos, qui nunc extant autores, nulla eſt deſcriptio, quæ tam referat. Inuenerunt autem hanc Corylum in Macedonia & Hæmo Thraciæ monte Legati quidam Buda Conſtantinopolim miſſi, inter quos fuit & Paulus Rubigallus, qui hæc nobis retulit.

Butyerius & fatiuaſ duplices facit: quippe quædam inſignes rotunditate & amplitudine, membranam, quæ ambit, candidam habentes. Aliæ oblongæ magnæq; cubiſcentem tamen nocte, has Geſn. ait Lombardicas aliquos cognominare: additque vrbanas & rotundas, fatiſque magnas ſe vidille in Sabaudia.

In Italia, ſi Matthioli credimus, & in vrbanarum & in ſylueſtrium genere numeroſe reperiuntur. Ex domeſticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ ſunt. Oblongæ præſtantioreſ putamine, vehementer rubent, & fractu minimè ſunt contumaces, quales ſunt Vicentina, quæ tam ſuaui ſunt ſapore, vt Piſtaciis ſerè comparari poſſint. Siquidem non omnibus *Auellanis* idem ſapor reperitur, neque eadem pulpæ gratia: aliæ namque prædulces ac manuſ faciles, aliæ verò aſperiuſculæ & ingratioreſ, & manuſ duriuſculæ habentur. Oblongæ ſerius maturitatem ſentiunt: celeritùs verò rotundæ: quapropter illæ vegetiori ſunt nucleo, diùque perdurant. Sylueſtres in Tridentinis montibus oblongæ & rotundæ. Veſtitur *Auellanæ* nucis putamen viridi calloſaq; membrana, in extremis tamen mollior & ſimbroſa in barbatum protrahitur: quo fit vt quibuſdam hæc Barbatæ Noces appellentur, eſtq; genus reperiatur haud barbatum, ſed adeò breui amictu, vt putamen anteriori parte nudum videatur. Nuci nucleus quandoque albus, quandoque præpurea veſtitur membrana. Putamen aliis rubrum, aliis fuluo colore aureum, ruſum aliæ dulces, omnis acrimoniæ expertes: aliæ contra, eodem teſte. Cæſalpin. vrbanarum fructum candidiorem dicit, quod admitti poteſt, ſi putamine liberum, & cute ruſſa exutum intelligat nucleum. Camer. apud Norimbergæſes, Cellenſes, à quodam monaſterio prope VVurzburgum denominatas

Tom. I.

aliis præferri ait: ſed quales ſint non docet. Creſcere etiam apud ſe addit minores iſtas, quæ iſtis à loco, vnde adferuntur, Lugdunenſes vocentur. Colligamus paucis iam dictas differentias. *Auellanæ* aliæ ſylueſtres, aliæ hortenſes. Sylueſtres vel longæ vel rotundæ, hortentibus minùs ſapide. Hortenſes oblongæ & rubræ, putamine & cute interna, cæteris nobiliſſime habentur, & Germ. *rothe* vel *zame bafelnuß* / aliis *Rohre Bährnuß* / vt iam monuimus, ſunt & hortenſes illæ magnæ ampliſſimæ, Franciæ, Lugdunenſes, Lombardicæ, aliis Italicæ dictæ. Hæ noſtris regionibus cognitæ: nam quas Cordus Macedonicas vocat, noſtris hortis nondum innotuerunt. Habemus racemiferè ſpecie duodecim *auellanas* ſibi mutuo coherentes, verùm eæ de ſylueſtrium genere ſunt: item geminas, & trigeminas ſylueſtres & fatiuaſ non iniucundas viſu, naturæ peccantis potiùs aut luxuriantis opera, quàm diſtinctæ alioquin ſpeciei. Non inelegantiùs eſt, quod ſerè quadrangulum quatuor coſtis toroſis ac eminentioribus conſtans adferamus. Sed placet, mote noſtro, nobis obſeruaturn *Auellanarum* deſcriptiones, breuiter ſubiicere, quantum cæpleræque tam dictæ ſint.

1. Quæ paſſim in noſtris proueniunt montibus, ſylueſtres dictæ, paritè ſunt, albæ, ſubrotundæ, vel ſublongæ, vmbilico gibboſo putamine dentibus fragili flauſcente nucleo, v. continent, fungoſa atque ruſſa quadam cuticula obtectum.

2. Specie diſtinctæ ſint, an varietas tantùm, quas paruas admodum, rotundas, magis ruſſas, vmbilico magna ex parte ſeſſili habemus, adfirmare pro certo non auiſimus. Hæ quidem ſylueſtres ſunt.

3. In ſylueſtrium quoque cenſu habentur, vulgatæ illæ, quas paſſim in hortis & viridaria translatas colunt, arboris & fructus facie primis ſimiles, ſed lapidè ſerè maiores ſpecioſiorèſque, ſed vtrinque ſerè obtuſiores, nucleo habitiori ſuauioriq; pellicula albicante rectos. Longitudine tamen vociam non æquant, latitudine ſemunciali.

4. Eleganti varietate conſpicuæ, & ipſæ in hortis cultæ ſunt graciles admodum, & quædam callum ſcriptorum craſſiorem craſſitudine ſua, præſertim circa vmbilicum, non ſuperantes longitudine vnciali. Cylindrica atque toroſa ſerè figura: niſi parte inferna modicè dilatarentur, quò fit, vt à notabili illa rotunditate vmbilico tenuis prædita, deſcendant.

Prædictæ omnes & ſequentes putamine ſuo herbaceo media ſerè parte detectæ & nudæ, ob quam fortè cauſam à Piſticiſ caluſ nuncupatæ, vt quidam volunt.

5. Satiæ rubræ prædictis omnibus maiores, vnciâ tamen ſerè breuioreſ, vmbilico magno, ex lato, oppoſita parte exacuta: hæ putamini ſuo herbaceo atque barbato penitiùs immerſæ, vix acuminis partem exerunt. Eſtque exterius putamen magis barbatum cæteris, ſed principio minùs ſerè calloſo carnoſo ve. Cortex lignoſus durus, rubens, quem excindendo cuſq; idem cultro faciùs adaperias, præſertim non planè recentem, quàm dentibus. Nucleus rubra vel potiùs purpurante tunica contectus, præſertim in recentibus & haud ita pridem decerpta, guſtu gratiore præcedentibus: ideò & præ iſtis lauciorum menſis adhiberi ſolita. Vulgò perſuaſum ſcimur, prædictis omnibus facile cauſari, Dyſenteriam. Vnde

*Rohre Bähr nuß* à quibuſdam, quaſi dyſentericæ nucis.

*Nucis Bar-* Auellana seu Nucis dicta. Has Nucis barbatae,  
*bata* Bartusi / Io. Wittichius vocat.

*Auellana* Restant magnae illae, quas alii Lugdunenses, alii  
*magna* Italici vocant, vnciali amplitudine, rotundae: Et  
*Lugdun* hae rubro putamine ligneo contextae, sed duriores  
ceteris omnibus. Latiores tamen ferè sunt quàm  
altæ, vmbilico sessili, leuiter impresso: nucleo du-  
riori ceteris, gustus suauitate facillè cum rubris di-  
ctis certantes, ideòque delicatioribus expetitur.  
Lugduni saccharo incrustantur.

*Delectus.* Porro ex omni specie Nucum auellanarum præ-  
feruntur & modò dictæ magnæ: rubrae: sed & in-  
ter has & reliquas, quæ integræ sunt, ponderosæ,  
ligno non pertuso, corpulento nucleo, sapore  
grato, & inter Castaneam ac Amygdalum quo-  
dammodo medio. Duratiorne præferuntur maxi-  
mæ, vel ipsi rubris durabiliores, vti putatur: nec  
tamen sapore inferiores. Infimæ sunt syluestres,  
ligno ex nucleo candicante. Improbantur leues,  
perforatæ, quia vemiculose, vetustate oleagineæ,  
rugoso nucleo & exuoco. Delectus signum haud  
postremum quis capiat à Petronio Arbitro qui in  
suo Satyrico sic ait. Auellanas Nucis cum præca-  
tione misit in vinum: & siue in summum redie-  
rant, siue subfederant, ex hac coniectura dicebat,  
nec me fallibat, inanes scilicet, ac sine medulla  
ventosas Nucis in summo humore consistere:  
grauiores autem & plenas integro fructu ad ima de-  
ferri. Sed par est & Byzantinam dictam Auella-  
nam inter differentias accenseri.

#### AVELLANA BYZANTINA.

*Descriptio*



*Calycis*

*Fructus.*

*Nucleus.*

*Sarmentum*  
*modus.*

dura asperaque lanugine hirsuti, interiore parte  
lruis, continetque fructum Auellanae syluestri  
& spontè nacenti ferè similem, breuiorem tamè,  
duriorque putamine, vti illæ, constantem. Qualis  
verò sit, qui in eo continetur nucleus, indicare  
nequeo, cum vnicum duntaxat fructum mihi de-  
derit Man f. D. Daniel Vignad (de paucis quod  
ad ferendum retinuit) càmque ob causam con-  
stringere noluerim. Postea tamen cum plures nactus  
esset, & aliquot ab ipso accepissem suis calycibus  
inclusos & exemptos, non modò degustare volui,  
sed etiam telluri commisi in fictilibus, non cum  
suo calyce, vt antè mihi fuerat significatum, sed  
nudos: atque illi quidem altero duntaxat à satio-  
ne anno nati sunt, & in singularem virgulam ex-  
creuerunt pedalem, quam sine ordine oblon-

giora paulò quàm in vulgari ambiebant folia, per-  
inde tamen rugosa. Eius vnicum fruticem huma-  
nam altitudinem superantem adhuc alebam, eum  
Francofurto discessi M. D. XCI. sed qui vilius fru-  
ctus speciem non dūm dederat, imò neque etiam  
anno M. D. XCV. licet in magnà altitudinem ex-  
creuisset, vt ad me scribebat, cui arborem disce-  
dens reliqueram. *Clus.*

Idem Auellanae tarum admodum genus hoc  
atque peregrinum dicit, quod Turcarum Impera-  
tori cuiusque Proceribus in deliciis sit, Constanti-  
nopoli allatum. Constantinopolitanis & Sals-  
nusi Taber.

Montes (autore Constant.) amat Corylus, de-  
scenditque etiam in plana. Gaudet humidis & ar-  
gillofis. Sic Montes in Gallia & Germania passim  
syluestribus atque vulgaris Corylis vestiuntur, &  
nemora sciat, maximè vliginosa, aliqua sunt  
partibus Rheno finitimis, vt annotat Tragus. Vt  
Matthiol. in Italia vrbanae pariter & sylue-  
strius numerosus proventus. Syluestribus Co-  
ryleis, propemodum innumeris, sciat Triden-  
tini montes, quæ oblongas pariter, & rotundas  
largiuntur Nucis, tanta vberitate, vt eas rura sac-  
cis legant, vbi maturitatem senserint. Domesti-  
cis horti ornantur in Gallia & quibusdam Germa-  
niæ locis, quorum pèrgula vmbra superbiunt  
multa, densa, per canalicules ardores recubanti-  
bus expetitissima. In Heluetia, vt tradit Gelin. ro-  
tundæ minores in sepibus & syluis, præsertim hu-  
midioribus locis copiosæ: Vrbanae rotundæ in Sa-  
baudia, Laufannæ, præsertim verò Lugduni a-  
bundant. Has aliquoties Montb. in horto E. C.  
Lugduno accersitas plantandas curauimus, sed  
frustra. Rubras tamen habemus, ex Alsatia & Ba-  
silea accersitas, in quibus locis non infrequentes  
sunt, & optimæ. Syluestres verò hic passim in vi-  
cinis montibus proueniunt: itémque in Silecia-  
cis tam montibus & collibus quàm syluis, teste  
Schuyvenckf. In Scotia tum longe, tum rotun-  
dæ spontaneæ in syluis vbiq; autore Cargillo,  
medico doctissimo. Quales proueniunt Montpe-  
li diligenter non obseruauimus. Adueruntur  
quidem magna copia ex Hispania (vt perhi-  
bent) maximè illæ, quæ & Lugduni copiosè ven-  
duntur, & à nostratibus interdum emptæ mercato-  
ribus ad nos importantur. Tho. Hariot in hist.  
Virginæ insulæ scribit in ea prouenire Auella-  
nam Nucem [Coudrier] & ex ea incolæ arcus  
parare.

Iuli primo quoque tempore erumpunt, nondū  
solata hyeme. Imò & Octobri & Nouembri lu-  
los nouos exertos sæpenumerò conspeximus, qui  
deinde Martio aut Aprilis succrescentibus foliis fla-  
uifcentes abscedunt: mox verò flosculi emicant,  
& post eos folia. Fructus syluestrium Augusto  
mense: satuarum Autumno maturus legitur, te-  
ste Dod. Nos tamen etiam rubras illas satiuas  
Augusto in mensis sæpissimè vidimus. Locis ca-  
lidis Iulio circa Nonas matura est, teste Pallad.

Auellanae, eodem præcipiente, ponendæ sunt  
Nucibus suis. Nec amplius supra terra ducenda  
est, quàm crassitudine duorum digitorum. Planta  
tam. n & sobole expertum se testatur melius pro-  
uenire. Mense Februario, seu planta seu semen  
exponitur. Gaudet loco macro, humido, frigido  
& sabuloso.

Translatu miscunt syluestres, prægraciles  
virgæ desquamantur, crassioresque derafæ inter-  
polantur. Nux Pontica, vt tradit Didymus apud  
Const. feritur eo quo Amygdalus modo, aut  
Nux, & tempore eodem deponitur: Ex eo gene-



re est rotunda & oblonga. Rotunda si eodem quo longior tempore pangatur, celerius comprehendet, & leuior adolefecit. Arboreum si quis frequenter colloct, fructum meliorem copiosiorumque ferre traditur, neque itaque migrat in fruticem. Quare tonderi resecarique præcipiunt, sic fecundiorum reddi: alioqui si arborefcere patitur aliquis, in corpulentiam alimentum omne transferet.

Nuces Ponticæ, quas nonnulli Leptocarya vocant, ex sententia Dioscori stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritæ, & in aqua multa potæ, veteri tulli medentur. Tostæ verò si cum Piperis exiguo comedantur, destillationem concoquunt. Sin autem totæ crematæ fuerint, & cum axungia aut adipe vili tritæ, illita alopecis capillum reddunt. Aiunt nonnulli vsta putamina, & cum oleo ad læuorem contrita, castas infantibus oculorum pupillas persuso faciemque denigrat. Nucleus Auellanae, vt tradit Plin. capitis dolorem facit, inflationem stomachi, & pinguetudini corporis conferunt, plus quam sit venisimile. Et Gal. Est & aliud genus nucum minorum, quæ nimirum Ponticæ nuncupantur, plus habens essentiae terrestri ac frigidae. Itaque etiam gustanti austerior tum cortex tum planta, tum fructus apparet. Cæterâ magnæ Nuci Iuglandis similes sunt.

Simeoni Secchi Auellanae calidæ sunt & humidæ, magis nutritiua quam Iuglandes Nuces, difficultiusque concoquuntur: & vt quidam aiunt, comestæ ieiunum intestinum lædunt. Facilius autem concoquuntur, minusque ventrem sistunt, si interior earum cortex abiciatur. Dicitur quoque, si quis ante reliqua cibaria sumperit, cum ruta, huic venena nec morsus venenatorum efficere dicitur illa, scorpionisque ab eo fugere. Sumptæ verò cum caricis, morsum scorpionis venenat sanant. Ad acidam qualitatem, quæ à nigro humore in ventriculo exeat, valde proficiunt.

Plutarchus scriptum reliquit, Quoties Coryli nucula laqueis appensis coharbit scorpiones in domicilia non ire pet. Negat enim Auellanam à scorpione adiri. Nec est omitendum, quòd simplex rusticus obseruauit & Ruell. annotat, serpentem obtorpescere, quæ Coryli candide vel virgâ fuerint ictæ, & tandem emori. An quia ob earum firmitatem, (propter quam & ad equos castigandos expectantur) ictæ spina, quæ per eius longitudinem extenditur, vertebri sibi mutuo per apophysisin haud secus ac in cæteris animantibus, insertis, luxetur, sicque ad motum inceptor reddita tandem contabescat? Peculiarem eis esse hanc antipachiam asserere non ausimus.

Athen. scribit, Heracleoticas nuces non tantum alere; quantum Amygdala, ac præterea aliquid habere quod innaret, & stertorem ac raucedinem (περὶ ἡσυχίας, ἢ ἡσυχίας) vocis efficere: largius sumptis caput granare. & minus nocere recentes quam siccas. Et mox: Ponticam nucem pinguem dicit, concoctæque difficilem, & iterum. Heracleoticas nuces Castaneis esse deteriores, id eo quæ fugendas, vt nocentior pinguedo absumatur.

Auellana, teste Aetio, præterquam quòd frigidior, austerior, terrestriorque est, in reliquis Iuglandis assimilatur.

Sed quare Auellanae tantopere obnoxie sunt vermibus? Sanè quia Aristoteli humor putredinis mater est, causa vel nimia earum humiditati tribuenda, qualis præsertim recentibus necdum maturis inefficet: vel quia parum olei habent.

Tom. I.

Ac vtraque ratio egregiè consentit. Nam adultiores & iam oleaginosiores, vix amplius vermibus infestari videmus, sed potius contrà, & exiccari. Eandem ob causam Iuglandibus nulli solent innasci vermes, nempe quòd oleo magis abundant omni tempore, vel recentes vel atique.

Nucibus Iuglandibus quoque comparat auellanas Auicen. easque tradit declines esse ad caliditatem & siccitatem pariam: & nonnulli recentes illas in secundo ordine calidas faciunt & siccas. Gal. tamen illas potius frigidis censet. Maturum fructum primum in ordinem non excedere arbitrat. Brassauola: imò antequam sit maturus, humiditate non habet, & crassum.

Porro nuce Auellanae stomacho tenuioribusque intestinis infestas esse, maximè si non satis maturæ fuerint, non solum ex vericulo Macri:

Ex minimis Nucibus, nulli datur esca salubris.

Sed etiam experientia ipsa docere conatur Tragus. Pueri namque (infant) si Augusto mense Auellanas nuces auidè deuorant, facilè in Dysentericum morbum incidunt. Idem Ruellum ridens, quòd Coryli baculo vel candide serpentem ictum ex rusticorum obseruatione morti tradit. Ego, verò, addit, non dubitari si fastes, quos ex Coryli radicibus rusticis desumptos hinc inde secum gestant, id nullo negotio efficere possent, quibus vel canem rabiosum interficere difficultè non sit. Nos verò an aliqua id ratione fieri possit, etiam cum tenuioribus virgis, (quæ tamen digitalera ferè habeant crassitudinem) paulò antè quædam attingimus.

Oleum Nucum Auellanae efficacissimum ad tussim veterem, & destillationem, eidem Trago.

Matth. author, bilem augere Auellanas. & ad menses cohibendos valere subruffam cuticulam sub putamine nucleum ambientem. Oleum earum destillationes efficacissimè concoquere, & articulorum dolores inunctum leuare. Sed quòd Dioscorid. putaminibus vtilis, ac cum oleo tritis, glaucas in pueris oculorum pupillas denigrare prodidit, hoc illustri experimento factò aliquoties se cognouisse, & verissimum esse compertisse gloriatur Cornarius.

I. V. Vittich. in præf. sanit. Nuces, ait, Auellanas seu Ponticas ludat Hippocr. quòd cerebrum augeant, verum sunt calidæ & siccae naturæ, facilè grauant caput & ventriculorum. In eo laudantur, quòd hepar corroborant.

In Thuringia Mures agrorum coaduerant nuce, quas quidam perquirunt, tollunt, suspendunt per aliquot dies ad fumum, & vocant Mures sennuße. Hæ nuce non solum sunt lapidæ, verum parum nocent, vt sapè se expertum dicit.

Lacuna scribit istud quòd dicitur stomachum & caput grauari, & experientie, & communi reclamare opinioni: bonæ quippe matronæ Hispanicæ tostis vulgariter vtuntur ad placendum suo stomacho, cerebrumque confortandum, non sine felici successu.

Succus ex Auellanis veluti ex Amygdalis lacteus extractus, valenter alium adstringit Dodonæo, atque Cæliaci & Dysentericis hac ratione prodesse potest. Iuli frigidi ac sicci, & similiter adstringentes, ventris quoque fluxiones sistunt, Auellanae Cellensium cremor in calculo renum & ardore vrinæ vtiliter exhibetur.

Camer. Auellanae lac generant, quia comminuatæ lactis plenæ sunt: ad restituendas vires, & ad Venerem roborandam præstant. Porta ex Galeno.

Cur Iuglandibus non innascantur vermes?

Temperâ.

Nota.

Dysenterium.

Oleum auell.

Ad menses. Ad destill. & articulorum dolores.

Experimentum.

Hepar corroborans.

Succus lacteus. Amygdalis. Cæliaci. Dysenteria. Iuli. Calculus. Ardens. na Lac.

Hort. Luf.  
ant. Nit.

Horti Lusatiae auctoris, quisquis ille sit, vana nobis videtur illa coniectura, qua dicit, Auellanas similes Calculis renum & Vesicae, eorum affectibus conferre. Similior silex aut lapis alius topiaceus, num igitur conferat? Nec magnopere videmus quid in Auellanis esse possit, quod ad calculum conferre queat, nisi forte exhibitum oleum ex iis expressum, quomodo Amygdalinum, ad dilationem, ad lubricandas vias, ad dolorem.

Biuyetius refert, Auellanas rubras, matronis in cibis gratissimas, praesertim recentes & maturitatem exactam non adeptas. In Plinii sententiam, pinguedini corporis conferre, posteror medicina manibus pedibusq; descendit. Tostas autem in salubriores dicit, quicquid dicat Athenaeus.

Pinguis-  
sima.

Saccharo  
insuffusa

An nebula  
oculorum.

Septisarii saccharo inculcant, quae bellariorum vices implent, praecipue quae sunt ampliores & rotundae.

Notabile est hoc Arnoldi: Ad Albulam & nebulam vilians. Accipe virgam Auellanae, in capite perfora, imple foramen granis Piperis, & tere supra cotem cum vino albo, quod distillat, collige, & in oculo pone.

Horstius tradit, ad Dysenteriam pestilentialē Auellanas nocuas, idemque & vulgo persuasum nouimus passim ferē. Hinc Illustriss. Princeps Guille. Palatinus Dux Bavar. in quodam mandato de Politia obseruanda tempore pestis, cauet ne venales proponantur Auellanae (Baselnuß) & vinum sublimatum [Brandwein] sine permissu, quia sanitati resistere & Pesti occasionem praebere per doctos existimantur.

Mandatum  
de Auella-  
nis.

Caudicum  
Sjus.

Caudex Coryli quotannis multis stolonibus, seu virgis fructuat, quae si non laedantur, intra paucos annos ita crassescunt, ut ex his circulos doliarum elegantissimos conficere queas.

Ex ligno etiam carbones parant pictores, sculptores, & autifabri ad delineationes & figurarum praeducenda commodos. Ex huius etiam ligni carbonibus pyrius puluis conficitur. Sed & ligno assulatum secto ad cubra vtuntur.

Rudicis &  
sum.

Extradice nodosa ac undulatum crispata vasa & suppellectilia varia fabricantur, quae ad longos annos durant, nec facile corrumpuntur. *Tragus.*

Nic. Metri in libro medico, per Heremiam Martium in lucem edito mirabiliter commendat Viscum, Coryli [Baselstauden Nischstel] quem librum, quia non amplius nobis ad manus, lector ipse si lubet, consulat. Coryli vrbanae atque agis & scenis opere topiatio texendis, & in altum etiam eleuandis conueniunt. Tales in Gallia multis locis, in magnatum & nobilium hortis praecipue Biturigibus, ut Gesnerus annotat, constructae videntur. Vidimus in splendissimo quodam horto (putamus fuisse Reguli cui de Fleury cognomen, quondam ad Helucios Legati) sub topiatica Corylo commessantes, vel potius ex gentis more, pomeridiana collatione sub vmbra suum salientes pro libitu hinc isthinc cenare in Muscolo sedentes pulchras & lapidissimas diuersi generis Auellanas decerpisse. Ipsae alioqui Coryli dentae frondes pullis Gallinaceis optatam praebent vmbraem & quoddam velut asylum, aduersus impetum & rapacium animum insidias.

Esus Gel-  
poris abu-  
sus Virgu-  
la furcata  
Coryli.

Restat, ut Coronidis loco, de insigni illa Coryli virgarum vtilitate aliquid dicamus, quia nobilis & eximia à nonnullis, spes vanas pretio vendentibus, ad inueniendas auri aliorumque metallorum mineras atque [si Diis placet] gazas subterraneas, praestare creditur. Modum & rationem docti & eleganter descripti Agnolaei & Metallici, si quisquā alius, sui seculi consultiusimus, in hunc

modum. De virgula furcata inter metallicos multae & magnae contentiones sunt: nam eam alii aiunt, in venis inueniendis, sibi maximo vsui esse, alii negant. Qui tractationem & vsum virgulae probant, eorum alii primò furcam cultro refecant colurnam: quam praeteris ad venas querendas idoneam esse censent: praetertim si Corylus supra venam aliquam creuerit. Alii pro vtilitate metalli diuersis virgulis ad venas inquirendas vtuntur: etenim Coryli virgulas adhibent ad venas argenti: fraxini, ad aeris: Piceastris, ad plumbi, maxime candidi: ex ferro vel acie ferri factas, ad auri: deinde utriusque virgulae cornua manibus preheidentes pugnos faciunt: necesse autem est ut digiti compressi ad oculum spectent, utque virgula erigatur ea parte, qua cornua coeunt tum hac & illuc passim cum per locos montolos vagantur: itaque dicunt simul atque supra venam pedem posterius, statim virgulam versari & volvi, sibi que prode re venam: ubi pedem retulerint: & ab ea discesserint, rursus virgulam immobilem manere. Verum, ut ipsi asserunt, causa motionis virgulae est vis venarum: eaque interdum tanta est, ut arborum, prope venas crescentium, ramos ad se flectat. Contra qui virgulam nulli viro bono grauique vsui esse posse dicunt, hi vim venarum iccirco motionis eius causam esse negant, quòd omnibus non solet moueri, sed istis tantummodo, qui cantionibus aut altius vtuntur: vim praeterea venarum negat ad se trahere ramos arborum, sed exhalationem calidam & siccam eos efficere contortos. Ad quae isti respondent: quod vis venarum virgulam, cum quidam est metallicis aut ceteris hominibus eam tenet in manibus, non vertat, in causa est hominis proprietates quaedam singulares, quae vim venarum impedit atque alligat: quia enim vis venarum versat & voluit virgulam, non aliter ac magnes ferrum ad se allicit & trahit, eam occulta hominis proprietates debilitat & frangit, non secus atque alium Magnetis vires infirmat & excludit. Etenim alii succo Magnes oblitus ferrum ad se non trahit: nec idem trahit rubiginosum. Quin etiam de tractatione virgulae nos admonent, ut digitos leniter non stringamus, neque comprimamus acriter: nam si leniter tangeamus virgulam, deciderit, inquit, antequam vis venarum eam verteret: sin acriter confringemus, vis manuum vi venarum resistet, & eam superabit. Itaque, ut ipsi censent: quinque res sunt necessariae ad hoc, ut virgula suum faciat officium: quarum prima est, virgulae quantitas: vis enim venarum baculum nimis magnū voluere nequit: altera virgulae figura, nam nisi furcata fuerit, eadem vis eam uertere non potest: tertia vis venarum, quae naturam voluendi habet: quarta virgulae tractatio: quinta priuatio proprietatis occultae. Ex iam dictis autem solent concludere hoc modo. Si quoddam virgula omnibus non moueatur, in causa est ineptia eius tractatio, aut occulta hominis proprietates, quae vi venarum repugnat & obstitit, ut supra diximus, qui venas ipsae quaerunt non necesse habent id cantionibus facere, sed satis est eos virgulam apte tractare posse, & occulta proprietate carere. Virgula igitur in inueniendis venis viro bono grauique vsui esse potest. Verum de ramis arborum contortis plura non dicunt iusti, sed manent in sententia.

Cum autem hae res controversae sit inter metallicos, ea suis ponderibus examinanda.

Virgula diuina, qua incantatores scrutantur venas, ut annulis etiam, speculis, crystallis quamuis forma furcae figurati possint, nihil tamen

Furca  
luna

Nobis  
nemini  
gam

Tru-  
cadu

Affici-  
pari  
[pon]  
impe-  
subi-  
cuius

Cau-  
cata  
nemini  
gula

Quin-  
dece-  
ad us-  
Virg

Ras. e.  
num  
trouet  
callico

ad



ad rem interest, recta sit, an in aliam figuram formata: non enim valet virgule figura, sed incantamenta carminum, quæ mihi commemorare non licet neque libet. Veteres autem, non ea modò quæ ad victum & cultum attinent, virgula diuina conquisiuerunt, sed rerum etiam formas vertunt: etenim incantatores Ægyptiorum virgas, vt Hæbreorum litteræ narrant, in serpentes mutarunt: & apud Homerum Minerva senem Vlyssæm virgula diuina repentinè in iuuenem conuertit, ac rursus restituit in senium. Circe quoque socios Vlyssæ mutauit in bestias, eisque reddit hominis effigiem: quinetiam Mercurius virga, quæ caduceus appellatur, vigilantibus somnium dat, ac à somno excitat dormientes. Itaque virgula diuina primò ex incantatorum impudis fontibus defluxisse videtur in metalla: deinde cum viri boni abhorrenter ab incantamentis carminum eaque reciterent, virgula à simplici metallico- rum vulgo est retenta, & in querendis venis vestigia antiqui visus remanserunt.

Quonia. nam verò metallico- rum uirgula mouetur, etiam si eas incantare non solent, alii dicunt, motionis earum causam esse vim venarum, alii iactationem, alii vtramque. Verùm quæ viad se attrahendi prædita sunt, ea omnia in orbem non torquent res, sed eas ad se alliciunt, verbi gratia: magnes ferum non voluit, sed id ad se trahit: & succinum attritu concalcfactum non vertit paleas, sed simpliciter eas ad se allicit. Similiter vis venarum, si eandem cum Magnete aut succino naturam haberet, virgulam toties non versaret, sed semel tantummodò ad spatium semicirculi versatam rectà ad se traheret, & nisi compressio hominis qui virgulam teneret in manibus ipsi venarum vi resisteret & repugnaret, virgulam ferret ad terram: quod cum non fiat, necessariò sequitur tractationem esse causam motionis virgulae. Id verò hinc etiam perspicuum est quòd calidi isti tractatores rectam virgulam non capiunt, sed furcatam, atque eam colurnam, aut aliquam aliam ita flexibilem, vt si sic tenetur in manibus, vt eam tenere solent, omni homini, quocumque in loco steterit, in orbem vertatur: nec mirum si virgula non versatur cum inertes eam tenent. Etenim eius cornua acriter comprimunt, aut leniter stringunt: hoc autem ipsam vulgo metallicorum fidem facit, virgulâ venas inueniri, quòd ea videntes casu aliquas inueniunt, sed iidem multò sepius perdunt operam, & vt venas inuenire possint, nihilo minùs in fossis agendis defatigantur, quàm aduersæ partis metallici, Metallicus igitur, quia cum vitum bonum & grauem esse volumus, virgula incantata non vitetur, quia rerum naturæ petitus & prudens, furcatam intelligit sibi visui non esse, sed habet naturalia venarum signa, quæ obseruat. Itaque ea si natura vel casus, aliquo in loco, ad fodiendum apto, patefecit, ibi Metallicus agit fossas, si non ostendit, crebris fossionibus usque eo scrutatur locum, quoad venam crudam reperit.

Schuyvenckfeldius rem paucis comprehendit: Vulgus, inquit, Metallicorum ad virgulam Diuinam, vt vocant, qua venas Metallorum inquit, præ cæteris furcam eligit colurnam, verùm cum ex impudis fontibus incantatorum primò in Metalla defluxerit, Metallicus, vt pote vir bonus, & gravis ac naturæ peritus, ea non vitur, sed alia naturalia signa venarum obseruat. Verè ac rectè, & per omnia Agricola iudicio consentiens. Enimverò sanè pletòsque vt virgulâ, nulla quidem Magica arte, vel bona, (cuius ne nomen

quidem nouerint) vel mala imbutos existimamus. Sed ex mera quadam impostura, ac spe lucrandi, hoc est, decipiendi Magnates ac Principes, quibus persuadeant hoc fucò vt nummos suppedient ad perquirenda metalla. Sunt enim & hi, nocturnæ ad auenias crumenarum, è quibus aurum, quod pollicentur ipsis, sibi effodiant prius. Talem aliquando vidimus & deprehendimus in insigni quodam & extra pudorem impostore, qui Ill. Exc. C. V. Vir. Principi nostro ac Patrono clementissimo multa vanitatis plena persuadere conatus fuerat, vt suppedigaret argenti- um & aurum, ad vestiganda effodiendaque illa. Vidimus, didicimus & probè scimus: Solent isti manu vtraque in pugnum contracta, furcam hanc Colurnam præhendere, angulo fursum spectante, & vtroque radio ex apprehensione reflexo. (eam autem præferunt quidam, cuius alter ramus cum capite & angulo eiusdem anni, bimulus, alter verò statim post angulum nouit us & proximi anni, solus, & integer sit fœtus.) Ita vagantes per loca, metallis (si credere sis est) vel opportuna v. l. prægnantia, velut in æquilibrio, situ prædicto, virgulam continent vbi volunt, nullo manifesto motu premunt vel laxant, vtroque enim ferè modo declinare solet si vatrè tractetur, tum à metallis tractam insigni impudentia mentiuntur. Tenemus & ipsi modum: (nam vt imposturam detegas, imposturam discas licet, quòd nemo temerè fraudem detegat, nisi qui eandem prius nouerit) sed inter nostras manus nullus motus aut tractio inuoluntaria, vel subiecto auro & argento, consecuta. Ita dextrè possumus tenere, vel potius regere virgulam, vt in æquilibrio maneat, nec tamen vi teneatur vlla, si adit vis aliqua, vel lenissima, quominus attrahat. Possimus etiam, nemine id deprehendente, facere, quod illi faciunt, vt allici aut trahi à quodam subiecto metallo videatur. Sed malè fortè nobiscum actum existimabunt, quòd vel Magica arte, (qui eam ad hanc rem postulant) vel sympathia illa metallica destituamur. Quibus confutandis, & ad turpitudinem, si verecundiam nesciant, redigendis, vel hæc sufficiant rationes. Aut vis trahendi primaria est in metallis, aut in virgula accedendi. Vbiunque sit, ibi certum est, primum esse motionis principium: mouens seu agens, in mouente: patiens in moto. Rursus eadem vel sufficiens, vel non. Si sufficiens, quid opus hominis sympathia, aut Magica arte? Quamuis, vt ingenuè fateamur, consensum adesse oporteat, tam ad laxandam virgulam, quàm ad aucupandum sumptus non necessarios, quod paucis melius dixeris, ad decipiendum. Si non sufficiens: Ergo iam inter hominem & metallum cognatio quædam. Est, est, pro dolor, & maximus inter vtrumque consensus, quo nisi fascinata essent maximorum & ingeniosissimorum alioqui Principum ingenia, eiusmodi nebulonum, patibulo dignorum, arte aut experimento ferè vel nunquam deciperentur: docerentque tandem istos lucripetas nequitias suas exuere, quibus sine opprobrio furti, interim etiam sine virtute, honores atque diuitias licet indagare atque consequi.

Virgula  
condensio  
metallis

Impostura  
manifestè  
ex clarè  
detegitur.

Ludwig

## STAPHYLODENDRON.

## CAP. XVII.

Definitio

Folia

Fructus



eminus intuenti racemulum mentiantur, ita ut Sambuci, quinis foliis radiatim expansis, albis, mucrone nonnihil interdum foris rubente, totidemque candidis, item surtectis, coeuntibus leuiter mucronibus, ut concavam viceoli figuram exprimere posse videantur, quæ intercedunt totidem stamina alba, apicibus luteis donata, mediū occupante stylo albido, bifido. Superueniunt vesicæ magnæ virentes, in duos loculos seu scrotum dispersæ, in quibus duæ nucleæ coherentes, putamine fragili & tenui, colore flauo aut subruffo, in quibus nucleæ corio virecente obtectæ, sapore nonnihil nauseoso. Ex nucleis caluariæ commodè exprimi possunt, sculptura leui.

De eadem sic scribit Plin. Est & trans Alpes arbor, similima Aceri albo materie, quæ vocatur Staphylo dendron. Fert siliquas, & in iis nucleos, saporis Nucis Auellane.

Ruell. de Colutea altera Theophrast. tradens, hanc Plinio ait, Staphylo dendron dici existimant. Quæ interim sit Staphylo dendron aut qualis non docet Ruellius. Cuius quoque nihil aliud habet, præter ea quæ d' Ta à Ruellio.

Quidam, ut scribit Tragus, sub Pistaciis Dioscor. comprehensas volunt nuculas, arboremque ipsam Staphylo dendron Plinii vocant. Verum cum Plin. Staphylo dendron siliquas ferre dicat, hæc verò Vesicas gerat, non video (inquit) quo iure ex Nuce Vesicaria Staphylo dendron hi faciant, nisi fortè per siliquas, vesicas intelligere velint, quod per nos quidem illis licebit. Nos tamen in præsentia Nuces Vesicarias & follicula. res nuncupabimus, quoad emergat aliquis qui certiore nos doceat nomenclaturam. Ex quibus verbis patet Tragum quodammodo hæsitasse an Staphylo dendron Plinii sit hæc de qua agimus. Difficultas quam obicit, levis est, siliquæ vocè ampliore significatu, pro folliculo vel vesicula Plinio usurpante.

At Scal. Apud Iesuas nostros, inquit, arbor est, è qua virga pacta, & adoleuit celerrimè, & effusus stolonibus frequentissimam circa se conficit syluam. Enodis, si quæ alia, olivæ folio sim-

plici, aut Salicis frondi proximo. E ramis folliculorum, qualem Halicacabus, durum tamen. In eo fructus conduntur bini, terniue, efculenti, natura, colore, sapore Pistaciorum, sed orbiculatiore facie. Quare qui Pistaci arborẽ ignotam habebat ex hac Pistaciorum medullam elitarim: an sit iam ad Pistaciorum species referenda, non ambigam. Idem paulò antè [extat autem locus lib. i. de Plāt. falso Arist. tributus] Pistaciis vestigia esse scribit, quæ per seipsa hient aliquando vetustate: Ne hac in parte Plinii sequatur errorem, qui solius Iuglandis nucleum binis tegi valvis scripsit, additque Pistaci arborẽ sibi nunquam videri.

Scaligerum equidem ut virum doctum atque ad præsummi acuminis admiramur, & ab eius lectione non raro doctiores redire nos profitemur: quando verò tam leui de causa Plinium, grauem, antiquum ac venerandum autorem, virum, inquam, ob summos labores & diligentiam, ei præsertim seculo quo scripsit, omnibus admirandum, taxat atque adeo erroris accusat, ut solet aliàs, hoc loco id impune non feret, maxime cum ipsemet talpa cæcior loco citato grauissimos committat errores. Primum enodis an sit indicabunt quibus primò occurrat visenda planta. Tam verò, quæ obsecro Staphylo dendron folio similitudo cum oliuæ aut salicis. Quin necharum sanè ea similitudo, ut vtrique vni eidemque rei, conferri mereantur, aut à subtilitatis adeo professore debeant. Melius videtur Tragus & Matthioli. Fraxini foliis comparasse. Natura, color & sapor, Staphylo dendron fructui diuersus à Pistaciis quibus putamè fragile tenui membrana [virenti fortè in virente] immediatè obductum atque adhærescens. Staphylo dendron fructus in amplo & rotundo residet folliculo, vmbilicotenus tantum adhærens, hoc est, basi, velut columna quadam in theatro aliquo constituta. Staphylo dendron fructus fusci Trag. & recentes rufi, Pistacia candidissima Cordo, vel sanè pallidula ex albo. At nucleæ plurimum differunt: Pistaciis quidem nucleos colore in flauo virentes, valdè suavis, tenuis teste Cordo) oris halitum commendas: Staphyl. albus, qui Matthioli. sapore dulci nucleam communens dicitur. Sed fortè pro Scaligero quis obiciet nobis, cum non scribere de Staphylo dendron, sed de alia planta: quod nobis non sit verisimile, neque persuaderi nobis patiemur ynquam donec prodeat aliquis, qui doceat, quam aliam intelligat. Cætera quæ scribit de sua Pistacia arbore omnia nostræ conueniunt Staphylo dendron. Gesn. Nux Vesicaria, Staphylo dendron Plin. Itali quidam, ut Romæ, vocant Sambucum validam.

Staphylo dendron, Arbor vitæ, Anguil. Lob. & Pen. Aduer. an Staphylo dendron Plin. ut quidam volunt, qui tamen Aceris folium dicit. In Obstamen, apertè Staphyl. Plin. vocant. Lectori verò considerandum relinquimus vbinam locorum suo Staphylo dendron Plinius tribuerit Aceris folium. In loco fanè citato de ligno locutum intelligimus. Qualecbono scribenti, de Coulcoul & Hebulben nil dum certi se intelligere potuisse, respondet Matthioli. Nucleum quem Coulcoul & Hebulben appellas, Arbor Plin. Staphylo dendron. Nobis verò non constat an Quelcebonus idem putarit quod Matthioli. nimirum Coulcoul & Hebulben idem esse, nec etiam quo nomine misit nucleos Matthioli. Ex Bellonio fanè manifestum est Hebulben rem esse diuersam à Coulcoul. Descriptio Nucis Coulcoul apud Bellon. nullo modo potest conuenire cum nostra Staphylo dendron. Hebulben non describit.

Idem





Athen. auctor est Terminthos siue Terebinthos credi solitas à nonnullis, quæ nunc Syri Pistacea vulgò appellant: foliorum similitudine, vt arbitor fallente.

Pistacia.

Offic. *Fistia*, & *Fisticorum grana* vocant: itemque sequaces sephaliorum medici: qui malunt corruptam vocem sequi quam geminam, vel meliorem nesciunt.

Pustech.

Ruell. teste in Parisiensi agro in ædibus D. Mariae satum seminis enata, folio maiore, quam Lentisci, ita in ordinem vtrinque deposito, distantioribus frondium intervallis. Serapio *Pustech*, voce nimirum, vt putat Tragus, à Pistacia nomenclatura deflecta nominauit.

Tereb. Indica.

Matthiolus Pistaciam arborem legitimam Indicam Theophrast. Terebinthum nulla dubitatione esse censet: In Italia vidisse foliis Lentisci maioribus, colore ex viridi in luteum inclinante, ac eodem ordine extremis ramusculis emergentibus, è quibus racematim suis quæque pediculis pendeanit Pistacia. At postremis comment. omittit, quod de foliis Lentisci tradit, quasi prius vera non dixisset: Nunc verò ait totam arborem Terebintho similem explicasset saltem priorem sententiam, ne lectori fucum fecisse videretur.

Matt. not.

Terebinthum Theophrasti in India nascentem non contemnendis coniecturis Dioscoridis Pistachium credidit esse Io. Vincent. Pinellus. Sunt eadem Pistacia & foliis & arbore Terebintho similia: quanquam nescio, a Marantha, quo pacto Matthioli pictura ferratas in ambitu reddat frondes: quæ ita reuera non sunt, sed nihil à Terebinthi euariant foliis. Adde quod Pistaceorum arbor resinifera est, & in Sicilia passim in Terebintho infertur, & pulchriores suauioresque fructus profert: quibus induci possumus ad credendum Terebinthi speciem esse. Quod vel illud magis persuadebit, quod Theophrast. nullam facit mentionem de Pistaciis: vel quia ex India non adhuc in Græciam allata esset huiusmodi planta: vel quod sua tempestate sub Terebinthi Indici nomine Pistacia noscerentur: paulatimque progressu temporis in hoc nomen transierit.

Porro quod opinionem de Terebintho Indicam Theophrast. attinet, eam non omnino reiicimus: quid tamen de ea re sentiamus, indicabitur seq. c. de Terebintho Indica.

Ryff. annotat Pistacea vel Pistia Nicandro dici, quem locum nondum vidimus.

Pistacia.

Pistia

Pistachium plantum Terebintho similem dicit Anguill. ideoque Terebinthum Indicam Theophrast. vocari.

Lacuna.

not.

Lacuna aliquid noui suo figmento sapere voluisse videtur, quando nouam, ab aliis diuersam, foliis ferratam, breui, consuetam iconem proponit.

Turner. testatur se arborem pumilam adhuc Bononiæ vidisse, verum folia nihilcum Lentisco habere simile, vt scribit Matthiol. præter crescendi ordinem, formâ, magnitudine & colore differentia. Eadem ratione & Hermod. & Ruell. censura digni, qui idem tradidere. Nos veram descriptionem ex ipsamet planta dedimus. Ipse verò etiam Turner. præter descriptionem propriam, figuram non laudabilem ponit, cui additi fructus: qui vix nisi in pumila adhuc arbore.

Matt. not.

Hermod. &amp; Ruell. not.

Rob. Const. Syriacas Noces Pistacia interpretatur. Terebinthum Indicam Lob. & Pen. aperte tradunt esse Pistacia Diosc. ac addunt: à nucleis Picæ strobilos imitantibus munda dictas. Item in Qb. Pistacia cum corniculis. Quo loco mira-

Pistacia

vide.

mur à Lob. piagi cū corniculis, & tamē refertur ad Aduersaria, vbi aliam posuerat iconem Pistacia: à se visa, sine illis corniculis, quæ eadem cum Lob. postiore: Verum corniculorum tantum titulo tenus meminit: vtrique folia acuta habet. Loniceri icon non est folio acuto. Sunt nobis rami Pistacia, in quibus folia acuta, quamuis in ramo Lutetia collecto quædam folia sint penè rotunda in eodem ramo.

Rauuolff. suæ Pistacia omnia folia adpingit rotunda: quapropter diligentioribus considerandum relinquimus, an sit aliqua inter Pistacias diuersitas.

Tereb. Indicam Theophrast. statuunt Dodon. Camer. Clus. Sed hic parum consideratè in Hispaniis hist. ait omnium consensu esse Terebinthum Indicam. Cautius in historia postrema dicit, plurimorum consensu. Rauuolff. testatur Pistacias arbores circa Alepum *Fistach* appellari: isdem confert Terebinthi nuculas peregrinas, quibus laus similes dicit, nisi essent breuiores: alioqui non minus bonas, de quibus seq. c. specia-

litas. Cæsalpinus quoque prorsus sibi persuaserat Pistaceam esse Terebinthum Indicam Theophrast. Ait enim Theophrast. non solum nostratem Terebinthum indicare cuiusque sunt bacce, sed & Pistaceam, cuius fructus grandiores viles in cibis afferuntur, aut Pistacea ex Syria, quanquam & in Sicilia proueniant. Nucleos esse oblongos, paulo crassiores Pineis, aut Auellanam longam referentes: coriaceo albo, crustoso magis quam olisco, externa tunica arida, subnigra & decidua: medulla interna viridi, dulci, & sabaci. Arborem quæ ex eius satum aliquando apud se, [Pisis aut Florentia] prouenit, magnam esse, foliis Terebinthi aut Siliquæ, perpetuis: florere in cacuminibus racematim vt Rhus, exiguo & rubro flore. Hanc Theophrast. Terebinthis annuerat, cum alias Pistaciorum non meminerit: testati & Athen. credi à nonnullis Terebinthos, quas Syri vulgò Pistacia appellant.

Et certè, nisi Rauuolffius nobis demonstrasset Terebinthum Theophrast. de qua seq. c. indubiè & ipsi sentiremus non tantum cum Cæsalp. sed & cum Anguill. Athen. Matthiol. Lob. Camer. & Clus. Pistaciam esse Terebinthum Theophrast. sed

Ex quo verò autore Ruell. scribit Pistacea in Syria nasci ex arbore omninò nuda, præterquam ramorum cacuminibus, nos later. Fortè ipsemet nesciuit. An ea sint arbores, quas Plin. ait in Syria peculiare nasci? Peculiare quoque si solum speciem rotunditatè, videntur esse quas Rauuolff. depingit, & ipsas in Syria notas, de quibus paulò antè.

*Fustach*. Serap. interpres *Fistia* reddit: Cordus Syetiam *Pistia* vocat, vtrique vox vulgi errore de-torta videtur ex Arabica: quibus & *Pistech* *Pustech* aut *Festach*. Offic. & Barbaris *Fistia* circa Tiopolim & Alepum *Fistia*. Germ. *Welsch pimper-nissin*. Belg. *fistici*. Gal. *Pistaches*. It. *Pistachi*. Hisp. *Albargo*, *Albargos*. Castal. *Fistini*. Portug. *Fistius*.



*Fisticos. Bohem. Pistacea. Angl. Pistacez & Pistifles.*

Præter foliorum varietatem, qua vel natura ludit, vel autores decipiuntur, si non sit speciei quædam varietas atque distinctio, vnicus, quod nobis quidem constat, Palladius cum Damogero de Maris & Fœminæ differentiam agnoscit. Maris, inquit, dicunt, cui sub Corio velut offei videntur latere testiculi: quibus verbis quid sibi veliscatur nos nescire. Omnes enim fructus Pistaciorum, qui ad nos importantur, inter se sunt similes. Staphylo dendro quidem fructus geminus intra corium latitat velut testiculi, non tamen Pistaciam marem dicimus.

Pistacia ex sententia Palladii, amat locum calidum, sed humidum, & rigatione gaudet & Sole. Hæc autem tradente Dioscor. in Syria nascitur, vbi & Galen. vberum nasci testatur, præsertim vero Alexandriam earum esse foracem, sed in primis Berthæam oppidum Syriæ. Hanc L. Vitellius, qui censor fuit, in Italiam primus intulit & Syria, cum Legatus in ea Prouincia fuisset, nonissimis Tiberii Cæstemporibus: simulque in Hispaniam Flaccus Pompeius, eques Romanus, qui cum eo militabat, auctore Plin. qui & Syriam peculiare habere scribit arbores. N. cander in India apud Choasum amnem Pistacia nasci, supra citatis verbis testatur. Ruell. in Parisiensi agro, in ædibus facris D. Maris satum feminis enatam vidit. Bruyer. in tractibus Gallie quibusdam satas vidit arbores, sed haud temere peruenire dicit ad maturitatem: ita necin G. illa Narb. obuam eam arborem quamquam cælum solumque habeat huiusmodi arboribus autum.

Raavolf. narrat, cum tenderet ex Tripoli ad urbem Damand & Halepum, vidisse circa urbem Sermin sylvas arborum Pistaciorum, quæ ibi coaduerantur, & Tripolim deportantur, vbi nostris mercatoribus venduntur. Scias vias quoque obseruasse, potissimum in vicis Bassil. Circa Halepum quoque vulgatam admodum esse. Arborem qualem in hortis Italicis vidisse Lobel. scribit, etiamque in horto Pharmacopœi ad Londini in Angliam enia, prorsum [inquit] dicas Terebinthum. Column in Italia & Galloprovinciæ locis quibusdam, sed maturitatem non assequatur. Angull. in Italia provenire tradit, sed fructum non ita bonum, ut in Aegypto & Syria. Proueniunt & in Sicilia in Agrigentino, ut refert Cæsalp. Vt Matth. Pistacia quorum est communis in O. scilicet, ex Persia, Arabia & Syria Venetias importari solent. Horum arbores [addit] Venetiis, Cæteræ, Neapoli, & in aliis Italicis locis vidimus. Quidam doctus vir perhibuit, sibi demonstratam in horto Cathis. in ora Parisiensium. Lugduni vidimus arborem per aliquot annos durantem, vbi etiam fructus tulisse, testatur Hist. Lugd. Item Genevæ quondam visa nobis in quodam horto. Fructum, qualis copiosè Lugdunum importari solet, aliquoties terræ commissimus in horto Montb. fed frusta. Ramos binos habemus, alterum Luteciæ collectum in horto Robini insignis Botanici regii: alterum cum fructibus satis magnis: unde acceperimus, non amplius recordamur.

Pistacia ex sententia Pallad. feruntur Autumno & mense Octobri sobole, & nucibus suis. Sed melius ipsa Pistacia iuncta ponuntur mas & fœmina. Qui diligentius facere voluerit, pertusos calyculos, & stercorata terra repletos parabit, & in his Pistacia terna constituet, ut ex omnibus germen quodcumque procedat: quod vbi consualue-

rit planta, hunc facilius transferatur, tenente Februario.

Diophanes nucem integram, suisque putaminibus illatam, ac ne desquammatam quidem plantandam præcipit. Damageron circa Cal. April. serebat, maris & fœminæ coniuncto matrimonio, sed ita ut maris dorsum ad Fauonium spectaret. Sic enim nativis coniunctis largiorem fructum, vtili promittit, producent.

Inferitur & eodem tempore, & in sui generis arbores, & in Terebintho, & videri existimat, Amygdalo.

Paxamus iubet serbes prius faciendos esse locis apricis, & optime insolaris, probè subactos, & Cultus. accipiendos arborum stiones aut viuiradices nouellas, vegetas, easque vnâ colligatas in serbem demergendas, Luna secunda, terræque in ambitum accumulata serbiculos adimplendos, & sufficienti stercoratione pastinandos. Sed operam dandam, ut octonis diebus rigentur, & de nudo rursus constingantur. Postquam verò triennales facti fuerint caudices, ablaqueatione facta, effossique serbibus sinum addiciendum, & impulsio altius trunco, aggere vndique probè munniendos, ut cum arbor in vastam exiret proceritatem firmius stet, aduersus ventorum impetus.

Didymus in Georgicis suis quoque ait Pistacion in Amygdalum inferi. Et Pallad. inferi Terebintho tradit mense Febr. vel Martio: at secundum alios & Amygdalo inferi posse, de qua re hos fecit versus.

*Quin & Amygdaleas subeunt Pistacia ramos*

*Et debet in manu de breuitate peritur.*

*Hæc & cognata cingens Terebinthus amictu*

*Nutrit ad optum n. b. l. r. a. n. d. a. c. o. m. i. s.*

De repositione insitiores eorum locorum, vbi proveniunt, aut qui aduehant curiosi sunt. Nobis sufficiat hoc loco de delectu aliquid dixisse. Ergo deligantur maiora, ponderosiora, & candidissima, quæque adeò sua sponte modicè dehiscent, nucleum recentem, non rugosum neque rancidum continentia. Nam quæ ab his notis recedunt, aut inutilia, aut certè parum grata minisque proficua sunt. Possunt tamen & ista confectionibus sugillata curantibus immisceri, ex iudicio Cordi. Syluius recentia eligi suadet, nucleo intus herbaceo, sapore iuncto. In crustantur à seplasiariis saccharo: sed perit verustate gratia: rancida enim ut cæteræ nuces sunt.

Pistacia Dioscor. stomacho grata sunt. Eadem vires & siue edantur, siue trita in vino bibantur, aduersus vius. reptilium bestiarum morsus opem ferunt, quod posterius & Plin. confirmat: alioqui eosdem vsus & effectus habere quos Pinci nuclei. Fructus Pistaciæ, uti scribit Gal. quodammodo tenuioris essentia est, subamarum quid & odoratum habens. Obstructiones itaque liberat, sed maxime obstru-  
iæccoris, veruntamen etiam thoracis pulmonis. Et alibi: parum quidem nutriunt, verum ad hepar roborandum, & succos in ipsis viis infarctos purgandos viles sunt: qualitatem enim habent aromaticam, subamaram & subadstringentem. Porro non ausim affirmare vllam ex ipsis stomacho accedere utilitatem aut lesionem insignem: quemadmodum neque quod alium deiciant, aut sistant. Et in lib. de med. expertis Galeno falsè attributo. Decoctio Fistic confortat stomachum, & mundificat canales pulmonis & hepatis. At nos nullas eiusmodi vires in corticeprehendimus, nisi fortè sint in extimo recentium, antequam ad nos aduehantur, aut in cortice arboris itidem recenti. Sic de Dynamis.

diis eidem attributo opusculo Fisticorum sic mentio in Antidoto ad Lumborum dolorem, & frangendos lapides, & ut lumbi pinguescant.

Ceterum consideret hoc loco Lector insignem Gal. inter- Gal. modestiā & in tradendis suis scriptis postitati prudentiam integritatemque, qui ne nobis imponeret, nihil in expertum licetis mandare voluit. Non audeat vti vides asserere, an stomacho profint vel obfint: aluūne moueant, an cohibeant, ut vel hinc conici, immo quasi sciri possit, non nisi assidua experientia cum fide explorata, ne vitam salutaribus fraudaret, prodidisse.

Tantò magis ridendi neotericorum multi, qui vix cognita pro certis experimentis produnt, fucū potius simpliciū, quàm commodum Republicæ medicæ præstantes: de quorum perfidia vel vanitate aliquando ridebit posteritas. Paulus Aegiptetæ Galeno posterior, moderatè grata stomacho censuit, easdemque vires obtinere Amygdalis, in expurgandis visceribus atque thorace: præstantiora verò in leuandis ictericis anfractibus.

Actius tenuioris esse substantiæ, & cetera Galeno consimiliter scripsit. Simeon Sethi ait parum vitiari: reliqua quæ habet in dicta sunt, nisi quòd addat, oleum quod ex Pistaciis confectum est, conferre pectori, renibus & pulmōi.

Auic. scribit: Fistici calidiores sunt quàm Nux & Amygdala, suntque calidi in fine secundi, cū aliqua humiditate. Quidam perperam existimant frigidos esse. Hepatis obstructions & partium nutritioni dicatarum liberant, propter suam amaritudinem & vim aromaticam, conferuntque stomacho. Oleum eorum prodest in dolore hepatis ab offarctu succi crassi & pituitosi: arceat nauicam & vomitum, & confortat os stomachi. Alium nec soluit, nec retinet: habent tamen viscidam quandam & aromaticam adstrictionem, propter quam tradunt exhilarare cor idque corroborare: eaque propter inter theriacales medicinas connumerantur.

Amato teste, Venerem stimulant, & apprimè nutriunt, quibus de causis hodiè bellanis instantibus & rescipientibus *anaperuicis* Græcis dictis commiscuntur, tam ab Hispanis quàm ab Italis & Gallis medicis.

Rabbinus Moses de Aegypto ex omnibus fructibus Fisticos præstantissimos æstimat. Non abs re miratur Alois. Mundella, cur Trallianus lib. 3. cap. de Dysenteria ex frigida hepatis intemperie facta ita illa damnet, ut certissimè putredini obnoxia, & in bilem conuersti, idèque summè in morbo vitanda, maximè cū Gal. ea probet ad Iecur resocillandum & tum ipse tum plerique alii Stomachica dicant. Illud quoque dubio non caret, quæ ratione Venerem stimulare credantur, cū modici alimentis perhibeantur à Gal. neque statum generare constet, neque humida esse, cuiusmodi solent esse ea, quæ Venerem prouocant & incendunt. Generant siquidem semen, quæ vel probè nutriunt, vel tota substantia familiaria sūt, vel acrimonia aliqua incitant, vel denique status generant. At horum neutrum manifestè in Pistaciis deprehenditur, nisi quis fortè velit substantiæ proprietatem id præstare, credere, eandemque vti tamquam portitore aromatica illa qualitate, & fortè etiam plus nutrire, quàm vulgò credatur. Nam siquidem restaurantibus accenseantur, talia autem optimè nutriant, & quæ optimè nutriunt, semen prolificum quoque gignant, certum est & hac vi, & insuper suo calore & vegeto, nec nimio tamen, & fortè etiam substantiæ similitudine Venerem utere posse. Hæc propter medicinæ con-

ditatos: alioqui in historia potius *ne en*, quàm *ne* *non* tractandum scimus, & ab omni disputationis ambitu non necessario sibi temperandum esse.

Matthiol. quoque à medicis ad conciliandam Venerem, & ad pinguedinem inducendam macie & Marasmo affectis, commendari tradit. Perperam facere Pharmacopœos qui odoratam cuticulam nucleis detractam abiciunt: inesse enim huic cuticulæ vim quandam sensim constringendi, & viscera corroborandi. Pistaceorum oleum potum dolores internos sedare, quibus origo sit à pituita vitida & stantibus. Idem prodesse contra spasmi & Paralyfin, & interno vtu facere ad generationem.

Dalechamp. in 6. lib. Paul. Aegin. cap. 40. Si fortè [inquit] in sectione venæ basilicæ vulneretur subiecta arteria, Albucafi putaminis Pistacii fissi partem mediam [ut cui vis sit adstrictoria] superius oniuibet cum pelagellis & ligatura, itaque dimittendum in diem inlequẽtem. At nobis profectò non placet Albucafi medicamentum hoc: non enim tanta adstrictio cortici, ut multum præstare possit ea retione impolitus: præterea cautitas eius exitum præbere videtur sanguini arteriole, non benè compungendo arteriam, quod Dalech. annotare debuisse.

Rauouff. refert in Halepi finitimis locis Aethiopes verno tẽpore recentes colligere turiones, priusquam se explicent folia, eisdemque in acetariis præparare, sicut nos asparagos. Finiamus Pistaciorum vires hoc Fieræ Ditticho.


*Agne Nucis superat, rones inuat, & Iecur humens*

*Pistaceum hic stomachi Cæna senili amat.*

## TEREBINTHVS INDICA MAIOR

FRUCTV ROTUNDO.

CAP. XIX.



Terebinthū Indicam cū Theophrast. plerique existimant esse Pistacia arborem ut paruit cap. præcedenti. Huius porro Terebinthi Indicæ nucle Pistaciis bonitate nō cedunt, in quibus præter saporem, salum, inest. mediocrius quedam fœcitas. Pistaciis etiam fatis similes, sed breuiores & rotundiores, ex racemis pendunt ut illa, vel potius ut bacca Terebinthi,

pro qua etiam nonnullis habentur, potissimum quia arbores suis maximè foliis longiusculis Terebinthi folus satis similes, quā notā facit quoque à Pistacia arbore distinguuntur cui folia rotundiora specioraque, ut testatur Rauouff.

Pistacia Indicæ Nicandri præcedenti quidem capite meminimus, adscriptis eius verbis, quæ fortè



ad hanc hauri temere quis referat, quod hæc ipsa adeo Nicandri Pistacia Indica videri possit.

De sua verò Terebintho Indica sic scribit Theoph. l. 4. c. 5. Ferunt & Terebinthum in India haberi, ali similem arborem Terebintho: cui folia & rami & reliqua omnia Terebintho similia, fructus autem diuersus, quippe qui similis sit Amygdalis. Sed & in Baetris Terebinthum esse, ferreque nuces Amygdalarum magnitudine, verum non magnas, sed aspectu similes, & suauitate Amygdalis etiam præstantiores, & ideo loci illius homines his potius viui.

Iam antea monuimus hanc Terebinthi Indicæ descriptionem Theoph. satis bene conuenire Pistaciis antè dictis. Verum cum in ipsa quoque India reperiatur arbor correspondens, & quæ nomine quoque conueniat, maluius hoc loco potius recitare quæ Theoph. de ea scribit, quam de Pistaciis.

Peregrinæ hæc Terebinthi nuclea, auctore Rauuolfii in Itiner. Arab. Borin, Persis Terback. Borin quibit.

Idem censet maiores has nucleas esse Faël. Serap. Auic. & Rhafis, quæ potissimum in India proueniunt: & Theoph. Indicam Terebinthum. Item parte quarta, ubi figuram proponit, Indicam Terebinthum Theoph. Arab. Borin & Alborin. Germ. Groß Terebinthen nüsslin. Serap. tr. & a Melargie Albazari & Rhafi auctoribus Phel. Pistachiorum aliud genus Rauuolfii. Cam. Terebinthus Indica 1. Theoph. Hist. Lugd.

Magni Champ Officinæ & loca vicina abundant Terebinthis Indicis. Copiose proueniunt in Agemia aut Persia, Mesopotamia & Armenia. Rau.

Melargia, & Rhafi Serap. Phel est medie n calida & siccata: Albazari & Rhafi confert ventositati hæmorrhoidum.

## TEREBINTHVS INDICA FRV. CIV PARVO, AD CORCVLM accedente.




Terebinthin nüsslin.

Serap. tract. 2. Eben Amran. Bel est Medicina Indie. Calidum & siccum est in tertio gradu. Confert defluxionem in nervos & articulos, & podagra, semen prolificum anget Melchar: Prodest etiam ventositati hæmorrhoidum.

Tom. I.

## TEREBINTHVS.

C A P. XX.



**A** Arbor est Terebinthus, sed quæ Clus. teste, maxima ex parte fructicat, ramis longis, raris, cinereo cortice tectis, nec ea quidem quantum animaduuerimus, sed dis super hyemem tenax. Primus ferè est florum verno tempore apparatus, quos & ramulorum tuberculis copiosos in longo racemo producit, menis

Descriptio

Flor.

Folia.

Fructu.

lamineis fibris purpurascensibus contextos. Hinc se explicant in alam folia, quantum non semper æquali situ, Laurinis similia, sed magis oblonga, [Pistachis & eiusdem odoris Cl. l.] coniugata in Sorbo nascentia, subrubentia, quæ crebris obliquis nervulis percurruntur. Fructus delapsos flores excipiunt, parui, ex rotundo oblongi, rubentes, Carpobalsamo Offic. penè similes, resinoso lentore viscosi, nucleum continentes. Pro Carpobalsamo, ab impostoribus interdum duendi putamus.

Observauimus sæpè in Terebintho copiosum excrementum, utris instat, ut in Ulmo: in extremis etiam ramulorum cartilagineæ substantiæ cornicula rubentia, quatuor, quæque aut sex digitos longa, aut etiam longiora, quibus ipertis lenta salua in conspectum se dat, quæ inuiscati hærent culices parui, alati. Abundat hæc arbor resinâ.

Folliculi

Terebinthi

Cornicula.

Bellonius annotat etiam Gallas ferre, de quibus in viribus. Videntur autem Corniculorum tantum primordia esse.

Galla.

Terebinthum Theophr. inter aliquando ægyptia, inter arbores syluestres, quæ semper folia habent, ponit. Eodem auctore, alia mascula est, alia feminina. Masculæ non fert fructum, ideo [inquit] marem nominant. Femininæ autem alia fructum protinus rubrum fert, magnitudine Lentis, qui coqui nequit, alia viridem [χλωρόν: alii χλωρόν legunt ut Plin. qui pallidum verit] primò editum, postea rubentem, & cum viamature scenscentem & postremò nigrum, magnitudine Fabæ,

Semperni-

rens.

differeciæ.

Theophr. st-

lustr.

[ἡλίκον χύμας] resinolum. [Dioscorides: Dal. legendum censet Dioscorides, id est Thyia fructui similiorem: Gaza legit Dioscorides, sulphureum: Plin. vertit odore iucundior, quasi legisset Dioscorides quam lect. Corst. veram putat: sed & vulgata illa bona est, & fortasse hac melior, & inter omnes optima.] Arbor autem est circa Idam & Macedoniam, brevis, fruticosa, contorta. Circa Damascus Syriæ, magna, frequens & pulchra. Montem enim aut inibi admodum magnum Terebinthis reuertum. Sed in quo nulla alia arbor gignatur. Materies ei lenta, [πλίξεν] radices validæ & profundæ, & tota arbor incorrupta.

Aa 2





ca vindemias, dum maturuit virentem.

Terebinthus arbor, inquit Ryff. cuius picturam damus, iuxta Monspesium nascitur, *Pudis* appellata. Ast non satis mirari possumus quorundam temeritatem [vt ne quid dicamus grauius] de stirpibus historias compilare audentium, qui nihil minus quam Botanici, vt ex eorum scriptis facile quibus, & passim deprehendat, vel semestris Herbarius: atque adeo plura incognita sibi proderi non erubescunt, vt eo abierit etiam fingendi licentia, vt falsas pro veris introducere audeant figuras: qualis est Ryffii, nullo modo Terebinthum exprimens, immo, vt existimamus, nullam plantam naturalem. Et tales sunt, qui vulgi manibus triti, exotica, si Diis placet descripsisse putantur.

Anguill. ex Theoph. annotat: Terebinthum aliam magnam, aliam esse parvam.

Lob. & Pena de Terebintho sic tradunt. Coccinæ racemorum bacculæ aut acini rubelli similes & concolores quodatenus Ciceri nomen Terebintho potuerunt fecisse: nam *ἐπιθύσος* Græcè Cicer est. Huius autem semper virentis & perpetui folia, nullas collis aut deuexus paulo aprior Narbonæ aut Galloprovinciæ non feracissimus, vbi duas folio tenui discernendas meminimus.

Frequentior quippe est angustiore Lentisci positu (non Fraxini, vt Senenensis) colore & habitu, folio duplo maiore. Alteri autem folia multo latiora, rotundiora, vicina Lauro & Pistachia, adeo vt eminus intuentem fallat. Vix vtriue eadem, acinulis, quam Lentisci, maioribus, coccineis, purpurantibus: demum ex viridi in cæruleum maturefcentibus, non per initia, (vt putauit radiatus Apollo) flore Lentisci aut Sumachi racemosi, foliuli cartilaginei, teretes, aut comici, angulosi, vel sphaerici: vnde culices & fuliginosa excremento euolant, sacro saluare ad Balsama laudato effluunt. Vtiliores, & aduiores sunt, arborem proceritatem affectant: & ferro vulnificulis factis, in Valena Sylua Monspeliacum, sepius nobis non paucam Terebinthinam exstilarunt lucidam.

Ceterum si reprehendatur Apollo, cur non potius Theophrastus ex quo transcripsit? Hoc sanè arguit, Pen. & Lob. non consuluisset Theophrastum, aut eius verborum non recordatos. Quamuis Matth. supra vulgus nequiquam fuerit in cognitione stirpium versatus, vt ex diuersis eius commentariis, potissimum prioribus, vel leuiter peritis apertum est, veritati tamen studentes, hoc loco à vero nequiquam deflexisse, vt Pen. & Lob. sibi persuadent, statim. Positus Lentisci, Terebinthi similis, addamus & Fraxini, quatenus positus: vt ne quis nodum querat in scirpo. Coniugata folia vbique magnæ ex parte, eademque situ & ordine, si impar supremum existimas (in Lentisco, cui plerumque deest) disposita, vt patebit dictarum arborum ramos diligenter conferenti. Notandum verò, eos Terebinthum perpetui folia facere: num rectè, ipsi viderint. Cæsalp. profectò in Italia deciduis esse foliis testatur, quamuis Theoph. inter perpetuè virentes recensent.

Ceterum Diof. [vt annotat Lob.] dicit: Adulteratur Carposalamum semine Hyperico finili, quod è Petra oppido defertur: sed minime ita legendum videtur, quamuis & Plin. ita habeat, sed petra Terebintho. Terebinthi resina ex Arabia Petra defertur asseruerat Diofcor. Apparet Carposalamum Terebinthi fructu adulterari posse, quemadmodum euenit hodie. Sed in hoc

solum differunt, quod Terebinthi fructus immaturus inanis sit, minuscule rotundus, & vtraque parte magis acutus.

*Τερεβινθος* Theoph. Diof. Polluci & Græcis: Apud Theoph. etiam *τερεβινθος*. Et Pollux, *ἐλκντ* *αὐτὴ τὴ Τερεβινθος ὁ καρπὸς ὁ ἐστὶν ἐλκντ* *ἢ Τερεβινθος*: eius resina *ῥητίνη Τερεβινθῆς*. Plin. & Latinis atque Herbariis vulgò Terebinthus. Et resina, Terebinthina. Monachi apud Mesetiam Terminthum, & ab ea Terminthinam resinam dicunt. Arab. *Helcalimbar*, Alborin, siue *Bicin*, vel *Boton*, aut *Baton à Rha*. si *Haelchalmibit* scribitur. Gluten *Alimbath*, siue *Alimbac*, siue *Alimbach*, seu *Olimbath*, seu *Albutin*, *Alborbin*, idem quod Terebinthina. Nonnullis Hebræis *Barnen*. Gen. 41. nominatur: Resina autem *Zari* Ieremias 51. Gen. 43. teste Lonic. Germ. *Terbenthinbaum*. Gal. *Terebinthe*. Ital. *Terebintho*. In Abruzzo comitatu de Roca Scaligna vocatur *Tridente*. Romæ Cornucapra: In Patavina ditione Lentisco, teste Anguill. Cornucapram Italici dici propter folliculos cornu similes, annotat Camer. Hisp. Castil. *Cornicabra*: Catal. *Lo abre del pi*. Belg. *Terpentum* est *termenthinboom*.

Lob. duas icones habet, vnam, titulo, Terebinthus cum flore: alteram, Terebinthus maior. Toridem & Tabern. 1. Terebinthus. 2. Terebinthus latifolia.

Resina Terebinthi ex Arabia Petrea conuehitur. Prouenit tamen etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa & Cycladibus insulis, auctore Diof. Plinio verò montes amat Terebinthus. Theoph. tanquam rem miraculo proximam narrat, Terebinthum visam in Olea, & Polypodium vocatum in quibusdam arboribus. Nobis verò non videtur mirabile granum Terebinthi in aliquam cauam Oleam incidisse, & ibi germenisse etiamque excreuisse, vt sepius vidimus in Quercubus Salicibus & eiusmodi, alias prouenisse arbores. Mirabilis est in præcæcis muris, vt castrorum vetustissimorum fastigiis, summis montium ac præruptis iugis atque saxis nasci arbores, quales non raro conspiciuntur. Quasi verò non ed delata fuerint olim semina, vel per ventum, vel ab animalibus, vel ab animalibus etiam quadrupedibus, vt sunt Mures, Sciuri, &c.

Ceterum libenter prouenit locis siccis, lapideis & soli expositis, vt testatur Muth. qui primam se vidisse gloriatur in colle vulgò cognomine *Castel Trento*, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesim, à Theoph. historia haudquaquam dissimilem: ipsamque deinde reperisse in aliis compluribus Hetruriae locis, videlicet in collapsis Romanorum ædificiis ac rudetibus: sed frequentem admodum in Iapidæ collibus, prope Pucinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergesto. Et Bellon. In Creta [inquit] proueniunt. Inter Siderocapsam & urbem de la Cua, olim nominatam Bucephalam, sunt monticuli, in quibus Terebinthi non cresunt in magnas arbores, vt fit in Insula Corfu. Sed cum regio rubis aspera sit, non altiores Corylis proueniunt. Gignuntur & in montibus circa Hierosolimam, circa Libanum: in Cilicia & Syria. Inuenisse se scribit rusticum Arabem ducentem Camelum oneratum seminibus Terebinthi: proximos enim montes refertos esse eiusmodi arboribus, ex quibus Gummi colligunt, quod vendendum ferunt Damascum, quod autem in Cairo venditur: adferri ex regione Turcis dicta Asamia, Latini vocantur Chaldeam, cuius caput Babylon Turcæ comprehendunt sub Asamia Mesopotamiam & Assyriam. Constantinopoli in Officiis

Synon. linguar.

Cornucapra

Locus:

Olea in Terebinthi

Gummi

uentunt omnes semen viride Terebinthi, & eius resinam, quæ dura est.

Veram Terebinthum, si Thurnisio credamus, hodie etiamnum alit Aegyptus & Tmolus Lydz. perhibetur & in monte Horeb Libanice syluosis iugis crescit. In agro Romano circa Virguntium Castellum Vrinorum sunt Terebinthi altissimi & crassissimi, sicut etiam in Scythonia supra Zaratinum in insula Sala. Sed qui nascuntur in Tuscana & Lombardia & in Abruzzo, parui sunt, atque contorti, Angul. Venetiis in Franciscano cœnobio reperitur, & in montibus, prope Veronam & prope Tridentum iuxta Episcopiacem. In Germania nusquam vel sponte nascitur, vel in villo quod Cordus & Gesnerus quidem se scire aiunt in horto reperitur. Sponte quoque, teste Clus. prouenit plurimis Hisp. & Lusitania locis, quemadmodum & Galliz Narbonensis, vbi interdum in arboris formam assurgit, sed maxima ex parte solummodò fruticat. Nusquam, quod ille sciat, commemoratis locis resinam & Terebinthinam elici. Circa Monspelum in syluis Aegremont & Valeua sponte nascentem sapissimè vidimus, & flores folliculos, fructus atque cornicula legimus. Sata in horto Month. etiamnum ducat, sed parua, & singulis annis folia decidunt. Diligenter hyeme custodienda à frigore hyemis.

Tempus

Floret Monspelimense April. Septembri cum fructibus legimus, sicut & folliculos atque cornicula. Theophrasto ineunte Vere germinat Terebinthus: circa Tritici messem, aut paulò serius semen redit, eademque se & Plin. tradit. Montbelgardi prouenit nobis etiam ex semine Terebinthi. Contraria videtur scribere Hipp. de vfu fructus Terebinthi. Nancem si fluor muliebris copiosior sit, Terebinthi (trinita) fructum tritum ex vino & aqua propinat. Nunc si menses non eant eodem modo ieiunæ bibendum dat, & caldatur.

Ufus & virtus.

Terebinthi folia, fructus & cortex (tradente Dioscor.) quæ pollent astringendi vi ad eadem ad quæ etiam Lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Eius fructus esculentus est, ac stomacho noxius: vinam verdè ciet & excalescit. Est & ad excitandam Venerem aptissimus: ex vino verdè potus contra phalangiorum morsus prodest. Et Gal. Terebinthi (inquit) tum cortex tum fructus astringentiorum quiddam obtinent. Sed & secundo ordine excalesciunt. Itaque quod etiam desicce manifestum est: recentes quidem etiam humidique modicè: sicci verdè ordine secundo. Caterùm aridus propinquus est etiam tertio ordini desiccantium. Est enim aded calidus, vt mandentibus protinus eius caliditas percipitur. Itaque etiam Vinam prouocat, lienibus prodest. Plin. Terebinthi folia & radix collectionibus imponuntur. Decoctum eorum stomachum firmat.

Ufus & virtus. Terebinthi folia & radix collectionibus imponuntur. Decoctum eorum stomachum firmat.

Cap. dolor. Aluum mouet. Terebinthi folia & radix collectionibus imponuntur. Decoctum eorum stomachum firmat.

Semen in capitis dolore bibitur in vino, & contra difficultatem vrine. Ventrem leuiter emollit: Venerem excitat. Celebratur & Thericles nomine, calyces ex Terebintho solitus facere torno, per quem probatur materies. Omnium hæc sola vngi vult, meliorque oleo fit. Color mirè adulteratur luglande ac Piro syluestri tinctis, atque in medicamine decoctis. Eiusmodi calyces ex Terebintho à Thericle factos à sigillis discernere facile non erat. Quidam *Thericles* dicta volunt Terebinthi ligna, quod in iis ferè inculperentur: Rhodig. Figulum Conithium Thericum fuisse, non autem vsem torno scribit Athen. Idem tamen ex Apollodoro Celoo erat *melior* *Thericles*: Dalech. quod ante Plin. & alios Theophrast. prodidit his

verbis. Nigrum admodum, ac densum est Terebinthi lignum: Traduntque circa Syriam nigrius esse Ebena: ex hoc quoque capulos pugionum, fieri & pocula Thericlea tornari, quæ à fidelibus fecerint non possint: Verùm cor tantum accipi, & oportere lignum perungi, sic fieri & melius [?] & nigrius. Hæc Theophrast. qui tamen postea alio loco, vbi recenset vsum diuersarum arborum, tum ad ædificia, tum ad vtenilia diuersa, addit: Terebinthus non nisi fructu resinaque utilis, quod profectò prædictis contrarium videtur, nisi inueniamus aliquam Theophr. excusandirationem. Anigitur ibi de Terebintho arbore, hic de fruticante tantum locutus? Sed leuis excusatio hæc: & textus ipse Græcus per se sit euident. Existimandum, Theophrastum fuisse hominem, & tam ab aliis falli potuisse, quam fallere alios. Mirum tamen Scaligerum, virum supra Simonidem memorem, in suis annotationibus huius contradictionis ne verbulo quidem meminisse, quam tamen de Phylia eo ipso loco circa eandem rem detexit. Impostores pro Ebena phalas ad pedestres lanceas venditant de Terebintho. Scal. Bellonius testatur, veterum morem in comedendis seminibus Terebinthi nunc adhuc durare in Cilicia & Syria, sibi; aliquando rusticum Arabem occurrisse (vt iam supra quoque monuimus) ducentæ Cameli Terebinthi feminibus onustum. Testati sunt auctores fide digni, ante duo millia annorum hominibus, esum lenium Terebinthi in vfu fuisse, ac Persas in vilitate ante vsum panis. Ruthia Thracia & Macedonia ferèntis magnè esse vsum Gallarum Terebinthorum, qui per colles crescant & abundant, [vt idem Bellon. scribit] lueri quod inde sperant occasionem non prætermittunt. Nam circa Iunii finem parua poma sub foliis colligunt, aut ad rami radicem, ferèntis semina ad formam racemi, vbi inueniunt paruum Gallam vacuum & inancem, magnæ acinis Austriacæ, quæ si crescere sineretur, longa euaderet ad formam parui cornu: sed adhuc paruum colligunt, ac carè vendunt, attingenda ferica subtilia diuersis coloribus in virbe *Bonæ*: vbi in communi vfu est simplex hoc vteribus incognitum. Quotannis consumunt plustquam sex millia librarum.

Et alibi. Species sunt Gallæ, magnitudine paruarum Gallarum, Romanarum, inus citæ, prouenientes ex excrecentiis foliorum Terebinthorum Maseulorum, colliguntur vere, quo tempore nisi colligerentur in longitudinem semipedalem excreverent ad formam cornu.

#### DE RESINA TEREBINTHINA, EIVSQVE VIRIBVS.

Non inconueniens diximus de Resina Terebinthi quam Terebinthinam hodiè passim vocant, specialius differere. Nomina, Locus, modusque eliciendi à planta sua superius declarata.

Legitur tamen nonnunquam minus rectè, & quasi barbarè per varios libros Ferbentina, seu Feribentina, vel Terebentina, Trementina aut Fermentina, vt annotant Monachi apud Mesuen. Glut. in Alu. bath, alu. bath, alu. bath: vt ferè omnes iunior, declarant, idem significat quod Terebinthina. Est verdè Terebinthina vocata, vt describit Cordus Terebinthi arboris resina, colore candida, subflaua, vitrea, aut candida, cæruleum colorem affectans, interdum pellucida, quæ friata, primum in plurimas micæ teritur, mox lente-

scij



scit & glutinosa sit, odorem habet acrem, suauem, aliquantulum grauem, & Laricæ resinæ non dissimilem, præsertim manibus tractata, & prunis imposita. Gustu modico amarescit, & inter dentes lentescit, iis dum masticatur adhærens. Destillat hæc primum liquida, deinde paulatim accrescit. Eandem hæc resinæ sacrificuli vnâ cum Thure accensam, in templis adoleuerunt, ob id incensum appellantes: quo factum est, vt hodie adhuc cum Thure ex Syria & Aegypto allata, pro Thuris quadam specie vendatur ab imperitis & impostoribus mercatoribus, qui differentiam inter vtrumque facturi, hanc, Incensum siue Thus appellant: (sed magno errore) Thuc autem verum, Olibanum, non intelligentes hæc duo vocabula, alterum Græcum, alterum Latinum, eiusdem rei nomen esse. Porro ex præmillâ descriptione facile patet, eam quæ hodie vulgò Officinæ Terebinthinæ nunc habetur, genuinam Terebinthinam non esse, quippe quæ tenax, liquida, interim lenta, si auescat, & odore sit graui, Abietino vel Laricæ, de qua re specialius suo loco.

Præsertim autem à Dioscoride magis pellucida, candida, vitreo colore, & in cœruleum vergente, odorata ac Terebinthum olens.

Resinas porro omnes eodem auctore, antecedit Terebinthina: proxima huic Lentiscina: deinde Pineæ [πινεύς] & Abiegna. Post hæc numeratur ea quam ferunt Piceæ [πίκνιν] & Strobilina.

Vis autem resinæ cuiusvis molliendi, calefaciendi, discutiendi, dissipandæ & expurgandi. Tussi ac tabi conueniunt in eodem, per se aut ex melle, quæque ex pectore educi oportet expurgant. Vrinam quoque mouent, cruda concoquant & ventrem emolliunt: ad agglutinandos palpebrarum pilos conferunt: itenique ad lepras cum trugino, futuro stramento ac nitro. Ad aures denique sanie manantes cum melle & oleo, nec non ad genitalium pruritus sunt viles. Emplastris quoque, malagmaus & acopis admiscuntur: quin & per se illis aut impositis laterum doloribus auxilio sunt, hæc Diosc. Ex cuius verbis patet eam resinam Terebinthinam omnium optimam, strobilinam verò infimam statuere. Cui quasi è diametro contrariari videtur Galen. Is enim, de comp. med. & syn. principem calore facit strobilinam, proximam huic Abiegnam, postremam Terebinthinam esse scribit. Scilicet de bonitate resinarum absolutè locutus est Diosc. Galenus verò de earum qualitate, seu caliditate agit: in aqua primas hæud dubiè obtinet strobilina, veluti & eo ipso loco disertè admonuit Gal. ne à Dioscor. dissente videretur.

In eandem porro sententiam & simpl. Terebinthinam & huic viribus proximam Lentiscinam, ob eam quam præ cæteris maiorem habent partium tenuitatem, magis digerere, magisque attrahere prodidit. Sed ipsummet dicentem audiamus. Inter resinas (inquit) primas meruit omnium Lentiscina: inter alias præsertim Terebinthina, manifestam quidem non tamen similiter atque mastiche adstrictionem possidens. Cæterum adiunctam habet amaritudinem quandam, per quam magis etiam quam mastiche digerit. Ob eam qualitatem inest & absterfio, tanta quidem, vt & ploras sanet. Quinetiam quæ in profundo residet, cæteris resinis magis attrahit, nimirum, cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. At tamen Picea, & hæc etiam magis Strobilina, acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen di-

gerunt neque atrahunt. *Mediæ inter hæc sunt Digeris: Pineæ & Abietina: acriores quidem quam Terebinthina, minus tamen quam aut Picea, aut Strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam Terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo Lentiscina, sicut & Cyparissina acrimonia. Quò loco rursus patet Lentiscinam à Gal. reliquis omnibus præferri, sicut à Dioscor. Terebinthina. Sed ad diuersa respexit vterque, vt patebit Galeni integrum illum locum legenti. Non enim hic omnes controuersias specialius de clarari consultum.*

Persequamur vires ex Gal. Terebinthina resinæ, cum detergendi discutiendi, facultatem habeat, etiam affectus tales quod concoquat, quidpiam obinet. In lib. de sanitate tuenda, vbi docet, quibus senes vt debeant ad aluum ciendam, eam nucis Ponticæ magnitudine, aliquando duarum triumve sumi præcipit. Quippe non modò aluum soluere citra noxam posse, sed & viscera omnia, iecur, lienem, renes, pulmonemque abstergere. Idem & Paulus confirmat, & ventri vel oliuæ magnitudine deglutitam apprimè conferre testatur. Andromachus Terebinthinam in suâ Theriaca addit, & quidem Libyam: de quo miratur Galenus, cur hanc potius Chiam præferat: hanc enim penè omnes meliorem iudicare, quamquam & Libyam laudandam censeat, si bona sit, sed proculdubio bonam semper non esse, quemadmodum quæ è Chio venit. Nasci quoque & in Ponto, & in aliis aliquot locis optimam. Verùm Chiam reliquas & odore & sapore vincere.

Sic Plin. in Oriente optimam tenuissimamque Terebinthos fundere Terebinthinam, odoratissimamque tradit.

Porro non diu est, inquit Matth. quod Veneτίας defertur ex Cypro. Antea coctam afferebant, vel quòd esset adnectu aptior, vel quòd impostoribus, ad adulterationem aditus hoc modo facilius fieret. Verùm liquida, vt per se ex arbore manat, iam frequens facta est. Cæterum quia Terebinthina iamdiu in Italiam non aduehebatur, Larigna non modò Terebinthinæ locum sibi vendicauerat, sed etiam cognomentum: Larignam enim falsò Terebinthinam Officinæ vocant, quamquam in hoc magnum errorem haud committi Amatus existimet, quum vtraque easdem ferè vires ac facultates obineat, vt testatur Gal. cui postea & Paul. & Aet. subscriperunt: Satiùs tamen esset vera vt Terebinthina. At dum ea caremus, illa eius vice vt possumus. At Mopachi, satius esse ducunt, in defectu veræ Terebinthinæ vt Mastiche, quippe quam ipse Diosc. in omnibus Terebinthinæ correspondere tradit. Ideoque tutius quoque esse in eius carentia ponere Masticem, quam aliud. Sibi autem certè cognitum esse, eam, qua hodie sub Terebinthinæ nomine vitimur, ex Laricis arbore excipi, tamen Aetii autoritate, ad omnia quæ Terebinthina valet.

Auic. in cap. de Terebinthina nihil dicit: sed mittit lectorem ad cap. de grano viridi. Verum tamen Bellunenſis in capite illo pro Terebinthina, rescriptit alchambat.

Inuenitur etiam apud filium Serap. *Helcallimbar*, quod idem est, quod *Alchalimbar*, id est, glutin alimbar. *Halc*, enim, siue *Hole* Arabicè, glutin interpretatur Latine.

Quæ pro resina Terebinthina venditur, ex Syluii testimonio, aut Laricæ est, aut Abietina. Terebinthinam veram è Cypro allatam, Venetiis, ad eum misit, Io. Bapt. Opizzo Medicus, nostræ Laricæ & Abietinæ affinem, sed infinitis

Emolli

Purgans

Viscera  
purgatAndroma-  
chus nat.  
ChiaLibya.  
Dolectus  
& locus

Larigna

Mastiche

Laricea.

partibus præstantiorem. Terebinthina proxima est Laricea. Larici bonitate & tota natura est affinis Abietina, quæ hodie propè sola pro Terebinthina ab omnibus officinis supponitur, magno errore, cum sit multò inferior Terebinthina.

Abietina.

Quod si Gal. non modò Terebinthinam exigebat, sed Chiam tanquam omnium præstantissimam requirebat, quæ, non dico, ignominia, sed pœna mulcandi sunt illi, qui, scientes, Abietinam pro Terebinthina vendunt, vspurantque non sine Medicorum id permittentium infamia & culpa.

Syluio ad stipulatur Apollo de adulterio, sed de virum diuersitate nequitiam. Sic enim insit. Terebinthina, multis iam præteritis lustris Medicos omnes lauit, nec dudum Venetias ferri cœpit cocta, & in massas velut placentas congesta, fortè quòd ita commodius vehitur, aut sic facilius adulteria admittit. Nec deest liquidæ copia, qualis ex Terebinthino manat. Huius loco ætas nostra resinam Larignam vspurauerat, ei Terebinthinæ locum, & cognomeatum falsò vendicans: nec grauius admodum errore, quum ex Galen. lib. 4. de comp. med. per gen. cap. vlt. omnibus his Pharmacis, quæ Chironiis conuenire palam est, Larix resina, loco Terebinthinæ, nullo errore miscetur, sibi inuicem affini similitudine. de comp. med. per gen. c. 15. atque Lenticine Terebinthinæ respondeat, ex Diosc. altera alterius defectui faust. cere poterit, quamquam Terebinthina passim vendita, flauis coloris, & mellis Attici, ex Larice resina sit *Hæftenus Apollo*, qui inter cætera Terebinthinam leuissimam dicit, sed qua vel ratione, vel quo auctore, nuppiam apparet. Ex Theoph. id desumpsisse videtur, sed malè intellecto, qui inquit, quod sit *ἡ ὀσφύρις ἢ κορυδαίνων τῆ ὀσφύς*, id est, odoris suauissimi & leuissimi, siue qui leuissimè feratur, quique grauis odore non sit: quod bonus ille Apollo ad pondus retulit.

Non improbat Apollo Syluio, Laricea.

Apollo m.

Quod veram Terebinthinam, de qua hic agimus, Valer. Dourez annotauit se collegisse ex ipsamet arbore factò sacrificatu. Eiusmodi rara est admodum, vidimus tamen in cucurbitis quæ ex Creta Venetias delatæ dicebantur, quæ etiam vsi sumus Lugduni & Geneux ad Theriacem quam preparabat Valer. Dourez me Bath. præfide & intendente. Pulchra erat, lucida, ac multò densior resina illa liquida, quæ ex Abiete colligitur. Veram Terebinthinam Dod. calidam facit ad secundum gradum, non tamen vsque ad eòdè siccum.

Temperamentum. Dosis.

Porro vt & de Recentiorum vitibus vtendi: modo aliquid addamus, dosis eius serè hodie à drach. j. ad drach. 4. quinque etiam exhibemus, vel in bolo cum pulvere Glycyrrhizæ, vel cum drachm. j. pulueris Rhubar. vt Syluius qui drach. iij. rarò excedebat, vel potu dabat ex decocto Cicerum, vel eius loco aquæ illius aut Olei destillando separati vnciam dimidiam cum vino albo propinabat nephriticis: purgatis priùs venis primis & ventre reliquo.

Vtendi modo.

Purgat thoracem ab omni immunditie: Item iecur, splenem, renes & Vesicam. Consert veteri tussi, spirandi difficultati, sputo sanguinis putulento, vertiginosis, calculosis, & peculiariter etiam ischiadicis, Podagricis, Chiragricis: aperit, mundat, calfacit & roborat neruos. Vnde Cermison sanctissimam appellauit medicinam. Quidam eius potum vtilem prædicant in affectibus vteri cum decocto artemisiz, & infusione Chamæmelis. Mulieres Persæ vtuntur ad masticandum gummi Terebinthinæ, quod prodest ita masticati, vt

Sanctiss. materia videri potest. Gummi Tereb.

dentibus non adhaereat, nec in ore consumatur, teste Bellon. Lob. in libello de Balsamo scribit, Lib. Balsamum quoris Balsami loco nullum præstantius esse. Opobalsamum, veri Terebinthi latice. Verno namque tempore ramulorum pullulanti tenella Terebinthi effracta flagella ipsoque etiam Narbonensi, Nitiobrigum siue Linguagotico aut Montpelienfi agro, instar Ficulnæ arboris, lac stillant, quod conchis exceptum & adseruatum in limpidissimum, tenacem, resinolum latice abis, qui dum recens est, id est, in musto, vt Plin. verbis vtat, in lancam vestem fusus, neque maculam faciens, neque si eluatur vestigium aut notam relinquens: senescens tempore crassecit: nec abluitur nisi oui vitello addito. Qui Garyophyllorum, Nucis Myrtificæ aut Cinnanomi oleum huic liquori præferunt, suauitati & saporis plus quam optatis facultatibus deserunt. Sic Clemeus Clementinus, Terebinthinam destillatam proximam esse Oleo Balsami prædidit, vel parum calidiorem & conferre omnibus ægritudinibus frigidis, & maxime neruorum. Immo ipse Dioscor. Terebinthino oleo Balsamum adulterari dixit.

Quod verò frigeferat vertunt in *ἄλκυον* interpretes Dioscor. ostendunt quam parum ad rem ipsam attendant, cum manifestè calfaciat oleum Terebinthinum, tantum abest vt refrigeret. Melius Sarrae. iuxta alterū *ἄλκυον* significatum siccare conuertit: quandoquidem & fructus Terebinthi è quo illud exprimitur (nam eodem modo, quæ Lenticulum & Laurinum ex fructu parari docet Dioscor.) euidenter exicare proditum est à Gal. 8. simpl. cap. de Terebintho. Quod si quis *ἡ κορυδαίνων* vitandæ gratia *ἄλκυον* legere maluerit apud Dioscor. pro *ἄλκυον* possit. Hoc autem oleum hodie apud nos, vt & in Italia, neque paratur neque habetur, quod & Matthiol. testatur. Hoc tamen, vt Mesues tradit, vulpera consolidat: medetur item conuulsis, Opisthotonicis, æneruorumque duritiis, & creberrimè Cataplasmatibus admiscetur.

Aliud est Oleum quod arte destillatoria ex ipsamet Terebinthina in retortam posita destillatur in arena, vel per se, vel cum aqua simplici, vel rosarum, aut etiam vino, vel hoc cum illa admixto: quale ego Cher. haud ante multos annos sèpius Lutetiz paraui pro Generosis ac Nobilissimis coniugibus D. de Sancy Cõsil. Regi à latere, & D. de Fabry Thesaurarii & Cõs. Regi, quorum prior illa miserè interdum Nephridiè consistebatur, & ex hoc oleo singulare solatium sentiebat. Terebinthinam probè lotam sacco lineo immittebam, huncque in retortam vino albo & aq. ros. semiplenam. Sic arenæ imposita adhibito excipulo, primò aqua limpidissima exibat, qua finita, oleum splendore sine dubio margaritis referens exibat, prædictæ aquæ innatans. Dixisses perlas dissolutas. Magna opus cautione, in regimine ignis, quippe si vel paucillum incandescat supra modum, tumet & sentiet oleum. Vbi sufficiens album existasse putauit, mutauit excipulum: non enim expectandum, donec flauescat. Tum & flauum secutum, & tandem rutilum. Primi, quod à sua aqua separatur, vsus est intra corpus, ad omnia supra scripta longè præstantissimum. Secundi & tertii quæ igneam propemodum naturam habent & topica, præsertim fridos partium morbos, & summam extinctionem. Quod remanet in retorta [quodque tamen non expectandum] Colophonia vulgò habetur.

Oleo reb.

Diosc. Diosc. reperi.

Diosc. mem.

Oleo lase. Tereb.




fiabetur, quæ, quod plus olei extraxeris, eò nigrior fuerit: adde, quod ea indurata, retortam frangi necesse sit. Modum hunc, & alia destillatoria artis nobilissima opera nunc docuit magnus ille vniuersæ Medicinæ Coryphæus Ios. Quercetanus, Conf. & Med. Regius, cui per aliquot annos, ceu alter adfuit Acharis.

Varios modos parandi olei Terebinthinæ habes in Enoynomo, eorumque vsum: Item apud Ryffium, Cordum, Cronenburgium & alios. Videnda quedam etiam lib. 9. titulo de Pini resina.

Dioscor. etiam vinum Terebinthinum parat è bacciferis eius ramis tuis, decem minarum pondus, in tribus musti congiis fersuefactis, donec duo supersint, aut certe dimidium: id vinum colatum ad vsum reconditur. Adstringit, stomacho accommodatur, & de fluxionibus intestinorum, velicæ & stomachi, & sanguinis profusio. Vlcerà omnia fluxionibus obnoxia, foris ad cicatricem perducit: fluxiones vulvæ ac sedis infestatione cohibet.

## LENTISCVS.

## CAP. XXI.



**M**eat Lentiscus stolonibus, mediocriter crassus, flexilibus ramis brachiatis, cinereo cortice obductis. Interdum in iusta magnitudinis arborem excrefcit, vt obseruauit Clus. folia minorâ, quàm Pistaciorum, vel Terebinthi, Glycyrrhizæ foliis paria, sed Buxeorum soliditate, ex viridi nonnihil rubentia, coniugata, sine vilo impari, ad costâ

canaliculatam rubescentem connexa, in spinulam plerumque desinentia, inque eandem ferè partem vergentia, iucundi cum quadam grauitate odoris, sapore acidiusculo & adstringente. His interdum folliculi (vel vesiculæ quedam) adnascuntur culicibus exiguis referti, haud secus ac in Terebinthinis vel Vlmeis. Ad alæ imum exoriuntur flosculi, veluti racemi, rubentes, vel colore ex herbaceo pallefcentes, nonnihil purpurascetes, qui in fructus abeunt, dimidio ferè Pisis minores, in stylum minutum desinentes, rotundi, rubentes, & per maturitatem nigricantes, acidæ, nucleum continent parvulum, durum, nigrum, albam medullam continentem. Fructum Cæsalp. oleaginosum dicit, medullam viridem.

Lentiscus siue *χένος* ea arbor fuit, sub qua Tudorum accusantium alter se Sufannam adulterantem inuenisse Danieli falsò testificatus est.

*χένος* Hipp. de morb. mulier. qui & alibi eiusdem operis *χένος φύλλα* pro Lentisco. Postea scribit ad strangulatam vteri naribus illinito *χένος λεπτόν* *ἢ διὰ κνήμης*. Cornarius sic interpretatur Schinum tenuem, Scillæ speciem, quæ mordeat.

Theoph. *χένος* eadem est, quæ Lentiscus, quando ait: alii Thuis arborem similem esse dicunt *χένος* (Lentisco Gaxa) & fructum quoque *πύρρον* (Lentisci Gaz). Folium subrutulum, *ὑμπερπερ*. At in libris de caus. aliam plantam denotat, scribens: *ἢ καὶ ἐν Ἑλλήνι οὐκ ἔστιν ἡ Σκιάνη, πάντως δὲ βρασίδας ἐνέκα τῆς ἀπορίας οὐκ ἔστιν. ἔχει γὰρ πᾶν ἀμύμον δένδρον καὶ ὑπερπερ, καὶ γένος καὶ δὲ ἐκαστοῦ τῶν Gaza: meliora euadunt, & quæ Lentisco aut Scillæ inserta terræ mandantur.*

Et alibi eiusdem operis: omnia quæ Lentisco (*χένος*) inserta terræ mandantur (*οὐκ ἐνέκα*) minus vermiculationem sentiunt, odoris fetuorisque causa. Quibus posterioribus locis quid sibi velit Theoph. non intelligimus, aut quænam possint plantari in Lentisco, vel terræ mandari, vt vertit Gaza. Si non faceret mentionem odoris: per *χένος* intelligeremus Scillam, quam & ipsi sumer intelligere verisimile est, vt patebit conferentj proximè antè hunc citatum locum.

Manet tamen difficultas de odore. Equis enini odor acquiri possit ex Scilla. Si acquirat, nullum sanè gratum acquireret. Habet autem Lentiscus per se ipsa satis gratum odorem. *χένος* Diosc. Gal. Arazo. Conf. in Geop. & aliis plerisque Græcis. Lentiscus Cæc. Plinio, qui q̃i baccas tribuit, & resinam quæ ex ea fuit Mastichen, & Lentisci glebas vocat. Plurarch. gloriatur se vidisse è Lentisco pullantem Oleam.

Potidè Lentiscus, si Hermol. credimus Resinam vbique sudat. Mastichen verò dictam in Chio tantum insula ferè ait, Lentisci fructum Hippoc. de morb. mul. Schinida (*σπινίδα*) nominauit, etiamsi Librarij om culpa, non Schinides, sed Echinides (*ἐχινίδας*) legantur, sicut & Cechudes pro Cedridas.

Plinius Lentiscum Italicam dicendo videtur præter Chiam alia quoque genera nouisse. Fructus initio rubet, post nigrescit, qui & in racemis Sambuci specie dependet, folio Pistacii sed minore, per extremitatem rubente, in summo siliquæ Pisorum, sed corniculi modo intortæ, in quibus resina odoris iucundi continetur.

Romæ demonstratur in rudibus monumentisque Lentiscus folliculis inanibus & deformibus, his confectis culices euolant frequentes.

Marcellò autore, notior quàm nunc sit, quondam Lentiscus fuit: & si, restant id Plinio, Ciceroni credendum est, rustica plebi necessaria; quæ cæli & in eo syderum imperita, arandi suorum operum auspicijs ex propinqua arbore certius cognoscere posset, vt specialius dicitur in tempore.

Lentiscum dictam putat Ruell. quod liquore quodam lentescat. Arbor est, vt ille tradit, Roboris magnitudine, Sorbi folio; Terebinthi odore, acinis illustri Punice rubentibus, vbi maturuerint nigris, tantisperdum coquantur rufis. Fertur & alia Iunipero similis. Plinius (addit idem) præter Lentiscum Chiam, aliud genus nouisse videtur, Lentiscum Italicam dicens, ea traditur folio Pistacii, &c. Sed Ruell. de illorum censu Italica *πῖ* est, qui de sibi ignotis tradunt, adde vt sub quo *σταχὶ φύλλα* Ruell. not.

At Iunipero similem quando dicit, nobis illa monstra pro Roboris magnitudine: Quænam illa, Roboris magnit. aut vbi visa? Sorbi folio? indicta hæc hæcenus, Sorbi folio? præterquam ipsi, qui solus eam vidit, in suo cerebello. At Iunipero similem quando dicit, nobis *σταχὶ*

Lentiscus

E Lentisco

Schinidis

Folia

Lentiscus

Italica

Siliquæ

Resina

Culices

Lentiscus

vnde

Lentiscus

Chia

Italica

πῖ

Ruell. not.

Roboris

magnit.

Sorbi folio?

Iunipero

simile

Pinas offert pro Rosis. Egregium sanè verò Herbarium, Lentisci tres solum facere audentem species cui nulla earum cognita fuerit, binæ verò in rerum natura fortè ne extent quidem. Nam quod de Lentisco Italica Plinii ex Hermolao transcriptum, eum tamen non citans, ad veram hanc nostram Lentiscum referimus.

Schinus & Schinos.

Porro voces hæ, *σχίνος* & *σχίνος*, sua similitudine, ut annotat Cord. aliquos in errorem coniecerunt; alterum pro altero apud autores accipientes: prior Lentiscum, posterior luncum aromaticum denotat. Idem proceram dicit arborem, folia Lénti similia esse, sed maiora: Germaniæ incognitam. Lentiscides, id est, Lentisci arboris bacca, eidem paræ rotundæque sunt, Ligustri baccis siue acinis æquales, sed colore virides. Vnde etiam à quibusdam dicitur Lentiscus Arbor grani viridis.

Lentiscides.

Arbor grani viridis.

Aud. amicus Matthiol. Lentisci, inquit, nonnullæ sunt plantæ quæ in arborem mediæ proceritatis assurgunt, nonnullæ verò humiles, quæ nullo grandiore caudice à radicibus sublato, sed virgulis, stolonibusque innumens, Corylorum sylvestrium modo dissiliunt. Verumtamen Lentiscus tum ramis, tum foliis densior constat; magisque virgultorum cacuminibus ad terram deflectitur. Foliis utraque & Pistacius [in post. edit. Myrtæ mulis,] graucolentibus, pinguis, friabilibus & in obscuro virentibus, in ambitu tamen rubent, sicut & quibusdam venulis. Perpetua fronde vitet. Cortice est subrufo, lento, tenaci, flexibili- que. Proferit Tereb. modo præter recemosos fructus, folliculos corniculati modo intortos, in quibus includitur liquor limpidus: qui tandem veterascens, vertitur in bestiolasius persimiles, quæ ex Ulmi & Terebinthi folliculis euolant. Totâ plâta grauius olet: quapropter nonnulli, quod olfactu caput aggrauet, ipsam denigrant. Sed Lentiscum, quæ Roboris magnitudine proueniat, folio Sorbi, acinis sylvestris Puniceæ rubentibus, ut Ruell. scribit, hæcenus non vidi, nec id nunquam me legisse memini apud probatos autores. Idcirco Ruellium hac in re hallucinatum crediderim: quemadmodum & Hermol. qui ea esse Lentisci folia existimat, quibus Coriari Venetis pelles conficiunt, vulgò propriè appellata *Figlia*. Si quidem planta, à qua hæc folia decerpuntur, maximè à Léntisco differt: est cum Terebintho aliquam habeat similitudinem.

Cortex sub-  
rufus.

Folliculi  
Ligustri.

Ruell. m.  
Hermol.

Folia Fe-  
neci.

Matth. not.

Idem Matthiol. in hist. Germ. Lentiscum folio Myrti dicit: aded sibi ipse constat. Quando verò ait Lentiscum folio esse Pistacii, alios potius imitatur, quam rem, vti reuera est, edisserit. Melius Amatus Olinx folio comparat, modò intelligantur particularia Lentisci folia: Idem & Pistacii folio confert quidem, sed in eo, quod perpetuò vitæat, ut illa, nec ab arbore decidant annuatim.

Galien. not.

Bellonius quoque Lentiscum semper virentem testatur: In sola insula Chio inter alias omnes Mastichen præbere, quamvis Gal. 2. ad Glauconem laudet Aegyptiam. Lentiscos quæ in Prouincia & Italia proueniunt similes dicit nascuntibus in Chio: Mastichen autem non fundere. At Matth. ut antè dictum, Lentiscum Italici Mastichen ferre scribit: & in hist. Germ. solum in insulam Chio gummi ferre: quæ si quis nobis accorderet, meritò magnus habendus fuisset Apollo. Amatus tamen & in Hisp. & Italia gummi ferre assedit.

Matth. not.

Schinus.

Cic. ex Arato.

Geln. Schinum vocat, quo nōmine [addit] Veneres Hipp. Arist. Theophrast. Scillæ speciem nominarunt, est Gaza malè Lentiscum vident, ut & Cic. ex Arato: nisi fortè & ipse Aratus homo-

nymia nominis deceptus, transcriptum ab aliis Schini nomen pro Lentisco arbore acceperit. Léntiscus an *et* floreat alibi non constat mihi. Hec ille. Si aliquo in loco Gaza apud Theophrast. malè conuertit *σχίνος*, crediderimus id factum lib. 5. de caus. cap. 11. & lib. 7. cap. 7. Imò benè veritè Cicerone, quum manifestum sit Aratum loqui de arbore: mentionem enim facit *σχίνος*, non *αὐτὸν*. Id manifestè etiam patet ex Geopon. Constant. Mallimus itaque credere eos de Lentisco scripsisse, quam existimare, tam excellentes autores, Aratum, Cicer. Plin. & Constantinum Geoponicum errasse. Sed nec res ipsa repugnat, quoniam, ni multum fallimur, & Lentisci fructus, possent temporari indicare, qui non omnes simul maturescunt, non minùs fortè quàm flores Scillæ. Nec videmus quis requirat in Lentisco, ut ter floreat, quicquid dicant Aduersaria Penæ & Lob. Præterea cur non possint duæ plantæ idem indicare, vna flore, altera fructu? Sed quid opus pluribus verbis? Aratus vtriusque expressè meminit, ac vtrique tribuit, vti patet ex loco inferius citato. Plin. quoque eandem rem vtriusque locis tradit, hic Lentisco, illic Scillæ.

Turnerus Mithulolum taxat, quod Pistaciorum arborem Lentisco nimis similem pinxerit, ipse interim quoque taxandus quod figuram tam ineptam & malè Lentisco quadrantem proposuerit. Theophrast. Dioscor. & Plinium notat, quod Lentiscum non descripterint: Quæ certè reprehensio si locum habeat, reprehensionum non erit finis, quod innumera propemodum ab iis non descripta, nullæ serè exactè descriptæ habentur.

Ceterùm, ut tradunt Aduersaria, lentorem foliorum attritu, quilibet percipit, vnde Lentiscum dicunt, partim etiam à Græcis mutuati, qui *σχίνος* quasi *σχίζω* aut fissile vocarunt, quod facile & frequens funderetur in denticalpia, ad nitellam alborèque dentium, ut etiamnum fit hodie.

Fruticat & arbore scit, stolonibus & candice, concolor & similis Terebintho minori sed botris & vitis in itid ex fuluo purpurantibus, maturescendo nigricantibus acinis, nitidis, Sumachi, Phylææ & Sambuci: vtriusque folliculis oblongis, rotundis & incuruis, teretibus, quibus insunt culices & effigies item Terebinthi, adeoque flores similes, racemosi, muscosi, quos primo Vere Aprilis mense promittit, non putalatum, ut putarunt ex Arati & Ciceronis versu.

Lentisco triplici siliæ grande scire factum, Quod Theophrast. meritò Scillæ attribuit: hi autem vocis affinitate decepti, Lentisco. Quare non esse contemptui habendam nomenclaturæ perpensionem, alibi iure asseuerabamus. Verùm iniuria sit hoc loco Arato & Ciceroni, non enim aiunt flores arandi tempora monstrare, ut antè dictum si d. *σχίνος*, factum, id est, baccas quamvis idem quoque tradat Ruell. de flore.

Matthiol. verò meritò reprehendunt, qui fallitur & fallit, quod pumilas recensens Lentiscos, alias à procerioribus specie facit: sit enim tantum refectis cymis ad usum, ne in arboris emulationem assurgant. Ut hunc errorem cumulat in scitia, cum Vniuersam plantam grauius olere ait: at nobis aliisque studiosis saltus & colles aridos Narbonæ peragantibus, inserta in os folia, non modò suauiter spirabant: sed etiam, quod fortè nescit commentator, sitim arcebant, & fauces humidas tuebantur. Itaque nobis silentibus, qui norunt Mastichen, & sciunt Lentisci fuculos, ut

Xyloballam





& gingivas colluit. Folia dentibus in dolore atteruntur: mobiles decocto colluuntur. Capillum tingunt. Lachryma sedis vitis prodest, cum quid siccari excalefierit opus sit. Folia tenera oculis in inflammationibus illinuntur. Medetur & atritis partibus, siue oleo è semine eius facto [de quo postea] ceræque misto, siue foliis ex oleo decoctis, siue cum aqua virilia foueantur. Quo loco non displicet nobis Dalechamp. lectionio, pro virilia, naturalia legentis, nempe vuluæ, quamuis de utrisque intelligi possit.

Idem Plin. testatur Democritum medicum in valetudine Confidix M Seruili Consularis filix, omnem curationem recusantis, diu efficaciter vsum lacte caprarum, quas Lentisco pascebat. Morbum eum fuisse Vlcus pulmonis renūme credibile est, aut immochas sanguinis profusiones, ex coniectura Dalech.

Lentiscus, ex traditione Galeni ex aquea essentiali calida facultate, & terrena frigida non pauca composita est. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente; in caliditate & frigiditate differentia quodammodo est medius & symmetricus. Similem omnibus sui partibus astrictionem obinet in radicibus, ramis extremis tenuioribus, germinibus ac foliis: præterea fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderate adstringens. Itaque bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quæ Dysenterias & alui affectus sanant: quin & ad sanguinis expuitiones: sanguinisque ex vtero eruptiones, tum sedis vuluæque proidentias idoneus est, ut pote ad hypocyrtida non nihil propè accedens. Idem in Euporistis: ad gingivas sanguiniblenas extremitates Lentisci & Balsastia in posca coqui & collui precipit. Porro dentiscalpia ex Lentisco parata tum priscis, tum hoc seculo magnatibus & delicatioribus præsertim in usu quotidiano pro optimis & præstantissimis habentur, quod Valer. Mart. quoque insinuat.

Foditurque confisi ora laxa Lentiscis.

Et in Apophoretis,

Lentiscum melius: sed si rivi frondea cuspis

Desuerit, dentes penna lenare potest.

Dentifricia eiusmodi per Hispanias, Italiam & Galliam, ubi passim ferè venalia habentur, & ad Germanos quoque à Mercatoribus importantur, in quotidiano sunt usu. Fabrè effectum & exculptum mihi Cherlero aliquando obtulit mulier Africana, ut arbitror, cum Venetiis Anconam versus solueremus vnâ. Sed necid inter nostra naturalia lignorum ordine positum, nec alia multa exotice raritatis nobis chara, rapaces cuiusdam, cui nimium fidebamus, manus deuitare potuit.

Cæterum eiusmodi assidui dentium exculptores adagialiter vocantur *gingivæ*, id est, Lentisci atrofores dicuntur, quod in eos potissimum quædrat qui nitiduli esse gestientes nimia satagentia corpus expoliunt. Linguagothi Lentisci virgulis ad calfacienda clibana & ad coquendum pro quouis alio ligno promiscuè vtuntur.

E Lentisco etiam vinum fit, quod Schinium siue Lentiscinum dicitur. Si verò Mastichen accipiat, Mastichites. Hac ratione. Bacciferi rami cum foliis tunduntur decem minarum pondo, & in tres musti congios merguntur, coquanturque donec duo supersint, aut certè dimidium, tademque colatum id vinum ad usum reponitur. Attingit hoc, stomacho accommodatum. Eo etiam in testinorum, vesicæ & stomachi destillationes fi-

stuntur, ac etiam eruptiones sanguinis. Vleera & fountur & ad cicatricem perduntur. Sedis vuluæque fluxiones tum iniectionum potum cohibet.

Ut vini præscripti, ita & Olei Lentiscini parandi rationem & usum docet Dioscor. Lentiscinum oleum similiter atque Laurinum ex maturo fructu confectum ac prius inspissatum, scabiem iumentorum canumque sanat. Pessis, acopis & ad Lepras tollendas accommodatis medicamentis aptè & vtiliter immiscetur: ac sudores etiam cohibet. Idem & Plin. tradit, additque idem effecturum quod rosaceum, ni durius paulo intelligeretur: vsum eius esse ad papulas à nimio sudore excitatas, Gal. in destiuio capillorum: Lentiscinum oleum valde commendat, habere namque adstriktionem atque maiorem oleo in Iberia aut Hispania nato, sponteque nature tale existere, quale est ipsum Ladanum. Quare neque experiri se, neque mente concipere posse vllum præstantius Pharmacum ad defluos capillos, quam quod ex Ladano & Lentiscino oleo permixtum constat.

De eodem sic Actuar. tradit. Quod si gingivæ ob inflammationem doluerint, oleum Lentiscinum, si moderatè calidum ore contineatur, præstantissimum est remedium. Sit autem recens: nam quod vetustum est, deterius est. Porro id in duplici vasi callescere debet. Est igitur hoc gingivuarum inflammationi quam maximè accommodatum. Nec verò minus, si quis in alia quapiam parte membranas, tum linguarum vellentis, tum succingentis totam os, dolor ob inflammationem oriatur, Lentiscinum sedare potest. Repellit enim placidè, & citra asperitatem quam austerorum plurima obtinent. Adhæc, absque morfu discutit, quo inflammata omnia inprimis opus habent.

Apud Germanos tamen, teste Cordo, nullus est olei Lentisci usus, quoniam nec aliunde afferatur ipsum oleum neque in Germ. nascitur, ex cuius bacis confici possit: quoniam tamen præstas eius usus est, ut patet, possent persicilè ex Gallia Narbonensi vel Italia accersiri, cum & ea quæ gula & ventri deseruiunt abundè ista loca inistorum cura nobis suppetant. Ab Hispanis sanè Oleum fructuum Lentisci in maximo habetur usu, præsertim etiam pro insciendis chirothecis, quod sua voce *Azeite à Mara* apellatant, teste Amato. Et Clus. quoque scribit, cum in Narbonensi degeret Gallia, oleum ex bacis exprimi solitum magis ad varia usus quod in peregrinas regiones asportabatur.

Adulteratur eiusmodi oleo opobalsamum, si Lob. credimus. Appellatur Gallis *Huile de Mastie*.

## LENTISCINA RESINA, MASTICHE.

Masticen & dictum, Lentiscus Lachrymatur, (modumque superius declarauimus, & specialius adhuc dicetur postea) cuius grani, quales ad nos importati in Officiis habentur, orizæ granum æquant, longè etiam interdum maiores, candidi, pellucidi, fragiles, qui statim sub dente dissiliunt, mox tamen fissura omnis denud coit continuata masticatione, lentescitque mollis ceræ, [sine adhesionis ad dentes metu] quam rursum exiit simul atque aërem sensu: prunis iniecta flammam concipit, promptius tamen fumat, quam flammescat, contra ac Thus, guttasque as-

fatim



fatim destillat, id quod Thuri negatum, odoré-  
que non ingrati spirat. Sapor leuiter adstrin-  
gens cum calore modico.

Cordus annotat aliquos hodie Mastichen San-  
daracha adulterare. At Diosc. seculo, ut ipsemet tes-  
tatur, Thuris & resina Strobilina admixtio ne.

Resina Lentiscina, Mastiche, *ua, xvi, nunguim*.  
Offic. Mastix. Germ. Mastich / & Mastix vulgò.  
Belg. Mastick. Gal. Mastix. It. Mastice. Hup. Almace-  
go, o Almasiga. Arab. Gluten R. manum.

Huius & Theophr. meminit lib. 9. quando ait:  
ex Lentisco (*gins*) & spina Ixine dicta lachry-  
ma effluit, quæ *ua, xvi* vocatur. Et Diosc. E. Lenti-  
sco, inquit, gignitur quoque resina, Lentiscina  
cognominata, & à nonnullis *ua, xvi* dicta. P. xitan-  
tissima porro & copiosissima in insula Chio pro-  
uenit. Præfertur pellucida, teræ Tyrrhenicæ can-  
dore similis, densior vel plena, arida, friabilis & o-  
dorata. Viridis autem minus probatur. Myrrhan  
verò Lentisci glebis adulterari, quemadmodum  
& gummi, apud Plin. legitur. Sumus inter Ma-  
stiches glebas haud raro reperiri glebularum gummi  
Tragacanthi & Aracici, qui fucus tamen à peritis  
facile discernitur, ab aliis etiam masticatori-  
bus igne. Reliqua vitæ deprehenduntur sapore gum-  
mi dente lentiscentis.

Mastiches, auctore Plin. & ex alia spina fit in In-  
dia (an hæc illa spina quam supra Ruell. Lenti-  
scum dixit similem Iuniperi?) itemque in Ara-  
bia: Lamam vocant. Sed mastiche quoque gema-  
na est: quoniam & in Asia Græciacæ reperitur  
herba, radice folia emittens, & carduum similem  
Malo, seminis plenum: lachrymaque erumpit in  
cilia parte summa, (sina Dal.) vix ut dignosci pos-  
sit à Mastiche vera. Nec non & tertia in Ponto  
est, Bituminis similior. Laudatissima autem Chia  
cantada cuius pretium in libris xxx. arg. a verò xii.  
Chia è Lentisco traditur gigni gummi modo. Ad-  
ulteratur ut Thura, resina. Hæc Plin.

Quod verò de herba illa tradit, Ixinem apud  
Theophr. insinuat videtur, ex quo verisimile est  
eum partem tantam posuisse. Id annotat eum Cha-  
mæleonem album intellegere, qui Ixinem Mastiche  
similem gignit. Porro in Medicis Græcis Mastiche  
etiam solum Chia vocata reperitur, ut falsi pos-  
sit quilegunt, & ad proximè antecessens medi-  
camentum hanc vocem referre.

Mastichen personatam Marcellus Medicus  
empiricus vocat alubici, fortè ex eo quòd faciei  
illitionibus admixtam, claritatem ac nitorem in-  
ducere Diosc. dixit, ut sit velut *mesurine*, ut con-  
iicit Cornar. Quamvis autem Gal. ad Glauc. lau-  
det Masticeam Aegyptiam, scimus tamen (inquit  
Bellon.) in sola insula Chio nunc provenire, ubi  
Lentisci arbores coluntur ea diligentia, & non  
minoribus sumptibus quam antea nos vitesilius  
insulæ diuitiæ consilunt potissimum in Mastiche.  
Et nisi coletent diligenter, Oleæ modo, Lentisci  
parum Mastiches proferrent. Turcæ tributis vice  
incolæ annuatim quatuor vel quinque millium  
ducatorum Mastichen solvunt, singulo pondo  
centum & quinque ducatos æstimato. Reliquum  
sibi referunt. Mercatores Galli, quia vident  
perpetuò eo diuendi pretio, aiunt, ac sibi persua-  
dent, quæntes collecta certa quantitate Masti-  
ches, reliquam abicere. Sed hoc falsum. Nam,  
videtur, multum impendunt, in excolendis  
Lentiscis. Sed Mastiches pretium nec minuant,  
nec augent propter quantitatem pretii 4000. du-  
catorum, quam tenentur Turcæ persolvere: ita  
cum detrimendo summo imminebant vel am-  
plarent pretium.

Tom. I.

Ergo quæ ad nos importatur & in vniuersam  
ferè Europam vel Matth. quoque teste, in Chio  
prouenit ex domesticis solum Lentisci plantis,  
vulnerato quotannis arboris trunco. Fluit enim  
inde Mastiche, & in terra circumpanita concre-  
scit. Mastiches idemne quod in tota insula pro-  
uenit, Reipublicæ debetur, quòd, ut qui vin-  
demur tempore propriis in agris Mastichen col-  
ligunt, id totum absque dolo in commune sciunt.  
Mulctantur scilicet manu, qui Lentiscum Masti-  
chen fundentem, in proprio vel alieno agro ex-  
ciderint, tanta est Mastiches cura & reuerentia, a-  
pud Chios. Nec abs re quidem, cum illis tantum  
Mundus ferè vniuersus tam necessarium & salu-  
bre medicamentum acceptum ferat. Tradunt et-  
iam in Creta Lentiscum Mastichen fundere, sed  
flauam, amaram, & Chiâ longè deteriorem.

Idem Matth. certò se scire ait, Caphuram, Ma-  
stiche, ardenti aqua, Zedairaque ab impostori-  
bus adulterari. Plinium verò tum ipse tum Ama-  
tus reprehendit, quòd liquidarum generi Lenti-  
scinam adscribat, quæ est nostra Mastiche ceteris  
profecò durior. Sic & Dalech. Plin. u. l. 20. Ma-  
stichen resinis liquidis annumerasse scribit. Et alibi:  
E Lentisco inquit resinam liquidam fluere  
tradit Plinius, quod tamen vsus falsum esse mon-  
strat.

Hæc isti boni viti aduersus Plinium, non ad-  
uertentes quàm facili ab eorum reprehensione  
vindictam possit. Liquidis yuque accenseri po-  
test, quatenus effluit. Non enim nisi hæc specie  
promanare quit. Ex quo & posterior reprehensio  
exploditur, nam siquidem liquida effluit, & in  
terram decidens, vel ipso Matth. teste, concrefcit,  
non videtur falsitatis in eo accusandus Plinius.  
Immo nihil concrefcit, nisi quod liquidum est.  
At rem concretam ne Dalech. quidem negauerit.  
Statigitur in nota Plinii sententia. Si verò con-  
trariū vsus sciuit Dalech. cur non docuit? quam-  
uis hercle nondum rectè percipiamus, quid per  
suum vsus intelligat.

Idem Amatus in Hispania & Italia provenire  
quidem fatetur Mastichen, aded tamen in parua  
quantitate reperit, ut de ea colligenda homines  
nullam habeant curam, Sed ostio suo sati fecit.  
set, si docuisset, eademne cum Chia, an diuersa,  
& in quibus differat, aut conueniat. Annotat A-  
pollo Dioscor. scripsisse Mastichen propolis more  
ductilem esse. Nostram autem vix talem esse com-  
pertum existimus, & locum illum in Dioscor.  
nondum reperimus.

Mastiche pota sanguinis reiectioni & veteri  
tussi vtiliter adhibetur. Stomacho quoque est vti-  
lis, rusticumque mouet. Additur etiam in denti-  
ficia & faciei illitus: quippe quæ nitorem cuti  
concligit. Quin & pilos oculorum fluentes glu-  
tinat & cohibet: comanducta otis halitum  
commendat, gingiuasque contrahit, Diosc. Quod  
& Plin. confirmat ex parte, his verbis: Mastiche  
Lentisci repheandis palpebris, (oculorum pilis  
superne agglutinandis) & ad extendendam cu-  
tem in facie, & smegmata adhibetur, & sangui-  
nem reiciens, tussi veteri, & ad omnia quæ  
Hammoniæ vis. (Acaciæ vel hypocistidis Dio-  
scor.)

Galeno Mastiche candida & Chiâ consueto mo-  
dò cognominata quodammodo ex contrariis  
composita facultatibus est, astringente videlicet  
& emolliente. Proinde stomachi, ventris, intesti-  
norum, iecorisque in inflammationibus competit,  
ut puta secundo ordine exsiccans & desiccans.  
Nigra verò quæ Aegyptia cognominatur, tum

Bb

Modus  
colligendi

Mastiche  
Cretensis

Caphura  
adulterata

Plin. mor.

Matth. A.  
mat. &  
Gal. not.

Plin. de  
datur

Amat.

Vires & vi-  
sus  
Rustica  
Dentes  
Vires  
Pils Hal-  
tina  
Gingiva

Sang. spu-  
tum, Tussis

Tempera-  
mentum  
Nigra seu  
Aegyptia  
vires

Turniculi.

Oleum Mastiches.

Vulua.  
Stomachus.  
Scurvus.  
Celaena.  
Dysenteria.Anacardi  
cardus.

Duritias

Corn.

Ad dolores  
ventriculi  
repercutum.Ad alui pro-  
fluvium.

magis hac deficiat, tum minus astringit: quamobrem aptior est ad ea, quae validiorem digestionem per halitum exposcunt. Hac ratione furunculus bonum est remedium. Porro oleum vnguentumque ex Chia conficitur, non admodum lanè ex Aegyptia. Ceterum similis est & ipsum Mastiches facultatis. Paratur autem docente Diosco. è trita Mastiche. Contra omnia vulua mala efficax est, leniter calefaciens, astringens simul & emolliens. Est & vtile ad prominentes circa stomachum scirrhus, vt & ad Celiacorum Dysentericorumque cruciatus. Vitia quae sunt in facie emendat, colorumque meliorem praestat. Optimè verò in Chio insula componitur. Preparandi modus etiam apud Pauli, Aetium & Mesuen habetur, alter simplex, alter compositus. Prior: Mastiches vnc. iij. ol. sesamini sextario coquuntur in vase duplici. Alter. Mastiches vnc. iij. Vini albi boni vnciae iij, alii octo, ol. ros. lib. j. in vase duplici coquuntur ad vini consumptionem. Cerebrum nervos, iundururas, ventriculorum, hepar corroborat, tumores duros lenit, dolores sedat. Posterius hodiè ferè tantum est in usu, quia praestantius habetur priore, quicquid clamitet Matthiol. seplasiarios priorem obhitos conficiendi modum. Sciant tamen Pharmacopoei in duplici vase, hoc est, balneo calentis aquae confici debere, non aereo vase carbonum igni admoto, vt solent. Matthiol. oleum simplex, Syllius cum Paulo olei omphacinum sumè. dum potius existimat, quàm sesaminum: sed diuersa olea pro diuersis scopis sumi possunt: ac par est scopum Vniuersalem ei relinqui, ne iudicium iuniorum medicorum turbetur.

Matthiol. gloriatur se vitreis organis è purissimo tantum Mastiche illud saepius confecisse. In officinis cum oleo rosaceo fieri solet, ad consumptionem vini, ex praescripto Cordi, quem ferè hodie sequuntur. Fernel. loco vini, aq. ros. sumit, & ol. vel omphac. vel ros. Sic lienteriae & vomitioni magis fuerit accommodatum, quoniam magis astringendo roborat. At ex ol. ros. & vino antiquo ad partium lassitudinem & imbecillitatem fit Mesuae in fine Canonum. Dioscor. suum, quod simplicissimum est, ad duritias imponi praecipit, imbuto videlicet linteolo in ipso, atque ita imposito, verum duritiam prius calidè oleo fricari par sit. Sed vox ἀντιρροϊσμός ad ἀντιρροϊσμός (quamvis Marc. ἀντιρροϊσμός legat) à biguam lectionem fecit: vt putat Corn. Verum inquit, si ἀντιρροϊσμός legitur, & ad oleum refertur, integram & rectam sententiam exhibet. Quasi verò ἀντιρροϊσμός non aequè apertè ad ἀντιρροϊσμός reduci possit, sensu integro & congruo, vt nobis quidem videtur, & ex loco superius ex Dioscor. adducto, satis patere potest.

Ad omnem ventriculi dolorem, vt refert Matthiol. vomitum & nauseam magni faciunt hoc remedium Alfarabius & Mathaeus de gradi, &. Vitellum oui n°. j. mellis & spumati cochl. ij. Mastiches gr. xv. Contrita & commista, indantur teste magnae oui anserini, si haberi possit. & in calidis cineribus assentur. Ex hoc magmate si comedat eger, certò iuuabitur. Solent & Mastiches grana aliquot in aqua hordei decoqui, iis quibus interdum est vinum. Ad dolores ventriculi topicum: in puluerem redigitur Mastiche inspergendum linteolo aut alutæ, post calacta imposita ventriculo dolorem & vomitum compescit. Vel re. panem tostum, tere subtilissimè, cui admisce Mastiches drach. ij. Sacculo imposita, & calacta, ventriculo imponantur. Contra omne alui profluvium, praesertim verò hypercatharsim. Cingitur arduissimè, mox prunis iniecto puluere ex aquali-

bus partibus Mastiches & Thuris suffumigatio excipito: exemplo sistit. Egregium & probatum ad inueteratum coxendicis dolorem, &. Myrrhæ & Mastiches ana part. æqual. contrita coquantur in oleo Chamamelino, eo calido inungatur locus dolens. Emplastrum ad arthritidem à frigida causa. &. Masticha. Cymini, Puleg. Salu. Bacc. Lauri. Sabinae ana part. æqual. Subacta cum melle calida applicentur.

Addendum Coronidis vice de Mastiche, quod vt annotat Camer. ex liquida adhuc & lenta fiant vasa magna debiliorem ventriculum expetita, quæ infuso potui gratum saporem conciliant.

## NVCVLA EXOTICA PISTACII SPECIE-

## CAP. XXII.



Rara prorsus & exotica nunc sequuntur: nam ab initio huius libri dictum fuit de nucis vulgarissimae Iuglandis sc. & de peregrina nucis aromatica, Anellanis, Staphyloandro, Pistaciis, Terebintho & Lentisco. Fructus igitur exotici in maxima copia mox tradendi sequuntur, nucibus Anellanis, Pistachisque finales.

Sunt nobis peregrini fructus seu nucleae, quæ, si bene recordamur reperiantur interdum cum Anacardis & Aromaticis aliis, ad Pistacia suo clausa officulo accedentes, magnitudine & forma oblonga, nonnihil angulosa & conuexo in aequali putamen fragile, fuscum, rugosum & nucleum comprehendit solidum, coloris obsoleti, pingui, rancido [in nostris saltem vetustissimis] sapore praeditum, quem obuoluit tenerior quædam pellicula, coloris cinerici.

## NVCVLA PEREGRINA ALIA.

## CAP. XXIII.

Cul. in peregrinis lib. 2. c. 30. describit octauo loco, fructumque hunc peregrinum depingit, quem dicit Pinei alicuius se existimare, adeo nostras Pineæ nucleos referre, licet plerumque sint & longiores & craffiores: duro scilicet putamine eodemque colore. Huc refert libuit, quia de Nucum familia sunt, sed quarum planta, nondum innotuit. Huius icon est cum superiore.



## SEL SERAPIONIS, ET AVIC.

## CAP. XXIV.

**F**ructus *Sel*, quales Rauvvolf. vidisse scribit, carent duris putaminibus, planèque nudi sunt, magnitudine Pistaciorum, colore Iuglandibus nostris non dissimiles, sapore satis amaro cum manifesta acrimonia. Dedit sibi Minoritam quandam Hierosolymis, qui dicebat in vicinis locis provenire. Esse autem *Sel Serapionis* & *Avic.* De quo sic Serap. tradit. *Sel* Ilaaci Eben Amram, est Citonium Indum, fructus rotundus sicut Auellana, absque cortice. Virtutem habet Zingiberis, calefacit tertio, humectat primo ordine. Attenuat humores crassos, & induratis nervis confert. Mesibaho idem tradit. Rauvvolf. verò etiam *Sel* vocari citat.

CACAO AMERICÆ, SEV  
AVELLANA MEXICANA.

## CAP. XXV.

**C**acao Scaligero arbor est Castaneæ folio, fructu Amygdali, specie rubicundo tum cortice tum nucleo. Benzo sic describit: *Cacauate* vulgò Indi vocant, moneta illis vni præbet. Est arbor modicæ magnitudinis, nec nisi calido loco & opaco vivit. Simul ac Sole tacta est, contabescit: itaque ferè in sylvis umbrato & humido loco se-



ritur, neque id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editiorem plantant, quæ simul ac adolescere cœpit, eius cacumen ita concinnant aptantque vt adulta ea arbor *Cacauatem* inumbret defendatque ita ab æstu, vt Solis radii lædi non possit. Fructus Amygdalarum specimen referens, siliquis quibusdam, velut Cucurbitis includitur, crassitudine & latitudine Cucumeris: annuo spatio maturefcit. Maturas eas vbi legere volunt, excussum folliculis fructum super storeis expansum ad Solem exponunt, donec sudorem exsudaverit.

Clusio verò Amygdalo planè similis est hic fructus suo putamine exemptus, membrana tectus tenui, nigra, nucleo qui in binas aut ternas partes dividitur subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingrati gustus, quare non mirum est, si qui primum degulant à potione ex eo confecta abhorreant. Eam tamen claris hominibus propinant, vt nos aromatis vinum soleamus, referentibus iis qui pauculos fructus retulerunt.

Cacauate Benzoni. *Cacao* Scalig. Clus. Hist. Lugdun. Taber. de quo Guiland. Palmarum, inquit, Tom. I.

naturam obtinet Auellana Mexicana, cuius fructum indigenæ *Cacahu* appellant, quæ citra sociam sui generis arborem non fructuat.

Provenit in India Scal. Celebrem per vniuersam Americam multique vsus fructum Peruanæ Prouinciæ littorale gentes secum detulerunt Cacao. Clus.

Ex nucleo Cacao fiunt Sorbitiunculæ refrigerantes: eam ob causam aded expectat, vt cum eis quidvis vel pretio vel vsu carum facillè commutent. Hunc potum confectum (inquit Benzo) in testa sicili ad focum exsiccant: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, confusum & commolitur, fusumque in pateras (quæ cucurbitæ specie è certis arboribus per omnem Indiam enascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo Pipere quali vulgò vtuntur, condiunt, eoque in potu vtuntur. Porcorum ea vitiùs colluies, quàm hominum potio. Quum eam Prouinciæ peragrarem, plusquam integrum annum à tali lora abhorui: & cum pagum aliquem prætereuntem Indus fortè aliquis ad bibendum inuitaret, ego verò aspernarer, multum mirans ridensque abibat. Sed cum mihi vini copia non esset, ne semper aqua bibere cogerer, alios imitari didici. Ea Cælia sapore aliquid amaro satiat & refrigerat corpus, minime tamen inebriat. Hæc præcipua & clarissima merx earum regionum est: neque quidquam aliud Indi maiore in pretio habent, vbi quidem in vsu est.

## CACAO SIMILIS FRUCTVS.

**F**ructum, inquit Clusius in Exot. à Iac. Gareto accipiebam adiunctum Oregioellæ: Cacao fructum magnitudine penè æquabat, membrana fusca tectus, per medium secundum longitudinem diuisibilis, vt Amygdalæ, Auellanae, Glanides & similes non oblique, vt Cacao, eiusdem tamen cum illo saporis, & forsitan eius genus: gemellum similem, etiam cum illo accipiebam.

FRUCTVS BRASILIANORVM  
PERNITIOSVS.

## CAP. XXVI.



**I**acobus Garritus Clus. vt inuenti apparebit in Exoticis lib. 2. cap. 16. mittebat fructum, qui vnicalis erat longitudinis, non tam denso quàm lento cortice tectus, spadicem flavo coloris, nucleum continens cineraceo colore præditum, & tenui, nigerrimæque, & splendente membrana obvolutum, præterquam infima parte, quæ aut Bb 2

Descript.

candicans, ~~et~~ (deterfa membrana) nuda, quantum quidem mihi obferuare licebat, dimidiatum enim fructum cum integro nucleo duntaxat accipiebam, ita vt hic expreffus: guftare tamen nolebam, quia, qui mittebat adfcripferat, Brafilianos monuiffe illos, qui hunc fructum legabant, ne manducarent, quoniam perniciosus efferet.

CVRCAS AVELLANAE MAGNITVDINE.

CAP. XXVII.

**Defcriptio** **N**afcitur in Malauar, autore Garcia, fructus quidam magnitudine Auellanae, cum suo putamine, non tamen adeo rotundus eft, candidus, guftu quali funt Tubera cocta, dependet ex ramis cuiusdam plantae quae feritur: nullius, quod fciam, in medicis a vfus. Dicitur in Malauar Chiquilenga, id eft, exiguum Inhamae. In Cairo vbi frequens eft Curcas, (licet enim in quibusdam Malauar locis) in Cambaya Carpata. Quantum coniectura afequi poffum videtur Serap. huius meminiffe, vocafque Habelculcul corrupto vocabulo, cum Habelculcul dixiffe deberet, quod Curcas fignificat. (nifi nofipfi forte Curcas corrupte vocemus) Hab enim magnum fermen fonat: articulus eft genitiui. Scribit autem Serapio eius frequentem vfum, feminis quidem copiam facere, fed cholericam, quam vocant, paffionem excitare: quae omnia Malauares huic fructui tribuunt. Eius meminit Rhafes de re med. lib. 3. cap. 20. vocatque Kikil, fed forfitan corrupte. Cluf. tamea annotat, videri Serapionem eo loco non Curcas intelligere, fed fuum potius Secacul: Se praeterea ingenue profiteri, quod ignoret, quid fit exiguum Inhamae, nifi fit Trafi, quod Hispani Lunica Auellunada appellant. Sed nobis Clufi fufpicio non placet, vt dicemus cap. de Trafi, lib. 3.

**Synonyma**  
Chiquilenga.  
Inhamae.

**Habelculcul**  
Serap.

**Vfus**  
Sperma  
auget.  
Cholera.

**Kikil.**

**Secacul.**

PETITA PERVANVS: ALIVS QVE  
SIMILIS FRVCTVS.

CAP. XXVIII.

**Defcriptio** **I**n fructu hoc quaedam eft varietas: nam alter altero maior & amplior eft, licet color & forma propemodum eadem. Planus eft & oblongifculus, altera parte latior, altera anguftior, glaber & lauis, totus fufci aut interdum fpadicei coloris, nifi linea quaedam candicans, qua parte suo fructui adhuc fit (nam alteri in clufus fuisse videtur) varium faceret, pregnans eft, & fomitum edit. Cluf.

**Alter fimilis.**

Huic fimilem fi non eundem habemus ex liberalitate Illuftriffimae Duciffae Wirtembergicae: qui magnitudine Amygdali, lubrica leuitate fplendicat, colore ex pullo flauefcente obfoleto: cortice mediocriter duro. Supernè latior, infernè anguftior, alteram faciem compreffam habet, veluti veltigium ex appreffu alterius: parte oppofita tumidior. Laterorfum hilo infignitur longo, profundo, candicante. Non piftum damus, quod Cluf. ad piftæ figuræ fatis bene expriment. Habet praeterea hic fructus affinitatem cum fructu Amygdaloyde nitido peregrino fequenti. Color & magnitudo ferè eadem, ficut & lauis. Figura tantum euariat. Tres à D. Paludano acce-

**Amygdaloides piftæ.**

pimus, forma & colore huic fimiles, nifi quod vnus ex illis vtrinque puluinatus: hylus quoque non albus vrin prædicto. Nucleus qui intus eft Pineo nucleo minor, obfoletus & rancidus.

FRVCTVS AMYGDALOIDES  
NITIDVS PEREGRINVS,

CAP. XXIX.

**L**auis & lubricus eft fuperficie, nuclei Amygdalini magnitudine & forma, nifi quod vna parte paulò eft acutior, obtusà Amygdali parte, infraque mucronem alterum lacuna orbicularis infculpta, non tamen effatu digna altitudinis: fortè hinc prodibat germen. Color eft ex flauo ferè cinereus: & altera quidem parte magis in arcum curuatur Damafcenii Pruni nuclei modo: corticèque tegitur tenui, fragili nucleum in fe continens. Vnde acceperimus non occurrir.

FRVCTVS PERVANVS AMYGDALOIDES, SVB TERRA NASCENS.

CAP. XXX.

**M**iffus eft (inquit Monar.) ex Peru fructus sub terra natus, pulcher admodum afpectu, & grati faporis, qui & radice caret, neque aliquam plantam profert, aut ab illa planta producit, fed folummodo sub terra enafcitur, quemadmodum tubera: Dimidii digiti magnitudinem aequat, rotundus eft & contortus, & affabrè elaboratus, coloris fpadicei, nucleum intus continens, refonantem dum ficcus eft, Amygdalæ fimilem, cortice fulco, intus album, & in duas partes diuifum, vt Amygdala, grati faporis, & Auellanam guftu referentem. Multae nos rationes mouerunt, vt ad Noces referremus.

Inuenitur apud flumen Maramnon, nec vifpi alibi per vniuerfam Indiam. Editur recens & exiccatus, fed torrefci præfuit. Adponitur fecundis menfis bellariorum loco, quoniam ventriculum admodum exficcat & roborat. Sed fi liberalius edatur capitis grauedinem generat. Eum admodum eftimant cum Indi tum Hispani, nec immeritò, quoniam eos, quos ad fe miffos tradidit Monardes grati faporis effe deprehendit, cui & temperatus effe videtur.

MANOBI LERII.

CAP. XXXI.

**F**ructum quendam Sylueftribus Manobi appellatum, ait, Lerijs Amer. Hift. sub terra Tuborum modò nafci, terribus filamentis fimul cohaerere, nucleum non effe maiorem domestica Auellana, eiusdemque faporis, cinerei coloris, cortice non duriore, quam Piforum filiquae: an verò folia, femine proferat ignorare fe fatetur, licet frequenter fructum ederet. Cluf. Lerium interpretatus, vertit aliter quàm nos: Fructum nucleum continere, ac Manobi fibi videri idem cum fructu Amygdaloide. Nos dubitamus an Monardes bene defcripferit fuum fructum, qui nobis videtur potius arboreus: fortè Manobi vix Trafi genus aliquod. Trafi autem funt veluti fructus & nucleus Auellanarum.

AMYG.





Matthiol. & prædicos sibi non constare, nec his cum eo consentire, qui eius opera illustrant.

### AVELLANA INDICA MAIOR

SVBRVFA CLVS.

Descriptio



**A**vellana vero Indica hic proposita ex Clus. annot. in Garc. lib. 1. c. 26. pollicari longitudine, duorum vero digitorum crassitie, inferiore parte sessili, rugosa scabie & cinerea: superna autem, & eminentiore parte leui, subrufiq; coloris, ita ut avinimaculum duro corio contentum videatur: pragnans est, & aliam continet. Huic ferè simile

genus inuenitur minus, nigricansq; colore quod à Matthiol. exhibetur inter Indicas Auellanas. Hic etiam pro Auellana Indica. Clus. altera exhibet Hist. Lugd.

Anno 1606. Gener rediens ex Anglia & Belgio detulit, fortè munere Jac. Gareti, fructum planè eà magnitudine & figura, quàm est icon nostra ex Clusio, ei tamen optimè respondet descriptio, cui hoc addimus, corticem esse fragilem, instar ferè testæ onorum, minus tamen cum sit spissior, continet nucleum magnum, testum tenui membrana, cinerea, in qua saporem insignem non animaduertimus: Nucleus autem magnus, rugosus, firmus, Amygd. modo, sapore non ingrato. Cum hac Auellana Lectorum oculis inspicenda quoque proponimus iconem Fructus peregrini ovalis, Indico lapidi magnitudini paris, itemque alterius nucem ponticam non excedentis.

### NUX SIVE OSSICVLVM CYPOTIS

TE SIMILE NVCI BALSAMI PERUVIANI.

Descriptio

**S**cribit Clus. Exot. lib. 2. cap. 18. Accipiebam Hispali anno 1596. à Doctiss. viro Simone de Touar, fructum, cui nomen adscriptum erat, Nux siue Ossiculum Cypote. Non autem erat valdè ab similis illi, qui mihi aliquando missus pro fructu eius arboris, quæ liquorem illum Balsami appellatione donatum, in insula Hayti siue Hispaniola profert: sed minor, nec spadiciei, vtille, coloris, verè fuscior, & præ liuore splendens: ventre siue inferna parte: cineracei coloris, non leui, vt superna, sed scabra: quem pictor valde negligenter expressit. Alio fructu haud dubiè inclusus fuerat, nam ossiculum duntaxat erat alterius fructus: qualis autem fuerit arbor quæ fructum protulit, aut quâ in provincia naxa, nihil erat adscriptum: tamen autem nucleum continere hanc nucem certum esset, agitata tamen nullum strepitum edebat, nec aqua merla subsidebat.

### BALSAMI PERUVIANI FRVCTVS CLVS.



**A**t quos hic exhibemus Clus. lib. 2. de peregr. & Exot. c. 29. similes ait fructu Auellanae Indicae maiori (de qua modò antè) ternas autem vncias longitudine superant, crassitie vnam, altitudine duas ferè equant, alioquin forma & colore illi auellanae planè similes: nêpe crasso cortice seu putamine constantes, inferiore parte &c: vt in præcedenti. Pragnans & hic est, & nucleum intus continet duas vncias longum, vnam latum, geminum, extrema parte simul coherentem, tenui cineraceque membrana testum, materie firma vt Amygdalæ aut Castanea recentis, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore satis iucundo prædita, & gustu non ingrato. Eum accepit Lusitanus

quidam mercator Petrus de Frias nuncupatus à prouincia Peru Prorege, pro fructu illius arboris in nouo orbe nascens, ex qua balsamum elicitur, cum ipso Balsami oleo. Verùm si D. Monardes descriptioui credendum, longè minor est Balsami fructus. Consultè in eam cap. 3. ipsius histor. simpl. ex nouo orbe, quem Latinum fecimus. Hic Clus. Hist. Lugd. eandem iconem habet nomine fructus Balsami.

### AVELLANA INDICA PRO BALSAMI

FRVCTV MISSA, EIVSQVE SPECIES ALIA MINOR.

**H**anc primò depictam à superioribus, si non pro specie, at figura diuersam, Hercules Saxonia ad nos cum aliis aliquot munificæ naturæ Indicarum monumentis, adiecitque etiam iconibus ad viuum, nobis dono misit sub hoc titulo: Fructus Balsami Petri de Frias minor. Magnitudinè eicon ostendit, digitum ferè æquat, & si competentè haberet crassitudinem atque rotunditatem, galeam quodammodo repræsentaret. Testa constat leui, splendida, ex rufso ad spadicem vergente, crassa fatig





fatis, substantia  
olsea. Nucleus  
intus later A-  
mygdalini facie  
sed lator, in cæ-  
teris propor-  
tioni nucamen-  
ti respondens:  
sapore rancido,  
quippe exole-  
to, quem Num.  
II. exprimit. Nū  
in, III. Prædicto  
multo minor  
concolor, figu-  
ra nonnihil va-  
riat: potissimū  
hyli illud vesti-  
gium, quā in  
fibus nostris  
vulgatis non la-  
tius, nec ut in

prædicto eminet. Testa tenuior multo, nucleum  
quoque paruum, sibi que proportionatū continet.

#### BALSAMI PERUVIANI FRUCTUS METÆ FORMA.

**F**RUCTUS Exoticus concessus à Paludano, in-  
quit Clus. Exot. lib. 2. c. 20. in aquam coniectus,  
non mergebatur. licet satis grauis, & nucleum  
contineret, vt ex strepitu quem agitatus edebat,  
coniecturam faciebam, vnicalem superabat ma-  
gnitudinem, nec formam quodammodo refe-  
rens, hoc est ab amplā basi sensim gracilior assur-  
gens, cineracei fortē coloris. Paludano ad le-  
missum scribebat pro fructu Balsami Peruviani: al-  
terius tamen erat formæ, & valdē ab eo differe-  
ns quem eo nomine ante multos annos acci-  
piebam, (Lector eius iconem inueniet in prima  
tabella cap. xxviii huius libri) vt ex vniūque  
collatione cuiuslibet manifestum esse poterit. Si  
porro vterque conferatur cum fructu à Nicolao  
Monardes Balsamo Peruviano attributo neuter  
conueniet.

#### BALSAMVM EX PERV.

##### CAP. XXXIII.

**B**alsamum Peruvianum quod antē aliquot an-  
nos ab illustribus Principibus D. Dorothea Du-  
cissa Lotharingæ, vidua illustris Ducis Brufuic.  
&c. (eū ei in graui morbo à consiliis essemus)  
Nucula Indica Qui vix maiori reconditum, gra-  
tioso & liberali dono accepimus, liquor est pon-  
derosus, mellæ consistentiæ, densus, lentoris  
resinacei: color ex ruffo ad nigrum vergens odor  
fragrantissimus, Styracis, ad Benzoini suauitatem  
nonnihil accedens, & qui sua fragrantia totum ad-  
dedit conclatē perfundat, diūque perseveret. Sapo-  
r subactis, linguam mordicans. Dentibus attri-  
tus lentus, nec illico separabilis adhærescit. Flamma  
facillimē concipit igni admotus, suauiterq;  
olentem similiter fumum spargit. Aquæ iniectus  
mox fundum petit, in qua existens, si vel statim  
digitis atteratur, albescit: nec idē lentorem de-  
ponit, sed instar resinæ digitis etiam magis, quā  
dentibus adhæret.

Lectores considerent idēne sit cum nostro  
hoc quod describit Monardes his verbis: Balsa-  
mum nouæ Indiæ, Xilo, liquor est, qui ex nouæ  
Hispaniæ lictoribus præstantissimus ad nos impor-  
tatur, & Balsami nomen obtinuit ob insignes &

Tom. I.

admirabiles eius virtutes huic cum Egypti vero  
Balsamo communes. Prouenit ex arbore, Granato  
maiore, foliis donata vertice, dissectis, tenuibus.

Fit autem duobus modis. Primus: Fisso incisur-  
is cortice liquor exstillat tenax subalbidus. Al-  
ter, Indis vitatus. Dissectum truncum & ramos  
in minutissimā frustula, in capacissimum Lebe-  
tem aqua plenum coniciunt & bullire sinunt,  
quod satis sit. Quā refrigeratū oleum superna-  
rans conchis colligunt; quod pro Balsamo ad  
nos inuehitur, & quo illic communiter vtuntur.  
Colore est pullo, ex ruffo scilicet ad fuscum ver-  
gente, odoris suauissimi. Neque verò aliter ac-  
seruatur, quā in vase argenteo, stannæo, vitreo  
aut vitreato, propter insignem penetrandi vim.

Idem parte secunda ait: Qui per incisionem  
exstillat, ad nos non adfertur. Multo enim labore  
colligitur. Iam verò nauibus quibusdam à con-  
tinenti Americæ & noui orbis solventibus ma-  
gna copia Balsami incisurā extracti ad nos inferti  
cæpit. Illud autem ex arboribus quibusdam elici-  
tur, arboribus eius Balsami, quod per deco-  
ctionem paratur, similibus. Hæ sunt magnitu-  
dinis procera, à quibus ad radices rami plurimi  
extenduntur, duplici cortice tecti, exteriori cras-  
so, Quercuum cortici simili, tenui altero, quin-  
terior ligno proximus adhæret. Ac intra hos duos  
cortices Balsami liquor collectus per vulnus ex-  
stillat, albus, pellucidus, odoratissimus. Huius  
Balsami, vel sola guttula toti amphoræ præceden-  
tis præfertur, quod vsus eius cuius manifestum  
faciet. Et certò mihi persuadeo, huncce Balsa-  
mum Aegyptio illo vero, quo iam à tot seculis  
caremus, præstantia & viribus neutiquam esse in-  
feriorem, ita vt illum etiam illo multo pretiosio-  
rem existimem. Est verò mihi illius fructus, exi-  
guus quidem pro arboris magnitudine, cicutif-  
que grano vix maior, gustu amaricante, in filique  
summo latitans, quæ digitum lata, compressa, al-  
ba atque tenuis est. Eo fructu vtuntur Indi in  
suffumigiis ad capitis dolores atque fluxiones tol-  
lendas. Idem Monardes proponit iconem pro  
Balsami fructu. An verò respondeat eius descri-  
ptioni, iudicent qui viderunt aut videbunt. Clu-  
sius sanē eam omittit. Consideret Lector, quan-  
tū differat ea icon à Balsami fructu Clusii, de  
quo nos antē.

Amatus, Opobalsamum (inquit) quod è Pe-  
ru regione noua adfertur, purum & sincerum es-  
se crediderim, cum tantæ sit fragrantia & odo-  
ris, vt omnes alios præstantissimos odores an-  
tecèllat: quod, vt tradunt qui arborem illuc vi-  
derunt ex arbore Pinu persimili non adeo ta-  
men procera colligitur, gustu pingue, acutum,  
diu in ore saporem retinens, odoris ad Belzui-  
num tendentis, colore & substantia aquæ mel-  
lis insipissatæ. Manifestum non esse eiusdem spe-  
ciei cum Iudaico aut Aegyptio: quanquam Tro-  
gus Pompeius arbores Opobalsami, quæ in Iu-  
dæa nascebantur, Pineis similes fecit, ita vt has  
arbusculas Peru delineasse visus sit.

Matth. liquorem, qui ex Occidentalibus In-  
diis odoratissimus adfertur, liquido Styracis ad-  
modum similem dicit, quem qui deferunt, in-  
quit, Balsamum vocant. Verum tamen cum, teste  
Strabone, Balsami lachryma lacteo colore sit,  
crediderim potius nouum liquorem hunc, ve-  
ram Staëtem vel Styracis liquorem, quā Bal-  
sami: ob idque non esse penitus ab re si quispiam  
eo Balsami loco vteretur.

At Lacuna audentius, Balsamum scribit, ex no-  
ua Hispania non verum est Balsamum, sed oleum

Bb 4

Arbor Bal-  
sami Syrica  
folio  
Quomodo  
fiat

Afferunt  
ratio

Arbores  
Balsami,  
quales

Fructus  
exiguus  
Styracis  
Vni frug-  
tus

Amatus

Odoris fra-  
grantia

Arbor Pi-  
nae similis

Differt à  
Iudaico  
Dasyne  
Trogus Pom-  
peij Balsa-  
mum  
Matis.

Strabon

Lacuna  
Styracis  
oleum

*Syracis purissimum. Et alibi: Balsamum odorifertum quod adfertur ex noua Hispania est Dioscor. Syracinum oleum.*

*Scaliger. Quædam.* Consulamus scientissimum Scaligerum. Is ad Cardanum sic scribit. Quæ de Goacomax pingis arbore, unde oleum fiat Indicum, Balsamum ab Hispanis appellatum: cur eius facies non persuasit tibi, ut Iudaicæ Balsamo congenerem iudicares: Siquidem ut Balsamum Theophrast. ita tu hanc Punicæ similem agnoscebas. Est apud nos liquor is inter alia Indiæ monumenta. Balsami vires multas æmulatur. Non omnes expertus sum. Tantum in aquam stillatum non diffunditur, sed neque lac cogit, neque fundum petit.

*Celt. Flor.* Collegium Florentinum quoque & Borgarucus testantur pro Balsamiliquore Balsamum ex India aduehi.

*Alpinus.* Prosper Alpinus in suo Dialogo de Balsamo, Balsami Occidentalis Indiæ, Amati & Monardis meminit. Idem, Balsamum, inquit, nunquam ab aliquo nostrorum vel Arabum visum est neque auditum: nisi forte produceretur nouissimè ab Occidentalibus Indiis delatum, à quibusdam pro legiimo Opobalsamo receptum, quod falsum esse planè constat.

*Opobalsamum falsum. Bn. J. nouum adulterium.* M. Fumei in hist. gen. Indiæ scribit: In Insula S. Dominici Balsamum adulterinum provenire ex arbore Geaconax, nec esse eiusdem bonitatis cum Aegypto vel Iudaico. Ad flumen Maragnon incolas coquere panem cum Balsamo, aut saltem cum liquore ei simili.

*Goropius.* Goropius: quid dicam, ait, de arbore ex Atlantico orbe, quæ liquorem illum suppeditat nobilissimum, quem ob odorem, suauitatem, & maximas recentium vulnerum curandorum vires, Balsamum vocamus? Eius, duo genera sunt, alter cortice inciso limpidissimus distillat, haud secus atque oleum Abiegnum: alter excoquitur & iccirco spissior est.

*Cæsalp. nouum genus Balsami ex India Occid.* ex russo ad nigredinem vergens: arbori folia Vriticæ: Indi appellant Xylon: decoquant ramos & colligunt oleum: Lachrymam etiam excipiunt: sicutus Ciceris modo inclusus &c.

*Balsamum Peruanum compactum, quod immixtum in aqua subsidet, Lob. qui & alibi Peruanum illud officin.* Opobalsamum vocans, minime sincerum vti plurimum esse putat.

*Balsamum Indicum seu Occid. Hist. Lugd. Monard. fructum Balsami dicit: Linnæus, fructus de Balsam.*

*Eius usus, autore Monar. in Medicina tantum celebris, & ab eo ipso ferè tempore, quo innotuit Indiis, Hispani quoque Indorum exemplo eo vulnera perlanantur.* Tum primum tanto erat in pretio, ut uncia vna decem aut etiam viginti ducatis venderetur. Hodie verò libra vna non pluris tribus aut quatuor emitur. Romam primum delati uncia centum ducatis fuit diuendita. Nunc tam copiosè eo delata, haud ita magni æstimatur, ut etiam amici hoc se mutuo darent dono: Ad eorum abundantia homines in sui rapit despectu. Nam quod rarum in principio frequentissimo fuit in usu, illud vulgatum nunc meliorique emptum pretio ferè contemnitur, iuxta illud:

*Omne rarum carum, vile sit quod diuina.*

*Portò triplex eius usus medicus. Aut enim per os introsum assumitur, aut foris applicatur, aut Chirurgicis remediis permiscetur. Sumptum manè à ieiunio Asthmaticis utile est, & vesicæ labes & vlcera abstergit. Menses ciet sumptum, & pessi modo subditum. Dolores Ventriculi inueteratos le-*

*nit linctu matutino repetito, eumque roborat. Hepatis vitia corrigit: pectus alleuiat infarctum: iuuentutem conseruat. Illustris mihi notus heros, qui ex huius usu frequenti ætatis vigorem iuuenilem cunctis representabat, absque vlla corporis molestia. Phthisicis plurimè profuit. Fœminæ steriles, pessi vice feliciter admiſerunt. Omnes frigidus & flatulentos dolores apprime demulcet litu calido aut imposito linteo eo imbuto. Resoluit enim, discutit, & apostemata antiqua & frigida absumit. Membra roborat impositum. Cerebrum confortat mirabiliter, dolorèque lenit à qualicunque causa obortum. Paralytin tollit, si caput, ceruix & spina parsque ipsa resoluta eo illinatur. Omnibus patiter neruorum imbecillitatibus & Spasms medetur. Ventrículo illitum, aut panno calido inductum concoctionem adiuuat, & robur ei addit: flatus dissipat: oppilationes eius Lienisque remouit atque aperit: Intestinorum cruciatus abigit, calidè insulsum: Vinam prouocat illitum: doloribus iuncturarum mirè confert, in quibus, atque adeò Ischiatis primas tenet. Durities & apostemata resoluit. In neruorum passionibus nulli secundum. Destillationes quasvis absumit ac sistit.*

*Sit & in Chirurgia varios habet usus, tum per se, tum aliis medicinis admixtum, quæ omnia particulatim exponere longum foret. Quicque perito artifice debitus miscendi vtendi; modus reliquus esto. Vulnera quævis, etiam capitis, ubi cranium non fractum fuerit, contusiones item & sugillata persarat. Sed vulnera etiam recentia sine suppuratore glutinat.*

*Eius usus apud Venetos ad plagas celeberrimus est, & vel intra triduum vulnera restituit: omnia præstat, quæ ad vulneris glutinationem requiruntur, ut non temerè egenorum thesaurum quis dixerit. Neruorum iuncturarumque, omnia denique tam recentia quàm antiqua vulnera vel per se, vel aliis permixtum, mirum quantà felicitate perlanet. In febribus chronicis spina eo calente inuncta paulò ante paroxysmum, superhaussitque statim vini aliquot guttis horrores abigit & anteuertit discutiendo. Sed repetito usus opus est.*

*Cæsalpinus tradit, Balsamo ex India Occid. delato magnas vires tribui, præcipuè vulneribus glutinandis, & cæteris ad quæ Opobalsamum Aegyptium laudatur. Idem ad superscriptos affectus omnes deprædicat, si quatuor aut quinque guttæ vino vel aqua modica vel intra quince intromitantur sensim deglutendo, ita tamen ne linguam attingat, ut vel gustum deprauet vel eadem pertinacius adhareat.*

#### BALSAMVM DE TOLV.

*Arbores è quibus colligitur Balsamum de Tolu, inquit Monardes, pumilis Pinis sunt similes, multos ramos, quæquauersum spargentes, foliaque Ceratæ similia obtinentes, perpetuè virentia.*

*Præferuntur domesticæ & in cultis nata. Colligunt verò hunc liquorem Indi vulnerato & inciso arborum cortice, qui tenuis & tenellus est, suppositique & arbori adnexis veluti quibusdam cochlearibus è Cera nigra, in illis regionibus nata confectis, quæ emanantem è vulnere liquorem excipiant, quem deinde in alia vascula ad eam rem parata effundunt. Id verò seruenissimum fieri solè necesse est, ut liquor facilius emanet:*

*nam*



nam noctu ob frigiditatem nihil effluit. Erumpit etiam interdum ex ipsis arboris nodis & aliis nonnullis liquoris, qui cum exiguis sit, & in folium decidat, perit.

Balsamum verò hoc colore est rubro ad aureum tendente, medix inter liquidum & densum consistentie, glutinosus admodum, & ubicunque reponatur firmiter inhaerens: sapore dulci & grato, nec si fumatur nauseam mouente, quemadmodum reliqua Balsama, odore excellentissimo & limonum fragrantiam quodammodo referente, sic ut ubicunque reponatur, abscondi non possit, sed suo odore locum gratiorem reddat, ac etiam paucillum in vola manus attritum, suauissimum spirat odorem, ut lasini ferè.

(Lusi. quoque tradit nunc recens aduehi ex continenti quadam Prouincia inter Carthagenam & Nomen Dei sita; *Tolu* ab Indis appellata: ideòque Hist. Lugdun. Balsamum Toleitanum vocat.

Monardes paucillo simili Balsamo à Morgano sub suum è Londino discessum donatum se testatur.

Balsamus hic liquor, ut idem refert apud Indos maximè celebris est, ob insignes eius facultates, à quibus edocti deinde Hispani, cum miros eius effectus animaduertissent, pro re maxime pretii inde in Hispaniam detulerunt, magno illum istic remedium, nec abs re, quandoquidem præstantius esse maioribusque facultatibus polleere videtur, eo qui è noua Hispania aduehitur. Eius facultates insignes sunt, quoniam incisione elicitur, quemadmodum olim Balsamum in Aegypto: ad eadem omnia, ad quæ illud celebratur, efficitur. Omnia recentia vulnera curat, consolidat, glutinatque labra, nec materiam purulentam in eis exoriri sinit: quòdque maius est, nullum cicatricis vestigium curatis vulneribus relinquit, si eorum labra probè iuncta fuerint.

Quapropter in faciei vulneribus singularis est. Primum autem emundandum est vulnus, ab omni spurcie, & vino eluendum: deinde eius labra probè vnienda, Balsamumque subtepidum illinendum, & lineus pannus duplicatus eodem Balsamo intinctum superimponendus, atque ita colligendus, ut labra hære nequeant. Postmodum vitæ ratio sit tenuis, seorsumque vena si accessit sit, quarto demùm die soluiat ligatura (nisi symptoma aliquod antè soluere cogat) & vulnus consolidatum inuenietur. Quod si singulis diebus vulnus curare necesse sit, lineum pannum Balsami intinctum liquori subinde adponendo glutinabitur. Etenim eius facultas est prohibere, ne materia in vulnere generetur. Præsertim verò vtile est in vulneribus in quibus confracta sint ossa, exemptis prius iis, quæ separata sint fragmentis, & reliquis intactis, quoniam Balsami facultas ea expellet, vulnusque sensim consolidabit.

Miræ etiam virtutis est in articularum vulneribus & neruorum sectionibus, omnibusque puncturis: etenim ea curat & à contractione liberat, ne partes inutiles fiant, & motu priuentur.

Altè penetrantia & cuniculosa vulnera curantur huius Balsami albo vino mixti per Syringam iniectione, & post ternas deinde horas eius educatione. Idem fit in vulneribus punctim inflatis, semel in die mediocriter calidum iniiciendo. Vtile præterea est in contusionibus, reliquisque Chirurgi operam requirentibus, modò nulla inflammatio adsit: Eà verò conuenienter

bus medicamentis sublata, Balsami est usus. In morbis in quibus Chirurgi opera non est necessaria, plurimum profunt haustæ eius aliquot ex albo vino guttæ, veluti in asthma.

Temporibus adpositum, omnem defluxionem, in oculos præsertim, cohibet, eorū aquas dolores leuat: præcalidum cerebro impositum dolorem tollit, roborat, & Paralyti remedio est. Vbi sunt & nonnulli Phthysici, manè aliquot guttæ manu lambendo, magnūque senserunt commodum, quoniam pectus egregiè expurgat. Aliquot eius guttæ ex aqua vitæ calida initio rigoris in quartanis aut tertianis diuturnis & importunis sumptæ, viles sunt: sed etiam ante frigus eodem Balsamo feruenti oleo rutaceo permixto ceruices inungendæ. Si quis ab orificio ventriculi ad umbilicum vsque inungatur, ventriculus roboratur, & dolore liberatur, languens cibi appetentia excitatur, concoctio iuuatur, flatūs discutuntur. At longè maiore efficacia istud molitur, si æquales Balsami & olei Nardini compositi vel simplicis partes misceantur: facilius etiam illinitur. Longæ experientia apud Indos probatum est, eos qui Hydropticorum in more inuident, si hoc Balsamo æquis partibus cum vnguento aperitiuo mixto ventrem illinant, Lienis regionem præsertim, magnum leuamen sentire: quoslibet tumores & oedemata cuiuscunque partis corporis resoluit: omnes dolores à frigida causa promanantes, etiam diuturnos, tollit, emplastri modo applicatum, & continuè delatum donec spontè decidat. Eosdem effectus præbet calidè adpositum, lineòque panno, qui aqua vitæ selesissima & calefacta madeat, superimposito, ubi sunt flatūs, siue in ventre, siue in alia corporis parte. Magnæ est etiam efficaciz in Nephritico dolore, si feruens cum aliis oleis ad eum morbum vilius mixtura illinatur: contractorum neruorum dolorem lenit, & si per summos æstus illo illinantur & fricentur, eos relaxat. Parontides seu Scrophulas cecæ & apertæ curat. Alias præterea multas facultates obtinet hic mirabilis liquor, quæ me latere, sed quas intelligere potui, vniuerso orbi notas facio, ut adeò præclaro medicamento, & tam insignibus viribus prædito (quibusque longè plures & maiores tempus deteger) quilibet vi queat.

# BALSAMVM NOVVM FRVCTV RACEMOSO.



Avtor generalis historiae Indiarum narrat in India & Hispaniola insula plantam quādam spontè nasci, arboris magnitudine, vtpote quæ ad duorum hominum proceritatem interdum assurgat; caulibus cæreis, foliis viridibus, superiore parte magis quàm inferiore, grandibus & amplius, costa crassiore & elatiore per

Descriptio

*Fruſtus.* per medium diuiſis ſoliorum pediculis non virē-  
tibus, ſed rubefcentibus. Fruſtus eſt racemoſus,  
longus, inſtar manus digitate, acini eius rari, viren-  
tes, quandoque rubefcentes, & qui matureſcen-  
do magis ac magis rubefcunt. Succum ex eo hoc  
modo extrahunt. Cyrras & aſparagos teneros huius  
plantæ colligunt, alii racemos addunt, & ex  
his ſuccum exprimunt, quem in aqua coquunt ad  
dimidias: deinde magis ac magis ad ſapē aut mel-  
lis craſſitudinem. Reſidere ſiunt, & ad uſum re-  
ponunt. Eius ſolium hic ad vium eſt expreſſum,  
vtrouque extremo acuminatum, ſex digitos longū,  
latum quatuor cum dimidio.

*Folii de-  
ſcriptio.* Reperitur in multis locis Inſulæ Hiſpaniolæ.  
Vlceribus & Vulneribus admoūet: ſanguinem  
enim reſpimit: terget & mirificē eis medetur,  
etiam vero Baſſamo efficacius. Ex eius ſummitati-  
bus deſtillatur aqua, præſtantior aqua vitæ, vul-  
neribus vtiliſſima, & morbis omnibus qui à fri-  
gore ortum habent, vti doloꝝ ventriculi aut par-  
tis alterius, ſi diebus aliquot bibatur. Reſert Hiſt.  
Lugd.


De hoc Baſſamo Poſthius Electoris Pal. Medi-  
cus doctiſſimus ſic cecinit.

*Hæc fertur ex Hiſpania  
Noua nouum, ecce Baſſamum,  
Aegypto haud minus potens.  
Odoꝝ nam ſuauiſſimo.  
Nares caputque recreat,  
Morbiſque prodeſt frigidiſ  
Infirma firmans viſcera.  
Idem doloꝝ corporis  
Totius illitum leuat:  
Vnguento & omni fortius  
Cruenta ſanat vulnera.  
Miram ō Dei potentiam!*

### BALSAMVM VERVM, XYLOBALSAMVM, CARPOBALSAMVM, OPO- baſſamum.

#### CAP. XXXVI.

*Ordinis ra-  
tio.*



vel adulterari, vel eidem ſubſtitui, aliāque quæ  
ſuadere poterant, hoc poſſiſſimum loco de eo  
tradendum.

*Xylobal-  
ſamum.* Porro vt à nobis notis exordiamur, exoleti illi  
ramuli, qui Xylobaſſami nomine in Offic. vendi-  
tūtur, nec ſaporem nec odorem vllum euidentem

ſenſibus ingerere ſolent, contorti, digitali craſſi-  
tie, duplici cortice inteſti, exteriore tenuiori, ru-  
goſo, cinereo, aut ex cinereo ruſſefcente, interio-  
re craſſiore, ſuſco, textura ſatis compacta: nodoli  
ſunt admodum & multis tenuibus ramulis bra-  
chiati.

Carpoſbaſſami nomine in Offic. habentur ſemi-  
na Terebinthi acinorum oblonga forma & ma-  
gnitudine, pediculo breui donata, cortice ru-  
goſo, ſuſco, quatuor coſtis in totidem quadrantes  
diſtinſta, cui ſubeſt tenerum putamen album, ſæ-  
pè caſſium, interduꝝ nucleo pingui dulci, niſi ve-  
tuſtate nimia ranceſcat, grauidum: alioqui ſapor  
eſſetis, cuiuſmodi in officinis aſſeruari ſolent gra-  
na, nullus: nullus odor.

In ipſius vero arbuſculæ deſcriptione, mirum  
quā inter ſe variant autores, vt patebit in pro-  
greſſu. De namque tam pretioſa, tam rara, ſed tam  
principibus atque magnatibus omni tempore ex-  
pectata aliquid ſolidi medicum & Bontanicum ſciſ-  
ſe par eſt. Operæ pretium igitur facturi ſi autorū  
tam priſcorum quā recentiorum, & ipſer hos il-  
lorum poſſiſſimum qui Aegyptum peragantur,  
eiuſque ſolum natale viderunt obſeruata in me-  
dium producamus, exorſi à Theophr. Bora-  
nicorum vetuſtiſſimo.

Baſſamum, inquit ille, in valle Syriæ gignitur, Loc-  
in duobus tantū, vt ferunt, hortis, quorum alter  
viginti ingerum eſt, alter multo minor. Ar-  
boris magnitudo, quæ magna malo Punice, ra-  
mis valde multis, folio Rutæ ſimili, ſed ſubcandi-  
diore, perpetuū virente. Fruſtus ſimilis eſt Tere-  
bintho, magnitudine, figura & colore, valde odo-  
ratus, ipſæque adeo lachryma odoratori. Hanc ex  
incitura colligi tradunt in caudicem facta vngu-  
bus ferreis circa ſuprema, ſub ſydere, aſtu ſeruen-  
te. Colligi æſtate tota perhibent nonnulli, verū  
haud multum eſſe quod effluit, nec magis vna  
conchā plenā in diem colligi. Sed odor ſuaui-  
tate eximia & diſſuſa præſtare, adeo vt vel tantilli  
odor longum ſpatium permeet: ſed ſincerum ad  
nos nullum aduehi, ſed cum collectum eſt atque  
permixtum: multarum namque rerum permiſſio-  
ne vitari, & quod in Græcia venditur  
ſæpè adulteratum eſſe: Sed & valde odo-  
ratos eſſe huius arboris ramulos, hoſque quotan-  
tis putari, non tam vt reliqua valentiora ſeruen-  
tur, quā vt emolumenti plus comparetur: ven-  
di namque vel illos magno poſſe pretio. Atque  
huius arborum cultus cauſam adimbres referunt,  
quos crebro decidere perhibent: Sic & virgarum  
amputationem cauſam quandam eſſe dicunt, ne  
proceræ ſiant arbores. Etenim frequenter puta-  
ta vel attonſæ, virgas tantū emittunt, nec in  
vnum caudicem vires intendūtur. Sylueſtre Baſ-  
ſamum nullibi extare accepimus. Ex maiori hor-  
to vaſa duodecim plena colligi, quæ congi dimi-  
dium capiant: Et ex altero duo tantū. Sincerum  
vendi duplo ad argentum pretio: pro ratione mi-  
xtionis. Baſſami præſtantiam præcipuē in odore  
conſiſtere videri.

Solius in Polyhiſt. ſimiles vitibus ſtirpes eſſe  
tradidit.

Strabo Coſmog. 16. Baſſami huiſtoriam paucis  
complexus eſt, his verbis: Hiericus eſt campus à  
montana quadā valle circumdatus, quæ in theatri  
ſpecie ad ipſum declinat. Hoc in loco eſt Palmetū,  
cui immixta eſt etiam alia materies domeſtica, &  
ferax, Palmis abundans, ſpatio ſtadiorum C. &  
totum irriguum & habitacionibus plenum. Vbi  
& regia eſt, & Baſſami viridarum, quæ arbor a-  
romaticæ eſt & fructuſa, Cyſiſ & Terebintho per-  
ſimilis



similis: eius corticem scindentes succum in vasis suscipiunt, tenaci lacti persimilem, susceptus autem in concavis coagulatur. Dixerat autem eodē lib. in Arabia apud Sabaeos tractu maritimo thūs & myrrham & Cinamonum nasci: in ora etiam Balsamum & quandam aliam plantam valdē odoratam. Et rursus: à Iordane lacum esse: qui aromaticum Iuncum & Calamum ferat: habere etiam paludes, Lacum Genefareticum vocari. Gignere etiam Balsamum. Videtur autem Strabo Sylvestre balsamum aliud denotare, eo quod spontē in maritimis Sabaeorum nascitur, etsi istud incognitum fuerit Theophrasto.

Et Dal. apertē scribit sylvestre illud esse. Pautasias in Bœoticis balsami arbores in Arabia describit, Myrtorum magnitudine, foliis Amaraci. Videat Lectōr reliquam historiam viperarum sub eius fronde latitantium, quam longum esset hic recere.

Sed consulamus potiūs Plinium, qui non parum balsami historiam ex Veterum monumentis, suisque annotatis illustrasse videtur. Postquam igitur de pluribus Arabiæ & Aegypti odoratis tradidisset, omnibus odoribus præferri (inquit) balsamum, vni terrarum Iudææ concessum, quondam in duobus tantum horis, vtrōque regio, altero iugerum xx. non amplius, altero pauciorum. Sequit nunc hæc, & tributa pendit cum sua gente, in totum alia natura, quam nostri externique prodiderant. Quippe Viti similior, quam Myrto. Malleolis feri dicitur, nuper vindta, vt vitis: & implet (at nunc implet Dalec.) colles vinearum modo, quæ sine adminiculis se ipsæ sustinent. Tondetur similiter fruticans, ac rastrois nitescit, propterque nasci, intra tertium annum fructifera. Folium proximum Rutæ, perpetua coma. Saviere in eandem Iudæi, sicut in vitam quoque suam. Contra defendere Romani, & dimicatum pro fructe est. Seritōne nunc eum Fiscus: nec vnguentum sui numerosior aut procerior. Proceritas intra bina cubita subsistit.

Arbori (Xylobalsamo) tria genera. Tenui & capillacea coma, quod vocant *Euthersium*. Alterum scabro aspectu, incurvum, fruticosum, odoratus: hoc *Trachy* appellat. Tertium *Eumeces*, quia est reliquis procerius, lævi cortice. Huic secunda bonitas, novissima Euthersito. Semen eius (*Carpobalsamum*) vino proximum gustu, colore rufum, nec sine pingui: peius in grano, quod leuius atque viridius. Ramus crassior, quam Myrto. Inciditur vitro, lapide, ossisve cultellis. Ferroladi vitalia odit. Emoritur protinus, eadem amputari superuacua patiens. Incidentis manus libratur artificii temperamento, ne quid vitra corticem violet. Succus (alibi oleum vocat) è plaga manat, quem Opobalsamum vocant, suauitatis eximia, sed tenui gutta: ploratu lanis parua colligitur in cornua. Ex iis nouo fœtilli conditur crassiori similis oleo, & in musto candida. Rubescit deinde, simulque durescit è trans lucido. Alexandro Magno res ibi gerente, toto die æstiuo vnam concham impleri iustum erat. Omni verò fecunditate è maiore horto congios senos, minore singulos, cum duplo rependebatur argento (Quem locum ex Dioscor. lect. sic restituit doctiss. Budæus lib. 5. de assē: Anni verò fecunditate è maiore horto congios senos singulis annis, cum duplo rependebatur argento.) Nunc etiam singularum arborum largior vena, ter omnibus percutitur æstatibus, postea deputatur. Et sarmenta quoque in mercē sunt DCCC. (denariis trecentis.) Amputatio ipsa

furculisque vāniit intra quintum demum annum. Xylobalsamum vocatur, & coquitur in vnguentis. Pro succo ipsum substituere Officina: corticis etiam ad medicamenta pretium est. Præcipua autem gratia lachrymæ, secunda semini, tertia cortici, minima ligno. Ex hoc buxosam est optimum, (*μυρρὸν* Dioscor. Plin. videtur legisse *μυρρὸν*) quod est odoratissimum: è semine autem maximum & ponderosissimum, mordens gustu, feruensque in ore. Adulteratur Poterō Hyperico, (semine Hyperico simili, quod à Petra oppido defertur Dioscor.) quod coarguitur magnitudine, inanitate, latitudine ceulongitudine, odoris ignavia, sapore Piperis. Lachrymæ probatio, vt sic pinguis, tenuis, & modicē ruffa, & in fricando odorata. Secundus candido colos, petor viridis crassiusque. [cæsiū (que Dalec.) pessimus niger. Quippe, vt oleum senescit. Ex omni incitura maximē probatur, quod ante semen fluxit. Et aliàs adulteratur semine suo (seminis succo. c. h.) vixque maleficium deprehenditur gustu amariore. Esse enim debet lenis, (lævis Dioscor.) non subacidus, odore tantum austerus. Vitiatur & oleo rosæ, Cyperi, [Cypri m. & ch.] Lentisci, Bilani, Terebinthi, Myrti, Resina, Galbano, cera Cypria, [cerato Cypriano aut Myrtino Dioscor.] prout quæque res fuit. Nequissimè autem gummi, quoniam ipsum quoque inhaerescit manu inersa, & in aqua fidit: quæ probatio eius gemina est. Debet sinceram & inhaerescere: sed hoc & gummi addita fragili crusta euenit. Et gustu deprehendunt. Carbone verò, quod cera resinaque adulteratum est, nigrior flamma. Num melle mutatum statim contrahit muscas. Præterea sinceri densatur in tepida aqua gutta fidens ad ima vasis, adulterata olei modo innatat: & si in metopio vitiata est, circulo candido cingitur. Summa probatio est, vt lac coagulet, in veste maculas non faciat: nec manifestior alibi fraus. Quippe milibus denarium sextarii empti: vendente fisco tricenis denariis vaneunt. In tantum expedit augere liquorem. Xylobalsamo pretium in libras vi. (xy. m. & ch.)

Tacitus medicam arborem ait, vt non tam ex aliorum erga cæteras arbores comparatione, quam definit ex hoc paruum arborem esse oporteat.

Iustinus historicus è Trogo Pompeio tradit, Opes genti ex vectigalibus Opobalsami creuisse, quod in iis tantum regionibus Iudæa gignitur. Est namque vallis, quæ continuis montibus velut muro quodam cincta instar hōtorum clauditur, spatium loci ducenta millia iugerum, nomine Iericho dicitur. In ea valle sylua est, & vbertate & amœnitate insignis, siquidem Palmeto & Opobalsamo distinguitur. Et arbores Opobalsami formam similem Pincis arboribus habent, nisi quod sunt humiles magis, & in vinearum morem excoluntur. Hæc certo tempore anni Balsamum sudant.

Iosephus quoque magnus ille Hebræorum Historicus in Iudæa nasci confirmat. Et Egesippus de excidio Hierosol. Locum ait propè Iericho esse, in quo Balsamum gignitur, virgultisque innascitur, quæ acutis lapidibus incidunt pueri agriculturalum, pèrque eas incisiones destillare humorem lachrymis pulchrè rorantibus.

Diosc. non solum in conualle Iudææ quadam, sed Aegypto quoque nasci testatur, cuius verba quoque de Balsamo referre lubet, quod à prædictis, maximè Plinio, non parum euariet. Sicigitur

Xylobalsamum  
Succedaneum Balsami  
Cortex  
Lignum delictum  
Seminis delictum  
Adulterium  
Seminis de digno.

Lachryma  
probatio

Aliud adulterium  
et id Balsamum

Probatio

Summa  
probatio

Pretium

Parua arbor

Loci descriptio  
per alia

Pincis similes esse

*Lyg. sem  
i. pyxan-  
tha. mte-  
grend  
i. mcep.  
Pyxacan-  
tha.*

ait. Balsamum arbor Lycii seu Pyxacanthæ [Lycium] *μυραγδίνης*: Aue. quasque Lycium habet: alii legunt *μυραγδίνης*: videtur *μυραγδίνης* vocabulum omnino perperam ex dictionum affinitate *μυραγδίνης* irrephisse, quod facile conceder, qui vel ad prædictorum & sequentium autorum iudicium circa magnitudinem respexerit, vel ipsum ad *μυραγδίνης* cum Pyxacanthæ aut Pyracanthæ, aut Granati, aut Vitæ, aut aliqua alia prædictarum vel dicendarum magnitudine cō.ulerit,] magnitudine conspicitur, foliisque habet Rutæ proxima, sed candidiora multo & perpetuo magis virentia. In

*Folia Rutæ.*

*Varietas.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

*Ther. p. m.*

vnus Iudææ certa quadam conuale, & Aegypto nascitur, differens ipsum à seipso, scabritia, proceritate & gracilitate. Quod igitur in fructu tenue & capillaceum est, Theriston quasi demessile dicitur: quoniam fortissimè ob gracilitatem facile demetatur. Quod verò Opobalsamum dicitur, æstius sub ortu Canis ardoribus excipitur incisa ferreis Vnguibus arbore. Sed tam paucum exsultat, ut quæ tannis vix plures quàm seni septenarius conglu colligantur: inbique pondus argenti duplo reperitur. Est autem bonus succus qui recens est: validi odoris, sincerus, non subacidus, dilui facili, s. levis asfringens, & linguam modicè mordēs. Sed variè vitatur. Sunt enim qui ipsi olea, vnguenti ad miscerant, quale Terebinthinum est, Cyprium, Lentiscium, Suisinum seu Liliaceum, Balaninum ac Metopium: itemque mel & ceratū Myrtinum aut Cyprium valdè liquidum. Humusmodi verò maleficium facile deprehenditur: Si quidem sincerus laneæ vesti instillatus, si deinde eluatur, neque maculam facit, neque notam illam relinquit: at vitatus inhaerescit. Rursusque purus lacti instillatus, id ipsum coagulat, id quod adulteratus non efficit. Quin & sincerus lacti aut aquæ infusus, celeriter diffunditur atque laetescit: at adulteratus olei modo innatat, in orbem circumagens aut diffundens sese stellæ in modum. Attamen sincerus etiam vetustate crassescens, se ipso deterior euadit. Porro hallucinatur qui sincerum hunc existimant aquæ instillatum prius ad ima fidere fundumque petere, ac postea tanquam qui facile diffundatur & dissuat sursum remeare. Lignum verò quod Xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, rufum, odoratum, quod intenus Opobalsamum spirans. E fructus genere (nam & huius necessarius & vsus) eligito flavum, plenum, grandem, ponderosum, gustu mordentem & feruentem in ore, modicè Opobalsamum redolentem. Asportatur à Petra oppido semen Hyperici simile, quo fructus hic adulteratur: sed ex eo dignoscēs, quod minus illud sit, inane, igneum sapore Pipis. Scribit tamen Gal. Balsami neque fructus neque lignum fraudes vllas admittere: fortè quod sicum facillimè deprehendi posse existimaret. Opobalsamum Syriacum, inquit idem, quod à loco in quo plurimum & optimum prouenit, alterum quoque nomen recepit, Sagadinumque dicitur: cunctis aliis melius quod in Palestina prædiis colligitur. Quam verò; Falernum vinum eo quod Caupones vendunt, præstantius est, tantum Aegypto Opobalsamo Sagadinum vocatum præstat. Sciens itaque G. leuissimum Balsamum esse quod pluribus artibus adulterari, ut internosci vix queat, ipsemet in Iudæam navigare & coram inspicere voluit, quomodo liquorem fundat, ac inde particulam ceu regulam quandam aliorum sumptam apud se semper habere. Ac multas quidem adicit eius adulterationes, quæ etiam exercitissimos lateant,

quas tamen publicare scientes dignum non iudicauit, ne prauit addiscētes, in multorum fraudem ea arte abutantur.

*Hactenus* & Veteribus ferè præcipuis Balsami historiam persecuti sumus, studio omittentes eos qui obiter tantum de eo aliquid tradidere, vt illud Virg. Georg. 2.

*Quid tibi odorato referam sudantia ligno Balsamique &c.*

Item

*Balsamique & baccas semper frondentis Acanthi.*

Quod nec suis caret laudibus in sacris paginis. Sed restat ex prædictis difficultas explicanda de modo colligendi Balsamum. Nam Theophrast. & Dioscor. ferreis Vnguibus incidi scalpū solitas arbores testantur. At Plinius non solum non ferro amputari tradit, sed eo lædi incidi autem vitro, lapide, ossisue cultellis. Quod & Solinus confirmat, Lignum, inquit, caudicis attræctatum ferro, sine mora moritur: eapropter, aut vitro, aut cultellis ossisue, sed in solo cortice artifice plaga vulnerandum. Tacitus quoque cauet ne vis ferri huic arbori adhibeatur, hanc enim puere idèq; venas fragmine lapidis aut testa aperiri. Sed leuis admodum hæc difficultas diligentius consideranti videbitur, prædictūque Autores facillè inter se conciliabuntur, si dixerimus, rem eò redire, idque vnum voluisse omnes, in vulneranda Balsami arbuscula apprimè cauendum esse, ne quid vitra corticem oblectatur, idèq; fortè à cultellorum ferreorum nimis illa acie abstinentum censuerit hi, illi verò eo erūt vtendum, non quod ferrum ipsum per se efficit. Nam ferre. s. alioqui etiam vnguibus, hanc ad inuadendum ferreorum eo genere, quod ad vnguis humani figuram (vt Serap. censet, fortè melius in vulneranda Balsami arbuscula aptari refert in falsis speciem, quali & hodie vitores vt solent) conuexum sit, quidni corticem inuolutum intactōne caudicis ligno scalpere liceat, huius secus atque vitro, testa, fragmine lapidis, ossisue cultellis? Eiusmodi verò ferreorum vnguis mentionem facit Colum. lib. 12. cap. 18. quibus vindemiatores vnguis vice ad colligendas vuas vti voluit, vt ne manibus vuas distringerent, sicque non minima fluctus portio dispersis adnis in terram dilaberetur.

Colligendi modum nobis indicare voluit Fr. Broc. Monach. in descriptione Aegypti, his verbis. Saraceni carpebant folium vnum à stipite adherent enim folia stipiti] & contra radium Solis illud discerpentes, guttam lucidissimam, & supra modum odoriferam colligebant. Et est eū verus liquor Balsami qui in phialas vitreas colligitur, & ad diuersas mundi partes mittitur: tamen si raro sine mixtura ad regiones nostras perueniat. Aiunt etiam si folium illud contra radium Solis non frangeretur, minime succum illum stillare.

Inter recentiores Cordus non dubium esse scribit quin pro Xylobalsamo alterius cuiusdam fructus surculi vendantur: reperiuntur tamen inter eos nonnunquam qui mirum in modum odoris & saporis gratia commendantur. Idem quoque de Carpopalsamo vocato vsu venit. Semina inana sunt & insipida, habentque figuram Hyperici fructuum: non raro tamen inter ea inueniuntur adulternis granis maiora, pleno pinguique intus & oleoso nucleō, odoris in attritu gratissimi, & quæ gustu ineffabili, odoris, saporisque gratia oris halitum diu commendent. Ipsum porro Carpopalsamum vix credit Cordus ad nos adferri amphiis, vastatis Syria, Iudæa, & nunc etiam Aegypto



gypto Turcarum & Barbarorum rabie & incur-  
sionibus. Itaque nemo speret temere se sinceram  
Balsami lachrymam consecuturum. Quid dicemus  
sinceram? ne adulterati quidem copia nobis con-  
tingit, & si importetur ea, in Principum tantum  
venatur manibus, qui potissimum speciosis eiul-  
modi imposturis illicuntur. Vidisse tamen ve-  
rum Balsamum gloriatur idem, quod hominum  
memoria aliqui ex Aegypto attulerint, Hieroso-  
lymis huc reuerſi, colore fulvum, lentum, spif-  
sum & inueteratum: interim tamen suauissimi  
adhuc odoris, cuius tantillum totum palatium  
penetraret. Antiquitus, vt tradunt suprascripti  
auctores, Plin. & Theoph. Balsamum vni terra-  
rum Iudææ concessum erat. Sed postea, si Matth.  
credimus, propagata admodum fuit species, cum  
Iudæa ipsa simul cum Balsamo Romani potius  
fuerit, qui eam malleolis ferendo, atque iterando,  
non secus ac vites in collibus propagantur, la-  
tius auxerunt. In Arabia nasci ex Pausania di-  
ctum, sed quomodo sit factum [ vt in Syriam pe-  
regriantes vno ore fatentur ] quod hoc tempore  
omnibus sanè balsami plantis Iudæa sit peni-  
tis destituta, cum olim sola eiusdem ferax à com-  
pluribus crederetur, declaratu haud ita obuium.

Verum, inquit Matth. cum certò sciam proba-  
tissimorum virorum testimonio, qui ex Italia sol-  
uentes plures in Aegyptum nauigarunt, Mem-  
phiti balsami vitidarium extare. Illud fortasse eue-  
nisse putandum est, quod è Iudæa ab Aegypti re-  
gibus, quibus vniuersa subiciebatur Syria omne  
in vniuersum balsamum edè fuerit translatum,  
quod decoris inde plurimum Regiæ accederet. Si  
vnuquam hodie Opopalsamum venale inuenia-  
tur [ tamen in Italia per longas ætates non am-  
plius venturum putem ] non ematur, nisi prius  
de eo omne fiat periculum. A Veterum balsami  
fructu, quod hodie Carpopalsamum vocatum,  
& ex Alexandria importatur longè differt. Suspi-  
candum hoc idem esse semen simile hyperico,  
quod [ vt supra ex Dioscor. diximus ] olim à Petra  
Palesina oppido deferrebat.

Quod Xylobalsamum hodie vocant potius  
Myrtum quam balsamum referte censet Matth.  
Mirum Dioscoridem corticis non meminisse, &  
Plinio tamen dictum, eiusque medendi usum.

Amatus certum se ait balsamum in Aegypto  
nasci, indeque nunc Xylobalsamum verum ad-  
duci, primo aspectu vitis ramulos figura & co-  
lore referens. Cæterum hodie alibi balsamum,  
quam in supradictis regionibus nasci sibi cog-  
nitum. Sed aliud balsamum non intelligit, quam id  
quod prius Peruvianum vocatum, quod verum  
balsamum Antiquorum non est.

Fuchsius in ea suspitione est, quemadmodum  
& Lacuna, neque Carpopalsamum, neque Opo-  
balsamum, neque Xylobalsamum Neplasiarum  
esse legitimum & verum: ideoque non temere  
illis ad conficienda medicamenta vtendum, sed  
potius ex officinis Medicorum euicienda, & suc-  
cedaneo illorum vtendum esse, de quo nos pos-  
tea specialius quædam trademus.

Scaliger suo more censoria stipatus virgula in-  
cedit. Sic enim Card. alloquitur: balsamum de-  
fuisse ais: æ paruo esse in pretio: quorum vtrumque  
vanum est. Nam & apud Maximil. Cæs. multum,  
& nonnihil apud patrem meum vidimus, ex ipsis  
allatum locis purissimum: Nec parum apud Ca-  
rolum Sabaudia Ducem. Miror te Iesemino bal-  
samum comparasse. Aboli non corrigebas: qui  
de balsamo cum scriberet, idem & in aqua con-  
tere, & cum aqua misceri scripserat in eodè loco.

Tom. I.

Lonicus lignum quod Xylobalsami nomine  
adfertur excoctum putat, quemadmodum & fru-  
ctum adulteratum. Is falsam figuram habet, ad  
descriptionem effictam, non ad visam plantam.

Lonic. nos.  
Cast. Dhr.  
nos.  
Munster.  
nos.

Castor Durantes quoque figmentum ponere  
videtur pro balsamo. Munsterus herbam vocat in  
sua Cosmogr. & picturam stirpis nec visæ nec co-  
gnitæ exhibet.

Scriptit Lob. ex professo libellum de balsamo,  
ex quo sequentia potissimum ex eius obseruati-  
onibus annotanda. Dioscor. vires balsami melius  
quàm stirpem notam habuisse, eoque ab Agy-  
ptiis potius & Arabibus quàm à Græcis peten-  
dam. Apud Dioscorid. minime legendum *λευκόν*  
[ quamvis omnino ita legendum censet Mar-  
cell. ] sed eam vocem expurgendam, aut legen-  
dum *λευκόν*, cui & Strabo comparat. Pro Pyxacan-  
tha apud Diosc. leg. Pyracantha, cuius nulla men-  
tio apud Antiquos.

A quibus  
balsami  
hist. peten-  
da

Marcell.  
nos.

Diosc. emend.

Apud Trogum Pompeium, quem & Iustinus Trogi mem-  
historicus citat merito mendum multi docti in  
codice suspicantur, quando balsamum Piceæ ar-  
bori comparat. Pausaniæ collatio cum foliis Sam-  
puchinis balsamo minime repugnat.

Matthiolumastix Guilandinus, Bellonius, &  
Prosper. Alpin. qui arbusculam foliis Rutæ aut Len-  
folia las-  
tici, aut lasini profitentur, quod Theoph. Dio-  
scor. & Plin. minime repugnat.

De balsami liquore varia est lectio. Alii *ῥῆμα* Diosc. illuſt.  
nos cum Ruell. & Marcell legunt, qui citissime pe-  
netrat, facile diluitur: quæ lectio rei ipsæ mini-  
mè quadrare videtur. Alii, vt rei meliusculè con-  
ueniat *ῥῆμα*, quod facile scissilis, penetrabi-  
lis & facile diuiditur, vertunt. Vetus interpres Se-  
renum interpretatur, qui *ῥῆμα* legisse videtur,  
Serap. secutus, quem *ῥῆμα* id est, facile solu-  
bilem legisse autumant: nam ipse interpretatur  
velocis resolutionis. Marcelli verò versio reci-  
pienda videtur, quia maximè cum balsamo par-  
tium tenuitate conuenit. Quod etiam à Plin. te-  
nue dictum est: multoque magis etiam ab ipso  
Gal. lib. 7. simpl. qui Diosc. tacite reprehendit. V-  
bi autem Diosc. dicit adulterari Cypria cera liqui-  
da, videtur legendum Cypreo aut Cyprino cum  
nulla sit cera Myrtæ aut Cyprea.

Varia lectio

Diosc. nos.  
Diosc. corr.

Opobalsamum crassum [ inquit Lob. ] legitima  
Terebinthinæ Cypriæ veteris siue vitæ aut resi-  
nacorum liquorum instar densatum seruamus,  
glebæ Benzoini ferè concretionem, sapore acii, &  
colore fuluo, masticanti vt Mastiche, lentescente.  
Recens præfertur Antiquis, quare in hoc maximè  
vulgus hallucinatur, qui quod antiquius est, eò  
melius opinatur. Viperæ illæ, quæ in balsameti  
vitam degunt, innocuæ sunt.

Opobal-  
samum con-  
cretum

Vulgi error

Viperæ in-  
nocuæ

Carpobalsami arborem Aduersaria ex amici cu-  
iusdam relatione sic referunt. Humilis est frutex,  
aspectu deformis, cineracei coloris, flore lasmini  
lutei simili, minore, perpetuis virgis. Liquor au-  
reus, sapore Moschi. Mirum verò quod Pen. &  
Lob. in suis Aduers. referunt, [ ex cuiuscunque id  
tandem testimonio tradant ] & contra omnium  
scriptorum authorum sententiam, saporem esse  
Moschi. Si odorem intelligunt, neque sic verè  
narrare videntur: quis enim vnquam balsamo  
Moschi propriè tribuit odorem? Si saporem, quæ  
quæso possit esse saporis gratia Moschi, partis ex-  
crementitiæ, siue iam sanguis sit, siue sudor, siue  
peculiaris alia collectio excrementitiæ, de quo  
nondum constare certò apud plerosque videtur.  
De genuini verò balsami odore & sapore, plus fa-  
tis supra.

Carpobal-

Humilis

Frutex

Flor

Lob. nos

Pen nos

C. Bauh. apud Matth. balsami arbusculam de-

Qc

*Flos Violæ  
alba.*

scribens, ait esse floribus albæ violæ similibus, vt figura Alpini adposita exprimat. Mox subdit in India & Aegypto prouenire. At apud nullum hætenus autorem legimus flores esse Violæ albæ, nec illud Alpini icon declarat vlla ratione, nec ipsius Alpini historia, qui expressè ait Acaciæ floribus proximos, id quod dicta icon haud iconcinnè exprimere videtur, quæ flosculos ex meris apicibus constantes exprimit, quales nemo stirpium gnarus facillè dixerit, vllam habere similitudinem cum Leucoio. Præterea negant Alpinus & Bellonius, quibus præ aliis huius fructicis vera & exacta debetur historia, prouenire in India ac Aegypto spontaneam.

Sed par est tandem & eos audiri qui ipsam arbutulam in loco suo natali viderunt & eius historiam literis prodiderunt, quales inter alios præcipui sunt Theuetus, Bellonius & Prosp. Alpinus, qui posterior de eo tractatum integrum conscripsit. Huic Italia, sed potissimum Serenissima Respublica. Venetorum debet, quòd Aegyptii Balsameti monumentum vitium in Augusta sua viderint vrbe. Binas, inquam, plantas, ex Arabia cum aliis [nisi fallor secum allatas, aut accersitas, sed duas tantum habuisse & coluisse, ex ipso met [ego Cherlerus, cum anno 1596 & 1597 Patavii ager] intellexi, & alteram quoque bis vidi, quæ Leucoii magnitudinem non excedebat, foliis lasmini quodam modo: de cæteris certò statuere, quòd è longinquo tantum & per fenestram viderim, non possum. Altera autem famuli eius vti putabatur, vel cuiusvis alterius maleferati furto nequissimè erepta, ad id morosum ipsum effecit, vt nemini aditus ad residuum pateret. Vidi tamen, & semel vidit mecum Henricus Ellenberger, tum Consil. Illust. Germ. nat. Patavii, qui nunc, vt audio, professorem Celeberrimum agit Marpurgi, qui idem mecum, si recordatur, testari potest. Sed quid magno opus testimonio, cum hoc notum sit omnibus, & ipsemet iam superioribus annis aluerit, vt ex ipsiusmet testimonio aliorumque infra patebit: & ipse Alpinus adhuc sit in viuis, nunc magno suo merito Celeberrimi illius horti Patavini præfectus, idemque Professor Botanicus Patavinus.

*Theuetus.  
In Agypto.*

Sed placet prius audire Theuetum. Hic testatur se vidisse hortum non procul à Cairo Aegypti liquore illo raro & pretioso ex Balsamo arbore profluente celeberrimum, quam Prouincia præfectus adhibitis custodibus diligentissimè cõseruat, vt eius liquorem colligat, quem quotannis ad Turcarum Imperatorem mittat. Itè à Grecorum Patriarcha & vrbis senioribus audiuisse, eum qui hodiè colligitur, neque tam oleosum, neque vulneribus vlcibusque curandis tam vtilem, quàm qui postremi Regis Aegyptii tempore colligebatur. Plures quidem clam Opopalsamum vendere, sed adulteratum. Narrasse Arabes ex historiis Cleopatram Aegyptii Reginam ex Iudæa Balsamum primum in Aegyptum transtulisse. Sed hinc historiarum vix assentitur Theuetus, quod in alia vulgari Græca lingua conscripta, in Palestina legitur, Traiani tempore Balsami feracia fuisse montana Engadi, & quædam alia Asiæ minoris loca: quanquam re vera cum hæc lustraret, nullam reperire potuerit Balsami stirpem. Præterea Balsami montis Libani incolæ, ex historiis suis referebant, in quadam montis parte, quæ Solis ortum spectabat, Alexi Græcis imperante, tantum Balsami colligi solitum, quantum in Aegypto. Sed regione à Turcarum tyrannide oppressa, & exactis inde Christianis, eius liquoris memoriam vna

*De loco  
quadam.*

cum planta ipsa exoleuisset. Aegypti Reges nihil pretiosius habebant, quod Regibus & Imperatoribus Persidis, Catax, Aethiopiæ, Græciæ, cæterisque dono darent, siue ad inuendam, siue ad confirmandam cum eis amicitiam.

Autor descriptionis Africæ, in octava eius parte tradit extra urbem Aegypti *Milfruberich* primam in Aegypto à Mahumentanis conditam ad Nilum, excellentes esse & magnificas sepulturas Regum Aegypti: nec procul ab illis esse hortum vnicam alentem arborem, quæ Balsamum producit, nec in toto orbe vllam aliam esse præter hæc solam. Plantata est in medio fontis instar putei: nam est procera arbor. Folia eius similia sunt foliis Vitis & parua. Audiuisse se refert, qui dicerent, si aqua fontis diminuat, plantam ipsam siccatam iri. Hortus cinctus est validissimis muris, in quem ingredi nemo potest nisi maximo fauore, aut dono custodibus dato. Multa quidem hæc illi de Balsamo: nullus tamen notis omnibus delineauit eius imaginem, vt verisimile sit eam præsertim Veteribus illis incognitam fuisse.

Bellonius denique & Alpinus Balsami historiam perspicuè, vt putamus, sic tradunt. Arbutula est (inquit Alp.) viticosa, quæ exscit ad altitudinem *Elhanne*, seu Ligustrum, vel Cyrti, folia paucissima gerens, Rutz proxima, non tamen, vt dicebat Dioscor. iis candidiora, sed potius Lentisci foliis similia cernuntur, scilicet colore viridi, subalbido, perpetuòque virentia. Eius lignum gummosum lenèque apparet, colore exteriùs subrubro, cuius ramuli eodem colore conspiciunt, longi, recti, graciles, paucis foliis ordinatim referti, foliaque simul terna, aut quina, aut septena alæ adnata, aliquo pacto Lentisci foliorum æmula. Sunt ramuli odorati, gummosi digitis que contriecti eis tenaciter adherentes. Flores fert paruos, albos, Acaciæ floribus proximos, ternos singulis appendicatos, quasi in umbellæ forma, summè odoratos (odor paululo temporis resoluatur) à quibus femina promanant flauis, folliculis nigris subrubescens, contenta, valde odorata, intusque humorem flauum meli perissimè habentia, sapore subamaro, parumque acri linguam ferientia, Opopalsamumque, redolentia, Terebinthi fructuum figuræ & magnitudinis æmula, extrema aculeata & medium crassum obtinentia. Opopalsamum, cum primum educit, colore, vt audio, est albo, qui paulò post in viridem, teritid in aureum, & demum in melleum mutatur. Eius succi etiam substantia in primis turbida crassaque, vt oleum statim ab Oliui expressum cernitur, postea tenuissima atque clarissima, demum Terebinthi modo crassescit, odore eximio in primis atque acutissimo Terebinthi redolens, cum suauiore odoris fragrantia cernitur, saporeque amaro, acri & adstringente. Lenissimè est in primis diebus, atque vsque adeo validi & acuti odoris, vt aliquibus inter odorandam sanguis è naribus eruperit, & præ multà eius leuitate in aquam stillatum non desideret, sed ex alto in eam proiectum parumper in ipsa mergitur, serèque continuò assurgens supra totam aquam superficiem totum expanditur, eique miscetur, & citissimè in ea dissoluitur, vt ab aqua maximà cum difficultate coaguletur, in qua paulò post concreuit atque coagulatur, stylo totum ab aqua eximitur, quòd tunc colore laetescit, siue album quale lac visitur. Quantò hic succus annosior, eò fit inodoratior, atque ad motum segnior. In primis itaque statim albo colore cõspicitur, qui color paucissimis diebus in viridem mutatur, oleique crassitie cernitur, qui postea longo tempo-



ris interuallo depuratur, nonnullique annis tenuissimus euadit atque clarissimus, ex viridique colore in aureum splendidissimum transit. Senio vero confectus, crassius qualis Terebinthina fit, qui si in aqua vel lacte stilletur, statim confidet, multaque cum difficultate, & non nisi longo tempore, denud supraquam fertur, tardissimèque in ea dissoluitur. Vnde Plinium ex variis coloribus ac substantiis in Opobalsamo inspectis, varias eiusse succi differentias vel species facientem errasse clarissimè patet. Improprie & falsò Opobalsamum quoque appellatur nigrum illud, quod ex India Occid. importatur, cum sit diuersæ arboris, magnitudine, figura, ramis, foliis, fructibus, à vera balsami arbore longissimè differentis.

Bellonio teste, quotquot eius frutices in horto Materæ apud Cayrum aderant, stipitem solum habebant pedis longitudine & pollicari crassitie, tenuibus alis præditum, raris foliis obsitum. Vbi-  
cunque autem nascantur, daorum aut trium cubitorum altitudinem non superant: & pedali altitudine cum sint, in multos graciles ramulos anserinæ pennæ caule haud crassiores finduntur. Balsami frutices Materæ iam recens putati fuerant, sic ut soli stipites superessent, qui ramulorum rudimenta producebant. Eiusdem etenim est balsamum cum vite naturæ, quam singulis annis putare necesse est, alioqui degenerat. *Alpin.* Audio in Arabiæ solo ad Lycii, Terebinthi & Pyracanthæ magnitudinem [ut scripserunt Dioscor. atque alii] & maiorem etiam excrescere. Iustinum vero quòd Piceæ arbori plantam balsami similem asserat, deceptum omnino fuisse credendum est.

*Bellon.* Folia utrinque in neruo nata, ut in Rosarum, vel Fraxini, vel Iuglandis foliis videre est: ciceris tamen foliorum magnitudinem non excedant, sicque constructa erat ipsorum series, ut postremum foliolum extimam alam occupans, imparem numerum efficeret: nam totius alæ foliis numeratis, terna, quina aut septena inueniuntur: septenarium certè numerum superare vix animaduertimus: extremum autem foliolum reliquis maus est: factò etenim ab illo progressu reliqua sensim minuitoria fiunt, ut in Rutæ foliis. Ipsum lignum candicat, odorisque & saporis expers est, non secus atque aliud inutile lignum. *Alp.* Balsamum quod ex feminibus nascitur, bina folia in primis habet, bifoliis nascentis vitis maximè similia, & quæ post hæc, quæ sunt tria quatuor vel quinque, prodeunt, Amaraci foliis sunt proxima: quæ verò tertiò nascuntur singula trina existunt, Rutæque proxima cernuntur. Hæcque sunt Balsami folia, aliter quàm Scriptores antiqui descripserint, ex quibus atque aliis Dioscoridem fortasse atque alios multos antiquos Scriptores viuientem Balsami plantam non inspicisse iure suspicamur. Ramum & folia (addit Bellon.) degustauimus, quæ facultatis non nihil adstrictoriæ esse compertimus, pinguisque aliquantulum saporis, atque aromatici: ramulorum autem cortex his odorator. Geminio cortice præditi sunt ramuli, extimo foris subrubente, qui ut membranarum operti. Is gustatus, inter Thus & Terebinthi folium sapit, Satyreæ sylvestri sapore simili admodum grato, atque digitis tritus Cardamomum olet.

Ex dictis hæcenus patet quanta sit autorum varietas, non tantum circa arboris formam & magnitudinem, sed & partium eius descriptionem, cui tamen controuersia & obscuritati, ex posteriorum, maximè Bellonii atque Alpini [qui ipsimet arbusculas diligentiùs considerant] pla-

Tom. I.

citis & annotatis magnam huic balsami historię lucem accessisse indubiè quis affirmare auit. Restant & de loco & tempore quedam specialius excutienda.

Ergo quoad locum, ut iam patet ex præced. Dioscor. in sola Iudæa in quadam valle & in Aegypto nasci tradit, differens ipsum à seipso asperitate, longitudine & gracilitate. Ante ipsum Theoph. in duobus tantum vallis Syriæ vitidiciis: Strabo & in Syria, valle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacet, iuxta lacum Genesareticum, & in Arabia quoque Sabæorum tractu maritimo. Hierony. in Epitaphio Paulæ matris cap. 5. Contemplata est [inquit] balsami vineas in Egiptu. Ita plerique autorum balsamum in Aegypto & seipso perhibent, regione quæ nunc Solis oculus siue fons dicitur, quondam Heliopolis, ut annotat Hermol. ex Auid. balsamum, ut scribit Lob. vnâ terrarum Iudææ & Aegypti Memphi ciuitate, quæ Cayrum vocant, oriundam Theophrast. Dioscor. Plin. & nonnulli antiqui affirmant: hodiè tamen constat, neque Iudæam, neque Aegyptum, eius esse spontaneum solum. Eius olim multæ plantæ à Mecha Arabiæ felcis oppido in Aegyptum translata. Sed Monardes balsamum antiquorum petiisse scribit in Aegypto, & in hoc mundo non amplius repetiri. Idem & Petrus Martyr confirmat, nempe balsamum circa Cairû Aegypti petiisse: interitus varias recenset causas, & inter alias menstrui sanguinis venenum, quæ nobis non videntur verisimiles. Sed quid ad hæc Bellonius? Sunt, ait, qui existimant Materam balsamum à Iudæa fuisse translatum, nos verò nunquam in valle Hiericuntina cultum à b. uiam. Non longè Cayro Aegypti hortense duntaxat existit. Quanquam autem putat Theophrast. nusquam sylvestre reperiri, constanter tamen affirmare audemus, & olim & etiamnum in Arabia felice existere, vnde lignum & fructus ab omni antiquitate cum aliis mercibus Arabicis deferri solita: quod ex Mithridatica antidoto, ex Dioscor. Diod. Siculo Paulan. Strab. Cor. Tacito facillè est probare, adeoque insistentes Cayrini de balsamo interrega responderunt, quicquid Xylobalanum & Cayrobalsamum unquam vendiderint, cum aliis medicamentis Mechâ Arabiæ delatum: meminisse autem balsami arbusculas, quæ hodiè Materæ visuntur, magnis Sultani sumptibus ex Arabia felice adportatas fuisse. Ceterum arbusculæ, quas ego Materæ vidi iuxta Cayrum, pauca admodum habebant folia mente Septembri. Et Alpinus: Habentur, inquit, arbusculæ in horto Matthæia propè Cayrum, cura Eunuchi Messer dicti, Aegypti Præfecti Mechâ & Medinâ, ex Monte quodam arenoso in quo multas balsami plantas viuere affirmant, quas insigni Mahemetis miraculo in sterili illo monte natas affirmant, per Haly æti peregrinorum ducem, Anno à partu Virginis 1575 transfecit. balsami plantam apud me viuientem verissimam, Iacobus Contarenius Senator clauis. Iohan. Vethus nobilis Anglus, Franc. Ferretius Gallus, Ioach. Iungermanus Germanus, Marcus Fennarius Venerus Pharmacopola & plures alii viderunt, verumque etiam Opobalsamum ab eius foliorum alijs distictis exstillauisse quod multis maximè mirum fuit cum aliis Italiam hanc plantam habuisse, nusquam appareat. Arabia autem felix balsami locus patrius semper fuit, nunquam Aegyptus ac Iudæa.

Legitimum Opobalsamum notis omnibus comprobatum vidisse gloriatur Matthioli, apud Imper.

C c 2

Ferdin. à S. Martino Imp. Tereacum missum : cui simile omnino sibi visum ait illud, quod Franciscus Calceolarius Veronensis referebat Reuerendissimo D. Barbaro, Electo Aquilensi Patriarchæ, ad suam parandam theriacem.

Porrò, vt Campesius in suo speculo pharmaceutico testatur, Balsamum incognitum (quod non simpliciter, sed magna ex parte intelligendum censeamus) in Gallia, Italia, Hispania, & magis in Germania verum non habemus, sed tantum adulteratum. Aliquando se vidisse iactatidem apud D. Annam Franciæ, x. aut xii. ampullas vitreas, quarum quædam erant missæ per Sultatum Aegypti Regi Ludovici xi. eius patriar. Duc Burgundie Carolo: alia Regi Carolo viii. Sed vnum non fuisse simile alteri, existimâtque maiorem partem fuisse veram Terebinthinam ex Grano viridi. Balsami ramulum vegetum adhuc nactus Bellon. eundem exiccatum cum Xylobalsamo Offic. collatione facta, per omnia conuenire deprehendit, idemque de Carpobalsamo, dicit.

Tempus.

Incidi tradunt autumno ad liquorem eliciendum, teste Hermol. Alpinus tamen refert mensibus Iunio, Iulio, Augusto, partim spontè, partim stipite ferro scarificato destillare & in vitrea vascula recipi album, quod postea teporis successione mutatur, vt prius dictum. Lob. & Pen. ex amici cuiusdam relatione perhibent Decembri mense ramulos præscindi, quibus cera oblita appendantur amphoræ excipiendo aureo liquori. Folia, vt idem tradunt exiit Decembri, quibus non nisi mense Maio noua sufficiantur. Quod si verum, iam conruit omnium tam præcorum quam neotericeorum recepta opinio esse perpetuis foliâ. Et sanè inter notas à Veteribus proditas, quibus Balsamum dignosci possit, vna est, vt perpetuè vireat: illud tamen in Materia, apud Cayrum, teste Bellonio, pauca admodum folia Septembri mense habebat : quod sibi insolens visum est. Nam reliquæ arbores, quæ hyeme virere solent, folia, inquit ille, solum nouo vere abiciunt, cum videlicet noua germina produxerunt: solentque autumno magis virere, quam nouo vere. At reliquæ, quæ folia abiciunt, id sub hyemem facere solent, vt æstate noua acquirant. Ideoque nobis præter naturam videbatur Balsamum folia abicere, vt hyeme noua germina produceret: nobis enim id obseruantibus, quæcunque habuit folia, teceus nata erant. Has fortè difficultates vel ex relatu scientes, vel subsolfacientes Pen. & Lob. perpetuis virgis Balsamum dixerunt, non perpetuis foliis: at perpetuis virgis eodemmet merito, vt nobis quidem videtur, dicas salicè, vitem, aliâque arbores vel frutices plurimos.

Pen. & Lob.

Nomina  
Linguis.  
Balsamum

Arab.

Balsami  
succedanea  
Receptiorum

Balsamum Paulanias in Bœotia *Palsamum* proferri vult: *Καλαμύρι* Græcis à quo reliquarum ferè Linguarum nomenclaturæ detorta videntur. Scrap. *Belesén* vel *Belsina*, qui ex Dioscor. dicit arbores esse magnitudinis Grani viridis & sicuti: ab *ris Bocates*. *Belsan* Auic. Inuenimus & *Balsam* Arab. dici. Alp. tradantiquis Arabiæ medicis *Baleffam* dictum.

Germ. Balsam. Ital. Balsamo. Gal. Baume. Hermol. liquorem *Oleum Balsaminum* vocat, quam rectè ipse videt.

Dicta sunt supra Balsami, *αἰθέρια ἔλαια* ex Dioscor. Plin. & aliis: nunc & recentiorum quorundam de ea re sententiam audiamus, antequam transeamus ad vires. Etsi enim ex supra scriptis satique inculcatis notis Balsamum nosse, fortè haud videatur difficile, attamen cognitum habere longè difficillimum esse certum est. Opera itaque dan-

da accuratissima, quò eius vires quàm exploratissimas habeamus, vt quando non licet illo frui, saltem bonitate proximis & simili facultate præditum vtamur.

Tribus huius plantæ partibus, tria succedanea est medicata posteritas. Liqueoris namque loco sua Balsama (quæ vocant) vnguinâque vulneraria nostri Barbari in Thesauris habere, quorum mirificæ vires lites & experimentis prodita sunt. Quidam Ol. Terebinth. vel Laurinum, vel Gummi hederæ substituant, vt legitur in quodam incerti auctoris libello, quem Sepalsarii. Quid pro quo nuncupant. Syluius Placoto. Borgarucus, Lacuna, Monachi, Lobel. Myrrham statim substituant, id est, Myrrhæ pinguis sima expressa liquamētum, quod quidem nobis, si ad Myrrhæ facultates quis respiciat non displicet. Alii substituendum malunt Sytracis electæ liquorem. Verum & ea ipsa rara habetur hodie electa, pura, nec commixta: alioqui non improbaremus. Antidotarium Romanum Oleum & feminibus Citri substituit, quod improbare non possumus, præsertim ad venena in theriaca: alioqui si de vulneribus iudicium fiat, aliter statuendum. Matthiol. maullt supponere Ol. Myrsicæ nucis, vel Sytracum, quàm Terebinthinum vel Laurinum. Colleg. Florent. Cordus, Placotomus, Borgar. Antid. Rom. Ol. Garryophyllorum: Medici præsertim Romani expressè dicunt Ol. ex Gaioph. non multum distare à Balsamo: quorum sententiam tamen improbant Pen. & Lob. ob nimium eius feruorem. Cordus vult Ol. Cinnam. similes virtutes esse Balsamo: quod ob suam acrimoniam oculis nequitiam conuenire videtur. Placor. speciatim Ol. Iuniper. candidum, quod & ipsum in quibusdam nostro calculo admitti possit. At Terebinthi è pullulantibus botris atque flagellis tempore verno laticem limpidissimum, odoratissimum, non parum tenacem emixisse se profitentur Pen. & Lob. qui digerendo glutinando, dolorémque mulcendo, vt illi tradit, omnia quæ Opobalsamo insunt, conferre videatur. Quod non modò doctiorum, sed & Chirurgorum consensus secutus est. Nullum enim videre est ex illis vnguinibus, quod vitium præstantia nomen Balsami meruerit, cui non sit admixta Terebinthina vulgata: Quid putas futurum, si genuinum Terebinthi liquorem admiscuissent? Eâ de causa nullum præstantius succedaneum iidem arbitrantur, cuius omnes partes omnibus respondeant paribus, liquori, semini, quàm Terebinthum genuinum. Matthiol. & qui suum Garryophyllorum, Nucis Myrsicæ, aut Cinnamomi oleum, huic liquori præferunt, suauitati & sapori plus quàm optatis facultatibus deferunt. Hæc namque tamet si eximios fundant liquores: tamen nec Dioscor. nota, nec venenis aut Theriacis comparata fuere. Et præterquam quòd plerumque vel ferant vel ferunt ignis gmpyrcumate, præsertim ab ignaris parata: tamen si vel probè sint confecta, acriora sunt, quàm ad tale institutum par sit, idèoque intemperiem feruidam imprimere nata. Oculorum verò hebeti aciei [quod à Balsamo genuino postulat] si quis admouere auit, ne ille hominem ex luscioso cæcum faciat. Myrsiticum verò oleum, laxando & inquinando, nec foris vulneribus glutinandis, nec stomachi viribus colligerdis idoneum est, nec quidquam Balsamo simile habet. Alii, teste Lob. Coppam-Iuam Indorum Balsami loco obtudunt: qualem & nos aliquando vidimus magnis laudibus celebratum pro Balsami genere Ill. Duc. Wirt. quod nominabant *Azaida di Capo vna*.

Carpog.



Carpobalsamo cubebas substituit Cerdus, & Matthiol. qui plerisque rei medicæ studiosos se- cum sentire confirmat: addit præterea rationis lo- co, quod si ea mandantur, dentibusque conficiantur, mordent gustum, feruentes in ore percipiuntur, & aromatis non modicum resipiunt, quas nimirum qualitates Balsami fructui inesse Diosc. testatur. Eiusdem sententiæ sunt Borgatucus, Placotomus & Adolphus in multis locis, & quidam alii. Fuchsius Galeno utique illo tributo tractato, Quid pro quo, dicto, deceptus nimirum tribuēs, Carpobalsami loco Leucoii radicem substituenda censet. Sed ad rem ipsi respiciendum fuit, non ad putati auctoris testimonium, & deprehendisse nullis qualitatibus præditam eam radicem, quæ vel minimo ad Carpobalsamum legitimum accedere possit, suamque illam opinionem nec Gal. genuinis libris, nec vilius probati auctoris cal- culo comprobatur. Garyophyllos recipiunt, Adolphus, Cord. Placot. Borg. & Colleg. Flor. Carda- momum Cord. Borg. Placot. Grana Paradisi, Col- leg. Flor. Fructum Hederae, Tract. quod pro quo. Xylobalsamum equali pondere, idem. Grana lu- niperi, Medici Veneti, ut testatur Alpinus, quos taxat & reprehensione dignos censet. Pena & Lob. qui in ea sunt opinione, Carpobalsamum quod in Offic. prostat neutiquam esse fructus Bal- sami, imò cuiusnam plantæ, incertum esse, tancidū, vietum, exoleūti, in odorum, minime Capobalsami loco usurpari debere: quin potius huius penuria semen Terebinthi vel Lentisci immaturi eximias vires, omnes Carpobalsami facultates, & dotes, vi si quod aliud, explere ipsis videtur. Prosper Alp- tamen vulgaria femina pro vulgari falso Carpo- balsamo à multis recepta, quorum ad nos singu- lis annis magna copia aduehitur, verum esse Anti- quorum Carpobalsamum se iudice affirmandum suadet. Idem tradit Pseudocarpobalsamum, Car- pobalsamo admodum magnitudine, colore, figu- raque simile esse: differe tamen à vero, quia eo sit oblongius & ex medietate tantum folliculo con- tectum sit: Illudque esse suspicatur quod olim Dioscor. tempore ex Petra oppido Arabiæ præ Carpobalsamo asportabatur, & quo verum Car- pobalsamum adulterabatur, si Piperis saporem præ se ferret.

Campefius in suo speculo pharmaceutico aper- te dicit nec Carpobalsamum nec Xylobalsamum inueniri Lugduni, Antuerpiæ, Medinæ campī, au- Francofurti. Quod si ita est, & quis eo uti velit, utique de antiballo meno sollicitus esse debet ho- no, & viribus quàm proximè accedente. Testa- tur tamen Alpinus virgas apud se adseruatas, cum iis quæ apud Venetos Pharmacopolas sunt, ead- em esse, modico tamen tempore omni odore & sapore exui, ut & hac de causa succedaneo opus sit. Perperam autem quidam Nerio Alpino pro eo videntur, ut tradit Gesn. Et Fuchsius nihilo prudentius radicē Leucoii ex tractatu Quid pro quo, qui & eidem lignum Hederae supponit. Acorum verum Colleg. Colon. Macim Colleg. Florent. Macerem Fernel. quia Xylobalsamum, ut apud eundem annotat Plantius, Gallis minimè suppe- dit. Maceris & Cypriani a part. æq. Adol. Occo: qui & alibi Cyperum solam sufficit, sicut & Colleg. Flor. Agallochum Matth. Cubebas Adol. Occo & Bapt. Montanus, ut testatur Cronemb. Cy- perum rotundum maiorem & minorem in Italiâ ferunt ad Theriacæ compositionem. Aptissimum enim Xylobalsami succedaneum iam diu Patavi- na & Veneta Collegia sanxerunt & usurparunt, tametsi ex Pen. & Lob. sententiâ commodiora ho-

die suffici possent. Cùmque ex illorum sententiâ, Lignum quod Xylobalsamum dicunt officinæ, Lentisci sint furculi, plerumque carioli, tamen neuitquam contemnendi: modò recentes sint, nec odorem amiserint: gratissimus namque pulvis in- tus & foris, stomacho, propter naturæ amicū temperamentum: cuius argumentum faciunt de- tistica palia, quæ aromatica & moderata astrictione & calefactione dentes, gingiuaque perpur- gant, roborant & mulcent. Idcircoque eorum multæ myriades parantur à miseris mancipiis. qui in tristemibus Ligurum sub neruo vitam degunt. Pseudoxylobalsami huius magna copia paucò ære parari potest ex Italia & Gallia Narbonensi.

Efficacissima liquoris vires inest, ut qui maximè ca- lesfacit. Quæ pupillis tenebras offundunt exter- get: itemque vulnæ perfictionibus medetur. cum cerato rosaceo adpositus. Menfes quoque secun- dis, & fetus extrahit: rigores illitu soluit, sordida- que vlcera expurgat. Quin & potus concoctio- nem iuuat, urinæque ciet: agrè spirantibus con- uenit, nec non & iis qui aconitum hauserunt, si cū lacte exhibeatur, itē nque à vipera demorsis. Mi- scetur & acopis, malagmatis & antidotis. Ac in Vniuersum efficacissimam vim habet Balsami li- quor: proximam hunc fructus: minimam verò Li- gnum. Fructus potui datus conuenit Pleuriticis, peripneumoniacis, tussientibus, ischiadicis, con- uulsiuibus, vertiginosis, Orthopnoicis, torminosis, dfficultate mientibus, & à vipera, venenatisque aliis animalibus demorsis. Porro & ad muliebris suffitus accommodatur: itē nque decoctus in fessu vuluam aperit, humiditatē nque exhaurit. Li- gnum eadem cum fructu vires habet, attamen minores: ex aqua decoctum & potum cruditati- bus, torminibus, virulentorum moribus, conuul- sique opitulatur. Urinas quoque cit, & capitis vulneribus cum fride sicca conuenit: squamas e- diam passim extrahit. Denique ad vnguentorum etiam spissamenta editur. Ad capitis dolores, & suffusiones oculorum incipientes, & habitudinē nirsicē conferre tradit Strabo, eoque pretiosius esse, quod in Hierocontio soldm tractu nascatur.

Plin. Balsami vires tradens inter olea Balsami- um oleum vocat obliuiose, quod apertissimè prius in eius historia succum esse scripserat, ut re- uera est, vel Dalechamp. quoque teste. Sic autem Plin. tradit de vitibus. Balsaminum longè pretio- sissimum omnium, (oleorum) ut in vnguentis di- ximus contra omnes serpentes efficax. Oculo- rum claritati plurimum confert, caliginem discuti- uit. Item dispncas, collectiones omnes, duritiâ- que lenit. Sanguinem densari prohibet, vlcera purgat: autibus, capitis doloribus, tremulis, spa- sificis ruptis perquam vtile. Aduersatur Aconito ex lacte potum. Febres cum horrore venientes peruncis leuiiores facit. Utendum tamen modi- cè, quoniam adurit, augētque vitia non seruatō temperamento.

Balsamum, auctore Gal. desiccatur & excalescit secundo excessu: est autem & tenuium partium, ad cō vt odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorū etiam partium est quàm ipsa planta, non tamen adeo calidus veluti quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus eius persimilis facul- tatis est, cæterum longè in subtilitate partium in- ferior. Videtur autem his verbis Galenus Diosc. tacite reprehendere, qui cred. dit Balsamum præsentissimas & primarias facultates ad calfa- ciendum habere, deceptus partium tenuitate, vt euidenter Gal. testatur. Diosc. tamen Plin. quoq; secutus est, ut liquet ex vtriusq; verbis adductis.

Lentisci furculi.

Balsamū vires & a-  
sus ex  
Dioscor.  
Oculi.  
Vulua.  
Menfes.  
Rigor.  
Vlcera.  
Vrina.  
Asthma.  
Aduersus  
Aconitum  
Ex mor-  
Superarum.  
Fructus  
vires  
Pleuritis  
Etc.

Ligni vrus

Plin. 306

Adu. Sen-  
pentes  
Caligo  
cul  
Dyspnœa.  
Tumores.  
Sanguis resal-  
uens  
Vlcera  
Adu. Aco-  
nium  
Horroris.  
Cautio.  
Temperatū  
mentum.

Balsami felicissimum successum vidisse testatur Scal. ad ingens vulnus cuiusdam equitis in inguine: periculosissimūque vulnus & maximū, cuius cicatrix quam sub oculo laevo habebat, vix ostendebat vestigia, non alia, quā Balsami sibi ab Heroīna misso, auxilio sanatum scribit. Lob. quoque experimentum siue mirandum periculum factum esse tradit Opobalsami in quodam nobili, ore sonipedia vngula fauciato: momento & breui tempore restituito, his tantū peruncto aut inposito.

Ceterū nullum est medicamentum, vt refert Alpinus, quo magis ac frequentius Aegyptii medendo vtantur, quā Opobalsamum, quod illi ad omnes serē morbos ac symptomata adhibent, ad eosque maximē qui vel ex simplici intemperie frigida & humida, vel frigidis humidisque succis, vel à venenis concitantur. Summa cum laude eo vtuntur ad omnia vulnera, quo mirificē curantur, quod experientia in Petro Mariano Veneto mercatore, in capite à Turcis nocte quāpiam vsque ad os pessimē signis vulnerato, comprobatur: Balsamo siquidem inuncta ea vulnera, per diem tantū, serē omnino coaluerunt, & eo quā pau-  
*Balsami  
Suis apud  
Aegyptios*  
*Ad intem-  
peries.*  
*Vulnera.*

natus est. Vtuntur etiam ipso ad vlcera sordida, quae eo mundantur atque sanantur. In venenatis & demoritis à serpentibus, atque ictis à scorpionibus, tum epotum, tum illitum maximē iuuat. In peste, vt ab eius contagio defendantur, nihil maius habent, quo vitius & tutius vtantur, singulis diebus eius semidrachmam deglutientes. Multa quoque etiam putridae febres eo epoto illi sanant, largiore ab ipso erumpente sudore. In chronicis febribus à crudis frigidisque humoribus, ob-  
*Vlcera.*  
*Morsus  
et ictus Ven-  
enarum.*  
*Febres.*  
*Obstruc-  
tiones.*  
*Dysit.*

structionibusque viscerum, nihil vitius ac prestantius experitur, quā Opobalsami binos scrupulos vel drachmam par os quotidie exhibere, liberat enim valenter viscera ab obstructionibus, calorēque naturalem fouendo, crudos humores concoquit ac digerit: hincque eius vsus ad omnes frigidos morbos ac symptomata apud eos est frequentissimus. Oculis visum perditum, atque auribus auditum, instillatum restituit, auriumque dolores sanat. Praeterea ad convulsos ex humiditate ac frigiditate, ad vertiginosos, epilepticos: resolutos, trementes, ad tussimque ex frigido humore, orthopnoeam & omnem spirandi difficultatem, pulmonum fluxiones, humiditates & dolores, ad stomachi frigiditatem, cruditates, atque ad omnes flatuum molestias, ad uteri frigidam humidamque intemperiem, ad praefocationes, dolores, sterilitatem, albos fluores, ad interceptam vrinam ex frigiditate, flatu, vel lapidibus, ad calculosque in renibus valenter frangendos ac abstergendos, vsus Opobalsami est apud omnes illos populos notissimus, & ad haec omnia mala praestantissimum illi auxilium experitur.

Mulieres verò Aegyptiae steriles eo tum supposito, tum epoto, tum sufflato, feliciore successu saepe ad remouendam sterilitatem vtuntur.

Non minori in vsu etiam habent ad pulchram faciem afficiendam, quando eo ipsa illita à rugis defendatur. Ferunt etiam aliquas ad conseruandam faciei pulchritudinem ac iuuentutem non inutiliter vsas fuisse. Balsamanda enim mulier (vt sic loquar) in balneo calidum in primis moratur, quousque multum incaluerit, quo tempore cutim Opobalsamo multoties copiose illinit, à qua liniuione per horam & amplius in balneo valde calido, quosque cutis recte Opobalsamo imbibatur & arescat, morata, balneum

egreditur, solitūque munia exercet, permanetque sic facie atque pectore Opobalsamo inunctis, per tres ad minus dies, in quibus nunquam peruncta cutim abluit vel mundat, ac tertia die abinunctione rursum in balneum eodem iam dicto modo se conserit, faciemque ac pectus valde calefactum copioso Opobalsamo multoties perungit: aliquae sunt, quae vel decies vno die cutim inungunt, obseruantes commodum interuallum, quo recte cutis peruncta totum Opobalsamum imbibat, atque paululum arescat, vt promptius succum intimius haurire queat: quam Opobalsami inunctione hoc modo praestitam, multoties moriuntur, saltem diebus triginta, in quibus cutem nunquam lauant vel mundant, à quibus quidem & etiam amplius sic cute Opobalsamo inuncta quiescent, quosque nihil liquoris ostendat, probeque ab eo siccata fuerit, quo tempore aqua fabarum stillantia, prius ad eas partes praemissa modica olei Amygdalarum amararum inunctione se lauant, cutemque multis diebus abstergunt.

Semen atque virgarum quoque recentum vsus apud illos est familiaris. Eis siquidem ad omnia serē, ad quae Opobalsamo vtuntur: praestitumque ad robur stomacho conciliandum, eius enim puluerem cum decocto Spicae Nardi ad binas drachmas exhibent, idem praestat decoctum, quo maximē calorem naturalem fouent, augment & roborant. Vtuntur & ipso in spirandi difficultate, tussi frigida atque aliis morbis à frigiditate nascentibus. Vsum frequentissimum habet pulvis & decoctum ad humiditates veteri exsiccandas, cuiusque calorem viuificandum. Suffitum ex his frequentant ad morbos omnes veteri à causa frigida concitatos. Eodem modo & ligni vsus est. Succus enim, semina, ac lignum, isdem facultatibus donata sunt, ad eademque vsum habent. Veruntamen Opobalsamum efficacius potest, eoque minus Carpobalsamum, omniumque minimē Xylobalsamum.

#### OPOBALSAMVM SOLIDVM.

CAP. XXXVII.

Illustrissimū Cels. Wittembauri D. Paludanū Opobalsami solidi nomine, quod ita est solida substantia, vt flexioni interim non resistat, pellicula, & digitis ductili, non friabili vt Colophonia, quam colore rutile egregiē refert, vniiformi, odore suauī Benioini, quem fragrantiorē, cum adoleatur, adspirat narius, nec leuiter flammam concipit: sub dentibus lentescit, & is inhaerescit. Fortē hoc idem est cum Lobelii Opobalsamo concreto de quo capite praecedenti.

#### BALSAMVM CERTARVM QVA-

RVNDAM PLANTARVM, QVAS  
Copaibas vocant.


CAP. XXXVIII.

IN Brasilia [vt refert Mass. Indic. nauig.] certis est plantis, quas vulgō Copaibas vocant, inciso per aestatem cortice, in modum Balsami liquor suauissimi odoris emanat: cui, cum ad alios mortalium vsus, tum ad curanda vulnera & cicatrices tollendas mirificam esse perhibent vim. Ea plantae cernuntur affricu animalium attrita, quae à serpentibus venenatis, aut à feris icta, ad remediū illud ipso naturae instinctu se conferunt.

A VEL.



AVELLANA INDICA MEHEMBETHENE CORTVS.  
CAP. XXXIX.



**A** Quat magnitudi-  
ne parvam In-  
glandem, formā  
ferē ovali, in  
cuius basi tri-  
quetrum patet  
foramen, produ-  
cens ex singulis  
angulis costam,  
ita ut præter ter-  
nas illas costas  
totidem alia al-  
terno situ per  
longum concē-  
dant, putamen  
durum, crassum,  
nonnihil inæ-  
quale ex cinereo  
flavescente: quo  
effracto, tres  
cellulæ sese o-

stentant nucleum continentes oblongum, al-  
bum, ac dulce, nisi Clusio credimus.

Hæc verò eundem fructum fortè Matthiol. in  
Comment. ad Diosc. Gal. Lat. & Ital. cum magnis  
figuris sic describit: *Auellana superior* [de qua  
antè egimus] longè minor à Cl. Cortuso mihi  
Patauro missa, quæ suo tegumento exempta,  
quod læue mollè quæ est, colore subpallido, nec  
folio Palmæ crassius, glandis acuminatæ aut My-  
robalani flavi ferè figura, duro putamine, colore  
vulgaris *Auellanæ*, oblongo intus nucleo, pumi-  
lam *Amygdalanti* referens, ut ex eius hinc imagi-  
ne omnibus patiam fiet. Sed non aperte agit no-  
bitum, Matthiol. quando nos ad icones remit-  
tit. Nam cum tres vel quatuor diuersos fructus  
in eadem præponat tabula, duos verò tantum de-  
scribat, reliquosque ne verbo quidem memi-  
nerit: coniectura potius licet allequi, quam certò  
scire quam intelligat.

In Epitome ait, secundum & tertium genus ex  
eorum imaginibus faciliè intelligi posse. Nimirum  
sic botanica studiosis, præsertim in Exoticis non  
versatis, egregiè prospectum. Quicquid sit, per  
*Auellanam* eius alteram hanc ipsam intelligimus,  
quamvis minus accuratè ab eo describatur.

C. Bauh. apud Matthiol. adponit iconem qua-  
lem habet Clus. & Lob. pro *Mehembethene*: & Nucis  
Ind. nomine eandem tabellā, quæ villosum habet  
inuolutum, cuius tamen Matthiol. ne verbulo  
quidem meminit: ipse verò (Casp. Bauh.) eandē  
faciens cum *Mehembethene*, (à qua Clus. diuersam  
fecit nec describit tamen. Ita tenebræ obducun-  
tur nebulis.

Clus. in edit. 4. Garziz. de arom. *Auellana* Ind.  
à D. Cortuso missa nomine *Mehembethene*, quā-  
vis non admodum eius descriptioni conveniat,  
& potius eorum sententiam amplectendam cen-  
sest, qui inter *Vnguentarias* referunt: pollicem  
transuersum longam dicit, formā triangulari, du-  
ram & ligneo putamine, fractam tres habere cel-  
lulas, in quibus nucleos oblongos, albos dulcēq;  
inueniatur. Et placent quidem icones à Clus. pro-  
positæ: at non placet eius vel eorum opinio, qui  
ad Nucem *Vnguent.* referendam censent. Sanè in  
paucis cōuenit cum eadem admodū hic fructus,  
& tres habet cavitates, quas in illo non habes.

Tom. I.

*Mehembethene* siue *Auell. Ind.* varietas Lob. qui  
se inter Nuces Moschatas Antuerpiæ aliquando  
repperisse testatur eandem, quam pro *Mehembethene*  
Cortulus misit. Colore, [addit] figura & ma-  
gnitudine Nucem Myristicam refert, sed triangu-  
laris forma, osseo & prædure cortice, Nuculæ In-  
dicæ nostræ: ac effracta tres cellulas habet, vnā  
conspicuā dulcem nucleum claudente. Caterum  
Lob. eandem habet iconem cum Clus. à quo ta-  
men in eo diffidet quòd *Auellanam* priorem exi-  
guam villosa inuolutura non distinguit aut sepa-  
rat à *Mehembethene*.

Tabern. in icon. & Hist. *Mehembethene* vocat  
*Indianisq; baselnus*. Hist. Lugd. Matth. *Auellana*  
Ind. 2. Item Clus. *Auell. Ind.* 3. Quomodo autem  
inquit, *Mehembethene* nomen illi tribui possit, non  
video, cum Avic. de *Mehembethene* tractans nihil  
aliud, quàm Græcorum *Lathyrum* describat. At  
eadem Hist. Lugd. ne *diuina* figurarum destituta  
videretur, duas posuit, vnā ex Matth. alteram  
ex Clus.

Anno 1608. Illustr. nostra Princeps dedit octo  
fructus *Auellanæ Mehembethene* Cortuso di-  
cæ, magnitudine, longitudinēque differentes,  
omnibus triquetrum foramen, vnus à nobis per  
medium sectus planè respondet iconi Clusii, tres  
insunt cavitates, duæ minores vacuæ, in maiori  
nucleus inuolutus, tenui, rufa tunica, albus, gra-  
to sapore cum quadam amaritudine.

AVELLANÆ INDIAE MEHEMBETHENE VALDE SIMILIS FRUCTVS.

Describe.

**V**idere est apud Clus. Exot. hb. 2. cap. 25. In-  
ter aromatum Tripoli allatorum purgamen-  
ta inuentus septimus fructus cum 1. hancis quif.  
quiliis, nucis vnguentariæ genus, à nonnullis  
*Mehembethene* nuncupatum. Erat enim figura or-  
biculata, cortice spadicei coloris, eoque leui con-  
stans, atque veluti in binas partes secto. An verò  
alio cortice, siue inuolutura testā fuerit hæc nux  
(ut verisimile est, me latet: alia tamen addita  
erat nux crassa, sed paulò oblongior, neque ad-  
dèd spadicei coloris, quæ mediā ex parte testā e-  
rat suo inuolutura nigro & rugoso, cui petiolus  
adhuc inhærebat, quo in ramo firmata fuerat.

AVELLANA IND. PECULIARIS CAMER.

Describe.



\*

**D**E hac *Auellana*  
hoc tantum ha-  
bemus apud  
Matth. in Hist.  
Germ. & in Epi-  
tome per Cam-  
mer. renouatis,  
quod hic pro *Auellanæ* Indicæ  
peculiari specie  
pingit, quam ta-  
men non des-  
cribit, quamvis  
à Matth. *Auell.*  
2. diuersam face-  
re videatur, cu-  
ius iconem omi-  
sit. Si quid ta-  
men ex iconē  
sola coniectari

sit integrū, suspicamus differentiam quandā *Auell.*  
Indicæ *Mehembethene* dictæ esse, iam modò de-  
scriptæ.

Gc 4

AVELL. IND. VILLOSA, FORA-  
MINATA.

Descriptio

**A**vellana Indica, tribus lateribus elatioribus, atque itidem tribus foraminum vestigiis, uti Nux Indica seu Coccus conspicua, villosa quodam involacro, veluti *Fausel*, ferè recta, nucleum continens dulcem, tenui candicante membrana inclusum Clus. Cui apud Garciam de arom. Auellana prior exigua: & de peregr. stirp. Prima Nux annot. hist. Arom. dicitur.

Mehembethene sue Auell. Indicæ varietas Lob. qui eandem cum Clus. iconem habet, verum non separat à *Mehembethene* ut Clus. Sed videtur eadem specie facere, varietate tantum distinctam.

C. Fugib.

Casp. Bauh. iconem ponit nomine Nuculæ Indicæ, nulla addita descriptione, cuius tamen non meminerat Matthioli, præterea eandem facit cum *Mehembethene* contra mentem Clus. & Tabern. qui Nuculam Indicam quoque & Indianis *Vibis* lin vocans, non citato Clusio addit, tria habere foramina, rectam esse cortice villosa, *Fauseli* ferè modo. Nec tamen negamus & ipsi hanc Nuculam seu Auell. Indicam, fortè speciem aut differentiam præcedentis *Mehembethene* Cortusi esse posse.

AVELL. MEHEMBETHENE CORTUSI  
SPECIES ALIA: NVDA, ET VESTITA VILLO.

Descriptio

Fausel.



arget, & à tanto viro nomine diverso nullus esset,

**A**ntè à nobis descripto fructu speciosior, & altero ferè tantò crassior, minusque longum dono ad nos misit, vir sapientià, maximisque doctrinis clarus Hero. Saxonia Med. Patavinus Primarius, sub nomine, *Fausel* Arabum, & nucis Indicæ paruz. Qui præter eas notas, quas superius descriptus habet, pulchre etiam tripartitus est, median-tibus tribus costis, quæ in imo & summo coeunt, com-munem triangulum superne comprehendentes, cui area albes-cens, triquetru-que foramen in medio est: reliqua facie corporis ru-gosa, eo ferè modo, quo Nux moschata. Dignum pictura censui-mus hunc fructum, quoddam prioribus non esset pi-ctus, ab iis tamen non parum eua-

quale sine dubio haud temerè ei imposuist

Hunc eundem suspicamus fructum quem apud Cl. D. Platerum observavimus, cuius figuram quoque depictam damus. Magnitudine & figura prædicto respondet, superius quoque foramen triangulare habes sed villis ex parte tectum. Nam totus corticosis ac lentis segmentis parvis; putamini tenaciter adherentibus obductus est, in modum ferè Auell. Ind. Clus. de qua c. præced. Eadem segmenta à trianguli foraminati veluti centro facta exortu, & in ambitu fructum universum complectentes, parte opposita in scopam & veluti caudam coeunt.

Hic fructus pro magnitudine admodum ponderosus, ac si ossesus esset, aut lapideus, color fus-cus, aut ex Cinereo nigricans, concussus strepi-tat, argumento intus contenti nucleï. At quia no-ster non fuit, aperire non decuit. Lectori con-siderandum relinquimus, in quibus & quantùm ab Auell. Mehembethene superius descripta dif-crepet. In secunda tabella pinguntur etiam Glo-buli Saponarii.

NVX, SIVE OSSICVLVM, FRV-  
CTVS EX PALMARVM GENERE.

**N**Vx aliqua De Clus. Exot. l. 2 cap. 14. siue Ossiculum fructus ex Palmarum gene-re, à Petro Gareto, cui villi, quillam vestiebant, adempti fuerant, nam daldè terla & po-lita erat, multif-que venis nigris, à summo ad imum distincta, præfer-tim iis, quæ à tri-bus veluti umbili-cis æquali prope-modum spatio ab inuicem discretis originem duce-bant, & magnam venustatem nuci



adferebant: alioqui nux binas vncias longa erat, eius ambitus tres cum semisse continebat, umbili-ci autem penè vnciam ab inuicem distabant: du-ro cortice nux illa erat prædita: & nucleum conti-nere, ex motu strepitum ciente, manifestum erat.

FRVCTVS IVGLANDIS FERÈ  
MAGNITVDINE, DVRISSIMVS, INDIS  
Carairi sapore nucis moschatæ.

CAP. XXXX.

**A**Nno 1608. cum essemus Stutzgardia, Mercator quidam, cui nomen Claudius Cintre, dedit nobis fructum, magnitudinis parvè iuglan-dis, non ponderosum, inæqualem valdè; tuni-ca tectum cinerea, sub qua alter duriss. crassitu-dinis dorli cultri, niger vbi effractus; non facile frangitur, plenus est, nucleio aut medulla sue pulpa flavescente, oleosa, per medium fissa, sa-poris grati & nucis moschatæ, miuoris tamen.



Idem fructus, ni fallimur, nobis datus ab Ill. nostra Principe, qui speciosior, maior, qui bene exprimitur icone nostra desumpta ex Clusio, is etiam inæqualis, vna parte tamen magis gibberosa, altera depressa. Cor penè exprimit hic fructus, prout vulgò pingitur, cortice exteriore minùs cinereo, quo abrafo, subest niger, durus: Eum non aperimus. De prædictis fructibus Clus. in libello de peregrinis, vbi icon sub numero II. scribit. Fructus alter peregrinus, Nucis Juglandis ferè magnitudine est, extrema parte latiuculus, totus rugosus, atque vt Nucis Juglandis putamen



inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus. Levis est & minimè ponderosus, tametsi admodum solidus sit, & faxea duritie præditus, nec minùs in aqua subfidat, quàm lapis. Confractus crasso durissimòque cortice constare, deprehenditur, & nucleum candidum succulentum, grati saporis, iucundique

odoris, oleum ferè Macis referentis, continere, in binas partes sectum & tenui candidaque membranâ diuisum, alia insuper paulò crassiore firmiorèque inclusum. Eiusmodi ante plurimos annos Antuerpiæ inter aromata inuentos, cum repurgarentur, meminì.

Addit præterea: Anno 1597. inter aromata, quæ Batavi ex Iaua referebant, similes multò recentiores conspicebam, quos Abdala Camiri, adpellari dicebat.

Et c. 15. Inter nuces Myristicas repertus fuerat Sextus, quem ab Indis Camiri appellari intelligebam, vncialis magnitudinis, nuci Juglandi, suo illo externo viridi cortice exempto, non dissimilis, inæqualis, summâ parte latior, in summa in obtusum mucronem propemodum desinens, putamine satis crasso faxea duritie præditus, nucleum continente album, amygdalæ penè sapore. Alio fructu, siue externo cortice operto fuisse videbatur, quia depressioribus putaminis locis cineream quandam materiam adhuc in hærentem retinebat. Sed & alios similes inter aromata non semel repertos habui. Atque anno M.D.C. V. num inter plures à Parduino accipiebam, tenui, fragilique, & in binas partes sectili putamine inclusum, cuius suprema pars mucronata in vnum non coibat, aut claudabatur, sed aperta erat, atque supinâ parte plana fidem faciebat, binos fructus coniunctim nasci, vel etiam ternos, è pediculo aliquo dependentes, quemadmodum apud nos Staphilodendri fructus. Eundem hunc fructum ex Clusio proponit Hist. Lugd. Tabernæ dicitur fructus peregrinus.

# NVX INDICA PVLCHRA, CUI VNGVIS ALBVS.

## CAP. XLI.

Cum fructibus Exot. Ill. C. Wirt. piz memoriz Descriptio Stutg. 1608. pulcher fructus, vnciam & semis longus, vnciam latus, compressus, niger, splendens, in suprema parte veluti vnguis albus, sô norus est: Cortex niger, mediocriter crassus, subest medulla alba, in iis saporem manifestum non animaduertimus, medullæ autem albæ subest fortè ossiculum, est enim sonorus, fructum aperire non sum ausus, quia referuat Illust. Principis.

# FRVCTVS PEREGRINVS OVA-TVS, SIMILIS LAPIDI IYDAICO.


## CAP. XLII.



Fructus peregrinus alter Clusio, libello de peregr. & Exot. l. 2. c. 3. oualis, Iudaico lapidi magnitudine par, & eius formam exceptis striis pulcherrimè exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, vt maiores nonnullæ gallæ, levis, & aquæ impolitus supernatans, duro putamine constans, ac nucleû continens. Nactum se ait Clus.

Londini eo delatum ex ea Nigritarum in Aphrica regione quæ vulgò Guineæ appellatur, & circiter quinque gradus ab æquatore distat.

# FRVCTVS FVSCVS, DVRSVS, STRIATVS, STREPITVM EDENS.



Mihi, inquit Descriptio Clusius Exot. l. 2. c. 24. fructum exoticum concedebat, vt describere possem Cl. V. Petrus Paauvius, primarius in Academia Lugduno Batava artis Medicæ, idemque Anatomes & simplicium medicamentorum Professor arque Academici horum Præfectus: Is paulò erat longior vnciâ, triù verò vnciarum

ambitum (quâ parte crassior) continebat, colore fusco præditus, durus, striatus in obtusum mucronem definens, in quo ossiculum vel nucleus inclusus, quia agitatus strepitû edebat. Icon. N<sup>o</sup>. I.

PYRIFORMIS FRUCTVS, RVGOSVS,  
NIGER, DVRO CORIO TECTVS.

Descrip.

**E**Xoticus fructus anno 1601. ex Orientali India aductus auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 24. turbinatus, eratque pyri forma, binas vacias cum semisse longus, quatuor cum semisse eius ambitus, lævis tamen, rugosus, prorsus niger, adeò duro & tenaci corio tectus, licet non valdè denso, ut difficulter cultro, nisi malleoli vi adactò, aperire possem: apertum binas cellulas habere deprehendebam membrana quadam fusca & splendente distinctas, in quarum singulis nucleus bifariam diuisus, mediâ etiam intercurrente membranâ, quemadmodum ferè in nuce Iuglandæ: totus nucleus siquæ vetustate contraxerat, & initio quidè nullo manifesto sapore præditus videbatur, diutiusculè tamen in ore retentum quandam acrimoniam habere, & tandem fauces quodammodo vrere, componebam. Icon. N<sup>o</sup>. II.

PYRIFORMIS FRUCTVS, LÆVIS,  
SPADICEI COLORIS, FRAGILI  
cortice tectus.

Descriptio

**E**Xoticus fructus visus Amstelredami 1601. ex Orientali India aductus, binas etiam vacias cum semisse longus, cuius ambitus trium vnciarû, lævis totus, & spadicei cum cineraceo mixti coloris, in longum mucronem definens, fragili cortice constans, qui an alio operimento tectus fuerit, me latet, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 24. pulpam autem continebat nigram, in qua ossiculum latebat vnciâ magis longum, durum, cineracei ex fusco coloris, obtuso mucrone præditum, & summâ parte in vno latere veluti exsculptû, in quo haud dubiè nucleus, licet agitatus nullum sonitum ederet. Vtrumque hunc Amstelredami nanciscerbar. Icon. N<sup>o</sup>. III. in præcedenti tabella.

FICVIS SIMILIS FRUCTVS EXOTICVS.

CAP. XLIII.

Descriptio

**F**ructus, quem dono accepimus ab Illustriss. Ducissa Wirtemb. Ficum communè magnitud. & figurâ quodammodo repræsentaret, si non angulosus esset & supernè cordatus. Cortex exterior subflauus, fragilis quo decorticato alius subest crassus, durus, niger. Concussus non crepitat. Iniectus aquæ suo pondere sidit. Similem accepimus à D. Paludano, sed crusta cinerea obductum.

NVCVLA IND. LOB. ET PENÆ.

CAP. XLIV.

Descriptio

**N**uculam Indicam hanc, admodum fructu variam fortèque & sylvestrem esse suadent Nuculæ quas ex finibus Trogloditicæ Guinæ habemus: hæc vix magnam æquat Oliuam, corticò nucleo, oleaginoso, ac lapido, illi prorsus nuci

Indicæ similis, sed huic Nuculæ testa ossea. Adu. & ic. & hist. Belg. Icon integra magnam habet similitudinem cum Chamæriphe fructu.



\*

NVCVLA INDICA PECVLIARIS CAMER.

**D**e hac Nucula Indica peculiari Camerarii nihil habemus in præsentia quod scribamus præter nomenis enim iconè posuit in hist. Germ. Matt. in tabella Nucis Indicæ, asserens esse Nuculam Indicam particularem: Ein besunder Indische Nuss. In epit. Matt. folam exhibet iconem sub Nuce Indica: quam verò intelligat nescimus. Si non scripsisset Nuculam, suspicio esset, eum intelligere Nucem Ind. paruum cuius mentionem fecimus c. de Balsamo Peruviano. Conferatur etiâ cum nostra Nuce Ind. laruata. Est autem cum Avellana Indica peculiari Camerarii.

NVCVLA INDICA AB HERCVL. SAX.

XONIA MISSA.

CAP. XLV.

**M**agnificus vir Herc. Saxonia, Medicus nostri sæculi nulli secundus hanc misit Nuculam, hoc titulo: Cochiglio de Guigne. Vnciâ beuior est, semunciam vix lata, nigra, dura, modicè exterius arcuata, interius sinuata, phasoliâ modo, multis fissuris, seu lineis excavatis variè sparsis sulcata, quæ tamen omnes in tuberculum, parvum, umbilici speciem præferens, coeunt.

FRUCTVS PEREG. SYLCATVS.

CAP. XLVI.



**A**vellanæ domesticæ magnitudine est, oblongus, turgidus, niger, cætera lævis & politus, præterquam ad latera profundus sulcus, rectus, (quem à summo ad imû habet exaratus, lineola in medio tantillûm eminente) ubi nonnihil rugosus: parte opposita sulco respondet lævia quædam alterius cuiusdâ sulci vestigia impressa.



Is verò quem inter monumenta nostra Exotica feruamus, foramine per longum peruius est, ad cuius margines in altero finium apophysis parua est, in medio fissa: inanis est, & pullatus resonat, proculdubio aliquando pulpa plenus, vnde nacti sumus, non commercimus.

FRUCTVS OMNINO ROTVN-  
DVS, LVTEVS, NON SPLENDENS,  
cum suo frutice.

## CAP. XLVII.



**H**ic frutex est ex globulo ipsi appi-  
cto, hoc anno  
fato, cuius colo-  
ris verò ille fue-  
rit, me latet. Frutex quidem,  
qualis primo  
anno erat, sua  
magnitudine est  
depictus. Huic  
ex opposito la-  
tere idem folio-  
rum numerus,  
duobus scilicet  
inferioribus ra-  
mulis folia sunt  
duodecim, supe-  
rioribus autem  
tantum vnum.

In hoc frutice, anno 1608. Iunio nullam spinam obferuo in tranco, in foliis incipiunt apparere ali-  
quæ, sicuti etiam in principio caulis superante  
duos priores ramos. Sapor foliorum ingratius,  
cum aliqua amaritudine. Vidimus & alium simi-  
lem fruticem hoc anno natum, cui caulis glaber  
& folia priora penè eadem, cui tamen non tot foli-  
oli. In vno enim nouem, in altero decem. Sa-  
por idem, in supermitate nondum apparent fo-  
lia illa quatuor sibi inuicem opposita color virens  
& lucidus est. Huius Ill. Principissa apposuit fru-  
ctum planè luteum non splendens, sed aspe-  
rum, modicè cinctatè rotunditatis, cum tubenti  
ymbilico, qui minor reliquis. Anno 1608. obser-  
uavi globulorum luteorum plantas spinosas in  
horto Ill. nostræ Prin. Stuttg. rdiz.

FRUCTVS PEREG. TANQVAM  
TORNO ELABORATVS ARGENTEVS.

## CAP. XLVIII.

**T**rigidus ex rotundo aliquantum oblongus  
est, politus & lubricus laevis, coloris ar-  
gentei, circularibus lineis saturatoribus densè  
cinctus, durus, altero sine nonnihil turbinato,  
ymbilico luido, & in eo veluti pediculi vesti-  
gium ostendens, à quo vna aut altera linea de-  
mittitur, ad oppositam ferè basin pertingens,  
pregnans est, & concussu resonat. Hunc vidi-  
mus apud Illustissimam Ducissam VVirtemb.  
germinasse satum, produxisseque bina folia pin-  
nata, spem futuræ arboris facientia, vel ipso Ia-  
nuar. principio. Plantarat autem Exc. Celsit. fru-  
ctum ad aptum & prius in arena madida mace-  
ratum, in olla in hypocaufto posita, & quotidie

rigati iubeat. t.  
Eundem dono  
accepimus à D.  
D. Schuartz Ex.  
Cels. VVirtemb.  
Medico & col-  
lega nostro ho-  
norando.

Varietas

Videtur au-  
tem hic fructus  
nonnihil varia-  
re. Nam minùs  
tumidum & no-  
nihil angulosu  
accepimus ab  
eadem Excell.  
Celsitud. lineis  
prædictis caren-  
tem, nihilo mi-  
nùs tamen,  
quàm ille, den-  
sè cinctum zo-



nulis, quo secto ferrà per mediũ, depræhen-  
dimus corticem crassum satis, ac duritiæ ossæ,  
eiusdemque externam tantum faciem argenteam  
esse, internam substantiam subrutum. Nucleus  
qui intus latet pallidus est, duriusculus, gustu a-  
maro. Aquæ iniectus fundum petit.

C. Bauh. Milium Indicum vocat. Scimus & à  
quibusdam Italis Auallanam Indicam aliquam  
putari.

Milium  
Indicum.  
Auell. Ind.  
ca

FRUCTVS PEREG. TANQVAM  
TORNO ELABORATVS, FLAVVS.

Descriptio

**A**d figuram orbiculatam quamproximè ac-  
cedit, & vel tantillum ad oblongam vergit.  
Cortex lævis, colore flauescente, ac ferè melino,  
zonulis saturatoribus quidem, sed vix ac ne vix  
quidem conspicuis densè cinctus, perinde ac si  
arte torni ita factus esset. Parte extrema aut su-  
prema area quædam liuida aut subfusca conspici-  
tur, in cuius medium punctum, adhesionis vesti-  
gium. Ponderosus est, & aquæ immixtus, mergi-  
tur. Quia vnicum tantum habemus Ill. Ducissæ  
VVirt. munere aperire non libuit.

Eundem Clus. fructum peregr. 6. vocans in suo  
Libello, & Exot. lib. 2. cap. 29. describit, orbiculari  
ferè rotunditate, tanquam torno elaboratum,  
ovo passerino minorem, flauum omni ex parte,  
nisi in altera extremitate subfusca macula insigni-  
tus esset, solidum, lapideæque duritiæ, & in aqua  
subsidere.

Doctrinâ insignis vir & consultiſſimus Adfel-  
sor Cameræ Spirensis, Dominus Tengenagell. hæc  
de hoc fructu ad nos scribit: Nucleum hanc ali-  
quando confregi, intus habebat nucleum, colore  
& carne nucleum Pistachiam referentem, sed durio-  
rem & solidiorem & magis ad flauum colorem  
inclinantem, nulla albedine, totam nucleum sine  
villo tomento implet, sapore est adeò amaro, vt A-  
loës quoque amaritudinem vincat. Purgandi vim  
habere creditur.

Anno 1606. Gener noster Cherlerus ex Anglia  
& Belgio rediens, pulcherrimam hanc Nucleum  
maiores attulit, quàm nostra argentea vnciâ lon-  
giorem, non rotundam, vt est icona nostra ex  
Clusio, sed longam & oualem. Attulit etiam om-  
nino sphericam, minorem multò & icona Clu-  
siana non maiorem, coloris penè Aurantiorum  
non maturorum splendentem vmbone & macu-

Nucleus  
Maior  
Minor

la perura apparente, & tris etiam circularibus, minus euidenibus, in aquam iniecta, fidit.

FRUCTVS IND. TANQVAM TOR-  
NO ELABORATVS VIRIDIS.

**Descriptio.** Eiusdem generis cum argenteo iam descripto videtur. Sed color viridis est, & multis angulis & impressionibus inæqualis, ac si ab aliis vicinis fructibus compressus fuisset. Zonulis item saturationibus frequentibusque in orbem cinctus, vt nisi equalitas id caueret, torno & hunc elaboratum diceret. Concussu sonat: aquæ iniectus non mergitur, fortè quia non perfectè maturus (vnde fortasse adhuc viridis) nisi quis coniectari malit nimis esse exoletum.

Dubitat an idem sit cum eo quem Clus. depingit ac describit in sequenti lemmate: quia color diuersus tantum, cætera conuenire videntur. Eicosæ non damus, quia Clus. figura satis benè exprimit, si Zonulas addas.

FRUCTVS PEREG. CLVS. DVRS-  
SIMVS: ALIJSQVE SIMILIS.

CAP. XLIX.

**Descriptio** Alteri iam memorate non admodum dissimilis est Clus. libelli de peregr. Sed minor & Ponticam Nucem non excedens, tametsi Iuglandi ferè æquales videre meminerim) laevis, splendens, cinerei coloris, & saxeæ duritiæ præditus, licet in aquam demersus supernatet, inæqualis aliquantulum, & compressus vti Pisa quæ in eadem filiqua nata sese mutuo contigerunt.

Considerandum an ille fructus Cordi in Obseru. sylua huc possit referri, de quo sic ait: Fructus quidam globosus modicè, acuminatus, olivæ foris soliditatis, colore cineraceus, linea quadam à basi usque ad apicem spiræ modo circumvoluens. Norimbergæ vidi.

*Alia Gari-  
nas si non  
sæm.*

FRUCTVS PEREG. ORBICVLA-  
TVS CUSPIDATVS.

CAP. L.

**Descriptio**



**F**ructus hic, teste Clus. l. de peregr. & Exot. lib. 2. cap. 30. mediocrem Nucem auellanam non excedit, orbiculari ferè, nisi infirma parte paulo angustior in triangularem veluti cuspidem desineret, colore ex ruffo nigricante, tametsi levis, in aqua subsidens, & immo petens, duro crassoque putamine consistat, & nucleum candidum tenui

fusca membrana testum continet, Londini datu fuit, qui ex Guinea delatus erat. Terræ commissus non est natus. In hac imagine habetur etiam fructus peregrinus sphaericus penè, &c. itémque Fr. Ind. sphaericus granulatus, ac etiam Fr. Ind. Beruha dictus.

LAVRI BACCÆ SIMILIS  
FRUCTVS.

CAP. LI.



**E**st nobis fructus peregrinus, magnitudine & forma, quæ Baccæ Lauri maiusculæ, coloris nigricantis, lævis & nitida superficie, ex altero turbinato sine stylo retusum, quemadmodum in glandibus videre est, proferens: altero autem, tanquam ab acicula impressum vestigium habens, durus, & lapidi allisus cum sonitu resiliens. Eorum vni circa medium insculptus apparet

serobiculus, naturæ an arte nescio.

SAPONARIÆ SPHERVLÆ AR-  
BORIS FILICIFOLIÆ.

CAP. LII.



**F**ructus quos Saponarias sphaerulas vocant, dono accepimus à Cl. D. D. Fel. Platero Archiatro & Professi. Basil. sine nomine, cui ex Anglia aliquot erant missi. Gallæ sunt magnitudine, orbiculati, nigro corticoso atque rugoso quodam putamine contexti: sub quo alius cortex testaceus ac penè ossæus, verum non crassus, colore fusco splendens. Horum aliàs duo, aliàs, vt ex vestigiis patet, tres. Intus si fructus lateat exquisitè sphaericus, ossæo & crassiusculo cortice contextus, nigro, læui, & Ebeni politu in modum splendicante. Hic mediante fluorescente quodam tomento ab extimo putamine distinctus videtur. Nucleus qui in globulis est, pallet, Auellanae instar, oleagineus, & per



& per vetustatem rancidus, quem etiamnum alia cuius spadicea atque fungosa cingit, perinde atque Auellanae nucleos. Eicon utrumque ostendit, cum putamine cui parvus & abortivus adhæret, & nucleum exemptum, integrum atque dissectum.

Parata & iam sculpta icone, alium prædictis maiorem, nempe Iuglandis magnitudine accepimus missum ab insigni Botanico Regio D. Robino. Huius cortex spadiceus, pulposus quodammodo, lævis & splendicans, atque adeo per omnia, quam iam descripti, elegantior, minimè rugosus, pediculo crassiore, quippe qui perfectiorem maturitatem consecutus videatur. Sonitus in-  
tus latentem globulum faciliè prodit.

De his Quiedus in Hist. Ind. sic scribit. Sunt in Hispaniolæ insulis & continenti quædam arbores, quæ à precariis sphaerulis & à saponi nomen acceperunt, quarum folia Filicis folia non nihil referunt, licet minora sint. Celsæ sunt & formosæ fructum ferentes Auellanae aut Cerasii magnitudine, corolla insignitum minimè edulem, qui Sole exiccatus sub flavum colorem retinet: is officulum intus continet globulo bombardario æqualem, rotundum, nigrum: at si Solis radiis opponatur, subrußum, quod semen exiguum & amarum habet.

De fructu eadem penè tradit Monardes additque pumilam eorum esse arborem, incurvum magis quam rectam, veluti Ruscus, cuius folia Filici sunt similia. Sphaerulas adeo duras dicit, ut nisi malleo aut alia quapiam re solida & dura constringi nequeant.

Officulis perforatis sunt precatoria corollæ, non inelegantiores, quam si ex Ebena confectæ essent: immò his præstant, cum quod læviores sint, tum non adeo fragiles. Fructu integro cum aqua calida panni purgantur, perinde atque saponi. At si quis frequentius eo utatur, pannos vitæ & corrumpit. Semel duntaxat necessitatis causa eluisse sufficiat. Pulpa officulum ambiens ea est quæ saponis vicem præbet. Est verò is fructus, teste Monarde, adeo amarus, ut nullum quadrupes, aut avis, eum degustet. His vestes elute multò nitidiores redduntur, quam si saponis librari pondere elotæ forent: plurimam etenim spumam excitant, eosdemque effectus præbent quos saponi, paulatim liquefcentes donec solæ sphaerulæ superfuerint, quæ in precarias coronas perforatæ concinnantur, uti dictum.

Anno 1609. Gener Cherlerus secum deferbat ex Anglia vix existimo duos globulos simul iunctos eo modo, quo Clusius pingit Exot. lib. 2. cap. 16. minores paulò & non maiores, quam in icone nostra: de his autem ille scribit: Fructum accepimus à Jac. Gareto orbicularem & semuncialem, duro cortice testum instar fructus styracis, duplo tamen maiorem, colorisque minùs illo splendentis, & quasi fuliginosi, nucleum aliquem continentem, quia agiturus itreptum edebat.

color non adeo niger, sed fuscus potius in quo apparebant subflavescentes quædam venæ. Alio autem fructu comprehensum fuisse, & nucleum duntaxat fructus alacius esse, apparebat: nam sectus, versicolore substantiâ constare deprehendebatur, magnis albis maculis fuscæ substantiæ, & satis molli [ut quæ cultello sine difficultate incidi posset] permixtis.

## PLANTA GLOBVLORVM SAPONARIORVM.

### CAP. LIII.

**G**lobulorum saponariorum plantæ folia sunt Perlici arboris, quædam in duas partes dividuntur, alia in tres: saponem insignem non exprimitur. In horto Ill. Princ. nostræ Sturgardiæ, anno 1608 Iunii principio repolita hæc planta per Hyemem, triennalis erat, folia cæperat protrudere Aprili. Sphaerulas nobis dedit Illustriss. nostra Princeps.

## FRVCTVS RVGOSVS, PARVVS, GRAVIS ORBICVLATÆ PÆNE FIGURÆ, QUASI COMPRESSÆ.

### CAP. LIV.

**F**ructus exoticus minor, à Paludano datus, Descriptio  
gravis, orbiculatæ penè formæ, planioris tamen & quasi compressæ, rugosus, cineracei ferè coloris, durus & solidus, aquâ tamen mersus non subfidens. Eius nomen, ut etiam sequentis Paludano ignotum, nec ex qua Provincia utrumque accepisset significabat. Ex relatione Clusii Exot. lib. 2. c. 20.

## FRVCTVS PLANVS, FORMA CORDIS, CVM MVLTIS TVBERCVLIS.

### CAP. LV.

**F**ructus exot. à Paludano missus, alter minor, Descriptio  
[ait Clus. Exot. lib. 2. c. 20. planus, binas uncias longus, totidem latus, summâ parte, cordis [ut vulgò pingitur] formam quodammodo referens, multis tuberculis eminentibus inequalis, fusci coloris, lævis, aliquantulum cariosus, quia immaturus collectus fuisse videbatur, an aliquo putamine inclusus fuerit, me latet, quia nullum petioli à quo pependisset, vestigium in eo apparebat.

## FRVCTVS ORBICVLARIS, PERPOLITVS, MVCRONE GLANDIS.

### CAP. LVI.

**C**lus. Exot. lib. 2. c. 25. Fructus exoticus, orbicularis formæ, uncias pæne tres ambitu comprehendens, lævis & perpolitus, spadicei coloris, superna parte exiguo mucrone [veluti glandes] præditus, infernâ, vestigio quodam, cui  
D d

## NVX PVRGATRIX SIMILIS SPHERVLÆ SAPONARIÆ, FVSCA.

**M**ittebatur, inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 16. à Iacobo Gareto, officulum non valde dissimile saponariæ sphaerulæ, Nucis purgatricis appellatione: etenim orbicularem, ut ille, habebat formam, & eandem magnitudinem, huius tamen  
Tom. I.



M

FRUCTVS SVBLONGVS, COR-  
TICE DVRO, FVSCA TECTVS  
Epidermide.

CAP. LVII.

Descript.


FRuctus exoticus iam descripto orbiculari nō valdē dissimilis: paulō tamen minor & oblongior, tamen etiam reperitur eiusdem cum illo magnitudinis, corticem verō habebat durum, penē instar putaminis nucis ponticæ, fuscā tectū epidermide, internam autem partem cineracei coloris: aquā merus non subsidebat, sed innatabat, licet nucleum contineret auellana non minorem, cineraceum, rugosum ob vetustatem, non adē solidum vt primo intuitu apparebat, sed qui cultello facilē secaretur, subflauā carne, siue substantiā, quæ manducata, satis acris deprehendebatur. Clus. Exot. lib. 2. c. 25.

Icon capite præced. habetur sub: N. II.

FRUCTVS INDICVS, VEL NV-  
CLEVS LUTEVS PARVVS AVEL-  
LANÆ oblongæ facie compressus.

CAP. LVIII.

Descript.



FRuctus quē nunc describo Basileæ anno 1608. antē à me descriptus est Montbelgardis, ac etiam picturā expressus est: vnciam ferē longus, flauus, læuis, lucidus, Ricino maiori aliquomodo accedens, vnciā fœnis angustior, penē compressus, vtrinque tamen ferē in medio elatior, vna parte paulō latior & rotundior, parte autem quā basif-

pediculus inbasif-  
se videbatur, læuis  
& aquā innatans,  
tamen nucleum  
aut pulpam con-  
tinens, vt ex stre-  
pitu deprehende-  
bam.

se apparet, nonnihil angustior, & non ita rotundus, asperior cortex facilē acicula perforatur, in eo nucleus: qualis medulla nobis nondum constat, nondum enim aperimus quia vnicus.

Hunc fructum etiam vnicum vidimus apud fratrem C. Bauhinum, figurā multū differentem, breviorē, minū compressum. Multō quā adhasit parte angustior, quasi vmbilicus, aut oculus. Crista item non ita apparet, repræsentat Staphilodendron.

CHAMÆRIPHES OSSICVLO NON  
DISSIMILIS, SED MAIOR,  
orbicularis penē.

CAP. LIX.

EXoticus fructus, relatus, vt ait Clus. Exot. lib. 2. cap. 15. in prima nauigatione in lauam per Batauos, orbicularis penē formæ, *Chamarifes* fructus ossiculo non dissimilis, sed maior, læuis, cineraceo colore præditus, putamine satis tenui, quod fungosā quadam materiā suffultum, internā, quā nucleum includebatur, læue & fuscum: ipse etiam nucleus ferē orbicularis formæ, infimā tamen parte in mucronem desinens, qui in binas partes diuiduus erat instar glandis & similibus: eius substantia dulcis, vt amygdalæ ferē subflauis coloris.

OSSICVLVM FRUCTVS INDICI.  
TVBERC.

CAP. LX.

Ossiculum quoddam alicuius fructus Indici esse videtur, maius ossiculo Cerasi, subrotundum, vndique rugosis tuberculis asperatum, colore pullo. Visum & depictum apud Ill. E. C. Wirt. Icon habetur antē cum aliis cap. 57.

AVELLANÆ COMPRESSÆ FACIE  
FRUCTVS VEL SEMEN.

CAP. LXI.

Iacobus Castgillus doctiss. Medicus ex Anglia ad Inos misit fructum Anonymum quendam, vnciam ferē longum, vix semunciam latum, modicē compressum, durum, dilutē croceum ac splendendum, parte angustiore, quā adhæsisse putamus, saturatiū tinctum: longæ alicuius Auellanæ speciem quodammodo referre videtur, sed planē exoticum esse & facies & notæ iam scriptæ satis insinuant. Huius fructus Icon habetur cum aliis antē cap. 3. & 58.

Anno 1605. inter exotica, quæ gener Chelidonium secum adferebat ex itinere Anglico & Belgico, reperimus duos fructus similes prædictis, nullo adscripto nomine, quorum vnus eiusdem magnitudinis cum nostra iconē & eiusdem figuræ; alter erat breuior & latior: color idem, vterque aspersus longiusculis maculis albescentibus, extremitas partis angustioris, scabra, & cinerei coloris, videntur etiam vna parte magis plani: cultello perforatus vnus, cortex visus paulō firmior, quā castanæ & tenax, intus apparuit medulla alba, tenera, quæ extracta per paruum foramen, parua quantitate degustata, sapiebat cum acrimonia:

nu:



nia: fortè commoētis Ricino subnecterentur hæc semina, vel fructus.

SEMEN, TAMARINDI SEMINI  
SIMILE, VNA EXTREMITATE  
dentatum.

CAP. LXII.

**I**gnoro, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. cuius fructus semen, quod Iacobus Gareus mittebat, quod quidem Tamarindi semini non valdè dissimile erat figura, sed magis planum, & oris magis compressis, cortice spadiceo coloris tectum, semen continente album, durum, & ob vetustatem rancidum: ipsum semen cum suo cortice ab vna extremitate dentatum.



\*

SEMEN FRUCTVS EXOTICI FOR-  
TE CUCURBITACEI.

CAP. LXIII.

**C**lus. Exot. lib. 2. cap. 16. à Iacobo Gareto, accepit semen fructus potius, quam fructum, vel cucurbitacei generis, vel alterius cuiuspiam: nam similem quodammodo formam habebat, licet aliquantulum crassior, nec adeò rugoso, verum lævi, colorisque vel spadiceo, vel ex spadiceo flavescentis cortice tegeitur: sed nec huius generis semina eiusdem erant magnitudinis, verum quædam latiora, nonnulla angustiora: nucleis qui in eo continebatur, durus ob vetustatem & insipidus.

ARATACOV BRASIL SEMINE  
MELONIS FVSCO, FERVIDO.

CAP. LXIV.

**D**issimulus vir Richardus Garth, vt ait Clus. Exot. lib. 2. cap. 17. mittebat fructum, quem è Brasilia accepisse significabat, quem non integer accipiebam, & ab incolis Aratacov appellari adscriptum erat, scilicet alius longitudinis fuisse videbatur, quantum quidem ex fragmento summâ parte abrupto coniecturâ facere licebat, de crassitudine nihil pronuntiare possum: sed illud fragmentum fungosâ quadam materiâ præditum erat, in qua latebant quaternâ aut quina semina fusci coloris, duobus ordinibus à summo ad imum serie quadam disposita, melonum semini- bus formâ non valdè ab similia, medio tumentia, medullâque continentia feruidi saporis, etiam toto quatuordecim annorum curriculo, postquam accepissem elapso: ipse fructus foris inæqualis & fusci coloris. Cuius porro fuerit usus apud indigenas, me latet, & qui mittebat, nullam mentionem faciebat.

NVCS INSANÆ, BELGIS PRV.  
NVL INSAANA, PVTA MINE FVSCO,  
officulo membranaceo nigro, cum  
macula alba.

CAP. LXV.

**I**acobus Cuelenerus, auctore Clus. Exot. lib. 2. c. 16. Vir ornatiss. & Commissarius in eâ naue, cui Tom. I.

nomen Amstelredanum illud classis, quæ in Indiam Orientalem ablegata 1603. rediit, inferebat exoticum fructum quendam, quem nautæ ab effectu malle pruymsens, hoc est, fatua siue insana prunula appellarunt, ego nuces dicere maluissem, quia maiorem similitudinem cum nucibus habere mihi videbatur, quam cum prunis, nisi ab effi-

culo, quod continet, prunis sylvestribus in spinis nascentibus non dissimili, appellationem sumentem esse contendant.

Erat porro hæc nux prorsus orbicularis formæ: Descriptam eius ambitus, siue à pediculo per longitudinem, siue per transversum metieris, paulo plus quam binarum vnciarum erat, putamine non valdè denso, satis tamen firmo constans, foris subfusco, & non lævi, internâ autem parte spadiceo coloris, & lævi, officulum membranaceum continens nigrâ quadam pulpâ tectum, pruno filvestri nec formâ, nec magnitudine ab similem, infimâ & sessili parte, quæ petiolo respondebat, albâ maculâ satis amplâ insignitum, sub quo nucleis, cineracei coloris durissimus latebat: ipsa nux breui crassiusculoque petiolo prædita erat, quam maxima ex parte singularem, interdum autem geminam simul coniunctam nasci intelligebam in arbore cerasi magnitudinem æquante, cui folia essent longa & angusta, mali Persicæ foliis non dissimilia.

Pruna fil-  
u si non  
ab simili


Ceterum occasionem, cur istum fructum fatuum siue insanum nautæ appellarint, præstat vt Lector intelligat ex ipsius Iacobi Cueleneri narratione scripto comprehensa vernaculo sermone, & ad me missa, quam sic Latinam faciebam.

Duodecimo die Octobris anno à nato Christo 1601. post longos errores, tandem singulari Dei beneficio, in Sinum quendam appulimus, situm vndecim gradibus & quadraginta quinque scrupulis ab Aequatore versus polum Arcticum. In eorum sinu prunorum quoddam genus reperiebamus, quo cercopithecos [qui isthic valdè frequentes] vesci conspiciebamus: nostri nautæ, qui alioquin alimentis non abundabant, id obferuantes, hæc pruna etiam legerunt & comederunt, nec ea re contenti nonnulli, ipsa fructus officula cum nucleis in aqua macerata coquentes, vorarunt: quotquot autem vorarunt, capitis vertigine & mentis alienatione correpti sunt, mirasque imaginationes habuerunt pro naturâ cuiusque temperamento: vnus enim arbitrabatur in suo cubili seu sponda, ædes fabricari, ad coquendam ceruissiam commodas, & quotquot propter stabant compellabatur, dicens: Videte quid ista ventila in meo cubili agat: alter singulos conuocans percontabatur, an pisces emere non cuperent, se enim cepisse omnis coloris genere præditos: tertius in sua sponda iacens conquere-

Noxâ

Dd 2

batur sibi de toto corpore carnes detrahi : quartus vociferabatur ingentem nauem in suo cubili fabricari: quintus etiam in sua sponda iacens, quatuor aut quina vasa confringebat, dicens, multos humunculos istic adesse qui eius spondam occupare conarentur : sextus nauclerū compellans, videlicet, inquit, diabolum in rostro naui sedentem & pisces captantem: septimus affirmabat se per naui alium anchoras in imo maris fixas conspiceret: nostri Naucleri filiolus ad patrem accedens, chare pater, inquit, plurimos homunculos per tuum nasum cursitantes video : sic ut ipse pater cum quodam metu admiraretur : quibus porro somno indulgere licebat, statim istarum rerum imagines evanescebant, nec defuerunt, qui per triginta sex horarum spatium, in id per integrum biduū dormierunt : fuerunt etiam qui alui profluuiū correpti sunt. Eiusmodi & pleraque aliarum imaginum uis contigerunt, qui naue Amstelredamum appellata uchebantur, quas nimis longum esset referre: inter reliquos autem nautas, Anglus quidā, in cælum suspiciens, illud apertum se videre affirmabat, atq; voce inelamabat, O Domine te habes sequor, variisque suis gestibus, risum omnibus qui circa ipsum erant mouebat: nihilominus semper in cælum suspiciens progrediebatur, ut parū abesset, quin in mare prolaberetur, nisi qui ipsi astabant, detinuisissent. Haecenus Cuielenerus. Quæ cum ita sint, mirari necesse est vnius eiusdem fructus manducationem, tot tamque varias imagines, in hominum cerebro potuisse parere.




## FRVCTVS DYSENTERICVS FLAVVS.

## CAP. LXVI.

**Descriptio** **P**rouenit in India, autore Monarde, fructus Dynteriam sanans, delatus ex Quito, qui videtur esse vasa arboris, altera parte laevis, flavus, altera asper, coloratissimus, ac veluti pullus. Cæterum qualis esset fructus, cuiusve arboris, nunquam peruestigare licuit. Clus. in versione sua vocat fructum Dyntericum: Hist. Lugd. Fructum & Corticem ad Dynt. Monard.

In pollinem tenuissimum redactus, & cum aq. capitum rosarum manē & vesperti exhibitus, dynterico fluxu miserè afflictum breui sanitati restituit, indicante Indo, qui sapientis expertus erat in aliis.



## FRVCTVS PEREG. TVBEROSVS MAIOR CLVS.

## CAP. LXVII.

**Descriptio** **A**licuius fructus officulum sphaerica penè figura, cuius magnitudo penè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis vndique oblitum: coloris flauescens, lineæ eminentiore transversum secante, quam, ut in Iuglandibus, putaminum coniunctionem & cōmisionem esse arbitror. Clus. libello peregr. & Exot. lib. 2. cap. 31.


Iconem autem dedimus antè cum aliis cap. 50.

## FRVCTVS IND. GRANVLOSVS VLL TVBEROSVS MINOR.

**I**nter Pipera interdum reperitur fructus, quales duos habemus, alterum Pruni parui ferotini magnitudine, alterum dimidio minorem, lapidea & inuicta ferè duritiei: forma utriusque oliuarii ferè, color rutilus: superficies externa granulis omnigenis asperata: ab umbilico modicè cauo ad oppositam partem leuiter elatam, inter prærurpta veluti scopulorum quinque decurrunt rectæ lineæ in minore, in maiore duæ duntaxat conspicuæ.



Clus. de fructibus peregrinis & Exot. lib. 2. cap. 30. quantum facit, nostro iudicio, quem sic describit. Alicuius fructus officulum forma planè sphaerica est, magnitudo globuli minoris scopi, putamen flauescens coloris, & perpetuis tuberculis, at non adedè crassis, oblitum, nullaque linea cinctum. Ex nostris fructibus depicti sunt.

Icon etiam habetur antè cum aliis cap. 50.




## NVCVLA EX GVINEA.

## CAP. LXVIII.



**N**vis Myristicæ ferè magnitudine & forma, levis, concussa sonum edens, cuius alter finis styli quid simile habet, ex quatuor parvis sulcis siue eminentiis procedens, oppositus verò scrobiculum, vnde auulsius videtur pediculus, unde radii recti producantur: cortice mediocriter laui subrufo testis, quo abrafo subest albus durus qualis in Nuce moschata: huic subest alius

crassior, spadiceus, fungosus, politus: nucleum ambit immediatè quartus pertinaciter adhærens, pelliculæ tenuis inftar, rugosus, spadiceus quoque, ipse verò nucleus amplius, candidus, piguis, gustu dulci cum fastidioso quodam sapore. Primò accepimus munere Ill. E. C. Wirt. cui miserat D. Paludanus, qui postea etiam nobis communicauit nomine Nucularum ex Guinea. Prior cum extimo putamine ex Ill. E. C. fructu depictus fuit, quem sationi destinarat: posteriores ex nostris.



## NVX IND. ALIA.

## CAP. LXIX.


**M**inor est Iuglandis, latitudine vncialis, paulloque longior, colore pullo obsoleto, fuscis maculis consperso. Desinit in breuissimum acumen, qua parte quinquepartita esse videtur. Parte opposita pediculi pars adhæret lignæ proflus, firma



fructu crassaque, unde coniectura arboreum factam. Ipse alioqui fructus levis, minimè ponderosus. Interiora introspicere non licuit, quòd terræ commixtura erat illustr. D. Nicla V Virtemb. apud quam descriptus atque depictus. Huius Eicon. ap. preced. cum alia habetur.

NVCVLA INDICA, GLOBOSA, SONORA.

CAP. LXX.



Inter fructus peregrinos Ill. Celsus. Virt. pie memorie Stutg. 1608. Orbicularis siue globulosa, Gallæ parve, siue parvulo globulo similis, cinerei & maculosi coloris, costis penè totus cinctus, sonorus, Cortex non admodum durus. Figuram indicat numerus I.

NVCVLA PYRIFORMIS INDICA ET SONORA.

CAP. LXXXI.

Fructus repertus inter Ill. C. pie memorie peregrinos, articulo postremo pollicis non maior, exprimens parvum pyrum Moscatellinum, solidus, durus, rugosus. ferè cinereus, lignosus, sonorus: saporem manifestum non sensimus. Ill. Principissa, reservavit fructum 1608. Stutgard. sua magnitudine pictus est. Icon cum prægressa sub Numero II.

FRUCTVS PYRIFORMIS, FVSCVS, LAEVIS, STRIATVS CVM CORONVLA, in quo nucleus.

CAP. LXXXII.

Ac. Garetus misit fructum, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. vncialis magnitudinis, qui prorsus fuscus, penè orbicularis, striatus, levis admodum & in aqua supernatans, illi mersus, tametsi nucleum continere ex agitatione deprehenderetur: anteriore parte veluti coronulam striatam habens, in qua florem sedisse verum le est, posteriore autem in oblongiusculum pediculum desinens. Figura ponitur etiam in præcedenti tabula sub numero III.

FRUCTVS TRIANGVLARIS SCISSVRAS OSTENDENS.

CAP. LXXXIII.


Exoticus fructus à Paludano concessus, de quo Clus. Exot. lib. 2. cap. 25. Triangularis formæ.

ma erat, eminentibus tribus angulis, & scissura ostendentibus, ex quibus internas partes facile diuidi posse, intelligere licebat: levis erat, & aquæ innatans, nec innum peritens, tametsi diuturno tempore in ea hateret: foris fusci coloris: an quidpiam interiore parte cogeretur, ignoro, quandoquidem contingere iam veritus, quòd vnicuius illius generis haberet paludanus: arbitrabar tamen pulpam continere, quòd licet agitat, nullum stiepiumederet.


DE NVCE VNGVENTARIA.

CAP. LXXIV.

Nux unguentaria arbor.



Nucula siue glans unguentaria.



Nuxes Vnguentariae fructus. dictæ, oblongæ ferè sunt, nuclei Auellanae magnitudine, aut etiam nucleo cum suo putamine, sed minoris, figura triquetra: putamine teguntur albicante, medio cricet crasso, fragili, cui nucleus subest crassiuscula furgoßa pellucula niuci coloris obductus, albidus, auellanae nuclei aut Amygdalæ consistentia, pinguis, quæ nobis iam in Nucibus ante triginta annos repositus non tahescebat, sapore tantum amaro præditus. Huius generis nucleæ alie sessiles, alie oblongæ, maiores, minores. Effigies triquetra, sed rotunda & glandis amula huic nomen generis aptauit.

Nascitur autè in siliqua, quam, vt inquit Aduersi, nullus Vetterum aut Recentiorum hereticis mandauit, admodum elegantem.

Siliqua descripta.

palmum longa, carinula biforti conflata, tereti, rotunda, gracili, binisque loculis ventriosa, nempe una mediæque sui parte, quæ protuberat, glandem singularem singulo claudens, summa vero, acuto stylo, quo, rostri instar, vel Rhododendri vel Periplocæ repentis, acutum mucronem; protendit: intus subrufo colore: foris pullo cinereo, & secundum longitudinem striis rugisque exarata: coriacea tota, flexilis & corticosa, inflexa.

Id.





à Glande vnguentaria, quæ Nux odorata siue Moschata vulgò Veteribus incognita, vt existimat & annotat Hermol. Cornar. com. in Gal. c. 1. l. 5. de comp. med. secundum loca βάλανον αργυρίαν Critonem eo loco dicere existimat, quam mox sequi pharmino βάλανον μυρεψίδιον appellat, quamque glandem vnguentariam Latini, Myrobalanum Plin. vocat Aegyptiam autem dici patria appellatione, vbi & μυρεψίδιον nasci affirmat, & compositum βάλανον dictam, hoc est, Palmæ glandem: vnde error vtique committi potest, vt altera pro altera sumi possit, à quo errore neque Plinius immunis fuit, nisi error Librario imputandus, qui lib. 23. c. 5. pro Phœnicobalano Myrobalanum substituit: quamquam idem Plin. lib. 12. cap. 22. vbi ait: Myrobalano in vnguentis similem proximamque vsum habet Palma in Aegypto, quæ vocatur adipsos, vindiis, colare Mali cotonei, nullo iatus ligno, &c. videatur planè Phœnicobalanum cum Myrobalano confundere, quoniam tamen res sint diuersissimæ, & Palmæ succus in Vnguenta commodus nequaquam exprimat. Quare quod Diosc. de Palmæ fructu dixit *παρασκευάζει τὸν φράσιον μυρεψίδιον*: Plinius in vnguentis similem proximamque vsum habere ait, cum Diosc. id non velit, sed *παρασκευάζει* de aliqua figuræ similitudine dicat, non de vsum in re medica ac vnguentis. Imò planè alias vires Palmulis, quæ & δακτυλῶδες vocantur, & Diosc. & Gal. ascribunt, quam Myrobalano siue glandi vnguentaria, vt ex suo patebit loco. Idem doctiss. Dalech. apud Plin. legendum censuit, Myrobalano vnguentaria similem proximamque figuram habere, ex cit. Diosc. lectione, quam similitudinem Plin. ad vnguenta negligeret reuoluit.

Myrobalanum verò Arab. à Diosc. dictam, non esse aliam, quam *βέν* ab eodem lib. 4. descriptam. vel hinc patere potest, quòd nulli libi speciatim Myrobalanum describit, sicut neque Gal. neque Aetius, neque Paul. minimè reliquos, si diuersa ab illa ipsa esset. Quare certum esse, penitus sibi persuadet Cordus, Myrobalanum Græcorum Medicorum, nihil aliud esse, quam *βέν* ab eodem lib. 4. descriptam: quod ipsum & Aetius conceptis declarat verbis, cum ait: *ἀπὸ τῆς βέν* lib. 1. c. 1. *βέν* ab eodem lib. 4. descriptam, vii pluribus declarat diligentissimus Cordus.

Hanc eandem sententiam non solum secutus est Lacuna, sed & in magno errore versari scribit eos, qui putant eiusdem generis esse Myrobalanos Arabum seu Officinarum cum Glande vnguentaria.

Arabes *Ben* vocant. Sic enim legimus apud Serap. *Habben*, id est, granum *Ben*. Et Auenic. *Ben* est granum maius Cicere, albidum, cui medulla lenis & vinctuosa. Et Hali Abbas: Ben per simplex e, inquit, & sine h, est fructus cuiusdam arboris, similis Myricæ, teste Diosc. &c. Audet tamen Tagaulius scribere *Ben*, *Been*, vel *Behen* nomina esse Barbara, Arabibus Balanum Myrepsicam denotantia. Idem Mesuem taxat, quòd Ben antiquum melius dixerit recenti. Sed ipse met potius taxandus videtur, qui Mesuei mentem non intellexit, de qua antè diximus: Mesues nostro iudicio prætere in vsum medicò antiquum Ben, quia in eo consumptus humor quidam, siue serum acre ac malignum, quale obseruamus admixtum oleo, cum recens exprimitur. Eundem in modum Asari etiam radices & folia violenter purgant per inferiora & superiora, vbi vident, propter tale aliquod serum: si existencur, amittunt vim illam malignam & vehementem. Quod idem quoque e-

Tom. I.

uenit Iridi, quæ virens vrit & purgat violenter: Exsiccata non item.

Ceterum Olei expressi magma residuum, vt annotat Syllu. videtur esse *μυρεψίδιον* *πινκον*, id est expressum, quod cataplasmaus miscet Gal. lib. 11. & 13. Meth. & bis lib. 9. comp. ph. par. splenicis remedijs adhiberi scribit Gal. Quo in loco *μυρεψίδιον* tantum, aliquando *βέν* ab eodem lib. 11. leges: aliquando *μυρεψίδιον* *αὐτὸν*, id est, farina & puluis, & *μυρεψίδιον* *ἀπὸ τοῦ*, id est, putamen & cortex & *μυρεψίδιον* *ἀπὸ τοῦ* *κεκομμένον* *ἢ σπορόν*, id est, Myrobalani testæ & cortices incisi & tusi cribratique. Omnia hæc ad splenicis scribuntur, vt sit credibile maximè de fructu eodem, scilicet Balano Myrepsica, & eius paribus omnia hæc intelligi.

Matth. examinandum proponit, an Lilac dicta arbor sit ea, quæ glandem vnguentariam fert. Idem Theophr. reprehendit, quod è putamine fructus oleum elici tradat: Plinium addens & Theophr. & Diosc. sententiam comprobare. Veruntamen hac ætate ab omnibus tantum è nucleis à putaminibus repurgatis exprimi. Nec se credere ex solis putaminibus, vel fortissimo prelo pressis quicquam effluere, maximè cum hanc parandirationem Diosc. prætermiserit, non solum cap. de glande vnguentaria, sed etiam libro primo, vbi tamen de Oleis & Vnguentis conficiendis latius differuit.

Idem Manardum notat, quòd dubitarit, an Vnguentariae glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, Galenum tamen, qui rem hanc abundè enucleauit, constanter asseuerasse, Balanum oleum vnguentarium ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiam facile ex Diosc. colligi possit, cum dicat consimili modo fieri Balanum & Amygdalinum. Tandem & in eam cadit suspitionem Theophr. locum esse depreuatum aut minds integros aut veraces fuisse authores, à quibus fortassis Vnguentariae glandis historiam accepit. Sed de hac re abundè iam prius actum, vt ex quibus hæc & similis omnis difficultas de hac re facile vel tolli, vel explicari possit.

Andreas Marinus, inquit idem Matth. Medicus non vulgaris, in suis super Mesuem annotationibus, plantam quandam pingit pro vnguentaria glande, à Cl. Pet. Ant. Michaelio Patrio Veneto acceptam, quæ à præscriptis omnibus tota facie differt: sed an legitima sit, cur probet aut improbet, non habere. Titulum eius mendacem esse: siquidem Ben album inscriptum habeat. Itaque verendum ne & ipsa quoque imago tituli sequatur errorem.

Idem in post. com. cum magnis sig. addit. Plantam cuius imaginem damus, Constantinopoli alata est, sub nomine *Lilac*. Eam cum inspexissem & fructus eius agnoscerem, Pistaciorum faciem perquam bellè refert, illicò in suspitionem veni (inquit) an hæc fortassis glans vnguentaria dici posset. At mehercle *Lilac* fructus nihil habere nobis videtur, quod sit simile Pistacii, vt clariùs patebit suo loco.

Amatus glandem vnguent. Pistachiis similem facit, non malè, si cortice extimo spoliata sit, quamvis minor sit, & forma triquetra.

Porro obseruatione digna sunt Bellonii verba, in hunc modum scribentis. In Arabia ad pagum Phatagou dictum, conscendimus rupes, vbi inuenimus arbores Balani Myrepsica, prouenientes ad altitudinem Betule inter rupes, cuius ramus etiam similes, truncus albus est, ita vt è longinquo

D d 4





cum balano, quod nobis quidem nemo facile persuaserit: hoc *ἡ δὲ φάρμακον* manifestam & efficacem habet, illa aut nullam aut certe obfcuram, & quæ forte simplicissimi olei oliuorum vires non transcendat, quamvis altero pro altero vsum fuisse, non magna consequi possit noxa.

Vnguentarii, tradente Gal. vntur carnis eius succo, qui calidus est. Reliquæ autem vnde expressus est, vincentem habent qualitatem amaræ. Sed & admixta est quedam adstrictio. Proinde extergentem simul, & incidentem contrahentemque & slipantem effectum possident. Itaque (præter iam dictos vsus quos studio non repetimus) & securi indurescentialiquant. Drach. pondere cum melicrato caro eorum pota, vomitum mouet: sæpe etiam per inferna aluum largiter fubducit. Viscera expurgat. Externis noxis cum aceto administrari debet. Sic efficacius reddetur ad prædictos cutaneos morbos omnes: item ad Exanthemata quævis alia, achoras, & vlcerosæ, & quæcunque crassi sunt succi. Cicatricibus decorem affert. Lienii illinendum cum farina quadam exsicante, ut Erui aut Lolii.

Cortex eius admodum adstringit. Itaque vbi adstrictione opus, accommodari potest. Celsus ad lienem sic aptat. Glandis (quam *βλάστη* Græci vocant) cortex & nitrum, partibus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quàmacerissimo. Vbi Cerati crassitudinem habet, linteo antea in aqua madefacti, illiniuntur, & sic imponuntur, supraque farina hordeacea iniiciuntur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne Lienem consumat: fatiisque est bis aut ter fieri. Speciales, ac vti solet medicæ admodum, eiusdem vires Melius persequitur, sic: calfacit morbo initio, ordi, siccit. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua venæculi n. subiacet, nauseam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vnti: & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso & flatulento, sumptus, balano, clystere iniectionis, cataplasmate ex ipsius medulla hordei farina & melle appositus, & calore suo nervorum frigiditatem, spasmo, tetano, contractioni. Tumores quoque duros, strumas, nodos, resoluit cum melle. Hepati autem aut Lieni obstructo, vel durato cum farina Lupinorum & spica confert imposita. Ad hæc fructus minor, & eius oleum efficacius admoventur. Idem oleum auri infusum, tinnitui, sibilu, surditati auxiliatur: cicatrices scædas, lentiginis, alphas, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat, aperit obstructa. Paruus autem ad omnia est valentior, molestè purgat, vires d. i. cit, sudoremque frigidum mouet. Ob id non vtendus etiam oleo, nisi emplastro, vntione, cataplasmate. Magnus ne ventriculo noceat, facit assaui. Ea enim humiditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit & resoluit: tuncque solum deiectione purgat. Adduntur præterea ipsi, præsertim coquendo, semen anisi & feniculi. Ex huius autem ita cocti medulla cum dimidio pondere Amygd. dulcium, & melle vuarum passarum, formæ sunt Auellanarum effigie. Ipsi autem fructus integri, vel potius horum medulle multum trita aromatis aliis, vel anisi aut feniculi semine adiecto, involuuntur passaro, & maza: potest coquantur sub cinere calido.

Non absque ratione dubitat Manardus, an vnguentaria glandis oleum conficiendum sit ex fructu, an ex eo, quod cortice obducitur, hoc est, fructus substantia? ex Diosc. namque scriptura est

nucleo fieri debere colligitur. Nucleus autem & corticem continet, & id tenerum, quod in cortice continetur, quod totum semen verum, quàm fructum dixeris: nam si totum fructum: mirum est, quod à corticibus ita ficiis oleum exprimi possit: si tantum ab eo, quod intus est: videtur Dioscor. scripturæ repugnare. Sed dicendum ibi fructum pro eo, quod in semine continetur, accepisse, quod ostendit id, quod subdit: præferri, quæ facile delibretur: quæ si delibratam assumi debere ex hoc significaret. Cui & hodiernus vsus, teste Maranthæ, adstipulatur. Vnguentarii enim ex seminis substantia, non ex toto semine oleum de Been [ita enim glandem vnguentariam appellant] eliciunt. Oleum autem quod ex his extrahitur datur à drach. sem. ad drach. j. & sem. Ben. ex sententia Auic. fluxum sanguinis natiui, reprimat sua adstringenti facultate.

Decoctum radicis colluendo os confert dolori dentium, Duritiem hepatis ac splenis auferit cum aceto drachm. ii. pond. potum. Sed stomacho noxium, nauseamque facit, auri pondere cum melicrato haustus succus vehementer vomitum & aluum ciet. Loco eius ponitur tantundem Rubiæ, medium Calix lignæ & decima pars Macis. Quæ Auic. verba haud supinè accipienda. Quod si nota ei arbor Ben. eiusque radix, cur non descibit? & quis ante ipsum hæc radici tribuit vires? Respicat Lector ad d. lin. drachm. cum vnicatantum, vel ipsomet teste vehementem vomitum moueat. D. osc. drach. j. tantum præscribit. Maior dosi nobis suspecta. Quale oblecto succedaneum illud? docti iudicent.

Amatus testatur Med. cos hodie, qui in India degunt, glandem vnguentariam in potu ad subducendam aluum & prouocandum vomitum ægris propinare.

Vnguentarii oleo vtuntur pro conficiendis odoratissimis vnguentis, in quæ & molchum, ambrai & zibetum addunt pro Chirothecis & maniciis, aliisque sufficit perfundendis aut illinendis. Porro præ aliis omnibus oleis hoc potissimum celebrant Vnguentarii, non quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum enim est, si Matth. credimus) sed quod nunquam vetustate rancorem contrahat. Ergo rancoris expers cum sit, omnium aptissimum habetur ad misturas [sic vocant] delicias & lasciuæ causa excogitatas. Quandoquidem, si odorata prædicta alio quouis oleo liqueferent in vnguentum, aut quouis alio modo exciperentur, cōtracto inde nō multò post tempore rancore, *etate enim omne oleum præter Balanum rancescit* non modò vniuersam odoris suauitatem exuerent, sed etiam putida fœtidaque euaderent.

Itali odorato oleo de Been, quale ad eum vsum studio Regulari parant sibi casariam & barbam innungunt [teste Monarde], deliciarum gratia, & Senarè iam dudum hic luxus à meretricibus ad fœminas reliquas, & ipsos quoque viros transferri cœpit, quasi intersit homini bestia odorem præ se tulisse. Et multi egregiè in hæc gestunt.

Matthiolus & Amatus alique tradunt nunquam fenescere nec rancidum fieri hoc oleum: imò (inquit hic) si oleo Amygd. gutta vna aut altera huius olei adiungatur, illud à corruptione præseruat.

Ben. Glan.

Vnguentaria

Dosis olei.

Fluxus

Sanguis

Dolor dentium

Substitui

Am. por.

Causa.

Chirotheca

Catumina

Aut sem

Ficula

Barba sic

Cus

Sensu

Xanthi abu

Sua sucori

Praeserua

tio ol. A

mygd.

## AVELLANA PURGATRIX NOVI OBRIS.

CAP. LXXV.

Loco.

Descrip.

Ben ma-  
gnum.Nucis pur-  
gantis.  
Vires.Purgant.  
Calica.Dosis.  
Tempera.

git cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc sequitur putamen minus solidum, quam in vulgaribus Auellanis: id nucleum continet Auellanae magnitudine candidum, solidum, Auellanae vulgaris aut lignae, sapore, tenui membrana obductum. Integra aux altera parte sessilis est, & coniunctum binas nasci videntur, vt interdum Castanea. Monardes Auellanae purgatricis vocat, additque Medicorum vulgus Ben magnum vocare (nam esse duorum generum,) paruum autem esse id de quo praeced. cap. egimus, nempe ex quo oleum conficiatur odoratum. Ben magnum Hist. Lugd. Nuces purgantes, frömbde purgierende Caselnus Taber.

Eodem Monarde teste, his Indi familiariter se purgant. Postea Hispani necessitate compulsi, illis etiam purgare se coeperunt, non sine vitae discrimine. Pituitam & bilem supernam & infernam purgant. Nonnulli tamen earum vehementiam assatione infringebant. Coli doloribus praesens sunt remedium, flatu discutiunt, & Clysteribus injecta, mediocriter euacuant. Dosis est à drach. f. ad drach. i. sed assanda sunt. Calidi sunt temperamenti initio tertii gradus, & sicca in secundo. ]

## PINEI NUCLEI MALVCANI SIVE PURGATORII.

CAP. LXXVI.

Descript.

Solia.

Fru. fusi  
Auellana  
magnae.Pinea Nu-  
clea.  
Monardi.

**A**litur in hortis quibusdam Malabar, tum etiam in nonnullis syluis sponte nascitur arbor magnitudine Pini, cuius folia inferne diluto virore praedita sunt, supernae autem saturo, admodum tenella & mollia, quae gustata valde actia deprehenduntur, & linguam diu vellicant. Fructus triangularis, Auellanae magnitudine, interius in multa receptacula distinctus, in quibus semen est album, solidum, rotundum Pineo nucleo seu putamine exempto par. A Costa.

Considerandum an eadem sint Pineae Nuculae catharticae Monardis, quas sic designat. Trásmittit noua Hispania Pineorum nucleorum ge-



nus, quo Indi se purgabant: quos imitati sunt plurimi harum regionum. Nostris Pineis nucleis similes sunt, nascentes in strobilis magnis, quales sunt Myrsipice Mutica: molliore putamine, & nigriore, quam nostri, rotundi, intus albi, pingues & gustu dulces.

Pignoli di Maluco, hoc est Pinei nucleii Malucanini, quo nomine & Hist. Lugd. habet. An apud eandem Pinei nucleii cathartici Monardae? Et an ex ipse quae Pignoli purgatiui & Pinei nucleii purgatorii dicuntur eidem Monardae?

Eo fructu, autore A Costa, frequenter vtuntur Indi, cum in curandis quibusdam morbis, tum etiam in suis nequitiis. Binos eiusmodi nucleos, tenui membrana quae illos contegit liberatos tenent, & Clysteribus vulgaribus admiscunt aduersus Schiaticam & vrinam difficultatem: seu propinant cum gallina in fuscio ad educendos putridos, lentos, crassosque & frigidos humores, & althmaticos curandos, aduersus quem morbum plurimum comendant & frequenter vtuntur. Ex aqua tritis impetigines inunctae, primum tamen diligenter coruscatae & abrae, pro breui temporis spatio curantur, sed admodum vrunt, vt experientia didicidit eundem autor. Improbae etiam mulieres illarum prouinciarum suis maritis parum aquae, quatuor grana siue nucleos edendos praebent, vt eos intermiant. Nuclei pinei cathartici, vt scribit Monardes, pituitam & aquas validissime purgant: & licet Auellanis mitiores, attamen vomitum cient, atque ventrem subducunt. Assi, neque tam valenter, neque cum tantis torsionibus purgant. Dantur in diuturnis morbis, & peculiari quadam facultate crassos humores expellunt. Quinque aut sex triti & vino diluti, dantur pro virium robore, praeparato prius conuenientibus Syrupis humore, qui euacuandus est, & obseruata, quae decet, vitus ratione. Etenim qui eis vtetur, illum obseruare oportet, quae ab his obseruari solent, quibus purgans medicamentum propinatum est.

Calidi in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam praediti, quae siccitatem nonnihil imminuit.


Quibus obtingent Pinei nucleii Malucani A Costa, vel Pinei nucleii cathartici Monardis. siue diuersi, siue iidem sint, non temere exhibeant agris: siquidem, vt refert A Costa, grana quatuor intermunt, & admodum vrunt. Monard.

verò ad euacuandum quinque aut sex exhibet.



## BERETINVS FRVCTVS.

CAP. LXXVII.



IN Cancrorum insula celsissimas inuenerunt arbores, Quercu maiores, foliis Laurinis, crassis, splendentibus, & minimè in ambitu ferratis, quæ oblongiusculum fructum ferunt, exiguis Iligneis glandibus similem, nullo tamen calyce, ut ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo, interdum atro, tectum, nucleum continentem oblongiusculum, candidum, nullo [cùm induruit] manifesto sapore præditum, tenui membrana tectum. Similibus arboribus abundat Beretina insula illi vicinæ, ad quam postea delati sunt: à cuius incolis illarum arborum fructum, quem prius non attigerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum delixio, aut in farinam contuso, & pulvis modo cocto & inspissato, alterius cibi penuria, cùm in ea insula, tum in nauis famem subleuauerunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Clui, qui sibi hunc fructum à Cancellariæ Londonensis Præncipio communicatum fuisse, tradit.

Est & nobis quidam fructus ex liberali Illustr. Ducis VVirttemberg. cuius figura ferè Corni est minoris, nempe oblongus, ouatus ferè, cortice tectus tenui, flauescente, & yngue haud diffcultè separabili. Substantia intus albicat ut Dactylorum, sed firmitudine inferior, & cultello scilicet, nullo gustu manifesto. Summa apex paruis & niger occupat: Ima adhesionis vestigium. Videtur autem nucleus quidam esse aliquo cortice tectus, quo nunc exutum habemus, nec suspicio, ne caret, esse fortè Beretini iam descripti, de quo tamen nihil certi nobis adhuc constat.

GLANDI ILIGNEÆ QVODAMMODO  
SIMILIS FRVCTVS, CORTICE  
fragili.

EX fructibus peregrinis Ill. C. Wirt. 6. an. 1580. Scutgardiz offerebatur paruis fructus, paruum glandem Iligneam quodammodo exprimens formâ & ferè colore: cortex tenuis & fragilis, subest alter tepuis, flauescens: nucleus albus, durus. Conferendus est hic fructus cum Beretino, similis enim videtur.

FRVCTVS INDICVS, VILLOSVS,  
PARVVS.

CAP. LXXVIII.

Inter fructus exoticos seu peregrinos Illustr. Celsi. VVirttemberg. p.m. 1608. reperitur vnus

NVX, PONTICAE NVCI NON VALDE  
ABSIMILIS, SPADICEI COLORIS.

CAP. LXXIX.

AMstelredami, inquit Clusius Exot. lib. 2. c. 26. Descriptio. Accipiebam ab ornatisimo viro Henrico van os / eius urbis ciue, Nucleum spadiceo coloris; Ponticæ nuci non valde ab similem, vnciam longam, eius ambitus vnciâ paulò maior, fissili siue infimâ parte angustior, extimâ crassior, & veluti decussatim formata, dura, solida, nec vllò motu strepitum edens: an aliquo calyce excepta fuerit, glandis aut auellanz instar, me latet, necis sciebat qui illam mihi donabat: nam inter aromata illo anno aduecta fuerat. Huius iconem cum præcedenti damus.

NVCVLA INDICA, CORTICE TENERO,  
FORTE BERETINI FRVCTVS.

CAP. LXXX.

ME visus inter fructus peregrinos Ill. Celsi. Descriptio. VVirt. Stutg. 1608. vnus falcus, paruz oliuz magnitudine, vnâ parte, vbi adhæsit, latiuscula, alterâ in acumem desinente, in quo paruz costæ sex numerantur, rectæ non oblique distinctus; sonorus est: cortex cedit yngue compressus: In hac tabella numerus primus, primam: secundus, alteram, & tertius tertiam denotat nuculam.

NVCVLA INDICA ALTERA COMPRES-  
SA, CORTICE DVRO, COLORIS  
castaneæ, sonora.

EX fructibus peregrinis Ill. C. VVirt. p.m. Stutg. 1608. vnus erat longitudinis ynguis, nucleus parui Pruni quodammodo dissimilis, sublongus, eâ magnitudine, quæ pictus, compressus, costis in vno latere confans, coloris penè castaneæ, lucidus, sonorus, duæ facies sunt depictæ.

NVCVLA INDICA TERTIA SPLENDI-  
DIOR.

HC fructus idem fortè cum præcedenti, color Descriptio. Hpenè idem, nisi diluor & splendidior, magis

magnitudine auellanz vulgaris, constans tunicis villosis, subflauis: cortice tenero, vna parte nigricante. Qualis fuerit intus nucleus, nos latet, quia casus corruptus.

etiam compressus & latior, potissimum vna parte: est etiam sonorus, duæ facies pinguntur.

FRUCTVS INDICVS, OVI PARVI  
PERE FORMA.

CAP. LXXXI.

Descriptio



EX fructibus peregrinis Ill. Cell. Wirt. p. 1608. Stutgardæ, parvus fructus, formâ ferè parui oui & iconis magnitudine, coloris quodammodo castaneæ, sed dilutionis splendens, duæ facies exprimiuntur, circulus ambiter totum, qui non splendet, quid continuerit nescio, erat in vtraque parte foratus.

NVCVLA SVBLONGA, VELOS  
FRUCTVS ALICVIVS INDICI.

CAP. LXXXII.

Descriptio

EX fructibus peregrinis Ill. E. C. Wirt. 1608. Nucula vel, os alicuius fructus Indici, vnciam longa, vnciam semis circiter lata, rotunda, fusci coloris, vna parte latior, lignosa, cava: in ea nucleus cortice tenui tectus, qui fuscus, intus filius, durus, albus & sapore manifesto destitutus. Nucula hæc in priori tabula expressa.

NVCVLA TRIANGVLARIS, INDICA,  
CASTANELLE FERÈ FACIE.

CAP. LXXXIII.

Descriptio

IVcunda aspectu, nucula sessilis, triangula, pisco maiori haud maior, inter angulos compressa, ex vno latere commissura nigricante insignita, colore subfusco, in rufum quasi ex spadiceo in cinereum vergit. Concussa non strepitat, vt quid intus latet nos lateat, sed circulum perelegantem nuculæ concolorem, parte sessili innatum vel pectus enatum (nam linea eleuator & nonnihil splendet) intersecat commissuræ linea prædicta. Ex obs. Cherleri.

NVCVLA IND. OVATA FERÈ.

CAP. LXXXIV.

Descriptio

NIlli vtrique acumen quoddam extaret, ovata esset figura, longitudo vncialis, latus medio: colore inter fuscum & pullum medio, maculis dilutionibus picturatus. Costis quibusdam eminentibus, quales in Nuce vnguentaria Ben

dicta, insignita. Nucleus intus latet albus vt ex leuiter adaperto fructu deprehendimus, quem corrumpere non debuimus, vt integer terræ committit posset ab Ill. Ducissa Wirt. quæ aspectus & picturæ vsuram concessit.

NVCVLA QVÆDAM AFRICANA.

CAP. LXXXV.

FRuctus peregrinus Clusio, nucis Auellanae Descriptio magnitudine & eiusdem colore, putamine puro, veluti in duas partes diuiso nucleum intus continens. Similes aliquando Granatæ in Hispaniis accepit idem ex Africa [El penon de Velez arce ab Hispanis occupata] delatos, nucleum continentes album, dulcem, quos ad vnguentariae Nuclei genus aliquod referendos existimabat. Huius icon est cum Fr. Amygdaloide nitido peregrino.

OSSICVLVM SVLCATVM FRUCTVS  
PEREGRINI.

CAP. LXXXVI.

ALicuius fructus Indici ossiculum esse videtur. Descriptio Figura ovata est, vtrique extremorum acuminatum, per longitudinem profundè satis sulcatum, colore pullo. Vifum & depictum apud Ill. Ducissam VVitemb. &c.


Icon habetur cum aliis huius libri cap. 88.

OSSICVLVM TAMARINDI ADMIXTVM.

CAP. LXXXVII.

EX prima naviigatione Batavorum relatū Clus. Descriptio Vt videre est Exor. lib. 2. cap. 15. ossiculum cuiusdam fructus, vncialis ferè longitudinis, semuncialis crassitudinis, lævi spadiceique coloris putamine tectum, superne quodammodo cristato, & coloris albi, atque paulò infra conumillum ad latus vestigio apparente, quo suo fructui inhæserat. Inter aromata ferunt repertum cum Tamarindorum seminibus & aliis quicquid, quæ sex penumeris his commisceri solent.

FRUCTVS EXOTICI OSSICVLVM ALIVD.  
CAP. LXXXVIII.



VIdetur & Descriptio hoc peregrini cuiusdam fructus ossiculum esse: semuncialis longum, nucleum Pini ferè figura par, ambitute enim obiter turbato, durum, politum, læve. Colore rufescente, maculis quibusdam albicantibus aspersum. Vifum & pictum apud Ill. E. C.

FRV.



## FRVCTVS IND. CORNI FIGVRA.

## CAP. LXXXIX.

**D**iceret Corna esse, si rubri essent, aded figura & proportionē respondent, sed niger est, laevis, splendidus, durus, pediculi residuo crasso. Concussus non sonat, & aqua iniectus fidat, ponderis argumento. Dono accepimus ab Ill. Ducissa V. Virtemb. &c. Eicon cum aliis cap. praeced. habetur.

FRVCTVS IND. OSSICVLVM PER-  
ELEGANS.

## CAP. XC.

**M**agnitudo ferè Amygdalæ est, sed figura nonnihil diuersa. Collo supernè donatus angusto: quatuor insignibus per longitudinem lineis notatus, cætera quoque parte nonnihil rugosus, colore pullo. Vidimus apud Ill. E. C. V. Vir. aperire neciuit, nec interna describere.

HIBOVCVHV AMERICANVS.  
ITEMQVE CARAMEN FRV-  
CTVS INSEM.

## CAP. XCI.

**A**mericanorum mirabilis morbus quidam est, quem exigui quidam vermes procreant, dum pedibus eorum se insinuant. Lingua illorum Tom dicantur, nec Sironum vulgò dictorum magnitudinem multum excedunt. Crediderimus in ipsis pedibus generari. Ita abundant interdum unico loco, vt tumorem mox excitent magnitudinis fabæ, nec sine dolore, partisque atrophia. Eadem plagâ & nos [inquit Theuctus] aliquando vexati, dum in America ageremus, aded vt pedes eiusmodi tumoribus ferè scaterent. His adaptis vel spontè dehiscentibus, albus se in conspectum dabat vermiculus inspicienti, cum puris tantillo. Hoc mali genus incolæ oleo ex fructu Hyboucouhui ipsi dicto sanant, qui Dactylum aliquo modo representat, nec edulis est. Oleum istud adseruant vasculis quibusdam ex fructibus excavatis paratis, quos Caramen suo idiomate nuncupant. Eo oleo vtuntur, vt ii perhibent, felicissimo successu. Sed & corpora labore ac lassitudine fracta, eiusdem affictu refocillant. Experientia quoque docti facere conferte vulneribus ac vlcenibus.

GOAN ARBOR TVTIAE, CUI NVCLËVS  
CVM PUTAMINE.

## CAP. XCII.

**T**vtia nos hic in India (inquit Garcias) vtimur, quamque in Lusitaniam & Hispanias reliquas Occidentales regiones exportant, è metallicis conflata non est, sed ex eorum est genere, quæ Diole. *arboris* appellantur. Mibi enim retulit mercator harum similitudinē rerum curiosus indagator, se certò accepisse à Persicis negotiatoribus hanc Tutiam in Quirmon Persiæ regione, & Ormuz finitima [vbi etiam Iudatissimum Tom. I.

totius Persiæ cuminum nascitur] fieri, atque con-  
flari è cineribus arboris cuiusdam isthuc nascentis, nomina Goan, quæ fructum eiusdem nominis profert, cortice & putamine constantem: corticem verò & nucleum, quæ putamine clauduntur edules esse. Hanc Tutiam Alexandriam vocari, non quòd in Alexandria fiat, sed quòd è Quirmon Ormuz delata, deinde in Alexandriam exportetur, ex qua tandem & Italia & Gallia comunicatur. *Hæc ille.*

At nos non vidimus vllam hætenus in Officinis Germania, Gallia & Italia Tutiam præter Cadmiæ Botryitem: De Tabaxir Arabum quod nallè Spodium dixerunt, & de Antispodii trademus lib. 8. post Salices.

## ARBOR GEHVPH SIVE COBBAN.

## CAP. XCIII.



**A**lit Tapro- Descriptio  
bana insula  
hodie Sumatra  
nuncupata, ar-  
borem admiran-  
te facultatis, vt  
est Theuctus,  
iuxta illic Gehvph,  
India Cobban  
licetur. Folis est  
paruis, quemad-  
modum & arbor  
quæ siliquam ca-  
thartica fert,  
ramis breuiori-  
bus, cortice fla-  
uolente siue cro-  
ceo, fructu cras-  
sifusculo & ro-  
tund, pilæ luso-  
ria instar, in quo  
Nux Auellane

par coarctetur, quæ nucleum includit valdè amarum, qui linguæ admodum radicis Angelicæ saporem refert.


Fructus ad sedandam sitim commodissimus. Eo tamen nucleis quamuis amarus longè præstantior: ex eo enim indigenæ oleum eliciunt, seduloque conseruant, quia ad Hepatis & Lienis dolores maximè confert, quibus doloribus cum affliguntur, primum dies aliquot parafissimo vtuntur victu: deinde octo dierum spatio oleum sumunt: quo tempore morbus paulatim minuitur, & tandem curatur. Quod si qui oleum sumere noluerint, veluti pueri & mulierculæ, eo ventriculum, spinam dorsî & latera, inungunt. Idè articularis morbi, cui huius insulæ incolæ valdè obnoxii sunt, summum est remedium.

Ex eadem arbore gummi manat vtilissimum. Ex eo enim cum mediocri oleo supradicto dilu-  
luto, cataplasmata conficiunt quæ pellibus illi-  
nunt, & partibus laborantibus applicant. Hanc  
arborem diligenter propè ades suas, & in hortis  
colunt.

FRVCTVS ORBICVLARIS, CRASSI COR-  
TICIS, TVBERCVLOSI, NIGRI COLORIS.

## CAP. XCIV.

**P**etro Gareto, inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 14. Descriptio  
missus fructus orbicularis propemodum, bi-  
Ec



I



II

ferat. coniecturam faciebam. *Idem in tabula habetur supra n. I.*

## FRUCTVS MLTIFARIAM FISSVS

CAP. XCV.

Descriptio

**I**nter fructus peregrinos, quos adferebat Gener Chirlerus rediens ex Anglia & Belgio erat fructus ferè orbicularis totus, nisi vtrique parte esset nonnihil compressus, finditur circiter in duodecim partes, quæ fungosæ sunt, sapotis manifesti nullius, inest internè ossiculum durum quid autem cõineat ignoramus, nodũ aperuimus, cortex totius fructus, exterior, tenuis fuscus, & cinereus.


Sapor.

Cortex

## FRUCTVS IND. IVGLANDI SIMILIS, TVBEROSVS.

CAP. XCVI.

Descriptio



**I**vgländ pul-  
lunato suo calyce triannuum  
intectum equat  
perpetuis tuber-  
culis, & longioribus iugis al-  
e-ratus, ex cinereo  
ruffescens, cuius  
interuenia te-  
nui replet cor-  
tex fuscus: infu-  
maparte umbilicũ  
habet fissil. m.,  
opposita modi-  
cè in conum fa-  
stigiatur: durus  
est & grauis fru-  
ctus. Illustr. n.  
nostro Principi  
a quo accepimus  
misit D. Paluda-

nus nomine Indici fructus peregrini.

## FRUCTVS IND. OVALIS RVGOSVS.

CAP. XCVII.

Descriptio

**O**valis est figura, vncias ferè duas altus, quinque in ambitu basis cõligens, in qua & pe-

nas vncias longus, quatuor vnciarum eius ambitus, crasso præditus cortice, inæquali, & multis tuberculis obstituto, nigri extrinsecus coloris, intuscinco subru-  
fi, continens nu-  
cleum tenui ci-  
neracei coloris  
membranâ tectũ,  
odoris non insua-  
uis, sed violam  
quali referentis,  
& non ingrati sa-  
poris: crasso pedi-  
culo subnixus suis-  
se videbatur, vt ex  
vestigio, cui inha-

diculi vestigium apparet cum circulo penè fusco  
Superficie est asperiuscula, & veluti fursu-  
rola, punctulis albidis, cinereis, fer-  
rugineis versicolori: grauis est, & concussus  
resonat, nucleum contentum testatus. D. Palud.  
Illustrissimæ C. V. Vittemb. peregrini fructus In-  
dici nomine misit: Vidimus præterea Basileæ a-  
pud D.D.F. Platerum sub titulo Dactyli cum cor-  
tice, quod nomen eidem non conuenit. Simi-  
lem fructum attulit Gener Cherlerus posteaquam  
Londino redisset 1606. sine nomine, à Iacobo  
Gareto datum, vt existimamus, eã est magnitudi-  
ne, quã nostra icon.

Clus. Exot. lib. 2. c. 25. videtur pingere & descri-  
bere his verbis. Exoticus fructus primus, scilicet  
longitudinis, binas [fortè legendum quin-  
as] latus vncias, aut amphor eius ambitus, duro,  
inæquali, rugosusque cortice constans, fusci co-  
loris, grauidus, hoc est, alium fructum vel ossicu-  
lum siue pulpam continens: nam agitatus, strepi-  
tum edebat: quid verò contingeret, me latebat  
initio, quia, quum vnici mihi esset, corrumpere  
nolebam: sed alium similem posteaactus, ape-  
riebam, & nucleum continere deprehendebam,  
crassum, eiusdem cum ipso fructu formæ, cauum  
intus & inanem. Substantiã tamen fuscã constan-  
tem, & sapore quali urystæ & rancidæ amygda-  
læ. Nostri figura eleganter expressa nobis magis  
atridet, quàm Clusii, quæ non correspondet  
aliis multis in libris suis passim expressis.

*Idem cum alia precedenti capite habetur.*

## FRUCTVS EXOT. OBLONGVS,

ANGVLVS CINERACVS.


CAP. XCVIII.

**F**ructus Exoticus alter, eiusdem erat cum pri-  
mo (modo dicto) longitudinis & crassitudi-  
nis, non quidem in rotunditate oblongus, vt ille,  
sed angulosus, cortice inæquali & valde fibroso,  
cineracei foris coloris, internè fusci, leuis, aque-  
dum eã mergebatur, innatans, nucleum cõinens  
profus rugosum [quia fortè ante maturitatem le-  
ctus] & substantiæ rufescentis, adstringentisque  
saporis. Clus. Exot. lib. 2. c. 25.


*Idem habetur cum alia cap. 94. supra n. II.*

## FRUCTVS IND. ECHINATVS, SONORVS.

CAP. XCIX.



I



II

**I**nter fructus pe-  
regrinos Ill.  
Principis, Ducis  
Wirtembergici pie  
memoriæ, erat fru-  
ctus, magnitudi-  
nis circiter nucis  
moschatae, coloris  
cinerei, plurimis  
abundans tuber-  
culis, obtusis, de-  
gustatus videba-  
tur aliquid astric-  
tionis habere:  
pediculus crassus,  
ligneus, quid con-  
tineat, nos latet:  
sonorus est, non  
licuit aperire, quia  
Ill. Principis libi  
relerauit. Qui-  
dam



# LIBER III

327

dam vir doctus adscriperat se putare *Stramoniam*, verum inepit.

## FRVCTVS EXOT. STRAMONIE MODO TVBERCVLVS OBSITVS.

CAP. C.

**N**avigatione Iauanâ Bataui retulerunt, auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 15. fructum fescuncialis longitudinis, vnciam latum, paulo enim planiore erat formâ, colore ex fusco subrubente. Totus tuberculis leuiter mucronatis obsitus, perinde ferè atque *Stramonie* fructus: nucleum autem continebat fuscâ quadam membranâ tectum, oblongiusculum, lauem, spadiciei coloris, qui albescentem medullam continebat, sed duram, [ quia sicca ] & quodammodo insipidam. Huius eicon cum alia cap. præced. habet.

## FRVCTVS PEREGRINVS NOVM NERVIS DISTINCTVS.

CAP. CI.

**N**on inelegans erat, referente Clusio. Exot. lib. 10. cap. 10. fructus, quem Cl. V. Paludanus mutuo dabat, cuius tamen nomen & ipse ignorabat, & illi à quibus acceperat. Erat verò orbicularis formæ, sex vncias in ambitu crassus, tres longus, ductâ à petiolo cui inhærebat, ad extremum fructum lineâ, hoc est, in toto illo ambitu sex vnciarum longitudinem explens, novem nervis à summo ad pediculum semunciarum penè longum ductis, distinctus, fusci vel spadiciei quodammodo coloris, levis, prægnans tamen, & nucleum vel pulpam ressecatam cum seminibus continens, quia agitatus, strepitum edebat.

## FRVCTVS PEREGRINVS, ORBICVLARIS, NOVM NERVIS DISTINCTVS, minor, cum officulo anguloso.

CAP. CII.

**F**ructus peregrinus, inquit Clusius: ære meo cum plerisque aliis exoticis redemptus erat quoque orbicularis formæ, novem similiter nervis à summo ad petiolum distinctus, ut iam descriptus, minoribus tamen neque adeò eminentibus, longè etiam minor: nam trium duntaxat vnciarum quaquaversum erat eius ambitus, nec strepitum vllum edebat agitatus, quia maturitatem forsitan nondum adeptus, & levis ut alter: hunc aperiebam, & in eo multam pulpam cortici adhærentem intuebam, cum officulo valdè inæquali, & totidem angulis, quot fructus nervus habebat, ad summum corticem pertingentibus distinctum, cui sanè simile officulum nullum videre memini: qualem verò nucleum contineret, ignoro, quia infringere nolui.

## FRVCTVS PEREGRINVS ORBICVLARIS, SENIS NERVIS DISTINCTVS.

CAP. CIII.

**F**ructus Clusio prorsus orbicularis figuræ, sed senis duntaxat nervis distinctus ab infimâ se-

Tom. I.

de ad extremum vsque per longitudinem rectâ lineâ excurrentibus, fescunciam longus & crassus, fusci coloris, aliqua tamen ex parte cineracei, nucleum vel pulpam à cortice seuundam, & liberam continens: levis tamen erat, & aquâ merus, innatabat. Hunc ex Guinea acceptum Paludanus etiam concedebat ut describerem, quo nomine appellaretur ignarus.

## FRVCTVS PEREG. EXIGVVS, ORBICVLARIS CVM SEX NERVIS.


CAP. CIIII.



III



I



\*

neret, me fugit, quia agitatus & commotus nullum strepitum edebat, & quia vnicus, infringere nolebam. Huius iconem exhibet in hac tabella numerus III.

## FRVCTVS GYANENSIS, OVALIS, CINERACEVS.

CAP. CV.

**F**ructus peregrinus Clusio Exot. lib. 2. c. 6. anno 1598. Secundus ex Guyana delatus, valdè solidus & gravis erat, ovalis formæ, penè binas vncias à pediculo ad extimum mucronem longus, tres cum semisse mediæ corporis ambitu completens, corio denso, fibroso, cineracei ex fusco coloris, tectus, ambiente putamen crassum admodum, durum, & nigricans, quod nucleum coatinet ferè orbicularem, durum, cineracei penè coloris. Figura est in præcedenti tabula sub num. I.


## NVCLEVS EX GYANÂ SPADICEI COLORIS MEMBRANA TECTVS.

CAP. CVI.

**T**ertius ex Guyana fructus allatus, ut ait Clusius, quem Garetus mutebat, cuius icon, in præcedenti tabella, paulò longior erat ovali: nam duarum vnciarum longitudinem superabat, non adeò tamen crassus ut superior, & magis inæqualis, ut verius dici mereretur nucleus alicuius fructus quàm fructus, spadiciei coloris membranâ

Ee 2

rebus qui haud dubiè aliquo fructu aut nucle fuerit inclusus, medullam siue pulpam continens albam, non ingrati saporis, licet vetustate contrahior esset, & eius medullium in lacunam dehisceret. Huius figuram exprimit tabula antecedens, sub numero II.



FRUCTVS RETICVLATO CORIO,  
PEREGRINVS.

CAP. CVII.

Descriptio FRuctus Clus. Exot. lib. 2. cap. 11. Duro corio, & multis fibris retis in modum quodammodo inter se intertextis & duris contexto præditus erat hic fructus, foris quidem inæquali & rudis, intus verò lævis & splendente, colorèque ad spadiceum tendente, tres vncias cum semisse longus, binas & amplius latus, supernâ in gibbum extuberâs, infernâ planus ferè, nucleum continens crassum, plenum, succulentum, & qui in naui, quâ



recens ex Guineâ aduectus fuerat, iam germinare inciperat, vt mihi referebat Parduinus, qui illum anno 1595. adquisierat: quique haud dubiè creuisset, si statim terrâ commissus fuisset.

Toto porro decennio antè similem accipiebam Viennæ Austriæ, à D. Richardo Guth. Londino missum, pro officulo magni cuiusdam fructus in *Vvingandecavro* siue Virginia nascentis, vt a descriptum erat. Eius pulpa licet solida, quia tamen vetusta, rugosa foris & sulci pænè coloris, internâ autem parte albicans, & acris aliquid saporis: nullum eius nomen neque tunc, neque postea intelligere potui. Similem præterea conspiciebam anno 1603. illumque paulò ampliorem & magis planum, villos quibus tectus erat densos adhuc retinentem, partim crassiusculos & rudes, partim valde tenues & molles, omnes cineracei ex albo coloris.

FRUCTVS EXOT. BAMIAE INSTAR  
ANGLOSVS.

CAP. CVIII.

Descriptio FRuctus ex Iauana navigatione per Batauos delatus, authore Clusio Exot. lib. 2. cap. 15. binas ferè vncias longus, vnam crassus, in quinque angulos distinctus, instar penè fructus Bamiae, siue Alceæ Aegyptiacæ, durus, fusco colore (cui albo permixta) præditus, solidus, hoc est, nullū strepitum, quamvis agitaretur, edens, levis, & in aqua non subsidens: & hic nullâ appellatione

insignitus.

Huius iconem indicat in hac tab. num. I.



I



II

NVX TRIFIDA EXOTICA.

CAP. CIX.

FRuctus exotici Clus. Exot. lib. 2. cap. 25. vncias pænè tres ambitu comprehensens, sphaerica forma, putamine cōstās qualinux iuglās, firmo, sulci externâ parte coloris, internâ spadicei, qui in tres æquales partes diuidebatur, & in ternâ parte in 3. veluti cancamerationes vel loculos separabatur, in quibus singularis grana, malorum vulgarium feminibus non valdè dissimilia.

C. nr. superiori si per numero II.

FRUCTVS EXOT. CINEREVS, CVM  
LINEIS ET TYBERCVLIS, DVRS.

CAP. CX.



I



II

FRuctus exotici, quem Clus. Exot. lib. 2. cap. 19. scribit siue missum à Iac. Plateau, binas vncias cum semisse longus erat, quatuor in ambitu crassus, cineracei coloris, quem aliquo operimento tectū fuisse arbitrat: in quinque partes diuidi posse, venæ per longitudinem ductæ indicabant: alioqui eminentibus

aliquot tuberculis instar vesicularum, oblitus erat, quæ aperta, inanes & inæquales lacunas ostēdebant spadicei coloris & splendentes, quasi semen aliquod continuissent: valdè durus autem erat is fructus, & astringente facultate præditus. *Fructum hunc denotat num. I.*

FRV-



FRUCTVS MALO AVRANTIO RESIC-  
CATO SIMILIS, LEVIS, AVREI  
coloris, octo nervis distinctus.

## CAP. CXI.

**I**acobus Plateau, inquit Clusius, mittebat fructum exoticum, qui prorsus orbicularis erat formæ, quatuor enim vnciarum erat eius ambitus, siue à pediculo circumferentiam metieris, siue medio corpore, corio siue cute testis coloris ex aureo flavescentis, vt exiguum aurantium malum resiccatum videretur, octo tamen nervos satis crassos à pediculo ad summum fructum omni ex latere ductos habebat [ vt hac ratione inter exoticos fructus nervis distinctos, reponi posset] eorumque nonnullos geminos, alios quaternos simul iunctos, alios si regulares: valde autem levis erat, quia resiccatus: breuiter omnes notas habebat mali aurantii, præter illam nervorum distinctionem. *Est hic fructus cum superiori sub numero II.*

FRUCTVS IND. ROTVNDVS, TV-  
BERCVLIS ASPERATVS, NIGER.

## CAP. CXII.

**A**n nux sit ve-  
de Phasiolo-  
rum familia, pro-  
certo adserere  
non possumus.  
Fructus Indicus  
est, aspectu non  
visque adeo spe-  
ciosus, circinata  
ferè rotunditatis.  
Vncias duas penè  
latus, compressus,  
sed è visque  
vt vnciam medi-  
crassitie aequet.  
præterea par-  
gibbosiore: nar-  
vtrinq; ceu gib-  
bus quidam emi-  
net. Cortice ve-  
stitur nigro, tu-  
berculis quibus-

dam asperato, duro: supernè umbilicatus, sub cortice tunica intermedia albicans substantiam internam nucleatam inuoluit, quam citè confidatè aut gustu decernere non fuit, quippe quem Ill. nostra Princip. V Vittemb. terræ committere constituerit, apud quam vidimus, descripsimus & figuram hanc sua magnitudine ferè depingi curauimus.

AMYGDALA GYANENSIS, QVODAM-  
MODO TRIANGVLA CVM TVBERCVLIS.

## CAP. CXIII.

**P**eregrinus fructus scribente Clasio Exot. lib. 2. cap. 6. anno 1598. ex Guyana ad me mittebat Garetus, valde crasso & duro putamine erat præditus, vt non immeritò nux appellari queat, infima enim parte ferè rectilinea erat, & depret-

Tom. I.



\*

nucleum continere deprehendebatur, eiusdem cum nuce figuræ, pelle siue membranâ opeitum rufa, sed interiore parte candidissimum, atque in binas partes separatum, instar amygdalæ, cui etiam similem saporem habebat: quâ de causâ non ineptè fortitan *Amygdala Guyanensis*, siue *Guyanica* dici possit.

FRUCTVS EXOTICVS DVOBVS ANGV-  
LIS DISTINCTVS.

## CAP. CXIV.

**I**nter fructus per Batavos ex Iauana nauigatio. *Descriptio*  
Ine erat auctore Clasio Exot. lib. 2. cap. 15. nonus vnciam longus, minis vnciâ latus, cortice densò constans, cineracei coloris, duobus angulis distinctus, & extimâ parte mucronatus, levis, & in aqua haud subfidens, tamen eâ mergeretur, durus tamen erat, & agitatus strepitum non edebat,

FRUCTVS HEPATICVS INDICVS.

## CAP. CXV.

**R**ariorum fructuum ex Indiæ Guinzæ nouè *Descriptio*  
Importatorum hic vnus, Lutetiâ nobis misit insignis Botanicus Regius Robinus cum hac inscriptione. *Fructus quo Indiani vtiuntur in obstru-  
tibus Hepatib.* Cuius an quisquam hætenus memin-  
nerit, nondum nobis constat. Figura sanè hep-  
ati quodammodo respondet. Est enim altera  
parte gibba seu conuexa, altera sinuata & con-  
caua, figura oblonga, magritudo Castanæ ma-  
ioris, eique concolor, hoc est, spadiceus, sed ad  
pullum accedens: Superficie tenus inæqualis, ru-  
gosus, nihil corticosi habet, eademque ferè sub-  
stantia interna. An alio cortice fuerit compre-  
hensus, nobis incertum. Binalis est, aut gemi-  
nus potius, sulco tamen satis insigni in ambitu  
coherentiam designante: nec multa vi diuiduus.  
Substantia tota glandulosa, Quernæ glandis  
siccatæ, durior, præter leuem quandam quam  
præbet adstrictionem, nullo nec gustu nec odore  
insigni. Placuit curiosius describere pro-  
pter nouitatem & facultatis pol-  
licitationem.

Ec 3

## FRVCTVS IND. DECVSSATVS.

## CAP. CXVI.

Descriptio



**O**Villi renis formam habet, tanquam ex plucibus partibus coagmetatus, cassitaneae magnitud. & colore, oblongus, crassiusculus, parum cōpressus, interdum magis orbiculatus, passim terrae sigillatē (qualis in Officinis ferē ostendi & haberi solet) forma & magnitudine aequans, quē vna quidem parte duo sulci decussati in quatuor partes suis radiis diuidunt: Opposita

verō parte, sigmoides sulcus duplex conformem porcam ambiens, artificiosē exaratus, inter cuius cornua triplex eminentia germinis sedet. Vnde habuerimus pulcherrimum hunc fructum Indicum non recordamur. Binos etiamnum inter Indica nostra monumenta seruamus. Figura vtramque faciem haud imperitē ostendit.

Hunc eundem fructum à Iacobo Gareto depictum exhibet, ni multum fallimur, Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. addita hac descriptione. Elegans sextus fructus & veluti ex quatuor Anellans simul connexis constans, leuibus, spadiceicoloris, qui alio operimento reclusi fuisse videbantur: nam inter interstitia, quibus singulae nuces ab inuicem separatae, restabant adhuc membranaceae cuiusdam fuscæ cutis partes, quā reclusi fuerant. Constabant porro singulae istae anellae putamine spadiceo, ut dixi, coloris, firmo quidem sed non valde denso, in quo nucleus continebatur crassus, durus, foris subtilis, internā parte candicans, neq̃ ingrati saporis.

## FRVCTVS ATER, QVATVOR SVLCIS DISTINCTVS.

## CAP. CXVII.

Descriptio

**P**orifus ater erat xi. fructus à Iacobo Gareto, missus lauisque & splendens, quatuor sulcis supernē distinctus (tanquam in quatuor partes diuisus esset) quorū bini ad prius aduersae umbilicum vsque ducti: planus alioqui, & orbicularis penē formae, vnciam paulō minor, supernā parte aliquantulum tumescens, & quasi puluinator, nisi quā parte sulci deprimebant: aduersa pars vestigium retinebat sulcum, quo fructui siue cortici, qui tegeret, firmiter inhaerēse videbatur, quale in castaneae equina conspiciere est, verūm non adeo amplum: durum autem & solidum deprehēdebam, adeo ut etiam limam quodammodo respueret: eam ob causam, quem nucleum contineat, mihi incompertum. Huius mentionem



facit Clus. Exot. l. 2. cap. 16. Formam huius fructus depingit numerus I.

## FRVCTVS ORBICVLARIS FERE, CVM TRIBVS SVLCIS ET TRIBVS FORAMINIBUS.

## CAP. CXVIII.

**F**ructus quem misit Iacobus Gareto, formam orbicularem habebat, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. paulō tamen planior erat, superna & sessili parte, vnciam latus, solidus, nec vllum strepitum dum agigaretur, edens: cineracei coloris, tribus canaliculis siue sulcis distinctus à summo vsque ad tria formina, quae in lateribus obtinebat, tribus aliis minoribus summa parte praeditus.

Ideam huius demonstrat tabula praecedentis num. II.

## FRVCTVS ORBICVLARIS FERE FORMAE, FVSCI COLORIS.

## CAP. CXIX.

**F**ructus peregrinus quartus à Petro Gareto missus, [Clus. Exot. lib. 2. c. 14.] orbicularis formae, vncialis magnitudinis, lauis, fusci coloris, breui quidem subnixtis pediculo, sed cortice satis duro, tamen non valde crasso praeditus, qui apertus [nam in binas partes diuidi posse ex signis apparebat] quatuor grana nigra continere deprehēdebat: semunciam lata & longa, cordis humani formam quodammodo referentia, sed magis plana, binis duris membranarum, ut in nuce iuglandis, illa separantibus. Exprimatur hac figura sub numero III. in praeced. tab.

## NVX ORBICVLARIS, CINERACEI COLORIS.

## CAP. CXX.

**F**ructus (seu verius Nux) à Petro Gareto missus, orbicularis formae, variae tamen magnitudinis (plures enim conspicebam), quorum nonnulli ternas, aliqui binas duntaxat vncias ambitu comprehēdebant: omnes duro sed non crasso praediti cortice, cineracei foris coloris, & qui alio operimento reclusi fuisse videbantur: interna nuci pars fusca & splendens, atque nonnulla ex parte videlicet



videlicet nuclei, quem continebat, fastigium tangebatur) fungosa materia plena: nucleus autem inferiore parte crassior erat, deinde in metà quodammodo assurgebat, & in nutantem mucronem definebat, coloris exterius subpunicet, substantiâ satis molli & interiore parte flavescente præditus, iniucundi odoris & valdè

ingrati saporis, ut non mirer, eos qui edissent, malè affectos fuisse, quemadmodum mihi referebant qui obseruauerant. Cæterum qualis arbor esset quæ hunc fructum protulisset, cuiusve formæ fuissent eius folia, intelligere non potui. *Hæc refert Clus. Exot. l. 3. c. 14.*

FRUCTVS PLANVS, RVGOSVS, NIGER, SEMINA CONTINENS.

CAP. CXXI.



ce, & semina continens, ut strepitu, quem agitatus faciebat, deprehendere poteram: alio integumento haud dubiè tectus fuerat, nam alterius fructus ossiculum, sine nucem esse apparebat. Verum enim verò qui mihi commodabat, nihil certi affirmare poterat.

NVX ORBICVLARIS PEREGRINA, GLABRA, SPADICEA.

CAP. CXXII.

NVx hæc Clusi, lib. 2. cap. 13. orbicularis penè formæ, paulò tamen longioris: nam illius ambitus, sumptâ vtrinque per longitudinem mensurâ, quinque vncias cum semisse continebat, vix autem quinque vnciarum erat circumferentia. *Tom. I.*



rentia: infernâ parte nonnihil mucronatâ, superiâ verò obtusiorè, duro & satis glabro putamine constâs, spadicei coloris, & nucleum continens, ut ex agitata strepitu cōiecturam facere poteram: alio verò inuolucro tectam fuisse certum est: quale porro id fuerit, aut quali in arbore nata hæc nux, intelligere nequimus.

NVCIS AMYGDALINÆ PENE FORMA fructus, rugosus, subruhi ex fusco coloris, vñâ parte planus.

CAP. CXXIII.



quæ à pediculo pependerat, subruhi ex fusco coloris, non valdè grauis, licet densissimo corio constans, ut quod semencialis ferè esset crassitudinis, multisque fibris obliquè & transversim sese secantibus contextum, & adeò durum, ut aperire nequiverim ad conspiciendum quid contineret, nisi cultro magnâ vi cum malleo adactò: geminum autem & oblongum nucleum continere deprehendebam nigra membranâ septum, internâ quidem parte albicantem, dulcisque, ut amygdalæ, saporis, nisi iam ranciditatem ob vetustatem contraxisset.

FRUCTVS INFERNA PARTE PLANVS, membranâ spadicei coloris tectus.

CAP. CXXIV.

FRuctus alter peregrinus, quem accepit à Petro Gareto Clus. Exot. lib. 2. cap. 14. erat longitudinis fructus prædicti, qui nucis amygdalinæ formâ, minùs tamen crassus, infernâ parte planus.

Ecce A

## HISTORIÆ PLANTARVM.

nus, supernâ in gibbum allurgens, infimâ parte quâ pediculo adhaerebat, latior quàm extimâ. quâ in obtusum mucronem defuisse videbatur: membrana autem dura & splendens, spadiceique coloris, fuscum corticem tegebat, continentem nucleum siue pulpam quandam cineracei ex albo coloris, quâ ore aliquantulum retenta, in farinaeam materiam resoluebatur quadam acrimoniâ prædita.



\*

FRUCTVS OSSICVLA TERNA,  
AVT QVATERNÀ SIMVL IVNCTA,  
cortice non valdè duro, rugoso, cineraceique coloris.

CAP. CXXXV.

Descriptio

Fructus inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 14. à Petro Garcto acceptus, siue ut verius dicam, fructus officulû (terna enim aut quaterna simul coniunctim nata fuisse videbantur alio quodam fructu inclusa) binas vncias longum erat, totidè latum, mediâ parte tumente & sese attollente planis & compressis lateribus: quâ fidem faciebant, bina ad minimum



\*

alia adiuncta fuisse, cortice non valdè duro præditum, externâ parte rugosum & scabrum, cineraceique coloris, internâ autem laue & candidum: magnum nucleum continens prorsus implentem corticem, solidum quidem, non tamen durum, tenui membranâ tectum: ipsa autem interna materia siue pulpa, nucis vnguentariæ penè odorem habebat, sed acrisculum saporem, an ob vetustatem, ignoro.

BACCÆ CVIVSDAM PRÆGRANDIS  
OSSICVLVM.

CAP. CXXXVI.

Descriptio

Fructus à Paludano concessus, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 20. baccæ cuiusdam prægrandis officulum, ipsi quidem & nunc ignota, vide-

batur: sed quod formâ Oliuæ officulum vtcunque referret, longè tamen maius, ut pote fescuncialis lógitudinis, vncialis verò latitudinis, rugosum, solidum: nucleum in se continens, ut ex agitati strepitu coniecturam facere licebat.

FRUCTVS OLIVÆ OSSICVLVM RE-  
ferens, rugosum, cum tribus linceis.

CAP. CXXXVII.

A Vuthore Clusio Exot. lib. 2. Fructus sextus concessus à Paludano, vnciam crassus erat, fescunciam serè longus, forma etiam oliuæ officulum quodammodo referens, maior tamen, rugosus, & veluti frequentissimis tuberculis oblitus, tribus nervis secundum longitudinem distinctus, extremâ alterâ parte obtusâ, alterâ verò mucronatâ, satis gravis, & nucleum aut tale quidpiam continens, ut ex agitatione coniciebam: in aquam iniectus, non mergebatur.

AVRANTII FORMA, COLORIS  
cineracei fructus, strepitum edens.

CAP. CXXXVIII.

Fructus communicatus à Paludano, ut ait Descriptio Clus. Exot. lib. 2. cap. 20. prorsus orbicularis erat, utrique nostrum ignotus, parui mali, siue aurantii formâ, quatuor aut quinque vncias ambitu continens, levis, coloris serè cineracei, solidus & durus, pulpam aut nucleum iam rescicatum continens, quoniam commotus strepitum edebat.

DATVRÆ SEMINE FRUCTVS.

CAP. CXXXIX.

Clus. Exot. lib. 2. cap. 20. scribit fructum sibi concessum à Paludano, orbicularis serè etiâ formæ, qui tenui veluti membranâ consistaret, breui petiolo præditus, penè cineracei coloris, intus inanis, nisi quædam rugosa granula continuisset, tis quæ in Solano manico maiore conspiciuntur non valdè absimilia, inhærebat autem sarmentis quibusdam, vitis viniferæ sarmenta referentibus.

NVCLEVS NVCIS QVODAMMODO  
conuolutus.

CAP. CXXX.

Annotatum à Clusio Exot. lib. 2. cap. 20. Paludano concessisse fructum in orbem quodammodo conuolutum, nucleum veriùs, quàm fructum, qui putamine aut nuce aliqua conclusus fuisse videbatur, solidus tamen & fusci exterioris coloris, internè albus: non ingrati quidem saporis, sed acidiusculi, quem tamen vermiculi albi, iis non dissimiles qui in Ponticis siue auellæis nucibus generantur, sed minores, valde appetebant, & breui tempore totum erodebant.


BARV.



BARVCE FRVCTVS E PLVRIBVS NV-  
CIBVS, ARBORIS HVRÆ.

## CAP. CXXXI.

*Valichius Syvertz anno 1599. redemerat de Nautis ex America reducis, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 21. fructum baruce appellatum, qui erat admirabilis formæ, & in Guyana nasci ferebatur satis celsa arbore, Hura nuncupata. E multis autem veluti nucibus vncialis magnitudinis mirabili modo simul iunctis & connexis constabat, quæ in bina lignosa duraque putamina dehiscabant, & orbicularem planumq; nucleum continebant cineracea membrana tectum. Eum verò fructum tot nucibus simul iunctis, & veluti in vnum caput coactis interdum crescere intelligebam, vt tanquam orbicularem clauam, geminum pugnum crassitudine æquantem, & in multos angulos desinentem referre videatur. Huius fructus nucleos, incolæ vt dicebant, ad corpus vomitu & alui deiectione purgandum.*

VVARICORAMORI, RVGOSÆ GLANDI  
SIMILIS FRVCTVS,


## CAP. CXXXII.

*Emptus fructus à VValichio Syvertz de Nautis reducis ex America, vt ait Clus. Exot. lib. 2. cap. 21. cui adscriptum erat secundum flumen Arrivari crescere, adquam tamen rem vtilis esset, ignorari. Binos autem similes accipiebam, eiusdem quidem formæ, sed magnitudine differentes: nam vnus binas fere vncias longus erat, alter vncialem longitudinem non superabat, vterque tereti & rugosæ glandi similis, adstrictior facultatis, qui alio cortice siue putamine tectus fuisse videbatur.*

## ARARA FRVCTVS AMERICANVS.

## CAP. CXXXIII.

*Rara fructus emptus, inquit Clusius, In Kajana crescere, in arborene an humiliori planta, non erat adscriptum. Erat verò vncialis longitudinis, cute veriùs quàm putamine constans, satis durâ tamen, nigraque, longiore pediculo & inæquali nitens, vt plures flores inhæsisse viderentur. Incolæ eius contracti & in aqua elixi decocto, maligna vlcera lauant, ad eam curandum: aiebant etiam vtilem ad aluum emolliendam, quod de nucleos intelligendum arbi-*

OSSICVLVM FRVCTVS ORBICVLARE,  
aliquantulum a mucronatum tuberculis  
obtusum falcem.

## CAP. CXXXIV.

*Communicab. VValichius P. Idyrius Clus. Descriptio Exot. lib. 2. c. 22. ossiculum fructus veriùs quàm fructum, quod erat vncialis longitudinis, orbiculati penè formâ præditum, [ nisi quâ parte fructus ipse quo continebatur, è pediculo pependerit & extimâ, quæ aliquantulum mucronata ] trium fere vnciarum ambitu, fæci coloris durum, & perpetuis tuberculis oblitum [ quæ pictor non expressit ] in quo tamen apparent veluti triangularis formæ vestigia in vtraque extremitate, solidum, graue, aquæ tamen innatans, nec sicens, etiamsi eâ mergatur. E Guinea allatum significabat. Est cum præcedenti numero scilicet II.*

CVNANE, FRVCTVS ARBORIS MORRE-  
MOR, LONGVS, VEL OVALIS, FERE NIGER.


## CAP. CXXXV.

*Valichius Syvertz Antilethanij anno 1599. de Nautis ex America reducis redemit auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 21. fructum Cvnane vocatum, binas vncias longum: vnciam summo capite latus, deinde paulatim ad infimum vltique gracilior fiebat, dorso paulò elatiore levis, niger & splendens, tribus foraminibus summo capite præditus, vno*



*superiorem, binis inferiorem. Illum in pusilla arbore nasci ferebant, cui nomen Morremor: immaturus*


autem erat: sed plenam maturitatem adeptum, duplo maiorem asseriebant: eumque supra ptunas totum, manducari ab iocolis aduersus capitis dolores. Hunc fructum indicat numerus I.



CUNANE, NVCI SIMILIS, CINEREI COLORIS.

CAP. CXXXVI.

**Descriptio** **F**Ructus, quem communicabat Wilhelmus Pardynous, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 22. erat longitudinis darum vnciarum cum semisse: qua parte autem latissimus, vncialis aut paulo amplior latitudo, forma nonnihil conuexa, dorsū elatum & assurgens, arcū caput, infima pars in mucronem desinens, cineraceus color, crassiores eminentioresque nervi à hummo capite ad infimam partem per dorsum excurrentes tantā arte expressi, vt humanā industriā sculptos quis arbitrari potuisset: alio autem cortice testum verisimile est, qui assidua à fluctibus marinis in littore volutatione attritus fuerit: constabant verò illi nervi ex fibrosa materia, quemadmodum infima pars nonnihil attrita fidem faciebat. Ad nucis porro Cunane formam valde accedebat, exceptā illā nervorum eminentiā, tum etiam colore, qui in Cunane prorsus alter erat. Hac icon ostenditur in precedenti tabula numero II.



FRVCTVS PLANVS SVBPVRPVREVS, nucleo impensè amaro.


CAP. CXXXVII.

**Descriptio**



**F**Ructus nobis à Iac. Gareto datus, inquit Clusius Exot. lib. 2. cap. 16. planus erat & circino ducte ferè rotunditatis, quem non singularem, sed plures simul connexos alio fructu inclusos fuisse arbitror: nam alii aliis quasi incubuissent vestigia in nonnullis adhuc apparebāt. Erat verò crasso quidem, sed fungoso cortice præditus, subpurpurascens coloris,

levis, fescunciam latus, nucleum continens planum, candicantem, impensè amarum: nullum nomen erat adscriptum, vt nec aliis plerisque quos mittebat.




FRVCTVS EXOT. INÆQUALIS, fusci coloris.

CAP. CXXXVIII.

**Descriptio** **I**acobus Gareus, vt Clus. testatur Exot. lib. 2. e. 16. mittebat fructum durum, densoque cortice præditum, eoque inæquali & fusci coloris, inter-

nè leuiore & quodammodo cineraceo, mediā eius parte fibrosā & firmā, nucleū autem continebat auellane suo putamine incluse magnitudine, graue, durum, rugosum (quia resiccat) in binas partes diuisum, solidum, interiore parte albicantem, in quo nullum manifestū saporem deprehendere poterā, quia omnis vis ob vetustatem fortè evanuerat.




FRVCTVS TOTVS NIGER, BINIS FORAMINIBUS INSIGNIS.

CAP. CXXXIX.

**Descriptio** **F**Ructus à Iac. Gareto missus Clus. vt apud eum videre est, Exot. lib. 2. cap. 16. vncia maior erat, circiter vnciam latus, totus niger, & satis laevis, anteriore parte binis foraminibus insignitus, posteriore vestigia retinēs, quo vel pectiolo irā hæserat, vel suo loco, si aliquo lobo inclusus fuerat, an nucleum contineret, ignoro: agitatius enim nullum crepitum edebat,



& in aquam cōiectus non mergebatur. E Brasilia allatus ferebatur.



ANACARDIVM. CAP. CXL.



**Descriptio** **A**nacardio fructui nomen dedisse creditur forma auiculæ cordis æmula, compresso, vnciam longo, aliquando maiori, in obtusum mucronem desinenti, ex pediculo rugoso totam basin occupante appendice, colore nigro, aut fusco splendenti: externo hoc cortice ex altero nucleum immediatè ambiente clauditur



tur liquor glutinosus, seu mellig nigricans, cui alii vim causticam, Cordus saporem primum dulcem, mox acrem, deinde vehementissimè adstringentem, adeò vt fauces in angustiam constingat & strangulationis periculo respirationem detineat, adscribit. Nos in inueneratis, quæ habemus, vt substantiam diuerfam concretæ melliginis splendido nigrore bitumen Iudaicum referentis & porosæ, inuenimus, ita & saporem penitus exoleuisse, & nihil quàm faciam dulcedinem lingæ offerri, nucleum verò in membranæ nigricantis tenuitatem exaruisse, quem Cordus planum candidumque prodit. Obseruamus & gemella, aut certè per medium diuisa, cuiusmodi curauimus vnum depingendum, & alium cum crasso pediculo, tertium apertum.

*Baladar* Serapioni est Anacardus fructus arboris similis Cordi auis, cuius color est rubeus, cordi penè concolor, in quo continetur substantia quadam sanguinis æmula. Auicenna *Anacardum* similem ossi Tamarindorum facit: medullamque eius similem medullæ Amygdalæ dulcis, nec in ea vllum esse nocuum: cortice raro, persorato, vel habente foramina, [ sic interpretis ait ] hoc est, vt nos interpretamur, intus cauo, vt patet in sequentibus: nam addit in cuius raritate (cavitatem) est mel viscosum, odoratum. Sunt qui cum Nuce masticent, absque vlla noxa.

Anacardi, & Anacardum montanum Rhazæ. Inde confectio quam ab Anacardi cuiusdam arboris Indicæ [ vt ille ait ] fructu Anacardinum appellant: & Anacardorum succus, qui ob similem mellis consistentiam mel Anacardinum dicitur. Eorundem & Melues meminit, vt dicitur in viribus *diaphanæ* Medicis recentioribus, sicut legimus apud Paulum in quadam compositione, & apud Actur. in antidoto aureo Alexandri & in Dianacardo vocato.

Anacardus, Pediculus Elephantis ab imperitis petperam dicitur, teste Pandeet. At Platearius, Anacardi, inquit, sunt fructus in India nascentes: quidam dicunt, quòd sint pediculi Elephantis, quod falsum est. Ex tamen hortus sanitatis quoque Pediculum Elephantis vocat, in quo icon exhibetur: cuius plantæ fit, nos lateat: saltem Anacardum non exprimit.

Ruell. & Matth. apertè dicunt veteribus Græcis incognitum, quemadmodum & Rheginus, cui Anacardus dicitur in masculino. Angul. optimè descriptum ait à Serap. *diaphanæ* & Enschlino in Nomenclat. *Sergbaum.* Anacardium huc Anacardus. Germ. *Anacardien*, Elephanten aut *Belffanten lauß.* *Abollador* in Onom. phil. Tixiti. Lacuna Anacardos inter Nuces refert. Garcias Anacardio nomen, inquit, indiderunt recentiores Græci [ nam Veteribus ignotum fuit ] à cordis tum similitudine, tum colore, Arabum vestigia secuti, quibus *Baladar*, Indis verò quoq; *Bybo* dicitur.

Vult autem Clusius legi *Beledhar*, ac notat Garciam sic scribens. An Anacardum habet aliud simile cum Beledhar? an verò Beledhar habet cordis significationem? utroque modo acciperis, vtrumque falsum.

Lusitanis Fava Malaqua, quòd viridis & in arbore pendens similis sit nostrati maiori Fabæ. Quod confirmans Acofta, Anacardium, ait, fructus Fabæ vulgaris admodum similis dum adhuc virescit, & recens est: exsiccatu verò niger & splendens: continet medullam Amygdalæ similem, inter quam & supremum corticem oleum admodum vians inuenitur. *Muramur* verò neque

Garciam neque Costam arborem Anacardiorum descripsisse.

Cæsalpinus verò noua prodit opinione, quando ait: Ab Anacardo non abhorrent conditiones traditæ Perseæ: nam similis est Myxis rubentibus, vt Plin. testatur: depressus autem est Amygdalæ modo, cui Theoph. comparat. Præterea venenum continet: licet alicubi innoxie comedatur. *Hæc ille.*

Illis quæ Veteres scripsere de Perseæ, lib. præcedenti relatis, Lector Anacardos conferre potest, potiss. cum verbis Theoph. quæ & ab ipso Cæsalp. citantur. Nucleum intus habet Perseæ, vt Prunus, longè minorem & molliorem: carnem vehementer dulcem, suauem, concoctu facilem: nec si comedatur, quicquam nocet. Anacardum verò non esse fructum similem Pruno nec Nucem, qualis est in Pruno, & ex pediculo Anacardis interdum adhærente satis patet, & ex tota adeò facie & constitutione fructus. Præterea Anacardos nullam supra se habere carnem, qualem Pruna, neque habuisse nostros, manifestum esse putamus, & vel semestri Pharmacopœo constare possit.

Serapio scribit deserti ex Sim, & nasci in Sicilia in montibus ignis. Paludanus etiam testatur se virides ex arbore pendulos in Sicilia monte Aethna vidisse. Monachi quoque tradunt de Sicilia optimos adferri Anacardos: & Curtius non in Sicilia tantum montibus, sed & in Apulia provenire inquit. Cordus verò adferri ex transiariensis partibus ad nos in Europam. Magna, inquit Garcias, [ vt & Linschottanus nau gauris suæ cap. 83. ] eius est in Cananor copia, tum in Calecut, reliquisque Indiæ Provinciis, mihi cognitis, velut in Cambaia & Decan. Et Acofta magnam refert esse copiam in Malabar & reliquis Indiæ regionibus, quod præter hos & Platearius, & Ruell. Gorthæus, Rob. Conft. & Curtius tradunt: hic speciatim etiam de Syria adferri.

Deligenda nigerrima, ponderosissima, candidum recentem nucleum & copiosiore ac fluidiorem liquorem habentia, vt suadet Cordus, qui plurimis annis durare ait, antequam vetustate corrumpantur. Rhafæ præcipit ea [ vasa ] quibus conservantur, semper infundenda & humectanda esse.

Anacardi, tradente Rhazæ, calidissimi sunt, frigidis ægitudinibus & obliuioni auxilium ferentes: sanguinis tamen generant adustionem, ac fortassis ad amentiam perducunt. Idem hausti acutos morbos creant. Confectio verò Anacardina dicta est theriaca Paralyfis & Torturæ & Apoplexiæ. *Baladar* seu Anacardus ex Aben Mesuai apud Serap. calidus est in quarto gradu, & confert vitiatu sensibus, memoriæ, & omnibus ægitudinibus cerebri factis à frigiditate & humiditate, & nervis resolutis. Idem ex Gal. citat drach. eius dimidium sumptum conferre memoriæ, sed melius & efficacius eius partem internam, delere verrucas, & exulcerare cutem. Ex Abegerig citat, vehementer calidum esse, commouere *algues* & *baras* & lepram, & apostemata, præsertim iuuenibus & cholericis, & fortè etiam interficere. Quapropter iis non exhibendos. Prodesse tamen Paralyticis, & ad eam procliuibus. Anacardium, Auicenna: auctore calidum & siccum est in quarto recessu. Eius melligo exulcerat, inflamat, sanguinem & humores adurit. Verrucas delet & leucen, alopecias implet à pituita ortas, nervorum restrictionibus & resolutionibus confert, memoriæ abolitæ aut imminutæ succurrit, præsertim

Perseæ.

Cæsalp. not.

Locus.

Delectus.

Viris &amp; v.

sus.

Noxa.

Paralyfis.

Tortura.

Apoplexia.

Tempora.

Verruca.

Causticum.

Paralyfis.

Téperam.

Noxa.

Leuce. d'o.

pocia.

Placor-  
mides.

confectio ab Anacardis denominata, mentem ta-  
men mouet. Haemorrhoides immodicè fluentes  
suffuso exsiccant. Denique veneni non est expers,  
quin adurendo humores occidit, cui occurritur  
machid vaccino (fortè lacte) & oleo nucis.

Elst Anacardis  
Vires

Rhaza aduersus Anacardos in principio buty-  
rum coctum & crudum, & oleum telami-  
num, donec suffusio & mordicatio, si qua  
sentiat in faucibus ac ventriculo, cesset, danda  
praecipit, postea vero aquam hordei & lac vacci-  
ni acidum in potu, & oleum violaceum ossa-  
tum praebendum. Caput quoque epithematis,  
qualia e de alguete qui praescripfit, muniendum.  
Sed & Psylla mucilago cum rulepo aliquo conue-  
niente aut succo Granatorum in potu dari potest.  
Noces verò propriè qualem iis resiliunt, eod-  
em teste. Melues Eiect. Anacardino speciatim  
his vires tribuit. Ventris totus inferioris & cere-  
bri affectus frigidus compescit, sanguinem reddit  
purpurem, & inde spiritu animali reddito purga-  
tione & tenuiore, sensus omnes, apprehensionem,  
intellectum & memoriam iuuat, coloremque vi-  
uidum corpori tribuit. Compositionem vide apud  
eundem. Sed quod sextum demum mensem dan-  
dum consulit ad diachil. cum aq. Foenic. & Apili:  
quo sumpto, vitandum laborem, iram, coitum,  
ebrietatem. Ideo autem post sextum mensem da-  
re iubet, quòd tum vis ferè eius maligna, vt censet  
Sylius, expiauerit feruendo antè namque vti est  
periculosum. Apud Aetiar. quoque antidotum  
dianacardon habes, ad vertiginosos, comitiales,  
difficiliter spirantes, & ileños: menses pellit, in-  
cipientem hydropem & cachexiam sanat, Parat-  
ur vt Mel Anacardinum dictum, cui incocti sunt  
Anacardi recentes & relictu. Vsu frequens est, in  
compositionibus, vt passim videre est apud Pra-  
dictos. Hec Veteres.

Dofti.  
Lunio.

Antidotum  
Lianacardon  
don: eius-  
que vires.

Mel Anacardis  
Vires.

Temperã.

Myropol.  
Vires. Vires.  
Vires.

Non Gene-  
nari  
Asthma

Lumbrici  
Vires.

Cassipium  
Strum. a.  
Ad obli-  
guos  
pannos.  
Vires. Vires.  
Vires. Vires.  
Vires. Vires.  
Vires. Vires.

Conditã.

Cibus.

Mangas.

Anacardi Mart. exsiccant & exsiccant tertio ex-  
cessu: praestat in medicina liquor, etsi myropolæ  
còmun errore & cortice & nucleo vtantur. Por-  
ta Neapol. Anacardia noxia dicit, & deleteria non  
vacare facultate, quibus remedium sit oleum ex  
eorum nucleis expressum. Garcias Scrap. repre-  
hendit, quòd Gal. citat, tanquam huius fructus  
meminerit, [cùm tamen illi planè fuerit incogni-  
tus, vt ille ait,] quòdque deleteriam habere facul-  
tatem scribit, cui tamen experientia refragetur,  
siquidem in Indis è lactis sero maceratum asth-  
maticis dari, & aduersus lumbricos. Præterea iis  
viridibus (addit) & sale còditis vtuntur in cibariis,  
oluarum conditarum modo. Fructu verò sicca-  
to caustici uice vtuntur in strumis: totaque India  
huius cum calce misti vsus est ad pannos obsigna-  
dos. Auc. idem taxat, quòd inter venena retu-  
lent, quæ deleteriæ sint facultatis. Nulla enim præ-  
ditum esse venenosa facultate, ostensum: caustici  
verò vim non nisi in sicco esse. Nonnulli,  
infit idem, calidum & siccum constituunt in quar-  
to, alii in tertio, nemo tamen mihi satisfacit, quã-  
doquidem in virente clarum est deesse hunc ex-  
calfacientem & exsiccantem excessum: neque ra-  
tioni consentaneum videtur in eo caliditatis & sic-  
citatibus gradu constituere quo est Piper, nisi fortè  
quod in Sicilia nascitur sit ea facilitate præditum.  
Eiusdem fructus facultates Acosta persequitur in  
hunc modum. Ego sanè vidi hunc fructum viridè, &  
per multos dies sale & aqua conditum Oluarum  
Hispanicarum modo venalem in foro proponi,  
& edi non solum quidem, sed excitandæ appeten-  
tiæ causâ coctæ orizæ admisceri, vt solent fructum  
Mangas vocatum, aliòsque fructus astringentes  
& acidos, alios minime. Nonnulli in desiccato

extimum corticem demūt, eamque membranana,  
qua medulla tegitur, deinde medullam edunt ad  
bibendi appetitum irritandum. Illud potè cer-  
tissimum, oleum id quod inter corticem & nucleū  
continetur, admodum causticum esse & veneno-  
sum. Totà tamen prouincià Malabar, illius vsus  
est caustici vice. Si quis insillit in putridum &  
cauum dentem, vrit, frangitque, & corrumpit  
facile. Calce addita ad bombycinos pannos obfi-  
gnandos, & alias res quaslibet notandas vtuntur:  
etenim notam adeò firmiter imprimit, vt nulla lo-  
tione eximi queat. Solent interdum Indi non-  
nulli hunc fructum cuspidi cultelli infixum cande-  
lae ardenti imponere, qui, dum vritur, mirum quos  
strepitus edat, quas ignis scintillas quasi fulmina  
eiciat diuersorum colorum, eaque ratione rudio-  
ribus quibusdam & mulierculis imponunt, illis  
persuadentes, se in his scintillis & flammæ radiis  
spiritus conspiciere qui ipsis loquantur, & edoceat  
quodcumque scire cupiant. Tali igitur commen-  
to miseros fallunt, persuadentque quod volunt,  
dantes responsa iis, qui ipsos consulunt, pro suo  
arbitrio. Vt verò omnes isti Gentiles, augures, in-  
cantatores, & dinatores rarè loquantur, & cum  
mora ponderèque respondent, in suis responsis  
semper sunt ambigui, & adeò astuti, vt quomo-  
documque res, de qua consulti sunt, cadat, sua  
exiluminatione minime periclitentur, dicantque  
se euentum prædixisse.

## CAIOVS.

## CAP. L.

Caiio nomine innotuit fructus peregrinus (hic  
cum præcedenti pictus.) Castaneæ maiori par,  
forma renum, altera parte gibbosus, opposita la-  
cunam impressam habens, quæ pediculi auulsi ve-  
stigium apparet crassior, infima parte tenuior, cor-  
tice autem tegitur cinereo, duobus maculis ma-  
gis albicantibus vtrinque lacunam dictam obfi-  
dentibus. Præter hunc corticem alius nucleum  
complectitur pallidum, eà formà quæ & totus est  
fructus, succulentum, sapore Amygdalæ dulcis,  
substantia molliori: inter duos cortices, qui cul-  
mi ferè latitudine inuicem abfunt, tophaceis ca-  
uernulis còcrecetur melligo crassiuscula & læta, se-  
pè ceraforum colore & consistentia, sapore pri-  
mum adstringente, mox insigni acrimonia lin-  
guam vellicante, seruata tamen adstrictione.

Theueto depingitur & describitur arbor ipsa,  
folio Piri, acutiore paulò, mucrone subrubente:  
cortice item nonnihil rubente, satis amaro, mate-  
rie molliuscula: fructum ferè pugni magnitudi-  
ne, oui anserini formæ, cuius fini Nux quædam  
Castaneæ æqualis adnascatur, renis leporini for-  
ma. In eius tamen figura accessariæ nucleæ con-  
nexum aliud ostendit, quàm ipsius consideratio  
doceat: si quidem, vt mox diximus, pediculus quo  
primario fructui comectitur, non in tenuiori,  
sed crassiore latiorèque parte conspicitur, quod  
etiam melius demonstratur per figuram Linchot-  
tani, qui hæc tradit de Caiis.

Arbor in India ad Mali fructus formam fert Pi-  
ri magnitudine, flauo colore, posteriore parte a-  
cuta, & anteriore crassa, molli tractu sunt matu-  
ri, & contraria planè forma Pomis crescent. Cùm  
enim Poma pediculo in crassiori parte arbori ad-  
hæreant, hi fructus (quos Caiones vocant) ibidem  
Castaneam ostendunt, magnitudine pollicis prio-  
ris articuli, alio sanè & diuerso à castaneis laque  
colore.



colore. Saporem quoque gratiorem habent, verum affari debent. Interiorum albescunt vt castaneæ Europæ, putamine tamen crassiore, cui cœruleus color ac lauidus est. *Caioues* ipsi ea parte quæ anterior est pomo, caulem habent inlitum arbori.

Gēn. epistolâ ad Adolphum Oconem: Fructus reni similis quodammodo, figura & magnitudine leporinum renem referens, Anacardiis vocatis congener, vt iure *ἀνακαρδία* in dicitur appellatione nominari possit. Qui namque *Ἀνκαρδία* vocantur, minimè mihi placent. Longè autem magis errant, qui *ἐλαειδέν* seu Oliuellam aut Fabam Aegyptiam appellant. Indigenæ quidem Indi, Canibales maxime & Anthropophagi arborem *Acaiou* & *Caiou* nuncupant: fructum verò Recentiorum quidam *καταιον βροστιχάκον*, id est, *castaneam bresilianam*.

Rondel. in praxi sua, quam manu mea transcripsi Monspelii [ego Bauh.] Castaneæ, inquit, quæ adferuntur ex India, quæ formam renis habent, ita vt videantur esse species quædam Anacardi, fructus ligni quod vulgò dicitur *Bresil*. Sed fallitur Rondel. Theuetus enim aliqui Indiarum regionum *ἀνκαρδία* Scriptores, Brasiliam ab hac arbore separant: Theuetus speciatim quoque Brasiliam ait fructu carere.

Clus. apud Garciam, Nucis genus vocat è Brasiliæ regionem, incolis Caiouis dictum, cuius arbor magna, fructum ferens oui anserini formæ &c. quo vtuntur Brasiliæ, [licet Theuetus contra asserat] in extremo fructu prominet Nux quædam renis leporini formæ &c. Idem apud Acoftam: mirari satis nequeo, Acoftam non describere Nucem quæ in extremo fructu Caiouis nascitur. Caiouis pronuntiandum potius, quàm Caias. Acofta notat *Caiu* vulgò appellari fructum. Theueto Arbor Acaious. Vngunt arborem Theuetus & Linschottanus, nec figuræ admodum differunt, sed huius tamen concinnior, quia ære exsculpta, quemadmodum & Bryfratrum. Caiouis Clus. Hist. Lugd. Cast. Dur. Caioues Paludan. qui omnes testantur quosdam Anacardiorum genus existimare. Sed Hist. Lugdun. Caioues & alio loco denuò de eo tradit sub titulo Acaiou. Et Taber. Caioum audacter Elephantem laus German. vocat, quod nomen & Anacardis quidam tribuunt, vt dictum cap. præced. quasi i. p. certò constaret ad Anacardos esse referendum. Et Cat. Francof. Caioum aperte Anacardium Brasiliæ vocat. Lerijs Brasiliæ arborum dicit elatam Vlmorum modo, cuius fructus à siluestribus Aca-iou dicatur, crassitudine & figura oui gallinæ, per maturitatem Cydonio magis flauo, non tantum eduli, sed succo etiam acido, suauis, orique ita grato vt nihil supra, habereque vim refrigerandi. Difficulus propter altitudinem arborum decuti, nec sibi frui licitum, nisi Simiz caudatæ, quæ eius esu delectantur copiose deiecissent. Cæterum in huius historia hoc nobis obscurum videtur, quod Lerijs & Acofta non meminerint Nucis à nobis depictæ, Theuetus verò non bene appingat. Præterea si quis titè consideret Nucem nostram, est quod dubitet, an alteri fructui vnquam adhaerit, Vestigium vbi pendisse ereditur, nescio quid aliud demonstrat: & potius tuberculum dicas à natura factum, quam pediculi aut adhaerionis vestigium: Perpendendum igitur, an idem nomen non tribuatur duobus diuersarum arborum fructibus. In Canibalum Provincia, vber est arborum Acaious prouentus, Theuet. per Indiam copiosi, eodem

Tom. I.

tempore quo Mangæ maturefcant. Linschott. E Brasiliæ regionem Vlyssipponem adferuntur, Clus. Adferuamus & nos aliquot fructus, & vnum inter hos, speciosissimum ab Ecc. Herc. Saxonia Profess. Med. apud Pataunos celeberrimum cum alus multis exoticis ad nos missum. Paludan. ait: Orientalis Indiæ proprii non videntur fuisse: verum eò ex Brasilia allatos volunt.

Saporem gratiorem habent quàm castaneæ laqueæ, verum affari debent. Crudas nemo securre ore aperiet, quòd continuò cutem abradant, magno dolore eorum qui ignari temerè eas referant. Idèd cultro aperiantur, aut igne vruntur vt manducari possint. Guttur autem peculiari natura cum degluciantur stringunt, gustu acido & succulento. In orbes idèd scinduntur, adiunctâ aquâ, siue vino, faleque iniecto, quibus modis adstringendi illa facultas mitigatur, palato ita gratissimi. Mangis tamen Ananisque cedunt, viliores enim sunt: Linschott. Sunt qui ex fructu potum quendam conficiant, quanquam per se minimè suauis gustu, sapore Sorbi mediæ maturitatis. Nucula accessoriz nucleus non ingratus quoque præbet cibum, leniter tostus. Ex melligine, quam cortices gemini claudunt, copiosius oleum possent incolere elicere, quàm nos è Iuglandibus. Nullus apud Cannibales ligni vsus, præterquam ad fouendum ignem, vt quibus aliorum non magna suppetat copia. Theuet. Clusius quoque testatur nucleo leuiter tosto incolas vesci, gratiorem ita esse, & Venerem stimulare. Acritillo oleo nihil præstantius esse f. runt ad Lichenes & impetigines tollendas. Incolæ etiam aduersus scabiem vtuntur.

Vires &amp; Vfus.

Cautio.

Vt palato grati fiant.

Patis.

Nucleus. Medigo.


Oleum.

Lignum.

Ad Venerem. Olei Sireci, Lichenes, Impetigo.

## AHOVAI, FRUCTVS VENINATVS.

## CAP. CXLII.



Ahoval fructum nobis donauit Lutet. Io. Robinus scriptum exoticarum cultor prope modum singularis. Is triquetra figura deltoïdes est, mediocris castaneæ magnitudine, duobus cornibus compressioribus, cætero qui turgidus, coloris rani, superficie aliquantum inæquali: ac inter duo inferiora cornua rimam agit ad inuicem penetrantem: à summo apice, in quo foramen vultum peruium, quatuor ducuntur sulci, in totidem quadrantes fructum diuidentes, qui concussu nucleum inesse testatur.

Arbori, inquit Theuetus, altitudo Pari, folium verò duos trèves pollices longum, duos latum, æterni viridis: cortex albicat: rami vulnerati succum lacteum manant: odorem autem spirant amputati insigniter fœtidum, quare siluestres isti nullo modo vtuntur, nè ad ignem quidem fouedum.

Arboris descriptio.

Succus lacteus, fœtidus.

ff

HABU.

HABU.

Appellatur autem *Ahouai* & *Hahmay*: Vtroque enim modo scriptum habet. De eadem Leriushic scribit. Arbor in Brasilia syluestribus hominibus dicta *Ahouai* tantis factoris & ita Allia redolens, vt cum scinditur aut igni admoetur, odor tolerari non possit, folijs Pomis nostris ferè similibus: fructus quodammodo similis tinbulo aquatico, nucleo summè venenato.

Lib. 4. tradimus plantam nomine Aspalathi, cuius lignum grauitèr quoque olet. Potuisset hic tradi, nisi nominis affinitas & similitudo quadam cum Aspalatho. h. d. describi postuisset. Nescimus tamen cuius arboris sit lignum.

H. Lugd.

H. Lugd.

Goropius se eiusmodi ligna ex Atlantico orbe allata subolsisse testatur, humanum sterces natibus representasse perhibet. Hist. Lugd. binis locis de ea agit. i. nomine Arboris fructu pernicioso. H. Lugd. v. Theueti. titulo *Ahouai* & *Ahouay* Theueti ex Clus. ac vtriusque figuram proponit. *Ahouai* Theueti nomine & Clus. & Lob. & Tabern. habent.

V. Lugd.


V. Lugd.

*Ahouay* porò fructum fert venenatum, vt dictum, & pernecabilem, verèque deleterium: talis autem potissimum est nucleus, quo exempto syluestres putaminibus tintinnabulorum loco videntur, quæ crucibus circumdata nihilo remissius sonant quàm campanulæ nostrates. Tantùm verò abest, vt ii peregrinis fructus istos recentes donent, vt suis etiam liberis tactu interdican, priusquam exemptus fuerit nucleus. Theuetus.

#### NVCVLA QVÆDAM FALSO HIGVERO ET AHOVAI PVATA.

##### CAP. CXLIII.

Descriptio



funiculo traiecto pependisse. Dono accepimus à D. Casp. Bauh. & plusscula vidimus apud D. Fel. Platerum.

Clus. ad Garciam in edit. 4. *Ahouai* Theueti vocat. Olim verò sine nomine & descriptione posita erat figura. Quod deinde *Ahouai* Theueti nomine proposita sint, existimamus Typographi errore dictum.

Job. 20

H. Lugd.

Hist. Lugd. Fructum Higuero vocat ex Clusio. Lob. idem dicit. Atqui Clus. non vocat hunc fructum Higuero, quod adhuc quidem obseruauimus, sed relictum in notam. Higuero lenge aliud est fructus: quæ ratio quidè maiori cau-

tela Taber. Higuero fortè suspicatus sit, non definitè statuerit.

#### NVX PEREGR. OCVLATA, COMPRESSA

##### CAP. CXLIV.



**M**aior est Nuce vomica Offic. dicta, quæ hirsuta est: hæc verò circumscriptioe haud ita rotunda, sed per ambitum nonnihil sinuata, altera parte in gibbum extuberante, alterà compressa. Color cinereus vel in rufum declinans. Gibbus per delictu ordine positos habet ocellos quinque impressos: compressa pars scrobiculos ha-

bet insculptos, in umbilico quidem vnum, vnde & petiolus videtur prodire: in marginibus autem multi incerto numero. Ocellis respondent totidem locelli distincti, in quorum vnoquoque semen vnicum, Pomorum aut Pirorum seminibus simile, sed habitius, substantia pingui, oleosa, sapore Auellana: circumiecta omnis substantia lapidea est duntaxat.

An Scrap. *Leum alkei*, vel *alke*, id est, (vt reddit interpret) Nux vomica. Habix: Vomitus vehementer mouet, vel per se, vel cum alijs trita cum modico salis, quod faciliat vomitum. Dosis drach. ij. Abraam apud eundem: Est nux, inquit, colore inter glaucum & album medio, Auellana paulò maior, in qua sunt nodi, cuius corticis drach. j. trita & cribrata, sumpta cum duobus aureis Anethi triti aut semine Feniculi, addito melle, sicque mixta cum aqua calida vomitus cient, & humores cholericos eiciunt simul ac phlegmaticos, atque adeò alui quoque superfluitates per inferna subducunt. Non ausimus pro certo asserere Nucem nostram oculatam hic depictam esse Vomica Scrapionis, quia vires ignotæ nobis sunt. Quod scribit in ea nodos esse, respondere videtur. Bellun. in Arab. nom. interpret. Illa Nux ait, quam Venei Nucem *Metel* vocant & quæ reperitur inter Nuces moschatas, non habet spinas quas ei tribuit Auic. eadèmq. Nux, quæ importatur ex India, ignoratur à Physicis Orientalibus quid sit, & ab Italis connumeratur inter stupefactiua, Mauritan. Nuces memorant, quas Vomicas & Metellas vocant. Sed tam Officinæ quàm medicorum vulgus has magno errore confundunt, quòd plarumque legimus vomicas, Metellorum loco usurpant, & contra *Metellas* nonnunquam Vomica vice. Metellas vocant, quæ nonnihil extuberantes, quibusdam nodis, veluti paruis oculis, per ambitum sunt resectæ: at eorum lapsus faciliè deprehendi potest Scrapionis testimonio: ex sunt legitima Vomica Scrapionis: Hec Matthioli. qui tamen in post. com. Lat. & Ital. non scribit esse legitimam Scrap. Vomica, sed in silen-



no prætere, ac potius negare videtur, adeo sibi ipsi constare didicit in suis scriptis.

Nux vomica vera, & Pharmacopolis malè Nux metella, Lacun. Nux vomica vera: *Merella offic.* Germ. Fränauglin/Lonic. Nux vomica Serapionis, & Metella Sepalsiariorum, Amat. Quidam volunt, inquit Anguil. Nucem *metel*, vulgarem esse vomicam: verius est Metel commune esse Metel verum, quam vomicam. At nobis, vt iam diximus, nostra Nux oculata melius respondere videtur Nuci vomice Serap. quam eiusdem Methel, si intè considerentur quæ Serapio scripsit. Nux methella Offic. Hist. Lugd. Fructus peregr. 6. Taber. Et rursus fructus peregr. 6. Cuiusdem Hist. Lugd. quide eadem Nuc duobus diuersis locis agit, non sine oscitantia.

Cuius qui peregrinum 6. facit sic describit. Nucem vomica maior est, planus idem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulò eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima verò, quinque grana inter se distincta, & veluti ipsi impressa ostendens, Metepilorum Serapionum officulis non valdè abumilia, quæ exempta, satis alta lacunatum vestigia relinquunt. Totus lignea duritie prædurus est.

Cæterum de vomicarum Serapionis facultatibus priùs diximus: qui nullam vim lethalem eis tribuit, sed tantum vnius aut duarum drach. ponderè cum Anethi decocto ac sale misicè per superna, nihilominus quoque per inferna, humores biliosos pituitosque educere.

## NVX MECHIL SERAP.

## CAP. CXLV.

De hac ita scribit Serapio, *Leum Alrachaba*, id est, *Nux mechil*. Haemet eben Diuid, ex Arabis cuiusdam relatione dicit Rachaha esse arborem magnam sicut Nux, foliis amplis Ficus magnæ, fructu Malogræci parui nacente a flos. exortum, in modum Ficuum, pediculo incuruo, ob fructus pondus & magnitudinem. Neque nominandum esse Iumazen. id est, Ficus Pharaonis, quod non sit Ficus, sed Rachaha. Se verò idem tradit in Oriente plures vidisse, Ficubus similes, cute densa, sapore dulci, suaves, odoratos, ideoque hominibus & pastoribus potissimum expetitos. Anninebeten apud eundem Serap. vult esse Nucem vomicam. Sed differunt nimirum inter se Rachaha & Nux vomica. *Hæc Serap.*

De eadem Monachi in Mesuen ita tradunt. Serapioni nux Mechil, siue Mochil (diuersa à nucem Methel) est quædam planta magna quæ in Syria copiosè nascitur, speciatim in deserto Iesù Christi, vbi nimirum 40. dies & noctes ieiunauit. Similis penè est in omnibus nuci Methel dictæ: sed fructus eius non est spinosus, & à pastoribus comeditur, vt plures fratres nostri ordinis retulerunt nobis: quæ planta videbatur eis esse species Solatri, quam plantam adhuc nonnulli ex Mauritania Mochil vocant, & alii aliter vulgò nominant. *Sic illi.* Enimvero sanè, vt quod res est fateamur liberè, nec Serapionem neque Monachos rectè intelligimus. Et multum est, si ipsimet seipfos intellexerunt. Quæ Monachi tradunt de nucem Methel, licebit videre capite de Strammonea. Scribit Bellon. Tatulam siue Solanum somniferum provenire circa Hiericho, quod notandum propter ea quæ Monachi dicunt de Solatro: Verum Tatula spinosa est.

Tom. I.

## NVX HENDEN ARABVM.

## CAP. CXLVI.

NVCIS nomen facit vt plantam nobis incognitam tradamus ex Arabum sententia, de quibus Lectoribus & nobis cum tempore iudicandum. *Item henden*, inquit Serap. dicitur *Nux hendem*, vel *Nux handen*. Rasis: dicitur *Adeps terra*, & *den* *Petra terra*. Idem in Zirau tradit esse Tuber, ex quo fiat vinum cum melle. Isaac eben amtam *den* *Adeps terra* *handen* sunt tubera granata, sicut cicera alba, colore in glaucum vergente. Adfertur de Barcha, & de Corascen, estque illud cum quo viscaria, ur mel, & nominatur Tuber. Salomon eben haham *Tuber*. *sen*: Nux henden in Perside, est Tuber mellis, quod viuificat ipsum mel. Adfertur d. Ketuen, & Loc. vomitum ciet. Paulus: Ex sententia Galeni est sicca, modicè refrigerans, tollens impetigines, resinguens calorem, & fluxum sanguinis comprimens. Liber de tallamethi. Hæc in Barbaria vulgato nomine dicitur Nux columbarum, & in Damasco Nux handen: de quibus vnum cange proicitur in libris x. mellis: & in lib. j. munda tertio aqua calida, & agitur bene, postea cooperiatur vas. Ita vinum fit, quo Barbari vtuntur Alchamzi: Impinguat & spiritum iugit. *M. impinguat* idem ait, & modicè calidum dicit. Atabari verò & hæc tradit, & prætere addit libidinem excitare ad coitum, stuporemque dentium tollere. Rasis in libro aggregato: calidam & humidam dicit, & prohibere appetitum lun[an Picam?] *Hactenus ex Serap.*

Audiamus & Auic. *B. z. k. nden* [vel *K. z. k. kenden* Bellun] id est, Nux henden, est res cuius, sicut *Asne* *Asne lutea*. *lutea*: in Rakia vocatur ltercus columbarum: in Bagaded, Nux handen: vel vt quidam scribunt Genden. Melior inter eas est Barbarica: sed Rakia inefficacior. Calida & humida est, in primo excessu: sunt qui tradant leuiter refrigerate, de quo nondum satis constat. Exiccatur & extinguit: Temperat. quidam dicunt incidere sanguinem. Fit exis vinum: Huius vini descriptionem tradit, vt & similis Serapio, scribitque vterque id & impinguare & vomitum ciet. Quod si hoc aliquid ad declarationem obscuræ huius Nucis historię facere queat, sciat lector *Asne* multis dici Muscum. Qualem igitur Muscum intelligat Auic. vt incomper tum nobis, curiosioribus subtilioribusque considerandum relinquimus.

Quæ sequuntur ex alio Auic. loco, nempe lib. 2. tr. 2. c. 503. hanc historiam reddunt obscuriorem, scribit enim Nux hendem, est terra glutinosa, sicut cicera alba, declinans ad citrinitatem, quæ defertur ex Barcha & Corasceni, ex qua cum melle fit vinum. Paulus dicit habere virtutem refrigerandi, extinguendi, & exsiccandi parumper: Fluxum sanguinis inhibere: impinguare. Sanare impetigines, excitare coitum. Bellunenensis ad marginem Auic. addit: Giarzi hendem totum hoc caput à Serapione accepit.

NVX VOMICA VVLGO OFFIC.  
COMPRESSA, HIRSVTA.

## CAP. CXLVII.

Epilasis vulgò Nux vomica nominata, orbiculata, nummo aureo quem scutatatum vocant, aequalis, subinde minor, compressa, calamus

Descript.

Ff 2



colore ex fuluo cādicante, sapore insigniter amaro. Ipsa substantia tritu & contusu contumax, addēdō solida lentāque est, nec nisi probē siccata frustula, & ea quidem ne vix ac ne vix quidem contundi, seu in puluerem redigi apta. Cū in duos orbiculos finduntur, vterque in orbis circumfrentia exiguum foramen habet, quo continetur, vt annotat Cordus, germinatura, & ex semine hoc facit exitura plantae rudimentum: exiguo pediculo, & veluti paruo Tiliagineo aut Hederaeo, venolo, duplici quoque folio constans tam exquisita perfectāque figura, vt cum veri folii consummata forma de perfectione certet: eius vnica tantū pars, hoc est pediculus, praedicto foramine vel cauetna continetur, foliola verō duplicis fructus communi clauduntur. Reperitur, sed rarius, formā oblongā. Vomica dicta quod vomitū ciere credatur, & solet.

*Varietas.*

*Etymon.*

*Nux Vomica Offic.*

*Castanea Vomica Vel Indica.*

*Nux metel.*

*Fuchs. net. Tithym. Myrsin.*

*Nux Vomica.*

Hæc itaque est *Nux vomica* quā hodie vtuntur officinæ, & qua se vsum officināque suo tempore testatur Cordus.

*Nux vomica*, inquit Monachi, quæ & *Castanea vomica* vel *Indica* dicitur, tenetur esse illa, quæ deservit ex Orientalibus plagis, quæ est velut placenta, denarii magnitudine, albicans, depressa & incurua. Non contrariante quoddam legatur in Serapione, esse maiorem Auellana, & quod in ea sint nodi. Nec etiam obstante quod in ipso Serap. & Auic. cap. de Nuce methel dicatur, esse similem Nuci vomicae, cū expressē videatur contrarium: forsā quoddam vel vterque textus sit malè translatus, vel quod ipsi intelli gendi sint de virtutum seu proprietatum operationūque similitudine alioqui in aliis qualitatibus in iis omnia vera comperiuntur.

Fuchsius *Tithymalum Myrsinitem*, cuius fructus *Caryites* [vt ille ait] dictus, esse qui *Nucem vomica*, Germ. *Brönäglin* vocatam putent, tradit, nec refutat aut improbat, Quamuis reuera eorum opinio qui *Nucem* hoc cap. a nobis depictam atque descriptam *Myrsinitis* fructum putant, tam sit absurda, vt aliam refutationem nō mereantur quā lectorem vtriusque descriptionis ab intelli gente factam, n quo tōtē aliquo pacto *Fuchs*ius excusari possit, qui eandem hanc nostram *Nucem Vomitoriam* nuncupat.

Ryff. quoque testatur quibusdam *Tithym. Myrsinitis* fructum censerī. Sed quibus?

Easdem Nuces, vt refert Matthiol. memorant Mauritanos quas vomicas & Metellas vocant. Sed

tam Officinæ quā Medicorum vulgus has magno errore confundunt, quoddam plerunque legitimas vomicas Metellorum loco vsurpent, & contra Metellas nonnunquam Vomicarum vice [vt & cap. de Nuce oculata monuimus.] Nam Vomicas quidem eas appellant errore ducti, quæ Lupinorum instar compressæ sunt. Serapioni Nux metella a bonis fructus est *Mandragoræ*, hirsuto cortice. Quas vomicas nuncupant, corticem hirsutum habent, facultatibus, non autem notis (vt quidam falsò existimant Serapion. intellexisse.) *Mandragoræ* fructus referunt.

Idem in post. com. Lat. & Ital. nunc primum intelligere scribit se in censendis Mauritanorum Nucibus Vomica & Metellis in errore versatum esse. Credidisse enim nuces quas Vomicas seplasia vocant genuinas esse Metellas, nec id sine ad stipulantibus indicis. Nucem Vomica quidem genuinam non esse Auic. & Serap. Itaque hanc caninam non vomica posthac appellare licere, quoddam canes deuorata, parua temporis morā interimit.

Sed Matthioli senectus ille censor Guiland. iam prius hanc opinionem priorem in suo Theone exploserat: Nucem vomica (inquiens) falsò Matthiol. Metellam contra Bellunensis sententiā decernit. Auctores habeo Ebenbithar, Auic. Haeslen & ceteros Muripitanos Scriptores. Quacensura coactus & ipse met tandem suam opinionem retractauit.

Lacuna eandem pingit nomine Nucis metellæ, addidit Pharmacopœos errare qui Vomicas vocent.

At Amatus, Matthiol. imitatus ait, Nucem metel, quæ vulgaris sit Vomica, similem dici *Mandragoræ* semine & virtute, non figura.

*Nux metella vera Vomica Offic. Brænäuglin/Lonic.*

Aliquid noui importat Anguil. Non existimo, inquit, Nucem vomica communem, Vomica esse nec Methel: non respondet notæ Methelintellexi ad D. Io. Verelli Materano Apulensi, Nucem vomica vulgarem radicem esse foliis rotundis ac serpere: id si verum, certum nostram Vomica, cū sit radix & non fructus, non veram Methel. Quidam volunt [additidem] Nucem vomica vulgarem esse Metel veram: quod, vō verum sit, oportet secundum Auic. in ea contineri semen simile Citro aut *Mandragoræ*, quod non reperitur in ea.

*Nux metel*, autōre Celsalp. vulgò & Fungus Orientalis appellatur ossium quiddam compressum, & circularē instar Fungi abiecto pediculo: aliud integro circulo, aliud deficiente vt Luna in centro apex quiddam, in labro seminis medulla continetur, ob paruitatem invisibilis, vt in Dactylorum ossibus, quasi ab eis differat tantum: quia in Dactylis extrema ossis utrinque replicata sunt media quadam rimula constituta: in Nuce metella eadem sunt explicata & aperta, vnde circularis figura. Est autem id lanugine tenui obductum & candicante: vtuntur eo solum pro veneno ad canes interficiendos puluere inaspero carnibus: idem pisces & aues obstupefacit. Putarunt quidam hanc esse Nucem vomica Serap. quæ deservit maior Auellana & nodosa, cuius corticibus pro medicamento vomitorio, non pro veneno vtabantur: minor etiam fuerit quæ *Nux metel* apud eundem & Auic. traditur, fructui *Mandragoræ* similis, cortice scabro, licet ea obstupefaciens sit venenum, sed apud Plin. videtur inter Palmæ fructus poni, cū inquit, quibusdam ossium



osseum continetur lunatumque, dente contra fascinationem religionem positum.

Acolta Amato succenfer, quod, vtille putat, existimavit nucem Vomicae & Metellam idem esse, nec desinbat plantam, quodq; referat quæ Serap. dixit de Metella, quæ non sint diuersa ab opinione eorum, qui existimant nucem Metellam esse Stramoniam. Sed respondemus Acolta, Amatum satis demonstrasse, se non Stramoniam intelligere per nucem Metellam: dicit enim esse planam vtrique parte, quid minus Stramoniam fructui, quid melius competit Metellæ?

Tabern. ait, se proponere duo genera Nucis vomicae Brænaugen, vt figuræ demonstrant. 1. genus Apothecariorum dicta *Nux vomica*, verum esse Nucem metellam: nam Nucem vomica esse Serap. &c. Sed is, quicumque tandem fuerit, qui in lucem emisit partem tertiam Hist. Tabern. cum alibi passim, tum etiam hoc loco summam ignorantiam suam in re herbaria prodidit: & cur in figuris dicit poni duo genera Nucum, quum sint quinque figuræ vnius eiusdemque fructus: præterea quem pingit, non conuenit cum Metel. Fructus quem vocat Nucem vomica Serapionis est in historia eius alio loco inter fructus peregrinos numero vi.

Porro Nucis vomica vulgè nuncupatur, si Matth. credimus, oleosa & gustui non ingrata facultatibus, non autem notis vt quidam falsò existimant Serap. scribentem de nucem Metella intellexisse. Mandragoræ fructus referunt, eum auctore Serap. quarto refrigerent excessu, ita vt drach. ii. pondere esitate interimant, minore vero mensura temulentiam faciant. Quos quidem effectus præstare videmus non modò in canibus, sed etiam in hominibus, quibus hæc data fuerint, quas vomicas esse contendunt. Verum iam antea ostendimus Matthiolum mutata sententia non existimasse amplius nucem Vomica vulgarem esse nucem Metel.

Illud notandum præterea, nos nucem Vomica vulgarem, de qua hoc loco agimus non oleosam, & gustui non ingratam, vt Matth. scribit, sed substantia corneam, & gustui peramaram cum aliis multis non deprehendisse, vt & lingua & oculi Matth. scellisse videantur, quando de earum qualitibus decreuit.

Cæterum nucem Vomica Narcoticam esse, & vel opio deteriore, de quo prius dubitabat Gesnerus, tandem factò experimento certius cognouit hac ratione. Drach. semis exhibitam, canis cum carne cruda deuorauit, post horæ quadrantem obdormiit, & inter dormiendum modò caput mouebat, ac si conuelleretur, modò tibias anteriores, modò posteriores, tandem post horas quatuor extinctus est. Tum rursus alteri etiam cani tantundem huius nucis similiter dedit, & post horas serè tres, cum graui symptomata ipsum iam inuassissent, Antidoti Saxonice Moibani drach. sem. cum carne exhibuit, quod remedium cum deuorasset, sanatus est, & nihil mali passus est, etsi non euomerit, fortè quòd tardius antidotus data fuerit. Cani aliquando bene magno atque robusto, Anatomiz in gratiam studioforum, deficiente humano subiecto, destinato, integram exhibuimus cum caseo: sed ea die ex illa nihil mali passus, sequenti tamè die somno oppressum interfecerunt studiosi, impatienter moram Anatomiz inspectionis ferentes. Alia vice, dissecta & leuiter in minutiora quædam frustula vna & semis data cum caseo masticato, paucis horis interfecit canem, sed prædicto multo

minorem. Ne autem pereant nucis Vomica veneno canes, auricula eorum vulneranda [vbi iam gestus & saltus miros insanientium edunt] ita vt sanguis exeat, aut etiam pars eius amputanda.

Electuarium de ovo, quod tantopere d. prædicant aduersus Pestem, nucem Vomica recipit: Quam bene atque prudenter, docti soli & circumspècti Medici iudicabunt. Gesnerus tamen dubitat adhuc, vt ipsemet fatetur in epist. quadam, an vi refrigerandi in quarto excessu possit, sicut, aiunt. Adolphus Occo in sua Pharm. testatur Iulium Alexand. ad se scripsisse Nucem vomica ablegandam esse, nec ad compositionis villus vsum admittendam, quippe aduersaturam semper naturæ humanæ, nec quicquam tamen interea vnquam commodi allaturam: quæ doctissimi viri sententia nobis perplacet: nec quenquam hætenus vidimus qui suo experimento aliquid laude dignum illorum vsu profecisse prodiderit.

### CORDIS FIGURA NVX, PLANA, CINERACEI COLORIS.

#### CAP. EXLVIII.

Ostendebat mihi, inquit Clus. Exot. l. 2. cap. 26. Ornatusissimus Vir Christianus Potretus, quandam Nucem planam, cineracei coloris, formam cordis, vt pingi solet, referentem, & quibusdam locis tumescentem, eamque adèò lorto cortice constantem, vt maxima cum difficultate aperire possem, ad obseruandum quid contineret: reperiebam autem sub eo alium corticem, non minùs lentum superiore, sublaui coloris, tegentem nucleum candicantem, falsi saporis, inuolutum rufescente membrana.

### NVCULA TAPHET HERC. SAXONIÆ.

#### CAP. CXLIX.

Taphet nomine ab insigni viro & Med. Herc. Saxonia missa Nucula, amplitudine sua æqualem medi digiti æquat. Sessilis est modicè, in gibbum hamisphaericum penè elata, ita vt per medium sectum globum serè repræsentet. Cortice munita est duro, cinereo, perinde atque Nux hirsuta, Vomica Offic. dicta. In centro partis planæ foraminulum vmbilicale impressum. Substantia interna nigra est, duritie cornea, sine sapore notabili. Ad quod genus fructuum aliud referenda sit, quàm ad Nucem prædictam, nondum constat, ex cuius sorte familia & classe & hæc vna esse possit. Lectoribus tamen proponimus discutiendum, an Clus. Exot. lib. 2. cap. 9. non meminerit huius Nuculæ in descriptione sequentis fructus?

### FRVCTVS ORBICVLARIS. PEREGR. CVM GRANIS NVCS VOMICÆ SIMILIBUS?

Anno 1597. Amstelredami ostendebatur mihi, inquit Clusius lib. 2. c. 9. ab honesto viro Stephano Iohann. Scharm Pharmacopæo orbicularis & sphaericæ prorsus figuræ quidam fructus, quem navigatione Batauorum prædicti anni ex Iava allatum asserbat: illum tamen ostensum

Descriptio




Indis qui ex Iava adducti erant, negarunt apud se natum sed è Madagascari insula delatum. Dimensi autem siue per longitudinem lineà ductà, siue per transversum, ambitus erat pænè vnciarum novem, nonnihil tamen striatus erat, circa eam partem quā pediculus adhererat, coloris fusci, levis & intus cauis, aliquid tamen continēs, vt ex strepitu quē agitatus edebat, coniecturam facere licebat. Ex illo postmodum per-  
tuso, educta sunt multa grana plana, nucis vomicae formam perbellè referentia, nisi minora fuissent, & oras minus crassas habuissent, saporemque minimè vt illa amarum: ossea tamen eorum durities.

FRUCTVS EXOT. LATVS COMPRES-  
SVS, COLORE SVBERIS.

CAP. CL.

Descriptio



vt altera facies concava, altera in gibbum sublata atque convexa videatur. Cortice constat colore suberis ferè, non valdè duro, sed vel mediocri compressu fragili, nucis Avellanae crassitudine, fungoso quodammodo: sed interior pars magis sangosa est, fusca, insipida, quia euania, & magna ex parte caua. Quare ratio quod & ipse fructus pro sua magnitudine admodum sit levis.

LIGNVM MOLVCENSE, PAVANA DI-  
CTVM, FRUCTV AVELLANÆ.

CAP. CLII.

Descriptio

**A**Rbor est domestica, Mali cotoneae magnitudine, cuius folia Maluae vulgaris foliis sunt

similia, fructus verò Avellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante, Costa: quì *Lignum Molucense* vocat: & cum istic gubernaret Lud. de Tuyde, ipsius nomine hanc arborem dictam fuisse testatur. Lignum Molucense Hist. Lugd.

Inuenitur in Moluccis. Seritur, coliturque in hortis diligenter, nec alibi facillè inuenias: tanti Loenim ab incolis aestimatur, vt peregrinos ne ad eius quidem aspectum admittant.

Huius ligni [ inquit idem Costa ] periculum feci, cum in nonnullis agris, quorum curam habebam in nosocomiis, tum in variis morbis, qui in longa navigatione plerumque oriri solent, cum in Lusitaniam redirem: partim adiutus facultatum relationibus quas intellexeram, & vtendi methodo: partim iis quae nobilis quidam in Moluccis dixerat. Illius semen iam antè videram, mihi donatum ad aues capiendum. Etenim eo in aucupis vtuntur non modò in illa regione, sed etiam in multis Indiae provinciis, ad quae eius rei gratia, venale deferunt. Huius paucillum cum oriza cocta mixtum, aubus syluestribus exponunt: quae degustant, illic decidunt sopite & stupida: quae verò auditis id edunt, moriuntur antequam illis auxilium praeberi possit, quod est, vt frigida caput perfundatur. Grauli omnium citissimè eo degustato extinguuntur. Nunc ad salubrem huius arboris materiam accedamus, cuius paucillum hodie plurimi facio. Intus sumptum, aut foris appositum, omnibus venenis resistit. Intro assumitur magno commodo ex aq. ros. vel vulgari, auiūque iusculo, eius pulueris apta quantitas pro necessitate, & aeri natura, modò decem grana non excedat, sed infra id pondus consistat, & viperarum, Regulorum (qui serpentes pileati appellantur, & admodum noxii sunt) aliorumque similibus aspidum aut serpentum morsus: Bibitur hic pulvis ex aqua, ipsique moribus inspergitur. Eadem ratione praebent in vulneribus, quae à sagittis toxico illius facta sunt, quibus illius regionis incolae plurimum videntur. Puluerem verò ex hoc ligno sibi parant lima è pelle marinae caniculae confecta, aut tenui aliqua ferrea lima. Robustissimo cuique dimidium eius scrupulus ex aqua limpida tepida aut rosacea, aut gallinarum iusculo tepente, summo mane datur (caena autem diei praecedentis parca esse debet) euacuat enim omnes humores, praesertim crassos, lentos, & melancholicos: conuenit quartanis diuturnis, febribus continuis, Iliacis Colicisque doloribus, flatibus, hydropis, arenulis, renum calculis, vrinæ difficultatibus, tenuissimae cholericae passioni, aliisque morbis, veluti articulorum & tibiarum inueteratis doloribus, scyrthis & serofulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam deiectam reuocat: & si nimia fiat euacuatio, bibat aeger dimidium Cyathum *Cassa*, hoc est, decocti Orizae, aut auculam comedat, subito cessabit, quoddam multa laude dignum est, paucisque medicamentis vulgare, vt in potestate sit medici aut aegri, purgari quantum cupierit. Huc accedit quoddam neque foetorem, neque tedium, neque metum, dum sumitur, pariat, possitque sine Dieta obseruatione, etiam iis qui sui negotia foris peragunt, propinari, vt ex iis deprehendi, qui vna mecum nauis uehebantur, nullum sentientes incommodum, tametsi dum purgarentur, nulla Dieta vterentur, viuerentque solutissimè. Obseruaui etiam illius praestantiam in inueteratis capitis doloribus, hemiplegia, apoplexia aurium tinnitu, arthritide, Ventriculi & vteri affectibus & asthma. Propie-



rea tidens illi plurimum, sepius in diversis naturis, ætatibus & locis feliciter vsus sum, & sine ulla molestia, nisi quoddam biliosus naturis, calidisque ventriculis non nihil molestie parere, donec cibum iument, & in nonnullis vomitum excitare, vsus est: sed biliosus nonnunquam hunc puluerem dedi syrupo acetoso, aut Carambola condita exceptum, aut in Catapotia cum saccharo rosato efformatum. Exhibendus est summo mane, neque cibis aut potus concedendus, donec purgati sint, quantum necessarium videtur: tum demum Cyathus iusculi gallinarum tepidè datur, dimidiaque aut integra hora post conceditur pulvis gallinaceus, & paululum vini aqua bene duluti: deinde toto illo die potu abstineat ad cenam vsque, quæ parca erit, & facilis concoctionis. Subsequenti die sumitur saccharum rosatum cum aqua buglossi, aut borrag aut communi, atque iniicitur clyster ad aluum eluendam. Solet verò interdum in nonnullis ani pruritum & exoriationem excitare, atque in aliquibus [sed paucis admodum] hæmorrhoides. Hæc sunt quæ de hoc ligno *Panara* conspexi & intellexi: Nunc verò in illis regionibus magnus est eius vsus, tantaque æstimatio, vt sine metu in multis morbis suprà enumeratis vsurpent. Ego bis illud sumpsi in Colic dolore, & hemicrania, mihiq; salutare esse deprehendi. Cæterum cum propter eius insignes facultates incolæ plurimum faciant, illasque quantum in ipsis est, celare non studeant, quæ proculdubio longè plures sunt quam quas nouimus, sperandum est temporis successu reliquarum notitiam nos consequuturos.



fragiles atque punctatas carinas dehiscences mollissimam delicatissimamque ostendunt lanuginem, in fila ductilem, cui inuoluntur. semina. *Strobilis supparia*, tenero fragile cortice, cui lanugo pertinaciter adheret, nucleo intus dulci. Strobilorum Amygdalarumve dulci sapore. Ipse fructus vicia longiore pendet pediculo ex calyce crassiusculo emergente. Catina singula singulum interstitium internè in medio sui secundum rectitudinem habent, quasi ante maturitatem in fructus medullio coiuissent. Singula quoque carina vel valua in singulos apices fissos ac breuiter extorsum reflexos, desinunt. Nuclei color in nostris siccis, quales aliquot habemus, planè putamini nucum Iuglandium osseo concolor. Aliud est Xylon arborum, de quo mox.

Dioscoridi notam fuisse Bombacem [quæ nihil aliud est, quam Gossipium vt patebit] nobis videtur cum Amato, licet Matth. contrarium statuatur: scribit enim Diosc. lib. 3. de Acanthio, *Calybæ* xylonis, *giperu*: ait ex eius lanugine texta fieri vestes bombacinis similes: quamuis alii bombycinis conuertant. Gossipium *Calybæ* est, non *giperu*. Notum autem quid differat Bombax & Bombyx, quamuis & ipse adeò Plin. Xylo, seu Gossipio, seu Bombaci [nam vnum & idem sunt] Bombycis nomen alicubi tribuat.

Sed si cognitum Diosc. Gossipium, cur [inquires] de eo non tradit? Id idè factum putamus, quoddam eius ætate nondum in vsu medico fuerit. Scribit autem de materia medica, Quidam quod ne de Serico quidem scripserit, quod tamen ante eius tempora Aristoteli & Theophrasto non incognitum fuit? Non enim sequitur, non scribit de eo, ergo, non cognitum habet. *Sed ad rem.*

Apud Cordum describitur *Coron* herba lanigera: floribus luteis, rosea figura, intus lanuginosis & purpureis, semina habens Ciceris quantitate, intus cinereis sparsa punctis, candida, multa; lana inuoluta.

Ruellio Xylon siue Gossipium frutex est exiguus laniger, palmæ folio, similem barbata Nuci gignens fructum, cuius in exteriori bombyce lanugo netur in linum candidissimum mollissimumque, quod *Coronium* vulgò vocamus, vt lanuginem ipsam *Coronium*. Plinio superior pars Ægypti in Arabiam vergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & idè lina inde facta Xylina vocant. Fruticulus similem barbata Nuci desert fructum lanugine plenum quæ netur: nec vllum lini genus est, quod huic candore & mollitia præferatur, quam firmitatis in eo parum. Ea Nux cum hialcès fatiscit, lanuginis globos representat, qui nendo sunt. Hoc iam in Gallia nasci ferunt ex Italia delatum. Ita vides Ruellium herbaceum Xylon intellexisse, cui tamen Plinii aptata verba, sed mutata, vt solet, & iam fruticem vocat, iam fruticu-

# XYLON, SIVE GOSSIPIVM HERBACEVM.

BACEVM.

CAP. CLII.

Xylon tam herbaceum, quam arborum Nuxem fert, quapropter hunc locum sibi meritò vendicant, sed illud priorem, quia vulgatus. Brevis autem vitæ herbaceum Xylon, caule cubitali vel altiori, lignescente, cortice rubente hirsuto testato, in ramos aliquot ternos, vel quater-nos Fl. Quintin.] breues ducto: [Cæsalpin. Malux similem dicit:] foliis virgineis, primaria diuisione triplice, Aceris minoris folia æquantibus, hirsutis, ex pediculis duas tresve vncias longis, pilosis. Pro floribus numerosis apices crocati [subcærulei, Quintin.] antheræ vocatæ, [Cæsalp. in medio purpurantes] figura floris Malux, fructum [amplitudine Auellane nuci, Quint.] barbulis quibusdam florem tegentibus inclusum, qui [maturitate ruptus, præduras pilas ostendit. Quint.] per maturitatem in tres vel quatuor



Tom. I.

lum, cum tamen reuera herba sit annua, ideoque duplici ratione à frutice vel arbore distat. Plin. verò non herbam, sed arborem intellexit, quamvis fruticera nominet, quod constat, quia sua verba ex Theoph. transcripsit, qui de arboreo tradit non de herbaceo Gossipio, quamvis sub alio nomine, ut patebit postea.

Matth. tamen & ipse de herbaceo tradens, de hoc, inquit Plin. ait: Parvulus est, similemque *Barbatæ* nuci desert fructum: ex quo patet Mat-  
*not.*

*Differen-* tuiolo, ut plerisque aliis, non fuisse cognitum, Gos-  
*sipii* diuerfas fuisse plantas, herbaceam scilicet & arboream, eique tantum herbaceam cognitam fuisse, quæ non cõuenit cum *Barbatæ* nuci Theophrasti. ut Matthioli suspicari videtur, quamvis neget prius Græcis cognitum Gossipion seu Bombacem, sicut & Fuchs. Lacun. At non fuit Theophrasto, nec Suidæ, neque Polluci, saltem arboreum: & iam antea monuimus Diosc. cognitam Bombacem. Apud Plin. verò nec fruticem exiguum, neque fruticulum, neque fruticem simpliciter legimus, ut ex eius verbis quauis à Ruellio (plantam non sibi cognitam, sed eandemmet cum Plin. describente,) licentiosè non nihil conmutatis liquet: neque verò etiam parvulum apud eundem legitur, ut Matthiol. citat, licet compilerator Hist. Lugdunensis eandem vocem retinuerit, manifesto argumento ex Matthioli. potius commentis, quam ex ipso Plinio, Plinii transcripsisse verba.

*Matth. & Hist. Lugd. not.*

À mali Cotonei similitudine id quod in hoc fructu gignitur, aut à pocilli forma, vulgò *Cotonem* vocatum Ruell. existimat: aliqui *Girb. nem* à *Girb.*, cui similem ferè gerit in capite folliculum, appellant. Videtur tamen Ruellius suspicatus, (si ingenuè fateri velimus quod res est) nec obsecrè, Gossipium in diuersis nasci plantis, quamvis arboreum non agnouerit. Nam postquam aliquoties fruticem dixisset, scribit postea, gigni etiam in quadam arbore & eade qua mox: & addit: Theophrasti. lanigeras Indiæ arbores demonstrare Mori folio, corpore autem Cynorrhodi.

Caterùm meretur sanè Monachorù diligètia hoc loco Celebrari, qui Bombacem seu Cottonem vti vocant: ita scriptis tradiderunt. Lanugo ipsa (si ita dici libet) ab omnibus cognoscitur, quia in multis habetur vsus. Est enim simillima bombycis serico albissimo. Planta autem ipsius non ita cognoscitur, quia non vbique provenit, sed in regno Apuliæ copiosè. Bicalitalis herba est, & ramosa, effigiem parui arbutuli ferens. Radix do-  
*Descriptio Monachorum.*

*Citrii semine.*

*Semen quale.*

*Est bene amittere albedinem nigram.*

drantalis, alba atque lignosa. Folia ut vitis habet, minora valdè. Flores fert mellinos, è quibus scapi ad instar Nucis vsuales (Inglandis) trilecti prodeunt: & in eis semen vti semen Citrii, minùs tamen & ordinatè positum, lanugine dicta vndiq; obductum. Qui scapi maturacionis tẽpore, lanugine dicta intumescẽte, tripertitè diuiduntur, [nos & quadripertitos habem?]& tanquã flos niueus, lanugo ipsa *Bambax*, seu *Bombax*, quasi *Bombyx* dicta vnã cum suis granis siue seminibus scatur, ac inter defluendum colligitur. Et licet ipsa *Bombax* sit al-  
*Descriptio Monachorum.*

bissima, ut nix: semen tamen ipsum exteriùs vergit ad nigredinem potius, quàm ad albedinem: interius verò est album, vntuosum, gustusque non ingrati. Hallucinantur autem nonnulli putantes Bombacem arte dealbari. Sed scitote, ipsam à natura ita candidissimam nasci: in quo quidem diffidet à ceteris Lini generibus. Nam cum lauatur, non accipit, (quod nec potest accipere) aliquid albedinis: sed è contra amittit magnam partem sui niuei candoris, ut experientia testatur. Sci-

mus mulierculas quasdam lepidè deceptas, cum, nimis albedinis ornamentorum capitis illicio percussæ, ex bõbace telam texere curarent, ac eam multa lotionè ruffescere, & pristinum nitorem amisisse aduertentes, ad Lini ordinarij texturã tandem redierunt. Hanc enim, quo sapiùs laueris, eò candidiorem efficiens. Ceterùm arte separantur grana ab ipsa bombace, hac ad lanificia, illis ad vltim medicum referuatis, quamvis multa etiã in ea residua inueniantur, nondum depexa: in qua, qui is indiget, semper inueniet.

Lacuna de eadem Plin. tradidisse scribit: sed fallitur: existimamus enim Plin. de arbore scribere, quam in Arabia nasci tradit.

Eodem errore decepti, Matthioli. Rob. Const. & alii. Dod. Gossipion arborem lanigeram Theophrasti vocat, quamvis ei arbor neutiquam cognita fuerit, cuius ignorantia effecit ut etiam Theophrasti. tacitè carpere voluisset videatur, quamvis intempestiuè, quando inquit: nec mirum videi debet, si suprà incognitam & in remotis regionibus nascentem arborem esse putauerit, cum & hac ætate, quã plurima in cognitionem venit, lanugo huius Baumwoll / id est, arborea lana à Germ. appelletur: quasi insinuare vellet incognitũ fuisse Theophrasto, esse herbam, cum ipsemet potius Dod. ignotum fnerit, esse etiam arborem.

Penã & Lob. lubenter Gossipium herbaceum voluissent Dioscor. facere Gnaphalium, aut eius speciem, & per descriptionem licetè putabant. Verùm Theophrasti postea loco moniti, ad illius lanigeras vites referendam esse censuerunt, Theophrasti quæ lectionem ibi corrigendam monuerunt, simulque Matthioli. reprehendunt, existimantem, nullam huius à Græcis antiquis factam mentionem. An verò Theophrasti vel Plin. hanc intellexerit alienibi herbaceam Bombacem, nondum nobis innotuit.

Idem Pen. & Lob. *descrip. egyptiæ* Guilandini dicunt, sed vel hic vel illi, vel vtrique decepti: non enim hæc arbor est.

Caterùm plantam istam Veteribus Græcis incognitam fuisse multi arbitrantur: sed illi, ex lententia Hist. Lugd. errant: quæ vult ad lanigeras Theophrasti. vites planè referendam, vbi per fructum, non vefum intelligendum putat. At nullam apud Theophrasti. inuenimus mentionem factam Vitium lanatarum, sed arborum. Ait quidem folio esse vitis. Videtur Hist. Lugd. in hoc imitata Lob. & Penam.

Sed & ipse quoque Hon. Bellus vocis Bombacis seu Gossipii homonymia deceptus videtur, quando ait: Gossipium in Arabia & Ægypto arborefcit & multos annos durat: sed in Creta hyeme perit. Nobis verò duæ diuersæ sunt plantæ, quæ non solum variant loco & duratione, sed specie ipsa. Illa enim Arabia & Ægypti arbor est. Quæ in Creta perit, herba.

Cæsalp. in eundem impingit scopulum: sic enim scribit: Quamvis Serapio *Cotonem* seu *Bombacem* arborem tradat esse, non tamen putandum aliud genus Bombacis ostendere, quàm id quod superius descripsi, [describit autem herbaceum] cum testetur eodem anno, quo fata est, Bombacem ferre, ac magis præferendam: sed apud nos aduertente hyeme pereunt ex toto eius plantæ, ob frigoris impatientiam. Fortè apud Plin. [addit] eadem sunt arbores, quas Gossipinos vocari tradit. Ast differt Gossipium Cæsalpini ab arbore diuersimodè: illud annuum & herba videtur: alterum arborum modo durat. Figura etiam immò specie ipsa diuersa, vti dictum: suntque folia arbo-



reo glabra: loca item ubi proueniunt diuersa, neque mutantur transplantatione in se inuicem. Quid? quod ex ipso etiam Serap. manifesta appareat distinctio, uti patet ex eius verbis postea citandis.

Porro et si Gossipium herba plerisque Veteribus Græcis incognitum fuisse videatur, nomen tamen Græcorum stipatū neutiquam caret, quæ sibi communi iure cum arboreo vindicasse videtur. Appellatur enim *βόμβας* siue *πάρμαξ* & *παμβάσις*, & *βόμβας* Suidæ. Vulgò Herbaris *βόλος* ἢ *βολλών*. Pollux etiam *βόλος* vocat. *βόμβας* Nico.

Myrsipus: *βόμβας* quoque ipsam lanuginem lunisconsultus, & ex eo Had. lun. Latinis *Xylon*, *Gossipium*, *Bambax*, *bombyx*, *bombax*: vulgò etiam *bombas*: *bambacium*, *bombacium*, *Cotton* vel *Cotto*, nū: seu *Cotton*, *corti*, seu *Cotum*, ti: seu *Cotonum*, nū: & alia plura pro vno & eodem, scilicet bombace, testibus Monachis in Mes à iunioribus accipiuntur. Priores autem Latini prædictis ferè Græcis nominibus vsi sunt: quidam *xylon* & *gossipium* dixerunt. Barbaris & Arabibus *cotum* & *bombax*, & *bombasum*, & *bambasum*. Sed genuino suo idiomate *bablabab*: Trogodytæ *bafut*, teste Scaligero. Ab hac planta uetites *xylina* & *lina xylina*, nominantur. Iurisconsulti lanam eius *lineam* nuncupant: Syri *cor*: Gal. *cotton*. Ital. *cotone*, *bombace*, *bambagia*. Hisp. *algodon*. Ang. & Belg. *Cotton*/His verò magna ex parte *Boonwol*/ *cotton* & *bombasum* dicitur. Germ. *Zaumwol*. Boh. *Bawelina*: Aegyptiis *Gornesegiar*, ut scribit Alpinus. Vngar. *gyaport*. Olim, auctore Lacun, plantabatur totum in Aegypto, nunc ferè per totam Europam habetur. Nam & in Gallia nasci, ex Italia delatum, Ruellius testatur. Fulch. nunc in Germ. hortis plantatur: qui tam fertilem tradit esse hunc fruticem, ut simulque adoleuit, quod duorum sit spatium mensium, nunquam desinat florem & fructum proferte, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur. Italia, ut scribit Bellon. tempore Romanorum abundabat. *C. tunc*: nunc nulla planta inuenitur. Inter Marat & Halæpum abundat. In Creta, insula Lemno, inter Hierosolymam & Damascum magna copia feritur, ubi pleni agri conspiciuntur, magnique ex eo fiunt reditus. Sentitur & hac ætate in Cypro Maltha & Sicilia insulis, ubi copiosissime prouenit, quemadmodum & in regno Apulæ. Denique calidis gaudet locis Gossipium, inquit Alpinus, Aegypti ad ipsorum usum aliunde aduehunt: neque enim apud ipsos herbacea illa planta, ex qua Syri vel Cypri Gossipium colligunt, nascitur, sed tantum quæ arboreus frutex est.

Sentur in Apulia Febr. vel Martio mensibus. Colligitur Septembr. & Octobr. testibus Monachis. Bellonio verò tradente, inter Marat & Halæpum satum Maio aut Iulio, demerunt Septembri: nec manet satum in terra per medium annum, nam & in Creta hyeme perit, teste Bellon. In Germania Camerar. speciatim Norinbergæ ex semine prodiit & floruit, sed fructum ferè per æstatem fugacitatem non consuevit. Nobis quoque, ut Geneuæ ita & Montbelgardi non semel creuit ex semine Massilia allato, & abundè floruit, flosculis pallidis, nucularumque primordia protrudit, sed subinde decidua, antequam grandescerent. Radice nitebantur profunda: Nouembri inaruerunt. Creuit etiam Platero Basileæ. Solum amat tenue Cotonon. [quod nostrates ait Quintin.] ab exotico animante detonsum credunt, magis quam pingue, cœlum utique siccum, vix

aliter habiturum Melitæ aruum. Miratus sum hoc quamquam calidius solum est, fimo misceri ab agricolis & stercoreari, quum Sole statim inarescant omnia. Vere feritur, nec nisi pridie madefactum, & in aruo statim restitibi [ illo enim agrum pinguescere ferunt] mox aratum integitur *Satio*. crate, vel rastro quod supertrahunt: suo sarritur tempore, & runcatione quadam inutilibus herbis liberatur tam manu quam falculo: dum vellitur, tunc pluuia horrent. Incolæ hoc maximè cupiunt ferere, si liceat: quoniam quæstus plus quam è frumento: cuius etiam admodum ferax non est insula. Hac vna re vel maximè felix, quod iuxta sita est Sicilia, fugum omnium fertilissima, quæ illis pro horreo est, fame alioqui periculis. Et paulò post Biseræ arbores, binæ sæpè missæ: demisso enim hordeo, mox *cottonum* succedit, vel *Hordeum cottono*, adè terra non cessat parere.

Quod ad usum attinet, nullum Lini genus est, Vires & v. quod huic candore & molitia præferatur, quam firmitatis in eo parum esse videatur. Excal. Tèperam. facit auctore Matth. planta p'a & si cat. Vltà sit sanguinis profluuii: & præsertim in vulneribus. Seminis medulla tussientibus & disth. ult. spirantibus mariscè auxiliatur: genituram quoque auget, proinde Venere stimulat. Oleum è seminis medulla expressum lentigines, alphas, & ceteras cutis infectiones delet. Eiusdem lanugo manifestè quoque calefacit ac siccit: quæ si comburatur, mirum in modum manentem è vulneribus sanguinem sistit. Eadem accensa, & naribus suffusa, uteri strangulatus auerit. Oleum seminis palpebrarum quoque asperitates lenit. Cottoni semen gratissimum præbet pabulum bubus, glandis sapore, Quintinus. Iuba ex eius lanugine tradit fieri liateæ Indicis præstantiora. Lanugine eadem hodie passim vtuntur ad faciendas vestes fouendi caloris ergò. Fiunt & liateæ ex ea diuersi artificii, ut femoralia, quæ *brachas* appellamus, si. Femoralia. ue subligacula, quæ sunt mulierum coloris, ut puniceæ & albicantis, nec non vermiculati. Nigritis etiam locupletioribus omnibus est habitus ex *Habitu*. cottonina quadam alba admodum, quæ instar camisæ vestem eis suppeditat. Reticula quoque quædam magna ex bombyce pænant Insulani fortunati, quæ in aëra suspendunt ac in illis dormitant. Ex relatione Lud. Rom. Lineis vestibus *Vestigi*. [verum verticolaribus, amittuntur mulites Sultani urbis Aden in felici Arabia, arcendi algoris gratia: Xylon siue Gossipium, Neoterici bombicem appellant. Sunt enim gossipinæ huiusmodi vestes prælio nauando non ineptæ, quas ob id iuri in bella Chamydis loco induunt. Idem Regi ac Reginæ urbis Calechut, incolique, idolorum cultoribus haud dubiè dissimilis non est habitus: quippe qui Gossipino, haud sanè serico panno obscena tantum velant: Chirurghi quidam solent *Chirurgorū error*. post sectionem venæ bombacem applicare, quod ego rarè fieri velim, filamenta enim quæ vulnus ingrediuntur, conglutinationem retardant, & interdum in causa sunt, ut in eo aliquid puris generetur. Si tamen amplior sit sectio, & periculum ne vena iterum aperiat, applicari potest.

## XYLON ARBOREVM.

Descriptio



triplici, profunda, acuta, (vna in vnamquamque laciniam excurrens,) actotidem neruis distinctis, pediculis haerentibus semina longioribus.

alp. not.

Manifestè differt hoc Xylon arborescens ab herbaceo, cui folia hirsuta non glabra, quæ tamen notâ non distinguit Alpinus, paucis his eam describens: Gossipium Egypti est arboreus frutex, in quibusdam tantùm viridatis proueniens, pluribus annis viuens, dissimilis ab herbaceo tantùm proceritate caudicis, ramorum atque foliorum figura. Crescit ad decem vsque cubitorum altitudinem, stipite ramisque duris lignosis, eandem quam herbaceum fert lanuginem: quæ ob modicam penes ipsos quantitatem in usu non est.

Ylonea  
arbor  
Theophr.  
illustr.

Hoc *Ylonea arborea* est Theophrast. quod sic describit. In Tylo insula (quæ in sinu Arabico est, parte ad Oriente spectante) lanigeras arbores plurimas nasci proditum est: hæc folia habent Vitis, verùm minora: fructum nullum. [*ἡ γὰρ τοῦ δένδρου φύλλα ὡς τῆς βίτης, ἀλλὰ μικρότερα*] Id quod Lanam continet, Mali verni amplitudine est, clausum ac velut in sinum contractum: vere compressum, maturitate se recludens, vnde lana eximitur, ex qua telas texunt, aliàs pretiosas, aliàs viliores. Hoc idem in India sit, & in Arabia. Quo loco obscuritas declaranda. Nam quid hoc est dicere, nullum ferre fructum, & ferre aliquid Mali magnitudine, clausum, in quo lana? Sunt qui ita explicant, nullum ferre fructum vescum. Sed hoc non satisfacit. Fructus enim essentia aut ratio formalis non est, vt sit vescus: sũntque fortè non pauciores non vesci, vescis. Scaliger hinc nihil olfecit. Nos ita legendum ex re ipsa censemus. *ἡ γὰρ τοῦ δένδρου φύλλα ὡς τῆς βίτης, ἀλλὰ μικρότερα*: ita vt & istud expungatur. Sic consentiet lectio Theophrast. cum re ipsa.

Theophr.  
correct.

Eadem ex Theophrast. Plinius transcripsit, his verbis. Tylos insula in eodem sinu [Arabico] est, repleta syluis, quæ spectat Orientem, quæque & ipsa æstu maris perfunditur. Eiusdem insulæ excellentiore suggestu lanigeræ arbores alio modo, quàm Serûm. His folia infecunda: (Lanæ secus quàm apud Seras, quorum in tractu Laniferæ arbores folia lana operta gerunt. Dalechamp.) quæ, ni minora essent, Vitium poterant videri. Ferunt Cotonei mali amplitudine Cucurbitas, quæ maturitate ruptæ ostendunt lanuginis pilas, ex qui-

Plin. illustr.

bus vestes pretioso linteo faciunt. Hanc & alibi paulò aliter sic describit: Superior pars Egypti in Arabiam vergens pignit fructum, quem aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & ideo lana inde facta Xylina. Paruus est, similèque batata: Nucis desert fructum, cuius ex interiore bombace lanugo netur. Nec vlla sunt eis candore mollitiæ præferenda. Mirum verò Plinium Xyli herbacei non meminisse: an quia suo seculo nondum sereretur, aut ipsi saltem nondum innotisset: an, quod verisimilius videtur, quòd non agnosceret discrimen. In Aegypto autem arborei nascitur, non herbaceum, vel Alpino teste.

Gossipium  
Xylon.

Bombax.

Coton.  
Bombax.

De eadem arborea intelligendus Serapio, sic tradens: Coton, id est, Bombax: Narrant quidam medici de Kelbe, Cotonem nasci apud se in arboribus Antipericorum similibus, duratæque viginti annis. Preferri nouum & recens, debitoque anni tempore plantatum.

Deleph.

Scal. de arborib. Eriophoris Theophr. tradit quidem: at non demonstrat eandem sint cum Gossipio, quamuis id insinuare videatur.

Mass.

Matthioli. verò cum Xylon siue Gossipium à Theophrast. *ἡ γὰρ τοῦ δένδρου* appellari ignoraret [inquit Guiland. in suo Theone] pricis vili Græcia hominibus silentio præteritum assignare non erubuit. Ipse verò etiam Guilandinus non demonstrauit discrimen inter Xylon herbidum & arborem Laniferam Theophrasti. Apud Indos, inquit Gorop. delicatissimæ vestes in arboribus crescunt, Lana Xylina, & Bombycis tela, de qua falsò credere Veteres, arboribus depecti solere, in quibus fuit Virgilius:

Guilandin.

Virgil.

*Velleræque ut solus depectunt mollia Seres.* Scimus arborem esse, cuius Nuxlanas inuoluit, è quibus fiunt telæ molliissimæ hoc tempore Cotonæ dictæ. Idem in Vertumno.

Cæterum huius arboris Laniferæ [vt annotat Bellon.] primò mentionem fecit Herodotus, quem postea secuti sunt Theophrast. & Plin. ac plures alii, estque è numero semper virentium.

Semp.

Bellonium carpit Bellus sic scribens: Bellon. fortè sub arboris Lanigeræ nomine intelligit fructum *Qasar*. Si verò hanc Lanigeram Theophrast. Plinii esse putauit, valde hallucinatus est: Lanigeræ Theophrast. nihil aliud sunt quàm Gossipium, quod in Arabia & Aegypto arborei, & multos annos durat: sed in Cieta hyeme perit. *Hæc ille.* At nobis sanè omnia quæ scribit Bellon. de arbore Lanifera, videntur conuenire cum Xylo arboreo, à quo nec Alpinus dissentit. Ipse verò Bellus hallucinatus nobis videtur, opinatus Aegypti arbores laniferas easdem esse cum Xylo herbaceo Cretensium, quæ opinio in superioribus sufficienter refutata.

Semp.

Qasar.

Bellon.

Bella.

fructus.

adue.

Bella.

Bella.

Calp. Bauh. Gossipium alterum arboreum vocat. Eadem denique nomina atque Synonyma, linguarum quæ suprà herbaceo assignata sunt, & huic conuenire possunt, si arboris differentiam addas.

Nascitur in Aegypto & Arabia, autoribus Alpino & Bellonio, qui & in hortis Cairi altitudinem hominis excedentes inuenisse tradit, quæ hyeme non pereat: & in Arabia ignem fessile ex ligno arborum Laniferarum. Creuit hæc Anno 1595. in horto Cl. D. D. zuingeri, Basileæ quam mense Augusto in spithameam ferè altitudinem excreuisse vidimus, paruulamque eius plantulam iconi adiungi curauimus. Qui verò fructus in eadem depecti sunt, mox describentur, à Xylo vtroque iam dicto diuersi.

Loco.

Vire.

us.

lam.



lam aliam preferendam censet, vestesque ait, inde sacerdotibus Aegypti gratissimas fieri: quod specialius declarat Apulcius Apologia prima de lineo texto. Purissimum est, inquit, rebus divinis velamentum: quippe lana signisimè corporis excrementum pecori detracta, iam inde Orphei & Pythagoræ scitis, prophanus vestitus est: sed enim mundissima lintes, inter optimas fruges terra exorta, non modò indutui & amictui sanctissimis Aegyptiorum Sacerdotibus, sed opertui quoque inde rebus sacris vsurpatur.

Arabes, teste Bellonio, ex ea pulchras telas texunt tenuiores & subtiliores ipsis sericeis candidioribus & bombacynis. Hocque demonstrari posse tradit pomis à se allatis, in quibus magna sit lanæ copia. Quæcunque verò suprà de viribus Xyli herbacei dicta sunt, & huc referenda sunt ex Serapione, qui & hæc specialius addit, succum foliorum conferre fluxui ventris puerorum. Bombacem calidiorem dicit recentem: semen conferre tussi: & commodam pectori. Lanugine, vt refert Alpinus, vtuntur Aegyptii, linearum petiarum loco, quibus nostri tantum vtuntur ad vlcera, vulneraque omnia sananda: quando lineis petiis apud nostros ad vulnera vlceraque frequentata, illi non vtantur: adhibent & ipsa, vti nostri faciunt, ad fluentem sanguinem sistendum. Seminum quoque mucilaginis vsus est frequentissimus ad omnes febres ardentes atque venena erosionem ventriculo & intestinis inferentia. Ad tussientes ex acrimia salforumque humorum destillationibus plurimus apud eos vsus. In Arabia ex hac Xylini lanugine telas illas tenuissimas (quas *seffa* illi appellant, atque multis Byssum Antiquorum esse persuasum est) parant, quæ utique ob pulchritudinem ab omnibus commendantur.

## XYLON BRASILIANVM.

## CAP. CLIII.

**I**llustrissimo Duci VVirtemb. Xyli Indici seu Brasiliiani nomine à D. Paludano cum aliis multis Indicis missus fructus, in quo grana duobus versibus, quos lanugo xylina vulgari similis intercedit, distincta, licuti figura, quam præcedenti tabella xyli arborei exhibemus demonstrat: obliquè per superficies planas sine vlla lanugine media inter se incubitu disposita, oblonga, Strobilorum forma, minora, fusca, glabra, bombace vt in Xylo herbaceo toto grano non adherente, quorum extremum agmen granum vnum singulare cogit: intus cuticula membranea: priori subiacens, exalbida, medullam continet candidam, pinguem, dulcem vt in vulgari.

De quo & Bellon. Adfertur genus Cotonis ex India aut Brasilia, quod multum differt ab Asiatico. Brasiliano crassum semen, nigrum, conglomeratum ex x. aut xii. granis, aliter quàm Asiatico, cui grana singularia separata.


Lob. in diuersis suis operibus, quemadmodum & Camer. & Dod. grana separatim picta exhibent, qualia à Bellon. descripta, sed ea nec describunt, nec vllam faciunt eius scripto mentionem. Videtur autem huius arbores Gossampinas dixisse Martii in opere suo de rebus Oceani & noui orbis, quod in ea nasci & Gossipii nomine appellandum censet, atque apud Canchirtenses vulgò suapte natura nasci, vt apud nos arbuta sylue-

De hoc Gossipio Brasiliano tradit Leriùs quæ obseruauit in suo Itinere, Brasiliano scilicet. Arbore bombacem ferentes abundant in Brasilia, mediocris sunt altitudinis, flores campanulis similes ferunt, luteos, instar cucurbitarum vel citrulorum. Fructus maturus accedit ad figuram Fagi, qui in quatuor etiam partes finditur, bombax [Cotton] Americanis dictum *Amen-iou* ex iis pendet magnitudine paruorum pilarum, in medio grana nigra, simul arctè iuncta, renein exprimentia. Faba non crassiora nec longiora. Hoc mulieres syluestres colligunt & filum ex eo parant, pro suis lectis.

Descriptio Leriuni.

Amen-iou.

Filum.



## LANIFERA ARBOR PEREGRINA.

## CAP. CLIV.



**C**irca Bantam Loc. Cl. uz Insulæ Descriptio vrbem celeberrimam, referente Francisco Roderigues Bengala oriundo, qui anno 1598. Amstelredamo cum natauis in Bantam profectus, insequente anno cum isdem inde rediit, nascitur arbor procerà, multis ramis prædita quos sepiunt numerosa folia, vt conspicere est in falice, sed illis longè angustiora, & libanotidis coronariæ

Locus. Descriptio Arbor proceræ.

Folia.

Fructus.

foliis similia, longiorata en. Eam ferre dicebat fructus siliquarum penè instar, (quorum vno, quem retulerat, me donabat.) sex vncias longos, quinque in ambitu crassos, à pediculo sensim augescentes, cute veridè quàm cortice præditos, cineracei coloris, rugulos, extimâ parte mucronatos, in quinque partes dehiscens, plenos tenuissimò mollissimoque & candidissimo tomento, in quo latebant multa semina nigra, legitimi xyli semine minora, tomento siue lanæ non adherentia, vt in xylo, sed libera, & circum quinque veluti affulas longas mediam siliquam occupantes, nascentia. Eâ lanâ negabat Franciscus incolas vti ad stamina ducenda, quemadmodum alio xylo, nimis enim brevis est, sed puluinarum impleri asserbat, ad quam sanè rem commodissimam esse mihi videbatur, vt quæ vulgari tomento, imò vel ipsâ etiam planâ mollior sit. Clus. Exot.

Semina.

Vfus.

Cæterum anno 1601. reducis septem illis navibus ex Moluccis & Iaua insulis, nuce myristica, pipere & alio aromatum genere onustis, alium fructum huic similem, sed maiorem & magis integrum, honestissimi viri Petri Gareti diligentia acquirerebam, suum pediculum durum & lignosum binas vncias longum adhuc retinentem: eum autem fructum obseruabam non ab imo mucrone in quinque partes dehiscere, vt putaram, sed à summo, videlicet à pediculo, à quo procedunt quinque illæ affulæ, circa quas semina nascuntur. Intelligebam præterea ab Isbrando Hieronymi filio, Cheirurgo, qui naue, in signe siue symbolum

Fructus alter.

Solem habente, vetus fuerat, incolae eo uti non modo ad implenda ceruicalia, sed illud etiam ab ipsis in stamina torqueri (alia tamen ratione quam vulgò Linum, lana, xylum) itaque staminibus suis vestes facere.

**Locus.** Sed etiam Sebalus de Wert affirmabat arbores finilem fructum gerentes in Guineæ maritimis crescere, quæ tamen ampliora haberent folia, quam Franciscus Rodriguez illi tribuit. Eam ob causam suspicabar, an illa lanifera arbor esse posset, cuius meminit Petrus Bellon. cap. 60. & 67. l. l. suarum Observationum, quas nos Latio donauimus ante multos annos, & breui, Deo volente, longè correctiores & aliquot scholis illustratas, euulgare habemus in animo.

An verò ea arbor, ex qua teste Philostrato Byssum nati fecerunt, basi quidem Populo persimilem, foliis autem salicis.

## COCCI ORIENTALES.

## CAP. CLV.

T. C. P. 10



**A**dferuntur grana quædam, quæ *Coccos Orientales* appellantur, Cicetibus paria aut maiora, renis ferè figura, fusco, rugoso cortice exteriori, interiore crassiore, cinereo, itidem rugoso, utroque lento, nucleum claudente fragilem, obsoleto coloris, lenticulari apophyse, quæ geminæ ex umbilico corticis partes emittunt, circumiectum.

Cohærent autem interdum Cocci bini aut terni crassius totidem hærentes, ut plurimum singulares. Sustinentur pediculis viciatim, unico modo articulatis, qui sanè lignei cum sint, arboris fructus esse haud obscure insinuant: quæ ratio cur Nucibus subieciamus, quodd & putamine, eoque gemino constent, & intus nucleum contineant. Sapore sunt admodum amaro.

*Coccos Orientales.*  
*Avicenna.*  
*Ruell.*  
*Cuculus.*

*Caro.*  
*Cortex.*

*Nucleus.*

*Cocci Orientales* officinæ vocant. Ruell. Aristolochiæ cuiusdam fructum suspicatur, quamuis nihil commune habeant, cum ea saltem quoad figuram. *Cuculi* fructus sunt, in Aegypto nascentis furiosi Solani [Annotat. vulgò *Cocce de leuante* nominat Historiæ solani apud Diosc. & Theophrast. non respondet] racemoso, dum adhuc in matre suo hærent, habitu, nouem, decem, aut duodecim (Cordo Hist. plant. id attestante) acinis ab vno pediculo Corymbi figura dependentibus: infra succosâ, mollique carne, lignoso cortice, & nucleo constantibus, quorum caro paulatim, exiccato eius succo, tabescit, & rugis contrahitur antequam ad nos è tam longinqua regione perferantur. Singulis acinis siccatis Auellanae parua magnitudo est, & rotunda, aliquantulum oblonga figura, & circa annexum modicè renum instar sima. Nucleum habent candicantem, pinguem,

sinuoso, contorto & lignoso distinctum interfecto, sapore amaricantem, subdulcem, & modicè tenuem, quo ad capiendos pisces vtuntur. Eligito maximos, ponderosissimos, & candido nucleo intus repletos, nam ad nos allati, ut plurimum inanes & leuissimi sunt. Idem in Annotationibus: Στεφάνος, in Aegypto copiosum nasci tradit, vnde ad nos afferatur, & à Pharmacopœis cuculos *de leuante*, id est Solanum Orientale vocari: Nam Cuculum idem esse, quod Cucubalum, siue solanum ait: præterea semel satis recetis se vidisse. Verum nihil in his videmus quod cum Strychnis vel solanis respondeat.

*Grana Orientis* vulgò, Officinis *Coccali Elephantini*, itemque *Coccali grana* & *Piscatoria grana*. Nec satis constat ex qua planta producta sint, licet sint qui Clematidis fructum esse opinentur, teste Corn. & Apolline. Verum ii plurimum falluntur.

Amatus Tithymali cuiusdam semen esse putat: quæ & olim Matthiol. fuit opinio, quam candidè se mutasse fatetur. Et si Amatus contulisset descriptiones Tithymali cum *Cocco piscatorio*, nunquam existimasset esse Tithymal. cuiusdam semen.

Thaddæus Nemius ab Hagek ad Matthiol. in epist. Germanico idiomate *Gebulas*, Offic. *Cocculas Elephanticas* Fuchl. ab animali Elephante vocari prodidit. Eius historiam à nemine antè se traditam putat Matthiol.

Elephantinas vocari sunt qui censeant, quòd Elephantis gratissimus sit cibus. Sed ii à veritate aberrant, ex Matthiol. sententia. Primum allata in Italiam nullo nomine ex Alexandria. Vnde factum ut à Veneris negotiatoribus *Coccole de leuante*, id est Bacca Orient. vocarentur, quod nomen in vniuersam Italiam diuulgatum est. *Cuculi* siue *Cucubali* Indianus, quem insanum seu furiosum solanum faciunt. Lob. Nec sua destitutus opinione. Casalp. fortè Nucem vomicam esse putat, quæ in Offic. Gallia orientalis dicitur ad pisces & blutepesciendos qualita. Idem baccas inanes dicit, & in cauitate inchoationem tantum faminis apparere, indicio colligi antè perfectionem, neque grandiores esse Auellana, ut monet Serapio.

Taber. *Mergenlendische Nüss* Germ. vocat, de quibus ait Garciam in hist. aromatum lib. i. cap. 26. agere. Sed fallitur: nulla enim ibi mentio horum fructuum, sed historia traditur Cocci Indici siue Nucis Indicæ, cuius historiam non sine supina oscitantia tradit idem Taber. nomine predicto: licet inter se nihil planè commune habeat. *Cuculus Indicus* Lat. Cast. Dur. *Cocculas* Offic. Boetel Berner & Fischerner / Reformatio Wormal. vocat. Incolæ *Doam Samac* vocant, teste Rauoull. Piscatores Italiæ vulgò *Cocca*.

Cocculas has substantiæ calidæ ac igneæ esse, iple gustus euidenter indicat. Thaddæus. Lobelius tradit, Ceruiciæ Germanis & Belgis Cuculos incoquere autem id faciunt, siue Narcoticas quis credat, ut Matth. siue insigniter tantum amaras, ut reuera sunt, & nihilominus fumoso suo halitu cebrebrum [vbi plerique visum] obsuscant & stupefaciunt, non temerè quis mirabitur. Nam Pädagogus quidam ut refert Amatus, Cubebas poscens, ex imprudentia pharmacopolæ fructum accepit quem piscatores vulgò *Coccam* vocant, & quo pisces interficiunt, & quem ipse Tithymali cuiusdam semè esse putat: Cuius cum quatuor ad summum grana auidissimè comederet, jilicò in nauséa & singultum ac animi angustias incidit: mox ei vomiti.



vomitum exhibitum, quo vel intra horam ex integro ab eo agone & periculo liber est factus.

Nihil praestantius [inquit Cassianus de subtilit.] ad pisces attonitos reddendos, eo fructu qui ex Oriente vehitur, vocant *cogolum*, nigra bacca est, persimilis laminæ, sed minor ac rotundior. Compositio nostra ad pisces capiendos experta hæc est: Baccardum Orientalium quadrans vicia, cymini & aquæ ardentis singulorum sextans, casei vicia, larinæ vicia tres, digeruntur contusa in pastillos.

Thaddæus Nemicius Matthioli scribens: solent, inquit, Coccos Orientales miscere cum veteri cafeo, melle & farina tritica: inde formant globulos, seu pilulas pisi magnitudine, quas in flumen, ubi piscium concursus frequentior fieri consuevit, prouciunt. Alii hac sequenti compositione utebantur, quæ idem Thaddæus & se dum esset adolescens, delectatum fuit, non tam quod tenebatur [ut ille ait] studio capiendorum piscium, quam quod vehementer admiraretur artem & effectum. 2. Cotularum Elephantularum, [coccorum diluato] adipis agni ana. vnc. sem. casei antiqui vnc. j. sem. cannabini seminis vnc. j. Sem. anethi, hyoscy. ana. drachm. iij. farinæ tritici drachm. iij. mellis drach. vj. camphoræ drach. j. hæc omnia in mortario in massam redigantur, & fiant inde cataportia pisi magnitudine, quæ flumini placide iniecta [ne videlicet rapiditis flumen pisces alio abripiat & deferat, unde posthac tolli non possint] & a piscibus deuorata, paulula interiecta mora, eos infatiant, ut hinc inde nunc in flumine discursent, nunc moueantur in orbem, magna cum voluptate adolecentum. Mox fatigati, & iam ferè exanimis, in summo fluminis nates, reticulo piscatorio extrahuntur: extracti subito vel exenter intur, vel in recentem aquam coniciuntur, eiecta prius ex illorum ore pilula deuorata, quæ plerumque adhuc in faucibus, ex ventriculo fortasse eorum reiecta, hærere solet. Plerique redeunt ad se, & quasi reuiuiscunt, quod etiam quibusdam accidit, si fortè paulò diutius, vel in flumine relinquuntur, vel vi fluminis in alium locum deferantur.

Eidem Thaddæo respondens Matth. sic inquit: Tractu temporis cum diligentius hæc baccas examinarem, nec nisi necari pisces, sed in soporem vel stuporem agi viderem, priorem sententiam qua Tithymali alicuius fructum esse existimabam, deserui. Quo factum est, ut posthac mihi persuaserim alicuius soporiferæ stirpis Aegypti, unde deferuntur, eas esse fructus. Et certè dum harum baccarum facultates mihi propono examinandas, cum ad soporiferas esse scia, ut sumentes in stuporem agant, easdem sanè calidas, igneas, scæcæque habere vires, non ita facile mihi persuadere possum. Soporiferas esse has manifestum est argumento, quod additis cafeo tantum & farina, ac subinde defuto vel dulci vino exceptæ, p. seibusque obiectæ, in paulò post stupidi fiant. Nec me à mea mouet opinione amaror ille, qui gustu percipitur, quique aliquem non abque ratione calidas esse has ad credendum inducat, quod Opium, quo nihil validius est in sopore stuporeve excitando, amaritudine longè maiore pollere videamus, quæ quidem amaritudo non impedit [si Galeno credimus] quominus Opium sit ex quarto refrigerantium ordine. Quinetiam amara sunt Papauerum capita foliaque, quemadmodum & Mandragoræ radices amaro non vacante, quæ tamen omnes sua frigida somnum conciliant.

Toni. I.

Hæc Matth. sententiæ etiam Gesnerus subscribere videtur quando ad Grassærum Medicum scribit in hunc modum: Mirum nunc Vomica & Opium, utraque peramara, summe ta nen frigida esse, sicut & Coccos Leuanticos dictos. Hoc etiam mirum, frigidissima hæc sudorem mouere. Nobis sanè minime probabile videtur ob suam frigiditatem sudores mouere, imò ne mouere quidem, nisi fortè per accidens, hominem in Lypothimæ vel Synopes motum coniciendo, ob molestiam, quam stomacho creant assumptæ, le qua re ampla possit initium disputatio, si tractationis hæc ratio id admitteret.

Audiendus tamen & Codronchius, qui cocculas in tractatu quodam singulari, neuiquam frigidas, sed potius calidas putat, idque multis rationibus non solum probare, sed & Matth. conceptam opinionem conuellere nititur, quando ita scribit.

Baccas Elephanicas dictas calidas & siccas esse, experimento adeo constat, ut nulli ferè indigeat probatione: nihil enim nus id speciat ex sensu gustus cum amaras experiamur. Nihil autem ex Galen. quod non desuper a nari non modò calidam, verum & siccam frigiditatem ostendunt: nec Baccas Orientales tantum calefacere & siccare, verum & impensè id facere videmus. Cum enim amara sint, & amara à caloris excessu fiat, ita ut quæ res aliqua erit amara, à maiori etiam omni caliditate cretenda sit. Quapropter dubium non est pediculos & pisces interimere posse. Quanta verò signa maritibus istarum baccarum, ab vxore piscatoris idem se didicisse narrat, qui cum eas pro pasta conficienda idonea capiendis piscibus in mortatio contulisset, & eius vxor in eo optimè abluto ac detergo scilicet consecisset, adeo amara ipse effecta sunt, ut nullo pacto ab eis, quamuis admodum pauperibus comedi potuerint. Præterea cum mulier experientia visum fuerit, & ab eodem in puerulis suis [ut ipse met scribit] sequenter & improbaum sit, puluerem harum baccarum etiam in exigua quantitate cum adipe nillo vel pomo decocto & similibus permixtum, & capiti appositum, egregiè pediculos in capite ortos interficere. & felicius quam Staphidem agnam, tuiusque, quam hydrargyrum, caliditate & siccitate intensa affectas esse iure fatendum erit, atque adeo vi pollere, non solum siccandi & calefaciendi, sed & ex alto trahendi, Experientia quoque compertum est, in aliquibus puerulis curam totius capitis rubefactam esse, & ut dicunt mulieres inflammata, & per aliquot dies pruritui fati intenso affectam, signo manifesto Cocculas has esse valde calidas & siccas. Expropter hæc in setam manifesta non potui [inquit Codronchius] opinioni Matthioli adherere. Cum igitur clarum sit, has baccas calefacere & exsiccare, facile est etiam ex dictis colligere illarum alias facultates, egregiè nempe abitergendi, incidendi, aperiendi, trahendi, euacuandi, nec non pediculos ac pisces necandi. An verò baccæ istæ inter venena reponendæ sint, & ob id pisces & pediculi? Sum e-

nat. An venena. go huius sententiæ, eas nullo pacto facultate deleteria vel venenosa præditas esse, neque hac ratione, verum merito primarum qualitatum & suæ amaritiei animalia ista interficere. Quod non sint venenata ex eo potissimum conici potest, quod etiam aliqua levis noxa exillarum applicatione per longum satis tempus non fuerit visa, nec ullum symptoma secutum sit. Et si obui-

Gg

Frigidissima.

Gesnerus.

Calida esse.

Ad naves calid.

Experientia. Palla ad capiendos pisces.

Pediculi.

de arth. mor.

Quædam alia.

An venena.

ciat aliquis non esse mirum, cum tantum exterius applicentur, si nullum inde oriatur symptoma: dico, quod si medicamentum venenatum esset, ratione nobilitatis membri & ratione molliciti & debilitatis illius in pueris necessarium aliquid mali exinde oriri aliquando fuisset obseruatum, quod cum non euenit: nulla facultate delectaria ipsas insignitas esse credere cogor: sed, ut dixi, non solum ratione caliditatis & siccitatis insignis, verum & multo magis fortasse ratione suae amaritudinis istud medicamentum habet interimere pisces & pediculos: cum habeamus à Gal. 6. simpl. med. amaritudine lumbricos necari: Cum autem ventris tinea amaritis interficiantur, multo magis pediculi & pisces necabuntur, cum mea sententia facilius sit eos quam vermes occidere. Eapropter Matthiol. sententiam probare non possum, scilicet puluerem harum baccarum pisces infatuare, vel in soporem & stuporem eos deducere, & ob id soporiferas esse, frigidas & humidas, sed potius piscatorum opinionem sequi cogor, à quibus intellexi ab isto medicamento pisces etiam breui temporis curriculo necari, si deo nisi quamprimum capiantur, facilius putrescere, & in plures partes diuidi: quod non nisi ratione inter se caliditatis agentis in carnem illam valde mollem, teneram, & humidam, potuerit potest: immo etiam ab iisdem relatum, pisces, qui puluerem hunc sumperint, nisi cito capiantur & aperiantur, ut plurimum medios rumpi, non tamen ita celeriter contabescere. Quod autem pisces ex hoc assumpto puluere non infatuantur, sed interimantur potius praeter hanc piscatorum relationem possumus à simili comprobare. Quemadmodum enim pediculi ex apposito puluere harum baccarum non infatuantur, nec hac vel illac per caput discurrunt, sed statim interimuntur, ita & multo magis piscibus euenire existimandum erit. Et si quis obiciat, pisces per aquam discurrere & volutari assumpto puluere, & id ratione ebrietatis seu facultatis, euenire, illis dicam ego, non harum ratione, sed doloris quem percipiunt à contrario illo sic agitari & volutari, ut vni quodque animal facere, & praesertim homines solent, cum dolore aliquo torquentur. Postremo, cum pisces platyphyllo Tithymallo teste Diosc. necentur, Tithymali autem omnes vincentem habeant acrem calidamque facultatem, insitque Galenus asserit, idem de illis baccis statuo. Confectarium ergo est, piscibus sic captis, tunc absque ulla veneni suspitione nos velci posse, etsi aliqua ratione à mensis abdicandi essent, quod mortui vel semimortui, praesertim in ætate, capiti, ratione suae molliciti citissimè à putredine corripiantur. Si tamen cum primum capiti sunt exenterentur & coquantur, absque ulla periculo comedi posse crederem. *Hætenus Codd. m. h. v.*

*Matth. rationes refut.*

*Piscatorum experientia.*

*P. m. h. v.*

*Obici.*

*P. m. h. v.*

*Confectarium v. m. h.*

*Piscatorum experientia.*

*Occulsa proprietates.*

Talibus controuersis & iactationibus percelluntur, qui nudas rerum qualitates sectantur, nihil earum formæ aut occultæ proprietati tribuentes, quæ tamen vna diuersarum, etiamque contrarium facultatem dispensant, genitrix & moderatrix. Non disputabimus hic, quod locus non sit: si tamen alterutri hærendi esset sententia, posterioriorem probabiliorem existimarem. Tutius tamen incedere eos statuimus, qui proprietati occultæ eorum tribuunt, quod ab iis pisces quasi cæstro quodam percussis interficiantur, ut ab his etiam metus sit in cibis. Quod si à colore, aut à baccis quatenus calidis: vtique idem præstabit Piper, Pyrethrum, Zingiber. Aut si à baccis qua-

tenuis amaris: idem poterunt omnia amara, valde.

## FAGARA MAIOR ET MINOR.

### CAP. CLVI.



Misit nobis <sup>1.</sup> Fagara A. uic. nomine nobiliss. D. Cortusius putamina Pisis paria, rugosa, fusca in geminas carinas ad medium vsque dehiscencia, pediculo tenui donata, immutatusc. lruin.

Sunt nobis <sup>2.</sup> etiam his similes cortices minores multo, quales Imperatus pingit pro Fagara minore: cortice quoque sunt bivalui, hiantes. foris aspero, intus pellicula candicante intersepto, sapore aromatico, subamaro, linguam calore suo vellente, non ingrato tamen, simili ferè Corticem Alantiorum.

Accipimus pro Cubebis veris Constantinopoli allatis.

Est autem reserente Clus. Fagara fructus Ciceris arietini magnitudine, cortice tenui constans, ex cinereo nigricante, cui

subest tenue putamen nucleum continens satis solidum, & tenui nigraque membrana obductum. Integer fructus cum magnitudine tum forma & colore adeo similis est ei, quem nostræ Officina Cuius in Indis de quo cap. præced. appellant vt primo aspectu fallere, & pro eo sumi possit.

Meminit huius Aui. cap. 266. in hunc modum. Fagara quid est: Granum simile Ciceri, habens granum Mahaleb, & in concauitate eius est granum nigrum, sicut Schabedene, & adportatur de Sossale.

Imperatus vtramque agnoscit speciem & maiorem diligenter ab Arabibus descriptam esse. Verum ab eam diuersam esse speciem minorem quæ deferatur etiam ex Orientalibus regionibus.


Linschott. in laua credere aut Fagaram, magnitudine Cubebe aut Piperis, Corne obiectam tenui, in quo granum vnicum cute nigra tenuissima obiectum.

Fagara



& v. Fagara Aric. granum est calidum & siccum in  
tento, mistam habens cum resolutione adstri-  
ctionem: additur in medicamentis, quibus frigida  
ventriculi & fecinoris intemperies corrigitur.  
Ventriculi fluxum, cui originem dedit frigus, con-  
stringit, concoctionem adiuvat. Linschott. testa-  
tur, maximè conducere ad pectoris frigidos mor-  
bos & imbecillitates stomachi: immò ad alui quo-  
que fluxiones. Siccare enim & calefacere in mo-  
dum cubebarum.

OREGIOELLA.  
CAP. CLVII.



**A** Liquando  
à Jacobo  
Gareto, inquit  
Clus. Exot. lib. 2.  
c. 16. accepi exoti-  
cum quid, sitne  
cortex ab aliquo  
fructu detractus,  
an aliud quid-  
piam, prorsus he-  
rebam, nec qui  
ad me mittebat,  
quidquam de ea  
rescribebat: sche-  
de duntaxat in  
quo involutus  
cum sequente fru-  
ctu, adscriptum  
erat *Oregioella*,  
nuncupari, atque  
ex ea, cui admi-  
scretur fructus

*Cacao* similis, potionem fieri incolis visitam. Erat  
verò hic cortex [si corticem appellare licet] vni-  
versalis magnitudinis, reflexis oris præditus, crassius-  
culus & satis durus, aciduli saporis & salivam  
cientis, cineraceique ex fulco coloris. *Est figura sub  
num. I.*

*Oregioella* non multum differre videtur à no-  
stro folio Indico descripto, & forsitan idem.

FRUCTVS QVADRANGVLVS NIGER,  
CVM MEMBRANA MINIATA.

CAP. CLVIII.

**O** Stendebat, inquit Clus. Exotic. lib. 2. cap. 26.  
fructum vnciam longum, quadrangulum,  
lateribus aliquantulum depressis, prorsus ni-  
grum, mediâ tamen ex parte rectum tanquam  
membranâ foris miniata, fructui firmiter inha-  
rente. Quid autem nomine appellaretur, cuiusve  
planta esset, aut qua in regione natus, intelligere  
nequiebat. *Icon huius exprimitur in tab. cap. præced.  
num. II.*

PALMA.

CAP. CLIX.

**M**agnus stipatus fructuum exoticorum ad nu-  
ces aliquo modo accedentium exhibitus. De  
Palma non inconsideratè hoc in loco agitur, cum  
nunc enim Indica postea tradenda maxima affi-  
nitas.

*Vidimus quidem Monspelii aliisque locis  
Palmam, sed in iam dicta urbe bene proce-*

*Tom. I.*

ram, etiamque florentem: verum quandoqui-  
dem, dum hæc commentamur, arborem inte-  
gram ad manum non habemus, eam quæ sup-  
petunt partium descriptionem damus. Ramus



plusquam tri-  
bitali est longi-  
tudine, minimi di-  
gitu crassitudine  
& ampli-re, præ-  
sertim circa infi-  
mum, sensu ad  
urina usque te-  
nuatus, ut mul-  
tum de crassitu-  
dine decedat, fo-  
laque frè latitu-  
do pristina sit  
notabilis, tadem  
ia folia aliquot  
arcto ortu cohe-  
rentia degene-  
ret, triangularis,  
striatus, intus  
nonnihil fungo-  
sus, & quasi ex  
longis filamen-  
tis, quotur. spa-

tia facit medulla quadrata, compactus. Huius fo-  
lia complura vtrinque adnascuntur, acundinacea,  
rigida, semunciam lata [in primis superiora], infi-  
ma enim dimidio sunt angustiora] in acutissimum  
mucronem desinunt. Adhæsus ad ramum ple-  
rumque est obliquus, ita quidem ut vel bina vel  
terna propinquo exortu circa rami infimum sint  
coniuncta, celsio inter coniugationes duorum  
triumve digitorum intervallo, at superiora agmi-  
natum pari ferè passu priusnamque exurgunt. Id  
autem quod spahi involutum fructus sustinet,  
non malè scòpis comparaueris: à manubrio si-  
quidem compresso, sequentiâ lato, sensum gra-  
cilescente, materie cum ramis persimili, in fila so-  
lubili, bacilli scoparum forma, cubitiles & am-  
phiores exeunt quàm plerumque gradum, ex inter-  
uallis modicis, ut eisdem è vimine nassarum ru-  
dimenta mentiantur: singuli autem bacilli, parte  
inferiore, quæ nuda est, quadrati, tanquam cultro  
præcisi apparent: superius paulò inæqualiter tor-  
quati & crebris tuberculis, quibus fructus adha-  
ret, asperati occipiunt.

Dactyli figura oblonga mediante calyculo ses-  
sili bacillis adhaerent, cortice externo per matu-  
ritatem fuluo, cui subest pulpa pinguis & dulcis:  
huic verò subtenditur membrana alba in tenuia  
filamenta diuidua, proximè ossiculum contigit  
eiusdem, ut videtur, portio, colore cinereo, albi-  
do aut fuluo. Ipsum ossiculum oblongum, modò  
tente, bruchi instar, modò crassum beneque ha-  
bitum, rugosum, altera parte secundum longi-  
tudinem sulco profundo exaratum, aduersa parte,  
suspensa lineola notatum, in cuius medio impres-  
sus umbilicus, cui intrinsecus respondet antrum  
exiguum, conceptaculum germinis albicantis &  
mollis. Detracta vltima membrana, substantia  
apparet rubra vvarum acinis concolor, superficia-  
lis, nisi quod ex sulco penitus se infinuat in inti-  
mam ossiculi seu nuclei substantiam albam, du-  
ram ut cornu, atque adeò verè ossæam, marioris-  
que fragmenta fractu imitatur: eiusdem duritiæ  
& colorem, cum duritia & colore cornuum mi-  
stam gerens, sapore subdulci, & haud infrenuè  
adstringente, in cuius visceribus medulla latet,  
quæ penè cartilaginis refert naturam.

Gg 2

Flores numerosi, tenuibus quibusdam villis  
appensi haerent, in magni racemi modum, facie  
crocinis similes, sed multò minores, colore  
albi.

2000.

Insa vero vagina, Elate & Spatha piforis primoribus dicta, flores & fructuum rudimenta primò claudens, mox hians, diutius reconditis ostendens, quale nos habemus, pedale quiddam est, res vnciatum, modicè compressum, sed in medio nihilominus protuberans, utroque extremo angustum, intus cauum, substantia corticea, ariditaccam diceres: hæc nouo accedente vere, [ut Marcell. ex eorum relatione qui diu in Aegypto & Syria fuerunt, testatur.] cum noui in hac orbore fructus appetunt, tunc in summo trunco Palmæ, quæ parte folia simul & fructus nascuntur, velut in frugibus spicarum vagina: & in utroque Dracunculo feminis corticem inuolucrum, tenera primò, mox lignosa materia, quæ vltimò fructus prodeunt cum latitudine aliquam locum procedit: prolatis deinde floribus, & postea flores racemosa Palmularum fructu arelit: reliquæ in arbore sequenti anno auferuntur non aliter quam putatione inutilia samenta in Vitibus nostris per te auferuntur.

Alcophra

Hanc florum & fructuum, vt ita dicamus, va-  
 ginam Theophrast. quoque expresse, inquit:  
 maximè propria & peculiaris (*ἰσχυρὰν*) cūm re-  
 spectu reliquorum seminum . tum eorum quæ ex  
 ligno consistit fructuum (*ἐκ τοῦ ξύλου*) est Pal-  
 me generatio. Non enim à vetulis, nec à noue-  
 lis [geminibus] fructificat, sed à rudimentis &:  
 Inter alios quippe ramos virga (*ἡ ῥάβδος*) & loculi re-  
 ctissè diceres, nisi Græcum prohiberet [?] quæ fru-  
 ctum gerit, quomodo modum spica, (*καθὼς ἐν σπικῇ*)  
 erumpit. Cuius rei causam arboris licet interius quis  
 dixerit, & totam ad eus formam. (*ἡ ἰσχυρὰ δὲ  
 ὡς ἐστὶν*) Cūm enim fructus egat munimento quo-  
 piam ad conseruationem, & cūm editi sunt, &  
 cūm exeunt: aliarum arborum fructibus hoc præ-  
 sidium in frondibus comparatur: in Palma verò  
 quoniam non est secundum frondem fructus, ne-  
 cessè fuit in ipso sicut <sup>causa</sup> firmari atque consistere,  
 vt non tener, sed validiusculus prodeat in aërem.  
 Accirco intus in cognato atque sibi necessario (*ἐν  
 τῇ συγγενείᾳ ἐκείνῃ*) [?] quasi gremio primò conceptus  
 atque inchoatus, postea editus est, forsasè quia  
 frugibus inspicandis in morem eius fructificatio  
 peragi debuit. Ergo si fructificatio hæc similis est  
 spicarum fortificationi: quoniam hæc spicarum e-  
 ditio communis & nullis communem quoque cū  
 illis multis Palmæ fructus causam obtinebit. Quod  
 si soli Palmæ id contingit, priuata causā exi-  
 dendam erit. Mirum tamen inter omnes arbores lo-  
 li Palmæ id euenire: nam si quid peculiare exor-  
 niat in congenerum aliquo, id vetò iure quodam  
 admirationem meretur. Quamobrem de hoc ampli-  
 us cogitandum.

Descriptio  
arboris ex  
Theophr.

Ceterum Palma, vt idem Theophrastus, fusè passim describit, ex earum arborum numero est, quæ semine exaritur: autè difficilis, perpetua fronde virens, & sola inter arbores nullis ramis constar, prævalida aliq̃ui ad sustinenda pondera, non enim flectitur deorsum, vt cætera ligna, sed ponderetinoque sursum incuruatur, materie tamen esilem, trahi faciliæ mollem, quædam. Suber, sed melior Subere, quia lenta: Suber enim fragile est: [σπασθῆναι] non rigidum, vt Gaza veritè ex sua opinione, necad mentem Theophrasti, quomobrem simulachra nunc ex Palmis faciunt, [σπασθῆναι] Suberis materie, vt incommoda. Nequos non

per totum corpus diffundit, neque prolixos extendit, neque eodem posuitur modo cunctos porrigit, sed multiformi. Siccat hæc materies potest, cum dolatur & serratur. Vira genitalem in vertice candido tahquam in capite gerit, in quo medullæ copia continetur, quod cerebrum Palmæ [*xyris* @] vocatur: hinc & folia & fructus exeunt, quod cacumen in quo aurescat, sterilesce videtur, nec non penitus interiore. Caudice seu trunco assurgit simpliciter licet alicubi etiam bifidus, & in plures partes diuisus assurgat ut dicitur postea recto, firmo cortice scabro & volutu squamis obducto, ligno nervoso, ut dictum, sine tamen medullæ discrimine. Virgæ quas emittit folijs vestitur harundinis, sed multis ex vno pediculo lignoso & crasso aculeatæque prodeuntibus in multam longitudinem, angustis, sibi inuicem cum adhuc nouella sunt coherentibus, colore subalbido, leuissimis | culcillos vocant, quos in lacris mysterijs vna cum Olea assumunt | viliâ ad nexum, & ad lenia capitis vimbracula texenda. Eadem postea explicantur duplo effectæ ac vitiore, in telæque ad latera alijs ex medio stipite lucrescentibus. Figura folij explicata, qualis hominis Palma, (hoc in Palma, humilis potius oblectatur, quæ quæ postea) sed longissimis digitis numerosisque quamquam differentia multis fortitur. Quædam enim etiam explicata nunquam tamen inuicem disunguntur, ut in modò natis aut nascentibus Palmis omnibus, & in quodam genere peculiari: quædam diuincuntur, sed aliqua tantum parte, non ex toto, ut æliuquæ palmæ manus luduntur, præter digitos, ut in humili genere appareat: quædam ex toto disunguntur vsque ad pediculum, ut in Palma, quæ dactylo fert, quæ. hæc enim desuperius & deprimuius.

Hæc in arborem prægrandem affurgitum folia ad  
longitudinem quatuor cubitorum, & cum stia  
virga incuruata veluti in orbem spargitur, (cu-  
iusmodi raram picturam exhibet) quod Palmæ ra-  
mos, &cent. Hæc pæcis vtilitatem exadhe-  
quenti relinquere standum opportunitu-  
lima: vt pulchre obtineri potest in eleganti &  
proceralla qua in domo cuiusdam Patrici Mon-  
speli vifitæ) alioquin derelinquntur, impen-  
trabili vultu fæcandibus æditum intercludunt,  
[vt in iuniora illa, qua in horto Cl.D.D.Hüthche-  
ri profefloris Regni & Cancellæ Med. Vniuerfitatis  
M. N. conſpiciuntur, æmulationem potest, & qui-  
buſſam etiam aliis locis N. bonnæ. Fructus racem-  
atim velut ex Miliu dependunt, prodeum-  
bus non ex medio cerebro, vnde novella ex p-  
foliorum germina, fed à latere. Veſtitur initio ra-  
cemus tunica conuoluta, ſimilitudinem gerens  
enſis cuiusdam lati, ſua vagina incluſi (antea ex  
eodem Theophr. denotus erat), ſpatham  
appellari.) ventre quodam medio elato, pro-  
pe cubitali longitudine tranſiunt folia. Qua ada-  
perta: & hiant, iuba illa, quæ intus latebat,  
in conſpectum ſe dat: ac in mare quendam flores  
tantum ſine fructu, candidos pinguiculo quodam  
reſertos: in ſemina autem pinguiculi ſine flore.  
Nam Palma rati-  
litatur idem Theophrasti.

Tradit præterea puluerem illum Maris fœmi-  
næ aspersum, eam fecundiorē reddere; neque  
fructificare ipsas Fœminas, nisi ipsis Mas adfuerit,  
hoc est, iuxta ipsas confusus sit.

Alpinus ait, Palmæ caudicem in rectum se at-  
tollere, viginti passuum & amplius altitudine.

Caudicus



Fruticosa,

cedentia: sterilem hunc, alibi & ipsum fertilem, breuique ramorum orbe foliosum. Tectorii vicem hic parietibus plensque in locis præstat contra aspergines. Proterioribus sylua arbore exipisa, foliorum aculeo fruticante circa totas pectinatim, quas syluestres intelligi necesse est. Incerta tamen libidine etiam mitioribus se miscent. Reliquæ teretes atque proceræ, densis gradatisque cornicum pollicibus, ut pribus, faciles se ad scandendum Orientis populis præbent, vitem sibi arborisque induuis [arborémque indulus. CH.] circulum mira pernicitate tum homine subeunte. Coma omnis in cacumine: & pomum est, non inter folia, ut in cæteris, sed suis [suos al.] inter ramos palmitibus racemosum, vtraque natura vix atque pomi. Folia cultrato mucrone, lateribus in se bifidatis, bellas primùm demonstrare gemmas: [leg. bullas cum primùm demonstrare gemmas Dal. Alii, nouellas demonstrare gemmas: quæ lectio ex Theophrast. probatur.] nunc ad funes vitilumque nexus & capitulum leuia vmbacula finduntur. Arboribus, imò potiùs omnibus quæ terra gignit, herbiq; etiam, vtrumque sexum esse diligentissimi natura tradunt. Quod in plenum satis sit dixisse hoc in loco. Nullis tamen arboribus manifestis. Mis in Palmite floret, femina citra florem germinat tantum spinæ (spicæ: vet.) modo. Viri quoque autem prima nascitur pomi Caro: postea lignum intus, hoc est, semen eius. [Nota Plinio tam matrem, quam feminam frugiferam, contra Theophrastum. Vocat autem lignum, quod abbi Græcos imitatus osseum dixit.] Argumentum, quod parua sine hoc reperiuntur in eodem Palmite. Est autem oblongum, non, ut Oliui, orbiculatum. Præterea castrum, a deriso puluinata fissura, & in aluo media plerisque vmbilicatum, vnde primùm spargitur radix. Multis candidisque lignum hoc à carnibus discernitur tunicis, aliis corpori adherentibus: laxèque distans, tantum cacumini filo adheret. Caro maturefcit anno. Quibusdam tamen in locis, ut in Cypro, quanquam ad maturitatem non perueniat, grato sapore dulcis est: & folium ibi latius, fructusque reliquis rotundior: [forte iniucundior] nec ut deuoretur corpus, verum ut expuatur, succo modò expresso. (Hæc à Theophrast. de duobus generibus dicta, malè in vnum confunduntur.) Et in Arabia languidè dulces traduntur esse Palmæ: quanquam Iuba apud Scenitas Arabas præfert omnibus saporibus, quam vocant Dabulan. [Dablan M. & CH.] Cæterum non sine maribus gignere feminas spontè edito nemore confirmant: circàque singulos plures nutare in eum pronas blandioribus comis. [Idem prolixius Florentinus in Georgicis.] Illum erectis hispidum, afflatu visûque ipso, & puluere etiam reliquas maritare, [illis maritari. D.] Huius arbore excisa vidua pòst sterilefcere feminas. Adeoque est veneris intellectus, ut coitus etiam excoigitatus sit ab homine, ex maribus flore aclinugine, interim verò tantum puluere inspecto feminis. Idem & Theophrast. scribit, & modum specialius docet, quem infra trademus in Cultura eius.

Porro quod Plin. ait, non sine maribus gignere feminas, id præter Theophrast. etiam aliterstantur. Guiland. in Aegypto & Orient. obseruauit. Item Pontanus, ut dicitur postea.

Pergit Plinius. Quædam in Syria & Aegypto in binas diuidunt se truncos: in Creta & in ternos: quædam & in quinos. In Cypro verò, Syria, Aegypto, quadrimæ aliæ, aliæ quinquennes, aliæque

dine hominis, nullo intus Pomi ligno, quamdiu sunt nouellæ, ob id spadonum accepto nomine. Genera eorum multa. Sterilibus ad materias, oportumque lautiora vitur Ailyria, & tota Perlis. Sunt & cædæ Palmarum quoque syluæ, germinantes rursus ac radice succisæ. Dulcis medulla earum in cacumine, quodd cerebrum appellant, exemptique viuunt, quod non aliæ. Vocantur autem Chameropus. Fructiferarum aliis breu us lignum in pomo, aliis longias: his mollius, illis durius: quibusdam osseum lunatumque, [limatumque CH.] dente contrà fascinantem religione positum. Aliud pluribus vestitum paucioribusq; tunicis, aliud crassioribus tenuioribusq; tunicis. Ita sunt vnde quinquaginta genera, si quis omnium persequi velit nomina, etiam barbarâ, vinorumque ex his differentias. Clarissimæ omnium, quas Regias appellauere ab honore, quoniam regibus tantum Persidis seruabatur, Babylone natæ vno in hortu agunt. Ita enim vocant spadones: qui apud eos etiam regnauerunt. Hortus ille nunquam nisi dominantis in aula fuit. At in meridiano orbe præcipuam obtinent nobilitatem Syagri, proximamq; Magides. (Magarilides alii. Ex breues, candidæ, rotundæ acinis, quam balanis similiores. Quare & nomen à magaritis accepere. Vna earum arbor in Chora esse traditur, vna & Syagrorum. Mirumque de ea accepimus, cum phœnice autemque putatur ex huius Palmæ argumento nomen accepisse, emori ac renasci ex seipsa: etiamque cum hæc proderem fertilis. Ipsum pomum grande, durum, horridum, & à cæteris generibus distans sapore ferino, quem fermè in apris nouimus: euidētissimèque inde causa nominis. Quarta autoritas Sandalidum, à similitudine appellatarum. Iam in Aethiopia sine quinque earum nec plures arbores tradunt, non raritate magis quam suauitate mirabiles. Ab his Caryotæ maximè celebrantur, & cibo quidem, sed & succo vberissime. Ex quibus præcipua vina Orienti, (E Chydæis maturis fieri scribitidem Plin. alibi ut & Dioscor.) iniqua capiti, vnde Pomo nomen (nempe ante 7. v. d. 9.) Sed ut copia sibi atque fertilitas, ita nobilitas in Iudæa, nec in tota, sed Hierichunte maximè. Quanquam laudatæ Archelaidæ, & Phasclidæ atque Lusiadæ, gentis eiusdem conualibus. Dos his præcipua succo pingui lactentibus, quodamque vini sapore, ut in melle prædulci. Sciciores in hoc genere Nicolai, sed amplitudinis præcipuæ, quaterni cubitorum longitudinem efficiunt. Minus speciosæ, sed sapore Caryotarum sorores dictæ, proximam suauitatem habent, non tamen eandem. Tertium ex his genus Pateton, [Patete CH. alibi ait fieri & è Palmis, quo Partbi & Indi vtuntur, & Oriens totas, maturarum quas vocant Chydæas modio in aquæ congiis tribus macerato expressoque] nimio liquore abundat: rûpitque se pomi ipsius, etiam in sua matre, ebrietas, caleatis similis. Suum genus è sicciore turba dactylis, prælonga gracilitate curuatis interim. Nam quos ex his honori Deorum dicamus, Chydæos (viles, exigui pretii D.) appellauit Iudæa, Gens contumeliâ Numinum insignis. In totum arentes Thebaidæ [sic dictæ à Thebis Aegypti. Papinio in sylu. Thebaidæ. Charta, Thebaidæ, Caricæ. Rhod. Atque Arabicæ, macroque corpore exiles, & affluuo vapore torrentes, crustam uetius, quam cutem obducunt. In ipsa quidem Aethiopia fiatur, [tanta est siccitas] & farinæ modo spissatur in panem. Gignitur autem in frutice ramis cubitalibus, folio latiore, pomo rotundo, sed maiore, quam Mali, amplitudine, triennio maturefcunt

Feminam  
non fructi-  
ficare sine  
maribus.



turefcunt: femperque fructi pomum est, fubna-  
fcente alio. Thebaidis fructus extemph in cados  
conditur, cum fui ardoris anima: ni ita fiat cele-  
riter expirat: ita fit vt celeriter expiret cū. mar-  
cefcitque non retostus furnis. Ex reliquo genere  
Plebeia videntur. Syri & Iuba tragemata appel-  
lant. Nam in aliqua parte Phœnicis, Ciliciæque,  
popolari etiam nomine à nobis appellantur Ba-  
lani. Eorum quoque plura genera. Differunt fi-  
gura rotunditatis aut proceritatis. Differunt &  
colore, nigriores, ac rubentes. Nec pauciores Fici  
[quàm Fico Theoph.] traduntur colores. Maxi-  
mè tamen placent candidi. Distant & magnitudi-  
ne. Quidam sunt non ampliores Faba [Cicere  
Theoph.] Seruantur hi demùm, qui nascuntur in  
salis atque fabulosis, vt in Iudæa, & Cyrenaica  
Africa. Non item in Aegypto, Cypro, Syria, & Se-  
leucia Affiriz. Quamobrem fues & reliqua ani-  
malia ex his saginantur. Vitati aut vetuli pomi  
signum est, decidisse candidam verrucam quæ ra-  
cemo adhæserit. Est & Palma in Aegypto, quæ vo-  
catur Adiplos, viridis, odore Mali cotonei, nullo  
intus ligno. Colligitur autem paulò antè quàm  
incipiat maturefcere. Quod relinquitur [Quod  
fi relinquitur. m. & c.] Phœnicobalanus voca-  
tur, & nigrescit, vefcenteque inebriat. Ceterùm  
Palmula, Aegyptia quæ Plinio hoc loco dicitur  
dicta, medio suæ maturitatis tempore potius, quàm  
potius seu potio vocatur Dioscoridi. Adiplos di-  
cta, quoniam humore multo plena non aliter si-  
tim minuit, quàm si bibatur aqua, nec caput ten-  
tat, ac maturitate percocta, à puniceo, siue Phœ-  
niceo colore Phœnicobalanus dicitur: ac sic caput  
grauat, vt, quod ait Solinus, sensus intercipiatur,  
gressus præpediatur, in qua retardetur, oblescitque  
mentis & corporis officinis, imitetur vitium ebrie-  
tatis.

Quod verò Plin. de Palma adipso tradit, id Dio-  
scor. de Palmulis refert, verùm non ait, os siue li-  
gum intus nullum esse. At Theoph. quoque speciem  
agnoscit, quæ nullum intus habeat os, & ap-  
peltur dicta eidem & Aetio, qui id fieri scribit &  
natura & arte, sed quænam ea sitas, non expli-  
cat.

Plin. quoque alibi ait Palmam quæ fert Myro-  
balanum, probatissimam in Aegypto, ossa non  
habere reliquarum modo in balanis, quod Dalec.  
ita exponit. Colligi virides & immaturas balanos,  
pomo carne sua tantùm obfecto, nondum geni-  
to intus nucleo: ex lib. 12. cap. 22. vt ipsemet citat.  
Ait sanè Plinii verba aliter sonant. Ait enim, nul-  
lo intus ligno, & colligi paulò antè quàm inci-  
pian maturefcere: quanquam lib. 13. cap. 4. dicat  
Palmæ mari & fœminæ nasci Pomi carnem: po-  
stea lignum intus, hoc est, semen eius: Ex quibus  
tamen verbis nunquam extorquebit Dalec. quod  
intendit. Reprehendit verò Plinium, eum malè  
lignum vocare iniquens, cùm sit officulum, quasi  
ipse velit docere Plinium, putissimum Scriptorem,  
Latine loqui. Certum quidem à Græcis, vt Theo-  
phrast. & aliis os vocari, vt & suprà monuimus:  
quanquam si rem ipsam inspiciamus, æquè ad li-  
gneam naturam, & forè etiam magis, quàm ad  
osseam accedere videbuntur.

Porrò ipse quoque Plin. apertis verbis lib. 15. c.  
23. scribit, cuidam Palmarum generi nec intus,  
nec extra esse lignum. Item carne Palmas place-  
re, cruita Thebaicas, succo Caryotas.

Diosc. author est Palmam in Aegypto gigni. Ex  
cavèrò fructum in medio Autumni vigore colligi,  
gi, Arabicæ Myrobalaño similem, quæ Poma  
[poma] dicatur, colore viridi, Mali cotonei odo-

rem referent. Quod si dimittatur, vt maturefca-  
t Phœnicobalanum fieri. Idem & καρυσθίου memi-  
nit, & θηβαϊκόν, & nucleos Aegyptiarum, atque ex  
humilibus Palmis [ἐκ τῶν χαυροθίων ἢ ἀν' αἰνικαί] cate-  
ris in vsu medico præfert. Item, ποινῆς, inquit, id est  
Palma, quam nonnulli ἐλάτῳ aut σπάθῳ [Elaten  
aut spatham] appellant, inuolucrum est Palma-  
rum [ποινῆς] adhuc florentium. Optima habetur  
odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, inter-  
na parte pinguis. Sed & fructus qui sub ea conti-  
netur Elate appellatur, à nonnullis Borallius,  
[ἐλάτῳ] Et medulla caudicis, ἐλατός δὲν τὸ πρῶτον  
vocat. Idem & alibi Palma Chydneæ siue Sula-  
neæ meminit. Diligentibus verò considerandum  
relinquimus, an Palmæ Spatha sit odorata, vt ait  
Diosc.

Palmulas porrò Thebaicas, sunt qui putarint  
Officinarum esse Tamarindos, quos ab acido sa-  
pore nonnulli ζυσοεινικὸς vocant, verùm omnino  
differunt à Palmis & Dactylis, Thebaicæ autem  
cuera genuinis Palmarum generibus accensent-  
ur videntur: nam, vel Strabone teste, omnium  
sentitur optimæ ac suauissimæ, & inter eas ma-  
ximè quæ Caryotæ dicuntur, vt prius dictum, cui-  
tiam consensit Plin.

Præterea Palmæ fructus Pomis accensentur, Tamarin-  
quod de Tamarindis nemo naturæ stirpium gna-  
dos non ef-  
rus facit dixerit, cuius fructus potius inter fili-  
quas referendus. Doctissimus Siracenus in no-  
tis suis ad Diosc. pro πῶμα, πῶμα legendum suspica-  
tur, seruata Analogia, ἀπὸ τῆς πῶμας: quamvis et-  
iam πῶμα pro poculo aut potione interdum, sed  
rarius vsurpetur. Quod si πῶμα, quasi Pomum  
Latinorum, dictum quis velit qualemcumque  
seu Palmæ fructum, quodd, vt dictum, sit de  
censu Pomorum generaliter dictorum possit.

Ceterùm πειραλλόμενα istud, quod ἐλάτῳ seu vericalli-  
σπάθῳ appellat Diosc. nominat Paulus καὶ πειρα-  
σπῶν, ἐκ τῶν κατὰ τὸν καρπὸν ἐκφυγόντων, hoc est, operimen-  
tu a fructum enascentem ambiens. Galenus verò  
τὸ δὲν ἀμφιέσσειν ποινῆς, quo loco ἀπὸ τῆς depra-  
uatè legitur. Archigenes apud Gal. καὶ τὸ πῶμα, ean-  
dem πειραλλόμενα appellat, quam quidem vocem ob-  
seruius exponit Helychius, τὸ ἐπ' αὐτῇ τῷ κατὰ  
ἐλατῶντος φυγόντων, quod in summa Palma cortico-  
sum enascitur.

Apud Diosc. ἐλάτῳ nomine, non tantùm eius. Elate huius  
modi tegumentum, Palma corticem Plin. & Co-  
lumellæ dictum, significari, sed fructum quoque  
ipsum eo cortice inclusum, ex ipsismet Diosc. ver-  
bis liquet.

Alia ab his diuersa significatione ἐλάτῳ vocem  
vsurpauit Gal. loco citato, dum τὸ ἀπαλὸν ἐκβαλόμενα  
τὸ ποινῆς, Palma tenellum germen esse voluit.  
Cum eo sensu idem Helychius, ἐλάτῳ, explicans,  
ἐλάτῳ τῷ πρῶτῳ ἐκφυγόντων. Placuit hæc obiter ex  
Cornar. & aliorum Obseruat. annotare, vt intelli-  
gant studiosi ἐλάτῳ Galeni à Diosc. Elate diuer-  
sam esse.

Et quoniam in vocum explicationem incidi-  
mus, placet & hæc adicere. Palma vitalem vim  
non in radicibus desofam, vt cæteræ stirpes ha-  
bet, sed in summo trunci vertice, [vt ex præce-  
dentibus liquet] quasi cor, sitam in ramorum  
medio, à quibus circumquaque stipatur ceu prin-  
ceps à suis satellitibus. Eam partem ἐκκαρδὸν πρῶ-  
τον vocat Diosc. caudicis quasi corculum seu me-  
dullam, quam σπαστήρα, Theophr. καρδὴν, μέτρηαν, Cor;  
seu μυελὸν appellare consuevit. Idem speciatim et-  
iam lib. 2. hist. c. 8. Strabo lib. 15. Plutarch. in lib. de  
tu. san. Philostratus lib. 2. de vita Apollonii ἐκκαρ-  
δῶν.





ma placita deinceps inaudiamus, inter quos fere primus Hermol. paucos Palmæ ramos tribuit [loquitur autem de Palma vulgarissima, quæ dactylos fert, quamque depictam dedimus] improprimè nimirum virgas ramos appellans, quæ tamen plurimæ sunt. Aut si alicubi in ramos brachiatam vidit, cur locum non declarat? Bifidas, trifidas, immò etiam quinquepedes supra diximus ex Theoph. Medullam omnem Palmæ denegat idem Hermol. qua Myrobalanum cognominatam toto genere distinctam ait. Palmulas è mari Plenes, è femina Balanos appellatæ, ex Iulio Polluce traditæ, qui sumpsit ab Herodoto. Phoenix non modò Palmam, sed & herbam denorat, de qua inter herbas. Item musicum instrumentum ab inuentore ita dictum, siue vt aliis placet, quia primùm ex Deliana palma, cubiti eius facti fuerunt. Ipsos Palmarum cum fructu termites, *Bala & Spadices* Græci præsertim Dorici appellant, à quo & color equino generi spadix aut spadiceus & phoenix, hoc est, Palmeus: vnde vulgò quoque *bainu*: alioqui phoenix propriè est, qui vermiculus & punicus vocatur ab Eusebio siue Hieronymo in Chronici, nomen habens à Phœnice illo qui literas inuenierit. Caryotatum siue Caryotarum Hermol. tria genera tradit: Nicolai scilicet, amplitudinis vasis, vt quæ cubitorum quaternis longitudinem compleant: de quibus paulo ante ex Athenæo. Alterum genus minus speciosum, sed sapore Caryotarum proximo fortes, vnde nomen. Tertium genus nimio liquore madidum, rupe se pino in parente ipsa quoque calcato fundit: ob id Pateton appellatum. *Chamaelon* idem apud Diosc. Pumlani interpretatur, & à *Chamaeris* Theophrastus appellat, hoc est, abiecta & repente humi Palmam distinguunt.

Porrò quod in Ægypto natas Palmulas Arabicis Myrobalanis comparat Dioscorid. figura aut quantitate similitudinem hæc intelligendam censet Marcellus: nam [inquit] quod ad odorem & vsum pertinet, nulla erat similitudo: odoratus enim Arabicus Myrobalanus, & vnguentis quondam tantum natus, vt cuncta alia quæ in felici & odorum feraci Arabia nascebantur, & vt videre licet, adhuc nascentur: Ægyptiæ verò, omnique aliz Palmule in cibus & in Medicina quotidianum habent vsum, inclinatur animus tamen, facileque persuasum deor congenere plantas & fructus esse, diuersique regionibus natos, diuersa bonitate diuersos habuisse vsum: & quoniam in Arabia nati ob odoris bonitatem ad vnguenta exprimerentur Myrobalani facti ex vnguento & glande nomine appellati fuisse: cæteras verò omnes ex aliis nouis laudes & nomina inuenisse. Indicatur quæ Plin. qui in lib. xii. antequam ab odoratis in Arabia discederet, post Casiam, Cinnamonum aliaque multa, de Myrobalano egit, statimque illi coniunxit, quod ad Ægyptias palmulas & Phœnicobalanos pertineret: quasi naturalium non generis inter Myrobalanos & Ægyptias palmulas discrimen sit.

Cordus Hermolam reprehendit & magni erroris insinuat, quod Nicolaos palmulas scribit quaternum cubitorum habere longitudinem, eam Plinius dicat, earum quaternas cubiti longitudinem habere. Auxit itaque Barbarus decies & sexies eorum mensuram. Cordus ipse multa ponere videtur in sua Palmæ descriptione, quæ pertinent ad Palmam, siue nucem Indicam. Neque intelligimus descriptionem Elates eiusdem: nam nec squammatum compactam, nec pinguem, nec odoratam obseruauimus.

Tragus ad Palmæ suam historiam, falsam apponit figuram, nam Dactylos ex humilitate ramos pendentes ostendit, non ex Spatha: quem errorem & Gualth. Ryff. secutus est. Nec placet apud eundem & Lonicerum Tamarindos iungi, quasi eius quoque sint fructus: Sed decepti sunt: quod v. Tamarindi etiam Dactyli dicuntur à Me-sue, & Iacobo Manlio placet.

Fallitur & Lonic. in eo quod ait *Phœnicobalanus* Lonic. not. seu Palmæ glandem etiam *Phœnicobalanus*, id est, cerebrum appellari à Galeno. Nam & Galeno imponit, & vel ex ipso Dioscor. discere potuit aliud esse *Phœnicobalanus* Diosc. & *Phœnicobalanus* Gal. vt ex præcedentibus liquet.

Duas figuras habet Lonic. sed vtramque falsam. Idem parum scitè Spatham in Palma, nil aliud esse censet quam folia.

Plinius taxat Cor. eum [inquiens] non agnouisse Myrobalanum, [siue vnguentariam balanum] & cum immaturo Palmæ fructu confudisse. Non enim ille Palmæ fructus Myrobalano similis in vnguentis vsum habet, sed similis est, vt Diosc. ait, magnitudine. Grauius deliquit, vt ait, Palma fert Myrobalanon: non enim Palma fert Myrobalanum, sed alia abort. Quare Phœnicobalanum legendum esse videtur, si non rursus confusionem illi imputare velimus, etiam si Phœnicobalanus maturus sitem Palmæ fructus vocetur, & ipse hoc de immaturo loquitur.

Sunt qui priusquam quoddam Palmæ genus Adipson vocatum a Plin. Myrobalanum appellatam esse volunt: hi palmam relargiuntur à Diosc. qui eidem Palmæ, & Pomam maturam, & Phœnicobalanum maturum fructum attulerunt. & ab ipso etiam Plin. qui quod de Adipso relinquitur, Phœnicobalanum vocari dixit.

Deceptus & in eo Plin. quod peculiarem arborem Palmam Elaten siue Spatham prodidit, ipsamque medicinæ germina, folia, corticem conferre dixit: quum tamen omnem medicinam ab ipso traditam, vna pars quæ fructus tegumentum & inuolucrum est, præter: deinde etiam ipse fructus, borassus appellatus, idem efficiat. Sed hæc lib. 23. c. 5. tradit, vt qui de ipsa arbore antea lib. 12. sine, longè maiore errore dixisset. Est præterea arbor ad eadem vaguenta pertinens, quam alii Elatem vocant, quod nos Abietem, alii Palmam, alii Spatham. Videtur enim vel Palmam cum Abiete confundere, vel sanè insinuare velle Abietem quoque ad eadem vnguenta pertinere.

Perendi non sunt, qui Elaten, [vt de Abiete nihil dicamus, quæ nihil commune habet cum Palma, seu Palmæ cortice Elate, aut Spatha dicta.] Palmam & Spatham inter se confundunt, quæ à se inuicem manifestè distinguuntur in præcedentibus.

Bellon. Palmarum abortiuarum meminit, de palma abortiuis postea c. de Palma humili.

Curtius Palmam Adipson separat à cæteris, atque ab ipsa ad eam genuina Palma contra Dioscor. mentem. Adipso relinquenda sub genere veterum Palmarum: ex ea enim Phœnicobalanos. Quis autem scripsit [quod idem ait] Adipson folio Myrti? Videtur Curtius sibi confinxisse descriptionem Palmæ, quæ non est in rerum naturæ, confusus diuersarum plantarum notis.

Matthiol. i. in diuersis suæ histor. editionibus diuersas Palmæ figuras effinxit. Nam in prima editione Dactylos appingebat foliis. In secunda mutauit, sed non in melius, omisitque Spatham: tandem in postremis editionibus melius ex Spathis emergentes fructus exprimit. Atqui præsti-

Tragus not.

Ryff. not.

Lonic. not.

Plin. not.

Alicui Plin.

error.

Adipson ni

palmam

via Palmæ

species.

Alicui Plin.

error.

Elate Sp.

the.

Borassus.

Plin. not.

Bellon. ab.

ortina Bel.

lon.

Curt not.

Adipso.

Folia Myr.

12.

isset velin prioribus etiam editionibus quorundam imitatione omittere fructum, quam non visum falsò & ex suo cerebello appingere. Non enim Dactyli adherere foliis, id quod tantus Botanicus poterat discere ex Dioscor. qui *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* vocat *σπυγδαία* & *καρπὸς αὐτῆς* *σπυγδαίου* adhibetur, prout & nos obseruauimus in trunci vertice, ex quo exit inuolutum magnum & speciosum, in quo continentur multi veluti ramuli satis longi, qui sunt instar virgarum crisparum, quibus adherent Dactyli alternatim positi.

Annotat Theuetus in eodem ramo reperiri quasdam Palmulas paruas sine ossibus.

Mirum quod scribit Lacuna Elatem esse qui existiment esse Cocum Indicum: alios qui Matim, utrinque tamen falluntur, imò nihil ferè commune aut simile inter se habent, uti constat omnia ista noscentibus, ut visus declarabitur suis locis.

Ipse verò Lacuna quoque cum Amato hallucinatur, existimante utroque, Tamarindos esse Palmulas Thebaicas: hoc etiam amplius sibi persuadente Nucem Indicam esse Elatem.

Sed à priorè opinione non profusus alienus fuisse videtur doctiss. Scaliger. qui in notis suis ad Theophrast. ita scribit: Palmulæ quæ ex Alexandria ad nos afferuntur permultos durant annos: quas, si dicas, ab Indis conchui; quæram quæ ratione peculiari vocant aliud certum genus medicatum, Tamarindos. Tamar enim Palmulam significat. At Curtius Tamar Barbaris Dactylum esse ait.

Dod. scribit Palmam proceram admodum esse arborem: sed an talem viderit non annotat. Caryotæ sunt ei dulciores Palmulæ.

Guiland. apud Plin. lib. 3. cap. vii. ex Vatrone memorat in Palmæ foliis scriptitatum, Maluæ foliis reponendum censet. Ast sanè nobis Maluæ folia parum videntur apta scriptioni, ut taceamus ipsummet Plin. pro Papyro annotasse de quo postea, & capite de Indica Palma vulgò Nux Indica dicta.

Cæsalpinus nobis minimè probatur, qui putat Myrobalanos vulgò dictas esse ex genere Palmarum, sicque dici quasi Myrobalanos, ut aliquando Plin. vocat, quos fert Palma probatissima in Aegypto, quæ ossa non habet in balanis &c: Sed deceptus fuit Cæsalp. hac Plinii lectione, quam vel corruptam esse oportet, ut fortè legendum sit, Phœnicobalanos: vel sanè æquiuocè ibi accipit Plinio vocem Myrobalani: nam ex Myrobalanorum historia facillè Lectori constabit, non esse de genere Palmarum, nisi quis plurimum differet plantis sub vnum genus cogere velit. Sed addit Cæsalpin. Quid si Emblicos Phœnicobalanos dicamus? qui os intus habent, ad Thebaeos & Arabicos Myrobalanos reducamus? Hæc ille. Verùm qui diligenter cõsiderabit ea quæ de Myrobalanis suo loco tradidimus, is facillè à Phœnicobalanis & cæteris discernet.

Audiendus quoque Cardanus de rerum varietate lib. 6. cap. 20. Palmarum tot sunt genera, inquit, ut non vna arbor censeatur, sed quædam ligno maxime probantur: nam hastis confidendis adeò sunt idoneæ, ut absque ferro feriant acriter, nec tamen frangantur aut flectantur, quæ verò nigra sunt, pulchritudine præstant: porò coloris causa est exustio, duritiæ soliditas ex humido tenui, bene concocto: quid enim prohibet, cum ferrum quod ducitur & liquefcit, tam vehementer feriat diuidatque, quin & ligna idem non possint? Sed & ossa & lapides huic vsui apta sunt,

verùm ferrum, non duritiæ, sed tenacitate præstat.

Ceterùm ut Palmæ nomina & Synonyma in vnum quasi fasciculum collecta demus, quædam Græci arborem & fructum simul dixerunt, à colore positi fasço utrique nomine: *καρπὸς* enim & *σπυγδαία* puniceo colore rubere est, quo maturi in hac arbore fructus videntur. Homerus sanè ob arboris huius pulchritudinem Phœniciæ puellæ venustatem Palmæ ramo assimilauit. Latini arborem *Palmam*, fructum verò *Palmulam* dixerunt: indicatque id in Claudio Suetonio, quem in conuiuio & inter epulas obdormiscientem Oliuarum ac Palmularum ossibus ab alio in cœssi solitum Scriptor ille ait. Nostra etas vna appellatione *Dactylos* omnes hos fructus dicit, cum tamen propriū genus & nomen Dactyli quondam haberent, qui in Palmularum censu præloga gracilitate curuati, humanis digitis, quos Græci *δακτύλοι* dicunt, similes sunt, ut annotat Marcellus Virgilius.

Maro arduam *Palmam* dixit, estque præ aliis arboribus nobilissimis ac variis epithetis ornata ab autoribus classicis: *Olympiaca*, *victrix*, *monobilis*, *Elaa*, *amara*, *egregia*, *sterida*, *triumphalis*, *Idumæa*, *Aegyptia*, *tremula*, *victrix* praminum, *frondosa*, *umbrosa* &c.

Quid enim *ἡ δὲ τῆς ὀστέας*, id est, Palma Elate sit, antè dictum: verumtamen antiquiores Græci, ut Pollux etià testatur, totas sepe & arbores & earum ramulos iisdem appellationibus indicauerunt: *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* & *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* *καρπὸς* *καρπὸς*, inquit ille: id est, Palmæ quoque ramulus æquiuocè Palma appellatur: quum rationem secutus Dioscor. Elatem siue Spatham, Palmæ partem, Palmam dixit: & ne legentes totius arboris appellatio falleret, adiecit, quom Spatham siue Elatem aliqui vocant. Vnde Spathalion ramus, cui Dactyli dependent.

Dicta autem videtur *ἡ δὲ τῆς ὀστέας*, quòd in longitudinem simul & latitudinem procedat: docentque veteres Græcorum Grammatici tria Elatem significare: nouissimam primò omnium arborem Abietem. Tum extremam & latiore rem in nauigio partem: qua fortè significatione non à palmarum, sed à Palmæ abotis parte hac Latini in ramo palmulam, & Maro in spectaculis ab Aenea in Sicilia editis.

Et *λεῖος* *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* *καρπὸς* *καρπὸς* sine Palmula cantes, dixerunt: denique noui & iam iam nascentis in Palma fructus inuolutum, simili tum forma tum figura, ob quam & *καρπὸς* dicta, quæ voce ea Gens gladium vocat: & eundem qui bullantes in coquendo fetiores despumantur & in homine latrone, ut ait Pollux. Sc Colum lib. 12. cap. 22. spatia lignæ permiscendam præcipit fluxuam cum piceliquida ad condiendum mustum, nouissimum in coquina instrumentum ea voce significans dictum despumationi. Ab horum omnium similitudine nouam Palmæ germinationem Græci *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* appellauerunt. Aduert. ab harundinacea cultura Xyphii fiende Spathas dictas autem.

De Corde seu Cerebro Palmæ antea dictum. Dioscor. ait clausum in Spatha Palmæ fructum Borallum dici. *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* legitur in vulgatis: aliis *ἡ δὲ τῆς ὀστέας*, aliis *ἡ δὲ τῆς ὀστέας* magis placet, quas tamen voces apud nullum alium Scriptorem præter Diosc. inuenimus, videturque à Barbaris promanasse. Palmæ folia etiam Thali Polluci dicuntur, & ramus, seu avulsus à Palma termes, *καρπὸς*. Alioqui *βαλῖς* & *βαλλία* apud autores propnè Oleæ est termes siue frons, cauliculus & surculus. Sunt qui Palmulas scq. Dactylos hæc significatione Caryo-

Palmula  
parua sine  
ossibus.  
Quorundam  
error. Cacus.  
Macm.

Lacuna  
Amato. not.

Tamar

Guiland.  
et.

Myrobalanus  
vulgus.  
Cæsalp. not.

Emblis.  
Alter Cæsalp.  
error.

Palmarum  
genera.

Nigra



*...latente palma*

*latente palma*

vi. *Pregnantes Carytides*

*Muriialis.*

Et notat

45. *Nannulli fasciata* Balgarn.

Nonnulli perianthium palmorum genus duplex ad-  
distingunt. Nam Pollucis mascula fructus *Spid* dici-  
tur, alii *Spid* ferunt: semella *Spid* *Spid*, & *Spa-  
tha*, unde *Spid* dependet. Dorici *Spadica* quo-  
que anullum cum fructibus termitum vocant.  
*Palma* fructus Franci *Palme* & *Ficus* regis dicunt.  
Hebraei autem Trag. *Thamer*, *Thamer*, & *Thimo-  
th*, vt Cant. 1. 7. Ioc. 1. Iud. can. 4. Ezech. 41.  
1. cod. 15. Et *Hathimoria* 1. Reg. 4. Apud Davidem  
in *Palanis*: *iusus* *us* *Palma* florebit. Arab. *Machla*  
aut *Nachal*, & *Tamar*, fructus. Gall. *Dattier*, arbre  
de dattes, palmier, dattes, & *figue royale*. Ital. *Palma*,  
*Dattoli*. Callii. & Catal. *Palma* *palmera*. Portug.  
*palmeira*: & eisdem *Dactyli* ob commercium cum  
Africanis *Tamaras*, test. Lacuna. Germ. *Dattel-  
baum*, *Datteln*. Belg. *Dagbrom*, *Dagbrom*.  
Vng. *Palma* fa. *Bohem*, *Palma* & fructus *Dacty-  
li*. Angl. *Datties* tre/ *Dattier* tre. *Palum* Aegy-  
ptii vocant *Dattel*, & rannum cui appensi sunt  
*Dactyli* *Palma* *Palma*. *Dactylorum* inuolutum  
*Dore*: *Dactylum* recentere, enixum profus immatu-  
rum *Talla*, & grandiorum fructum *Nin*, & *Ra-  
mies* pelt. *Tallam* siue pene maturum, & matu-  
rum siue *Tallam*: *Secos* maturos *Tallam*, & qui ferè  
purius, siue *Secos* *Tallam* *Tallam* *Tallam*.

Porro vade loco tandem differamus, Palma inquit Theophr. caloris est avida: quapropter in Aegyptio nascitur, vbi largè suauiterque fructum progenerat, atque etiam magis circa Babylonem ac Syriam fructu præcellit, cœliumque frigidum ferre nequit. Apud Babylonem fructum mirum in modum largitur. In Grecia verò ne fructum quidem maturat, apudque nonnullos nec fructum vllum offendit. Palmas quoque nonnullæ partes Indis pleraque habent. Amat loca salis, argumento quoddã vbi Palmarum copia est, solum tale spectatur, vt in Africa, Syriâ aliisque eiusmodi tractibus. Quo fit, vt vbi salugo non sit, ope proxima salis lubueniant. Esi enim Palma ærem circumfusum calum delideret, vt fructus maturefceret posse, tamen radicibus refrigerari ob licentiam desiderat: quod efficit sal. Quam obrem apud Babylonis salis vsus, non ferocior est. Quam verò quod saluum solum tantopere Palma prodest, nature eius propietati imputari par est. Materies enim radicetis huius arboris plurimum à cæteris distat: quapropter facile adiuuare alimentum vberius trahunt, quo & sibi satisfacere, & arborem totam augere faciliè possint. Cûque Palmis acerbis in sit, eandem proptinus salis vis à primis initis tollit. Parte Africa, qua nûquam pluit, Palmas magnas & optimas provenire tradunt. Cæterum vbi Palma salisignem, & rigum esse locum, necadmodum in profundo aquam competiri, & dulcem ibi salamque inuenire propinquas. At vbi reliqua oriuntur, solum secum, & omni aqua orbatum esse. Ita & aquas Palmis subditas esse ad Ammonis delubrum serant. Palma fructifera sterilis sit in Grecia. *Hæc Theophr.*

Quin & Varro : non scitis, inquit, Caryotas in Syria parere, inuectas in Italiam non posse. Refert Strabo. Posidio Arabici sinus ora, continuum esse Palmerum quoddam aquis abundans, & in magno honore haberi. Propterea quòd tota circumstantis regio æstuosa sit, & arida, & ymbrarum

expers. Hæc maximam Palmarum copiam esse.  
 Loco vir & uxor præfunt per genus constituti,  
 pelliti ambo, victum ex Palmis ducentes, dormiunt in tuguriis factis super arboribus, propter  
 ferarum multitudinem.

In Aethiopia Aegypto contermina, auctore Plin. Palmæ, quales retulimus, (supra inter differentes) Gignuntur longe fabulosaque terra, maiore in parte & nitrofa. Gaudent & annis, totoque anno, bibere cūm ament, non utunt. A fimo quidem etiam laci putant: & Assyriorum pars aethiops, si non fims miferatur, (si non aquis miferatur fims Theoph.) Diximus falsum ab his folum diligi. Ergo ubi non est tale, falsum aspergunt, non radicibus, sed longius paulo. Est & Judææ Hiericuntæ Palmætis consita, & gens Effenorum socia Palmarum. Infra hos Engadda oppidum fuit, secundum ab Hierosolymis fertilitate Palmætorumque nemoribus: nunc altum bustum, Regio Aulocrene est, per quam ab Apamia in Phrygiam iter, ibi Palma Deli ab euldem Læi atate confpicitur.

Const. Cæsar salsam terram ad omnia ineptam  
dicit, præterquam Palmæ fructus, quos optimos  
& fertilissimos producat: propter hoc enim in  
talibus locis solum Palmæ fructum fertilitate præ-  
stare.

Cateuini narrat Ammianus Marcellinus lib. 24. Iulianum Imperatorem, postquam armatus Alyriam est ingressus, inuenisse pures agros confitos vinctis varioque pomorum genere : ubi orti arbores assueta Palmaum per spatia ampla, instar ingenuum memorum. Et quia incescit quispiam, temerates, et spadicæ cernere assidua, quorum ex fructu, mellis et vini conficiatur abundantia. Gacitas nemore prodidit, Palmas nusquam tota India repeniri, et fructus earum deserti ex Arabia in Indiam, ubi magna quantitate succos ed, similiter et in massa compactas abiectis nucleis: Meminisse tamen se vidisse quoddam genus sylvestre Palmae in Cambaya & Guzarat, sed sterile.

Threuctus, ait, in tota India Americana & Peruana in terra firma & insulis inueniri septem species Palmarum fructu differentium, inter quas reperit quasdam ferentes esui bonos Dactylos, quales Aegypti, Arabie felicitis & Syriae.

Doctiss. Glandinus ex eo loco Garcia (quem supra trigessimum annum medicum in India Orientali continenter sciffe testatur) colligit per palmās, quas Theophr. Arriahus, Strabo, & alii Scriptores Veteres nasci in India natarauerunt, intelligendas esse non propiè dictas: sed quas recentior ætas nunc Indicas cognominat, de qua. Palma fusius Gulianidi sententiam recitabimus, capite de nuce Indica. Apertè verò Plinius scribit, vinum Indos è palmis exprimere. Scribit etiam Tobias Roelus, Nigrosum, insulam Sancti Thomæ habere Palmam, quæ fert Dactylos. Maximil. Transylu. de Moluc. Insul. Potus Indorum, Insulæ Subuth & Porne (quem Præfeco exhibuerunt bibendum) erat humor, qui ex confissis palmarum ramis defluere & manare solet. Verum item hanc diriment, qui Indias perlustrant.

Protiehiunt & palmarum diuerſa ſpecies diuerſis locis in Europæ Italia, vt & Sicilia ſteriles, in quibusdam limbitibus Hiſpaniæ fructiſera, ſed fructu immitti eſuique ingrato. In Africa dulcis, ſicut & in Cypro, Creta, Arabia, Iudæa, vtiſſima Hæſtico copioſe. In Canariis inſulis, quæ olim fortunatæ dicebantur: inter quas & palma, à pal-

Palma  
Dccl.

Mel & Vi-  
num ex  
fructu.

*Palma sp.*  
*Ind. & nob.*  
*l.*

Gaele. 25  
nos.  
Dactyli e.  
subsoni in  
India Th  
neco.

Nux. Irid.  
ca.

Potest et  
patrias.

*Palma Euphorbia*  
*ropea.*

Palmas inj.  
[10.92]

marum copia dicta. Palmam non ignorauit Iu-  
uenalis apud Tentyram nasci in Aegypto. Sic  
enim.

*Qui vicinâ colunt umbrosa Tentyra Palmæ.*

Sunt, inter quos est Curtius, qui Palmam in  
his ferè regionibus præterquam in Syria & Ba-  
bylone iterum esse statuunt, sed posteritas ali-  
tèr obseruauit, ut iam partim dictum, partim di-  
cetur amplius. In Babylone Diodorus Caryotas  
magnitudine ferè sex digitorum ferè scribit: illa  
autem fecunditate præcipua, ac copia & nobili-  
tate incluta, non tamen tota, sed Hierichus tan-  
tum (scribente Secundo) in Rechelade, Phasali-  
de & Luide eiusdem conuallibus prosperè enu-  
trita. Hæc etiam vrbs, in sacris literis dicitur *vrbs*  
*Palmarum*, ut auerit Theodoretus in suis que-  
stionibus Theophrast. verò vallem esse dicit,  
quæ per Arabiam, ad mare rubrum progrediatur,  
atque in parte concutitur has gigni, condique &  
releuatur.

Dio forus autem largius Iudæam omnibus lo-  
cis Palmis feracem refert, quæ fluminibus &  
aquis irrigentur.

Solius verò Engadam oppidum Essenorum  
in ea fuisse, quod nunc exilium est, iuxta quod  
dicitur Palmarum decus, lucus eminentissimus. Idu-  
mæ Syria regio, ab Idume ciuitate dicta, Palmis  
abundantissima. Virgil: Georg. 3.

*Primos Idumæas referant tibi Mantua Palmas.*  
Lucan. lib. 1.

*Et arbesco palmarum diues Idumæ.*

Sæuis:

*Næ sibi saltes siluas ponentis Idumæ.*

Sæuis:

*Palmifer æquæ senes bello dominabit Idumæ.*

Persim vique ad Mesenem, & mare magnum,  
Palmæ abundare, ait Ammianus. Dulcem ferè  
tradunt Africam, verum non durantem, sta-  
tim quoque exarescentem & putrescentem.

Diodorus quoddam ac partem describit cu-  
iusmodi in Aegypto & Phœnicæ, quamuis Syriæ  
propinquæ sint, Theophrast. autore. In illa si-  
terat, inuicem eleuentur. In locis tamen Deltæ  
& Alexandriae proximis atque Thebaica, opti-  
mæ.

Eodem tradente, in Cypro genus quoddam  
peculiare, dulcedine suauitateque apprime com-  
mendabile, etiam non maturecat. In Arabia verò  
languidæ dulcesque traduntur, quanquam Iuba  
Rex, ut refert Plin. apud Scenicæ Arabas Pal-  
mam, quam vocant Dabulam, sapore cæteris om-  
nibus præfert.

Palmæ Selinas memorat Silius: & Vergil. --- *Pal-*  
*ma si cernis: Vibemusta liliæarum.*

Palmæ certè Syriam maximè significat, atque  
eius illam partem, in qua Iudæa continetur, ut  
est in illo summo videre, qui Iudæam ceptam ha-  
bet sub Palma sedentem, quod Diodorus quoque  
Silius annotauit, Caryotas huius regionis pro-  
prias esse dicens.

Exiat verò symbolum in antiquo illo nummo  
Aug. Cæs. ubi Corcodilus Palmæ alligatus, indi-  
cans primum per eum denariam Aegyptum: cum  
hac inscriptione: Colligauit nemo.

Eadem sunt insignia antiquissimæ & nobilissi-  
mæ ciuitatis Nemaufensis, quondam Colonie  
Romanæ, ut patet ex adscriptis notis Col. Nem.  
non quòd Palmarum ferax sit ea ciuitas, sed quia  
calidarum Europæ regionum notissima, sicut Aeg-  
yptus nota & illa sub Rom. Imper. redacta, ut equi-  
tem et necitatur. Palma enim symbolice cali-

dam regionem denotat, quemadmodum Croco-  
dilus Aegyptum.

Est & alia Vespasiani moneta Palmam fructi-  
feram continens, cum hac inscriptione: Ipsa fuit  
testis victoriam cladis: indicans fortè ab eo deu-  
ictam Iudæam, ubi abundat Palma: sed victoriâ  
cruentâ.

Porro in sacris paginis legimus venisse Mosen  
in Helim, ubi duodecim reperit fontes & Palmas  
septuaginta &c: Elidem Goropius Belbam, siue  
ut vulgò vocatur, Belbes esse censet, quam Bel-  
lon. de Palmarum copia celebrat, a quibus regio-  
nem Palmarum, ut ille ait, vocat, longè diuersam  
à Palmariena.

Idem tradit ex ipso mari obseruasse in Aegypto  
Palmas, & eas in magnam excrecere altitudinem  
circa Cairum: Ad Nilum sylvas esse Palmarum:  
In Creta prouenire Palmas, sed steriles, propter  
loci frigiditatem. Media leuca à Thor portu ma-  
ris rubri in planitie quadraginta esse Palmas, qua-  
rum fit mentio in Bibliis: ac prope ipsas esse par-  
uum balneum aquæ calidæ.

Est ciuitas [teste Paulo Veneto] inter Balda-  
chum & Chyrin, Bascia nomine, quæ magno Pal-  
mularum nemore circumdatur, de quo maxima  
daçtylorum copia colligitur Inueniuntur etiam in  
regione Camandri in magna copia Daçtyli. Tan-  
dem abundat terra, Formosa dicta, arboribus Pal-  
marum. Adhuc Regio ciuitatis Ephaer palmis cum  
daçtylis. Inueniuntur flumen, autem Aloysio, vi-  
tra flumen S. Annæ ad miliaria fere 70. cui ob co-  
piam palmarum, nomen à palmis inditum est.

Curtius quoque perhibet in Europâ, in Græcia  
scilicet, ac Italia vulgò nasci, sed fructum non ma-  
turare, & apud nonnullos ne quidem villos ostē-  
tare. Ad Marth. contrâ, Quæ in Creta, (inquit)  
proueniunt. si autem sanè percognunt, sed magis  
admodum Cypriæ: ut uter nunc verum dicat, Cre-  
tensis diuidendum relinquamus.

Anguill. Palmam in Italia raram admodum di-  
cit, nec vulgò in Italia nasci, quod Curtius dixit.

At Marthol. Visuntur, ait, Palmarum arbores  
in compluribus Italiae ciuitatibus, nempe in hor-  
tis, viridiis, & monachorum claustris dictis, in-  
signi magnitudine, ac speciosa proceritate, cum  
tamen climatis Italici temperies earum naturis in-  
clementior sit, fructum ibi non præferunt, sed ste-  
riles consenscunt.

Certum tamen nullam esse in Italia, quæ  
spontè & absque diligenti cultu genita sit,  
nec in alia terrarum parte, nisi calida. Idem  
fortè raram dixerunt prædicti, in Italia.  
Nos sanè in multis Italiae hortis vidimus  
satis adultas, sed benè magnas nupsia alibi, quàm  
Monspessuli vnâ insignem, de qua supra dixi-  
mus, vere florentem diximus, & Daçtylos etiam  
ferentem autumno, quo tempore & Matthi. cum  
Fiebus maturecere scribit: [Satis ante eum Daç-  
cor. medio autumni vigore.] Satis magnos, ac ipsi  
etiam ex arbore deceptos habemus tam flores  
quàm Daçtylos, quamvis Gesner. l. de hortis di-  
cat Palmæ arbores circa Monspesium steriles. Ca-  
terz verò omnes quæ tum Monspessuli tum Ne-  
mausi, Arelatæ, itemque cæteris Narbonæ & Li-  
guriz maritimis, & præsertim ad Olbian Gallo-  
provinciæ frequenter & feliciter enatæ visuntur,  
fructum non maturant, ferunt tamè quædam, im-  
mò plures: ferunt indubiè & reliquæ ubi ad æta-  
tem perueniunt. Monspeliensis illa insignis cæ-  
tesimum annum superare creditur: Et vulgò ibi  
persuasum ante grandem ætatem fructum non  
proferre, & vix ante quinquagesimum annum, ut  
qui-

Caryota  
magna

Palmarum  
arbores

Engadam  
Palmarum  
decus

Idumæa  
Syria  
regio

Idumæa

Idumæa  
Syria  
regio

Idumæa

Cypro

Arabia

Palma Da-

bula

Palma So-

linas

Syria

Idumæa

Nummus

Aug. Cæs.

Col. Nem.



quidam perhibebant. Sed plerisque locis tam Italia quam Gallia Narbonensis, decoris, statitatis & voluptatis potius, quam utilitatis causa alitur.

Mirum verò, quod Palladius refert, eum locum, ubi Palma sponte nascuntur, nullis propè fructibus vtilem. Tanta est regionum in ferendis arboribus differentia, proprietateque.

Videtur & in Baldo in Minoritarum Monachorum insula florida & pulcherrima palma. Coluit in horto suo Heidelbergæ Sprengerus. Coluimus & ipsi Montbelgardi nucleo latus, sed hyemem non pertulerunt, et si reposcitur, & diligenter custoditur. Ipsi verò palmarum fructus Venetias aduehantur ex Syria & Alexandria Aegypti, atque etiam Neapoli illuc prius ex Numidia importati.

Postellus de Repub. Turc. ex Alcorano Mohamed recitat impiam historiam de beata Virgine, quam dicit diu fuisse sub Palma, quam nolamus hic referre ne inter Christianos, quod perperam fecit ipse, eiusmodi mendacia vel cogitatu piis h. m. e. d. & obnoxiis da ipa. g. m. u.

Nunc de Palmæ satus atque cultu tradendum, patitur ex Theophr. tum etiam ex aliis. Palmarum itaque satus & cultus præter aliarum arborum peculiaris est. Seruntur officula plura iuxta se in eodem foramine deposita, bina superius totidemque inferne colligata: sed omnia prona. Germin enim non ex cauis partibus emittunt, ut quidam putant, sed è supernis. Quapropter in coniunctione illorum quæ superponuntur neutquam operienda sunt principia ( seu umbilici, unde germin emergere solet. Ista verò expertis nota sunt. Plura autem simul seruntur, quoniam germin vnius tantum infernum est. Horum radices mutuo amplexu connectuntur, & statim primæ germinationes ita coalescunt, ut unus ex omnibus stipes gignatur. Talis itaque facta eius, quæ ex semine fit. Seruntur & trunco duorum cubitorum longitudine, à cerebro ipso arboris viridi, fissuris diuiso, atque defosso. Amat autem Palma solum arenosum & salsum. (addendum enim, si de uirgibus, ut ex ipso textu colligitur, quamuis in vulg. exempl. desit.) Quare ubi tale non sit, agricolæ salem aspergunt. Hoc autem non circa radices facere oportet, sed paulò remotius accumulare quantum semifestarius. Amant etiam maxime rigationem. De fimo diuersa sententia est. Quidam enim fimo nequitiam delectari contendunt, sed prorsus abhorret. Alii v. f. m. f. m. probant, & magnum inde incrementum capere tradunt: sed fimum optime irrigandum esse, sicut Rhodii facere solent. Sed de hoc amplius indagandum. Fortè enim alii hoc, alii illo modo colere consuevere. Et fimum ipsum cum aqua vtilem esse, sine ea etiam nocuum.

Cùm autem anniculæ sunt, eas transferunt, saltemque adiciunt, & himas rursus transponunt ( nam vehementer transplantatione gaudent.) Transferunt quidam Vere: sed Babylonii circa caniculam. Omnino autem maior pars eo tempore ferit, quò & proueniat & crescat celerius. Nouellam minimè tangunt, sed comas tantum religant, ut recta asurgat, & virgæ non recuruentur. Post hæc deputant, cùm iam maiuscula sit, & crassitudinem habeat. Tantum virgæ relinquunt, quantum magnitudo palmi. Quandiu nouella est, fructum nullo intus osse proferit: postea verò cum osse. Quidam perhibent Syrios nullam adhibere culturam, sed purgare tantum atque irrigare. Gaudet verò magis aqua per colliquias detinquat, & v. p. a. p. a. u. m. legendum, non v. p. a. p. a. u. m. v. t.

Tom. I.

vulgata habent. Perperam Gaza scaturientem aquam vertit. Nam quis singulis palmis queat singulos fontes adhibere? quàm pluuia. ut aiunt. Talem autem in conualle palmis confita exuberare. Conuallem istam per Arabiam usque ad rubrum mare protendi Syri affirmant, ac plerique qui inde venerunt: Eiusque conualis parte cauiissima palmas nasci. Sed hæc utroque modo forsitan fieri possunt: nam pro regionibus ut ipsæ variant arbores, & earum culturam variare, ne utiquam absurdum. Cæterum inter siccas, & vnicò caudice ( absque stolonibus ) nasci solitas plantas, palma sola præter seminis ortum alia quoque nascendi genera patitur. Virgas enim *Alia ferens de raso.* tenerimas Babylonios viuivaces efficere, adultasque transferre accepimus. Quin & Græci locis, si quis ramos supernè decisos ferat, radicem demitti: & germin non solum cerebro enasci, sed etiam subtus radicari largius asserunt. Item si *Alia.* truncus inuersus deponatur, sitque solum humectum, multis partibus radices demitti, & germina remitti. Id tamen ampliore magnitudinem capere nequit. Sed virgis commodissimè procreari potest, tum humi frugalitate, tum expeditæ germinationis habilitate. Sumenda autem virgæ *Quales virgæ deligenda.* tenerimæ, quia tales humilissimæ sunt. Sed ex cerebro potius quàm imis partibus germin pro-dire ratio est: hinc enim & virgarum exortus, & omnino veluti principium quoddam vitale hoc est. Quia causa, cerebro exempto, aut morbo aliquo laborante, mox Palma emoritur. Hadenus Theophr. de satus & cultu. Trogus antiquissimus Scriptor folia palmarum apud Babylonios feri, atque ita arborem prouenire prodidit, quæ ridens Plinius eum hoc credidisse demiratur. At Theophrastus, inquit Scilicet, eam à lachrymis, idque non de vna tantum: quem tamen locum apud Theophr. nondum animaduertimus. Nam nec cap. 3. lib. 2. hist. neque cap. 2. lib. 1. caul. quibus locis potissimum & curiosius de palmæ satus, rationisque diuersitate tractat, quicquam de ea re habet. Quidquid sit, utrumque nobis minus videtur probabile.

Plinius rem paucissimis expedit. Palmæ ligno [inquit] puluinata fissura, & in alio media, plerisque umbilicatum, & in alio media, plerisque umbilicatum, unde primum spargitur radix. Seritur autem primum, & bina iuxta composita semina, superque totidem, quoniam infirma singulis planta est: quaternæ coalescunt. Seruntur autem Palmæ & trunco, duum cubitorum longitudine, à cerebro ipso arbori [arboris fissuris. m. & c. h.] viridi fissuris diuiso atque defosso. Et ab radice auulsa vitalis est satus, & ramorum tenerimis. In Assyria, ipsa quoque arbor strata in solo humido tota radicitur, sed in frutices, non in arborem. Ergo plantaria instituunt, anniculæque transferunt, & iterum himas. Gaudet enim mutatione sedis, verna alibi, in Assyria autem circa canis ortum. Nec ferro attingunt ibi nouellas: sed religant comas, ut in altitudinem exeant. Robustas deputant crassitudinis gratia, semipedales ramorum relinquentes truncos, qui decili alibi necant matrem. Nam si quis palmæ cacumen auferat, sterile scit, nec moritur, quod ante Plin. etiam Theophr. scripsit.

Palladius circa Calendas Maias plantam palmarum, quam Cephalonem vocat, locis apricis & calidis ponendam præcipit. Et in O & Obri. Cui [inquit] placet curas agere seculorum, de palmis cogitet conferendis. Hoc igitur mense Dactylo-

rum non veterum, sed nouorum ac pinguium recentia ossa debet obruere, terræ cinerem miscere. *Planta Cei phalane.* *Osium ad sacranem delectu m.*

Hh

re. Si plantam velit, ponenda est Aptili mense, vel Maio. Locis delectatur apricis & calidis. Fovenda est, vt crescat humore. Terram solutam & sabulonem requirit, ita tamen, vt quando plantae deponitur, circa eam vel sub ea terra pinguis fundatur. Annicula transferatur, aut bima lunio mense, vel Iulio incipiente. Circumsodiatur assidue, vt rigitione continua ætatis vincat ardore. Aquis Palmæ aliquatenus salis iuuantur, quæ infici debent salibus, etiam si tales eas natura non præbuit. Si ægra est arbor, faeces vini veteris ablaqueatæ oportet infundi, vel radicem superuacua capillamenta decidi, vel cuneum salicis interfossis radicibus premi.

Constant. Cæsar stercoreis vsum ad Palmas non improbar quidem, præsertim falsi & terræ dulci commixti: at verò fœtidam terram penitus fugere oportere suadet, vt quæ omnibus inutilis existat. De Palmarum verò plantatione specialius ex Leontio hæc tradit. Scrobem cubitorum duorum profunditate, eademque latitudine, aut etiam ampliore, aggere terræ cum stercore caprino explebis, semicubitali profunditate relicta, deinde in medio aggere glandis Palmæ nucleum siue os implanabis, ita vt acies ipsius sursum spectet, obructiq; terra cum stercore & sale admixto, & quotidie rigabis, donec germen emittit. Quidam igitur hoc plium transplantant, quidam in loco sinunt: & quandoquidem falsa terra gaudet, singulis annis circumfodere oportet, & sale adiacere. Sic enim citò magna fient. Est enim tarda admodum Palma in crescendo, autore Varrone. Floridiores autem euadunt fæce vini veteris rigatæ. Ossa verò Palmarum non statim in terra ponenda sunt, sed in tegulæ fundo, atque sunt transplantanda.

Fructus Palmarum generosos fieri promittit Democritus, quum vacuas vaginas, quas aliqui helicas vocant, florentes ablatas & siccatas ex ramis ac truncis suspenderis, quemadmodum grossos ex ficis.

Floridæ verò & altæ sunt Palmarum arbores, tradente Didymo, fæce vini veteris incolata radicibus affusa. Iuuantur etiam sale iniecto. Quod verò ad flores arum & sportarum texturam alba & idonea fiant germina, viridia adhuc ipsa de ramis auellenda, & sub tegmine deponenda ad quadratum complui sinenda, & à Sole resiccari, donec alba euadant.

Postestas obseruauit, nec iniuncto spectaculo & Naturæ ostento, commodissime feri Dactylorū tria officula, vni quæ iuncta pangit: tres inde oriuntur exiles stipites, sed in vnum conflat: foliorū tamen pusillorum & harundinaceorum trina pullulatione distincti, cuiusmodi in nostris etiam regionibus haud difficile prouenire solent. Ternis itaque satis simul ossibus, qui stipites ex iis prodierint, vnus stipes fiunt. Amat enim Palma coitionem. Itaque propriam speciem tametsi non inuenit ad legiūm coniugium: tamen quod potest desiderium explet amoribus succis suis, vt more suo faceret iocatur Scaliger. Non tamen caret profunda ratione. Societatis quippe atque cōiunctionis appetens est, vt mox fusiū dicetur] idèoque nixu quarit sibi cohesionem.

Nobis sanè ex vnico etiam Dactylo sato foliū erupit non semel, quod tamen aduentante frigore vel in hypocauto repositum cōtabuit, nec vquam repullulauit nuclei reliquum radicatum anno sequenti.

Costæus tradit, os vino maceratū citius

quàm aliis prouenire. Camer. annotat ex nucleis enata germina Norimbergæ rarò vltra hyemem obdurare. Mirum est, quod nucleis seu os Dactyli initio durissimum in terra tandem ita emolliatur, vt decorticari queat & auferri ab interiori medulla.

Non omittendū quod Sueton. de D. Octau. Aug. scribit, enatam inter iuncturas lapidum ante domum suam Palmam, in compluium Deorum Penatum transulisse, vtque coalesceret magnopere curasse.

Ad culturam quoque pertinet mirabilis ille modus quem tradit Theophrast. in historis lib. 2. cap. 9. ad maturandum Palmæ fructum. Palmis [inquit] macularum coitum tribuunt: hoc enim & perdurare & maturefcere fructus potest: quod aliqui ob similitudinem quandam caprificati [dicitur] dicunt. Fit autem in hunc modum. Dum mas floret, spatham abscondentes, ex qua flos emergit, protinus vt lanuginem, & florem & puluerem continet, super fructus fœminæ. Illa sic eo aspersa afficitur, vt fructus suos retineat, & neutiquam amittat. Ita fit, vt verique (ambabus: hoc est: æquè Palmæ ac Ficui.) à mare fœminæ auxilium præstetur. Fructiferam enim fœminam vocant (at paulò ante æquè marem ac fœminam fructiferam dixit: Ergo sibi contradicit, nisi ita illum excusamus, ibi ex lua, hic ex aliorum loqui sententia: idè aut xal'oi). Sed alterum veluti coitu, alterum alia ratione contingit. Et in secundo de causis, postquam de Ficuum caprifcatione abundè tradidisset, subdit: Quod verò Palmarum generi euerit, non idem est: habet tamè similitudinem quandam: idè & illud opus caprificari [dicitur] appellant. Quando enim maris flos & puluis & lanugo fœminæ fructibus insperguntur, siccitate ex caliditate ac reliqua potestate concipiunt, atque spirantiores redduntur: quibus causis vis perdurandi acquiritur. Item alibi eiusdem operis: Fructum in Palma fœmina perdurare nunquam posse, nisi florem maris cum puluere super eā concussissent [ita enim quidam afferunt] peculiare sanè est præ aliis: sed simile caprifcationi [τῆς ἐκφυγῆς] Ficorum, qua fructus perficitur. Vtiue quis dicere queat, fœminam ad perficiendum minus sibi sufficere: sed hoc non in vno genere aut duobus, sed vel in omnibus, vel in pluribus constare deberet: naturam enim generis ita diiudicamus. Et in his tamen ipsis paucis generibus mirum, quod Palma nulla ratio dari possit, cūm caprifcationis causa conspicua esse videatur. Ergo causam expressam caprifcationis Palmæ [hæc enim nunc & nobis cum illo loqui] quam profiteretur, cūm videret Theophrast. deesse sibi paulò ante citato loco, quod potuit, apposuit exemplum in natura piscium, quod etiam extat in historiis animalium Aristotelis. Oua edita à fœmella sequutus mas aspergit suo semine: atque ita demum fœcunda fiunt ac vitalia. Nam vel ex remotis generibus similitudines desumi possunt.

Eiusdem Palmaris caprifcationis non obscure meminit & Pollux.

Sed apertissime Herodotus & Ἡρόδοτος Palmarum meminit, & eas Ficorum modo coli: (οὐκ αὖτε τῶν ἑκατόκων) Ait enim Palmarum, quas mares (δρακόνες) appellant, poma illis circumligari quæ balanos edunt, vt earum fructum maturet culex subiens, nec ex arbore is defluat: Culices autem in maris fructu concipi, non aliter quàm in Caprificus grossis (καθάρται οἱ ἐκ τῶν βαλάνων). Dissert itaque in eo Herodotus à Theophrasti sententia, quod is non

maris



nians fructum, sed eius florem admoventi feminis, & ex eo puluerem succuti scribit. Præterea Culicum, quod equidem sciamus, è Palmulis natum nusquam meminit, quamvis capificationi hanc medclam aperte contulerit.

Ex horum classicoꝝ autorum scriptis, aliorumque proculdubio, quæ fata nobis inuiderunt, Plin. philosophandi rationem arripuit, ita prodens: Arboribus, imò potius omnibus [hoc & Theoph. dixit ante eum] quæ terra gignit, herbisque etiam, vtrumque sexum esse diligentissimi naturæ tradunt. Cæterò non sine maribus gignere feminas Palmas, spontè edito nemore confirmant: circæque singulos plures nutare in eum pronas blandioribus comis. Illum erectis hispidum, astitit visuque ipso & puluere etiam reliquis maritare. [illis maritari. d.] Huius arbore excisa viduas pòst sterilecere feminas. Adeoque est Veneris intellectus, vt coitus etiam excogitatus sit ab homine, ex maribus flore ac lanugine, interim verò tantum puluere in perlo feminis.

Cæterùm Palmas inuicem maritali quadam copula coniungi, maresque attrahere ad se feminas, neque congressum, quantumcunque adniti possunt, auferere, sed vtròq; ramis ab veraque vicissim ad osculum quodammodo exportectis, manifesta dare mutui desiderii signa eleganter refert Philostratus in imaginibus, attingitque Gal. lib. 6. de loc. malè affectis cap. 5. non sine graui interpretis errore, qui, quæ ibi de palmarum arboribus dicuntur, ipse Phœnicie populorum amoribus tribuit. Quem interpretis lapsum primò deprehendit Hier. Mercurialis eximius ille Medicorum Italix Coryphæus & post ipsam, sed ipso in suo genere & studio neutiquam inferior doctissimus Guilandinus.

Eadem non modò comprobat sed & ampl. commemoratione declarat Florentinus apud Cassianum Bassum, & Const. Cæsarem lib. x. *de vitâ*, cap. 4. his verbis: Palma vehementer se mutuo prosequuntur amore, ita vt altera alteram depereat: neque prius desiderium in ipsa cessat, quàm ipsa à lamatus mas consoletur. Videre namque est ipsam pronam & incuruatam suis comis incumbere, impatientemque se ipsam firma stabilitate vi sustinere: quin & quasi viduam sterilecere. Atque hoc ipsum agricolam non latet. Nouit enim quòd amet, sed cuius amore deflagret, aut in quem maritandi cupidine sollicitetur, ignorat. Quapropter complures Palmas inibi circiter obstitas digitis contrèctans, ac blandè demulcens, reuersus ad hanc denuò quæ corripitur amore, & manibus hoc dicit tanquam osculo contingit: tum quadantenus veluti reficito huiusmodi desiderio denunciâns, blandioribus comis perinde quasi manibus in eum nutat, cuius cupidinis tabe peribat. Hoc velut oculorum gestu amorem confessâ, seseque huius studio constimulata, quasi radicibus abiicit. Huius velanix remedia sunt, si subinde manus ei admoliat agriculturalis, quæ matrem cuius amore capiebatur, attingerint. Multò magis insanus amor discutietur, si maris flores trunco erutos idem Amasix capiti circumponat: hæc mariti ornamento collustrata fructum dabit, hocque pignore amoris exhalata fecundabitur, opimumque & pulcherissimum fructum edet.

Similia quoque narrat Ammianus Marcellinus lib. xxiv. nempe maritari palmas ipsas, facileque sexus posse discerni. Quin & generare feminas seminibus illis marium, calque amore

Tom. I.

mutuo delectari: atque hoc inde clarere, quòd contra se vicissim nutantes, ne turgidis quidem flatibus auertantur. Et, si ex more femina, cuius arboris amore percussa stignoretur, vnguento ipsius infici truncum, & arborem aliam naturaliter odoris dulcedinem consipere, hisque indicis velut coeundi quandam prodi fidem.

Amplius Hexæmeri tertio cum magno Basilio Ambrosius. Est etiam inquit, quod mireris: nam ipsis sexus Pomis inest: inest arboribus sexus dulcetricio: quippe palmam videas, Dactylos quæ promit, plerumque ramos proclinantem suos, seque submittentem, ac concupiscentem, & amplexus speciem quodammodo arbori prætendentem, quam Palmam marem nuncupant rusticorum pueri. Palmam igitur illam feminam intel-  
*Arborum sexus.*  
*Palma mas & femina.*  
ligunt, quæ sexum subiectionis specie confiteatur. Quo sanè argumento agricolationis peritiamis eius Dactylorum, vel masculæ Palmæ feminæ præstuentes, veluti perfuctionis sensum infundunt, ac experti concubitus exhibent gratiam. Quo affecta munere surrigitur denuò, ac planè hilarior comam protollere animaduertitur.

Hunc maximorum ac fide dignissimorum de amore Palmarum authorum consensum doctissimus Guilandinus pro re certissi. in allicuerat, atq; Palmarios etiam in Aegypto, Arabia, Mesopotamia, Iudæa, Phœnicia, tota Syria, volentes cauere, ne foras, aut sterilitatis noxam incurrant, aut fructum, quem aliquando imaginatione libidinis, vt ita dicamus, concipere solent, [quem admodum aues ouis irrita, quæ hypenema dicimus] ante maturitatem amittant, ita ordinate vtriusque sexus Palmas, vt mares eo saltem interuallo à feminis distent, quòd pulvis ventorum flatibus à foliis mascularum subleuus, in feminarum folia incidat: idque satis ad fecunditatem, & fructus maturationem facere compertum esse. Sed mirum dictu, quòd, si quæ procul à mare absterit, vt neque pulvis neque aura, odorve eius ad eam permeare possit, excogitauerunt coloni funem à mare relictum ad feminam vsque producere, atque ita quasi maritali vinculo copulatam masculi virtute clanculum per funem irrepente fecundam fieri, quæ prius sterile sebat in ea solitudine. Quæ omnia, ne quis fabulosa suspiceretur, inquit idem Crisalp. eiusmodi amoris exemplum atque coniugu, nondum octogessimus agitur annus, [scripsit autem ante 30. circiter annos] ex quo id genus arbores in Italia, studiorum omniumque virtutum altrice terra, dedere. Huius autem rei celeberrimi testis est Iouianus Pontanus, Alphonsi iunioris Neapolitani regis præceptor, & epistolarum magister, Philosophus, Orator, ac Poëta insignis, & quem fabulas pro historia, de re maximè suo tempore omnibus conspicua, scribere puduisset. Hic sanè duas celebrat Palmas, vnani marem Brundusii, alteram feminam Hydrunti, quæ diu steriles permanferint, donec scilicet paulatim succrescentes, nondum alteram altera contueri poterat: vbi verò tantum adolueret, vt sese inuicem conficere potuerint, longo quantumlibet multorum ita dorum tractu dissidentes, scitificare ceperint. Sed cur non ipsum audiamus?

Brundusii latis longè viuet ardua terris

Arbor, idumcis vsque perit a locis.

Alter a Hydruntinis in salubris amula Palma,

illa virum referens, hæc muliebres decus.

Non vno creuere solo, distantibus agris,

Nulla loci facies, nec socialis amor.

H.

*Mutuo si tam affe-  
da quæ  
distant  
m.*

*Italia lami*

*Alind,*

*Alind re-  
medium.*





gargarizatum vehementer adstringit & cohibet. Palmatum verò nuclei ceterorum omnium more in scibili nouo cremantur, deinde restituti vino lauantur, & tanquam spodii vicem supplentes, ad ornandas decorandasque palpebras conducunt. Quod si non sufficienter viti fuerint, illud idem iteratur. Vim habent adstringentem, & spiracula cutis obstruentem, ad oculorum pustulas, staphylo mata, ciliorumque defluuia addito Nardo efficacem. Supercrementem carnem cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatricem perducunt. Omnium verò aptissimi sunt Aegyptii nuclei, qui ex humilibus palmis excerpuntur. Palmæ spatha vnguentarii in vnguentorum spissamenta vntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, praelusa, interna parte pinguis. Vis ei adstrictoria, quæ vlcera depascientia sistit, laxatosque articulos committit, si trita malagmaticis & cataplasmatibus admisceatur. Prodest & præcordis ac stomacho imbecilli, nec non & ictericis affectibus, conuenientibus quæta cataplasmatibus. Eius decoctum subinde affictum capillos denigrat. Potui verò datum, renum, vesicæ, aliorumque viscerum vitis confert: alii, utriusque fluxiones sistit. Ipsa verò scabiem sanat diebus viginti, si adhuc tenera cum resina & cera decocta imponatur. Fructus etiam qui sub ea continetur *Elate* quoque & *Borassus* dictus, & ipse adstrictorius cum sit, spathe quoque præbet effectus: nisi quod ad vnguenta non æquæ est utilis. Cæterum alba quoque caudicis medulla [ἐν τῇ καυδὶ τῇ ἀπὸ τοῦ κορυφῆς] tum recens comesta, tum decocta ad eadem facit, ad quæ etiam *Borassus*. *Hæc Diosc.*

Aegyptiam Palmam situm sedare, Solinus auctor est, apud quem in impressis cunctisque aliis legitur *ἐν τῇ ἐν τῇ μερῇ τῇ ἐν τῇ μερῇ*, nullo sensu: idem *ἐν τῇ ἐν τῇ μερῇ* legit Marcellus ex Plinio, dimittatur pro decoquatur recte.

Ex Palma, tradente Strabone, apud Harmenios & Babylonios panis & mel & vinum & acetum fit; & textilia varia. Nucleis pro carbonibus Fabrifertarii vntur: qui in aqua macerati bobus & ouibus in pabulum dantur. Dicunt esse carmen quoddam Persicum in quo ccc. & lxx. Palmæ utilitates numerentur. Nam vel Galen. auctore in palmis, respectu virium & facultatum, non parua est differentia. Quædam enim sunt sicca & adstringentes, ut Aegyptiæ: aliæ molles, humidæ & dulces, ut quæ Caryotæ appellantur. Præstantissimæ autem hæ in Syria & Palæstina nascuntur, in Hierichunte. Reliquæ omnes aliæ Palmulæ inter hæc duo genera sunt mediæ.

Difficiles autem sunt concocti, capitique dolorem inferunt: verum ex his aliæ magis, aliæ minus sunt humidæ ac dulces, sicca atque adstringentes. Verum constitutis extremis, iam omne quod in medio est, facillimè cognoscitur. Nulla certe ex ipsis est, quæ non dulcedinem quandam & adstrictionem habeat. Siquidem Caryotæ exiguae adstrictionis, Thebaicæ obscuræ dulcedinis sunt participes. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & ventrem sistere ostensum est. Palmulæ si largius sumantur, omnes concocti sunt difficiles, & capiti dolorem afferunt: quædam autem & morsus cuiusdam sensum ori ventriculi inducunt. Succus autem qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus quidem omnino est, habet autem & lentoris copiam, cum Palmula ipsa pinguis fuerit, sicut Caryotæ. Quum autem dulcedo tali succo mista fuerit, celeritè quidem hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem maximè ab ipsarum esu, quod aut

inflammetur, aut scirrho obsideatur: post hepar autem & lien obstruitur ac læditur. Maximè autem Palmulæ virides, si paulò largius sumantur, ad omnia sunt noxiæ, ac dulces quidem succum habent calidiorem, adstringentes frigidiorum. Quin & Palmulæ virides, sicut Ficus, status *Palmulæ virides*, gignunt. In regionibus autem non admodum calidis palmulæ haud perfectè nature fiunt, [ut & superius declaratum, ad eò ut reponi queant: quod sit ut cum homines cogantur ipsis viridibus vesci, crudis succis impleantur, & rigoribus qui ægrè calefiunt, & hepatis obstructionibus præhendantur.

Confirmat hoc Galen. cuiusdam sibi coctanei exemplo, qui Alexandriæ Palmulis immaturis per complures dies antè & post balneum satiat, absque febre sæpè horruit, ac riguit. Phœnix seu Palma arbor, eodem auctore adstrictoria facultatis omnibus suis partibus est participes. Igitur ramorum succus austerus est, ex aqua substantia tepida, & terra frigida constans. Similis facultatis est Encephalos, hoc est, cerebrum esui aptum. At fructus eius, & maximè dulcis, non paucam habet caliditatem. Cæteri cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impositus, ubi quid robore, desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est, sed etiam tanquam cibis sumptis & simul cum aliis, & perse. Porro quod *Elate* vocant, tenerum illud Palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem obtinet. Quod verò velut integumentum eius est, adstringentem etiam qualitatem habet. Vesci nō plus quàm dicta omnia exsiccat, utpote quod essentia constituta illis siccus est, & multum habet huic indicis. Itaque iure vtuntur illo ad vlcera putrescentia, ad articulos plus iusto laxatos. Ad hæc medicamētis hepaticis & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix plantæ desiccatoria citra morbum facultatis est, adiacentem habens & ipsa adstrictionis quippiam. *Hæc Gal.*

Nicander in Alexiphar. Palmæ fructum cum lacte epotum ad haustam Buprestium commendat; quum ait:

--- τὸν γὰρ ἀποτὸν ἐν γάλακτι ποιεῖν οὐκ ὀφείλει  
Lac, inquit, vasi infundens sæpè admisce tene-  
rum Palmæ fructum.

*Sive recente reple non magnum lacte Catinum,  
Et tenerum misce victrice ex arbore fructum.*

Meminit & Xenophon lib. 2. expeditionis Cyti cerebri Palmæ & palmarum. Peruenerant iam ad eos vicos, inquit ille, è quibus iussa dum suorum commeatus caplandi erant. Plurimam illic & frumentum & vinum è Palmulis aderat, acetumque ex iisdem elixis paratum. Palmarum verò fructus [ἐν τῇ ἀντὶ τῇ γονίῳ] : glandes palmarum ] quales apud Græcos videre non licet, seruis ac famulis præbebantur: seligebantur quas seruarent dominis, magnitudine & pulchritudine admirabiles, aspectu proflus Electro similes. Eas quidam arefactas in vsum belliariorum reponebant. Vinum quidem illud potu suaue erat, sed capiti graue. Milites eo primum in loco Palmarum cerebrum esitarunt, omnibus cui detractum id fuisset, exarescentibus, admirantibus cunctis eius cibi speciem ac suauitatem quandam peculiarem, quæ tamen valdè caput tentat.

Herodotus lib. 1. eum de Babylone loquitur scribit: In eius toto agro Palmas generari, magna ex parte fructiferas, è quibus non solum vinum, mel, cibum conficiunt, sed illas etiam Cari-

Observa-  
tio  
Arboris  
res.  
Téperam.  
R. morum  
m. ut.

Encephalos  
Dactyl.

Elate.

Vlcera.  
Luxatio

Radix  
res.

Frumentum  
& vinum  
è palmulis.

Glandes  
palmarum  
magna Electro  
similes.

carum modo in ossa cogunt. Nicander in Georgicis.

*Pullulantes in Palma st. lones [scilicet] quod dicitur exsiccantur.*

*Cerebrumque, ad adolescentibus experitum cibum afferunt.*

Diphilus Siphnius, [vbi citat Athen.] narrat, Palmarum cerebrum plenitudinem corporis efficere, largitis nutrire, ventriculum grauari, vix distribui, situm inuichere, alium coercere.

Paulus Aegineta palmulas stomacho commodare scribit. si non valde fuerint pingues. Et rursus alibi. Palma fructus maturus moderatè calidus, & corroborans, & stomacho gratus, siue interò sumatur siue foris imponatur. Verùm quod reliquum est in ipsa abundè adstringit: vnde stomachicis & hepaticis compositionibus admisceatur. Omnium autem maximè adstringit id quod nascentis fructus velut inuolucrum quoddam.

*Sciunt.*

*Temperat.*

*Nona.*

*Delectus.*

Simeon Sethi præter pleraque illa quæ ex Galeno adducta sunt de palmularum viribus hæc tradit. Palmulæ calidæ sunt secundo ordine, humidæ primo: rigorem difficulter incalcentem gignunt. Omnibus autem gingitis dentibusque noxiæ sunt. Sed enim reliquis meliores sunt, quæ cum aliqua vi adstringendi, aliqua etiam duritie constant, vnâ cum modica dulcedine & non valde mellea. Quæ verò in frigidis regionibus nascuntur, pessimæ sunt: quoniam non maturescunt & noxas cum rigore febrili inferunt, morbosque & quamplurimas obstructions: meliores autem quæ rubræ, gilvæ sūt. Quæ verò austere sunt, calidæ sunt primo ordine, sicca secundo: neque enim paruum inter Palmulas est discrimen: nam aliquæ siccae sunt & astringentes, vt Ægyptiæ: quædam molles & humidæ vt dulces, vt quæ in Baetris nascuntur. Medix inter has sunt reliquæ. Qui ex omnibus sanguis gignitur turbulentus est.

*Palmularum colla-  
tio.*

*Sanguine  
Siccissim  
Gignunt.*

*Quibus à  
Palmulis  
distincendi*

*Raza.*

*Rorab  
Zuchcharini  
Hayonensis.*

*Coloris.*

*Nigri.*

*Cytilis.*

*Dolorifica-  
machi.*

*Fluxus si-  
guum.*

*Palmulis  
inflammatis.*

*Spatha ex-  
siccata pro  
ligno.*

Scribit Rufus, cum pineis nucleis fauces lenire, bonumque corporis habitum conferre, præsertim si frigidum sit temperamentum, sed assiduo vsu vesicam exple. Oportet autem ab his abstinere, qui faciliè obstructions capiuntur, & anginis, & lippitudinibus, & dentium doloribus.

Audiamus paucis & Arabes. Raza Rotab minis calidos esse quàm Dactylos, quique cum sint lenissimi, stomacho prosunt. Apud Serap. legitur Rorab. Interpretes reddit Dactylos. Aben Mesuai apud eundem profert Rorab zuchcharinos, & Haharad & Hayron. Est autem Hayron species Dactylorum colore citrino vel rubente, quæ cæteris præstat, post quos sunt glauci. Improbantur nigri. Ex Rasi Rorab citò conuertitur in bilem, & noxium est iis qui temperamento sunt calido, aut hepate. Deteriores ex eis sunt magni, dulciores. Frigidis naturis competunt, eoque impingunt. Cytilonis, [autore Aben Mesuai apud eundem Serap.] id est, cordis Palmæ, temperies frigida est in fine primi gradus, sicca in medio eiusdem: confert cholera, calori & effervescentiæ sanguinis, sed stomacho grauis, ventrem adstringit, parum nutrit. Sedat tamen dolores stomachi à proprietate quadam. Secundum Rasin, compellit fluxum sanguinis, stomachi arcet inflationes, sed tardè descendit ad fundum stomachi. Expediendus deventur, si edatur cum singibere condito, aliòque electuario quodam calido. Cæterùm Spatha prolatis floribus & post flores racemoso palmarum fructu arefcit: relictaque in arbore sequenti anno aufertur, non aliter quàm putatione inutilia fæmenta in vitibus nostris per ver aufertur: etiam sapia quoque dictam. Nec alijs

nunc eius toto illo Ægypti ac Syriæ tractu, quàm ad ignes vsus est, vt annotat Marcellus ex relatione eorum qui illa loca perustrant.

Et Bellon. refert, vix alia ligna in Ægypto reperiri quàm Palmæ, sed ad edificia & Archietæcturas nihil valere. Addit rusticis eius regionis summitates præscindi, & medullam internam eximi, Alexandriamque venalem deportari: Ibidem enim ciuam comedi, gustuque Carduum esculentum (artichaut) referre: illud ipsum esse quod Græci ἰχθυόων, & cerebrum Palmæ nuncupent.

Bellonio circa ligni vsum contrariatur Alpinus, qui ait, non esse vllam aliam arborem, Palmā, humano generi vtiliorem: at Ægyptios ex truncis domorum trabes facere, ex ramis parietes, multaque alia lignea vasa ad vsum, quæ Cusfæ nominat. Et sanè Alpino etiam fauet Theophrast. qui & ea Africa parte, in qua nunquam pluit, Palmas benè magnas & altas, optimasque prouenire, & materiem earum diuturnam esse, quippe spissam, siccam ligno samque: quæ quidem opum sunt notæ ligni ad Archietæcturam expetiti.

Strabo quoque Palmaceis tabibus Babyloniz tantum robur tribuit, vt tecta quoque sustineant, vt amplius dicitur in fine capitis. Ex foliis [ad idem Alpin.] habella & sporas, è caudicis cortice funes pro naubus conficere.

Sed quem ipsi ad medendum vsum habeant, nunc quoque dicendum. Ex Palma tria sunt, quibus Ægyptii sanitatis gratia vtuntur, quippe Spatha [Spartum ter legitur apud Alpin. quamuis eam vocem eo significat apud nullum alium auctorem legerimus.] puluis in spatha vel inuolucro contentus, atque Dactyli. Spathæ igitur membrana cum pulu. facta, vtuntur, tum ex ea parato decocto. Puluis maximum vsum habet per os sumptus ad Diarrhæam, Lienteriam atque Dysenteriam, nec minis ad omnes alias vel sanguinis, vel alui humores naturæ vacuantes compescendas: præcipuè verò ad hepaticum fluxum, hæmorrhoidum, atque vtericentiam vacuationem, atque ad spatum sanguinis. Eodem vtuntur ad referenda vlcera depascientia, ad vix relaxationem, ad firmandos dentes mobiles. Decocto ad omnia prædicta quoque vtuntur, sed sapè cum eo puluere admixto: articulos debiles, aptosque deflexionibus mirum in modum iuuat eos firmando & roborando. Puluere quoque albo in inuolucro veris tempore inuento, quando scil. Palma florere incipiunt, vtuntur familiarissimè ad raucedinem, tussim & opthalmias cum saccharo misto. Estque ipse dulcis & subastringens, quo mulieres Ægyptiæ familiarissimè vtuntur non tantum ad cohibendos menses, sed ad retinendum foetum. Eundem vsum habent Dactyli immaturi in cibo per se, & ex decocto. Dactylorum maturorum vsus frequens ad faucium raucedinem, tussim. Dispnoeam, pleuritim & peripneumoniā. Decocto etiam ad iuuandas variolarum in pueris excretiones.

Lacuna ossa Dactylorum plurimum conferre putat ad roborandum cor, propter figuram illam quam cordi, vt ille ait, quodammodo similem habent. Sed parui facimus eiusmodi facultatum æstimationes à figuris, quas nullam per se agendi vim habere, boni Physici norunt, ac ne sanè occultam quidem, vt quidam opinari audent. Inuenias præterea multa cordi similia, etiamque lapides, immò fortè & venenata quædam, vt Anacardi, Ahouai fructus & cæteræ propterea cordi conferre dicemus: Mirum verò hoc præcipuos auctores, vt ex antè dictis patet, noxam ex Palmularum capiti



capiti vno consensu tradidisse, quemadmodum & vini earum potu, vnicum tamen Areteum [quantum hactenus quidem nobis constat] scribere ausum, omnia bellaria caput dolore infestare, præter Palmulas, Ficus & uvas: quod si ipsi soli & probè cognitum fuit, habet possentius sententiam eius confirmandi: sin minds, temeritatem risu, scripta spongiâ castigandi. Inter Saturnalia dona olim palmulæ mittebantur, ut testatur Quidius:

*Quid vult Palma sibi, rugosaque carica dixi.*

Et Martialis:

*Aurea porrigitur Iani Caryota Calendæ.*

Vini è Palmulis in superioribus aliquoties mentio facta: quod ut conficiat, tradente Diosc. Palmulas, quas Chydæas quasi vulgares vocant, bene maturas in dololum in fundo perforatum & arundine picata obstruere mittes, ita vt foramen etiam lino sit obrutum. Tum denis Chœnicibusternos aquæ congios affundes: quod si non admodum dulce id esse libeat, quinos congios infundes, & ad dies decem macerari sines. Exacto eo spatio, hoc est, die vndecima, detracto ab arundine linteo, vinum crassum ac dulce excipito, atque reponito. Suaue illud quidem, sed capiti noxium. Contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficac: eandem ob causam stomachicis, colicis, & sanguinem excreantibus conuenit. Tamen qui eo non sunt afflicti, & primum bibere ceperint, ventris fluxum cient, inquit M. Paul. Venet. Qui verò afflicti fuerint, mirum in modum pinguescunt. Incolæ ciuitatis Cormosæ pane triticeo non vescuntur, sed comedunt dactylos. Sunt qui additarum pari aquæ mensura, manantem deinde liquorem excipiunt: id quod tertio, quarto, & quinto faciunt, non item amplius: quando quod reliquum ab his est, accescit. Meminit & Xenophon loco superius citato vini è palmulis optimi. Plinius verò lib. 14. c. 16. in vini præparatione à Diosc. discrepat, tunc quòd Palmularum minorem quantitatem sumit, scilicet modicum, qui, teste Paulo, chœnices duntaxat octo continet, cum quia post macerationem palmulas ipsas exprimit: sic ait: Fit & vinum è Palmis, quo Parthi & Indi vtuntur, & Oriens totus, maturarum [mitiorum Vet.] quas vocant Chydæas modio in aquæ congiiis tribus macerato, expressoque. At idem lib. 13. c. 4. E Caryotis fieri tradit, non è Chydæis. Dioscoridi etiam in eo contrariatur Plinius quòd Palmum vinum ventri molliendo non inuile prædiat, quemadmodum & sanguinem excreantibus. Sed Librariorum potius, quam Plinii errorem hunc putant: idè Corn. pro molliendo, morando: Sarrac. molliori legit, eodem penè sensu. Ex Recentioribus Theuetus vinum Palmum excellens esse prædicat, sed cerebrum lacerare. Fit & Vnguentum ex palmæ Elate seu spatha apud Diosc. Sic: Testam discerpamque Elatē in labrum conicito, & Onphacium oleum affundito: in quo tridui spatio eam macerari sinito. Mox fiscella exceptam exprimito. Sint verò vtraque paria pondere. Tandem vbi vase mundo repositus vitor. Vim habet rosaceo proportionē respondentem: sed alium minimè molli. Falitur Plinius, quando inquit: Est præterea arbor ad eadem vnguenta pertinens, quam alii Elatē vocant, quod nos Abietem: alii palmam, alii spatam. Nam vocis, Elate, homonymia ei imposuit. Exoleuit hodie huius vnguenti parandi modus & vñs. Extat & conscriptio Diosc. habens apud Gal. quam palmeo bacillo cernmifcendam præcipit: non alia de causâ, vt quidam volunt, quam

vt adstrictionis aliquid inde capiat.

Quibus deest Palma recens, pro Spathula ad empl. diachal. seu diapalmes. teste I. uib. suadet Melues radices Arundinis illud obire: Verum non est similis horum facultas, vt alterum alteri substituitur. possit substitui: quum radix prædicta eucllat spicula ex alto, vt dicit Diosc. suffragante experientia. Palma verò potius constringendo repellat. Quam ob rem malum ego huic subrogare arundinis cannam seu calamum, vel spatulam factam ex querno, mespilino aut alio eiusmodi adstringente ligno. Guido pineam substituit, Chirurg. par. 2. d. 1. cap. 3. cum antea spatulam de canna esse voluisset.

Ingrediuntur & dactyli optimam & selectissimam illam compositionem Melues, Diaphani- con à Palmulis dictam. Vulgò officinis à Palma dicitur Diapalma emplastrum. Paulus Aegin. in Epithemate ex vinacis quatuordecim, & vñs coniungere iubet.

Ad vulgaris Palmæ naturam illa quoque pertinet historia. Ex palmarum cinere, & oleo fieri aiunt Saponem, omnium præstantissimum, ad manuum candorem, notante Scaligero. Est apud Americanos, referente Stadio, natio quædam Karaya nomine, quæ ex Palmis Glem conficere solet in condimentum ciborum. Verum qui è liberaliùs vtuntur, vitæ sunt etiam. Palmæ indur. sal. tem huius salis nouum. quæ a Diosc. d. 8. c. 8. parando semel iuuile testatur, huic docet. Palmam prægrandem incidunt, quam sciunt minutim. Hinc struem ex lignis aut conuenientibus palmæ legmina superimponunt, & omnia simul ignibus subiectis cremant. Hinc ex cineribus illis lixiuum parant, quod coctum cogitur, & tal illud producit. Ego quidem nitum arbitrabar, sed ignis exploratione secus se rem habere deprehendi. Sal sapiebat, & colore erat cinereo.

Restaret geminus palmæ honos, ac vterque præcipue nobilitatis dicendus, alter literarius: militaris alter. Palmarum quippe foliis primò scripturatum fuisse Plin. ex Varrone prodidit. Verum quia Recentiorum quidam eam gloriam peculiari tribuant palmæ speciei, huic quoque rei caput proprium paulò post dicandum fuit. Nunc militarem atque adeò triumphalem celebremus. Equis verò virtutis alumnus nescit palmam omnibus penè prisca & anteaetis seculis, (excepto vltimo hoc propemodum serido) vincenem, in certaminibus fuisse præmium? Quod fatè illustissimi quique, immodò Reges & Imperatores ipsi, non modò non detrectarunt, sed omni nisu & conamine, atque adeò vel cum vitæ discrimine quæsiuerunt: vt qui maiorem apud suos exterosq; gloriam spectarent, ac pluri arboream, quam auream facerent. Qua non semel plurièsve contenti, ni iterum ac sæpiùs illa insignirentur, vt tantò plus se accepisse decoris existimantes, quò frequentius in ludis sacris & certaminibus vicissent. Ita vel etiamnum hodie plurimorum triumphales statue palmæ ramum manu gestantes. Notis sunt triumphi Græcorum: noti Romanorum Cõsulum & Imperatorum. L. Papyrio, & Sp. Carthilio Cõsulibus, deuictis Samnitibus, capul- que illorum oppidis, Aquilonia videlicet & Cor- uino, Palma victoribus data: morè tunc primùm è Græciâ ad Romanos translato. Postea autem inoleuit, vt qui certaturi forent, spadicem haberent. Claudianus.

*Nutant ad nutu Palma fiedera.*

Cæsar in Hispania contra Pompeii liberos decet- tauit, eosque deuicit. Ergo in eo campo, vbi bel-

Hh

latum, Palmæ ramus statim post victoriam agnatus: quod tamen non ad Casarem, sed ad Octavianum, è sorore filium portendit. Nam ibi praelians multa præclara armis facinora peregit, quibus clarus futurus erat. Hæc Xiphilinus in Epitome Dionis.

Suetonius Tranquillus in Octavio: Apud Mundam, inquit, Divus Iulius castris locum capiens, cum silum cederet, arborem palmæ repertam conferuari, ut omen victoriæ, iussit. Ex ea continuò nata soboles, adè in paucis diebus adolevit, ut non æquiparet modò matricem, verùm etiam obtegeret, frequentereturque columbarum nidis: quamvis id avium genus duram & asperam frondem maximè vitet.

Musa palmæ coronata.  
Phænices literarum triumphator.  
Cæsar, id est, Palma coronatus.

Differt ad iugum edictum, Corona palmata.

De Palmæ sententia.  
Palmæ sententia.

Palmæ sententia.  
Palmæ sententia.

Martyrum Emblem.

Cur palma triumphus dicatur.  
Prima ratio.

Delata palma.  
Sacra palma.

Musa præterea (Phurnuto auctore) Palma coronata, propter homonymiam, quod Phænices primi inuenisse literas credantur. Nam Palma Græcè *ελαια*. Hanc tamen rationem non probat ille: verùm ob arboris teneritudinem, (vel potius inaccessam scabietatem, aut ramorum huiusmodi qua caudicem maniant, nisi circumcidantur, ut superius dictum, ut nos interpretamur.) propter quod non facile scanditur, sicut nec ad Musas & poësin, propter difficilem ad earum pulchritudinem accessum, Nam dulcissimos ferit fructus. Ab huiusmodi corona Palmæ postea usurpatum, ut aequè vocabulum Palma, atque arbor ipsa, victoriam denotaret. Cuius significationis vnum Ciceronis, alterum in Virgili, tertium Ovidii locum citasse satis esse ducimus. Ille de senectute:

quam Palmam utinam Divi immortales tibi, Scipio, referunt.

Alter: Eladium Palmæ: Epeiros equarum. Hic: Et lente victoris premia Palma.

Vnde proverbia nata: Palmam dare Palmam ferre, deferre, tribuere, præcipere, accipere: Habere Palmam ex aliquo: Reservare alicui. Quæ omnia ad victoriam referantur. Et Palmarium, auctore Plin. quicquid in victoria sit. Dicitur etiam Vlpiano Iurist. Victoria salarium. Terent. in Eunuch. tum hoc alterum, id verò est, quo mihi puto Palmarium. Victoriam: Deam Palmarem Apuleius vocat: &c. Palmæ vestis, siue Palmata, propriè triumphantium fuit, quam merebantur, qui de hostibus Palmam reportassent. Etiam in pace Consulatum fuit. Aufonius in Panegyrico, Palmata vestis, ut in pace Consul est, sic in victoria triumphalis. Et Palmæ sententia, quæ vincit. Cicerone: Sententia philosophorum Palmæ. Et Palmæ statua, Ciceroni, quæ alicui propter victoriam erigebatur. Sed quo rapimur? An celebramus Palmam, ut Palmam in posteritatis Theatro mereamur? Felices verò eos qui Emblematicam illam Coronam cum Palma ex gladio mortis immortalis victoriæ reportant: ut habeant contra terrenos hos fastus quod trucibus Christianæ fidei oppressoribus atque tyrannis desuper occurrant: Cessit victoriæ victis.

Sed cur tandem Palma præ aliis arboribus præcipuis victoriæ triumphis dicta: adeoque ut & certaminum euaderet symbolum, attestante in Symposiis Plutarcho? Huius rei ut annotat Curtius hæc perhibetur ratio. Thefeum deuictio Minotauri, è Creta redeuntem, Delum appulisse ferunt, & in ea, ob adeptam victoriam, Apollini sacros ludos instituisse, in quibus victores Delica palma coronarentur: Alii ibi è sacra Palma ramum decerpisse, & secum detulisse, ut inde postea inoleuerint mos, ut cuiusque certaminis victor, Palmæ ramis contonaretur. Pausanias egiæ huiusmodi causam attribuit. Nam Isium

vbi in Olympicis vicisset, dextra Palmæ termitem gestasse scribit, & equo insidentem abiisse: ut inde, dextris Palma portata, victoriæ indicium sit. At Aristoteles, Plutarchus. Plinius & Aulorum tam præcorum quam posterorum plerique qui de hac re aliquid prodiderunt, causam reddunt hæc, quod virgentibus ac prementibus ponderibus minime cedat: à qua vi atque natura Græci nihil victoriam dictam volunt, quasi *ἀνδρα γένος*: à non cedendo. Strabo sanè in xv. Geogr. scribit Palmaceas trabes peculiare quiddam pati. Nam cum solida sint, cum inueterascunt, non cedunt (inquit) in partem inferiorem, sed in superiorem panduntur, propter onus, vnde melius tectum sustinent. Quin & Theophr. in fornem concurrari Palmam sursum versus pondus ait. Plinius. Palmæ arbor valida, induratum enim curatur. At Populus, contra omnia inferiora pandatur: Palma è contratio fornicatur. Quamvis alii inuolida ligant, & ita in vulgatis habeatur: ita tamen ex Strabo & Theophrast. alique legendum, nisi contrarium huic velimus facere Plinium, qui ex eo hunc locum transcripsisse videtur: sique etiam in m. f. exemplari legitur, teste Dal.

Ea res in admirationem traxit Aulum Gellium sic scribentem. Perhercle rem mirandam Arist. in viii. probl. & Plutarch. in vii. Sympo. dicit: Si supra Palmæ [inquit] arboris lignum magna pondera imponas, ac tam grauius virgeas oneræque, ut magnitudo oneris sustineri non queat, non deorsum Palmæ cadit, nec intra flectitur, sed aduersus pondus resurgit, & sursum nititur, recuruatque. Propterea, inquit Plutarchus, in certaminibus Palmam lignum esse placuit victoriæ, quoniam ingenium cuiusmodi ligni est, ut virgentibus opprimentibusque non cedat.

Idem testatur Cardanus, addique idem euenire Afinis Canteleis ex Xenophonte. Causas verò quas reddere conatur, tanquam fuitiles & pueriles explodit Scaliger. exercitatione cxxxiii ipse tamen meliorem non addit, se d' ingenuè fatetur nodum hunc se soluere nescire, quod rarum & mirum in tanto subtilitatis Professore. Plutarchi saltem conatus produxisset, qui tam stupendi in Palma experimenti [ut Guiland. ait.] triplicem causam recitat in libello de causis naturalibus, probl. xxxii. quod vñ cum sequentibus octo in Græcis exemplaribus impressis desideratur. Virum, inquit, quoddam ignea, & spiritalis facultas, quæ maximè pollet, cum tentatur & irritatur, sese exercens, magis & magis erigit: An quoniam pondus ramos subitò virgens, aerè omnem, qui in his est, oppressum cedere retrò cogat, qui deinde resumptus paulò viribus aduersum onus non sustinens, cum onus quiescit, paulatim se erigunt, & speciem, quasi contra illud adurgant, exhibent?

Sed neutra istarum nobis satisfacit: & frustra nō dñm queritur, vbi non constat de *τῷ*. Nam Amatus Lufit. & Antonius Musa Brasauola, quæ de Palmæ ligno tradita sunt, suo experimento falsa esse compense testantur, nec enim contra pōdera inniti aut recuruari, imò experientiam indicare, lignum hoc debile esse. Fortè hoc dicit Amatus, quia apud Plin. legerat, inuolida. Aut si expertus sit, vel non ritè expertus est: hoc est, Vel in ligno non satis adulto, aut non ritè secto: vel non adhibita mora temporis competente. Nam tot classicorum Aulorum consensum vnius experimenti putati specie reuicere, prudentis non est. In inueteratis illud obseruari dicit Strabo. Ergo multo tempore opus. Aut si in inueteratis istud viderunt,



viderunt, cur locum non citant, quod fecit Strabo: aut experimenti sui modum assignant? Quamvis autem de hac re nihil certi nobis constet, attamen tot summorum authorum consensus non patitur temerè sibi fidem derogari. Immo nec ipsa quoque ratio, quam quodammodo dari posse putamus. Ergo audendum aliquid. Multum sanè potest in lignis nervorum atque fibrarum ductus ad flexuram & incurvationem. Tales & palmam habere existimandum. Nam ita putamus. Quemadmodum rami ex truncò exeuntes mox in fornicem incurvantur, ita incurvationis illam causam ex fibrarum trunci continuato ductu dependere. Quod si hoc in virgis euenit, cur non idem in Palmis trabibus eueniat, etsi mole pressis. Quid? quod & Abietina tigna in ædificiis ponderi neutiquam cedere, sed cum tempore etiam sursum flexi nobis à peritissimis Archytectis & Carpenteriis relatum sit? de quo tamen amplius perquirendum. Nec dubitamus, si Palmæ arboris caudex secundum rectitudinem in quatuor vel plures diuisuras finderetur, vnamquamque earum quasi in arcum incuruatam iri, haud secus acin rostellis Geranii excicatis euenit, quorum veluti costæ in viridi ac integro adhuc rostro recto ductu cohererent, at maturi aut siccitate fissiscentis atque diuisi filamentorum quorundam vi ita incuruantur partes illæ vt vermiculorum aut serpentum motum flexuosum in eundo spectaculo imitentur. Sed de hac re hunc satis.

## PALMA VINIFERA THEVETI.

CAP. CLX.

**A**rbor est à Palmarum genere, vti refert Scalliget, à vulgari palma differens. Cæditur ad imum trunci: vnde liquor. Aquâ succum temperant: alioqui ebrii futuri. Cùm stillat, dulcissimus est. Seruatus accedit, sapore non ingrato. Mignol vocant. Cardanus describit, quale à Ludouico Mustano accepit. Cæterum neque arborem, vnde eliciatur, neque eius saporem indidem narrat.

Postquam igitur Theuetus in lib. suo de singularibus Gallie Antartice tradidisset, subdit: Promontorium vinde Palmis abundat, ex quibus Syluestres Ethiopes vinum parant, quod vocant Mignol. Est autem hæc palma pulcherrima siue proceritatem, siue perpetuam vinitatem, atque alias speciosæ arboris dotes contempletis. Fert paruos Dactylos austeros & acidos, vt non facile edi possint. Arboris tamen succus gustus suauissimus est, idèd hunc magni faciunt gustu, quemadmodum nos vina generosa. Caudicem ima parte duorum pedum altitudine à terrâ perforant, ita liquor effluit, quem vase terreo ad foraminis altitudine exceptum, & in alia ad id destinata trasfusi, ad vsum referunt. Hoc vinum, vt facilius à corruptione præseruetur, sale aliquantulum coniungunt, quo humiditas illa putredini obnoxia consumatur. Colore vina alba Campaniæ & d'Aniui refert: gustuque est præsuauis, & quouis defruto Cidre Britannis dicto, Pirorūve vino præferendo. Apitissimum est ad ardorem & sitim, cui incolæ obnoxii sunt ob excedentem eius regionis calorem. Eodem Egyptii olim mortuorum cadauera ante quam Balsamo condirent, ter quaterve abluebant, ita tutiora futura existimantes à putrefactione: Eisdem potus vius est in plurimis Aethiopie tribus:

Cogitent verò Lectores an hoc palmæ genus non idem esse possit cum præcedenti, quamvis hoc modo ex illa vinum educi à nullo hæctenus proditum obseruauerimus. Distinctionem tamen etiam ostendit Palmularum exiguitas & sapor acidus, ex quibus tamen vinum fieri vt ex prædictis Dactylis non docet Theuetus.

Consideret item Lector an possit esse illud palmæ genus, quod India profert, [ vt Marth. ex Iosephi Indi navigationibus perhibet, è cuius truncis, excisis consultò ramis, mense Augusto distillat liquor, quem incolæ vasibus excipiunt, ebibuntque suauiter vini vice: verum tamen nisi extoquatur, post triduum in acetum acerrimum desciscit. Ea; propter illum decoquant, vt nos defrutum, sicque hoc modò, velut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resolunt, & diebus viginti artificio quodam percolant, donec optime sit defrutum, atque pellucidum: quo artificio iucundissimus redditur potus, diuque perennat.

*Palma genus ex India.*

*Alia peruranda potum ratum.*

## PALMA GVINEÆ.

- CAP. CLXI.

**I**N Guinea circa metallicas auri venas [ *Cassel de Descriptio Minas nuncupant* ] abundè crescunt arbores ab inquilinis Palmæ appellatæ, altitudine & crassitudine naualis mali, [ ita enim describit Franc. Peninus apud Clusium hist. Aromat. Garcia ] summo salubri o gestantes folia [ foliorum alas intelligit ] deorsum inflexa. 12. aut 15. pedes longa, ætundum ritu incisa: sub his folijs [ ramos aut foliorum alas veriùs appellat ] nascuntur, breuibus pediculis inherentes vix humani capitis magnitudine, in quibus congesti fructus prunis maiores, coloris aurei, quorum nucleos incolæ eximentes contundunt, ex his exit liquor olei lymphidi instar [ cuius paxillum cum nucle ad te mitto speciminis gratia ] oleum de palma ab ipsis appellatus, quem edulis miscunt, ad oculi colorisque gratiam conciliandam. Is liquor huc delatus frigore concreuit butyri instar, coloremque aureum contraxit. Eum liquorem siue oleum qui retulerunt, recentibus vulneribus & artubus contusione læsis vel afflictis illitu leuamen attulisseprehenderunt. Incolæ, terebra perfoliis arboribus ligneum paxillum induunt, ex eo foramine profluit liquor dulcis feri lactis instar, quorum melle syluestri commixto, potionem conficiunt vini de palma appellatione quo liberalius hausto, etiam temulenti fiunt. Arboris materia rubescens, flauis venis distincta, ad fabricas inutilis, quia fissa, tenuibus & gracilibus segmentis dissilit.

*Oleum de palma.*

*Vfus.*

*Modum collegendi.*

*Vinum de palma.*

*Arboris materia.*

## PALMA HUMILIS SEV CHAMAE.

RIPHES.

CAP. CLXII.

*Palmæ humilis Hispanica non spinosa.*

**F**ructus Chamæriphe quos habemus, magnitudine sunt & figura oliuari, triplici cortice obiecti: extimus colore Castaneæ, in rufo nigricans tenuis est: huic alter subiacet crassior, colore cinereo, in fila ductilis: tertius ad nucis moxata colore accedit, nucleum obiectiens duritie cornea, sapore dulcem, album, quem per-

*Descriptio fructus.*

Palma humilis. *Hispanica non spinosa.*



Palma humilis spinosa.



Floris

Cerebrum

Cerebrum

racematim prodeunt, ut ex appicta figura cognoscitur. Pars radici propinqua in globum extuberans internum, gerimen quoddam quod Cerebrum vocant, innumeris ferè inuolutis circumseptum habet, tenerimum, lapidum, & ori grauiusculum, de quo Lobel. Encephalum gula blandimentum, scapus propè radicem ventricosior, crispusque humanum æquans, fistulosus, claudens medullam, qualem editauimus suauis Carduorum gubna.

Palma hoc genus Theophr. *χαμαιψιτος* vocat, de quo sic tradit. Palma autem *χαμαιψιτος* vocata, (humiles vertit Gaza.) aliud quoddam genus est, quasi æquiuocè dictum. Nam exempto cerebro viuunt, & ab radicibus succis repullulant. Fructu quoque ex foliis distant. Sunt enim lato mollique folio : ob id sportulas, regetes & capitibus vmbacula eo contextunt.

Eadem Plin. designasse videtur his verbis : Sunt & cædæ Palmarum quoque sylæ, germinantes rursus ab radice succis. Dulcis medulla earum in cacumine, quod cerebrum appellant : e-

caruat. lineæ rursus breues, ex hisque vna cæteris longior ad centrum pertingit, ut figura nostra ostendit. Folia verò quæ in herbatio notio sicco adstruimus, ita sunt digesta, ut muscarum instar ex pediculo vno ceu manubrio triangulari, non multum caesso, foliorum dense stipatum agmen affurgit, quorum singuli semina latiora, striata, bifida al quando, longitudine ferè sequebuntur in cultratū mucronem designant.

Palma genus humile pumilique, (inquit Marthiol.) quod in Sicilia & Creta copiosissimum provenit : quin etiam in maritimis Senensibus, cubiti cunctitudinem parum excedens, folio cæteris simili, sed longè minore breviorque. Flores edit ex obliquo è capillacea quadam coma emergentes : è quibus baccæ

racematim prodeunt, ut ex appicta figura cognoscitur.

Palma humilis genus Dod. Germ. Heine Palmen. Palma minor Tab. Chamæripes siue reptatrix Palmula Pen. & Lob. quarum Encephalum siue cerebellum Antiquis imprimis commendatum : tota minor est vulgari Palma foliis angustioribus, baccis cerebriosis, minoribus.

Bellonius duas species *Cephalonia*, quam & *Palma abortiuam* vocat, obliuiscit : *Hispanicam* cuius fructus aut cerebrum nautæ in Gallias per maria inuehant, suntque ex ipse Palmæ, quas Insulæ & Aromatari Rotomagenses & Parisienses quatuor aut quinque assibus regis singulas diuendunt : Et alteram *Creticam spinosam*, à modò dicta differt ntem. Hist. Lugd. vtramque depictam dat, his titulis : Palma chamærops Plin. 2. Chamæripes seu Palma humilis Marthiol. Vtramque & nos exhibuimus.

C. Bauh. in libello suo cui titulum fecit, *Animaduersiones in Hist. Lugdunensem*, (quam cepit Dalech. Medicus Lugdunensis, vir Doctissimus, sed quæ à quodam stirpium non suis pe-

temptaque viuunt, quod non alit. Vocatur autem Chamæropes, folio latiori ac molli, ad vitia utilis.

Dioscor. *χαμαιψιτος* vocat. Plerique interpretes humiles Palmas reddunt. *Paralas* quoque dici minus Palmas, & *deiphalas* notant Cael. Rhodig. Annotit quoque Scal. in notis suis ad Theophrast. ad vocem *χαμαιψιτος* in suo codice Pliniano scriptum esse, Chamæropes. Hoc ab *parala* illud ab *parala*. Hermo. neque iulicæ, neque indiciæ sed nescio quid puerile utrumque complexus est illis verbis, abiecit & repentem humi. Idem aliam tradit hanc, & illam quam Dioscor. *χαμαιψιτος* vocat. Neque tamen potest causas adducere : solo quippe nomine posito à Dioscoride. Chamæripes putat idem eadem cum his, quas Siculum vulgus Ciphilionem, & Marthiol. & plerique alii recentiorum Herbariorum vocat, ut patet mox : de quo tamen dubitare videtur Scal. quod Theophrastus vsum ipsius cerebri in cibo non dicit. Ac scire potuit aut debuit, Theophr. perard vires dicere, sed historias potius & causas plantarum t. ad. d. d. quem admodum Dioscor. earum vires.

Coldembergius insignis Pharmocopæus, fructum quem in principio descripsimus & in icona expressimus ad nos misit cum hac inscriptione. Palmis vulgè Hispanorum fructus à Palma est diminutivum : qui sanè rectus villo suo apprimè respondet Lobelii nucula Indice. Sed circa hanc vnicam plantam opinionum quasi mellem, vti nam confusione vacuam, nobis producit Amatus in Cem. ad Dioscor. sic scribens : *Idem hanc vocat, Cephalio, Palmis, Palma agrestis, Hispani Palmis : Ital. & præsertim in Sicilia Cephalion. Quamquam & Encephalos plantas reperiatur parua, à nonnullis Cephalio nuncupata, quam vocem hodie Neapolitani seruant, eam Cephalion nuncupantes, Lusitani verò, simul ac reliqui Hispani Palmam vel Palmam appellant, quam Viues in Colloquiis agrestem Palmam nominat. Heulæ : qui etiam ait, sub persona Ludouici quam introducit, Elatem Dioscor. & Elatem Encephalon Galeni hanc esse plantam. Poitea addit : reuera plantam bulbosam Theophr. lib. 7. h. it. & ex eo Plin. lib. 19. cap. 2. esse Encephalon siue Palmam nostram paruiam. Item addit : de ea Serapio Bdelium confici meminit, quæ Ciphilionem corrupta voce appellat. Palma humilis Garzæ, Gazz. Palma humilis genus Dod. Germ. Heine Palmen. Palma minor Tab. Chamæripes siue reptatrix Palmula Pen. & Lob. quarum Encephalum siue cerebellum Antiquis imprimis commendatum : tota minor est vulgari Palma foliis angustioribus, baccis cerebriosis, minoribus.*

Bellonius duas species *Cephalonia*, quam & *Palma abortiuam* vocat, obliuiscit : *Hispanicam* cuius fructus aut cerebrum nautæ in Gallias per maria inuehant, suntque ex ipse Palmæ, quas Insulæ & Aromatari Rotomagenses & Parisienses quatuor aut quinque assibus regis singulas diuendunt : Et alteram *Creticam spinosam*, à modò dicta differt ntem. Hist. Lugd. vtramque depictam dat, his titulis : Palma chamærops Plin. 2. Chamæripes seu Palma humilis Marthiol. Vtramque & nos exhibuimus.

C. Bauh. in libello suo cui titulum fecit, *Animaduersiones in Hist. Lugdunensem*, (quam cepit Dalech. Medicus Lugdunensis, vir Doctissimus, sed quæ à quodam stirpium non suis pe-

Vitæ folia  
runt  
ad  
Palma.



rito & quamplurimis ignorantiae ac oscitantiae  
nauis conspersa eandem capit quasi vnius plan-  
tae figuras duas & duas penè similes descrip-  
tiones posuerit, posterioremque fuisse iconem as-  
sumendam, tanquam meliorem. Verùm siquidem  
veritati & studio fori vilitati studendum in o-  
mnibus, quantum quidem in nobis fuerit, hanc  
eius censuram neuiquam probare possumus.  
Nam apertè ex Bellonio constat, duas distinctas  
esse species, spinosam Cretensem, qualis pingi-  
tur à Matth. alteram Hispanicam diuersam, quam  
existimamus per Dalechampium bene depictam,  
qualem aliquando obseruauimus in horto Pata-  
uino, iuxta domum in angulo ferè, spinis caren-  
tem, & quatenus ex ipsiis ramis ex illa auiis,  
quos adhuc habemus, diiudicare possumus, diffe-  
rentes à pictura Matthioli. Palmam humilem spi-  
nosam nos existimamus à Cordo in silua Obser-  
malè pro herba his verbis tradi. Phleon palustris  
herba, aculeata sub foliorum exortu : foliis Ha-  
rundineis ab vno principio in ventiliabii figuram  
explicitis. Affertur ex Italia cum sarcinis aliarum,  
idque casu.

Chamaeriphes Theoph. seu vt Plin. vocat Cha-  
maeropes, vtriusque authoribus in Creta insula a-  
bundè proueniunt, atque etiam inuuldè plures in  
Sicilia. Plurimas quoque gignunt maritima Se-  
nensis, sed pumilas : quibus paulò maiores illae  
quae ex Sicilia Neapolim inuehuntur, teste Mat-  
thiol. In monte nigro Pisenium notissimi Cesa-  
ghioni. Anguill. atque adèd plerique Hispaniae,  
Gallo-provinciae & Italiae maritimis vt obserua-  
runt Pen. & Lob. Eundem potissimum in Baetica  
regione & Algarbia Lusitaniae parte, magnus est  
prouentus. Ex quibus regionibus, teste Amato  
Antuerpiam magna inuehitur copia, vbi in maxi-  
mis habetur deliciis, nec nisi Optimatibus aut  
Principibus praesentatur, quum cibus sit delica-  
tissimus, luauis, ventriculo gratus, multum geni-  
talis seminis gignens, qua ratione ab illis multum  
desideratur. Celsalp. notat, spontè oriri in scopu-  
lis maritimis insulae Iux, & Palmeola vocata in-  
sula illi contermina. In plusculis etiam Italiae hor-  
tis, speciatim Bononiæ in horto quodam. Fructus  
& ramos inter *quosdam* nostra adseruamus. Sed  
fructus, quamuis recens & integer videbatur, à  
nobis satus Montb. non prouenit.

Iam supra dictum ex Theoph. folia sportulis,  
tegetibus & capitis vimbraulis texendis vsu  
praebere. Diosc. huius nucleis easdem vires tri-  
buit quas nucleis Palmarum, atque ad omnia ea  
aptissimos esse Aegyptios nucleos qui ex humili-  
bus palmis decerpuntur. Idèd Lectorem ad eum  
locum remittimus. Nonnulli huius Palmæ cere-  
bro easdem vires tribuunt, quod Gal. ex differen-  
tibus partibus constare tradit, aequa videlicet  
quadam substantia tepida, & altera terrestri frigida :  
proinde humidum esse, & cum adstrictione  
quadam refrigerans. In cibo sumptum crudos  
humores ac flatus gignit : atque idcirco cum sale  
& Pipere edi conducibile est. Pars tuberosa iux-  
ta radicem, inquit Matth. tenerima lapida & ori-  
gratissima : adstringenti pollet facultate : itaque  
roborat & cohibet. Germen quod cerebrum vo-  
cant, estur secundis mensis pro bellariis, cardui  
esculenti modo cum Pipere & salis momento. Ar-  
ridet enim maximè gustui. Id [ vt alqui aiunt ]  
ad Venerem excitandam haud parum praestare  
creditur. Cardanus eius substantiam carneam di-  
cit, candidam, solidam, sed partem imam quae ra-  
dici iungitur mandi solitam. Sarculi, qui Palmæ

folia referunt, candidi & ipsi, sed lignosi, non a-  
pti cibo. Rami quadragesimali tempore defun-  
tur venales per totam ferè Italiam, ad exornan-  
dos Oleæ ramos varioque plexu conuertiendos,  
qui sacra palmarum die ab omnibus in templis  
gestantur. Praestant idem ad sportulas, tegetes,  
[ etiamnum hodie aequè ac Theophr. seculo. ] &  
scopas parandas : sunt enim ad verrendas domos  
rami vni cum foliis ad scopas parandas, non so-  
lum peridonei, sed etiam viles, quod non con-  
fringantur, nisi tempore longo. Cætera cum ma-  
iori palma communia habet. Baccæ sua adlirin-  
genti vi, dantur contra omnes corporis fluxio-  
nes. Palmarum tuberosæ radicis Scal. concretio-  
nem pinguem dicit, & tuberculeam medullam in-  
tus : gustum gratum asuetis. In Sicilia & ora Æ-  
tica maritima magna vis caditur, quæ Romam af-  
fertur magna ex parte quadragesimæ ieiuniis ve-  
nalis : alioqui verius sunt gulæ blandimenta  
quàm cibus, gustu ferè Carduorum. Aegypti ru-  
stici quoque cerebrum magna copia cadunt in  
campis, & Alexandriam vendendum important,  
vbi crudum manditur, sapore iam dicto, teste Bel-  
lonio.

CHAMAERIPHE PEREGRINA.

C A P. CLXIII.



Petrus Gare-  
tus mittebat  
Clus. peregrinæ  
cuiusdam humi-  
lis palmæ ramū,  
qui erat pedem  
romanum lon-  
gus, vel maior,  
quadragesis aut  
pluribus virgis  
præditus, fulci  
coloris, ineguali-  
bus & frequen-  
tissima vestigia  
reuerentibus, in  
quibus læsser e  
flores, aut fru-  
ctus rudimenta,  
contortis infimā  
parte, vt faciliè  
appareret, aliquo  
innolucro siue

spatha fuisse tectas : prodibat verò hic ramus ex  
denso quodam cortice semunciam alto, quatuor  
autem vel plures uncias lato, & lunato, sui flauo  
coloris, pronà quidem & supinà parte læti, sed  
ipsa corticis materiā è multis transuersis fibris  
constante, us penè similibus quæ in magnarum  
illarum nucum Indicarum, quas vulgò *Cocos* ap-  
pellant, tegumento conspiciuntur, aut quæ hu-  
milium palmarum germina, à plerisque in deli-  
ciis habita, vestiunt.

Nautæ à quibus repertus fuerat hic ramus, se  
in altissimo quodam scopulo, è mediis maris ca-  
put attollente, nascentem reperisse & rescidisse  
affirmabant : faciliè nihilominus mihi persuase-  
rim, non in scopulo marino, verum in aliqua  
insula, ad quam appulissent, reperisse, & ex af-  
bore vel frutice detraxisse, & tegmen ad-  
misse, vt obseruare possent quid sub  
illo latèret.

## CHAMÆRIPHES FORTE FOLIVM.

## CAP. CLXIV.

**C**VM Chamæriphe superioris furculo mittebat idem Gareus folium, ab amico acceptum commodatò, ut illud conspiceret, atque etiam, si vellem, describere possem. Admirationem autem mihi pariebat, quòd adsciberet, illum, qui ipsi hoc folium mutuo dederat, adfirmare Nymphææ esse in Moluccis insulis natæ, & supra aqua haud secus spargi, quàm nostræ Nymphææ folia: illiusque florem non esse nostratis flori dissimilem, ei præsertim qui candidus est, sed colore dumtaxat differre, hoc est, non album esse, sed caruleum. Ex illo autem folio concinnatum erat flabellum ad ventulum faciendum, atque ex duplicata pediculi eius parte manubrium confectum, quod manu teneri posset.

Descript.

Huius porro flabelli ambitus erat trium pedum & novem vnciarum: Longitudo ad manubrium usque, siue ad folii pediculum, duodecim vnciarum, latitudo quàm maximè patebat, tredecim vnciarum: manubrii ex ipsius folii pediculo duplicato confecti, & vimineo vinculo adstricti, ut commodius manu teneri posset, longitudo, quinque vnciarum. Istius folii prona pars crassior nerviū ostendebat, per medium folium secundum longitudinem procurrentem, ex quo oriebantur alii minores in latera expansi: ab vno quiddam latere viginti tres, ab altero autè viginti quatuor: supina pars totidem plicaturas, quàm ad eò de causâ suspicio mihi oriebatur non esse Nymphææ sed Chamæriphe alicuius generis potius folium, quodque non in aquatica planta, sed in terrestri natum esset, qualis fortè illa, quam Bataui in insula Meariti nascentem obseruabant, habentem [ut illius navigationis diarium refert] tam ampla folia, ut vnicò quispam sese tegere, & ab imbre præseruare posset: pictura similiter quæ in eo diario addita, tametsi ruditer expressa, meam suspicionem confirmare videbatur. Folii autem, ex quo flabellum concinnatum, color, flauus erat, qualis in culmis maturæ segetis conspicitur, parte tamen supinâ splendori quàm pronâ in foliis verò ambitu, ad illud expansum retinendum, annexus erat vimineus limbus, illi penè similis quo manubrium adstrictum, rubro tamen colore infectus.

Nymphææ  
folium non  
est.

folium.

## PALMA HUMILIS PAPYRACEA ET DE PAPHO EX PALMIS.

## CAP. CLXV.

**S**VNT & humilia Palmæta, folio tam polita superficie, ut eo pro chartis vti viderentur ad scribendum in prouincia Mangi: alterius arboris usus idem. Talis dicitur Scalig. Palmarum folia olim Papyri vsum præstitisse, cum Plinius ex Varrone, tum alii plures auctores, (qui ferè eorum mos esse solet, ut quæ primùm data porta est, præcipites, & posteritatis nimis secuti scriptores, irruant,) tradunt: verum quæ sit illa Palmæ species, nemo hæcenus, quod equidem sciamus, proprius atque distinctus exposuit, quàm Maffæus & Scaliger: hinc fortè, ut coniecere est, ex relatione aliorum. Nam si eam notam habuisset, (quæ fuit eius viri erudiendæ posteritatis inimitabilis propemodum sagacitas) indubie dicto lemmate declarasset.

Descriptio  
Papyracea  
arbor Tal.

Humilium palmætorum folia polita dicit, utiis pro charta vti viderentur ad scribendum. Sed prius adfirmat Plinium.

Hic lib. xiii. cap. xi. postquam de Aegyptiis arboribus, atque inter eas sanè ad longum & eleganter de Palmarum natura ac differentiis differuisset, sic inquit. Priusquam digrediamur ab Aegypto & Papyri natura dicetur, cum chartæ usu maximè humanitas vitæ constet, & memoria. Et hanc Alexandri Magni victoriam repertam, auctor est M. Varro condita in Aegypto Alexandria. Antèa non fuisse chartarum vsum: in Palmarum foliis primò scripturam: deinde quorundam arborum libris.

Hæc Plin. de charta ex Palma.

Testatur quidem Io. Linfchottanus in suis narrationibus Indicis, ex eo Palmæ genere, quam Nucem Indicam vulgò vocant Chartam Indos habere, verum non ex foliis, sed ex interiori medulla arboris, [fortè hæc vna earum est, quarum libris deinde scripturam Plin. dixit.] eam esse, omnèque libros Indiæ ex hac materia, natura producente in ipsa arbore plicas ad distinctionem foliorum.

At Maffæus in sua historia Indica apertè ait, eius Palmæ, cuius fructum Nucem Indicam Lusitani dixerunt, [de qua nos post folia libraris pro Papyro esse, & loco tegularum imposita domibus arcere imbres, tum etiam in vestes forma facili simul ac spisso contextu necesse. Verum hæc nec Palma humilis est de qua loquitur Scaliger, nec eius folia adeò lata ab Autoribus traduntur, (immo Palmæ vulgatæ aut arundinis similia ait Garcias, Clus. simpliciter Palmæ comparat foliis, quæ sanè cultrata sunt & petangula. A Costa ne foliorum quidem meminit in sua descriptione.) ut chartæ vices supplere queant. Adde quod Plin. suam Palmam, in Aegypto nasci satis manifestè declarat, in quo nemo auctorum, quod nobis quidem constat, Nucem Indicam dictam nasci prodit.

Quas fortè difficultatès subolfaciens Doctissimus Guilandinus in eruditissimo illo suo opusculo de Papyro, [quod commentarii vice scripsit in Plinii caput de Papyro.] ipud Plin. pro Palmarum foliis, Maluarum foliis, quoniam olim, ut ille putat, in Maluarum foliis scribebatur. Huius suæ audaciæ [sic enim vocat] non vnam causam prætexit, sed quod apud nomen Varro antiquiorem comperit, Palmarum folia ad vsum scribendi aliquando accommodata fuisse: tum quòd natura asperiora, durioraque sunt, quam ut commodè in eum vsum recipi queant, tum verò quòd arundinea passim obuia subrogari præstabat. Palmæ frondem Suetonius Trāquillus durā & asperam dixit. Accedit [addit Guil.] ad gratiam quòd Maluarum folia rectius opponuntur arborum libris, quàm folia Palmarum, quæ & ipsæ arbores sunt: præterquàm quòd Cinna antiquus Poeta, cuius Catullus & Seruius meminere, in Maluarum foliis scripturam indicat. Adducit præterea Guilandinus tetrastychon ex lib. vi. Isidori, (quos vid. infra, Cap. de Malua) quibus dicitur, carmina Maluæ libello scripta fuisse. Hæc Guilandinus sunt rationes quibus apud Plin. in Maluarum foliis primò scripturam fuisse, legendum indicat: quamvis & alios versus, ex Virgil. iii. Aeneidos, ubi de Sibylla canit: ut ex lib. vi. eiusdem: Iuuenalis item Satyr. viii. in eum sensum quasi vi trahere conatur, in quibus tamen omnibus ne verbum quidem aut significatione aliqua Maluæ sit mentio, sed simpliciter foliorum, quasi uerò Sibyllæ folia fuerint Maluæ?

Suspiciatur denique etiam huc respexisse Pythagoram



goram, quando sanctissimum esse folium <sup>uero dicitur</sup> id est, Maluz dicebat. Sed hæ meræ sunt coniecturæ, & nostro quidem iudicio, in veritate reique natura parum fundatæ. Nam quotusquisque credat in Maluz folio tam fragili tam molli, [unde & nomen accepit] atque vno verbo, tam ad libros & scripturam inepto, vquam scripturatum fuisse, aut quod scripturæ vel libri titulum mereatur, ex eo vquam desumi potuisse? Sume quamcunque roles Maluz speciem, etiam arborescens, cuius folia latissima, sed hirsuta, ideoque scriptio ni inepta, & in eius folio scribendi periculum fac, & habeas tibi si lubet bullam pro libro. Eodem sanè iure plurimorum aliorum foliorum pro charta vsus esse possit. Nec dubitandum, & id Herbariorum consensus approbat, Veterum Maluam ad nos etiam pertigisse. Aut si ipsè quoque Guilandinus aliam cognovit ad eum vsum aptiorem, cur nos non docuit? Cur non declaravit modum? At Isidorus, inquit, hoc versibus Cinnæ expressit: At his opponimus viros grauissimos Varronem & Plinium. Enimvero sanè tanti facinus Poetas illos in re herbaria, quanti hos authores in Theologia, in qua si claruit Isidorus, non ideo claruit in hoc studio. Et malimus sanè apud istos Poetas & Isidorum emendare Palmæ, quam apud Varr. & Plin. Maluz.

Sed cur non Varronem quoque emendauit Guilandinus, apud quem tamen ipsemet fatetur legi, priscam illam hominum ætatem, nec dum satis exculatam, atque politam, suas literas exarasse. Quod verò obicit, Palmæ folia naturâ asperiora durioraque esse, quàm vt commodè in eum vsum recipi queant: hoc de vulgari intelligendum, quæ Dactylos fert, & olim in victoriis celebrata fuit, cuiusque folia nobis planè inepta ad eum vsum videntur: non verò de omni palma, aut saltem non de iis, quas ex Scaligero, Massæo, & Linschottano chartæ vsum suppeditare diximus.

Siue igitur aliqua harum apud Plin. intelligenda sit, siue alia aliqua, quæ nondum nobis innotuit. Statuamus etiamnum Palmarum foliis [neutrumque Maluarum] legendum, maxime cum suppetant Palmæ, quæ eum vsum præstent, donec aliquis prodeat, qui nos clariora doceat ac certiora.

Non tacendum hoc loco quod idem Guiland. ex Anacreonte, Alceo, Aeschilo, Comicis Veteribus, Platone, Aristotele probat, Papyrus siue Byblum cognitam quidem fuisse, antequam nasceretur Alexander, verum in vsu frequenti & publico fuisse, Alexandri seculo. Quare non eius tempore reperta primum charta, sicut Plin. ait. Quin & Lopez in hist. Ind. tradit Indos Palmæ foliis res memorabiles & instrumenta inscribere solere, vt fusiùs declarabitur cap. de Nuce Indica, ubi priùs quasdam alias Papyracearum arborum historias interseruerimus.

## PALMÆ INDICAE GENVS LANTOR

DICTIONVM.

C A P. CLXVI.

SCRIBIT Linschottanus in hist. Ind. Orient. Cocci seu Palmæ quatuor genera vniuersam propemodum Indiam Orientalem alere: quartum autem genus, lingua Malayuica Lantor vocari, fructum ferre exiguum, magnitudine Cerasi, colore qualis Arantiorum, nucleum intus continen-

Tom. I.

tem, quem Coccus nuncupent. Ex hoc fructu perelegans fieri oleum, colore Arantii, esui iucundum admodumque salubre assuetis. Esse qui hanc speciem Nuci Indicæ antè dictæ foeminam faciant. Vtramque reperi in Gufinæa. Ex quarta hac specie [addit idem] Indi suam chartam parant ad scriptonem & libros. Et quamuis omnes eæ quatuor supradictæ species conueniant similitudine foliorum, quippe quæ folii arundinis speciem quodammodo ferunt, qualia etiam quædam ex India, Palæstina & Syria ad nos importantur: nihilominus tamen quarti huius generis folia cæteris ad scripturam aptiora commendabiliora sunt.

Bry quoque fratres in eiusdem hist. annotant, Lantor genus esse Coccus Indis dicti, seu nucum Indicarum. Folia viri longitudinem æquare, quibus Indi chartæ loco vtantur. Arboris figuram Palmæ nonnihil similem esse. Cæterum quia Linschottanus ait, fructum eius esse Cerasi magnitudine, memoriæ subit ea species palmæ, cuius meminit Theophr. lib. 2. cap. 3. eam fructus ferre minutos inquit, Cicerum magnitudine <sup>maximè nuci</sup> xoris & pegivdræ. Dixerat autem paulò antè, colore quosdam esse flauos. Sed in tanta breuitate nihil statuere licet.

Capite de nuce Indica maiore, ex Ferdinando Lopez: Facta mentio Olæ, siue Palmule foliorum, quibus Indi inscribunt res memorabiles. Hic Clusius apud Garciam in post. edit. subiungit: Similia folia cum integra, tum per medium secundum longitudinem secta, Malacensisibusque characteribus inscripta ab Hollandis ex Iaua sunt relata, anno 1597. quorum bina Petri Gareti operâ, nasciscebantur, cubitalis longitudinis, extremitatibus tamen recisis [nam integra bicubitalia aut longiora sunt] secundum medium neruum per longitudinem excurrentem complicata, & binas ferè vncias lata, vtroque latere exteriore secundum longitudinem tribus versibus inscripta: videbam & quæ quatuor versus inscriptos haberent, præterea librum sex & septuaginta foliis constantem, non integris quidem, sed quæ extremitatibus recisis, per medium folium secundum nerui longitudinem secta, ytrinque quatuor versibus stylo ferreo exarata essent, vt apud illos moris est, tribus locis pertuso, in medio videlicet, & duabus extremitatibus, funiculo traiecta, aptatis vtrinque binis asserculis, quibus contracto funiculo tegeantur. Sed & ea folia quæ nasciscebantur, & aliquot alia, quæ apud diuersos conspiciebam, ab vna extremitate pertusa erant, & caractere quopiam in capite notata, vt funiculo connexorum series dignosci posset. Intelligebam portò ab ipsis Indis, hos characteres nostro more exarari, hoc est à sinistra ad dexteram ducto stylo, non Hebræorum aut Arabum, qui à dextra ad sinistram scribendo calamus ducunt: sed [quod dolebam] nullus istorum Indorum, qui in diuersis Prouinciis, vt Guzarate, Malabar, Iaua, & Madagascar erant nati, legere, aut scribere norat, vt characterum aliquam notitiam assequi possem, præter vnum Sinensem, ex Cantan oriundum, quem, meo rogatu, pingentem quosdam Sineses characteres, integram dictionem denotantes conspiciebam, à summa pagina ad infimam, sumpto initio à dextro latere pagine, deinde seruato eodem ordine in singulis versibus, ad sinistram procedendo, Sinenfium vsitatu more, illorum enim scribendi rationem intelligere volebam. Ea autem folia illius Palmæ non erant, quæ Coccus siue prægrandes illas nuces fert, sed

Nux Indica summa.

Charta.

Arundinis folio.

Lantor Coccus genus.

An Palma Ciceris magnitudinis fructum ferens Theophr?

Locus. Descriptio

Palma Coccus ferens folia non sum.

*Lantor.* peculiaris illius generis palma, quæ à Iauæ Incolis Lantor appellatur.

ARECHÆ ARBORIS FRUCTVS  
COFFOLO.

CAP. CLXVII.

*Coffolo.  
Arecha.*

**E**Dere suenerunt, autore Ludou. Rom. lib. nauig. Calchuti fructum quendam, cui *Coffolo* nomen est: hunc mittit arbor *Arecha* nomine, Palma non abstinulis, quæ Cariotas gignit etiam non abstiniles. Hæc arbor, cuiusque fructus qualis indagent Posterit.

PAPYRVS VETERVM PALVDANO.

CAP. CLXVIII.

**Descriptio** Papyri Veterum nomine à Cl. Paludano missum seu folii Arundinacei speciem quandam representat. Est illud tres cubitos longum, nec tamen integrum, vt ex extremitatum laceratione apparet, seiscunciam latum, crassitudine pergameni crassioris, colore paleaceo, & nonnihil ad cinereum tendente. Fibrarum stamina canabinis similia, fragiliora tamen, utraque facie per rectitudinem decurrunt, sine vlla tamen costarum striarumque eminentia, quæ subtegminis vice alia transuersæ intercurrunt, ac vtrique membranz suæ tenuitatis leuissima quædam ac vix conspicua, stylo tamen perceptibilia, vestigia imprimunt. Quæ textura porosa quadam medulla farcitur. Stylo supra scriptisimus, sed descriptioni impedimentum aliquod obiecerunt intertexta stamina & fungosus folii habitus. Nec apparebant characteres nisi salua, velaqua madefacti & affricti. Quo facto, legibiles illic apparent.

*Varietas.*

Eiusdem faciei foliaceum quiddam splendidius ac lauius, [non tamen diuersum, vti putamus, quamuis paulò latius, & ni fallimur, naturali sua latitudine] ab eodem accepimus, vtrique nigris litteris Arabicis, ni fallimur quales aliquando vidimus, aut certe his similibus insculptum acuto quodam stylo, quatuor linearum ordine, nobis sanè gratissimum vetustatis monumentum. Iudicium peritioribus relinquimus cuius plantæ possint esse ista folia. Fit quidem cap. de Nuce Indica mentio Chartæ à Linschottano D. Paludano missæ: verùm eandem asserere hæc folia temerarium nobis videtur.

PAPYRACEA ARBOR TAL.

CAP. CLXIX.

*Descriptio*

*Fructus.*

*V'gnetal.*

**D**E Papyracea arbore *Tal*, cuius mentionem fecimus cap. de Palma humili Papyracea ex Scaligero, quæ in provincia Lagni prouenit, hæc scribit Theuetus in sua Cosmog. In provincia Magni est arbor *Tal* nomine, folio grandi, quod chartæ vsum præbet in tota India. Fructus profert magnis Napis similes. Quod cortici subest, tenerum est, dulce, esu gratum. Cortex tamen melior & suauior à quibusdam *V'gnetal* nominatur.

PAPYRACEA ARBOR GVAIABARA.

CAP. CLXX.



**P**apyracea Arbor minor Ouiedi in Insula Hispaniola proueniens *Gvaiabara* Barbaris dicta, Hispanis *Vuero*, ab *vua*, quod pro fructu *vua*s ferat. Materia est rubefcente, rotunda, densa, atque ideò optima, præsertim ad carbonem ramis expansis. *Vuas* edit rariùs sparsas, atque à sele distatas, Moris ferè

concolores, exigua earum parte esculenta: nam acini sunt Auellanz nuci magnitudine, nucleum tam crassum concludentes, vt parum carnis supersit. Folii figuram hic depictam videtis, ab aliarum arborum foliis planè diuersam, atque ideò memoratu dignam. Maximum palmæ manus magnitudine par est, dempto pediculo. Id Hispanis in insula Hispaniola & finitimis bellum gerentibus Papyri & atramenti vsum præbebat. Tota enim hæc regio charta ad scribendum & atramento prorsus caret. Folium istud viride est, aliquando rubrum, crassum & æquè spissum, ac esse possent duo Hedera folia simul iuncta. In parte tam prona quàm supina literas pingebant acicula, aut stylo aliquo, modò recens esset, & eodem die decerptum, quæ candida apparebant, aut ita diuersi à folio coloris, vt facillè legi possent: neque enim folium literas transmittit: & costa per medium eius excurrens, etsi crassiuscula sit, tamen venulæ ab ea deductæ sunt tenues, vt scribentis manum parum aut nihil remouentur.

An M. Fumee hist. Ind. Occid. gen. lib. 1. cap. 1. *Guibaras* fructus habens nucleum? An Lerio cap. 13. *Arbor Bresilia proueniens*, cuius folia testili crassiora.

PAPYRACEA ARBOR COPEIA.

CAP. CLXXI.

**P**etrus Martir de rebus Oceani & noui orbis, Dec. lib. 8. E Copeia [inquit] arbore, pax non aliter legitur, quàm ex Pinu, licet dicant plerique stillicidio colligi, comburendo eius lignum. Fructus autem eius parvus est, vti Prunum, cuius satis aptum. Arborem esse hanc existimandum est, cuius foliis, Chaldaei literarum primi repertores, conceptus mentis absentibus significabant, priusquam vsus chartæ repeniretur. Spithameum est latitudine folium, rotundumque ferè: acu autem stylo



Stylo quouis ferreo siue ligneo inscribunt, non ineptius quàm chartæ.

M. Fumee in Hist. Gen. Ind. Occid. Gallicè scripta lib. 3. c. 95. *Copei* in *Beruey* insula Indiæ, arbor ferens Camphoram. Item l. 1. c. 34. Cum stylo scribitur supra folia *Copei*, & ex iis sunt chartæ luforiæ. Papyracea arbor altera maior [ inquit Hist. Lugd. ] Oniedo l. 8. c. 14. in Insula Hispaniola proveniens, *Copei* nuncupata, *Guibara* procerior, folio specie quidem simili, sed duplo maiore, crassiore, & ad scribendum aptiore cum acicula, aut stylo aliquo, venulæque exiliores sunt, quàm superiores, & minus scribenti impedimentum adferunt. Quamobrem cum Hispaniolam & cæteras insulas Hispani subiugarent iis foliis chartarum luforiarum vice utebantur, quòd in iis Regum, Reginarum, Equorum, & aliorum huiusmodi figuras faciliè imprimerent, nec faciliè rumperentur.

Ex hac fortè papyracea arbore moneta illa fiebat, quæ, tradente Fr. Hauhono Armeno lib. de Tartaris cap. 1. in regni Cachay partibus expendebatur, quæ formâ quadrata regalique signo erat signata, secundum quod moneta maioris pretii habebatur vel minoris: hæc, si quando timebatur per vetustatem corruptam iri, à postfessore ad regalem curiam deportabatur, inibi que mutabatur. Eicon cum alia habetur capite præcedenti 170.

PAPYRACEA ARBOR, AMPLISSIMO  
ET TENNISSIMO FOLIO.

Nic. Costinus in Itinerario prodidit, haud procul ab vrbe Cæli nasci arborem sine fructu, cuius folia sex brachia sunt longa, totidem lata, adèd tenuia, vt compressa comprehendi manu possint, quibus chartæ vice vruntur ad scribendum & ad pluuiam arcendam: folio enim expanso, tres quatuorve in Itinere ita operiuntur, vt pluuiam non metuant.

PAPYRVS ARBOREA TENNISSIMA,  
EX IAVA.

CAP. CLXXII.

Ibrum arboris scribit Clus. habuisse se tenuissimam membranæ instar candidum, quo omnis generis scriptura perinde atque vulgari Papyro excipi queat. Eum in Iava Insula aliarum mercium permutatione Drake comites acceperant.

Huius arboris [ inquit Clusius Exot. ] ni fallor meminit Antonius Pigafetta in suo Itinerario, vbi refert Insulæ Tidore scæminas pudenda tegere panno, è libro arboris hac ratione confecto. Delibratur cortex, & aquâ maceratus donec mollescat, ligno tunditur, atque qualibet longitudine ac latitudine diducitur, adèd tenuiter, vt sericei veli instar, venis transversim discurrentibus contextus videatur.

PAPYRACEA ARBOR, CUIVS LIBER  
SYBPNICEI COLORIS.  
CAP. CLXXIII.

Elegantissimus arboris liber, quem ab honestissimo viro Willhelmo Parduyn anno 1599. Tom. I.

accipiebat Clus. licèt non albi esset coloris, sed subpuniciei. Erat autem illius Libri fragmentum [ à quo plus dimidiâ parte resectum fuisse arbitror ] pedalis ferè longitudinis, quatuor vncias latum, adèd læuis vbique & æqualis superficiei, vt ne charta quidem scriptoria magis æqualis sit: id, tametsi neque densum, neque crassum, in sex tamen pagellas nulla difficultate separare poteram, quæ perbellè scripturam admitterent, perinde ac charta scriptoria, nec atramentura transmitterent. Et si quis maiorem curam in separando adhibere voluisset, in plures adhuc pagellas haud dubiè diuidere potuisset. Similem etiam pagellam, latiore & longiore, aliquando accipere memini à Iacobo Gareto, quâ inuoluta erant Tabaci folia, quemadmodum inuoluere solent nonnulli Americani, dum, vt eius fumum hautiant, tubum ab altera extremitate incendunt.

Tabaci inuolutum.

Non absre fuerit hoc loco *mapisoy* aspergere, sanè annotatione dignissimum, siquidem foliorum Papyraceorum tenuissimorum mentio incidit. Anno salutis 1602. Circa Calend. Martii Huldricum Christianum, puerum 12. annorum, I. Christoph. Zenger Ill. E. C. VVirtemb. Cancellarij Montbelgardenis ex coniuge nepotem, febre maligna etiamque phrenitide periculossimâ, aliisque grauissimis Symptomate stipatâ, à me Dei Gratia perfanatum fuisse: cui sub morbi declinationem vniuersi corporis Epidermis seu cuticula tanta facilitate abcessit, vt pedales etiamque ampliores, quales adhuc adseruamus auulserit ipse puer, absque vilo dolore, non sine adstantium admiratione. His quoque [ si chartis cutis humana accensenda ] nullo negotio inscripsimus: quod hic annotare placuit, vt habeant sagaces Medici, quod philosophentur.

PALMA INDICA NUCIFERA.

CAP. CLXXIV.

Palma nucifera arbor.

Fructus qui Nucis Indicæ nomine ad nos adfertur, interdum humani capitis magnitudinem æquat, aut etiam superat, interdum magnitudine oui Struthii, qualem & nos habemus, & aliam Cygni ouo vix maiorem: figura cucurbitina, aut Melonis, nisi quòd, tot angulis non sit donatus, sed ex rotundo triquetrus magna ex parte, duplici eortice obiectus, extimo crasso, carnoso, crassitudine digitali superficiei tenus neruis quibusdam per longitudinem perceptantibus, ac si ex meris fibris esset congestus, quemadmodum tota eius crassitudo, colore ex fusco cinereo

Descriptio fructus.



li 2

Nux Indica.



Palmæ Elephantis Acoſta.



ginosus, recens lapidus, subdulcis, inueteratus rancidus, in medio concavus: in quo maturo ac recenti liquor gustu suavi ac dulci continetur, qui ætate acescit ac rancescit, donec tandem penitus concreſcat & exiccetur.

Oſſeus cortex diligenter politus & argento decoratus apud plurimos hodie speciosi poculi vice in conuiuia venit, quale & nos habemus munere Ill. E. C. Wirtemb.

Arbor ipsa, autore Garcia, vaſta est magnitudinis foliis Palmæ aut Arundini ſimilibus, aliquantulum tamen latioribus: flore Caſtanæ, materia fungoſa & ferulacea. Traderit quoque Coſta, præalta est arbor, & recta, nec admodum craſſa, præſertim in ſaſtigio: ham ab in ſimo ad ſummum paulatim gracileſcit, & colore cinereo est: truncum à radicibus ad ſaſtigium vſque paruis, quaſi gradibus circumdant rami, qui aſcenſuris ſcalarum vicem præbeant: ſlos Caſtanæ ſimilis: fructus vero integer capite humano maior, forma oblongiore, trianguli, & colore viridi, admodum diluto. Cocco ſerentem arborem inquit Cluſ. apud Garciam palmæ modo creſcere & in altum extolli,

Deſcriptio  
arboris.  
Folia  
Flores.

Fructus.

extrinſecus intus coloris ruſſeſcentis & æruginofi, ſimili medulla puluerulenta ſarcto, quæ ſiccata aut vetuſtior reddita, vel leui attritu in pulcrem ſaſcit. Ab hoc proximè ſubeſt alius ſolidus, ac propemodum oſſeus, triquetrus quoque, anterioris barbatus & inſigni foramine peruius, iuxta quod adhuc alia duo impreſſa conſpiciuntur, vt laræ alicuius effigiem quodammodo æmulètur, prædicto concolor, cuique plurimi prædictorum villorum inſerti conſpiciuntur, ex quorum concurſu dicta barba reſultat, interna ſubſtantia ſuſcus & ſubniger. Nucleus in hoc continetur, totam eius cavitatem proportionaliter explens, cùm recens est: [ vt Cordus ånotat ] ſiccatus verò, conculſa nuce mouetur. Color ei est in rugoſa ſuperficie ſulcus, intus albus, olea-

ex Fabricii Mordentis Salernitani aſcorumue rolatu, qui eam naſcentem conſpexerunt, intelligebam: eius autem caudicem minimè ſcabro, vt Palmæ Daſtyliſeræ, ſed leui cortice eſſe præditi. Eam ob cauſam vinculis ligaturique ex ſpartho aut alia ſimilia materia conſtantibus per interualla ſubinde cingi ſolere, eaque vincula, ferreis clauis trunco interdum adhiſci, vt firmius hæreant, facilioremque aſcenſum præbent: alioqui difficile omnino ſcandi poſſe, niſi laqueis pedibus apertis. Eius ramos, vt in Palma, deorſum inſecti, arcus inſtar, dorſoq; eſſe eminentiore oris vtrinque in anteriorem ſive ſupernam partem vergentibus, vnde folia naſcuntur Palmæ ſimilia. Ex inferiorum ramorum, quæ caudici in hærent, aliſ, alios enaſci ramos, qui quinas & ſenas proferunt Nuces craſſas (ſimò etiam multò plures, interdum vſque ad vigenas, quemadmodum mihi Amſtredami anno 1597. referebant Indi eodem anno è laua maiore aduecti) ſuo multiplici denſoque velamine teſtas. Porro ad eò vicinas interdum ſolère creſcere Areæ & Cocciferæ Palmæ arbores aiebat Fabricius, vt illarum rami mutuò ſeſe implicantes, pulcherrima vmbracula præberent ad Solis radios æſtûſque arcendos. In his etiam commemorantur plerumque Simiz & Cercopitheci, perque ramos ex vna arbore in alteram tranſcendunt, venatorum qui eas perſequuntur conatus ea ratione ſubinde eludentes.

Illarum autem arborum materies non eſt fungoſa, vt Palmæ illius quæ Daſtylos fert, neque ferulacea, vt Garciaſ aſſerit, ſed ſolida & ad fabricas idonea: neque minis elegans eſt & ſplèdens, quàm Iuglandis materia: & ipſemet paulò poſt, materiem ad plurima vilem eſſe fatetur.

Eandem arborem & hiftoriam eius pereleganter tradit Scaliger, in hunc modum. Coccum ſerens palma trunco eſt recto, procero, excelsæ altitudinis, ad ſumma vſque in orbem ſeſe effundentium ramorum initia in offeſe læuitatis. Palmæ ſolium, quo tegunt ædes ſacris ex eo ſloriis, certo aduerſus iniurias cæli munimento, ſenum menſium vilitate. Conſertim gerit fructum, palmarum more, ſingulæ ad centenas, duce naſce nuces. Medulla recens eſt ſuauis eſt, tum per ſe, tum loco panis cum obſonio, Sapor Amygdali, ſed iucundior. E ſicca farinam faciunt, atque ex ea panem. Tegitur medulla cortice proximo ad carbonum uſum accommodato. Aurifices ſibi præcipuum habent. Vrant etiam ac cineres legunt ad medicamenta. Extinum corium multis in uolucris quaſi ſtupcis, craſſiſſimum ita interpolatur, vt ex eo tanquam Goſſypium fiat: cuius tenuiſſimam partem ad pannos præparant, ſericis non ignobiliores. Quod reliquum eſt, nent ad funiculos: è quibus deinde complexis, rudentes componunt. Eius ſilum Cambaia vocant Indi. Vbi nux prodire, atque conſiſtere incipit, ſimul intus aqua concreatur, ſimul atque perfectæ nux eſt, completur aqua: cuius incrementi ſinis initium nuclei eſt. Ex eius namque condensatione concreſcit nucleus. Quantitas aquæ Cyathos menſarios interdum tres explet. Eius ſapor neſtareus cæteros omnes, vſque aſiunt, ſuperat ſua uitate. Ex nuclei medulla preſſa nobiliſſimum faciunt oleum. Ex frabricis fieri poſſunt cineres. Vbi arbor ad iuſtam adoleuit magnitudinem, quodam è ramis Auguſto menſe ad medium amputant: eius, v. quod reliquum eſt, ſummitatem ferro paululùm ſcindunt. Singulis appenſus calix quatuor ſcyphorum completur in die. Crudus liquor bibitur cum ſapore & vi. Coctus lapam excellenſiſſimam



simam imitatur, ad inebriandum efficacissimus. Accuratiore decoctione in saccharum densatur. *lagara* vocant Indi. Si non coquatur, amittit dulcorem, quo perinitia commendabatur, atque a ceteri vim præstat. Fructum perpetuo gerit, alio alium subeunte. Tricenos, aut quadragenos viuit annos. Lignum ad materiam cadunt: posteaquam vitæ finis aduenit ei. Amat fabuleta. De Cocci medullæ magnitudine potest ambigi. Varro ait, esse minimi digiti crassitudine. In Indicis Navigationibus Hispanorum legitur: Cocco immaturo semicyathum aquæ contineri. Nulla igitur contradictio. Quippe de testa hæc: ibi de medulla. Magnopere tamen est considerandum. Neque enim ex ducentis Amygdalis magnus v. fus ad edendum vna ex arbore queat esse. Neque tantulum cauum respondere capacitati bintum cyathorum. Oh authorum ignauiam orta est hæc ambiguitas: vt de Nucis Indicæ, quam videmus quotidie, facie, natura liceret dubitare. Cocci tamen testam describunt nigram: atque ex ea vasa fieri. Nucis huius Indicæ fulua est, non autem nigra. Ceterum haud alia est. Nam & in medullæ medio sinus est cauus, vbi fuerat liquor: & capillamentis obductam vnâ & alteram vidimus. Solimanus Turcarum Princeps, è calyce porabat nucis Indicæ, frugali auro ad formam Cyphi adornato. Honos apud indigenas par vtilitatibus.

Theophrastus quoque Nucis Indicæ arborem ait similem esse Palmæ Aegyptiæ siue Arabicæ, altitudine & foliis: & in insula Madagascar, aliàs S. Laurentii fructum patrio nomine vocari *Chicorin*. Arborem adeò esse teneram, vt si vel leuiter ferro vulnere, liquorem exsillet dulcem, & sedandæ sit apussumi.

An verò Theophr. & reliqui hanc descriperint, haud ita iudicatu facile: verum quia Græciæ memoriæ literis prodidit, Palmas nusquam tota India repetiit [vt iam dictum suo quoque loco] & fructus earum defert ex Arabia in Indiam: si ita est, existimandum sanè cum Guilandino, per Palmas, quas Theophr. Arianus, Strabo & alii Scriptores veteres nasci in India tradunt; intelligendas esse non propriè dictas, sed hanc ipsam de qua hic egimus. Non quidem illo argumento, quòd mel, panis, vinum & acetum ex Palma conficiantur, quæ omnia fieri ex palma nata in Mesopotamia, vbi Nux Indica non oritur, testatur Strabo lib. 16. & qui hunc multis seculis præcessit Herodotus lib. 1. & vtroque posterior Plin. lib. 13. c. 4. Sed quia Palma, quæ passim in Asia & Africa gignitur, nusquam tota India pullulat: & sicubi in ea prouenit, illic sterilis, & infœcunda exsurgit.

Iam verò palmas in India quoque nasci, paucis quidem sed apertis verbis testatur Theophr. ybi de arboribus Indicis tradit. Palmas, [quoniam] inquit, quoque nonnullæ partes [Indiæ] plures habent. *madag*, habet textus. Gaza pleraque vertit, alieno ab authoris sensu: quasi pleraque palmarum differentia in India nascerentur. Verum quales sint ex palma, nullibi, quod nobis quidem confet, declarat. Palmas tamen intelligit, quæ sint arbores. Nam statim subdit: *hæc autem*

Videntur & illa Plinii verba, [quæ & suprà citauimus in Palmarum differentiis] ad hanc pertinere, quibus ait: Reliquæ teretes atque proceræ, densis gradatque corticum pollicibus, vti olibus, faciles se ad scandendum Orientis populis præbent, vtilem sibi, arborique induunt cir-

culum mira perficitate tum homine subeunte De qua re & paulò antè dictum ex Atoista & Clusio.

Hæc tamen perperam videtur Cordus ad vulgatam palmam referre, eamque cum hac confundere, quando ait. Cortice vestitur carne & capillatis neruis concreto, qui ex intervallo velut in orbes, circulos & verticillos extuberat: quibus se ascensuris veluti gradibus ad hoc stans consilium præbet. [Non ad hoc natos, sed arte factos antea dictum.] Videmus nos Palmæ frondes, materiam & corticem, adeoque magnos corticum circulis adhuc circumdatos truncos: quod idèd referimus, ne ex relatione aliorum hæc scripsisse, aut ex Plinio excerptis videremur. Hæc illi. Sed viderit, quantum volet, non vulgatæ siue Aegyptiæ, sed huius Indicæ palmæ corticem vidisse verisimile est, si modò vera dicunt prædicti auctores. Ipse verò Cordus satis aperte declaratis verbis palmam Dactyliferam sibi nunquam visam, saltem non adultam, cuius caudicis cortex totus squarofus, ac veluti squammis, nullis ex intervallo circulis in orbes cinctus est.

Verba Strabonis suprà retulimus in viribus Palmæ. Rhazalib. cap. 20. *Naregil* vocat. Et apud Serap. cap. 21. *Neregil* est Nux Indica, estque Palma insula quæ sita est in mari Arni, & in insula Zing. Sunt qui dicant *Neregil* esse Palmam de Mocho, quæ insula vocatur Dabget, ex qua us defertur Dabig, id est, *Neregil*. Vltima istarum insularum est Strandib.

Apud Aui. quoque lib. 2. tra. 2. cap. 505. Nux Indica est *Neregil*, & in marg. *Gianzi* i. alhend. Ita quidem in nostris horum Arabum exemplaribus legitur: & subscribit Matth. qui & ipse Arabibus *Neregil* vocari testatur, & Dabig seu *Gianzi* i. alhend.

Serap. & Rhazæ arborem ipsam *Lavalnare*, id est, Arborem nuciferam.

Vocat autem vulgò ipsa arbor *Mayo*, & fructus *Narel*, quod vocabulum *Narel* commune est Persis & Arabibus. In Maluæ arbor ipsa *Tengamarian*: fructus verò maturus *Tenga*, sed vitidis adhuc & immaturus *Eleni*, & *Gox Lanba*: in Maluæ arbor *Triscan*, ipsa nux *Nihor*, cui Lusitani nomen Coquo indiderunt, ob tria illa foraminum vestigia, quibus Cercopitheci aut alterius similibus animalis caput repræsentat. Rami in Maluæ vocantur *Olla*: Vinum mustum ex ea, *Cura* & *Sara*: de qua Cura ab incolis vocatur *Orragna*. Destillata sit aqua ardens, eis dicta *Fula*, id est, flos. Suram siue Curam Solis æstu vel igne destillatam sacchari modo *lagran* vocant. Nuces recentes siccatae *Copra* vocantur.

Huius arboris descriptionem, vt annotat Clus. apud Garciam) cùm alii, tum Lp. Romanus lib. 5. c. 10. & Iosephus Indus cap. 17. & 18. tradiderunt. Sed & Strabonem Geogr. 16. huius palmæ meminisse, idem statuit, vt satis mirari non sit, Garciam veteribus Græcis incognitam dicere auctum hanc arborem; cùm vel Theophrastum Indicæ Palmæ meminisse, ex superioribus clarum sit.

Nusquam in nostris exemplaribus authores adductos à Garcia *Lavalnare* meminisse occurrit, *Neregil*. *Neregil* meminere, quemadmodum & Pandectarius cap. 565. Ferdinandus Lopez lib. 1. hist. Ind. Olla vocat, non palmæ ramos, sed ipsa folia, quibus inscribere solent Indi res memorabiles, & instrumenta publica. Refert idem, simili Olla seu folio, Arabicis characteribus inscriptam fuisse eam epistolam quam Rex Calcut ad Lusitaniam scripsit.





ditam scribunt, non modò rationi consonum non est, sed ipsa quotidiana experientia manifestissimum est, eius vsu lumbricos generari: cui morbo totius Prouinciæ Malabar incolæ admodum obnoxii sunt, teste Costa. Quod verò Serapio ait, Nucis huius esu alui profluua fitti, alienum à ratione non est, quòd ea sit terrestrium partium: oleum verò, quod tenuium & acrearum est partium, ventrem subducere. Nullum autem oleum exillat illa arbor, sed duntaxat ex ipso Cocco exprimitur: tamen Lacuna in Comm. ad Dioscorid. scribat in ea opinione quosdam esse, vt credant, dulce id oleum, quod ex hac Palma stillat, Dioscoridis esse Elzomeli, quem errorem supra refutauimus.

Cæterum duplici cortice integitur hæc Nux: exterius villosi materie compactus est, ex qua fit Curo Malabaribus dictus, hæc in Prouincia magni vsus. Nam & ex eo rudentes & funes nautibus necessarij sunt, qui in corrupti uiuant in aqua marina. Ac vt Clus. annotat, omnes rudentes & funes nautici Onerariarum R. giarum Vlyssipone confecti sunt ex villis istarum nucum, præsertim verò eorum, quæ in India nauigant. Sed & ex his villis sunt nodosa cingula, magni vsus inter omnes ferè tenuioris fortunæ mulierculas Vlyssip. ex his.

Idem ait: meminisse videre ex similibus villis ducta istamina valde tenuia & candida, de quibus nobiles maronæ vitas reticuli instar contexebant ad capillos coerendum. Ex eadem materia authore Garcia stupre loco naues obturantur ac stipantur, insitque adeò stupis præfatis, quòd putredini minus sit obnoxia, & aqua marina imbuitur densiusque.

Nulla certè, [inquit idem Garcia,] ex hac villosa materie fiunt auleæ, vt persuadere nobis nititur Lacuna. Ex putamine ilo interno & prædura vasa in tenuiorum vsu tornantur, & etiam carbones fiunt, Aurifabris perquam viles. Sed ea vasa Paralyticos, si inde bibant, minime iuuant, vt putauit Sepulveda, & vulgo Lusitanorum creditum est. Nam nihil huius fructus neruis iulutare est, præter oleum, de quo paulò antè. Sed nec ipsi incolæ huiusmodi facultates talibus vasculis tribuunt, nec quisquam probatus author meminit. Incolæ quoque istarum Palmarum germenibus vescantur: gratiora enim sunt palato, quàm aut Castanæ molles, aut humiles Palmæ. Quò autem vetustior est Palma, eò tenerius & delicatius germen producit. At eo sublatò perit Palma: hinc fit vt qui huiusmodi germen edit, non immeritò Palmæ in vorare dicatur.

Costa quoque eadem ferè de huius Palmæ utilitatibus cum Garcia confirmat, & præterea specialius quædam addit: Ex hac arbore [inquit] ex insulis de Nalediua fabricantur naues, atque clauis, malis, velis, rudentibus, aliisque armamentis necessarijs instruuntur: instructæ iam, mercibus ex eadem arbore confatis onerantur, Oleo, vino, aceto, saccharo nigro, fructibus, aqua, & ardente aqua vulgò vocata. Ex illa etiam ipsa exstruuntur aedes cum suis tabulatis satis firmæ: atque eiusdem ramis [quos Ola dicunt,] contingunt imbricium vicè, nam imbres commodè arcent. Ex iisdem ramis testæ comparant ad tegendas hyeme naues, quæ in portum deductæ, remulco deinde in terram trahuntur.

Fructus recens, antequam nigrum colorem contrahat, tener & candicans est, editurque cum sale, vel sine sale, vel cum aceto & Pipere interdum, atque gustu est Cinaræ. Cum verò iam non-

nihil indurari cœpit, Cardui caput sapit. Medulla cortici adhærens, tenera & dulcis est, continetque multam aquam limpida, suauem, nec fastidium aut nauseam sua dulcedine parientem, quæ vulgò in Solis ardoribus bibitur. Frequens est huius aquæ sub dio refrigeratæ, atque etiam Iagæ vsus aduersus iecoris renūque nimios calores, purulentæque materiæ per virgam excretionem. Refrigeratur hæc aqua in sua nuce viridi *Lanna* appellata: diu conseruatur: nam toto anno inueniuntur istæ nuces virides, quarum nonnullæ interdum tres aut quatuor libras siue pintas aquæ continent.

Postquam iam indurata est hæc nux, duriorumque medullam contrahit, remanet in concuitate limpida quidem aqua, at non adeò dulcis vt prior. Nucleum tum vocant Malabares *Eleni*. In annotinis nucibus mutatur hæc aqua in rotundam quandam substantiam, Mali instar, candidam, spongiosam, & leuem, sapore dulci. Vel, vt Linschottanus tradit: aqua si nux arbori diu hæreat, in albumen siue nucleum coalescit, isque interior fructus est, sapore nuci Auellanzæ similis: dulcior tamen aliquantulum.

Medulla nucis recentis tenera, alba & dulcis, sola editur ab incolis, aut cum *lagre*, hoc est Saccharo de Sura confecto, aut cum *Auela*, pulmento ex Oriza in aqua cocta, deinde trita & probè Sole exsiccata. Editur item cum piscis quodam genere siccato ex insulis de Nalediua aduecto, simili ferè bubulis carnibus fumo induratis, *Colomasa* vocant, bonumque condimentum est, ad bibendi appetentiam prouocandam. Ea verò mixtura non modò incolis in vsu est, sed ab ipsis etiam Lusitanis expetitur.

Ex eadem medulla lac conficitur, Amygdalino Lac simile, ad edulia paranda vtile.

Tomentosum & stuppeum operimentum, præter supra scripta, & lanæ, xylî, lini & sparti vsu præbet. Niger durisque cortex incolis *Xareta*, dictus scutellas & alia vasa potiora in tenuium vsu subministrat. Dictum quoque ex eo vstulato carbones Aurifabris viles fieri, qui in illis Prouincijs periti & industrii, nec admodum sumptuosi reperiuntur. Solent enim suum opificium proclamantes compita circumire, secum deferentes vrcolum, malleolum, & duo cæla, cannæque tubulum palmari longitudine manu tenentes, quo focum incendunt. Ii in aedes admissi, vasa ex auro & argento conficiunt, pro eorum qui ipsos euocarunt, arbitrio. Fiunt & ex huius Palmæ foliis petasi maiores & minores, ad Solis ardores & imbres arcendos idonei. Textuntur etiam storceæ, & alia pleraque.

Cæterum tota prorsus Palma in vsu est ita multiplici, vt vulgò, si quem frugi, & industrium laudibus efferre volunt, Palmæ viliorem appellant. Verum prima dos, in fructu ipso. *Tengam*, *Narlemve* Indi, *Cocum*, siue Nucleum Indicam Lusitani dicere: humani fermè capitis magnitudine, duplici opimento: quorum exterius in summo læue, stupea intus densitate netur ac textitur Cannabis, & Sparti modo, cum alios in vsu, tum præcipuè in vitillum nexus, & anchoralia.

Sed præ stupei illius corticis materiâ, his paratis anchoralibus, non inuenias aliam ad nauticos fines & maris impetus obsequentiorum namque vt falsuginem amat hæc arbor, ita & lanatus ille cortex [Cairum vocant,] in funes aptatus & marinis aquis immerfus identidem reuirescit: qui anchoris illigati, Maffeo teste, fluitantes in salo naues egregiè continent, non tam abinnata du-

*Aqua Gires,*

*Iecoris renūque caloris Gonorrhœa purulenta.*

*Aqua quæ sitas.*

*Eleni. Aqua in rotundam substantiam mutata.*

*Edendi modi Auela.*

*Colomasa. Bibendi illius.*

*Lac.*

*Xareta. Cortex totius scutellæ.*

*Malabar. Aurifabris viles, eorumque mos.*

*Foliorum vasa. Petasi. Storcea.*

*Adagiū.*

*Corticis mû cum vsu.*

*Cairum funis.*

ritie, vel operis firmitate, quàm viriditate ipsa, & lentitia quadam ad instar Corni: vt sese vel in altum elato nauigio micam in tenuitatem extendat: vel residente rursus in crassitudinem contrahat, quod secus in nostris euenit rudentibus, quàm nimirum ipsa vi ac pertinacia sæpè rumpuntur. Oportet igitur nervosas admodum illas corticis venas esse. Interior autem calix, rufo colore, & globosâ rotunditate prædurus, add. to auro vel argento, in pocula figuratur: ipsa verò pomi caro Amygdalæ in modum, pinguedine quadam, & grato sapore lactescens, non per se tantùm in cibo grata est, ac salubris: verum etiam vbi visum fuerit, exhausto lacte, paulatim in oleum eliquatur: totus autem racemus, dum ex eo tener adhuc emicat fructus, modò constrictus, ac leuiter incisus, in obdita oris angustis vascula opimum instillat succum, ex quo variis artibus, coctionibusque, veteri, vt Strabo ipse testatur, inuento, mel, vel Succarum, vinum, ac etiamque, perficitur. Iam folia, cum & Libanis pro Papyro sunt: tum etiam in vestes formâ facili, simul ac spisso contextu, neſciuntur. Denique vna eademque arbor, omnia prorsus ad rem nauticam instrumenta, ac materiem præbet: quippe truncum & ramos, in malum, assamenta, clauosque: comam in vela: Cairum, in funes [vt dictum est] omnium optimos, filaque ad laterum suturas: postremò Cocum ipsum, quæque ex eo conficiuntur, in onera: ita non sine miraculo quodam, omnibus planè rebus ex seimet apta, & instructa nauigat Palma.

*Tunica.* Incolæ importato Lino, sericòque, tales tunicas quoque eleganti opere texunt, quibus honestius multò quàm ceteri Indi veiant corpora. Nā & Congi Rex Æthiopæ, vt testatur idem Mafseus in Hist. Ind. munere misit Ioanni Regi Lusitaniz, magnâ eboris vim, vestemque permultâ (hæc Æthiopum gaza est) è Palmarum foliis admodum scitè atque artificiosè contextam. Idem eburnæ sellæ insidens mitatus erat insula è Palmæ foliis opere subtili & eleganti perfectâ. Sed rudentes & funes prædictos aqua salâ conseruari debere suadet Linschott. dulci quippe situm & putredinem contrahere, quòd picis illius careant. Eius naui, qui ipse ex India in Lusitaniam vehabatur, rudentes eiusmodi post dies quatuordecim lemel fuisse marinis fluctibus immergendos, vt à putredine seruarentur, eoque modo rudentium è cannabi vicem faciliè supplere. Piscantur etiam palmeis verriculis minuta conchylia (sunt qui veneræ conchæ genus putent) miro splendore & colorum varietate.

*Canarinarum obliqua erga viatores pretium fructuum.* Sed relatione dignum quoque quod Linschottanus annotat ambulantes viatores sic correptum, Canarinum aliquem compellere, qui illic cultro accinctus arborem ascendit, lani. isque (fructus immaturos) pro arbitrio poscentis numerosas abscondit. *Bajaruci* vnus [id monet exiguè pretii species] aut duorum pretio, ac ad potum peritè præparat. Aquæ huius potus, licet multus, non nocet, quòd amœnus sit, & naturæ commodus.

*Vins temperam.* Secunda ex *Sura* destillatio (quam *Vracam* vocant) vinum totius Indiz vnicum est, calidum sanè, & efficax, quod tamen Indi aquæ instar potant. Colore albo est. Lusitanis hoc modo temperatur. In dolum *Vracæ* tres manipulos ex vuis passis purgatis coniiciunt, quæ in Indiam ex Ormutio vehuntur. Manipulus ibi 12 pondo habet. Epistomium apertum permittunt, ipsumque dolum non ex toto implent. Vi enim caloris mox rumpetur, seruescit quippe ad bullientis aquæ

modum. Singulis autem diebus, duarum septimanarum spatio, mouent liquorem, eo transacto, ipsa *Vraca* rubrum colorem pulcherrimum nanciscitur, æmulum vini rubri Lusitaniz, à quo sapore parum distat, nisi quòd dulcis & calidus sit. *Vinum* autem *passæ*, siue *rosinarum* vocatur: frequenti negotiatione in Bengalæ, Malaccæ, & Chinæ loca translatum Goæ communiter triginta Pardauiis æstimatur. Sacchari Iagra ex succo parati, apud eos paræ æstimationis est, ob nigredinem, cum aliis in India candidi sacchari vsus promiscuus sit.

Medulla arboris siue trunci *Palmito* nominatur, quæ magno in pretio loco muneris ad opulentiores potentiorèque mittitur. Chartæ autem tenuitate & candore, formâ plicabili crescit, ita vt subinde quinquaginta aut sexaginta plicas habeat togæ muliebris instar. Ex hac Indi chartam & libros instaurant. Ex ea etenim charta tenuis ducitur. Virentibus inscribunt plicis, quæ tum siccatae literas indelebiles habent, stimulo ferreo antè notatas.

Indis *Ollam* vocari supra dictum, consiãtque ex eadem materia omnes gentis annales, libri, & volumina, quam & signare norunt in epistolarum vsus. Chartam huiusmodi, vt prius monuimus, ac literas apud D. Paludanum eiusdem Linschottani munere vides.

Theuetus in suis Singularibus Galliz Antartice nihil peculiare habet de hoc fructu, nisi quòd totum bonum & edulem dicit, etiamque carnem superficiale, quam vocat: deinde ait: hunc fructum ea esse odoris fragrantia, vt etiam pocula ex testa eius confecta ad odorem nescis moschatæ accedant, eosdemque qui communiter ex iis bibant, [vt sibi à Iudæo primario in Cairo coram relatum asseuerat] à capitis & nephriticis doloribus immunes esse, etiamque prouocare vrinæ, sibi hoc experientia cognitum asserit. Quod nec Plinium subiciuisse ait, tradentem omnes Palmæ species esse cordiales, & in quamplurimis morbis prodesse.

Sed duo in Theueti verbis animaduersione digna videntur. Primò quòd totum fructum edulem facit, nam nec stuppeum & corticosum illud operimentum elui aptum. Quando verò huic nuci odoris fragrantiam tribuit, cuius nullus cæterorum Authorum ne verbulo quidem meminit, docet, vel sibi emunctiores fuisse aëres, vel non probè cognitam habuisse hanc Nucleum eiusve arborem. Nucleus moschatæ odorem, quem ille fortè in vno aut altero poculo ex eo sensit, ascriptum existimamus, nempe ex affrictu nucleis moschatæ, vt sæpe vulgò fieri solet: alioqui in nostris, & aliis Recentioribus, etiamque integris nihil tale deprehendimus.

Porta Neapol. noluit committere, quin & circa hanc fructum nouæ suæ Philosophiæ specimen ederet, inquires, huius Nuclei succum biliosis interdici, quòd Nux ipsa ex rubro flauescat. Hic natus esse solet nouitatis Philosophicæ, vt vtroque impingat. Nam si icoris renūque nimios calores emendat ille liquor, vt testantur Costa & Paludanus, quo iudicio is biliosus ab eius vsu arcebit? Deinde si vel ex rubro flauesceret ea Nux, quod tamen apud neminem hæcenus legimus, & in iis quas vidimus non verum est, non idè sequeretur biliosis interdiciendam, quòd tales plures sint fructus, biliosis conuenientissimi.

Ergo si utilitates omnes, quæ ex hac arbore & fructu redundant inspicias, vtique naturæ non infimum



1. *Chrysomelidae* (Coleoptera)

## CAP. CLXXVI.

Defect: none

BVS DAM.

C A P. CLXXV.




**D**Ebemus ,  
[ iniquum  
Pen. & Lobel. ]  
Occiduis Indiis  
istud coriaceum  
solum, cui simile  
aut par latitudi-  
ne aut crassitie  
nullum novi-  
mus. E Palma  
congenere arbo-  
re euulsum vide-  
tur: quin ipsa to-  
ta textura asserit  
binos cubitos la-  
tum, aut potius  
tegetem, quater-  
nos aut quinos  
cubitos longum  
refert, tegule  
modo, fornicat-  
um, & media  
secundum lon-

gitudinem costa semidigitum crassi carnatum,  
superiora ora quasi perfectum esset, margine digi-  
tali tioriore, duriore, clauditor. Vniuersum foli-  
um à summo ad imum in villos, iis quantenus  
similes qui obducunt nucem Indicam aut capilli-  
tum tendens finibus aptum, disceperit, quem-  
admodum totum est tectoris adium & stonis ac-  
commodum. Huius folii iconem exhibent iidem  
in diuersis suis operibus cum hoc titulo: Praegan-  
de folium Palmæ filamentos.

Hist. Lugdun. eandem iconem habet, & folium arboris Draconis ex Indiis delatum, quod Pena descripsit, appellat. Sed quid eius historię compilatorem mouerit, cur ita vocarit, nescimus: neque enim conuenit cum eius arboris foliis.

An verò sit folium nucis Indicæ, asserere non  
audemus. Si est, verisimile iconem Clusii nucis  
Indicæ minùs bonam esse, qui Palmæ similem  
pingit: Et Garciam aliosque nihilo feliciùs Pal-  
mæ aut Arundinis foliis contulisse.

Acosta longè diuerſam habet à Cluſiana figu-  
ra. Quippe paucas & ex longis intervalis folio-  
rum diuerſas pingit, vtrique pediculum ſi-  
gnem ex trunci cacumine dependente, quater-  
nis & quinis fructibus onuſtum. In cacumine  
trunci ſpicam ſignem offendit. In trunco ve-  
luti gradus quoſdam inciſos. Cæterùm videtur i-  
dem ſolum hic depiſtum ex Cluſio deſcri-  
ptum eſſe cap. præcedenti, quod An-  
tuerpiæ vidit.



**A**dmirabilis  
est arbor,  
inquit Clus in  
Exot. quæ à Ba-  
tavis quibudam  
nautis qui Am-  
stelredamum an-  
no 1599. redie-  
runt, in deserta  
insula reperta in  
America. Nautas  
Insulam *Curano-*  
*pez*. appellasse  
mihi relatum est:  
in qua integras,  
sylius repere-  
runt nullâ aliâ  
arbore constan-  
tes, quàm palmæ  
quodam iusita-  
to genere, cui,  
ab inuoluto

facum sine colum referente in quo fructus re-  
conditus [ Spata enim commodè dici nequit il-  
lud inuolucrum] *faccere* nomen tridui, quando-  
quidem forma valde simile est illi colo sine sacco,  
quali hoc repote Pharmacopolæ vinū aromatites  
[ Hippocraticum vulgò appellat] percolare solēt:  
nam creberrimis quibuldam fibris [padice colo-  
ris transuerſim & obliquè ab infimo ad ſupre-  
mum excurrentibus magnò à natura artificio  
contextum eſt , idque varià longitudine : quod  
enim ab ornatuſſimo viro Theodorico Coornhart  
accipiebam, viginti duas vncias longum erat, & ea  
parte, quā patebat, ſeptem latum.

VVilhelmus Pardunus vir honestissimus v-  
num habebat, cuius longitudo meum octo vi-  
cibus superabat, etenim binos pedes cum semisse  
sive triginta vncius longus erat, eius latitudo par-  
cum meo. Plura quam hæc duo mihi videre non  
contigit: vtrumque autem sensim gracilescens in  
mucronem desinebat.

Ista porro inuolutra [iis referentibus qui ab  
arborereliderant] plena fuerant fructibus nucem  
iuglandem cum externo seu puluino huc vi-  
ridi cortice magnitudine aquanubis, in quibus  
orbiculares aliae nuce adae rotunda, vt torno e-  
laborata viderentur, & globulis illis, quos pueri  
in lusu pollice impellere solent [vulgo Battauo-  
ni Brickers, Galli Martes appellat] essent  
per similes, cum magnitudine cum colore, atque  
admodum [vnam enim confingebam, vt vide-  
re quid contineret.] vt nisi ferro malleo, & cum  
difficultate confingere quierim, tamen non  
valde crasso putamine sint praeditae: continebat  
autem ea orbicularem nucleum putamini adhae-  
rentem, medio cauum, & qui siccitate Lacunam  
contraxisset, candidum, sapore initio quasi legu-  
minum, deinde instar Lupini amaro. An vero lac-  
cusille aliquo cortice aut cute teosus fuerit, me  
latet, nec mihi facultas data est eos conuenienti  
qui obseruauerant, vt diligentius omnia perscruta-  
rei: lacum autem, qualem accipiebam, cum  
orbiculari nuce adpingendum curabam, in illa-  
rum gratiam, qui exoticarum rerum studio dele-  
ctantur.

Fructus  
nucis in-  
glandis  
magnitu-  
dine.

Globuli ro-  
tundine li-  
ti torno e-  
laborari.  
Knichers.  
Martres.

FILVM ARBOREVM TENVISSIMVM ET  
CANDIDISSIMVM.

## CAP. CLXXVII.

Descrip.

**S**cribit Clus. Exot. lib. 1. c. 4. Candidissimi fili glo-  
sum Garetus ad me mittebat, cum aliis: eum  
autem ex arboris cortice confectum scribebat:  
cuius sanè tenuissima, valida tamen, erant stami-  
na, filo etiam à Lino aut Cannabi deducto longè  
validiora, tres pedes cum semisse longa, ex vna  
parte resecta, vt longiora fuisse verisimile esset: ex  
quibus vitta & similia ad muliebrem ornatum  
pertinentia, commodissimè fieri possent. In-  
terea, quæ anno 1605. Gener Cherlerus adfere-  
bat ex Anglia procul dubio à D. Iacobo Garetio,  
fili stamina comperimus, vlnas tres longa, alba,  
serici modo tenuia & firma, non monitus iudi-  
carit esse cannabina: non dubitauerimus ex iis  
staminibus parari posse tenue & optimum filum.  
Considerent Lectores, quæ ex Clusio de stamini-  
bus ad vittas scribimus c. de nuce Indica magna.

## NVX INDICA MINOR.

## CAP. CLXXVIII.

Descrip.

**N**vis indicæ testam habemus oui anserini cit-  
er magnitudine, in ea erat Balsamum  
Peruvianum: minorem hætenus non vidimus:  
hanc diuersam facimus à Cordi nuce  
Indica siue Cuci: & prædictæ nucis Indi-  
cæ genus paruum existimamus: ea, fortè Clusio,  
Exot. lib. 2. cap. 9. est orbicularis fructus peregrin-  
us tertius, non valdè dissimilis à suo secundo, de  
quo mox agemus, longior & crassior, oui anseri-  
ni formæ & magnitudinis, in quo adseruabatur  
Balsami illius Americani liquor odoratus & ad  
multos morbos salutaris. Hunc accipiebat Clus.  
ab honesto viro Petro Garetio.

*Nux Indi-  
ca Cordi,  
siue Cuci  
non est.*

NVX INDICA AD VENENA CE-  
lebrata: siue Cocculus de Maladiua.

## CAP. CLXXIX.

Descriptio



*Medulla.* Huius Cocci medullæ fragmento nos donauit

**N**iger est, te-  
ste Garcia  
Cocci de Mali-  
diua cortex, &  
nitidior vulgari  
Cocco seu Nuce  
Indica, figura  
ouali magna ex  
parte, nec ita ro-  
tunda vt vulga-  
ris: medulla si-  
ue pulpa inter-  
rior, quæ sicca-  
ta dura est ad-  
modum & can-  
dida, nonni-  
hil tamen ad pal-  
lorem inclinans:  
in superficie ri-  
mosa est & valdè  
porosa, nullo sa-  
pore excellens.

Illustriff. noster Princeps: fungosum est, eâ con-  
sistentiâ, quam videmus in fungis Nucum, colo-  
re foris in luteo cinereo, intus pallido, fibris va-  
riatum subinde ferrugineis & croceis, gustu insi-  
pido. Integra autem duas Nuces apud eundem  
ill. nostrum Princepem vidimus Stutgardia, Nu-  
ce seu Cocco Indico maiores, longiores, admo-  
dum capaces: pedem sunt longæ, rotunditatem  
vix duabus manibus amplecti poteramus: pars  
compressa erat lex uncias lata: in qua amplum fo-  
ramen apparebat ab alio fructu separatum, ita vt  
gemellus fuerit fructus: coniunctorum fructuum  
ingentem fuisse magnitudinē apparebat. Vtriuf-  
que capacitas erat insignis: cortex durus & spis-  
sus, qualis aliis nucibus, externè striis obliquis,  
longis, excavatus, colore nigro: pulsatus ollæ mo-  
do resonans. Sic corticem etiam villosum ha-  
bet, vt alix nuces Indica; prægrandem fructum  
esse oportet capitèque humano maiorem multo:  
foramen ei tantum est, vt pugnus indi possit.  
Dicuntur CC. aureis Gallicis emptæ. Eius iconem  
geminam damus vtrâque faciem ostendē-  
tem.

Est quidem Clusio icon apud Garciam, quam  
omittimus, quia ob ornatum parum de natua fi-  
gura denotat.

Acosta testatur, hanc nigriorem, nitidiorem,  
longiorem, maioremque esse, quam vulgata Nux  
Indica. Coccum de Maladiua vocat idem, ex vers.  
Clus. Garcias verò *Cocculum de Maladiua*. Item  
*Coccus de Maladiua* Hist. Lugd. Et rursus in appē.  
[ne ei deesset numerus] Coccus de Maladiua ei-  
dem. *Grana Maladiuana: Noces Maladiuana: Cocci  
di Maladiua: Ein frömbde purgierende Frucht /  
Catal. Francosurt.* Sed cer purgantem fructum  
Germanicè vocet, nescimus. Nec placet tam ma-  
gnum fructum grani nomine vocare.

Laudatur hic Coccus, aut hæc Nux [sed præ-  
sertim eius medulla] aduersus venena ab ipsis ea-  
rum Insularum incolis. Et à viuis fide dignis ac-  
cepisse se Garcias testatur, ad Coli dolores, Para-  
lysin, Epilepsiam, aliòque neruorum affectus se  
vtilem sensisse. Acoli quidem doloribus, quod  
vomitus excitaret: ab aliis verò ægritudinibus  
immunes reddi ægros, si aquam in iis nucibus  
(adiecto medullæ momento) aliquandiu conser-  
uatam ebiberent. Sed cum ipse non sit expertus,  
minùs fidei his tribuit. Fatetur tamen, nullam pe-  
riculum faciendi, occasionem habuisse, quòd vt  
malit medicamentis quorum facultates iam sibi  
sint perspectæ & multa experientia comprobata,  
velut sunt lapis Bezar, Theriaca, Smaragdī, terra  
sigillata, & alia pleraque medicamenta, quàm re-  
centibus minùsque certis. Nam quod nonnulli  
dicant, se huius vtu commodum sensisse, an id  
persuasiōe & imaginatione factum sit, igno-  
rare se, nec quicquam affirmare posse. Inueni-  
tur interdum isti Cocci prægrandes admodum,  
interdum etiam exigui: omnes autem in litus  
iecti.

Vulgari autem fama accepimus, [addit idem]  
insulas Melidivas aliquando continentem fuisse,  
sed inundatione maris submersū, has insulas ef-  
fecisse: in quibus obrutæ Palmæ fuerint, quæ hos  
Coccos protulissent, qui terra indurati in hunc  
modum conspiciuntur. Sintne verò eiusdem ge-  
neris cum nostris, facillè iudicari non potest, cum  
hætenus nemo folia aut arboris truncum vidēre  
potuerit: sed soli Cocci in litus eiciantur, nunc  
bini coniunctim, nonnunquam verò singuli se-  
paratim. Sed hos nemini colligere licet, nisi cum  
capitis periculo: quoniam Regis esse asserunt,  
quicquid



quicquid de mari in littus eicitur: quæ res maiorem auctoritatem huic Nuci conciliauit. Eximitur autem ex his Coccis pulpa siue medulla, deinde exiccatur eadem ratione qua Copra, [hoc est, nuces Indicæ à superiori cortice delibratæ & confectæ,] atque indurefcit eo quo venditur modo. Diceret esse calcem ouillum. Coccus de Nalediua cognominatus, ut scribit Acofta, adeo commendatur ab ipsis incolis, & à Malabarenfibus, non modò à plebe, sed à Regibus & Principibus viris, ut in omni ferè morborum genere ad eum confugiant, tanquam ad facram anchoram.

Fiunt in eam gratiam ex illo pocula, quæ aut vel argento excipiuntur, & in nauum tiremiûmque figuram efformantur, ad aquam bibendam, in quam ex catenula medulla ipsius Cocci fragmentum pendere sinunt: sibi que certò persuadent, illis, qui aquam ex his poculis hauriunt, nullum venenum nocere posse, futuròsque immunes à multis morbis, in quos sanè memini multos incidere, qui ex his poculis bibere soliti erant. Et licet omnem diligentiam adhibuisset Costa, nunquam tamen obferuare potuit, similia pocula aliquem ex morbis curare, ad quos vtilia esse creduntur. Potius igitur arbitratu & is, tantam laudem obtinuiffe à vulgi opinione.

Nonnullos ex huiusmodi vasculis bibere solitos, sibi affirmasse ait, sese experientia didicisse, eorum incendi, tenes noxam contrahere, & calculum generari: nihilominus tamen magnum esse eorum pretium, longèque pluris æstimari iis locis ubi inueniuntur, quàm aliis procul inde diffitis: nam interdum eiusmodi nuces nudas, neque auro aut argento exornatas, i. aut amplius aureis nummis æstimari.

Clus. apud Garciam lib. 1. cap. 26. Vidimus cum Vlyssipone, tum aliis locis, vascula ex Cocco de Maldiua confecta, oblongiora pleraque iis, quæ ex vulgari Cocco parantur, magis que nigra & nitida. Quinimò ipsam medullam siccatam venatè reperias, cuius facultates misce extollunt, atque omnibus ferè Alexipharmacis præferunt: eamque ob causam ingens eius pretium, Quàm verò parum fidei sit adhibendum huiusmodi fabulosis & commentitiis facultatibus ex Clusio satis liquet.

Paludanus quoque à se tentatum, an contra venena aliquid posset, tradit, sed nullo successu.

**SAMBAUCAIE.**

CAP. CLXXX.

IN Brasiliã regione prouenit arbor Syluestrius hominibus dicta Sambaucã, cuius fructus crassior duobus pugnīs, formæ cyphi, in quo continentur parui nucleī, similes Amygdalis ac eiusdem ferè laporis. Putamen eius ad vasa commodum est. Existimo à nostris vocari nucem Indicam, aut eius speciem esse.

Meminit Matthioli aliarum nucum Indicarum rotundarum & dependentium ex arboribus magnitudinis magnorum melonum, quarum in prædicta regione vidi putamina: ubi torno politæ sunt, apud nos solent argento excipi & muniti. In Brasiliã insignis tornio Petrus Boardon, parauit multa pulchra vasa, tum ex his fructibus Sambaucæ, tum ex aliis lignis diuersorum colorum, quorum ille partem dono dedit D. Villegagnon, qui magni faciebatur. Lerus in Hist. Amer. Talem sanè nucem à nemine hæcenus descri-

Tom. I.

ptam legimus; quæ paruis contineat nucleos. Qui vidit aut nouit, doceat nos, & posteros.

ARBOR MANICONGO NUCIFERA, ET  
DE ALIIS QUIBUSDAM ARBORIBUS GUINEÆ.

CAP. CLXXXI.

Q Vidam Anonymus in tabula Cosmographica apposita hac figura sic tradit. Sunt arbores in regione Manicongo, proferentes fructum Nuci magnæ similem, qui intrinsecus & extrinsecus viridescit: inde non solum oleum, sed & vinum, acetum, bel-



laria & panis præparantur. Oleum seu Butyrum. Eius visus est in condiendis cibis, in lychnis & vnguentis præparandis. Panis ex putaminibus, quæ nucleum ambiunt, conficitur. Nucleus salubris est comestus, nec non boni saporis. Vinum ex lummitate arboris prouenit, foramine in arboris vertice terebrato, è quo humor lacti similis promanat, qui dum recens est propter dulcedinem loco vini vsurpatur: sed si diu seruetur vappescit, ac denique in acetum vertitur, quod acetiariis præparandis vtile est. Sed haustum calculo specifica vi medetur, ita vtilis loci, ubi prouenit, quemadmodum scriptis proditur nullus calculo afflictus reperitur.

Ceterum figuræ, quam ex eadem tabula hic proponimus, videtur quodammodo referre Musiam: de qua lib. 1. Descriptio & vsus in plerisque conuenit cum Nucis Indicæ descriptione. Eius tamen tabula author antè meminit nucem Indicam, quas separat ab arbore Manicong.

Postea verbò & aliarum arborum Dactyliferarum historias tradit, & à prædictis quoque distinguit, easdem tamen vires illis quoque tribuens, quæ nuci Indicæ tribuuntur. Hæc autem sunt eius verba. Habentur in Guinea distinctæ arbores, quæ decem commoda præstant. Proferunt racematim nuces Dactylis similes: cortex exterior foco commodus: ex proxima materia tenuissima, sericum stylis simile, media linum, crassior cannabis loco vsurpatur ad funes nauium. Ex altero putamine carbonæ parantur. Tertium putamen nucleo adhærens eius aptum est, in quo aqua pura gratissima. Elucit ex Nucibus oleum bonum & pingue. Cum ventorum vi corrumpunt arbores hæc, per commodam tegendorum ædificiorum materiam suppeditant. Aliquas istarum arborum fecunditate prouent ad succum eliciendum, quem excoquunt, donec aquæ similis reddatur, qui tantæ efficacis est, ut non solum sapore, sed & odore temulentiam inducat. Hæc ille. Quæ postrema magna ex

Rk

parte ad Nucem Indicam referri possent. Veremur enim de incognitis sibi scripisse: quasdam inter se arbores confudisse, aut saltem aliqua interpetuè repetisse.

PALMA ADY INSVLAE S. THOMAE  
& fructus Abanga & Caryoces.

CAP. CLXXXII.

**Descriptio** Meritò Arbori ex Manicongo subiiciamus Palmam *Ady* in cuius descriptione multa conueniunt, licet icon apposita, huic non respondere videatur, sed Musæ. Palma *Ady* de palmarum genere est, ut tradit Tobias Roellius in Epist. ad Clus. cum scribit: Insula S. Thomæ Nigrorum habet palmam tertiam, illis *Ady* nominatam, arbor valdè celsa est, & insigni proceritate, arborisque truncus crassus, nudus, & erectus est, non suffruticat, ipsaque Pinum superat altitudine, ut mihi à variis relatum fuit. Trunci atque ramorum materies rara est, succo prægnans: foliis prioris palmæ similibus constat. In vertice plurima excrescunt germina, quibus præcis vel cæsim læsis, vas aliquod idoneum appendunt: in quo Lachrymantem colligant succum, qui vini vicem apud Indos tenet, & faciliè inebriat. Dulce hoc enim est, verum post aliquot dies acescit: Non omnes Palmæ tunc vini liquorem fundunt, sed ea tantum quæ *Ady* ab ipsis Nigris nominatur: nec idcirco fructus suos facere desinunt eiusdem arboris reliqua germina, quæ à ferro intacta manserunt. Huius autem Palmæ *Ady* germen non edunt incolæ istius Insulæ, quæ quidem maiori cura & diligentia percontatus sum, quod apud Garciam legerim, Incolas regionum Orientalium, Palmarum germinibus vesci: & quod sublato germine pereat Palma, sed hæc ipse de Palma Indica generatim loquitur.

Nunc superest ut de fructu palmæ *Ady* aliquid subiiciam. Integer fructus Lusitanis dicitur *Caryoces* & *Carioff*, ab indigenis Nigris istius Insulæ *Abanga* nominatur: qui facione producit arboris. *Abanga* nucleum ad te misi, cui etiam tum putaminis præduri pars inhærebat: putamen huiusmodi tegit pulpa seu caro fuluescens, ac pariter luteus est exterior cortex. Itaque cortici caro subest non aliter quàm in malo Persico) quam pullum putamen offeum sequitur: hoc verò intus nigrum continet nucleum eius aptum, qui adempta pellicula candidus est. Fructus integer formæ & magnitudine est Citrii istius mali quod *Limon* vel *Limonem* vocant. Edunt ipsi hos fructus inassatos, frequenter etiam crudos: *Caryoces* nucleos integros inter edendum miscent fatinæ *Manyouæ*. Hos nucleos credunt ipsi mirum in modum reparare languentes ex morbo vires, adeò ut suis ægris bis tæne in die confortandi causa tres quatuorve *Abangæ* nucleos exhibeant. Quod ipsis tam sanum liare est, quàm nobis est ouum forbile, vel pullus gallinaceus, uti asserbant Lusitani, qui Indorum præfecto tunc temporis aderant. Præterea ipsi ex hoc fructu oleum conficiunt: nempe ut carni à nucleis auulsa adiciant aquæ feruētis bonam partem, deinde iubent ut pulpa in lebetè diu agitur, commisceaturque exactè super ignem, deinde remotum ab igne lebeten tanto temporis intervallo stare sinunt, donec amurca omnis in fundum subleuerit: tandem oleum aquæ supernatans cochleari excipiunt: quo exhausto, iterum affusa aqua feruente bene commiscunt ut

prius, & postquam decoxerint, quicquid olei puti supernatauerit vasculo rursus excipiunt. Olei color croceus est, qualem *Caryoces* pulpam esse diximus, cuius tibi nunc speciem mitto in vitreo vase, concreuitque ex frigore nostræ patriæ, aliàs autem liquidum est oleum. Nisi veteret Epistola limites nimis excedere, mouerem quæstionem quæ inter scribendum occurrebat: Cur nimirum Oleum in aqua supernatet? Dicunt aliqui corpora ob grauitatem submergi, & ob leuitatem natante. Quod autem corpora non ponderis aut leuitatis ratione natent aut subleuant, sed pro Elementorum, ex quibus constant, proportionem & dominio, locum inter Elementa petant: parui scrupulus in flumine ostendit, qui ob terreæ & compactam lapidis substantiam subleuit: in quo ingens trabs lignea, ob æream eius & porosam substantiam supernatet. Sed his præteritis ad Oleum *Caryoces* reuertor, quod famem non minus tollere potest, quàm oliuarum oleum & butyrum nostrum vaccinum: quare præsuri vel cenaturi, suis edulis hoc oleum miscent. Et cum apud nos Medioburgi essent, pisces, carnes, pyra, poma, aliæque cibana ex hoc oleo in sartagine torrebant, atque ad omnia obsonia tam assa quàm elixa exhibebant hoc oleum Nigræ, ad quæ videlicet videbant venustus nostras ancillas butyrum addere. Sed Butyri nostri ex Batavia allati sapor & odor magis mihi placet: ipsique profecto ancillis pigris Galli deformioribus cum oleo isto instructa fercula epulæque lubens relinquam, quasque cum oliuarum vel amygdalarum oleo, præstanteue Zelandiæ butyro, ancillæ nostræ colore genarum roseo decoræ apposuerint, sepe præferā. Olei huius usus apud ipsos etiam vulgaris est ad inungendas corporis partes rigidas, atque contractas, imprimisque neruos distentos relaxare dicunt. Exercitatos etiam, & quolius labore fatissimos toto corpore inungunt: neque quod exercitiis similes corporis partes exsiccantur, & colliscent: quod ipsum humedatione sua impedit huius olei perfunctoria ac lubrica fictio. Hoc ipsorum acopum est, & insigne lassitudinis remedium esse prædicant. Olim hæc corporum inunctio frequentius in usu fuit tam apud Græcos, quàm apud Romanos illorum in deliciis amulos: & habita certè sunt non postrema salubrioris Medicinæ prophylactica, id est, sanitatis conseruatricis, pars, ut partim Galeni scripta perhibent.

Huius palmæ *Ady* meminit autor descriptionis Guinææ, *Manicongæ*, Angolæ & vicinarum regionum occidentui Oceani, ubi dotes regni Congo refert, in campis proueniunt permulxæ & variæ Palmæ, ut pote, quæ Nuces fert Indicas, & quæ daçtylos gignit. Crescit præterea alia ibidem Palmæ species, non multum à duabus primis fronde diuersa, ex qua oleum, vinum, acetum fructus, ac panem colligunt: per viam expressionis fit oleum è fructus pulpa, ut ex oliuis fieri solet, colore & substantia simile nostro butyro: præterquam quod è viridi in flauum colorè magis declinet, utuntur eo ipsi pro butyro & oleo: lampadum flammæ eo alunt, eodem oleo sua perinungunt corpora, ut glabra & agilia reddantur. Denique cibi vicem gerit necessitatis tempore, uti nobis euenit, qui fame perissemus, nisi hoc oleum habuissimus. Huius palmæ vel fructus nomen non refert: verum ex orationis serie satis patet, hanc esse palmam *Ady* quæ fructum *Carioff* fert, ex cuius pulpa fit istud croceum oleum.



## NVX INDICA VELVT LARVAM

OSTENDENS, ET ALIA EI SIMILIS,  
si non eadem.

CAP. CLXXXIII.



**A** Pod Principisā no-  
stram Clemenz-  
tiff. mirabilem  
hunc fructū In-  
dicum vidimus  
& depictum ac-  
cepimus, quem-  
admodum & al-  
terum fructum.  
Prior niger est,  
duas vncias ferè  
longus, vnciam  
penè latus, ceu  
monticulis qui-  
busdam inæqua-  
lis, ouatā figura  
longiore: cui ter-  
nifrobiculi su-  
pernè aduersā  
facie impressi, eo  
situ, vt larvam

quandam simiæ caudatæ aliquo modo represen-  
tent sine naso. Pictus est bis sua magnitudine,  
vnus auersam, alter aduersam partem ostentans.

Sequitur alius fructus dono datus, vt iam di-  
ctum. Hunc cum præcedenti eundem esse suspi-  
camur, quamvis figura nonnihil euariet. Nam &  
tres illas frobiculas habet, sed tribus lineis cana-  
liculatis, in medio concursu tres angulos oppo-  
sitos facientibus: interstitiatis. Figura fructus  
etiam ad triangularem accedit, secundum longi-  
tudinem canaliculis striatus atque sulcatus: eā  
parte qua foramina sunt latiore, oppositā acutio-  
re. Color ex pullo cinereus. Concussus nullum  
sonum præbet. Et quia singularem tantum ha-  
bemus, integrum relinquere malimus: quod  
non maximopere Reipub. medicæ interesse iudi-  
caremus, scire quid intus latet

## FRUCTVS PEREGRINI DVNTAXAT

NVCLEVS.

CAP. CLXXXIV.

**N**aturalium periti conferant fructum à Clus.  
pro quinto descriptum in libello suæ pe-  
reginationis cum *Sel*, vel *Seel* Arabum, de quo e-  
gimus post *Lenticum* & *Mastichen*: de suo au-  
tem fructu ille sic ait. Duntaxat nucleus est, suo  
putamine siue cortice exemptus, firmus, tenui  
membrana fusca & multis venis distincta, firmi-  
tèrque ipsi nucleo inharèrè, rectus. Ipsa materies  
firma est, candida, pulpæ nuci Indicæ siue Coc-  
ci similis, nullo quidem odore prædita, sed satis  
grato sapore. Calidum in primo gradu, aut secun-  
di initio iudicat. Clus. exot. lib. 2. c. 29. omittit, quæ  
scripserat de temperamento, & addit, quæ se-  
quuntur. Hunc nucleum anno 1598. Deprehē-  
debam eius nuci esse, quæ tertio loco, siue pro  
tertio huius capitis fructu descripta est: nam mul-  
ti similes nuclei, partim sui putaminis fragmen-  
tum adhuc retinentes, maxima autem ex parte  
audi, & à suo putamine liberi, nonnulli etiam in-

Tom. I.

tegum corticem adhuc habentes adferebantur  
naue quadam ex Insula Diui Thomæ aduecta, Loeb.  
quibus Lusitani quidam eadem naue vecti, sua  
mancia cum radicis cuiusdam farina commixtis,  
aluerant in itinere. Est autem fructus Palmæ *Aedii*  
nuncupatæ.

## NVX PEREGRINA, NIGRA, ANGVLOSA,

CVM TRIBVS CAVITATIBVS VELV-  
ti nucleis.

CAP. CLXXXV.

**F**ructus hic Indicus formā est inæquali, partim  
enim extuberat alicubi, & quasi in gibberum  
extumescit, partim verò alicubi in concavitatem  
depressiusculam abit: parte inferiore, collectæ  
multæ fibræ nervosæ in vnum conspiciuntur al-  
bidæ ex omni latere ductūque continuo inibi  
concurrentes, colore castaneo: alterā verò parte  
opposita quā adhæsit tribus in locis trianguli in  
morem inter se dispositis tres occurrunt rotun-  
diusculæ cauitates albicantes in quibusdam, in al-  
liis verò minis conspicuæ multis ex nervosis cir-  
ris conflatæ, per longum ipsius tractum nervi  
oblongi ducuntur trahunturque castanei coloris  
agitati quidam commotique sonitum edunt, ali-  
cuius intus nuclei latentis argumentum præben-  
tes, aperti cum essent corticem durum crassiusq;  
præbebant conspiciendum, intra cuius cauum ni-  
gum alium nucleum condebant, propria tunica  
nigra vestitum, quæ intra se continebat pulpam  
albam vetustate tamen insigni rancedine dona-  
tam, sicut & alii his similes fructus, si non iudem  
planè nigricantes, oblongiores, in quibusdam  
locis tuberosi: totus fructus per longitudinem  
suam sulcis quibusdam oblongis, modò altiùs, mo-  
dòque leuiùs impressis ac vetustate albicantibus  
conspicius est, parte cui adhæserunt tres iidem  
concauitates rotundæ, altiùs quàm in prioribus  
impressæ occurrunt vilendæ, quarum quædam in  
aliquibus foraminulentæ sunt redditæ, vel arte,  
vel, quod credibilis est, vetustate peruiæ factæ,  
corticem quidam sortiti sunt crassum nigrum, sunt  
etiam sonori.

Nos munere Ill. nostræ Principis, anno 1608. Icon  
nuculas descriptas Stutzgardia accepimus, qua-  
rum Iconem proponit Clusius in lib. Peregr. pro  
fructu tertio propositam exhibemus.

Ita porò suum fructum describit Clusius. Ma-  
gnam similitudinem habet fructus tertius cum  
prima nuce in Adnotationibus ad 26. cap. 1. hist. a-  
rom. [de qua nos antè, post nucem *Mehenberthe-  
ne*, sub titulo, *Auellanæ villosæ foraminatæ*] sed  
paulò minor est, angulosus, niger, crassioribus  
quibusdam, firmisque villis ipsi incumben-  
tibus, & firmiter inhgrentibus obseptus (alterā parte  
tribus foraminum vestigiis insignitus, quorum  
tercium maiusculum est & infra spectat. Clus. hæc  
inclusa omittit in lib. Exot.) præduro putamine  
constat, & prægnans est (hinc concussu crepitat,  
& sonitum edit. Hæc etiam relinquit.) Hist. Lugd.  
pro fructu tertio Clusii. *Tabern.* autem pro pere-  
grino 2. proponunt.

Nos sanè suspicamur Clusio non bene perspè-  
ctam fuisse, & quidem postremò Exoticorum de-  
terius cognitam, quandoquidem omittit trium fo-  
raminum vestigia: quæ sanè apparent in iis, quas  
describemus.

An *Auellana Indica villosa*, tria etiā for-  
amina habeat, dubitamus, quia *Lobelius* ali-

K k 2

ter sentire videtur, dum Mehenbethene varietatem facit.

## PALMÆ FACIE CUCIOFERA.

CAP. CLXXXVI.

Descriptio  
fructus.

Cortex ex-  
ternus.

Nucleus.

Cortex in-  
ternus.

Cavitates  
duae.

Germen.  
Cuciopho-  
ron.  
In quo dis-  
serat a Pal-  
ma



gdalarum dulcium nucleus, semunciam crassa. Cavitates duas habet: alteram in totius fructus medio oblongam, fructus formæ respondentem, in æqualiter tuberosam, pulvis ex oryza facie, sed cornea duritie, cætero qui inanem: alteram in parte turbinata paulò supra priorem incipientem, & ad corticem desinentem, oblongam, exiguam, quam exactè complet corpusculum quoddam, rufum, molle, dulce, quod germen existimamus, à quo per maiorem cavernam filum demittitur, duritie, colore & sapore cum nucleo conueniens.

Theophrast. lib. 2. cap. 4. de Aegypti arboribus tractans: *κρυόφωρον* [inquit] appellata, Palmæ similis est, similitudinē habens in caudice & foliis. Sed differt ab ea: nam Palma individua simplexque affurgit: hæc autem, ubi pluculūm adoleuerit, diuiditur & fit bifida, [ *σπινθηρ* enim legen-

dum, non *σπινθηρ*, ut in vulg. habetur, quasi dimidia fiat cacumen: inepto sensu.] atque vterque ramus rursus subdiuitur. Fert præterea virgas breues & paucas. Cortice, [ *φλοιός*: fortè rectius legas *φύλλο* folio: quam lectionem Palmæ historia approbat. ] sicuti Palmæ ad vtenfilium nexus videntur. Fructum peculiarem parit, magnitudine figura & succo [ *χυρός*: non *κρύος* ut vulg. ] à Palmæ fructu differentem: quippe magnitudine ferè, quā manū adimpleat, rotundum, non oblongum, [ *σφαιρική* ] colore flauicantem; succo dulcem & oī gratissimum: cæterum non conferunt, ut Palma, sed singillatim diuisum: nucleo magno, vehementer duro, ex quo velares detornant annulos, [ *κελύς* legimus cum Plin. vulg. *κελός* habent: Gaza verisimiles annulos vertit. ] ad lectorum pedes conficiendos: quibus in stragularis vinculis vtuntur, Gaza. Materies quoque à Palma plurimum differt: altera enim (nempe Palmæ) rara corpore, fibrosa & viridis: altera spissa, grauis, carnosaque, & cæsa crispas admodum, atque dura. Idè & apud Persas ad lectorum vsum, quorum pedes ex ea cōficerent, in pretio fuit.

Eadem ferè & Plin. transtulit l. 13. cap. 9. Cuci titulo. Cuci [inquit] in magno honore, Palmæ similis, quando & eius folijs vtuntur ad textilia. Differt quòd in brachia ramorum spargitur. Pomo magnitudo, quæ manū impleat, color fulvus, commendabilis, succo ex austero dulci. Lignum intus grande, firmæque duritie, ex quo velares detornant annulos. In eo nucleus dulcis, dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandi non possit, nisi [nisi in M. deest.] pluribus diebus maceratus, Materies crispioris elegantie, & eīd Persis gratissima.

Cæterum textilem Persicum, quam Theophr. plurimam in Aegypto nemore Thebaico fuisse scribit, quidam [inquit Hermol.] pro Cuci capiūt Palmæ simili, alia à Persæa.

Cordus nucem Indicam minorem vocat, & Theophrast. Cuci appellari ait: cui tamen Cuciophora dicitur & Plinio. Cuci sic describitur: Cuci dicta nux Indicæ similis est, multò tamen minor: totus enim fructus tres aut quatuor uncias longitudine raro excedit, idem superius latior est, quàm inferius, ubi pediculo adnascitur, figura triquetrus, foris carnosus venosque cortice, intus lignoso consistens, quo nucleus continetur oblongus, in summo quàm imo latior, vtriusque corticis modo triquetri, vnus tamen angulus harum partium acutus est: reliqui duo obtusi ac teretes. Color nucleo & in superficie fulvus, intus candidus: habet etiam in medio cavitatem proportionē toti fructui respondentem, a quo loto humore plenam, paulatim cū exicatur euanescente. Sstantia nucleus constat primū cartilaginosa, paulòque durior, quàm maior nux Indica, sed cū inueteratus fuerit, cornu soliditate æquat, qui pluribus diebus in calida aqua maceratus teneræ cartilaginis duritiem acquirit. Saporem habet, quemadmodum & odorem subrancidum, velut maior.

Cordi descriptionem hic totam dedimus, vt iudicent Lectores vtra opinio verior. Nostra, qui ad Cucioferam referimus, an Caspari Bauhini, qui ab ea diuersam facit, vt antè dictum cap. de nucē Indicæ. An Anguill. epistola quarta *κρυόφωρον* Plinii Ariena, qui ait ex Nubia, distantissima regione, adferri, cuius fibrata substantia masticata paucam præbeat dulcedinem, reliquum expui: nucleum internum, Prupo similem esse, videntem



ridantem, ex quo manubriola fiant Terebellorum, & annuli, etiam ex traditione Theoph.

Nos tamen *κρυόφορον* Theoph. ab Ariena Plinii, diuerfum existimamus, de qua egimus lib. 2. c. de Musa.

Matthioli. Cuciophoram sibi pro nuce ex Constantinopoli per Qualebenum missam ait. Idem in Com. ad Diosc. cum magnis fig. Satyrii (inquit) Erichronii vocati radicem Mali effigie, ad me misit Cochinus Martinellus Rauennas Pharmacopæus, cuius imaginem excudi curauimus ante multos annos. Valerandus Dourez doctus Pharmacopæus, stirpium peritissimus, quique Italicas officinas curiosè admodum perlustrauit, assererebat esse Cuciophori medullam, quod tamen pro certo affirmare nec audemus nec possumus.

De Matthioli Satyrio plura scribemus lib. 19. de Bulbosis. Cuciophoræ autem nucem quidam, vel Camer. teste, receperunt pro Bdellii fructu.

Et, vt perhibent Pen. & Lob. in Aduert. noluerunt quidam non nisi tanquam syluestrem à fatiua Myrrha distare Bdellium. Porro Myrrhæ descriptio quam dant, non est ita diuersa ab ea, quam Plin. scripto reliquit, fructu Caprifici: quem Caprifici quadantenus effigie fructum industria Car. Clusii in versionibus è Garcia habemus.

Idem in Obs. Bdellii fructum nulla circuitione vocant. Sed Palmodiam canens Lob. (cum Clusio) in Hist. Belg. Fructus, inquit, quem Clus. Bdellii putauit esse, eodem nuper monente, videtur potius esse Cuciophori.

Hist. Lugd. in Append. habet nomine Cuciophoræ Matthioli. Item lib. 18. cap. 47. vbi figuram posuit, titulo Perseæ fructus Dalech. Item lib. 18. cap. 18. pro Bdellii fructu Cortuso. Ita vides, eius Hist. compilatorem, exotici huius fructus tres icones, tribus distinctis locis ac titulis, supina quadem oscitantia proposuisse.

Rob. Const. in Lex. & alij *κρυόφορον* sine Cuciophoram arborem putant, quæ nucem Indicam parit, de qua antè sub Palma candida nucifera.

Clus. tandem de eo sic tradit apud Garciam in notis. Bdellii fructus à Cortuso missus, fructu lu glandis nucis magnitudine, aut etiam amplior, triangulari etiã forma, odoratus, colore subcinereo durissimo putamine, quod pregnans esse & nucleum continere videtur. Sed in post. edit. paulatim ad recentem inclinans: non desunt, ait, qui hunc fructum magis referendum censeant ad Cuci Theoph. & Plin.

Et in vltima sua Hist. in fol. Quidam, inquit, Perseæ historiam negligentius perpendentes, nostram fructus Cuci suo puluino nudati iconem pro Perseæ fructu adiecere, qui nobis aliquando pro Bdellii fructu obtusus fuit. Verùm quod in principio dixit Clus. nullum odorem, ac ne vel in attrita quidem, percipimus, nec nucleum in eo, quem ille Bdellii fructum putabat, hoc est in nucleo totius Cuciopheræ vnquam deprehendimus, sed cavitatem quandam inanem, vti prius descripsimus: qui error quoque Clusio cum altero illo renocandus fuit.

Cuciopheram ineptè scribit Tabern. Putamus enim *κρυόφορον* Græcis dictam arborem, quod Cuci ferat, vnde fortè fructus tantum nomine à Plinio appellatur: aut quod Cuci æquè arborem ac fructum significet, sicut Nux: nam & de arbore & fructu agit.

Cuciopheram Theophrast. inter Aegypti arbores tradit: & eius peculiarem esse testatur Scaliger. Fructum primum Patani vidimus & alia plura exotica apud Nobiliss. Cortusum hortu Patani

Tom. I.

praefectum. Obseruauimus quoque Basileæ apud D. Fel. Platerum apertum quem prior icon nostra representat, posterior verò, tum extimam puluinum, tum interioris nuclei magnitudines diuersas, ex nostris quas inter naturalia adseruamus, parata, quamuis minus feliciter sculpta.

Nullum eius vsus hæcenus traditum scimus, Vfus: præter suprascriptum ex Theoph. & Plinio.

~~~~~

## PINEÆ NUCI SIMILIS INDICVS

FRVCTVS.

### CAP. CLXXXVII.

Scribit Cordus in obs. silua: Nux quædam Pineæ nuci similis, sed maior, crassiori cortice, venenosa quadam carne operta, nucleo duro. Affertur ex India: Hæc ille: quem autem fructum intelligat faciemur nos ignorare, quædam videntur quadrare cum fructu Cuciopheræ ab ipsomet Cordo descripto.

~~~~~

## FAVEL SIVE ARECA PALMÆ FOLIIS:

EIVSQVE FRVCTVS VARIETATES.

### CAP. CLXXXVIII.



Nucum Favel. Descriptio  
fructuum.

Nucum Favel, quas habemus alia nigra, alia ruffa, alia cinerea: maritima.

xime magnitudo Nacis moschata, minima Cerafo ferè par: sunt & alia his intermedie. Nigrarum alia turbinata, alia sessilis. Turbinata seu coniformes, rugosæ sunt & striatæ extrinsecus, à latifcula basi in obtusum mucronem desinentes, materie non admodum cadenti cultro, renitente, venis nigris intus distinctentibus, atque latentibus ad medium tendentibus, citra tamen centrum desinentibus, durioribus: quarum spatia & oblongum medullium infarcit substantia ruffa, mollior, fungi arborum compactura: sapor totius aromaticus nonnihil, nec obscure ad-

Kk 3

Sessile.



Rufa.

Cortex.

Barbitum.

Cinerea.

Sapor.

Foramen.

Auellana  
Indica.  
Serap. III  
Arbo. u. de  
scriptio.  
Negil, Ne-  
regil.

Sapor.

Arboris ex-  
actor de-  
scriptio.

nux rugosa, itidem ruffa: internè quoque discurrentibus venis ruffis, quarum interuenia complet materia alba l. gnosa, & pulchra, refert Nucis moschate substantiam interiorem. Turbinatè verò, portu corticis laevis ruffi adharet, quo alibi exuta Ochram pallidam colore imitatur, multò minùs rugola quàm præcedentes, parte sessili propendet fibrarum lutearum barbitum: intrinsecus autem omnium pulcherrimè striis ruffis albidisque variata est: materie magis solida quàm reliquæ dictæ, [quam d. l. sectam pictura exhibet in media tabella: ex hoc genere videntur Camerianæ notatæ K. L. L.] Cinereas item duplices habemus, sessiles & turbinatas: hæc cortice tenui cinereo obuestiunt ruculam nonnihil rugosam, intus Nuci moschate crispo venularum discursu perquam similem. (cui respondere potest figura Clus. not. B.) Sessiles non minùs tenui cortice cinereo teguntur, ipsæ quoque interna substantia turbinatus respondentes. Sapor omnibus vnus, aromaticus & adstringens, in vetustis quas adseruamus: & plerumque omnes ad basin lacuna seu foramine hiant, qui locus videtur germinis.

Cordus Fausel in genere sic describit: fructus est longitudinis vncialis inferiùs subulata basi, turbinata cauernula, modicè concauus, superiùs reticis configurat in mucronem definens, qui supra mentam basi collocatus, cavitatem tegit, erectæ pyramidis figuram imitans: foris cinereo aut subfulco colore, tenuibusque rugis, intus versicolore venarum discursu, Nuci moschate similis. Saporem habet mediocriter adstringentem, odorem verò nullum fatu dignum.

Cæterùm apud Serap. Fausel est Auellana Indica: Autose Habonnisa, arbor Fausel similis est arbori Negil: (fortè legendum Neregil, id est, Nux Indica) fert camerulas [putamina intelligimus] in quibus est Fausel, sicut Dactylus. Hæc arbor non prouenit in Arabia. Isaac Eben Amram de hac scribit: Fausel est Auellana Indica, fructus similis Nuti moschate quantitate & colore, rugosus, saporè nonnihil calido cum pauca amaritudine. Describitur ex Sim.

Sed arboris descriptionem exactiorem dant Garcias & Clus. hanc ille: Arbo Fausel recta est, fungosa materie, foliis Palmæ, fructu nucis Moschate, minore tamen, aut Iuglandibus exiguis simili, intus duro, & candidis rubentibusque venis repperfo, non planè rotundo, sed altera parte sessili, quæ tamen notæ non omnibus Arece generi-

stringens. Sessiles complicitam offusam imitantur, aut pastillos terræ Turcicis characteribus signatæ, altera parte planior, altera gibbosa, rugis externis, internardumque venarum discursu & sapore cum turbinatis conuenientes. Ex ruffis quæ sessiles sunt, aliæ adhuc intactæ sunt cortice, ruffo, in fibras sessili, sub quo

bus conueniunt. Integitur hic fructus inuolucro admodum lanuginoso & foris subflauo, perquam simili Dactylis, cum maturuit, & antequam siccatus sit. Arbor Arece Clus. teste in magnam altitudinem extrescit, trunco æquali propemodum vbique crassitudine, qui cortice integitur adeò leui, vt nullum ascensum præbeat, nisi apratis ad pedes compedibus, & laqueis, aut cincto per intervalla caudice, vinculis quibusdam ex sparto at hæc materia confectis. Huius rami deorsum non inflectuntur, sed sursum vergunt & incuruantur, vt procul intuentibus orbem quodammodo conficere videantur. Folia pectinatim ramos utrinque ambiunt, & aliqui Palmæ similia. Fructus deni aut duodeni, suis inuolucris villosis tecti dependent ex crassis & oblongis pediculis, qui in inferiorum ramorum alis nascuntur.

Idem in Arom. Garc. hist. nobis scribit de Fausel. Iudasius codex Auicennæ dicit esse speciem Oliuæ Indicæ: quæ verba neque in Latina editione extant, neque in Arabico exemplari, quod longè vberius, quàm editio Bellunenſis Fausel describit. Verba ita habent in Arabismo. Fausel fructus plantæ in India similis nucis Moschate, nisi quod Fausel est rubro colore, frangi contumax, & in particulis tangitur, & ex fractione fragrantis odore. Indi autem assument illud ad emendandum halitum: & in hinc dentes rubore. Facultas eius proximè accedit ad facultatem Sandali. Frigidum in tertio cum aliqua siccitate. Frigefacit cum quadam adstrictionis facultate. Bonum ad Apoplemata calida & crassiora, membra oculi, quæ inflammatione laborant. Cohibet humores frictum & illitum. Hæc omnia ferè desunt in cod. Latino: quæ nos, vt solemus, non satis latine, sed perspicue, & fideliter reddidimus. Alioqui & latine, & nudè reddidissimus, si maiorem eloqui quàm verborum Auicennæ, rationem habuissimus. Hæcenus Clus. Sed hic se exerceat Philosophus naturalis, quomodo fieri possit, vt fragranti odore sit Fausel, & nihilominus frigidum tertio. In nostro Fausel hunc odorem experimur, nec tenemus, vt ad nos adfertur, frigidum tertio.

De eadem sic Scaliger. Est & alia Palmæ species gracilior, procera, foliis læuissimis, inter quæ racemati harent poma, nucum magnitudine, alba. Fructus is pro bellariis cum Betol manditur à Proceribus. Arece nomen est. Fertur in mercatus magna estimatione recens. Seruatur & in modum Palmarum siccata. Vartomanus Arece vocat arborem: fructum Cossol. In navigationibus, & apud Odoardum Barobsum & apud Lud. Barthema de India, fructus Chosole, alibi etiam Cossolo dicitur: arbor Arecha: & alibi Palmæ species Arece.

Matthioli in post. com. Lat. & Ital. ubi figuras quinque ponit & vnam cum inuolucro: sunt, inquit, quadam nuces, quas quidam Methellas putant, Myristicarum magnitudine & colore, aliæ rotundæ, altera parte sessiles, aliæ oblongæ, conteguntur capillaceo quodam inuolucro. Nuces Farfalah Constantinopoli vocari scripsit ad me Qualcebenus, vt latius in epistolis scriptum est. Ego verò Indicas crediderim Auellanas Serapionis Fausel appellatas, videturque hæc nuces rectè agnouisse Mathæus Syluat. quippe qui Fausel Auellanam Indam, Nuci moschate simillimam interpretatur.

Satis autem admirari non possumus, quid venerit in mentem Matthiolo, vt scribat Fausel & Auellanas Indicas esse, quas quidam Methellas putant.



putant, magnitudine Myrsiticarum & nucis Farsalachi. Ostendatur nobis auctor aliquis, qui Fausel Methelham dixerit. Qualecunque scribit se per nuces Farsalachi intelligere nuces vomicas ipsius Matthioli, id est, nostras nuces cellatas: quæ quibusdam Methel, de quibus antè: planè existimamus eum non intellexisse, quid commentaretur, & confudisse fructum siue nucum duo diuersa admodum genera.

In eiusdem Matthioli commentariis, Illust. per C. Bauhinum l. i. c. 147. insignis est confusio, postquam enim Matthiolus annotasset multa de Methella & Vomica vulgaris Stramonio, quod Methel censet, earumque vires retulisset. Sunt & alia, inquit, quædam nuces, quas quidam Methellas putant, Myrsiticarum magnitudine & colore, suis nixi rationibus, de quibus, quid in præsentia dicam non habeo. Atqui non omnibus eadem est facies, quippe quod alia rotunda sit, quæ ad Fausel pertinet, & non ad Stramonium.

Camerarius quoque quibusdam Methellas dici ait.

Arabum Fausel Garcias cum plerisque Herbariis confirmat, tametsi corruptè Avic. lib. 2. c. 262. Filsel & Fusel legatur: tum etiam in Dofar ex Xael portibus Arabicis: in Malauar Pae à vulgò, à nobilibus verò *Areca*: quo nomine veniunt Lusitani, qui in Indis habitant, quoniam primùm ea regio fuit illis cognita: in Guzarat & Decan, *Su-pari*: in Zelan, *Pas*: in Malaca, *Pinan*: in Couchin, *Chacani*.

Meminit quoque *Areca* Lud. Rom. in nauig. fructum *Chypho*, iniquis nasci in arbore *Arecha*, *Palmæ* non absimilem.

H. Lugd. more suo de hac tractat, locis diuersis: primò sub nomine *Areca* siue *Fausel* Clus. ubi arborem pingit, l. 8. c. 10. & mox inter alios fructus, vnicum in medio cum inuolucro. Secundò alio in loco nomine *Areca*, absque iconè. Tertiò, in appendice, titulo, Auellane Indicæ Acofæ. Tam egregius ille fuit diribitor exoticarum.

Cæsalp. Nuci Indicæ affinem ait, arbore erecta, fungosa: fructu inuolucro casto & limbiginolo contento, exterius flano, imitante *Dactylos* maturos, sed non siccos. Lusitani *Arequers* vocant.

Linchott. quedam à prædictis diuersa habet. Fructus, inquit, cupressi fructum similitudinem refert, quidam verò ab vna parte planiores, ab altera elatiores sunt, alii maiores ac durissimi, [quos forfice scindunt ac cum Bettela dentibus terunt] interius venis multiplicibus distincti, colore rosaceo. Crescit arbor sicut *Palmæ* *Coquifera*, verum tenuiore ligno, foliisque minoribus, vt non malè quis *Palmæ* speciem quandam syluestrem dixerit. Fructus primùm cortici inclusus est, donec florere incipiat, tum aperitur cortex qui maturo iam fructu & flauescente decidit. Fructus verò ipse ex longo crassoque ramo, in petiolos scopæ instar diuiso, dependet, magnitudine haud par. Sed ad figuram æneam *Palmæ* quidem similem iconem pingit, verum cum calyce foliaceo. An bene, nescimus, quia fructum recentem aut ex arbore pendente nunquam vidimus. Idem tamen in alia figura variat, nec calycem ita artificiosè appingit.

Arboris figura quam Clus. exhibet plurimum differt facie ab Acofæ. Vtinam esset, qui exotica ista aliquando fideliter & ex rei natura depingeret, describeretque. Genus *Arece* apud eundem Linchott. describitur, quod Indi *Checaninum* vocant, minutum, nigrum, ac durissimum. Tamen cum cæteris pariter *Bettela* adiungitur, in masti-

catione & usu, nullo nisi ligneo sapore. Ipsum tamen os humectat, ac rubore & nigredine inficit, ita vt nondum sicca dentes ac labia *Arece*, velut ex cruore maceant. Et alia inuenitur, quæ manducata homines quasi ebrios in vertiginem rapit. Verùm id malum citò cessat. *Areca* ac *Bettelæ* libum ex ligno siue arbore, quam *Kaatani* vocant etiam admiscet, ipsaque *Bettelæ* folia calce vngunt ex ostrearum testis adultis confecta, quæ tamen ob exiguitatem corpori nocere nequit. Hanc confectio nem pariter deglutiunt, succum nempe, nam cætera expuunt. Valet (vt aiunt) aduersus scædum oris halitum, firmat dentes ac ginguas, oscedinem, siue (vt vulgò vocant) *Scabutum* auertit, atque idè experimentis constat Indis nunquam os malè olere, nulli dentium dolorem esse aut stomacacces scæditatem, vel huiusmodi alia vitia, ad summam fœtorem vique inuiolato dentium ordine, cum inter os velut cruore delibutum, scædo adpectu squalcat.

Lusitanorum mulieres in Indis degentes eundem manducandi morem habent, cui cibo ita assueti sunt, vt sine *Areca* atque *Bettelæ* viuere sibi *deputarum* ducant. Mares perinde ac femina tota die, inuicem etiam noctu malicari solent, cum dormire nequeunt. Atque eius elu ventriculum roborant, nauseam auerit, appetentiam promouent. In hos scopos post singulos pastus *Areccam* cum *Bettelæ* & calce vorare consueverunt.

Cæterum Serapioni, ex authoritate Isaac eben amram, *Fausel* est frigidum & vehementer adstringit ac roborat membra, eiusdemque est facultatis cum *Santalo rubro*: confert apostematibus calidis: quo deficiente substituitur idem pondus *Santali rubri* & media pars *Coriandri* virentis. Mahazer dicit frigidum & siccum, & vtile esse in morbis calidis illitum. Bedegoras verò ait conferre crassiss ac duis apostematibus. Mesurugia in dolore dentium & scabie palpebrarum commendat. Aben Mesue tradente, frigidum & siccum est *Fausel* in tertio gradu, & stipticum, confert dolori dentium eoque vacillantes cum ginguis firmat, ac reprimat calorem oculorum. Hac apud Serap. Verum non placet Bedegoræ sententia: nam quæ valde adstringunt, & sicca frigidaque sunt, non possunt resoluerè induratos tumores. Nec frigidum existimamus in tertio gradu.

Scribit idem Serapio excalefacere, & amaritudinis particeps esse. Sed cum degustauissem, inquit Garcias, nullum calorem deprehendi, verum cum insipiditate adstrictoria facultate præditum esse comperi. Itaque puto aut Serapionem hanc *Areccam* non nouisse, aut, si nouit, illum nunquam degustasse.

Immaturus fructus, eodem Garcia teste, stupefacit & inebriat. Editur autem immaturus à nonnullis, vt veluti inebriati, dolorum cruciatus non sentiant.

Siccitatem verò fructum sic parant. Contusam nucem *Fausel* in tenuissimas partes cum *Lycio* & folio *Betæ*, cui exemptus sit neruus, mastificant, & priorem saluam, quæ cruenta est, expuunt, eaq; ratione cerebrum & ventriculum expurgant, ginguas & dentes stabiliunt. Potentiores ex *Fausel*, *Lycio*, *Capitura*, ligno aloës, & *Ambrai* momento formas orbiculares siue pastillos componunt, quos mastigant.

Ex ea viridi aquam stillaticam vitreis organis elici iubet idem Garcias, qua maximo cum succellu in biliacis alui profluuiis vsum se gloria-

Rūtor.

Alia præ-  
meliora.Mixtio Ti-  
dorum ex  
Arece & v-  
aliti Kua-  
tam.Vires & v-  
sus.  
Oris scæd.  
Dentes  
scabie.  
Scabutum.  
Experimen-  
tum ludo-  
rum.

Téperam.

Apostema  
suc. eda-  
neum.Dolor den-  
tium.Calor ocu-  
lorum.Bedegora  
sententia  
improbata.Serap. ex-  
ror.Immaturus  
sucet.Arece  
preparatio.

Pastilli.

Aqua ex  
Fausel.

*Arecum* tur: sed arecum id sibi hæcenus fuisse.

*ut alia  
profusum.*

*Sira. bi.  
Sira. d.  
Sira. m.*

*Tambolos*

*Ara. Ind.  
Ind.*

*Ara. Ind.*

*Ind. Ind.  
Rom. Ind.*

*Locus*

*Varietas  
ex regionibus.*

*Serap. Ind.*

Ridiculum est quod scribit Lud. Rom. ac parum rationi convenire videtur, nescimus an experimento respondere possit, (quoniam quæ sanitatis tuendæ causa edantur, præsentissimum venenum assent) nisi historiam & modum ipse adiceret. At Sultanus, inquit, letho traditurus è Satrapis quempiam, ad se accersitum cui mors imminet, nudum sibi assistere compellit, moxque edet non nulli sibi uenas, *Chofolos* vocant, instar nucis myrsicæ: mandit etiam quædam herbarum folia, modo mali Assyrii, *Tambolos* nominant, addit etiam attritarum concharum ostrea calcem, simulque cuncta mandendo ruminat. Tandem cum, quem cupit occidi, expuit, aspersoque eo, continuò mors subsequitur, præsentaneo veneno vitam perimente: nam ubi in hominem, ut præmissimus, expuerit contrita venena, intra mediæ horæ spatium perfusus veneno, in terram corruens efflat animam. *Hacille* de Sultano Cambaiz, quem pater à cunabulis veneno aluerat. Similis historia est apud Auicennam ex Rasi testimonio, olim nutritam puellam esse veneno, eam tantum ob occasionem, ut reges quosdam & principes (quod formosissima esset) qui secum rem haberent, inficeret: verùm Matthioli ait eam historiam Arabicis potius fabulis imitari, quàm rem aliquam, quæ omnibus naturalis Philosphiæ rationibus comprobari possit. Nos etiam in eam sententiam faciliè adducimur fabulosam historiam esse Auicennæ, ut & historiam de Sultano Cambaiz, & non dubitanter dicimus cum Clusio Ridiculum quod scripsit Lud. Rom. de ea necessarium morbis quam putat idem recentem subitanæque expuitionem esse, credimus: nec quod Sultanus Cambaiz enutritus sit veneno, propterea contrita dentibus venenata reddi. Intelligendum igitur aliam mortis causam violentam intervenire, alioqui ridiculum esset illam expuitionem passum interfici: sicque expuitio non causa, vtilis ait, sed signum erit mortem præcedens.

Potè, ut refert Garcias Fausel nascitur plurimum in Maluaz, in Gazarate & Decan pauca quantitate, idque duntaxat in maritimis, sed laudatum, præsertim in Chaul, quod defertur Ormuz. Optimum item provenit in Mombaim insula. Laudatur etiam quod in regione Basaim provenit, atque id defertur in Decan cum hoc quod in Gauchin nascitur nigrum & pusillum, durum admodum, postquam siccatum fuerit. Nascitur etiam in Malaca, sed tam parva quantitate, ut vix incolis sufficiat. Item in Zeilan magna copia, sed candidum, quod in eam partem regionis Decan defertur, quæ Cotamaluco paret: tum etià in Bisnaga. Defertur etiam ex Zeilan in Ormuz, Cambaya, & in insulas Maldivas, siue Naledivas. Et tamen scribat Serap. lib. simpl. cap. 345. Arabiam non alere Arecam, [de mediterraneis locis, magna ex parte intelligendum id est:] nascitur tamen laudata: sed exigua in Dosar & Xaël locis maritimis. Amat enim hæc arbor maritima loca, & mediterranea respuit. Adfertur ad nos ex Indis in Europam, sed rarsissimè, nec nisi à curiosioribus. Casuta enim inuenias inter alia aromata, præsertim Zingiber. Sed nuper admodum Hollandiæ portus naues appulisse scimus, earum non parvam quantitatem aduehentes, de quibus plures diversarum figurarum, & qualdam cortice albo eoque tenui mediè testas, atque etiamnum barbato hærente accepimus ab amico quodam nostro pharmacopœo.

Quod si quis & apud nos ad usum transferre volet (hæcenus enim in Europa in usum medicum non venere, quod sciamus.) is eligat maiores, ponderosiores, recentiores, adstringentioresque, vel Cordo id suadente.

## NVCI MOSCHATÆ ET FAUFEL SIMILIS NUCLEUS.

CAP. CLXXXIX.

Quum Gener reuertetetur anno 1606. ex Anglia, & Belgio inter varios fructus, non adscriptio nomine, habebat fructum formæ, & magnitudine nucis Moschatæ, non sessilis, & turbinatæ, ut plerumque est *Fausel*, vnciam sublongum, durum, resistentem sectioni, qui inæcus in aquam fidit: in vna parte pulcher umbilicus, in medio nonnihil protuberans: ab umbilico exoriantur nerui nonnihil elati, albi, qui per nucem fulcam, vel nigricantem, obliqui, & reticulatim perueniunt ad oppositam partem, nucleum existimamus ut *Fausel*, cuius fortè genus, in parua parte aliquid corticis nigri.

FRUCTVS VNA PARTE SESSILIS, velut sulcis distinctus, instar nucis Fausel.

CAP. CXC.



\*

Inter fructus, quos adferrebat Gener Cherlerus ex Anglia, unum reperio ab humilissimo Virolac. Gareto procul dubio datum, qui magnitudinis iuglandis cum suis tunicis, ponderosus, in aqua tamen non fidit, durus, sectioni resistens, videtur siccus, & nihil continere, sed nucleus esse, saltem nihil sonorum, colore

fulco est, globosus ferè, nisi vnâ parte nonnihil sessilis, non tamen *Fausel* modo, sed suo particulari, cui alioqui ferè similes habet sulcos, penè reticulatim distinctos: corticem duplicem, vnum tenuem, nigrum, lucentem: externum fulcus est, cum aliquo robore, similis cortice nucis moschatæ, duro, fragili tamen: habet magnum umbilicum, album.

Existimamus hunc fructum ita tradi per Clusium Exot. l. 2. cap. 22. Fructus è Valachia acceptus, & communicatus per honestum virum V Vilhelum Parduynum orbicularis penè erat figuræ



figuræ, vñ tamen parte scissilis & quodammodo planior, alterâ in orbem allurgens, creberrimis- que subnigrâ, spendentēque, quâ tegebatur, cute, siue membranâ, quaquaverum velut sulcis distinctus, inftar nucis *Fausel* siue *Areæ* suo inuolucro exemptæ, cui etiam substantiâ non videbatur adeo dissimilis: verum longè maior, nec adeo turbinatus. Grauis erat, cortice fusco præditus, eoque, quem dixi, modo sulcatus, interna pulpa siue substantia, dura, candicans, salsi initio saporis, dein adstringentis.

SIRI GATA GAMBER INDIS, PA-  
STILLI EX FAUFEL.

## CAP. CXCI.

EX fructibus [inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 15.] delatis per Batauos in prima nauigatione, datus decimus tertius [si fructus appellandus est] proflus circumnata erat rotunditatis, planus, nucis *Vomicæ* magnitudine, & penè formâ, ex rufo cineracei coloris, qui confractus, internâ parte albus, amaritudinis cum aliqua acrimonia particeps. Si fructus erat, externum corticem habuerat quo spoliatus: sed faciliè mihi persuaserim non fuitum fuisse, veram pastillum ex *Areæ* polline, & calce, aut aliquâ re simili confectum: nam statim atque *Albada* Guzaratenfis [quem euocari curaueram, quum exotici illi fructus mihi conspiciendi tradebantur, vt nomina, si quæ ipsi nota essent, percontarer] vnum & alterum in os iniecit, & appellatione indicatâ, *Siri gata gamber*, præsentibus binis mercatoribus manducauit: eam ob causam, quum maiore diligentia hos pastillos considerarem, & cap. 25. lib. 1. Historiæ aromatum Garcia examinare, prorsus similes is esse videbantur, de quib. sectione quinta illius capituli scribit: Potentiores videlicet ex *Fausel* siue *Areca*, *Lycio*, *caphura*, ligno *Aloës*, & *Ambari* momento formulâ componere, quas essent. Similes antè accipere memini Londino nissos, quum Francofurti ad Manum habitarem, cum hac Inscriptione, Apud Indos magno in pretio haberi. Sed & quotquot naues deinde in Indiam profectæ, redierunt, huiusmodi aliquot formulâ retulerunt.

FAUFEL ACCEDENS NVX.

## CAP. CXCH.



O Stendebat mihi Theodorus Clutius, [inquit Clusius Exot. lib. 2. c. 23.] fructum exoticum, sciscuncialis longitudinis, vncialis crassitudinis, cutaceo putamine præditum, cineracei, foris coloris, internè multis fibris constantem, penè inftar inuolucris nucis *Fausel*, siue *Areæ*, internâ parte veluti gemino, & duplicato calyce mu-

nitum, extimâ siue supremâ mucronatâ: nucleum siue verius nucem continebat nigram, valdè rugosam, duram, *Fausel* non dissimilem, ad cuius genus non ineptè referri posse arbitror. Similem *Fructus* inde aliunde accipiebam, cuius officulum erat durum, nigrum, multis villis oblitum, nucleum continens rugosum, durum, insipidum. *Figura est num. I.*

NVCLEVS PYRAMIDALIS INDICVS, AD  
FAUFEL ACCEDENS, VENIS.

## CAP. CXCHII.

Inter fructus peregrinos Illust. Cels. V. Virtemb. Descriptio scilicet memoriæ Stutg. 1603. Pyramidalis erat, vnciam longus, quâ magnitudine pictus, externâ parte nigricantibus venis pictus, ad *Fausel* accedentibus, pulpa albâ, durâ, in medio aliqua cavitâs, eo modo, quo in nuce *Indica* magna, saporis manifestum non exuperior. Nucleus videtur non maior, quàm cavitâs nucis hirsutâ, quæ antè in huius libri c. 188. tertia numero habetur. *Huius non est cum præcedenti, num. II.*

PALMÆ FACIE HAIRI.

## CAP. CXCHIV.

*Hairi* in America arbor est, folio palmeo, ligno marmoris nigro simili, quâ mobrem multum *Ebenum* esse existimant: quorum sententiam *Theuctus* non approbat in sua histor. Gallix Antartica. Nam



*Ebeni* lignum nitidius spîdet. Deinde arbor hæc tota spinosa est, minime verd *Ebenus*. Postremo *Ebenus* in *Aethiopia* & *Callecto* nascitur. Lignum istud ferri modo ad ima aquæ fidit: quare *Barbari* ex eo enses faciunt atque monilia, adeoque durum ac validum est, vt ex eo sagittæ quasuis ferreas loricas penetrare possint. Fructum e-

dit pilæ lusoriæ magnitudine, altero extremo quodammodo acutum. Intus nucleus est niuei candoris. Hanc autem arborem syluestrem *Brasiliz* *Airy* dictam *Lerius* existimat *Ebeni* speciem, *Airy*, quam describit foliis *Palmæ*, trunco multis spinis armato tenuibus & pungentibus instar acuum, fructu mediocri magnitudinis, in quo nucleus candidus, non edulis. Lignum nigrum, ex quo propter duriciem syluestres homines parant enses, & fustes, & sagittas. Politum est & lucidum, ita ponderosum vt aquæ iniectum fundum petat. *Theucti Hairi* quadantenus similem fructum nomine *Tayama* descripsit *Ouiedus*.

Considerandum an de *Hairi* hæc scribat *Plin.*

lib. 12. cap. 5. vbi postquam de Ebena tradidisset, sic ait: Ibi (in India videlicet) & spina similis, (Ebena dicta) sed deprehensa vel lucernis &c.

## PALMA YRL

## CAP. CXCIV.

**I**N Brasilia, vt scribit Linius, Palmarum quatuor aut quinque species conspiciuntur: inter communiore sunt, quas Syl. homines vocant *Gerau*, & quæ dicuntur *Tris*, sed in nulla earum Dactylum vidit, existimat etiam non proferre. Yri quidem fructus est rotundus, Prunellorum seu Pruni Syl. dictæ specie, sed in magnum racemum congestus, tantæ magnitudinis, ac ponderis quantum homo vna manu attollere queat: sed meri sunt nucleis, nec cerasi nucleis maiores, quorum quidem sit vsus. Sed & teneram quandam gerit summitatem inter folia istarum sed iuniorum, quam in cibum cædebat cum focis: testaturque nobilem à Pontæ hæmorrhoidibus vexatum, dixisse eas sibi remedio fuisse. Antea egimus de Palma *Lantor* dicta fructu cerasi, sed ab hac diuersa.

## EBENVS.

## CAP. CXCVI.

**E**benum vt iungamus Palmis ansam præbet Plinius, qui Ebenum Palmarum generis facit. Hæc quoque modò descripta, quæ à quibusdam Ebenus existimatur, Palmo est folio. Ceterum Ebeni lignum quale ad nos Europæos importatur, (Hoc etiam testante Hen. Schickart, industria & peritissimo Ill. E.C Wirtemb. Architecto) duum est generum: *Verum* seu genuinum: [ *Gurr Eben Germ.* ] & sylvestre: [ *Wild Eben* ] Vtriusque fructum egregium & perpolitum dono ab eo accepimus.

Estque illud quod *Verum* appellatur sylvestri ponderosius, nigrum, alicubi interdum colore ligni nucis luglandis, aut etiam pallidius, quam coloris varietatem in bonitatis notis habent. Passim ceu minutis quibusdam segmentis scarificatum, longè frequentibus aliis splendentibus nec impressis refertum. Idem Architectus aliquando, sed rarius, hominis crassitudine truncos vidisse testatur, sed nullum vnquam quod non putredinis aliqua labe alicubi fuerit infectum: quale & nos aliud habemus, ac suberis quodammodò fungosæ substantiæ in parte quadam, quod ætati & corruptelæ tribuissimus, ni is monuisset aliter.

Sylvestre ab eo vocatum, prædicto nigredine ac pondere cedit, sed vix elegantia atque splendore: passim quoque lineis ceu scarificationis quibusdam vestigiis, verum non vt in priori, profundis aut incisis, nihilominus tamen splendentibus, conspicuum. Veri portio adolescens flamma, non iniucundum pirat odorem, vt nobis quidè videtur, nò tamen sine odoris quadam grauitate peculiari. Vtrumque aquæ iniectum protinus fidit: & vix aliud è lignis inuenias ponderosius. Videtur tamen sylvestris natura non nihil pinguior & oleaginosior esse. Sed quid Auctores de hac tradiderint audiamus.

*Differentia* Theophrast. de arboribus Indicis tradens, Ebenus (isem: Gaza Hebenum vertit:) quoque, in-

quit, eius regionis propria est: Cuius duo genera: alterum præstanti pulchroque ligno: alterum vile ac ignobile. Rarum est id quod præstantius: aliud copiosè habetur. Coloris gratiam recondita & asseruata non acquirit, sed natura statim. Ipsa arbor fruticosa est, veluti *Cytisus*. (Sic cum Plin. & Gaza tantisper legamus, donec prodeat qui nos doceat quid sit *nummòs*, vt in vulg. exempl. legitur) Eius lignum Buxo [ *oxyx* ] aspectu simile est, sed decorticatum, nigrum apparet: multæ durationis est, ac naturæ quodammodo perpetuæ: nam ne arefactum quidem leuius redditur. Graue etiam densum.

Aristoteles Ebenum aquas subire ait propter densitatem in lib. de mistorum affectibus. Non autem fluitare ait, quia *δυσανέμων* est. Quo ex loco & id obseruandum, quod ait: *ἐν δὲ τῷ Ἰβν* & *πυρρῷ*. Quasi etiam non nigra quæpiam sit Ebeni species, vt neid quidem latuerit Virgilium, qui epitheton adiecit, tanquam necessarium, cum dicebat: Sola India nigrum fert Ebenum. Herodotus tamen ex Aethiopia post expeditionem Cambyse vespertiles Aethiopes factos, centenas Ebeni phalangas tributi nomine Persarum Regibus pendere solitos, scribit, vt mox quoque specialius dicitur ex Plinio. Id quod adiecit viros doctos (vt annotat Scal.) suspicari, Guaiacum iam vsu Veneræ luis factum nobis popuiare, nihil esse aliud, quàm Ebenum decolorem. Quæ ligna si sunt affinia, potius hominum opinione, quàm specie, meminimus, ab autoribus proditi, frondes Ebeni Buxo similes: Guaiacinas viduinas allatas, Comari, Laurisue facie. De Pausaniæ hæc quoque in historia [ inquit idem ] mendacis non est hic locus: Ebenum radicem esse operam sine stipite. [ Sed ex alterius sententia illud tradit, vt dicitur mox. ] Contrà, impostores & phalangas pedestres lanceas venditant è Terebintho, & incoctas atramentum Populas assulas ad speculorum capsulas: & ad tessellatum emblematis opus Roboris frustilla, quod diu sub aquis natum fuerit nigredinem commendabilem.

Plin. de Ebena sic tradit: Vnam è peculiaribus Indiarum arboribus Virgilius celebravit Ebenum, nusquam alibi nasci professus. Herodotus eam Aethiopiæ intelligi maluit, ac in tributi vicem regibus Persidis è materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Aethiopes cum auro & ebore, prodendo &c. Romæ eam Magnus Pompeius in triumpho Mithridatico ostendit. Accendi eam Fabianus negat: vitur tamen odore iucundo. Duo genera eius: rarum, id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi: alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India dispersum. [ De vtroque id Theophrast. non tantum de viliori: vbi videas aliter hæc tradita loco paulo antè citato. ] Spississima ex omni materie, idè & grauissima iudicatur Ebenus & Buxus gracilis natura: (magis placet hæc lectio, pro vulgata illa, Ebenus & Buxus, graciles: nam paulo antè arboreum dicit: & visi sunt trunci arboris iustæ magnitudinis. At Theophrast. Buxum quidem totam gracilem dicit, Ebenum medulla) neutra in aquis fluitat. Cytisus proximè accedere ad Ebenum videtur. Quamquam non desinit, [ vt Theophrast. ] qui Syriacas Terebinthos nigiores affirmat.

Porro quod antea de Pausaniæ dictum neutiquam fabulosum existimat Matthioli. Ergo vt res propriis cognoscatur, verba eius producenda. Is *Γαζαν* describens sic ait: Audiui Cyprium hominem



minem oppidū quā peritum in herbarum genibus ad medendi vsum notandis, qui diceret, Ebenum nulla folia, nullūque omniū fructum ferre, quin & stirpem nullam esse Soli expositam: radices tantū terra occultari, quas eruant Aethiopes, atque ii inprimis, qui quo maximē loco reperiantur, norunt. *Hec ille.* Quæ etsi fabulosa fortasse videantur, facilius tamen illi credendum censet Matth. quā Anguillario, qui minorem Anagyrim, quam Ananienfes Eghenum vel Eghelum vocant, vocis tantū similitudine fretus, secundum Ebeni genus [videnda sanē opinione,] Theophrasto esse censet. Cū Eghenus foetidissima sit planta, & scribant Theoph. & Plin. id Ebeni genus in India tantū nasci, & in India tota dispersum.

Sed quod de Pausania Ebeni dictum, istud quidem haudquaquam fabulosum putat Matth. cū scribat Georg. Agricola, fossilium indagator maximus, reperi etiam in Germania Ebenum fossile, ad 7. libris ferē calcem, his verbis. Quinctiā Hildesheimi intra terram aluminosam iuxta lignum in lapidem mutatum, & in eius commixtissimis reperitur Ebenum fossile, quod & sparsum in aliorum lapidum cauernis, tanquam in aluo latere Theophrastus non ignorauit. Stirps est nigra, foliis fructūque carens, cornu politi modo splendida, solida sed leuis, omnino aspectu similis gagate lapidi, sed naturā admodum diuersa. Nam Ebenum ignem non sentit, Gagates accensus ardet & igni perit. *Hec ille.* Sed verba Pausaniae videntur demonstrare potiū adulterinum Ebenum, quā verum, de quo hic agimus: aut saltem ei non notam eius arborem.

Quod si Matth. quoque credidit Ebenum illud fossile & lapideum de quo Agricola agit, esse id quod hoc capite descripsimus, tam erat, quā verē Pausania narratio mendacium à Scalig. vocatur: vt taceamus Ebenum adulterinum, non magis esse Ebenum, quā statua homo. Scribit Goropius in Ad. lib. primo. Stabant ingentes sub profunda terra trabes, quæ diuturno seculorum decursu Ebeni tum colorem tum duritiā contraxerant: documento, quī in hac regione Ebenum possimus imitari, quod illi nouerunt, qui vermiculata ē hignorū diuersitate opera componunt. Scaliger. de Plant. lib. 2. similitum Ebenorum meminisse diuersis lignis adulteratorum, de quibus paulō antē.

Consulamur Dioscoridem. Ebenus, inquit, optima censetur Aethiopica, nigra, venarum pectinūve expers, cornu laborato leuore similis, quæque fracta densa apparet, mordet autem gustu ac leniter adstringit. Prunis imposita cum odore iucundo & citra fumum vitur. Recens verō igni admota ob pinguitudinem accenditur, & ad cotem trita subfusula redditur. Est & altera Indica, intercurrentibus lineis prædita, candidis & fuluis, itēque maculis frequentibus: ceterū prior bonitate antecedit. Nonnulli porrō Mori aut Acanthi ligna, quod consimilia sint, pro Ebena vendunt. Ex eo autem internoſcuntur, quod fungola sint, & in asfusal ad purpuram vergentes resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec suauis odoris in fuffitu præ se ferētia. *Hec Dioſc.*

Nunc quaeritur an Ebenum, quod ad nos importatur, & hodie apud Magnates & artifices pro Ebena celebratur, quale duūm generum superius descripsimus, sit vnum aliūquod ex his à Dioscor. descriptis. Dubitationis occasionem præcipuam putat Matthiol. quod fuffitum nullo commendetur odore. Noſtrum sanē non solūm non

foetet, sed & incundi quiddam spirare videbatur, flammā adoleſcens. Quod verō Matth. ait, Plinium nullibi odorati Ebeni meminisse, ostendit se Plinii locum, vbi maximē de Ebena disſerit, admodum oſcitanter perpēdiſſe.

Dalech. putat odorem eius tempore longo, per maria & itinera euaneſcere poſſe, quod in totum vix fieri poeſt in tam ſolido denſoque ligno.

Curtius quaſi in nouum quendam orbem delatus de Ebena iudicat: Arborem vt plurimum eſſe tenuem, vimine raro, & in craſſitudinem caudicis extuberato, cortice hiulco, & admodum reticulato, adeo venis dehiſcentibus, vt per ſinus ipſos intima pars tenui libro contegatur. Sed quo auctore hæc dicit? aut vnde euentus eſt hanc Ebeni deſcriptionem? quis ei dixit arborem vt plurimum eſſe tenuem? Quaſi verō ei nota fuerit. Neque hoc illi ſat erat, niſi hanc ſuam temeritatem ingeminaret aliā: Theophr. autem [inquit] foliis ramisque, ac reliquis denique omnibus Terebinthino ſimilem dicit, fructu tamen diuerſo, & Amygdalis conformi. Plus sanē ille vidit apud Theoph. ſi hæc vidit. Sed qui Theoph. conſulet, facile agnoſcet ipſam ei imponere. Ita enim ait l. 4. c. 5. *ἡ δὲ τῆς ἐβένου ὁ σῆμα τῆς ἀμυγδαλῆς ὅμοιον ἐστίν, ἀλλὰ τὸ φλοιὸν καὶ τὸ σῆμα τῆς ἐβένου ἄλλοιο.* Nihil hic de Ebena: ſed Terebinthum Indicam comparat cum Terebintho Græca.

Anguill. liberē ſatetur, Verum Ebenum quale ſit, ſe ignorare, ac quum in noſtro deſit odor, qui à Dioſc. requiritur, verum Ebenum ſe dicere non poſſe. Et alibi: *Egan*, ait, videtur Ebeni ſecunda ſpecies Theophr. [quam opinionem improbari à Matth. paulō antē dictum.] Totam Ebenum quā vtuntur Veneti, ſcio, eſſe ex Egeno quæ deuehitur ex Syria & Cypro, vbi hodie adhuc vocatur *Heben*. De hac Ebena Anguill. plura c. de Laburno. De Hō. Belli Cytiſo vera, & medulla nigra Ebeni Theophr. agemus cap. de Cytiſo vera & Maranthæ, & de Ebena Creuica Hon. Belli cap. de Cytiſo Cretica flore rubro.

Guiland. Theonino ſuo dente Matthiolum petit, quod Ebeni innumeros haberi in Italia truncos adſtruit, nec animaduertit, lignum quod vulgō Ebeni nomine venit, ſuffitum ſupra carbones, iucundum odorem non eſſare, neque ad cotem aliſum ruſſeſcere, neque etiam cum aqua tritum in ſuccum abire: quapropter ſædum ait eſſe hunc Matth. errorem. Sed, vt ita ſit, iſta omnia non conuenire truncis iſtis, quos vterque intelligit, tamen cand. d. ſi cum Matth. agere debuit, quippe qui ipſemet falſus ſit in ſuis ſcriptis, vt antea dicebamus, Ebenum vulgō dictum, ſuffitum nullo commendari odore. Deinde ſcire debuit Guiland. iſtas notas quas adducit non Indico ſed Aethiopico tantum tribui à Dioſc. quapropter nihil obſtare quominus Indica Italis & Matthiolo fuerit cognita. Itaque ſæpē non videmus mantice quod in teſto eſt.

Amatus Ebeni ſecundam ſpeciem, Guaiacum facit.

Verum neſcimus quid ſibi velint Pen. & Lob. quando in Adu. ſic aiunt. Officinarium Ebenum [ſue Xylaloes Offic. in marg.] quin ſit ſpecies Guaiaci nihil obſtat: nam præduræ aſſulæ, grauiſſimæ, quæ in Officinis viſantur, & aquæ melleæ ſidunt, tum pinguedo, quæ exudat igni, perinde atque à Guaiaco, tum aſpectus ipſe, & vires, & ſapor, videntur teſtari: nam odor etiam ei ineſt Guaiaci, vires ad eadem quæ Guaiacum coſamendantur. Sed ſi id intelligunt, quod in Offic. nomine Xylaloes ſeu ligni Aloës habetur, eſſe

Matth. not.

Curt. not.

Alter Curt. error.

Ebenum Venetum eſſe Laburnum Ebeni medulla Cytiſi Ebenus Cretica.

Matth. not.

Matth. ex parte excuſatur &amp; Guiland. not.

Offic. Ebenum. Species Guaiaci.

Lob. &amp; Pen. na not.

Ebenum, & ipsimet cap. de Agallocho apertè declarant: Et Lob. in Obl. ait, Hebenum siue Xylaloën, officinarum legendum: nullo sanè labore refutantur: Non enim nigra est Xylaloë, cum quàm benè Guaiaci odorem tribuant, ipsi videntur.

Hist. Lugd. Hist. Lugd. quoque Ebenum officinas pro Xylaloë habere ait: quasi nec ipsa apud priscos illos Theophrast. Diosc. Plin. & alios legisset Ebenum esse nigrum.

An verò Ebenus sit species Guaiaci, vti censent, asserere non possumus. Sanè quæ Ebeni nomine hodiè habetur ligna, nec odore, nec sapore nec pinguedine cum Guaiaco conueniunt. Videntur & Guaiaco duriora, quamvis substantiæ soliditate ac pondere ad id quamproximè accedant. *Hairi* quosdā Ebeni putare, suprà dictum. Lacuna plures Ebeni species esse scribit, excellentissimam autem quæ vulgò dicitur Guaiacum: Sed vnde hoc sit.

Synonyma Dicitur Græcis ἑβένος, & ἑβένου. Suid. Ebenus siue Ebenum, teste Seruio Mauro: vel vti alii scribunt, Hebenus & Hebenum. Sed melius Ebenus dici videtur, à nomine Hebræo Eben, quod lapidem significat, vt notat Gesn. Sanè & hæc Hebenus & hoc Hebenum cum aspiratione & sine ea scribitur à doctissimis autoribus. Luc. lib. 10.

Hebenus Mareotica vassos

Non operit posses.

Hebenus autem, inquit Seruius, arbor est, quæ cæsa durefcit in lapidem. Malimus tamen hac in parte sequi Græcos [quod & ipsa Græca dicitur esse appareat] qui sine aspiratione scribunt.

Hauben. Goropio notante, in Vertumno, Hebenum dicitur Hauben apud Hebræos, vt est apud Ezech. c. 27. Verùm quia Hebenum vox est Latinis. Græcis, Hebræis, Arabibus & Chaldeis communis, suspicatur iam ad antiquissimos referendam natales. Hauben namque, quid [inquit] aliud est quàm Haut-been, [Cimbris] id est lignum osseum, siue lignorum os. Arab. dicitur Habenum, vel vt alii volunt Abanum vt Serap. cap. 152. seu Abennus, Barbaris Ebanus. Germ. Ebenholz: Gal. Ebene noir: It. Ebano: Hisp. Castil. Ebano: Portug. Abenu: Apud Paulum Epulionem Marcorum, (qui in epistolis à se collectis scribit inter muhera missa regi Hisp. Philippo per Regem Persarum, fuisse quattuor cornetti di legno Audauico, quali resplendino como spechio, [per lignum Audauicum splendens vt speculum, Ebenum intelligendum suspicamur.

Locus Theophrast. Indicam tantum dixit Ebenum: Dioscor. tam Aethiopicam, quàm Indicam. Virg. Georg. 2.

Sola India nigrum

Fert Ebenum, silis est rhurea virga Sabæis.

Ad quam Virg. sententiam Seruius: Atqui, inquit, & in Aegypto nascitur. Sed Indiam omnem plagam Aethiopiæ accipimus, quam & Virgilius, vel Constantino teste, Indiæ nomine complexus est. Lucanus per Mareoticam Habenum Aegyptiam videtur ostendisse, vt idem putat. Negat tamen Plin. in Aegypto nasci. Solinus exigua Aethiopiæ parte tantum crescere autumat. Strabo ex Megasthene scribit, apud Prasios (in India) nasci. Apud Plin. Meridiano Aethiopiæ cardine syluæ Hebeno maximè virent: quod & Theuetius confirmat, additque etiam in Calecut nasci. Ex Pomponio Mela discimus etiam in Arabia, & aliis variis locis nasci, vt annotat quoque Amatus, qui addit, hodiè magnos truncos in officinis haberi ybi pestines sunt, & eos egregios. Videas la-

nè Venetiis & Augusta Vindelicorum tanta copia Ebenum, vt sint ibi artifices, qui nihil aliud ferè quàm hoc lignum tractent. Apud Magnum Ducem Hetruriæ splendidissima opera affabrè facta ex Ebano nigrissimo, politissimo, nec vulgata magnitudinis vidimus, & videre possunt curiosi qui Florentiâ transeunt. Ferunt, inquit Curtius, Ebenum in mari rubro nasci, foliis Fructuque Oliuæ proximo. Sed hæc nouitas merebatur titulum sui autoris.

Cariem inquit Plin. non sentit Ebenus: eandem maximè æternam putant, claro iudicio in templo Ephesiæ Dianæ, de cuius simulacro Deæ ambigitur. Cæteri ex Ebano esse tradunt.

Ebenum Theophrastus ad cotem tritum, oculis vtilem prædicat. Et, vt scribit Dioscor. vim habet ea extendi, quæ pupillis caliginem offundunt: pollet & ad veteres fluxiones ac pustulas. Quod si quis facta ex ea cotacula (duntaxat) vtatur ad terenda collyria, efficacius medebitur. Ad oculorum medicamenta efficax quoque redditur, si scobes ramentæ in vino Chio per diem ac noctem macerata, diligentèrque ad laeuorem contrita, in collyria digerantur. Nonnulli ipsa prius trita citro cernunt, ac deinde reliqua eo modo peragunt. Quidam pro vino aqua viuunt. Vtriusque etiam in hictili notu, donec in carbones redigatur: lauatque plumbi vsti modo: Itaque preparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit. Non tractamus, inquit, in medicina alienos orbes: non omittetur tamen Ebenus propter miraculum. Scobem eius oculis vnicè mederi dicunt: lignoque ad cotem trito cum passo, caliginè discuti. Ex aqua verò & radice, albugines oculorum. Item tussim pari modo Dracunculi radices adiecto cum melle. Ebenum medici & inter ardentia assument. Consideratione quidem dignum quomodo intelligenda Plinii verba inter ardentia.

Eiusdem meminit Gal. lib. 6. simpl. his verbis. Ebenus ex iis lignis est, quæ trita cum aqua facile in succum resoluuntur, æquè ac lapidum nonnulli. Vis ei inest excalfaciendi, extergendi & tenuium partium, quamobrem quæ pupillis offuscant vitia extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas siue pustulas accommodata sunt. Cæterum variat nonnihil Plin. à Dioscor. qui Ebenum super cotacula tritum collyriis indi ait: illo autem Ebeni ligno ad cotem trito caliginem discuti. At Serapio ex Ebano parari coticulam [siccatorem vertunt] cui collyria afficiuntur. Sed res eodem ferè redit, modò vis medicatrix collyrii dependeat ab Ebano. Ardentia sanè voce Græci non modò coticulam intelligunt, sed & medicamentum ipsum ad cotem tritum, qualem ex Ebano fieri ad eum vsum perinde ac ex hæmatite nihil vetat.

Strabo autor est, Indicos exercitum, præcipuè frictionem, probare, maximè strigilibus leuibus corpora expolire.

Ebeni siccatos truncos, teste Matthioli, maximè hac ætate nouit Italia: namque innumeri videntur in eorum officinis, qui pestines conficiunt ad explicandos aptandisque capillos: item apud illos, qui globulos funiculo traiciendos ad preces numerandas torno in orbiculos expoliunt. Porro quod de frictione ait Strabo, id. & Curtius probat ex Celso, quod corpus exedat, euocet, educat, leuetque exasperatum. Curtius etiam miratur, aliquos credere pestines & orbiculos de precatonibus, aliæque minima & leuia, torni opera, vt ille ait, ex Ebano fieri, præsertim verò cum tot,

& tant



Etiam varia veniunda exhibeantur. Existimat enim tanti pretii ac nobilitatis lignum in vulgaris hos usus non venire, ratiusque esse, quam ut quousque innotuerit vulgo.

Pet. Martyr de rebus Oceani & noui orbis, in insula Guanabana scribit esse vtenfili ex ligno nigerimo, lubrico, lucido, quod Hebenum Doctor I. Baptista Elysius esse contendit.

Reges Indos ex Ebena sceptrata gestare, Solinus auctor est. Eosdem non nisi ex Ebena Deorum suorum simulachra fingere: item pocula crateraque ex eo fabricare tradunt, quod sane credant contra maleficia efficacissimum esse, & quicquid veneficii fuerit, tractu eius averti. Vt itaque nil mirum sit, si peregre in pretio sit, cum etiam his apud quos nascitur & familiare est, ipsique adeo Regibus summo in honore sit.

Refert enim Plutarchus in vita M. Antonii Cleopatram Aegypti Reginam, Alexandriam, apud Idus ædem, & in præclarissimis sepulchris, aurum, argentum, preciososque lapides, Ebum quoque, & quicquid denique rarum ac pretiosum haberet, condidisse & occultasse, propter bellum, quod Octauius Cæsar contra eam, & Marcum Antonium gerebat.

Adalligatum infantium cunis, tumultuosa infomina prohibere scribit Albertus.

Hodie, vt dicebamus, varia opera ex ea fiunt, apud Magnates & Principes, thecæ, arcule, abaci, capsellæ, speculi thecæ, pedines, narthecæ, tragematothecæ, fellæ plicatiles, pocula, ad altaria exornanda, signa crucis, cingendas imagines Principum aut Sanctorum, & alia eiusmodi pro modum infinita, eaque vel per se pura, vel auro, argento, aut ebore vario artificio adornata, qualia Venetis, & Augustæ Vindelicorum apud artifices aut Magnates videri possunt.

# EBENI VERSICOLORIS MATERIA ARBOR PYRIFOLIO.

## CAP. CXC VII.

Scibit Theoph. lib. 5. cap. 4. vbi de Terebintho Syria agitur, quæ Ebena nigrior. Altam arborem reddunt, quæ cum nigredine varietatem quandam præ se fert subtilitatem, vt aspectus Ebena versicoloris appareat, fieri ex hac lectos, & subsellia, & reliqua lautiora opera narrant. Amplam maiorem in modum, & frondibus conditam pulchris, similisque Pyris eam assignant.

# FRUCTVS PEREGRINVS TETRAGONVS.

## CAP. CXC VIII.

Fructum peregrinum tetragonum referebant, teste Clus. in Exot. Bataui Nauceri, qui ineunte Septemb. anno 1601. ex Iava & Moluccis Insulis reduces Amstelredamum, in quali tamen arbore nasceretur intelligere nequii. Si tamen coniecturâ vti licet, prægrandis alicuius palmæ cuiusmodi illa, quæ magnas Indicas nuces, vulgo Coccos appellatas, aut nucem Fausel, siue Arecam proferat, fructum arbitror, atque plures simul ex casto vno pediculo instar illarum pendere.

Biæ autem eiusmodi nuces videre mihi contigit. Vnam magnam, quam Cl. V.D. Petrus Paauvius artis Medicæ Professor in Academia Tom. I.



formæ.

Maior porro, nitidior & leuiore cortice testâ, septem vncias à summo fastigio ad pediculum v.

que longa, pedem cum semille crassi erat, siue sesquipedalis eius ambitus: singuli enim anguli

quatuor penè vncis cum semille ab inuicem distabant: cortex valdè densus, ex multis fibris, retis

quodammodo formâ contextis, constans, materiam fungosam intermixtam continebat, corti-

que, vt dixi, leui & splendent, spadicæ coloris, exteriore parte testus erat. Tota tamen nux valdè

leuis pro sua magnitudine: quid verò ea contineret, me latebat, quia, cum mea non esset, aperire nolebam. Sed minorem, quæ mihi donata,

mediam secabam, vt me omni dubitatione exsoluerem: nam quum Cheirurgus, qui illam attulerat, affirmaret, se in maris littore nascentem eruisse,

mediâ ex parte arenâ mesam, fibrisque in ea firmiter hærentem, & supernâ parte cauliculum

promerere lignosum, viridi cortice testum, fastigio quina aut sena folia Myrtinis familia sustinentem,

eaque adeo ratione bulbaceam esse plantam sibi persuaderet: ego verò multas notas conspicerem,

quæ me, vt arboris potius fructum esse crederem, impellerent: illam aperiebam.

Superiore longè minor hæc erat, vt quæ tres Descriptione duntaxat vncias cum semille longa, octo autem

ambitus contineret, non nitido cortice testâ, vt superior, sed valdè rugoso, quo ante maturitatem

adempta, & subrusa cute testâ, quadrangularis, perinde atque superior, formæ, sed angulis magis

inæqualibus, neque adeo distinctè ab inuicem seiunctis, sub externa cute, multis fibris, retis in-

star transversum sese interfecantibus, cortice constabat, quemadmodum etiam interiore parte, quæ

officulum tegebat & inter illas fibras, fungosa materia insipida, & valdè resiccans, suberini corticis

instar: ipsum officulum formam habebat ab infima sede latiore in metam allurgentem, & crassius-

cylum erat, molle tamen [quia fructus in maturis] subrubente cute testum, acidi saporis, sicut

etiam nucleus qui in eo continebatur candidâ membranâ testus.

Hæc sunt quæ de illo fructu, seu nuce, commentari potui: quia qui retulerant, nihil ad eius historiam plenius & accuratius describendam affererebant, præter paucas illas incertas, quas enumeravi notas.

Lugduno Batau, à Mercatorum societate cum aliis quibusdam exoticis adquisuerat. Alteram longè minorem, quam mihi donabat Amstelredami honestissimus vir VValthius Syuert, illius vrbis Pharmacopæus, ab Isbrando Hieronymi F. Cheirurgo, qui eam retulerat, redemptam. Vtræque verò quadrangularis erat

Fructus maior.

Cortex.

Color.

Minor fructus.

Planta bulbacea.

Cortex.

Officulum.

## PEREGRINVS FRVCTVS CRASSVS, IN QVO MAGNVS NVCLEVS.

CAP. CXCIX.

Descriptio



Cortex.

dumtaxat nouem : crasso rugosóque cortice præditus erat, illóque fusco, cauum orbem vmbilici instar circa pediculum habente, supernâ autem parte tuberculis quibusdam obstituto : internè magnum continebat nucleum in binas partes sectum, valdè rugosum, fusc[us] quia siccus] coloris externè, ex atro verdè rubentis internè, additingentis in initio saporis, deinde subdulcis.

Sapor.

Locus

Ex Indiâne, an ex America, Guineâne allatus esset hic fructus, ipse Paludanus, qui eum, vt describerem, concedebat, ignorabat.

## FRVCTVS PEREGRINVS, ABIEGNÆ nuci p[er]similis.

CAP. CC.

Abiegna nuci facie.

Fructus squamosus primus [Clusio in Exot.] Est Abiegna nuci facie, quam conspiciebat 1595, apud Cl.V. Paludanum : cui similem eodem anno adquirebat. Cylindroide autem erat formâ, tres vncias longus, binarum vnciarum eius ambitus, multis veluti squamis imbricum modo

dispositis constans, in medio nonnihil compressis, oris tenuioribus & quodammodo villosis instar penè abiegni strobili, sed breuior, colore spadiceo [qui fuscus, & villis carês, quia fortè vetustior] grauis, & nucleum vel nucleum continens, nam agitat[us] crepitabat & sonitum edebat, quemadmodum & ille, quem ipsi dono dabat sexennio post, Nobiliss. vir Paulus

Descriptio



Nucleus


Choartus Buzenuallius, Christianissimi Reges apud Illusterrimos Ordines confederatarum Provinciarum Legatus: cui deterfi etiam erant (si quos hauerat) villi: breui fragilique pediculo subnixi fuisse videbantur omnes: nucleum autem illum qui in similibus fructibus, oblongæ esse formæ obseruabat, durum, solidum, quique contractus, crebras venas ostendebat, quales *Nux Fausel & nux Moschata* habent.

## FRVCTVS PEREGRINI NVCLEVS.

CAP. CCI.

ANNO 1602.

Emanuel Zvveert, cuius Amstelredamensis ostendit fructum, quem à nautis peregrè redeuntibus emerat, qui anserini oui magnitudinè æquabat, imò etiam superabat, quinque videlicet vncias penè longus, septem cum semisse crassus, siue totidem eius ambitus comprehendebat, valdè gravis, nucleus siue pulpa



verius cuiuspiam fructus, quàm fructus censendus: nam mollis erat, tenui quadam & rugosâ membranâ ex fusco cineracei coloris tectus, vnguibus (si quis premeret) cedens, coloris subflauo, ob vetustatem fortè, & falsi quodammodo saporis: qui an naturâ ipsius pulpa, an arte adquisitus, ignorat Clus. Exot. lib. 2. cap. 13. sed haud dubiè aliquo putamine clausa fuerat: nam membrana eam tegens, vestigia adhuc retinebat impressa à crassioribus ipsius nuci internis nervis.

Qualis autem fuerit nux, quâ hæc pulpa inclusa, se ignorare dicebat à quo illam accipiebat, atque etiam quali in arbore, quâue in provincia nata.

## PALMAPINVS SIVE CONIFERA.

CAP. CCII.

Robinus Rhorulanus Regius, & stirpium exoticarum cultor propemodum singularis fructum ad nos misit anonymum, petelegantem, figurâ & magnitudine ouatum, cortice constantem fuluo, in spadiceum polito ac splendicante, duro satis, tragonis squamulis pyxidatim coaggesto artificii







artificiosissima! compage, per quarum media singulis ordinibus æquabilis canaliculus, per vniuersi fructus longitudinē descendit, vno insigni, cæterisque ampliori canali eodem ordine ac descensu inter cæteros conspicuo. Parte supernā apex eminet, circa quem longē miniores squammule reliquarum feriem claudunt, & in dictum apicem

fastigiantur, pulchro prorsus & visendo artificio. Ipse fructus concussu sonorus intus contentum nucleum prodit. Fructum hunc cum ipsa arbore Palmæpini siue Coniferæ nomine sic fortè describunt Pena & Lobelius; in Aduersariis. Vulgaris Palmæ [inquinunt] congeneres esse multas sylvestres in sinu Guinææ Oceani occidui, quæ steriles sunt, nec nisi exilitate à satius abfunt, narrabant nobis mercatores industrii Gallobritones, qui illuc quotannis ferrè commercii causa adeunt. Inter quas & alii Angli institores non parum venustam & miram hanc, icone hic expressam, inibi oriri affirmant, cuius ramos luculenta conorum fœtura onustos dono iidem atulerunt stirpium cultorisque artis peritissimo Pharmacopœo & Cui Londinensi Io. Riccio, qui nos donauit isto Palmite, aut potius Pinopalmæ terminæ: cuius arborem, quasi quandam ex Palma & Pino hybridam natura ludibunda videtur conflasse.


Est quippe lignum ipsum fungosâ Palmæ prorsum texturâ, in villos dehiscens, & squammosa cute loriatum, fastigio termitis numerosis & in orbem exortis furculosis ligulis quadraginta aut quinquaginta compactili verticulorum & squamarum serie pyxidatim articulatis, pedem longis, rotundis, parum compressis. Quarum singulis commissurâ, singuli, numerosi coni aliis inferuntur triceni, aut quadrageni, qui mediocrem Conum Cedri ementiuntur, puluillis in quinque digestis, reticulatâque & imbricatim extuberante ventrioso nucis cortice, fusco, nitido, polito, crassius & concretionis nucis Indicæ, intus nucleum glandemve oblongam, [se]sq[ui]uinciam aut duas vncias longam] continentem, prædura, inque farinam agrè friatili, gustu glandis & castanæ, quæ sunt ei Gentis panis supplementum.

In Obl. idem Lob. Auellana Indicæ genus oblongum Clusii idem censet esse cum nucleo huius Palmæpini, quod an ei concedendum confiderandum est.

Tab. Palmam conifera. Germ. Zapffenpalm.

NUX INDICA OBLONGA, INTRINSECVS SIMILIS NVCI MOSCHATÆ.

CAP. CCIII.



Descriptio

Nuxem hanc seu potius nucleum habemus ex dono Valerandi Dourez: forma est oblonga duas vncias æquans: lignum quis dicat: externa facie rugosa est, & rectis fulcis à summo ad imum profundè exaiata, cortice partim rufso, partim fusco intermixto alba, maculis nigris partim rotundis & paruis, partim oblongis notata, aliquatenus ve-

nas internam Nuxem myristicam percurrentes imitata. In medutillio nonnihil fungosi macularum extremis circumscriptum: reliquæ enim circumquaque partes maculosæ duriores existunt.

Hanc Camerar. quoque eleganter exprimit in Matth. hist. Germ. sub titulo Auellana Indicæ.

Clus. quoque apud Garciam de Arom. lib. i. cap. 25. depingit sub nomine Auellana Indicæ oblongæ, vbi nuxes oblongas vocat, & fortè Fausel genus esse putat. Hunc autem fructum scribit Exor. lib. 7. suæ lib. Arom. cap. 25. esse oblongum, Fausel nucem cum suo inuolucro magnitudine penè æquantem, prædurum, foris nigricantē, qui per medium transversim sectus, myristicæ nucis nucleū nō secus, quàm Fausel mirificè referebat. Fausel genus forsitan erit, aut simile quidpiam: sed quum vetustate exsuccum videre tantum licuerit, de sapore & temperamento nihil pronunciare possum: talem etiam ad me, post aliquod temporis interuallum, mittebat Morganus Pharmacopæus diligentissimus. Similes mihi adhuc postea ostendebantur, sed liguati & expoliti, quos lapides quosdam raros, magnique pretii esse mihi persuadere conabantur.

Lob. idem existimat cum nucleo Palmæ-pini: cui tamen non assentitur, donec melius edoceamur.

An Matth. & Qualcebeno in epist. Matth. Nuxis quoddam genus ex Aegypto?

Taber. nomine Areca seu Fausel pingit.

Auell. Indicæ Matth. Hist. Lugd.

IVGLANDIS FERE FACIE FRVCTVS

EXOTICVS, SVLCATVS, TVBEROSVS.

CAP. CCIV.

EX Cl. D. D. Felicis Plateri naturalium thesauri amplissimo hic nobis innotuit fructus. Magnitudo nucis Iuglandis habitioris maiorisque, cortice tectus cinereo non duro, sed gallarum instar fungoso, quasi recens putamen carneum



esset, integrum non fuit. Nec odor eius nec sapor vllus effectus dignus, quippe obsoletus in plantis & multis foraminibus, præ ætate aliâne occasione, vt arbitramur, scitens.

fuerit. Totus pet longitudinem speciosè sulcatus est: sulcosque rectos decem in hoc numeramus nec sine eminètiis extraordinariis, inæqualibus, tuberosis. Ima parte quâ sulci conuerunt serobiculus est: Opposita gibbus. Si acuti substantiam eius confodias, interna duriora deprehendes. Aperire quia noster nō

appendicibus veluti calyce fructum inâ parte apprehendens, qui tanquam squamulis serie quadam in obliquum dispositis constabat, ab extimo, versus petiolum vergentibus, contrario prorsus quàm in præcedente situ. Flauescerebat autem & inanis erat. Si verò Abdalz Guzerateni [quem dixi à Batauis Nauclesis illo ipso anno ex laua aduectum fuisse, cuique eum fructum Amstelredami ostendebam, percontans an agnosceret,] fides est adhibenda, *Canna de Bengala fructus est*, sed exilis & immaturus. Franciscus tamen Roderiguez è Bengala ipsa oriundus, sibi notum esse negabat.

FRVCTVS PEREGR. ELEGANS,  
SQUAMOSVS.

CAP. CCVII.

Fructum tertium peregrinum, squamosum i. cone & descriptione proponit Clus. loco citato, de eo autem scribit. An eius generis ille fructus, quem vt describere possem anno 1599. ab honesto viro Ioanne Gouert vander Aer, mercatore Amstelredamensi, mutuo accipiebam? Certè formâ non dissimilis, sed longè maior, vt qui Iuglandem externum illum vitidem cortice adhuc retinentem crassitudine superaret, orbicularis penè figurâ, magis tamen depressa, & quasi in umbilicum sidentis lupremâ & inâ parte [inter quas trium serè vnciarum erat interstitium,] & penè sex vnciarum ambitu: constabat verò veluti squamis elegantis serie in obliquum dispositis, ab extimo versus petiolum tendentibus, illisque quodammodo sectis & lacunam habentibus per longitudinem: squamulæ autem petiolo proximæ sursum vergere nonnihil videbantur, nucis color splendens & spadicens: cæque nucem continebat: nam comota & agitata strepitum edebat, valdè tamen levis erat pro eius crassitudine. E qua regione esset allata, quouè nomine appellaretur, ignorare se dicebat, qui illam mihi commodabat.

NVX INDICA OBLONGA, CORTICE  
CONTECTA.

CAP. CCV.

Species quædam iam dicta esse videtur, si non eadem. Magnitudinem icon ostendit, quemadmodum & figuram. Cortice ruffo obsoleto re coniecta est, tenui, & oui putamine non crassiore, fragili, & vngue separabili. Sub quo substantia fusca, dura, serèque ossæ, secundum longitudinem flexuosè sulcata, quorum impressiones vestigia in extimo quoque cortice conspiciuntur. Sapor adstringens. Interiorem substantiam describere non possumus, cum fructum dissecare [quod noster non esset, sed Cl. D.D. Plateri, qui picturæ & descriptioni suppeditauit,] non fuerit integrum.

Anno 1608. ex munere Ill. nostræ Princ. nacti sumus similem fructum vncias duas longum, vnciam vnâ non latum, externè ex fusco nigrum, cortice tenui tectum, sub quo materia fusca, cui subest os durum, albicans.

Datus præterea alius longior & paulò crassior, in quo detractus cortex & pars elatiorum rugarum, quod limace forte factum.

Tertius item minor, verùm torno omninò læuigatus & ophitem lapidem representans, colore & maculis nigris: in medio est foramen non totum penetrans, quod arte factum existimamus. Icon cum alia habetur in cap. præc. 204.


FRVCTVS CANNAE DE BENGALA  
creditus.

CAP. CCVI.

Tradit Clus. Exot. lib. 2. cap. 3. fructum peregrinum, squamosum, exilem, de quo ait: Erat parua Auellanae nucis magnitudine, valde elegans, orbicularis, nisi extrema pars in mucronè defuisset: petiolus, cui inhærebat, brevis, tribus

NVX INDICA TESSELLATA  
PERILEGANS.

CAP. CCVIII.



Nec minori sed vel o-  
perosiori natu-  
ræ ostento, præ-  
cipueque ele-  
gantia, si quem  
alium videre  
hactenus conti-  
git, insignitum  
hunc fructum  
& alios non  
paucos habemus  
ex liberalitate Ill. ac Cle-  
mentiss. nostræ  
Principis, Du-  
cissæ W. reitemb.  
&c: Amplitudo  
securialis, ex-  
actè propemodum  
rotunda,  
nisi vtrinque  
leuiter



leuiter sessilis esset. Infernè siuam & pediculi vestigium habet. In cortice decus præcipuum, qui culmum crassus & firmus satis, exterius lauis, splendidus, spadiceus, totus tessellatus, sulcis ac striis impressis per singulas tessellas secundum longitudinem excurrentibus, & rursus aliis oblique & intercussum, pulcherrimo, mehercle, naturæ emblemate. Corticis interna pars fungosa, eademque penè quæ interioris corticis castineæ, tam colore quàm substantia, sed densior ac minus villosa. Nucleum continet magnitudine ferè Iuglandis, sed rotundum, aut certè rotundo proximum, supernè umbilico prædictum satis insigni, à quo per eius longitudinem sulcus insignis descendit, substantiâ ossea, qui terra disiectus ebur positum colore, lauore, & duntia refert. Sapore quidem nullo manifestò, aut quod vetustate exoleuerit, quippe qui in terra per annum ferè manu eiusdem Illustr. Cels. confusus delituerit. Qui demum, quodd nullam faceret germinationis spem, ad nostras quoque peruenit manus. Vtriusque faciem non malè exprimit icon nostra.

Clus. Exot. lib. 2. cap. 4. huius fructus etiã iconem habet, ac de eo scribit. Londino anno 1598. fructum elegantissimum accipiebam à Iac. Gareto, ex Guyana Americæ Prouincia, ab his, qui Generolum Equitem V Valterum Raulæum comitatus fuerant, allatum. Orbicularis rotunditatis ferè erat primus, ab umbilico siue infima parte ad supremam tres uncias vtrinque latus, & sex unciarum totus per transuersum eius ambitus, cortice siue corio valdè duro testus, spadiceis à nigro coloris, sed ad eò elegantibus, cum rectis, tum obliquis, transuersisque ad amissim, & proportionem quadam seruata, ductis sulcis insignito, vt summum Naturæ miraculum appareret: ossiculum satis magnum in se continere, ex sonitu quem agitat edebat, coniecturam facere, & per sedem, quæ nonnihil aperta & hians, videre licebat: quã tamen formã, quòve temperamento esset prædictum, me latet, quia fructum, qui mihi vnicus erat, & propter vetustatem charus, confringere verebatur, ne corrumpere.

Similem anno insequente mihi ostendebat honestissimus vir V Villhelmus Parduynus Medioburgensis etiã ex Guyana, vt aiebat, delatum, sed minorem, vt qui binas duntaxat uncias cum semisse ab infimã sede ad extremum mucronem, & totidem in ambitu haberet.

Alium huic etiã non dissimilem nasciscebatur Christianus Porretus Anno 1600. qui licet vetustus & catiosus, calycem tamen cui pediculus annexus erat, adhuc retinebat: in illo etiã squamæ magis distinctæ apparebant, & à summo ad imum progredi manifestè conspiciebantur, non à pediculo ad summam partem: quod in duobus aliis obseruare non licuerat, ad eò arctè & firmiter cohærebant, vt ipsum corium siue integumentum sulcis duntaxat distinctum videretur.


BALY INSVLÆ FRVCTVS, PYRI FORMÆ, ASPER.

CAP. CCIX.

Vt Scriptorem primæ partis Historiæ navigationis Batavorum in Indiam Orientalem anno 1598. euulgatam cap. 37. Baly Insula profert fructum magnitudine nostratum Pyrorum, cortice prædictum aspero instar squamarum piscium, pulpâ albâ prædictum, adstringente & continente vnum ossiculum, sæpenumerò etiã bi-

Tom. I.

na. Nascitur in altis arboribus confertim congestus vuarum modo, tantâ abundantiâ, vt mirum sit ramos non confringi.



\*

culo inhæsisse videbatur, sex penè uncias, supernâ verò parte angustior, & veluti in metam desinens: vt quodammodo Ficus aut Pyri formam æmularetur, quo nomine etiã Christiano Porreto missus fuerat Amstelredamo. Aspero testus erat cortice, & ab infima parte, sursum versus, densis ordinibus veluti squamarum sibi mutuo incumbentium ornato, quæ seungi nequibant, sed cum integro cortice non valdè densò eximi poterant, flauescens coloris, dum regens ex conditura exemptus, deinde subfusci. Continebat porrò hic fructus pulpam albam, odoratam, instar Pyri formatam, substantiâ autem non valdè abssimilem, albo illi condimento, quod ex Amygdalis repurgatis & confusis, lacte, farinae flore, aqua stillatitia è Rosarum floribus & saccharo fieri solet, solidiorem tamen, nec ad eò glutinosam, sapore [quia fructus muria conditus fuerat, valdè salso & linguam mordicante, continentem in medio ossiculum solidum, penè uncialem, & in metam allurgentem, formæque ipsum fructum referentem, infernâ parte crassiorẽ, supernâ angustiorẽ, pulpæ autem integræ adiunctos obseruabam binos aut tres grumos, & veluti ex crassiore fructus parte dependentes: etenim corticem secundum longitudinem fissum, facillè integrum à pulpa separare poteram, haud secus ac serpentis exuuium, quia pulpa non adhærebat, nisi paullulum eâ parte, quæ à pediculo pependerat.

FRVCTVS PEREGRINVS IERASOY.

CAP. CCX.


Ierasoy dictus fructus è rationibus quoque esse videtur: per medium sectus cauis apparet, sed binis cellulis intergerino pariete interueniente distinctus, aut si integer esset, [vñ non esse coniectamur, quem apud Cl. D. D. Fel. Platerum & C. Baubinum vidimus, prædicto nomine] quaternis. Extima facie lauis, sed squammatus, albicans, pediculo crassiusculo. Rosæ nondum expansæ, ac per medietatem sectæ figuram nonnihil referret, nisi esset cauis. Ita squarmata eum extinsecus ambiunt foliola.

LI 3

## DRACO ARBOR : ET DE EIVS

Lacryma, seu sanguine Draconis,  
Cinnabari Veterum.

CAP. CGXI.

Descriptio  
folii.Arboris de-  
scriptio.

Rami.

Folia.

Truncus.

Lacryma  
eius san-  
guis Dra-  
conis.  
Lignum.

Locus.

quid cum folio Iridis, & potissimum palustris lutez, habens, striatum, virefcens, cubitos duos & semis longum, acuminatum: sescunciam latum, lauis multo quā trūco adhæret, plusquam quincunciale, membraneis veluti alis utrinque donatum, & colore lucido ad luteum tendente præditum. Transuersum in tabella pictum vides.

Est verò Draco (vt auctor est Clus.) pro cetera arbor Pinum procul intuentibus referens, adeo æquales semperque virentes sunt rami. Huic truncus crassus, octo aut nouem bicubitales ramos, æquales & nudos sustinens: hi rursus in summo finduntur, & in alios ternos aut quaternos ramos cubitales aut paulo ampliores, brachialisque crassitudinis desinunt, nudos item & sine foliis: qui in summo gestant capita plena cubitalium foliorum, masculi pollicis latitudine, sensim in mucronem desinentium, in medio densiorum, & eminentiore costa, vt in Iridis foliis, tenuium & rubentium in lateribus. Mucronem planè representant ea folia, semperque virent, & Aloës & Iridis modo, inuicem amplexando nascuntur. Truncus perquam scaber, multis ramis dehiscit, humoremque fundit per Caniculæ ætus, qui in rubram lacrymam densatus, sanguis Draconis appellatur, ob quam causam, hanc arborem Draconem nuncupauit. Materia trunci firma est, ferrumque difficulter admittit, quod veluti fibris transuersim & oblique excurrentibus consistet, at rami cum multo succo prægnantes sint, satis facillè cadi possunt. Eā arbore Vlysi pone primū vidisse testatur idem, Anno Christi 1564 pōst monasterium D. Virginis sacrum, cui nomen à Gratia: octo Palmorum crassitudine inter aliquot Oleas in colle nascentem, monachis ignotam & neglectam, quam neque florem neque fructum ferre assererent: rem tamen aliter se habere postea deprehendit, ramulo ex illa ipsa arbore anno sequente donatus ab amico. Est autem hic ramus (quem cum aliquot foliis, corticisque fragmento, & lacryma suis manibus exempta multo tempore seruare se ait.) pedali ampliorē longitudi-

ne, cui inhærent alii ramuli, multo fructu race. Fructus compacto onusti. Fructus color flauescens, sapor aliquantulum acidus, magnitudo exigui cerasi. Eum in lummis capitibus nasci verisimile est, vt in Palma dactyli nascuntur: spatha tamen vti illos includi non intellexit. Huius porro arboris recentia capita tenella sunt, & humilium Palmarum siue Chamæriphe modo, cuius cerebrum in deliciis est, edi possent, nisi amaritudo prohiberet. Hæc ex obs. Claf. quibus subiicienda quædam de eius succo à nobis obseruata.

Pulchros sanguinis Draconis grumos asseruamus, glebis Thuris æquales, rotundos vt plurimum, alios inæquales, foris ferrugineos, fractos pellucidos, coccineos, concretionem Vernicis duræ, dentibus fragiles, saporis expertes, saluā statim & assatim rubore tingentes, qui candelæ admoti flammam concipiunt liquefcuntque Retinarum instar. Admixta reperiuntur glebæ, quæ colorem præcedentis Resinæ egregie mentuntur, cæterum concretionem gummi Arabici: non enim accedunt flammæ candelæ admotæ, sed bullas agunt, crepitantque, in aqua soluntur, quam & mucilaginosam reddunt, dentibusque lentore suo valde adhærescunt: & vix leuiter saluam rubore tingunt. In offic. plerumque fordidior est, corticisque habet admixtos, coloris ferruginei, nunc crassiores, nunc tenuiores, sapore adstringente, qui flammescunt quoque, vnde decedentes adnatæ lachrymæ liquefcitæ tingunt itidem. Atque hæc nobis obseruata sunt in sanguine Draconis, quàm lachrymam vocant.

Alium habent off. duū generum: Vnum siquidem, licet ligni cuiusdam rubri assulis admixtis impurius videatur, flammam tamen luculentam concipit, liquefcitque glebularum instar minorū præcedentium Thuris magnitudine: vt ab illis non nisi impuritate quadā discrepare sit verisimile. Alterum offis constat compressis, obscurioris & sordidi coloris, nullo modo flammam concipiens, & gummi instar lentescens, adulterinum. Cæterum quoniam iam suo seculo Dioscor. scribit Creditā Cinnabariū esse sanguinem Draconis, placet eius ea de verba proferre. Cinnabariū inquit] falsè putant nonnulli cum eo quod Minium appellatur vnum & idem esse: [reliqua vid. lib. 5.] Cinnabaris autem de qua hic agitur ex Africa quidem inuehitur, at magno constat: & vique adeo rara est, vix vt versicoloribus pictorum lineis satis esse queat. Est porò altè & abundè colorata, & eam ob causam quidam sanguinem esse Draconis exultimauerunt. (Quæ d. p. d. n. v. r. al. d. u. n. v. r.)

Vt iam Dioscor. non temerè à Galeno lib. 11. simpl. notetur, ut dicitur in eod. & Galeno, & d. p. d. n. v. r. al. d. u. n. v. r. qui non agnouit nō inuadere vocem esse æquiuocam, significareque etiam Minium illud arenarium, quod quia ex naturalibus arenis fieret, à Theophrast. dicitur, quoniam dictum est, quod vel ex hoc autore discere potuisset. Et forte qui tum Cinnabarin, sanguinem Draconis dixerunt, non animal, sed arborem hanc intellexerunt: quanquam Theophr. dicitur de quo ipse agit d. p. d. n. v. r. al. d. u. n. v. r. scribat, quod saturè rubro esset colore.

Fortassis & ea ipsa arbor est aut eiusdem saltem generis, cuius Strabo lib. 3. Geograph. ex Possidonio meminit, his verbis: De arbore in Gadibus existente scriptus prodidit Possidonius, quæ ramos dum vique incuruatos habeat, frondes læpissimè mucronis speciem gestantes, quarum ad cubitum



bitum longitudo est, latitudo verò digitorum  
quatuor. Circa nouam Carthaginem arborem ef-  
fles, quæ de spina corticem emittit, ex quo tele pul-  
cherrima conficiantur. Huic quidem Gaditanae,  
nos in Aegypto, in ipsa ramorum curuatura simi-  
lem persequimus. Cæterum, fronde dissimilem, ac  
infertuofam. Hanc autem luctum ferre dicit. In  
Cappadocia quoque è spinis collecta texuntur.  
Arbor autem nullas spinas affert, è quibus cortex  
extet, verum humi ferpens herba. Gaditana ve-  
rò arbori, & illud innatum esse traditur, quod vi-  
no fracto ramo lac effluit, quod si radicem absci-  
deris, minii humor excludat. *Hæc ille.* Verum ar-  
bor de qua hæc traditur, teste Clus. neque ramo  
habet incuruato, neque folia tam lata habet, nec  
illius ramis effractus lac excludat, ac humor aqueus  
duntaxat. De radice quod adscribit, nostræ satis  
quadrare videtur, è qua secundum radices tere-  
brata, lachrymam flatus anni temporibus efflu-  
ere aiunt rubram, vt potius adscipius.

Plin. lib. 33. cap. 7. Itemque Solinus, cap. 28. (ua  
historiz. in eo errore verati sunt, vt exilimarent  
Cinnabarin Indicam, sanguinem seu saniem esse  
Draconis elisi Elephantorum morientium pondere,  
permixto vtriusque animalis sanguine. Vt  
dicitur autem mercatorum fabulis decepti ita cre-  
didisse. *sed præstat ipsum audire Plinium* : Milton,  
ait, vocant Græci minum, quidam Cinnabarin.  
Vnde natus error Indico Cinnabarin nomine. Sic  
enim appellant illi saniem Draconis elisi Elephan-  
torum morientium pondere, permixto vtriusque  
animalis sanguine, vt diximus. (lib. 3. c. 1.) Neque  
alius est color qui in picturis propriè sanguinem  
reddat. Illa cinnabarin antidotis medicamentis-  
que vtilissima est. At hercule Medici, quia Cinna-  
barin vocant, pro ea vtuntur, hoc minio, quod  
venenum esse paulò magis docebitur. Cinnabari  
Veteres, quæ etiam nunc vocant Monochromata,  
pingebant. Pingerunt & Ephesio Minio,  
quod derelictum est, quia curatio magni operis  
erat. Præterea vtrumque nimis acce exilimatur.  
Cinnabarin adulteratur sanguine caprino, aut for-  
bis tritis. Pretium fœneræ nummi quinquaginta.  
*Hæc Plin.* Qui dum Medicos erroris infimulare  
conatur ipse in longè maiorem quasi præcep-  
sit, quod credidit Draconis bestię maxime  
venenatæ cruorem falubrem esse, antidotisque  
admiseri.

Hermol. de generationis sanguinis Draconis modo eadem quæ Plin. dicit, quæ ipsemet vidisset. Sed iam prælo ille zuo Ariarius in Periplo ac lustratione maris rubri prodidit, Cinnabarim Indicam cognominatam, lachrymæ instar ex arboribus colligi in insula Dioscoridis appellata nacentibus; ἡμεῖς δὲ αὐτὸν [Inquit] ὕμνωδοντες, τὸ ἐξ ὧν ἐστιν ἡ δυνάμις τοῦ δὲ ἐξ ὧν ποιεῖται τὸν οὐκ οὐκ οὐκ οὐκ.

Et hoc feculo Aloisius Cadamustus Venetus l.  
4. fuz nautis, elufumidi arborum in infula *Sancti*  
*porus* Lufitanis vocata, hodie nalcntium memi-  
nit, fructum earum fimilem effe Cerafo, coloris  
*Veneris*; hoc effe, crulei: arbores certo anni tem-  
pore incidi: anno vero proximè fequenti ftuere  
lachrymam. Infulæ, quæ arbores eas fect, incolæ  
*filium Draconum* vocant, & aduenas cum aduentis  
per locum tali nomine deterent. Ipfam vero lach-  
rymam exceptam è vulnere incolæ ahenis de-  
coquant, & defæcatam *fanguinem Draconis* appel-  
lant. Sed nobis non videtur verifimile decoqui  
lachrymam, niſi præterit aditus. Meminit  
quidam *diuor & dyakon* ætæ, tum alibi fcriptis,  
tum etiam Teſtab. 4. Serm. 3. cap. 12. in Emplaſtro  
Purpura inſcripto: ſed fallitur dum ſumum illud  
Tom. I.

*ajma* *ῥακωνίη* in India ex herba quadam *Dracunculo* appellata colligi scribit, præsertim si Cadamusto *αὐτόντη* fides adhibenda aliisque Recentionibus, qui de ea arbore tradiderunt. *Actium nar.*

Apud Serap. legitur *Demalochoben*, id est, sanguis Draconis: Diosc. Verum non possumus dicere Serap. intellexisse Cinnabarim, quandoquidem verba tantum Diosc. & Gal. de Achillea recitant, nec arboris fit mentio in nostro Codice, licet Cornar. scribat eum arbotem dicere. Fortè interpretis culpa fit mentio sanguinis Draconis. Quicquid sit fallitur vulgata exemplaria, dum iam dicta herba succum sanguinis Draconis nomine describit. Vt non videamus quo iure Cordus reprehendit Anton. Musam, qui putat nostrum Draconis sanguinem diuersum esse ab eo, qui à Serapione describitur: Ipse potius reprehensione dignus vti patebit descriptione cum eo arboris & sanguine Draconis conferenti.

Marcellus utramque Cinnabarim, tam Plin.  
quàm Diof. ait passim esse in usu: primum in eo *Marcellus*  
peccans quòd differentes facit: deinde si tales a *geminus*  
gignit, quod vix credimus, quòd non doceat *aror.*  
quàm amille sint.

Monachi in Mefuen de Sanguinis Draconis  
diuerſitate & homonymia tradentes, deteriorem  
fieri aiunt & alibi, ex Sorbis confuſis, bolo non  
Armeno, & caprarum ſeu hircorum ſanguine, ali-  
lii que diuerſis rebus, & placentarum more par-  
antur.

tes formatas, furno aut Sole desiccari. Vt pluri-  
mum in equorum & similibus medicaminum u-  
sum adhiberi, licet multos non pudeat ad huma-  
norum corporum vfus eas quandoque admini-  
strare. Verz autem *Draconis* arboris furculus re-  
centes habuisse, sed depaſtos Romæ non creuiſ-  
ſe. Vlyſſipone autem vidisse ingentes eiufdem  
arbores, columnarum modo erectas & vniſſi-  
-

tes, more *Palmarum*, ab *lique ramis*. *Folia* eis esse  
*similima Spatulæ* *foetida*, *crassiora* tamen. *Cortice*  
*trunci* *fubincineritum*, & *vna cum tota arbo-*  
*re*, *rubro succo* *prægnantem*. *Scarificatas* *tempo-*  
*re congruo* *emittere lachrymas* *languineas*, *quas*  
*more gummi* *condenatas* *abradunt* *de cortice* *in-*  
*colæ*, *nec villis* *vendunt*. *Multos etiam* *lignum*  
*eius* *fusculatum incifum* *ebullire* *facere*, *deco-*  
*tionem* *quæ huiusmodi* *igne aut Sole* *conden-*  
*sa*. *Ac vitrumque* *sanguinem Draconis* *nuncupari*.  
*Se* *longè meliorem* *esse lachrymam*, *seu succum*  
*collectum ligni decoctione*. *Se* *sine dubio* *fal-*  
*santur*, *quando aiunt*, *melius* *esse huius veri loco*  
*vi succo* *sideritis* *seu Achilleæ* *Serapionis*, *vel suc-*  
*co lactuca* *cum Adic*.

Cardanus putabat arborem sanguinis Draco-  
nis è genere Cardii esse, sed regionum varia-  
tatem effecisse, vtilius lachryma pro sanguine Dra-  
conis in usu sit. Et mox: certè, inquit, vt colore  
præstat vero sanguini Draconis, qui teste Diosca-  
ridi Sideritide excipiebatur herba: ita vbi incognita  
proprium admodum. At Sideritidem Millefolii speciem  
putat Brauaolus. *Hæc ille.* Cuius ridiculam opinio-  
nem non temerè reuicci Scalger, vit, vit videtur,  
ad explodenda pleræque Cardani dogmataatus.  
Nam [inquit] quisolorumfaciem ignoraret, à  
solo fructu non poterat vniuersæ speciei præsci-  
bere communem. Tantò minus, cum fructum il-  
la, vtilis ait, cæruleum, vt alii, luteum ferat. No-  
stræ tot, tamque diuersis speciebus omnes ru-  
rum. Nimirum totius quoque arboris facies di-  
uersa est. Stipes ab imo ad summum sese fubici-  
torus teres, sâffigio Pyramidis. In suprema cuspide  
ramialiquot, cum quernis frondibus. Cortex  
ei admodum delicatus. Secundò malè loquitur  
Cardanus.

Tertius er-  
ver.A. archon.  
Dens Al-  
chusCardanus  
Cui acci-  
piuntAlia Cin-  
nabarum  
Diosc. alia  
velut m-  
neralis sen-  
sacina.Sanguis  
Dra. offic.  
Cinnabari  
Indica  
Plin.Cinnabari  
factitium.Auctorum  
consensus  
de Cinn-  
bari Diosc.

Fuchf. not.

Cardanus: non enim regionis diuersitas efficit vt eius lachryma pro sanguine Draconis habeatur, sed color. Neque si coloris autorem dicat regionem, continuo rectè sentiat. Non enim regio est, sed forma. Tertio: qui scit Cardanus, huius lachrymæ colore sanguinis Draconis colore minus esse commendabilem: cui, qualis illa sit Sideritis, incompertum est. Brassauli quoque satis frigide turget autoritate. Nam si Cardano nota fuisset, vel herba, vel succus ille, à Serapione potius, atque Aboali accepisset qui primi omnium, quod è scriptis quidem confiter, id ei nomen indiderunt. Alter enim *Alachum*, alter *Dem Alachum* vocat: quam ad rem cum testem citaret Dioscoridem: nonne sibi erat conscius incuriæ & audaciæ suæ? Quid sibi vult à nobis credi posthac quando sibi è Sideride Dioscor. expressit sanguinem Draconis: At ille inter quatuor Sideritidum historiam, de eo nihil. Vbi veid castigat eos, qui Cinnabarin sanguinem Draconis existimant: tantum. At præterea nihil. Vnde huc noua subtilitas emergit. Nostrium enim Cinnabrium ab illa Cinnabari Dioscor. longè est diuersissimum. Cinnabarin Diosc. huius arboris succum existimo: Cinnabarin nostrum, siue Cinnabrium, rectè factitium. Sic Plin. Indicam Cinnabarin aliud à metallo fuisse docet, in illa sua venditricum libri declaratione. De sanguine Draconis autem tota fabula est. Atque ita quidem Scaliger & Cardanus perstringit, & suam de hac re sententiam liberè nullaque circuitione vsus, explicat. Potuisset tamen mitius tractare hominē Scaliger, si animaduertisset eum Serapionis textu aut fortasse eius interpretis versione lapsūque deceptum, qui ad illud Sideritis caput Dioscor. citat, quasi ex eo desumpisset: Cui fidens Cardanus, Diosc. vltimū non consuluit, maiore sanè oserantia, quàm tantum Philosophum decebat.

Porro quum hodiè Materiæ Mancipes, & officinæ medicamentariæ, sanguinem Draconis ostendant, quem ita nominant, ac pro Draconis sanguine diuendunt: non satis constat, an hic sanguis Draconis vera illa Indica Plinii cinnabaris sit, an adulterata, velut quibusdam videtur, qui iuxta Plin. ex sanguine hircino, bolo armena, & sorborum succo, aut aliis similibus succis (vt prius dictum) factitium quiddam esse censent. Rem certè metallicam esse, nullo argumento, quod sciamus, probari posse, cum Cornario arbitramur. Est enim Cinnabaris vel Cinnabrium [liceat ita cum Scal. vocare ad illius descriptionem] quod pistoribus & Officinis hoc nomine notum, res planè factitia, ex Sulphure & argento viuo multo igni inuicem calcinatis & reuerberatis [vt loquuntur] effecta. Est & aliud fossile, spontè per se nascens: quorum neutrum id est, quod sanguinem Draconis in offic. vocant: ac sanè ne illud quidem quod Cinnabarin Dioscorides, quæ ex Africa deferretur, eadem facultate pollens, quæ hæmatites lapis, vt patebit in viribus, quas nemo Cinnabrio minerali, vel factitio, vel fossili tribuet.

Cinnabarin verò Dioscor. esse sanguinem arboris Draconis atque adeò hanc lachrymam quæ hoc nomine hodie habetur legitumam esse Diosc. Cinnabarin præter iam dictos auctores, Matthioli. Amatus, Lacauna, Fallop. Castor Dur. Theuerus, Clus. Dalech. Hist. Lugd. & Celebriores Medici plerique, vt non malè iam Diosc. ætate, Sanguis Draconis, non animalis quidem, sed arboris fuerit nuncupata.

Fallitur verò Fuchf. de Matth. censura, quando

existimat, in Nic. Myreplici codice in Damasceni antidoto ab aliquo imperito additam esse cinnabarim. Nam non de factitia cinnabari vel fossili, sed de arboris Draconis lachryma, Dioscoridi Cinnabaris dicta intellexisse censendum. Deceptus autem fuit Fuchf. non tam vocis homonymia quàm rei ignorantia, vt quidem coniciere est. Verum ipsius Nicolai verbis doceri potuisset, quando ait: *καὶ δὲ αὐτὴν ὀνόμαζον*.

Sed quid Theuetus de hac arbore tradit paucis quoque videamus. In insula Madera, inquit, quædam arbores certo anni tempore Gummi exudat, quod sanguinem Draconis vocant, perforata arbore propè radicem magno & profundo foramine. Eius fructus luteus est, magnitudine Cerasi nostratis, refrigerando corpori, & leuanda siti, in febre aut ardorib. ualde utilis. Non est dissimile à Cinnabari Diosc. de qua & Plin. Apud nos non reperitur nec Cinnabaris, nec Sanguis Draconis puri, quales descripserunt Veteres, sed uterque adulteratus. Prædictum igitur Gummi omnino existimo Cinnabaris & sanguinis Draconis astringente vi. Hæc Theuetus, Sed mirum cum auctor sit istarum Insularum scriptor, eum arborem non describere, ac ne villa vel notula quidem designare, non absque negligentia nauo. Videt etiam Leæor recentiores hos Auctores, Aloisium Cadamustum, [cuius supra meminimus] & Thevetum in fructus colore minimè conuenire, hic flauum dicit, cui subscribit Clus. ille Venetum, id est, cœruleum vt Vegetius interpretatur, vel marinum, & Thalassium, vt Lucretius & Lampridius: vel ferrugineum, vt alii. Hi enim tres tantum ex Recentioribus, quod equidem sciamus, hanc arborem descripserunt. Sed fieri potest, vt fructus ipse variet, vel mutatione coloris, vel pro diuersitate arboris speciei varietate differens.

Ergo hæc arbor *δράκων* siue *δράκων* τὸ δένδρον, Syriacè quamuis eius arboris veteres Græcos meminisse non dum apertum sit: Lachryma verò *καὶ δὲ αὐτὴν ὀνόμαζον* recentiorum Græcorum. Draco arbor: Cinnabaris: sanguis vel lachryma Draconis. Germ. *Drackenbaum* / *Drackenblut*. Gal. *sang de Dragon*. It. *Sangue di Drago in lacrima*. Castil. *Sangre de Drago en lagrima*. Portug. *Vermellao*. Arborem quoque Hispani *Draconiam* vel *Draconem* appellant, vnde eius liquor sanguis Draconis: quod nescientes decepti, vt sanguinem animalis esse crederent.

Apud insulas Maderiæ & Canariæ, olim Fortunatas dictas magna ex parte provenit, & fortè etiam in Africa quæ Cinnabarim Dioscor. tempore subministrabat. Ex quibus locis in Italiam importatur parua quantitate, & carè venditur, teste Lacuna. Sed adulterata per totum ferè mundum distribuitur. Aloisius Cadam. scribit sanguinis Draconis arbores præcipuè crescere in parua quadam insula Atlantici Oceani propè Maderan, quam Lusitani Portum sanctum appellarunt, vti dictum. Fructum fert Martio mense. Olysi pone nasci arbores, iam supra dictum.

Ceterum ad id, quod Strabo ex Possidonio arborem supra ex eodem descriptam in Gadibus nasci prodidit, ait Clusius, sc. tametsi diligenter totam insulam perlustrarit, nullam arborem cõspexisse, qualem Possidonius scribit: sed neque villam aliam, præter aliquot salices, & vnai aut alteram siliquam, licet [vt ab incolis viris fide dignis accepit] circa vrhem Gades, recenti adhuc adhuc memoria, latissima viridaria fuerint, omni fructiferarum arborum genere exultissima, quorum



rum nē velligia quidem nunc apparent; faburra arenacea, quam naues eo appellentes exonerant, omnia complente & exurente. Simile folium, quale separatim in icone expressum, qualeque olim Baro Germanus ex Hispania attulerat, dono accepimus à perdocto & egregio Medico D. Osualdo Crollio, quod rapaci cuiusdam manu nobis fuit surreptum. Lobel. annotat creuisse Draconem arborem suo tempore in Coldenbergii botto Antuerpiæ ex Hispanis delatam, talem omnino, qualem eleganter Clus. descripsit.

Cinnabaris, ut prodidit Diosc. eandem vim habet, quam Lapis hæmatites, ad oculorum medicamenta vtilem, imò etiam efficaciorē: magis enim adstringit & sanguinem cohibet. Igni quoque ambustus, & papularum eruptionibus cerato excepta medetur. Galeno Cinnabari modicè acrem facultatem obtinet. Habet verò & adstringentis quippiam. Fructus aciditas argumento est vtiliter in febrilibus, ut censet Thevetus, præberi posse. Eius lachryma, inquit Clusius, adstringendi vi pollet, illiusque visus non infelix ad muliebres & dysentericas fluxiones, cruentas excretaiones, litmandus commotus dentes, & roborandas gingivas. Quæ facultates eis admodum sunt similes, quas Diosc. Cinnabari tribuit. Non tamen existimamus frigidam & siccam esse tertio gradu, ut Lonic. scribit: nullam etiam insignem vim hæc tenus animaduertimus in legitima, ad reprimendos fluores sanguinis. In adultærio ob admixta adstringentia maiorem credimus.

**TACORI FOLIA DRACONIS ARBORI SIMILIA.**

CAP. CCX.

Valebius Syvertz Amstelredami redemerat de nautis anno 1599. reduciibus ex America folia Tacori, in Kayana & V Viapoek nacentia: arborifine verò, an alicuius alterius plantæ, non erat adscriptum, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 21. Draconis tamen arboris, cuius historiam primo Rariorum Plantarum dabam, foliis valde à similia erant, cubitalis, vel etiam bicubitalis longitudinis, vncialis verò latitudinis in summa parte, deinde paulatim in mucronem gracilescens. Incolas aquà macerare dicebant, contundere, & in tenuia stamina diducere lini, aut serici instar, quin & funes ex illis torquere ad tigna in suis fabricis colliganda idoneos. An alterius sit apud illos præterea vsus, ignoro.

**SVCCVS, SEV GVMMI, AVT POTIVS RESINA CINNABARIS COLORE INFICIENS.**

CAP. CCXI.

Mittebat Garetus, inquit Clusius Exotic. lib. 4. cap. 8. succum duodecimum, quem anno 1603. ab iis, qui Iacobum van Neck ex Sinarum regno comitati erant, acceperat: gummi cuiusdam fragmentum in planam massam redacti semuncialis penè crassitudinis, quod lucernæ adhibitum liqueſcebat, id, quum eleganti & florido cinnabaris colore inficeret, mihi persuadebam Arboris Draconis, purius & defæcatum gummi esse posse, quod sanguis Draconis appellatur.


**SVCCVS RVBRO COLORE INFICIENS. AN OVIEDI BIXA?**

CAP. CCXII.

Donabat mihi, inquit Clusius Exot. 4. cap. 8. Descript Amstelredami anno 1600. honestissimus vir Petrus Garetus Iacobi frater eius urbis ciuis, succū concretum, ab iis, qui eodem anno ex sua longinqua navigatione redierant, redemptum, qui siccus erat & durus, ut potius in pollinem attareretur, quàm dentibus cederet, aut ore retentus mollesceret: eius color ex atro tubescens, ut saluà leviter aspersus non minùs rubro colore inficeret, quàm terra synopica, in quo tamen levis quædam flauedo inspersa videretur, odoris, quemadmodum etiam saporis, expers (mea quidem opinione) nisi ex præcedentium odoratu & gustatione, odor & sapor naribus & palato adhuc inhaerentes, meum iudicium deprauassent. Succumne concretum hanc massam appellarem, an terram aliquam in globum congestam, hærebant in eâ tamen opinionem magis inclinabat animus, ut terræ genus quodpiam æstimari posset, quàm resina, quia igni admota nigrescebat, & citius consumebatur, quàm arderet & liqueſceret. Nisi forte Bixa Ouiedi censenda sit, cuius in suo Summario meminit c. 10. & lib. 3. c. 6. primæ partis Hist. General. & Natural.

**DRACONIS SANGVINIS FRUCTVS MONARDI, DRACONIS EFFIGIEM IMPRESSAM HABENS.**

CAP. CCXIII.



Fructum arboris, ex qua manat lachryma ista, quam sanguinem Draconis vocat, quemque attulit ex noui orbis continentis Episcopus Carthaginiensis, authore Monarde, longè diuersus est à prædicto, & admirandus: nam sublata, quâ integitur pelle, illi co Dracunculus apparet, tanto artificio à natura fabricatus, ut à peritissimo ali-

quo artifice è marmore sculptus videatur, collo oblongo, ore hiant, spina aculeis horrida, cauda oblonga, & pedibus conspicuis. Ab eo fructu denominationem proculdubio sumpsit arbor, & eius lachryma, quæ ex illa per incisionem legitur, quam ex Carthagine Peruana selectissimam aduehunt: vnde Veterum & multorum Recentiorum inscitia deprehenditur, qui quid esset sanguis Draconis, aut cur sic appellaretur, omninò ignorarunt.

Magna est arbor, cortice satis tenui, & qui sa-

Dracunculus.

Eryman.

cilè incidi potest: eà vulneratà, liquor ille effluit, quem sanguinem Draconis in lacryma dicunt, ab eo efficiens, quem sanguinem in pane vocant, quod in panaceis massas utit cogant, quemad resina in Castella.

Cæsalpius quoque ex Monarde meminit huius fructus Draconis: sed arboris præcedenti cap. descriptæ non meminit. At Clus. refert, à Francisco de Hollebecque regis H. sp. hortulano sibi missos quosdam fructus Dragonalis nomine, ex quibus terre cō missis nonnulli prodierunt. Erant ferè foliis Iridis, oblongis, viridibus, per oras rubris [qualia in grandi arbore Olysiptone conspexisse ait,] sed sub hieme absulit. Fructus erat ceruin magnitudinis hinc aut Oxymus sine, rotundus, tenui pelle contextus; quā sublatà, ossis nucleus conspiciebatur, qualis est in fructu Rusci: sed is nullam similitudinem, nedum Dracunculi tanto artificio subrepti figuram referebat. Verum rotundus erat & laevis, & totus ossis, uti dictum. *He. Cl. sp.*

Sed & in eo repugnat descriptio Clus. à Monardis, quod hic arborem scribit esse cortice satis tenui: ille verò ferrum difficulter admittere, atque adeò truncum eius perquam scabrum esse, multique rimis dehiscentem. Vnde Hist. Lugd. suspicatur Dracunculi fabulam esse cum mirando illo fructu, ac huius arboris historiam effictam, quod nos tantisper in medio relinquimus, & huius etiam historiam separatim hoc cap. apposita figura damus, non ut approbemus Monardis dicta contra sententiam Clusii [quam tamen directè neutiquam reiicit] sed donec prodeat qui nos doceat vter illorum veriora tradiderit: nam sanè si vterque vera scripsit, necesse est duas esse diuersas sanguinis Draconis arbores.

#### AGNVS SCYTHICA, BOROMETZ.

##### CAP. CCXIV.

**H**ic Vic Monardis Dracunculi fructus inculpti narrationi attexamus longè insolentior, ex Scaligero. Superiora ludum putes, prout est admirabilis Tartaricus frutex. Tartarorum herba primaria Zauolha est, vetustissimæ nobilitatis commendatione. In eo agro ferunt semen seminis Melonis simillimum, sed minus oblongum. Ex eo

*Tartaricus frutex. Semen melonis.*

satu plantam exire tradunt, quam Borometz, idest, Agnum vocant. Crescit enim Agni figura, ad pedum ferè tertium altitudinem: quem pedibus, ungulis, auribus, toto capite, prætenquam cornibus repræsentat. Pro cornibus pilos gerit, singularis Cornu speciei. Obducitur corio tenuissimo: cuius detracti vsus ad capitum tegmina incolis. Ferunt internam pulpam Gammarii referre carnes. Cæterum è vulnere quoque sanguinem manare. Dulcore esse admirabili. Radicem humo exertam surgere ad vmbilicum vsque. Illud miraculi fouet magnitudinem. Quando vicinis obsiderit herbulis, tandiu viuere, quasi agnum in læto pascuo. Absumptis illis, tabescere, atque interire. Idque non solum vel casu vel tractu temporis, sed etiam experiundi gratia, subtrahitis atque ablatis euenire. Quin illud augeret admirationem: appeti à Lupis eam, non item ab aliis bestiis, quæ carne vescantur. Hoc quasi condimentum, atque intritum, ad fabulæ & Agni allusionem. Illud scire velim. Ab vno stipite, quatuor dissita crura cum suis pedibus, qui possint prouenire atque produci.

Laurentius etiam Seruius in Chronica Germani 1504. meminit huius seminis Meloni similis, ex quo in Tartaria proueniat Agnus, lanam, carnem & sanguinem habens, qui ex medio ventre radicem habeat, terræ adhaerentem, qui viuat ex esu adiacentis herbar, quæ depastà moriatur. Lupos & rapacia animalia ei infesta esse: hanc historiam confirmari per multos insignes viros. Inter quos Io. Maria Bonard. deminer. Agno similis planta apud Tartaros, quæ voratur à lupis, quasi agnus esset.

Et Caroroë similis fructus in regione Cadissâ, in qua animalculum reperitur cum carnibus, ossibus, & sanguine, simile Agno sine lana, quod comeditur cum fructu.

Eadem Sigismundus Liber refert in suis Comment. de rebus Molchoitarum, ut mirum sit Scalligerum nec hunc, nec alium à quo fortè accepisse potest, citare pro teste, præsertim cum hanc nec viderit, nec ab ullo visam proditum sit unquam. Merebatur sanè tanti miraculi [nisi sit fabula, quod valde veremur,] recitatio, auctoris honore maculari. Sed adeò nimirum omnia voluit scire, aut scisse putari vir ille sine æmulo maximus, vel in eo seipso fretus, noluerit alieni nominis subsidio gradum sibi facere ad gloriam suam.

#### FINIS LIBRI TERTII.













# HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER QVARTVS.

QVI ARBORES VARIAS CONTINET POTISSIMVM INDICAS,  
AROMATICAS, ODORATAS, ALIASVE EXOTICAS, QVIBVS VARIJ  
generis interfuerunt cortices & ligna.

Tot exoticarum ordini non absurdè subiiciuntur vel huius, vel remotissimi orbis Odoratae arbores, earumque partes, quas quidem aquorea illa velutatio mortalium, proiecta audacia plena, habendique cupiditate compulsa, & in hanc usque diem accersere ausa, non minori sanè huius Orbis ditandi compendio, quam amplianda felicitatis humanae conservandaque sanitatis accessorio, comparavit: cuiusmodi diximus, odoratas plerisque, & quicquid exoticarum divitiarum nostro studio addisci potuit, ut doceremus alias: exorsi ab ea quae praeforibus quasi occurrit, odoratarum vulgarissima, forrè & nobilissima, Lauro.

LAURVS.

CAP. I.



Aurus plerumque multis stolonibus luxuriat, vel mediocris arboris altitudinem affecta, alioqui in iusta magnitudinis arborem excrevit, praesertim regionibus calidioribus, caudice enodi, cortice tenui, materie

rara, nec multum valida. Radices habet crassas, inaequales & obliquas, Ceterum perpetui viroris est, nitidi viros in iunioribus, in adultioribus saturatioris, (elegantior Ouid.

Vique meum intonsus capus est iuvenile capillis Tu quoque perpetuos semper gerere frondis honores.)

Folia ci oblōga, dura, acuminata, sed mucrone



aliàs acutiore, aliàs obtusiore, sescunciā aut vncias duas lata, palmo longiora, versus pediculū & mucronem paulatim angustiora reddita, quae secundum

dum longitudinem percurrit costa recta, obliquas in margines nullo ordine nervos exporrigens: Sapor. por acer aromaticus & subamarus. Adhaerent autem folia ramis viridantibus, breui pediculo. Flores secundum ramos exeunt conferti, Hederaceis quadantentis similes, maiores, albi, [ Lobelio flavescentes ] multis in medio apicibus: quibus succedunt baccae Cerasi minoribus pares, oblongae, colore primum viridi, ubi maturuerint, nigrae, quae sub cortice tenui, nucleum bifidum, callosum, ac durum, cum aliqua acrimonia amarum & pinguem claudunt.

Theophrasto quoque Laurus perpetuo viret: eius fructus bene olet & pinguis est. Pro flore vnam fert, [ τὸ ἄκρον: fortè leg. ἑλκον, quod floris certum quoddam genus, in Lauri florem non male quadrans. ] Sed fructifera, quanquam non omnis, sed genus quoddam: tamen vna in Lauro non fructifera, quam marem vocant, magis gignitur. Facile perit Laurus ob raritatem inimitatēque, quamvis non abunde fructificet: nā in hoc genere quaedam sterilis est, ut & quaedam muscosa. Non vermiculatur Laurus, quia acerba est, quamvis citò putrescat.

Cato ex Lauri differentiis habet Delphicam, Delphicam, Cypriam & Syluaticam, quam postremam Clus. Laurum Tinum suspicatur, de qua postea.

Sed videamus Plinium in Lauris Triumphantem, qui tredecim eius genera recenset. Laurus, inquit, proprie triumphis dicatur, vel gratissima domibus ianitrix Caesarū Pontificumque: quae sola & domos exornat, & ante limina excubat. Duo eius genera tradit Cato: Delphicam & Cypriam.

Mm

Plin. nat.  
Hist.

Delphica.

Cypria.

Tinus.

Regia: Au-  
gusta.

Baccalia.

Trium-  
phalis.

Taxa

Spadonia.

Chamae-  
daphne.

Alexandri-  
na.

Daphnoi-  
des.

Pacifera.

Laurifera

cellus.

Fulmine

sola non i-

citur Lau-

rus.

Cur honor

Lauri ha-

bitus in

triumphi.

Coronatus

Tiberius

Lauri con-

tra fulmen.

Strabon.

priam [imò tria tradit, ut modò dictum.] Pompeius Lenzæ adiecit, quam Multaceam appellauit, quoniam multaceis [Eduhis genus, è farina siliginis multo confecta, Aniso, Cymino, adipe, cateo, ramentis virgæ Lauri, subditis, dum coquantur Laurifoliis.] subiceretur. Hanc esse folio maximo flaccidoque & albicante. Delphicam æquali colore, viridiorē, maximis baccis, atque è viridioribus. Huc victores Delphis coronari, & triumphantes Romæ. Cypriam esse folio breui, nigro, per margines imbricato, crispam. Postea accessere genera: *Tinus*, hanc syluestrem Laurum aliqui intelligunt, nonnulli sui generis arborem. Differt enim colore, est enim ei cærulea bacca. Accessit & *Regia*, quæ cæpit Augusta appellari, amplissima & arbore & folio, baccis gustu quoque non asperis. Aliqui negant eandem esse, & laum genus *Regiæ* faciunt longioribus foliis latioribusque. Idem in alto genere *Baccalia* appellant hanc quæ vulgatissima est, baccarumque ferulissima. Sterilem verò earum, [quod maximè miror] triumphalem, eaque dicunt triumphantes vii: nisi id à Diuo Augusto exceperit, ut docebimus, [mox] ex ea Lauri, quæ ei missa è cælo, minima est altitudine, folio crispo ac breui, inuentu rara. Accedit in topiario opete *Taxa*, excrecente in medio folio paruulo, veluti lacinia folii. Et sine ea *Spadonea*, mira opacitatis patientia. Itaque quantalibet sub umbra solum implet. Est & *Chamaedaphne* syluestris frutex, & *Alexandrina* & *Daphnoides*, de quibus suo loco. Notatum Antiquis, nullum genus Lauri in Corsica fuisse: quod nunc fatum & ibi prouenit. Ipsa pacifera, ut quam præterendi etiam inter armatos hostes quietis sit indicium. Romanis præcipuè laetitiae victoriarumque nuntia additur literis, [litus Vet.] & militum lanceis, pilisque. Fasces Imperatorum decorat. Ex hac in gremio Iouis Opt. Max. deponitur, quoties laetitiam noua victoria attulit. Idque non quia perpetuò viret, nec quia pacifera est; præferenda ei vitroque *Olea*, [utique Myrto & *Olea* Vet.] sed quia spectatissima in monte Parnasso. Ideoque etiam grata Apollini, affluctis eò dona mittere iam & regibus Romanis, teste L. Bruto. Fortassis etiam in argumentum, quoniam ibi libertatem publicam is meruisset, lauriferam tellurem illam osculatus è responso. Et quia manu fatarum receptarumque in domos, fulmine sola non igitur. Ob has causas equidem crediderim, honorem ei habitum in triumphis potius, quam quia suffimentum fit cedis hostium & purgatio, ut tradit Masurius. Addeoque in prophanis vrbibus pollui Laurum & Oleam fas non est, ut ne propitiandis quidem numinibus accendi ex his altaria aræ debeant. Laurus quidem manifestè abdicat ignes crepitum, & quadam detestatione. Tiberium Principem tonante cælo coronari ea solitum ferunt contra fulminum metus. Sunt & circa D. Augustum euenta eius digna memoratu. Namque *Linie Drusillæ*, quæ postea *Augusta* matrimonii nomen accepit, cum pacta esset illa *Cæsari*, gallinam conspici candoris sedenti aquila ex alto abiectam in gremium illæ. Intrepidèque miranti accessit miraculum, quoniam teneret rostro Laureum ramum onustum suis baccis. Conseruari alitem & sobolem iussere atuspices, ramumque eum feri acritè custodiri. Quod factum est in villa *Cæsarium*, fluuii Tiberi imposita iuxta nonum lapidem *Flaminia via*, quæ ob id vocatur *Ad gallinam*: mirèque sylua prouenit. Ex ea triumphans postea *Cæsar*, Laurum in manu tenuit, coronamque

capite gessit: ac deinde Imperatores Cæsares cuncti. Traditūque mos est ramos, quos tenuerunt, ferendi. Ex durat sylua nominibus suis discretæ, fortassis idè mutatis [nominatis Vet.] triumphalibus. Vnius arborum Latina lingua nomen imponitur vitis. [Liberus Ciceronis Lauream Tullius vocatus est.] Vnius folia distinguuntur appellatione. Lauream enim vocamus. Durat & in vrbē impositum loco, quando Loretum in Auentino vocatur, ubi sylua Lauri fuit. Amyci Bebry tumulus in Ponto circa Heracleam à supremo die Lauro tegitur, quam insanam vocant quoniam si quid ex ea decerpit inferatur nauibus, iurgia fiant, donec abiiciatur. Hæc Plin.

Diofcoridi duæ Lauri species celebratæ; *diopna*, [inquit] ἡ ποτὶ τὴν ἀντιόχειαν & ἡ γαλατικὴ: Laurus alia tenuifolia, alia latifolia est. Lauri folia *reparis* à Veteres appellasse Athen. autor est, quod *Plinius* Cammaudibus nuncupatis obducebantur. Placent id genus fuit oleo & melle maceratum Eustathio: aliis farina cum oleo cocta, Lauri foliis operata. Sed par fuit & à Poëtis Laurum suam celebrari. Id quidem abundè præstitum & veluti certatum. Hanc verò Apollini Deo suo dicatam, omnes consentiunt: vnde Virgilius:

Phæbo sua semper apud me  
Munera sunt Lauri.

Hanc enim ob rem, Eurotam fluuium, qui Spartam præterfuit, quod Lauris ab utraque ripa parte oblitus sit, Apollini sacrum Poëtæ dixerunt: inter quos hic in Sileno:

Omnia quæ Phæbo, quondam meditante beatus  
Andris Eurosas, in sinque ediscere Lauros.

Simili ratione & Parnassus mons huic sacer, quod Laurus in eo spectatissima semper proueniat. Lucanus:

Cardine Parnassus gemina petiit æthera colle  
Mons Phæbo, Brimæque sacer.

Hæc autem Laurus Virgilio Phocaica, quod Parnassus mons in Phocaica regione situs sit.

C. r. dida Phocaica complectitur insula Lauro.

Hic obiter notandum apud Virg. in Bucol. Egl. 6. ubi legitur iussit educere Lauros, nostro iudicio rectius legi Tauros, perperamque legi à nonnullis ediscere Lauros, ut rem poëtico studio magis adaptent, temeraria satis, mehercle, non coniectura, sed emendatione: quippe qui videre poterint poëtam paulò antè de armentis alisque animalibus locutum. Ferunt præterea templum, quod toto orbe terrarum Apollini primùm ædificatum, apud Delphos ædificatum fuisse: atque tantum è Laui ramis, è Tempe ac Peneo Thestaliæ petitis, ac in terram in specus morem de fixis, scribente Pausania in Phocentibus. Exin postea, in Apollinis sacro festo ac pompæ sollemnitate puer solitus sacram gestare Laurum. In Ismeno colle [à quo Apollo Ismenius: licet quidam non à colle, sed à fluuiio dictum velint] extra dextram Thebarum portam templum Apollini sacrum, cuius sacerdos Daphnophorus, id est, Laurifer cognominatus. Daphnites etiam à Syracusanis Apollo dictus, auctore Hesychio. Sed nunc ad rationem dedicationis deueniamus: cuius varie sunt Authorum, sicut in re vana, opiniones. Lubet tamen poëticas has amenitates paulò diligentius perstringere, quod in iis interdum multiplex interiorque delitescit rerum scientia, atque adeò verborum illo inuolucro non nihil etiam veri prætereundum solent.

Diodorus igitur Siculus hanc causam affirmat, quod ille primus hanc plantam inuenerit. Alii



*Differentia  
fructus.*

# HISTORIAE PLANTARVM.

ius utramque in syluestrem & sativam: quid sibi velit, Oedipus alicui diuinandum reliquimus.

Bellon. in monte Athos quinquè species Lauri semper virentis obleruasse tradit, & inter eas vnam in odoratam.

Laurus  
in odora.

Theophrastus differentiam maris & foeminae sic explicat Hermol. Fert & viam suam Laurus, tam foecunda, quam sterilis: nec tamen foecunda omnis: copiosius sterilis quam marem appellatus.

At Matth. maris & foeminae differentiam à foliorum diuersitate defumendam censet, quando ait: folia habet Laurus oblonga & lata origine, in acutum desinencia, in vno genere latiora, in altero angustiora: quàm foliorum differentia alteram marem alteram foeminam censemus. Sed plantarum studiosis decernendum remittimus an vllum aliquando viderint Lauri folium, origine latum.

Matth. not.

Dod. alteram mediocri arboris altitudine, foliis duris ait: alteram fruticosam magis, à radicibus germina plura emittere, quæ tamen in tantam altitudinem non assurgat, & corticibus ramulorum rubeat, cuique sint folia teneriora ac minus dura, quas differentias & Dioscoridem agnouisse putat.

Laurus  
baccifera.  
Virgula-  
re non  
baccata.  
Daphne  
Gude.

Lobelio vulgarior Laurus baccifera: humilior virgulacea non baccata dicta, quam & Gigartiferam cum Pena vocat in Aduerf. Quoniam vetò frondes igni fragorem edunt salis itreptu, Daphnem dictam volunt quasi Daphnen. Quem itreptum fortè & Virg. insinuauit:

Et fragiles incende bitumine Laur. s.

Id est, vt explicat Dalech. inter vrendum fragores & crepitum edentes. Nihil enim æquè magno sonitu crematur ac Laurus.

Tabern. septem proponit Lauros totidem distinctis figuris, ac titulis insignitas, has. 1. Laurus mas, Lorberbaum menslin. 2. Laurus foemina Lorberbaum weiblin. 3. Laurus latifolia mas. Groß lorberbaum menslin. 4. Laurus latifol. foem. Groß lorberbaum weiblin. 5. Laurus tenuifol. mas. Klein lorberbaum menslin. 6. Laurus tenuifolia baccifera, Klein lorberbaum menslin. 7. Laurus angustifol. mas, Lorberbaum menslin. An verò ea harum sit differentia, quæ septem figuris indiguerit, Lauri varietatum gnari Lectores iudicent.

Apud Amatam quoque in Edit. Lugd. cum annot. Rob. Const. pro Lauro malè posita Hypoglossi icon. Arbor Græcis *δάφνη*, quæ voce etiam Latini, vt Petron. Arbitr. Et baccis redimita Daphne & etiam Ladonis, patronymicè appellatione à patre Ladone. Sunt etiam qui *κασσιόλα* vocitent: alii *κασσιόλα*. Baccæ eius *δασυδής*. Laurum *κασσιόλα* in Alexipharm. vocat Nicander, quoniam in Thessalia comperta fuerit primum, vt notat Cæl. Rhod. Lauri tutiones cum legis, summas partes intellige, ac præterceras. Folia in Catone dicuntur *Laurea* & *Lorea*. Fructus Lauri *bacca*, *Daphnococci*. Oleum *δάφνης*. Arabibus Laurus, vt videre est apud Serap. *Gaur* vocatur. Item *Går*. Lingnum in Auerh. *Aegarelschaar*. Laurus German. *Lorberbaum*. Fructus, *Lorberbeer*. Gal. *Laurier*, *Grain de Laurier*, ou *Baies de Laurier*. Ital. *Lauro* & *Orbaco*: *Bacche di Lauro*. Hisp. *Cal il. Láur*, *vel*, Portugal. *Laurreiro*. Catal. *Lorel*. Fructus *Castil. Vayus*. Angl. *Laureoibaytree*, vel *Laurrel tree* & *Baytree*. Belg. *Laurusboom* / *Laurier* & *Laurierboom*. Fruct. *Bay* & *Bacfelser*. Bohem. *Bobef*.

Lauri Epi-  
glota.

Laurum denique variis Poëtæ ornauerunt epithetis, insignis eius nobilitatis vberissimo argu-

mento: *Salva*, *Asylitimen*, *Apollinaria*, *Phiedra*, *Delphica*, *Fatidica*, *Pythica*, *Pieria*, *Phocæica*, *Aonia*, *Parnassia*, *Thessalica*, *Palaia*, *Triumphalis*, *Delta*, *Chalcedonica*, *Indica*, *Marcia*, *Pacificæ*, *Virgulea*, *Enthea*, *Virginæa*, *Myrica*, *Tacta*, *Virgo*, *casta*, *cumulus*, *crepitans*, & alius quamplurimis. Romani boni generis plantam vocant, teste Const. Cesare.

Ex iis quæ mansuescere possunt, Laurus & Myrtus, vt tradit Theoph. quæminime in frigidis durare possunt. Fert tamen frigidior locum Laurus magis quàm illa, argumento: quod in Olympo Laurus multa, Myrtus omnino nulla: in Ponto autem toto neutra est, quàmquam summo studio, omnique solertia ferere conantur ad vñs rehgionis. Sæbit & montosa Laurus, vt tradit Plin. Sed à Theoph. non nihil variat quando ait: Frigus inimicum Lauro fecerat: sed in Olympo copiosior nulla est. Circa Bosporum Cimmerium in Panticapæo vrbe, omni modo laborant Mithridates rex, & cæteri incolæ, sacrorum certè causâ Laurum Myrtumque habere: non contigit, eam teporis [repositi in M.d. temporis cu.] arbore abundent ibi. Theophr. tanquam rem raram & ostento similem narrat, Laurum aliquando ortum in Platano & Queru. Gaudet locis calidioribus. Quare in Lexobis, ac Bellocastis Neultra, hortos maris afflatu tepentes non designatur. Quin & in Italia & Hispania non tantum hortus & vineis cognita, sed & syluis & montibus, potissimum mari vicinis. Ad lacum Benacum secus itinera sepes vbique ferè sunt, ex Lauris artificiosissimè concinnatæ: sed & abundè ibi passim in collibus & nemoribus sua sponte prouenit, quemadmodum & in Creta. In monte Athos atq; Lauri spontaneè nascentes ardorem Solis anni tempore reprimunt. In monte Amano Laurus latifolia frequens, teste Belloñ. In Germania, Gallia, Anglia, & Belgio non nisi lata & diligenter culta prouenit, in Magnatum tamen hortus haud adè insolens. Apud Germanos hyemem non facit perfert, nisi reconducatur. In Anglia, inquit Turnerus, in magnam arborem non excreuit: felicis tamen adolefcentiæ etque quàm in Germania. Sed huius regiones totæ non omnes perstruitur. Stutgardia sanè in horto E.C. pulchras Lauros vidimus cum baccis: verum hyeme teguntur, ac hypocaulis reclinantur. Basilæ quoque in horto D.Fel. Plateri elegantes habentur, vbi copiosè florent, sed sine baccis. Montpelitin magnas excreuit arbores. Columbus Montbelgardi veluti syluulam quandam, cuius tamen minores omnes ex maiore veluti matre expullularunt. Rariùs florèt.

Post Fauonium demum geminare Theophr. auctor est. Primo Fauonio, Plin. Floret Martio & Aprili. Baccæ maturantur sub finem Autumni cum oliuis, & nisi decerpantur pèt totam hyemem ad ver vique ita arbore hærent. Theophrast. scribit Lauro vites offendi, a quæ ac Brassica, odorifice eius vehementia reddi detentiores, quàm in se atrahant: vt mirum sit. Const. Carlatem eam commodam ad vitrum sepes dixisse. Ac sub Pinu Laurus commodè leti, quod ea radice simplici atque sit, idem Theoph. prodidit. Quod verò Laurum aucti difficilem ait, fatendum nos contrarium obseruasse. Pautis enim annis ad hominis altitudinem creuisse scimus. Baccæ passim in Officinis habentur.

Seritur autem pluribus modis, Nam & semine prouenit, & auulsionè [et] Theophr. si quis amputatis succulis ferat. Sed quod



quod auellitur, radicis aut stipitis (ὁρίζων, ὁρίζων) radicatum esse aut ramo (um) aliquid habere debet. Eius enim extrema germinare nequeunt: nisi id raro & præter naturæ consuetudinem eueniat. Nam nec rami prægrandis germine Lauri vnquam erumpit, ac ne avulsione quidem, nisi difficilè. Cuius causa siccitas & raritas. *Hæc Theophrast.* Cui non consentit Plin. quando ait: Testatum sic obiter & ramo Laurum feri, quoniam dubitare Democritus & Theophrastus. Crebras deponere Lauros non plus nouenis pedibus distantes præcipiunt.

Quintilius inferi posse tradit Lauros mutud, & in Sorbo & Fraxino. Diophanes baccas suadet legi circa Cal. Decemb. feri verò post Idus Martias: viuiradices transferri mense Octobri. Alii mense Ianuario Aquilonis afflatu siccant baccas legi præcipiunt, expandique raras, ne calefiant acerbæ. Postea quidam fimo ad lerendum paratas vitina madeficiunt. Alii in qulo pedibus in profuente deculcant, donec auferatur cutis, aliquin vlgo infestat, nec patitur nasci. In sulco repulmato palmi altitudine vicinæ ferè acuatim ponuntur mense Martio: eadem & propagne feruntur. Triumphalis taleâ tantum: Augusta & Baccalis plurius modis: ab oculo Aquilæ ad oculos Sagittæ feri iubent. Baccis recensibus, [notante Trago] verno tempore in humo pingui, digiti altitudine depositis, Maio mense erumpunt, quæ si diligenter colatur, ac Autumno in figulina transplantetur, in arbutulam enatit mediocrem. Seritur & surculis apud nos, quos vere terra obruere conuenit, quæ ratione & Lauendula propigatur. Nostra obseruatione scimus surculos difficulter admodum prouenire: posse tamen: facilius si quid radicula habeant, quales copiosè è matris radice pullulantes emergunt. Nostri in vasis colunt, & hyeme diligenter reponunt: verèque rursus exponunt, vel in isdem vasis, serobibus in area excitatis, quod in Magnatum hirs fieri solet. Curam eandem adhibent, quam Citris adhiberi diximus.

Laurus inquit Theophrast calida est: idè ex ea ignaria facere solent. Est verò rara corpore: ideo fenes ex ea pulchros & præcines baculos faciunt. Dioscoridi vtrique Laurus [tam tenuifolia quam latifolia] excalfactoriam emollientemque facultatem habet. Itaque decoctum ex his infessu vulnæ ac vesicæ vitii conuenit. Virentia folia [τὰ χαλὰρὰ φύλλα] sic enim leg. non ἔχοντες, vt quædam ex habent] non nihil astringunt: trita & illita vespærum apumque ictibus opitulatur. Eadem adhibita cum polenta & pane ad inflammationem quamlibet leniendam valent. Pota verò stomachum grauant, & vomitiones mouent. In Græco legitur, πρὸς τὴν ἀσθενεῖαν τοῦ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ἢ ἐν τῇ μήτρᾳ. Corn. pro πρὸς τὴν, id est, mitigant, Cæ. pro, legit, id est, grauant. Facileque fuisse aitalteram vocem pro altera agnoscere. Plin. certè omisso priore membro, simpliciter dixit: folia pota vomitiones mouent. Marcello quoque vetus lectio suspecta est, putatque aliud aliud quod subuertendi, miſcendi, & exasperandi significationem haberet. Sane in alterutro membro clausulæ errorem subesse ostendit eorum inter se repugnantia, vt rectè animaduertit Corn. Verum is nostro iudicio non in primo, vt placet Cornario, esse videtur, qui βαταίνε legit, vt conformetur sequentibus

Tom. I.

ἐν τῇ μήτρᾳ: sed in his potius postremis. Certum enim est tum experientia tum ex Galenò, aromaticam esse totam, & amaricantem cum non nulla adstrictione hepatis amica, qualia ventriculum tantum abest vt subuertant, vt nauſeabundum corroborent potius. Quare rectè retineri *επαυγεία*, optimorum codicum fidem secuti, existimamus: non *αυγεία* verò in textum irrepsisse & expungendum esse: quemadmodum legisse verisimile est Galenum, alioquin hoc non taciturnum: *Plinius autem videri potest corrupto vsus cortice, vt multis locis ei euenisse pater.* Pro nostra opinione facit quoque Dodonæi obseruatio, quando scribit, Lauri folia à recentioribus non raro cum nonnullis cibariis præsertim pitibus coquantur: verum inde nulla nauſea accedit: sed eibus istis conditus sapor ac ventriculo gratior redditur. Nostra ætate à nonnullis cum carnibus suillis in eundem scopum coqui solent.

Porro Lauri bacca (addit Diosc.) magis quam folia calc faciunt. Proinde in Eilegmate trita cum melle aut passo profunt tibi, orthopææ ac thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, & vitilignes emaculant. Exptesus ex iis luccus, aurium doloribus auditusque grauitati auxiliatur, cum vino vetere & rosaceo instillatur. Inferitur & acopis & vnguentis tum etiam discutiendi vi præditus. Cæterum cortex radicis calculos rumpit, partus necat & hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus. *Hæc Diosc.* Nostra ætas baccis non ad pulmonis aut pectoris morbos vitur: sed ad ventriculi, locinoris, Lienis ac Vesicæ affectus folia exhibet: refrigeratum ventriculum concalfaciunt: concoctionem crudorum humorum promouent: languentem appetentiam excitant: cibi fastidium pellunt: iocinoris ac lienis obstructions aperunt: vrinasciunt: menses mouent, & ad securandum expulſionem faciunt.

Plin. eadem ferè quæ Dioscor. habet, sed aliis quoque adaucta. Laurus inquit, excalfactoriam naturam habet, & foliis & cortice & baccis: itaque decoctum ex his, maxime è foliis, prodesse vuluis & vesicis conuenit. Illita folia vespærum crabronumque & apum, item serpentum venenis resistunt, maxime lepis, diptidis & viperæ. Pro sunt & mensibus sciminatum cum oleo cocta. Cum polenta autem quæ tenera sunt trita ad inflammationes [Ruell. legit collectiones: quid si legamus inflationes?] oculorum: cum ruta, testum: cum rosaceo, capitis dolores, aut cum irino.

Quin & commanducata atque deuorata per triduum terna, liberant à tussi. Eadem profunt spiriis trita cum melle. Cortex radicis cauendus grauidis: ipsa radix calculos rumpit, iocinori prodest trib. obolis in vino odorato pota. Folia pota vomitiones mouent. Bacca menses trahunt appositæ trita, vel potæ. Tussim veterem & orthopæam sanant binæ, deſtracto cortice in vino potæ. Si & febris sit, ex aqua, aut eilegmate ex aqua multa, aut ex passo decoctæ. Pro sunt & Phthisicis eodem modo, & omnibus thoracis rheumatismis. Nam & concoquunt pituitam, & extrahunt. Aduersus scorpiones quaternæ ex vino bibuntur. Epinitidas ex oleo illitæ & lentiginæ, & huleta mahâtia, & vlcera oris, & furfures. Cutis pruriginem [porrigi] emCH. Yuccus baccarum emendat & phthiasin. Aurium dolori & grauitati instillatur, cum vino vetere & rosaceo. Perunctos eo fugiunt venenata omnia. Prodest contra ictus & potus, maxime autem eius Laurus, quæ tenuiora habet folia. Bacca cum vino

Tabes.

Ortho-

pææ.

rheuma-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

scorpi-

serpentibus; & scorpionibus & araneis resistunt.  
*Gangraena.* Ex oleo & aceto illinantur & lieni & iocriori: gā-  
 grenis cum melle. Et in fanguine etiam aut per-  
 frictione succo eo perūgi. Nitro adiecto, prodest.  
*Partis pro-* Sunt qui celeritati partis multum cōferre putent  
*motus va-* radicem, acetabuli mensura in aqua potam, effi-  
*da.* caciū recentem, quā aridam. Quidam aduersus  
*Scorpionū* scorpionū ictus, decem baccas dan iubent potui.  
*sitia.* Item & in remedio vix iacentis, [ Gargareonis  
*i' vula.* demissi & laxioris ] quadrantem pondo bacca-  
 rum foliorūve decoqui in aqua sextariis tribus  
*Capitis do-* ad tertias, eamque calidam gargarizare: & in ca-  
*lor.* pitis dolore, impari numero baccas cum oleo  
 conterere, & calefacere. Laurus Delphicæ folia  
*Pessilia.* trita olfactūque subinde, pestilentie contagia  
*Oleum.* prohibent, tantū magis si & vrantur. Oleum ex  
 Delphicæ ad cerata atque, ad perfractiones  
*Aurium* discutiendas, nervos laxandos, lateris dolores,  
*dolor.* febresque frigidas [ vel rigores febiles, vel he-  
 pialas & Lyprias, in quibus ardent simul ægri &  
 algent. D. ] vile est. Item ad aurium dolorem, in  
 mali Punici cortice tepefactum. Folia decocta ad  
 tertias partes aquæ, vnam cohibent gargarizatio-  
*i' vula.* ne: potu alui dolores, intestinorumque. Tenerrima  
*Pecoris do-* ex his trita in vino, papulas, pruritūque, illita  
*lor.* noctibus. Proximè valent cetera Lauri genera,  
 de quibus singulis specialius suo loco. Laurus  
 quidem manifestè abdicat ignes crepitu & qua-  
 dam detestatione: interaneorum etiam vitia &  
 Interaneo-  
 rum quæ-  
 dam. Crepitum  
 Lauri quid  
 denotet.  
 Plin. nat.  
 Plin. corr.  
 Pessil.  
 Tempera.  
 Calculus.  
 Ciba.  
 Tania.  
 Radicis corticem ante Plinium Hippoc. partis  
 celeritati plurimum cōferre prodidit. Contra  
 venenata animalia succi remedio, & contra alia  
 venena, si Curtio credimus, munimur. Hoc etiam  
 inuncti protegitur, vt etiam venenosa bestie

nos fugiant. Lauri folia in aqua marina decocta  
 omnes pulices pelium ingredi compellunt. Oes-  
 trum, huc Tabanus bouem aliāque quadrupedia  
 in amentiam precipitare solent, maximè per-  
 stius calores: aduersus quas molestias, si Lauri  
 baccam contuderis, & in aqua coxeris, & coloco  
 vbi boues depasturæ, aut incubaturæ sint, insper-  
 seris, proderit. Hæc Sotio. A mulsis autem ne  
 infestenter, baccas Lauri contundito, atque oleo  
 incoquito, & boues inungito.

Huius autem arboris vim propè diuinam, non  
 ignorarunt aliquot animalia. Nam Coruus avis,  
 occiso Chamæleonte, qui etiam victori nocet,  
 Lauro infestum virus enecat. Pituita quoque gal-  
 linas, præsertim messis ac vindemiæ tempore,  
 vt plurimum infestat: illarum medicina est, vt  
 cubatus earum in Lauri fumo fiat. Hoc autem fit  
 cæca naturarum discordia, quam *antiquæ* vo-  
 cant Græci. Aduersus boum coriaginem, traden-  
 te Colum. proderit Laurum decoquere, & ea ca-  
 lida terga fouere, multoque oleo & vino conse-  
 fsum subigere, ac per omnes partes apprehende-  
 re & attrahere pellem, idque optimè fit sub dio,  
 Sole feruente. Idem animalis genus Cephalo-  
 gia, hoc est, capitis dolore torquetur: quod tunc  
 dignoscitur, vbi aures demittens non comedit:  
 tum foliorum Lauri, quantum manus apprehen-  
 dit, in os iniicit.

Sed ad vtilitates potius, quas homini præstat,  
 redeamus. Bacca Lauri à cortice exteriori mun-  
 data, deinde per noctem infusa in vino albo vi-  
 que ad consumptionem, fortiter exprimitur,  
 liquor reponatur in vas vitreum: de eo in angu-  
 lo lachrymali pone vnam vel alteram guttam, &  
 potenter lachrymas restringet. Eadem in vino  
 cocta, trita & oculis superposita dolorem & tu-  
 morem tollit, attestante Arnaldo. Amatus inter  
 selecta medicamenta combustionibus medentia,  
 siue ab igne vel aqua feruente, aut alia aliqua  
 causa eueniat, hoc primum obtinere certum  
 esse testatur ab Indico Medico acceptum. Super  
 Lauri folia facies de alto cadere porcinam carnem  
 ignitam, quousque folia in cinerem vertantur.  
 Eo vnguento combustam partem inungas, bisq;  
 in die, & intra tres dies sanam reddes. Lauri te-  
 nerimas summitates cum Nardo in vino deco-  
 ctas, aurium grauitati & tonis mederi, scribit Mat-  
 thiol. si eius decocti calentis vapor infundibulo  
 in aures recipiatur. Laurus ex se vim habet ignem  
 producendi: quippe si exsiccata ramus ramo fre-  
 quentiùs confricetur, superaspergo sulphuris pul-  
 uere, ignis statim exiliet. Ex baccis in nodulo in  
 vino aut cerevisia maceratis, vtilis sit potio ad  
 colicum dolorem: dissipant enim bacca flatus  
 in quos vsus asseruatur in Officinis Eleæ. de bac-  
 cis Lauri nuncupatum. Lauri baccis laxata Colu-  
 mella seu vula ad locum reducit, si cum aqua  
 li pondere Cymini, Hyslopi, Origani, Euphor-  
 bii, melle excipiantur, & summo capiti calidæ  
 applicentur. Easdem vniæ pondere cum tritici  
 vel hordei fursuris manipulo, baccarum lunipe-  
 ri vniæ semis, Alui bulbis tribus contusas, & af-  
 fusis vini albi libris duabus ad emplastri consi-  
 stentiam decoctas, & pectini admotas, tanquam  
 singulari remedio ad vniæ retentionem, vel  
 suppressæ prouocationem, prædicat. Septem  
 Lauri baccas à prægnantibus propediem paritur-  
 ris, cum se dormitum recipiunt, deuorata, faci-  
 lem felicemque partum præstare. Tenerrimas  
 Lauri Cymas cum Calamintha & sale contritas,  
 ex tepida aqua sumptas, aluum ciere, pituitam-  
 que & lumbricos celeriter expellere. Bacca Lauri  
 & Pira



& Pira Sylvestria confusa simulque imposita frō-  
ti & temporibus in linteolis, Camer. teste, sedant  
dolores capitis. Eadem bacca cum pauca Scam-  
monea & Croco trita in aceto & oleo rosaceo, in-  
staturque linimentum applicata in hemierania diutur-  
na non parum proliunt. Lauri folia Veteres o-  
lim inter bellaria adhibebant ii, qui nolebant  
vinum sibi nocere: vi namque exsiccatoria folio-  
rum, fumi ad caput elati adfumebantur: vel po-  
tius qui, cum vinosi essent, vinum tamen redo-  
lere nolebant, & sobrietatem mentiri conaban-  
tur: id quod Martialis faceret & clarè admodum  
significat.

*Favere multo Myrtale solet vino,*

*Sed fallat ut nos, Folia deuorat Lauri,*

*Merumque, tanta fronde, non aqua misceat.*

Ægyptiorum Hieroglyphica Picam folium Lauri  
ore tenentem pingunt, quo designabant homi-  
nem sibi ipsi medentem. Nam Pica ægrotans  
dicitur Lauri folia in nidum congerere & illis  
morbos arcere. Palumbes præterea, graculi, me-  
ruleque, perdices quoque, vt noxias bestiolas  
fugant, nidulis suis Lauri folia ingerere traduntur.  
Scribit etiam Secundus, eas annum fastidium  
Lauri folio purgare. Refert insuper Hōrus Apol-  
lo in Hieroglyphicis literis, palumbum quoties æ-  
grotauerit, Lauream frondem in suo nido appo-  
nere, quo remedio statim reconualecēt. Quamo-  
breum Ægyptii hominem sibi ex oraculi responso  
vtiliter medentem offendere volentes, vt modò  
dictum, Picam, vel secundum alios, palumbum,  
Lauri folium tenentem effigiant.

Mirum quoque, quod de can suo Asino aureo  
scribit Apuleius, Anethi foliis modicum cum  
Lauri foliis immisū cum aqua fontana, lauacrum  
& poculum esse ad faciem pristinam recipiendam,  
arte magicam immutatam.

Conueniente etiam narant in maleficiis amato-  
ris Laurum incendi, etsi amantium quarimo-  
nias repræsentet.

Columbæ etiam pullis suis contra fascinatio-  
nes præcauentes, Laurinos ramulos nidis repon-  
nunt. Anser folium Lauri non exest, ne quidem  
si vel fame prematur, attingit: nec rosam Lau-  
rinam, neque etiam viadhibita. Præclarè enim  
intelligit, si id comederit, vita se priuatum iri.  
Hæc Aelianus de Animalibus. Scribit etiam Lu-  
cianus, equo, asinoque Lauri folium perniciosum,  
& è vestigio mori edentes.

Colum. vult boues satiari circa autumnum fron-  
de Laureæ. Et ante ipsum Cato, si metuit mors,  
adhuc tamen sanis Laureæ folia tria cum sale &  
porri fibris danda præcipit.

Laurinum oleum apud Dioscor. è drupis, seu  
maturitate deciduis Lauri baccis <sup>de quædam</sup> in aqua  
decoctis conficitur. Tum enim ex ambiente cor-  
tice pinguitudinem quandam exudat, quæ ma-  
nibus prius expresso è tritis baccis succo conchis  
excipitur. Nonnulli verò vbi Omphacinum oleū  
Cypero, iuncto odorato, & calamo prius inspissa-  
uerunt, tenera deinde Lauri folia in id coniecta  
simul decoquunt: Sunt qui Lauri baccas addant,  
dum iustus odor accesserit. Alii styracem & Myr-  
rham admiscunt. Porro ad eiusmodi olei conse-  
ctionem optima est Laurus montana & latifolia.  
Palladio ex Lauri baccis oleum conficitur, hoc  
modo, Lauri baccas quàm plurimas, & maturitate  
turgentes in aqua calida bullire facies, & vbi diu  
ferbuerint, olei quod ex se dimiserint, superna-  
antis vndam pennis leuiter cogentibus in vasa  
transfundes. Ad Plin. Fit inquit, è Lauro admi-  
sto druparum oleo. Quidamque à baccis expri-  
munt tantum: alii foliis modò: alii folio & corti-

ce baccarum, nec non Styracem addunt, aliòsque  
odores. Optima Laurus ad id latifolia, syluestris,  
nigra baccis. Sed non satis explicat Plin. an bac-  
cæ Lauri cum oleo druparum conteri ac exprimi  
debeant, aut ab expresso simul vtroque fructu  
sic olei druparum admixtio fiat. Græci verò me-  
dici Aetius, Actuarius, & Paulus, alterum Lauri-  
num parum faciunt è Lauri baccis expressum: al-  
terum mixtum, ita vt ad quinque oliuarum matu-  
rarum sextarios, de baccis Lauri sextarius vnus,  
aut etiam æqualis mensura addatur, & olei expres-  
sio fiat. Mesuræ verò baccæ Lauri maturæ & rec-  
teseruntur in pila, ex aqua in Lebetes coquun-  
tur, pōst torculari plano exprimuntur in vas sub-  
iectum, in quo aqua supernatans oleum colligi-  
tur. Simplex vtilius, & quò recentius & viridius  
colore: amarissimum est & acre. Ex Gallia Nar-  
bonensi vtribus, vt commune, aduehitur, vnguē-  
to similis quam oleo. Nostri non parant, sed al-  
latum emunt.

Visei exalfaciendi, emolliendi, spiracula ve-  
narum aperiendi, & lassitudines discutiendi. Quin  
& malis nervorum omnibus, doloribus anum  
ac destillationibus confert: renum verò vitio ex  
frigore contracto laborantibus illitū est præstan-  
tissimum, & maximè si quid aliud, vtilis. At potū  
idem nauseosum est. Ob vim eius exalfaciōnem  
Paralyticis, Spasticis, Ischiaticis, saggillans, capitis  
doloribus, inueteratis destillationibus, auribus  
in calyce Panicæ calfactum illinitur. Apert, mol-  
lit, discuit. Idè intemperiem omnem frigidam so-  
lam & cum pituita vel flatibus sanat, & ab his Co-  
lo dolenti clystere insusum mirè prodest, vt parti-  
bus omnibus cerebri illitum, articulis, ventriculo,  
spinæ dorsī, horrore febrili, denique omnibus ner-  
uorum vitiis, algoribus, lassitudinibus, catarrhis,  
hepatis, Lienis, renum, vteri, frigidis affe-  
ctibus. Scabiè detergit eo in petiginibus, in balneo illitum:  
verum eo conuenit abstinere in lichenibus, psoris  
& aliis inflammationem minantibus, & in reli-  
quis calidioribus & biliosis temperaturis. Vermes  
& pediculos tam agrestes, quàm domesticos & lē-  
des enecat. Capitis furfures emendat: alopecias  
& quæ ophiatis nominatur, corrigit. Ad hos enim  
vltus in balneo illinendum: postea verò oportet  
vino & melle, vel ovo, cum melle & Pæonigræci  
farina detergere. Cauendi ne capiti calorem sen-  
tienti hoc admoveatur. Ano suppositum vel inie-  
ctum, hæmorrhoidum dolorem mitigat, & ex  
his profluentem sanguinem sistit, notante Cur-  
tio. Fit & uinum è Lauro, vt ait Plin.

Ex eius baccis conficitur emplastrum officinis  
frequentatum, autore Mesue. Recipit Thuris, Ma-  
stiches, Myrrha, sing. vnc. i. Baccar. Lauri vncias  
duas, Cyperi, Costi, sing. vnc. i. mellis colati quā-  
tūm ad ea comprehendenda sufficiat. Si autem  
Cyperi sefcunciam admisceas, & sterces capræ aut  
vacæ siccum ad pondus omnium, ad Hydropsē  
fit mirabile. Alioqui ventriculi, intestinorum, he-  
patis, renū, vesicæ, vteri, & partium aliarum  
dolorem, à flatibus, aut intemperie frigida ortum  
placat. Quare in colico dolore à flatu & pituita  
salubriter calidum ventri imponitur, vacuata ple-  
nitudine. In clystere quoque iniicitur vncia vna,  
vel sefcuncia, cum ceteris eodem pertinentibus.  
Inflationem quamuis, id est, à flatu tensionem,  
& tumorem, eadem ratione iuvat.

Diuersum ab hoc Emplastro Malagma dicitur  
apud Galenum, id est, è baccis Lauri, Nuro  
rubro, Ammoniaco, Cera, Resina, Picea, Pice  
Brutia.

Electuarium de baccis Lauri Iac. de Manliis in

Mm 4

Olei Sirei.

Nervorum  
affectus.

Caulis  
vcrum  
pediculi.

Laurinum  
vinum.  
Emplastrū  
Laurinum.

Hydrops.

Colica.

Elect. Lau-  
rinum.

in luminari maiori, cuius descriptio est apud Rhazam lib. 9. c. 72. cur à Lauro nomen acceperit, non videmus. Sunt enim in eo Elestuario efficaciora & maiora quantitate, quàm sit Laurus. Funt & igniaria ex lauri ligno. Exploratorum hoc vñus in castris Pastorūque reperit, quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis occasio est, Teritur ergo lignum ligno, ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi fomitis, fungi, vel foliorum facillimo conceptu. Sed nihil Hedera præstantius, quæ teratur, Lauro quæ teratur, auctore Plinio. Mercurio id inuentum tribuit hymnus ad eum scriptus. Sanè plerique etiamnum pastores, inquit Tragus, coacto isto igne [Sic enim à Germanica voce Notseur dicere possumus] vel multas videntur superstitiones, quæ seductæ & miseræ plebi longè magis arident, quàm veritas ipsa. Sed de hoc lauri attritu & prius quædam dicta, quæ modum & de Mustaceis, quos sic facere iubet Cato. Farinæ filiginæ modium vnum multo conspergito. Anisum, Cuminum, adipis. p. ii. Casei libram, & de virga Lauri deradito, eodem addito. Et vbi defixeris, lauri folia subitis addito dum concoques. Hinc Cicero ad Atticum ait, Bibulum in Amano cepisse Laureolam in mustaceo, non sine cauillo. Quum enim quis assumpto mustaceo feris aduenisset, faceret dicebatur: ille in mustaceo Laurum querit, utpote cui præter sedimentum nihil superesset. Quum itaque denictis, profigatisque à Cicerone Amani montis incolis, Romani populi sempiternis hostibus, Bibulus superuenisset, ut non nihil gloriæ occuparet, falsè à Cicerone dictum est, eum in mustaceo laureolam quæsisse. Quod in eos quadrat, qui in minimis ac frivolis negotiis venantur gloriam.

Laurus insuper Alexpharmacum est, & venenosa venena, ut supra dictum: unde Græcum adagium, *de xymio xepo laurineia*, hoc est, Laureum gesto baculum. Quod his convenit, qui feliciter à periculo aufugissent, & tutos se asserere volentes illud pronuntiarent. Videntur porro apud Catonem Lauri folia intelligenda in illa Libi confectione, quando ait: Casei pondo ii. in mortario bene disterat: vbi bene distriuerit, farinæ filiginæ libram, aut si viles tenerius esse, se libram filiginis solum eodem indito, permiscetoque cum caseo bene, ouum i. addito, & vnà bene permisceto. Inde panem facito. Folia subdito. In foco calido sub testa coquito leuiter.

Cæterum præter vires medicas alias propè diuinas habere creditur Laurus, si modò vera sint, quæ Authores tradunt. Quippe iam supra ex Plinio dictum, quod & Tranquillus ait, solam fulmine non icti Laureum. Hinc Tib. Principem, qui tonitrua præter modum expauit atque exhorruit, tonante cælo, contra fulminum mctus nunquam non Lauream coronam capite gestasse. Et Horatius:

*Tum spissa ramis Laureæ seruidus  
Excludit ictus.*

Quod & Colum. confirmat, quando ait: Plurimi etiam infra cubiliū stramenta graminis aliquid, & ramulos Lauri subiciunt: quæ cuncta remedia creduntur esse aduersus tonitrua, quibus vitiantur oua, pullique semiformes interimuntur, antequam toti partibus suis consummentur. Quidam etiam, teste Curtio, Lauri ramos in dolia imponunt, ne tonitrua & fulgura vina perueriant, per contrariam naturæ vim auxiliantur. Sed hæret & non absque ratione Hier. Fracast. lib. de Sympath. & Antipath. rerum, vtrū in Lauro talis antipathia sit: [quod nimirum à fulminis tactu

immunis tradatur.] illud magis inquit in causa putarim, quòd Laurus rotunda admodum est, & corticis densi ac læuis, à quibus omnibus sit, ut incidens vapor non inhereat, propter quam rationem nec columnas, à fulminibus tangi videmus, quòd rotundæ tersæque sint.

Contrarium etiam experimentum profert Laccuna, qui scribit anno 1539. Romæ in Palatio Ducis de Castro fulmine elegantissimam Laurum ictam. Ut merito ante eum Tragus videatur dixisse: fulmen non ictare Laurum Veterum superstitione credidit: quod idem de aquila & vitulo martino affirmant.

Simile fortè & illud, quod tradunt odio maximo à Daemonibus haberi. Aiunt enim plures factum morbum aliquem aut demonem eum locum infestare minime, vbi Laurus adfuerit.

Quare Romani, boni Genii plantam vocauerunt, ut supra dictum, quia secundam valetudinem adferre existimatur. Proinde Laurus & Carica Ianuar. mensis prima die, à populo Principibus donabantur.

Rubigo autem segetum maxima pestis, Lauri ramis in aruo defixis abigitur, transiitque ex aruis in earum folia, attestantibus Columella & Plinio.

Empedocles quoque philosophus Laurum tanti fecit, ut optimam conuersionem in arborem existimaret, quasi post mortaliū vitam in bestiarum demigrandum sit.

Porro præcipuus quoque Lauro honos & vñus ad victrices triumphantium coronas. Romanorum sanè Principum corona è Lauro fuit, ut legimus in historiis. Nam vt memoriz Appianus reliquit, Iulium Cæs. post ciuilia bella in vibem reuersum, multi Regem appellarunt, & vt aliqui ex ferone rem, sanè expunierunt, eius imaginem Lauro coronarunt, tanis albis infestis. Marcus Antonius Consul quoque, vt ex Plutarcho in illius vita est, illi in foro lauream porrexit. Quam quum huic semel atque iterum repudiata denuò obtulisset, iussit in Capitolium deferri, offerentem pauci faciens. Ipsi verò rennenti, plures congratulati, vt libertatis Reipublicæ affererent. Scribit tamen Dion, ciuibz inuitis post victorias obtinuisse, vt in conuentibus, veste regia, & corona laurea, ornati perpetuò sibi liceret: cuius rei causam asserbat, quòd caluus esset. Decretum insuper est, vt Augusti palatium Lauros propositas haberet, ex quibus corona cornea penderet: quasi ipse hostes perpetuò vinceret, & ciues conseruaret.

Julianum autem nondum Principem, Socrates in H. st. Ecclesiastica refert, quandam ciuitatem ingressum, & Lauream coronam inter columnas pendentem, rupto sine, super eum decidisse: & illum amplissimè coronasse. Quod qui viderent, hoc signum futuri imperii fore acclamarunt. Aludis, & illorum victoriis, inde obseruatum [referente Curtio] vt qui de hostibus victoriam reportassent, simili honore afficerentur, vt propterea triumphantes ex Lauro corona caput suū cingerent. Nam, vt dicebamus ex Plinio, hæc proprie triumphis data fuit: vnde in Aristide dicit Plutarchus: quicquid ob victoriam publicitus fiebat, id cum Lauro erat: vt ea præterea victorie signum remaneret. Quæmodum enim in victoris Delphicis lauro coronabantur, sic Romæ triumphantes. Quare de ea sic Ouidius:

*— Tu ducibus lætis, càm læta triumphis  
Vox caner.*

Iuuen. Satyr. 8.



*Nobilis ornatur Lauro collegæ secunda.*

De Mario loquitur, qui secundo de Cimbris triumphavit. Lucanus.

*Atque Lauriferæ dæminat Syllanæ iuuentæ.*

Hoc autem dixit propter Syllam qui Pompeii ad huc iuuenis decretaet triumphum.

Nonnulli tamen leguntur, qui in hac pompa, non Lauream corollam gestant, Verum tantum Lauri ramum dextera: quod solum Plutarchi, & Appiani testimonio clarum fiet. Hic in Libyco: Scipionem de Carthaginensibus triumphantem altera manu sceptrum, altera Laurum tenuisse scribit: Ille Paulum Aemilium in triumpho dextra Lauri ramum detulisse meminit. Gordianus etiam Carthaginem ingreditens ramum Lauri tantum tulit, attestante Hesiodiano. Sed ex alia quoque arbore, quam Lauro coronas gestasse triumphantes, legere est: Nam Papyrius Nafio de Sardis triumphans, Myrtea vltus corona, quod illos in campis myrteis debellasset. Cæarem etiam in triumpho Gallico, de Citero induisse coronam auctor Paterculus. Verum post Augustum natum, hæc corona desuit à Lauro primum in palatio confecta, atque eadem quæ Augustus natus, germinasse dicitur, ut Seruius Maurus memorie mandauit. Sed vlt paulo altius historiam repetamus, Suetonius autem est, aquilam prætoriam, & gallinam albam, Lauri ramulum rostrantem, apprehensam: in Liuia gremium, post Augusti nuptias, quum Vientanum suum reuileret, demisisse. Quem cum pangi placuisset, postea ad natum lauretum, ex quo deinde triumphaturi Cæsares, Laureas deciperent, ut alias eodem loco ferent, quas sub cuiusque satorum obitu, vt clanguerent obsecratum, Neronis verò ante interitum omnis sylua exaruit, & genus albarum gallinarum interit. Fuit autem vltimus de Cæsaribus, qui ab Aenea procellerint. Hæc Dion. R. huius autem Lauri bacca habuit, ut aliquid magnum significaret, eodem autore. Hæc coronæ triumphales & Festo & Gellio iniquitibus dicitur: quæ in ipso triumpho, ad Iouis Capitolini pedes deponerentur. Quod Lucanus exprimit videtur:

*— Haud sacras possunt Capitolia Lauros.*

Nazarius, siue alius sit qui panegyricum Constantino dixerit: Vidi isti, inquit, Apollinem tuum, comitante Victoria, coronas tibi Laureas offerentem. Cæterum ministri triumphi dicti, auctoribus Pompeio & Gellio, quique prælio non interfuerunt sed triumphum procurant, primo quidem corona oleaginea vsi sunt, postea verò augescente huiusmodi solennitate milites etiam Laureati, triumphantis curram secuti sunt: ut sic purgati à sordibus humana, ut existimabant illi, urbem ingrederentur. vnde Lucanus:

*Lauriferos nullo comitentur vulnere curras.*

Primum autem hac corona triumphasse reperitur Liber pater, de Indis, & Romulus deuictio Acrone Ceninensium Rege, tradente Dionysio Halicarnasæo. Sed & oualis corona tandem à Lauro fuit, quæ prius, auctore F. Pompeio, Myrtea fuerat. Nam M. Crassus, qui fugitiosos & Spartacum vicit, eum Lauream ouauit, Massurio auctore. Ita Nero ut Xiphilinus auctor, de Græcia Romam reuersus ouauit oliua coronatus, Laurum Pythiam præ se ferens. Tanti denique in victoriis Romani Laurum fecere, ut sapientis pro victoria acciperetur. Horat. in odis:

*Cui Lauros æternos honores*

*Dalmatico peperit triumpho.*

Scribit enim, teste Acrone, ad Asinium Pollionem,

nem, qui Solonas apud Dalmatiam ciuitatem cepit, & Lauream tanquam Poetæ, & triumphanti dedicauit. Idem ad Pompeium Varum:

*Longaque fessum militia Laus*

*Depone sub Lauro mea.*

Nempe victores, præterquam in triumphis, Lauream donabantur. Cleanthus enim, ab Aenea Virgiliano Lauream coronam redimitus, viridique aduolat tempore Lauro: quod is primus Fidenam irrupisset.

Sed Augusti in Hispanos victoria abunde declarat Laurum symbolum victoriæ fuisse, quam idem Poeta in odis sic celebrat:

*Herculi ritu modò dictus, & plebs,*

*Morte venalem petisti Laurum,*

*Cæsar Hispana repperit penates*

*Victor ab ora.*

Sed & aliter præterquam in triumphis etiam victoriæ nuntia fuit Lauros: nam & tabernacula, & falces, & literæ, naues, militumque iacula Lauro, in eam significationem adornata sunt. Norum est, Pompeianos milites, de futura contra Cæsa rem victoria (quamvis nimis securè) confidentes, sua tabernacula Lauro condecorasse. Plutarchus scribit Paulum Aemilium, Persam Maedonum Regem expugnasse, & post victoriam ad tabernacula reuerbis milites, illa Lauro, atque Hedera ornasse. Lucullus, ut Appianus in Mithridatico auctor est, captio apud Leucon insulam Varo, Alexandro, ac Dionysio eunucho, nauem Lauro ornata, ut in victoria [vt ille ait] mos est, cum literis Romam misit. Literæ etiam, quæ victoriam nuntiarent, Lauri foliis insigniebantur. Sic enim Liuus lib. 5. ait: Literæ à Posthumio Laureatæ sequuntur, victoriam populi Romani esse, Aequorum exercitum deletum. Idem. Post deuictum Persæ nuntius Laureatas literas consuli C. Licinio, victoriæ nuntias. Iulianus ad Preuinciarum signa, literas Laureatas misit, ut testatur Ammianus: quibus se in expeditionibus inter primos versatum significaret. Sic enim Aeron in Odis Horatianis inquit: Laureatæ literæ de victoria nuttebantur.

De falcebus, hoc vnum tantum à Plutarcho in vita Luculli exemplum erit. Lucullum ac Pompeium in quodam Galatiz vico conuenisse scribit: Laureatos vterque propter victoriam falces ferebat: verum longo Pompeii per loca squallida & arida, atque arboribus sterilia, itinere, Lauri circa falces palluerant, ac ferme aruerant: quod ubi Luculliani Lictores aduerterunt, ex propriis, quas recentes, & virides in manu habebant, liberaliter contulere: curramque Pompeii frondibus impleuerunt: quod in bonum Pompeii omen cessit. Etenim Luculli res gesta Pompeii imperium perornant: Idem in Pompeio, Tabellarios ut Mithridatis mortem, Pompeio gratiam visu nuntiasset, iaculo suum cuspidem Lauro adornasse, memoriam mandauit. Dion in Nerone: Nuntius ad Neronem veniens, Laurum ferebat, vtili significaret victoriam, quum Corbulus, de Vo logeso, Parthorum Rege, & Teridate, Armenia principem, habuisset. Mos etiam Prætorum fuit, ut vates Lauro coronatus, ac si de futura victoria speraret, & faciem gestans, atque præcederet. A quo verò omnes abstinerent, quod ferrum in lacrum virum stringere nefas esset. Vide proverbia: *Ne gnifer quidem super fuit*: Cui significare volumus, omnes ad vnum interille.

Sunt & alie Lauri celeberrime, quibus Antiquis decora atque honorabilis extitit. Nam quod dicebamus ex Plinio, Gratissima domibus ian-

*Laurus Gordiana nomen.*

*Nauis laureata. Literæ laureatæ.*

*Laureatis falces.*

*Laurentius currus.*

*Laureata iacula.*

*Vates laureatus.*

trix, Cæsarum, Pontificum, sola & domos exor-  
nat, ad limina excubat: Menſe quippe Martio in-  
grediente, vt ſcribit Macrobius, tum in regia cu-  
ritſque, atque Flaminum domibus laureæ veteres,  
nouis laureis mutabantur. Apollo enim apud O-  
uid. Laurum ſic alloquitur.

*Postibus anguſtis eadem ſidiſſima cuſtos,  
Ante fores ſtabis.*

*poſter lau-  
reæ.*

Festis poſtea diebus Lauro ornate poſtea cep-  
runt: vt his Tertullianus atteltatur: Cur die læto  
non laureis poſtes obumbrent: quod oſtendit lu-  
uenalis;

*Pono d' mi Lauros, duc in Capite lia magnum  
Cretarumque b. uem.*

Magiſtratibus etiam prima menſis Ianuarii, ſolia  
Lauro à populo porrigebantur. Laurum præterea  
omnibus luſitionibus adhiberi ſolent erat,  
quod omni tempore vireat, vt ſimiliter Reſpu-  
blica vireat. Poëtiſ enim ſunerum ſolemni-  
tatibus, vt aqua Lauri ramo aſpergerentur aſtan-  
tes, inos apud A. quos fuit. Quod Virgil. lib. 6.  
Aeneidan Oliuæ ramum commutauit, atque id  
in Auguſti gratiam. Ad rem enim lugubrem lau-  
rum ad aptare noluit:

*Idem ter ſocias paræ circumtulit unda,  
Spargens æte leui, & ramo ſiluiſ Oliuæ.*

*Non perſo-  
vum mer-  
catorum.*

Romæ autem extra Capenam portam ſons Mer-  
curio ſacer, à quo nomen accepit. A quem cum  
mercatores irent, ſub Mercurii enim tutela Mer-  
catores ſunt] vnuiſque alterius caput eius a-  
qua cum Lauri ramo, inuocato Mercurio, aſper-  
gebat, prolatus in futuri perituri exprobatorem,  
quibuldam verbis. Huius verò rei ampliſſimus  
teſtis Ouidius, cuius largum teſtimonium hic in-  
ſerere, quod rem maxime exprimat, non in tempe-  
ſtate ſua.

*Eſt aqua Mercurii porta vicina Capenæ:*

*Si iuſtat expertis credere, numen habet.*

*Huc venit monitus tunica mercator, & orna*

*Paruſ ſuſſiſſa, quam ſeret, haurit aquam.*

*Vbi ſit hinc Laurus: Lauro ſparguntur, ab vda*

*Omnia, quæ dominus ſani habitura nouos:*

*Spargit & ipſe ſuſſa Lauro rorante capillis,*

*Et peragitur ſiſſa fallere voce preces.*

*Ablue præteriti perituri temporis, inquit:*

*Ablue præteriti perſida verba fide.*

*Sine ego te ſeci teſtem, falſoſue citauis,*

*Non audiri numina vana louis:*

*Sine Deum prudens alium, Diuæue ſeſelli,*

*Abſtulerint celeres improba verba Noti.*

*Et pereant, veniente die, periuria nobis:*

*Nec curent Superi ſi qua locutus ero.*

*Da modò lucra mihi, da ſacta gaudia lucro,*

*Et ſac, vt emptori verba dediſſe iuauer.*

*poſta lau-  
reæ.*

Porro triumphantibus acouantibus in ſuo gene-  
re non inferiores Poëtz, parem quoque ſibi co-  
ronam ingenii & ſacundæ [nam vtræque in vera  
Poëſi excellit] compararunt. In quem ſinem ludi  
literarii pluribus in locis inſtituti, vt idem honos  
vincentibus, atque in ludis Olympiſis, Iſthmiis,  
& cæteris concederetur. Fuitque duplex, ex Lau-  
ro videlicet atque Hedera. Sed ea lege ac diſcri-  
mine, vt maiores lauro, minores Hedera corona-  
rentur. Lauro itaque coronatos vel iam olim  
ſuiſſe Poëtas, quamuis per ſe ſatis apud literatos  
conſtet, vno tamen alteròve teſtimonio claritùs  
euadet. Horatius:

*Coronandus conſuetæ Poëtiſ*

*Lauræ.*

*Idem in Odis.*

*—Et mihi Delphica*

*Lauro cinge volens Melpomene comam.*

Et alibi in Pindaro:

*—Immenſus ruit profundo*

*Pindarus ore,*

*Laurea d' nandus Apollinari.*

Statius:

*—Sed nec ſolita mihi vertice Lauro,*

*Nec fronti vultus bonos.*

Hac enim ratione coronandos Lauro Poëtas an-  
tiquitas cenſuit, quod hæc Apollini, qui Muſis  
præſectus, ſacta ſit. Scribit enim Heſiodus ſta-  
tim in limine ſuæ Theogoniæ, ad illum iuxta He-  
liconem montem, mulieres nouem veniſſe [ hæ  
Muſæ erant] & ramum heliconicæ laurus illi man-  
ducandum potrexiffe. Qui cum deguſtaſſet, re-  
pentè vniverſa doctrinæ & poëtiæ repletus. Cu-  
ius rei meminit Ouidiuſ

*Non mihi ſiſſa viſæ Clitæ, Clitæſque ſorores*

*Aſtræ rui.*

Forſè & Iuuenalis:


*Laurumque m' mordit.*

Et in hanc vſque diem, Poëtz celebres, vel qui  
hunc titulum, aliorum ceu edicto, quibus tales  
create poteſtas ab Imperatoribus data, Poëtz  
Laureati [ quorum tamen non minima pars ve-  
nidis laurati] quaſi Laureæ redimitti appellari con-  
ſueverunt.

A Poëtuſ non in lubidè nec certè minori meri-  
to [ ſi verè tales ſint] Lauream quoque ſibi vſur-  
parunt. Medici: nimirum cum & hi, pari cum iis  
iure, Apollineæ proles ſint atque dicantur, præ-  
mium atque coronam ſuorum quoque laborum  
ac vigiliarum, in Doctura [quam vocant] ſolemne  
ſymbolum aſciuerunt, vt quos Doctoreſ titulo  
inſignent, Laureæ Phæbeæ ſeu Apollinari redi-  
mitos pronuntiant. Qui ſanè mos hodie in Ita-  
liæ & Galliæ locis non paucis, adeoque per vni-  
uerſum Rom. Imperium in Academicis ad inſti-  
tutus in primis verò in alma illa Baſilienſium A-  
cademia [ ab Aeneæ Sylui in Conſilio Baſil. ad  
imitationem Bononiienſis, matris ſtudioſiorum nun-  
cupatæ, inſtituta,] tam receptus atque ſolemnis,  
vt ex hac, tanquam ex equo Troiano, Apollinari  
Laureæ redemita turba prodians, in varia Regna  
& Prouincias diſfundatur.

LAVRVS TINVS, SEV SYLVESTRIS.  
TRIUM GENERVM.

CAP. II.



DE Lauro ſil-  
ueſtri Cluſ.  
hæc ſcribit. Inter  
Lauri genera Plin-  
ius Tini memi-  
nit, nulli fortè  
Veterum Lati-  
norum præterea  
cognita, niſi M.  
Cato lib. de re  
ruſtica eam no-  
mine Lauri ſilua-  
reæ intell. gat.  
Eius tria genera  
nonnihil inter ſe  
differentia. Prior  
Tinus frutex eſt,  
Cornus ſæminæ  
magitudine,  
virgis oblongis  
& quadrangulis  
ramo-



famosis foliis ordine distinctis, & perpetuò geminis simul inter se aduersis, magnis & latis, Cornus foemine ferè similibus, sed ad Laurina accedens nigricantibus & splendentibus, perpetuis, nullo odore, sapore amaro, cum nonnulla adstrictione. Summis ramis umbellas florum quinis foliis cohærentium profert candidorum & odoratorum. Deinde fructus succedit, Myrti bacis paulò longior, planior, angulosus, cœrulei coloris elegantissimi. Nascitur præruptis & lapidosis inter alios frutices, & in sepibus circa oppida Lusitanie Montemotho & Tomar, ubi cū suo flore & fructu collegit mense Nouembri, tamen aliis Iulio & Augusto floreat, ac fructus maturetur Octobri.

## TINUS ALTERA



Altera, eadem, quâ superior altitudine assurgit, ramis frequentioribus & firmioribus, & cortice ex rubro virescente tectis: circa quos folia superioris, angustiora & oblongiora aliquantulum, & venulis plurius distincta, sibi invicem opposita, ut in priore. Flores extremis ramis umbellatim etiam nascuntur, colore nonnihil pur-

purascens, neque ad odgrati, ut superioris: fructus etiam minor, plenior, nigrior. Hæc vno duntaxat loco in Lusitania, quodam monasterio *Pera longa* dicto, locis incultis supra Vlyssipponem extructo observavit secundum piscinas, & in Beticæ maritimis.

Tertia ei primùm in Belgicis hortis conspecta, semine ex Italia delato, nata apud Clariss. virum D. Ioh. Boissot, arbusculæ magnitudine, quæ singulis annis & florem & fructum profert. Alunt nunc plerique alii rei Herbaria studiosi, tum nobiles matronæ, tum viri, ramis ex ea arbusculæ desumptis, & terræ commissis enatis frutices. Minor verò est quàm superiores, folio Laurino tamen latiore, lævi, & nigricante, perpetuo, ramos ordine quodam per intervalla ambiente, ut in prioribus generibus: umbellæ florum alborum foris nonnihil pupurascens summos ramos coronant, deinde fructus ex cæruleo nigricans, levis, minor quàm in alis. Bis plerumque floret, vere & sub hyemem.

Theophrast. lib. 1. cap. 4. inter perpetuò virentes & sylvestribus dicitur *ἀγρία δάφνη*: à Plin. *Tinum* & *Laurus sylvestris*: Lusitani priorem *Tinum*, *Vna de Perro*: [est tamen & alia planta dissimilis hoc nomine donata.] Alteram *Follado*, à foliorum, ut arbitror, frequentia vocant: Beticæ *Durillo*. Italica

[sive tertia] *Anguillara Lauro saluatico* vulgari nomine dici scribit, & à Brucijs *Moleffo*: Bellon. *Lentagine* nominat. Hæc Clusius.

Ceterum iconem nostram primo loco positam ponit Clusius pro *Tino* 2. Pro tertia aliam iconem habet, in qua nulla folia hirsuta: quam *Folia pilosa* Lobel. pilos in margine foliorum pingat, nec tamen eorum meminerit. Eidem cum *Pena* in aduersis. *Laurus* *Tinus* cærulea bacca valde quàm elegans & noua assurgit in arboris æmulationem. Fert corymbaceam umbellam multis conflatam *Terebinthi* seminibus, aut *Gigartis* vuarum similibus, sed ex argenteo in cæruleum luridis: flore ex albo purpurascens.

Ad iconem Lobelii in margine additur *Laurus regia* Italorum. In ea iconem nobis videntur flores & bacca minis feliciter expressæ. Folia, ut dictum, appingunt hirsuta in marginibus. Existimamus eandem esse cum Clus. tertia, quamuis pilorum nullam faciant mentionem.

Lob. in Obs. Clusii secundum vocat *Tinum Lusitanicam* Clusii.

Dod. in hist. Lat. vnicam exhibet iconem, nempe eâ quàm primo loco posuimus, titulo *Tini* sive *Lauri sylvestris*. Taber. tres icones habet: prima, quæ falsa, iuxta non bonam iconem Lob. & *Penæ* in adu. omisit tamen pilos: non erat etiam nostro iudicio separanda à *Tino* quàm ponit pro secunda, licet Clusio sit tertia. Lusitanica autem Tabern. est Clusii secunda, quàm Germ. *Portugalesischer witten Lorberbaum* vocat idem Tab.

Camer. in epit. Matthioli. *Laurum sylvestrem* seu *Tinum*, intrepidè Catonis *lyluaticam* dicit, *Laurus* *glauca* addens, Italici *Lauro saluatico*, *Lauro regia* & *Lentagine* dici: folia, inquit, esse nitentia, inodora, lanugine tenuissima pubescentia: flores ex albo purpurascens: baccas sapore acerbo.

Mirum verò *Gazam* apud Theophrast. loco citato *Laurum* simpliciter conuerrere, cū tamen in omnibus exemplaribus, quæ hæcenus quidem videre licuit, manifestè legatur *ἀγρία δάφνη*. Alii tamen *ἀγρία δάφνη*, sive *Laurum syl.* [si ita interpretandus Theophr. locus] esse malunt veram *Laurum*, sine hominum cultu prouenientem, quales multæ circa *Montepelium* in sepibus visuntur.

Dalechamp. interperitos Herbarios constare ait, depictam à se arborem in historia Lugdunensi esse *Laurum Tinum* Plinii, quàm *Laurum* nonnulli sui generis arborem intelligant, alii *sylvestrem Laurum* etiam Theophrasti. Arbor hæc eodem Dalechamp. autore, cortice vestitur subrubro: ramis abudat, ex quorum nodosis articulis folia enascuntur, bina semper aduersis pediculis sita, venosa, carnosa, minimè dissecta, in acutum desinentia. Flos ex albo purpurascens est in umbellis, copiosissimus: Cærulea bacca plurima, oblonga, angulosa, gustu astringens. Arbor ista nunquam exurit. Quare mirificè intuentium oculos delectat, & allicie frondis honore sempiterno, umbellarum aureo fulgore, & baccarum cæruleis aceruis. Nascitur in asperis, saxosis & maritimis Gallicæ provincie, Hetruriae, agrisque Latini colibus. Itali vocant *Lentagine* & *Lauro saluatico*, diuersam à *Lantana* sua, quàm Matthioli. *Viburnum* esse arbitrat. Nascitur & in plerisque locis montis Cestii inter *Cocciferas* *Ilices*. Placuit totam *Lauri Tini* Dalechamp. descriptionem proponere, cuius icon meritò in quibuldam displicet, vix descriptioni in omnibus respondens. Quicquid sit, *Laurum Tinum* eandem putamus cum *Tino* 3, Clus. donec meliora doceamur, quàm

*Tinus* *Lusitanica* Clusii.

*Tin.* *Taber. m.*

*Laurus* *glauca*.

*Gaza* m.

*Laurus* *Tinum* Plinio. Descriptio

*Semen*

*Locus*

quam aliter fensisse videatur compiler Hist. Lugd. Facit enim primam, nec tamen eandem dicit cum Clusii primâ, cuiusque descriptionem omittit.

C. Bauh.

Liberius quoque nobis videtur C. Bauh. in suis Aduers. scripsisse hæc verba: Sic dicendum erat, summis ramis umbellis profert candidas & odoratas: & hoc vel ex viva planta, vel ex lectione diligenti Clusii habuisset: Hæc sanè verba apparet desumpta esse ex descriptione Clusii. Sed oportebat prius pro certo statuere Dalech. Laurum Tinum eandem esse, antequam docti viri descriptionem carperet. Nos potius coniectamur, quàm pro certo adstruamus, magis conuenire cum tertia Clusii. Ipse verò C. Bauh. in sua descriptione, quàm apud Matth. dat & odorem florum & saporem totius plantæ omisit. In floris descriptione ait esse quinque folium, & icon, quam is eandem cum nostra ex Camer. apponit, quadrifolium tantum ostendit. Quanquam, ut verum fateamur facillè existimamus quinque folioli prægendas foli.

Locus.

De loco & tempore satis sparsim dixisse nos videri posset, nisi & à Lob. & ab aliis alibi quoque nasci observatum fuisset. Etenim in Valenæ nemore Narbonæ plurima, & plerisque Ceti montis, inter cociferas ilices frequens, ubi & legimus. Italiæ ac Hispaniæ agri, & aliæ fortè regiones huius feraces sunt, in primis verò eâ sylva Hæturæ abundat. In Samnitibus circa Lintianam & alibi reperitur eius magna copia: abundat circa Anconam & Spoletum, sed copiosius in Narbona.

Cultus.

In Germaniæ hortis facillè fert hyemem, parum tecta, & ex ea fit pulchrum opus topiarium: nimis tamen frigoris succumbit, ut annotat Camer. Cæsalp. si sit in Hæturæ sylva hyeme florere, fructumque annotinum nouellum expectare. Semen nobis ex Italia missum aliquoties fecimus Montbelgardi: sed irrita spe. In hac planta folia variare deprehendimus: superiora enim inferioribus sunt magis glabra. Bononiæ vidimus in horto Saluatoris, ubi perperam Laurocerasum vocitabant. Patavii in horto publico, & alio Pharmacopœi Germani elegantes arbutusculas vidimus. Item Heidelbergæ in horto Electoris, Anno 1595.

Foliorum  
Varietas.

Laurocerasum.

Vire: & v.  
sus.

Ex baccarum acerbitate facillè industrius quis ad præscriptum Galeni de earum vsum medico statuat. Premitur ex iis oleum auctore Lobelio, quamvis eius nullum vsum declaret: nisdem valde quàm lubenter vescuntur sturni, turmatimque ad illas conuolant.

## LAURO CERASVS.

## CAP. III.

Descriptio  
Folia.

PERAMENNA est arbor Laurocerasus, frondis æternæ, Citriorum folia æquantis, palmatis, sesquipalmatis, duorum triumve digitorum latitudine, obiter per margines crenatæ, hilarit virore micantibus, lævis, pinguiusculæ, cuius medium percurrit nervus crassiusculus, auersa parte elatior, unde sine ordine in oras excurrunt venæ: haud ita multæ: sapor subamarus, adstringens. Ramulorum cortex viridis est, lignum interius album. Fructus racematim serie longa disponitur, brevibus hærentibus pediculis gratus, dulcis, Ceraso paulò maior, sublongus, ex cæruleo rubescens: sub pulpa non semina bina aut terna plana, plu-

Fructus.

rimam accedentia ad Loti Africanæ semina; hæbet, ut vult Clusius: sed officulum vnicum Cerasi officulo simile, longius tamen, sapore amaro ad Cerasi nucleos accedente, neque simile quicquam habet cum Guaiacana vulgò dicta.

At ne quis interim Clusio diuersam à nostra traditam putet, eius descriptionem subicimus integram. Laurocerasus iustæ magnitudinis est arbor, caudice recto, multis ramis donato, qui cortice atrovirente obducti sunt, nouellis tamen omnino virentibus. Folia alternatim ramos ambiunt, non decidua, Laurilatifolia, siue potius Cætriæ mali foliorum æmula, per ambitum nonnihil dentata, nervis aliquot ex mediâ costa in latera excurrentibus, superne splendens, inferne nequaquam: Color in vetustis ex atro virens, in nouellis ex viridi pallescens: sapor amarus, nucleorum mali Persicæ aut Amygdalarum amararum æmulus. Oblongas in summis vetustis ramis inter



superioris anni folia fert hastulas, digitalis longitudinis, crassiusculas, in quibus breui pediculo numerosi, & racemi in modum conferti nascuntur flores, candidi, quinque foliolis constantes, multis in umbilici ambitu staminibus prædit, Cerasi autem vulgò nuncupati floribus non admodum dissimiles, odoris tamen expertes, qui nullum fructus

rudimentum præbuerunt, sed caduci admodum fuerunt, quales in Germania creuerunt. Supra hos deinde rami germinant & nouella folia protrudunt. Fructus Constantinopoli missus, forma fuit ovali, exigui pruni magnitudine. Sebesten-fructui proximus, foris niger, rugosus, pulpam continens dulcem & edulem, Cæriorum vel Brunensium in Moravia Prunorum pulpæ modo, in qualatent bina aut terna semina plana, spadicei coloris, plurimum accedentia ad Loti Africanæ vulgò Guaiacanæ nuncupatæ semina. Quam seminis descriptionem tamen Clus. in posteriori suæ hist. editione deinde inculcat, atque ita sibi missum testatur hunc fructum anno 1581. præmissa tamen vera & genuina officuli descriptione ex alia sibi visa, officulum (inquiens) continens sessili parte orbiculare, deinde sensim in oblongam tenuemque cuspidem desinens. Sed quicquid sit, valde suspicamur diuersa hoc loco semina à Clus. descripta, priusque non fuisse Laurocerasi.

Non displicent quæ Cæsalp. de hac arbore his verbis scripsit: Plinius affert Laurum regiam amplissimam & arbore & folio, baccis gustatu quoque non aspero. Hanc Pisif habemus peregrinam foliis longioribus, pulposisque, ad Malum Medicam accedentibus, perpetuò virentibus, sed odore graui: flores in racemis erectis fert, candidos, suaueolentes: baccas Lauro similes, paulò maiores, oblongiores, in maturitate nigras, pericar-



plo pulposo; suavi, quod quò magis siccatur in arbore, dulcius redditur: intus nucleus est oliuarius, fragilior, perficitur Autumno incipiente: medulla interna amara. Seritur optimè ramo. Fructum terræ diligenter commissum, etiam in scilicibus, minimè tamen germinasse sibi Clus. affirmat. Arbusculæ autem Constantinopoli missæ germina, vbi paulò altius excreuissent, in terram inflexa radices egerunt, aliàsque arbusculas dederunt.

Carmer. ait furculis propagari, verùm non sine labore.

Missæ porro fuit hac arbuscula Clusio Trabiolum Curmali nomine, quod Trapezuntinam Dactylum interpretati sunt. Sed cum nihil cum Palma commune habeat, satis improprie hoc nomen illi inditum censet.

Bellon. lib. 1. Obsister arbores perpetuò virētes recenset Trapezuntinam quādam ferentem cerasa. Meminit & eo libello, cui de ratione cicurandi syluestres arbores titulum fecit cap. xx. & Laurocerasum appellat: eius tamen historiam non describit nisi quod eodem capite illius rāmum mali Citrix ramo æqualem facit, & eius prægrandem arborem Genuæ in horto Principis d'Oria postea vidisse asserit. Cum verò huius nostræ folia maximam similitudinem cum Citrix foliis habeant nec desint, & Trapezunte Constantinopoli, vt nomen indicat, primum allatum fuisse verisimile sit, eam esse omnino censet Clusius, quam Bellon. obseruauit.

Laurocerasi autem nomen conicit ei impositum à foliorum Laurinis similitudine, & fructu cerasis æquali: tamen si postremo loco ex Pliniana historia id euentisse assermet. Verùm [inquit] nusquam apud Plin. Laurocerasi vocem legere memini. Is quidem lib. xv. cap. xxv. vbi Cerasi genera enumerat, de Cerasis Lauro insitis agit. Minus quinquenarium est ait, quod prodire quæ vocant Laureæ, non ingrati amaritudinis, insitæ in Lauro. Hanc autem quam proponimus arborem, ipse nō intelligere, vix se sibi persuadere posse Clus. scribit: Sed [addit] cum aptiore appellatione careamus, neque sine iudicio Bellonius eā vsus esse videatur, Laurocerasum cum ipso nuncupabimus donec ex Veterum monumētis commodior aliqua sese offerat. Si cui tamen Palmæ Trapezuntinæ vocabulum, quod Constantinopoli adepta est, aut Cerasi Trapezuntinæ vocabulum, vt Bellon. etiam Gallico sermone vsurpat, magis aridet, vt eo possit Itali *Laurum regiam* vocant: alii *Laurum Trapezuntinam*. Hortus Patau. *Lauro regi d' Dattilo di Tribisfonda*.

Dalechamp. eam secundam Loton Theophr. esse iudicauit, quam nonnulli docti Herbarii Laurocerasum nominant, ex Africa aduectam, Plinio & Matthioli. incognitam [si Hist. Lugd. credimus], & in hortis principis Dotæ Genuæ luxuriantem. Sed hæc Dalechamp. opinio de Clusii sententia minimè probanda: nam huius fructus non nascitur Myrti modo alternis, siue vt Græcus codex habet, *καὶ δ' αὖτε τὴν μύρτον παρὰ δ' ἄλλους*, sed faciem, vt modo, quæ admodum & flores in bustula coarctati plurimi nascuntur, vt dictum. Neque quod Dactylum Trapezuntinam esse statuit Lotum Africanam Matthioli, cui durum nucleum tribuit: quæ de causa *διότι οὐκ ἔστιν* Theophrasti. esse vult, cuius, nucleus durus est, in qua opinione etiam est, marginalibus in Athen. ab ipso Latino donatum scholiis. At, insit, Clus. Lotus Africana non nucleum sed semina duntaxat habet. De qua re vide plura capite de Guaiacana.

Tom. I.

Ceterum iam prius dictum, videri Clusium duos fructus confudisse, nempe Laurocerasi cum Guaiacana, ex eo errore hic quoque denuò impigisse videtur, nec minùs censura dignus quàm Dalech.

Porro Laurocerasum primus nobis idem celeberrimus medicus Dalech. Lugdunus ostendit nomine Lauri regis Pisis missam, quam postea agnouimus in horto Cl. D. Fel. Plateri: ei pro ignota & innominata putata: & ut perhibebat, Lucernæ Helueticorum missa. Eadem hybernum frigus aliquot annis non testis pertulit, fructusque Lucernæ protulit dulces, gratos, quorum partem in horto Montb. seuius, sed vana spe, partem inter naturalia nostra sicca etiamnum adferuamus.

## LAVROCERASI FOLIO ARBOR.

### CAP. IV.


**A** Pud CL. Paludanum [inquit Clus.] conspiciēbam anno 1595. ramulum peregrinæ arboris, qui erat circiter pedem longus, satis gracilis, foris læuis, nigro colore præditus: intus cauius, summa parte nodosus: cui nimirum folia alternis inhærebant, ex aduerso semper sita, senu, aut octona, mali foliis maiora, magnitudine & formā proximè ad Lauri Cerasi folia accedentia, superne læuia & splendentia, inferne minimè, sed venis à medio nervo in latera excurrentibus insignita, in ambitu non serrata. An perpetuò virescant, nec ne, mihi incompertum: sed fusca erant quæ videbam, utpote resiccata: sub singulorum autem foliorum exortu ad latera singulares nascebantur appendices, summa parte orbiculatæ, & deorsum inflexæ, siue quodammodo fornicatæ: summo rami fastigio senu, aut plura inhærebant vascula breui petiolo innixa, nuce ponticâ minorâ, membranacea, & denis nervis distincta, summæque parte in quinque lacinas siue foliola diuisa, exili nigro semine plena; satis feruidi saporis. Quo nomine apud incolas appelleretur, aut quis illius apud eos vsus, indicare non poterant, qui præcedenti anno ex Guinea attulerant nauæ. An verò huic simile folium illud, quod à Batauis naucleris anno 1597. ex Iava, vel Madagascar relatum, *BRANAS* vocati Abdala Guzaratensis mihi dicebat?

Descriptio

Folia

Vascula

BRANAS



BVNA, BVNNV, ET BVNCHOS

ARABVM.

### CAP. V.

**B**VNæ nomine, quem habemus fructum, magnitudine æquat, aut certè parum superat Ricini nostratis semen, oliuari figura, vna parte sulcatus, vel vtraque, cortice exteriori crassiore nigricante, interiore tenuiore, & quâ nucleum spectat rutilo, altera facie cinericea. Vtroque cortice detracto nucleum comperimus durum, Dactyli officuli effigie, lacunâ secundum longitudinem sulcatum, pallentis cinerei coloris, saporis amaricantis & ingrati. Ab umbilico ad oppositum mucronem ostentat gemina grana. Hunc fructum Bunæ nomine à quamplurimis amicis acce-

Descript.

Sapor amari.

N n

*Bon Ban.* cepimus: sed à Cl. D. Paludano nomine non vel  
bam, eumque etiam vel vnicò sulco donatum vel  
duobus.

A Cl. D. D. Fel. Platero datus sub nomine Buna  
Clusii. Et apud eundem in scatula quadam habe-  
tur nomine granorum quibus Turcæ somnum  
fugant.

*Grana cen-  
tra Janu.* Rauvvolff. in Itinerario suo de simili fructu  
scribit: Malepi Turcæ parant potionem ex fructu  
dicto incolis *Bunnu*, qui extinscus & colore &  
magnitudine ferè refert baccas Lauri, gemino ve-  
stis cortice: adfertur ex India, vt aiant, duo-  
bùsque locellis totidem seorsim grana flauescen-  
tia continet. Consideratis viribus & nomine om-  
nino respondere videtur Bunchum Auicennæ, &  
Buncæ Rhafis ad Almanforem.

*Bunnu  
Rauvvolff.  
Locus.* Clusius quoque de eo scribit in hunc modum.  
Pusillus fructus, quem misit D. Alphonfus Pan-  
cius, quemque Buna nonnullis, aliis verò Elzane  
nuncupari tradit, Fagare est magnitudine, aut  
paullò amplior, oblongior, plerumque colore ex  
cinereo nigricante, cortice tenui, & veluti sulcum  
quendam per longitudinem vtrinque habente,  
per quem facillè in duas æquales partes diuidi-  
tur, quæ singula grana continent oblonga, altera  
parte plana, fuluescentia, gustu acido.

*Sapor aci-  
dus.* Taber. & Hist. Lugd. Buncæ nomine habent.

Cæterùm Buna quam descripsimus, quamuis  
exuma facie apprime respondeat iconi à Clusio  
propositæ, eandem tamen dicere non audent  
(propter quasdam notas non respondentes)  
Bunnum Rauvvolff. & Bunam Clus. multò minùs  
pro certo asserere ausimus esse Bunchum Auic.  
de quo l. 2. Traç. 2. c. 91. & Rhazæ ad Almanf. l. 3. c.  
22. (quorum verba paulò pòst adscribemus) ne-  
que enim describunt.

*Such. Se-  
rap.  
Galboa.* Serapio c. 53. sub nomine *Such*, id est, (vt vertit  
Interpex) Gallia, ea ipsa verba recenset, quæ  
Rhafis de Bunca scribit. *Such* verò, vel Gallia, res  
factitia est, vt ex ipso Serap. patet, qui ex authori-  
tate Isaac scribit *Such* parari ex Ramich, Moscho  
&c. Nobis sit verisimile Bunam Clus. & Bun-  
num Rauvvolff. idem esse cum Bon vel Ban Al-  
pini, idèd hoc eodem cap. subiiciemus eius histo-  
riam, vbi priùs vires Bunchi & Buncæ recitaueri-  
mus.

*Ban Alpini* Bunchus, inquit Auic. defertur de Iamen. Qui-  
dam dixerunt decidere ex Anigalen. Eligitur ci-  
trinum, leue, odoratum. Reprobum, album & le-  
ue. Calidum est & siccum in primo: aliis in primo  
frigidum. Membra corroborat, cutem emaculat,  
& sub ea conclusas humiditates absorbet: corpus  
odore grato commendat, ventriculo prodest.  
Bunchum, auctore Rhazæ, calidum est & siccum,  
quod stomacho congruum existens, mali sudoris  
odorem aufert.

*Vires &  
vius.  
Auicenna  
delellus.  
Tempera.* Rauvvolff. scribit, familiarè esse Turcis potù, què  
magni faciunt, *Chaube* nomine, huic colorem a-  
tramenti nigerrimum, cuius in multis morbis, po-  
tissimum ventriculi, multus est & efficax vñs:  
hunc matutinis horis, etiam publicè in comitis,  
passim pituitando bibunt ex testis & procellanis,  
quàm possunt calidissimum. Fit autem ex fructu  
*Bunnu* incolis dicto cum aqua. Nihil hoc potu fre-  
quentius apud illos, quem eodem loco habent,  
quo nos vinum absinthites aut aromatites.

*Chanbe po-  
ens.* Clus. quoque testatur traditum à nonnullis in  
Alexandria potionem quandam fieri ex *Buna*,  
vim refrigerandi non mediocrem obtinentem.

## BON VEL BAN ARBOR.

**A**Rbor cuius semina ex felici Arabia aspor-  
tantur Eonymo similis, foliis crassioribus,  
viridioribus, perpetuòque virentibus, quam, in-  
quit Alpinus, vidi in vindario Halybei Turcæ, ex  
qua semina illa ibi vulgatissima *Bon* vel *Ban* ap-  
pellata, producantur: ex his omnes tum Aegy-  
ptii, tum Arabes



parant decoctum  
vulgatissimum,  
Coaua vocant,  
quod vini loco i-  
psi potant, ven-  
diturque in pu-  
blicis ænopoliis,  
non secus ac vi-  
num apud nos.  
Præterea vtuntur  
eius decocto ad  
roborandū ven-  
triculum frigi-  
diorem, adiuuan-  
damque conco-  
ctionem, & non  
minùs ad ause-  
rendas à visceri-  
bus obstructio-  
nes: in tumori-  
busque hepatis  
ac lienis frigidis,  
& antiquis obstructionibus, feliciori cum succe-  
ssu decoctum multos dies experiuntur. Quod et-  
iam vterum maximè respicere videtur: ipsum e-  
nim excalfacit, obstructionesque ab eo aufert: sic  
enim in familiari vñs est apud omnes Aegyptias,  
Arabasque mulieres, vt semper, dum fluunt men-  
ses, huius decocti copiosis sorbitione hanc  
ipsam vacationem adiuent, aut in quibus sup-  
pressi sunt, prouocent, nec absque magna qui-  
dem vtilitate, sic in plures dies purgato corpore.  
Neque verum videtur, quod Auic. hoc semen ca-  
lidum in tertio, & siccum in secundo gradu con-  
stituit, quando semen sapore dulcescat cum pau-  
co amarore, nullamque acrimoniam præ se ferat.  
Nihilominus ipsum obstructionibus viscerum,  
frigidisque tumoribus hepatis vel lienis multum  
conferre docuit. Sed ait stomacho nauseam concita-  
re, pituitamque purgare atque multa alia hæc semi-  
na præstare, ac se experientià penes Aegyptios  
didicisse Alpinus ait, atque hanc arborem Cayri  
vidisse. Hæc Alpinus ex Auic. citat, non addito ta-  
men nomine, quo Auic. vocat: neque hæcenus  
apud Auic. reperire potuimus nomen *Bon* vel *Ban*,  
nec scimus quo nomine eius meminerit. Viden-  
tur tamen nobis, ritè omnibus consideratis,  
semina *Bon* vel *Ban* conuenire cum  
*Buna*. Consideretur potio quæ  
ex non fit, & ea quæ  
ex *Buna*.



## CARYOPHYLLI INDICI.

## CAP. VI.



**N**Otiores nobis ipsa arbore Caryophylli: eius autem ramuli aut surculi siue pediculi, quos obseruauimus, coloris sunt fuliginosi, longitudinis duarum circiter uncias, cortice factus crasso, gustuque nonnihil aromatico. His adherent sapè caryophylli aliquot: partes inferiores, quæ crassiores, quadrangulæ apparent. Ex prædictis ramulis,

quorum aduersus situs, seu præpilati clauis rugosi affiguntur singulares, semina longiores, externe fuliginosi coloris, interne dilutiores paulò, qui quatuor denticulis decussatis radiatim coronantur, quorum medio capitulum Pisi parui magnitudine insidet, è foliis squammatum implicatis contextum, quibus patentibus fibræ quamplurimæ apparent, rufescentes, & inter has ex cavitare quadrangula stylus: color eiusdem coloris: atque hunc quidem florem esse non absurdè quidam scripserunt, cuius odor fragrantissimus: quòd tamen non in omnibus conspicitur, quippe quod facillè in tanto itinere atteratur: sapor recentium feruidus non sine amaro, valde tamen gratus & aromaticus (Cordo adstringens quoque) & nescio quid stuporis linguæ imprimens. Succo oleaginoso & rubente. Flore autem excusso, cauda clauis in ventrem turgescit, longa tamen semper remanens, inque corticem degenerans: nucleum ventre concipit, aliàs simplicem, aliàs geminum, vt durioribus denticulis; difficultè fragilem, ita parum illius gratiæ aromaticæ feruidæ retinentem, nigram in duas partes ès *duæ* committas fissilem.

Porro arbori formam Lauri attribuit Garcias, nec non magnitudinem: folia etiam Laurina, sed angustiora: ramos multos, flores copiosos, primum candidos deinde virescentes, postremum rufescentes, dum vitides sunt ad odorem (vt à fide dignis viris accepit) vt reliquos flores odoris suauitate superent. Interdum cum Caryophyllis reperitur guimmi nigrum, vel potius resina, de qua paulò post.

Caryophylli folia, si Cordo credimus densa sunt crebrisque & tortuosis venulis exarata: figura autem & magnitudine tenuifolia Lauri folia imitantur: colorem habent in idem paulò fuscior: odorem ac saporem Caryophyllorum, sed remissiore.

Idem minores seu graciles Caryophyllos immaturos: maiores ac ventriosiores, maturos dicit. Surculos verò, festucas Caryophyllorum, aliqui-

Tom. I.

bus *fusti* aut *fustichi* nominati.) Arborem paruum, materie solida, duræque, & Lauri folia habentem: Immatuum decerpi, cum floret, cum adhuc est secuturi fructus rudimentum. Materiam cartilaginosa, modicè lignosa, lentam, infragilem, tutu difficilem, tam foris, quam intus. Cur veid paulò post hunc eundem Caryophyllum immaturum seu minorem acerbum vocitet, fatemur nos nec gustu nec vlla ratione posse assequi. Maturus ille seu tumidus ac omnibus tam Medicis quam Pharmacopolis Anthophyllus appellatur, quem non infubidè idem oliuæ seu Corni nucleo æqualem dixit, si quadrangularem pythmenæ, quod superius habet eximas. Cortice detracto duplicem quoque obseruauit nucleum, ligni aut Cornu instar solidum, tritumque difficilem.

Chariss. frater Casparus Bauhinus anno 1604. ostendit nobis folium quoddam, eimsum pro Caryophylli folio, eiusdem longitudinis, quæ icò est Clusii in nostra tabella expressa, verum latius, & ad Lauri folium accedens, Malabathri modo splendens parte superna, inferna non item, in qua vnica costa, vel rachis, à qua per latera nervuli disperguntur: degustatus pediculus optimè Caryophylli saporem exprimit.

Tradit porro Clusii Exot. apud Garciam lib. 1. cap. 21. Caryophylli folia nec esse rotunda, neque Pyri foliis similia, sed Lauri foliis potius, tam eius, quæ latiore est folio interdum, quam eius, quæ est paulò angustiore: quapropter ipsi fuit impositum, quando folium illud Laurino multò angustius, & Salicis, Persicæ uel mali folio simillimum, oblongiore tamen pediculo præditum, cum Caryophyllorum ramulo muria condito, pro legitimo eius folio obtudebatur: qualem cum eodem ramulo exprimi curabat in prima Hist. Aromaticum editione. Eam ob causam nunc illud ademptum. Legitimam porro exactamque Caryophyllorum historiam, cui adiunctus est ramulus, suis foliis & fructu onustus ad viuum expressus, in primo Exot. suorum dat, eamque denuò cum ea, quæ foliorum experts, hic subiicit. Eam (historiam exactam) autem sequentibus verbis proponit.

Nova icon Clusii.



**Q**UUM O. Robri mense, anno 1600. Amstelredami essem, binos arboris Caryophyllos ferentis ramos, suo fructu onustos, valde recentes adquirebâ, vt qui præcedente Aestate nauibus, quæ ex Ternate insulari die Augusti, anni 1599. discesserant, aduecti essent. Vnum quidem singularem, pedalis ferè longitudinis, cuius formam in præfenti tabella expressi curabam: alterum longè maiorem, selqui-

Na 2

pedalem, aut cubitalem, summâ quidem parte in quinque, aut plures, graciles ramulos, suo fructu onustos, atque alternit in ex aduerso nascentes, diuisum, infimâ. [à qua tres, aut quatuor minores iam relecti erant] sic iporum calami crassitudine non superante, cineraceique coloris cortice tectum, graciliores, tenellique ramuli eum candicantem habebant, præter extremas fascias ipsum fructum sustinentes, quæ fusci coloris erant: folia angustifolia Lauri foliis valdè similia habebat, minùsque lata, quæ in ramo in hac tabella expresso, oblongiusculo pediculo prædita, alternis, sub singulorum ramulorum alis ex aduerso nascentia, medio nervo singula folia per longitudinem secante, & multis venis utrinque in latera excurrentibus: extremi ramuli in eas, quas modò dixi, festucas desinebant, alternis etiam & contrario inter se situ plures pediculos ferentes, eoque ternos vix plurimum, suis petiolis sustinentes Alabastrum (qui sunt ipsi Caryophylli) summi parte in quatuor denticulos decussatim diuisos, medio florem nondum apertum continentes, sed in quorum nonnullis (qui aperti quatuor constituisse videbantur) multa exilia staminula congesta apparent: tamen si verò folia & cortex non tantâ odoris gratiâ fragrant, ut ipsi Caryophylli, non tamen prorsus odore destituebantur, sed Caryophyllos nonnihil redolebant, atque etiam eorum saporem referebant, quemadmodum & iporum ramorum lignum.

Folia Lauri

Alabastrum sunt ipsi Caryophylli

Sapor foliorum et ligni.

Florum.


Florum Caryophyllorum cærulei.

Locus. Arbores celsa.

Caryophyllorum delictus.


Minorem ramum, qui hac tabella expressus, donabat Io. Langhe Chirurgus Amstelredamensis: maiorem verò nanciscebar curâ Petri Gareti, qui alium æquè magnum mihi procurabat, sed foliis orbium, cuius tamen fructus longè acerrimus. Caryophyllorum porro flores intelligebam post diligentem inquisitionem ab iis, qui se vidisse affirmabant, formâ non dissimiles esse floribus Ceraistorum, eoque non candidos, sed elegantis cærulei coloris esse, quorum singula foliola tribus candidis radiis, seu venis essent distincta, staminula verò medium florem occupantia, purpurei coloris.

Cæterum (ut mihi affirmabat VVibrandus à VVarvvick, celsa sunt Caryophyllorum arbores, nec Malis, aut Pyris apud nos nascentibus minores: crescunt verò illæ in Amboyna, Ternate, Motie, Bacian, Marigeran, Makian, Tidore potissimum: in aliis tamen quibusdam vicinis insulis similiter, sed perparcè: præstantiores tamen censetur, quæ in Makian & Tidore nascuntur.




### ICON ALIA CLVSII.

Quia autem (inquit is in Auct.) vetus hæc Caryophyllorum Icon ad capitulum 21. lib. 1. Garcie scholion proposita, quæ sine foliis, tum ea, quam cap. 17. lib. 1. Exot. exhibendam, mihi per omnia non satisfaciebant, alium ramulum, qui fructus rudimentum iam formatum & florem nondum explicatum sustinens, & rudimentum formari incipiens, foliaque haberet, nactus, sex prioribus Exoticorum libris iam typis expressis, illum non modò à perito pictore in tabella delineandum, sed & ipsam tabellam à perito etiam artifice sculpendam curabam, cuius exemplar in hoc Auctario adiunctum esse volui scholio ad cap. 21. lib. 1. Hist. Ar. Garcie, tamen si scholion



### ICON CAMERARII.



### ICON ACOSTAE.



Acostæ posuimus, quam Clusius falsam existimat, quod nobis verisimile videtur, potissimum, quod ad situm florum & fructuum: de foliis nihil affirmare possumus.

illius capituli & veterem foliorum expertem, & alteram è capite 17. lib. 1. Exotic. petitam contineat.

Cate-



Cæterum nūspiam veteres Græcos, vt Theoph. Dioscor. aut Galenum Caryophyllorum mentionem fecisse inuenimus: tametsi Serapio ex Galetini autoritate de iis tradiderit.

Nominis quidem Plin. meminit, quando lib. 12. cap. 7. sic scribit: Est etiamnum in India Piperis granum simile, quod vocant Caryophyllon, grandius, fragiliusque. Tradunt in Indico luco id gigni. Adhucitur odoris gratia. Dalechamp. ad Plin. hunc locum annotat: hoc quidem esse putant Comacum Theophrasti, memoratum cap. 7. lib. 9. hist. Nos verò cap. de moschata ostendimus, videri Comacum Theophrasti, melius conuenire Nuci moschata: parum etiam similitudines habent Caryophylli cum Pipere, quæ occasio vt Scal. non existimet Plinii Caryophyllon idem cum vulgari, sed potius Cubeas. Ferrantes Imperatus alium fructum, nempe Indorum *Negundo*, de quibus suis locis. Est quidem in Caryophyllis Capitulum illud deceptum figura satis simile Piperi, quemadmodum & magnitudine: sed substantia, hoc est, duritie aut soliditate nequaquam. Saporis quoque acrimonia non parum distat.

Placet quod Paulus Aegineta ait, Caryophyllon non pro nominis ratione etiam substantiam habere, quum solum Nuci illo significetur: verum ex India velut flores quosdam arboris, festuacuram speciem præferentes asserit. Idem Caryophyllon non Caryophyllon vocandum existimauit: quia fortè etiam notà nostros Caryophyllos à Caryophyllis Plini differre apertum fiat.

A facie clauata Francis huius nomen *Clauis* Caryophyllum a. loptauit. Nondè sunt qui Caryophyllum repræsentent Buxi caudice, Lauri folio sed rotundiore, vt annotat Ruell. qui cum multis aliis Herbariis huius nec Dioscor. nec Galenum in censu simplicium vllam fecisse mentionem apertis verbis testatur.

Apud Serap. *Caryophyllus* est Caryophylus, [Ita enim scribit interpres,] qui annotat cum Paulo, aliam esse eius essentiam, quàm nomen ipsum exprimat: q. solum Nuci denotat. Adferri ex Indiæ locis, similem floribus arboris, esse veluti lignea quædam frustilla, nigra, longitudine transuersi digiti, (quæ fortè recentium est: nam sicca breuiora sunt) odorifera, sapore acuto cum quadam amaritudine. Paulum citat, eundemque eadem cum Galeno scripsisse de iis de verbo ad verbum. Sed locum eum apud Galenum nondum legimus.

Apud Auic. Caryophyllus [Charunful Bellan.] similis est Sambuco, sed nigrior. Masculus est veluti Oliuæ nucleus, longior & nigrior: fructus arboris Indiæ.

Ka. *vepillov* quasi Nucifolium dicas, inquit Curtius, tametsi illius naturæ aut effigiei nihil habeat, Flos arboris cuiusdam, vel, vt alius placuit, fruticis, sustaceus, longitudine pollicari, subamarus. Tanta longitudine ubi viderit miramur. *Hæc serè Antiquorum de Caryophyllo Placita. Nam vires postea dicentur.*

Qui verò posterioribus seculis in Indiam & ad Insulas Molucas nauigauere, cerniaunt ibi arborem, tum altitudine, tum crassitudine, foliis quoque, tametsi maioribus ac rotundioribus, Lauri similissimam, affatim in congeriem foliosam, vt Buxus, cui eius caudicem quoque compararunt. Nasci autem fructum, quem à similitudine, *clauum* vocant, ex summis, singulos singulis ramulis, eorollant primùm, tū in ea haud aliud, quàm Mali aurei veluti aciem, quæ cuspidis ipsa Caryophyl-

li. Summis furculis in fidere; ac paulatim in longum exurgentes, veluti mucronem facere. Primum autem rubescere, mox verò totum sote nigrescere. Leguleiis autem fructum arundinibus decutere, solo secundum arborem tegetibus prius strato. Locorum verò indagatores Caryophyllorum odorem per longum spatium in mari præsentire. Ita quidem Curtius refert.

Vartomanus, qui ad Moluchas non peruenisset, vt perhibet Scaliger, auditione sola, quæ de Caryophylli arbore scripsit, acceperat. Esse buxo caudice, Lauri foliis, paulò minùs longis: ori in *Molac* insula proxima *Bundan*. Nos eius nominis inter *Moluchas* nullam inuenimus. Tres aded esse, in quibus oriatur: *Tidor*, *Terenati*, *Macchian*. Caudici crassitudo, quanta humano corpori. Cortex oleaceus. Lium Cinnamomi: multum fructicare: confertis flores in summis prodire furculis, denos & vicanos, oblongos, lato capite, cristato atque in stellæ modum coronato, radiatòue. Initio virides, postea albescere: tum flauescere. Postremò in fructum excrecere tumidum, intus osseum, bipartitum, buxo colore, corio higrò tectum. Anthophylla vocant Apotheca, vt diximus. Ipsos verò Caryophyllos tribus vocant nominibus, *Gomode*, *Chianche*, *Bugalaian*. Alibi nasci negant. An Plinio notum fuerit, inquit Scaliger, haud constat ex eius historia. In duodecimo granum simile Piperi radit, maius & fragilius. At Caryophyllum neque granum est, neque vlla in re Piperi simile. Dum crescit, satis lentum: cum adoleuerit, durissimum. Quamobrem nequaquam his assentior qui ita prodidere. Fortasse potius Cubebe sit hoc Plinii granum. Non enim est Oxymyrsine, vt videbimus. Eorum præterea vetus error, qui putarunt *Folium* quod *Indum* cognomen habet, ex arbore Caryophylli protenire. Carpesion pusillos Caryophyllorum furculos somniallem, nisi in Ponto & Pamphylia nasci prodidissent. Quare ne Cubebe quidem nostræ illud erunt, sed Plinii caryophyllum.

Matthioli quoque Caryophylli caudicem Buxo similissimum dicit, eandemque eius materiem, quam comparationem paulò libetius ab eo prolata suspicamus. Nam vt duritie, colore vel pondere similis quidem sit, non tamen erit eadem. Contrarium sanè vel furculi insinuant, qui adferuntur, & quæ Casalpini de ligno eius scribit.

Idem Matthioli. crassiores caryophyllos vocat abortiuos, qui non benè prouenerint, eosdè quoque ait cum iis quos Antophyllos vocant, & in edit.

Germ. *Wignegelin* vocat. Folia Cinnami vulgaris instar habere, sed rotundiora. Fructu esse paruo. At in Epitome, folia eius scribit Laurinis esse angustiora, Salicis aut Persicæ mali similibus, sensum per ambitum sinuatis: multis arborem præditam esse ramis, floribus numerosis, in principio candidis, deinde viridescens, postremò rufescentibus, vique aded odoratis, vt reliquos flores odoris suauitate superent, è quibus caryophylli proueniant, qui nihil aliud sint, quàm rudimentum fructus. Flores enim qui quaternis foliolis constant, huius fructus rudimento infidere: fibris numerosis refertum, perinde ferè ac Myrti flores. Prouenire in extremis ramulis, Myrti modo. At quid Matthioli intelligat per Cinnami Vulgaris folium, vel Cinnamomi, vt in Ital. edit. ait, explicare debuit, neque ignotum aut obscurum, per æquè obscurum, ac fortè sibi quoque ignotum, interpretari. Folium sanè quod iuxta Caryophyllos pingi curauit, simile apparet esse folio, quod vulgò Malabathrum

Legendi  
modi.

Cortex.  
Folium.  
Flos.

Fructum  
Nucleus.  
Anthophylla

Non esse  
Caryophyl-  
lon Plinii.  
Cubebe.  
Oxymyrsi-  
ne.  
Carpesion.

Caryophyl-  
li abortiuos.

Folia Persicæ aut  
Salicis.  
Florum Car-  
pæi.

Caryophyl-  
li quid.

Maligh. neri.

Tabern  
mot.

Icon. T. 1.  
bera. folia  
apud. Mar-  
shol.

Math. c.  
trudell.

Portius  
Math. er-  
ror.

Quarim  
eiusdem er-  
ror.

C. Bauh.

Festucarius  
fol.

Buxi folio

Amatus  
mot.

Lacuna  
not.

Crassiores  
Caryophyl-  
li.

Auic. error.  
Quorundam  
error.

Caryophyl-  
lus Pauli  
Veneti.

Folia quale  
auro. De.  
Ramuli  
muria con-  
diti.

Mar. Cy.  
Famina.

dicatur, quodque prudenter in aliis quibusdam editionibus non fuit, sed inepte adiunctum in iconone Tabern. quam idem operum Matth. vindex in postrema Editione adaptare non debuit. Eius verò ipse quoque Matth. in sua epitome retineat solum illud, nullam tamen eius facit mentionem, sed dicit, foliis esse Salicis.

In vltima quoque editione eius manifesta contradicção, tum ipsiusmet authoris, tum patroni & commentatoris oscitantia posita & relicta, quando primò ait, folia Cinnami vulgaris instar habet, sed rotundiora: postea verò, esse Salicis, in quibus, quid appareat rotunditatis, ipsi videntur.

Illud quoque considerandum, Matthiolum contra aliorum opinionem crassos Caryophyllos, abortiuos vocare, quos illi omnes vnanimi consensu fructus dicunt maturos. Neque videtur nobis Caryophylli provenire in extremis Myrti modo: ut patum absit, quin existimemus, ipsum Myrtum florentem nunquam aspexisse, cuius strobilos per ramulos inter folia emicare vel tinestres norunt Botanici.

C. Bauh. præter falsam iconem Tabern. apponit etiam Clusii cum folio angusto, nec quale verum & legitimum sit docet, at sic neutrum sibi cognitum fuisse non obsecrè declarat.

Amatus Caryophyllum festucarium quendam florem vocat, arborem verò Buxo figura trunco & foliis persimilem tradit: fallique eos qui eadem folium Nucis aut Cinnamomi inesse autumant, quam reuera arbor Caryophyllorum Buxi folio vestitur. Ut nunc cæteris fide dignis Scriptoribus ad Indicas oras remigrandum sit, ut Caryophyllorum folia rectè inspiciant, qui Lauri angustifolia, Perficæ aut Salicis folio perhibuerunt. Sed si tam bene constat Amato de Buxeo Caryophylli folio, cur non docet vade id sciat? ubi viderit? à quo habeat? nimirum ingens hæc remeitas alio regimine occultari non potuit, quam experientia vel auro. Iam quàm ipsi nullam fuisse haud vanè suspicamus? silentio.

Lacuna quoque folia Cinnamomi foliis breviora & rotundiora dicit: sed aliorum fultus pronunciat, plantam trunco & ramis Buxo similem scribit, cum nihil ferè minus in furculis, si quis eas cum Buxi ramulis conferat, appareat. Notandum quod Garcias annotat, eos Caryophyllos, qui in arbore hærent, crassiores fieri, neque ab aliis nisi vetustate differre, tamen falsò existimavit Auic. crassiorem hunc mare esse.

Falsa quoque eorum opinio, qui Caryophylli arborem cum Moschatæ nucis arbore eandem esse putant.

Clusio Caryophyllum nihil aliud est, quàm rudimentum fructus.

Describunt etiam Lud. Rom. l. 6. c. 25. & Maxim. Tran. de Molucis in suis. At quem M. Paulus Venetus lib. 2. cap. 38. exhibet, planè alia est planta.

Caryophylli folium [inquit Clus.] Laurino angustius, Salicis aut Perficæ mali folio simillimum aliquando vidimus vñ cum Caryophyllorum ramulis muria conditis.

Idem Clus. olim in fine Histor. Gal. Dodongi scriptis Caryophyllon Plinii, Pauli & Sethi, flores officinis dici, & Caryophyllos fructus, Anthophyllos, cum potius flos ita sit vocandus. Auicennæ florem esse feminam. fructum marem.

Acosta tradit in arboribus Caryophyllos præferentibus nasci fructus Ficus modo, sparsim per ramos ad foliorum basin, binos, ternos, quaternos simul iunctos, vel vnicos interdum. Hunc suæ

descriptioni & figuram aptavit, & ut ipsum taxat Clus. vel hanc vel vllam aliam ad viam imaginem imitatus est, & scripta sua plerique, præter illa quæ imaginariè effinxit, ex Garciz Observationibus desumpta.

Legitimus iconem in Aromatum eiusdem Garciz historia ex ipso ramo, muria condito, se exhibere Clus. testatur, vidissequè ait ramos do- drantales & pedales fices à Franc. Dracke nauclero Anglo, [qui vniuersum orbem circumnavigavit] ex Moluccis, sed omnes extrema parte fructus protulisse.

Mouerat fortè Costam Matthioli temerarium iudicium, qui dixit, Myrti florum modo Caryophylli flores ramulis adnasci, vti notatum antè. Voluit igitur Costa in sua iconem Caryophyllos eo modo, quo Myrti flores nascuntur, flores interserere, non minus, mehercle, lepido, quàm ridendo atque adeo nouo tradendum Exoticarum Historiarum aucupio.

Franc. Alexander in suo Apolline refert, auduisse se Citreæ malum Indicæ regionis esse: id quod etiam comprobant Mentia Lusitana illuit. Renati comitis Chilianii vxor, quæ flores nostratum afferri iussit, hosque ablatis barbulis, viam Caryophyllorum imaginem prius repræsentare indicauit: torrido autem Indicæ regionis Sole, pomum non maturefcere, ac in eo grano, quod Caryophyllis insidere consuevit terminare allerebat: sique ita sit, ipsi acceptum refert. Sed si radicus ille Apollinæque bucanator considerat, crassiores Caryophyllos, quos Anthophyllos vocant, animaduertisset eos in duas partes findi, quod in nullo Citri fructus rudimento fieri potest, ac vel eo solo argumento discere potuisset Caryophyllos ex nulla esse Citra malo, nec passus fuisset, vnus mulierculæ coniecturâ in eam ferre se trahi opinionem.

Eius folia, quæ se habuisse testantur Pena & Lob. fuerunt Arantii magnitudinè, minus videntur: alia latiora ac rotundiora ostendebant Dou. Etissimi Comascus & Anguillara, hic Ferraria, ille Venetia. Spirabat istud Caryophyllum. Hæc ipsi. Nihilominus Loban suis Obler. & Leon. proponit iconem folii qualem Clus. habebat, quod ipsorum descriptioni minus conuenire videtur, quale & nos exhibuimus.

Lonicerus rudis profectò & inscius planè, scribit Tegeæ oder Jndi, he blatter folia esse firma, ut Nardus, lucundi odoris & saporis, cum potius intellexisse debuisset Folium Indum siue Malabathrum, quod malè pingit cum Caryophyllis pro eorum foliis.

Celsus Caryophyllorum fructum cum perfectus est ad maturitatem vsque minus odoratum, ac minus acrem esse annotat, figura & magnitudine constare Laurinæ bacca oblongæ, aut fructus Rosarum, semine intus durissimo, implicato.

Anthophylli apud Nicolaum intelliguntur grandes Caryophylli, cum tamen verbum Anthophyllon debuisset florenti fructui aptari, Caryophyllon autem fructui perfectò ob Nucis similitudinem. Idem perhibet ex eorum relatione qui Indicas oras perlustrarunt folia esse Cinnamomi, rotundiora, ad Laurina accedentia, in furculorum acuminibus fructus esse quindecim aut viginti simul, initio candidos, postea rubentes. Si ad perfectam magnitudinem intumescant, duos evadere & inuicem, præter corticem. Saporis acedentem inesse etiam arboris cortici, ligno & foliis virentibus, ut fructui.

Caryo-





Oceani, ultra sinum Gangenicum, Eois montanis, & si aliò transferatur, nequaquam viuere. Nascuntur & in Mare, auctore Loupetio. Nascitur, inquit Garcias, duntaxat Caryophyllon in Maluccis insulis, quæ sunt quinque numero [quarum primaria est *Guntulo*] nec procul nimium à mari, nec etiam locis mari nimis vicinis. Nascitur etiam in *Zeilan*, nonnullisque aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor, quàm in Maluccis, quæ sub linea Aequinoctiali sita. Ex præter Caryophyllon nihil ferunt, quod inde per orbem distrahitur. In locis quibus hæ arbores crescunt, nullum gramen esse perhibent: omnem enim succum ad eas detruiant.

His subscribit Maximil. Transf. ad Card. Salz. Insula, inquit, Moluccæ sunt numero quinque, *Tarante*, *Mabil*, *Theutori*, *Mate* & *Matthien*, tum citrà, tum yltrà, tum etiam sub ipso Aequinoctiali sita, vicinæ omnes, sed parua atque angustæ admodum. Quarum minima *Tarante*, proxima *Theutori*: quippe quæ paulò vltra sex miliarium Italicorum ambitum habent. Est huic finitima *Matthien*, & ea exilis. Hæ tres ex quinque Moluccæ insulis Caryophylli magnam copiam gignunt, sed longè vberiores in quartum annum. Arbores hæ non nisi in abruptis rupibus prouenire solent, & ita densantur, ut plerumque lucum faciant. A mari ad tormentum iactum, inquit Linschott. ] Caryophylli arbores distatæ crescunt, sponte sua, nullâ curâ aut plantatione: humum decerpunt ea incolæ duntaxat purgant subrus.

**Colligendi modus.** In anni magna fertilitate Caryophylla foliorum numerum faciliè superant. Manu non colliguntur, sed ad ramos alligatis funibus multa vi auelluntur. Idèo læsis grauitè arboribus fructus sequenti anno nullus est, spe in tertium producta.

**Tempus.** Colligitur Caryophyllum, auctore Garcia, à decimo quinto Septembris vsque in Ianuariam & Februarium, non manu, ut nonnulli volunt, sed violenta flagellatione.

**Repositio.** Decussa Caryophylla biduum aut triduum siccantur, deinde asseruantur, & Malacam, in aliâque Provincias mittuntur. Quæ in arbore herent, crassiora sunt, nec ab aliis nisi veritate differunt. Magni prouentus augurium est, si arbor plures flores produxerit quàm folia: siccirò non debent nimium flagellari arbores, quia vehemens & nimia flagellatio steriliores efficit. Cauliculi seu surculi simul decutiuntur. Etenim in Moluccæ insulis Caryophylla nequaquam emundantur, rarò autem in India, plurimumque venduntur cum matre, [sic Anthophylla, seu magna & ventriosa, quæ maturiora diximus, vocant,] puluere ac cauliculis. Quæ tamen in Lusitaniam mittenda veniunt, ea distinguuntur.

**Cautio.** Arbores aliæ ex deciduis Caryophyllis spontè crescunt, ut Castaneæ, quàm citissimè ob imbricam abundantiam. Intra octo annos fructum ferunt, intra quod tempus adulescunt, duraturæ vsque ad centesimum, quemadmodum ipsi incolæ testantur.

**Satio.** Arbores aliæ ex deciduis Caryophyllis spontè crescunt, ut Castaneæ, quàm citissimè ob imbricam abundantiam. Intra octo annos fructum ferunt, intra quod tempus adulescunt, duraturæ vsque ad centesimum, quemadmodum ipsi incolæ testantur.

Scaliger ex Vartomani relatione tradit, bis in anno legi, Decembri & Iunio. Quarto quoque anno liberiores esse prouentum. Triennio vacante vindemia, ita demum efferari, atque degenerare. Cæsalp. ex eorum narratione, qui Indicas oras perlustrant, bis in anno sub vtroque Solstitio colligi prodit: neque sinere incolas ut ad perfectam magnitudinem intumescant.

Nullius autem pretii fuisse Caryophylla ferunt apud Maluccanos, donec eo delati nauibus Chi-

Caryophyllon a-  
pud Ma-  
luccanos  
neglecta.

nenses, inde magnam eorum copiam in suam regionem exportarunt, & inde in Indiam, Persiam & Arabiam. Conseruari autem in sua bonitate si marina aqua inspergantur, alioqui terebinthem sentire. Viridia saccharo conseruata, ac in condimentum, quod *Achar* vocant, redacta, in Malacam quoque ac Indiam mitti. Hodie quoque flores conditi cum petiolis & ramulis teneris, præcipuis quibuldam Europæ emporis, ut, Venetiis, Genuæ & Antuerpiæ visuntur, testibus Pena & Lob.

Ipsi quoque surculi, *Fusti* dicti vnà cum Caryophyllis adferuntur, & hodie in quamplurimis locis, potissimum Genuæ & Lugduni, saccharo incruantur. Sed folia rarò cum his adferuntur, notante Cordo. Fructus potissimum seu Caryophylla ingenti lucro tam per Asiæ quàm Europæ Provincias distrahantur.

Caryophyllum deliges nigrius, solidius, ponderosius, & copiosiorum liquorem diuulsum vngue, vel acu punctum, exudans, odoratum, frangi contumax ac lentum, recens linguam masticatâ vnà cum faucibus penè adurens, acre & aromaticum. Annos quinque seruari posse ait Sylius loco temperato: nam in humidore putrescere, sicciore crescere, & rugosius euadere atque imbecillius.

Minus probantur Anthophylla dicta, quippe quorum acrimonia remissior, ac interdum penè nulla. Ex surculis seu fustis dictis præferuntur quoque nigriores, pinguiore, liquorè quoque fructuum modo remittentes, odore ac sapore ad Caryophylla quamproximè accedentes.

Folia, si quis eorum vltus esse debeat, suadente Cordo, deligantur maiora, crassiora, firmiora, integraq. Fracti verò in puluerem, aut fragmenta eorum, vitanda. Possis tamen his, quemadmodum & *fusili*, substituere ipsâ Caryophylla, quæ abundè suppetunt.

Matth. scribit ramuscolum Caryophyllis onustum, cuius iconem posuit, Veronâ sibi misisse Calceolarium, sed absque foliis.

Caryophylli Paulo Aeginetæ sunt aromatici, acres, subamari, calidi ac sicci circa tertium ordinem, multiplicis usus tum in obsoniis, tum in aliis medicamentis. Atius in secunda calefaciendi siccandique classe reponit. Auicenn. in tertio vtriusque qualitatibus. Et sanè, Calor tam est huic aromati essentialis & genuinus, ut cum in India emendatur, si vas aliquod cum aqua aliòve liquore adfret [teste Linschott.] id omne intra duos dies, etiam aliquatenus diffusum, ingenti siccitate Caryophyllorum exhauriatur, ut saporem experimentis comprobatur ait. Otis halitum commendat, idè mulieres Indorum frequenter manducant, in eundem finem, quod & Lusitanæ feminæ & plerique alii cæterarum Nationum promiscui sexus iam dudum facere occiperunt. Ad oculi aciem conferunt, & nubesculas exterunt. Ventriculo robur addunt, & hepatici Vomitus compescunt, & nates aduersantur, auctore Auicenn. Drachmarum quatuor pondere [quæ dosi nobis satis magna videtur, quam tamen & Palud. retinet: malimus scrupulos quatuor cum Amato, quod prior dosi, præsertim delectorum & recentium, magnam incendium sit allatura, maximè in corpore bilioso.]

Veneris inuentum sunt, Serapioni: qui & ligni [surculorum] & fructus vsum esse ait: præsertim quæ ad ruborem inclinant, quæque sigillatim ex arbore digitis decerpantur: ubi subaudiendum putamus ad delectum. Alioqui nihilo præ-

Conf.

Ach.

Ca.

Eu.

Del.

Cal.

F.

Fol.

del.

V.

Or.

V.

V.

S.

V.

V.

V.

V.



præstantiora indicamus decreta, quam vi decus-  
ta, quod ex casu illo nihil iniuriæ effectui dignæ iis  
accendere queat. Cor roborant, digestionem ad-  
iuuant, sed alium cohibent, eidem. Simeon  
Sethi pulmonem ledere ait. Auenzoar in pro-  
mo libri de confer. san. scribit sibi à multo tem-  
pore propria experientia compertum esse, si hye-  
me vertex subtilissimo Caryophyllorum puluere  
aspergatur, frigidos catarrhos & capitis humores  
consumi. Attamen satius esse, capitis tumma-  
pulis vino ardente maderieri, vt puluis  
facilius adhæreat, eiusque vis penetrare queat,  
quod melius & citius fiet, superligato linteolo aut  
Cucupha, ne vis eius exhalet. Puluis eorum oculis  
indivisi visus claritate adfert. Sed cautione  
opus ad hanc rem, addendaque aquæ quadam oc-  
culares, feruorem eorum exparte retundentes,  
qualis esse possit rosarium, Ephraïæ, aut simi-  
lium.

Conducunt porro caryophylli contra morbos  
omnes cerebri frigidos, Apoplexiam, spasum,  
Paraly sin, Lethargiũ, stuporẽ, si dẽ siue suffimento,  
siue elu faciunt contra aẽrem pestiferũ. Ad anhe-  
litus fœtorem, cum vino assumitur puluis ex cru-  
sta panis fecalini, Galangæ, cum paucis Caryo-  
phyllorum. Contra nauicam & vomitum omne,  
omnemque profusum alui ex causa frigida, edi-  
tur crusta panis, vino Cretico madens, puluerẽ  
que caryophyllorum aspersa, autore Math.

Aduehebatur olim odoris tantum gratia, vel  
Plinio teste [si de nostro scribit:] nunc quoque  
excrecente ad ingluuiem auditate, eò ferẽ mores  
abierunt, vt sine caryophyllo dapes despiciantur.  
Actantum potuit ingeniosa gula, vt non tantum  
epibœmas pertinaciter inspergeretur eorum pul-  
uis, sed & gallinæ, capones, galli Indici, bubula  
linguæ, iocinora vitulina, vaccarum vbera & alia  
eiusmodi plura non nisi caryophyllis transfixa as-  
fentur. Quin & iis fructus transfigi & condituras,  
vt Mala, Pira, Cotonæ &c.: à mulierculis consue-  
uerunt.

Vulpant item ad olfactoria, & vestiũ odores.  
Quidã Cer. u. si. s. saporem iucundum cõciliant  
caryophyllorum pulueratorum drach. ii. tantundem  
baccarum Lauri contusarũ, sacculo inclusis in do-  
lio suspendendo.

Animo inquentibus præmansũ caryophylli na-  
ribus offeruntur: ad idem valet acetum, in quo  
macerati sint caryophylli & Rosæ. Estque iam fe-  
rẽ translatum apud Germaniæ mulierculas ca-  
ryophyllos aliquot secum gestare ad obuiandum  
eiusmodi affectui.

In Lixiuio suspenditur vtiliter nodulus caryo-  
phyllorum cõsutorum, quo morbis frigidis labo-  
rans caput abluir.

Vtus est etiam in ventriculo dicatis scutis &  
sacculis, tum ad vomitum, tum ad ventriculi &  
ventris dolores à causa frigida, quales interdum  
vulgò præscribere solemus cum crusta panis pul-  
uerisata, asperso aceto ros. modico, aut vino ru-  
bro odorato, additis aliis quoque aromatis ad id  
pertinentibus. Quidam puluere caryophyllorũ  
caput spargunt contra dolores capitis ac grauedi-  
nes. Sed & vinam ciere sunt qui scribant.

Apud Indos quoque, vt prodit Garcias in mul-  
tiplici vsu sunt, tum ad obsonia, tum ad medica-  
menta: tamen expetuntur in laua crassiora illa &  
annotina caryophylla: à nobis verò tenuiora, quæ  
adhuc viridia aceto & sale apud Maluccanos con-  
diuntur, sed his teneriora saccharo asseruantur, in  
magnum palati amœnitatem.

Nostri quoque caryophylla saccharo incrusta-

re solent, non inconfinito, ad placendum palatui,  
& calefaciendum frigidum stomachum, inuenio.

Ex caryophyllis quoque destillationis artificio  
elicitur, Oleum, quod quidam omnia polle-  
Balsami facultatibus asserunt, tam interno quàm  
externo vsu. Id tamen calidius multò censemus  
autore Camerario. Gutta aliquot exhibitæ cum  
vino aut Gallinæ iusculo, sunt præstantissimum  
remedium in ingenti dolore Ventriculi, à flatibus  
& pituita.

Lusitanicæ mulieres, quæ apud Maluccanos  
degunt, è caryophyllis viridibus aquam stillatitiã  
organis eliciunt, mira odoris suauitate fragran-  
tem, & cordis affectibus vtilem. Sed & sudor iis  
qui Lue Venerea laborant excitatur caryophyllis,  
Maci, nucis Myristica & longo nigroque Pipere.

Si quid autem sit, quod Cinnamomi vicem sup-  
plere queat, caryophyllos esse Cæsalpiudicat.

## CARYOPHYLLORVM RESINA.

**H**oc nomine Resinam asseruamus, glebã [vt  
Happaret] fusili, crocei coloris, fragilem ad-  
modum & siccam, nullum gustanti saporem offe-  
rentem, (fortè ob vetustatem) odore tamen vbi  
adoletur, suauis, caryophyllorum: faciliẽ ardet, cla-  
ràque incendia dat.

Caryophyllorum gummi [inquit Pena & Lob.]  
quod eximi odoris est, glebæ Ammoniaci con-  
cretionẽ & colore seruamus: quod Lob. postmo-  
dum in sua hist. Belg. denudò repetit, & colore so-  
ris nigræ cante esse ait. Cero offels gummi vocat,  
sed rectius, nostro quidem iudicio Resinam voca-  
set, quod promptè flammam concipiat, cuius-  
modi lachrymas Diosc. generaliiori voce *ceres* vo-  
cat.

Serapio cap. 39. ex autoritate Albugerig: Glutẽ  
inquit, [potius resina] Caryophyllorum est simi-  
le glutino *Albostem*:

Scribit Auic. caryophyllorum gummi, *Albostem*  
seu Terebinthinæ facultate respondere. Hanc  
ob causam percontatum se ait Garcias ab iis qui ex  
Maluccis caryophyllum aduehant, sed negasse se  
huiusmodi gummi vidisse. At nos non in Moluc-  
cis fumus, & vidimus tamen, & habemus inter  
fructus repertum. Ohius quoque testatur Cal-  
ceolarum habere Gummi caryophyllorum: sed  
cur non descripsit rem tam raram?

Clus. quoque annotat inter caryophylla, quæ  
Antuerpiam adferuntur, inueniri interdum gum-  
mi ex atro rufescens, odorum, & quod prunis in-  
iectum caryophyllorum sanè odorem referat: su-  
spicaturque idem esse gummi, de quo Auic. pro-  
didit.

CARYOPHYLLO AROMATICO  
similis fructus.

## CAP. VII.

**F**ructus delatus in priore Batauorum nauiga-  
tion. anno 1597. ex laua de quo Clus. exot. In  
binarum vnciarum longitudinem, vel etiam am-  
plorem, & vncialẽ crassitudinem excreuerat se-  
ptimus fructus: videbam enim caryophylli aro-  
matici vetustioris in fructum iam se formantis dũ-  
taxat magnitudine, cui sanè valdè similis, vt primo  
intuitu mihi imponeret. Totus fuscus erat, nec val-



Nucleus.

& veluti articulis distincta, in minore, angusta & mucronata: fructus ipse denso duroque cortice erat præditus, vt cultro vix aperiri posset, & vtrumque salis lapidis. An verò hic fructus, falsedinem ex aquæ marinæ aspersione contraxisse ignoto?

## CARIOPHYILLOS REDOLENS

FRUCTVS.

## CAP. VIII.

**Descriptio** Cubit Garcia in opusculo suo de Aromaticis, Barbarissimam illam Gentem quæ Insulam D. Laurentii incolit, mercatoribus, qui eò interdum deuehuntur, fructum quandam ostendere, qui Caryophyllos redoleat, Auellanae magnitudine cum suo putamine, aut eà amplior, sed incomperiti adhuc vsus.

A. N. &amp; M. N. &amp; M. N.

## MALABATHRV M ET FOLIVM INDVM

OFFICINARVM.


## CAP. IX.

**Descriptio** Vocant Officinæ Malabathrum & folium Indum ex India importari solitum, nonnunquam ramis suis inhaerens, sapè solum & aulsum. Sunt autem rami, vt ex cubitali specimine, quod habemus apparet, satis magni & mediocriter crassi, cortice fuluescente, aut nigricante aromatico, tecti, materie Fagina, ex quibus alii pronascuntur ramuli ex aduerso sita quoque & folia apposita sunt, notiora nostro Orbi, quàm rami, quæ magnitudine va-

Rami.

Materies.

F. N. &amp; M. N.



dè leuis, superne quatuor alis decussatum crucis, formâ dispositus præditus, inquit Caryophyllorum aromaticorum, infernè angustior & peritius, prodeunte ex foramine veluti caudâ, crassâ aut tenui, pro fructus magnitudine: quæ nihil aliud est quàm nuclei extrema pars, qui in fructu continetur, in maiore crassior & caua,

stant: nam & aliquando dodrante longiora prostant, aliàs palmum longa, latitudine vnus aut duarum triumve vnciarum. Forma Laurini folii, latiora tamen, & quædam rotûda ferè, cui & nitore nõ cedût parte superiore, color. n. parte inferiore est cineraceus. Iam verò insignis est costarum nota, quas ternas semper habet, easque subtus quàm suprà magis extantes, mediam rectam, laterales pari ab ea intervallo abscedentes, sinuatas, à quibus hinc inde & in margines venulæ transuersæ discunt. Sapor aromaticus.

Cùm ad nos peruenit, colore est, inquit Cordus, virenti, sapore glutinoso, tenui, aliquantùm subacri, aromatum modo iucundo, veluti si quis Piperis & Cinnamomi odores commisceat. Caryophylli folia differunt, quòd neruum seu costam tantùm habeat, non tres, vt nostrum Malabathrum.

A prædictis folia diuersa pro Malobathro sic describit Cordus: Folium propemodum rotundum, & disci figura orbiculatum, trium ferè digitorum quoquoersus latitudine, colore in fusco & spadiceo cinereum, venosum, densum, Laurino crassius, lentum, flexile, & fractu contumax, nisi omninò aridum fuerit, gustu subacri, subamarum, tenue, per palatum se diffundens, orisque halitum odoris gratia diu commendans, odore aceti, Nardi æmulum, & admodum aromaticum.

Malabathrum, inquit Diosc. nonnulli Nardi Indicæ folium esse arbitrantur, odoris quadam cognitione decepti. [Sunt enim multa odore Nardi similia, veluti Phu, Asarum, Neris: vñes Græcè habent: aliqui legunt ieris, cuius tamen odor nobis Nardo non admodum similis videtur.] Secus autem se res habet. Etenim peculiare genus est, quod in paludibus Indicis gignitur. Folium id est, quod Lentis palustris modo aquæ innatat, nulla solum radice. Idipsum collectum statim Lino traicitur, siccaturque reconditur. Aiant & aqua per assiduos ardores exsiccata, cremis, fomitibusque aridis terram peruri: atque id nisi fiat, non amplius renasci. Laudatur recens & in nigrore quodam subalbidum, minimè fragile, integrum, nares odore feriens, illiusque suauitate diutius implens, Nardo sapore simile, nullo salis gustu. [ἡ ἀλυσία ἢ τῆ γὰρ αὐτῆς, ἢ ἀλυσία: aliàs si Lacunæ credimus, ἡ ἀλυσία ἢ τῆ γὰρ αὐτῆς &c.] in firmitum verò ac minutatim concisum, & vetustate cariosum expirans halitum, vitiosum est.

Sic verò Plinius: Dat. & Malobathrum Syria, arborem folio conuoluto, arido colore [colore auri folii. ch.] ex quo exprimitur [paratur d. quæ lectio & nobis placet.] oleum ad vnguenta, fertiliore eiusdem Egypto. Laudatius tamen ex India venit. In paludibus id gigni tradunt, Lentis modo, [Lenticulæ palustris modo aquis innatare. n.] odoratus Croco, nigricans, scabrumque, quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrimè situm in vetustate sentit. Sapor eius Nardo similis esse debet sub lingua. Odor verò in vino suffusus facti antecedit alios. In pretio quidem prodigio simile est, à singulis ad ccc. peruenire libras: Oleum [Folium m. & ch.] autem ipsum in libras lx. [Lxx. m. xix. ch.]

Ita vides Plin. à Diosc. non parum variare circa Malobathi historiam, vt valde vereamur ne iple met cum plerisque Veterum ignorat, quid verè sit Malobathrum. Sed vt cum Diosc. conueniat Plin. de palustri Malobathro, pro iis verbis, [quodam salis gustu. Minus probatur candidum. Celerrimè situm &c.] ita legendum censent: Quod salis gustu, minus probatur: candidum celerrimè



lerrimè situm &c: Alioqui Plin. minds probaret candidum, laudatiusque censeret, quod est quodam salis gustu, contra Dioscor.

Quod si vera scripsit Plin. gemina Malobathri conditio: alterum palustre, alterum ex arbore: posteritas fortè nec primum nec secundum, sed tertium Malobat. genus nouit, vel doctissimi Hermol. iudicio, appellatum à Mauritanis *Embul*, cuius surculi [inquit] cum folio, quale Arbuti siue Lauri est: Pollicares plerumque ad nos feruntur, & fructus quoque Laurinis baccis simillimus. Omnia tria Folii appellatione significari consueuerunt, sed priora duo maximè.

Vidisse tamen iacet Corn. Materiarios, vt nunc vocant, qui etiam priora illa duo genera ostenderent, & pro vero Malobathro venderent: quibus, inquit, si quis omnino fidem denegat, tum in his, tum in alijs quæ ex longa experientia pro genuinis agnita nobis aduexerunt, quo tandem tota medica materia deueniet? Sed nimirum egregium illud Herbatium, si Diis placet, ac potius omnis propemodum naturæ Botanica imperitissimum, in cæteris alioqui doctissimum, decuisset, duo illa Malobathri officinarum priora genera [vt illorum relatione fretus, confidenter vocat] describere, & ipsum prius ex diligenti inspectione discere in quo differant, tum inter se, tum à *Tembul* Mauris dicto: deprehenderit. Iam non insistoribus, sed ipsiusmet negligentia denegabimus fidem: quanquam non videamus, quomodo post tot secula Materiarii scire queant, quænam sint legitima Veterum Malobathri genera, quos nemo nescit, ditandi potius quam discendi aucupio inhiare, quæque adeo à peritissimis & sagacissimis tam medicis, quam Herbariis pro incompetitis, aut saltem pro non probè competitis habentur, vt patebit in progressu. Deneganda vtique fides non tantum *ἀνιστοις* Materiariis, sed vtique omnibus qui sine ratione, sine experimento certò aliquid proferunt, maximè de his quæ ad salutem hominum pertinent. Eat nunc Corn. & omnium, quorum Mundo sunt, nobilissima artis materiam vel considerationis subiectum [subiectum enim reductionis homo est] abditos, earumque vel temeraria, vel falsa & inficia, vel denique decipiente & sophistica relatione addiscat, vt sibi materiae medicae cognitionem acquirat, non interim confideratis Veterum de ea traditis notis, cæterisque quæ propria industria considerari ab industriis medico possunt & debent. Nam reuera in talibus vel iplomet fatente, Hippocraticum illud requiritur, *μὴδὲν εἰδὼ, μὴδὲν ὑπερβῶν*: vt nihil temerè approbemus, neque rursus commitemur: sed Veterum descriptiones diligenter examinemus, adhibitis non tantum auribus, quid vel hi, vel nostri dicant insitatores, sed & oculis, naribus, ac ipso adeo gustu, cum sæpè contingat ex vna aut altera nota non penitus respondente, earum aut conceptam relationem opinionemue totam lubueri: quod *σημεῖον* & in plenum hoc loco dixisse conueniat.

Actius eundem Malobathri delectum habet cum Dioscor.

Dicitur autem Græcis *μαλαβάθρον* vel *μαλὸς βάθρον* cum Arrian. quod etiam vocatur *μαλὸς βάθρον φύλλον*, & simpliciter *φύλλον*, & ἡ ἰνδικὸν φύλλον. Nec *φύλλον σκλήμα* aliud esse videtur apud Aëtium, quam Malobathrum siue Malobathrum Plinio, quod & *Folium* tantum nominatur: & *Folium Indicum*. Cæterum cum apud ipsum Aëtium *φύλλον* simpliciter dicatur, cur folium Scylmatidis vocetur, fatemur nos ignorare. Neque vox *σκλήμα* aliunde hæc-

nus nobis nota, nisi ex Epigrammate vbi legitur, *σκλήμαθ' ὀκνῶν*, Laniatus comæ. Sed quid laniatus ad Malobathrum? Cogitent peritiores. Est & foliatum vnguentum apud Plin. ex hoc ipso folio confectum. Et foliatum vnguentum Plautus videtur in Curcul. vocasse Petalium.

*Tu Stalle, tu Cinnamonum, tu Rosa es, tu Crocus, tu Cassia es, tu Petalum.*

À voce Græca *πέταλον*, id est, folium. Quo nomine etiam Iurisconsultus Malobathrum appellauit, si de his quæ debent Imperatori vestigal.

Sic & Paul. Aegin. lib. 4. cap. 48. dum *φύλλον μαλαβάθρον σακχάρια* β. id est, folii Malobathri pilulas duas in medicamentum quoddam recipere iubet, nihil aliud quam folium ipsum in pilam & globulum conuolutum intelligere videtur.

In quem eundem sensum Const. Cæf. lib. 6. cap. 6. *οὐλλὰ μαλαβάθρον σακχάρια* i. id est, folii Malobathri pilulas quinque in picationem quædam recipit. Et lib. 7. cap. 13. in quandam vini conditoriam, *φύλλον* simpliciter *σακχάρια* β. id est, folii pilulam vnam assumit, quum in præcedentem condituram adhuc minus, nempe *οὐλλὰ* β. id est, folii tantum recipere iussisset.

Quod autem locis citatis *πέταλον* ipsum folium in globum conuolutum significet, vel Plin. quæque lectio lib. 12. cap. 26. satis aperte insinuat, quod Malobathron arborem folio conuolutum dixit. Cui rei Folii Indi historia, quæ ab Arriano, circa finem Periplus maris Erythraei describitur, perbellè responderet. Is enim illa folia tradit à Selatis populis, qui finitimi sunt Cirrhadiis (apud quos etiam præstantissimum nascitur Malobathrum, teste Ptolemæo) circa ciuitatem Thinau afferri, ac dum in vicinia populabundi vagantur, stramentorum loco subterni, tandemque postquam remigrarunt, ab ipsis Thinau incolis auidè conquiri, & in globulos conuolui atque complicari, calamorumque villis consui, Sed hinc tria genera effici. E maioribus enim folijs, quod *ἀδρόσπαστον* Malobathrum dicitur: è mediocribus, *μεσὸσπαστον*: è minimis, *μικρόσπαστον*. Quæ lic compacta & conferta in Indiam deportantur, & magno venduntur. Notandum obiter hoc loco mendosè ac ineptè in apologia Paul. Hæsti pro Guilandino aduersus Matthiolum legi *ἀδρόσπαστον, μεσὸσπαστον & μικρόσπαστον*. Atque hinc fortassis prædicti Antores Malobathri pilulas, Plin. verò Malobathrum folio conuolutum dixisse videri potest: quanquam ille totidemque quot Arrianus genera, iidemque nomenclationibus nuncupata, non Malobathro Syriaco, quod Folio simpliciter vocitato reddidit.

Quia verò Nardinum vnguentum etiam parabatur cum Malobathri folio, vt docet Dioscor. hinc fortè factum vt Plin. deceptus, ipsum Nardinum etiam foliatum vocitaret lib. 13. cap. 1. Galenus tamè spicatum à foliato accuratè distinxit lib. 1. cap. 2. *ἡ ἰνδικὸν φύλλον*. Quæ fustis explicare placuit, quia in his labuntur vel doctissimi, vt ille, tamen insigniter eruditus, interpres Theophrasti de Odoribus, vbi ait in Scholijs, Nardinum vnguentum Theophr. non è folio paratur, &c: vbi quid folium, quid nardus, vel quid foliatum aut spicatum, vel Const. quoque iudice, ignorasse videtur.

Plutarchus quoque in libello, cui titulus est, quod bruta ratione vtuntur, *φύλλον* simpliciter vocat, oderamentis alijs coniungens, simulque numerans & folium Malobathrum s. hoc. Quæ vox à Marcello ex antiquo & probationis fidei Græco codice instaurata illic est, vbi legitur: Ab hac appellatione Malobathrinum vnguentum, foliatum

*πέταλον.*

*φύλλον.*

*Quomodo globuli e Malobathro sunt.*

*Malobathri tria genera Arriano.*

*Plin. III.*

*Folium Barbaricum.*

*Plin. not.*

*Interpres Theophr. de odor. not.*

*Plutarch. locus corr. Malobathrinum vng.*

Nardinu  
Sedg  
Sadeg.  
Sadeg.

Martiali & plerisque aliis ex Græcis & Latinis Scriptoribus dictum est: & ob odoris similitudinem, idem Nardino est creditum aliquando.

Apud Serapionem legimus *Sedg*, id est Malabathrum, Dioscorid. est herba quæ nascitur in India. Apud Avic. Folium Indam est *Sadeg* & Malabathrum. Folia & rami sunt *Sabesfram* [Garc. *Saisfram*] similes: flos stansibilis, [Dioscor. flos nullius meminit:] provenit in India paludibus, innatat aquæ Lenticotæ aquatice modo, & radici non appendum: ibidem ligant filo & exiccant. Quidam existimant esse folia Nereidis [Nardi Indicæ propter viritum similitudinem: Garc. Gollam legit, quam vocem Clus. Nymphæam reddidit.] Arabes secundum quosdam etiam vocant *Tembul*, à quo differre potest diceretur.

Tembul.

Bethrum.  
Bathram.  
Etymon.

Indi verò, apud quos provenit in regione Malabar, dicunt *Bethrum* vel *Bathram*, vnde composita à Græcis videtur dictio *Malabathrum*: hodieque apud Indos, etiamnum teste Garcîa paucis immutatis foliam *Tamalapatra* nuncupatur. Quam vocem, ut putat Garcias, Græci & Latini nuncupant corruptè *Malabathrum* nuncupant.

Mal bathru  
Inde.  
Cadeg  
Indi.

Arabes *Cadegi* Indi, id est, *Folium Indum* dicunt: nec dicitur Folium per excellentiam, sed quoniam Avic. lib. 2. cap. 259. ita vocavit. Qui & folia *Saisfram* esse ait, quamvis in quibusdam Exempl. *Sabesfram* legatur.

Saisfram.  
Sabesfram.

Lacuna  
nos.

Ital. *Malabathro* & *Folio Indano*. Hisp. *Castil. Catal. Folio Indu*. Gal. *feuille des Indes*. Lacuna ait Lusitanis *Bereay* *Berer*. Sed velis vel hi falluntur, qui nomen *Berere* alteri folio tribuunt. German. *Indianisch blatt*. Quidam, qui tamen egregii Herbarii vulgò creduntur, temerè & nulla ratione solida, *Vegelblätter* vocant, ut Euch. Roslin, Lacuna & alii: ac temerario etiam magis ausu alii *Caryophyllis* adhaerentia pingunt, ut Tabern.

Ruell. nos.

Cinnamomum  
folium.

Ne fallaris, inquit Ruellius, [cui placet identidem Hermolai decocta ruminari, & pro suis venditare,] quod Officinæ *Folium* nominant *Indicum*, Cinnamomi non Malobathri dicunt esse comam: profectò id quidem sub lingua Cinnamomi refert saporem, folio Iuglandis, flavo, venisque tribus &c.

Quorundam  
Herbarior.  
temeritas.

Desit, inquit Sylvius, & *folium Syriacæ arboris* Plinio celebratum. In horum locum Mauri inuenerunt folium Laurino proximum, sed maius, & nervis tribus folium intercurrentibus distinctum, odore iucundo: Primum illud *folium Indum* dicitur Serapioni: tamen Actuarius in *Hedychroo* magnate, *σύνθετον* & *σύνθετον* seu diuersa miscet. Idem in Antibal. vult pro Malabathro fumendum folium illud vulgare Indi dictum, quam opinionem quoque sequitur Placotomus.

Succedat,  
folium Indu  
an.

Malabathrum, ut tradit Cordus, crediderunt multi Nardi Indicæ folium esse, verùm decepti & falsò, ut Dioscorid. cum ipsa experientia contrarium testantur. *σύνθετον* Græci, Romani *folium* dixerunt, quoniam nihil aliud esset quàm folium.

Malaba-  
thrum non  
esse Nardi  
folium.  
Folium cur  
dictum.

Iam verò amplius non affertur, præterquam quod casu nonnunquam cum Nardo Indica affertur, quod descripsimus folio orbiculato. Eius in locum, Casia, Cinnamomi & Caryophylli folia substituta sunt, quæ pro Malobathro quidem in usum recipere licet cuiuslibet: sed eadem *Malobathrum* siue *folium Indum* appellare, non perinde licere arbitramur.

Malaba-  
thrum vul-  
gare.  
Cinnamomum  
folium  
non est.

Idem alibi scribit: folium quod hodie pro Malobathro in usu est, & simpliciter *folium* magno errore vocatur, Cinnamomi folium à plerisque et-

iam Doctis creditur, sed malè: nam sine dubio à viliori & non adeò efficaci Casia producit, quod pediculi eius sapor manifestè indicat, qui planè rubentem & glutinosi saporis Casiam refert, & nequaquam Cinnamomum. Nobis autem uti non certò constat, quid sit Malabathrum Veterum, ita etiam Cordi & vulgare Malabathrum non reiciimus. Atque ut Cinnamomi folium non esse & ipsi putamus, ita nec Casia rubentis esse iudicamus: Malabathri enim siue Folii Indi vulgaris cortex tenuissimus est, nec similis cum Casia rubente.

In Navigationum Tomo primo ex Edit. tertia pinguntur folia Malabathri vulgaris seu folii Indi nomine *Berelle*, aut *Berre*: ubi scribitur *Berelle* Persis dici, & Arabibus *Tembul*, in Italia, *folia Canella*: sed perperam, nostro quidem iudicio: uti in eodem Nauig. libro *Berelle* & *Tembul* planta, arborescens eadem existimatur ab Odoardo Barbof. cum folio Indo vulgò vocato. De *Berre* plura videant Lectores c. seq.

Malabathro, inquit Scal. non subest radix, si vera Græci fabulantur. Et abhi apertius. Sine radicibus quoddam, ut Lenticula ac uæ. Nihil ei præter folia. Nam de Malabathro Veteres somniant. Qui enim omnes Arabias, ac Vniuersas Indias penetramus hodie, nusquam folium illud mirabile compertum habemus. Et iterum alibi. Folii *berel* facies & magnitudo, quæ & quanta Citrio: multis nervis, ac venis quasi striatur. An sit hoc, quo vitum, *folium*, cum de facie, tum ex effectione deprehendi potest. Mansum enim iis, quæ suo loco dicta sunt, indicis sese proder. An verò sit hoc Malobathrum Antiquorum? Ad hoc non respondebo. Quia mendaces Græci *folium Indum* in aqua natare palustri, sine radice, prodidit. Cuiusmodi toto Indiæ Orbe nullum compertum est.

Fuchsius lib. 1. de Comp. Med. quatuor folii differentes proponit. 1. à Dioscorid. dictum, folium Indum Græcis dictum à quo Vnguentum foliatum, à Nic. Myrepto descriptum. 2. Malabathrum, folium arboris cuiuslibet Plinio, ac vtrumque folium hodie adferri desuisse. 3. Esse præterea aliud cuiusdam plantæ folium, Nucis Iuglandis folio simile, in Malabar India regione natum, quod incolæ Batrum nominant. Hoc cerebrum & stomachum roborare, cor exhilarare, venerem incitare, & halitum oris commendare: itidemque Indi incolis *folium* appellari. 4. In horum locum Arabes quartum inuexisse *folium*, Laurino proximum, sapore Cinnamomi iucundo. Vnde quibusdam Cinnamomi folium putatum: at Officinis, ut Mauritanis, simpliciter *folium* dici. Et rursus postea: rarò hodie Cinnamomum affertur. Nam quo Cinnamomi nomine, vtriusque Sepalsæ, magna ex parte Cassia est. Caterùm arboris huius folia Nucis Iuglandis foliis similia sunt, quæ in Officinis falsò pro Malabathro venduntur. Hæc ille. Cuius quatuor species, si verum fateri hæcet, nec intelligimus ipsi, nec ipsi summet vel nouisse, vel etiam, quid sciret intellexisse, putamus. Suspiciamus enim eum bis idem tradere. Folium Barbaricum & Malabathrum res esse diuersas, inquit Anguil. ut dicam, facit authoritas Digestorum tit. de publican. & vellig. lib. 39. in Pandectis Florent. Videtur etiam Gal. facere duas compositiones: vtri nomen *Foliatum*: alteri *Malabathrum*. Apud Nic. Myrept. in pluribus compositionibus præstantur Folium & Malabathrum. Apud Avicem, in quodam medicamento lib. de vitiis. Cord. manifestum discrimen apparet. Malabathrum non cognosco: De folio Barbarico & folio simpli.



simpliciter dicto historiam narrabo, quam aliorum iudicio subiciam. Reperiuntur duo Foliorum genera, quae incolae solent tenere in ore, & masticare boni halitus ergo: Vnum provenit in India: alterum in Persia. Indicum in India dicitur *Betel*: Persicum, à Persis *Tembul*. Fertur *Betel* provenire in Malabari locis potius humidis quam siccis: ex eo parantur *Pergulae*: cuius folia Indi in ore tenent & masticant, ut concilient oris gratum odorem. Hoc multis in Italica locis vituntur pro Folio Indo: reperitur & cum ramis Venetiis. *Tembul*, ut testatus est *Eccell.* *Michaël de Muri*, arbor est similis *Piperi nigro*, foliis *Tiliae* &c: Posset affirmari hæc duo foliorum genera esse duo Folia à nobis dicta: aliorum tamen iudicio relinquo. Nobis sanè non placet *Anguil.* recitata Foliorum historia, dubiorum sanè plena, quæ omnia hic explicare non est locus. In eo autem nobis potissimum lapsus videtur, quod *Betel* cum folio Indo vulgari confundit. Si *Tembul* est foliis *Tiliae*, cur Foli speciem faciat, non videmus. Consule caput de *Betre* siue *Betele*.

Audiamus *Matthiolum*. *Malabathrum*, quod plerique *solum Indicum* vocant, ait ille, qui hæc ætate viderit, habeo neminem. Non desunt, qui Indici folii loco *Cassia odorata* vel *Cinnamoni* folia suppedient, quæ esse *Caryophylli* existunt *Brassanolus*. Nonnulli præterea quædam arborum folia ex *Alexandria* aduectæ, quæ *Lauri* vel *Arbuti* frondes referunt, in *Malabathri* vsum venditant. Hæc *Hermol. Ruell.* pariterque *Brassanolus* eos secutus, nulla auctoritate, quod sciam, *Nigritarum Tembul* esse arbitrantur: verum cum adhuc eorum, qui *Tembuli* historiam & notas scribant, inuenerim neminem, quævis de eo *Auct.* breuiter scripserit: iccirco illa potius asseram arborum folia esse penitus ignota, quam illorum sequar opinionem. Nullo itaque modo hæc ad vsum veniunt admittenda. Nam cum eorum facultates nos lateant, non est, cur ea comprobare valeamus. *Plinius* præter *Diofcor.* sententiam præstantius *Malabathrum* dixit, quod saluum est [*Plinius* lectionem mutatam antea dedimus.] Vnum tantum fuit *Folium* apud Antiquos. Vnguentum *Malabathrinum* apud *Gal.* non differt à *Foliato*, quod *Folium* & *Malabathrum* duæcæ sint medicamenta, sed quod diuersa fuerit parandi eiusmodi vnguenta ratio. Non negauerim trium Foliorum à *Iuriconsultis* fieri mentionem, nempe *Malabathrinum*, *Barbaricum*, & *Pentaspærum*. Atqui ille titulus *Digestorum* pluribus scaturit mendis. *Pentaspæri* nullus Antiquorum meminit. Et agmè istud errorum [*Nam Cassiam*, itaibi legitur, *Turiana*, *Aroma Indicum*, *Alchelusa*, *Sargogalla*, *Omerabicum*, *Carpalum*, opus *Bussicum*, ferrum *Indicum*, *Folium pentaspærum*, *barbara*, mehercle, & magna ex parte inaudita vocabula, quorumque explicationem ne ex *Tripode* quidem haurias, & alia nonnulla quæ ibi deprauatè leguntur, Et legi debebat, *Cancanum*, *Thymiana*, *Ammoniacum*, *Agallochum*, *Sarcocolla*, *Gummi Arabicum*, *Carpesium*, opus *Byssinum*, *Ebenum Indicum*.] Satis superque arguit, nihil solidi, verique, de *Folio Pentaspæro* ibi haberi: quin etiam nec fortasse de *Barbarico* de quibus nihil apud *Theophrast.* *Diofcor.* *Gal.* *Plinium* posteritatis memorie traditum est. Quapropter non *pentaspærum* legi debere censeo, sed potius *Hadospærum*, aut *Mesospærum*, aut *Micospærum*. Nam trium horum, ut ex præcedentibus liquet, & *Plin.* & *Arrianus* meminit, non quod specie aut genere differant, sed amplitudine tantum, ut ex ipsius eorum

verbis patet non obscurè. Existimandum itaque censet *Matthiolum*. *Pentaspærum* non esse per se genus, sed ita deprauatè legi in *Iuriconsultorum Digestis*: existimatque vnicum tantum esse *Folium* nempe *Malabathrum*: Et *Syriacum* *Plinius fabulosum*. *Malabathrum* potius fabulosum esse, quam verum.

Errant præterea (addit idem) Recentiorum nonnulli, in censendo *Tembul* [nam quidam & *Tembul*, hoc quoque Foli genus faciunt, ut dictum.] quod putant hoc differre ab *Indorum Betel*. Nihil enim inter se differunt. Siquidem, quod Indi *Betel* vocant, Arabes & Persæ *Tembul* & *Tember* appellant. Id illi continuè mandunt, quod putent secundæ valetudini multum conferre, corporibus vires addere, Venerem augere, Cor & cerebrum robotare. Vbi autem copiosius edatur, mentem mouere. Idcirco mulieres *Tainasari* in defectu mariti rogam scilicet iniecit, tantum illas vocant ut amentes efficiantur. Id aqua aspergunt, qua soluta sit calx è conchis parata, ac rum demum vescuntur eo. Sed hæc perperam transcripsit nouus quidam reherbarum indagator, [*Anguil.* quippe qui hæc folia calce vel cinere circumuoluta ab Indis deuorari scribit: sed tam suaue obsonium nobis non vendit. Est *Betel* folium plantæ quæ *Hederæ Smilacis* modo arborescunt, neque per se consistere potest absque pedum necto. Floret nunquam, nunquam fructum profert: foliis est hæc planta *Citro æmulis*, nervis quibusdam secundum longitudinem discurrentibus, ut in *Plantagine*. Hæc *Alexandria Aegypti* ad nos pluribus antè annis comportatur. Nec desunt, qui loco *Malabathri* iis vitantur. Sed videant illi an rectè: mihi verò (insit *Matth.*) *Malabathri* vicem nunquam præstabant.

Atqui, mehercle, ipse etiam *Matthiolum*. parum sibi constat in tradendo vulgari *Malabathro*, siue folio *Indico*, & pleraque in postremis comment. omittit, quasi prius præter veritatem scripsisset: olim quippe ipsi duplicia Folia aduehebantur pro folio *Indico*, nempe alia, quæ folia *Cinnamomi* dicit, alia ex *Alexandria* folio *Lauri* vel *Arbuti*: quæ nunc nescio an doctior factus an cautior, folio plantaginis comparat. Enimvero sanè valdè veremur versutum illum plantarum *Metaplasten* [ut ita dicamus] de plantis sibi ignotis commentatum. Nec obscurè suam vel in eo prodiit ignorantiam, quod cum *Malabathro* siue folio *Indico* vulgari, arbore, plantam scandentem *Betre* vel *Betele* plurimis Neotericis dictam [de qua suo loco] confundit. Is præterea in postremis *Comm.* & *Eptome*, ni multum fallimur *Caryoph.* iconi appingit Folia *Indica* vulgaria, quasi eorundem essent Folia, id quod iam c. de *Caryophyllis* monuimus. In *Hist. Germ.* dicit è *Lusitania* sibi aduecta, quod antè siluerat, nunc fortè de nouo excogitauit. Sed nimis profectò crassa, & velleuco animaduertenda illa contradictio, quæ in vltima eius editione, illustrata per *Casp. Bauhin.* vno eodemque capite, nec ita multis interiectis lineis legitur in hunc modum: scribit *Arrianus* antiquissimus auctor, se magnam *Malabathri* copiam reperisse in quibusdam *Rubri maris insulis*, quarum oras & littora legebat. Et post: ait *filissimum* extare apud *Arrianum* se reperisse *Malabathri* copiam. Quam contradictionem mirum vel *Typographicos Lectores* adeò oscitanter præterisse, quam vel tyro quisquam simplici lectione deprehendisset, & vel ipsi *Matthiolo*, vel eius editionem collatoribus ac interpolatoribus securè hunc inconsiderantiam nœum inuississet. Quid sibi volunt tales *Scriptores* posthac à nobis credi?

*Syriacum Plinius fabulosum.*

*Betel.*

*Timber*

*Indorum Tainasari mulierum mos.*

*Anguil. not Betel quid.*

*Matth. plantarum Metaplasten.*

*Contradictio crassa in vlt. edit. Matth.*

*Interpolatores Matthiolum.*

Ipsæ præf. & Gailand. quoque in suo Theonē clamat lapsum Matthiolum in Malabathro, & Joho. hæcque medicamenta duo in vi um ab ipso confusa, quæ Apicio, Maruano Iuriconsulto, Galeno & Plinio latè distinguuntur. Paulus item Hællus in Defens. pro Gailand. ubi triplex Malabathrum fuit, Indictum, Syriacum & Folium, tantum abesse statuit, vt Plin. Malabathrum Syriacum idem esse cum Folio sentit, vt tria etiam huius genera fecisse eum putet, quæ omnia toto cælo ab utroque Malabathro discrepent. Sed si hec verum fieri, nondum comperimus, quod putat Hællus, per Gailandinum probatum, Malabathrum Indicum, Syriacum, & Folium, esse tria. Dioscor. enim historia Malabathi nascentis in India sine radice, falsâ esse videtur, vt antè dictum, nec id memorat Plin. quamvis cum Diosc. dicat in paludibus gigni Lentis palustris modo: nec quicquam tale percipimus ex Neotericorum Indicis navigationibus de planta in India nascente. Authoritas Iuriconsulti, cum non fuerit Medicus aut Herbarius, nec discrimina docuerit, parui facienda, nec maioris, quàm quanti fieret ab ipso Medici iudicium in explicandis legibus, quo tamen in multis ex necessitate egent. Cætera argumenta ab vngaentorum diuersis d. nominationibus desumpta parui momenti existimamus, & iam supra ipsarum magna ex parte explicata sunt. Cæterum non propterea asserimus vulgare Folium Indum esse Malabathrum Veterum: [quis enim in re tam accipiti & lubrica, & in tam obscura Authorum narrationis obscuritate ferat iudicium?] hoc tantum monitum volumus, in nostro folio Ind. cuiusque partibus quædam esse, quæ respondere videntur Cinnamomo Veterum, vt apparebit consideranti quæ scripta sunt ex eis cap. de Casia & Cinnamomo.

*Triplex  
Malaba-  
thrum.*

*Hællus &  
Gailand.*

*Diosc. histo-  
ria de in-  
dicis Ma-  
labathro  
folij.*

*Nulla Iu-  
riconsulto-  
rum autho-  
ritas in ar-  
te medica.*

*Folium no-  
strum Indu-  
m multis  
cum Vere-  
rum Cin-  
namomo  
conuenit.*

*Folium.*

*Betrum:  
Cinnamo-  
mylium.  
Cinnamo-  
mum ex  
Zeilam.*

*Cassia ado-  
rata folia.*

*Lacuna  
erret.*

*Nostræ  
folium esse  
Malaba-  
thrum.*

*Diosc. not.*

Quæ fortè animum adiecerunt Amato, vt tam confidenter scriberet, certum se esse, Folium quoddam Officinis hodie pro Malabathro receptum, non Betrū esse à nobis descriptum, sed potius Cinnamomi folium, vt Officinarum Sepiasarii quoque fatentur. Immo manifestius alibi Cinnamomum ex Zeilam appellat: foliaque quibus vestitur esse Iuglandis, quæ in Officinis pro Malabathro, falsò tamen vendantur. Sed interim in hac sua securitate ipsi metuedum fuerat, ne *Canellam* siue Cinnamomum nunc vulgò dictum, cum folio Indo Officinarum confunderet.

Lacuna quoque, Pharmacopœi [inquit] non cognoscunt Malabathrum: eius loco quidam assunt Cassiæ odorata folia, quæ est Canella: alii alterius, valdeque aromaticæ arboris, quæ adfertur ex Alexandria, & existimata *Tembul* Arabum. Nos autem suspicamur Lacunam nesciuisse quid scriberet.

Manardus se vix vnicum folium Malabathi vidisse affirmat, in eo sanè felicius nobis, qui nullum vidimus aut nouimus, quod tam audacter Veterum Malabathrum dicere ausimus: quod vnicum etiam ab eo visum vix Veterum genuinum fuisse putamus.

Pena & Lob. in Adu. titulo tenus, & maiusculis quidem literis, ceu edicto Regio promulgant. *NOSTRATÆ FOLIUM MALABATHRYM* est. Adhuc tamen mox: Nihil lubet aut licet asserere de Malabathro Antiquorum. Diosc. prodidit sine radice innatare paludibus, cum tamen nullo vsquam angulo totius Indię illius, quæ nostræ ætati multò notior est, quàm illis fuerit sua Græcia, compariuit hæcenus istud folium, quod nec expressit sa-

lis Dioscor. Vnde gēmina hesitandi occasio: primum notūne habuerit: deinde quā possit fieri, vllum vt sit folium, non modò sine caulis adminiculo, sed etiam sine radice, id est, sine ore. Quid si ortus & natales aliquantum deprauatē tradantur? Quare id sanè fuerit istud nostratē Malabathrum, iamdiu Arabibus cognitum, & hodie Italis Medicis vsu receptum, non modò quia in Malabar Indię regione cognomine oritur, sed etiam quòd propter eximias vires plus proportionis habet cum plantis aquaticis, quàm illa folia Cinnamomi aut Caryophylli, quibus folium Laurinum ferè est. Fibre verdè longitudinem ducit, cuiusmodi Potamogetoni, qui propter figure & natalium similitudinem, nonnullis inepetè folium putabatur: Nobis secus, cum huius folij apud Anguillaram & alios non multis abhinc annis vidissemus, quibus adhuc hærebant lignei pedicelli: & quasi furculi è ramis extracti, [quin potius integros ramos meminimus.] Cinnamomi autem folio & Caryophyllis facies ferè eadem, nūdus læuor, aromaticus, squassilodor. Temperamentum, crasis, modus & vsus non ita disparia sunt, & halitum commendant omnia, vt Diosc. Malabathro attribuit. Verum quid intelligent Pena & Lob. per folia Cinnamomi aut Caryophylli, ingenuè fatemur nos nescire. Olim Folium Indum existimabatur Cinnamomi aut Caryophylli: nec existimamus illud Folium quod Lobel. ex Clus. depingit fuisse vulgare aut in Officinis demonstratum pro Cinnam. folio: nam eius descriptionem à nullo traditam hæcenus nouimus, ac ne ab ipso Clusio quidem, qui pingit.

Quinque tradit Benedictus Malabathra, *stata* tuncque, *folium Indum* vulgare, de quo hoc agimus capite, diuersum à Malabathris Veterum: Præterea [quod plarè displicet] separat Malabathrum tertium ab Hermolao traditum à Pharmacopolarum folio, licet non sit diuersum, isque nostro iudicio sub nomine Bathri, confundere videtur cum folio Indo vulgari plantam dictam *Berre* siue *Berele*, vt postea plenius dicetur.

Cæsar. refert, allatos quondam ex Oriente furculos quosdam, cum folijs Laurinis & baccis, quod Folium Indum vocabant, quasi esset Malabathrum Diosc. Quosdam putasse esse Cassiæ aut Cinnamomi folia aut Caryophylli: alios rectius putasse esse *Tembul* apud Auic. de quo inquit, frigidum est in primo gradu &c. hocque [addit] videtur intellexisse Plin. Malabathi ex Syria nomine. Non esse autem hoc illud genus folij, quod Indi *Betellas* vocant. Atque quod furculos ex Oriente allatos attinet, fides penes ipsum esto. Non enim de ignotis iudicamus. Videat verdè Lector cap. de *Berre*, vbi docebitur Cassalpinum non bene distinxisse *folium Indum* vulgare à *Betelle* seu *Berre*, sed potius cum eo confundere.

C. Bauh. apud Matth. triplex facit Malabathrum 1. Diosc. quod apud Plin. secundum dicit. 2. quod Plin. primum ait. 3. Officinarum quibusdam Folium Caryophyllorum: aliis Cassiæ folium, aliis Canellæ, Trago Malabathrum: Cassia aromatica Cordo: Folium Indianum Acostræ: Folium Offic. Lobel. Fructus vocati *Tembul*, Fructus Canellæ nomine ad nos ex Italia missi. Non malè factum à C. Bauh. nostro iudicio, quod iconem ex Clusio apposuit Matthioli historię: sed bene interim quoque fecisset, si monuisset incautos studiosos à se etiam positam iconem horum foliorum pro Caryophyllis in falsâ iconē Tabern.

Præterea illud quoque notandum studiosis, cap. de Cinnamomo ex eodem Tab. arboris folij Indi



Indi vulg. baculos duos, vel lignum malè posuisse sub titulo Cinnamomi, sub quo etiam duos cortices Cinnamomi offic. siue vulgaris pinxit, & folium, quod Clusio Cinnam.

Sed vt tandem intricatam hanc Folii seu Malabathri inuestigationem concludamus : Malabathrum neque Indicæ Nardi folium est, vt verè monet Dioscorid. Neque id folii genus, quod Arab. *Berre*, Persis *Tembul* appellatur. Diligentissimus Garcias multò minùs Canellæ aut Caryophylli folium esse censet : sed sui generis Folium, non quidem in Syria aut Aegypto, vt voluit Plin. sed in India ex arbore procera decerptum, hodièque, vt dictum, etiamnum *Tamalapatra* dictum. Non innatat aquis, vt scripsit Dioscor. & hunc secutus Plin. Decepti quoque fuerunt Serap. & Avic. qui eiusdem historiam ex Græcis mutuati sunt : qui cum Malabathrum non norint : ex eorum scriptis aliis innoscere non potuit. Non colligitur, inquit Garcias, vt Dioscor. perhibet : sed collecta in fasciculos colligantur, atque ita vaneunt. Dilutiorè viridi colore nitent, non ex candido nigricant. Plin. in Syria & Aegypto nasci scribit : Medici Memphisici, Damasceni & Aseptini negarunt omnes. Non est tam validi odoris, vt Crocus, nec saporis Nardi, vt scripsit Plin. neque tam validi odoris atque spica Nardi, sed suauioris. Falluntur qui Caryophyllorum foliū esse asserunt. Scribit Franciscanus quidam in Aethiopia gigni, sibi que datum cum inscriptione foliorum Canellæ. Verùm in Aethiopia nullæ sunt Canellæ arbores, neque Folium. Addit Clus. ad Garciam : Folium Indum, quale hic autor describit, ad nos etiamnum adfertur : legitimum conui- cio ex Garcie descriptione : differt à Caryophyllorum folio &c.

Ceterum quod Folii Indi, quod in officinis habetur delectum attinet, deligendum recens, densius, crassius, maius atque integrum, quodque non facillè in partes minutas frangitur, quod tam gustu quam odore proximè ad Cassiam accedit, vt vult Cordus. Fragmèta verò & friatorum puluere medicamentis ne commisceas. Sed Syluius inter bonitatis notas postulat, vt ad albedinem declinet, quam ex Dioscor. desumpsisse videtur.

De succedaneis quoque solliciti fuerunt Medici. Nam eo deficiente, idem pondus *Thalisafar* substituunt, ex Auic. præscripto : quod quid sibi velit, Garcias fateor se planè ignorare. Clusius Macerem intelligit. Nec opus erat, insit idem, *alibani*, si diligentiores essent pharmacopola & medici Lusitani : siquidem tanta eius Copia hinc exportari poterit, quæ vniuersæ Europæ sufficeret. Eius autem penuria Canellæ foliis vitatur, si ea nascuntur : sin minùs, Spica Nardi, non autem Maci, vt voluerunt nonnulli. Vbi opus est Malabathro, & illud absuerit, Gal. Cassiam odoratam, vel Nardum Indicam supponendam vult.

Malabathrum Dioscoridi eadem cum Nardo vires fortitur, sed illud efficacius omnia præstat : tamen Malabathrum & vniuersa ciendi maiore vi pollet, & stomacho conuenientius est. Oculorum inflammationibus in vino seruefactum tritumque ac illitum apprime confert. Subditur & linguae ad commendandum oris halitum. Quin vultibus etiam vtiliter interponitur : eas siquidem & à tinea defendit, & odore non ineleganti tueretur. Ex eo olim pretiosissima fiebant vnguenta, de quo specialius idem tradit eodem habere quæ Nardinum spissamenta, Myrrhæ autem plusculem addit : qua de causa calscit, Crocino aut amaracino viribus respondens. *para-bathron* vocat.

Tom. I.

Apud eundem è Syriaca Nardo & Celtica Malabathroque Vinum paratur in hunc modum : singulorum minæ semissem in binos multi congios mitto, & post bimestre colato : Cyathum vnum cum tribus aquæ exhibeto. Bene facit hoc vinum nephriticis, ictericis, hepaticis, vrinæ difficultate laborantibus, decoloratis & stomachicis. Sunt qui Acori vnciam vnam aut alteram, & Celticæ Nardi vncias tres in multi amphoram adiiciunt. Plinio singuli succi nobilia vnguenta faciunt : Inprimis Malabathrum. Ipsum folium oculorum epiphoris vino expressum vtilissimè imponitur. Item frontibus dormire volentibus : efficacius si ex aqua bibatur. Cetera de viribus ex Dioscor. eadem habet. Iam prius ex Gal. diximus Foliatum vnguento olim Romæ fœminas ditiores oblini solitas : & oleum exprimi ad vnguenta ex Plin. & quàm variis immisceatur compositionibus apud diuersos autores. Vnguenti celebrem apud Veteres fuisse vsum, velex Horat. patet ad Pompeiunt Varum sic canente.

Pompei meorum prime sôdaliū,  
Cum quo morantem sæpe diem mero  
Fregi, coronatis nitentes  
Malabathro Syrio Capillos.

Martial. Epigr. II.

At mea ne libram foliari possit amica.

A quo Malobathratus eo vnguento delibutus. Quo vltus est Sidonius Apollinaris. In pretio quidem prodigio simile fuit (scribente Secundo) à singulis denariis ad trecentas peruenire libras, oleum autem ipsum in libras sexaginta. Confule etiam quæ supra ex Plinio de pretio tradita. Auic. Folium Indum calidum & sicum facit, in secundo gradu. Decoctum in quâ rosacea & tritum vtiliter imponitur apostematibus calidis, etiam oculorum, eodem autore.

Vinum  
Malabathrum  
Vini Sui.

Alum mûs  
dus.

Oculorum  
epiphor.  
Sonnæ cubi  
ciliat.

Pretium.

Apostema-  
ta.

#### CINNAMOMI NOMINE EXHIBITVM

Lignum : nobis Lignum Folii Indi  
Officinatum.



callus nodosarum arborum forte non esse eximè-  
dam hanc arborem arguit. Sapor ligno nullus;

Habemus  
penes Descriptio  
nos bacillos  
ligni Cinnamomi nomine  
exhibitos, palmo longiores, crassitudine plûsqum pollicari, materie inter duram & mollem media, coloris cinericei, pectusibus rectis, cum micis exiguis transuersis, in rectis fissiles, medullâ iunceam aquate, duriore multo : ex ipso medullitho emergens foratque vergens

Odor.  
Sapor.

odor in cortice tenui ambiente, cinericeo, rugosoque ad Cinnamomum aliquatenus accedit, in quo etiam sapor acrisculus, suavis, aromaticus, Cinnamomo haud ablimilis, multò imbecillior: nec mirum, cum iam ante annos triginta penès nos sit, nec bene ab iniuriis aëris tuti recte ve bacilli, & extra dubium sit, multos annos, partim apud alios, partim in itinere hæsisse.

Tales quoque fuisse videntur bacilli, de quibus Clusius: Cinnamomi, quæ, duos ramulos in Belgio vidi. Sunt ii recti, crassitudine pollicari, non enodes, sed nodis quibusdam siue ramulorum vestigiis palmum ab invicem diffitis insigniti. Cortex tenuis est, subcinerei quodammodo coloris, iucundi odoris, suavis gustus, sed qui sua acrimonia aliquantulum linguam vellicet. Lignum certè inodorum est & insipidum, non minus, quàm Salicis ramus, cui perquam similis est. Retinet autem cortex suavem illam cum odoris, tum saporis iucunditatem [tamen si totis quadraginta annis à sua matre reuulsi sint ramuli] atque eam etiam maiorem, quàm nostra canella, cuius folium Io. Placa Medicus in Hispania mihi dedit.

Nos præter Clusii iconem addimus & nostri bacilli non omnino teretis, sed per longitudinem fissi.

Cassia.

Scribunt Pena & Lobel. se Cassiam ad Cinnamomum verum proximè accedentem vidisse in Offic. Guil. Dries Pharmæ. Antuerpiensis, multorum iudicio putatum ferculum illum Cinnamomum, bacillo folido, fractu facili, Cinnamomæ cortice oblecto, cui etiamdum cuticella pullo colore obducta fuit. Folium verò seu pictum seu sicum, multis in locis videre est.

Hosidem Lob. in Hist. Belg. Cassiam, Canell.

Symmetroclit. Gal. canella. Hisp. & Ital. canella vocat. Item in Obler. & Icon. nomine Cassiæ proponit.

Lob. Pena

et Clus. sa-

ranitur.

Sed dum pressius bacillos nostros cum Clus. & Lob. bacillis corticæque perpendimus, non possumus nobis persuadere, vel hos vel illos esse Cinnamomi vel canellæ vulgaris: id quod facili discant, quibus eiusmodi ad manum fuerint: alios docebit cortex cinericeus, tenuis vnicus & simplex, nec alteri vel subiectus vel superiectus. Quin collata nostrorum bacillorum tam materie quàm cortice, magnam animaduertimus habere affinitatem cum ramis Malabathri vulgaris: [quales foliis præditos referuamus,] vt in eam ferè propendamus sententiam, vt ad Folium Offic. seu vt volunt Malabathrum potius quàm canellam referendum hoc lignum putemus.

Folium ca-

nella.

De folio Canellæ quod pingunt, non habemus quod dicamus, an sit Cinnamomi nec ne, quod nemo id describat. Icon sanè diuersum à folio Indo Offic. demonstrat.

Cassia ado-

rata.

Matth. scribit, Cassiæ odoratæ frustulam cum cortice & ligno suo interiore sibi dono dedisse Ferdin. Archiducem Austriæ, ab integro ramulo abscissum, quem ipse reconditum habebat. Huius corticem colore quidem cinereo à nostro vulgari Cinnamomo dissidère, non tamen odore ac gustu: quandoquidem mansum, id ipsum, quod vulgus Canellam vocat, ori planè repræsentaret. At lignum quod cortice concegitur, fragili constare materie: neque vilo prorsus odore saporèque commendari. Quare hinc faciliè colligi posse, corticis tantum eius vsum esse: atque etiam Theophrastum non absre memoriz prodidisse, huius virgas in frusta secari, recentique bouis corio hæc confui, vt vermiculis, qui ex eo nascuntur, lignum illud inutile erodatur.

Theoph.

Embarr.

Ceterum hoc quoque Matth. lignum idem putamus cum eo, quod à nobis descriptum, quodque Amato Cinnamomum dicitur, cuius verba postea tradentur: nam apertè dicit Cinnamomum esse cuius folia in Offic. pro Malabathro falsò credantur. Sed interim nescimus an faciliè possit lignum tam tenui contentum cortice, sine iactura huius à vermiculis erodi, vt Matth. de suo ligno ex Theoph. persuadere conatur.

Nostro iudicio Tabern. in tabella seu iconè à se propòsitâ pro Cinnamomo, ligni, quod descriptimus bacillos duos pictos habet, quemadmodum & C. Bauh. apud Matth. ex Tabern.

~~~~~

#### CANELLÆ FRUCTVS QVIBVS DAM, NOBIS POTIVS FOLII INDI.

Fructus quos supra in tabella iuxta Malabathrum depictos dedimus, glandium figuram ferè repræsentant. Calyci quippe pullo & superne cristato angulisque inæquali glandula immissa est rufescens & spadicea. Pediculo donatur crasso, lignoso, cupulæ concolori. Sapor Cinnamomeus aliquatenus, qualis Officinatum folii Indi, sed obsecurior, vel quia euanidus fructus, vel quia ad maturitatem non peruenit. Sunt plures quàm 35. anni, ex quo habemus hos fructus à V. I. Lerando Donnez: eodem etiam nos donauit Cl. Fel. Platerus. Sed plures ad nos cum aliis exoticæ raritatis nomine nobis gratissimis, insignis illa Medicorum Italæ stella Hercules Saxonia, sub titulo fructus Cinnamomi.

Cordus quoque prodidit Cinnamomum ferè fructum paruum, glandibus in acetabulis similem. Et Vib. Calu. apud Benzo. lib. 4. cap. 8. ponit descriptionem ex Aug. Zarat. Hist. Peru. cuius fructum ait esse calyce Subertino aut Quercino similem. Lectores considerent descriptionem positam cap. de Cinnamomo siue Canella vulgari, cum qua fortè confundit fructum Folii Indi.

Sed & Clus. testatur à Cortuso accepisse se fructum exiguum glandis forma, cum hac inscriptione: *Fructus canellæ* ex quorundam sententia, ex aliorum verò *Tembul* conuoluuli in India.

Eum quoniam dicitur interdum vnà cum folio Indo vulgari ad nos adferri, [quandoquidem Tembul fructus longè sit diuersus] folio Indo Clus. imitatione appingendum curauimus.

At Lob. in Obs. Fructum *Tembul* ait esse exiguum glandis figura, quadruplo minore: & tamen adpingit iconi folii Indici vulgaris, à quo si diuersum putat, non assentimur. Sed nec Clus. nec alii pro Tembul fructu recipiunt. Casp. Bauh. apud Matth. eisdem fructus *Canellæ* fructus nomine sibi millos testatur.

~~~~~


#### CANELLA ACOSTAE.

Canella arbor, vt scribit Acosta, Mali aureæ magnitudine est, nonnunquam maior, interdum minor, ramosa admodum, cuius teneriores rami recti sunt: folium Laurino simile, latius tamen, colore dilutior, & minus succum, tribus nervis insignitum. Flos candidus, odoris propemodum expers. Fructus sylvæstris Oleæ bacis par, viscens initio, deinde rufescens, & ubi plenam maturitatem consecutus est, niger atque splendescens, [quo tempore colligi debet] officulum intus conuenens sylvæstribus Olis simile, simili.





similique carne præditus, ex quo exstillat oleagineus quidam liquor suburefcens, odore baccarum Lauri, sapore acri cum paulillo amarore comisto. Præditus vero est hic fructus folioli parte paruo calyce, latiore, minusque crispo, quam sint Illicis calyces. Harum arborum magna est frequentia in sylvis prouincie Malabar: sed



*Folia Betre Descriptio*  
nomine missa, folio.  
qualia à plurimis annis in nostris Musæi thesauris habemus, circumscriptione & magnitudine cum Tiliaceis possent conferri, rotunda, nisi in mucronem, non sensim, sed mox d. fineret, glabra, atrourentia, tenuia, Potamogetonis modo, neruis quinque aut septem, partim rectis, partim sinuatis ad mucronem usque excurrentibus,

pediculo vnciali appensa, sapore aromatico, tenui, mansit nescio quid arenosi sub dentibus esse videtur. Nisi iam parata fuisset figura, cum descriptissimus, iuxtillemus ad latus tabellæ iconem ex nostro folio depictam.

Garcias aliam à nobis descriptionem habet, Descriptione hanc: Est Betre folium simile ferè Mili medicæ folio, oblongius tamen & per extremum arcuatus, venas siue Costas per longitudinem excurrentes habens, amarum. Optimum censetur bene maturum, colore fuluolcente, tamen nonnullæ mulieres præferant quod immaturum est, quippe

quod maiorem sonum edat in ore, dum masticatur. Corruptum si recens à planta collectum diutius manibus tractetur. Fert Betre in Maluccis fructum quandam contortum, Lacerti caudæ similem, quem istic edunt, quod bene illis sapiat. Fuit id semen delarum Malacæ, atque degustati optimi saporis inuentum est. Seritur autem vitis modo, addunturque stipites & pedamenta, per quæ repens se sustineat, nostratis Hederæ modo.

Aloisius Cadamustus tradit viros & feminas incedere per urbem Calecut, esitantes folium quoddam, cui nomen sit *Betelle*: eo infici dentes colore subrufo: hoc more abstinere tantum obsecuro loco natos: vbi verò ob funera pullam induunt vestem in speciem moestitæ, temperatæ si bi à folio huiusmodi, vt & dentes præ se ferant moerorè: subrufo colori succedere nigricantem. Verum Cadamustus colorem subrufum perpetuam Betele tribuere videtur, qui potius acceptus ferendus *Areca*, quam simul masticare solent.

Quoniam verò Betre à quibusdam *Tembul* Aui. existimatur, vt mox apparebit, hic subiciamus quæ ille tradit. *Tembul* frigidum est in primo, sicum in secundo ordine, stipticum & exsiccat: roborat gingivas: continuè masticant Indi, quia ventriculo confert. Belluni ad marginem annotat, *Tembul*. Haly l. 2. c. 34.

Lud. Rom. scribit, Regem Calecut quandoque adductum superstitione, ad annum à re Venereæ abstinere, & item animo destinare vesci nolle *Betellis*. Ea folia Assyrii mali frondis similitudinem exprimere, hæque frondes in cibatu habere gratissimas.

Sapor.

Dilectus.

Fructus.

Cibus.

Satio.

Scandens planta. Betelle.

Calecuta-norum mos.

Cadamust. n. Areca.

Tembul. Aui.

Regis Calecut mos.

Assyrii mali folio.

## BETRE SIVE BETELLE.

## CAP. X.

Non incommodè potuisset de hac planta tradi inter scandentes: Verum quia nonnulli Folia Indæ Offic. huius folia putant, atque adeo cum hac confundunt, placuit eius historiam hic referre.

*Folium Indum.*  
*Tembul.*  
Odoardus Barbosa de Ind. Or. in nauig. t. r. Betelle inquit folium, nostris *folium*, scandit arbores, &c. *Ethiopes*, Arabes, Persæ, vocant *Tembul*. Summarius quoque de populis Orient. Betelle ait, *folium Indum* dici. Et Ant. Pigafetta in nauig. Betelle vel *Berre* Persianis & Arab. *Tembul* dici affirmat, in *Itaha folia canella*: aliisque considerandum relinquit, sitne verum folium *Indum*.

*Folia canella.*

*Herba Tembor.*  
*Betole*  
*Pigafetta canel.*

Lud. Barthema in Nauig. Herbam *Tembor* & *betole* vocat. *betela* P. Aluares in Nauig. Ait sanè quicumque folia *candellæ* vulgò dicta eadem putant cum *betre*, manifestè produnt se in re plantaria nequitiam versatos, minùsque in cognitione Exoticarum. Vna arbor est surrecta: altera scandens, cuiusmodi plantas *abade spidus* Graeci vocant. Cap. de Malabathro monuimus in Nauig. libris pro *betelle* pingi folium Indi vulgare.

*Pam. Siri.*

*Betre*, inquit *Garcias*, in Malauar, in Decan, Guzarate & Canam, Pam: in Maleio, Siri. Halucinantur qui *Berre* folium *Indum* esse putant: in quo errore etiam versatus sum, cum primum in Indiam appuli. Auic. d. ueris capit. de folio & *Betre* agit. Illud *Cadegi* Indi hoc *Tembul* vocat, corrupto, ut videtur, aliquantulum vocabulo, quod ab omnibus *Tambul*. Verùm descriptio *Garcie* multum à nostra differt, quoad folium, & à pictura *Clusij*: nec multum dissidet eius descriptio à folio *Indo*.

*Locus.*

Est apud Indiam regio quædam, [ut perh bet Amatus] Malabar dicta, cuius maritimæ ciuitates sunt Batequala, Cananor, Calicut, Chalequa, Tanor, Cochym, Charamandel & aliæ plures quas Lusitani frequentant, in qua regione, planta magis nominis & pretii viticosa, quæ circumuoluitur arboribus folio viridi, perpetuo, amplo, persimili Nucis folio, quod à parte exteriori tribus latitis notis lineis ornatur, nam totum folium vndulatum est. Vocant Indici *Betrum* siue *Batrum*. Alii *Malabathrum*, &c. An Arabum *Tembul* sit, pro firmo, ut credam, ait ille, nondum statui. Suae deo, si *Betrum* hoc Indicum haberi possit [quod hodie verum ex India delatum Anconâ habemus, & ex Olyssipone.] nullum aliud desideretur Malabathrum, Folium dictum, quum omnia in Folio Indico desiderata, in *Betre* reperiantur. Et nisi tanta esset autoritas Diof. non vereretur affirmare nullum in India vnquam Malabathrum reperiri, præter hoc in India repertum cum antiqua voce. Verùm Plin. Malabathi duo facit genera: alterum palustre, de quo agit Diofcor. & omnibus hodie ignotum. Alterum verò arborescens à nobis delineatum. Hac Amatus. Sed si Diof. Malabathrum idem est cum *Betre*, non erit ignotum, quum ipsemet Amatus dicat vendi Vlyssipone. Curetiam *Betrum* potius Plin. arborescens Malabathrum dicatur, non videmus: suspicamur Amato non cognitum *Betrum* & confundere cum folio *Indo* Offic. ac præterea, ut postea dicemus, cum Cinnamomo siue *Canella* vulgaris.

*Betrum.*  
*Batrum.*  
*Malabathrum.*

*Folium Indum.*

*Malabathrum duo Plinio.*

*Amatus.*

*Tembul.*  
*Capreolis.*

*Tilrafolia.*  
*Locus.*

*Anguill.*  
*not.*

Anguill. ex relatione D. Michaelis de Muti, tradit *Tembul* esse arborem similem Piperi nigro, multis capreolis vitium modo pergulis adhaerentem, foliis Tilix similibus, cui nerui quales Plantagini, magnitudine foliorum Alni: Nec semen nec florem proferre. Foliorum tantum esse usum. Prouenire locis aridis & siccis in Persia, ubi incolæ soleant boni halitus ergo masticare cum aliis quibusdam mixta. Posse affirmari, vnum esse ex Folis Veterum. Videant Lectores quæ scriptum de Malabathro, ubi indicauimus nobis videri confundi historiam plantæ *Betel* seu *Betre*, de

qua hoc cap. agimus cum Malabathro siue folio Indo vulgò dicto.

An item Matth. probè fuerit cognitum folium *Betel* & folium *Indum* vulgare intelligent Lectores ex antè positis cap. de Malabathro verbis: veretur enim & ipsum confudisse, quemadmodum & Lacunam.

Quod verò Anguill. dixit nec semen nec florem *Malabathrum* gignere, satis refutatur testimonio *Garcie* & *Clusij*. Quorum hic tradit. Arboribus se implicat & circumuoluit *Berre*, eaque scandit *Hederæ* modo, cui perquam similia habet folia, teste Fabricio & pictura: fructum ex foliorum exortu promittit contortum, ut *Garcias* refert, & pictura ostendit. Cui cum simillimus videatur fructus à *Rassio* [Luteciano] ante decennium donatus, eius etiam iconem oculis subicimus.

Hist. Lugd. more sibi fatali duobus distinctis locis de hac tractat: primo sub nomine *Betre*. Deinde in appendice, titulo *Berre* *Garcia* ab herbo, ut incertum sit, an memoria defuerit eius compilatori, an stirpium cognitio, an vtrumque, rem eandem ad eò nobis seu repetitam *Crambem* obtudenti.

Linschott. in Hist. Or. scribit *Betela* siue *Betra* folia aliquantulum grandiora & acutiora esse quam *Mali* Medicæ. Alibi *Pisti* foliis persimilia dixit, pulchrè virentia, ut colore fortè tantum similia intellexisse videatur. Scandere arbores ac stipites ambire. Caulis quippe esse gracili ac obsequioso. Aquæ ad eò Piperi ita similem esse, ut à longè vicinum Piper à *Betella* vix discernas. Nullos autem fructus præter ipsa folia reperias. Idem in figura ænea iconem exhibet *Betelæ* nomine, sed angustioribus & longioribus foliis, quam in iconè *Clusiana* à nobis propolita.

Curtius ex Lusitanorum narratione scribit, eos regionem quandam nomine Malabar apud Indos inuenisse, ubi planta scandens folio amplo, perpetuè virenti, Nucis persimili, lineis tribus multum amplis & vndantibus. Incolis *Bathrum* dicunt esse apud eum pretiosam. Sed videtur nobis Curtius quoque hac sua descriptione confundere *Betelle* siue *Betere*, cum plantæ quam antè vocauit *folium Pharmacopolæ*, ut iam monuimus cap. de folio *Indo* seu Malabathro vulgari.

Bry frates annotant harundines *Betelen* adreperere, Piperis instar, ab eoque propter similitudinem vix discerni. Crescere simili modo, ut apud nos *Pisum* genera.

Non omittenda quæ *Cæcilij*, de hac planta tantum quam confusè prodidit. Malabathrum, inquit, ex Potamogetonis genere videtur esse: nam affertur ex India, quod folium *Indum* vocant, *Lauri* simile, cui tres venæ seu nerui discurrunt secundum longitudinem, iucundi odoris, sapore pingui ac sub acido. Huiusmodi sunt apud Calcutenses mandiolaptatis gratia: *Betella* patrio nomine vocant: ora mandentium, & dentes inficere colore subrufo. Putant quidam huiusmodi esse, aut *Cassia* folium, aut *Gryophylli*, quoniam earum folia *Lauri* vel *Mali* *Alyrii* traduntur. At qui arbores eas viderunt, ut *Betellas*, tantum rem diuersam tradunt, ut videre licet apud *Lud. R. m.* & *Alo.* *Cadamustum*, & alios, apud quos & pictura eiusdem folii traditur: neque fuerit *Tembul* Auic. Consideranti igitur Potamogeton folium in nostris paludibus, & figura, & neruis tribus discurrentibus maximè affine huic folio esse, nullum videbitur absurdum, si hoc Malabathrum statuamus apud Diof. Contendit *Garcias* Malabathrum esse Indiæ arborem ingentem in ficcis



siccis natam. De *Betellis* autem, inquit, in insulis Molluccis fructum ferre simile caudæ Lacertæ, nasci vbiq; in maritimis Indiæ, ac in mediterraneis nequaquam, nisi transferatur, egere aquarum irrigatione continua. Ex quibus significatur plantâ palustre esse, similem quoq; fructui nostro Potamogeto, intelligique pro Malabathro Diosc. Quod autem *Tamalapatra* vocant Indi, esse genus arborum, quod scribitur à Plin. & apud Auiem. *Tembul. Sic illa.* Sed nihil aliud quam Folium Indum vulg. cum *Betelle* dicto confundere videtur, vt iam suo loco dictum. Fallitur & in eo quod putat inficere colore subrufo: nam propter *Arecam* seu *Fausel* euenit ille colos, quod simul masticant. Quæ de similitudine cum Potamogetone dicit, & obscura nobis videntur, & minus apte quadrat. In Potamogeto enim plures nerui quam tres. Nec tantummodò irrigatione indigent palustres plantæ sed in aquis aut certè iis proximè nascuntur. Potamogetonem certè vix videas extra aquas natum. At testatur Anguill. prouenire eam plantam, (quam paulò ante ex eodem descripsimus, & nihil aliud quam *Betelle* esse videtur) in locis aridis & siccis Persiæ, quamuis vel ex *Garcia* & *Linschotani* historia minus verisimile videatur in Persia nasci, vt in sequentibus patebit.

Quicquid sit, difficile putamus & difficultatibus plenum *Betelæ* Malabathrum Dioscor. dicere, licet *Lacuna* dicat: In Malabar herba valdè odorata, aromatica, visque aded cardiaca, vt ore contenta sustentet hominem per quinque vel sex dies, *Betelæ* dicta, sine dubio Malabathrum est.

*Calp. Bauhin.* apud *Mithiol. Betel seu Tembul* ait esse Folio Indo aded simile, vt idem esse multo credant & misticant, Sed misticant quantum velint, non ideo tantam eorundem similitudinem tam confidenter asserere ausimus, præsertim cum ex fide dignis autoribus constet, huius esse summam arborum *Betel* verò plantam scandentem, vt iam plus satis inculcatum.

Cæterum *Betelle* folia, quæ vulgariter Indis in vsu sunt, quotidianâ manducatione, in omnibus item Indiæ Lusitanis cognitis plagis crescunt, teste *Garcia*: non quidem interiore regionis (seculu vel continenti, nisi raro admodum, sed maritimis in locis, aut si ex his in illa transferantur. Verum quidem est in *Dultabado* vrbe opulenta in *Decan* & *Bisnagua* inueniri, sed minori certè quantitate, quam vt ad Persas & Arabes deferatur. Supra *Calaiate*, quod octoginta leucis ab *Ormus* distat, inueniri haud erit facile. In frigidis, vt in China, non nascuntur, neque etiam in valdè calidis, aut à Solibus nimium adustis, vt in *Mosambica* & *Soffala*.

Seruiutis modo, prius dictum. Quidam maioris quæstus gratiâ Piperis aut *Arecæ* arboribus id maritat, atque ita pulcherrima vmbacula cōficiunt. Multam verò curam & assiduum irrigationem desiderat. Atque aded singulari cultura in pretio ab incolis habetur, ob quotidianum eorū vsum. Nā decrepta per longum etiam tempus facile conseruantur, ac dīdenariis venduntur. Ibi tum mulieres iuxta ac viri quouis die tria ac duodenaria, & quod excurrit consumunt, non quidem prandii aut cœnæ gratiâ: sed ita illorum mos fert.

Matutino tempore, pomeridiano, vespertino, imò etiam nocturno *Betellam* maducant, eamque cōtinuò manib. gestant. Sed nec simpliciter *Betellam* vtuntur: nam masticata, amara deprehenditur. Ergo ad mitigandam hanc eius amaritudinem, a-

recam admiscunt, & calcis momentutū, sicque præparatam, suauissimi esse saporis affirmant. *Garcia* sanè, cum primū degustauit, propter amarorem ita displicuit, vt ab illo tempore semper abhorruerit, nec vnquam degustare potuerit. Alii *Betellæ* Lycium admiscunt: diiores & potentiores *Caphuram* de *Burneo*: *Alilignum Aloes*, *Molchum* & *Ambarum cinericium*: atque eo modo præparat asuauem gustum habet, orisque halitum aded commendat sua fragrantia, vt perpetuò ferè illam masticent opulentiore, tum etiā alii pro facultatum ratione, tamen si non desint, qui *Arecam* cum *Cardamomo* aut *Caryophyllis* masticent.

In terræ interioribus plagis à mari remotis folia hæc magno venduntur pretio. Ferunt *N zamoxæ* Regem quotannis 30. millia aureorum Lusitanicorum, quos *mileseros* vocant, impendere. Hæc tragemata illorum, hæc dona, hæc iter agentibus propinant. Hæc Reges ipsi ditionibus largiuntur, aliisque per famulos. Iter facturo *tramenæ* ex *bysso* donantur eum præparata *Betella*: neminem autem absque eo munere liberè abire: est enim diplomatis loco. *Satrapæ* ac Reges famulorum continuum habent, qui cum argentea phiala vbiuis locum illis adfiliat. In ea *Betella* acetum condimentis necessariis, quibus folium præparatum famulus porrigit. Legati non audiuntur licet ipse Rex inquam calleat, nisi per interpretem, tuenda auctoritatis gratia. Ipse interim Rex decumbit, vel *ut* *Leo* infidet terræ iniecto, famulo cum *Betella* adstante, quàm continuò dentibus tent, succumque ac rel quas in argenteam peluam inspuat, quæ adstat, vel à famularum mulierumque aliqua tenetur. Hæc magno honore Legatum adficiunt, præsertim cum & illi Rex *Betellam* offert. Ita recepto more omni in loco ac ad actus omnes *Betella* adest.

*Satrapæ* ac Indiæ reges pilulis ex *Arecca*, *Cata*, *Pilula*, *Camphora*, & *Aloë* cōiunguntur, cum *Ambaro*. Eas cum *Betella* loco *Arecæ* manducant.

Lusitanorum mulieres eundem *Betellæ* manducandæ morem habent, cum sine ea vitam vix sibi constare posse arbitrentur. Ideò nocturno tempore ad caput aut iuxta pedes lecticæ apponitur, ibi somno cessante, mox illis *Betellæ* os inficit, quam tum velut fluentem sanguinem quæ colorem ab *Arecca* admixta conciliari supra dictum: expuunt. Ita interdū (alio enim exercitii genere præter ablutiones carent) mulieres otiosæ, eandem veluti pecora ruminant. Etiam Lusitani consuetudine mulierum inducti, idem faciunt. Etiam ad coniugii vsum proficiscentes mulieres *Betellam* manducant, quod per eam lasciuam augeri, atque aded *Veneris* summam esse illecebram opinentur. Inde in visitationibus ac mutuis salutationibus *Betella* ipsis in manu est, & summâ beneuolentiæ significatione, vbiq; ea offertur cum calce & *Arecca*, in catino ligneo, quæ ad eum seruant vsum. Quamobrem omnibus in locis *Betella* venalis ac iam cum prædictis præparata prostat. Primum autem ex *Kaata* aliquid ex *Arecca* sumunt, idque mandant ac mox *Betellæ* folium adiungunt, quod neruis seu costis vngue pollicis, quem acutum recepto more habent, excerptis, calce vngunt, ac ita rotatum ori inferunt, succum priorem inde expuentes certo ad purgationem cerebri ac stomachi à phlegmaticis humoribus remedio. Quod expuunt cruorem representat, vti dictum: succum alterum deglutiunt. Indi communiter per plateas & vicos *Betellam* hanc edentes incedunt, præcipue cum

*Betella cū aliis mixtura.*

*Oris halitus.*

*Veneris illicium.*

*Kaata.*

aliquem ex Optimatibus conuenire volunt : ita enim bonum odorem halitus comparant, absque ea qui sermonem facit, probro seque excipitur. Ideo omnes illam etiam post prandium sumunt, quoddam cibi alter fastidium [ut sibi persuadent] paterentur : & qui coindere suum non abstinent, eos corrupto halitu oris laborare deinde existimant. A Betella tamen abstinent certis temporibus, in funere alicuius propinqui, & quibusdam ieiunio destinatis diebus, ut & quidam Arabes faciunt, ac sequaces Ali Machometi Soceri, in suis abstinentiis dicatis diebus.

Errat, [inquit Paludanus, & ante ipsum Garcias] Aui. cum folia hæc primo gradu frigida ponit, & sicca secundo : idque vel interpretis vel certe ipsius auctoris errato commissum : aut exemplar vitiosum est, quod eruditi Arabes arbitrantur. Nam folia hæc calida sunt & sicca in fine secundi gradus, ut Garcias ipse experimento dicit, quam notam odor gustusque approbant. Ut mirum sit Maffæum in sua Historia scribere Principes Indos hæc folia assidue mandere leuandæ sitis gratia. Nam quâ ratione calida & sicca siuum leuare queant, equidem nescimus.

Sed nimirum bonus ille vir, medicina ignarus in hoc vulgi errorem secutus videtur, utpote cui, ut annotat idem Garcias, Piper, Cardamomum, Cepa, sunt frigida.

#### COCA INDORVM FOLIS MYRTI.

##### C A P. XI.

DE Coca sequentia scribuntur à Monarde iuxta Clusii interpretationem : Cum tam multis annis celebrem illam apud Indos plantam, quam Coca nuncupant, & tanta cum diligentia serunt atque colunt, quoniam omnes eam in quotidianos suos vsus & oblectationes conuertunt, videre cuperem, ad me perlata est. Est verò ea vlnæ magnitudine, foliis Myrti paulò maioribus [quæ veluti aliud solum simili forma in medietullo delineatum habent] mollibus, dilutius virentibus : fructu racematim coherente vti Myrti fructus, rubente quando maturescit, eiusdemque magnitudinis, quando verò plenam maturitatem adeptus est, nigricante : tum verò herbæ est messis, quæ collecta in canistris, aliisque rebus ad exsicccandum reponitur, ut melius conseruari & in alias partes transferri queat : nam è montibus in alios montes deferitur mercimonii gratia, proque aliis mercibus commutatur, vestibus, gregibus, sale, & aliis rebus, quia illis pro pecunia est.

Benzo huius quoque meminit, cum dicit, Peruaniani peregrè profecturi rubro quodam Bitumine faciem oblinunt, aduersus ventos : herbamque ore clausam [Cocam illi appellant] velut pancrestum quoddam Pharmacum circumferunt. Quippe eius præsidio freti, integrum diem, nullus nec cibi nec potus egentes, iter faciunt. Atque hoc quidem herbæ genus earum rerum, quibus mercaturam exercent, præcipuum est.

Cæterum, inquit Clusius, quotquot Peruanam Historiam scripserunt, referunt earum regionum incolas, admodum delectari quarundam radicum ramulorum, aut herbarum gestatione in ore, ut Orientales suo ære delectantur : præsertim verò familiarem esse [Petri Cieca testimonio] quandam herbam Coca illis dictam, quam à summo mane ad noctem vique perpetuè in ore

retinent, tamen neque eam mandant, neque deglutiant. Percontati cur eam assidue in ore habeant, respondent eius vsum neque famem aut sitim sibi molestam, & vires roburque sibi confirmari. Est autem hæc pumila arbor, folio [quod Coca vocant] Myrti, vel ut alii volunt, Rhois coriariorum. Eius arbuticulæ folia Sole desiccata oblongis angustisque canistris circiter libras 25. continentibus reponuntur in vsum quotidianum. Seditur hæc arbuticula magna cura, plerisque locis in conuallibus montium, quos incolæ Andes dicunt, à ciuitate Guamanga, vsque ad eam quæ ab argento, Plata, Hispanis nomen mutuata est. Cæterum tanto in pretio est apud eos ista coca, ut illam auro, argento, panique præferant, & anno Domini 1548. & aliquot subsequentibus, singulorum hereditatum, in quibus fertur pretia, alia octoginta, alia sexaginta, alia quadraginta, alia viginti ducatorum millibus singulis annis æstimata sint. Postea verò adeo eius cultura studuerunt, ut nunc vilior sit, nunquam tamen desinit summo in pretio esse : imò plerique iam in Hispaniis viuunt, qui solius coca mercimonio distingi uisere.

Vulgaris est Coca vsus inter Indos ad multas res, tum ad eas quæ ad iter necessariae sunt, tum ad eas quæ ad voluptatem in suis ædibus seruiunt, hoc modo : Conchyliis aut ostreorum conchas, vrun, & calcis modo comminunt : folia deinde Coca dentibus atterunt, & subinde puluerem illum conchyliorum vstorum admiscunt, & simul quasi fermentant, ut tamen nunor sit calcis quàm foliorum quantitas : ex hac massa trochiscos, seu orbiculos conficiunt, & sicandos exponunt. Quando iis vti volunt, vnum orbiculum in ore sumunt, eumque exugunt, subinde in ore nunc hæc, nunc illac versantes, & quamdiu possunt retinentes : vno assumpto alium sumunt, deinde tertium : sic pergentes toto tempore quo in longis itineribus conficiendis opus habent, præsertim si per loca fiant, vbi nulla aut cibi aut aquæ copia est : quoniam horum orbiculorum sollicitudine, famem, sitimque sibi leuari, & vires sustentari asserunt. Si duntaxat voluptatis gratia vti volunt, solum Cocam mandunt, eamque in ore versant, donec omnis facultas assumpta sit, deinde aliam sumunt. At si inebriari, aut aliquantulum extra se rapi, & veluti mente alienari, Coca Tabaci folia admiscunt, atque simul mandunt & sudent : ea ratione extra se feruntur veluti homines ebrii, magnam voluptatem inde capientes. Et profecto res admiratione non caret, conspiciere quàm isti Indi oblectentur mente & sensu quasi priuaci, quandoquidem eius rei gratia cocam cum Tabaco fumant, aut solum Tabacum.

#### DE CINNAMOMO ET CASIA EX PLACITIS ANTIQVORVM.

##### C A P. XII.

Nihil lubet aut licet asserere de Cinnamomo & Casia Veterum, quando ex eorum monumentis tam consulam habeamus historiam, ut fatius ducamus tantisper hesitare, aut etiam nos nescire fateri, donec certiora rimemur, quàm de Præcis minùs benè sentire, aut ab erudita posteritate parum gratie inire. Illi namque adeo laxa notione rem signarunt, ut quid capias, nescias : quos, antequam de nostro Cinnamomo tradamus, priùs de suo vel differentes vel narrantes, [ & v.



( & vñam interdum quosdam non etiam fabulantes : ) audiri par est : subinde quid nostræ aliorumde obseruationis ac iudicii sit, interferi.

Scribit Auit. lib. 9. hist. an. c. 13. In Arabia Cinnamomum Auet. [ *κιννάμωμον δένδρον* ] appellari, quam Cinnamomum [ *κιννάμωμον* ] comportare, ac nidos ex eo conficere tradunt : quamvis vbi & quomodo nascatur hæc planta, non assignent. Nidificare in exelsis arboribus & ramis : sed incolas sagittis plumbatis nidos petere, atque ita decussum in terram Cinnamomum legere. Eadem & Solinus scribit, de Arabia transans, additque Cinnamomum hoc amplioribus vendi pretiis, quippe quod mercatores magis probent, quam aliud : sed auiem ipsam non Cinnamomum, sed *Cinnamum* vulgò appellari.

Aristotelis verba & Plin. repetit. lib. 10. cap. 33. sed auiem Cinnamologon vocari ait in Arabia, & Cinnami furculis nidificare : plumbatis eos sagittis decutere indigenas mercis gratia. Postea vero lib. 12. cap. 29. huius narrationis vel inmemor, vel eandem dissimulans, vel sanè reprobans, inquit : Cinnamomū & Casias fabulosè narravit antiquitas, princepsūe Herodotus, auium nidis, & priuatim Phœnicis, in quo sita Liber pater educatus esset, ex inuisuribus arboribūque decuti, carnis quam ipsæ inferrent [ ipse inferret. M. ] pondere, aut plumbatis sagittis. Item Casiam circa paludes [ gigni ] propugnantem vnguibus dico vesperilionum genere, aligerisque serpentibus : his commentis augentes rerum pretia. De Cinnamomi natalibus, delectu, pretio vario, colligendi more & c. plura Plinius, quæ breuiatī studentes prætermitimus, cum præsertim pluraque sint Theophrasti, ex cuius scriptis huc postea referentur.

Serpentum fabula ex Theophrasti. lib. 9. hist. c. 5. ita habet, ipso etiam fabulam vocitante. Conuallibus, inquit, exire id auium, in iisque serpentes plurimos conuolari, morsum hominibus mortiferum inferrentes, aduersum quos incolas leptis manibus pedibusque decedere, atque ita legere Cinnamomum quod cum deportauerint, ac in tres partes diuiserint, inire cum Sole fortiendi rationem : tum quæ portio illi obtigerit, eam relinquere : abeuntēque flagrare eam spontē confestim cernere. Sed hoc planè fabula est. De Cinnamomo & Casia [ *κιννάμωμον & κασία* ] eodem Theophrasti, autore, ista narrat : vtrumque fruticem esse non magnum, sed magnitudine Vitis seu Agni, [ *ἀγνός* : perperam Gaza Ametina reddidit. ] multis lignosisque ramis constantem. Cinnamomum excisum in quinas partes diuidi : Id optimū esse, quod germinibus proximum fuerit : quod ad palmi longitudinem caditur, aut paulò maius. Bonitate proximum, secundum, quod sequitur, quod & breuius caditur, esse & tertium & quartū. Vltimum omniumque vilissimum, quod radici proximum : quod minimum corticis habeat : is enim vtilis est non lignum. Quam ob causam quod ex cacuminibus decerpitur omnibus præfertur, quia plurimum corticis habeat. Hæc quidem ita referunt. Alii fruticosum esse Cinnamomum aiunt. Duo eius esse genera : nigrum & candidum. Atque de isto prædicta fabula narratur. Casiam verò aiunt virgultis constare crassioribus [ *παχύτεραις πρὸ μακρύτεραις* ] rectè legere nobis videtur Gaza. ) valdè neruosis, nec suo cortice exui posse : vtilem verò esse huius corticem. Quando igitur secant virgas, in frusta duorum digitorum [ *ὡς δινδύκτου τοῦ ὀνόμου* : Plin. habet longitudine binum cubitorum ] aut paulò maiora confecant,

recentique bonis corio ea consuunt, tum ex eo & lignis putrescentibus vermiculos nasci, qui lignū exedant, corticem verò nequaquam attingant, ob amarorem odorisque acrimoniam. Atque ita quidem de Casia & Cinnamomo referunt. Gignitur Casia & Cinnamomum regione Arabum, media circi Sabe & Adramyta, & Citibæna, & Manali. Per Cinnamomum Caryopum Plinii Guiland. intelligit Nucem moschatam. Frutex & Casia est, *Casia de-* inquit Plinius, iuxtaque Cinnami campos nasci-*scrip. Plin.* tur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui-  
cute veriùs, quàm corticē, quem contra atque in Cinnamo leuari & exinaniri tenue ac gracile esse] pretium est. Amplitudo fruticis trium cubitorum : Colos triplex. Cum primū emicat, candidus, pedali mensura : deinde rubescit addito femi-  
pede : ultra nigricans. Hæc pars maximè lauda-*Colos Casia triplex. Candidus. Rubescens. Nigricans.* tur, ac deinde proxima : damnatur verò candida. Confecant furculos longitudine binum cubitorum. [ Digitorum aut paulò ampliores Th. ] Probatur recens maximè, & quæ sit odoris mol-  
lissimi, [ grauiissimi alii. Cur non gratissimi potius? ] gustūque quàm maximè fetuens potius, quàm lento tempore leniter mordens, colore purpureo, quæque plurima minimū ponderis faciat, breui tunicarum fistula, & non fragili. Latam (Ladam Vet. Ladam CH. fortasse Achy. vt apud Dioscor.) vocant talem barbaro nomine. Alia est Balsamodes, ab odore simili appellata, sed amara, ideòque vtilior medicis, sicut nigra vnguētis. Pretia nulli diuersiora. Adulteratur ityrace, & propter similitudinem corticum, Lauri tenuissimis furculis.

Cinnamomiferam plagam postremam ad meridiem habitatam nouimus, inquit Strabo. Habet India quæ Australis est Cinnamomum, Nardum & alia aromata, quemadmodum Arabia & Aethyopia, cum his Sole persimilis sit. In scelericissima quoque Sabæorum terra Cinnamomum nascitur : pro combustibili materie, Cinnamomo & Casia vtuntur. Aromatiferam regionem in partes quatuor diducunt. Ex aromatibus Thus, & Myrrham ex arboribus esse dicunt : Casiam verò ex lacubus. Sunt qui dicant magnam eius partē ex India adferri. Sed alia quadam diuisione totam scelericem regionem in quinque regna partiuntur, quorum aliud habet eos, qui opificia & artes tractant : aliud Myrrham fert, aliud Thus : eadem tamen & Casiam & Cinnamomum & Nardum ferunt. Sed quænam Casia illa Virgiliū de qua agit Georg. 2.

O fortunatos nimium, sua si bona norint,  
Agricolæ : quibus ipsa, procul discordibus armis,

Fundit humo facilem victum iustissima tellus.  
Si non ingentem floribus d. mus alta superbis  
Mane salutantum totis vomit adibus vndam.  
Nec varios inhiant pulchrâ restudine postes,  
Illudæque auro vestes, Ephryciæque ara,  
Alba nec Assyrio fucatur lana veneno,  
Nec Casia liquidi corrumpitur usus Oliui  
At securæ quies & nescia fallere vita.

Equidem existinamus Virgilium hoc loco intelligere Casiam Aromaticam, diuersam ab ea quam eo ipso lib. humilem Casiam apibus gratam ait, de qua postea c. proprio.

Sed quæ sit Casia frondens apud Colum. l. 3. c. 8. non æquè facile fuerit pronunciare. Sic scribit : Tmolon, & Coriicion florere croco, Iudæam & Arabiam pretiosis odoribus illustrem haberi, sed nec nostram ciuitatem [ Romam ] prædictis egere stirpibus, quippe cum pluribus locis vrbis : iam

*Colos Casia triplex.*

*Candidus. Rubescens. Nigricans.*

*Apulteriu.*

*Locus Straboni.*

*Ligni scilicet præbent.*

*Casia ex lacubus.*

*Casia Virgiliū duo genera.*

*Casia Colomella.*





terris arca cubitos quatuor & medium longa Romam perlata cum fuisset, in qua Cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eoque M. Antonino Imp. Antidotum quandā composuissent, ipsa eam multum prætare deprehendit, ad eam ut lupator quoque eā degustata, medicinarum concordationem, velut in aliis fieri solet, expectare noluerit: Sed statim ea vñs sit nondum integrè duobus mensibus elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec Theriacæ, nec Cinnamomi curam illam habuit, sub quo non solum arboris illius, quod superfluerat, omne dissipatum est, verum etiam quodcumque post Adriani tempora comportatum fuerat. Quo factum est, ut nunc Imperator noster Severus, cum me sibi theriacam eo modo cōficere iussisset, quo M. Antonino consecerat, ex Cinnamomo Traiani & Adriani tempore reposito sumere coactus sum, imbecilliorque planè mihi visa est, & tamen nondum annitriginta intercesserant. Hinc optimi Cinnamomi notas quasdam necessarias subieci mus. Sauium per se ipsum bene olere, inexplicabilemque præ ceteris bonum quandam odorem spirare, ac calidum gustantibus se multum exhibere. Non ita tamen ut medicando tristitiam palato inferat. Colorem denique talem habere, qualem si quis lacti nigrum colorem admisceat, atque soruleis, quæ vocantur, aliquantulum addat. Ex hoc igitur quantum volebam, ut mos mihi fuit, cum accepissem, ramusculos aliquot apud me deposui, in ea apotheca, in qua res meas omnes pretiosas seruabam. Verum ipsa combusta, quæ tempestate & templum pacis incensum est, & hæc, & aliæ quinque Cinnamomi species, quas mihi conquisueram, perire. Nunc itaque cum Imperatori nostro Severo theriacam componerem ex Cinnamomo Adriani tempore reposito, quod optimi visum est, elegi, de quo etiam utile quiddam leaturis subdere, cum possim, id facere non grauabor. Super sunt adhuc ibi multa vasa lignea, quæ varias Cinnamomi species continent, quarum nulla tamen veluti truncus in ramos plures diuisus, multum attollitur, sed Ellebori figuram præfert. Immo verò Damasceni quod è Creta ad nos adfertur. Quævis autem Cinnamomi species ab una radice, seu frutem quidam paruos confurgit, emittitque hæc sex, illa septem virgulta, vel paulo plura paucioræ: non æquali tamen omnia longitudine sunt, verum quod maximum est, pedis Romani dimidium non excedit. Vriueris autem Cinnamomi natura similis est quodammodo optimæ Casiæ, quam qui adferunt Barbari Gizi vocant. Item de Antid. lib. i. cap. n. Ob similitudinem optimæ Casiæ in Cinnamomum euadit. Vidimus enim alias frequenter Casiæ elatæ & auctæ tantum, ut fruticis magnitudinem æquaret, ramos quosdam Cinnamomo penitus similes aspectu, corticis tenuitate, præterea huius signis quæ Cinnamomum certissimè ostendunt, ac gustu olfactuque percipiuntur. Item cap. i. in multis de medicina libris scriptum est: duplum Casiæ si quis Cinnamomo egeat iniiciendum. Hoc dictum irrident Satyrus magister meus, vnam ex Quinti facetiis ipsam esse dicebat, assuecantis eos qui duplum Casiæ imponere iubent, si Cinnamomo careamus, similia illis facere, qui nos censeant si quando Falerno caruerimus, illius quod in Cauponis venditur duplicata mensura bibere: si quæ panis siliigneus desit, fursuacæ duplum comedere. Mihi verò hæc Quinti facetia si de re vna quapiam, qua per se sola uti velimus afferatur, vera irreprehensibilisque videtur: sin de re

quæ in societatem multorum veniat, non est eodem pacto vera. Nam cuiuscunque quod solum corpori adiuuari debet, Rhus puta, Absinthium, Iris, Géciana, vel id genus alia aliqua medicinalia: si quis minus boni duplum loco præstantissimi accipiat, & corpori vel extra, vel intra admoveat, duplicato etiam nocebit. At si multis vñ aliquod optimum commiscendum fuerit, quod se aucturum aliorum vires spondeat, si præstantissimum desit, peius nihil erit vti duplo illius quod proprietates eiusdem generis habeat, etiam si deterius hoc illo videatur. Siquidem Casia & Casia, Cinnamomo genere proxima usque ad eam est, ut ex ipsa Cinnamomum quandoque oriatur, spectentque nonnunquam Casiæ arbores in eam præ, in quibus aliqua Cinnamomi virgulta è Casigrauis prodeant. Mihi reliendum omnino non videtur eorum præceptum, qui pro Cinnamomo duplum Casiæ imponendum censent, quamquam ego semper imposuerim ipsam Cinnamomum. Nam quibus Romæ antidotos composui, cum vel Imperatorum amici, vel diuites essent, facile fuit illis quidem à regibus petere, iis verò Cinnamomo nam emare. Quibus illud etiam addidit, quando Imperatoribus antidotos composui, me Cinnamomo nunquam egisse, superuicaneum planè fuerit. Necesse est illud etiam in primis explicemus quæ Casia Theriacæ iniicienda sit. Nā Gizi nuncupatam præcipue laudant, secundo autem loco Mors dictam. Sunt & qui Arebo Daphnæque probent. Ceterum Gizi quam vocant in omnibus Cinnamomo si non lem esse sapientius quoque diximus. Hæc est quæ ab aromatum peritis petinde atque Cinnamomum assidue venditur. Quamquam Andromachus iunior Casiam à quibusdam fistulam appellatam imponendam arbitrat. Hæc omnibus cognita est. Nam & vtilius ceteris venditur. Cuius exterior cortex fistula appellatus, quia ob uolatus ipsam repræsentet, saporem & odorem validum habet. Interior autem pars debilis ad eam est, ut nullum vñ præstet. In carminibus istaque Patris [quorum narrationem habes lib. i. de antid. cap. io.] Casiæ nomen absolute pronuntiatum est. In soluta verò Filii oratione fistulæ nomen Casig adiectum est. Atque ab eo series per eos qui ante nos theriacam Imperatoribus composuerunt, in nos usque derivata, fistulæ nomen nunc usque appositum feruat.

Item de Theriaca ad Pisonem cap. 12. Casia cinnamomique non modica est differentia, quæ plurimos fallere consuevit. Nam & adulteratum cinnamomum licet vero sit simile, gusta tamen & olfactu multo deterius esse deprehenditur, atque à Xylocinnamomo differt, quod lignum hoc plus sit, duriorisque ramusculos habeat, nec tam bene redoleat. Nam verum cinnamomum illud quod in montibus nascitur, nec subtile, nec longum cum sit, colorem habet ad modicam rubedinem magis tendentem, reliquum autem aliquantulum nigricat, & veluti qualdam fibras habet. Aliud reperitur cinnamomum planè albicans, fragile, non durum, nec magnam radicem habens. Est & aliud rufæ Casiæ simile, redolens & leue. Omnibus tamen præstatid, quod ab incolis Mosyllum appellatur, colorem habet cinereum, virgas paruas & subtiles, ramos densos, odorem vehementer redolentem: hoc nos præcipue feligere consueuimus, cum & odoratum suauissimum, & gustatum acre & mordax valde appareat, mansumque Rutam imitari videatur. Leue est etiam, & frangi facile potest. Casia quoque

Quomodo  
duplum  
substitutum  
alteri de-  
betur: &  
quando  
non.

Casiæ Cin-  
namomo  
genere pro-  
xima.

Gizi  
Mors.  
Arebo.  
Daphnæque.

Cinnamo-  
mum a-  
dulteratum.  
Xylocinna-  
momum.

Cinnamo-  
mum albi-  
cans.  
Rufum  
& reddet.  
Mosyllum.

Ruta sapa-  
re.

Scripta, nisi quis in iudicando peritus existat, fallere se puerum conuenit. Nam extat quadam falsa Cassia, quæ quidem similis veræ plurimum est, sed tam bene non olet, & modicula corticem adhaerere tenet. In summa verò, quæ censetur optima, modicè ribet, rosam spirat, gustata suavis erudit, non caua est, vinum refert, & valdè redolet. Ziger ab incolis hæc nuncupatur. Denique lib. 5. de Comp. Med. cap. 9. in Dentifricio: Si, inquit, odoratum esse velis, cassiæ aut Amomi drachmas duas admisceo. Si verò in Regis usum præparaueris, cinnamomi drach. i. addito. *Hæc*

Apud Aëtium de Comp. Med. in pastillo contra vias ileosorum legimus: tenuis Cinnamomi, cassiæ duplicata singulorum duella, cuius & denudò meminit in pastillo è Cappadibus.

Aëtius Cassiam (ita enim vocat) eligi præcipit foliam, boni coloris, corallium referentem, ætiam valdè longam, crassam, fistulis plenam, gustum mordacem & adstringentem cum quodam aromatico f. rore, vinum redolentem. Verùm putreant & crassam Ziger appellatam, R. nam odoratè retem, ad Medicum vltimè maxime aptam esse: quod cum ex Diosc. & Galeno. hincque & ipsi ex Diosc. delumpi debet dubium non est.

Athenæus Mnesimacho in eximio illo apparatu cenæ inter alia hæc refert:

Cassiam arunt aduicam ab Asiatica terra, nempe maritima Syriæ: Naves præcaluntis odor quatit Cinnamomi.

Philostratus in vita Apollonii, in hac parte Caneasimotus, quæ in mare rubrum porrigitur, nasci Cinnamomum scribit, quod nouis fermen- tis assimilatur. Cuius bonitatis experimentum è capra suscipiant. Si quis enim Cinnamum porrexit, tanquam capra in a. immutare, hominèque relictò ouili sequi. Quod si propius ad nares admoueatur, non secus acclamare, quàm si pabulo vi abstraheretur.

Aëtius septem genera enumerat, gentile nomen à locis, quibus nascuntur referentia, forsitan sub hac mentione complexus Cinnamomum, quod Pseudocinnamomum dicitur: omnibus tamen præcunt Moschen.

Hermol. putat Balsmoden esse, quam Diosc. Ziger & Gal. Gizer, Aëtius Ozen vocant. Pachnoides Cassia fortè eadem sit cum Daphnoide Mangonum Plinii, quam Daphnitum à mercatoribus vocari scribit Diosc.

Notandum, si quando Cassiam Syringam, hoc est, fistulam, in Antiquis Scriptoribus legere contingit, non pro ea capiendam Cassiam fistulam hodie dictam, sed aromaticam.

Hibes Veterum placitorum congeriem de Cassia & Cinnamomo, quos tamen nec cumulo fidem, nec narratione sua scientiam nobis peperit videas certam: quin potius plùs querendum reliquisse, nosque adeò inopes inter ignotas opes deferuisse. Nihil enim minus vel pericissimus quisque (nisi sibi vehementer præsumat) hodie etiamnum quærat: Quid est Cassia & Cinnamomum Veterum?

Mirum verò non magis perspectam fuisse Cassiam aromaticam & Cinnamomum Arabicis Scriptoribus, quàm Græcis & Latinis. Serapio enim nihil de his tradit, præter ea quæ Dioscor. & Gal. scripsere, vt videre est cap. 256. vbi Cinnamomum ei dicitur *Darsen*: & cap. 291. Cassia lignea

*Selycha* vel *Selcha*. Idem etiam patet ex Auic. lib. 2. *Saliba* tr. 2. cap. 127. Quo loco Cinnamomum *Darsin*: & cap. 154. Cassia *Salibacha* vocatur.

Sed paucis, quid in citatis Veterum scriptis notandum sit, videamus. Ac primum quod Arist. & ceteri ferè omnes eum secuti in Arabia & Aethiopia nasci tradunt Cinnamomum, vel falsum esse dubium non est, vel sanè nostrum Cinnamomum Cassiamve neutiquam intellexisse. Verùm, vt scribit Garcias, tam longa difficilique via petebantur olim hæc aromata, vt perfectam eorum noticiam consequi Veteribus haud faciliè fuerit. Hinc factum, vt innumeræ fingerentur fabulæ, quas Herodotus pro veris refert. Et quoniam ingens eorum erat pretium, maiorque in hominibus lucti cupiditas, adulterabantur aromata, & hac ratione fiebat, vt diuersa illis inderentur nomina, tametsi plerumque eiusdem essent generis. Propter locorum igitur distantiam, & minus frequentatas regiones Indicas ac Americanas regiones à Negotiatoribus, probè cognita Cassiæ & canellæ Historia Veteribus non fuit. Nam qui eam Ormuz & Arabiam deuehebant, Chineses erant, ex Ormuz, deinde in Alep emporium totius Syriæ nobilissimum ab aliis Negotiatoribus transferbatur. Qui verò inde ad Græcos deportabant, aut apud se nasci, aut in Aethiopia dicebant, multique cum superstitionibus cædi, vt supra ex Theoph. & Plin. retulimus.

Cæterum neque Cassiam neque Cinnamomum apud Aethiopes, aut Arabes nasci, Lusitanorum nauigationibus palàm factum est: qui licet totam illam oram circumlegerint, magnæque ex parte terrestris itinere peragrarint, nullam tamen cassiam aut cinnamomum vidisse affirmant. Huc adde, quòd ipsimet Arabes canellam dictam ex Indiis petunt, eiusque pretium apud illos intenditur, quoties hinc non deferunt. Dicit aliquis, canellam quidem apud eos non nasci, & propterea ab Indiis petere, sed legitimà Cassia, & vero cinnamomo eos non carere, fortè autem à Barbaris & inconditis populis ignorari. Familiares habeo (subdit Garc.) eruditos viros Medicos Arabes, Turcas, & Coragones, qui omnes canellam crassioram, cassiam ligneam appellant. Præterea nonnulli ex nostris totam Aethiopiam sub Aegypto (quam nunc Guineam vocant) non solum secundum mare, sed & in Meditarraeis peragrarunt, alii ab insula D. Thomæ nuncupata vique ad Sofala & Mozambique, & inde Goam penetrantes, alii perique à promontorio Bonæ spei cum naufragum passim essent, vique ad Mosambicque & Melindam, ita vt vtramque Aethiopiam supra & infra Aegyptum perlustrarint, nulla tamen his conspecta est Canella vel cassia. Cùm igitur orbis nunquam ita fuerit cognitus, vt nunc est, præsertim Lusitanis, verisimile est non defutura huiusmodi aromata & celebria medicamenta, qualia sunt cinnamomum & cassia: sed abundantiam ipsam, hanc nobis dubitationem parere. Neque enim (tametsi nostri minime curiosi fuissent) credendum ipsos incolas tam nobilia aromata celaturos. Nam quemadmodum barbarissima gens, quæ in insula D. Laurentii incolit, mercatoribus, qui eò interdum deuehuntur, fructum quemdam Auellanae magnitudine ostendit, qui Caryophylla redolet: eadem ratione credendum Aethiopes cinnamomum & cassiam (ad eò odorata medicamenta) nostris ostenduros fuisse.

Sed quid opus est verbis: dubium non est, Aristotelem, Theophrastum, Solinum, Strabonem, Diosco.

Cassia folia  
F. dicer.  
modic.  
Qua opti-  
ma  
Ziger.

Cassia

Cinnamomum

Cinnamomum

Cassia du

Cassia

Ziger.

Aëtius septem

genera.

Rassia. o.

des

Pachnoides

Cassia

Daphnoides

Ntra

Aëtium

indicum

Hibera

Veterum.

De Cassia

& Cinnam.

Nordum

cognitum

quid sit

Cassia &

Cinnamomum

Veterum.

Darsen



Dioscoridem, Plinium, plerique quæ de Cinnamomo & Casia prodidit, ex aliorum relatione, non quod ipsimet velin Arabia vel in Aethiopia viderint, tradidisse.

Infulse quoque Plin. vt rectè notat Dal. apud Aethiopes nasci tradit, mox subiungens Aethiopes mercari à conterminis. Si enim apud illos nascerentur, ab aliis non emerent. Multò magis etiam ofcitat: cum per vasta maria eas merces Aethiopes vehere scribit. Nam si contermini sunt, qui vendunt, Navigatione tam longa quorsum opus est?

Vt nunc, ita & olim, è Moluccis in superiorem Indiam Cinnamomum vehabatur, mercimonium id potissimum exercebat, quæ ad rubrum mare iacet, Aethiopiū Gente, quos Abyssinos vocamus, ob commodam Oceani propinquitatem: quæ res Plinium fefellit. Ergo per eos qui in Arabiam vehunt, non Aethiopes, sed Chineses potius apud Plin. intelligendi.

Imò etiam nunc hodie teste Garcîa interrogati Chineses, cinnamomum casiam in Ormuz aut in Arabia oram maritimam aduehentes quænam essent hæc aromata, & vnde ea aduherent, fabulas illas narrabant, quas recenset Herodotus, vt his commentis earum mercium pretia auget. De qua re plura dicentur postea vbi de de nostra casia & cinnamomo tractabimus.

Nunc videamus quid in Veterum scriptis occurrat quod nostræ casia & cinnamomo minus competere videatur, & quæ præterea in iis notanda vel censenda occurrant.

Ac primò sanè non nullis at friuolis inniti videntur rationibus qui casiam & cinnamomum Veterum nostrum, quod vtrumque in officinis hodie passim habetur, esse volunt. Nostrum profectò cinnamomum non potuisset ab aubis in nidos concinnari: neque verisimile est eos esse furculos de quibus Aristot. & Theophrast. & reliqui agunt: non enim sunt furculi, sed cortices crassorum ramorum, aut fortè etiam truncorum. Neque colligi nostrum ex virgulis [quod Theophrast. ait] satis apparet corticem circumuolutionibus, quæ apertè demonstrant ex crassis arbori vel brachiis vel truncis fuisse detractos, vti dictum. Quod Theophrast. & Plin. tradunt, lignum Casia à vermiculis excavari, cortice in columi & illafo ob suam amaritudinem, id fabulæ sanè similis quàm verò: & Dalechamp. apud Plin. aliisque apertè fabulosum esse clamitant. Deinde quis credat nostrum Cinnamomum aut casiam ex arbuscula Viticis magnitudine, vt inquit Theophrast. decerpi? Præterea quis nostro Cinnamomo tribuat odorem Rutæ, quod facit Dioscor. & Gal. Quanquam quando Rutæ aut Cardamomo confert, quæ nihil minus quàm similia sunt odore, mendum ibi aliquod subesse possit. Coniecturam nostram supra diximus, quamuis valdè vereamur ne inanem. Et quamuis montanum cinnamomum crassum dicam, tamen ne illud quidem nostrum esse posse videtur: addit enim & pumilum esse. At nos supra hominis altitudinem & crassos corticofos videmus interdum bacculos, quid igitur de eorum statuemus arbore?

Plinius folio Origani dicit: posteritas foliis Citræ Mali, aut etiam Piperis, quemadmodum in vulgatis habetur exemplaribus.

Galenus id cinnamomum quod maximum pedis Romani dimidium non excedere ait: nostrum, quanta sit longitudine, nemo nescit. Quamuis ipse etiam Gal. parum sibi constare videatur, ac modò arborum, modò fructuum genere compre-

hendisse. Iam verò si casia aliquando in cinnamomum vertatur, quod idem scribit, quis ritè philosophantium specie differre credat, nisi & credat, species in se inuicem transmutari?

Tales & multe alie difficultates, quas breuitatis causa hoc loco omittimus, [aliquando latius in disquisitionibus, Botanici D. F. explicandas] occurrunt in Veterum de casia & Cinnamomi historiis.

Ne tamen prorsus eorum cinnamomum aut casiam nostro seculo incognitam credidisse videamur, fatendum casiam fistulam Galeni haud temerè nobis videri in quibusdam nostro cinnamomo siue Canellæ vulgari respondere: sed eius mutationem cinnamomi in casiam ingenue confitemur nos nulla ratione intelligere aut comprehendere posse. Quæ autem Aristoteles & Theophrast. de cinnamomi fuscis & virgulis, Dioscor. de virgis, Galenus de ramis Ellebori aut Damasonii figura atque virgulis tradit, possent conuenire cum ramis & furculis Folii Indi vulgò dicti, quod cum suis partibus descripsimus c. de Malabathro putato.

Nunc vires casia & cinnamomi Veterum subiiciamus, vt ne quid temerè nostris tribuamus, quæ an cum Priscorum sint eadem, nos adhuc incertos esse fassii sumus: quamuis ab iisdem traditæ vires, nostris etiam competere posse neutiquam dubitemus.

Casia, autore Dioscor. vim habet calfaciendi, urinas mouendi, exiccandi & leniter astringendi. Conuenit ad ea medicamenta, quæ exacuenda oculorum aciei gratia concinnantur, & ad malignata. Lentigines tollit cum melle illita, menstruaque ciet. Quin & à vipera demorsis pota auxiliatur. Confert & epota internis inflammationibus omnibus, renibusque affectis. Prodest quoque feminis tum infellu tum fustitu ad vteridilatationem. Si desit cinnamomum, huius duplum medicamenti admistum eadem quæ illud præstat. Est denique ad multa perquam vtilis. Cæterum suspectum nobis est quod Dioscor. ait: internis inflammationibus omnibus epotam prodesse, quam tamen calidam & siccam tradidit. In Græco est: *ἀπὸ τῆς τοῦ πνεύματος πύλης τοῦ πυλῶντος*. Malimus equidem *πρὸς τὴν τοῦ πνεύματος πύλης* &c: ad internas pituitas, cum & huius offactus eiusmodi medicamentum talique modo sumptum egregiè liberare consueuerit. Iudicium esto Doctiorum.

Pergit Diosc. Cinnamomum omne vim habet calfaciendi, urinas ciendi, emolliendi atque concoquendi. Menstrua quoque ac fetus pellit cum Myrrha, tum epotum, tum & appositum. Contra bestias quæ virus eiulantur, venenæque conuenit. Quæ pupillis caliginem offundunt, discutit, fortius calfacit simul & attenuat. Illitum ex melle, lentigines & maculas à Solis ardore contractas exterit. Facit & ad tussis, defluxiones, hydropem, renum vitia, viinæque difficultatem. Quin & vnguentis pretiosis admiscetur: ac in vniuersum ad multa est vtile. Quò diutius eduret, trium vino excipitur, in vmbra siccat, atque ita reconditur.

Cinnamomi vnguenti descriptionem habes apud eundem Dioscor. lib. i. quod hic non ponimus, quia & ex multis aliis constat, & in vñ hodie non est.

Galenus Casia exicat & exalfacit tertio quodammodo ordine: sed & tenuium admodum paritium est: gustu verò plurimum habet acrimoniam. leuiter quoque non nihil astringens. Quamobrem hæc omnia incidit, simulque digerit, quæ in cor-

Casia fistula Gal. nostro Cinnamomum in quibusdam responder.

Folium Indicum vulg.

Casia & Cinnamomi Veterum vires & usus. Oculorum acies. Lentigo. Menfes. Viperæ morsus. Inflammationes. Vterus. Cinnamomi fustitu. Diosc. corr.

Cinnamomi vires. Ex Temperamento. Menfes. Morbus Venæ. Caliga in oculis. Lentigo. Tussis. Catarrhus. Hydrops. Renum vitia.

Repositio.

pore sunt crementa, & adhuc robur etiam instrumentis addit. Idoneam verò etiam suppressis mentibus, cum videlicet ob copiam simul & crassum linem excrementorum, quod sufficit euacuari nequeunt. Cinnamomum summè tenuum est partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nil autem aquè desiccatur eorum quæ pari sunt excalfaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentia. At Cinnamum nunc it velut imbecillum Cinnamomum. Nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant.

### DE CINNAMOMO ET CANELLA VULGARI.

Canella seu Cinnamomum vulgare.

Descriptio



Cinnamomum arbor theueti.



Coloris

Sapor.

Odor.

Color ruber, ferrugineus, vel fuscus, & uterque missione infinita variat, rarius cinereus, idque non ubique, sed obiter hinc inde repletus. Sapor acrisculus, subdulcis, suavis & aromaticus, sed cum sit partium tenuium non ita multò post euaculens, cui etiam respondet odor, sed exterior si

teratur manducatum in puluerem quodammodo facessit, lentoris non participem.

Cordus Cinnamomi characij, id est, visualis, & casia aromata genera sibi cognita sic describit. Cinnamomum characium, quod nunc ubique cinnamomum siue canella vocatur, cortex est rectus, longitudine cubiti, aut maiore, fistula aut canali modo concauus, colore in fusco rubescens, cuius crassiores & inferiores partes, alio cinereo, tenui & scabriori cortice vestiuntur, qui, quoniam inutilis penitus existit, deraditur: baculi autem arboris, à quibus deglubitur, pollicis aut digiti crassitudine sunt. Saporem habet valde acrem, non cum molestia pungentem, sed iucundum, & supra omnia aromata, suauis acrimonia linguam utilantem. Odorem item suauissimum, siue gustetur, siue alias tritum, aut contractum naribus admoveatur, spirat. Optima autem est interior corticis pars tenera, & in longum fissilis: exterior enim scabrior existit, & remissiori acrimonia, eaque simul adstringente constat: quod verò cortice continetur, lignum inutile est, idèoque ab incolis, ubi nascitur, abiicitur. Casia apud Veteres multa, quemadmodum etiam cinnamomi genera cognita fuerant, quæ multis seculis iam delituerunt: iam verò tria rursus asserti cœperunt. Est autem quodlibet horum Cinnamomo similis frutex aut arbutula, quatuor plerumque, aut quinque cubitorum altitudine, rectis caudicibus & ramis adulescens, duorum pollicum, aut vnius crassitudine: superiores verò ramuli graciliores sunt. Folia habet densa, Laurinis similia, multò tamen maiora, ad Citti potius folia accedentia, utrinque fastigiata, ternas indiuiduales venas per longitudinem transeuntes habentia, quarum media crassior rectaque est, reliquæ duæ leniter curuantur, eaque à tergo eminent, & euidentiores sunt, quam intus. Fructus fert Lancinis baccis similes, minores tamen & rubentes, calycibus, seu capulis glandum modo insidentes, qui rarissime adferuntur. Cortices verò eius, qui iam adferuntur, longitudine cinnamomo characio similes sunt, crassiores tamen & nigriores, præsertim duo priores: quorum vnus saporem habet acrem & aromaticum, veluti si quis cinnamomum Galangan & Caryophyllos æquis portionibus misceat, modicè insuper glutinosum: alter verò paulò remissiore, glutinosum in gultu lentorem, initar Symphyti, reddens. Tertia species gracilior existit, colore & forma ad Cinnamomum accedens, cui etiam saporem similem habet, sed remissiore acrimonia & glutinoso lentore leniter adstringentem. Quæ verò passim iam in omnibus Pharmacopoliis habetur, appellata casia lignea, adulterina est, & à præscriptis diuersa penitus: radices enim cuiusdam cortex existit, nullum fati dignum saporem, præter adstringentem habens.

Et in Comment. ad Dioscor. idem Cordus scribit: Casia siue casia multiplices habet differentias. Est autem casia Diosc. Cinnamomo cognata arbutula, cuius ramuli & furculi si cum ipso cortice ligno adhuc inharere vendantur, Xylocalia appellantur, cum verò exempto ligno cortices tantum adportantur, casia Syringitis vel Syngis nomine veniunt, quoniam excauati cortices fistule similitudinem habeant. talis est casia fistularis siue casia Antiquorum: Arabes aliam introduxerunt. Veterum casia fistularis siue lignea multis furculis in Europa visa non est. Iam verò quorundam diligentia factum, ut aliquot eius species rursus adferantur: sed tanta est quorundam Pharmacopolarum ignauia & pertinacia, ut



vt eam sibi non comparant. Habet autem hæc casia tantam cum cinnamomo similitudinem, vt alterutra in aliam non raro degeneret, vt Gal. scriptum reliquit. Itaque difficile est etiam ipsius casia species distinguere. Porro cinnamomi species non pauciores quam Cassia sunt. Optimum autem est, quod Gal. locis supra cit. describit: tali vero hodie omnino caremus. Hactenus enim ex omnibus eius speciebus tantum vnum illud ad nos in Germaniam allatum est, quod Arabes *Dar-feni*, & Græci *Characum*, hoc est, *vallare* vocant: propterea quod bacculorum crassitudineyallos æquet. Quidam opinantur nos in vniuersum *Cinnamum* carere, & vocatum vulgò *Cinnamomum* siue *Canellam* Cassia potius speciem esse. Quum verò tam cinnamomi quam casia plures sint differentie, inter se valde cognatæ, temerarium esset pronunciare nos in totum quocumque Cinnamomo destitui. Cinnamomum autem, vt hodie adfertur, cortex est, sui fructus, canali conuolutio similis, idem *Canella* aliqui vocant. Maxime vero errant illi, qui Cinnamomum credunt Caryophyllos & Noces Moschatas ferre. Neutrum enim fert, sed paruum fructum glandibus in acetabulis siue calyculis adhuc herentibus similem, multo tamen minorem. *Hactenus Cordus.*

Sed siquidem tam confidenter casia arbutula describit, nec vbi videtur, vel à quo dicerent monent, tam sibi quam nobis iniuriam facit. Si ex Veteribus tantum desumpsit, quod fecisse videtur, debuit indicare. Saltem docuisset ex quo desumpsit descriptionem foliorum suæ Casia. In India non fuit, nec vidit in arbore. Sulpicamur eum describere folia nostri *Folii Indi* vulgaris. Sanè fructum glandi similem existimamus esse eiuſdem *Folii Indi* dicti, vt antè cap. de Malabathro dictum. Num vero ab eo non obliuiscatur in *Cinnamomo* siue *Canella* vulgaris tubos plerumque tantos, vt euidenter appareat, ex maioribus ramis detractos quam pollicaribus.

Sed vt ad arboris *Cinnamomi* descriptionem propius accedamus, scribit Garcias *Cinnamomum* siue *Canellam* arborem esse magnitudine Oleæ, interdum minorem, multis ramis præditam, non iis quidem corticis, vt rectis ferme: foliis Lauri quidem colore, sed formâ ad Citri folia accedente [non foliis Indis, vt fabulosè quidam scripserunt] floribus candidis, fructu nigro & rotundo, Auellanæ magnitudine, aut ex gurgis Oliui similis. Est autem *Canella* nihil aliud nisi secundus & interior arboris cortex, (In nostra sanè *Canella* interdum inuenies fragmenta quæ non videntur interior ille cortex, sed omnino superior cinerea quodammodo pellicula obductus. Plerique tamen tubuli delibrati & crassiori inæqualiſſe cortice denudati videntur. Cl.) nam hæc arbor duplici cortice munita est veluti Suber, non eo tamen adeo crasso & distincto. Exemptus ergo cortex crasso illo & exteriori libro reputatur: deinde in laminulas quadrangulas sectus humi abiicitur, atque ita per se conuoluitur, vt trunci vnus tamen integer cortex videatur, cum tamen partes sint duæ: taxarcticis in tubulos digiti crassie conuolutæ: truncus verò interdum femoris crassitudine reperitur. Roleum autem illud, siue ex cinereo vinosum colorem Solis calore contrahit: qui, non probè paratus, candicans siue cinerei coloris fit: nimis verò ardoribus Solis adustus, niger. Adempto cortice tribus postea annis ab ea arbore abſtinetur. Frequenter sunt hæc arbores in Zeilan, Solebâtque vili emi *Canella*: sed triginta abhinc annis nemo eam emere potuit, præter

Procuratorem Regionum negotiorum, *Factorem* vocant. Zeilanici minores sunt ea quæ ignobiliorem *Canellam* præbent in prouincia Malauar, in Ioa siue Iaua: non tamen adeo pusillæ, vt eas Plin. & Gal. sentent. Sunt verò omnes syluestres & spontè nascentes.

Garcia circa descriptionem arboris folii, floris, fructus & corticem consentit Linſchortanus. At Theuetus partim eidem assentitur, partim ab eo non parum discrepat. Quippe in Cosmogr. sua narrat ab insula, quæ *Munorique* dicitur celebrior esse Caut & Subanin, propè quas optima *Canella* prouenit, quam Maluarici *Cais-mani* appellant, quæ vox dulce lignum significat. creditque Theuetus corrupto inde nomine Cassiam ligneam vocitasse. Ac reuera Veteres plerique, inficillè, existimant arborem, quæ *Cassiam* & eam quæ *Cinnamomum* & *Canellam* fert, eandem planè esse, quod falsum est, etiam si Garcias id quoque afferere voluerit: tantum enim differt hæc ab illa, quantum glandifera arbor à Castanea arbore. *Canella* arbor in montibus nascitur, Lauro nostrati similis, cuius ramuli dantur, & eorum toruli stato anni tempore Regis iussu amputantur & vaneunt. Ramulis multum brachiatis est, in quorum extremitatibus flores sunt parui, quibus Solis seruore statim flauelcentibus & delapsis, succedit fructus, ferè rotundus, Nucis auellanæ magnitudine, ex cuius nucleo oleum exprimitur, inodorum, nisi sit igni excostum. *Canella* que ad nos rhynchium: secundus est arbutus cortex, qui d. ille cortex in C. conuoluitur, & colorem mutat. Radix utilis est, nec non succus qui ex arbore manat.

Lud. Rom. quoque cinnamomi arborem Lauro folijs & bacis similem tradit, & eius ramorum, (non truncorum) corticem, tertio quoque anno delibratorem.

Cardan. item *Cinnamomi* partes omnes per omnia similes esse Lauro scribit: iccirco Laurum esse Indicam. In Zeilan nasci cinnamomum, & in Mutir vnâ ex Moluchis. Nullum gerere fructum. Aestu corticem findi atque abſiltere. Bis in anno deglubi: dulcem primum: mente postea perfici. Iccirco ibi *Cannama* vocari. *Cau* namque lignum significat: *Nama*, dulce. Tam propinquus etiam nunc vocis sonus est vocabulo nostro. Et Syri affini voce, *Chamam* dicunt. Vt queri iam definant nostri seculi medici, cinnamomum nobis incognitum: cum sit hoc aliud, quam quod describitur à Galeno. Sed Cardanum reprehendens Scaliger, eum falsi etiam accusat. Profectò inquit Scal. quale prodit ille nusquam comparere: Mirum sanè. Sed mirum magis, in toto terrarum ambitu atque complexu, qui rure nobis vniuersus notior, quam ipsi domus sua fuerit, apud tot reges Aethioparum, Arabiarum, Persiarum Indiarum omnium, nulla in insula, nullo in Continentis angulo latere, meditulio reperiri. Non Othomanus ipse, cui hæc affluit gallinaceum, suam Theriacam vero Cinnamomo perfici curant.

Dioscor. optimo nigrum statuit colorem, v. nolum, subcineticum, Mossiutæ casia simillimum. Acutum vult, mordacem; leui superficie, non sine aliqua faldedine, lenta fragilitate, non si- puluere. Quæ omnia nisi in istis fistulaceis corticibus inuenias, non inuenias in mai. talem. Quanquam de cinnamomi faldedine non subſcri- bo. Cum igitur à locis in duas species *Canellam* Zeilanitam & Mutiream priorem partiantur, Zeilanitam & Mutiream priorem puto esse *Cassiam*: crassior enim est: hoc quod virgultis eximitur exilioribus, *Cinnamomum*.

*Cinnam.  
Aegyptia  
Amat.*

Amatus refert & audiuisse à quodam qui viginti annos in Zeilam egerat, Cinnamomum esse arborem, quatuor ferè cubitos altum, crassitudine brachiali, sex vel septem è trunco mittentem ramulos, qui singulis annis amputantur, atque iterum pullulant: quorum cortex, qui cinnamomum est, vte nullum ita maximo in pretio habetur, colore exteriore subrufus, rugosus, cum quadam nigredine: Nam intus cinericeus conspicitur, odore suavis, gustu acer ac mordax. Folia quibus arbor hæc vestitur, Nucis Juglandis esse dices, quæ in Offic. pro Malabathro, falsè tamen venduntur. Hæc enim cinnamomo nostro inquit ille] ita respondent, & à Gal. tam sepe decepto, vt nullum aliud vnquam cinnamomum extitisse crediderim. Proinde rectè mea sententia Sepalsarii, nostro cinnamomo pro vero & Græcorum Cinnamomo vtuntur. Quare nullo opus habemus duplo casæ pondere, cinnamomi loco, quum cinnamomo vero abundemus. Argumentum verò quod Recentiores adducunt, vt credamus, nos vero carere cinnamomo, ex Gal. verbis desumunt, quæ si quis penitus animaduertat, inueniet Galenum non quidem afferere suo tempore Cinnamomum venale non proflare, sed potius quum sex cinnamomi genera passim ferebantur, vt facilius quis bonum à malo discerneret cinnamomum, opus erat Imperatorum cinnamomum optimum, tanquam regulam & cotem videre, & cum eo conferre. Sed quiddam regium magis quam aliud nominet Cinnamomum, illud videtur in causa esse, vt integras cinnamomi arbores, vt in orbe alieno, apud Imperatores stare indicaret. Tacebunt deinceps Scribentes ac Medici, nec amplius verum desiderabunt cinnamomum, quum eo nos abundare in confesso sit. Indici gentiles quum arbores exortiant, vtriusque [casæ cum cinnamomo] cuius, teste Gal. magna confinitas, nullam faciunt differentiam, sed indiseret casiam cum Cinnamomo in fasciculos redigentes ad nos mittunt. Omnes tamen Neoterici *canellam* siue Offic. *cinnamomum*, Græcorum casiam esse opinati sunt.

*Cinnamomum  
secundum  
Amat.  
dum.*

*Casia  
capitosa  
erod.*

*Amat. nos.*

Amatus præterea scire se tradit, in vastissimis capsis canella refertis, quæ ex India Antuerpiam afferiebantur, & casia & cinnamomi omnia pendere reperiri genera, vt qui hæc quoque curiosè quaesierit, inueniet. Est tamen Cinnamomum nonnullis internodiis ornatum, ad nigredinem rubens, sapore acri, linguam maximè vellicans, odoratissimumque: vnde fit, vt eius loco casia duplici pondere, vt olim Quintus præcipiebat, minimè opus habeamus, quum cinnamomo maximè abundemus. Casia verò coralli modo rubet, nec linguam ita intensè vt cinnamomum erodit, sed cum acuitate quadam adtingit, cuius maior copia quam cinnamomi semper comperitur. Hæc Amatus, qui dum Cinnamomi folium id putat quod in Offic. pro Malabathro venditur, perperam id cum cinnamomo confundere videtur, cuius etiam lignum Matth. cinnamomum dicitur: quod an cum canella vulgari adferatur nescimus. Minimè putamus Folium Indum vulgare esse ex arbore canella.

Aliter à prædictis & infra scriptis Authoribus Granato omnibus de canella arbore scribit Hist. Portug. similis canella arbore. Eam inquit, in Molucis insulis ex arbore valde simili Granato esse, cuius cortex vi Solis findatur: deinde detractus munderetur ad Solem.

Maximil. Trans. quoque epistola de Moluccis insulis cinnamomi arborem Punice mali similem

fecit, quam rectè [inquit Clus.] nescio. Eosdem secutus Franciscus Gomara in Hist. General. capit.

Hermol. tradit non conuehi modò cassiam, præterquam rarissimè, inter Xylocinamomi fasciculos quandoque inuentam, nigritiæ argumento. Quæ cum Cinnamomum vulgare Xylocinamomum vocet, non adhuc percipimus. De casia eius nigra postea. Cinnamomum Veterum quod intelligit, non docet.

Micellus de canella nostra nihil scribit, nisi quiddam cassiam nostræ ætatis nominet: verum quid per Cinnamomum Veterum intelligat ne verbulo quidem explicat, vir alioqui doctissimus, sed in stirpium cognitione parum versatus.

Ruell. ex Hermoleo tamen non citato, pleraque transcribit: is canellam nostram recipit pro Cinnamomo, sed definire debuit, quam intelligeret, & monere se antea cap. de casia Xylocinamomum vocasse.

Syluii sententia est, nos cinnamomo vero carere: nostram *canellam* aut *casiam* esse, aut *Pseudocinamomi* speciem. Et alibi: cinnamomum inquit, casia dicitur, Syrix fistula sæpe apud Gal. à purgatrice & Aegyptia diuerfa.

Fuchs. raro putat cinnamomum ad nos afferri: quo enim sub hoc nomine vtuntur Sepalsarii magna ex parte cassiam esse: cuius folia Nucis Juglandis foliis similia sint, & in Offic. falsè pro Malabathro vendi: quæ eadem descriptio apud Amatum habetur: suspicamurque duas ab eo confundi plantas. Dixerat autem prius, veram casiam quibusdam non videri esse nisi id, quod Nic. Myrepsus & alii *canellam* & *canellam* nominant. Sed haud dubiè in capsis canella refertis & casia & cinnamomi genera repetiri.

Si proximè & nostræ etiam [inquit Cornat.] ætatis homines, non indoctos illos, sed hac parte nimis curiosos sequemur, cassiam Diosc. & Veterum eam accipimus, quæ hodie Cinnamomum & canella siue *canella* appellatur. Cinnamomum autem verum nos non habere confitebimur, notas videlicet respicientes, quas ex illorum sententia, casia Diosc. habet, & canella hodierna præfert. At verò si vltim & longi temporis præscriptum spectare volumus, Cinnamomum & canellam hodiernam quæ optima est, verum Veterum Cinnamomum credemus, & cassiam esse eam, quæ Offic. adhuc casia lignea appellatur, & à Grecis *κασία*, itemque *κασία* & *κασία* quod Diosc. dixit, fistulis plena. Hoc itaque adit Corn. nos faciemus, cassiam ligneam Offic. cassiam veram Veterum esse confitebimur. Miramur verò Cornarium, contra Doctiorum sententiam retinere insulam Offic. Cassiam ligneam, pro casia. Si aromaticam intelligit, quæ non fuit vulgaris eius tempore, cur non docet discrimen?

Anguill. discrimen agnoscit inter cassiam & casiam. Cassiam Diosc. & reliquis Græcis, aromaticum esse arboris nacentis in India, cuius varietates species ad nos non adferantur, sed solà vnà bonum, quæ sit ex speciebus Diosc. De cinnamomo fatetur non posse se plura dicere, quam quæ dixerit Diosc. & Gal. nec quid sit.

Muth. inquit Hist. Lugd. J. contra Veterum & Recentiorum omnium, qui de Cinnam. & casia scripserunt, sententiam, cinnamomum, lignum non corticem esse arboris nacentis in India, vt dicam [inquit J] quid ego sentio, si quis fistulam, quam Cinnamomum perperam appellamus, & vulgò *canellam*, casia generibus rectè comparauerit, faciliè nouerit vulgaris vltus Cinnamomum



num legitimam Cassiam proculdubio referte. Describit Gal. quoddam aliud deterioris cassiæ genus, quod tradit iuniorum Andromachum cassiam fistulam nominasse, cum fistularum modo inanis cauæque sit, & crassi cordis: cuiusmodi in vulgari Cinnamomo frequentissima conspicitur. Huius sanè ea videtur esse generis, quam in suo conficiendorum Pharmacorum libello præfert Cordus, quod velit, Cassiam, præter Dioscor. & Gal. sententiam lubrici esse gustus. Si in Græcorum monumentis (excipio Actuar. & Nic. Myreps. qui à Mauritanis multa acceperunt) cassia fistula inuenta fuerit, vel in Mauritanorum compositionibus à Græcis trascriptis, cassiam odoratam, à Dioscor. & Gal. descriptam semper adhibendam existimo. Cinnamomum quod legitimum sit, quamquam diu multumque tum Venetiis tum Neapoli, & apud mercatores, qui ferè quotannis in Alexandriam nauigant, diligenter conquisuerim, nusquam id tamen videre licuit, neque etià percipere potui, num hoc tempore apud magnos negotiatores, qui è Lusitania Indiam & felicem Arabiam classè parauissima petunt, vel apud quæpiam Principem Regem vel Imperatorem legitimum, reperiri possit. Id mirum fuerit, quod, cum hac ætate cassiæ plurimè adferatur, quæ vt Theophrast. & Plin. inquit, nascitur iuxta cinamomi campos, sed in montibus, cinamomi tamen nihil importetur. Quare non deest suspicio, quin omne ferè cinamomi genus deperierit in Arabia, quemadmodum & Balsamum in Iudæa: quandoquidem enim scripsit Plin. l. 12. c. 19. combustas iam esse plurimas cinnamomi sylvas, vel credi possit à Plinii ævo id quod cinamomi reliquum erat, pariter vel Barbarorum bello, vel igneis flatibus deperitisse. Nam si aliter se res haberet, qui cassiam ad nos deferunt, cum in aliis plus lucri ex cinamomo, quam ex cassia se confecturos sciant, cinamomum etiam vnà cum cassia inueherent. Veruntamen cum non afferantur, an quoddam perierint, an aliam ob causam, si manifestius refertur, qui hoc tempore Liburnicis eò ad aromata conquirenda quotidie nauigant. Sed videtur Gal. satis perplexè de cinamomo scripsitasse. Nesciuerim explicare, quid sibi hac in historia voluerit, præsertimque cum tam tenui ipsius sermone esse tradiderit, vt Vereri vel Damasoni radicibus comparauerit. Sed illud etiam mirum videtur, quod ex cassia [vt ipse ait] cinamomum oriat, spectenturque nonnunquam cassiæ arbores integre, in quibus aliqua cinamomi virgulta è cassiæ ramis prodeant, cum tamen cinamomum & cassia diuersæ inter se sint plantæ. Nisi fortasse inter ytramque tanta sit generis cognatio, vt aliquando inuenta sint cassiæ virgulta, tanta odoris saporisque fragrantia, vt omni ex parte cinamomi rursus, etsi legitima fuerit cassia. Præterea non desunt, qui putarunt, hac Gal. autoritate freti, cassiam & cinamomum ex vna & eadem arbore provenire: quæ dum pumila sit, cinamomum edat: dum verò adoleuerit, cassiam. Sed cum dicit Gal. cassiam mutari in cinamomum, non autem cinamomum in cassiam, cadit eorum sententia vel Theophrast. etiam sententià, qui (vt supra ostensum) docet diuersas esse plantas: licet de earum forma & proceritate nihil certi exploratque affirmet. Cæterum cum scribat Strabo Arabes cinamomo & cassià vti, ad ignem parandum, cæterorum lignorum loco, videntur hæc plantæ non esse adeò pumilæ, vt quidam (præsertim Veteres) scribunt. Quod de cassia faciliè dici potest. Siquid Venetiis cassiæ videntur tantæ crassitudinis longi-

gitudinisque, vt faciliè quisque iudicare possit eas è ramis, seu virgultis non sanè breuibz fuisse decerptas.

Lacuna etiam in admirationem rapuit, quod dixit Galenus excellentem cassiam sæpius immutari in cinamomum, cumq; cinamomum sit perfectissima cassia, aromata verò omnia cum ætate deteriora euadant, amittendo multum de odore & viribus: itaque difficile videatur posse conuerti in rem magis perfectam & cardiacam, quam per se sit: rationabiliusque esse cinamomum mutari in cassiam. Sed imponit Lacuna Galeno, non enim dixit, nec intellexit, nostro quidem iudicio, cassiam in thecis repositam, aut à sua arbore auulsam, mutari in cinamomum, sed cassiæ fruticem, ramos quoddam cinamomo penitis similes aspectu retulisse: & rursus alibi: spectari interdum cassiæ arbores integras, è quibus aliqua cinamomi virgulta prodeant: quamuis equidem nec hunc modum in viua planta nos intelligere ingenuè fateamur. Porro [addit Matthiol.] tametsi hæc Galenus abundè probatum videatur, quod cassià veram habeamus, desideremus autem optimum & legitimum cinamomum: sunt tamen hac ætate Scriptores, qui non cassiæ solum, sed etiam cinamomi genera inueniri tradunt, inter quos extat Fuchsius, qui id libi de comp. med. scribit. Sed quibus id rationibus, aut autoritatibus comprobet, non video: nisi hoc acceptum referat Anato Lusit. qui apud nos cinamomi genera inueniri, atque etiam illud aroma notissimum esse contendat. Illud tantum addam, quod nobis, qui cinamomum lignum, non corticem, esse ostendimus, mirari quidem subit Fuchsium, qui eodem loco paulò post contrarium scripsit: In hanc, meo quidem iudicio vanam opinione n Fuch. no. secus atque in superiorem venisse deprchenditur, secutus Amatium, qui eandem ferè prius, quam ille post cinamomo effigiem reddidit, quamquam eam à quodam accepisse fateatur.

Cinnamomi arborem, (vt refert Curtius) qui ad Indos præfecti sunt, dicunt Lauro similimam, acinis tantum minoribus & albicantibus: arboris libro tantum vtuntur, quem è ramis, illælo caudice, in ænium delibant: non statim, sed post mensem ab incisione. Alii autem in Moluccis insulis & in Zeilam apud Indos nasci aunt, furciosa arbore, aliquando sterili, huic quæ apud nos Malum Punicum fert, persimili. Huius autem corticem ad Solis ardores desiccantem auelli, & paulatim ad Solem torrer. Mirum verò Curtium nihil de nostra canella specialius tradere. Cassiam apibus vtilem, Plinii verbis deceptus, non distinguit ab aromatica.

Lacuna cassiam à Dioscor. descriptam, certò ait nihil aliud esse quam Canellam vulgò dictam, licet cinamomum existetur: additque si quis Libonæ aut Venetiis magnos saccos Canellæ peruestigarit, quod se aliquoties fecisse iactat, inuenturum omnes distinctas cassiæ species à Dioscor. recitatas, inter quas præcipua est Zigir.

De Cronemburgi sententià verissimum est, quod Manardus asseruit cinamomum nostrum genuinam esse Dioscor. cassiam: putatque si quis magnas illas vulgaris cinamomi congeries, quæ Antuerpiam deferuntur, inuestigarit, eum vniuersa cassiæ Scriptorum genera in illis inuenturum. Verum cum tot genera agnoscant Lac. & Cronemb. debuerunt eadem describere, & cuique propriis dicatis notis, inter se distinguere,

Lacuna  
not.

Cinamo-  
mo legiti-  
mum de-  
scribit  
Fuch. not.

Lusit. re-  
preh.  
Mat. Cin-  
nam lignum  
est, non cor-  
tex.

Fuch. &  
Amat. re-  
preh.

Lauro si-  
milis Cur-  
tius.

Malum Pu-  
nicum simili

Curtius  
not.

Omnes Ca-  
ssiæ species  
reperiuntur

Lacuna. &  
Cronemb.  
not.

alioque, vel in eo saltem, suæ felicitatis participes facere.

Coudebergus, doctus Pharmacopœus Antuerpianus ad Cinnamomum Mesuræ, in Dispens. Coadi. ubi Cinnam. tenas, & cinnam. cr. s. s. s. part. æq. ponuntur, annotat. Per *Darseni* vel potius *Darchim* lignum Chinesense ceu lignum odoratum hoc est, china-nomum, tanquam Chinæ Amomum, siue china-nomum intelligunt Persæ atque Scriptores Arabes, cortices quandoque ligna appellantes, vt *Xylocinnamum* Græci. Quod inter crassi corticis est, cinnamum vocant. Per *Darseni* cinam. igitur, cinnamum cr. s. s. s. corticis, tanquam ligneum significare volunt: est enim & in genere crassioris cinamomi, quod & valdè bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aromaticum.

Scipio Mazzella de Antiquit. Puteol. verum cinna-nomum incognitum p. h. b. ex relatione eorum, qui aromata ex Oriente accerunt. Ac pro eo assumunt cassiam odoratam, quam *canellam* vocat.

Pena & Lob tradunt, iam non ambigi, an vera extet cassia, sed discipari, quid ab hac cinna-nomum distet. Istud autem hodiernum cinna-nomum, neque idem cassiæ, neque tamen multò diuerfum esse, pro certo asserunt: nec

Diole. descriptioni magnopere attendendum esse: nam cum dicit varias species esse, intelligere gradus potius & varietates etiam vnius speciei. Non modò [addunt idem] non deest nobis cinna-nomum verum, quod conqueruntur, ex Gal. descriptione, sed etiam adfunt plura quàm ille memorat: nempe illud graciliore fistula, colore fusco, sapore & odore vegetissimis, quod plurimò hodie fit Venetiis, & Theriacis, vt verum, additur Cinna-nomum: deinde nostra canella vulgarior: postremò cortex crassus. Denique vt Celsus. scribit, qui nostra ætate Indicas oras perlustrant, referunt vnanimi consensu, Cinam. arborem Lauro haud ab similem, præsertim foliis [n. minora essent, Cronemb.] baccas quoque Lauro similes, sed minores, albicantes: incidi ab ind. genis eius ramos singulis ternis annis, caudicem nequaquam: asseruari enim vt nouos stolon. nes ferat: ramos præcisos delibrari: corticem eo modo detractum cinnamomum vocari. At protinus cum collectum est, non inesse suauitatem, sed post tres demum menses odoratissimum reddi.

Theophrastus historiam non ab similem refert, inquit Celsus. sed duos esse frutices, vnum *cinnamomum*, alterum *cassiam*. Si nostri cinnamomi fistulas contempleris, illas vero & legitimum cinnamomum, vt hic censet, respondere inueniemus, quæ ex toto absolute à ligno sunt, quarum præstantiores comperimus, quò magis propè germina fuerint. Quibus autem adhæret aliquid ligni, crassam fistulam vocant, ad cassiam pertinere putandum est: argumentum certissimum non ex furculis, sed ex crassioribus ramis cassas fuisse, siue eiusdem plantæ, à qua Cinnamomum caditur, siue alterius. Profectò Galeni testimonio ead. m. planta aliquando & cassiam & cinnamomum reddit. Galeno laudatissimum mordens cum quadam salugine. Dicemus proculdubio inter nostras fistulas optimum cinnamomum haberi, à substantia lignosa purgatam: nam salugo illa acridini adiuncta dulcedo est, quam in optimo cinna-momo sentimus: sal enim cæteris saporibus admixtum, dulciore reddit. At cassia in cæteris quiddem cum cinnamomo conuenit, sed loco salugi-

nis adstrictio nem habet. Quidam ex Recentioribus ob fistulosam cassiæ formam, putauerunt omnes cinnamomi appellati fistulas ad cassiam pertinere, & Cinnamomum legitimum deesse. At eximia illa odoris fragrantia, & saporis dulcedo, qualis reperitur in fistulis quibusdam, nequaquam cassiæ conuenit. Nuper ex India Occid. lignum afferri cepit cortice odore cassiæ simili: appellat *Sassafras*. *Hæc Celsus*. Si autem quod scribit, trunco arboris non detrahi corticem, verum est, suspecta nobis icon Theueti, quam proponimus. In omnibus canellis cinnamomifve latens sal agnosceris, sed non gustu perceptibile, quod deum ostret bonitatem cinamomi, quicquid scribat Gal. & cum eo Celsus. Cinnamomum si sal respiciat, id per accidens fieri, eoque deterius esse, ac à mari potius contractum id vitium ex diuturnis navigationibus arbitramur. Nam & in caryophyllorum conuentione idem est animaduertum, vt alicubi notat Scaliger.

Refert Clus. in Notis ad Garciam, cinnamomi duos ramulos in Belgio se vidisse. Foliis sibi in Hispania datum, cui nos peculiare caput dicauimus, quia non compertum nobis an sit folium canellæ Garciz. De bacillo canellæ à Clus. proposito idem particulatim agimus, quia non censuimus esse canellæ Garciz: nec etiam folium appictum nobis videtur esse ex ea arbore, quæ cum baculo protulit, quem existimamus esse foli. Indi vulgaris, vt diximus c. de Malabathro.

Tabern. canellam vulgarem iungit cum prædicto fol. cinnamomi & Ligno Clusii, quod nobis non placet, cum diuersarum stirpium partes esse censamus, quamuis cum C. Bauh. quoque imitemur.

Non omittendum hoc loco, quod Lacuna scribit in suo Herbario Hispanicè edito: non mirum esse, si hoc seculo non cognoscimus cinnamomum, cum Galeni tempore, cum Imperatores Imperium tenerent, rarissimum fuerit, & frusta eius inter thesauros reposita. Vidisse tamen se gloriatur Ronæ secundum genus Cinamomi, colore ad rufum inclinant, quod *montanum* dicitur, sibi quæ tanquam singulare donum datum frustillum à D. Gilberto Medico excell. Repertum fuisse, inter alia valdè pretiosa iuxta Mariam Sororem Imperatorum Arcadii & Honorii, vxorem Sulpiciani, quæ fuerit sepulta ante 1400. annos in Vaticano: quod sepulchrum detectum fuit sub Pontificatu Pauli tertii. Vnde apparet manifestè pretiosum fuisse cinnamomum, quandoquidem, vt ille ait, ita vetustum, nihilominus valdè acre, & gustu aromaticum deprehensum sit, adeoque suauem suum retineat odorem. Verum non ritè hic nobis sanctus videtur Lacuna Botanici officio, cui tanta contigit felicitas vidèrè tale cinna-nomum, si modò non fabulantur, vt plenè putat Garcias. Quod nobis non speciales tradidit notas, quibus differebat à nostra *canella*, an cortex vel lignum, vel ramuli cum cortice & ligno, cuius crassitudinis, substantiæ &c. Id si fecisset, potuissimus certius scire, an Cinnamomum Veterum, vt illi scribunt, fuerint ramusculi fruticum vel arborum, & fortè nostræ canellæ summitates, aut arboris, quæ fert folium Indum vulgare. Sed nunc & reliquis à nobis obseruatis *canella* vel *cassia* varietates describamus.

Monardis sententia de Canella, cassia & cinnamomo est infra c. de Canella Peruaniana.



CANELLA SIVE CINNAMOMVM VVL-  
gare, crassiore cortice.

**C**anella siue Cinamomum vulgare crassiore cortice, notabilis est crassitudinis, triplo quadruploque crassior cortex eo qui passim profertur, texturâ lignosa & fissili, vtex-  
turam Tiliæ quodammodo mentiri possit, præsertim parte interiore, foris rugosus, dilu-  
tior ferrugine tinctus, intus adhuc etiam di-  
lucior: pstant-

nostriginta ad minüs, quibus adseruamus ad huc, sapore acutiusculo, suauis, aromatico, cum quadmildcedine, non diuerso à vulgari Cinamomo siue Canella, cuius fortè secundus cortex. Nam est nobis adhuc extensus cortex, eo superior, per cætera non ab similibus: at conuexa parte rugosus & scaber est, ac Zonâ præcinctus, coloris cinericei, sapore minüs vegeto: cuius figuram Pictam damus.

Hunc eundem designasse videntur Pena & Lob. quando aiunt: Veneti Institores, qui Londini negotiantur, attulerunt corticem fermè pollicem crassum, scabrum, callosum, & foris illic aut Oleæ concolorem, interius verò conuexum mollius superficie: odore sapore & colore quodantenus Canellæ vulgaris, quam prorsum gustâdo præ se fert nostra. Tercio & quorundam sententia fert esse Cassiæ arboris eximum & crassissimum corticem, cuius interior sit delicatior.

Est hic gustu astringenti, siccio, adque sistendum reputari, non parum opportuno. Eius interior superficies videtur à caudice arboris Canellæ avulsa, odoris præstantia nares feriens, & os, manus complens gustu Cinamomeo.

Xylocassia Lob. An Pseudocinnamomum Diosc. Adu. Xylocassia hist. Belg. & Hist. Lugd. Belg. Baselaer.

Casp. Bauhin. quoque Xylocassiam dicit, eiusque figuram ponit apud Matthiolum. liquidem [inquit] Matthiolum. monet odoratz Cassiæ loco multos segnentis incognitz arboris vfos esse. Huius Xylocassii nomine meminit Cordus in Dioscor. Fortassis Pseudocinnamomum Diosc. Hæc C. Bauh. Nobis sanè non videtur Canella hæc, crassior respondere descriptioni Pseudocinnamomi Diosc. nec quod Cordus scribit de Xylocassia huic respondet, quorum verba licet videre in antecedentibus. In hoc cortice non adest lignum, sed exemptus est à ligno, & fortè intercedit adhuc Canella tenuior inter hunc & lignum.

Canella ad Cinnamomum vulgare accedens.

Inter singularia nostra naturalium conquista iam à septenis lustri habentur læues & polititubi, annulari digito, pares, concauo fusco, con-

uexo ferrugineo dilutiorè vndulato, parietibus mediocriter crassis, fragiles, nullis fibris donati, sapore multò ignauiore quàm Canella, licet similibus, omnique lentoris experte.

Cassia Molybtica nomine datus cortex.

**C**assia Molybtica nomine cortex, Veronæ à Pharmacopæo ad lymbolum Angeli, anno 1563. datus anno, 1604. vegetissimum adhuc retinet saporem & rucundissimum, grata & luculenta acrimoniâ linguam vellicans, Canellæ instar, nisi validior videretur, ineffabile quiddam & diuersum gustu offerens: alioqui læuitate, colore, texturâ non differt.

Cassia lignea fusca aromatica, Cinnamomum ex Sarmatia dicta.

**E**st nobis cortex nomine Cinamomi ex Sarmatia, cuius tubuli minimum digitum crassitudine æquant, rugosi, & paucis tuberculis inæquales, coloris ferruginei obliuoris, parietibus mediocriter crassis, substantiâ minüs fragili quàm Cassia lignea glutinosa, & nonnihil lignosa, fibrosa, & sapore [etiam post annum amargissimum, ex quo habemus] acti & aromatico, Canellæ proximo, diuerso tamen, nullo lentore admisso, ut in Cassia lignea fusca.

Cassia lignea fusca aromatica & glutinosi saporis.



**C**anellæ siue miles tubuli, capaces, crassi, fusci in rubore, gustu Canellæ imbecilliore subadstringente, glutinosi. Corticem hunc satis magnis ramis detractum esse apparet. Copiose habemus datum nomine Cinam. ex Decan. quæ conseruauit suum saporem aromaticum etiam post triginta annos. Theob. N. blot, diligens & indu-

stius C. Wirtemb. Pharmacopæus Mont. habet in Officina, eaque loco Cassiæ lignæ, uti solet, eoque nomine emptam Lugduni, & in plerisque Emporiorum ita denominari testatur.

Cordus in Dispens. In Dianio Meluz: pro Cassia lignea vera, inquit, debet accipi, quæ nuper cepit effertur, figura Cinamomi, gustu alioquin nimis lubrica, & Cinamomi annula: ac non ille paruus cortex &c.

Cordus Matthiolum. reprehendit, quod velit Cassiam præter Dioscor. & Gal. sententiam lubricam esse gustus. Veritè imbecillitè carpit: non enim dicit notam esse Dioscor. & Galeno: quamuis hi etiam illam notam nequiquam denegent. Quid si hæc Cassia referatur ad nigram, purpurcam & crassam, quæ Zigir Dioscor. dicitur: Præterea Diosc.

Cordus vult, hanc fumendam, & non confuetum in lipidum corticem. Non dubitavi egregie aromatum in esse recentem, cum post tot annos haud minus generis boni gutturum aromaticum adhuc retineat. Equis licet quod annis iam tum in, quando aepicemus, ab arbore sua fuerit detracta. Sanè per tot annos nec inuoluta, nec vlla alia cura, quàm inter reliqua Cinnamomi, casie, atque confinium aromaticum genera, in theca interstitio iacet.

Ce, in fi-  
stula an-  
dromachs.

Xylocastia fuliginosa Bruynsee. ex Candel. Lobel. eaque est, cuius Muth. meminit cassie fistule Andronachi nomine : quam & Cordus in Diosc. Cassie Syringitis nomine expressisse videtur , ut censet C. Bauh.

*Cassia lignea fusca aromatica acrior.*

Alnus Cæſſie lignæ genus habemus, tubulis  
confiſtis in nobis, digito minimo paribus, di-  
midio ſerè tenuioribus, magiſque ſcabris & in-  
æqualibus, coloris ferruginei, laporis minùs viſidi,  
vegetioris, acrioris, magis aromatici, propiùſque  
ad Canellam accedentibus: Etiam ſuprà trifolium  
annuum annua revoluit.

*Cassia ex:erna parte insipida.*

**I**nter epistolas Doctissimi Pharmacopoei Valeriani Doney repetimus vnam scriptam à plantarum peregrinarum diligentissimo indagatore Alberto Martinello Veneto, subente anno 1567. Vengius : se mittere frustum generis Cassie lignee valde odorite, cui pars interior valde suaui s & aromatica, exterior autem insipida. An verò hæc sit vna ex iam descriptis, vel non, asserere non asumus.

\*\*\*\*\*

Q Vi, inquit Clus. Exot. l. 4. cap. 2. anno 1600. & eum sequente ex Molucis & Iauâ reduces,

Amittredamum  
aromata infere-  
bant, corticem  
quendam in lon-  
gos & enodes  
tubos conuolu-  
tum aduehebāt.

Conſt hant  
autem illi tubi  
cortice non val-  
de denſo, eoque,  
vt dicebam, enō-  
di, coloris ex-  
tiorē parte inter-  
dum candan-  
tis, nōnunquam  
cineracei, & illo-  
quidem laui, ali-  
quando etiam  
ſcabro, aliquan-  
tulū, coloris ſu-  
ſci, vt vilior que-  
dam canella cer-



Defectio  
C. 1. 1.

Camella Vi-  
lor.  
Sapor.

Substitutum  
legitima.

genus referri debere non inepte forsitan quippiam existimet } vicem supplere. Percontabatur porro ab his, à quibus eum corticem accipiebant, an intellexissent, quo nomine apud incolas appellaretur, & an arbore, à qua detractus, obleruassent, negabant omnes, & illud duntaxat se scire prohibebant, incolas, illius polline, ad condenda sua Eduia frequenter vii. Aliquo temporis spatio vero retentus & manducatus hic cortex, prater acrimoniam, lentorem quandam habere deprehendebatur. Similem etiam corticem ex *Parane* referebat biennio pòst, quo illuc vtebantur Canelæ loco.

Virendissimus Lambertus Hortensius Medicus, qui nunc vinctus, cui (symbolum Luna, ex Mellicæ & Lua redibat anno à Christi natiuitate 1601. donabat me exiguo Canellæ fragmento, quam in Lua nasci asserbat. Erat verò illud fragmentum quatuor vncias longum, semenciam penè latum, satisque crassum, coloris ferè in viliori canella conficit solet: eius odor exiguus, imò penè nullus: sapor, qui in viliori Canella, aut in cortice modò descripto, in quo tamen mandendo elibaretur quidam lentor, & veluti gummositas, quæ vel summis tantùm digitis admodum si hareret, & quodammodo Glutinis instar distendi possit.

Cinamomum Grecis *κιννάμωμον*, vt scribitur apud Anst. & Theophr. quod & apud Dioscorid. & alios *κιννάμωμον*, *Cinnam. muni*, vt quodidem, ab alijs etiam *cinnamini* appellatur: vulgo *canella*, à figura canaliculata. Est & *κιννάμωμον* apud Gal. Cinamomi generis inualidum, quod & ab ipso Gal. & Diof. *βουβωνιον* dicitur, & Cinamoides quibusdam Arabum Scriptorum nomina suprà dicta. Hodiernis Arabie hominibus cuiuscunque tandem generis canella sit, *Qersfas*, & *Qersfe*, vt vult Garcias: *Qurfa* vt Linchott. scribit. Reliqua verò nomina Arabibus prodita, corrupta sunt, vt *Darbbahan* & similia. Incolis Zeilan, apud quos plurimum crescit, *Curdo*, vt alii, *cuurdo*, vt alii *cuurde*: Malacitanis, *cais mains*, vt alii *cassinan*, vt alii *caumains*: M. labaris, & Iauanis *cameas*: vt alii *caina*. Quod verò Serapio *Darbhini*, arborem de China interpretatur, corrupta est interpretatio, & ab interprete addita. In Ormuz *Darbhini* dicitur id est *Iyom Chinenfe*.

Quæ verò Græcis *κασία* & *ἐποικασία* vocatur, vel vt Theophr. scribit *κασία*: *κασία* *οὐκ ἐστὶν* *τῆς κασίας*, id est cassia fistulosa Actuar. *vel* *α* Ni. Myrcel. *ἐποικασία* & *ἐποικασία* recentioribus Græcis: Lat. *Cassia* & *cassia lignea* Arab. *Selichab*, *Selichab*, siue *Selichab* à vulgo autem Indorum, eodem nomine dicitur quo *canella*: nullum enim inter *canellam* & *cassiam* discernim faciant, au. hore Garcia. Neque, vt verum dicam, inquit idem, quæ spiam cassiam à canella differentem vidit. *Cassiam* Lutin, inquit Hermol. pronuntiant, etiam si apud Græcos fore omnes geminata consonante scribitur. Cassiam autem Etymologicum dici vult *ἐκ τῆς κασίας*. *οὐκ ἐστὶν* *τῆς κασίας* *οὐκ ἐστὶν* *τῆς κασίας*. Sed forte fistulosi quasi *κασία* dictum putabimus, quod corticem concinnæ in opere mentum denotat, cuiusmodi sanè fore conspicitur Cassia nostræ tubuli. Ital. *cassia*, atque etiam Italorum vulgo *Canella*. Gal. *canelle*. Hisp. *canela*. Belg. *Canel*. Germ. *Zimmet* & *zimmet rinden*, vel *zimmet röltn*.

Ceterum quod Canella diuersa Cinnamomi  
& Cassiæ nomina indita fuerint ab Americanis,  
occasionem præbuisse, putat Garcias, mercatores  
Chi-

Chi-



Chinenses, (Nam Annales vrbis Ormuz prodūt olum quadringentas naues ē China vno eodēque tempore eō appulisse) qui cum ā sua regione autum, siccum, vasa murrina [ porcellanas vocant ] moschum, Cuprum, margaritas, aliasque huiusmodi merces eueherent, nonnullas ex eis in Malaca vendebant: fandalum, nucem myristicam, macerem, Caryophylla, lignum aloēs, contrā in suas naues inferentes: quæ rursus in zeilan & Malauar diuendebant, indēque sumebant Canellam, ex zeilan videlicet laudatissimam, & ex Malauar minūs selectam. Similiter & ex Iaoa. vnde etiam Piper Cardamomūque euehebant, eāque omnia deinde Ormuz, aut in Arabia oram maritimam perferrebant. Cum igitur quæ in Iaoa & Malauar supplerāt, differre conspicerent, diuersa illis indidēre nomina, eūdem tamen eiūsdē generis essent cortices, pro soli cœliq; varietate solum differentes, vt plerumque idem fructus pro regionum & soli varietate suabior fieri, aut ā naturali bonitate degenerare solet. Ementes ergo Ormuz incolæ eam *Canellam* ā Chinensibus, idcirco eam *Darchini*, quod Pērsis lignum Chinense sonat, appellarunt: deinde Alexandriam vebentes, vt eam Græcis confluentibus carius venderent, *Cinamomum* vocarunt, quod significat lignū odoratum, quasi Amomum ex China delatum. Deteriori autē Canellæ, quæ scilicet ex Malauar & Iaoa delata esset, idem nomen quod in Iaoa appellatur, indiderant, scilicet *Cais mains*, quod lingua Malaya dulce lignum sonat [ hanc corrupto vocabulo cassiam Græci dixerunt ] duo diuersa nomina eidem rei imponentes. Vt est autem Aui. cum Rhase & reliquis Arabibus vocabulo Pērsico *Darchini*, vt plerique alijs Pērsicis solet. Hæc ex hist. Garcie.

Verū quoniam Garcias Indicarum rerum naturalium sine dubio diligentissimus & sagacissimus Scriptor planē vult cassiam, cinamomum, & nostram Canellam, vnum idēque medicamentum esse, placet ea de re eius placita subicere. Scribunt [ inquit ] nonnulli Canellam nostram Veterum cassiam non esse, quod [ vt aiunt ] nigricans sit, & inodora: aut, si sit, Pleudocassiam Dioscor. esse potius, quā legitimam. Fit interdum, vt etiam hic in India cassiam admodum depretuatam cum alia inueniamus, non exigua quantitate ( quoniam aut non benē parata fuit, aut non suo tempore cæsa ) quandoquidem vix Aromateperias corruptioni magis obnoxium, quā Canella est, præsertim si diu in nani persisterit. Est enim ea regio putredini admodum obnoxia, maritimis præsertim locis, immo quotidiana experientia videmus, *Canellam* singulis annis multum de sua illa odoris & saporis suauitate deperdere. Si quis plura de cassia requirat, legat Monardum lib. Epist. 8. ep. 1. Sed quod Cinamomum cum Matthiol. neget, in eo falluntur, cum *Cassia*, *cinnam.* & *nostra canella* vnum idēque sint medicamentum. Annotauit Lacuna lib. 1. cap. 13. in ædibus Iudicis Vlyssipone se omnia Cinamomi genera ā Veteribus descripta obseruasse. Sed ego hic in India plura duobus non obseruauī, videlicet quod in zeilan nascitur, & quod in Iaoa & Malabar. Nam quod in Lusitaniam deuehi solet, zeilanicum omnino est. Poterit autem fieri, vt quinque genera bonitate discreta inuenerit, non autem genera diuersa. Nusquam alibi, quod sciam, nascitur *canella*, tametsi Francicus de Tamara scribat in freto maris Erythrei Cinamomi arbores, & Lauros maris æstu interdum operas inueniri: quoniam nostri singulis annis per mare E-

rythreum nautigant, nullam tamen huiusmodi arborem viderunt. Nam quod ad Occidentalis Indię historiā attinet, non verisimile videtur Canellam istic nasci quandoquidem eam dicunt calyces glandēque suberis modo ferre, cum legitima *Canella* velut oliuas ferat: sed alia erit sui generis arbor [ de qua nos postea. ] Nec, vt eadem refert, in China nascitur: nam ē Malaca Chinam cum alijs mercibus deferretur. Intellego verò plurimam etiam Canellam in insula Mindanao nasci, & vicinis Insulis: sed eę ptoculā China absumt. Putarūt etiam nonnulli in Alep nasci Canellam, quod apud aliquod Scriptores præscriptum inuenerint

Cinamomum Alipinum: sed sciant non magis istic, quā in Hispaniis nasci. Verū cum ex regionibus Ormuz & Giden, atque inde Alep deuehatur, lactum est, vt incorrupta & recens Canella isthinc in Europam aduecta, ab ipsa vrbe Alep denominata sit. Quamuis autem zeilanica reliquis præferatur, inuenitur tamen etiam interdum ignobilis, qualis est, quæ crassiori cortice constat, minūque in Tubulos conuoluitur, quod non sit eiūsdem anni: quod enim vetulior cortex eō deterior. Quæ verò in Malauar nascitur, tota ferē est ignobilis, tantūque ā zeilanica differt, vt centena zeilanica libræ decem aureos pendeant: Malauaricæ verò libræ quadringentæ vnum duntaxat aureum. Cæterū ut de nominibus generum canellæ ā Veteribus traditis aliquid hic dicam: fieri posse existimo, vt zigir vocatus fuerit totus ille Chingalarum tractus, qui est zeilan. Nam Pērsæ & Arabes nigros vocant zangues: omnes verò zeilan & Malauar incolæ nigro colore præditi sunt. Mosolyticum ab insula zeilan, quæ montosa est dici puto. Plin. in Gebanitarum portum Ocila vocatum deferri tradit, qui nihil aliud est, quā Chingalarum siue zeilan portus. Huc vsque Garcias.

Fallitur itaque Cordus, quando scribit: Omnes Cinamomi & Cassiæ species partim in India partim etiam in felici & odorifera Arabia nasci. Sed multo crassius Marcellus, qui ad cap. Dioscorid. de cassia & cinam. ait cassiam in maiore Romanæ gentis fortuna vbique in aluearibus cohiant, & sub Septentrionibus viuere coactam, nullibi tamen nostra græte in Italia reperiri: negatam oculis formam eius omnem & speciem difficillimūque nobis de ea commentationem facere, præsertim in tam corruptis Græcorum Latinorumque omnium codicibus, & in tanta Theophrasti Plinique in eius historia breuitate. Sed hallucinatur bonus ille Marcellus, quamuis ex Plin. ita putandi anam desumpserit. Nam nec olim quidem vnquā Italiam Dioscor. & Veterum cassiæ prouentu gauisam esse, existimamus nec hodiē gaudet aut fortē gaudebit: tantō minūs sub Septentrionibus.

Linschott. eadem ferē quæ Garcias prodit, insulam Seylon Cinamomum præstantissimæ notæ producere: ibi per syluas & saltus abundanter ipsa. Haberi & in tractu Malabar: verū vix ex dimidio comparari posse Seylanæ cassiæ, quod & arbores humiliores sint, cortice crassiore, ac virtute haud perinde efficaci. Idēdē cassiæ ex Seylon triplicatam suprà hanc æstimationem esse. Vocatur hæc *Canella de Mara*, id est, cassia syluestris. Edicto, ne quis eam in Lusitaniam vehat cautum est: verū nihilominus magna copia exportatur, titulo tamen *Seylanæ Cinnami*: vt Regi idēdē ex bona malacæ cassiæ vestigal sit: Cū in India Cassiæ Seylanæ quintallus 50. aut 60. pardauis æstimatur, tum syluestris duntaxat 10. aut 12. valet. In In-

Nullam  
Canellam  
in America  
nasci.  
Nullam  
item in Chi-  
na.

Cinamo-  
mum alpi-  
num  
Compara-  
tio Canel-  
larum in-  
ter se  
Canella  
zeilanica.

Canella  
Malauarica  
Pretium.

Zigir Ge-  
terū quid

Nigri.

Mosolyti-  
cum  
Ocila Plin.  
quid.

Cordus  
not.

Marcellus  
lappus.

Insula Sey-  
lon præstan-  
tissimum  
Cina ferē  
Malauarica  
arbores  
Cinnam.  
quædā  
Cassia sit  
vestigal.

Æstimatio

*Fr. sigal  
ca. nam*

*Lignum  
pro igne ci-  
nam. redol-  
et.*

*Lignum  
arboris ca-  
nella.*

*Ag. ex flo-  
ribus ca-  
nella arbo-  
ri*  
Delectus.

*Delectus  
Gal. not.*

*Vires & v-  
fus.*

*Aqua cin-  
nam. Syri-  
ac.*

*Colica.*

*Oris halit-  
tu  
Aqua ex  
floribus.  
Stomachic.*

*Gargaris-  
proh.*

dia tamen *Scylane* titulo; albo inscribitur, cuius etiam nomine Lisbonæ vedgal soluit, 15. aut 16. milretos in quintallum indifferenti aestimatione, circa bonam aut deteriorem Caliam. In laua, ad latus Sunda C. sic sylvestris magna copia crescit. Arborea tenetiores pro optimis habentur, ceteræque una non notabilem, sed communi ferè ligno similem habent. Vili pretio emittitur magna copia. Lignum quod igni struendo communiter per Indiam vsurpatur, odore Cinnamomum aliquo representat.

Lignum arboris canellæ, vt testatur Olius, quod fortè non contigit vquam vidisse, neque in celeberrimis erapontis inspexisse, hodie Veronæ apud Calceolarium prostat. Similiter Cinnamomum tam vehementer à Galen. celebratum, cuius nunc, vt idem ait, maxima inopia; fragrantissimum & iucundissimum odore, leui cortice & tenui, quale nec Antuerpiæ vidisse neque alibi dicere, apud eundem haberi, quemadmodum & Aquan ex floribus Canellæ arboris stillantiam, quam & olim pro Regina Flandriæ Margarita Austriaca habuerit.

De Cinnamomi delectu pro Soli natalis ratione, satis multa paulò antè. Si quis & nostræ canellæ delectum facere velit, Is sciat nobis cum Actuarius *de delectu canellæ*, nempe tenuius & interiorius, pro optimo, odoratissimo, suauissimo, acutissimoque probari. Ceterum rogatos vult Garcias, omnes cum Medicis tum Pharmacopœos, vt vultu calceolario euellam deteriorem præscribere desinant, & sceleratissimè vtantur, quandoquidem tanta nunc eius sit copia. Tum etiam re cassiam duplici pondere pro Cinnamomo in compositionibus in reant, tamen si freti Diosc. & Gal. auctoritate.

Iam suprà monuimus ex Hermol. apud Veteres per cassiam Syringam seu fistulam, non etiam sumendam quæ nunc [magna barbarie & rerum ignorantia] etiam ab omnibus cassia fistula dicitur, sed canellam hanc nostram siue cassiam odoratam, quæ & ipsa fistularis est, vt dictum. Felix, si modò liber eius est qui circumfertur, appellatione fistula simpliciter, cassiam odoratam siue aromaticam intelligit.

Ex Cinnamomo, etiamnum ex parte viridi, aquæ magnæ aestimationis destillat one educuntur, quæ in India maximo in vsu sunt, & in Lulitaniâ item transmittuntur. Odore ac potu amœnæ sunt: ceterum calidæ & vehementes, valent aduersus dolorem colicum, aliâque infirmitates, ex frigida intemperie, etiam contra prauum oris halitum. Aqua item ex floribus Cinnamomi prolicetur eadem arte destillatoria, sed quæ fragrantia & odoris suauitate prædictæ cedat. Vtilis est ad multa. Nam stomachi imbecillitatem roborat, coli dolores ex causâ frigida provenientes illico lenit, vt plerumque se expertum testatur Garcias, faciei colorem commendat, atque etiam oris halitum. Viraque verò ad cœdendos suauioresque efficiendos cibos perquam idonea. Sed Lacunam perperam reprehendit, aut sanè non intellexit Garcias, quando eum in simulat, quasi ex solis floribus aquam elici prodidisset lib. cap. 12. Nam apertè in suo Commentar. Hispanicè edito vtriusque meminit, à paucis annis ex Indiâ importari cœpti, & ad omnes lymphothimias & cordis stomachique debilitates, tantum remedium admirabile prædicat. Sumpta duo cochliaria ieiuno ventriculo firmare & confortare ad deliquium animi proclues: ventriculim imbecillum incredibili celeritate rescire. Re-

soluere omnem ventris dolorem à flatu vel à frigore externo.

Ex canellæ baccis oleum extrahitur, quemadmodum ex Oliuis, sebacem quodammodo, & saponis Gallici modo in panes coactum, in odorum, nisi calefactum sit, tunc enim cinamomum aliquantulum olet. Eo vtantur aduersus ventriculi & neruorum frigidam intemperiem. Radix canellæ, aquam præbet camphoram redolentem: verum ea [edito ita cautum] non euellitur, ne loboles pereat. In nostris quoque regionibus ex canella destillationis artificio aqua variis modis paratur. Alii eam contritam aqua fontana assuta destillant. Alii per dies octo in aqua ardente macerant. Quod si in aqua ardente rectificata, hoc est, pluries destillata maceretur in vase vitreo bene in crustato & tum destilletur lentè, spiritum extillare nouimus, cuius guttula vna altera integrum cyathum vini statim velut Hippocraticum efficiunt, præsertim si aliquid sacchari addas, nisi vinum per se sit dulce. Alii & alia aromata simul macerant in eundem vsu. Mirum quam velleuerit minuat guttula eius spiritus imbuta lingua, vniuersum statim os incalescat, ac vis eius etiam ad cor & vniuersum corpus pertingat. Sed senibus ac pituitosis hominibus tantum eius vsus esse debet, isque parcus. In cæteris minds tur.

Tutior est sequens. Cinamomi optimi triti non cribati, libram, pone in fundo vasis destillatorii, cautè, ne pulvis dissipetur aut lateribus adherat: & mox sequimur aquam recentis affundes, & operculo imposito, & vase recipientis subiecto, ignem lentum subdes. Destillari solet eo modo quo aqua ardens, nempe tubulo per dolum frigidâ plenum traiecto, per quem ex vase destillatorio in recipientis vas defluat. Possit etiam, vt Euclymus putat, destillari in cucurbita vitrea lato in crustata, vt aqua fortis, eo modo fortassis fortior, non iccirco melior, vt idem censet futura. Sed prior modus nobis & expertis melior, & vtilior videtur, qui fit per B.M. modoque prædicto. Nos vini albi optimi lb. ii. ad Cinam. cl. lb. cmis affundere iubemus, atque ita destillare. Et sanè suauissima est quæ sic paratur, & inter eam quæ cum vino ardente, ac eam, quæ cum aqua simpliciter paratur, media. In morbis calidioribus tamen, vbi eius vsus requiritur cum aq. ros. destillari potest, addito etiam, si videatur, modico vini. Aut iam destillata modicum cum Iulepo rosato permisceri. Ita longè suauissimum ac tutissimum Cardiacum efficitur. Quæ effluit aqua, albeat, quæ tamen facili clauficatur. Sub finem etiam clarior effluit. Si augeas ignem tandem & flauescit. Sed vix immunis erit hæc Emphyreumatis. Albedo illa in oleum cogitur, quod postea separatur: sed magis olei innatabit quod recentius & melius fuerit Cinnamomum. Item si cum aqua aliquid spiritus vini affundas, qui potentius quam vel aqua simplex vel vinum Cinnamomi vni prolicet. Cum aqua flauescere incipit, peractum opus est. Sed satius paulò infra subfistere. Sunt qui eandem rursus, separato oleo, alio nouo Cinnamomo affundant, & denuo destillent, vt prius. Ita quæ effluit aqua, longè efficacior & calidior, quam prædicta. Ex Cinnamomi libra vix olei boni & puri drachmam aut drach. vnam & semis aut ad summum duas elicias. Hoc cum cere albâ modico nonnulli in crustant, & pixidibus argenteis ac magnificis, cum aliorum aromatum eodem modo paratis oleis, affabunt ad hoc aucupium paratis inditum, Diuitibus & Magnatibus



tibus magni diuendunt, pro Balsamo Cinamomi.

Matthiol. Aquam Cinamomi ita parat. Sumito Cinamomi lib. i. aq. ros. stillat. lib. iiii. Vini albi odorati lib. semilem : destilletur in B. M. Vt parandi modo, ita & viribus variat Aqua cinnamomi : sed in genere, vires egregie reficit : contra omnes morbos quos figus excitauit, efficax est, vt pote quæ pituitam humorumque lentitiam digerat, incidat, absumat, flatûsque discutiat. Præuatim verò ventriculum iecur, Lienem, Cerebrum neruôsque iuuat & roborat : animi deliquio, cardiacisque affectibus præstantaneo remedio succurrit, venenis venenosorumque animalium moribus aduerfat : mentes pellit, & vinam ciet. Cæliacis auxiliatur, nauseam sedat, & fastidium abigit, vteri morbis perquam vtilis est. Proinde suppuriosis, resolutis, conuulsis & Comitiali morbo laborantibus, gustui gratissima est, atque oris halitum commendat. In summa vbi exalfacere aperire, incidere, digerere & roborare sit opus, huius aquæ vsus maximam præstat vtilitatem. Atque adeo quicquid virium Veteres Cinamomo & Cassia tribuerunt, huic nostro quoque egregie competunt, quas antea inter Veterum placita recensimus.

Consuetus est hodie apud multos puluis Ducis dictus, ex Canella & Saccharo paratus, ad prædicta omnia vtilis, suauissimi gustus, vt hodie ad ditiorum fercula addito vino embammatis vicem præbeat : eò cupiditas venere mores, vt & medicamentorum delicias in cibi delectum traxerint.

Præstans quoque est Syrupus de Cinamomo quem nos eleganti nec inarustico compendio parare nouimus cum aqua ardente in qua aliquandiu Cinnamomi nodulus maceratus fuerit, accensa, quo ad satietatem sit, & modico sacchari adiecto. Nihil suauius excogitari potest. Diligentibus & curiosis sat diximus.

Hippocraticum vinum quod ex eadem paratur in vino infusa, & per manicam Hippocratis, [ vt vocant ] hoc est, siltum, cum saccharo transcolatum, nunc vbique in vsu est. Addunt & alia aromata, cum nostris hominibus nil nisi ex variis commixtum sapiat. Nobis quò simplici, eò suauius videtur. Si tamen aliquid pipetis, zingiberis, aut Caryophyllorum, vel omnium simul libeat addi, non meramur. Hæc palati hodie illicia sunt. Hippocraticum aqueum, quod Galli Bonchet vocant, & Hippocras d' eau Gerin. Wasser Hippocras, Aqua Hippocratica, cum aqua limpidissima saccharo & Cinnamomi puluerisati modico parata, in sui & ardoribus, etiâque putridis & pituitosis febribus gratia & vsu multum prodesse potest.

## CINAMOMI FOLIUM CLVSIO.

Refert Clus. in notis ad Garciam Cinnamomi duos ramulos in Belgio se vidisse, tertium Bristolii. Lignum inodorum, corticem tenuem, odoris ac saporis incunctatam maiorem quam in nostra Canella. Cuius folium à D. Io Placa medico Valentino se accepisse ait.

Nobis verò ex tam paucis nondum constare potest, quodnam aut cuius plantæ sit folium hoc à Clus. depictum : non enim existimamus esse Cinamomi folium, ac ne quidem Cinnamomi ipsius Clusi : cuius Cinnamomum nihil nobis aliud est.



se videtur quam Folii Indis vulgari Li-gnum & cortex. Potuisset tamen is, imò debuisset foliū illud diligentius describere, vt aliàs facere consuevit, præsertim in exoticis & raris.

Sic & Lob. in Obs. & icon. & Hist. Teut. Cassia titulo exhibet idem foliū & lignum à Clus. propositum pro Cinamomo : quale autem sit foliū, cuius coloris, o-

doris aut saporis &c. non demonstrat. Si existimauit esse idem folium cuius mentionem facit nomine folii Cinamomi cap. de Malabathro, saltē nos monere debuisset. Taber. quoque in sua iconiungit Cinamomi folio Clus. Canellam vulgarem, ac ni multum fallimur, Cinnamomum Clus.

Hoc idem folium posuit Casp. Bauhin. ex Taber. apud Matthiol. titulo Cinamomi Officinarū. Vnde id norit aut sciat, nos latet.

Lob. reprobi

Taber. tan-

C. Bauh.

## CANELLA FOLIO MALI PVNICÆ.

Canellæ similes plantæ seu arbores M. Fumce [hist. gen. Ind. Occid. Gallicè edita] tradente, proueniunt in Moluccis insulis, valde similes Malo granatæ : ex quarum floribus paratur aqua &c. Eodem autore, in Insulis Leucois arbores similes sunt Granatis, quarum cortex gustu Canellæ similis est, sed acris vt zingiber, odore Caryophyllorum : non sunt tamen in numero aromatum. Fr. Loupez de Gomara hist. gen. Ind. In Maluccarum, inquit, insula abundat Canella, arbore Granato valde simili, &c.

Canella fr. milti plant.

## CANELLA PERVVANA FRVCTV

Pileo simili. Et alia ei similis arbor.

Scribit Monardes in noui Orbis prouincia Squadam, quæ à Canella nomen sumpsit, sub Equatore sita, ab Indis Cumaca vocata, Arbores quæ Canellam ferunt, mediæ esse magnitudinis, & immortalis coma præditas, vt reliquæ Indiæ arbores, foliisque habere Laurinis similia : Fructū esse paruo pileo seu petalo formâ similem, ealitudine quâ nummus Hispanicus octo regalibus æstimatus (qui Germanici taleri amplitudinem æquat) interdum etiâ maiorem, intrinsecus & extrinsecus ex purpura nigricantem, interius læuem, foris asperum, cuius margines crassitie iam dictum nummum æquent, summities verò longè superet, & pediculo prædita sit, vnde ex arbore dependeat. Gustatum eandem saporis suauitatem & odoris fragrantiam habere, quam legitima

Descriptio

Arboris  
cortex.

Canella  
Orientalis.

Cassia.  
Cinnamo-  
mum. Cas-  
sia lignea.

Canella  
Peruana  
arboris de-  
scriptio.

Non deco-  
quenda.

Cultus.

Arbor can-  
nellæ ferax.  
Folia Lau-  
ri.

Siluestres  
et iuxta.

Canella ex Orientali India delata, cum nonnulla adstrictione coniunctam. In puluerem tritum, & edulis insperitum, eandem illis saporis & odoris gratiam conciliare quam Indica canella. Arboris corticem, qui crassus est, nullum canellæ spirare odorem, aut saporem referre. An interior tenuior-que membrana simile quid obtineat, ipsum latere: nam crassior duntaxat corticem, ipsumque fructum vidisse. Folia trita [inquit idem] tenuem quandam Canellæ odorem spirare ferunt: sed pinnaria vis in solo fructu consistit, contra quam in Orientalis India Canella, quæ omnem odoris & saporis gratiam in cortice obtinet, ut omnibus notissimum. Verum quidem est, alteram alteri præstare, quoniam licet eiusdem generis sint omnes arbores quæ Canellam ferunt, aliæ tamen tenuiore cortice præditæ sunt, qui magis commendatur, aliæ crassiore, qui superiori bonitate cedit. Hinc factum est, ut nonnulli Canellam in varia genera distinxerint, videlicet in Cassiam, in Cinnamomum, & in Cassiam ligneam, cum tamen vnius arboris genus istos cortices proferat, & sola loci varietas faciat alteram alteri præstantiorem. Itaque Cassia & Cinnamomum solis nominibus differunt, cum vtroque Canellâ tenuior & præstantior sit. Eam ob rem, ubi Cassia præscripta inuenitur, cinnamomum substitui potest, & e contra. *Hæc Monardes.*

Quod ad Occidentalis, quam vocant; Indię historiam attinet, tradit Garcias non verisimile videri canellam istic nasci, quandoquidem eam dicunt calyces glandæque Suberis modo ferre, cum legitima canella veluti Oliuas ferat, sed aliam esse sui generis arborem. Quotquot tamen Peruanam historiam descoperunt, istius canellæ, quam in Prouincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt, teste Clus. Est verò, ex eorum descriptione, canella ea arbor vasa admodum, folio Laurino, fructu racematum coherente, sed qui calyce suberino simili contineatur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigricante. Huius arboris fructui, foliis, cortici & radicibus [licet canellæ saporem & odorem habeant] longè calyces præferuntur, quorum duntaxat pulvis in vñ est. Nam si canella modo cum cibis decoquantur, tantum abest ut suauitatem edulis conciliet, quin potius eorum facultas & saporis gratia decoctione euanesceat. Quamuis autem multæ sint huius generis arbores syluestres, diligenter tamen & magna cura eas in suis prædiis colunt, [sic enim cultu longè melior] atque in vicinis regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi.

De hac etiam Fr. Gomara in *Hist. Gen.* c. 143. Aug. Carate lib. 4. *Hist. Perua. cap. 2.* & Pet. Cieca, parte prima *Chronici Peruaui*, c. 40. Virb. Caluet. ad Benz. lib. 3. c. 8. eandem denotat his verbis. Regio Canellæ ferax in Quitenfi Prouincia Orientali. Arbor Canellæ ferax in Prouincia Zumaco sub Aequinoctiali linea reperta, ampla est, foliis Lauri, minutis baccis racematum coherentibus, quæ calyce Suberino aut Quercino simili continentur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigricante. Hæc etsi syluestres per se sit, tamen culta longè nobiliorem Canellam quam illæ, producit: ideoque eam incolæ & diligenter colunt, & in magno pretio habent. Caterum in hac Caluet. descriptione hoc obscurum videtur quod ait minutas esse baccas, quæ tamen calycem habeant Suberino ampliore, in quo contradictio esse videtur. Contrarium etiam dicit prædictis authoribus, præsertim Garcie & Monardi,

quando ait, cultam longè nobiliorem Canellam gignere. Nam Garcias negat, villam in ea India canellam gigni: & Monardes arboris corticem nullum Canellæ spirare odorem, aut saporem referre. Nescite tamen se ait, an interior membrana simile quid obtineat. Præcipuum vin in calyce ponit, quam annotauit Franciscus Loupez Gomara in *Hist. sua Indię*. Suspiciamus igitur Calueti descriptionem ex diuersis arboribus compositam. Certiora docebit ingeniosa posteritas. Considerent Lectores etiam, an non pleraque in hac descriptione conueniant cum folio Indo, si calycum amplitudinem excipias. Thom. Hariot. in *Hist. Virgineæ insulæ*, cuiusdam arboris meminit, Alopoe nomine, valdè similis Lauro, cuius cortex calidus & sacris gustu, ac tradit eam multum referre arborem Indię Occid. quam Monardes vocat Cassiam ligneam.

Calycum puluere, ut prædicti Authores tradunt, ad plerisque morbos vniunt, sed præsertim aduersus Colic, intestinorum & stomachi dolores in potionibus propinant. Vulis porro ad multa est hic fructus Canella vocatus: nam in pollinem tritus ventriculum roborat, flatus discutit, oris fetorem corrigit, cordi prodest, & colorem faciei commendat. Pulvis & cibus veluti Canella inspergitur, quoniam iidem facultatibus præditus est. E vino aut aqua ad eam rem accommoda sumptus, muliebres purgationes molitur. Calidus est in tertio excessu, & siccus in primo, cum manifesto robore, ob adstrictionem quæ præditus est.

## CINAMOMI ET CASSIÆ SVBSTITVTVA

ET SVPOSITITIA. ITEM ADVL-  
teris, & æquiuoca.

Cinnamomi & Cassiæ substituta paucis dicemus, non quod alicubi eorum defectura esse putemus apud nostros, sed ut vel facultatum similitudo ex Authorum sententia pateat, vel sanè dissimilitudo ex ratione. Ergo cinnamomo deficiente, Cassiæ aut Amomi duplum ad odoris gratiam ponit Galen. lib. 5. *Comp. Med. in dentificio*. Pro Cinnamomo duplum optimæ cassiæ, vel cum Quinto Medico duplum vel multum Carpesii, vel certè non parcius Cassia eidem supponitur lib. 2. 9. & 8. *Comp. Med. & lib. 1. Antid.* Quidam carentes Cinnamomo in vicem eius ponunt æquale pondus ex Sem. Cardamomi. Syluius ait, se pro Cinnamomo cassiæ optimæ duplum miscere medicamentis, ut quantitate qualitatis imbecillitatem redimat. Colleg. Florent. cinnamomi vulgaris, quam canellam vocant, duplum. Nos selectæ nostræ & interioris canellæ æqualem portionem sufficere existimamus. Tractatus Quid pro Quo, cinnamomo substituit duplum Cubebarum.

Præter rationem nobis videtur Ruta sylu. supponi pro Cinam. ut est in Antibal. Fuchsi & aliorum. Neque nobilissimum & odoratissimum aroma petentibus, scetidam obtrudunt herbam.

Sabinæ duplum pro Cinam. poni planè displicet, quod fit in Syluii substitutis & aliis.

Valerianæ Hortensis radicum pro Cinnamomo vsum ex Cæsalpino ostendimus e. de Valeriani. lib. 27.

Cassiam existimari à quibusdam Malabathrum, siue solum Indum vulg. demonstratum est antea suo loco.

Cæsalpino Cassiæ speciei & odore simile est lignum



gnum Salsafias. Pro Casia cortice, inquit Syllius, & Gal. lib. 6. comp. med. Nardus Indica vel Mulabathi folium.

Casia substituit Sabinam inuenimus in tract. Quid, pro Quo, Fuchsi & Placotom. quod antiballomenon nobis neutiquam placet.

Scribit Anguill. esse qui Sabinam, quæ Diofcor. similis Tamarisco dicitur, esse Casiam veram putent: quorum opinio nobis reprobanda videtur.

Annotat Placarius Sophisticari quandoque Casiam ligneam admixtionem radicum Capparis. Pro Casia Poëtica siue Hygini exhiberi Lauendulam dicitur suo loco. Rosmarinus Coronarius à quibusdam estimatur Casia Hygini & Virgili. Casalpino Cneorū Theoph. & casia Plin. est planta Clusio dicta Sanamunda.

Casiam videntur Latini appellasse Chamæleam, inquit Ruellius. Lob. autem & Pena dicunt Guilandinum hallucinari dum Chamæleam cassiā esse putat. Plin. Chamæleam in petrosis nasci tradit: videtur autem, inquit Casalp. intelligere Cneorum candidum Theophrast. quod inter Coronarias Casia à Latinis vocatur: de qua nos mox. Casia Matthiol. quam alio nomine Cneorum vocat, est Chamæleæ species Tabernamontano. Thymelæam Latini casiam videntur appellare, inquit Ruell.

Annotat Tragus Thymelæam Diofcor. Hyginam casiam nuncupasse. Tragi autem Thymelæa videtur nobis dicta Laureola folio deciduo.

Caryophyllorum lignum quibuldā videtur habere similitudinem Cinnamomo Antiquorum.

Catalpin. caryoph. intelligit esse Carpesium Quinti, & antiquos pro cinamomo vltos.

Cassia loco in Diamarg. cal. Aui. malè imponitur Tapfia ob depravatam lectionem. Legebatur Casia, teste Lac. in annot. in prem. Dilector. Sed crassius & ridendus mehercule, est nuperorum etiamque fumosissimorum quorundam medicorum error, qui cassiæ solutivæ siue purgatricis corticem singulari suæ vel oscitantæ vel inscitæ aëuo usurpant & præscribunt in affectibus muliebribus & aliis pro vera cassia.

In cassiæ nomine, inquit Marantha, facilè est errare: eam, quæ ab Hygino ita appellatur, atque si Gazæ interpretationem insequamur etiam à Theophrasto, ad menses educendos exhibendo, vice nimirum odoratæ, vel ad alium leniter emolliendam: cathartica credentes esse cassiam: posset hic error hominem ad interitum facilè perducere: cum Hygini Theophrastique cassia [est enim Cneorum] vehementissimè pituitam, bilèque extrahat.

Hec circum (stationem apum) casia viridet & olentia latè  
Serpilla &c.

Item:

Subiciunt fragmenta, Thymum, & suisque re-centes [al. virentes.]

Casia re-centes.

Io. Frisius in suis ad Virg. Scholijs casiam interpretatur peregrinum pretiosum corticem, cinamomum, Zimmet aut cinamomo similem. Quam postremam clausulam non incautè adiecit. Nam similis esse nobis videtur: sed nomine fortè solo. Verùm, ne furor quidem ultra crepidam, habet adagium. Ita nos de ipso. Obseruasset saltem Virgilium casiam inter herbas, cæque domesticas reponere, quamuis idem Georg. 4. vci dicebamus, casiam aromaticam intelligat, cum ait:

Nec cassiā liquidi corrumpitur usus Oliui.

Quin & in nostro orbe leritur, [cassia] inquit Plin. extremè in margine imperii, quæ Rhe-nus alluit, viuic [vidi. ver.] in alueariis apum fata.

Marcelli not.

Color abest ille torridus sole, & ob id simulidem odor. Ex hoc fortè Plin. loco, vti dicebamus, deceptus, vir alioqui ingeniosissimus Marcellus, credidit casiam aromaticam hic à Plin. intelligi, quam ait in maiore Romanæ gentis fortuna ubique in aluearibus consistam, & sub Septentrioni-bus viuere coactam, nullibi (quod nouerit) nostra ætate in Italia nunc reperiri. Negatam oculis formam eius omnem & speciem. Casiam quam nostra ætatis medici ligneam appellant, vogue-nat ferè, tartiis, vitæque deliciis magis, quam medicinæ quondam quasitum fruticem: ideoque ab omnibus Poëtis passim celebratum, diuersum ab ea arbore: quæ eadem cum cassiæ appellatione filiquas potius quàm fistulas fert. Casiam Poëtarum fruticem dicit, cum Virgil. manifestè inter herbas recenscat. Ac eandem à casia Veterum aromatica non distinguit, sed à purgatrice tantum.

Caterum ad Plin. citatum locum annotat Dalechamp. hæc verba: casia, Lauendula nostra, Theophrast. alba casia: eidem nigra, nostra Libanotis coronaria. Casiam Hygini, quæ Theoph. cneorum est, cum India negligenter Plin. hic confundit. At nos, quam plantam intelligat Plin. asserere non possumus. An benè conueniat descriptio cum Lauendula, Libanotide Coronaria & casia Hygini, suis locis demonstrabitur. Considerandum, vt alio etiam monebimus loco, quænam conueniant cum Tamarisco in prædictis Plin. verbis.

Lauendula. la. Libanotis coron.

Rursus alibi Plin. In coronamenta folio venè-re Melethron, Spireon, [Spiræa M. & CH.] Tri-gonon, [origanum ex Th. Thryganum. CH.]

Plin. cor. tri-gon. CH. Casia coronaria.

Casia coronaria, quod casiam Hyginus vocat: & quod cunilaginem, quæ Conyza [ & Conyza, quam Cunilaginem. Vet. ] Melisophyllum, quod Apiastrum, Melilotum, quod Sertulam campanam vocamus. Item paulò post. Et Cneori duo genera, nigri atque candidi. Hoc & odoratum: ramosa ambo. Florent post æquinoctium autumnii. Et alibi, casiam inter alia coronamenta iuxta aluearia ferendam præcipit, Thymum, scilicet Apiastrum, Rosas, Violas &c: quæ Theophr. vt suffruticum genera [и розанкой] recenset, non vt plantas ad Coronamenta expetitas.

Cneorum album Anguill. Lauendula nostra vtraque, mas & femina: Cneorum nigrum, Libanotis coronaria siue rosmarinus, cuius nusquā Cneorum album. sub alio nomine Theophrast. meminit, inquit idem Dalechamp. Ergo videamus quid Theophr. de Cneoro scribat. Eorum, inquit, (suffruticum) quibus aculeus deest, digestio nulla penitus ge-

Qq

## DE CASIA APVM, CORONRIA ET Poëtica: etiamque de Cneoro.

### CAP. XIII.

Emersi tandem ex cinnamomi & cassiæ aromatica tractatione, nihilominus de cognomine vel potius æquiuoca Poëtarum casia, aliisque huic similibus, si non isdem, tradendum restat. De illa autem in Virg. Eclog. 2. sic canit.

Tum casia atque alius interexens suauibus herbis, Mollis luteola pingit Vaccinia Caltha.

Item:

Nam ieiuna quidem cluiflos glareararis Vix humilis apibus cassiās, vorèque ministrat.

Item Eccl. 4.

Tom. I.





iudicent Medici & Pharmacopœi, qui Romæ degunt.

Rauuolff. in itin. de plantis montis Libani, scribit, se reperisse cassiam Monspeliensem ibi vocatam *Mackquid* & *Muckmiff*; baccas autem *Habel mickemes* : suspicaturque an sit *Anacardium* Rhafis.

Cassia lignea maritima Hist. Lugd. quam [ inquit ] ligneam Herbarii vocant, cuius nominis causa mihi adhuc incognita. In maritimis crescit, caulibus lentis, fractisque contumacibus, foliis Lenticulæ, numerosis, gustu astringentibus : fructus oblongus, niger, vmbilicatus, ita gustu astringens, vt acerbatis non nihil habeat. Quidam Genistæ marinæ genus esse putant, licet siquas nullus edat.

In eadem Hist. Lugd. traditur Polygonum maritimum 2. Dal. quod multa communia habet cum iam dicto frutice.

Camer. & Cassiam Monsp. vocat, & cassiam poetam eorundem, additque nonnullos cortice radicis vti pro cassia lignea. Cassia quorundam : Cassien Tab. Cass. Poë. Lob. I. Gerard.

Nec Virg. nec Hyginii est, inquit Casp. Baubin. quam odoratam dicunt : Olyridique Plinii notas aliquas habere putat. Celsalp. cassia lignea offic. eidem.

Ceterum Cassia monsp. dicta Romano, Narbonensique agro vbiere prouentu oritur ad ripas Lani, propè pontem Castri noui in sepibus, præsertim quâ ad sinistram versus flumen ad montem contenditur. Et ad ingressum *Peraul* pagi ad stagnum Volcarum siti, deinde siluula *Egrement* cœnobio proxima, & in *Gramont*, Nec non Nemausi plurimis locis, & alibi passim in Galloprovinciis iuxta sepes & oliuetarum margines. Variis etiam Hispaniæ locis secundum vias frequenter assidue autem Granatensi & Valentino regno, teste Clusio in Italiæ hortis quibusdam etiam cultam vidimus D. Rentzius Medicus Wirtembergicus dedit nomine Cassia poetarum, collectam propè Tergestum versus mare Adriaticum, in monte dicto Cars.

Floret Iunio, semen rubet Augusto : Lob. flore ætate : fructus Octobri vel antè maturescit Clusio Nos & Aprilis & Maio florentem obseruauimus. Et Nemausi Iunio fructum. Communiter tamen Augusto perficit toto illo tractu Narbonensi.

Totus frutex, vt dicebamus astringens est. An verò rectè quidam radicis huius cortice, pro Cassia Veterum vsi sint, vt notat Camer. ipsi viderint. Et quamuis eadem esset cum Olyride Plin. non existimauerimus tamen, radicem decoctum sanare arquatos : magna enim illa astrictio quæ ei tribuitur, non videtur conuenire in obstruptione hepatis insigni, qualis plerumque est arquatorum vel Ictericorum. Camer. notat Cassiam nihil ferè aromatici habere, sed radicem validè astringere. Nec non vti quosdam radicis cortice in obstruptione iecoris. Malimus nos in contrario quodam eius affectu aut consimili alio intestinorum fluxu, præmissis præmittendis vti.

Myrica [ eadem est cum Tamarisco ] radices, inquit Matthiol. pro odorata cassia venditabant imperiti Impostores. Sed postquam fraus à peritis deprehensa est, eius in offic. vsus penitus exoleuit. Quandoquidem verò Tamarix copiosè prouenit ad ripam Rheni, subeunt memoriam Plinii illa verba, quæ suprà citauimus, de cassia quæ feritur extremo in margine imperii, quâ Rhenus alluit. Non tamen audemus affirmare eandem.

Scribit Cordus, pro Veterum cassia fistulari à multis seculis in Europa visa, corticem venosum radicis cuiusdam gustus acerbi & tenuis vendi. Et in Dispens. monet, pro cassia lignea in Dianiso Mes. non sumendū esse paruum corticem saporis insipidi ac stiptici, vt hæcenus factum. Fortè de hac eadem ait : Allatus est hæcenus in totam Europam pro cassia lignea cortex radicis cuiusdam crassiusculus, colore purpureascentis, præsertim fractus, gustu stipticus, tenui odore, gustantium palatum ad hancum torrendans, quem ex Aspalathi specie aliqua detectum opinamur : nihil tamen affirmamus.

At securè Cornar. cassiam ligneam Offic. [ inquit ] cassiam veram Veterum censebimus. Sed prudentius fecisset, si indicasset, quid intellexerit per cassiam ligneam offic. & docuisset, cur veram cassiam Veterum existimet. Nam cortex ille, quo sub cassiæ nomine hæcenus vsi sunt pharmacopœi non est vera Cassia, quod nec gustu cinnamomum referat, aut acis sit, nec odoratu, vt & Fuchs. annotauit. Sunt qui Genistæ radicis corticem esse putent.

Hæcenus, vt scribit Matthiol. tum medici, tum seplasiarii odoratæ cassiæ loco quædam incognitæ arboris segmenta, nec odore nec viribus prædita, semper cæpescunt. Veruntamen postquam nonnulli nostræ ætatis viri stuprum historiarum diligenter examinarunt, detectâ fraude, mercatores ex Alexandria mercimonia Venetiæ comportantes, in aliud nouum cassiæ genus segmenta illa conmutarunt : quæ sanè præter odorem, paritèrque saporem, quibus ferè penitus exoleta sentitur, cassiæ à Dioscor. descriptæ admodum habetur consimilis. Quapropter nec eos errasse crediderim, qui dicerent, hanc Dioscor. Pseudocassiam esse : quippe & crasso cortice constat, & in eius cavitate lignosa etiam visitur materies, paululumque est odorata, minimèque acris. Nonnulli hac non contenti, quædam vocati cinamomi fragmina cassiæ vice usurpant, quæ cum nullo odore saporeque commenduntur, potius Quercum vel Fagum quam cassiam referunt.

Cassiam, inquit Marantha, nullo odore, nullâ habentem acrimoniam medicamentis apponunt Seplasiarii, vt nihilò deteritis quispian lignum quoduis admiscere possit : sic enim cum tanta aliquis medicamenti quantitas tam citò exteri non queat, in officina diutius seruat ac vetustate fit elanguidum : illud tamen, ne intercem perdat, in compositis adhibent. Cronemb. & Manardus quoque testantur nefariè hæcenus cassiam Lignæ vocitatum, & pro ea diuenditatum, nihil minus quam germanâ esse cassiam inodorum quid, & proin penitus abiiciendum. Quod verò cinamomum [ inquit Casp. Baubin. apud Matthiol. ] communiter pro cassia exhibent, nihil aliud esse videtur, quam Pseudocassia Dioscor. & fortè cassia fistula Androm. iunioris apud Gal. tartid. licet alii corticem cassiæ Monsp. esse velint. Sed optasse, mus eum graphicè delineasse quid intelligat per cassiam communiter exhibitam

Myrica radish

Offic. error.

Descriptio

Aspalathi species. cassia vera det. Corn. repreh.

Genistæ radix.

Cassia officinalis

Pseudocassia Diosc.

Cinamomi fragmina exoleta

Cassia inodora

Cassia Cinam.

Pseudocassia Diosc. Cassia fistula Androm. Cortex cassiæ Monsp. Casp. Baub.

## DE CASSIIS OFFIC. ADULTERINIS.

## CAP. XV.

Officinæ, si Hermol. credimus, Tamaricis radicem Cassiam vocare solent : & quæ palam Imperitia Medicorum est, pro Cassia odorata vtuntur. Idem & Tragus ait, & Ruell. ex Hermol. iidem planè verbis, nec eo citato :

Tom. I.

POLYGONVM MARINVM ANGVSTIFO-  
LIVM DALECH.  
CAP. XVI.

Descriptio

Radix.

Caulis.

Cortex.  
Folia.

Polygonum  
lign. Plin.



gustu in maritimis falso, alioqui adtingente. Herbarii quidem Polygonum sylvestre à Plinio descriptum esse putant. Quantum genus, inquit, sylvestre appellatur, penè arboris modo frutex, radice lignosa, stirpe Cedri rubicundo: ramis sparti bündum palmoium, nigris geniculorum ternis quaternisve articulis, fuere qui Aizoum maritimum vocauerint.

Considerandum quantum Polygonum Dalechampi differat à frutice qui dicitur à Montpellierensibus, Cassia lignea.

CASSIÆ ADVLTERINÆ VEL PSEUDO-  
CASSIÆ NOMINE DATVS CORTEX.  
CAP. XVII.

Descript.

Hoc nomine exhibitus cortex, crassitudine ferè semunciali, Maceris æquat corticem, coloris ferruginei, punctis albicantibus aspersis, superficie tam conuexa quàm concaua leui, substantia nullis fibris intertexta, sapore nullo euidenti, anno 1589. Datus autem fuit hic cortex Patauii, anno 1561. in Pharmacopolio ad Symbolum Aquilæ.

Considerandum an de hoc cortice scripserit Matth. Epist. l. 3. ad Qualebenum: Corticis illius frustulum, cui vitulus erat, Argillada, putarem ego Pseudocassiam esse, quam nostri Pharmacopœi cassiam ligneam vocant.

Argillada.

LIGNVM AROMATICVM, SEV PO-  
TIVS CORTEX MONARDES.  
CAP. XVIII.

Lignum a-  
romaticum  
Monard.

Bernardinus de Burgos Pharmacopola, inquit Monardes, Italus ostendit mihi ligni cuiusdam fragmentum, quod primo intuitu putabat Lignum Sanctum portus diuiciis S. Iohannis. Lignum est, quod adolefcens candelâ, fragrantissimi odoris fumum excitat, alioqui insipidum & inodorum, haud secus ac lignum commune aliquod. Corticis verò odor aromaticus præstantissimus, sapor Macis aut Nucis moschatæ, còque etiam vegetior ac suauior, aromatica sua gratia vel quoduis cinnamomum & acrimoniâ ipsam addè Piper superans, & vel ex leui dentium attri-


Corticis o-  
dor.  
Sapor.  
Acrimonia  
maior  
quam Pi-  
peru.

tu omnes fauces peruadens, ac tota ferè die imbuen. Magna huius ligni quantitas in monte quodam caesa fuerat à Nauclero è Hauana [portu Cubæ, inquit Clusius, Insulæ ad Septentrionem sito, & Floridæ Provinciæ ferè oppolito] redeunte, & in nasam seu Liburnicam delata, ignis struendi causa.

Clusius in Annot. ad cap. 26. lib. de Simp. Med. Hist. Monardi ait: Simile lignum me natum esse arbitror anno 1597. Truncus enim quem in plures orbiculares partes terrâ relectum conspiciebam, solidâ & durâ massâ constabat, eaque non minus graui quàm Guayacum, candidiore tamen, licet aliquot nigricantibus venis distincta: illius etiam cor nigrum instar Guayaci, odor autem valdè tenuis erat, vt qui vix percipi posset, sapor verò non nihil calidus. Ceterum orbiculare illud fragmentum quod accipiebam, palmaris erat longitudinis siue altitudinis, & quinque vnciarum diametrum ferè habebat, cortice suo denudatum: quapropter initid nihil de illo pronuntiare poteram, nisi Guayaci genus aliquod vilius videri, donec anno insequente aliud fragmentum suo cortice adhuc tectum nancisceretur: tum demùm diligentiùs obseruato & cortice & ligno, illud esse de quo Monardes scripserat, confidentiùs asserere audebam. Comperiebam enim illius descriptionem huic ligno prorsus convenire, atque huius corticem cortici ab illo descripto ita ad amussim quadrare, vt quin ille ipse sit, nemo ambigere posset. Quum verò in solo cortice sit illa odoris & saporis gratia: mirati subit, cur Monardus ligno potius quàm cortici aromatici nomen tribuerit.

In ea porò sum opinione, ipsi ligno aliquas inesse facultates, illis quæ Guayaco tribuuntur, non dissimiles: & forsitan qui in Angliam id adferebant, arbitratos se quæstum ex eo, perinde atque ex Guayaco facturos: verùm cum sua spe se frustratos animaduertent, ex eo globos tornati curasse (vt mihi relatum) quibus exercitii gratia ad iactum vicerentur, propter ligni soliditatem & grauitatem. In Hist. verò Lugd. Lignum aromaticum Monardes dicitur.

CORTEX VVINTERANVS ACRIIS, SI-  
VE CANELLA ALBA.  
CAP. XIX.



Mvhere III. Dele-  
Ducis  
Vvint. Principis  
nostri Cl. habemus  
corticem E.  
C. misum per D.  
Paludanum, no-  
mine prædicto.  
Canulatus est,  
crassitudine cas-  
sia lignæ fusca,  
fragilis; coloris  
parte gibbâ ci-  
nerei, conuexâ  
fulci, per substan-  
tiam cinerei  
& fului. Sapore  
imprimit è vesti-  
gio luculenter a-  
crem, subama-  
rum, & aromati-  
cum, qualem ha-  
beret Zingiber  
mul.



multum cum Zedoaria pauca confusum. Sed cum tenuium sit partium feruida eius acrimonia, non ita multò post euanescit, remanente suau colore cum amaritudine grata.

Similem corticem Gener Cherlerus rediens ex Anglia anno 1605. accepit à Jac. Gareto, Pharmacopæo peritissimo. Corticem autem hunc crassissimum & acerrimum, præ omnibus aliis, Winterano respondentem inuenio præter tubulos corticum conuolutorum, ut solent Canellæ vulgaris: ex quibus apparet, fuisse detractos ex truncis, aut ramis arborum non paruorum: externa parte sunt illi tubuli, vel cortices cinerei coloris rugosi, ac etiam in quibusdam partibus ramosi cum multis tuberculis: interna quidem fusci: duplici cortice constant, interiori ipsiori: exteriori Buxei ferè coloris, & interna parte uti modò dictum, fusci. Horum tubulorum odor aromaticus sanè, gratus: sapor acerrimus cum amaritudine. Fragiles sunt tubuli quamuis crassi, quique dentibus facili atteruntur.

Winteranum corticem, sicut solet singula, præsertim peregrina & Exotica, quæ potuit fide, descripsit Clusius lib. 4. cap. 1. in sequentibus verbis: Wilhelmus Winter, qui Generosum Franciscum Drake ad Magellanicum vsque Fretum comitabatur anno redempti generis humani 1507. ulterius non progressus, nauim, cuius præfectus erat, in Angliam anno insequente reducebat, atque collectum istic corticem referebat, viliori canellæ cum substantiâ, tum colore non valdè dissimilem, plerumque tamen crassiorē, & cineracei coloris, vel fuscum externa parte, atque vltimi corticis instar scabrum, internâ verò nonnunquam dissectum, & multis rimulis hiantem. Tiliæ corticis modo, aliquando etiam valdè solidum & durum, odore non ingrato, sed perquam acri sapore, linguâque & fauces non leuiter vte, quàm pipere.

Cæterum Winteranus cortex, teste Clusio de peregrinorum accedere videtur ad tam descriptum ligni aromatici corticem Monardis, tametsi singularem illam odoris fragrantiam, quam suo cortici tribuit, in hoc nò deprehendere poterit. Hist. Lugd. Winteranum corticem à ligno arò. Monardis separat & distinctis locis & capitulis de iis agit, ut Clusius etiam facit Exot. lib. 4. cap. 2. Castori Dur. Lignum aromaticum Indiæ Orientalis.

Winterus verò (inquit Clusius) illius facultates nullas exploratas habuit, sed eo, dum recens esset, partim melle condito, ut acrimoniam deponeret, partim resiccato & in pollinem trito, ut in eduliis Canellæ aliorumque aromatum vicem præberet, vsi sunt, quæ ea naui vehebantur. Postea tamen intellexi aduersus stomachici siue Scorbuti morbum, quo eorum nonnulli in illa navigatione affecti fuerant, optimo successu vsos esse.

## CORTEX ERIOPHORVS.

CAP. XX.


ANNO 1603. mittebat ad me Petrus Garetus, inquit Clus. in Exot. corticis cuiusdam fragmenta, illo ipso anno ex India allata eaque veluti in tubos media ex parte conuoluta, quæ an à radicibus, an ab arboris alicuius ramis detracta fuerint, ignoro, erat illa fragmenta cineraceo qui-

Tom. I.

dem colore, satis verò acri sapore prædita: valdè fragilia, quæ vel in minutas etiam partes fracta, & protracta, veluti tenuissima stamina, instar telæ aranearum, ut lana autem candida, ostendebant, quemadmodum Eriophori bulbi folia, & squammæ radicis ipsius, de quo H.G.L. 19.

## CANELLA ALBA QVORVNDAM.

CAP. XXI.



ANnotat  
noster  
Cherlerus se accepisse à peritissimo Pharmacopæo Londinensi, Iacobo Gareto in Anglia anno 1605. cinamomum album inter cōtulos cortices, ligna & alia, quæ ad nostras manus peruerunt sine nominibus. Inuenimus duos cortices albos, quorum prior eiusmodi est, multò leuior quàm tubulorum pro Win-

terano cortice modò descriptorum, externa parte albus, tantillum ad cineream tendens, rugosus ut Winteranus: internè candidior, qui duplex videtur, fragilis & qui dentibus facili frangitur, odore & sapore æmulatur Winteranum corticem, verum multò remissius: nescimus an intellexerit per hunc corticem cinamomum alterum, vel Winteranum corticem. Secundus cortex albus, non rugosus ut præcedens, sed leuis, hinc inde tamen quædam veluti tubercula habet, facili atteritur dentibus, parum habet saporis, non grati cum leui acrimonia, odorem non sentimus.

De Canella alba, cuius nos iconem exhibemus, hæc scribit Clusius, in Exot. Ante paucos annos inferri cepit Exoticus quidam cortex: quoniam in tubos plerumque conuolutus est, Canellæ instar, tum etiam propter albedinem, Canella alba nomē indiderunt. Eius autem duo genera obseruare mihi videbar. Vnum maioribus longioribusque tubis, & etiam crassius, quod vilius, meo iudicio, æstimandum. Alterū tenuius, minoribusque tubis, quod præferendū. Vtrique generi, extimus cortex scaber, ferro, alioue instrumento, deterfus & æquatus videbatur: crassiori, color minis albus, minorque acrimonia: tenuiori, maior acrimonia, & color magis candicans, maiorque fragrantia. Elsène verò hic cortex ab aliquâ arbore fruticeus adeptus, an à radice aliqua, hærebam initio: nam candidioris tenuiorisque corticis collatione tum quidem facta cum cortice fragmenti radicis cuiusdam, quod anno 1591. Londino ad me mittebat doctiss. vir Richardus Garth, ex Wingandecao, siue Virginia, ut adscriptum erat, acceptum, sed nullo nomine insignitum, reperiēbam neque colore, neque substantiâ, neque acrimoniâ multum inter se differre. In ipsa quidem radicis substantiâ, nullâ manifestam quâ-

Canella alba duorum generum

Descriptio

Q9 3

*Radix.* litatem deprehendebam, sed in ipso cortice tota facultas consistebat. Erat porro illud radicis fragmentum dodrantalis longitudinis, pollicaris crassitudinis, [quia forsitan nondum adulta] in aliquot ramos infernâ parte diuisa, cortex ipse rugulosus, pallescens, & valdè actis: quam ob causam non est dubium, quin apud incolâ aliquo in vlti esset: nihil tamen de facultatibus, neque etiam de ipsa planta, cuius radix fuerat, Garthus meminerat. Non absimilium porro corticum fragmenta pedalis longitudinis vel etiam amphiora referebant anno 1601. nauta Batavi ex Moluccis & Iana reduces: quibus, quod candore essent eximio, & acrimonia non expertia, *canella alba* nomen indiderant &c.

*Canella alba* & *radice*

DE SEITARAGI ARABVM: EIVSQVE  
SVBSTITVTIS ET AEQVIVOCIS.

CAP. XXII.

*Sitaragi.* Sitaragi Indi, vel vt Bellun. scribit in margine, Sitaragi [& in titulo Lepidium] Auic. lib. 2. Tract. cap. 666. frustra sunt ligni parua, tenuia, & cortices sicut Caryophylli: Fractus [Monachi & Matth. legunt Fructus.] declinat ad rubedinem & nigredinem. Et Sitaragi quidem [forte leg. quidam] oritur in parietibus antiquis &c. Serap. cap. 352. Sitaragi, id est, Haufab Gal. Diosc. &c. Nostro iudicio Auic. melius posuisset cap. de Caryophyllis, quâ nungere ligna & cortices cum tenui herba Iberidis, [de qua suo loco] vt & Serapio, qui & ipse iungit cum Iberide, siue Lepidio, vt existimamus: Est verò Sitaragi vox Arabica, & vt scribunt Monachi, est Lepidium Diosc. Proposita Auicenn. descriptio cum nullo conuenit Authore.

*Alseitaragi.* Secundo loco leg. Alseitaragi quidem oritur, &c. Sinè de eorumdem sententia, Auic. confusè loquitur, & plura genera sub vno nomine comprehendit. Primum genus Indum non est herba: sed quædam species Casia lignea, vt testatur Bellun. in suis interpret. nominum Arab. ac etiam in 5 Cap. plius Auic. in pluribus confectionibus & Electuariis, vbi legebatur Casia vel Casia Indæ, ipse ponit Sytragi, vel Sytragi Indi, quia sic fateretur esse in Arabicis exemplaribus. In multis etiam confectionibus & Elect. filii Serapionis, in quibus legitur Sitaragi, seu Sitaragi Indi, in eisdem Auic. loco eius, habet casia, seu casia Indæ: vt in Elect. Alfarjns & aliis pluribus. In nonnullis etiam confectionibus ipsius Auic. legitur Casia, quæ loca Bellun. non permutauit. Vnde in illis locis non intelligitur Sitaragi Indus, sed est alia Casia species. Rhafis in 3. ad Almanforem Sitaragi seu Setarach, cassiam esse dicit. In Compôs. Auic. & aliorum legitur cassia Perfica, & idem est quod Sitaragi Perficum, quoniam reperitur & Sitaragi Perficum, vt in 5. breuiarii filii Serap. c. 3. de Baras, & aliis in locis. Ceterum Sitaragi siue Sytragi, siue Serragi siue Sitaragi, siue Sitaragi & similia, idem significant. De hoc Sitaragi Indico locutus est Hali Abbas, secundo Pract. cap. 42. quod est de medicaminibus, quæ sunt ligna num. 370. vbi dixit: Sitaragum melius Indicum &c. Secundum Sitaragi autem quod scribit ipse Auic. est species cuiusdam fructus. Terrium Alseitaragi Auic. cuius descriptio conuenit descriptioni Iberidis Diosc. Serapionis Sitaragi, distincta est species ab Auic. Alseitaragi. Sunt igitur quatuor species Sitaragi ad minus: quia præterea alia species Sitaragi seu casia quæ vocatur Perfica. De-

*Cassia speciosa.* Sitarach. Cassia Perfica.

*Sytragi.* Sitaragi.

*Iberis Diosc.* Sitaragi 4 species.

clarationes Luminaris maioris de Sitaragi sunt confusæ. Monachis tamen non assentimur existimantibus apud Auic. tradi tria Sitaragi genera. Ex primo enim genere Indo duo non sunt faciendæ: nam nostro iudicio, vnius est descriptio: in nostro codice pro fructus vocabulo melius legitur, Fractus.

Monachi, (infit Apollo) Vincetoxicum Iberidem esse scribunt; quâunque Sitaragi Indi in Triphera legeretur, idèd primum Auic. Sitaragi accipiendum & Casia aromatica speciem. At hi nobis videntur sapere Auicennianam caliginem quam res quatuor diuersas eodem cap. implicuerit, cuius sanè factionis Calopodiani illi, post longam nimis garrulitatem, re tandem infectâ, operam & impensam perdunt. Vincetoxicum foliis hederaceis pro Diosc. Asclepiade habita. At Franciscus Alexander Calopodiani insultans, se cerebro calum ostendat, nec bene hoc loco irradiare videtur in suo Apolline. Auic. enim vno capite Sitaragi nomine duas tantum res diuersas tradit, non quatuor, vt ipse autumat. Monachos non intelligit, quorum Vincetoxicum non est Asclepias. Quin docet ipse quid ponendum in Triphera pro Sitaragi.

Matth. quoque Monachos reprehendit, quod in Comment. in Damascenum perperam sibi persuaserint, nil aliud Mauritanis Sitaragi designare, quàm Indicam Cassiam, veterem Auic. Edit. fecit: siquidem Bellun. lib. 5. in Confect. Philof. in Triphera magna, cum in prima, tum etiam in altera in Elect. de gemmis vindibus aliisque nonnullis, vbi Gerardus modò cassiam Indicam vertit, Sitaragi in Sytragi restituerit. Et lib. 5. Epist. scribit Matth. Sitaragi primum Auic. odoratæ festucae Caryophyllorum instar, quas nos vulgò vocamus *Fujs de Garofani*, puto lubellè interpretis vel scriptoris Auic. mendum in dictione, Cortices, quum Caryophylli cortices non sint, sed fructus, putarim legendum tanquam putamina Caryophyllorum, quæ à Gerardo perperam cortices sine translatâ. Mhi omninò persuasum velim, nil aliud Sitaragi Indici loco in Triphera Sitar. magna Io. Damasceni imponi debere, quàm Caryophyllorum festucas seu pediculos Sitaragi secundum Auic. præ se ferre videntur fructus, quos Italice Sepalix Antophyllos & Pseudocaryophyllus vocant. Sed de hac Matthioli opinione quid sentiamus, diximus cap. de Caryophyllis: & apud Auic. non duo tradi Sitaragi Indos, sed tantum vnum. Ceterum non displiceat Antophyllos substitui pro Sitaragi.

Annotat Brassauolus in Exam. Pil. quæ sequuntur: Sitaragi Indi primo loco inconstantissimè Auic. meminit, de quo fortè intelligit Mel. in Pil. Aggr. Sitaragi Indum Auic. est Galeni Carpesium: à qua opinione tanquam falsa se dissentire cogi scribit Matth. lib. 5. Epist. quum Auic. de Cubebis scribens cap. 38. lib. 2. nil aliud scribat quàm Carpesium.

Monachi dicunt loco Sitaragi Lepidii posse poni Iberidem, quoniam eadem vires. Monachis autem Iberis dicitur Vincetoxicum, sicut etiam Brassauolo, non autem intelligunt per Vincetoxicum, Asclepiadem, vt ante dictum: quicquid scribat Apollo, qui Brassauolum redarguit, sed meliora non docet, dum ait: Brassau. in lib. Pillul. cap. de aggreg. per Sitaragi vel Carpesium, vel Fumariam seu Vincetoxicum vltimò existimat, quod prius Pipirellam coniecerat, animi inconstantiam facile demonstrans.

Sitaragi, Lepidium est Matth. qui lib. Epist. 5 ait:



ait : Seitaragi siue Sithrogi siue Sythragi (Synonyma sunt hæc apud Arabes) plura designare minime fuerit ambigendum. Serapioni nihil aliud quam Dioscor. Iberis siue Lepidium. Auicennæ tria genera explicantur. Postremum nulli dubium est, quin legitimam Iberim designet: sed ibi interpretis errore legitur Cordumeni pro Cardami.

Lepidium (inquit Tragus) quod & Piperitis dicitur, Germ. *Senffraut* / in Serap. videtur Seitaragi Indum [noster codex Serap. non habet Indum.] & *Hausab* appellari: nolim tamen super hac re cū quoquam contendere.

Ruell. hoc Lepidium intelligere videtur cū scribit: *Sataragin* Maureica lingua Lepidium nominant. Braslausius in exam. Pil. aggreg. Seitaragi, Sataragi nonnunquā Seitaragi Arabum, est Diosc. Lepidium. Auic. confundit Iberidem cū Lepidio. Lepidium verò & Sceterag est *Penegetta*. Colligendum est in hac pillul. comp. pro Sceteragi Arabes Lepidium intelligere: verum concipere nescio, quid in ea faciat, vel facere possit Lepidium.

Cordo in d. sp. supra pil. scitidas Rhafis, Seitaragi siue scytari Indum est Lepidium maius: *Pfess* / *serfraut*.

Monachi in Mel. dist. 1. gen. 40. in Triphera hoc idem tradere videntur Seitaragi siue Lepidium, cū aiunt: Non est multū à veritate alienum tenere Piperitellam esse Lepidium. Idē Lepidium est illa, quæ vulgari vocabulo apud Italos dicitur *Crapinella* vel *Caprinella*. Quia dicit Simon lanuensis in litera Seitaragi, quod quidem seitaragi vocauerunt Nucem viduarum seu captiuam. Considerandum an Monachi non intelligant Raphanum rusticum Germ. dictum *Wecretrig*. Idem autēbus pro Seitaragi sumendum Nasurtium, quod viribus, odore & sapore simile.

Io. Manlius, teste Trago, Nasurtium agrielle, Sitaragi, Senation & Lepidion vnius & eiuſdem plantæ nomenclaturas esse censet. Vbi pro Seitaragi, inquit Monachi, intelligitur Lepidium, si non habetur, sumatur Rubia ex Auic. & Gal. auctoritate. Rubiam & tractat. Quid pro Quo substituit, quod sanè substitutum nobis pro nullo Seitaragi conuenire videtur. Vesalio in Rhaf. lib. 9. cap. 9 Seitaragi est Thaphsia Indica sita & habet Arabicarum dictioſum antiqua interpretatio sub finem. Auic. Sitaragi, id est, Thaphsia. Braslausius in exam. pil. aggreg. N. si vocabulo Scitaragi addita esset particula Indi, lectionem corruptam esse putarem: & legendum esse Sitarag, id est, Fumi terræ, quem recipiendum suaderem, posteaquam Carpesium abesse certum est. Apollo accusat Braslausium inconstantiam, sed nostro iudicio immerito, vt suo loco amplius declarabitur. Arabicoſum nominum antiqua interpretatio habet. Seitaragi, id est, Fumus terræ.

Ita habes sanè Seitaragi Arabum satis intricatam historiam, non tam ex vocis multiplici variatione, vt equidem opinamur, quam Arab. Scriptorum incondita barbaries (quam sæpè vel inuiti sequi cogimur, ne, verborum puritatem aut lenocinia sectantes, latentem nucleum vel penitus omittamus, vel intempestiuè peruertamus) eòſque proximè (secutorum medicorum negligentia. Autorum nunc sententias dixisse, nostramque sententiam interposuisse sit satis, donec aliquid certius addiscamus de his quæ ad Casia historiam pertinere videbantur.

## CORTEX ANTIRHEVMATICVS.

CAP. XXIV.

**R**efert Monardes, ex Peru missum esse cras-  
sum quandam corticem ex vasta arbore Vl-  
mo simili: cū amplitudine tum forma, detractū.  
Ferunt nasci ad ripas fluminis cuiusdam viginti  
quinq̃ue leucis à Lima distantis: nec alibi facilè  
in India repetiri. Indos capitis defluxionibus,  
rheumatismis, aut alioqui capitis grauedine fabo-  
rantes huius arboris corticem in tenuissimum  
puluerem comminutum naribus indere: humo-  
res enim insigniter educere, eaque ratione libera-  
ri: quod verum esse expertum se testatur. Vide-  
ri secundum caloris gradum excedere.

Locus

Vires.

Catarrhus

Grauedo.

Temperā.

## PACAL ARBOR.

CAP. XXV.

**A**Rbor Pacal eodem autore, multò minor est, Descriptio  
quàm arbor cuius cortex Rheumatis vtilis  
est, quæ iam descripta. Nascitur in India ad flum-  
inis cuiusdam ripas, viginti quinque leucis à  
Lima distantis.

Huius ligni vsti cineribus cum sapone mix-  
tis Indi ad tollendos lichenes etiam foedissimos  
vtuntur, cū qui in capite nascuntur, [de quibus  
Martial.

Vires.

Lichenes.

*Non vltus acce, pustule lucentes,*  
*Nec triste mentum, sordidus lichenes]*  
tum qui reliquas corporis partes occupant. Sed  
& vetustas cicatrices emaculare dicitur. Paululū  
huius ligni accepit Monardes, vt eius facultates  
experiretur.

## ARBOR AQVAM STILLANS.

CAP. XXV.

**I**nter innumera penè naturæ præclara atque me-  
moranda, quæ Ill. noster Princeps, Dux Wit-  
temb. in singularium suo Theatro amplissimo ad-  
seruat, est ramus ex arbore, quem ipsemet Cle-  
mentiss. noster princeps nobis monstrauit, qui  
propria manu hæc adscripsit verba. Mirabilis ar-  
bor ex insula dicta Ferro: quæ arbor à multis cen-  
tenis annorum sine mutatione consistit: & quo-  
tidie tantum fundit aquæ, vt incolæ satis pro po-  
tu habuerint. Missa per D. Paludanum 1600. Jun.  
20. Eiusdem rami portionem liberaliter nobis  
communicauit Ill. E. C. quem primum à nobis de-  
scribi conueniat: deinde quid alii Scriptores de ea  
protulerint, subiici.

Locus.

Ramus est crassitudine arundinis vulgaris, vel Descriptio  
digni pueruli, substantia lignea, sed satis fragili, ram.  
colore subfusco, & quodammodo ad rufum ten-  
dente: per cuius medium medulla transit fungo-  
sa. Cortex exterior tenuis, cinereus, rugosus  
multis nodulis scatens, cui adhæret certis quibus-  
dam locis mucus paruus, citrinus aut subviridis,  
ex minutissimis filamentis coaggestus, mucus no-  
stratum arborum non multum ab similibus, sed bre-

Cortex.

Mucus.

Folia.

Tubercula.

Flores.

Sapor.

Mutila-  
gula folia.Arboris li-  
gna mu-  
tabilis.De cryptis  
arboris  
Folio in  
glandis.Mulier in-  
sula an-  
te detegit.

uissimus. Vestigia quoque apparent foliorum al-  
ternatim positorum. Densus est hic ramus in a-  
lios, qui etiam crassiusculi in quaternos serè mi-  
nores subdividuntur. Folia haerent Laurinis simi-  
lia, se ibi non gerant, sed ab eo qui per. In glan-  
dis foliis particularibus non male quis compara-  
ret, ex quorum costa media satis insigni, alii mi-  
nores nemini tantum videri, sed in obliquum per  
folii substantiam dissimulantur. Eadem parte ad-  
uersi, in utroque folio cum Malabathri solent, ac-  
ueris nequaquam. Sed & verrucosis quibusdam  
tuberculis iuxta pediculos maxime & costam ob-  
sita sunt, qualia serè in praedictis foliis obseruari  
solent. Ramorum extrema, Lauri Tini in morem  
quasi in umbellam cessant: quibus flosculi adha-  
rent per exigui, stellati, ob paruitatem specialiter  
vix describendi. Sapor ligni nullus: cortex non  
nihil aromaticus, non sine acrimonia & adstric-  
tione. Foliorum itidem aromaticus & glutinosus:  
ita ut dentium attritu cum salina in mucila-  
ginem abeant, qualem semina mali Cydonii præ-  
bere solent. Paulò cunosiùs hanc rem in de-  
scriptum propter admirandam eius historiam, si  
modò vera sunt, quæ Authores de ea referunt.

Benzo enim, in sua Canariarum Insularum re-  
latione historica sic scribit. In insula Ferro, insula-  
rum Canariarum vna, arbor est, perennes aquas  
è foliis exsudans stillantem, & quidem tanta co-  
pia, ut non incolis modò, sed etiam multò plu-  
ribus sufficere possit. Ea arbor mediocri magni-  
tudo, cuius in longis folio, quantum paulò  
maiore, multo circum lapideo septa, instar fontis  
est: & eodem modo defluens aqua suscipitur. Arca-  
num equidem naturæ mirabile: non reperiri to-  
ta insula vilam aquam præter eam, quæ ex illa ar-  
bor emanat. Per arboris perpetua ac densa  
nebula circumnecit: quæ tamen interdiu, ubi So-  
lis æstus flagrare incipit, paulatim discuti ac re-  
solui videtur. Principio, Hispanos eam insulam  
subigere aggressos, quum neque fontes neque  
puteos, nec flumina inuenirent, ingens admira-  
tio stuporque inceserat. Quumque ab indigenis  
sciscitando exsequerentur, unde aquam sibi para-  
rent: illi pluuiam aquam in vasis collectam re-  
ponere ad necessarios usus se respondebant: ar-  
bore nimirum prius arundinibus, terra aliisque  
integumentis operta, quippe ita rati Hispanos,  
ubi aquam non reperissent, ex omni insula excelsi-  
mos. Sed parum astutus profuit. Nam insulana  
mulier Hispano cuidam, quo cum familiaris ei  
consuetudo intercesserat, arboris & arcanam  
vim eius aperuit: protinusque ille Hispanorum  
Duci. At Dux, qui rem ita inusitatam pro fabu-  
la duceret, nisi temperare non potuit: mox ta-  
men detecta arboris, & rei certitudine comperta,  
omnes rei tam nouæ miraculo defixi obstupuerunt.  
Neque mulier indicium impune tulit, siquidem  
Pauores insule proditum ab ea arcanum cum co-  
gnouissent, breui ei necem clanculùm intulere.  
Breuiter ea arbor tanta copia aquam fundit opti-  
mam atque salubrem, ut non insulanis modò, eo-  
rumque armentis, sed etiam nauibus eò fortè ad  
aquandum appellentibus sufficiat.

Creditur verò Insula Ferro ea esse, quam Plin.  
& Solinus Ombrión seu Pluuiam vocant, de  
qua Plinius lib. 6. c. 32.

Quædam quoque rem certam esse scribit, ta-  
meti arboris vidisse negat, cum ter in eam in-  
sulam appulserit, iter in Americam instituens. Et  
Cornar. de Iudeis, ad Orbis figuram. In insula  
Ferro quotidie circa meridiem tempus, nubes quæ-  
dam spissa è celo se demittit, magnam quandam

arborem in monte stantem circumdans, & in eam  
nocte proxima, vna aut altera ante Solis ortum  
horas resoluens, adeò ut hinc tanta aquarum  
copia dimanet, quantam insularum necessitati suf-  
ficiat. Et Anonymus quidam ad Orbis figuram,  
Quis non admiretur in insula Ferro peculiarera  
stillantem arborem esse, quæ continuos per ra-  
mos & folia radios emittit, in tanta abundantia,  
ut vix dictum credibile sit: & quod in eola se suol-  
que huius aquæ beneficio sustentent, nullam a-  
liam [propter diuturnam siccitatem] habentes.  
Atque huiusmodi arborem testatur Io. Heukens  
in Guinea multas se vidisse, verum nullas quæ  
tam abundanter aquam destillant, quàm quæ  
sunt in insula Ferro. Nobis verò non constat, ex  
quo auctore Corn. de Iudeis sumperit figuram  
arboris aquam fundentis quam habet. Pe-  
nes auctorem sit fides.

DE ASPALATHO, EX SENTENTIA

VETERVM.

CAP. XXVI.

DE hoc ita scribit Diosc. Aspalathus, aliis Ery-  
thraeum, [ἐρυθραῖον]: quidam [ἐρυθραῖον]  
ex Plin. legendum suspicantur] siut ex illi-  
g. osus, spinis crebris aculeatus. Nascitur in Istro,  
Nisyro, Syria & Rhodo: eoque vnguentati ad  
spissanda vnguenta vtuntur. Probatur pondero-  
sus, detractò cortice rubens, aut in purpuram ver-  
gens, densus, odoratus, & gustu amarelens. Est  
& alterum genus candidum, lignosum, inodo-  
rum, quod etiam deterius habetur.

Breuius Theoph. Quibus ad vnguenta vt-  
untur, hæc serè sunt: Cassia, Cinamomum, Aspa-  
lathus &c.

Plin. lib. 12. cap. 24. In eodem tractu [Cypro]  
Aspalathos nascitur, spina candida, magnitudine  
arboris modice, flore roseæ. Radix vnguentis ex-  
petitur. Tradunt, in quocunque frutice curnetur  
arcus celestis, eandem, quæ sit Aspalatho, suauitatem  
oris existere: sed in Aspalatho inenarrabilem  
quandam. Quidam eum Erythraeum vocant:  
alii Sceptum: [Sceptum Hely'zi: Ely-  
sum: cuius probatio est in M. Dal.] probatio eius  
in colore ruffo vel igneo, tactuque spisso, & odo-  
re Castorei. Permutatur in libras xv. Item lib. 24.  
cap. 15. Vulgaris quoque hæc spina, ex qua cortinæ  
fulloniz implentur, radicis usus habet. Per Hispanias  
quidem multi, & inter odores, & ad vnguenta  
vtuntur illa [alia Vet.] Aspalathum vocantes.  
Est sine dubio hoc nomine spina sylvestris in O-  
rientem [vt diximus] candida, magnitudine arbo-  
ris iusta. Sed & frutice humilior æquè spinosus in  
Nisyro, & Rhodiorum insulis, quem alii Ery-  
thraeum, alii Adipatheon, siue Diaplecon, siue  
Diacheton [vel Diaxyon, vt Diosc. inquit Her-  
mol.] vocant. Optimus, qui minimè ferulaceus,  
rubens, & in purpuram vergens, detractò corti-  
ce. Nascitur plumbis locis, sed non vbique odoratus.  
Quam vim habere celestis arcu in eum inni-  
xo, diximus. Hæc Plin. quem videt à Diosc. non pa-  
rum variare. Non lignum, vt ille, sed radicem vng-  
uentis expeti scribit. Discrepat & in eo, quan-  
do ait: probationem eius in colore ruffo vel  
igneo, tactu spisso, & odore Castorei: cum tamen  
ipse deinde optimam asserat rubentem, & in pur-  
puram vergentem &c. Quod de flore ait Plin. in  
Diosc. non legitur.

Per



Per vulgarem Spinam fulloniam Dalechamp. intelligit Hippophaston : de quo suo loco. Of-  
citanter Plin. inquit idem Alpalathum Ori-  
entalem alium esse putat, quàm Rhodium. Probat  
tur sanè Dioscor. *ἐν ὁδῷ*, quicquid Plin. cum suo  
Castorei odore occinat. Hippoc. quoque lib. 2. de  
morb. mul. sub finem ferè, radicem nigam cum  
aliis quibuldam tritam, in vino nigro diluto bi-  
bendam præbet, ad fluxum, & omnes morbos  
qui ab utero sunt. Vbi sanè Gal. exponit *μέλα-  
να ρίζαν*, radicem Aspalatharomatici.

Esse autem Aspalathum fruticem admodum  
spinosum, etiam ex Platone cognoscimus, qui 10.  
de repub. Dialogo, Ardarum & alios tyrannos  
frutices Aspalathi spinis apud inferos lanari, ex E-  
ris Amenit fabulis recenset. Propterea Theocr.  
pastor admonerat, ne discalceatus per montem  
deambularet, qui Rhamnis & Aspalatho fronde-  
sceret. Edyl. 4.

*ἡ δὲ ἑρμηνεία τῆς ἀσπαλάθου κεκοινωνημένη*  
Interpres sic exponit : *ἡ δὲ ἑρμηνεία τῆς αἰ-  
δῆς ἀπὸ τῆς ἑρμηνείας, ἀσπαλάθου ἐστὶν ἡ τοῦ ραδίου  
ἡ δὲ τῆς ἀσπαλάθου ἀπὸ τῆς αἰδῆς, ἡ δὲ ἀσπαλάθου ἀπὸ τῆς  
αἰδῆς*. A percussis difficulter auellitur vel auferitur. Augian-  
dino verò quidam *φάραγγος*, quod Græci *σφαγγίον*  
dicunt, vel *σφαγγίον*, quæ vox gladium significat,  
quod frutex hic suis aculeis & gladio iugulet, vt  
annotat Curtius & Marcell. qui Sphagnò & Phas-  
ganon apud Dioscor. legi ait, ita indicans à se re-  
cipi voces supposititias, apud Dioscor. quæ ab aliis  
reiciuntur.

Serapio eius meminit sub nomine *Darsifahan*,  
id est, *Ανράχ*. Alii scribunt *Darsifan*. Est arbor iu-  
ste crassitudinis, sicut aliorum lignorum &c. De  
eo Dioscor. & Gal. Scribit autem Omas Benta-  
min, quæ sequuntur. *Tarsifahan*, Apothecariis  
*Ayrach*, est arbor Granati agrestis, cui lignum ci-  
trinum crassum, odoratum. Eius fructus vocatur  
*Bel* : quod in fructu carnosum est, dicitur *Cibor-  
haber* : astrigit alium, & confert febribus. Su-  
labin *Epenbahafan* scribit esse plantam spinosam,  
quæ ingreditur medicamenta odorata, flore cro-  
ceo, cortice subrubente : speciem esse ligni, ex  
quo parantur capsula, in quibus reponuntur læ-  
ces vel etiam pugillares. Magis odoriferum esse  
quod nascitur in Hispaniis, recipi in trochiscos the-  
riacicos : nominari in Barbaria *Aslam*. Ex quibus  
patet ineptia interpretis Serapionis, qui huic ca-  
piti titulum fecit, de arbore Granati. Quæ ex Dios-  
cor. Gal. apud Serap. citantur partim iam adducta  
sunt, partim dicuntur in viribus.

Auicenn. *Darsifahan* magna est arbor, spinis  
grandibus armata, quæ pigmentarii vnguentis  
acerbitatem conciliant [quo ad vnguentorum  
spissamenta pigmentarii vntur. Diosc.] Est au-  
tem partium dissimilium : Cortex enim acer est,  
flos calidus, lignum acerbum : quo fit vt diuerfas  
quoque habeat facultates : calefaciendi & refrige-  
randi. Sunt qui Indicæ spicæ [fortè leg. Spinæ.]  
radicem esse velint, quod asserere nolim. Eligi-  
tur grauis, cortice detracto rubens aut in purpu-  
ram vergens, odore & sapore grato : candida ve-  
rò, inodora, reprobata est.

Patet itaque Arabes in eo distare à Diosc. quòd  
illi arborem crassam, spinas magnas habentem  
hic fruticem tantum, spinis crebris aculeatum  
hic *ἀσπαλάθου πολλὰς κεκοινωνημένης* : Vetus quidem *κεκοινωνημένης*  
describat. Sunt & ex Recentioribus nonnulli, qui Aspa-  
lathi Veterum meminere, sed quam plantam intel-  
ligant, ipsi definitè non explicant. Sic Prosp.  
Alpin. In Aegypto, ait, crescit Acacia secunda

Matthioli, quam ego florentè mense Februario  
conspexi, foliis floribusque minoris *Antyridis*  
proximis, quæ gustata sapore adstringenti ferunt,  
paucisque tamen ac mollibus spinis obsita. Ne-  
que arbitror veram esse Acaciam, quam in Cap-  
padocia & Ponto nasci Diosc. prodiderat, &c.

Sic Hermol. apud Dioscor. Alpalathus, inquit,  
in Aegypto quoque nascitur, spina sylu. magni-  
tudine arboris Medicæ, candida, flore Rosæ : cuius  
radix vnguentis expetitur. Idem frutex humilior  
in Syria &c. Sanè per Hispanias multi ad odores  
vtuntur spina, quam vocant Aspalathum. Sed ea  
vulgaris est, ex qua fullionæ implentur vrnæ, radi-  
cisque vsus tantum habetur. Necdum comperi,  
sitne idem vulgaris spina & topiaria, de qua in A-  
cantho diximus.

Ita Hermol. more suo pro suis venditat ex di-  
uerfis autoribus conquisita, ac temerè de Aspa-  
latho pronunciat, quasi à se visa & experta, cum  
interim tantum abijt aliquid doceat, vt etiam  
obscuriorem eius reddat historiam.

Ceterùm inter supposititias legas apud Diosc.  
à Syris *Diaxylo* vocari, quod, vt annotat Marcell.  
nihil aliud significat, quàm mediolignum : quia  
lignosus hic frutex : sed de ea voce nihil Gramma-  
tici nostri.

Berchorio Aspalathus arbor est Cypro similis  
de qua Plin. Sanè Aspalathi appellatione hodiè  
nulquam in pharmacopoliis medicamentum habet-  
ur, nec quicquam certi hætenus scrutari li-  
cuit, quod ad eius cognitionem faceret, quod  
cum diligentissimo Cordo fateri cogimur.

Non line ratione miratur idem, non dubitare  
aut pendere Dioscor. interpretes, cuiam As-  
palathi parti inesse debeat subrubens & purpu-  
rascens color. Nam dubium nobis reliquit Diosc.  
vtrum de cortice an ligno id intelligendum sit,  
cum probat Aspalathum *τὸ δὲ περὶ τοῦ αἵματος ὑπο-  
κόρυτον, ἢ ποικυλὸς ἐστὶν* : indefinitè enim infiniti-  
us *περὶ τοῦ αἵματος* (Aetius, *περὶ τοῦ αἵματος*.) Interpretes ve-  
rò omnes, quemadmodum & Plin. infiniti-  
uo modo positum verbum in participium Latinum co-  
uertunt : quo fit, vt omnes intelligant eum co-  
lorem ipsum lignum præ se ferre debere, postquàm  
deglubatur. Nos verò contrarium intelligimus :  
censemus enim id de cortice dicere Dioscor. A-  
pud Serap. *Sulachin*, subrubrum cortici colorem  
tribuit, vt dictum. Corticem in vsu fuisse testan-  
tur Gal. & Aetius.

Rondel. in dictatis in Dioscor. miratur de radi-  
ciscortice à nemine vsquam mentionem fieri, præ-  
terquam in Hedychroi magmate apud Gal. nec  
se quicquam certi habere fatetur, quod de eo scri-  
bat.

Tam Matthiol. quàm Cornar. Aspalathum hodiè  
& officinis & sibi ignotum consistuntur.

Lonic. vulgò Lignum Rhodium putat : eo ta-  
men nos destitui.

Dipen. Colon. Aspalatho tanquam rei inco-  
gnitæ Lignum Aloes substituendum esse. Syluio  
contraria est sententia, qui censet, Lignum Aloës  
Offic. Aspalathum verius esse quàm Agallochum.  
De Aspalathi succedaneis postea.

Hoc loco non intempestivè paucis expende-  
mus, quod suprà traditum ex Plinio de arcu cæ-  
lesti, qui, in quocunque frutice curuetur, eandem  
quæ sit Aspalatho suauitatè odoris existeret, sed in  
Aspalatho inenarrabilem quandam. Ita & Arist.  
l. Prob. 12. Arborea, inquit, reddi odoratas aiunt,  
in quas cælestis arcus decubuit. Vtrum verum  
hoc sit, an falsum? Et, si verum, quam ob causam  
id eueniat? Nam nec omnes arbores, nec sem-

Aspalathus  
Aegyptia.  
Frutex Sy-  
riacus.  
Eulima.

Hermol.  
nos.

Diosc.

Cypro si-  
milis  
Aspalatho  
incognita.

Color de  
cortice in-  
telligendum

Dioscor.  
loc. illustr.

Dioscor.  
interpret.  
nos.

Lignum  
Rhodium.  
Lignum  
Aloes.

per aliquas, odorem ita acquirere palam est. Sæpe enim arcus celestis constitit, nec tamen arbores odoris spirasse quicquam, quod sensum mouere posset: cumque odor contrahitur (accidit enim: id aliquando, acita euenire narratur,) non in quaque matere contrahi potest. Causa verò ad arcum per accidens referenda est: præsertim si arcus ipse nulla est natura, quæ fixa & permanens sit, sed obrutus tantum refringendi affectio & apparitio. Provenit autem odoris effectus ille, non quod uterunque materies se habeat. Neque enim in viridi, neque in arida, sed in exusta, postquam, quæ arcui superuenerit, certam reddi suauitatem odoris, pastores referunt, præcipue ubi Aspalathus aut etiam Rhamnus est, aut id genus alia, quorum flos suauiter oleat. *Hæc ille.*

*Aspalathus  
Arist.*

Inde, nec absque ratione Aspalathum quidam non *ἰσχυρὸν* *ἔχει* vt in vulg. Diosc. cod. habetur legendum censent, sed ab incubitu & innixu Iridis, *ἰσχυρὸν* *ἔχει*: vt videre etiam est apud Plutarchum in Sympoſi. 4. Quæst. 2. Notabis Aspalatho suauiter olentem tribui florem ab Aristot. neque negari ab arcus incubitu odorantem orem reddi. Cum rei causam specialem idem summus Philosophus alibi tribuisse videtur halitui cuiusdam terræ præstauit, quem emittere solet eo loco, in quem celestis arcus decubuerit. Ita enim scribit lib. 17. Hist. Nat. Quod si admonendi sumus, qualis sit terræ odor ille, qui quæritur: contingit sæpe etiam quiescente ea, sub occasu Solis, in quo loco celestis arcus decubuerit capibus suis. Et quum à siccitate continua immaduerit imbre, tunc emittit halitum illum suum diuinum ex Sole conceptum, cui comparari suauitas nulla possit. Terra etenim quum feruet atque inurit, quod ediderit principio, bene olet. Etenim, quæ parè humido quandam in modum recaluerint, odorata redduntur: humor enim calore concoqui potest. Hinc quæ ad Orientem spectant, odoratiore exsurgunt. Irin verò efficere hoc putant, quoniam sine aqua effici nunquam potest. Quum verò materies immaduerit, caloræque interiori concocerit, respirare iam incipit, vaporæque interius conceptum emittit. Nec verò aquam nimiam accessisse oportet: eluit enim atque extinguit calorem ab igne iniectum. Quæ autem post arcum eueniunt, semper ferè mediocres sunt. Hæc qui non suspiciantur, quum causam nullam reperirent insignem, iridi effectum contribuerunt, Aspalathum autem & odoratos flores odoratiore idè reddi, tum putauerimus, vel quòd odor odori accedens, vegetior reddatur & copiosior, vel sanè quòd in copioso halitu Aspalathi odor per ærem potentiùs diffundatur, vt ferè simili de causa euenire videmus in arboribus & herbis florentibus mensibus Aprilis & Maio, idque non tantum incumbente Iride, sed aliàs etiam, postquam tepidum terræ habitum pluuiæ consimilis interuentu Solis vis euocat, & florum vim vel adauerit vel sanè latius sparserit. Subest & alia subtilitas. Quòd eo tempore potissimum flores aperiri soleant: vnde odor ille maior tantò, quantò recentium & nondum omnino hiantium florum odoratiore esse solet, quàm iam dudum apertorum. Sed de his & similibus aliquando D. V. plura & specialiora in disputationibus Botanicis, & Questionibus mirabilibus Chelieri. Nunc ad Aspalathi vires transeamus, à Veteribus traditas.

*Diosc. hanc non ἰσχυρὸν ἔχει vt in vulg.*

*Flor odor.*

*Arist.*

*Aspalathi  
vires  
Diosc.  
Vires vire.*

Aspalathus, vt tradit Dioscor. vim calfactricem cum adstrictione obuinet. Quo fit vt ad tetraoriz viscera in vino decoctus collutusque conue-

niat: atque etiam ad genitalium nomas, immundamque illuuiem, nec non ad ozænas commodè infundatur. Pesto additus, scetus detrahitis. Eius verò decoctum aluum silit. Quin & potu sanguinis reiectionem cohibet, vtriusque difficultatem ac inflationes discutit. Addit Plin. præteriam dicta, rhagadia quoque sanare. Discutere & strangurias corticem, aluuiumque sistere, similia præstare sylvestrem quoque putari. Fit & oleum ex Aspalathi succo in oleo macerato. Dioscor. quoque confectionem tradit ex Aspalatho, oleo omphacino, musto, calamo & iuncto odoratis, nardo Celtica, spatha, costo, meliloto.

Galeno Aspalathus, gustu quidem acris simul & adstringens est: facultate verò ex dissimilibus constat: nempe partibus suis acris excalescens: partibus verò aliis, austeris scilicet, refrigerans. Itaque vtriusque ratione desiccet, & proinde ad putredines & fluxiones est vilis. Corticis vsum in medicamentis testatur idem lib. de Ther. ad Pis. & de Ther. ad Pamphyl. In magrate H. dichroo iubet recipi *ἑκατόμβη* *ἑκατόμβη* *ἑκατόμβη*. Idem testatur Aëtius in suffumigio quodam.

#### LE LIGNO RHODIO: QVOD ALII ASPALATHVM RHODIVM VOCANT.

Rhodii ligni, siue Aspalathi Rhodii quibusdam putari historia nobis non minus obscura & intricata videtur, quàm Aspalathi Veterum. Nos vt nulla desit stirpium indagatoribus occasio ad perfectiorem earum cognitionem perueniendi, & vt discant, non temerè omnibus Scriptoribus credendum, potissimum iis, qui vel ex leui aliqua conjectura, quicquid in buccam & calicem verius quàm mentem venerit, vel ex aliis hinc inde consarcinando ac scopas faciendo, pro notis sibi, atque adeò suis produnt, lubet ea quæ à Neoterics de eo tradita sunt, interpolata, vbi opus videbitur, censurâ, hic referte.

Exordiemur à Ruell. cui Aspalathus videtur id esse, quod nunc Officinæ vocant *Lignum Rhodium*, nonnullis, quamquam falsò, *Lignum aloë*: vulgus *Rodoen*. Siquidem [inquit ille] singula quæ à Plinio & Diosc. traduntur delineationes huic ad amissum, nullâ reclamante notâ, respondent: namque lignum fuisse fruticosum nodi satis testantur, quibus adhuc exasperatum scater. Declarant etiam aculeorum vestigia nonnunquam id frequentibus spinis inhoruisse, quamvis spiculis castratum & suis viduum furculis: quin potius cortice spoliatum, ad nos deferri soleat: modicum tamen arborem vel fruticem fuisse, satis nobis hæc ligni reliquæ docent. Pondus eius graue satis librans manus perpendit, quòd cæterorum more demersum aquis non protinus extat, sed lapidis modo confestim præceps fidit: nec sic obrutum quouis modo consuevit emergere. Adde quod hoc lignum subrubet, & in purpuram quandam exuto cortice tendit, quod oculis euidentius est, quàm vt probari mereatur. Satis superque duritiæ & spissitudinem tactus sentit, odoris quoque suauitatem, ligni suffitus indicat. Cæterum si lingua consulatur, leuem amarulentiam respicere, & quadantenus amarescere constat. Gal. tamen gustu acrem Aspalathum adstringentemque deprehendit, cuius iudicio satis lingua subscrit, nec iis plura quæ ad eius cognitionem pertineant Diosc. scripta reliquit. Apportatur ad Rhodios & Rhodiorum insulis: inde Rhodij appellatorem



tionem declinauit. Quin & de flore fruticæque toto ad Rhodios Negociatores retulimus, qui florem Rose tribuebant, prædicabantque humilem arbutulam, fruticæmque lignolum, crebris spinis aculeatum. Baigitur, quæ ideli narratione acceptus, & ipsius ligni pericula quæ vnus quisque facere potest, in hanc traxerunt opinionem, vt Rhodium hoc lignum sit idem, quod à Veteribus *Aspalathus* dicebatur. Accedant etiam nostræ nimis sententiæ, qui diligenter hæc scrutati, & singulas notas disquirere voluerunt. Quippe quæ magnitudo et arboris modicæ, vel potius frutex humilior, spinosus in Rhodiorum insulis frequens, vnde deferretur ad nos: flore est Rose atque vergit in purpuram cortice detractò, densus, gustu subnitro. Mingones officinarum per se pro Agallocho Alpalathum subtrahunt, manifestò errore. Hæc Ruell. cuius descriptioni, vt ingenue fateamur, non fidimus: nec relationi Negociatorum. Veretur eius descriptionem potius esse repetitionem notarum Dioscor. & Plin.

Cordus apud Dioscor. refutando Ruellii opinio nem descriptionem amplissimam tradit, quæ non in omnino videtur conuenire. cū Ruell. de descriptione. Lignum, inquit, Rhodium, quod Ruell. vulgò Rodoen appellari scribit, idem est cum eo, quod apud nos à quibusdam *Rhodium* appellatur lignum, venditur sæpè pro Agallocho, quod eū Xylaloe, hoc est, Lignum Aloes vocant, & ponderosum est, ita vt aquæ immersum lapidis modifidat, nec vnquam postea emergat. Fuit ex eo quoque globuli, quibus funiculo traiectis præces suas mulierculæ numerant. Est præterea odoratum. Contra Ruell. aliterum non esse Alpalathum: ac neminem rationari posse, Rhodium lignum fuisse fruticem. Quod nodi in Rhodio ligno scateant, non probat fruticem fuisse: sed intortam & tuberosam arbutulam. Est enim incurua, tubernibus & conuolutis pectinibus intorta eius materia, quæ res manifestè indicat arboris potius caudicem quam fruticis virgas fuisse. Quod Ruell. subiungit, spinis id inhoruisse incertum multò est. Apparent quidem in superficie eius tubercula quædam & nodi & præcisiorum ramulorum vestigia, sed quæ nihil minus referebant, quam aculeorum reliquias. Modicam arborem fuisse ipsi quoque ex materia non vsque adeò crassa colligimus. Sed non continuò Alpalathus est. Neque adè gracilia sunt hæc ligna, vt frutices fieri possint afferuntur enim sapissimè quæ vnà manu nemo complectatur. Vidimus nos non rarè à caudice aut radicem principio resecta tubera, quæ crassitudine vitæque manū implerent, vt propter eam amplitudinem pocula ex ipsis fiant. Contra Alpalathus frutex ea crassitudine non describitur. Quod verò ponderosissimum sit lignum Rhodium, perinde non comprobat Alpalathum id esse: cum nullus vnquam Scriptor tanti ponderis tantæque densitatis notam Alpalatho tribuerit. Dioscor. Alpalathus *ῥυδαίνος* & Latinis lignosus: illud autem non lignosum, sed lignum & plus quam lignum appellandum est. Negamus etiam subrubere & in purpuram quandam tendere hoc lignum. Miror autem cū Rhodio ligno diuersi sint, sibi que alternis vicibus immixti colores, cur Ruell. silentio præterit candicantem & pallidum, rubescentem tantum & purpurascentem eligens, quia hi propius, quam illi ad descriptionem accedebant. Sed pace Ruellii dixerim, non rubescere neque ad purpuram vergere Rhodium lignum: sed habet venas partim libicantes, partim pallidas, partim in sp. adiceo fu-

scas & nigras, qui omnes colores aspectu luridi sunt, rarissimæque inuenitur, quod non distinctos habeat hos omnes. Interpretes omnes, etiam Plinius, colorem in Alpalatho intelligunt ipsum lignum præ se ferre debere, postquam deglubatur. Nos verò contrarium intelligimus, celsus enim id de cortice dicere Dioscor. In Rhodio ligno cortices studio & industria, ceu omnis aromaticæ facultatis & vilitatis expertes cum proxima & exteriori materia profundius resecta abiciuntur, soliusque ligni cor odore & sapore commendatur. Odorem ad castorium accedentem in Rhodio ligno tam crudo quam prunis imposito non percipimus. Miramur cur Ruell. dicat Rhodium lignum leuem amaritudinem resistere. Si accuratè gustum consulamus, Oleastri saporem, sed amariorem & acriorem in eo sentimus. Gal. nullam amaritudinem Alpalatho tribuit. Rhodio verò ligno tanta inest amaritudo, vt nullus gustum fugere possit: cui adiuncta est cum aliqua adstringendi vi manifesta acrimonia, quæ paulatim incipiat, donec prorsus excalescat fauces propemodum vt Cocognidium exasperet & feruore detineat: quare id in tertio gradu completo calidum pronuntiamus. Animaduertendum ne decipiamur in Agallocho comparando: plerique enim Rhodium lignum ignaris pro eo vendunt. Adulteratur præterea Agallochum, vt Platearius tradit, ligno quodam in montibus Almasæ nato, quod pondere, nodoso habitu, & quadam aromatica vi Agallochi notas vtunque refert. Matth. Syluaticus in Pand. idem paulò aliis verbis refert, & lignum quod pro Agallocho vendi conuenitur, Chamælaræ radices esse scribit. Per Chamælaræ hoc loco intelligamus Oleastrum necessè est, qui parua & syluestris est Olea: maximè cum talis ei sit materia, quæ faciliè pro Agallocho substitui queat: Est enim oleæ, densum, solidum, ponderosum, gustu amarum, & acre lignum, præsertim syluestri: inprimis autem in Arabia & Aethiopia nascenti, cui propter calidum calorem etiam odorata est materia. Censemus igitur sæpè pro Agallocho vendi Aethiopici siue Arabici, aut alibi in calidioribus locis enati Oleastri lignum. Nā ipsi Arabes Scriptores testantur in Arabia nullum Agallochū gigni, sed aliud quoddam lignum ei non dissimile, quod est oleastri. Id ipsum autem idem est Rhodio ligno vulgò vocato. Non obstat: quod Ruellius dicit in Rhodio insula nasci. Cur enim in Rhodio non nasceretur, Oleastri? Ergo quum in Rhodio siue Rhodisso ligno omnes notæ Oleastro conueniant, & manifestè constet, id ipsum ex Alexandria Aegypti, Aethiopiæ vicinæ, afferti, neminem profectò futurum arbitramur, qui neget Aethiopiæ oleastri materiam esse.

Porrò idem Cordus in Hist. scribit: Agalochū, Locos: id est, Xylaloe solida & ponderosa, in plures species ab Autoribus, præsertim recentioribus diuiditur: quo verò passim vitur, lignum est duū triūve digitorum crassitudine densum, ponderosum: & aquæ iniectum fundum petens, pingue, nodosum, pectinibus non adè rectis, sed interdum in tuberculis conuolutis. colore varium maculosumque, nigris, fuscis, & flauis distinctum venis, gustu acre, amarum ac aromaticum: odore, dum Prunis imponitur, grato & iucundo: prunarum calore pinguem rubentemque remittens liquorem, & spumæ modo paruas agentem bullas: affertur & hoc decorticaum sandalorum modo. Nascitur in India & Arabia. Quidam hoc Agalochum, lignum Rhodium siue Rhodiss-

Interpres  
Diosc. &  
Plin. not.

Cortices  
abiciuntur.

Non oleæ  
Castorium  
Alios Ruell.  
est, error.

Amaritudo.

Temperat.

Agallochi  
adulterium.

Chamælaea

Olea lignum.

Oleastri h.  
gnum.

Rhodium  
lignum  
quale.

*Aspalathū.  
Ruell. nos.*

*Cordus nos.*

*Agallochi  
loco Olea-  
ster Rhodi-  
ter vclitur*

*Aspalathū  
Sandali  
genus.*

*Curt. nos.*

*Ruell. ra-  
uit.*

*Xylala,  
Hoad.*

*Ruell. re-  
preh.*

*Oleafer  
Rhodium.  
Agalocenus.*

*Color ligni  
Ruell.*

*Olea ge-  
nus.*

*Santalum.*

num appellant, & Aspalathum esse affirmant, vt Ruell. sed errat plurimum, vir alioquin doctissimus, & multæ lectionis. Sunt etiam qui hoc Oleastri lignum esse credant. Hæc Cordus.

Quem autem sanè fluctuantem incerta vada tenere patet. Nam postremo hoc loco plus tribuere videtur atomici, quam fecit in Commen. vbi Aethiopicam Oleam putat: hic Indicam & Arabicam plantam dicit, quamvis ex Arabum auctoritate dixerit Agallochum in Arabia nullum generi. Antea affirmavit esse Oleastri lignum, hic quasi hæsitans aut ignorans, eam opinionem alas tribuit. Hæc sanè merentur consilerationem.

Iam loco Agallochi, inquit Cardanus, diu viderunt Oleastrum. Hic enim Rhodo natus, seu regionis natura, seu planta sit alterius generis, colore refert Agallochum: nec videtur omnino odoris expers: suauiter enim fedit paum olet.

Quidam è Recentioribus Aspalathum Sandali genus alterum arbitrantur: veritas tamen constat, ait Curtius, Rhodium esse quod ad nos asportatur, ex quo ad deprecationes orbiculi sunt, quibus à diuitibus orbiculi aurei interferuntur: qui sæpè ex hominum luxu tenuiores in brachiis & collo inuoluuntur, quod nonnulli inficiantur, tanta est inuidenæ inter Medicos labes. Sed si Curtius legisset & probè intellexisset Cordi argumenta, non tam temerè ac intempestiue Medicorum inuideniam denotans, suam met inficiam circa ea, quorum historias consarcinat, detegeret.

Syluio Agallochum, quod Offic. ostendunt, verius est Aspalathum, acre & austerum Galeni.

Ruellii errore & Scaliger explodit tanquam ridiculum, quod nimirum Rhodiensem arbusculam esse Aspalathum existimauit. Et addit: Rhodii lignum illud, ex quo Sphæulas faciunt, etiam nunc *Xilala* vocari. Arab. *Hoad.* de quo postea plura trademus cap. de Agallocho siue ligno Aloës.

Sed lubet & Matth. Ruellium refutantem & de Aspalatho differentem introducere. Sic scribit. Aspalathus quidem ex Creta, Rhodo, vel Syria ad nos [quod ego sciam] non aduehitur. Ruellius mediocri censura non vacat, quod pro certo asserat, id legitimum esse Aspalathum, quod Rhodium Oleastrum nonnulli vocant: quo item quoddam Agallochi vice utebantur Myropolia. Cuius materiem cum & in Sepalsis, & apud artifices, qui precatórias [vt ita dicam] coronas ad Deiparæ virginis salutationes torno conficiunt, diligentissimè sibi perferat: ea sanè nigra partim, partim verò ex nigro flauoque venola mihi sese obtulit. Rubram autem & subrubram [vt Ruell. inquit] nusquam me vidisse ingenuè fateri possum. Adde etiamnum, quod sit [quemadmodum Rhodi narrant] hæc planta ex Olearum genere, Rhodio tractui abundè proueniens, quæ Oliuas etiam proferat: sed nec multis spinis horrens, nec detracto cortice rigescens. Quamobrem [vt mea fert opinio] Aspalathus non erit Rhodium Oleastrum, neque Santalum rubrum. Itaque nobis Aspalathus deest, qui tamen facile ex Rhodiorum insula asferri posset.

Idem in postrem. Edit. addit: sententiæ nostræ non subscribit Anguill. Ille Constantinum Myropolan quendam Rhodium testem adducit: ego Rhodios alios, à quibus de his omnibus diligenter sum percontatus, qui plantam hanc Oleastrum, non Aspalathum vocari dicunt. Et quod Agallochum rarissimum esset, Officinæ ferè omnes

eius loco suppeditabant Oleastrum Rhodium. Et in Apologia. Ego. inquit, profectò Rhodium illud lignum multum distare ab Aspalatho certò scio: quod primùm illud cortice tenus rubens non sit, ab Aspalatho potius albicans. Sed & id clarissimè demonstrat Rhodium lignum nullam cum Aspalatho habere cognationem, quod scribat Gal. qui legitimum in Græcia fortasse pluries degustauit, hunc gustu esse acri, & simul adstringenti vi præditum: quod minime in hoc Rhodio ligno reperitur, quemadmodum nec præualens amaritudo, quam illi reddidit Dios. Quod autem huiusce ligni planta sit Oleastri species, id maximè fatentur Rhodii, qui eius historiam ex Melita insula ad me scripserunt his verbis. Lignum ex quo globuli toro sunt ad fundendas preces, truncus est arboris longitudine hominis metam non excedens. Oleastri arido & saxoso tractu, fronde perpetua, Oleastri æmula, floribus albicantibus, baccis nigricantibus, parvis, caudice breui, contracto, brachii instar crasso, à quo rami prodeunt rari, spinis ferè nullis, aut admodum paucis, albicante toto cortice. Ligni materies cortice tenus candicat: medullitis verò nigricat. Radicibus nititur firmis, albicantibus. Quibus palmæ esse arbitror Rhodium hoc lignum ab Aspalatho admodum esse diuersum: & Anat. Iusit. vnà cum Ruell. in eodem versari errore. Quippe Aspalathus tantum cortice tenus, non, vt ille existimasse videtur, in tota ligni substantia adeo saturatè rufescit, vt purpureus appareat. Huc vsque Matth. Quem videt Lector in tradendo ligno Rhodio planè contrarium esse Cordo liget cum illo neget esse Aspalathum, & velit esse Oleastrum Rhodium, dum ei denegat acrimoniam & amaritudinem, quam tamen allegat Cordus, vt demonstret lignum Rhodium esse Oleam Aethiopicam. Ait enim: est etiam acre & odoratum, atque gustu Oleastri acrimoniam & amaritudinem respicit, sed vtramque vehementiorem, quoniam terra & cælo siccanti & feruido enatum. Sed vtri iam credemus? Paulò post, quale sit Matth. Lignum Rhodium apparebit ex Ho. Bello. Amatus in Diosc. Aspalathus [inquit] Lignum Rhodium; Lignum Aloës, Cortex Bugie, Arab. *Darssan*: Hæp. *Alargis*: Ital. Ligno *aloes* da *Rhodes*. Aspalathus autem, vt Ruell. testatur & Recentiores Græci confirmant, lignum quod è Rhodiorum insula asfertur, & illud lignum Aloës Rhodiorum Officinæ hodie appellant, ex quo coronæ ad fundendas preculas parantur. Nec enim Matthiol. qui hoc tanquam falsum euertere contendit, audiendus est, cum reuera lignum hoc ex quo coronæ parantur, ex arbuscula humili crebris spinis aculeata, in insulis Rhodiorum & aliis Græciæ locis cædat, non verò ex Oliuæ speciem referente arbore. Vidimus enim apud Tho. Lucensem insignem Pharmacopolam Ferrar. à quo Monardus multa se didicisse libris suarum Epistolarum fatetur, huius ligni frustum, brachialis crassitudinis, solidum, graue, multis intercepit nodis, quod à Græcis hominibus sub nomine Aspalathi acceperat, & ex eo coronæ parantur. Erat autem lignum illud coloris subrufi, cui simile in Hispania apud Valentinos & Terraconenses præcipuè magna in copia reperitur: & illustradicis cortices, Officinæ sub cortice Bugie Mercatoribus vendunt.

Sed contendat quantum velit Amatus, non multum fidei tribuimus ei, temerè, nostro iudicio, asserenti Lignum Rhodium prouenire in Græcia, & non speciem Oliuæ referre. Cordus enim, vt iam demonstratum, scribit, manifestè



constare ex alexandria Aegypti, Aethiopia vicina affertur. Debebat Amatus Aspalathū à se visum describere, & præterea corticem Bugiæ. Constantinus Rhodientis Pharmacopœus Candia, ut notat Anguill. vult Lignum Aloes Rhodium esse verum Aspalathum, de quo scripsit: Inuenitur in insula Rhodo frutex spinosus, foliis Oleæ, sed paulò minoribus: flore albo odoratissimo: cortice albicante & aspero. Reperiuntur inter has arbutulas quædam, quæ detractò corticis coloris sunt rubescentis: quòd vetustiores, eò vegetior color: Totum lignum non rubet, sed solum partes quæ adhærent cortici. Non reperitur in tota insula Rhodo lignum vllum ibi nascens odoratum, excepto hoc. Ex quo Turcarum nobiles singularem parant compositionem ad suffimigia, in hunc modum. Dissecant in minutas partes maccrântque in aqua rosacea per triduum: tum admiscunt bonum moschum. Deinde sumpto saccharo dissolunt, miscentque cum prædictis, omniâque simul decoquant, donec videantur veluti frusta combusta. Postea sinunt refrigerari. Hæc frustula prunis imponunt, unde odor valde gratus & suavis excitatur. Hoc lignum ego firmiter credo esse verum Aspalathum, considerato odore, sapore & substantia. Hæc omnia scripsit ille Pharmacopœa, cui opinioni etiam assentitur Anguill. nec villo modo dubitat quin sit illud lignum verū Aspalathum, quum apud se frustum habere testetur, omnibus notis ab antiquis Aspalatho attributis præditum.

Errant, inquit Lacuna, qui pro Aspalatho accipiunt lignum cum venis luteis & nigris vulgè dictum Lignum Aloes, & alio nomine, Oleaster Rhodius, ex quo globulos precarios tornant. In huius ligni genere nullum rubrum visum quale debet esse Aspalathi.

Lignum Rhodium, ut annotat Gesn. seu verus Aspalathus, Theriacæ iniicitur: quod tamen lignū est, & trunci & rami pars: ac substitui non improbat: cum Veteres radicem aut potius radicis corticem usurparent. In ligno Rhodio tamen nulla astringendi vis videtur.

Scribit Ryffius asportari ad nos Aspalathum à Rhodiorum insulis, Rhodium lignum esse Veteribus Aspalathum. Agallochum lignum Aloes quod ostendunt officinæ verum esse Aspalathum: quem Germani Paradiesi aut Aloesholz vocant. Verum Ryffius videtur nimis securè de sibi ignotis iudicare.

Lonicerus fatetur lignum quòd in Offic. demonstratur pro Rhodio esse peregrinum & incognitum. At Clusius append. Dod. Gallicæ hist. ait Officinas ostendere duo genera ligni Aloes, præter lignum Rhodium, quod nihil aliud sit quàm Oleaster Rhodo delatus, quo Officinæ olim vsæ sunt pro ligno Aloes.

Apollo Ruell. & Amatus taxat, quòd arbutulam quandam Oleastri Rhodii cognomine, alia pro ligno Aloë habitam, Aspalathum putarint, quod non comprobandum censet, quum hoc Rhodium lignum coronaris fabris vulgatissimum nullibi rubescat, sed variegatum è nigro in croceum vergere videatur, exutum enim cortice ad nos affertur. Matthiolum verò Rhodiorum historiam ex insula Melita redidisse putat, maiore contradicendi curâ, quàm quòd res ita se habeat. Ex Anguill. lectione nullam in hoc desiderari notam. Hic obtiterit Gal. 6. simpl. ex quo gustu acris est, simul & astringens, quæ in Rhodio oleastro non reperiri ait, ut neque amaritudo, quam illi tribuit Diosc. Verum tamen est de re dubia

ineptum sit firmiter velle contendere, eius loco Rhodium id lignum, odoratum, amarulentum poterit substitui.

Catal. Francor. Bugiæ Cortex: die rind von Rodiserholz. Item Aspalathus vulgaris: Lignum Bugiæ: [leg. Bugiæ, Rhodiser Holz. Refor. Wormat. Lignum Aloes Rhodiorum: Lignum Rhodium, Lignum Bugiæ, Aspalathus suppositivus. At considerandum censemus, quid intelligant autores Catal. Francor. & Reform. Worm. per corticem Bugiæ, & quale sit eorum lignum Rhodium.

Cæsalp. de ligno Rhodio hæc tradit. Ex Olearum radice simulachra sculpere solent perpetua, autore Theophrast. in quem vsum hodie oleastrū Rhodium maximè expetunt, maculosa facie prædendum, ut quodammodo Agallochum Indicum æmuletur, impostoribus adulterandi anam præbens.

Nec omittenda quæ perdoctus & celebris medicus Cretensis Honor. Bellus in epist. ad Clus. scribit. Mitto, inquit, ramum floribus & foliis onustum, simul cum fructu Ligni illius Rhodii, quod Matthioli. *Olinastrum*, nonnulli *Agallochum* vocant, à quamplurimis etiam pro legitimo Aspalatho in Theriacis vsurpatum: ex cuius intuitu facillimè cognosces in quibus tenebris omnes adhuc versentur. Nam lignum illud neque spinosum est, neque Oleæ & multò minùs Aspalathi: sed veræ & legitimæ Cyrtis, perquam similis à Maranthæ descriptio, sic ut vnum & idem esse credam. Oritur hic frutex in insulis Rhodo propinquis, & Rhodo ipsa *Calucri*. Pathmi in spherularum præcarnatum vsum conuertunt: in dulla ipsa & nigra.

Errauit Matthioli. credens, lignum spinosum esse, & olæ speciem: non esse autem Aspalathum rectè iudicat. Errauit & Anguill. cum suo Rhodienti pharmacopœo, qui illud suffimigi genus somniauit. Hoc enim scire diligentissimè cupiens mendacium esse deprehendi. Sed omnium maximè in errore versantur, qui hoc ligno in Theriacis pro Aspalatho rectè vti iudicant, quemadmodum celeberr. Patauinorum collegium. Verùm de hac Cyrtis copiosius agemus postea.

*Aspalathi adulterium: fructus Oleastri radix.*

Pro Aspalatho obseruauimus in quadam Offici. Descriptio na lignum quoddam validissimum, & solidissimū, durum, graue, tortuosum, nigricans partim, partim albicans, alternantibus interdum vtriusque huius coloris venis, aliquibi flauescens, subinde transuersis micis pectines fecantibus, odore nullo, sapore amaricante.

Considerent Studiosi, an hoc lignum fortè traditum sit ab aliquo ex præcedentibus vel pterisque nomine ligni Rhodii & Oleastri, quod facillè nobis persuademus. Nescimus tamen ex qua planta sit. De eodem ligno fortè scribit Syluius in Pharmacopœa. Sunt qui ligni Aloes loco Olinæ arboris matricem substituunt. Et Monachi in Mes. Sophisticatur lignum Aloes præcipuè cum lignis radicem fil. Olinæ.

Lignum Rhod. amarulentum. Lignum Bugiæ. Aspalathus suppositivus.

Lignum Rhodum Matth.

Non spinosum. Cyrtis. Locus

Matth. reprobat. & Anguill.

Patauin medicor. error.

ASPALATHVS CRETICA ALPINI,  
ODORIS PERSVAVIS.

## CAP. XXVI.

**Q**uæ scriptis antè Hon. Bellus de Aspalatho Rhodio à nobis sub finem præced. cap. citata, faciunt, ut hoc loco proponamus Aspalathum Creticam odoris suavis Prof. Alpini, de qua scribit lib. de Plantis Aegyptiacis in hunc modum. Aspalathum, ut aliàs quoque dictum est, copiosissimum propè Frasciæ portum [Cretæ] in quodam colle virentem atque florentem sæpè inspexi, odorisque eximia suauitas ex huiusce plantæ floribus ad me delata, fuit in causa, ut ipsum agnouerim. Quæ planta est frutex dentis ramis, spinis albis, duris, horridis, cortice caudicis albo, ad trium cubitorum & plùs altitudinem in altum allurgens, floribus multis parvis, croceis, spathæ similibus, sed summe odoratis. Huius arbuti radices duræ, longæ, crassæ, colore flavo, atque cortice summe odorato tunc temporis à me fuisse observata. Multaque meas Pharmacopœus decerpit, Cayrûmque ad usum medicinæ meo iussu detulit. *Hecille.* Sed quum tot difficultatibus intricata sit Aspalathi historia, tam in Antiquorum quàm Recentiorum scriptis, ut patet in præcedentibus, rem dignam industria Botanico præstitisset Alpinus, si diligentius paulò Aspalathum suam Creticam descripsisset, ac demonstrasset folia, florum formam, & totius plantæ saporem.

Mirum præterea hunc fruticem tam suavis odoris non observatum in Creta per Bellon. & Honor. Bellun. Non censemus Alpinum intelligere Aspalathum trifoliam, quia antè eius meminit, nomine Acaciæ Matthioli.

LIGNVM ROSÆ ODORE: ALIIS LIGNVM THYRIS: ALIIS ASPALATHVS.

## CAP. XXVII.

Descriptio

Flos.

Sapor.



icus, primùm amaricans, pòst acer ad Schœnanthi saporē quodammodo accedens. Prunis impositum flammam celeriter satis concipit, & quidem *Legitimus*, sed nihil resinosi aut pinguis fundit. Fragmentum nostrum satis magnum, bra-

chiale arguit ligni [vnde dictum est] crassitudinem: quod nobis pro Aspalatho aliquando datum Veronæ: & denuo Ellingæ per D. Volmarium solertem Pharmacopœum pro eodem Veronâ missio. Accepimus & à D. Coudenbergio Pharmacopœo Antuerp. celebri, cum hoc titulo: Lignum ex Palma insula vna Canariarum.

Eiusdem ligni videtur meminisse Ruellius his verbis. Iam Liburnicis novum Orbem longa navigatione petentibus, delatum ex insulis ad nos lignum ex arborecente frutice, in nodos inflexo, scabiolo: cortice facieque lacunosa: materie dura, crispæque, colore intus buxco, candido singente orbiculo, quod profus oleat Rosas: ita ut scobem eius, vel etiam ramentum ligni, pro Rosis, vestibus interponi fuerit gratissimum: nec odore cedit Rosis, etiam si decoquatur igni. Iam ex hoc pectines, depurgando capiti ob odoris gratiam non insalubres fabricant: item alabastrum, pyxides, & cætera id genus. An Zigeri Cassia genus fuerit, non ausim asserere. *Hecille:* quem non placet huius eiusdem ligni [ut eandem censemus] aliam ponere descriptionem inter herbas lib. a. cap. 96. cum ait: Ex illo nouo reperarum insularum orbe, Liburnicarum remigatu lustrato, delatum nuper ad nos lignum crasso cortice & huilo, multis tubenbus & nodis inæquale, ponderis eximii, ita ut immersum aquis pessum eat, nec sidens rursus emergat. Buxi colorem, crassitudinem & duritiam imitatur. Hoc tritum, vel in scobem derafum, Rosas odoris suauitate prouocat, quin potius de paritate certans, incunditate vincit. Hoc rosaceum appellamus cum barbarum regionis nomen audire non potuerimus. In pensiles orbiculos pilulæve, quæ à mulieribus gestantur, Aspalathi aut Agallochi more tornatur, quibus filo immixtis, mulieres supplicationes suas numerant.

Ceterum de quo Ruell. non imprudenter, nostro iudicio, dubitat, id Porta magna securitate affirmatiue pronuntiat. Cassia [inquens] quæ Zigeri vocatur, Rosæ odorem refert, ac ad eadem ad quæ luncus præstat: ob id ex hoc pectines depurgando capiti, ob odoris gratiam non insalubres fabricant, alabastrum, pyxides &c.

Vides eum verba ex Ruell. desumpsisse, eo non citato: nihilominus pro certo asserere id, de quo ille dubitabat.

Scribit Anguill. se aliquando exultimasse lignum coloris Mali aurei [naranzato] & odoris Rosæ sine amaritudine esse Aspalathum: verum deinceps cognouisse esse lignum Thyris. Nec deesse, qui suam imitati opinionem adhuc exultiment esse Aspalathum, sed errare.

An illud Aspalathi frustulum exquisitissimum, quod Lacuna iactat Romæ sibi datum ab insigni matre medicæ pericructore Gilberto: Enmuerò sanè quum historia Aspalathi obscura admodum sit, si Lacuna bonus fuisset Botanicus, descripsisset.

Necignotum fuit istud lignum Gætopio, dum ligna ex Atlantico Orbe peti sentit, quæ suauitate cum Rosis centent.

Lignum odoratissimum, quod ex America non ita pridem aduectum, Palmario de Feb. pest.

In America siue Brasilia arbor speciosa, odoris suauissimi: Ligna manu retenta, Rosam spirant, Lerus.

Lignum rosaceum, Rhodoxylon, Aspalathus roseus, Rosenholz Germ. Catal. Francof. & Re. form. Worm.

Recentiorum sedulâ vestigatione factum est,



vt tres lignorum differentia nobis innotuerint, quarum quolibet Aspalathi nomine digna est. Prima nobis visa Verona & munere data ab eximio Pharmacopœis Fr. Calceolario & And. Bellioco, qui suis Theriacis Mysticis, de Doctorum Veronensium consilio inposuerunt. Frustum quod habemus densum, solidum & compactum fuit, quasi cuiusdam fruticis inæ parti resectum, radiatis fibris, ponderosum, colore buxo, sed satutiore, suauissimo odore & pertinaci. Eum esse verum Aspalathum tum persuasi fuimus. Sapor non ita amarus, nec gustu insuauis. Altera species Venetias aduecta Rhodo, de qua paulo post. Aspalathi 3. species, albida foris, intus thorulo subflauo aut citreo, Santali albi & citrini simillima, albam Rosam sapit, (olet fortè voluit dicere) nullam gustanti manifestam exhibet qualitatem nisi tantillum calidi, quod vix gustu discerni potest. Hæc primum nobis dono dedit Morganus Pharmacopœus Londin. & nomen id indicauit: alioqui Oliuastri Rhodensis aut Santali speciem arbitrantibus.

His addit Lob. in hist. Belg. superiore anno 1560. pulchrum ligni huius fragmentum conspectu contrauique apud doctum & industrium pharmacopœum Theodoricum Cluyt Delfersem, quod corticem etiamnum adherentem habebat, rugosum tortuosumque admodum, colore & textura illicis, inodorum: in rimis hærebat non nihil gummi suauis odoris. Hoc curauimus pingendum, eiusque portiones adhuc seruo ab eodem Pharmacopœo dono datas.


Idem Lob. in Adu. portunculam habet paruum depictam sui Aspalathi tertii. Belgica autem historia addit maiorem figuram maioris portione. Item icon. Plant. Aspalathi rosei nomine. Nos igitur hic exhibemus icones à Lob. datas pro tertia Aspalatho.

Lignum roseo odore, quod descripsimus, optime respondet Aspalatho primæ Aduerf. cui fortè congener, si non eadem Aspalathus 1. Lob. sanè Hist. Lugd. & Aspalathi primæ (speciei Penæ: & Aspalathi tertie speciei nomine proponit: additque hanc alios Aspalathi speciem, alios Oleastri Rhodii aut Santali putare.

C. B. apud Matt. scribit: Rhodius Oleaster dicitur Rhodii ligni Cordo in Diosc. cui & Olea Aethiopica videtur. Aspalathi 3. species Penæ & Lugd. que pro Agalochum sapè venditur. Quare Agalochum & Xylaloe folida & ponderosa Cordo Hist. cuius duæ species: altera albicat, & torulo est cinereo: altera rubet, & hoc Aspalathi 2. genus est Penæ & Lugd. Rhodium lignum rubescens Cordo in Diosc. Aspalathus roseus Lob. in icon. Hæc ille. Obseruandum Casp. Bauhinum iconem à nobis propositam ex Lob. in suo Matthiol. ponere titulo Aspalathi rosei. In Cordi ligno Rhodio, siue Rhodio oleastro nihil inuenimus quod conueniat cum Aspalatho 3. Lob. hæc enim albida foris, intus subflaua: illud venas habet, partim albicantes, partim fuscas & nigras, multumque differt à Santalo albo & citrino. In hac odor

Rosæ: in illo nihil tale prædicatur. caret manifesta qualitate, illud amarum &c.

## ASPALATHVS RHODIVS RVBENS odoratiss.



Aspalathi altera species inquit Pena & Lob. in Adu. Venetias aduecta Rhodo, missa fuit Nicolao Comasco Medico in primis erudito, apud quem tum maximum truncum vidimus, cortice exutum, rubet, Taxo colore, odore adeo fragrantem, vt quam latè patebat cœnaculū eximio imbueret odore. Eundem nos adhuc

frustulum seruamus dono missum à penitiss. pharmacopœo Valerando Dourez, qui ab eodem accepit. Idem Lob. tam in icon. quam in hist. Belg. Aspalathum Rhodium vocat. Figura in Aduerf. nulla erat, sed hanc quam hic damus, primum exhibuit Lob. in hist. Belgica. Et postea etiam Casp. Bauhin apud Matthiol. Quæ autem de eo scripsit, paulo antè dicta sunt. Interim perquirant Lectores vbi Cordus Diosc. scripserit de ligno Rhodio rubescente quod conueniat cum hac Aspalatho 2. Lob. odoratissima.

## ASPALATHI NOMINE DATVM Lignum grauitè olens.

### CAP. XXVIII.

Valerando Dourez Aspalathi nomine nacti sumus fragmenta ligni cuiusdam dura, contorta, nodosa, micis per transversos pectines apparentibus, vt in Fagino ligno, colore per medullam aliquatenus fusco, per reliqua cineraceo exalbido, odore graui, hircoso quem & per se, & prunis impositus spirat, sapore ingrato. Ex frusti nostri consideratione facile diiudicamus siue truncum siue ramum brachialis crassitudinis & spinosum fuisse.

Fortè Oliuus quoque de hoc ligno scribit: Aspalathum genuinum, sincerum & legitimum in Museo Calceolarii notauimus, qui primus omnium Matthiolo misit. Odore, vt censet Plin. proximus est Castorio Aspalathus, Senticosus, horrens ex multis spinis. Illis sanè vnguentarii ad spissam. ta vnguentorum maximè vti solent: parandæ Theriacæ fatis præcipuus, loco cuius nescio quas quisquilias admiscebat superior ætas. Odoratum Aspalathum itaque atque suauè olentem, vbi vi-

Rr 2

dere volēs, non grauat fumus locum ostendere, ne firculofam hanc plantam apud Rhodios querat, aut in Syria.

Hanc quoque in sua peregrinatione annotauit Aldroandus. Aspalathus albus pluribus quidem in locis nascitur, sed non odoratus. Sed sibi habeat Oliuus suaueolentem Castorei odore Aspalathum, nobis delicatior odoratus, qui talem nequitiam suaueolentem credimus. Sulpicamus bonum hunc virum confundere duo ligna demonstrata pro Aspalatho. Castorei namque odor suauis non est, sed hircino proximus, aut etiam deterior. Si quis putet huius modi aliquod aut vidisse aut etiam naribus adhibuisse Plinium, nos non omnino habebit repugnantes.

Considerandum tamen quoque an Matth. in post. Com. de hoc Aspalatho scribat, cum ait manifestè hallucinatos esse cum Ruell. ipsum, tum Anguil. palam facere Aspalathum, quem primus dono dedit Fr. Calceolarius, & deinde eiusdem Aspalathi truncum, humani brachii crassitudine à Barth. Rolleo Medico, & à Const. Syluestro Pharmacopæo Aninimensi ex Cypro Insula ad eum missum: cum huic, qui eiusdem generis est, cum altero à Calceolario misso, nihil penitus desit, vtile ait, quod in legitimo Aspalatho comprobando desiderari possit: & praeterea cum non solum detracto cortice, purpureo colore rufescat, gustu sit amaro, & materia densitate grauis, sed quod Castoreum non obscure respiciat, vt Plin. inquit. At Matthiolum describere suum nouum Aspalathum praestaret, quam suo more tribuere aucter notas veri Aspalathi. Existimamus in eo non repetas iri. Et cautio fuit apud eundem, ne quis vsuram videndi expetere: quippe militis gloriosi in morem minatur iis qui ad eum concedent videndi causa, nasum ligno sursum impulso ita protrusurum, vt inde sanguis profluat. Dignum, mehercle, verbum Gratiofo Medico & studioso docere profitente. Vt iam benè consultum sit Gesnero aliisque, qui eius signa detexerunt, quod non adierint hunc Thralonem, videndi & examinandi eius Aconiti gratia & alia ab ipso veteratori efficta. Nemini profectò consuluerimus à nobis descriptum lignum grauitè olens in Theriaca alijsve compositionibus poni loco Aspalathi, nisi fortè quis malit olentes crepius, quam Thura. Ahouat sane lignum quoque faciet, cuius fructus venenatus, de qua arbore lib. 3.

ASPALATHVS I. DIOSC. PLINII ET

GALENI, LEGITIMA PONA.

CAP. XXVIII.

**V**olui [inquit Pona in Baldo] repraesentare, & delineatione, & breui descriptione Aspalathum legitimam primæ speciei Dioscor. quæ eadem est & odorata, & medicamentosa à Plinio descripta, quam etiam adnotauit Galenus, & idcirco apta Antidotis, quibus vti debemus: non autem grauis, vt Ebenum: non amara, vt Absinthium, neque absque spinis, vt malè existimauerunt quidam, quod prorsus ab opinione Antiquorum Scriptorum abhorret.

Hæc substantia non est tam compacta, vt iniecta in aquam proruat in fundum, sed si confertur cum multis alijs lignis, satis compacta, & grauis dignoscitur: cortex ipsius superior est colore cinereo nigricante, & quadam acrimonia ad-



stringente præditus, hoc cortice dempto offert seile membrana quædam fibrata, longè elasticæ, si deglutatur, primo cortice colore rubro, ignem mutante: quo dempto ex parte inhaerente, lignum in superficie ad purpurâ vergens detegitur, intus pallescent, pars verò interna ad nigram vergens. Lignum hoc totum est qualitate adstringentis, cum aliqua acrimonia mixta. Odoratum est valdi odoris, & qui nares ferit, tam aridè & profundè, quam Castoreum: nitidè est lamentosum, spinis quibusdam oppletum. Sed miramur Pona non annotare vnde delata sit, & ubi obseruauerit suam Aspalathum.

Aspalathi antiballomona & equinoca.

Aspalatho deficiente plurimi substituant Lignum Aloe. Offic. vt Col. Florent. Cordus in Troch. Scill. Androm. Borganus: Disp. Col. in Troch. Helichroi, Apollo. C. Bauh.

Matth. in Epist. scribit, esse qui Agallochum substitui Aspalathi loco suadeant: quorum placitis facile subscribit, & Apollo in El. Cyphoides. Cæsalp. ait ab Aspalatho Diosc. non multum recedere. Est Aspalathum negat Braslaus. Corn. Agric. Scaliger.

Santalum speciem esse Aspalathi, existimabat Manardus. Cardanus Sandalum rubrum putat. Santalum loco Aspalathi sumi conuenient. Matthiolum in proœmio in Diosc. postea aberrasse dicit, qui Santalum rubrum, Aspalathum credidit. Idem & Apollo reicit.

Aspalathi loco Cordus in Troch. Scill. Androm. substituit Santalum cinereum odoratum.

Eidem substituit quoque Agallochum: aut ubi in eodem medicamento vtrunque recipitur, Lignum Guaiacum. In tota Europa pro Cassia lignea cortex radicis cuiusdam ex Aspalathi specie aliqua denotum opinantur, vnde Cordus de eo autem cortice antè cap. de Cassia adulterina. De fructu spinoso trifolio, Aspalathi genus 2. Diosc. & Plin. putato, traditur postea.

Pro Aspalatho secundo, quidam exhibent quandam plantam spinosam, cui foliola parua simplicia, de qua lib. 11. Clus. etiam alios affines tradit duos, de quibus lib. 11. Aspalathum, Aspalathus, est Genistella Pandætes.

Darfishan malè apud Serap. Interpretem fuisse, esse Malum Granatum syluestr. luce clarius: Merito igitur Amatus: pro Aspalatho non Granati sylu. radice vtendum, vt multi perperam faciunt. Pandætes confundit Darfishan & Aspalathum cum Granato sylu. Verum Toxites ex Poëta subito factus Medicus Paracelsita, medica tractans quasi essent fabulæ poëticæ, introduxit confusionem plurium stirpium in Onomastico [vt vocat] Philosophico. Stultis hæc pro videri obtrudenda: Benzuin, wolriedender laser, aut Azarwider Kranarbaum. Arbor tremula, Arbor Granati syl. Aspalathus, Aspalcos, Arbor Berberis, Aspalathus, odorata.



*odorata*, *Darssahan*. Impositura est, de rebus docere velle sibi incognitis.

Impingunt inquit Cord. in Dioscor. qui credit Alpalathum, siue, vt Arabes vocant, *Marsfahan*, idem esse cum *Berberi*. Apollo etiam reprehendit eisdem, & merito qui Berberim pro Alpalatho supponunt.

Rola Hierichontea vulgò dicta, quibusdam existimata est Alpalathus odoratus: Aliis Amomum, cum sit in odora planta, vt suo dicitur loco. Ex Gal. attributo libro de substitutis & Auic. multi Alpalatho d. ficiente volunt supponi semē Agni Casti, vt Cordus, Fuchsi, Jacun. Amat. Placot. Borgan. Bacchan. Apollo, Hierichus, Castor, Lonic. C. Bauhin.

In eodem Gal. tributo libro, pro Alpalatho, ponitur Etces fructus. Alpalathum dici de Cypetro, videbitur suo loco.

Annotat Fuchsi de comp. med. supra Ol. Irinum Nicol. Myresp. Alpalathum in Latinis exempl. desiderari: pro eo radicem Lili rectè substitui: se iudicare legendum *αειω βίος*.

Autore Trago Alpalathum dicitur Diosc. l. 4. c. 4. de Polygono.

Alpalathus, id est, Tapfus, Pandect. & Trago Verbascum, Barbaris Alpalathum.

Auic. interpres dum Theriacam describit, quo loco autores Græci Alpalathum scribunt, ille *Mumiam* habet, vt annotat Bellon. de Brumine.

Alpalax in herbaceis Theophrast. l. 1. c. 11. quæ planta sit, indagandum.

## DE AGALLOCHO VETERVM in genere.

### CAP. XXX.

**A**gallochum Dioscor. lignum est (ξύλον ἄλλοχον): Vetus addidit ad marg. *πρό τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, quod ex India & Arabia depositum, Thyæ ligno simile, punctis maculisque distinctum, odoratum, gustu quodammodo astrigens, cum quadam amaritudine: cortice vestitur cutis instar molli & aliquantulum verticolore. In Græco habetur, *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, pro eo quod diximus, Thyæ ligno simile. *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, legunt Orb. Aegin. Ruell. Goupyus, Hermol. Marcell. & Sarac. Sunt antiquiores Græci qui Sorbo legunt. Marc. pro *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, punctis maculisque distinctum, Aldi. codex habet *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*: pro quo fortè ex Aldin. cod. legend. *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, hoc est, *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*, compactum, solidum: aut potius ex Orb. *ἑνὸς τοῦ ξύλου ἄλλοχον*. Nam neque Serap. nec Orbis. nec Paul. punctorum macularum mentionem ullam fecerant. Attamen in optimo Agallocho cineræ discurrentes venas Recentiores nonnulli agnoscere videntur, vt notat Sarac.

Paul. de Agallocho eadem ferè quæ Dioscor. scribit.

Sim. Sethi *ξύλον ἄλλοχον* (quod Lignum Aloes interpres conuertit) lignum est arboris, quæ in diuersis Orientis regionibus nascitur, & partibus Meridionalibus, quod quandiu corruptum est, nullâ habet differentiam fuo odore à cæteris arboribus. Vbi verò putruit, bonum nanciscitur odorem, non admodum tamè perfectum: sed earum regionum incolæ concidunt, & sub terram multo puluere obrunt: & post aliquod temporis spatium, quantum sufficere visum est, ipsius ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt. Qui verò in Aegypto & aliis regionibus sunt, abra-

dunt, & corticem abiciunt, & ita in hanc speciem redigunt. Xylaloe verò decem sunt differentie: quarum decima quidem *Indica* est, & in India nascitur. *Sampha* verò dicitur, quæ in Samphi ciuitate provenit, & quæ *Speon* dicta est: quæ *Xylaloe* similis est, cum non sit propriè *Xylaloe*. Ad hæc, est quæ appellatur *Humida* [*ἡρώδης*] cuius rursus quatuor sunt differentie, de quibus non est vnunc dicamus.

In suffumigio, inquit Aet. *Tarum*, hoc est, *Lignum Aloes*, vt in suffumigio Domine Romule, vnguentari præscribunt. Xylaloe autem Aetio & vulgo medicorum ob amaritudinem dictum volunt, quasi *Lignum Aloes*. Hermol. à nonnulla similitudine coloris.

De Taro sic Plin. Ex confinio Casie Cinnamique & Cancamum ac Tarum inuehitur, sed per Nabateos Troglodytas, qui considerare ex Nabateis. [Sic vocant Chineses Dal.]

Pauca hæc Plin. de Taro habet: nec vsquam alibi, quod nobis quidem constet, huius ligni sub Agallochi nomine meminit, quamvis sedulo Dioscor. scripta perlegisse eum dubium non sit: *Tarum* autem Aetius idem cum Agallocho putat. Vt dictum. Mirum nusquam Galenum in libris de simpl. med. fac. Agallochi meminisse, præsertim cum Dioscor. ante eum de eo tradiderit, quem ipsum diligenter legisse constata, e post eum Paul. Aegin qui pleiæque sua excerpere consuevit. Sed verisimile est etiam Galenum in libris simplicium de eo tradidisse, præsertim cum Arabes eundem de Agallocho loquentem introducant. Sed fortè temporum iniuria Librariis inueniunt, quod & suspicatur Cordus, caput illud excidit. In libro tamen eius suppositio, cui titulus Medicinalia experimenta, de eius viribus & vsu traditur. Et in libro succedaneorum eidem attributo Agallocho Centaurium substituitur. Sed quàm bene, postea dicetur.

Apud Serap. ita legimus. *ἡρώδης*, id est, lignum Aloes. Dioscor. Agaloian est lignum quod deferretur ex India: &c. Gal. in translatione Albataci. Agaloian est lignum aloes Indum, habens odorem bonum &c. Abohanifa. Dicitur in Arabia nihil ferre præter lignum. *Nenig* quidem ibi nascitur, quæ ad species eius accedit. Præfertur tamè Indum. Et quamvis plures ibi nascantur species, vna tamen propriè Indica dicta est, reliquæ tantum per participationem loci, sicut Myrobolani nigre Indæ cognominantur. Reperitur etiam Lignum Aloes Indum in insula Fimua, in India. Præfertur nigrum, inclinans ad varium colorem, multa refertum humiditate, graue, durum, densum, carens omni albedine, diu durans supra ignem. Proximum ab eo est *Monduni*, ab Indæ loco Mondel dicto appellatum. Post hoc *Seifi*, quod inter bonas ligni aloes species censetur: nam aqua immersum sedit ob pondus: quò crassius eò melius. Sequitur, *Alkumeri*, prædicto bonitate cedens. Triduo spatio distat eius locus natalis. Ex hoc genere præfertur nigrum, mundum, aut etiam ad albedinē vergens, graue, diu permanens in igne, in quo tamen Seifi dicto cedit. *Cheal ferebeni* quoque Indum cæteris omnibus præfert: postea *Seifi*, cuius bonitatis nota, si aliquid luti adhæreat, quoniam sepius in terris Siti. Post hoc *Alkumeri*, cuius duæ species: vna dicitur *Kachile*, que melior est: altera *Sufori*, vilior. Post has *Seni*, in quo tumiditas superflua. Tum *Albel*, quod deferretur ex terris Sufellæ, similis speciebus cæteris Ligni aloes, excepta *Seni*. Vltima *Alhabeli*, omnium maximum & crassissimum: ideo ex eo fiunt

Fructus.

pedines, & tabulæ. Aiunt autem Lignum aloës lectum de sua aubore annuo spatio sepeh: ita contrumpi à terra superfluum, remanente Ligno aloës puto, & ab omni corruptionis labe immunum. Tradunt & repetiti frustula Ligni aloës, inter alias species medicinarum: nam ramulos arborum fractos, & in flumina cadentes ita per diuersas vcheregiones: *Aberuma* fructus est eius arboris, vt aiunt, figura Piperis minuti, sed colore rubro. Vocari *Piperellam*. Hec apud *Serap.* Vbi notanda vel contrarietas, [ nisi styli barbaries nos vehementer fallit, quem tamen vtrunque possitorem reddere conati sumus. ] vel hoc. Dicitur in Arabia non nasci ex planta eius aliquid, verum Lignum. Quod nos putamus idem esse ac dicere: infugiteram esse arborem: nec alium eius esse vsum aut reditum quam Ligni. Postea dicitur, fructum ferre *Piperellam* dictum. Sed diuersi auctores hoc tradunt. An forte in Arabia tantum infugifera: in India frugifera? Nam aperte dicit, in Arabia nihil ferre præter Lignum. Quæ certiora sciunt, nos doceant, Aui. tribus distinctis locis de eo agit. 1. sub titulo *Agalugin*, id est, *Agallocho*. lib. 2. Tract. 2. cap. 14. Secundò sub nomine *Xyloaloe*, id est, [ vt verum interp. ] *Agallochi* ibid. c. 744. Tertiò in Tract. 2. de Med. Cord. sub titulo Ligni aloës, non sine suspitione eum de ignotis tradidisse, & res distinctas credidisse, cuius etiam ipsum accusant *Mosachi* in *Mes.* Hinc non minori oscitantia *Christoph. de Honektis* in *Confect. Diamoschi* dulcis ait: Aui. non tractasse, in 2. Can. de Ligno aloës, cum duo capita fecerit nominibus prædictis: & tertium demum de Ligno aloës loco citato, quem posteriorem locum nullum Recentiorum, quod equidem sciamus, animaduertit ex eo patere arbitrari, quod priora duo citent, intacto tertio. Ergo in primo loco Aui. pleraque repetit quæ *Diosc.* de *Agallocho* tradidit, nisi quod dicat habere cutem asperam, & cutem diuersis maculis & signis coloratam: quas maculas *Diosc.* substantia ligni tribuit, & molli cortice vestiri ait. In secundo loco *Xyloaloe* speciem meliorem esse dicit *Almundilium*, asportari ex Indis medullio secundum quosdam. Sed melius eo esse, quod vocatur *Indum*, & in montibus nascitur, quoniam non generet pediculos, & odore sit penetrantiori. Esse tamen qui non discernant inter vtrumque. Probari etiam *Alsemenduri*, quod nascitur in regione Indis, dicta *Sesale*. Tum dictum *Alchameri*, ibidem nascens: & aloë *Alfanchi*. Sequitur aloë *Alchacheli* & *Alberi*: & aloë de regione *Cathæ*, & *Xyloaloe* *Syni* dictum *Calamuri*, quod est humidum dulce. Vihora istis sunt *Algelali*, *Almebethai*, *Alluati*, *Aluithani*. Sed *Almundilium* totum esse bonum. *Alsemenduri* melius esse varium, ponderosum, durum, multa humiditate refertum, densum & crassum, carens albedine, diuque manens in igne. Quosdam nigrum vario præferre. *Alcumari* probati nigrum, nulla albedine confertum, graue, ignem diu tovens, grossum, præ multa humiditate splendens. In genere autem optimum esse illud, quod magis in aqua sedit. Quod verò innatat, priuatum esse vitæ & spiritu [ euandum & inueteratum ] & esse vitiosum. De sepultura eadem dicit quæ *Sethus* & *Serapio*. Sed *Oedipo* aliquo opus esset, aut *Delio* natatore, ad interpretandas tam barbaras & malè comptas voces. Cur hic non se exercent, qui tantopere vniuersam Arabiam perulustrasse gloriantur. Non minor sanè laus Veterum scripta obscura illustrasse, & suis obseruationibus

*Xyloaloe*  
differeñtia  
ex delectibus  
Aui.  
*Almundilium*  
lum.  
*Indum*.

*Alsemenduri*  
*Alchameri*  
*Aloe Al-*  
*fanchi*  
*Aloe*  
*Alchacheli*  
*Alberi*  
*De Cathæ*  
*Calamuri*.

nibus nitè accommodasse, quam noua proposuisse. Immo prædictis longè inferiores putamus, qui noua tradentes, Veterum obseruata non intelligunt, & negligunt tamen.

*Agallochum*, inquit *Ruell. nostro* Orbis tantum nomine cognitum. Aetius & *Græcus* primus, quantum equidem inuenimus, *Xyloaloe* appellauit. Offic. *Lignum aloës & Paradisi* vocant. *Mangones* Offic. perlepe pro *Agallocho* *Alpalathum* substitunt, manifesto errore. Quid verò *Ruell.* intelligat per *Alpalathum*, vide antè sub *Ligno Rhodio*.

*Agallochum* prius dicebatur, vt patet ex *Dioscor.* *Michael de Capella* in *Synon.* apud *Haly Abb.* *Agalafini*, id est, *Lignum aloës*. *Steph.* in *Sinon.* *Agalofia* est *Xyloaloe* ab India veniens.

Ceterum *Agallochum* *Thyino* ligno simile esse, aut vt *Paulus* dixit *Thyia*, facile cognoscemus, inquit *Cornar.* si *Thyiam* arborem vel lignum haberemus, aut amplius nosceremus, quam quod à *Theoph.* lib. 5. cap. 5. traditur, & à *Plin.* etiam *Trogete* vocari dicitur: & ab *Homer.* inter ea quæ *Circe* odoris gratia incendit ac vrit, commemoratur. Cuius radice nihil crispus, nec aliunde pretiosiora opera esse dixit. Ex quo colligi posse putat *Corn.* quid sit quod *Dioscorides* *Thyios*, id est, punctis notatum dixit. Quidam tamen (addit idem) *Lignum Rhodium*, quod à quibusdam *Alpalathum* asseri diximus, *Lignum aloës* vocant, & *Agallochum* *Lignum S. Crucis*, vt sit distinctio, quam *Mangonum* imposturæ lignum *Rhodium*, *Ligno aloës* *Agallocho* dicto, admixtum comperiat. Sed interim *Corn.* non immeritò negligentia accusabimus, dum hæc non malè quidem annotat, discernen tamen inter vtrumque Lignum non ostendit.

*Fuch.* apud *Dioscorides*, id est, constructum & solidum, pro *Thyios* [ maculatum ] omnino legendum censet, ne more quorundam, *Alpalathum* *Diosc.* *Lignum aloës* verum non esse putemus, nisi quod sit maculatum seu punctis interstinctum. Satis enim esse si ceteras *Dioscor.* notas habeat. *Nicolaus* *Lignum aloës* crudum vocari monet, quod non est sub tetra conditum, sed quod statim ab arbore excisum in vsum venit.

*Lonicerus* *Lignum Paradisi*, & *Germ.* *Paradis* *holz* dici ait, quia fabulosè quidam scripserunt solum in *Paradiso* crescere, & per flumina inde *Orientalibus* provenire, quod & ante ipsum *Mosachi* in *Mes.* annotarunt & *Ch.* *Melili* forte quis ab odore ita dictum putet vulgò *infusitoribus*, quod suauiter oleat, qualia omnia in *Paradiso* nata creduntur.

*Pandec.* *Agalgium* & *Agalam*, *Lignum aloës* vertit. At *Toxites* in suo *Onomast.* vocum centonem conuehit, nescimus an à se intelledarum. *Agalofia*, *Agagel*, *Agalam*, *Agalim*, *Lignum amarum*, *Lignum aloës*, *Lignum Arabicum*, *Babylonicum*, *Lignum Anichi*, *Lignum fluminis Nili*, *Lignum Indum*, *Lignum optimum*, *Lignum Paradisi*, *Lignum Thymi*: & plura si vellet. *Germ.* *Lignum aloës* etiam *Aloës holz* & *Freugholz* vocant. *Gal.* *Lignum aloës*. *Ital.* *Legno aloe*. *Hisp.* *Portug.* *Limaloe* *Oriental.* *Portug.* *Padaloya*. *Græci* *Agallochum* *Arab.* *Agalogen* & *Hand* dicit scribit, *Guzarate* & *Decan* incolis *Vd*, quod vocabulum ex *Arabico* desumptum videtur: in *Malaca* *Garro*: *Isle* *Christi* num autem *Calambac*. A *Garro* autem *Tari* nomen desumptum esse quidam putant. Et annotat *Dalech.* *Tarum* hodie *Lusitanis* *Aquila* *braua*, id est, *Agallochum* *lyla*. *Lignum odoratum* dici, *Agallocho* verò non nihil simile. *Catal.* *Francos.*

Agal-



Agallochum, Lignum Aloes, Xylaloe, Xylum Aloes, Calambucum, Lignum Taprobanum, Tatum Plin. Lignum Daradisi, omnia pro vno & eodem ponuntur. 2. Lignum Aloes sili. Lignum Comoninum vocat: wild Aloes holz. Lignum Aloes vulgare, de quo mox trademus, *genium Daradis holz*. Reform. Wormudeni.

Agallochum commandacatum, itemque decocto collutum, halitum oris commendat: ac toti quoque corpori siccum tuiusque odoris gratia inspergitur. Ad suffimenta denique thuris instar adhibetur. Radix verò drach. i. pondere posita, stomachi superfluos humores, imbecillitatem, ardoremque mitigat. Iis quoque quos lateris & ictericis dolor exerceat, ac Dysentericis aut torminosis ex aqua bibita optuiatur. Diole.

Autore Scchio: Cuncta Xylaloes species calidae sunt & sicca, & ventrem lificant, & stomacho bonae, praefertimque Humida, & post Indica. Cetera verò minus. Corroborant autem partes interiores, & quae leuiores sunt obstructions soluit, humidi ac: que ventriculi absumunt. Cetera verò species, si crebro suffiantur, propter dulcedinem pediculos gignunt. Sed Indica sola prohibet horum generationem, ob suam acridinem. Arabi apud Serap. quoque calidum est & siccum, & thipicum, ideoque viscera corroborat & reficit gratia sua aromatica, corporisque superfluum humiditatem absorbet. Rh. sis idem ferè ait. Haec eben amram, calidum & siccum in secundo ordine facit, & bonum ait esse cerebro, à quo pituitam detrahat, discutere flatus, referare obstructions, prohibere vinæ stillicium inuoluntarium, cautatum à frigore & debilitate vesicae. Aut. cap. de Agallocho eisdem vires tradit cum Dioscor. At cap. de Xylaloe addit: Calidum & siccum est, in secundo gradu, vt puto. Subtilium est partium, aperit, & confortat omnia membra, & neruos quoque. Cerebro in primis confert, & corroborat sensus. Cordi etiam robor addit, ipsi quoque exhilarat. Lignum Aloes eidem simile est vinbus Ambræ, sed ea inferius. Recentiores quidam eius vsum praedicant etiam ad diapalmata, de qua re non contemnenda habes apud Marcellum Virgilium commentari, in Dioscor.

#### LIGNVM ALOES OFFIC. ET AGALLOCHUM plerisque putatum.

**L**ignum peregrinum, quod *Xylaloes* vel *Lignum Aloes* vocant officina, pectinibus plerumque densis & rectis est contextum, quodque transuersim sectum Quernei ligni pectines emulatur, partim albicans, durum, graue, pingue, sapore amaricante cum quadam acrimonia aromatica, prunis iniectum bullas agit totumque sensum colliquecit, suauissimum spirans odorem, tandem verò si sufflando pergas, flammescit. Tale habetur in officina industrii viri Theob. Noblot. Ill. E. C. Wirt. pharmacop. Montbelgardi.

Agallochum crassissimum & vsum probatissimum hodie magnacopia Venetiis habent Institores, vt referunt Pen. & Lob. gustu astringenti, praesicco, non multum amaro, suffitu suauissimum reddit odorem, & succum aut liquorem pinguem, odore, qualem in Hebeno vel Guaiaco videas, cui concolor, & fortè congener. Eidem Lob. in



Obi. Agallochus praetantissimus verior siue Xylaloes.

Itius autem <sup>Alia species</sup> Xylaloes quae Officinis nouissima, altera species Anticripia aduecta, prius nobis visa, & munere data ab optimo pharmacopoeo Antuerpiano Frac. Pennino, in cuius instructione officina prostat. Fructulum quod habemus & trisco vultum, penderolum est, multis venis constans, probatissima Xylaloes officinarum ferè concoloribus, tuis, odore & sapore non dissimilibus, sed suauioribus, amaris, & pinguioribus multò, quae manducatae lentescunt cera modo, reliqua ligni materia & superficies alba est, fragilis & fractu facilis, minus aromatica: istud sanè lignum aloes omnium quae vnquam vidit, sapore & odore vengeuissimum esse testatur idem Lob. ex quo sumpta est icon inferna parte posita. Superior desumpta ex Taber.

Porrò scribit Lud. Roman suis nauig. Ind. Or. ( & ex eo Cronemb. qui eius historiam corrumpit, tanquam ipse vidisset) triplex genus eius arboris haberi: Primum quod ibi *Calampat* vocatur, optimum, vendi in vrbe Sarnau, apud quos nascitur, aureis decem in libras, sed hoc distribui inter reges illarum prouinciarum nec ferri ad nos: eius fragmentum duarum vnciarum matibus contrectatum, inenarrabilem odoris suauitatem super omnia suffimenta spirare: Duo alia genera in insula Taprobana haberi: quorum vnum flumine quodam importatur, quod *Lubam* vocant: Alterum, *Bochor*, cuius ortus illis manifestus est: quae duo genera ad nos conuehantur.

Ipsa arbor, teste Garcia Olez instar est, interdum maior: Vidit enim ramum eius cum foliis. Fructum aut florem videre non contigit, ob difficilem & periculosa huius arboris diuturnam obseruationem, frequenter in illis locis ubi crescit, grassantibus Tigris. Ferunt autem recens dissectum *Agallochum* nullam odoris fragrantiam gratum esse, nec nisi siccatum, odoratum esse: imò eum odorem per vniuersam ligni materiem non diffundi, sed in ipso arboris corde sine matrice coaceruari. Crassum enim esse corticem, & ligni materiem odoris expertem. Haud negauerim tamen, (inquit Garcias) quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis humor matri se infuset, illamque odoratiorem reddat: sed vt odor Agallocho concilietur, minimè putredine opus est. Multi enim sunt adeò experti & dextri in Agallocho dignoscendo, vt etiam de recens dissecto iudicare possint, siue odoratum fatuorum, an nulla odoris iucunditate spiraturum. Etenim in omni lignorum genere aliud alio praestantius est. Solent autem Malacæ incolæ Agallochum

2-5  
r. purgare autē quam negotiatoribus vendant.  
Delebus. Præfertur verò multum nigricans, cinereis di-  
citur et dicitur vena, ponderosam, plurimo humo-  
re pingui prægnans. Probatio est, si igne accen-  
sus, multum humoris exudet, non si in aquam  
coniectum, subsidet. Nam selectissimum quan-  
doque innatat, nec subsidit. Gozarate & Decan  
mele, præter prædictas notas requirunt, vt  
neque in chag ad ea, effundent enim fieri, quò  
maiora sint, eo plus facultatis in se continere.

Substantia  
præparata.  
Aguila  
brama.  
Lignum a-  
loes pro.  
Eiusmodi quale hic commendatur, annotat  
Clusi ex India Vlyssiponem adferri, sed magno  
æstimari. Fieri interdum ex eo sphaerulas præca-  
tias, odoris iucunditate & pretii magnitudine  
commendabiles. Frequentiores tamen esse eas,  
quæ ex Xylaloe, vt vocant syluestri nam tale in  
Comorin & Zeilan provenire, quod *Aguilabrana*,  
id est, Lignum aloës sylvestre, vocant, testatur  
Garcias. ] torno concinnantur: quod mirum in  
modum Agallochum emulatur: in odorem tamen  
est.

Calamba.  
Lignum Pa-  
lo d' Aguila.  
Locus.  
Lignum aloës, quod in India *Calamba*, siue  
*Palo d' Aguila* vocatur, auctore Linschot. maximè  
in Malacca, insula Samatra, Cambaia & Siana,  
vicinisque locis Orientis inuenitur. Arbores Oli-  
uarum forma sunt, licet maiores, detruncata  
non ita bene olent, propter viriditatem immat-  
uram. Siccitate etenim melior odor crescit. Opti-  
mum *Calamba* vocatur, alterum *Palo d' Aguila*. Ab  
his diuersa syluestris prædicta, magno item in  
pretio, quòd Indi Satrapis & Sacerdotibus inde  
rogum defunctis struant, pari honore, quo apud  
nos marmorea sepulchra celebrantur. Verùm  
cum prædicto Aguila ligno siue *calamba* com-  
parari nequaquam potest. Syluestris, & iam di-  
ctis locis, & in tr. Qu Choromandel nascitur. O-  
portet autem notæ *Calamba*, item *Aguila*, circa  
Malaccam.

Scribit quidem Diosc. Agallochum ex India &  
Arabia deportari: sed legitimum lignum aloës,  
inquit Garcias, non nisi ex India deportatur. Ex  
Arabia quidem adferri potuit, prius tamen ex In-  
dia eo deportatum, vt pleræque alia merces. Nam  
in Arabia nasci non putat. Certe non vestiri, vt  
Diosc. de suo Agallocho tradit, sed cortice, vt reli-  
qua ligna. Neque verisimile esse pro Thure ad-  
fumenta substitui: sed potius è contrà pro A-  
gullocho Thus substitui debuisse, vt pote cuius  
semper maior copia fuit. Non solere enim ra-  
riora & inuentu difficilia vulgaribus substitui: sed  
contrà. Nam Thuris selecti centum pondo aureo  
duri taxati in India emi, tamen ex Arabia huc de-  
portetur. Lignum verò aloës, licet in India na-  
tum, tres aureos pendere in singulas libras. In  
omnibus quidem Prouinciis, quas Auicenna tradit,  
Agallochum nasci, non autem verum & legiti-  
mum Lignum aloës. Ac id quod in Promontorio  
Comorin, Venerb. Cori dicto, & Zeila inuenitur,  
lignum quidem odoratum esse, non tamen sylue-  
stre Lignum aloës, vt vocant. Legitimum verò  
in Malacca & Samatra nascitur, vnde à Chinesibus  
secebat. Hallucinari Auicenna cum ab incolis  
elixari, vt omnem odorem eliciant, scribit idem.

Agallochus  
pro Thure  
non substi-  
tus.  
Nos verò hoc loco idem dicere possumus, quod  
Clusi. apud eundem Garciam, nos totam Agallo-  
chi historiam apud Auicenna legisse, sed nusquam vl-  
lus elixationis mentionem ab eo factam inue-  
nissè, saltem in nostro exemplari Basilæ impres-  
so. Quare omninò dicendum Garciam, tam à no-  
stro, quam à Clusi exemplaribus diuersa habuisse.  
Quid verò per illa vocabula quæ Serapio ha-  
bet in historia Agallochi, [suprà à nobis citata,]

Pretium  
Auic. not.  
Sunt autem plures Agallochi differentia, in-  
quit Cordus, ex quibus optimum quod ad suos differ-  
entias referunt Indi & reliqui Australes populi,  
nobis quod non ita bonitate excellit mittentes.  
Idem testatur sæpe vidisse se maculosum crispum-  
que

Agallochus  
Xylaloe.  
Aloe.  
Aloe  
pro  
S. Aloe.  
Plavus  
in-  
gallochi  
differen-  
tias  
que

intelligendum sit, planè ignorare se facit Gar-  
cias, & nom. na admodum depravata esse putat.  
Per *Mandel*, fortè Melindam intelligi: per *Seisi* &  
*Aloumeri*, Zeilan insulam, & Promontorium Ca-  
morin, [in quibus Lignum aloës sylvestre, dictum  
nascitur] à quo tuduano itinere marino Zeilan  
insula distat. Quod idem de ramorum sepultura  
donec marcescat cortex, lignumque purum re-  
maneat: Item de collabentibus ex Agallochi ar-  
boribus ramis, à fluminibus inundationibus rap-  
tis, perque circumstantes Regiones deserti soli-  
tis tradit, in nonnullis testatur cum veritati con-  
sona referre, sed in quibusdam veritatem affec-  
tum non esse. Quod verò fructum proferre ro-  
tundum Piperis modo, & rubentem scribit, an  
verum sit, idem se ignorare confitetur, cum vi-  
dere sibi non contigerit, nec quonquam inueni-  
re, qui aliquando videtur. Nec eius reliqui Ara-  
bes, Rhales. Aueniis, & Isaac, vquam memine-  
runt, tamen Agallochi facultates descripserunt.

Quatuor quæ recentet Agallochi genera Ruel-  
lius vidisse negat Garcias, sed vnicum genus In-  
dicum nouisse. Fieri posse, vt reliqua genera le-  
gitimum Agallochum non sint, sed lignum ali-  
quod odoratum. Eundem tamen per omnia ver-  
itatem affecutus non sit, in plerisque tamen ha-  
lucinatum non esse. Scribunt Musa & Cronem-  
burg. inueniri harum arborum sylvas, quod ei-  
dem Garciam minime probatur: raras enim dici  
esse has arbores.

Scribit Paludan. in Annot. ad Nauig. Linschot.  
Agallochi, seu Ligni aloës multas species se habere,  
amænas omnes odore, variatas & maculosas,  
pinguedine plenas, densas adhæc & crassas. An  
verò sint ex distinctis specie Ligni aloës arbori-  
bus non docet: saltem multas species se habere  
ait: quoniam sære decussit omnes graphicè depin-  
gere, & docere in quo discrepent, in tanta huius  
rei caligine non paruum lucem allaturum.

Selectissima quoque Agallochi fragmenta in  
seu in suo adferre iacet Clusi. Sed sibi  
tamen habet, cum describere non fuerit dignatus,  
alioqui præter morem eius diligentia.

Sed quid reliquum Herbariorum vulgus, quod  
item Medici quidam de Ligno aloës Officinarum  
ut adant videamus.

Inter quos primus occurrit Cordus, cui Agal-  
lochum odoratum est lignum, quod Recentiori-  
bus Græcis Xylaloe, hoc est Lignum aloës, appel-  
latur, quo nomine vulgò in Pharmacopoliis pos-  
tenditur.

Quidam è Recentioribus id etiam simpliciter  
*Aloe*, & *Aloa* nominant, quorum in numero est  
Lud. Vartomannus, qui Orientales & Australes  
regiones descripsit. Videntur tamen etiam Ve-  
terum nonnulli similiter per aloën Agallochum  
intellexisse. Nam Diapsima illud, quo lectulum  
suum odoris gratia conspererat muliercula, de  
qua in Prouerb. Salom. legitur. Myrrham, Aloën  
& Cinamomum recipit: quo loco minime intel-  
ligendus densatus ille amarissimus & grauiter o-  
lens succus, *Aloe* vocatus, qui nullis odoratis pul-  
ueribus, aut Diapsamatis miscetur vnquam, nec  
reputatur inter aromata & odoramenta. Itaque  
hoc Prouerb. loco per Aloën, Xylaloe, hoc est,  
Agallochum intelligimus, ceu plerisque etiam a-  
liis locis.

Sunt autem plures Agallochi differentia, in-  
quit Cordus, ex quibus optimum quod ad suos differ-  
entias referunt Indi & reliqui Australes populi,  
nobis quod non ita bonitate excellit mittentes.  
Idem testatur sæpe vidisse se maculosum crispum-  
que



que, quale à Dioscor. describitur. Idem autem Agallocho euenire putat quod Thyia. Quemadmodum enim non quævis eius materia aut pars eripitur, ita etiam non quoduis Agallochum crispum appareat. Quod verò radici proximum, aut radicis pars fuerit, fluctuantibus venis in crispum habitum vibratur.

Porro quod ad nos defertur non usque adeo ponderosum est, ut aquæ iniectione lapidis modo subsidat. Hæc enim nota non est præcipua, neque omnibus Agallocho speciebus propria: alioqui Rhodium lignum, de quo supra, quod pro Xylaloe venditur, optimum esset Agallochum. Considerandæ potiùs hæ notæ: videlicet, ut sit odoratissimum, etiam per se. ut est integrum: gustu valde aromaticum, modicè amarefcent, leuiter astringens, pingue & resinofum, cuius suffitus gratissimum latè spargit odorem: & ut gustatum ac palatum commendet.

Apud eundem Cordum in historiis scribitur. Agallochum, id est, Xylaloe folia & poneseros. Quidam hoc lignum Rhodium siue Rhodum appellant, & Alpalathum affirmant, ut R. 1. lib. 1. d. errat, ut suo loco declaratum. Tarum, sit est, Xylaloe filialis, leuis & aromatica, quamuis Agallochi species sit, & ab Aetio Xylaloe appellatur, diuersum tamen penitus à prædicto Agallocho [videl. ligno Rhodio] existit. Crassiore quidem multo est trunco, &c. Adfertur & aliud ex India Tarum, prædicto simillimum, &c. Nos Cordi Tarum exilimamus idem cum Ligno Aloes à nobis descripto.

Syluius iudicat id, quod ostendunt Officina esse verius Aspalathum. Xylaloe dictum putat quod sit lignum Aloes arboris, non herbaræ, cuius tamen succum nigredine & amaritudine pauca, & succo inter gummoso nonnihil repræsentet. At profectò nobis tanta inter hæc similitudo est, non videtur, quæ homonymiam imponere debuerit, uti patebit *Aloes succum*, cum *Aloes lignum* diligenter conferenti.

Sauonarola in quinto suæ practicæ, Græcæ linguæ ignorantia deceptus, Lignum Aloes & Xylaloe facit diuersa.

Lignum Aloes quod Agallochum vocant, Hebræis in vsum fuisse constat ait Levin. Lemnius. Idem Lignum [ait] licet leue sit, nec vilius ponderis, subidere tamen, atque aquæ immersum in profundum labi, quod compactum sit, nec illi quicquam inane sit. At quomodo id quod compactum est, non sit quoque solidum, ac proinde ponderosum, non videmus. Fortè Lemnius non in multis periculum fecit: nam quædam etiam non fidere animaduersum, quæ sanè leuiora rarioraque esse ratio suadet ipsa, vis quæ fidunt. Nec pondus bonitatis notam esse perpetuam in eo, iam dictum est.

Brassauolus Lignum Aloes hoc ipsum esse ait quod Dioscor. & Paul. Agallochum vocant. Sed certum se esse ait id quod ad nos defertur, ex probatissimo genere non esse. Venetos vnum genus nouisse, quod Alexandria Aegypti habeant, illuc ex Arabia delatum. Quod enim ex India adfertur, ad Venetos non ferri. Ex Sumatra Lusitanos tres species agnoscere, quas etiam tractent. Suspiciatur eas esse de quibus Serapio.

Ferunt, inquit Cardan. Lignum Aloes vocatum nostro [Ligno Rhodio siue Oleastro] quod ad nos defertur longè fragrantius. Sunt enim illa tria genera: optimum quod Colampar dicitur, adeo fragrans ut in manu detentum omnem alium odorem obscuret: huius rei causâ ad nos conuehiunt.

Nascitur enim in Taprobana insula, quæ nostræ ætate Sumatra, tum ab incolis, tum à Lusitanis dicitur, ubi præter opes egregias luxur etiam prohibet, ne thymiamata pretiosiora ad nos deferantur. Hoc illud esse existimo, quod accensum, in lacrymant totum vertitur, hæc lignum sit. Idem quæ nobis spectantibus ostendit Gulielmus Casanatus Besuntinus medicus. Secundum, quod in aqua mergitur, ut Buxus, lignum Sanctum, licet leue, cum robur innatet, ænis enim expertus est. Meminit huius experimenti D. Erasmus, & nos periculum fecimus illius. Huius quàm primi maior copia est, minor tamen quàm vilissimi. Hoc est, quod neque soluitur in lacrymam ab igne, nec in aquam descendit: sed tamen, dum flagrat, flagrat mirum in modum. Quapropter quum inter odorata odore præstet, medica ratione inter aromata merito mirantur. Iam loco Agallochi diu vendiderunt Oleastrum. Hæc Card. Quem mo-

re suo castigatus Scaliger, sic inquit: Lignum Aloes, quod scribis esse densum, videtur ipsum non habuisse. An tu putabas, lignum hoc, quod impostores veritate circumf-runt, ac Lignum Aloes vocant, è quo precarios mulerculis detorant globulos, esse Agallochum, nequaquam est. Sed aut Cotini radix, aut alia omnino planta. At Agallochum nostrum, quod habemus, leue est, odoratumque adeo, ut sola tractatione, sine vilo subiecto igni, spiret admodum validè, sed iucundè. Et ut nobis Erasmus facis auctorem: quem

totius ignatum fuisse Naturæ, cum alibi, tum eo lemonitraminus commentatio, quem de eius fecimus Chiliadibus. Is in iisdem libris ait: se apud quendam Germanum vidisse lignum quoddam, ex quo fit Aloe. Quibus ex vnguib. Leonem stum metiri tuum facile queas. Rudus fundum quare petat doces. Quia inane, inquis, nihil continet, in quo claudatur aer. O ingentem confidentiam! Si non est inane, quod aerem capiat, quonam modo leue sit? Non aërescenti terræ hæc de causâ, suprà leuitatem adiungebas? Si terra grauis ex se est: leuis, quia mutatur in aerem: rãrescat necesse est. In eâ raritate, diffusis terræ partibus, si terra non est, aliquid aliud inerit necessarium. Non ignis: non aqua: non enim propterea fiet leuior, sed adderetur grauitas grauitati. Ergo aut inerit aer, aut dabitur vacuum, aut leuitas in tuo iudicio fuerit: in ligno Aloes propterea non erit. Sanè si aer non includitur, quæ quæ natura deprimet ipsum in aquis. Non enim descendet propter aquam: minus propter aerem, si intus ibi nullus. Non igitur submergetur nisi propter terram. Non esse igitur leue, quod deorsum sub aquas fertur, arguari potest. Et alibi: De Agallocho, inquit, quod aiebas, te citis in aqua pondus agnoscere ex Erasmo, fecellit nos. Sperabamus enim ex principe Aboali testimonium sumpturum. Hoc enim prodit ille. Quod Agallochum præstantissimum habetur, non necesse est ad suffitus adoleri flammis. Sola præsentia cubile, quantum quantum sit, odore complet. Hæcenus Scal.

Sed impunè non ferat, quod Erasmi tanti viri gloriæ insensum obtrudatorem se præbere voluerit, cum aliis, tum hoc loco, supra modestiam, quod sanè eius pace dici volumus: addimus etiam fortè infra veritatem. Quid? Erasmi idem totius ignatum fuisse Naturæ tam securè pronunciariphi sit integrum, quod & aquæ immergi Lignum Aloes expertus sit: & alibi scribat se apud quendam Germanum vidisse lignum quoddam, ex quo fiat Aloe. Quid si dicamus utrumque verum esse? & non temerè hoc ostensum, illud pronunciamus.

tum? Prius namque & alii ante Erasum & post Scalgerum expectant, ut abunde declaratum in hac Historia. Non enim necessarium Lignia loës bonitas notam esse, grauitatem seu pondus, iam declaratum. Sed quando Germanus ostendit Erasmo Lignum ex quo fit aloë [modò recens & genuinum fuerit Lignum aloës] dicimus eum nec ineptè illud dixisse, nec temerè credidisse Erasum, quod nesciebat Scaliger. Aloë quid sit in Spagina iam declaratum. Excisos arboris ramos terra obrui, ut putredinis interuentu corrumpatur id, quod in odorem, nempe cortex & exterior ligni pars, ex Sethio & Serapione a iudicauimus. Nec refragatur diligentissimus Indicarum Proinciarius Historiographus, Garcias, qui huius Ligni Historiam omnino optimè tradidisse videtur, nec alii qui de ea prodidèrunt. Si igitur crudum adhuc frustum, & cortice suo obtectum ostendit Germanus, ostendit id ex quo non quidem fit de nouo, attamen prædicto modo paratur Lignum aloës. vel aloë Priscis dicta: non aloë succus, quem si intellexisset Scaliger, deceptus fuit, quem non ex ligno elici, sed ex herba, ipsemet scire potuit. Crudum siñe Agallochum vbi que Mesues requirit, quod vel recens intelligi potest, ab extimo tamen cortice mundatum, vel non coctum. Coqui enim à quibusdam excipiendo odoris gratia post Auicennam annotauit Syllenus.

Per eundem  
agallochum  
quid intel-  
legendum.

Nicol. quoque Agallochi crudi sæpè mentionem facit: per quod Fuchsius intelligit id, quod non putruit: quamuis Matth. cum Syluio intelligendum censet id quod non fuerit elixum, quòd inde fortassis odoratissima lauacra ex Agallochi decocto sibi conficiant Indi, aliæque odoramenta in tegiles præparent vsus, ut etiam cum Rhabarbaro fieri narrant. Vel fortè per crudum illud intelligi putat idem, quod impetu fluminum longoque eorum ductu, [ut suprà dictum ex Serap. & latius dicitur mox,] per regiones non deferretur. In his namque calidioribus regionibus aqua à Solis æstu non obscurè calefacta non modò illud omni ex parte diluunt, sed etiam elixant. Illud præterea addiderim, quòd cum non modò crudum, sed & bonum addiderit Nicolaus, nullum aliud expectare videtur, quàm quod recens ab ipsa arbore excisum, & ab omni inodoro, ac superfluo purgatum sit, nec vlla vel putredinis vel elixationis macerationisue qualitate immutatum. Non reiciimus tamen Fuchsi sententiam, præsertim cum eidem & Cronemb. subscribat, &

Matth. not.

Apollo, qui nouè laudis studio Matthiolum Fuchsi sententiam refellere scribit quòd per crudum aloës Lignum intelligat, quod non putruit, sed statim ab arbore excisum, ad vsus capitur, sed à cortice & extrema parte mundatum, quale ostendisse potuit Germanus Erasmus. Quod si etiam Erasmus credidisset Aloë succum, parati ex eo ligno, non idèò totius naturæ fuisset ignarus, quem virum omnis literaturæ capacissimum celebrat posteritas. Ergo Scaliger postquam exercendo atque disceptando subtilitatibus suis summum fastigium imposuisset, rerum ipsarum fastigium nactus, subtilitatibus ipsis quoque modum statuisset, si statuisset reprehensionibus. Ut Erasmus, qui doctissimorum iudicio literarum scientià summus videbatur, nunc sese in suo genere Scaligero inferiorem non agnoscat: tantò minus ab eodem suppressus videatur.

Agallochum  
Agalugen.

Sed lubuit aliquantisper digredi, redeamus in viam. Monachi in Mes. Lignum aloës nihil aliud censent, quàm Agallochum Auic. Agalugen vel A-

galugin: in eadem opinione videntur esse Amacus, Lacuna, Borgaric. Apollo, Marantha, Calsalp. & alii plures. Anguill. tamen, multi existimant, inquit, Agallochum esse Lignum aloës: verum nunc id non asseuerabo, quandoquidem nescio an Thuiæ lignum sit Sabinæ. Clusius quoque annotat, pleioſque Doct. virorum virorum existimare, Lignum aloës, esse Agallochum Diosc. nec repugnat Garcias, qui sua Arabum scriptis accommodat. Matth. non diu esse tradit, quod legitimum Agallochum importari cæpit: nam licet antea quibusdam non deesset Agallochum verum, nihilominus, quòd rarissimum esset, Officinas fere omnes eius loco Oleastrum Rhodium suppeditasse, quem falsò putant Ruell. Aspalathum esse. Verum Agallochum illud, quod tantopere præstet se vidisse negat Matth.

Sunt, inquit Matthiolum qui somniantes dixerint, Agallochi arborem vidisse neminem, càm terretur tantam paradiso proueniat, illudque ferri fabulantur fluminibus, quæ [ut sacra testantur monumenta] ex eo manant. Atqui pro comperito habetur, & paucis innuit Serapio, Gangem Indicæ amplissimum fluium quamplurima secum Agallochi fragmina vehere, quæ tamen in ipsum decuntur aliorum fluminum cursu, qui in eum conflunt. Quippe cùm fluiui transuant loca, vbi Agallochum prouenit, aquarum inundationibus turgentes, huius truncos, fragmina, acramenta rapiunt vñ cum aliis variis generis lignis, & in Gangem transferunt, quemadmodum in nostris etiam fluminibus sæpè ac sæpius visitur. Cuius rei indicium affert illud, quod Venetiis venditur, vtpote quod longo aquarum discursu omni ex parte laceratum, exesum, comminutumque spectetur. Quamobrem mirum non est, addit idem Matth. si dum manibus tractatur, id odoris non præstet, quo illud fragrare prædicant ex natali solo in Lusitaniam aduectum. Sic ab ea opinione minimè est alienus Matthiol. ad cuius tamen marginem fabulosa dicitur.

Officinæ, ex obseruatione Clusii demonstrant duo genera Ligni aloës, præter lignum Rhodium, siue Oleastrum, qui Rhodo adfertur, quo vñ sunt loco Ligni aloës. 1. Vni diuersi colores, ex venis fibrilæ albis, aut ex luteo pallidis: aliis ex nigro rufescentibus, simul mixtis, magis in ramis, quàm truncis. Hoc genus quidam Docti Thuiæ lignum existimant, alii Aspalathum Diosc. 2. Lignum aloës aliud ex nigro rufescent, resinofum, quod vsu in gratum ex se reddit odorem, ponderosum, & aquæ fundum petens. Hoc quidam putant speciem Ebeni Diosc. Lignum aloës adfertur ex Calecut & Alexandria in Europam. Verum consideratis Clusii verbis suspicio incidit, quosdam confudisse lignum Rhodium, quem Oleastrum perhibent, cum Ligno aloë hic à Clusio descripto.

Ryffius quoque Agallochum siue lignum Rhodium militibus frequens dicens in corollis præcatis, vel alterutra voce abutitur, vel utrumque confundit. Nec minùs in eo hallucinatur, quòd veritas Aspalathum acre dicit & austerum existimat.

Castor Durantes pro Agallocho siue Ligno aloës ponit iconem, quam postea iterum reponit pro ligno odorato.

Cæterum eadem nomina, quæ suprà Agallocho tributa fuere Authorum plerique etiam Ligno aloës Officinarum tribuunt, cùm maior pars vñm & idem esse putet, quod nec nos negamus, sed in re nondum planè certa & cognita



gnitæ iudicium tantisper suspendimus, donec certiora discamus.

Easdem vires plerique Recentiorum tribuunt Ligno Aloes offic. dicto, quas suo Agallocho tribuunt Veteres, quas antea proposuimus.

*Agallochi & Ligni Aloes substituta, adulteria & equivocati, nei.*

**T**extor in lib. suo de Peste Agallocho deficiente substituit Santalum luteum vel rubrum. Lobait, Officinas quasdam autumare Agallochum esse Santalum citrinum, quod & Rondel. in pil. Alephang. supponit. De ligno Rhodio & Aspalatho vel Agallocho vſurpato, dictum ſupra.

Adulteratur Agallochum, vt Platearius tradit, ligno quodam in montibus Almafæ nato, quod pondere, nodoſo habitu, & quadam aromatica vi Agallochi notas vtrunq; refert, ſed neque nomen ligni, neque vbi ſit ſint Almafæ montes indicat. Matth. Syluat. Pandectarum autor idem paulò aliis verbis refert, & lignum quod pro Agallocho vendi conqueritur, Chamelæa radices eſſe ſcribit. Videndum igitur, quidnam per Chamelæam eo loco intelligendum ſit. Significat autem Chamelæa propriè [vt ille vult] eam plantam, quàm L. vine Oleagineam & Oleaſtellum, Arabes verò Mezereon vocant, Thymelæa, hoc eſt, granum Gnidium ferentis fructus figurâ & viribus ſimilem. Eius radices Matth. Syluaticus, pro Agallocho vendi credit. Cordus per Chamelæam meliùs, noſtro iudicio eo loco puiat intelligendum Oleaſtrum, vti dictum quoque cap. de Ligno Rhodio. Abſonum enim, inquit Garcias, quod Pideſtarius ſcripſit, & à veritate omnino alienum, Chamelæa adulterari Agallochum, cum totâ eâ regione, vbi Agallochum provenit Chamelæa non naſcatur.

Sophiſticatur, inquit Monachi in Meſ. Lignum Aloes multis modis: vt cum lignis ſimilibus, & præcipuè cum lignis ſylueſtris Oliuæ, & Chamelæa atque Thymelæa. Et quandoque bulliunt ipſum lignum bonum, & accepta decoctione deſiccant illud atque vendunt: rariſſimè ab aromatariis purum emittit.

Syluius quoque teſtatur eſſe qui ligni Aloes loco Oliuæ arboris matricem ſubſtituunt.

In Pharmacopoliis quibuſdam Verſeleſibus, [inquit Apollo] non Oleaſtri Rhodii fruſta, olim pro Agallocho vſurpata, vt pote demerſa aquis non emergentia, quadantenus amarulenta, nec odoris inuicundi, ſed, quod iniquius eſt, veterum lignorum ſegmenta, Nardino odore imbuta, in medicamenta inſeruntur, Venetiis tamen expetita abſque delectu pecunias potiùs curant, & illegitima ſinceris præponere malunt.

Caſtor Dur. Agallochus adulteratur ligno Oleæ in aqua odorifera & cum oleo odorato, vel cum Aspalatho vincto.

Diligenter notandum, quod ſcribit Honor. Bellus, nonnullos vocare Agallochum plantam Creticam eandem cum Maranthæ Cytho: de qua lib. ii.

Non veriſimile eſſe arbitratuſ Garcias pro Thure ad ſuffimenta ſubſtitui Agallochum, vt latius dictum ante.

In ſuccedaneis Gal. attributis Agallocho centauryum ſubſtituitur. Centauryum ſcribitur in textu Græco, & non Calamus aromaticus, vt in Lat. codicibus, vt annotat Borgarucus, magiſque

probat textum Græcum. Cui nos non adſtipulamur. Nam calamus magis probamus quid enim cum Agallocho Centauryum? in quo tanta amaritudo. nec aromatica illa & cardiaca qualitas, ac ne odor quidem ipſe, quæ in Agallocho requiruntur, & in Calamo aromatico non obſcurè ſunt.

## TAVZARGHENT RADIX ODORATA.

C A P. XXX.

**Q**uoniam Scal. exerc. 142. Agallocho ſubiungit radicem *Tauzarghent*, & odoris gratiâ couertit, eandem & hic referre lubet. Scribit autem eſſe in Occidentali Mauritania eam radicem tanti tamque boni odoris, vt appenſa laquearibus haud magna quantitas ſuppleat vicem magni ſuffimenti. Nec quicquam aliud de ea apud quenquam legimus.

## THYMIAMA SIVE STYRAX RVBRA Offic. & de Nalcaphtho.

**S**tyrax rubra Offic. ſunt corticum fragmenta *Descriptio*  
ſcraftiſcuſcula, fragilia, pulli coloris, aut ex pullo nonnihil ruſſelcentis, exiucca ferè, quæ adinota igni vix tantillùm reſudant, nec flammam ſatis claram edunt, nec pertinacem, odore deſtituta & ſapore, ob vetuſtatem, vt exſtitimamus. Talia erant à multis annis à nobis ſeruata, & olim Londini ex officiis empta. Similia vidimus Argentinae, ſed multò maiora ſegmenta, quorum quædam vncias duas longa, vncium lata, quadam cralla, quadam tenuia, prædictis concoloria, odore quoque ac ſapore maniſeſto deſtituta. Inter quæ fructum leniter cortici adhæreſcentem obſeruauimus, de quo poſtea. Huius corticis lib. j octo batziis vendunt. At Styraſ liquida, res odorata & prædictâ longè preuoſior ante biennium nempe anno 1602. à pharmacopœo Montb. eodem pondere 16. ſolidis regiis: hoc eſt, paulò minori pretio quàm cortex ille in odor, propemodum dixerimus fordidiſ ac penitiſ nihil. Similes cortices, ante aliquot annos, apud induſtrium quendam pharmacopœum, cuius nomen nunc excidit, obſeruauimus, nomine *Thymiamatis*, inter quos quidam craſſiores quàm prædicti. Sed & hi erant euanidi & exoleti. In eodem pharmacopolio, eodem quoque nomine, anno 1597. dati cortices Argentinae empti, qui in tenues multas partes conuſi, & in glebas compacti, admodum erant ſucculenti, ruſſi, hoc eſt prædictis concolorès, niſi eſſent ſaturatiores, odore graui, non ſine ſnauitate tamen, qui odor adhuc pertinaciter durabat anno 1604. licet iam ſiccinereum haud leniter contraxiſſent, & multò ſicciores euaiſſent. Igni admoti ſumum & flammam luculentam dabant. Sapor nullus inſignis, attamen glutinoſus cum quadam acrimonia. Odor ſane videtur aliquatenus referre odorem Balaſami Peruiiani, & vt liberè dicamus, Styraſis liquidæ offic.

Corticem ſupradictum Cordus Nalcaphthi nomine ſic deſcribit: *Nalcaphthum*, quod hodie *Thymiamia*, & *Styrax rubra* in pharmacopoliis vocatur, craſſi corticis fragmenta ſunt, colore in ruſſo nigricantia, quæ ſola per ſe aut cum aliis quibuſdam ad odores vaporantur: habetque acrem,

*Fructus*

*Thymiamia*

*Cortices odorati.*

*Nalcaphthum.  
Styrax rubra.*

res inuicendum in suffitu odorem: gustu nullam  
ferè qualitatem præ se fert, præter siccantem: est  
que huius rei causa, quod nimis inueteratum ad  
nos afferatur.

Narcaph-  
thon.

Narcaphthon, inquit Diosc. quod alii *Narphthon*,  
vocant ex India quoque deferunt. Est verò corti-  
cosum quiddam Mori [*serapii*] libro simile, quod  
iucundi odoris gratia hñficur. Facit suffimentis  
inferitur: vuluam quoque adstrictam suffitu iu-  
tat.

Vius.

Lacaphthi.

Argem. mor.

Paulus quoque Narcaphthon Indicum aroma  
dicit, eiusdem vsus. At in compositione Cyphos  
Solaris *argem. mor.* dodrantem admisceat, & ait esse  
corticem Pini [*pinu. q.*] aut alterius cuiusdam ar-  
boris. Quæ sua hesitantia & inconstantia effe-  
cit, vt incertum sit vtrum visis doctissimis, an i-  
dem Narcaphthon cum Lacaphtho putandum sit.  
Cuius sanè alii Scriptores non meminerunt, vt  
sicut ipsorum, ita & nostro seculo, [si idem non  
sit cum *Styrace rubra*] penitus ignotam videat-  
ur. Apud Photarch. tamen lib. de Ille & Osi-  
de, in compositione eiusdem Cyrhei heliaci, pro  
*plur. argem. mor.* habet *argem. mor.*, corruptè vt videtur, &  
cuius corruptio, censet Confl. Non est tamen vt quis credat Pini  
aut Piceæ, [vt vtriusque videri modo velis expone-  
re vocem *pinu. q.*] corticem Narcaphthon esse.  
Nam ut huiusmodi corticem, si Narcaphthon  
appellaretur Arabes, nō hñficur no lūn vltus  
in Europa Narcaphtho esse. Quoniam verò ex  
alio Orbe ad nos adferri certum est, nihil minus  
quàm Pini aut Piceæ cortex fuerit. Nisi licet Sto-  
rax appellata, Narcaphthon fuerit, potius nos  
remigorate cum Cordo faciemur. Certè non  
constat vnde afferatur, & cuius arboris cortex sit.  
Ex India non afferri, arguit vilitas, quamvis aliis  
quoque indicis constat.

Narcho  
Theophr.

Ceterum quid sit *Narcho* apud Theophr. difficile  
est pronuntiare in tanta breuitate, cum eius se-  
mel tantum me inuenit nominatus. Suspicio  
tamen est posse esse Narcaphthon Dioscor. maxi-  
mè cum Theophr. lib. 9. Hist. cap. 7. inter ea medi-  
camenta recenset, quorum vsum esse ait ad vn-  
guenta, quæ sunt omnia aromatica. Auger con-  
iecturam quòd quidam eo loco ex Diosc. *argem. mor.*  
legendum censent. Helmsl. Lacaphthon idem  
putat cum Narcaphtho: hocque à Plinio præter-  
missum arbitratu consultò, quia incerta esset na-  
tura eius, vt aliorum quoque plurimum, quæ ille  
Orbi nostro tantum nominibus cognita esse tra-  
dit, vt Serichatum Gabaliūque. Marcellus quo-  
que facit, nihil de Narcaphtho à se inuentum  
Theophr. aut Plinium docuisse. Ideoque illis in-  
cognitum fuisse suspicatur. Immo in antiquissi-  
mo libique probatissimo codice, nullibi etiam il-  
lud caput de Narcaphtho apud Diosc. legi, ac ne  
vestigium quidem eius ab eodem deprehensum:  
non leui, nisi Paulus id confirmaret, suspicione,  
cum liceret Plinio, ab eodem Diosc. à quo plura  
alia acceperat, hoc etiam accipere, quod tamen  
ne verbo quidem fecit. Sed Paulus suspensionem  
amouit, qui eadem penè cum Diosc. dicit. Pro eo  
verò quod diximus, vuluam adstrictam, habetur  
gemina lectio in Codicibus. Sunt enim in quibus  
*argem. mor.* *serapii*, & in quibus *serapii* legatur,  
vt vel angusta præclusaque, vel adstricta nec hu-  
mores remittens matrix intelligenda videatur.  
Nos cum Marcello & aliis doctioribus Interpre-  
tibus id malimus quod ab antiquo medicinarum au-  
thore Paulo *Argem. mor.* constabat, Sed de Plinio  
nondum transactum. Sunt enim qui cum Nar-  
caphthum intellexisse putent per Serichatum, &  
quando ait: Ed comportatur & Serichatum &

Diosc. illud.

Sericha-  
thon.

Gabaliū, quæ intra se consumunt Arabes, no-  
stro Orbi tantum nominibus cognita, sed cum  
Cinnamo Casiaque nascentia. Peruenit tamen a-  
liquando Serichatum, & in vnguenta additur ab  
aliquibus. Permutatur in libras xvi. Ex obse-  
curissimo hoc tripode, quasi Lanum momordisset,  
velut edicto quodam pronuntiat Amatus, Pli-  
nium non Narcaphthum appellari voluisse, sed  
magis Serichatum, huiusque descriptionem, tan-  
quam rei sibi incognitæ prætermisisset, tantum ab  
aliquibus in vnguenta addi, dicere contentum.  
Ergo Plinio incognitum fuit, & nihilominus A-  
mato cognitum, Serichatum apud Plin. esse Nar-  
caphthum: cum tamen ingenuè falsus sit nostro  
Orbi tantum nomine cognitum? Vt iam non im-  
merito *argem. mor.* eiusmodi coniectores appella-  
rit doctus quidam, qui tantæ securitate pronun-  
tiare, tantâ facilitate diuinare, atque adeo tam  
audacter pronuntiare didicerunt, quid auctores  
senferint in his præsertim, quæ velut non intel-  
lecta præterierunt, contenti nomina tantum ap-  
ponere, vt de Serichato & Gaballo fecit Plinius.  
Sed forte istud mouit Amatum, quod in vnguen-  
ta addi Plin. ait, quod idem & de sua Narthe  
Theophrastum scribere diximus, quam quidam  
Narcaphthum putant: quodque idem tradit Dio-  
scor. Sed & his & talibus coniectari aut suspicari  
liceat: neuiquam verò temerè interpretari as-  
statuere.

Mirum etiam Gal. nihil de Narcaphtho tradi-  
disse, quem tamen Diosc. libros diligenter euolu-  
isse liquet.

Serapio Abicis cuiusdam testimonio fretus tra-  
dit, siccam vocatam Storacem corticem esse arboris  
Storacem [Styracem resinam] fundentis, qui  
decoctæ & expressæ liquidæ Styraci superfit,  
quod tanquam verisimile, inquit Cordus, non  
impugnamus. Hoc tamen reticendum haud exi-  
stimamus, nobis videri aliam esse & diuersam ar-  
borem, liquidam Styracem fundentem, ab ea quæ  
calamitam sudat Styracem, vt de Styrace docebi-  
mus. Hoc enim loco non de Styrace, sed Nar-  
caphtho nobis tradendum. Io. Rhoder. Lusitanus  
Narcaphthum putat esse pretiosam illam ar-  
boris cuiusdam Indicæ materiam, quam *Ligni a-*  
*quile* nomine instructiores Lusitanorum Offici-  
neruant. Sed cum hoc lignum non sit cortex, sed  
arboris cuiusdam Indicæ materia, Agallocho simi-  
lis [cuius etiam speciem esse arbitramur] non au-  
simus eius opinionem confirmare. Siquidem Nar-  
caphthum cortex est arbori sue detractus. Aquil-  
æ verò lignum, non cortex, sed lignum est, quam-  
uis nonnunquam etiam cortice vestitum afferat-  
ur, sed rarè, & cui non sit eadem, quæ ipsi ligno  
in odore & sapore gratia, de quo plura diximus  
cap. de Agallocho & Ligno aloës. Facit itaque  
ingenuè Cordus sibi nihil certi de Narcaphtho  
constare, hortaturque alios vt id inquirant. Idem  
in Diacastorio D. Nicolai annotat hæc: Storacis  
rubeæ: hoc enim loco non est accipiendus cortex  
ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiam, at-  
que malè Storacem rubeam: sed Storacis Cala-  
mitæ purissimæ guttæ, quibus rufus est color. I-  
tem ad Troch. Alyptæ Mosch. Styrax rubra hic  
non significat Thymiam, aridum illum nigrum  
corticem &c.

Non desunt indicia, inquit Matth. si modò ad  
nos hodie deferatur] id omninò esse Narcaph-  
thum, quod vulgò Offic. vocant *Thymiam*. Nam  
*Thymiam* nō aliud integrat quàm *Thymiam* apud  
Græcos. Serap. Narcaphthum *Lafahaten* vocat:  
dicitur etiam Arab. *Nabach*. Ital. *Agall. cho* atque  
etiam



etiam *Tigmane* Seplafiarum vulgò. Idem post-  
com. Lat. & Ital. Et Epist. lib. 5. scribit: Placeret  
quidem Val. Cordi doctrina, qui rubeum Styra-  
cem imponi iubet, si tamen pro rubeo flauum,  
vt pote præstantissimum intelligeret. Sed cum  
ipse Germanus fuerit, & sciam ego Germanicas  
seplafias nihil aliud quam Thymiam, quod Diosc.  
Narcaphthum vocari censeo, Styracem rubeum  
appellare: vereor sanè, ne ipse quoque pro Co-  
zumbri, Thymiam addendum crediderit. Sed de-  
mus eū de selectissimo Styrace intellexisse, errauit  
tamen, cum sciret quid apud suos Myropolas ru-  
beus designaret Styra, quòd illis manifestam er-  
randi ansam præbuerit, à quo errore non habeo  
quibus excusum: præsertim cum mihi certò per-  
suadeam, Cordum in hoc Iac. Manlium esse se-  
cutum. Namque Manlius simul ac perperam ex-  
posuit Cozumbri, facem esse Styrcis liquidi, mox  
subiunxit Arabicum nomen secundum Composi-  
torem nil aliud designare, quam rubrum Styra-  
cem seu Thymiam, seu Thus Iudæorum. Quæ vt  
inepta, inania & incertis Autoribus allata, ita ri-  
denda & reiicienda videntur. *Hec ille.* Sed con-  
siderent eruditi Lectores, an Cordus non sit ex-  
cusandus, qui in duabus compositionibus prædi-  
ctis apertis verbis declarauit, se per Styracem  
rubram non intelligere Thymiam ac proinde ei  
à Matthiol. iniuriam fieri.

Ipse verò Matthiol. [vt annotat Guiland. in suo  
Theone] crasse in Narcaphtho & Staete errat, quæ  
ille medicamenta duo pro vulgari Tigname &  
Styrace liquida exponit, rectius facturus si recu-  
tarit. Styra enim liquida ex recentibus Styrcis  
arboris corticibus, admixto oleo ingentibus tor-  
cularibus, in Asia minori Aegypto & Grecia pre-  
mitur, quos ita expressos cortices magna Italiæ  
pars *Tegnane* vocat, sicuti & Calabria *Bisfari*. Sed  
nos de Styrace liquida & aliis Styrcis generibus  
specialius trademus post resiniferas arbores.

Amato Narcaphthon Arab. *Nabach*, *Läbassen*, li-  
gnum est corticosum & velut putidum, antiquita-  
tem nimiam præ se ferens, quod idem ait cum eo,  
quod Offic. hodie Thymiam, quia in suffimentis  
præcipue eo vtuntur. Itali corrupta voce *Tigna-  
ne*: Hispani Mauritania *Almeim* appellant. Ce-  
terum *Thymiam* vagum nomen est, suffitus omne  
genus comprehendens.

Lacunâ quoque teste, pro certo creditur *Al-  
meim* esse corticem Styrcis, ex quo per cocturam  
detracta Storax liquida offic. Storax rubra inquit  
Clus. in offic. Gallæ & Belgæ, quibusdam in Bra-  
bantia *Thus Iudæorum* dicitur, aliis Thymiam.  
Ex doctorum tamen sententia Narcaphthon An-  
tiquorum.

Diosc. descriptio conuenit cum Styrace rubra  
offic. harum regionum. Vt verò scribit Apollo,  
Styrax liquidus offic. Staete non est. Est & Styra  
ruber Arabistis *fax* Styrcis liquidi & Myrrhæ Sta-  
etæ seu etiam Cozumbrium, & Iudæorum aut  
Thymiam pro Staete inuecta.

Serapio inania garriens pro Thymiamate omnia  
simul obruit, vt etiam Auic. Pharmacopœi qui-  
dam ineptè satis, per Ammoniacum thymiam,  
Ammoniacum simul ac huiusmodi corticem acci-  
piunt. Bellon. in suis obser. de iis quæ in Rhodio  
vidit, refert vidisse se exonerantes nauiculam ad  
ripam portus, plenam simplici cuius in medicina  
vius est, quod Styra rubra dicitur. Græcis nunc  
vocari *Maurocapno*. Sibi dictum fuisse, arborem  
in ipsa insula nasci: verum non datum fuisse otium  
videndi.

Vt Narcaphthi olim, vt supra dictum, vsus  
Tom. I.

fuit ad suffitus, ita Styrcis rubræ hodie dictæ iti-  
dem præcipuus vsus in compositis odoramentis,  
quæ ad suffiendum parantur: ita vt præterquam-  
quod per se [si modò recens sit, aut tale quale  
suprà vltimo loco descripsimus] id muneris præ-  
ster, pauca fiant suffimentorum compositiones,  
quæ ipsum non recipiant. Sed quæ Pharmacopœo-  
rum quorundam hodie est pertinax proteruitas,  
malunt in hanc vsque diem euanidum illud &  
nullius nec gustus nec odoris corticem immiscere,  
fungum pro aromate, quàm meliora docentibus  
obtemperando operam impendere conquirendi  
præstantiora.

## SASSAFRAS SIVE LIGNVM PAVANVM.

CAP. XXXII.



**L**ignum Sas- Descriptio  
saffras parū  
Ligni.

ponderosum  
est, corticēque  
Cortic.  
(prout ad nos  
importatur) teg-  
gitur, extimo  
quidem tenui,  
cinereo, inter-  
iore cassiuscu-  
lo, & interio-  
re, fur golo nō  
nihil, melli,  
materiæ sub-  
cet alba, vel ex  
albo nificat;  
aliquā interdū  
etiam parte ad  
cinereum ver-  
gens, mollitie  
& pectinibus  
Tiliaceis, odo-  
re & sapore su-  
ui aromatico;  
acriusculo &  
subdulci, quo-  
dammodo Ani-  
si. Cortici verò  
siccatas cum nō  
obscura astu-  
ctione inest. Vi-  
dimus frustra fe-  
mons crassitu-  
dine, sed quæ  
vel prope ra-  
mos vel radicē  
exalta ex nodis  
& vestigiis con-  
iectabamur. Ac-  
cepimus & por-  
tiones qualdam  
à D. Volmario,  
quæ eundem

exhibent saporem & odorem, sed texturæ raræ &  
veluti porosæ, pediculi Nymphææ instar.

Folium vidimus anno 1607. apud charissimum  
fratrem Casp. Bauhinum, sublongum, in tres par-  
tes diuisum, cuius pediculus degustatus, fuit aro-  
maticus.

Arbor ipsa, teste Monardæ [cuius iconem ex-

arboris.

bibemus quæ prima fronte Cinnamomi videbatur, magnam proceritatem adsequitur, quam & mediocres & parvæ reperiuntur. Maxima Pinum mediocrem æquant, formâ etiam recta non abfimiles, truncus singularis est, nullis adnatis ramosus, Palmæ instat, atque superius duntaxat ramos Pini mundate in modum emittit, in orbem poculi instat circumactos. Cortex crassus, fulvi coloris, alio tenuiore cinericeo tectus. Materies alba in feluum deurgens. Estque tam truncus, [ vt & rami ] flexilis. Cortex commanfus, aromatico sapore præditus apparet, qualis est Fœniculi, tanto tamque fragrant, vt pauca eius quantitas totum conclauē compleat, habet & acrifculi quippiam. Lignum ipsum minus efficax, minusque aromaticum. Ramis hærent folia viridia, trifariam diuisa, ficulneorum æmula, tenera adhuc, Piri foliis similia sunt, vixque vllum angulum ostendunt, atrouerentia, odorata, multoque magis exiccata. Perpetuâ fronde est arbor, alique foliis marcescentibus alia succrescunt. Nescitur an fructum aut florem ferat. Radix pro magnitudine arboris crassa aut gracilis, flexilis quidem, minus tamen quam truncus & rami, summa t. llure vagans, vnde facile extirpatur. Cæalp. quoque corticem speciei & colore Cassia similem ait.

**Synonyma.** Vulgus Herbariorum, Medici item & Offic. *Sassafras* vocant: Camer. Lignum *sassepes*, quod odore Melle arboris liquore referre ait. *Lignum Pauanum*. *Pauanum* Tab. Catal. Franc. Refor. Wor. & *Lignum floridum*: Indica radix quæ *Sassafras* Codronchio. Gallis & Hispanis corruptè *Sasifraga*: Indis *Pauamen*, Hisp. Italis, *Viera*. In Virgin. insulis *Minacé* Germ. *Sassafras*.

**Locus.** Nasctur in maritimis, locisque temperatis, nec humiditate nec siccitate excedentibus. Scant hac arbore montes, inauissimūque odorem præternatigantibus ea adspirat. Floridæ familiaris, vno tantum loco, in portu S Helenæ, & portu S. Matthæi: alibi nusquam, auctore Monard. Non ita diu ad nos importari ceptum, nunc in omnibus bene instructis Pharmacopoliis habetur.

**Vires & v. sus.** Folia, [ inquit idem Monard. ] confusis imponunt Indi, sicca in Medicos etiam vsus assumunt. Optima pars arboris & efficacissima est radix, cui cortex intrinsecus multum viscidus, coloris fului, odore tum ramos, tum reliquam arborem vincens. Aromaticus magis est cortex quam radix: efficacius & odoratus est decoctum radicit, quam reliquæ arboris & ramorum. Quare tum ob hanc causam, tum ob copiam, in maiore est apud Hispanos vsu.

**Téperam.** Calidum est hoc lignum cum ramis, & siccum in secundo, paulò magis calidus est cortex, adeò vt ad tertium caliditatis & siccitatis gradum ascendat, id quod ex decocto facillè percipitur. Danda igitur opera, vt lignum & rami cum cortice habeantur, sine quo inefficaciores sunt illi.

Indi fragmentum ligni aut radicit rax pro æbitrio aquæ incoquunt, quo fit, vt inde reduces milites, quilibet pro suo placito decoctum præparet. Ego verò hoc modo vtor. Considerato vsuri temperamento & morbi modo, decoctum præparo: leuius quidem & ex minore ligni quantitate propino biliosis: pituitosis meracius, & ex maiore ligni portione. In sanguineis media via incedo. Eodem modo etiam pro morbis soleo variare, quæ omnia nisi animaduertantur, fieri non potest, quin multi errores in vsu committantur. Nec non magna victus ratio habenda, prout morbus exigit. Aliter hyeme parandum deco-

ctum, aliter Vere: aliter pro robustis, atque aliter pro imbecillis. Idem de temperamentis tum corporum, tum regionum iudicium est: quorum neglecta obseruatione, nobilis quadam marroina ex meraciori decocto in periculum est deducta. Hispani incolæ Floridæ insulæ in omnibus morbis vtuntur, tam acutis quam diuturnis, tam calidis quam frigidis, tam leuibus quam grauib.

Vulitas magna eius est in obstructionibus hydropicorum, febribus quotidianis. Hepar enim corroborat, obstructionibus liberat, ventriculū confortat. Tertiana notha laborantem iuuenem, & in hydropem propendentem, sanauit pilulis de Rhab. Dialacca, & decocto Sassafras. Meracius decoctum manè loco iussu cum vel sine Saccharo bibitur: simplicius in potum ordinarium cedit. Bene etiam succedit, si eo vino diluant, qui vino affuerit. Appetentiam mirum in modum reuocat. In doloribus capitis tam nouis, quam inueteratis, ex frigidityte ortis, datur meracum decoctum calidum, manè, in prandio, & in cœna, obseruata debita victus ratione. Sed appetitum est, vt præcedat purgatio, mediòque tempore vsus decocti, pilulæ sumantur de Hiera simplici. Qui autem decocto vtuntur, non necesse habent conclauē se continere: latis enim est. si probè vestiti sint, & frigus aëreæque intemperatiorem caneant, cibis autem laudabilibus vescantur. In morbis thoracis frigidis efficax est, meatus pectoris aperit, pientiam absumit, catarrhos in thoracem delabi prohibet. Primum decoctum calidum manè bibitur: diutius verò seu secundum decoctum pro potu ordinario. Postea verò meracæ sorbitiunculæ matutinæ intermittuntur, succedente diurno & continuo secundæ decoctionis vsu. Eri enim leuibus aqua, continuato tamen vsu, idem quod prima decoctio efficit: debet autem et ad misceri saccharum, vt facilius sit operatio. In frigidis ventriculi affectibus & flatulentis, præmissa vniuersali euacuatione: meracior decoctio manè calida sumitur, alias diluitur, vt dictum est. Prodest maximè in doloribus inueteratis, quo modo ventriculi dolores antiquissimos curauit, indictio postea continuo vsu simplicis decoctionis, aliamque seculi in hedomade catapotis de hiera simplici. Debiit corquenti ventriculo subuenit, flatus dissipat, ructus acidus tollit: vomitum continuū compescit: oris & anhelitus odorem commendat: Ilchiadici efficaciter propinatur: præsentem quidem dolore meracæ decoctio & calida, & ad præcautionem dilutior longo vsu, per se aut cum vino. Nec minore vultute calculis datur, & is quibus arenulæ gignuntur in renibus. Num & pituitam consunt, & flatu, dissipant. Aduenta estus qui ardore vine laborant, aut calida partium vine destinata in emperie. Alioquin vinam ciet, maximè si impedimentum fiat ab humore aut causa frigida. In artuum debilitate, & gressu impedito, sudor decoctione Sassafras prouocandus per dies multos. Nihil etiam refert interim, si non fudet. Dolorem dentium mirificè leuat lignum masticatum. In Lue Venerea, idem præstat quod Guaiacum, China, Sarsaparilla, simili vsu & vtilitate. Valet & ad arthriticos, podagricosque cruciatus, nec non membra resoluta. Ventrem soluit Cyathus mane calidè assumptus. Pafionem cœliacam diuturnam sanat, flatu vteri & cruditates consumit, certo experimento. Menfes mirificè prouocat. Obstructiones expedit, scdòque faciei colores emendat. Sunt quæ contra



sterilitatem non infelicitur vix sunt, quibus videlicet vterus fuit frigidior. Macilentis confert, & carnem auger, ob id fortassis quod hepatis obstructionibus sublati melior sanguis generetur. Multos nouimus ad pestis præcautionem aqua seu decocto eius vfos immunes euasisse à contagio: alios, qui radicis aut ligni frustulum continuò circumgellantes olfacerent, ad aëris labem corrigendam. *Hac Monardes.*

Admirandam profectò huius ligni facultatem non pauci alii medici hodiè celebrant, idque non tam ob odoris suauitatem, & quòd nullo ingrato sapore præditum sit eius decoctum, quàm ob virum efficaciam, si debite administretur. Non faciliè credat, qui non sit expertus, eius ligni vnciam vnam, [vel semunciam vt velut Monardes] dare octo libras potionis, vt saluberrimè ad corpora superfluis humoribus liberanda, ita consuetis ob odoris saporisque suauitatem ita amice, vt vt post aliquot dierum vsum assuesciti, non aliam sibi optatum sint vili, nisi fortè quorum genus penitus Baccho mæcipatus.

Potest destillatum ex eo parari, vel ipso decocto efficacius, præsertim siamenta aliquandiu in aqua sub cineribus calidis macerata fuerint: quæ postea destilletur in B. M. ita vt nihil viriù ligni exhalet, sicut fieri solet in decoctione. Dosis quoque minor erit quàm decocti: potèstque & secundarium parari destillatum. Sed quia id lignum non admodum recens ad nos importari solet, maior ligni dosis à peritis medicis sumi solet.

Cùm Monspelii ageremus, ligni cum suo cortice derasi vnc. j. f. in tribus tantum aquæ fontanæ libris per hor. x. infundi solebat, deinde ad lib. ij. consump. decoqui, & de colatura lib. f. manè sumi cæsi. Meliusque censemus cum celeberrimis eius loci medicis sic parari in duas tantum doses, quàm in plures, tum quia asseruatum gratiam odoris amittit, tum quòd facultas illius faciliè euanesceat. Est enim tenuissimarum partium. Resistentiam prædicti decocti infundebant per tres horas in lib. xvi. aq. font. decoquebant ad lib. ij. consump. colatoq; per manicam Hip. cum saccharo, Boscheti, titulo, aut absque eo pro potu ordinario utebantur, liberaliore adhibito victu, quàm in decocto Guaiacino, quo nomine frequens eius vsus in corporibus macilentis. Hac ratione magno successu præscribebant ad podagras, Ischiadas, veteres fluxiones, obstructiones confirmatas, febres nothas & antiquas, & singulari propemodum experimento ad fædos virginum colores. Et nos iam ad quosdam prædictorum morborum non infelici successu præscripsimus. Ipsa ligni materies, etsi ad opera satis inepta videatur, sustinuit tamen in elegantem pyxidulam torno elaborari quàm adseruamus.

## LIGNVM ANISI.

CAP. XXXII.

Inter ligna Atlantico Orbe aduecta, vidi (inquit Gorop. in Hip. lib. 7.) quod Anisi odorem ita spirabat, vt Anisi lignum nuncuparem.

Sanè si Goropius non separasset Sassafras à suo ligno Anisi, suspicari fuisset idem cum Sassafras. Saltem colorem & formam quoque indicasset.

Sed datum nobis eodè nomine lignum, ab industrio medico & amico nostro D. Thoma Platero.

Tom. I.

ro, vncias duas latum, ex trunco brachii crassitudine, nec illo tamen integro excisum, odore Anisi & quàm Sassafras suauiori, mitiorique materie, solidà, subfusca, pectines rectos maculis transversis ac splendentibus intercipientibus, quales ferè in Fagino ligno videri solent: faciliè finditur. Flammæ admotum, faciliè adolefcit, & luculentam flammam præbet: sed odorem gratum non reddit sicuti Sassafras. Perquirant Studiosi an tale aliquid apud Veteres vel Recentiores descriptum extet.

## ZINGI FRUCTVS STELLATVS SIVE Anisum Indicum.

CAP. XXXIV.



Vidus nobis hic fructus primùm apud Cl. D. D. Fel. Platerum in amplissimo eius *Pharmacopœia*, indeque postea nobis exhibitus à fratre eius Thoma Med. Doct. ex Argelia delatus, vbi ab amicis ex India, vt aebat, illatum dono acceperat. Stella figuram representat. Constatque ex septem nuculis particularibus, radiorum in morem in centro coeuntibus, triangularibus, longis, leuiter compressis, eà parte quæ committuntur impressis, extimâ & conuexa peripheria semicirculum ferè describentibus, cortice gemino tectis, duro, & spadiceo, nigricante, rugoso, interiori propemodum oleo; internâ substantia: cupri diffracti instar lucente, bin-

ualui, atque in siccis & inueteratis nonnihil hians. Nucleus verò cum in singulis nuculis latet singularis, leuis, sple ntidus, colore seminis Lini aut Pomorum, sed paulò dilutiore. Odor & sapor Anisi planè est, vnde fortè Anisum Indicum dictum, cùm interim nihil præterea cum Aniso commune habeat. Relinquit tamen nescio quid acrimonie in lingua commanfus. Figura magnitudinem ferè exprimit eius quem vidimus

Nucleus.

Odor &amp; sapor.

Zing.


Apud eundem Plat. didicimus etiam Zingi dici.

Anisum  
Philippina-  
rum insu-  
larum

De hoc ipso, postquam ista commentariu est-  
mus, in vltima rationum suorum historia prodi-  
dit Clus. Anisum Philippinarum insularum (que  
ducentorum ferè milliarium intervallo à Sina-  
rum regione distant) allatum ante paucos annos  
à Naucero Anglo, cui nomen Thomas Candi,  
cùm è sua navigatione, quà totum orbem circui-  
uit, rediisset. De huius autem radice, caule, foliis,  
vel etiam floribus quicquam pronuntiare posse  
negat, quodd seminum & umbellarum tantum  
partes Londino acceperit Anisi nomine: pro-  
prium nomen, quod natali loco obtinet, esse  
Damor [addiderat enim Gareus appellauonem,  
vnius ex insularibus, quem Candi aduexerat, ma-  
nu exaratam Sinanis caracteribus. ] Erant, in-  
quit ille, umbellæ latis latæ, Archangelicæ um-  
bellis non minores, sed vt conuicere licebat, et-  
iam laxiores, aliquot pediculis satis crassis & fir-  
mis, in orbem ex summo ratorum fatigio na-  
scentibus constantes, quorum singuli, non gemi-  
num semen, quale Anisi vulgaris, sustinebant,  
sed plura in orbem, vnciam latum interdum, serie  
quadam disposita, videlicet sena, octona aut plu-  
ra, fusci coloris, rugosa, in binas æquales partes  
compacta, quæ superâ parte diuisa, vt plurimum  
inania reperiuntur: aliquot tamen plena depre-  
henduntur, & semen vnicuius continentia, leue,  
splendens, cineracei coloris, Orobi penè magni-  
tudine. Sapor idem qui in vulgaris Anisi semine,  
atque etiam odor.

Damor.

Sapor.



## DE SANTALIS.

C A P. XXXV.

Descriptio  
citri.

DEcorticata Santali citrini, quæ adferuntur  
fragmenta, truncum arguunt satis crassum.  
Est autem lignum solidum, ponderosum, pectini-  
bus rectis, quo fit vt haud difficulter in rectas as-  
ulas findatur, colore ex pallido rufescente, aut  
verius flauescente ac nonnihil in citrinum ver-  
gente, vnde nomen indeptum putamus: sapore  
aromatico, amicante cum acrimonia totum os  
implente, suauis, odore fragranti, moschum non-  
nihil amulante, aut sanè ex eo ad rosarum odo-  
rem nonnihil vergente.

Santalum  
album.

Santalum album parum colore differt à Citri-  
no: magis pallescit, Piri ligno quodd pallidum sit  
colore satis simile: alioqui eadem substantia, ea-  
dem textura, & pecti nesuadem. Sed odore infe-  
rius, quippe qui debilis vix percipitur, vti nec  
sapor.

Citrinum  
Santalum.


Quod Citrinum appellatur Sandalum, diuer-  
sum penitus à [ruffo siue rubro] esse videtur: nam  
gracilius quàm illud est, & dissimili consistit mate-  
ria & qualitatibus, sine cortice ad nos affertur,  
forisquæ pallidius est: intus verò solido, ponde-  
roso, pingui, & si aquæ imponatur, fundum pe-  
tente, leui, tenuissimo, nullamque medullam ha-  
bente, ligno consistat: sapore acri, aromatico, per  
totum os se diffundente, & ad caput vsque pene-  
trante: colore in flauo rufescente. Odorem ha-  
bet quemadmodum & saporem aromaticum, iu-  
cundum, fortèque, qui facillimè caput tenet &  
repleat. Est & tertium Sandalum, quod quidam

Santalum  
album.

album vocant, sed reuera nullam habet in colore,

quæ à citrino dignoscatur. differentiam: inuenitur  
enim quod magis flauo & profundiore sit colore,  
quàm iam dictum citrinum. Quapropter hac nota

Santalum citrinum.



Santalum album.



parum cordis habet: Lignum autem à corde se-  
gregat, quoniam in corde tota odoris gratia con-  
sistit. Ad alium portum, Camanale appellatum,  
Improbum Santalum nascitur, vt pote, quod pluri-  
mum lignum, & nihil ferè cordis possideat. Huius-  
modi est & illud, quod ad portum Seruago nuncu-  
patum inuenitur. Sunt autem Mercatores in his  
discernendis aded exercitati, vt conspecto ligno,  
statim indicare possint, vnde sit allatum. Inueni-  
tur etiam Santalum album & pallidum in Verba-  
li, portu Iauæ, vehementer quidem odoratum, sed  
quod breui senescat, vnde debeat post annu mul-  
to ligno adempto eius odor reuocari, qui in me-  
ditullio consistit. Primum verò locum obtinet  
pallidum, quod odoratius est, sed minori copia  
inuenitur. Etenim inter innumeros Santali trun-  
cos vix quinqueagesimus quisque pallidus est. Nu-  
per tamen à Mercatoribus relatum, qui diu in ea  
insula versati sunt, plurimum Santalum pallidum  
locis apricis nasci, tantamque inter vtriusque

San-



Santali arbores esse affinitatem, vt pallidum à candido discerni non possit, nisi fortè ab ipsis incolis, qui eas casas mercatoribus vendunt. Ceterum Santalum in Nucis Iuglandis magnitudinem attollitur, foliis admodum virentibus Lenticuli æmulis: flos ex cæruleo nigricans: fructus Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus, & facile decidens. Inodoram ferunt esse arborem, nisi detracto iam cortice exiccata.

Quantum igitur ex hac Santali descriptione colligere licet, valde inquit Clusius not. ad Garc.] erit dubitandum, an legitimum Santalum pallidum habeamus: quandoquidem scribit vix in Lusitaniam deferri, quoniam eius pretium maius sit apud ipsos Indos quam apud Lusitanos. Fieri igitur poterit, vt aliquod aliud odoratum lignum nobis pro legitimo Santalo obtrudatur. Certè candidum nostrum planè inodorum est. Arlegitimi pallidi librale fragmentum, & stipse aliquot pedes longo, semipedem crasso, recisum, donauit mihi anno 1581. Morganus fragrantis admodum odoris. Est verdè id graue, solidum, nodosum, colore intus flauum, odore suauis reficiens cerebrum, & grato sapore palatum feriens.

Apud antiquiores Græcos nullam Santalorum mentionem inuenimus, sed apud Arabes qui ea nobis ostenderunt, & tria fecerunt, *album*, *rubrum* & *luteum*, quorum placita de Santalis infra inter vires videre licet.

Apud Plin. Sandalum non est arbor, sed herba frumentacea, de qua suo loco. Sunt tamen qui Sericatum Plinii Santalum flauum esse coniecerunt, à Serici erudi colore, vt annotat Dalechamp. Sed optauerimus tales Laurum in solidum momordicæ, qui ex tam leui occasione coniectari, & vtiplis censere, interpretari, nos, ludificari, audent.

Videtur tamen Galenus de Santalis tradidisse, quoniam eum citat Auicenna: sed valde suspicamur ne id falsò: Nam si cognita fuissent Santala Galeno, vtiq; eorum passim non vno tantum loco meminisset: vt nemo nunc quiritari queat ea capita vel libros perisse. Extat quidem de Sandalis libellus, sed falsò Galeno inscriptus cui de secretis Galeni titulus est. In eo vbi de Ictero traditur, Satalorū fit mentio quamuis non fantalum, sed Mahazari legitur, quam vocem Recentiores quidam, fantalum citrinum interpretati sunt, vt postea specialius dicetur. His autem non exhibendam esse fidem doctissimi iudicarunt. Eò quòd ab Arabe quodam collectus sit is libellus, & Galeni nomine inscriptus. Actuarius verdè ex recentioribus Græcis in Diaromaton suum Basilicum inter alia, recipit Santali tria genera, nempe *Citrinum*, *rubrum* & *candidum*: totidem & Hermol. genera facit: sed citrinum *Luteum* vocat.

Tria genera ista, ex tribus distinctis arborum generibus ex quorundam sententia prouenire tradit Cartius: quorum primum rubrum, in odorum: alterum luteum: tertium album, quod in abscissu frigiditatis sibi gradum vendicit. Rubrum verdè aliquantò ceteris frigidius existimari, omnibus præferri luteum, si pingui quodam scaeat. Et statim subdit: & quia odorum, quod rubrum est, secundas partes obtinet. Album tertium sibi classem arrogat, quod in odorum est, duobus prioribus suauiter spirantibus. Vt nunc in magna suspitione versetur bonus ille vir, ne credatur neutrum istorum vidisse, contraesse, ac minùs etiam olfecisse. Nam quid sibi velit, dicès rubrum in odorum: & postea odorum, & suauiter spirare, nec scimus ipsi, nec intellexit ipse. Quis

Tom. I.

odor rubri sit, post dicetur. Santalum citrinum inuenturum Plateario & Syluo: Hic speciatim Santalia [sic enim vocat] quæ sunt in officinis, acri sapore, linguam mordentia, præsertim Citrinum, minimè in vsum recipienda censet: quod non aliam ob causam scripsisse videtur, quam quòd Santala ab Arabibus in tertio refrigerantiu ordine collocati videret, quam temperiem, vel potius temperiei excessum Santalis hodie in Officinis prostantibus vix nostro iudicio rectè tribuerit: vt ex hoc, quoque dubitari queat, an nostra Santala sint Arabum. Monachi in Mes. tradunt, Santalum citrinum non amplius adferri. Aromaticos hodiernos excavare medullam ex albo, & pro Citrino obtrudere: immò illud ipsum esse asserere. Sed magnopere errare. Vnum quodque enim eorum genus suam propriam habere arborem, esseque diuersas arbores, & non duas. Omnium testimonio album esse minùs bonum. Inde colligunt: si Citrinum fuisset pars albi, non fore melius rubro, sed potius eo vilius quod est contra omnes auctores. Addunt, repetiri quandoque scriptum Sandali Mazahari: quod accipiendum sit pro citrino. Sed hæc vox tum horum alios non parum torset. Etenim in descriptione aromatici rosati Gabrielis, & in aromatici rosati min. & in aromatici Catiophyl. & in confect. Ramich, & in cap. de Tamarindis, & in cap. de Sorda & aliis similibus, post Sandalum immediate sequitur Machazari, vel Mazahari, vel Macizir &c. De Santalo autem dubitant debere intelligi Citrinum: quia semper [vt plurimi testantur] si legatur Sandalus absolute, Citrinus intelligitur: qui est magis aromaticus & præstantior, teste etiam Serapione. Vocabulum proximè sequens Sandalum multi ex iunioribus volunt referri ad Santalum tanquam adiunctum: vnde & pro Citrino siue luteo exponunt.

Quod confirmant Simon Ianuensis, qui scribens de Citrino. Vocati ab Aben Mesur Mazahan. Vltra septuaginta Barbaras variationes huius barbari vocabuli, per varios codices, in variis descriptionibus reperimus: *Machazari*, *mazahari*, *macaziri*, *marasari*, *mazazir* &c.: & nonnulli simpliciter legunt *Sandali*. Quidam ex Recentioribus, *Sandali citrini*. In quibusdam antiquis exemplatibus, & in priori impressione librorum Mesues, inter simplicia sunt quedam Synonyma in quibus legitur *Machazir*, id est, odoriferi. Quæ sanè expositio benè conuenit Santalo citrino. Garcias tamen Arabicum vocum non indiligens vestigator & interpret se prorsus ignorare fatetur, quid sibi velint ista vocabula, nisi fortè *Machazari* significet è Malaca pretium: aut Mazahani legendum sit, quod pallidum aut croceo colore infectum sonat. Antid. Rom. Sandalum *Nazzamari*, Sandalum citrinum seu odoratum exponit. Io. Wittichius, in febre Epidemica præscribit *Santalum Machaziri*, quod idem interpretatur citrinum odoriferum. Medicorum insectiam, vel pharmacopolarum ignauiam, taxat Bellon. qui Sandala nulla ratione vulgò Cedrum vocant. Nullam autem Sandalus cum Cedro habet affinitatem, & à neotericis Arabibus tantum cognitus. Sed error hinc emanauit, quòd cum Theriaca Cedri ramos admittat, quibus illi carent, Sandalon pro Cedro assument.

Cæsalp. duo tantum Santalorum genera agnoscere videtur, quæ ligna odorata vocat: *candidum*, & *rubrum*: Flauum autem quod hodie habetur, esse candidi medullam multo suauiorum reliquo ligno quod album est.

Sunt tamen plures alii qui tria distincta genera cum Arabibus agnoscunt, de quo, cum arbores ipsas non nouerimus, nihil certi statuere audeamus.

In Santalorum collatione inter se, & æstimatione non consentiunt Auctores. Ruell. omnes in frigidorum classe ponit, sed rubrum aliquantò frigidius dicit: satis temerè, quoniam ex suo cerebello. Excusandus fuisset, si dixisset ex Arabum sententia. Matth. omnibus præfert pallidum: secundum locum tribuit albo: postremum rubro, quodd, vt ille ait, nullo commendetur odore: priora verò duo suauiter spirent. Remissius quàm in Italicis lucubrationibus, inquit Apollo, vbi vtrumque odoratissimum dixit: & si demum rectius nares admouisset, deprehendisset vtique id, quod vulgò citrini seu flauii nomine circumfertur, multò fragrantius esse albo. Amato quoque luteus siue citrinus odoratissimus est, & cæteris melior. Tertius verò albus, medium inter rubrum & citrinum possidens. Præfert igitur rubrum albo, cum tamen hunc odoratum, illum inodorum plenique faciant. Lacuna sanè citrina & alba valdè odorata dicit: de rubro, dicit nullum habere odorem effatu dignum, sed aliquem tamen acquirere ab aliis Santalis. At radians ille Apollo citrina seu flaua sola ferè odorata dicit, quamuis alba communem ligni colorem habentia, & flauo inserta [vt ille ait] aliquantulum etiam redolent: Brassanolumque reprehendit, quòd in examine vnguenti Santalini falsò nihil omnino habere odoris censet. At non videt tot radiis stipatus, à se quoque non nisi per accidens tribui odorem albo, quando ait flauo interfecta aliquantulum etiam redolere, satis aperte his verbis asserens, quod animò & contradicendi studio taxat. Idem Musa Rubrum tradit, omni fragrantia destituti, etsi pro Santalo absolutè, illud quidem accipiendum velint, quasi magis infragidans, ipsi tamen Apollini [Serapionis auctoritate freti, qui ex Santalis melius esse dicit flauum] magis flauum ardet, quamuis calidus.

Cordum insuper taxat, quodd per Santalum Mechoziti, vel ex Genuensi codice Mazahari apud Mesuem speciem Citrini Santali, à vulgari diuersam atque odoratiorem supponit: hoc nimirum eius adolescentiæ inurendum esse dicens, quodd vetustate exanimata citrina Santala, recentibus collata, minus fragrare competerit, proinde in specie diuersa existimauerit, quum præter enarrata non sit dare quartam speciem Santalorum. Quod verò quidam Cedrum putarunt, & calida officinarum Santala cum Syluiò, id in rubro nullo pacto admittendum censet. At nos nec alba quidem Cedrum existimari debere censemus. Ipse verò Apollo nobis videtur nimis securè asserere, non dari quartam speciem Santalorum: quasi ille solus omnia viderit. Si diuini vixisset Cordus, vtique docuisset eum, quid intellexerit per quartam suam Santali speciem, [quam sanè ne nos quidem intelligimus] nec suam famam eius radiis obfusari vnquam tulisset, iuuenis quotquot vnquam vixerunt præter ætatem de Repub. Medica meritissimus.

Interim quoque mirari subit, vbi C. Bauh. legit, Fr. Alexandrum in suo Apolline quartum Santalorum genus esse voluisse: cum ex prædictis eius verbis aperte pateat, eum contrarium asserere.

Synonyma linguar. Porro apud auctores scriptum inuenias *Santalum* & *Sandalus*: *Santalum* & *Sandalum lignum*; *Serap. Auic. & Mauritani* cæteris itémque *Perlis*

corrupto nomine *Sandal*: Ab incolis locorum, in quibus nascitur *Chandana* teste Linfchott. In Timor insula omnibusque Prouinciis Malacæ vicinis *Chandama*: à Decanitis, Gularatis, Cananitis, aliisque Indis *Sercandaa*. Lusitanis & Italis *Sandalo*. Gal. du *Santal*. Germ. *Sandel/ Sandele* holz.

Cæterùm in pallidi penuria albi & rubri partes æquales præscribendas non censet Garcias, vt vult Sepulveda, sed potius solum candidum: magis enim pallido affine est album, quàm rubrum. Pen. & Lob. in Adu. alicubi Medicum quendam anonymum obiter carpit, qui ridiculè conquirebatur perperam fieri hodie, quodd Santalum citrinum adulteretur Ligno aloës. Ita quidam imperiti de rebus incognitis quiritari solent, ne nihil sciuisse videantur. Sed soli docti eiusmodi Leones ex vngue norunt, & à verè peritis discernunt.

Scribit Matth. Santalum in vtraque India syluis densissimis ingentissimisque nasci: Syluius, ex agro Calicuti Indiæ emporii aduehi à Lusitanis. Sed de hac re certiora nos docent Garcias & Linfchott. Album & flauum ex insula Tymor aduenit, quæ lauis adiacet, vndique portuosa. Integre ibi albi flauique Santali syluz visuntur, frequentique hinc commercio per totam Indiam distrahuntur. Aduehitur autem vtrumque Santalum Lusitanorum Liburnicis ex Malaca & in Couchin & Goa maxima totius Indiæ emporia inuehiuntur. Perit enim nunc Calecut amplissimumolum emporium. Inde scilicet ex Couchin & Goa potissimam partem exportant in Malaur, Canara, Bengala, Decan, & Guzarate: minima verò defertur Ormuz, in Arabiam & Lusitaniam. Inò vix in Lusitaniam legittimum Citrinum deferri putat Garcias, cum multò pluris ibi ematur, quàm in Lusitaniam delatum vendi possit. In exteris regiones delata Santali arbor etiam crescit. Vidisse enim idem testatur in Andanager totius regni Decan vrbe primaria, vbi regiam suam habet Nizamoxa, attamen non fuisse odoratum. Habere autem Nizamoxam istos hortos amplissimos, omni peregrinarum arborum, etiam nostratium genere excultissimos, quæ fructifera sint. Significatum ipsi fuisse, in insula D. Laurentii: Santalum etiam inueniri, & ipsos Ethiopes incolas sicasse referre. Verùm intellexisse postea non esse Santalum, sed ligni duntaxat genus odoratum, cuiusmodi ibi plurima inueniuntur. Massæus tradit in Chersoneso insula primæ notæ Santalum album nasci. Letin. Huius in Nauig. Holand. Insula, inquit Madagascar, id est, Lunæ, nunc S. Laurentii, quæ ex maximis & diutissimis insulis censetur totius orbis in India Orientali abundat Santalo, Ambaro & Ebore.

Serapio ex multorum Arabum autoritate Santalum frigidum esse statuit in tertio gradu. Auic. verò in fine secundi ordinis ad tertium vique, sicum in secundo uterque. Rubrum tamen Serap. frigidius esse dicit albo & citrino: illudque præ cæteris, humorum fluxum inhibere, Erysipelatus, inflammationibus, podagræ à bile ortæ ex succo Solani, aut Sedi, aut Portulacæ, aut Lentisculæ palustribus vtiliter imponi. Simile esse *Fausel* frigiditate & siccitate, atque adstrictione, robore, rarengiuas & stomachum. Omnia Cardiacæ à bile & calidis febribus aduegsari. Trita & mixta cum aq. ros. & modico camphoræ vtiliter temporibus illini ardori capitis. Santala alba media quantitate farco collæ adiecta, & cum albumine oui temporibus imposita, ad idem valere, & aduersus descensum humorum in oculos, incipientelque



reſque Ophthalmias. Apoſtemata calida lenire, & humorum influxum à membris attere. Omnibus autem præſerit Citrinum pingue, & poſtea Citrinum ſiccum: Viſuſſimum eſſe rubrum, & ſiccus citrinus. Eadem cum aq. roſ. epithematis vice ventriculo adnota, eius ſeruorem in ardentiffimis febribus mitigare, ſtomachumque firmare. Santalum quoque autore Auic. cordi amicum eſt, lætitiæ enim adfert, & robur ei addit: Quare iis miſcetur medicamentis, quæ Cordi & eius palpitatiõni ſuccurrunt. Hæc Arabes de Santalis, qui cur Santala frigida faciant, & quidem ordine tertio, rem tam odoratam, aromaticam ſaporem, amaricantem quoque, immò fauces quoque ſua acrimonia imbuentem, ſi noſtra intelligant, non dum ſatis intelligimus. Hinc ſanè Doctiſſ. Syluius itemque Fuchſ. anſa miſumperūt ſuſpicandi, noſtra Santala, non eſſe Arabum vera. Patet tamen à plerique receptum eſſe, non carere nos geminis Santalis, ſuntque qui Arabum potiùs iudicium de Santalorum qualitate improbandum cenſeant, quibus ſanè nos non inuiti ſubſcribimus. Santala frigida eſſe, perſuaſum eſt omnibus, inquit Scalig. ubi Santalum ab Alpalatho, tanquam rem frigidam à calida differre docet: vt & ipſe quoque in ea ſententia fuiſſe videatur. Sanè Quæſtio pulcherrima eſt, & medico ad iudicia tum faciendâ, tû propoſitâ maximè neceſſaria: ſuper quâ ſubtiliter Cardanus: ſolidè verò Scaliger ſe exercent: vt ex eorum ſcriptis vidèrè eſt.

Santalum album inter frigida cenſet Iouertus, quod, ſi, acrimonia careat, concedimus, quale poſſit eſſe euandum: aliàs nequaquam. Pro noſtra quoque ſententia faciunt Matthiol. Dalechamp. alique non reſcindi Autores, qui hac in parte Arabum ſententiam nequaquam probandam cenſent.

Porrò nomen medicamento triuali indiderūt Medici, quod ab illo triplici Santalorum commercio, triaſantalum nominatur, & Diatriuſantalum, cuius deſcriptionem habes apud D. Nicolaum, & ex eo in plerique Diſpenſatoriis vulgò dictis. Præſcribi ſolet à medicis aduerſus calidam hepatis intemperiem, cuiusque obſtructi reliquias, & ſæterum, (ad quos ſanè affectus ſi tamen frigida eſſent ſantala, vt clamitant, obſeſſent potiùs quàm prodeſſent) ad ventriculi & viſcerum debilitatem. Simili ratione Ceratum Santalinum vocitatum apud Meſuen deſcribitur, aduerſus phlegmonas & intemperaturas omnes calidas, ventriculi, hepatis, & aliarum partium, quas potentiſſimè extinguerè promittit. Ac à quibuſdam ſimplex etiam, tantumque ex meris Santalis, ſed duplici ad reliqua citrini doſi, pulvis paratur.

Nunc in multis locis medicorum potiones, vt gratiam aſſumentiam inreant, iis imbuuntur. Quin aliquid ſibi odoris incundi adſciſcant, pauliſper in eis macerantur: quo fieri putant, vt medicamenta à moroſis ægrotantium palatis longè minùs reſpuantur: atque Cinnamomi modo, iis qui medicinas horrent, ſaſtidium abolere, aperte proſitetur Ruellius: quod & ipſum faciat ad probandum eius calorem. Hinc putamus miſceri optima ratione cæteris cor roborantibus remediis.

Cæterùm Garcias prodidit, Sandalum vſibus humanis valde neceſſarium eſſe, vt pote quod Cordis affectibus non parum conueniat: magnamque tam albi quàm Citrini quantitatem per vniuerſam Indiam abſumi, valdeque tam ab ipſis incolis Indis, quàm à Mauris Indæis & Gentilibus expeti. Pinſunt hoc ipſi ac tundunt in lapideis

mortariis, aſſuſque, & in pultem redigant, ac vnguenti more ad corporis inunctiones vtuntur, deinde ſiccari ſiunt, tum ad ætus corporis tollendos, tum ad odoris gratiam corpori cõciliandâ. Indi enim naturâ odoramentis additi ſunt.

#### SANTALO ALBO SIMILE LIGNVM Sembrane.

Inuenitur & in Malabar odorati ligni genus, Santalo albo perſimile, quo ſe in febribus indigenæ inungunt: lingua Malauarica *Sambarane* appellatum. *Garcias.*

Eadèque repetens Acoſta addit non eſſe Santalum, neque illius facultates obtinere. Medicos tamen eius provincie Santali ſpeciem eſſe aſſerere, & conferre tenuioris fortunæ hominibus, commendare ad Eryſipelata & inflammationes, atque Santali rubri modo eo vt.

Conſultum proſectò fuiſſet, ab utròque ligni ſpeciem & ſaporem deſcribi, arboremque ipſam, ſi viderunt. Hoc enim diligentes medicos & Botanicos decebat.

#### SANTALVM RVRVM.

CAP. XXXVI.



**L**apideæ Descriptio  
ſeicè duritici & ponderis ſunt, è Santali rubri tunicis ſuſta, quæ del brata importantur, colore intentius rubente, quàm Breſilium, vt ſeicè ingreſſit, peſtinious reſtus denſiſſimis, interdum crispis tuber, aut nodofitatum veſtigia imitantibus. Odorem nullum euidentè ſpirant, ſapore ſerè fatuo cum leui ad-

ſtrictione. Commuſum ſaliſum vix modicum rubeo colore tingit. At linteo aſſuctum, tingit. Cordo Sandalum rubeum, eſt arbor, materia, craſſitudine, & peſtinibus rubenti Preſilio ſimilis, colore multò rubentior, & ad nigredinem accedente: huius etiam ſolidior, & propterea ponderoſior eſt, quàm illius materia, idèoque aquæ iniecta, quamprimum fundum petit. Saporem habens dulceſcentem, adſtringentemque leuiter: odorem nullum ſatu dignum: tingit hoc etiam quemadmodum Preſilium, ſed gravior profundiorque huius eſt, quàm Preſilii color.

Differunt vt vult Garcias, inter ſe Santalum rubrum & lignum Braſilium: nam Santalum rubrum neque dulce eſt, neque inſicit, quæ notæ in Braſilio manifeſtè deprehenduntur, quamuis

utrumque inodorum sit. Musa quoque duersa-  
rum arborum ligna esse testatur. Et sanè ipsa  
lignorum facies & color, paulò diligentioribus  
oculis non ita dissimularentur, aut ostendunt.

Lis rursus est inter Authores de odore Santali  
rubri. Odorem ei inesse negant Matthiolus, A-  
matus, Mura, Lacuna, Scaliger, Apollo, Casp.  
Bauh. alique: & si fortè non nihil redoleat, ei  
per accidentis inesse illam odorem, quod cum a-  
liis importari solet, quidam ex his dicunt. Cur-  
tius in utrumque paratus, modò inodorum, mo-  
dò odoratum, & ita ut ter spina capronatur. Non  
desunt verò, qui tenuè quiddam etiam per se spi-  
rare censeant, præsertim recens, quibus contige-  
rit videre tales iudicem. Cæsalpinus aliquid noui  
importat: variè forte videri, quoddam exigui o-  
doris, quoddam nullius, quoddam præterea lon-  
gè odoratus flauo, non sine quadam Castorii æ-  
mulati, sed nec eae coniecturæ.

Inficere negant Gucias, Acoſta, C. Bauh. At  
Clusius testatur Santalum suum inficere. Et  
Histoz. Lugd. Santalum rubrum sepe inficere so-  
lère tradit. Indultus & in singularibus versatilis  
mus M. deus P. L. Prætorius Achiattos Bafan tuo  
lib. de febribus, ad febres continuas, Santalum  
rubrum, aqua maceratum, ei rubrum colore con-  
ciliare testatur. Omnia nostra fragmenta, [habe-  
mus autem non pauca de duersis locis conquisi-  
ta,] in defacta & linteaminis afficata, rubro id  
tingunt, sed leuiter: masticata alia magis, alia mi-  
nus saluam inficiunt, quædam nihil ferè. Aquam  
maceratione non faciliè tingunt, nisi in puluerem  
redicta in præteritum, aut ebulliant. Pyxidula  
torno recentè relabratæ, vel per se, vel saluà  
in defacta linteolo afficata imbuebant, colo-  
rem eliciunt quidam aceto, alii Aqua vitæ, ac ru-  
bro colore inhiunt Tragemata ex saccharo. Si  
qui sunt qui contrarium obseruauerunt in suo, ha-  
bent quod dicant, vel differre inter se Ligna San-  
tali, vel in eo saltem, vel se aut nos non verum  
Santalum agnouisse. Iudicium feret aliquando  
possentia.

Hispani *Sandalos roxa* & *bermeia* vocant. Ital.  
*Santalum roſæ*. Gall. *Santal rouge*. Germ. *Noter San-  
del*.

Io. VVittich de Feb. Epid. cum mania præscri-  
bit Santalum rosaceum rubrum: & postea iterum  
Rhodosantalum, id est, rubrum odoratum, non  
vulgare, seu Pseudosantalum, quod nihil valet.  
Sed existimamus bonum illum virum, præscribere  
Santalum sibi incognitum. Tale enim nullum ha-  
ctenus nobis innotuit.

Cæterum Verzini vulgè dicti, seu Ligni Brasi-  
liani rubri puluere adulterari odoratum Santa-  
lum, annotat Cæsalp. Sed si odoratum esset ru-  
brum, faciliè detegretur fucus in his arboribus, vel  
ex odore remissiori. Non diffitemur tamen posse  
& solere Santali rubri puluerem illius loco ab im-  
positoribus diuendi: talem enim & nos habemus,  
ab institore quodam Santali rubri nomine da-  
tum. Sed ex dilutiori colore & facillimè inficien-  
te faciliè fucum deprehendes.

Santalo absolute apud authores posito, qui-  
dam rubrum accipi volunt: quorum sententiam  
non temerè improbauerimus, si ad calidos affe-  
ctus vsus esse debeat, quicquid ex Serap. clami-  
ter Apollo. Quicquid enim virum antea ex Ata-  
bis aliisque aduersus ardores & varios morbos  
calidos præscriptum est, huic potissimum compe-  
tere existimamus, quippe quod fugiditati proxi-  
mum, aut in primo refrigerantium [secundè  
nimirum in tertio Euch. Roel. statuit,] collocatum,

insuper etiam leuem quandam adstrictionem ob-  
tineat, in prædictis affectibus conuenientissimum.  
Consule itaque cap. præced.

Rubri Santali apud Indos exiguus est vsus, &  
rarus. Videntur tamen contra feruidas febres, eo  
tempora, frontem, & arterias inungentes. Ad alias  
regiones magna copia transfertur, potissimum in  
Lusitaniam Occidentalesque regiones, quod  
summi in Medicina vsus sit. Indi ex eodem ligno  
idola siue *Pagodos* & delubra sua interdum fabri-  
cant: qua de causa crassiora ligna magis expetun-  
tur, maiorique pretio redimuntur, auctore Gar-  
cia. Festuè sans D. Platerus docet in febribus ar-  
dentibus delirantes decipere infuso aut decocto  
santalorum rubrorum, eos qui vinum expetunt.  
Gratius & melius etiam efficitur, si addito Gra-  
natorum succo vini aliquem saporem ei concil-  
lies.

Porrò rubrum Santalum non nascitur in Ti-  
mor, sed loco valdè distanti, videlicet in India  
intra Gangem fluium, in Tanasarin, & mari-  
mis quibuidam Charamandel: ex his locis omne  
Santalum rubrum adferri pro certo allerit Gar-  
cias.

## ABELICEA SIVE SANTALVS ADVLTE- RINA CRETICA.

### CAP. XXXVII.


ABELICEA auctore Hon. Bello, arbor est ma-  
gna, recta, multis ramis prædita, aspectu  
pulebra, cui folia Alaterni, sed rotundiora, pro-  
fundè serrata: [quos flores proferat, ignorare se  
fateretur.] Fructus magnitudine Piperis, figurà qua-  
si rotundus, colore inter viridem & nigrum me-  
dio: materies ligni dura, & paululum odorata,  
pulvis enim huius Santala imitatur: unde Pseu-  
do-santalum Cretica iure appellari posset. Arbor  
hæc in solis montibus Leucis, eorumque altissi-  
mis iugis provenit, & ex ea trahes sunt.

Antiquis idem ignotam fuisse putat, nisi VI-  
mus montana Theoph. descripta l. 3. c. 14. Sed folia  
neque leuiter serrata esse, neque magna, vt Piri,  
verùm longè minor. Vocatur *ἀμύλκη*.

## BRASILIVM LIGNVM.

### CAP. XXXVIII.

BRASILIVM auctore Hon. Bello, arbor est ma-  
gna, recta, multis ramis prædita, aspectu  
pulebra, cui folia Alaterni, sed rotundiora, pro-  
fundè serrata: [quos flores proferat, ignorare se  
fateretur.] Fructus magnitudine Piperis, figurà qua-  
si rotundus, colore inter viridem & nigrum me-  
dio: materies ligni dura, & paululum odorata,  
pulvis enim huius Santala imitatur: unde Pseu-  
do-santalum Cretica iure appellari posset. Arbor  
hæc in solis montibus Leucis, eorumque altissi-  
mis iugis provenit, & ex ea trahes sunt.



Rasilium  
vulgò dictū  
dum & pon-  
derosum lignum  
est, delibratūq;  
ad nos importa-  
tur, pedibus  
satis rectis, colo-  
re sanguineo fo-  
ris, & quā parte  
imbres Solēmq;  
est passum, in-  
trinsecus autem  
dilutius rutilē-  
scit: sapore dulci  
est, saluamque  
commansum, aut  
liquorē cui fuerit  
infusum, colo-  
re rubro tingit.  
Cordus sic de-  
pin-



pingit. Presilium lignum aliquam in materia cum Acere habet similitudinem, colore tamen rubet: inuenitur etiam in russo candicans, sed prædictum melius est: crassitudine Guaiaco æquiparatur: pedicines habet rectos, ideoque faciliè finditur, scobina asperiore in assulas redigitur, quæ in liquorem, quo decoquantur, rubedinem suam deponunt, tinctoribus expetitam, scribendis etiam rubris literis aptam. Eligito materiam eius ruberrimam. Decorticata ad nos adfertur, ut pluias, vel alias ex industria affusas aquas faciliùs imbibe-  
re possit: hoc enim paucò id quod pallidius est, floridiorem acquirit colorem: quidam etiam lixiuio humectant: faciliè deprehenditur: purpurascit enim in superficie, intus remanente pallore. Saporem habet modicè dulcem.

Arborem Cardanus non magnam tradit, Enzine similem, sed tenuiorem, & magis obliquam: folium quercinum non tamen asperum: corticem ex arbore propter spicacitatem spontè excidere. Lignum colorum varietate, cum aliis arboribus certare. *Verzinum* vocari.

Longè aliter describit Theuetus, simulque modum tradit quo reperta sit hæc arbor. Portugaleses [inquit] regiones perquirentes, [nempe terræ Americæ] viderunt pennas rubras, quarum tingendarum rationem resciscere voluerunt. Quibus ab incolis lignum Bresilium ostensum fuit, visu pulcherrimum. Cortex exterior totus cineritius est: lignum internè rubet, maximè in medicullio, quod excellentius, cuius etiam plus asportant. Tunc igitur magnam aduexere Portugaleses quantitatem, quod adhuc fit. Hæc arbor folia fert similia Buxo, ita parua, sed spissa & crebra. Nullum gummi emitit, ut quidam alia. Olim maioris fiebat quàm nunc fit, maximè in Oriente.

Lerius arbores in Quercuum altitudinem ex crescere scribit, quoddamque arbores tantæ esse crassitudinis, ut tres homines amplecti non possint. Folia Buxi esse viridiora, fructum non ferre. Lignum non esse humidum ut pleraque ligna, sed naturaliter siccum: vrendo minimè & penè nullum fumum emittere, cinerem quoque tingere. Qua ratione *Bresilium lignum* differat à *Santalum rubro*, antea dictum.

Apud Veteres nihil de hoc ligno proditum no- uimus. Exilimatur tamen primò Lignum hoc ex Regina Saba Salomoni delatum, cuius sit mentio in historia 1. Regum dictum *Dalmagin*, ut notat Theuet. Magnus ille dux Onesicritus in itinere insulæ Taprobanae sitæ ad mare Indicum Orientale, attulit huius magnam quantitatem, quod multum probauit Alexander.

Rondel. in proximi l. cap. de Apoplex. tradit Castaneas quæ adferuntur ex India forma renis. esse fructus Ligni, quod vulgè dicitur *Bresil*. Verum cum Theuetus dicat Brasilianam arborem non ferre fructum, per Castaneam Rondeletii intelligimus *Catons*.

Peculiare quid, more suo Casalp. quoque sapit. Spinam vulgarem fullonum, quam in Hispania Aspalathum vocari à quibusdam testatur Plin. hodiè *Verzinum* vulgè vocari, Lignum rubrum crassitudine tibiam excedens, rubeo colore inficiens, cuius puluere adulterent odoratè *Santalum*. Sed eius opinio de Aspalatho iamdudum explosa est à pluribus, aduertat etiam Lector arboris Brasiliæ crassitudinem longè aliam traditæ ex Leriò.

Qlorius in Brasilia admodum frequenter & altissimas dicit arbores. Earum quoque aliquoties

meminit Pet. Martyr. de rebus Oceanici & noui orbis, Achores Coccineas vocans, quarum lignum mercatores Itali *Verzinum*, Hispani *Bresilium* appellant. Gesn. *Bresilium lignum* & *Bersilicum*. Fuchl. notat *Verzinum* vel *Bresilium*, quod è *Brasilia* adferatur. Incolæ *Arbortam*, Theuet. It. *Ligno Verzino*. Gal. *Arbre de Bresil*: *Eois de Bresil*. Germ. *Presilgen holz*.

Casp. Bauhin. apud Matth. Bresiliæ ligni duo genera facit: alterum rufum, alterum citrinum: rufum aliud ruberrimum esse, aliud in russo candicare: hoc tinctoribus expeti. Citrinum verò *Bugia* vocari. Verum hæcenus apud neminem legimus vllam Bresiliæ citrinum siue *Bugia* ex Brasilia adferri.

Ceterum iam auctorum nostrorum memoria deportari cæpit hoc Lignum ex Brasilia aliisque insulis longo Liburnicarum nauigatu quæsitum. Munsterus in Calcut & regno Pego nasci scribit. Maffeo teste, ea Regio ubi crescit S. Crucis nomine vocata in aliquot annos: sed à Brasilia rubro ligno, superinductum Brasiliæ cognomen.

Theuetus monet Bresiliū quod prouenit versus fluiuium Ianarel, Morpion, & Capo de Frie, melius esse altero. quod nascitur versus Canibales & totam regionem Mirignari.

In Officiis Europæ hodiè nihil frequentius, vsus, imbuendis magnopere velleribus aliisque rebus expetitur, ex quo Insectores magnum faciunt quæstum. Nam ut obiectauit Ruell. in tenuissima segmenta vel taleolas findunt, & aliquot diebus macerant lanas, elutriatæque cortinis incoquant, ut succum liberaliter ebibant. Colortantò dulcior, quantò saturitate fraudatà, minus saniei huius epotantur. Sed si plus suntu velle-  
ra, ut largius succo satientur, inebrientiur, subnigricante colore resurgunt. Cætare is infestius color cum purpura, si pannis tam pertinaciter hære-  
ret ut primam gratiam gestatu, attritu, aut vsu non exueret. Sed vellus huius succi non semper tenax, in rubrum colorem degenerat.

Qui librorum mangonio dant operam, segmèta ligni aceto tantisper macerant, dum omnè coloris vim ad se rapiat, cui nonnihil gummi, ne char-  
tas penetret adiungunt.

Alii lixiuio potius, & adhuc feruente illius scobem immittunt: vitro detrahi. m. optimum est ad hanc rem, quia tenuissimum, sufficitque ligni pars octaua, additòque modico aluminis inter cineres calidos per horam excoquitur, protinusque in vsum admittitur. Nec opus hic gummi Arabico, nisi splendicantes literas habere voles. Alii etià loco aceti aut lixiui aquam simplicem sumunt, sed efficacius priora tincturam eliciunt. Si diutius coquas quàm par sit, sanguineum colorem acquirere: sed si pergas, cæruleus aut atropurpureus. Neutro tamen modo, ni protinus in vsum admittatur diu seruari potest. Tempore enim mutatur, quemadmodum & in velleribus ipsis. Hæcque non ineleganti purpureo librorum margines ductis concinniter lineis exornant. Itidem atramenti scriptorii vice, voces quas velint marginibus adnotari, hac roseacea sanie sparsim exarant. Quare roseum, vel potius Rosetum vulgus nominant. Hoc tam eleganti venere libros commendat, ut lassos & continuo conspectu nigritiæ & candoris fatigatos, oculos sua iucunditate recreet.

Cinis quoque tingit lintea colore rubro, ut nullo sapone possit elui: quod & se obseruasse aliquando testatur Lerius. Indi eodem ligno vtuntur ad tingendos funiculos suos bombacinos &

Arbor  
coccinea.

Bresilium.  
Bersilicum  
Verzinum  
vnde.

Genera  
duo.

C. Bauh.  
not.

Locus

Delectus.

Vsus.

Tingendi  
modus.

Liquor  
rubrus ad  
scripturam

Alia pa-  
randi ratio

Referunt.

pennas, quibus elegantissimam coloris gratiam conciliare norunt.

Iam in multas rerum perpulchrarum formas lignum tornatur. Hoc etiam fabri lignarii ad tenuoscellulas ad opum pretiosiorum lautitiam & elegantiam vtuntur. Eodem etiam gladiorum cultellorumque manubria muniuntur & alia leuia opera tam tornatili quam dolatili opera fabricantur. Nec omittendum hoc loco Fallopi experimentum, quo dignoscas alumen in aquis medicatis seu thermalibus contineri. Coquatur lignum Bresiliū ex aqua donec penē nigrescat, de qua affunde supra sedimentum destillationis illius aqua, & si alumen addit, color ille ad nigredinem vergens mox reddetur dilutior clariorque. Huius ligni vis medica nulla hactenus innotuit nobis.

Ita dignoscas alumen contineri in aquis medicatis

#### BRESILIO SIMILE LIGNVM VERNIMBOCK GERMANIS DICTVM.

##### CAP. XXXIX.

**Descriptio** Vidimus apud quendam Fabrum lignarium Vnam metricam, ponderosam admodum, quippe quæ aquæ iniecta statim sicebat, solida Ebeni instar, rubens, Illud lignum Vernimbock nominabat. Ait in oppido Wittenbergico Bals Infectores eo vti ad tingendum. Vnde Braunprezilgen nominant, quasi dicas, Bresiliū purpureum. Argentina non incelebri emporio perquirentibus, quid esset Vernimbock, si ista duo obtulerunt Infectores, ex quibus in quæritia, intus rufesca, solida valde, & pondere suo aqua fundum petens. Legenotus D. Frid. Meyer, Armamentarius Argentinenfis elegantem colorem rubrum pro scripturâ parare dicebat, addito gummi & alumine. Idem aiebat, adiecto puluere concharum lacustium purpureum reddi colorem.

Vnde liquor ad scripturam

In quo descriptum

Hoc lignum differt à Bresilio nobis Genevæ pro Santalo rubro exhibitio, quod non fidit, habetque quo cum Eguineo ligno nonnihil conueniat, [si colorem deimas] præsertim maculis illis transuersis atque crispantibus per substantiam eius sparsis, neque dulcorem illum masticatum præbet.

Vernimbock vocant fortè Germani descriptum lignum, à loco vnde deservit: scribit enim Theuetus, consuetudinem esse arbori à Lusitanis, quæ nominatur Fernamboea, vbi syueltres homines mercaturam cum eis exercent.

An Cordo in Obi. Materia arboris cuiusdam peregrinæ, colore inter Sandalum rubeum & Bresiliū medio, ex qua faciunt capulos cultorum Norinbergæ.

#### ARBOR ΜΗΠΟΖΙΛΗΡΟΣ ΣΑΛΙΓ.

##### CAP. XL.

**Descriptio** GRæcum fortallè nomen à nobis inditum plus historia conueniet, quàm ingenio nostro. Tam enim est prope mendacium, quàm nos à voluntario mendacio alieni. Animi tamen gratia reponetur hic. In Iaua maiores, aiant, raram esse arborem, cuius medulla ferrea sit: exilis illa quidem, cæterum porrecta ab imo ad summum planta falligium. Atque eam fractum gere ferro impenetrabilem. Eadem refert Nic. Costinus in Itinerario suo. Deinde expergiscamur.

Mirabili

#### LIGNVM BRESILIO SIMILE COERVLEO TINGENS.

##### CAP. XLI.

**H**aud ita dissimili facie Bresilio est lignum quoddam à Porentruensi Pharmacopæo nobis donatum, colore & pectinibus Bresili vulgaris, sapore tamen luculentiore, & cum dulcedine nonnihil acti, & odore grato, quem acquisitum negant: sed lignum esse recentius, quod odoratus: in segmenta diuisum solent Officinæ Galliæ diuendere, quibus dicuntur Bas d'Inde: Germanis Pfeil: hoc etiam leniter masticatum cæruleo colore tingit, idè à tinctoribus expeti aiant, ad coriorum & telarum tincturam. Montbelgardenfes & Porentruenses accersunt ex Trecenti vrbæ & Argentina, emunt libram aliquot grossis: tincturam meliorem reddi dicunt, addito Alumine.

#### LIGNVM VIOLACEVM BRESILIANVM.

##### CAP. XLII.

**V**idimus in Bresilia, inquit Leriis, lignum naturaliter violacei coloris, & eo ligno attulimus regulas. An Hist. Lugd. ex Theuetio Arbores in America ligno purpureo, ex quo pulcherrima tinctoria fieri possent.

De hoc autem ligno sic Theuetus: In America provent lignum colore purpureo, ex quo meo iudicio, pulcherrima sculpturæ parari possunt. Dubito an fuerit Lignum purpureum, in quo Plutarchus scribit Caium Marium Rutilium præmum Dictatorem ordinis popularis inter Romanos, etiam seculi ætatem, post mortem eius 369. digitis minores: delatum fuerat lignum ex suprema Africa. Est & quoddam lignum Violaceum in Arabia d. eum L. in Africa non descriptum. Atque, quo vtuntur Medici ad Luem Veneream curandam: Iuniperus maior Scalig. quam suo loco trademus.

#### LIGNVM NEPHRITICVM, COERVLEO ET FLAVO TINGENS.

##### CAP. XLIII.



Inde strius &c. Iudicis illius Ducis V. Vitæ. Medicus & collega noster Do. Schoplianus mandante E.C. misit nobis nomine Pali Indiani cæterè ligni huius, fibræ sanè factū, amplum satis, cuius Diameter fere quadratus, cuius pulchritudo non vulgaris ex variantium lineærum emblemata resurgens. Et simul eisdem ligni scobem, colore rufescentē, sapore nullo manifestò: quæ in aqua macerata eam breui spacio mirabili colore cæruleo & flauo tingit, quæ lumi-

ni ub



ni obuerta Opali lapidis Gemmæ variantem colorem pulchrè repræsentat, ita vt in ea vario modo igneus, luteus, & rutilus splendor, & fulgens purpura, & virens mare incredibili pariter mixtura tranſiſcant.

Eiusdem ligni ſpeciem, eodè nque colore variante tingens fruſtulum accepimus nomine ligni Bezoardici ſeu aduerſus Venena, à quodam Italo, cuius hiftoriam mox recitabimus. Hoc ſaturatius rubet Santalo, & ad ſpiceum non nihil tēdit, peſtibus rectis, nullo nec odore nec ſapore, fortè quia euaniidum, materie ſatis dura.

Mitit, inquit Monard. noua Hiſpania ligni quoddam genus craſſum & enode, materia Pui, cuius vſus iam diu receptus fuit in his regiombus ad renem vitia, vrinæ difficultates & incommoda. Poſtea experimento compertum eſt, eius aqua in icteris & lenis obſtructionibus vtile eſſe. Fit autem hoc modo. Lignum aſſulacim & minutim conciuſum in optima & limpidiſſima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus abſumpta ſit. Dimidia hora poſt inieſtum lignum, aqua cœruleum dilutiorem colorem contrahit, qui ſenſim intenditur pro tēporis diuturnitate, tamen ſi lignum candidum ſit. Id adulteratur ligno illi ſimili, quod aquam croceo colore inſicit: de quo poſtea. Hac aqua qui aſſiduè vtuntur, eà vinum diluentes, mirabiles experientur effectus ſine vlla humorum commotione, neq; alio opus eſt victus ratione, quàm temperata: aqua enim ſapor non magis immutatur ligni iniectione, quàm ſi pura eſſet, & nihil in ea maceratum. Calidum & ſiccum eſt in primo gradu.

Cum poculo & ſcobe prædicta, miſſa ab E.C. adiunctum erat hoc ſcripſum. Paſſign. Indiani ſcobis vnc. j. in viciis viij. aquæ font. loco calido horis 12. inſuſa, & tepida aſſumpta inſuſo manè ſtomacho ieiuio, in dolore lumborum & prouocanda vrina plurimum valet. Idem præſtat ſi aqua aliquandiu in poculo ex cuiſmodi ligno parato inſuſa tepida bibatur, repetendo quoties opus fuerit.

Cæterùm Italus, quem dicebamus, ſui Bezoardici ligni libram j. duodecim coronatis Solaribus æſtimabat, promiſſo experimento extemporaneo. Cōuenit ſtudioſorum non paruus numerus, (qui hæc noſtra commentaria legentes, hoc ipſum teſtari poſſunt) inter quos & ego Cherlerus, docente, & præeunte nobis, more Monſpelienſibus laudatiſſimo, Cl.D.D. Pradilao, profeſſ. Regio, viro Gratiſſimo. Adſunt galinæ duæ, cuique eam pulte ſatinacea inſtruitur Arſenicum ſcrupulus. Sed alteri de aqua, quam ex inſuſione ſcobis prædicti ligni paratam habebat, apponitur, quam miſſella gallina ob intus excitatum ardorem auide haurire, ex parte reſociata quidem, nihilominus tota ea die moribundæ ſimilima videbatur. Euaſit tamen tandem, vt aiebat Pharmacopœus, nescio an corruptus vel largitione delinitus. Altera verò, quæ nihil de illa aqua hauſerat, variis iactationibus conuulſionibusque fatigata, miſerè interiit. Hic ſtudioſorum caterua alteram ſuperuiuentem conſpiciens, certatim de ligno poſcere cœpit, ſoluto pretio, ſed remiſſiori, [pro ſingulis vnciis mediū coronatū, vel aſſes aut ſolidos 10. regios, niſi fallor.] D.D. fruſtulum obtulit dono. At ego quiritari & cauſari, aquæ frigiditati ac copia potiùs eam vim dicandam, quæ ardentiffimi veneni vim retuderet. Italus impoſſurū detectā, ſequæ præſenti lucro priuatū iri vidēs, me tantū boni fruſtulo beare, blanditiſque delinire felici-

cius potuit, quàm debuit, vt tacerem. Nec caruit experimento ſuſpicio. Nam ſequenti die præſentibus aliquot ſtudioſis idem penitus obſeruatum in columbis, quibus itidem Arſenicum exhibitum, altera epotā aquā ſimplici ſed frigidiffimā ſoſpes euaiſit, altera interiit.

Porò dubitamus an de hoc ligno intelligat Go-ropius, quando ait: Lignum quod à colicis doloribus curandis quidam mihi nominarunt, nec dum ad vſum medicum vocauit.

Cæſalpinus qui nunquam non aliquā nouitate ſtipatus incedere ſolet, ex Fraxini genere ſuſpicatur lignum in noua Hiſpania repertum, cuiusamenta in aqua poſt horæ dimidium cœruleum elegantiffimum reddunt, cū ipſa candida ſint.

Vtuntur (additidem) aqua prædicta in potu quotidiano vſu cum vino ad Renem morbos, vrinæ difficultatem, & Iſehiadicis. Eiusdem ex eodem meminit Camer. Hiſt. Lugd. Lignum ad dolores renem vocat. Catal. Francof. Lignum nephriticum: Griſſholg.

Lignum ab colicam.

Fraxini genus.

## LIGNVM CROCEO TINGENS.

## CAP. XLV.

Hoc eſt illud lignum quod paulò antè diximus nephritico ligno ſubſtitui, & aquam croceo tingere, vt teſtatur Monardes. Plura de eo dicenda non habemus.

An Theuet. Americæ Lignum luteum ex quo aliqui ſuos parant enſes?

Conſiderandum an taſe quid inſinuet Serap. quando ex autoritate Aben Meluai tradit *Virtz* afferri ex prouincia Iaiemen, eſſe corticem arboris, ex quo paratur color ſimilis croco. Sub *Virtz* nomine eodem loco meminit aliarum plantarum ex variòrum autoritate, de quibus ſuo loco.

An Virtz Serap.

LIGNVM CANDIDVM FVNGOSVM  
cotis vicem præbens.

## CAP. XLVI.

Anno 1597. è Iaua maiore delati ligni fragmentum datum ſibi, ait Cluſ. Exot. l. cap. 8. valdè leue, vt nihil niſi Sambuci medulla quodammodo videretur, fungosâ materiâ conſtans & candidâ, cortice admodum tenui, & quali mēbranaceo teſta, cineracei coloris. Interrogatus à me Abdala Guaratenſis, quem Batau nautæ Amſtelredamum aduexerant ex Iaua, vbi aliquot annis vixerat [aliqua enim ex parte Luſitanicam linguam callebat] quod eſſet huic ligno nomen, & quis eſſet eius vſus, de nomine quidem nihil reſpondebat, ſed eduſto ſuo cultello, ſignis mihi innuebat, ad cultorum obtuſam aciem exacuendam inſeruire: & ſanè poſtea faciebam, atque ad id præſtandum valdè commodum eſſe deprehendebam.


Ligni exotici ſuaeſcentis, venis à centro ad circumferentiam ductis à Gareto accepti deſcriptionem tradit Cluſ. Exot. l. c. 67. ex quo petendâ relinquitur.

Deſcriptio

## CANDIDISSIMVM LIGNVM BRASILIANY.

## CAP. XLVII.

**Descriptio** IN Brasilia scribit Leticus vidisse se Lignum candidum vt charta siue Papyrus. Theuetus quoque tradit in America nasci arbores ligno candidissimo & tenerissimo, nullus tamen apud Americanos pretii. Consideretur Tocur gehit arbos, cuius lignum a suu nate und nis, Authore Piagolo, cuius meminimus Hist. n. l. 9.



## LIGNVM LEVISSIMVM.


## CAP. XLVIII.

**Descriptio** Gener. Io. Henricus Cherlerus rediens ex Anglia attulit ligni portionem cum hac annotatione : Ligni leuissimi frustam crassitudinis crassioris carpi, vlnatis longitudinis habuit D. Iacob. Garetus Pharmacopæus Londinensis peritissimus, misit D. Clusio, deditque mihi portionem. Hoc sanè lignum leuissimum est, per transversum si cta rotula, sua circumferentiā maiori ex parte rotundā, ni quadam parte totum fungosum, cuius superest etiam aliquid corticis tenuis cinerei, totum suberi simile fluscescens, distinctum circularibus lineis, ignem facili concipit, odor nidorulentus, sapor subsalsus, quem acquiescitium suscipiatur. De quo ligno etiam Clus. Exot. l. c. 8.

## COCCIGRIA: SIVE COTINVS PVTATA.

## CAP. XLIX.

**Descriptio**



**Plin.**

dullā multā sarctos, quibus folia pediculis subrubentibus semuncialibus & vncialibus alternatim adnascuntur, ex oblongo rotundata. Pistachiorum foliis paria, glabra, nervosa, odore quodammodo. Lentiscino, gustūque adstringente, non iniuncto tamen: sub ætatis finem rubescunt, elegantissimōque nitore oculos oblectant, id notante Clus. Ramulorum fastigia infinitos propemodum Meandros tenuissimorum sed rigidorum filamentorum latē diffusos sustinent,

pilis plumatim obstitas: & in his obiter semina compressa rubentia Lenticulis æqualia: Cæsalpino fluscescentia, quasi triangula, duro putamine, se lob reauitate in impartibili, [vt ille loquitur.] Materies flaua, solida, pectinibus rectis, externis orbibus albis cantibus, interna parte vsque ad matricem fungola. Flores scribit Clus. esse ex herbido pallecentes: radicem duram, lignosam, raris fibris donatam, vt in Terebintho.

Huius arboris lignum videtur nobis sic à Cordo describi. Presilium Citrinum, id est, Bugia, longi sunt baculi, crassitudine quā ferè manum impleant, rectis per longitudinem descendentibus pectinibus. Colorem habet flauum vel citrinum, dolabris in tenues & fascis similes assulas scinditur, quæ in aqua decoctæ, luteum vel citrinum remittunt colorem, quo fullones tingendis lanis & pannis vtuntur, in gustu ferè nulla qualitate linguam afficit.

Hoc est illud lignum quod C. Bauh. apud Mathiol. Bresili [quod ex Brasilia adferatur,] alterum genus, nempe Citrinum, quod Bugia vocatur, facit: verum hoc lignum ex Brasilia vel India adferri, apud neminem hactenus legimus, vt cur Bresiliū dicatur, aut dici debeat nondum nobis constat.

Si quæ alia planta hodie cognita, certè hæc, quam inod descensimus & pictam damus, ad κοκκινιά Theophr. referri posse videtur, quam sic describit. Coccymeia [κοκκινιά] Arbuto & Adrachne folio similis est, sed arbuscula parua. Peculiare in hac, fructum eius in pappum faciesse ac resolui [ἐκ πωπιδων τὸν καρπὸν.] Hoc enim de nulla alia arbore accepimus. Sed planè videtur ea vox κοκκινιά esse mendosa, etiam doctissimorum Herbariorum calculo. Gaza antiquam vocem retinens, & hanc potius respiciens satis fecurè conuertit Prunum. At quod Pruni genus in pappum seu lanuginem abeat, vel quæ Prunus similis sit Arbuto, nec sciuit ipse, nec hactenus obseruatum. Prudentius igitur Græcam vocem retinuit. Potuisset etiam animaduertere apud eundem Theophr. aliam κοκκινιά, hoc est, Prunum ab hac planta diuersam esse descriptam, quod sanè auget suspicionem lectionis mendosæ.

Mendosè in H. fl. Lugd. legitur κοκκινιά. νε κοκκινιά legit Ruell. Certum verò est Plinium legisse κοκκινιά, doctissimorumque virorum iudicio eandem ille Cotinum vocat.

Eandem etiam esse cum Coccygria eiusdem Plin. censent Anguil. Dod. Pena & Lob. Dalech. Const. Taber. Casp. Bauh. Sed videntur in tanta breuitate Cotinum nimis securè eandem facere cum Coccygria. Nam quid similitudinis habent inter se Coccygria & Cotoni descriptiones Plinii.

Clus. certè consultissimus Botanicus satis circumspexit: Cotini, inquit, Plinius meminit breuiter, vt nemo facile colligat, an ei stirpi, quæ apud Herbariorum vulgus tale nomen obtinuit, Cotini appellatio rectè applicata sit. Coccygriam tamen eiusdem fatetur plurimas notas habere nostræ stirpi conuenientes. Dicamus iunioribus quales. Parua est arbor. Est & nostra. Nec folia malè conueniunt. Sed an nostræ semina vel fructus, in papposa illa filamenta facessant, nondum obseruatum. Iisdem obseruatum adhærere, qualia antea descripsimus. Vt & hoc dubium explicandum restet. Camer. quoque hasitanter pronuntiat, in eo imitatus Clusium. Dubitat quoque Cæsalp. non segnis alioqui ad pronuntiandum.



Sed nec Plin. abeat absque censura. Falsum enim quod ait: nullius arboris præter Coggygie fructum amitti lanugine, seu pappo: nec videtur agnouisse Salices, Populum & similes, aut saltem earum non recordatum. Cautius Theophrast. de nulla id alia inaudisse. Cæterum, de sententia Clusii, aptius hanc stirpem Cocconeian, aut Coggygiam [si quis fortè Theophr. sic scripsit: cum Plin. censet.] appellabimus quàm Cotinum: cum ad m. & Theophrast. & Dioscor. Oleaster sit.

Sunt verò, (vt Dalechamp.) qui Plinii Cotinum esse putent, quod Scythiæ, tanquam Scythicum lignum Græci vocauerunt: alii Thapsum: alii Chrysoxylon, flauo melinòque colore, & lanas tingens, & capillum.

Matthiol. in post. com. Cotinum esse ait foliis odore subgrau, Gallæ contuse modo, caudice humano brachio paulò minore: gerere plumosam congentem, umbellâ ferè speciem præ se ferentem, colore ex candido rufescente, in qua filiquæ oblongæ, Hyperici ferè similes: in quibus semen conclusum: vocati vulgò *Rose* & *Scitano*. At hætenus non legimus à quoquam obseruatas filiquas, nec ipsi obseruauimus. Sed fortè Matth. non recordatus se de hac planta alibi scripsisse, imaginatione sua fuit deceptus.

Gesl. l. Hort. *Barba Iouis Plinii*, arbutula Terebintho cognata. Spontè circa Vrbanum nascitur: fortè Coccygia Theophrast. Idem abbat. eiusdem operis: Styracem arborem, inquit, ad quatuor cubitos enatam si bene memini, idque è semine, nifallor, vidi Augustæ in hotto doctiss. med. Ad. Oconis, qui ad me scripsit, bis verbis: Styracem meam quodammodo bifurcatam, in duas partes radicatis, & ex vna arbutula duas feci satis insignes. Hæc arbor mir. sicè me delectat, tum quòd sciam nullam eius generis reperiri in Germania nostra, præterim finitimis huic nostræ ciuitati regionibus: tum quia foliorum etiam florum pulchritudo speciosa videtur: de fructu in hisce partibus despero. Sed idem Gesl. in alia quadam Epist. ad eundem scribit: Non est Styrax, quam mihi demonstraueras arborem Augustæ, sed Barba Iouis à me olim existimata, quòd incanum veluti barbam circa fructum suum funderet. Recèdè Gesl. Styracem esse negat, quod vel ex eo patet, quòd hæc nostra folia nò habet lanuginosa vt Styrax: neque hæc Barbam fert. Iouis quoque barbam Plinii, non censemus, cui folia argentea, quod nostræ arbutulæ non conuenit. Terebintho quoque cognatam non ausimus dicere: non enim est resinifera. Folia quoque manifestam differentiam faciunt: in illa plura ex vna costa emergunt, vt in Iuglandæ, in hac nostra singulata sunt.

Turner. pingit sub titulo Rhus: descriptio tamen quam ponit, non quadrat figuræ.

Clus. annotat, hoc frutice ad paranda Coria, vt Coriarios non minùs quàm Rhoe, cum alibi, tum circa Viennam Austriæ, ibique vocat Rhois vulgare nomen Sumach indidisse.

Hinc Dod. Cotinum coriariam vocat: sed quando ait esse Vlmi foliis, prodire plantam cuius iconem exhibet non nouisse. Vlmi folium hirsutum est, asperum, longum, serratum.

Lob. & Pena & adu. Rhus 2. Theophrast. dicunt. Sic enim habent: Coccigia Theophrast. Cotinus Plin. & Theophrast. Rhus alterum: vt vel Cotinum Theophr. dicere velint, vel Theophrast. Rhus alterum. At nullam Cotinum apud Theophrast. nouimus, quæ Plinii Cotino

possit respondere. Rhus quodque Theophrast. esse non potest, cuius meminit lib. 3. cap. 18. vbi Giza vertit: fortè in Adu. non legendum Rhus alterum, sed Rhus Allobrogum. Neque enim credimus Pen. & Lob. tam differentem plantam cum hac nostra seu Coggygia confundere voluisse, quam eleganter sic depingunt. *Kalm.* sunt cirrei flocci, quales in galeis aut galli gallinæ vertice visuntur, quæ de similitudine floris, diæus fuit hic frutex, qui è summis virgultis, quinà n. cubitorum altis, pulcherrimum lanitium tollit, sericeo vellere & contextu calamistratum: quod crispatur & explicatur in latam Cæsarium, crinibus puniceis, fulcis, tortilibus, semine lentis minore, ex nigro rufescente: caudice & virgultis fuscis, vimineis: foliis circinatis, densis, rigidis, Capparis, Pistachiam aut Terebinthum redolentibus, & concoloribus. Quo magis miramur, tantæ venustatis stirpem frequenti vsu & mercatu ad coria curanda expetitam indiciam esse Commentatori Matthiolo.

Casp. Bauhin. annotat Oleam Aethiopicam Hippoc. nominari solitam à Guilandino. Pahniois *Farblauß* / Dod. fortè leg. *Farblaub*. Sabaudis *du Fuster*: Allobrogi. *Rhu falsò*, sed propter vsum in tinctura: Appennini incolis *Scitano* & *Sesteno* corrupta Cointi voce, Const. Quidam & vsus & similitudinis argumento Germ. *Gelb* presilgen holz quasi dicas *Bresilium flauum*. *Scotannum luteum* Scaligero.

Copiosè nascitur in Italia Lombardica inter sepes, vt obseruauimus Patavio, per Vicentiam Veronam, Bresliam, Pergamum, [finitimâque vrbes animi gratiâ lustrantes] Mediolanum tendentes Iunio, quo iam desloruerat, & citiorum fructuumque specimen ostendebat: sed humiles ferè sunt omnes, & vix videas hominis altæu lineam superantes, paucas æquantes. *Fl. rer.* circa Viennam Austriæ Maio: calidioribus locis maturius. Fructus maturescit Iulio & Augusto.

Crescit spontè in monte, Badensisbus thermis quæ à Vienna quatuor miliaribus absunt, imminente, vicinisque quibusdam montanis locis, vbi interdum ad eum pumila nascitur, vt vix cubitale altitudinem attingat. Clus. Prouenit & copiosè in Tridentino agro, potissimum in Apénino monte: in Histriæ alpiibus, in Pannoniæ superioris siue Austriæ: tum & in Hungariæ ac Bohemiæ arduis syluis, si Dod. credimus. Auriaco agro quatuor miliaribus Auenione, quæ insulas & aquas Sextias itur, magnus prouentus est. Lob. Ex ramo auulso diu vindis remansit sed non re-

germinauit sata Gesnero: vnde colligit plantam hanc diu durare posse si semel apprehendat. Vidimus etiam inter Camberium & Lugdunum: quòd lignum copiosè aduehitur ad tincturas, quæ admodum & ad alia loca tinctoriis officinis celebria. Itali qui Serici confectioem & tincturas instituunt ostenderunt nobis Stutgardiæ 1600. ramenta ex Italia delata nomine *Scodano*. Valer. *Scodano*. Dourez ad ipsam plantam annotauit Guilandino dici Chrysoxylon apud Anac. ita etiam vocabat Vlyss. Aldroandus cum essemus Bononiæ.

Radicibus vtuntur infectores, illique panum ruffo [rosso] colore inficiunt. Foliorum etiam & ramulorum vsus apud Coriarios in repurgandis coriis. Anguill. Idem ramis luteo tingunt, teste Const. qui tamè Plin. verba explicans, quando ait: ad lineamenta modo conchylii colore insignis, id de cortice intelligendum tradit. At nos ligni tantum vsus, nullum corticum obseruauimus cum Anguill. & Cæsalp. qui ait: cau-

Cotinus  
vnde dicitur.

Matth. not.

Olea Aethiopica.

Locus

Tempus.

Satio

Scodano.

Chrysoxylon.

Vires. & vsus.  
Tinctura.

Tépera.

*Ulcera  
Defluxio  
Fauces.  
Ulcera ge-  
nitalium.  
Menfes.*

*Alui deflu-  
xiones.*

dicibus decorticatis infectores vtuntur: flauo enim colore tingunt. Vis illi adfrictoria insignis, exicans, cohibensque. Sanantur foliorum decocto in collutionibus oris & linguae vlcera, quin etiam columellae & faucium defluxiones. Valet etiam ad genitalium quoque vlcera, si eo saepe abluantur. Adduntur folia in deflexionibus, quae ad mentes cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito, inspersus, alui defluxiones quasunque compescit. Match. Possis etiam eiusdem decocti collutione dentium dolorem incipiente maius fluxione calida arcere.

B V X V S.

C A P. L.



Descript.

Materia.

Folia.

Observa-  
tio.Globuli.  
Flosculi.

Fructus.

Semen.

Chamae-  
xus.Buxus hu-  
milis.

**D**E Buxo nõ  
intempesti-  
uè nunc trade-  
tur, quodd Bresili-  
li folia [ de quo  
ante ] tradantur  
esse Buxi:  
sicut annotauit  
Theuetus, ita  
parua scilicet,  
densa & spissi-  
sa.

Est verò Buxus perpetua frondis arbor, densis ramis brachiata, cortice scabro, albo, ma-

teric durissima, flaua, nulla intus medulla, valde aequali, ponderosa, adeo vt aqua iniecta recta sit. Imò nec cariem sentire in aquis, notat Marth. Folia creberrima, æterni virores, splendentia, leuia, Myrtis obtusiora, firmiora, interdum concava, & quod notatu dignum, duplicia, quæque diligenti vel cultello ita se inuicem separari possunt, vt tenuissima & ferè pellucida alterius plantæ esse exercitatio. In quoque videtur: suntq; Buxi folia odore parum grato, sapore tamen ingratiore, quorum ortus, sicuti & ramorum ferè est aduersus: ex quorum alis secundum ramulos globuli racemati coherant, qui mox in flosculos staminicos flauescences explicantur, quos vascula excipiunt vireolis similia, vitidia, Myrti baccis paulò maiora, superiore parte umbilicata, & tribus vel quatuor veluti ausulis donata, in quibus semen continetur lucidum, Fraxinellæ semini simile. Radix magna ex parte nodosa tuberosaque, parte præsertim superna, & ex parte eminenti, qua materies eius crispæ & elegans ad varia opera expetita. Reliqua radix non magna, nec profunda, materie cum ligno eadem.

Vesuntii nomine Chamæbuxi ostendit nobis Cl. D. D. Chiffletius, eius vrbis Archiater & amicus noster singularis, arbusculam Buxi humilem admodum & vix bipedaneam, stipite tamen crassiusculo, cuius folia valde parua, Myrti Tarentinæ. Similem ramum nobis postea exhibuit lechell. iuuenis Iac. Miege. Basil. Med. studiosus, nomine Buxi humilis, dodrantalem, in aliquot mi-

nores diuisum, foliis prædictis, quem etiamnum in Herbario nostro sicco adseruamus. Eandem & Dod. describit ad duos aut tres tantum pedes attolli, ramos tenues admodum, foliis esse rotundioribus & dilutius virentibus. Theophr. Buxus [ *μύρτος* ] non est magna arbor, folio Myrti, nascitur locis algidis atque asperis: Etenim Cytorii montes tales sunt, in quibus abundè prouenit. Olympus quoque Macedoniae frigidus, in quo gignitur, sed non magna. Maxima autem & pulcherrima in Cyrene. Nam proceræ est, & cæteras crassitudine longè superat. Idem melinsuaue, Buxum redolens, attamen multum & copiosum. Serotina admodum fert fructum, ingustabilem cunctis animalibus. Materies eius grauis, quia densa, quæ ne arefacta quidem leuis redditur. Ob nimiam spissitatem omninò enodis, aut paucissimis nodis. *Hæc ille.* Quod postremum nõ perpetuè videtur veritatis. Vidimus enim, imò habemus in syluestribus natas, penitus propemodum nodis scatente ligno: sed id rariùs tamen obseruatur. Cùm autem id euenit, id fieri suspicamur à crebra ramorum ipsius supernorum abruptione. In cultis & maioribus quod sciamus nunquam.

Ennius lib. 7. Buxum amaro corpore dicit:

--- Longèque Cypressi

Stant rectis soliti, & amaro corpore Buxum.

Inprimis verò materies honorata Buxo est, inquit Plin. raro crispantur, nec nisi radice: cæterò lenis quies materie, silentio quodam & duritie ac pallore commendabilis, ipsa verò arbor topiario opere. Tria eius genera 1. *Gallicum*, quod in metas emittitur, amplitudinèque proceriorem. 2. *Oleastrum* in omni vltu damnatum, grauem præfert odorem. 3. Tertium genus nostrate vocant: *lyuestre*, vt credo, mitigatum sat: diffusius, & densitate parietum vitens semper ac tonsile. Flos non spernendus, sed causa amaritudinis mellis, præsertim in Cortice. Semen illius cunctis animalibus inuisum. Buxo è syluestrium genere folia non decidunt, quæ concava. Plurima fert Buxus, nam & semen suum, & granum, quod Carthegon [ Cratægum. Vet. & ch. ] vocant, & à Septentione vltum, à Meridie Hyphear. In quibdam omninò nullus fructus, vt in suo genere Buxo. Hæc cum Ebena spississima ex omni materie, idem & grauissima, graciles natura: neutra in aquis fluitat *Hæc Plin.*

Oleastrum, nisi mendosus locus sit, id Buxi genus vocant, [annotat Dal.] quodd Oleastri modo semper humile sit, ac vix vnquam in arbusculæ magnitudinem assurgat: & quodd reliquis generibus folium minus habet, quemadmodum Oleastri folia, si cum Oles conseras, breuiora & angustiora sunt. Idem proflus deceptum fuisse Plin. aut eius libertum Scribam putat. Nam cùm apud Authorem Græcum reperisset secundum Buxi genus *ἀγένητον* *ἔλαιον*, omnino syluestre & agreste esse, incautè legisse, *ἀγένητον* *ἔλαιον*, Oleastrum esse. Idem inepè scripsit semen Buxi Carthegon vocari. Nam cùm apud Theoph. Historiæ Buxi statim & Crategi descriptionem subiecisset, Plin. huius partem cum illius historia confudit. Ineptis idem Buxo tribuit, quæ de Illice Theophrast. scripserat. Sic enim ait Theophr. Præter glandem, puniceum granum Illex fert, ac insuper viscum & Hyphear, vt interdum contingat fructibus quatuor onerari, & quæ ille oscitanter adscribit Buxo.

Virg. crispas Buxi radices dixit.

Diosc. Buxi historiam non habet, quod mirum, arbo-



arboris tam vulgate. Sed cum is ad vires potissimum respiceret, & vsum eius in arte medica exiguum suo seculo agnosceret, idem forte omisit. Meminit tamen eius aliquoties: ut cum ait, Visci folium esse Buxi folio simile. Et alibi Lycium dicit foliis Buxi densis.

Elaiz 30. legimus: Scribe ei supra Buxum. Porro etsi Buxus nullius in medicina vñus, vt Veteres prodidere, non defunt tamen à Recentionibus, vt notat Matthiol. qui velint, non aliud esse Italis Buxum, quàm Indis lignum quod Guaiacum vocant, eà tantum ratione ducti, quòd pluries experimento compertum sit, eius decocto etiam faciliùs eos sanatos esse, qui Gallica Lue affecti erant: quod si experientia concedi possit, illud Buxi lignum præstare: attamen quòd Buxum in Italia nascens, & Guaiacum ab Indis petitiū vna & eadem sint planta [ vt in secunda centuria Amatus Lusitanus asserere videtur, ] nunquam profectò crediderim. Siquidem Guaiacum pingue, resinosumque visitur: materie intus nigra, Ebeni ferè modo. Quin & sapor huic amarior & acris, quibus omnibus notis siccam Buxi materiem carere constat. Quin etiam Guaiaco (vt narrant ii, qui ab Indis ad nos redeunt) folia sunt Plantaginis, breuiora, crassiora, durioraque: lutei flores, & fructus Iuglandis magnitudine. Buxus vero fert folia Myrti, breuiora: flores herbaceos, & fructum Myrto nusquam grandiorē.

Nihilominus sunt impostores qui propter vicinum vtriusque colorem, sæpe pro Guaiaco in Italia præsertim exponunt, inquit Cronenburg. Ast, mehercle, stupidos proflus atque rerum ignaros oportet esse eos, qui Buxum sumant pro Guaiaco: dixerimus penè Cretam pro Carbone, vt Cronenburgius parum in eo suæ experientia cōsulere videatur, dum vicinum vtriusque colorem asserit. Etenim quamuis venæ & radii interdum in Guaiaco appareant ad Buxi colorem accedentes: tamen ita substantià differunt atque odore, vt non magis ceram aut aliud quoduis flauescens lignum cum eo conuenire dicas.

Dubitat Casalp. an Oleastrum Plin. possit esse densissimum frutex, qui in scopulis maritimis spontè vi ventorum condetur Buxi modo, quem alacernum alibi vocat: quod tamen nobis non sit verisimile. Vide cap. de Alaterno.

Casp. Bauhin. Buxum fruticem dicit, quamuis quædam etiam in arborem excreseat: at nos omnem buxum arborem potius quàm fruticem dicendam censemus, consideratà eius materie, & ipsa adeò arboris definitione. Fruticare creditur, quia tardè admodum crescit, satis clarè tamen vbius arboris notas exhibet. Quam verò idem adlungit Chamæpyxum Tragi & Tabern. non videtur ad Buxum referenda.

Nobis Græcis dicta, vt ex qua tabulæ ad scribendum olim fiebant, *αὐξία* dicta, vnde & Pyxides. Latini Y in V mutarunt, vt in pluimis aliis, testibus Festo & Prisciano. Buxus igitur, Capro autore, arbor: Buxum vero materies erit. Hebr. *Theaus*, teste Trago. Germ. *Buxbaum*. Belg. *Busboom* & *Buxbaum*: vulgò *Palboom*; teste Dod. Gall. *Bois*. It. *Bosso* & *Buxo*. Hisp. *Box*. Angl. *Boxe* & *The Boxe tree* & *Buxs*. Boh. *Poss*. pan. Hung. *Puzpang*. Buxi paruum genus *χάμαρυξ*, *Humibuxus*. Angl. *Dwarf Boxe*.

Poetis celebrata *Ismenia*, *Berecynthia*, *Comosa*, *frondosa*, *annosa*, *solida*, *confilis*, *crispata*, *constrepens*. Ex ea enim fiebant multiforatales tibia. Vnde & pro musico instrumento interdum accipitur. Ver-

gil. Aeneid. l. 9.

*Tympana vos, Buxusque vocat Berecynthia matris.*

Locus

Buxum in Cyro prouenire ex Theophrast. dictum. Plin. in Pyrenæis montibus legisse videtur, nisi in altero mendum sit vicinitate vocabulorum enatum, vti suspicatur Ruell. Locis feruidis difficillimè prodit. Cytoriis quoque montibus plurima & Berecynthio tractu. Cytorus, habet Theaur. ling. Latinæ, Paphlagoniæ mons Buxo abundans, quem Macedoniæ esse magno errore credit Seruius. Vergil. lib. 2. Georgicorum.

*Et inuau undantem Buxo spectare Cyrorum.*

Ab hoc, quæ Buxea sunt, Cytoriaca dicta, Ouid. lib. Metam. 4.

*Sape cytoriaco diducit pectine crines.*

Sed l. 6. aliter

*Vrque cytoriaco radium de monte tenebat.*

Crassissima in Corsica. In Olympo Macedoniæ gracilior sed brevis. Amat frigida, aprica, montes. Nulla magis quàm hac gliscunt montes & colles in Delphinatu & Galloprovincia. Quibusdam etiam aliofio ad Septentriones, cluofio, incultis, frutescit & arborefcit. In Heluetiæ, Sabaudiz, Burgundiæque montibus non infrequens. Etsi verò spontanea sit, tamen in lautioribus hortis tam Italiæ quàm Germaniæ Galliæque aliarumque circumiacentium prouinciarum hortis passim colitur, quippe quæ tonderi topiario operi facilis, & perpetua viuitate amœna. Patavii vidimus in horto quodam prope templum à Sancto cognominatum Libirynthum opere topiario pulcherrimum ex Buxo. Item Veronæ & in Italiæ magnatum quorundam hortis Buxi plantas artificiosè animalia varia exprimentes. Hortum E. C. Wirt. Montbelgardiensem areis Buxo cinctis ex vicinis sumpto, videas amœna facie etiam Hyeme virentem. In Germaniæ & Burgundiæ quibusdam tractibus, non temerè in pago aliquo templum videas, quod non vna aliàue egregia Buxi arbore stipatum.

Tempus

Floret communiter Feb. & Martio. Genevæ etiam Decembri florum rudimenta obseruauimus. Fructum fert Autumno, quo demum semina perficit, cum fructu diu arbori adhæsurum, nisi auellatur. Aprili noua germina promit. Sed prius lignum secari consuevit, si magis flauum cupis.

Facile seritur & ramis: Stolonibus etiam multiplicari loca iis confita testantur. An semine oriatur facile, indagandum. De insitionis mangonio nihil adhuc specialius circa eam compertum habemus. Constantinus ait: plantari auulsione, & clauis & ramis, depositis in plantario post Idus Nouemb. Gaudere autem humidis locis, quòd semper vireat.

Porro maximè æternam eius materiam putant, vetustatèque non sentire cùm tamen nos in Ducatu Wirtemb. anno 1608. hyemali frutice gelique cum consumptum obseruauerimus.

Durities quoque eius cum amarore teredines in ea duras, hacti prohibet. Eius materies pertinaciùs lerris resistit, earumque dentes replet aqualitate inerti: quia de causa artifices alternà inclinatione egeunt scobem.

In igni duritia quæ ferro, nec flamma nec carbone vtili, inquit Plin. Atqui obseruatum est, Buxum, præsertim benè exiccatum optimos ac viuacissimos ex se remittere Carbones, quauis cum Plin. & Tragus & Lonic. asserant contrarium. Semen quoque à formicis reconditur in hyemem, inquit Soler. Quamobrem non est cunctis animalibus inuisum vt Theophrast. & Plin. existit.

Theophr.  
Plin. Lonic.  
Trag. re.  
darg.

*Actinet.* marunt. Hodie pectinum dote commendatur buxi materies, ex qua laudatissimi fiunt. Vnde Martialis de Caluo.

*Quid faciet nullo hic inuentura capillos  
Multifido Buxus qua tibi dente datur.*

*Pyxider.* Fiunt & vnguentaria pyxides, quarum plurimas torno varia figurâ, perelegantique fabre effictas habemus, præsertim & radicum tophis. Commendatur etiam Ruellio ad plaustrorum axes, & aratorum buras: item Cochlearia. Folio cum materiei scobina & lixiuo capillum rufant, nec nullius in medicina vltus est hæc arbor, vt Ruellius putat.

*Ufus medicus.* Quippe Amatus testatur, se felici successu vsum Buxi decocto in laborante Lue Venerea: moderatius sortiti temperamentum, quam Guaiacum, ac proinde iis qui calidiori sunt temperatura, & morbo calidiori affliguntur, præcipuè in æstate, liberalis eius decoctum dabit: nec putat Guaiaci & Buxi arbores inter se aliter differre quam soli diuersi ratione, quod supra resutatum. Buxi verò lignum vnicè iecur plus iusto calidum emendare, vt sudorem egregiè euocare, multi experientiâ sibi compertum esse testatur. Idem in Centuriis curationem recenset Hemicramæ per consensum ventriculi factæ, & per buxiligni decocti potionem curatæ. Item de dolore in genu cum tumore per tres vel quatuor menses perdurante, buxi decocto postea curato. Hinc sententia contrariatur Herc. Saxon. differens: licet Amatus se quendam hoc morbo laborantem buxi decocto integrè curasse profiteatur, tamen vt dicitur, vna Hirundo non facit Ver, non est buxus lignum Indicum, vt ille putat: Natat enim buxus in aqua. Lignum Indicum residet in fundo, vt etiam Ebenus, vt ex pondere, colore, & densitate faciliè quisque conicere poterit. Sic & Lemn. Lemnius nequiquam probat eos, qui buxo tanquam Guaiaci aut balomeno vtuntur, miramque historiam hac de re commemorat in Biblicarum herbarum explicatione. cap. 41. Testatur nihilominus, Lob. virgulta, lignum & folia decocta, Guaiaci modo, sudores elicere, huiusque decocto famulam pauperculam Anglam à Lue Venerea vindicatam. Ditionibus propter ingratum & tetrum odorem reicitur.

*Amat. mor.* Recentiores, inquit Fusch. temperatam buxi essentiam esse statuunt, id quod non videtur verisimile. Haud dubiè verò adstringit atque adeò exiccat. Scobem eius decoctam in aqua, alui profluvia sanare tradunt, quod & Matth. confirmat. Quibusdam buxi decoctum cum vino rubro profuit in doloribus dentium à frigidis fluxionibus. Lonicerus quoque adstringentis & siccanis naturæ dicit: additque folia siccata & in puluerem redacta data cum aqua Lauendulæ tollere insaniam & maniam. Verum, quum umbra ipso Loniceri atque etiam Fusch. teste [qui ait somnū sub hac arbore cerebro vehementer incommo-

*Iecur.* dare, quòd eius odor naturæ proflus aduersetur] naturæ sit contrarius, minuatque intellectum, non ausimus præscribere folia ad insaniam, ne fortè eam adaugeamus, odore illo graui ad cerebrum rapti. Nam quod quidam etiam buxi comam tulam apoplecticis propinent: ratione caret, ait Dodon. nam fructus vel odore frequenti, quem tamen exiguum habet, cerebro ac capiti molestus est. Multum quoque & à veritate aberrabit, qui huius scobe, ligni Guaiaci loco vti voluerit.

*Hemicramæ.* Textor libello suo de peste, aduersus pestem commendat ignem ex ligno buxi. Sed quia id ratione non videmus, nisi penitus tetri odoris va-

*Tumor genium.* pore, insidians viris venenatum abigere velit, qua ratione non improbaucimus vel quauis fortissima accendi.

*Lue Ven.* Car. Steph. buxum plantandam prohibet vbi sint apes: quia, inquit, flos eius statim interficit: nam, corrumpique aërem suo fetido odore, idèbique paucissimam in hortis plantandam censet. Verum in eo contrarius esse videtur Theoph. dicens, in Cytera, vbi buxus, mel insuauè esse, buxumque olens, multum tamen & copiosum. Ergo apes non statim interficit. Ferunt quoque serpentes vulneratas eius radice degustatâ statim lenitatem recuperare.

*Temperâ.* Oleum aut Sulphur paratur ex buxo perpetuo virente & vituolato, cuius ingrato odore sulphur Narcoticum, quod continet, nobis exhibetur. Eius [inquit Querc.] buxi oleum, etsi faciliè cremabile, maximum tamen dolorum omnium lenitium est, vt pote, sulphuris narcotici vitriolati naturam ac proprietatem æmulans, omnique cum vitriolo, epileptico etiam morbo specificè conferens. Item ex rasura lignorum & corticum viridum arborum ac vitriolatarum, quales sunt, Iurpeus, buxus, Quercus, Guaiacum, &c. acidulus mercurialis liquor igne lento primò exillat ad dissolutionem, Corallorum, Perlarumque idoneus.

*Alui fluxus.* Caterum iam translatitium est Germanos ex Gallia Narbonensis Hispaniæ finitimus, præcipuè montibus Pyrenæis, circa oppidum Limonis haud procul Carcaffona crispatum buxi radicum magnam copiam aduehere, ob varias maculas & in tortos linearum discursus ad lautiora opera expectatum, ex quibus cochlearia, cultellorum manubria, latrunculi, fistulæ doliorum, & nescio quæ ludicra fiunt, ab his præcipuè qui oppidum illud Burgundicum in monte Iura D. Claudio celeberrime incolunt.

*Dolor dentium.* Et, vt vno verbo dicamus, ad ea quæcunque torno elaborari possunt nihil hoc ligno lautius, præstantius, lequacius. In hoc enim ligno Sculptores exercent artem: nam politissimas quarumcunque rerum icones; plantarumque imagines, ob insignem Ligni lauiorem, vt vel viuas non raro repræsentent, ex eo parant. Sed secto cautio sit exuere corticem, alioqui findi periculum est, præsertim in loco sicciori aut calidiori collocatum. Non omittendum, quamuis ludicrum facis, Turcarum pueros mingere in cunis per tubulos ex buxo factos, diuersos pro masculis, diuersos pro feminis, affabrè factos, quod dicit Bellon. vt non maculent & madesfaciant vrinâ linteamina sua: optimæ sunt fistulæ ex hoc ligno paratæ pro iniiciendis clysteribus: Pro iis & similibus deligendum lignum à multo tempore exsiccatum, non subito calore magno siccatum, faciliè enim finditur, vt obseruauimus euenisse lignis retro fornacem ad exsiccationem positis.

*Maniam.* Buxi coloris lignum Brasiliæ.

LIANVM.

CAP. LI

*Lonic. nat.* Apud Bresilianos testatur Lænius vidisse se ligna coloris lutei vt buxus. Theuetus quoque prodidit in America nasci arbores quasdam ligno luteo, ex quo enses fiant. Plura hæcenus de eo non legimus.

*Apoplex.* PAL.



## PALMÆ SANCTÆ SIMILIS ARBOR.

## CAP. LII.



**F**erebat quidem nostri ratio ut Buxo substitueremus Guaiacum, lignum illud Indicum Antiquis tum Græcis tum Latinis incognitum, quod à mirabili effectu quem in curandis morbis perniciosissimis & contumacissimis præbet, Lignum Sanctum, Lignum Benedictum, Palum Sanctum, Palmam Sanctam,

&c. vocauerunt. Verum, nonnullas graues ob causas, hic tantum ex Pen. & Lob. de Palmæ Sanctæ simili arbore agemus, alio loco Guaiaci Historiam fusè traditur.

Ex naucleris, inquit, qui ex India Occidua in Angliam remeauerunt, habuit Morganus, & nos ab illo, surculos, qui rami sunt arboris grandioris, recti, cortice arboris luteo, folio Citri, carnoso, nudo, Lauro lauiore, breuiore, neruoso: horum in summis hærent folliculi pallidi, coriacei, circinate rotunditatis, admodum compressi, nummo Coronæ Gallicæ pares, quorum medio insunt semina Lentis effigie & colore, compressiora, gustu amaricante. Hanc quidam arbitrantur *Palmam* aut *Palum Sanctum*, quæ species diuersa à Guaiaco est, quamvis similis designetur: nempe non vasta, ut Fraxinus, sed minor, et concolor cortice: folia cuiusmodi plantago, sed crassiora, minora, pinguiora, breuiora: fructus luglandis magnitudine, aluo subducendæ idonei.

Eadem Aduersaria in appendice & Ic. Pl. Tom. 2. p. 187. sicut & Hist. Lugd. iam descriptæ arboris folliculum ferentis iconi à nobis ex iis propositæ, inscripserunt: *Palmæ Sanctæ similis arbor*. Qualem verò intelligant *Hebenum* de quo tradunt mox post *Palum Sanctum*, ignoramus. Sicaiunt: Officinarium *Hebenum* siue *Xylaptes*, quin sit species Guaiaci, nihil obstat: nam præduræ assulæ, grauissimæ, quæ in Offic. visuntur, & aquæ mersæ sident, tum pinguedo, quæ exudat igni, perinde atque Guaiaco, tum aspectus ipse, & vires, ac fa-por videntur testari: nã odor etiam ei inest Guaiaci: vires ad ea ad quæ Guaiacum commendantur. Ne porò quis obiciat, solum Indiam nigrum ferre *Hebenum* ex Poëtâ, dicimus *Hebeno* idem euenire posse ut Guaiaco, quod non modò in Traprobanz finitimis ad Orientem, Austrum: sed etiam in India Occidua longissimè diffusa, frondet.

\*\*\*

Tom. I.

## FRUCTVS GVAIACI PVATVS ET FOLIA.

## CAP. LIII.



**C**L. apud Basil. Medico & Professore Casp. Bauhino, fratri & adfinitati nostro amantissimo acceptum ferimus fructum Indicum, eidem ex Itaha, nomine fructus Guaiacini, qui geminus ardè coheret, ambitus unguis pollicaris, nisi quod breuior paullo, effigie cordis, in breuem mucronem reflexu (in exiccato)

terminans in medio utrinque extuberans, circa extrema in ambitu compressus, cortice quasi testaceo, penè rufescente, quem exterius alius ambit tenetior, valdè amarus. Nucleos singuli binos continent, sed membrana intergerina disiunctos, quæ mediante gemine nucleæ coniungit, formâ & magnitudine Ricini vulgati, substantia dura, ac ossæ: quam tenuis inuolut pellicula. Perhibetur descriptus ab Ouiedo, qui autor nobis nunc non ad manus. Lob. fortè Hispanensem fructus Guaiaci, de quo antè: sicut & Cardani. Lectior consideret fructum Arboris tristici, Acofæ, mox sequentis: in cuius descriptione comperiet ferè similia, si non eadem.

Quia porò figura, quam hoc in loco proponimus ex Clusii Exot. lib. 10. capitis 20. mutata est, fas erit quoque verba eius describere. Sub initium anni 1601. accipiebam, inquit, à Petro Gateo, ramulum legitimum Guaiaci, qui pedalis erat longitudinis, valdè contortus, & frequentibus nodis distinctus, scriptorū calami, siue aserina pennæ crassitudinem infernâ parte vix attingens, materiâ durâ & pallecente præditus, atque cortice testæ rugoso, cineracei coloris: supernâ verò parte in tenues ramulos dinisus, quorum nonnulli folia adhuc retinebant, alii etiam flores, & fructus rudimenta: nata autem erant folia, seu veriùs foliorum alæ, in tenellis ramis contratio inter se situ, singulis alis quaterna, aut sena foliola Lentisci modo ex aduerso semper nascentia obtinentibus, crassiuscula, orbiculata, & multis venis distincta, quæ siccitate facillè defluerent, manentibus nudis alis, & foliorum, ubi sita fuerant, vestigia duntaxat retinentibus: in superiorum ramulorum nodis nata erant veluti tubercula, è quibus coniunctim exorti erant seni, octoni, deni, interdum plures, tenues, vnciamque longi petioli, sustinentes singuli florem, non magnum, sex foliolis constantem (albini, an flauis, aut cærulei coloris essent, propter siccitatem iudicare nequibam) è quorum umbilico multa prodibant staminalia, & in nonnullis floribus fructus rudimentum medium emergere incipiebat, binis lateribus præ-

Descriptio

An fructus  
arboris  
tristici

Ramulus.  
Descriptio

Materia.  
Cortex.

Folia.

Lentisci.

Flos.

Tt 3





tiam, & vitreis organis odoratissimam ex illis a-  
quam elici, quæ [asserente Fabricio] *aqua de Mogli* dicitur, quoniam Malabarico sermone arbor  
*Mogli* appellatur, cuius flores idem nomen reti-  
nent. Fructum obferuallē negabat. *Caserum* an-  
no 1601. mihi mittebat amicus Amstelredamo  
fructum eius arboris suo pediculo adhuc inhære-  
tem, quem ab illis qui ab India Orientali redie-  
rant, acceperat: erant verò plures fructus siue  
lobi, vnciarum binarum, longo ramulo siue cra-  
sso pediculo nati, satis contigui, similes penè iis lo-  
bis, quos Spartium n. Hispaniacum cap. 70. lib. 1.  
mez plantarum Historiæ descriptos habet, siue  
fabæ vulgari minori, quæ apud Belgas in iumen-  
torum pabulum cedit magnitudine pares, satis  
craffo cortice constantes, coloris cineracei, qui a-  
perti, sex femina cōtinere deprehendebantur, u-  
troque latere terna. Stramonix feminib. quodam-  
modo similia, sed immatura. Qualem autem ac-  
cipiebam, in eadem tabella cum ramulo suis flori-  
bus onusto, exprimi curabam, in illorum gratiā  
qui hoc studio delectantur. Altero autem post  
acceptum & descriptum illud semen anno, mul-  
ti eius arboris flores C.V.D. Petro Pauvvio mit-  
tebantur: nique oblongo & tenui arboris alicuius  
aut herbæ folio traieci corollarum instar, è quib.  
licet prorsus aridis, eam tamen formam agnos-  
cere poteram, quam Fabricius mihi descriperat:  
quæ sane longè dissimilis est iis floribus qui à nō-  
nullis proponuntur leucois similes, quatuor dū-  
taxat foliis constantes.

Ab Acofse in supericone & descriptione, discre-  
pant Clusi descriptio & binæ eius icones, quæ  
quidem & ipsæ, cū non parum inter se dif-  
ferant, occasionem inde sumpsimus, vt omnes  
tres apposuerimus. Prima igitur Acofæ sit, aliæ  
verò duæ Clusii. Prior, cui olimin nous in Gar-  
ciæ Arom. hist. p. 12. floris Mexicani fructum ap-  
pinxerat. Altera, in qua in post. Exot. dictum  
fructum omisit, alium racemosum addens, qui  
non multum differt à fructu, qui Guaiaci dicitur,  
qualem diximus fortè descriptum ab Acofse.

Ab his figuris etiam diuersa icon Io. à Doet. tam  
foliis quàm florum forma, quæ quadripartita pin-  
git. In nominatus quoque quidam iconem à pro-  
positis differentem habet, cuius flores quinque  
partiti &c: sic adscribit. Arbor *Arbi tristi* qualibet  
nocte [post occasum Solis] virides suos fructus  
renouat, floribus fulvis (quorum pediculi crocū  
imitantur) egrègiè ornata. E contra verò de die,  
post ortum Solis fructus suos deiecit, totaque mar-  
cescit.

Figura ænea Bry fratrum obscura est, ipsā fortè  
obscuritate exprimere volentes, quod non potue-  
runt vel ausi sunt aperire & clarè. Florem qua-  
drupartitum habent. Iudicent qui viderunt arbo-  
rem, vter horum rectius pinxerit. P. Hogger ad  
fig. æneam.

*ramum nigra quem nox suauibus or-  
nat,*

*Exiit ornatum floribus alma dies.*

*Ve decus hoc vna vigeatque & destuat hora*

*Continuas obeunt illa diesque vices.*

*Traxit & hinc nomen tristi quod squalida tritico*

*Auricomm rutilo cū miter orbi iubar.*

*Haud secus & nostro, qua sensu splendida fumos*

*Esse fidem veri Lux rediit vna facit.*

Hanc autoribus prædictis Goz Parizataco, in Ma-  
layo Singad vocant: in Decan Pul. Arabibus  
Guart: Persis & Turcis Gul. lingua Malauarica  
*Mogli*, quo nomine & flores appellantur: vnde  
nomen liquoris stillatio, *Aqua de Mogli. Arbore*

*triste* Io. à Doet. *Arbor tristis* Herbar. qui de ea tra-  
didit: quod nomen illi inditum quod noctu tantum  
floreat.

Peculiaris est hæc arbor Goz, quam è Malaca Locus  
allatam asserunt, nec se alibi per Indiam vidisse  
testatur Garcias. Multi in Lusitaniam transferre  
vulnerunt, sed irritò conatu. In Malabar autem  
& Goa, locisque vicinis, cum tanta facilitate na-  
scitur, vt quilibet rami in terram depacti compre-  
hendant.

Fabulantur autem indigenæ, Satrapæ cuidam  
nomine Parizataco elegantem fuisse filiam, quæ  
Solem deperiens: ab illo compressa fuerit: Cū  
verò postea illam relinqueret alterius amore irre-  
titus, Parizataci filiā præ amoris impatientia sibi  
ipsi mortem conscuissse. Ex cuius crematæ cine-  
ribus [nam adhuc vruntur in ea regione cadaue-  
ra] hanc natam esse arborem, cuius flores adeo  
Solem exhorrent, vt eum videre non sustineant.  
Miranda sanè res & obseruatione longè dignissi-  
ma, inquit Costa, elegantissimam hanc arborem  
intueri noctu pulcherrimis suauissimæ spiran-  
tibus floribus illustratam lætam, atque odora-  
tissimam: eadēq; flores, vt primū radius Solari-  
bus illustratos, deponere atque abicere ipsam ve-  
rò arborem totam vnā cum foliis suis veluti  
marcidam apparere.

Sanè quotquot hætenus odoratus sum flo-  
res, horum ego nullum [si quid mei iudicii est,  
hisce prætulerim, nedum cerè contulerim: adeo  
suauiter spirat, præsertim primū locum ingre-  
dientibus, vbi arbor colitur. Idem, manibus cō-  
tacti, vt euanidi redduntur & inutilēs. Flos sapo-  
re est subamaricantē, quem ex nuper collecto & vñs.  
degustato deprehendi. Eum cor resocillare inco-  
læ censent. Nam & Gentiles ibi medici semen  
eius inter Cardiaca referunt. Garcias nullum se  
vñm eius nouisse tradit, propter teneritatem: ni-  
si quod florum pediculis, qui lutei sunt, Goz in-  
colæ vtantur cibis tingendis, quos Croci modo  
insufficiant. Velle etiam nonnullos aquam stillati-  
tiam florum oculis vñem esse, admoto lino  
panno hac intincto. In quem vñm studiosè  
colliguntur ab incolis & propter odoris fragran-  
tiam, quam insignem habere testatur Cluse xre-  
latione Fabricii.

*Floris insi-  
gnis suauis-  
sime.*

*Sapor.  
Vires &  
& vñs.*

*Cor.*

*Tinctura.*

*Oculi.*

ARBOR INDICA DORMIENS.

## CAP. LV.

Theophrastus apud Libanum in India arbo-  
rem perhiberi ait, foliosam instar Rosæ, quæ  
noctu conuiueat, & oriente Sole iterum se ex-  
pandat seu aperiat, meridie planè explicet, & hinc  
iterum paulatim in noctem componat: Incolas  
dicere eam dormire.

ARBORES ET HERBÆ TACTVM  
refugientes.

## CAP. LVI.

Nascitur circa Memphim peculiaris quædam  
materia [Gaza vertit: Guilandinus autem  
quiddam: Plinius arbor] non foliis, vel ramis, vel  
totā formā peculiare quid fortita, sed euentu  
Tt 4

*Descriptio  
arboris.*

Herba cina hodie



pōst ad vitam redite & viuere. Theoph. lib. 4. Hist.

cap. 4.

De eadem & Plin. Sylvestris fuit & circa Memphim regio tam vastis arboribus, vt terni nequirent vel circumplecti, vnius peculati miraculo, nec pomum propter, vsūve aliquem, sed euentum. Facies enim ipinā folia habet ceu pennas, quæ tactis ab homine ramis, cadunt prouinus, ac postea renascuntur. Huic arbori affinem herbam prodidit Apollodorus Democriti discipulus, quā idcirco Aeschynomem non appellabat, quia admodum refugit, reneat omni foliorum contractione.

Hinc Guiland. de Papyro: Annon, inquit, Aeschynomem narrantam Apollodoro Democ. discipulo, cum supercibus annis in Arabia peregrinaret, appropinquante manu, folia contrahentem his oculis vidi: Quæ, aut eadem fuerit, aut ei similima, cum ea, quam Lusitania hodie *Herba viua* appellat, ex brasilia Provincia primum subuectam, quæ attracta non solum refugit, verum etiam omnia folia ceu indignabunda ad terram deiecit. Octonum circiter pedum est plantæ proceritas, quæ ontur in Provincia Malabar: ea rerum accessum videtur sensu percrepere: appropinquante homine aut animali ramos contringit, recedentibus, pandit. Folia Polypodii, flores verò luteos habet. Hanc Veteres ignorasse, vt censet Garcias Hortus, Proregum in India Orientali Medicus celeberrimus, non puto: quinimò suspicor de hac loquutum esse Theoph. lib. 4. cap. 3. peculiare quiddam circa Memphim nasci tradentem: Ego stirpem istam diu multumque in Aegypto circa Memphim, Heliopolim, Tanim & Alexandriam quæsitam nusquam offendere potui. Hæc Guilandinus, quem voluissimus detcripsisse suam visum Aeschynomem, ac indicasse, celsæne herba, aut arbor.

Meminit & M. Fumec in Hist. Ind. Gen. Arborum, quarum folia tacta in Nicaragua ardescunt. At Monardes scribit sibi duas herbas siccas delatas: ynam, quæ suo solo itans ac in vigore, si manu tangatur, subito in certam quasi mortua decidit: alteram supra terram delapsam, si tangatur vt colligatur, crispari & contrahi, vt brasilia Murcianna.

Sed herba viua historiam Acoſta sic tradit. Nonnullis inquit Afæ locis planta quædam inuenitur, vulgò *Herba viua* nuncupata, à Circum-

foraneis illis loque appellatis, *Herba amoris*, ab Arabibus & Turcis *suluq*, & à Pectis *suluque*. Exiguam habet radicem, è qua supra terram exilunt octo ramuli duos digitos longi, foliis vtinque in ordinem digestis, & inter se respondentibus onusti, quæ plurimum ad Erui tenella folia accedunt, nec dissimilia sunt foliis prioris Polypodii, cuius iconem Lacuna exhibet l. 4. cap. 187. in Diosc. sed longè tenuiora, & vtinque læuia, & grato virore oculis palcentia, vt Tamarindorum folia: è medio radcis capite exilunt pediculi [nam caule caret] quatuor, singuli suum florem sustinentes, flauum, aspectu pulcherrimum, minoribus Caryophylleis similem, sed sine odore. Nascitur calidis & humidis locis. Adèd mira est huius plantulæ natura, vt eam humana ratio assequi nequeat. Nam cum maximè virescit, gratissimæque est aspectu, si quis illam apprehendere cupiat, illico folia contrahit, atque ita tenues ramulos recondit: si verò apprehendat, subito adèd marcida conspicitur, vt exsiccati putet. Sed quod maiore admiratione dignum est, si manum detrahat, illico suum nitorem recuperat, & toties marcescit, atque reuivescit, quoties comprehenditur, aut manus ab ea retrahitur.

Testatur autem Acoſta sibi relatum fuisse, Philolophum quendam in Malabar, dum nimis curiosè huius plantæ naturam obseruare & perpendere cuperet, tamen esse redditum. Plantam se conspexisse, eamque cum suo exspite, nihil minds quàm de ipsa cogitans, eruisse, & in hortum quendam translulisse, vbi permanserit, at factum minimè vidisse. Herbam Aeschynomem Apollodorus, Lusitanum [Authore Dalecham. apud Plinium.] vocant Herbam viuam. Eius meminit Theoph. c. 3. l. 4. Ouid. in America Hist. & Iulius Cæsar. Scalig. nec non Garcias.

Hist. Lugd. quoque scribit esse, qui existiment, *Arborem pudicam* Scalig. esse eandem quam descripsit foliis Polypodii, & Theoph. folio Filicis. Sed illa separat, & in tribus distinctis locis agit de *Arbore pudica* Scal. de *Herba viua Acoſta*, & de *herba calta flaccescente*, & alia fe contrahente Monardes, ita vt quatuor faciat differentias hoc capite descriptarum plantarum, inter se distinctas.

Nonnulli indigenæ Medici, vt Acoſta perhibet, *Herbam viuam* affirmant vtilem esse ad virgines corruptas, in integrum [si credere fas est] restituendas, & ad reconciliandum amorem miræ esse efficacis. Gentilis Medicus, & pro ea regione satis doctus, cum adèd cupidum cognoscendi huius herbæ facultates conspiceret, ait, ynam se edoctrum adèd compertam & certam, vt ceruicem pro pignore deponeret, nisi sic se habere comperiret. Nempe vt illi cuiuspiam mulieris, qualiscunque etiam status, nomen modò indicaret, se effecturum vt illa in omnibus sibi [Acoſte] obsequeretur, dummodò ex ipsius precepto herba vteretur. Sed condicionem respuisse ait, in re tam illicita. Nihil igitur aliud post diligentem inquisitionem de hac planta intelligere potuisse, quàm apud Gentiles, præsertim verò Brachmenes Canarinos & Iogues in magna estimatione esse. Quodam die sibi accidisse plantas conquirenti non procul à flumine Mangate, vt Gentilem quendam humi sedentem, & verba quædam obmurmurantem, tanquam oraret, forte conspiceret, quem cum compellasset, nihil respondisse, sed suo interpreti, quem comitem duxerat Acoſta, manu duntaxat innuisse: cum homine intellecto celeriter sese inde proripuisse, ac se quoque secedere iussisse, dicentem, Gentilem illum

Herba Cinna deferta

Locus.

Folia Polypodii.

Garcias Hortus.

Duas species.

Brasilia Murcianna.



illum incantatorem esse cuiusdam illius regionis Capitanei, quem Caymal appellant, & istuc fortassis iacere supra Herbam viam: id fieri solere re-purgato prius circa ipsam plantam solo ad hominis longitudinem, recitarique quædam concepta verba, & expectari primam autem, aut rem animam, quæ istam plantam prætergrederetur, dum verba obmurmuraret, cuius sanguine [si comprehendi posset] persuenda esset: sin minus, alterius eiusdem speciei, idque cum multis ceremoniis h. pratermittendis, cum indignis sint, vt scriptis mandentur. Idem testatur conspexisse se deinde istam plantam siccam inter suppellectilem mulieris prostitutz pudicitiz. Vtiam nobis videatur hæc herba potius impudica dicenda, quam pudica.

## ARBOR VENEREM EXTINGVENS.

CAP. LVII.

**H**ic tam impudicæ herbæ, aliam plantam tamquam prostitutz pudicitiz ἀνεστίνον ἐξουαν addidisse cõueniat. Arbor quædam in India Peruanâ inuenitur, materie spongiosa, ex qua Indi nunquam ignem struent, tametsi quis illis mortis periculum minitetur. Aiunt enim, quotquot ad eius flammam siue ignem accedunt, aut quos fumus solummodo pertingit, in re Venerea impotentes fieri: Refert Monar. ex epistolis Petri de Olma. Quæ res, si fide non caret, lepidè facit inueterit illud Terentii, Accede ad hunc ignem propius, & frigescas plus satis.

## ARBOR AMBVLANTIBVS FOLIIS.

CAP. LVIII.

**I**nfula Cimbulon vicina est alta, in qua nascitur arbor, cuius folia, cum in terram deciderint, gradiuntur perinde ac si viuerent. Ea Mori foliis multum similia sunt, parte vtraque binos pedes breues & acutos habent: quibus abstractis sanguis minimè manat. Statim atque folium quis attingit, illud mouetur & abit.

M. Ant. Pigafetta, qui hæc refert in itineralio, testatur se octo dies vnũ in scarula habuisse. quod cum tangeret, circa scarulam iuisset: nec alia re quàm acire viuere existimabat.

Eadem & Scaliger prodidit, sed nullo citato autore. Quasi ipse vidisset & habuisset. Varia tamen in eo, quod non pedibus abstractis, sed compressis nullum exire sanguinem scribit. Immensum profectò naturæ miraculum, nisi subsit id, quod suspicamur: nempe folia illa ex corruptela quadam & proprietate specifica ex arbore sua delapla nobiliorem vitam acquirere, nempe sensitiuam, licet obscure, quàm perpetuò cum motu coniunctam esse Physici tradunt. Iamque non amplius erit de censu plantæco, quia non sub plantæ forma, sed sub perfectiori. Motuentur enim: immò seipsas motuent & promouent. Imò & sentiunt. Tactæ enim abeunt ac refugunt. Viunt igitur nunc vitam animalis. Quanquam e-quidem summum etiamnum videatur naturæ miraculum arboris folio animale sociare sensum & gressum.

Eandem celebrat doctiss. Guiland. libello de

Papyro, his verbis: Mirabilem plantam, qui Magellanica circumnauigationi interfuerunt memorant. Quippe in insula Cimbulon, quæ proxima est insulæ Burnei, conspexerunt arborem, cuius frondes in terram lapsæ, reptione quadam seipsas promouent: &c.

An M. Fumee in hist. gen. Ind. Arbor cuius folia Vermes, si cadant supra terram conuertuntur in vermes? Prouenit in Borney insula Indiz.

## AMBVLON ARBOR.

CAP. LIX.

**N**ominis affinitas & hanc iungat. Ambula- Descriptio  
bat ista reipsa: hæc nomine solo. Arbor est, cui nomen Ambulon, quam fert Aruchet insula: cuius è cortice fructus exit candidus, Saccharati specie, & magnitudine Coriandri. Scaligerum vidisse & nouisse dicas, tam confidenter refert, nec dicto autore.

## ARBOR MVSCARVM SPLENDENTIVM.

CAP. LX.

**V**ersamur sanè inter mirabilia. Ad quandam figuram Cosmographicam ab Anonymo quodam hæc annotata. De arborum specie legitur, quæ nullos peculiare atque vlti aptos parant fructus: sed noctu examine muscarum cinguntur, quarum quæque radiantem lucem de se spargit, non aliter ac si plurimæ candelæ circa arborem accensæ essent, haud exigua admirationem & terrorem incutientes iis, qui eius rei ignari, de improviso in eam incidunt.

Musca  
splendentes.ARBORES MAXIMAE ALTITVDINIS  
& crassitudinis: vt Ceibæ.

CAP. LXI.

**I**nter hæc arborum miracula, libet & naturæ potentiam celebrare in arborum vastâ & prope-modum immensa altitudine & magnitudine. Scribit Strabo lib. 15. de Indicis arboribus. Qui dixerunt trans Hyarotidem visam fuisse arborem, quæ vmbra in meridie faceret quinque stadiorum, cunctos exuperant de arborum magnitudine.

Vasta in-  
diæ arbores  
Strabon.

Refert Theophrast. In Corsica (vulg. Basil. co-  
dex κορσίνα, pro eo quod in Aldin. legebatur ἐν τῇ βορέῃ θή-  
κῃ). Correctionem approbant Scal. & Gaza. ) nasci ligna ad miraculum vsque procera, enodia, læuia, sed vastâ magnitudine arbores, magnoque discrimine reliquas excedentes. Et quamuis in Latino agro Abietes & Pini [sic & Pinus] tam magnitudine quàm pulchritudine inter omnes arbores præstent, has tamen nihil esse ad illas. Romanos enim aliquando oppidi condendi causa in eam insulam nauibus quinque & viginti profectos, tam vastis arboribus locus dicitur excepsisse, vt nauigantes per sinus quosdam & portus, telas & vela densosque malos passim & variè perupperint & dilacerarint: & omnino totam illam insulam confertissimam & quasi efferatam immani illo arbo-

Corsica  
arbores  
maximæ  
Theophr.

rum spatio. Quamobrem Romanos à condendo oppido destituisse. Sed nonnullos ingressos exiguu loci spatio, tam largam cœcidisse materiem, vt ratem perconderent quinquaginta velis duccendam, quàm in Pelago periisse addunt.

Annotat Scal. nunc in Corsica non esse eà miracula arborum, quæ iactat Theophr. Et Romanos fatuos, qui à litore non abisterent prius, quàm arborum proceritate, atque frequentia, quas procul liceret [vt mos est nauigantibus] conspiciari, vela scinderentur. Fidem propemodum excedit quod canit Virg. Georg. 2.

*l'Asie arb.  
Indici vrg.*

*Aut quos Oceano propior gerit India lucos,  
Extremi sinus orbis? ubi æra vincere sumum  
Arboris haud ulla iactu potuere sagitta.*

Virgilium & Valerius Flaccus imitatur, eandem arborum enormitatem exprimens. Quod cum legisset Plin. aut fortè aliunde quoque vel auditione lectione ve didicisset, in India tam altè scripsit arbores ascendere suis fastigiis, vt sagittis superari nequeant. Constituit etiam quibuldam designatam proceritatem, ad centum scilicet quadraginta quatuor [cx lxxi. ch.] pedes: sed eas quia nomine tenus tradidit, dicemus suis locis.

*Petrus  
Martyr.*

Sic & Petrus Martyr de rebus Oceanicis & nouo Orbe, illarum arborum altitudinem prædicat tantam, vt nulla vitilis lacertis vis sit, quæ domum ædificatam in illis tactu lapidis attingere sufficiat. Ex illis arboribus pleraque dimenlos brachiorum ambitu viros septem interdum octo stantes vix complexos esse. Idem alibi: Arbores ibi esse ita proceras balbutiant, vt pleraque sexdecim hominum manu iunctorum in gyrum vix lacertis concludi queant.

*Mira ar-  
borum  
crassities.*

Ac vtrumque hominum numerum pro amplexu cor firmat quoque M. Fumeæ in Hist. Gen. Indiæ Occid. traditque ibi vnam ingentis esse altitudinis, supra quam morabatur Indus Caciua Abibaba. Et rursus aliq loco: Arbores, inquit, altissime in Nicaragua, inter quas quardam vocatur Cerba, tantæ crassitudinis, vt quindecim homines amplecti non possint.

*Cerba ar-  
bor.*

*Cerba ar-  
boris de-  
scriptio.*


Referunt enim, vt annotat Cardanus, ibi quandam inuentam è Ceibæ genere [nam hoc est arboris genus omnium maximæ] trifidam inter ceteras, cuius singuli trunci viginti pedum ambitu cingebantur. Spatia verò ipsa inter truncos iuxta terram totidem pedibus distabant: per ipsa verò spatia currus onustus pulchrè duci poterat. At vbi trunci in vnum coibant: hoc autem à terra procul se tunc pedibus quindecim, crassitudo arboris pedum erat quadraginta quinque. Ab ima parte crassioris trunci, vsque ad locum vbi primò prodibant rami, pedes octoginta: superior pars, ex qua rami pendebant, abique mensuræ modo. Huius tantæ proceritatis causa solum fecundum, cœli robur, arboris natura: nam Lignum eius leuissimum est, terræ modicum & tenuioris habens, humidi plurimum. Eandem arborem Cerba in Nicaragua nasci ex autoritate Historiographi Indiæ Occid. refert, vt quindecim homines eam circumplecti nequeant. Ex eodem narrat duas vfas, alteram octo, alteram sexdecim hominum amplexus excedentem. Tot sanè Authorum consensus fidem sibi derogari vetat. Mirum tamen, nullum eorum, qui de Indiæ plantis ex professo prodidère, qui quidem hæcenus ad nostras peruenierit manus, illas arbores descripsisse, non Garciam, non Acoftam, non Monardem.

*Lignum le-  
uissimum.*

## ARBOR FARINIFERA.

CAP. LX.

Non admiratione caret, [inquit Clus. Exot.] Deter Arboris Farinifera natura, quam illi, qui generoso viro Francisco Drake, Equiti, [dum totum Orbem circumnauigauit] comites fuerūt, obseruabant.



Referabant, anno 1581. præcedentem anno inde reduces in Tarenate Insula æquatore proxima ad Arcticum Polum vergente nasci arbores quandam plantam, cuius truncus humana coxæ crassitudinem æquaret, decem verò pedum altitudinem attingeret: summo fastigio in orbiculatum caput Brasiliæ

capitate instar extuberantem, in cuius medullæ natura quandam candidam farinam produceret ad illius insulæ homines tenuioris fortunæ sustentandum: Eam diligenter colligere, deinde affusâ, siue inaspera verius, modica aqua, fermentare, pinlere, & in formulas quasdam coctili late-re constantes immittere longa serie, atque prunis ardentibus circumquaque admoos & super eam impositis coquere. Erant verò ii panes [liba, siue placentæ] interdum palmares, vnciali crassitie, quibus illius insule incolæ calidis & recentior coctis vesci solebant: at vbi induruisse, tepidâ aquâ macerantes pulvis modo ederent. Insuper saporis esse, cum degustarem, hic panis mihi videbatur. Verum iniecto Piperis aut Cinamomi momento cum saccharo, nonnullis deliciis esse queat. Eiusmodi panis bina fragmenta, qualia nostri Morgani opera accepimus, hac tabella exprimi curauimus.

An hæc potèd Zagu, cuius meminit Ferd. Lopez Ind. Hist. l. 6. c. 17? Scribit enim ex eius medulla panem fieri in hunc modum. Medullam exemptam in fictilia iniicientes, aqua salia macerant, post aliquot dies Soli exponunt, resiccatam mandunt, vel ex eius farina seu polline panem conficiunt, nostro [vidi enim] qui ex fecale fit, colore & sapore pessimilem.

Antonius Pigafetta, qui primus orbem naue, cui insigne Victoris circuiuit, in suo Itinerario Zagu per l. non per z. scribit.

Nec incommodè fortassis ea censeri possit, cuius meminit M. Polus Venetus lib. 3. sui Itinerarii, de regno Fanfur agens, his verbis, quæ de Italico sermone ita reddebam: etenim Latinus interpres satis negligenter suo munere functus mihi videtur. In ea inquit, Proincia, vastarum arborum genus est quas duorum virorum vlnæ vix amplecti queant: harum adempto cortice, qui tenuis est succedat ligni materies, medullam in se

con.



continens farinaceam, similem [ vernaculo eius sermone vtar ] à quella de caruol o [ cariet lignoni ]. Hæc in sigulinum vas aqua plenum, iniecta, baculo agitur, vsu fures & terdes superinatet, partiq; farina subfidat: effusa deinde aqua, fit è repurgata facina, massa ad vari generis edulia conficienda, idonea, quæ sæpius edisse, & nonnulla Venetias vsque deuulisse refert, panis hordeaceo, colore & sapore similia. Illius arboris lignum terro confecti potest, nam in aquam iniectum, sedit illico & mergitur, directèque, vt harundo donax finitur. Ex eo incolæ lanceas sibi parant, sed breues [ longas enim ob nimiam grauitatem ne uo ferre possent quorum extimam partem in cuspidem exacunt, & adurunt: his quamlibet armaturam facilius penetrant, quàm si ferrea cuspidem munita essent. Atibi lib. 2. cap. 16. scribit Ternatem insulam, neque Oryzam ferre, aut alias fruges è quibus panem conficere queant, eam ob causam ab arbore materiam illos petere necesse quæ panis loco vtantur. Eam itaque arborem recisam in multas partes findunt, quas malleis ex crassa arundine factis condunt, atque inde eliciunt veluti farinam quandam ipsi *Sagge* appellatam [ ea haud dubiè *Saga*, sive *Zaga*, de qua mox dictum ] scobi lignorum, quæ terra relecta sunt, similem, ex qua panis satis albi placentas quadrangulas conficiunt palmi magnitudine, quibus non modò vescuntur, sed magnà ferè ex parte sua mercuria exercet, harum permutatione alias res quibus indigent, re-dimementes.

## ARBOR FARINIFERA VENENATI SVCCI

CAP. LXIII.

**A**rbor cuius scanificatè liquor venenatus Risagali modo mortifer, radix tamen edulis, ex qua faciunt farinam Syluestres in insulis Canibalinis dictis, vti sitin America, licet arbor differat trunco, ramis, & foliis.

Quæ de Luca traduntur, habent quæ conueniunt cum hac arbore, vt videre est sub cap. de Manihot & Luca. Meminit & Scalapud Theophr. extialis Indicæ plantæ, cuius è farina, succo abiecto, conficiunt panes.

BAXANA ARBOR VENENATA  
aliæque similis, si non eadem.

CAP. LXIV.

**A**B insula Ormuz decem miliaribus distat ea quæ Quicione nominatur, è regione illius sita, olim Principum quorundam delicta, nunc inculta & deserta, tum quòd magna ex parte diruta sit ob vehementes terræ motus, tum ob viperarum, aspidum, colubrorum, qui colore à nostris valdè differunt, atque serpentium omnis generis copiam, quæ illic stabulantur: ex quibus tam venenata & pestilens aura exhalat, vt non solum homines perimat, qui vel aliquantulum moram illic fecerint, sed etiam stipes ipsas inficiat, in quibus est arbor *Baxana*, cuius fructus vel minimum degustatus, mox suffocat: id quod ipsius etiam umbra præstat, si quis vel quadrantem horè sub ea moretur. Cum tamen aliis in regionibus eiusdem arboris radix venenorum omnium sit

antidotus, illic lethalis, nec non & folium ipsius, & fructus qui *Rabuxit* vocatur. *Theuer.*

*Rabuxit.*

De eadem aut certè simili arbore scribit Pet. Martyr de rebus Oceani & noui Orbis. Est arbor, cuius si soba nudum corpus tetigerint, vibices eleuent ingentes: & nisi illis aqua marina vel salina matutina medeatur, illico lethalem suo veneno excutent dolorem. Hanc arborem & Hispaniola parit. Eius etiam lignum olfactu aiunt esse mortiferum, nec portari à quoquam lignum posse sine vitæ periculo. Repertum est eo ligno voluisse Primarios noctu dormientes suffumigatos interimere. Habent ipsi genus herbæ, cuius odore sulti remedium sibi comparant ab eius ligni veneno, vt portare illud queant indennes.

*Lignum mortiferum.**Remedium*

## ARBOR VENENATA ALIA.

CAP. LXV.

**I**n Perù & Canibales multa sunt insula, quæ *Locus* vnus imperio parent, quem *Cassique* nominat: in quarum maxima, in qua sæpius Rex habitat, arbor nascitur fructum ferens magnitudine palme, visu speciosum, sed venenatum. Huius *Vitis* succo Barbari sagutas imbunt, us aduersus hostes in præliis vsu. *Theuer.*

## ARBORES NAUTICÆ, VT ANGELINA.

CAP. XLVI.

**A**d figuram æneam à Io. Linfchottano annotatum, in Oriente Arbores esse crassitudine mirabiles, ex quibus etiam nauigia conficiuntur. Circa Cochinum Arborem esse, quam *Angelinam* vocant, ex qua itidem naues ædificantur, quas *Cones* nominant, integro trunco capicissimo & Iucissimo: nam & ferrum duritie sua rodere. Nullas in hisce nauibus committas esse: ita excavatum duntaxat lignum pelago innatare. An Acosta easdem intelligit quando ait. Colubrinum lignum proueniens locis humidis & inter arbores præsertim secundum eas quæ *Angelins* nuncupantur, nec procul à mari.


*Angelina.**Colubrinum lignum.*

An easdem Olorus? Brasiliensium nauiculae sunt ex magnis arborum corticibus, quædam ita amplæ, vt 10. homines faciliè capiant, Nam Indi alueis ex singulis arboribus cauatis nauigant, quas Cymbas illi *Piraguas* vocant, & earum maximæ quinquaginta circiter homines ferunt: vt notat *Benç.*

## ARBOR CANOARVM SIVE NAUICULARUM INDRAM.

**A**rbor est aliquot ramulos supernè protrudens, ex qua Indi suas carinas, quas *Canoas* illi, Nostri *Nachen* vocant, conficiunt. Bry fratres Icon. part. 4. Ind. Or. Earundem meminit Itinerarium anni 1599. quarum vsus in Insula S. Mariz. Canoas insuper incolæ Hispaniæ insula norunt, cymbas siquidem, non tamen ferro, sed cote præacuta excavant, easque *Canoas* appellant. Testa-

*Descriptio*



Habes in inferiore tabellæ parte Aphyllon Indicum.

tur hoc Maximilianus Transilvanus, dum inquit : accedunt aliam exilem Insulam Indiæ, ubi duas Canoas Indorum conspiciunt, sic enim hoc genus navigii, quod peregrinum est, ab Indis nuncupari solet, est enim excisum, cauatique ex unico arboris trunco, capitque vnum, vel ad summum, alterum hominem.

# ARBORIS YGA CORTEX AD NAVIGIA.

Sunt arbores [ inquit Io. Stadius ] in regione Yga, Yuera dictæ, hæcque integras decorticiant, à summo vsque ad imum, & ut cortex illæsus detrahatur, peculiari apparatu arbores cingunt, hinc cortices detractos in montes prope mare ferunt, & ignibus excalesactos, in viraque extremitate multum incurvant, per medium ligna transversa religant ne dilatentur : & scaphas ita conformant, quarum singulæ vel triginta viros armatos bello inuicere sufficiant.

Cortex hic pollicaris est crassitudinis, latus De quatuor circiter pedes, longus verò quadraginta, alii etiam longiores sunt, alii breviores. Has illi Scaphas summa agilitate impellunt, & quod libet locorum in eis vehuntur. Si mare impetuosum est, subducunt eas in terram, donec serenitas redeat, Ultra duo millia in altum non progrediuntur sed secus litus pro libitu procul excurrunt.

FINIS LIBRI QVARTI.







# HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER QVINTVS.

ARBORES ET FRVTICES BACCIFEROS,  
MINORESQUE BACCAS FERENTES HABET.



Ostendam illam exotici Orbis diuiciarum lustrationem, nunc propius ad nostrum Orbem gressum & oculos dirigentes, vnâ quasi tribu complexas dicamus Bacciferas. Baccas iam non adeo stricte sumi velimus, quarum ex edito Plinij situs lignum, & extra caro, ut Oleum, Cerasis: nec tam vago significatu, ut eadem his cum Pomis natura tribuatur cum eadem: sed potissimum, quas verius baculas dicas: quanquam & Ebuli baccas dixerit Virgilius, & Hederam bacciferam Seneca, nullo, Hercle, nannus ac Oleam, Laurum &c. Inter illas Choragii ins. tribuatur Myrto, ne eam negligentes, forte ad Myrtum canere iubeamur.

## DE MYRTIS IN GENERE

CAP. I.



Myrto Theoph. ramos ténues tribuit, perpetua coma virentes, folijs crebris angustis & odoratis: flores fructibus insidentes: ait fructificare ex annotinis: fructum esse vinosum. In fructum transire, nisi sepius purgetur: monte Cyrcæo Coronarij generis videri, cum ceteræ ampla exant magnitudine. Semine satam degenerate, & ex fructu nigro rubrum fieri. In Egypto tenuem esse, & odore longè præstantiorem: fructu exiguo, nec candido sed nigro. Hæc sparsim Theoph. cum iis quæ suis dicenda locis. Agnoscit igitur has differentias: Coronariam, cui quasi opponit magnitudine amplam, candidam, & nigram, respectu fructuum. Agnouit & Myrtum absque semine à pino, sed arte & Mangonio factam, uti dicitur.

Quærit Aristoteles, cur nigre Myrti copiosiores sint frondes, quam albe? An inquit, quod nigre generis sunt siluestrioris? Cuius iudicium, quod locis rusticis istæ proueniunt, minimè quæ ex cultu mutantur. Humida autem omnia fronde crebriore conduntur. Quod enim minus suos fructus decoquere possunt, idcirco ad frondem alimentum se conuertit.

Idem quærit, quam ob causam Myrta collisa in manu dulciora sentiamus, quam integra? An quemadmodum racemorum acini vindemiati dulciores sunt quam non vindemiati. Etenim musto, quod natura suauè est excepti acini quasi conduntur: quippe qui vel extrinsecus mustum resudent, at qui in racemo coherant, vti quæ insuauiores existunt. Ergo Myrta quoque natura dulcia, intrin-

que suam dulcedinem acinorum in modum vus continentia, ubi manu compressa, conflictataque sunt, diffusâ intestina dulcedine, parte quoque exteriori inopplentur: itaque dulciora non immerito sentiuntur.

Sed cur Myrta enucleatiora [ ἀνυπερβόρεια ] sunt quæ minora? An quia minus perfecta sunt quæ minora: idcirco semen continent imperfectum, cui perinde, ut finis, nucleus deputatus est: quambrem & minora sunt, utpote surculi quidem agnati exteriores partusque imperfecti, & minus dulcia, quam quæ iustum continent nucleum: sunt enim minus concocta. Concoctio autem, non nisi perfectio est.

Cur denique fructus Myrtorum non conditarum magis quam folia, desluant, conditarum autem, reseruataramque Alga [ ῥήρις ] ut sit, folia desluant, fructus adhæreant? An ita euenit non conditis: quoniam natura sancitum est, ut fructus peracta decoctione flaccescant ac decendant: quæ quidem decoctio in repositis fieri non potest, sed Algæ vapore prohibetur, ne humor fructus peruertatur ac immutetur: folia contra cum flaccescant, decidunt. Algæ autem, ut silia, exiccandi vim habent. Ergo non idem folijs accidit arbori adhærentibus, & conditis, modo quo dictum est. Hæc fere Arist. de Myrtis habet.

Apud Diosc. est *Myrtus inusitata*, id est, sativa: & *Myrtus siluestris*, id est, Ruscus. Satiua duplex, *νήχαρα*, & *λευκή*, nigra & alba: & in eo ipso genere accommodatior *ἡ ὀρεινή*, montana. Myrto siluestri suæ, folium tribuit Myrti, sed larius &c. de qua alibi.

Cato Myrtum coniungulam habet & album &

V u

*Diff. sativa*  
*Disj.*  
*Sativa.*  
*Nigra.*  
*Candida.*  
*Montana*

Martida-  
num 1. p.  
Ruell. nos.

nigram: sed Colum. duo tantum Myrti genera agnoscit, nigrum & album.

Hippoc. Martidanum videtur nominasse, ut obferuauit Ruell. Myrtidanum verò ipsam Piper. Hinc fortè Ruell. satis imperitè Myrti baccis, Piperis guttū tribuit: quamuis idem magna securitate dicat Curtius.

Myrtus.

Myrto Plin. tribuit folia perpetuò virentia, angusta, disposita. Sed succorum natura, ut idem refert ex Theoph. præcipuam admirationem in Myrto habet, quando ex vna omnium Olei vini-que bina genera fiunt, de quibus inter vires. Arbor ipsa, inquit idem, in Europæ citiore coelo, [solo. Dal.] quod à Ceraunijs montibus incipit, primum Circeijs in Elpenoris tumulo visa traditur: Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse apparet. Fuit vbi nunc Roma est, iam tum cum conderetur. Quippe ita traditur: Myrtea Verbenæ Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos in eo loco, qui nunc signa Venetis Cluacinae habet. Cluere enim antiqui purgare [pugnare. Gr. Gyrat.] dicebant. Et in ea quoque arbore suffimenti genus habetur. Ideo tum electa, quoniam coniunctioni, & huic arbori Venus præest. Haud scio, an prima etiam omnium in locis publicis Romæ facta sit, fatidico quidem & memorabili augurio. Inter antiquissima namque delubra habetur Quirini, hoc est ipsius Romuli. In eo sacra fuisse Myrti duæ, ante eadem ipsam per longum tempus, altera patritia appellata: altera plebeia. Patritia multis annis præualuit, flaccescente plebeia, exuberans ac læta: quamdiu Senatus quoque floruit, illa vicens, plebeia retortida, & squalida. Quæ posteaquam eualluit flaccescente patritia Marico bello, languida autoritas Patrum facta est, ac paulatim in sterilitatem emarcuit maiestas. Quin & ara verus fuit Veneri Myrtea, quam nunc Martiam vocant. Caro tria genera Myrti prodidit: nigram, candidam, coniugulam, fortassis à coniugijs: ex illo & Cluacinae genere. Nunc & alia distinctio: satiuæ aut siluestris, & in vtraque latifolia. In siluestri propria oxymyrsine. Satiuarum genera rōpiatij faciunt. Tarentinam folio minuro, nostratē parulo, exoticam densissimā, senis foliorum versibus. Hæc non est in vsu. Ramosa vtraque alia. Coniugulam exilimo nunc nostratē dici. Myrtus odoratissima est in Ægypto.

Myrtea  
Verbenæ.

Roma sacra  
Myrti duæ.

Patritia,  
plebeia.

Veneri  
Myrtea.

Catonis tres  
Myrti.

Coniugula,  
Cluacina.

Differentia  
Plin.

Siluestris,  
Tarentina.

Nostrata,  
Exotica.

Coniugula.

Cato ex  
Plin. illust.

Myrtus Ve-  
neri sacra.

Hernol. pro Coniugula legit Coniugalis, sicque in vetusto Catonis codice legisse se testatur Io. Maria. Illud potius annotandum, quod dicebamus Columellam duo Myrti genera tantum fecisse, tanquam Catonis verba sint aliter accipienda, quam Plin. senserit: coniugalem scilicet Myrti albæ & nigrae epithetum, quod esset idonea ad connubium, & non Myrti tertium genus. Nam coniunctioni præerat Venus, cui hæc arbor sacra, eiusque tutelæ subiecta. Quare Virgilius,

Formosæ Myrtus Veneri.

Et apud eundem, Æneas Veneris filius spectatur ludos,

Vetæ materna tempora Myrto.

Et alibi de Augusto Iulij adoptiuo.

Et re maximus urbis

Autorem frugum, rempestatumque potentem,

Accipiat, cingens materna tempora Myrto.

Habuit enim Iulius originem ab Ænea, ut tradunt: de quo idem:

Solida Paphia de robore Myrtus.

Silua Myr-  
tea apud In-  
feros.

Hic etiam Siluam Myrtea in apud Inferos cingere ca npos fingit, in quibus essent, qui amore rode-

rentur, quod Venus amoris dea esset. Æneid. l. 6.

Nec procul hinc partem fissi monstrantur in omnem

Eugentes campi, sic illos nomine dicunt:

Hic quos Æurus amor crudelis abe peredit,

Secreti celant calles, & Myrtea circum

Sylua regit.

Statius etiam Myrrum Paphiam vocat, propter insulam Paphum Veneri dicatam. Mulieres insuper, ut Plutarchus in Numa prodit, mensè Aprili, Veneti sacrificabant, quod is mensis huic Dea factus esset, ad cuius Calendas Myrto coronatæ laurentur. Veneri Myrtea Romæ ad vicum intinum sub monte Auentino aia verus fuit. M. autem Variò Murratam vocabat. Postea verò Plutarcho, Murta dicta est. Quod probat Lilius, dum ait: Ad Murtiam datâs sedes Latinis, scilicet à Rege Anco, ad habitandum. Et Apul. l. 6. sui Afini aurei: Conveniant, inquit, retrò ad metas Murtias Mercurium prædicatorem. Veneri simulachrum ex Myrto pullulâre ad flumē Heirmum fecit Pelops. Quare Hippodamiae consecutus est nuptias, Nunc prosequendum, quare Myrto Veneri dicata sit: & variè à pluribus opinionones assignantur. Phurnutus hanc rationem esse ait, quod hæc planta ad amores conciliandos faciat. Alii quod Venus in mari, videlicet Cypro nata sit, unde & Cyprigena. Amat enim Myrtus maris littora: quare Veneti sacra: vel, ut etiam Seruius ait, quod huius arboris in mulierum necessitatibus vltus multus ac plurimus sit, sicuti Medicorum Libri indicant, & nos inter vires declarabimus, quantum feret institutum. Ceteri verò ob arboris odorem: nempe Venus & odoribus & vnguentis delectatur. Græcorum etiam antiqui Mafici, ut Plutarchi in Sympol. l. n. ex Aristoxeno & Philo aurotitate scribit, dispositis citica vnam mentam lectis, accumulantes Myrtis, pef vices, coronis redimiti, sententias & amatorias catilenas, per obliqua carmina succinere consueverant. Hæc ita collecta dilegentia Currit.

Bellicis quoque se rebus inscruit Myrtus, ut prodidit Plin. triumphansque de Sabinis Poethumius Tubertus in Consulatu qui primus omnium buis ingressus urbem est, quoniam rem leuiter sine cruce gesserat] Myrto Veneris Victicis coronatus incescit, optabilemque arborem etiam hostibus fecit. Hæc postea ouantium fuit corona, excepto M. Crasso, qui fugitiuus & Spartaco Laureâ coronatus incescit. Massurius auctor est, curru quoque triumphantes Myrtea corona vfos. L. Pisto tradit Papyrium Massonem qui primus in monte Albaio triumphauit de Coris, Myrto coronatū ludos Circenses spectare solitum. Avus maternus Africani sequētis hic fuit, M. Valerius duabus coronis utebatur, Laureâ & Myrtea: qui & hoc vouerat. Myrto, quod Plin. taceret, & annotat Dal. mortuorum busta etiam Græci ornarunt, cum inferias soluerent, ut videre est apud Euripidem in Electra.

Agamemnonis de nubos inuaguetur,

et pueri & pueræ, & de eorum Myrtea:

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

Cui responder Agamemnonis altor:

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.

in hæc, quod de nobis & de agamemnonis.



ad Athen. coronas etiam Myrti celebrat

*A. Coronas fortassis uultis, an è Serpyllo,*

*An è Myrto? alia defloruerant.*

*Has è Myrto nos volumus:*

*Alias omnes his exceptis vendito.*

Controuersum fuit apud Græcos, quodnam cōn-  
onæ genus esset Anacreonti Naucratis appel-  
atum. Et pluribus visum est, non aliud esse, quàm  
ex Myrto, Rosis comitantibus: quamuis alii aliter  
interpretentur. Celebris est Hyppoliti & Phædræ  
umoribus Træzenia, cuius folia, ut inquit Pau-  
san. prope Veneris delubrum satæ, perforata nas-  
cebantur: iniuriæ videlicet ferentia læuentis  
unguibus & calami mistris fœmine.

Aliam commentum fuit Græci Fabulam: Myrsinē  
Atticam fuisse puellam pulchritudine ac robore  
insignem, ut reliquis puellas omnes, ipsosque  
adæd iuuenes fortitudine superasse, ideoque Pal-  
ladi, vel ut illi, Mineræ gratissimam. Hanc in pa-  
læstris ac ludis semper versatam, & vincētes cō-  
ronasse. Cū autem certamine iuuenes quosdam  
superasset, ab eis ob inuidiam interfectam: Sed  
Mineræ fauore in Myrtum conuersam. Ita factū  
ut ne mors quidem eius amicitiam deleuerit, Myrto  
à Dea illa etiamnum peramata. Eiusmodi  
nugis Græculi suas spes & cogitationes delecta-  
bant, ex quibus tamen mysticum sensum elicere  
norunt ingeniosi ac docti.

Lesbii, ut inquit Athen. Myrti ramulos hypothy-  
midas vocant: iis se coronant implexis floribus:  
Alii pectorales coronas, quibus & ceruices quoque  
redimibāt, hypothyriadas hypothyridasque di-  
cebant. E Myrto constant & Hellotides vocatæ,  
ambitus ingentis, cubitorum vicendū ab Europa  
dicte, quam Ellorida Corinthii appellant, quod  
eis ossa in Myrto condita ferantur. Quidam Elo-  
tida & Mineram dictam volunt. *Canere ad Myr-  
tum* prouerbio dicitur. In conuiujs enim mos an-  
tiquus fuit, ut vnuquisque suam canticionem cā-  
tillaret. Quod si quis cytharā accipere recusasset,  
(quod & Themistocli euenit, aliās doctissimo, sed  
eo ipso indoctiori habito) utpote Musices igna-  
rus, is per iocum accepto ramo vel Laureo, vel  
Myrteo, ad eum canere cogebatur.

Plutarchus in prim. simp. aliter: Mos antiquus  
fuit ut in principio cōuiujs voce cōmuni primum,  
Deum canerent: deinde Myrti ramū, quem *ἀσπα-  
νον* vocarent, vnicuique traderent post circum-  
latam lyram. Alii dicunt Myrtum ordine non so-  
lere circumduci, sed è sponda ad spondam trans-  
ferri, ut postquam cecinisset is, qui in prima spōda  
primus sedebat, ei traderet qui in sec. lecto prim.  
accumberet. Hic rursus tertii lecti primo. Deinde  
rursus primi lecti secundus secundo, in secunda  
sponda sedenti, ut ad hunc modum per omnes i-  
ret. De ignaris dicitur.

Redeamus ad Myrti historiam: quam Ouid. vni-  
co versu geminam dixit:

*Myrtæ silua subest bicoloribus obsita baccis.*

Baccas quippe candidas, vel in purpure albican-  
tes, candida nigra nigras parit.

Barbari ex Myrtis, Myrtillis & Cubebis. differē-  
tiam facientes, Cubebas vocant *Myrtos albos*: ni-  
gras verò *Myrtillis*.

Bellon. meminit Myrti sterilis, & fructiferæ folio  
lato circa Athos montem, nulla facta menti-  
one coloris fructus: verum alibi scribit se reperisse  
in Amani montis inferiore parte Myrtum fructu  
albo: item planiciem Cæsareæ Ciliciæ abundare  
eā, & planiciem in qua Alexandri & Darii con-  
stitus habitus, copiosam, sed tantum fructu al-  
bo: sed non docet quo folio sit Myrtus alba. Post

verò annotat inueniri inter Alexandriam & Ro-  
settam iuxta mare paruas Myrtos nigras.

Matthiolo Myrtus tam satiaua quam silvestris  
nigra & alba, vna icone folio latiore expressa:  
secunda Tarentina: Tertia Exotica.

Lacunar quoque & domestica & silvestris fructu  
est albo & nigro.

Turnerus in Anglico suo Herbario Myrti dif-  
ferentias ex Diosc. ita digessit, & his aptauit. Duo,  
[inquit] habet Myrti genera Diosc. De Myrto  
satiaua libro primo agit: De silvestri, Latine Rus-  
co, lib. 4. etsi innuere videatur, præter Ruscum;  
aliā esse Myrtum silvestrem. Duo facit idem Di-  
osc. Myrti satiaue genera: Albam, [Angl. *White  
myrt* vel *myrtel tree*] & Nigram, [Angl. *Black  
myrtel tree*] quarum vnam vidisse ait Bononia,

quintuplo minoribus foliis, quàm à Matth. no-  
mine Myrti vulgaris satiaue proponitur. Eandem  
vidisse in Apennino: sed qui demonstrabant, Myr-  
tum silvestrem denominasse: illam verò foliis mi-  
noribus, [quam reuera censet Myrtum satiaua]

Tarentinam] solam Myrtum satiaua. Ego tamen  
[inquit ille] hac in re Matthiolo potius assentior  
quàm contrarium sentientibus. Quāquam vide-  
tur mihi Matth. Ruscum nimis exiguis foliis pin-  
gere, Myrtum autem [alterius ratione] nimis la-  
tis, magnisque, siquidem Diosc. in Myrti filu. seu  
Rusci descriptione [Angl. *Bochers broom*] fo-  
lia ei tribuit latiora quàm satiaue Myrto. Vtrū-  
que vidi. Et certè erratum est in tenuitate foliorū  
Rusci, ut in Rusco dicitur fufius.

Satiaue Myrti rami lenti, cortex ruber, folia  
longa, æterni viroris, ad Punice folia accedentia.  
Alba folia candidiora: Nigra nigriora. Vtrisque  
flores albi, odorati. Satiua bacca maiores, quàm  
siluestribus.

Cæterum Turneri Myrtus visa Bononiæ nobis  
videtur Tarentina, quæ sanè olim non pingeba-  
tur à Matth. Dubitamus an Turner. viderit in  
Apennino Myrti illius speciem spontaneam, quā  
Matth. pro satiaua & vulgari pingit. Scimus autem  
cultam non minora habere folia Rusco: & apud  
Turner. parte secund. cap. de Rusco positam  
iconem Myrti vulgaris pro Rusco, non tamen  
bonam, sub titulo Sabinae. Non displicet illa  
sententia, quæ asserit Tarentinam esse satiaua  
Diosc. ut postea dicitur.

Dod. norante, Myrtus frutex haud magnus,  
cultura in exigua arboris specie, quandoque  
adolefcit: folia vni minuta, alteri verò maiora,  
& Vincæ peruinca vulgaris æmula: tertiæ au-  
tem mediæ magnitudinis. Sunt eadem nonnullis  
rariora, quibusdam frequentia. Fructus sunt  
bacca oblonge, colore aut nigre aut subalbide.  
Hac Dod. qui pro suis differentiis quatuor pro-  
ponit icones plantarum, sibi non benè (ut existi-  
mamus) cognitarum: nec etiam videntur ritè  
eius accommodatę differentiis. Olim in hist. Gal.  
duas tradebat Myrtos sub vna icone, magnam &  
paruam.

Annotat Csfus. se in Hispanica sua peregrina-  
tione aliisque locis multa genera Myrtorum ob-  
seruasse, nec dubitare quin ex fatione maior ad-  
huc varietas oriri possit. Myrtus, Græcis *μύρτος*, Synonymis  
*μύρτιον*, *μύρτος* vel *μυρτίν*: illud apud Aristoph. &  
Plat. hoc apud Galen. & Theoph. *μύρτιον* Pollu-  
ci. Archilochus Myrtum vocauit, & Græci Comici  
phibaleon, ut Antiphanes, notante Hermol. Non  
phibaleon, ut habet Curtius. Pro Ficu inuenimus  
apud Etym. nullibi pro Myrto. Quod verò Rastius  
notat, Murtam dici Varroni fructum, hoc apud  
eum nondum reperimus. Colum. quidem tradat





Ceralep. Myrtus arbor est fruticosa, in sterilibus & maritimis nascens, subrufo cortice, materie candida, foliis buxo latioribus in acutum desinētib; odoratis: Flores candidi, foliati, multis in medio staminibus, ex alis foliorum longo pediculo prodeuntes: fructus oblongi: intrus semina triplici septo membranaceo distincta: color in maturitate alius niger, alius ex rubro candicans. Turnero an nota fuerit, dubitamus: Icon tamen, sed nō admodum bano posita videtur incuria typographica Cap. de Rusco sub titulo Sabine.

Ceterum nostram Myrtum vulgarem, folio latiore, non ausimus cum Matth. facere Diosc. sariū, etiam si colatur: quia ipse Diosc. scribit cap. de Rusco, sariū folia esse minora quam Rusci, quod in hac nostra nondum obseruatum. Quam verò depictam dedimus, eandem censemus cum iis quas Frontignani & Monspelii vidimus in aliquot hortis.

Patavii cum baccis mense Decembri, in horto à Cortuso ostensa: Verona cū iisdem Martio. Colunt & Bononia in hortis: Basilæ Platerus, & Lutetia Robinus hortulanus Reg. aliquot egregias arbutulas colunt, sed magna cura hyeme recondunt. In Plateri Myrto mense Aprili observavimus baccas & folia binario numero distributa, sapore astringente, amariuscule & aromatico; odore grato terendo. Ex horto Sturgardienſi, vbi plures habentur, in Montbelgardenſem translatimus, sed non feliciter provenit, cum tamen Tarentinae tam depacti faciliē radices agant.

Myrti Batica latifolia secundum genus altius quam Batica latifolia domestica fruticat, & à radice plurimos, densos, crassos, firmosque ramos promit: folia dicta secundæ speciei similia, sed adeo confertim nascentia, ut mutuo fere se se contingant pediculi interdum duplici tantum serie, sæpenumero triplici, admodum odorata: flos eius candidus, quinque folijs constans. Cerasiorum floribus fere similis, villis candidis plenus, odoratus: cui fructus succedit paulo oblongior, quam in Tarentina, primum viridis, deinde cum matureſcere incipit, purpurascens, tandem vbi plenam maturitatem adeptus est, niger, vinosus, sapore grato, grana candida incurva in se continens. Clus. qui hoc genus primò conspexisse scribit in Complutenſis arcis horto, multis fruticibus serie quadam & ordine dispositis, elegantissimo spectaculo, cum semper vireat. Deinde Cordubæ in quibusdam hortis. Nos quoque Sturgardie observavimus Myrtum, odore perquam fragranti, cui ex certis intervallis folia fere semper terna indidem prodeuntia, laræ: an verò eadem cum prædicta sit asserere non audemus.

Locus.

An Lob. Obs. Exotica Myrtus Plin. pluribus foliorum versibus, siue 4. amatoria Venetique sacra: Arayham Morisco maior Hisp. vocata, folijs [tertiæ Myrti vulgari albæ] non disparibus, sed canulatis, & confertim iucundissimo spectaculo stipatis.

Clus. in Hisp. nullam habebat iconem: in postrema hist. eandem habet quam Lob. pro Myrto Batica angustifolia, de qua nunc.

## MYRTVS BOETICA LATIFOLIA DOMESTICA.



Hæc autore Clus. Hispanis dicta Arayham morisco, hoc est, Mauritanica Myrtus, ramis est satis crassis, foliis duplici serie ratiùs dispositis, magnis, ut interdum ad Lauri tenuifoliae aut Arbuti foliorum amplitudinem fere accedant; colore dilutius paulo virente, odoratis: ratiùs hæc floret aut fructus fert, quod

ea sepius texendis, quas tondere solent; plerumque utantur. Nusquam hoc genus vidisse ait, nisi in Monasterio quodam Hispalit & in lætissimis Mauritaniæ Granatæ viridariis, in quibus piscinas & lacus claudabant sepes hoc Myrti genere constantes, & ex alio quodam, non multum huic dissimili, minoribus tamen & paulo densioribus foliis, cuius nos hic picturam damus, quamvis minus peritè nostram à pictore ex Clusiana depictam agnoscamus.

Myrtus Batica 1. latifolia siue Laurea Clus. Item Myrtus Batica 2. Clus. Lob. Obs. vbi eadem icon cum Clusiana.

Myrtus Batica latifolia exotica.

## MYRTVS EXOTICA ANGUSTIFOLIA



Myrtus Batica angustifolia exotica eadem est foliorum densitate & serie, quæ Myrtus Batica exotica latifolia verum folio minore & saturatius virente: fructu etiam maiore & magis orbiculato, qui, reliquorum Myrtorum fructus instar, alba & inflexa grana fert; minora tamen quam præcedentis.

Huius generis unicam arborem vidisse refert Clus. in Hieronymitarum monasterio, primo ab vrbe Corduba miliari: Hispani Arayham morisco, hoc est, Myrtum Mauritanicam vocant. Latinis de Clus. sententia poterit esse Exotica, licet tenuis ad summum foliorum versibus distinctam idem viderit, cum Plin. senos versus suæ exoticae tribuat: verum quidem est, adeo dense stipata interdum nasci in exotica latifolia ante dicta & in hoc genere folia; ut pluribus versibus constare videantur.

Pro Myrto exotica angustifolia Clus. ponit iconem à Lob. exhibitam pro exotica Myrto Plinij pluribus foliorum versibus, de qua ante.

De Myrto exotica angustifolia Clus. hæc forte

scribit Lob. Myrtus 10. Pluribus foliorum versibus: Myrtus Mauritanicus alter Hiss. *Arayhans* Morisco minor, folijs item canulatis confertis & densissimè striatis, vulgatè Myrto ferè paribus. Iconi iam dictæ ex Lob. & Clus. Dodonæus in post. hist. Lat. nomen indidit Myrti 3. cuius folia trādit mediæ magnitudinis.


Marth. in Diosc. olim sine descriptione pro Myrto exotica Plin. exhibuit iconem. In postremis autem scribit: Exotica habetur nunc in Italiae hortis & viridarijs, folio nostrati non absumili, dilutiore tamen, acuminatiore copiosioreque, aded densio; vt eo rami vbiq; stipentur. Fructum fert oblongum & longoque pediculo dependentem, feminibus refertum, communi Myrto haud absumilem. Flores albicantes, vt in cæteris generibus: topiarijs operibus peridonea habetur. Item post. com. Lat. Exotica Myrtus nunc habetur in Italiae hortis, folio nostrati non absumili &c: Et in hist. Germ. vbi figura à Camer. appicta: *Der Augstendische Myrtendbaum*, Myrtus exotica, quæ olim Italiae peregrina, aliunde translata, maxime verò in Regnum Neapol. & c. Baccæ oblongæ, vt in Myrto vulg. sed sapore non aded grato, verum asperiore & magis acerbore.

Camer. iconem nouam posuit in Egit. ex hist. Germ. Marth. & Gesnerianis, vt existimamus, ad quam & nostra depicta.

Ceterum Myrtum exoticam Marth. à nobis visam Veronæ apud Calceplarium inter Italicas nostras observationes inuenimus: eodem nomine & titulo D. C. Bauh. ramum attulit Ferrariæ lectum.

#### MYRTVS LATIFOLIA BÆLGICA; FORTÈ ROMANA.

Descriptio.



Romana.

Coniugula.

sibi non visam.

Lob. in obs. Myrtus prima omnium maxima, Laure dicta à folio Laurino, Lauro Tino siue Regiæ simili, sed minori & magis acuto, atrouidente, nigraque bacca: alitur in altissimo Paradiso D. Philippi *Deurnagle* D. de Vroylande. Dod. iconem hanc ponit pro Myrto 2. cui folia Vincperuinæ.

C. Bauh. Myrti Romanæ nomine attulit ramum Myrti Bononiæ isti hortis nascentis cuius folia Myrti exoticæ, sed nonnihil latiora, in acumen

Myrti Romana alia species.

definentia, longitudine vnciali, sed longè alio ordine disposita: quippe bina sibi opposita, ex intervallo penè vnciali, quæ in re multum etiā differunt ab exotica, & accedunt Myrto vulgaris: sed ab hac quoque dissidet mollitie, foliorumque latitudine maiore.

*Myrtus latifolia Belgica minor.*

Myrtus alia, teste Clus. in hortis Belgicis prouenit, paulò minor præcedenti interdum vegetiore viridiorque folio, quandoque pallidior & tristiore. An Lob. obs. Myrtus 6. inter maiores minima, folio Olææ silu. siue Oleastris.


*Myrtus latifolia Belg. densiore folio.*

In Belgicis hortis obseruauit Clus. Myrtum densiore folio & magis mucronato quam præcedens Belgica, eodemque nunc vegetiore & lætiore, nunc etiam pallidior. An Lob. obs. Myrtus 2. folia habens paulò minora [quàm prima omnium maxima] supernè item mucronata, & in acutum fastigiata?

*Myrtus Belgica medio folio.*

Myrtum quandam tradit idem in Belgicis hortis visam; medio folio & Myrto Bæticæ silu. non multum absumili, sed minus nigricantibus & quodammodo pallefcenibus virgulis, longiore etiam fructu. An Lob. obs. Myrtus 7. inter minores maior, folio angusto Phillyreæ tenuifoliæ breuiore. Hanc eandem existimamus à nobis obseruatam Viciuntii in instructissimo exoticorum horto D. de Bellefontaine: folia erant paulò maiora, quàm in Tarentina & acuminatiora.

#### MYRTVS TARENTINA.



Nōsto cetero soloque reliquis notior est Myrtus Tarentina, duplici triplicique versu dispositis folijs, crebris, paruis: hilari virore nitidis, fragrantibus: Flores quinque folijs candidis aliarum more constant, quorum mediū occupat numerosa stamina, odore grato & amabili. Baccæ per (maturitatē haud secus ac aliarum) nigrescunt,

semine plenæ, inflexo, albo. Huius iconem olim Marth. exhibuit sine descriptione. At in post. com. hanc tradit nomine Myrti Tarentina, quam ait à Tarento Apuliæ ciuitate, vbi copiosè proueniat ita vocatam, folio nostrate [id est latiore vulgari] longè minoriore, robustioreque fructu minore, copiosiore & in summitate pluribus apicibus coronato, colore ex nigro purpurascēte, minutis, crebris, albicantibusque inrus ossiculis: floribus communi Myrto similibus, Topiariis peridonea.

De eadem sic Clus. In Belgio Myrtus prouenit minore folio omnium frequentissima in Septentrionalium regionum hortis, antequam minor domestica fructu alba nota esset. Eius cum ramuli facilius



etiam radices agat, si pingui solo pangantur, quam huius, etiam satis vulgaris facta est multis Germaniae hortis. Habet verò minor hæc conferta admodum folia, duobus ut plurimum versibus in ramulis disposita, nonnunquam ternis: quemadmodum in alijs generibus aliquando etiam accidit. Floret plerumque in Belgio autumno: fructus rarissime ad maturitatem peruenit, sed in ipsa planta tota hieme hærens, cum rursus sud veris finem aëri exponitur, inanis & immaturus decedit. Ad Tarentinam Myrtum referenda est: nisi quis potius ita censeat, candidam minutissimo omnium folio Tarentinam esse vocandam. Nam cum Caro ramentum nigra, alba, & coniugula meminerit: iam verò coniugula Plin. sit Romana, nigra & fructu satis nota: restat candida, quæ ad nullum Plinio descriptum genus referri possit quam ad Tarentinam. Sic Hortensis in Belgio proveniens minuitore folio non incommode Egyptiam Theoph. descriptam refert.

Minoris Myrti nomine Aduersaria eradunt, Offic. notiozem esse suis baccis, adeoque totam hortis Septentrionalium delicias & ornamentum. Fructu virgis tonsilibus, rectis, flexilibus, nigricantibus, effigie Buxi, folio minore, sed Rusci mucronato, baccis nigris Hederæ, vineum succum pressu remittentibus: quibus post vindemias saginentur aues, tamque suas illas edendo fieri, ut integre, non exenterate escentur, coque proverbio feratur, sterus earum præstare carnisbus.

In Galloprovincia maritima, vbi sicaneus collis nullus, cui arideat paullo placidior aura, nō multavenerat hæc Myrtus, autore Lobelio & Pena. Sed, quod aiunt Myrtum minorem suis baccis officinis notiorē, vix cōcedere possumus, licet in Belgio frequentior sit, teste Clusio. Consideret lector vnde adferantur bæcæ. In Belgio sanè non maturantur, quot eis sufficiant: sed nec istud placet, quod folio Rusci mucronato dicant.

Hanc eandem censemus Lob. obs. Myrtum 8, minorem vulgata, brevioribus [quam 7. a.] folijs stipatam: vbi sicut & in Icon. Plant. proponitur titulo Myrti minoris vulgaris. Gal. *petit Myrte*, quo nomine & Dod. in Hist. Gal. describere videtur: qui iconem habet, quam tamen non docet an maioris sit vel minoris, quasi neutram probè cognitam habuerit: Nos minoris esse putamus. In post. hist. Lat. omiſsa descriptione, meminit tantum Myrti folijs minutis: ac iconem à Lob. positam pro Myrto noua angustifol. & à Clus. pro Myrto domest. fructu albo, exhibet is titulo Myrti prioris: nec distinguit Tarentinam à minore, nec à Myrto fructu albo.

Camer. Myrti Tarentinæ titulo iconem Gesneri habet atquando ex nostra ipsi transmissa planta sicca, paratam. Ei quippe (ego Bauh.) omnes meas plantas siccas cum descriptionibus & observationibus per Italiam, Galliam, aliasque provincias collectas lubens, eo id flagitante, transmissi. In ea icone folia sua magnitudine picta.

CÆSALP. forè Myrti Hispanicæ genus angustissimi folij, sed numerosissimi. Ceterum quod Diosc. ait l. 4. de Rusco: *ἀγρία, ἡ ἰσθὶν αὐτῶν ἐν ποταμῷ ἔχει ἵκανον, πικρὰ τὸν σπόρον δὲ*: mouet nobis dubium, an fatiua eius Myrtus non sit referenda ad Myrtum Tarentinam. An Turner. Myrtus fatiua Tarentina, de qua antè.

Porro Myrtus Tarentina pulchre apud Matth. picta quamquam folia crebriora possent appingi, Abundat Monspelij in hortis & in maiusculam arborem excreſcit. Fructum fert Augusto mense

& autumno. Floret Iulio aut Iunio. In Italia multis hortis copiose colitur: Item in magnarum tam Germaniæ quam Galliæ hortis, sed tarò fructum fert aut certe rarum, quemadmodum & apud nos Montbelgardi, vbi plures alimus, aliquot etiam duos cubitos altas, stipite pollicari, iam à multis annis. Floret æstare & aduentante autumno: sed fructum pluuiæ autumnales intereipiunt. Feliciter propagatur ramis & surculis depactis: sed annotina vix hiemem ferunt, nondum firmis actis radicibus, nisi curiosè muniantur. De loco & cultura quemadmodum & viribus omnium Myrtorum postea.

Myrtus domestica fructu albo.

Myrtus domestica fructu albo, siue candido, tradente Clus. satis altè fruticat, tenellorum & rubentium ramorum frequentia densa, folijs omnium minimis, angustioribus & magis mucronatis, quam in vlla Myrto, saturatiùs virentibus, fragrantis odoris. Flos pat. reliquis tum etiam fructus, qui initio quidè m viret, maturitate autè non nigrescit, ut reliquorum, sed exalbidus manet. Primum hoc genus eidem conspectum in hortulo Ill. Viri Dn. Ferdinandi Colinho Lusitani peregrinarum studiosiss. cuius hortuli sepes ex hoc Myrti genere constabant. Conspicitur etiam apud Cl. V. D. Io. Boissot, qui omnium primum ex seminibus ab eodem communicatis aluit.

Hæc forè Tarentina Plin. vt cap. præced. dictum. Hæc eadem forè Diosc. *αγρία, ἡ ἰσθὶν αὐτῶν* Clus. in hist. Hisp. eius iconem non ponit: verum in postrema exhibet eandem quam Lobel. posuit pro angustifolia minima, ex quâ nobis mox eodem titulo proponitur. Myrti doesticae alteræ ex Hispania allatæ fructu albo se Clusium donasse ait Camer. sed frigoris impatientem periisse.

#### MYRTVS ANGVSTIFOLIA MINOR.



Clus. tradit Myrti domesticæ fructu albo inueniri aliam speciem eiusdem formæ, sed per omnia teneriorem, exiliore folio, primum visam in hortulo Ill. prædicti viri.

An hæc Lob. in obs. myrtus 9. minima, foliolis angustis, Thymi Cretensis longioribus: cuius iconem proponit in appendice & in icon. titulo myr-

ti 9. angustifolia. Clus. verò in postrema sua historia posuit pro myrto domestica fructu albo. Nos Lutetia in orto cultissimo Robini Botanici Regii diligentissimi obseruauimus myrtum angustiore & minore folio quam Tarentina, aliàs nullibi quod equidem sciamus, nobis visam, ac ne siccam quidem. Iconem hanc, vt antè dictum, Dod. ponit pro myrto priore. Hactenus Myrti differentias digessimus, prout censemus distingui posse. Nunc aliquid etiam de myrtidano tradendum.

## MYRTIDANVM.

**Defcriptio.** **Q**uod *myrtidany* dicitur, teste Diosc. id est, quod Myrto adnascitur, inaequabile, verrucosum, intumescensque & concolor: quod perinde, quasi manus, Myrti caudicem amplectitur. De hoc ipso locus videtur Gal. l. 7. simpl. his verbis: *η μυρτιά τοις αἰσθησις τῆς χειρὸς καὶ τοῦ ποδὸς ἀδύνατον ἐκ τῆς αἰσθητικῆς τοῦ μυρτιάδου οὐδ' αἰσθητικῆς.* Verum Paul. Agin. non *myrtida*, sed *myrtida* hoc ipsum appellauit. Idem Gal.

**Myrtida.** **Gloss.** Hip. Dioscoridem citans, inquit: *μυρτιάδων, οἱ περὶ τοὺς ποταμούς. Διοσκουρίδης δὲ ὁ ἀνὴρ λέγει ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, ὅτι μὴ ἀδύνατον ἐκ τῆς αἰσθητικῆς τοῦ μυρτιάδου οὐδ' αἰσθητικῆς.*

**Myrtidani.** *ἡ μυρτιάδων, ὅτι μὴ ἀδύνατον ἐκ τῆς αἰσθητικῆς τοῦ μυρτιάδου οὐδ' αἰσθητικῆς.* Meminit autem myrtidani Hip. in secundo de morb. mul. Ergo aliter ab Hip. aliter à Diosc. accipitur *τὸ μυρτιάδων*. Galeno verò homonymum est & utramque significationem agnoscit. De Hip. myrtidano dicitur cap. de Pipere. Plin. verò longe aliter myrtidanum accepit, nempe vinum ex siluestribus myrty baccis factum, de quo postea:

**Myrtidanum.** *Myrtidanum, Plin.* Scribit quoque Braslau. in exam. Myrty adnasci paruum Myrtum, quae Myrtidanum dicitur & Myrtida à Paulo. Id enim intelligere se per adnatum id, quod circa corticem nascitur. Epimyrty vocat, & frequentissime à se visum, quamvis Gal. myrtida sobolem Myrti solum intellexit. At facere nobis videtur Braslau. intelligendo, ut nihil intelligat. Nam aperte ex Gal. locis modò citatis patet à Gal. per Myrtida non tantum sobolem Myrti intellectam, cum ipsum etiam Diosc. citet. Immo ubi sobolem per *myrtida* intelligat, nondum vidimus. Non enim aequè feliciter nobis Braslau. sobolem dicit, quod Diosc. & Gal. *ἐκ τῆς μυρτιάδος* vocitarunt. Et iam nobis Braslau. paruum Myrtum facit ex myrtidano, quod Diosc. si non excrementosum quid, saltem pars quaedam tuberosa & excrementitia dicta: quam nobis seuerus ille examinatore nunquam rectè paruum myrtum dicit.

**Agrii noi.** Idem tradit, Myrti semen àb Hip. myrtidamò dici. Locum nondum vidimus. Si tamen quis per Myrtidanum vel myrtida, aequè intelligere velit paruum myrtum, magnè adnascentem, quod & Agricola fecit, ac adnatum id, quod circa corticem nascitur: primum est vt doceat nos quæ & qualis sit illa Myrtus parua, vt aliud nomen à matre sua habuerit, quam rami aut furculi: aut quo autore istud faciant. Non enim putamus vt Cisto hypocistis, ita myrto Epimyrty seu hypomyrtum innasci. Nec quicquam hæcenus, quod equidem sciamus, simile obseruatum.

**Myrtidani.** *Myrtidani.* Hermol. sanè myrtidanum seu myrtidam virgultum & sobolem myrti vocat, qualis fortasse in Ficu quoque fruticet, exiens ab radice: eundem fruticem ab Hip. *Myrtidanum* appellatum, *Myrtidanum* verò ipsum Piper. Quo verò in loco is apud Hip. legerit martidanum, nec addit, nec notum est nobis. Ruellius ex eo imeminit Martidani. De ea autem voce nihil Grammatici nostri. Nihil etiam de martidano seu myrtidano frutice recentiores Herbarij: quod legerimus. Quod autem autem Diosc. myrtidanum nominatur, vulgò notissimum est, ubi myrtus frequens nascitur, vel Matth. teste.

**Myrtidani.** *Myrtidani.* Annotis Myrti arboribus, inquit Camer. in ramis nascitur inaequale & tuberosum, colore vario, excrementum, quod manus instat, arborem complectitur, quod Myrtidanum appellant, astringentius efficaciusque quam Myrti vel folia vel semen.

Horum neuter fruticis aut stolorum ineminit.

Myrti adnascens dicitur Lonic. An eadem intellexit Nicatid. in Ther. per *quodam myrta*, stipantia Myrta. Myrtades quippe Myrto ipsa efficacius stipare & obstruere apud omnes in confesso. Nunc Natales Myrtorum in genere dicamus.

De Myrti Narahbus non conuenit inter Virgilium & Ouidium. Ille, Amantes frigora Myrtos, dixit: hic, metuentem frigora myrtum. Nodum soluisse putat Camer. sic: Ouid. loqui de plantis tenellis, Virgil. de adultis inam & hic Eclog. 7:

*Dum teneras defendo frigore Myrtos.*

Sanè tenellas myrtos, vt facile à frigore, ita facile à Solis æstu pari exporimò scimus. Malimus itaque sic. Vtrumque de myrto etiam adulta locutus, sed Ouidium magna frigora, Virgilium, loca vmbrosa & frigidissima myrtum mitum in modum odoratam affurgere scribit: ubi cætera omnia hebescent. Hermol. vitam ei, vt quibusdam animalibus, ambiguum esse ait, hoc est, terram & aquam. Ita Virgilius

*Amantes littora Myrtos. Et*

*Littora Myrtis latissima.*

Et Ouidius *Littora Myrtis*. Subeunt & in monrofa autore Plin. Sed myrtum in fetidissimis locis nasci etiam Theoph. autor est, minimeque in frigidis durare, minùs adhuc myrtum quam Laurum, argumento, quòd in Olympo Laurus multa, myrtus nulla omnino, in Ponto autem toto neutra sit: quanquam summo studio omnique solertia ferere conati sint ad vsus religionis. Hinc Plinius circa Bosporum Cimmericum in Panticapæo vrbe, omni modo laborauit Mithridates Rex, & cæteri incolæ, sacrorum certe causa Laurum myrtumque habere: non contigit, cum teporis arborum abundantiæ. Circum promontorium, quod vocant excelsum, refert Theoph. myrto scatere, quod Circen incoluisse tradunt indigenæ, & in Elpenoris inibi tumulo coronario genere nasci, in quo primum visa traditur, Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse Italiæ apparet. Libenter myrtus in sepulchris nascitur. Fingit Vergilius à Polydori in Thracia sepulchro cornu & myrtum agnatas: ad quas cum Aeneas venisset, & veller sacrificare, & eam frondibus contegere, nixus est myrtum euellere, è cuius radicibus sanguis effluxit:

*Forè fuit iuxta tumulus, quo Corne summo*

*Virgulta & densis hastilibus horrida Myrtus &c.* Hoc verò è consuetudine Græcorum Poetam finxisse censet Turnebus, qui tumulis & bustis, cum alia virgulta, cum myrtum imponere solebant, quod eruditissimus vir Victorinus annotauit. For Agric. ex Hermol. vt putamus, tradit myrtum modò in terris, modò in aquis nasci. Idem repetit Ruell. Sed nos contra non existimamus myrtum aliquam veram in aquis nasci. Si intelligant Oxycoeca Vaccinia quorundam aquatica, valde errant, quæ errorem iamdudum annotauit Turnerus Anglus. Copiose verò nascitur in Galloprovinciæ maritimis tractibus, quemadmodum & Italiæ & Hispaniæ. Sed non omnis. Loca propria differentiis assignauimus. Clusius annotat, omnia myrti genera Hispanica præter Beticam latissimam domesticam confecta apud cl. v. D. I. Boissot, qui omnium primus ex feminibus à se comunicatis aluit: deinde apud plerosque alios quibus comunicauit. Rami enim in, terram pacti radices agunt, vt mox dice-



tur. Apud eundem & alios Illustres viros & nobiles matronas in Belgio alia myrti genera ab Hispanicis diuersa aluntur. Coluntur in Italiae hortis & Gallia; sed rarius Germaniæ nec nisi Magnatum, diuersa genera, potissimum Tarentina & latifolia. In Italia eleganter in topiaria opera cōcinnare solent, quemadmodum & in Gallia locis quibusdam. Myrtum Ferrariæ in hortu Comitum cuiusdam tam artificiosè Liburnicam referentem vidimus, vt nihil suprâ. Tritemem item tam pulchrè tres tritemorum ordines exprimentè, & ramos in eo consili opera tam aptè in humanam effigiem aptatos tam Romæ quàm Venetiis vidimus, vt ab eo tempore ad opera topiaria myrto nihil aptius, nihil sequacius iudicauerimus. Quâuis autem passim in hortis Italiæ colantur abunde myrti, nihilominus in montibus cæduntur ad coria depellenda, vt Rhus & Lentiscus, teste Cæsalpino. Tarentina facillè germinat in Germaniæ hortis sata & culta: paulo difficilior, latifolia, Montbelgardii sapius à nobis sata nigra & alba: sed frustra. Folia cum baccis ex citatis regionibus, maxime Italia & Galloprovincia importantur.

Sunt qui diuturnissimam & validissimam myrtum esse affirmant, autore Theoph. Serò suum perficiunt fructum apud nos in Germania, aut rarissimum. Florent pro ratione loci; calidis citius, frigidis tardius: communiter æstatè, Iunio & Iulio mensibus: Quæ citò occidit; inquit Plin. velocia sunt; vt ficus, myrtus; &c. & tamen antecedent diuinit. In trimatu enim ferre incipiunt, ostendentes & antè. Ita vides circa durationem & ætatem myrti Plin. non consentire cum Theoph.

Scrutur ligno; ramis & semine: sed terra iugiter accumulanda, dum germinantes ramuli roborentur. Ligna tamen eius haudquaquam palmo minora diuidi oportet, inquit Theoph. Crebras ferere, non plus, quàm nouenos pedes distantes præcipiunt. Myrti genera omnia in Campania feruntur, vt Plin. tradit. Romæ propagine Tarentina. Democritus & alio modo scri. docet, grandissimis baccharum sulis leuiter ne grana frangantur, & eaque intrita restem circunlini; atque ita feri: sic parietem fore mixtæ densitatis ex quo virgulæ differantur. Sic & spinas sepius causa ferunt, romice moris spinarum circumlita. Pullas autem Lauros & Myrtos oenopas [ita enim leg. cum Dal. pro eo quod in vulgaris habetur: Pilas autè Lauros & Myrti inopia.] à trimatu tempestiuum est transferre. Sic inquam legendum. Nam Lauri & myrti terra emergentes & nouellæ, coloris sunt herbacei: grandiores verò obscurius virescunt & adultæ subnigritæ videntur, quas *oenopas* vocant. [Quidam legunt Pullulos autem Lauri & myrti, in inopia à trimatu &c. Alij: Pullos autem &c.]

Myrtus & tales ferunt eodem autore: Græci locis editioribus feri præcipiunt; quòd vicina odoris suauitate repleat. Auulsus stolo, aut termes à cacumine decerpitur; proceritate subrectus pangitur: qui solo stercore satiato, quouique ramulos emittat; exaggerari debet. Sunt qui cubitales palos, crassitudine manus, scrobibus, Olearum more, in obliquum mergunt. Alij ex baccis seminaria faciunt, quas leuiter rufas, & restibus Butomo contextis involutas, fossulis obruunt. Alij melius fructificare arbitrantur si in caput plantentur.

Inferitur in suum genus, & candida nigrae ac vice uersa: Item Punice, malo, mospilo, Illochnæ: teste Constant. Ex myrto per infusionem malum

Punicum crescere Plutarchi in sympo. testatur. Democritus quandam sympathiam esse naturalem myrto ad mala granata scribit. Proximè enim conficis, facundiores fieri, earumque radices inuicem connecti; & si non multum etiam propinquæ sibi fuerint. Idem scriptum reliquit Sim. Sethi.

Si verò iuxta ipsam plantentur Rosæ, latiore coma virebit, vberioresque fructum pariet vtraque. Baccas Myrti in arcolas ab Idibus Feb. vel etiam Calendis disserere præceperunt.

Baccas sine internis nucleolis creabit crebro aquæ tepentis imbre rigata; autore Theoph. Deprehensum id est fortuito; cum myrtus iuxta balneum staret neglecta. Ab hac enim vacua nucleop femina perentes ferebant atque ita genus huiusmodi Athenis esse coepit; inquit idem: quod tamen nobis rationi minus consonum videtur, necimus an experimento compertum, cum in acinis seu nucleis vti que vis generatiua potissima consistat, tanquam in semine. Quæ enim huic obducta pellicula & caro, semen non est; sed seminis operimentum.

Eti igitur *ἀμύμον* nasci fructum ex quorunda relatu tradat Theoph. quod & Constantinus Geoponicus confirmat, ex eodè tamen alias nasci aut vnquam natas minime putamus. Vt vel *ἀμύμον* Theoph. pro *ἀμύμον* accipiendum videatur, respectu reliquorum, hoc est, pauciora femina ferentium; vel sanè magna dubitatio relinquatur, quomodo ex fructu *ἀμύμον* nasci queat myrtus.

Scaliger difficultatum alioqui morosissimus examinatur, super hunc locum nihil, quod acumen eius redoleat. Historiam perspicuam ait. In myrto mutationem fieri per balnei strigmenta & sordes: diuturna illa aspersione talem factam, adeò vt in naturam transierit. Ex ea namque species eas fuisse postea Athenis; hoc (addit) fortuitum fuit. At sit fortuitum, tepide aspersu, vel, vt ille explicat; fordidum; *ἀμύμον* factam: at non idèd fortuita fuit eius propagatio. Decepta quippe ab Atheniensibus femina, lataque ordinato naturæ cursu similes produxerunt species, quæ in principio (*ἀμύμον*, vt Theophrast. loquitur, *οὐδὲν καὶ ἀμύμον*) casu fortuito talis facta. Sanè & ipse Theoph. subdubitasse videtur. Quid enim sibi aliud vult illud *ἐκ τῆς ἀμύμον* habetia aliquam probabilitatè vel fidem: Sed nobis magis hæc apud vulgus; quàm illa apud sapientes, meditemur acutiùs. Quid si per *ἀμύμον* non omnino enucleatum aut exacinatam intelligamus myrti fructum; sed nucleis tantum duri, aut talis; qualis in cæteris, expertem? Sic eodem sensu *ἀμύμον* ferid, Mali Punici genus, cui lignosus nucleus abest, quales blandiores acinos dixit; minus amarus, distinctos membranis. Et Apollon. apud eundem l. 3. eiusdem: *ποῦς ἀμύμον γὰρ νύκτας, ὅθεν γὰρ ἔσται*. Non igitur per *ἀμύμον*, omnino nucleis carentem intelligimus; alioqui nihil inde nasceretur: Sed carentem tali & tali, suæ speciei consuetu, completo, duro &c. Nā & Apyrena Punica grana habere & acinos in cōfesso eliciunt nō & Apyreni myrtilli.

Porro Myrtis etiam validius sterius congefendum præcipiunt, inquit Theoph. nempe spuiticis pellium; vrinamque quin germina profluerint: quasi fructus ita reddi apyrenos (sic enim malumus; quàm exacinat, aut nucleos carens) queat.

Gaudet Myrtus iugi repurgatu; ita in altiore proceritate adolescit. Degenerat in fruticem; nisi crebro purgetur: maximam purgatione quætere Andronion est autor: Latius etiam germi-

Sympathia  
Myrti cum  
Granato

Serendi  
tempus.  
Vt baccas  
et nucleos  
nascantur.

Theoph. ex-  
plicat illu-  
str.

Scal. moro-  
sis difficul-  
tatum  
examinatur.

Cultura.  
Vt latius  
germinet

nat, & ex anniculis fructificat furculis, à qua plura fuerint adempta, largioremque fructum ministrabit.

*Ps ex anniculis fructificet. r' sus lacula.*

Assidue quoque circumpurgata, cum ad textilia vasa, tum ad iacula ac spicula apta sit, autore Constantino Geoponico ex Græcorum testimonio. Humana vel ouilla vrina rigari desiderat: siquidem eâ, vt produnt, mirè lætatur. Plantas Myrti à trinitatu tempestiuum est transferre. Diligenter à frigore munienda, quoniam & tota arbor minus calida est, & proinde facile gclatur. Eiusdem maiores plagæ, si aliquæ fortè inferantur, contegendæ, ne admittatur vel Sol vel aer: nam alioqui periculum est, ne morbum contrahat quod fauciatum fuit. Sed nec corticè detrahendum censent Geoponici, quod alioqui in alijs quibusdam vtiliter fit: obsepit enim, conseruatque arboris vitam. Breui quoque interuallo conferendæ, vt se contectû operiant mutuo, atque Solis nimios æstus auferre possint. Myrtus multo macerata, melius redolere incensa putatur, vti prodit Theoph.

*Repositio.*

Virgas Myrteas si voles cum baccis seruare, inter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, suprâ stet amurca facito. Sed ea, quæ demissurus eris, sumito paulò acerbiore. Vas, quo condideris, oblinito planè: *Cato.* Myrti baccæ in vasa non picata coniectæ & cooperatæ, ad multum tempus virides habebuntur. Alij vnâ cū ramulis ipsas componere præstabilius putant: *Confl.* Myrti fructus Soli expolitus mox arescit: in vmbra autem posita, Solemque modicè sentiens, humorem suum, qui exiguus, seruat, & paulatim coalescit.

*Myrtorum virtus & vltus.*

*Temperam. Sang. sp. sum. Vescia erosio. Stomachus. Phalang. morius & scorp. Capillorum cuncta. Vlcera. Ophthalmia. Agilops. Vinum Myrtes. Crapula. Prodromi. dentia anti. & Sulcia. Fluxiones. Furfures. Vlcera capitis. Papula. Capillor. destitu. Luxatio. Fractura. Vitiligo. Aures purulenta. Capillorum cuncta. Humida. Sciera. Fluxiones. Calicæ. Herpes. Erysiel. T. s. s. m. in. flau.*

myrtus satiuâ nigra, docente Diosc. medicinæ vtilior quàm candida: & in eo ipso genere accommodatior montana: fructum tamen inefficaciorē habet. Vis tum ipsi Myrto, tum etiam fructui astringentia. Ac fructus quidem seu viridis, seu etiam aridus in cibo datur sanguinem excreantibus, vesicæque erosionē laborantibus. Virentibus baccis expressus succus eisdem effectus exhibet, stomacho vtilis est, vrinamque ciet. Prodest cum vino à phalangio demorsis & à scorpione ictis. Fructus quoque decoctum, capillum tingit. Is ipse cum vino subferuefactus & impositus, vlcera in extremitatibus corporis nata sanat. Cū tenuissimo verò polente polline impositus, oculorum inflammationes lenit: quin & ad agilopas illinitur. Vinum porò myrtites, quod expresso & aliquantū seruefacto fructu fit, (aliter enim paratum acefcit) præsumptum, crapulam atcet, & ad eadem ad quæ fructus ipse valet. Vile quoque ipsum in descensionibus vuluarum & sedis proidentia, itemque fœminis fluxione vuluæ laborantibus: detergit etiam fursures, vlcera capitis manantia, & papularum eruptiones: fluentes quoque capillos continet. Additur & in Emplastris lenibus, quæ liparas vocant, veluti etiam quod ex ipsius folijs conficitur oleum. Quin & foliorum decoctum ad infessus conuenit: eoque laxati & agrè solidescētes articuli, itemque fracta, quæ non confertbuere, vtiliter fouentur. Vitilignes quoque emaculat: Ad aures purulentas, denigrandasque capillos infunditur. Sed & cori succus eadem efficit. Ipsa verò folia trita & ex aqua illita, humidis vlcēribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisq; profunt. Siquidem Admisso oleo omphacino, aut exiguo rosaceo cum vino, valent ad herpes, Erysielata, testium inflammationes epmyctidas & cōdylomata. Arentia verò folia paronychij & pterygij, itemque alis feminibusque humenti-

bus, adeoque tertum virus spirantibus vtiliter insperguntur, & cardiacorum sudores prohibent. Caterum cremata, aut etiam cruda, cum cerato ambustis, pterygij & paronychij medentur. Exprimiur & folijs succus affuso vino vetere aut aqua celesti, cuius recentis vltus est. Nam exiccatus situm contrahit, virelque amittit.

Quod verò Myrtidanum dicitur, magis quàm Myrtus astringit. Tusum verò & vino aultero addito coactum in pastillos, siccaturumque in vmbra reponitur. Efficacius porò est tum fructu tum folio, ceratis, pessis, inflectionibus & cataplasmatibus admistum, vbi constringendum aliquid est. *Hætenus Diosc.*

In quibusdam Hipp. exemplaribus de nat. mul. legitur: Myrti nigra (μύρταν μαύραν) fructum tritum, aqua maceratum, & polentâ immixta ebibitum vteros purgare. At me quidem quod attinet, Hippocratis codices hoc capite grauius transcribendo conturbatos existimo, cum præsertim m. m. ad fluorem muliebrem rubrum myrti baccas nigras (μύρτα μέλαινα) commendat.

De myrti viribus & Plin. tradit, sed admodum confusè, quædam etiam reperiunt. Labet tantum ex eo præcipua colligere, & à Diosc. non tradita, vel aliter. Succorum (inquit) natura præcipuum admirationem in myrto habet, quando ex vna omnium Olei vinique bina quædam sunt. Item Myrtidanum vt diximus. Et alius vsus baccæ fuit apud Antiquos, antequam Piper reperiretur, illius obtinens vicem, quodam etiam generosi obsonii nomine inde tracto, quod etiam nunc myrtatum vocatur. Eademque origine aporum sapor commendatur, plerumque ad intinctus additis myrtis. Folia & per se siccantur in farinam ad vlcærum remedia in corpore humano leniter mordaci pulvere, ac refrigerandis sudoribus. Quinimò oleo quoque (mixtum dictu) inest quidam vini sapor, simulque pinguis liquor, præcipua vi ad corrigenda vina, faccis antè perulis. Retinet quippe fæcem, nec præter purum liquorem transire paratur, datque se comitem præcipuâ commendatione liquato. Virgæ quoque eius gestatæ manu viatori profunt in longo itinere pedi. Quin & virgei anuli expertes ferri inguinum tumori medentur. Quin & virga iaculi (sic repente Turnebo) fortasse quod è myrto iacula nonnunquam fierent, quorum haustile nondum ferro spiculatū Virgam vocant. Virg.

*Crebris hastilibus horrida Myrtus.*

*Iterum,*

*Et pastoralem præfixa cuspidē Myrtum.*

Itaque virgæ iaculi dici possunt, tam grandes, ut pro iaculo muniri ferro possint. Nic. in Ther. myrtâ conspiciantia & obstruentia dixit.

Myrtus, tradente Galen. ex contrariis substantiis constat: vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur, Porro tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se in attritione dissident. Myrtada verò quânto dictis siccius est, tantò & astringit vehementius. Quidam id tondentes reponunt, postea vino subigunt, in pastillos formant. Folia item arida viridibus plus desiccant: viridia enim humiditatem quandam habent. Succus non tantum ex virentibus folijs exprimitur, sed & fructu. Restringsim hæc omnia habent tum foris imposita, tum intrò sumpta in corpus.

Simeoni Sethi myrti Baccæ frigida sunt & sicæ primo ordine, opitulantur à scorpionibus percussis, & iis quibus alius fuit. Eam enim fortiter tistunt,

*Epimithia. Condyloma. Paronychia. Pterygia. Ala olei. Carduus. Sudor. Ambustio. Foliorum succus. Myrtida. Sires. Pastilla.*

*Hip cod. concus. m.*

*Myrti obsonium.*

*Placida.*

*Aduer. sudores.*

*Ad cor. da. Goni.*

*Aduer. lajitina. nem.*

*Inguis. Plin. co. erillu.*

*Myrti peram.*

*Succus.*



sistunt, sed vesicæ nocent. At albæ & dulces, alius sunt participes caliditatis. Cunctæ verò alium compescunt, solenneque calidas & humidas exhalationes: eademque ratione ipsius plantæ folia odorata, & capiti impolita. Medentur & dentium doloribus, qui ex calore fiunt, si ipsarum decocto talido os coluatur. Baccæ utique ad defluentes capillos simul cum galla valent, cum oleo si conterantur, & capiti imponantur. Foliorum verò succus, viperæ & serpentis ictus sanat, si eius libræ dimidium fumatur.

Myrteam coronam meti vapores inhibere, ex sententia Philonidis testatur Athen. Tardus suis nidulis vi bestiolas noxias abigat, Myrrum ingerit. Coturnices etiam, ut Didymus auctor, est, Elæborum, pastæ, in tantum vite discernit adducuntur, ut distendantur conuellanturque, seu vertiginæ correptæ: illis auxiliantur Myrri baccæ. Odorem oris commendat, vel pitidie commanducat: quod hoc hemistichio comprobatur Serenus:

*Myrtusque emendat oris odorem.*

Dysenteris denarii pondere dantur. Folia Noxiæ bestias & venenatis, quaque exulcerando nocent, medentur. Ex vino articularibus morbis & collectionibus. In vino verò decocta dysentericis & hydropicis potui dantur. Aceto, in quo eadem decocta fuerint, os ad dentium dolores coluitur. Coliculi autem cum flore decocti, & in nouo atque aperto fidei, in furno cremantur, postea ex vino teruntur. Pulvis hic ad omnia, quæ foliorum pulvis potest, efficaciter administratur. Aqua ex floribus Myrri destillata, odoris suauitate Myrcopolis plurimum expiatur.

Semen siue baccas eius Mûs Brasiliæ. primus saccharo condire docuit, optimum variis morbis condimentum, & ægris magnopere placens.

Camæ. ideo venter dicatur Myrrum indicat, quia multos habeat vsus in morbis muliebribus: Sanè in quibuscunque fluxionibus ritè administrata, plurimum potest.

Porta puniceas species tam fructu quam cortice sanguinis excretionibus & mensibus opitulari scribit, & non atras. Aded in coloribus est atque figuris suos medicandi fontes hausit: Quis autem nigris Myrtillis astrictionem denegare auit, cui gustus sanus est?

Scribit Diosc. Fungus strangulatus suspensio similes concitare, quibus contestim succurrendum. Cômunitè ex oleo vomere cogendos &c. Quod & Matth. approbat: & rectè. Vemirum sit, qua ratione idem Matth. Myrri vsum tanto per commendet in eodem casu, ut etiam mirificè prestare dicat. Nobis contra minus tutus eius vsus videtur: Nam cum ex iam citatis autoribus astringat, astringentia autem cōstācādo oesophagum & orificium ventriculi vomitum impediāt, atque aded fungorum retentionem adiuuent, non videtur tutus Myrri vsus. Nec etiam foliorum Pitastris, quibus id Diosc. tradat. Horum tamen vsus aliquis si possit esse in eo casu, tunc maxime futurum censemus, si superueniat a Fungis: Aut certe cietis iam vomitu Fungis, & multa agitatione laxato & prostrato ventriculo. Myrri baccis, vltimā maturitatem adeptis, Italice mulieribus vtuntur ad intinctus, qui cum assatis canibus escit maximam cum palato ineunt gratiam, teste Matth. ac simile quiddam videtur fuisse quod Plin. Myrratum, Catō mutatum vocat: Arctam myrteum condimentum seu *μυρτεον* languidos ventriculos roborat.

Nec differunt viribus inter se Myrri species. Foliis siccis omnium generum, quotquot habere pos-

sunt videntur Coriarii ad ipsānta trispandaque Coria. Bellon. quoque scriptis prodidit Illytios ad Coria paranda.

Fit & vinum e Myrto, quod Theoph. non ignorauit, qui Myrto aquæ vinolum ac oleum tribuit succum, quamvis vtrumque obsecurum. Habere enim ait talem quoque humorem, qui vino cum sacco transmittitur ac colatur, innaret, quem detrahunt, & ad lumen Internatum accendunt, quod Plin. admirationem creauit, geminos hos succos ex vna re promanare. Sed vini ratio duplex est, ut bina etiam appellatione distinguatur. Primum enim Myrtum vocant, siue Myrtidum, Myrtanum, Myrtiles vel Myrteum vinum: quod ex baccis: alterum Myrsin, quod ex tota arbore fiet. Plin. Myrtidum quoque vocat, quod ex silv. mori baccis conficitur. Myrteum vini parandi rationem hanc præcipit Cato. Myrrum nigram in vmbra arefacito: vbi verò iam passa, feruato ad vindemiam, in vnam musti condito (alii habent contundito) Myrte semodium. Id oblinito: Vbi defuerit feruere mustum, Myrrum eximito. Id est ad alvum crudam, & ad lateris dolorem, & ad celiacum, & si alvus non consistit. Haber & suam ex Catone Plinius: Habent etiam suas Dioscorides. alique Græci: sed apud omnes Autrotes (ex quibus perend) admodum variant, ut vel ex hac sola variationis diligentia apertum fiat, quantæ existimationis fuerit, cum propter gratiam, tum propter vinum medicam, quam ex Catone iam diximus.

Attente verò Colimella quoque Myrtiles valet ad tormina, ad alui profluuium, & ad imbecillum stomachum. Nam Diosc. teste, potenter astringit, & vbiunque stypticis utendum, valet. Reiectiones sanguinis inhibet, & alui stomachique rheumatismis prodest; itaque contra intestinas ulcerationes, fluoremque muliebrem: denique capitis etiam denigrat capillos. Myrsin, eodem autore, contra mandantia capitis ulcera, furfures, papularum eruptiones, gingivarum ac tonsillarum inflammationes, & aures purulentas efficax est, ac sudores quoque cohibet.

Myrte quoque Olei, siue Myrtini, duplex ratio. Aut enim e baccis fit, aut e foliis. E' baccis in Ianuario ita fieri docet Palladius. Vnciam baccarum (in vulg. ex. legitur foliorum) per olei libram vnam mittes, & per vncias x. vini veteris styptici heminam, & cum oleo bullite facies. Itcirco autem vino respergentur folia, ne frangantur ante quam decoquantur. Tale hodie non est in vsu, sed ex Arabum præscripto paratur ex Myrte baccis, & oleo omphacino, hoc est, immaturo. Commodè etiam adderetur succus, si haberi posset. Hoc oleum Myrtillorum vulgè vocant ad differentiationem Myrtini; quod ex foliis fit, cuius cōficiendi rationem geminam tradit Diosc.

Myrte nigre seu siluestris seu satius reuerentia quæque folia rindito atque exprimito, succo deinde Omphacini olei parem mensuram admiscerò, & ad prunas calcitrò, donec simul cocta fuerint, tollens ita quod supernat. Fuerit verò minus operosa confectio si foliorum molliissima cōtusa in aqua & oleo decoquas, & quod innat, adimas. Peculiari quoque modo, si exposita Soli folia in oleo maceres. Nec desunt, qui oleum prius inspissent Malicorio, cupressò, Cypro ac Iunco odorato: Ita vnguentum Myrtinum describit Plin. E' vilissimis quidem hodie est ob id creditum, & id in veritissimis esse, quod constat oleo Myrtico, calamo, Cupressò; Cypro, Lentisco, thalagranati cortice: nimirum hic calamum addi-

ad Coria paranda.

Vinum.

Oleum.

Vini duplex ratio

Myrte vini  
Gaij parandis modi.

Alui crudæ.  
Lateris dol.

Caliaca.  
Alui fluxus.

Myrtiles  
vires

Tormina  
Alui fluxus

Stomachus  
Sanguis fluxus.

Dysenteria.  
Menses.

Capillorum  
structura.

Myrsin.  
Sui Placera

Cap. Pabula  
Faucium

Inflam.  
Ol Myrtinum.

Ol. e baccis.

1.

2.

3.

4.

5.

Ol Myrtillorum  
Ol Myrsinum.

num 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

VITIS IDÆA MAGNA QVIRVSDAM  
SIVE MYRTILLVS GRANDIS.

CAP. IV.



Nisi iam lib. tradidillemus de frutice qui vocatur Diopsyros seu Amatanhier, & Clus. Vitis Idæa, posset non incommode hoc loco poni. Ad eum igitur locum Lectorem remittimus. Nunc Vires Idæas, vulgò Myrtillos dictas tradamus, quarum prima inter eas quæ à nobis obseruatæ fruticosior est, virgultis scisquicubitalibus, teretibus, ramosis, cortice spadiceo obductis, materie satis solidâ & densâ: in quibus folia vitis Idææ angulosæ magnitudine paria, oblonga, magis tamen rotunda, glabra, nec villo modo, vt illa, serrata, inferiore parte nonnihil glauca, sapore adstringente prædita, decidua. Bacca luniperinis vel Myrti Tarentinæ pares, vmbilicum habent latiorē, ex cuius medio apex prodit, quò fit, vt quàm Vitis Idææ angulosæ bacca minùs rotundæ sint: hærent autem pediculis longiusculis, sapore præditæ grato, subacido, & vinoso, quibus continetur grana aliquot minima, sublutea.

Iconem ex Clus. damus, cum sicce tantum plantæ nobis essent ad manum, cuius descriptionem etiam libet adicere, ne decipiamur fortè vel ipsi, vel discipiamus alios. Censemus tamen eandem cum nostra. Vitis Idæa altera (inquit) vicinior est vulgari (angulosæ), ramos habet interdum humi diffusos, teretes, lentos, nonnunquam verò firmos & erectos, cortice modò cinereo, modò rubescente rectos, in multas alas diuisos, & in his folia, illi quæ rubro est fructu formâ similia, sed tenuiora, venosa, subrus exalbida, gustus adstringentis & nonnihil acidi. Flos vulgari similis, ex candido purpurascens, concavus, labris in quinque crenas diuisis, & exterius reflexis, suis intus staminulis. Fructus vulgari similis, maturitate niger, saporis que gratia non minùs quàm vulgaris Offic. Myrtillus commendabilis, plurima granula in se continens. Radix est dura, lignosa, multis fibris capillata. Sarmēta siue rami procumbentes, subinde radices agunt. Ab Austriacarum & Striacarum alpium Venatoribus Zegerbeer nūcupantur. Libenter enim eius bacis victitant, vnde nomen quasi Venatorū bacca. In Sileſia vocatur Rauschbequemad. & ea quæ rubro fructu prædita est, & palustris: Similem etiam apud illos vñum obrint, qualem Ledon alpinum Insectoribus alpinis præstat. Hæc ille.

Nos nodum adhuc pro certo asserere ausimus an Theoph. & Plin. hæc intellexerint, an angulosam: (ille sub nomine Vitis Idææ: hic sub Vitis Alexandrinæ) an, quod vult Dod. ab his plantis diuersam. Libet tamen eorundem verba hic assignare.

PSEUDOMYRTVS BELLONII.

CAP. II.

In Ciliciæ planitie, in qua fuit Alexandri & Darioj confictus obseruauimus arbusculam fruticosam, alibi non visam, Myrto multam similem: postquam transmisissimus portas Cilicias, loco sterili & petroso prædictam arbusculam reperimus, cuius nomen exprimere non possumus, nisi vocemus Pseudomyrtum Bellon.

AVACARI FACIE MYRTI.

CAP. III.

In Maluaria Indię prouincia pusilla nascitur Arbor, maior frutice Coru, quæ folijs, floribus, & fructu Myrto persimilis est. Fructus eiusdem etiam est cum myrto saporis, multò tamen adstringentior. Hanc arbusculam trifolium olere ferunt. Avacari nominant incolæ. Nascitur in montibus. Alij mirè esse efficacis aduersus inueteratas Dysenterias è causa frigida prouenientes. Eius experimentum se fecisse asseruit Lusitanus quidam scæpex in filia sua: quæ cum integro anno Dysenteria laborasset, nec ei quicquam reliqua medicamenta profuissent, sumpto huius plantæ cortice trito & in aqua orizæ mactrato in prisana modò, sanata est. Garat.

Odor.  
Auarici.  
Locus.  
Vires & vñus.  
Dysenteria.

Oleo Myrti  
n. delectus.  
Ol. Myrtini  
Vires, Vlece-  
ra.

Syrupus  
N. yrtinus.  
Eius usus.



re, ne cogamur alibi repetere. Quidam enim & huic, & sequentibus Vitis Idæa nomen tribuunt.

Vitis Idæa, [ *αἰμαίνος* ] inquit Theoph. nascitur in ea parte Idæ quam Phalacras nuncupant. [ calvas Lat. dixeris ] Paruis virgulis fructicat, ramisque cubitalis emittit, quibus acini ad latera adherent nigri, Fabæ [ *κνέμιον* ] magnitudine, dulces, vinaceorum ( *νεφελῶδες* ) instar, aliquid intus continentes, molle ( *μαλακόν* ) quam vocem Gaza omisit. Folium rotundum, indiuiduum, paruum. Per *κνέμιον* uerò non est quod Fabam nostratam intelligas, alioqui nec figura nec magnitudine conueniet. Const. intelligit de Faba Græcia, à cuius similitudine etiam *κνέμιον* dictus est *ενισκός* bestiola multiplex, vulgò Afellus dicta, de qua in hist. Inscé.

Porrò eadem planta est Vitis Alexandrina Plin. quæ vitis Idæa Theoph. nam planè iam dicta verba Theophr. sub eo nomine transcripsit Plinius sic: Alexandrina appellatur vitis circa Phalacra, breuis, ramis cubitalibus, acinò nigro Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus: folio paruo & rotundo, sine diuisuris.

Du Choul in descriptione montis Pilati ait: In ipso montis penè vmbilico passim conspicitur humilis admodum frutex, *Aurelles* aut *Aurelle* nominant.

Vitium Idæam Theoph. inquit Cl. Milerus vocant Phalacras. Itali (vt accepimus) *Vua dolce*, hæc vocitant. Quæ sanè descriptio huic nostræ satis competit. Verùm in eo fallitur, quod dicit Theoph. vocari Phalacras, cùm nomen hoc sit partis montis Idæ vt modò dictum.

An Cæsalp. *Baccularum* vulgò in Alpibus, quasi *Baccularum* alterum genus, fructu minore constans [quàm Vitis Idæa angulosa, de qua paulò post] & paucioribus intus seminibus: foliis infernè albicantibus, specie Mali cotonei, sed pusillis. Videntur hi fructus quasi humiles Mespili, *Hec illo*: Nolimus tamen pro vero statuere hanc Cæsalp. descriptionem nostræ esse Vitis Idæa, quia multa continet quæ conueniunt cum Coronastro, de quo lib. i. Præterea nostra Vitis Idæa magna nihil commune habet cum Mespilo.

An Camer. Hort. Vitis Idæa Gesn. maior, quam crescere tradit in silua prope Negeldorff / pago mille passus à Norimberga vrbe sitò, quam Clus. in Pan. *Jegerbeer* & frater eius Ludouicus *Trinckelbeer* nominari aiebat, quia copiosior eorum vilius aliquem quasi inebriet.

In horto plantata non comprehendit.

Myrtillus grandior: *Groschen Reidelbeer*: *Rosberren*: *Drumpelberren*, *Bruchberren* / Trago. Vitis Idæa maior Sucuis dicta: (Mosberi Heluetis, Gesn. Vitis Idæa 2. maior: *Grosß Heydelbeer* Tab. Compiler eius historię, satis clarè sua prodit descriptione, se nescire quid scribat.

Getar. Anglus huius plantæ iconem posuit pro Vaccinijs rubris, quæ non parum differunt ab hac Vite Idæa maiore.

Vaccinium Alpinum Schuuenckf. in Catal. Silef. qui & Vitium Idæam 2. Clus. & Vitium Idæam nigram maiorem Thal. & Vitium Idæam maiorem Gesn. eisdem planè satis confidenter facit, quod tamen non temerè negauerimus.

Nascitur, eodem teste, in montibus & solitudinibus & siluosis. Tradente Clus. inuenitur in *Veitzalben* iugo duobus supra *Neuberg* Germanicis miliaribus: postea etiam in descensu *herrenalben* supra Theoph. multo fructu onusta, atque in *Reichero* Austria monte supra *Gamingam* Repe-

titur etià in silua Norimbergenfi vrbi proxima, ad Latomias, vbi & vulgares nigri & rubri baccis maxima copia nascuntur sub Pinastris, Piceis & Abietibus. Nos in Burgundiæ locis alpinis frigidis obseruauimus, & in inferiore parte montis d. 176, loco paludoso, dicto *Malsigne* vbi Burgundi *Duerner* vocant, Item in montibus Vogensis Lotharingæ adiacentibus ( *Ball. n* vocant ) in cacumine, sed loco itidem paludoso. Copiosam etiam vidimus in montibus inter Nagel arcem Wirtembergicam & Thermas Ill. Marchionum Badensium. Sæpè in hortum Montb. transtulimus, fructusque seuius, sed frustra.

Baccis inebriandi vim inesse referunt venatores, & aratores: testanturque du Choul, Camer. *Inebriant*. alique, præsertim copiosis deuoratis. Nec mirum. Sunt enim sapore vinoso & grato. Folia quoque aliquid aciditatis habent, sed alstringentem maiorem. Quare tum his tum virguleis Tinctorum vtuntur, idem præstantibus quod Ledum Alpinum, vt dicebamus.

# VITIS IDÆA FRUCTV NIGRO.

## CAP. V.



Hanc Clus. Descriptio.

Priorè facit, ramis flexilibus, & humi diffusis, gracilibusque, multis gemminibus, vix è Musco (quo rariùs occultantur) prominentibus, in quibus nullo ordine digesta sunt folia, prioris Ledi Alpini foliis penè similia, paulò tamen longiora, angustiora, tenciora, minusc; crassas admodum venosâ, superne virentia, infernè

dilutiora, leuiter per oras crenata, & mollibus quibusdam villis hirsuta, longo pediculo inhaerentia, gustus valde alstringentis. In summis gemminibus præcedentis anni, baccas fert rotundas, Cerasi nonnunquam magnitudine, oblongis & tenuibus pediculis dependentes, coloris initio viridis, deinde rubri, postmodò nigri, succulentas, non ingrati saporis, nulla ossicula continentes, sed plana duntaxat semina, alba, numero vt plurimum quina. Radix lignosa quibusdam fibris donata, & rami per terram sparsim similes fibras nonnunquam agunt.

Maturis & immaturis onustum hunc fruticem, iuxta Ericam bacciferam alteram nascentem, in vniuerso Sencalben iugi supra *Neuberg* scopulis mense Augusto eruebat idem. Florem non obseruauit.

An verd in classem Vitis Idæa rectè retulerit, alijs iudicandum relinquit: nec enim sibi ipsi illius nomenclaturâ satisfacere ait.


Ledi alpini generibus adscribi posset, nisi baccæ, quibus prædita est, & aliæ quædam notæ refragarentur. Simlerus ad Com. de Alpibus eius

mementi se videri, & Carlobsaden appellare : nam parum à Rosæ montanæ fructu differre asserit. Huius folia satis ad illam accedunt. Hæc Clus.

*Tabern. nat.* Taber. Vitim Idæam ꝑ. vocat, & *Heidelbeer*: Sed compilator eius iconem & descriptionem Clus. proponit, nulla eius facta mentione : flores appingi curauit, quos nec describit, nec Clus. vidisse taceatur.

Gerardus Anglus figuram Compilatoris habet: ac Vaccinia Pannonica, siue Vitim Idæā appellat.

VITIS IDÆA ANGVLOSA.  
CAP. VI.



Descriptio.

Folia.

Flores.

Bacca.

Grana.

Myrtilli.

**V**itis Idæa angulosa virgultis fruticat plerumque pedibus, interdum cubitalibus, satis crebris, virentibus, angulosis & fractu cōtumacib<sup>9</sup>, in multos ramulos diuisis: in quib<sup>9</sup> folia crebra, tenera: virentia, caduca, vnciam circiter longa, plusquam semunciam lata, acuminata, glabra, per ambitum argutis denticellis cre-

nata, sapore partim acido, potissimū primū emergentia, partim aultero. Flores in singulis hæret, inter folia, bullati siue vrceolum referentes, colore ex albo punicante, stylo croceo. Succedunt bacca, singulares quoque, Iuniperinis ferè pares, per maturitatem violacea potius quàm nigra, vmbilicata, sapore grato & acido primū degustare, quæ tamè paulo post nescio quid nauseabundi in ore relinquunt, purpureo uilacea, satiq<sup>3</sup> pertinaciter tinctora: cui grana immerguntur multa, parua, rubentia. Radix tum recta, tum obliqua: quauersū agitur, è supina etiam parte stolones emittens.

Hanc perperā quosdam Myrtum existimasse ex his Cordi liquet verbis, quando ait: Myrtus non est exiguus ille fruticulus, quem Germ. *Heidelstrauch*, (al. *Heidel* vel *Heidelstand*;) & cuius baccas *Heidelbeer* appellant, vt hæcenus falso à plerisque creditur etiam *Straudelbeeren*. Plerisque hodiè Myrtilli Latine dicuntur.

Quidam etiam fructus eius Vaccinia nigra appellant, auctoritate Virgilii. Sed insulsi homines videntur, inquit Tragus: nam Virg. de flore loquitur, Hyacinthum cum intelligens cuius Diosc. l. 4. historia proponens, Romanis testatur Vaccinium dici. Huius alterum genus *Ropbeeren* / *Stumpelbeeren* / & *Bruchbeeren* dicitur. Myrtillos Auerohoes lingua sua Arabica vocat *Her*.

Non placet figura Tragi, in qua folia non serrata. Nec quod scribit foliis vestiri solidis, Buxi per omnia similibus, sed tenerioribus. Quid si non distinguat Vitim Idæam fructu rubro, folio semper virente ab hac? eius enim non meminit, licet læpius cum hac proueniat.

Quoniam verò Germani & Boheimi legitima

Myrto se carere perspicere, aliam in siluis nascentem sibi compararunt pharmacopole, eamque myrtillum vocare, nempe hæc plantam, vt annotat Matth. Quod verò idem de hac planta scribit, folijs virente Buxo ferè similibus, sed tenerioribus, Myrti minoribus, robustis, non placet. Considerent quæso herbarum studiosi: quænam sit his cum Buxo similitudo, quodque robur in folijs. Suspiciamur Matth. minù versatum in Myrtillorum differentiis, pauciores probè nouisse. In Epit. *χαμαίφυλλον*, It. *Myrtillo*: Ananienibus *Calanezza* Dodon. *Cousines* in quibusdam Galliar locis: Brabantis *Erafelbesien* / *peffelbesien* & *Samerbesien* / qui ait posse dici Latine Vaccinia, non tamen Virgilij: melius tamen conuenire nomen Vacciniorum, quàm Myrtillorum, vt quidam apellant.

Videntur autem Vaccinia dicta à baccis, quasi Baccinia.

Quicquid sit, Vaccinia hæc nostra dici possunt, & cum Vaccinijs Plin. ac Vitruuij (de quibus suo loco) in eo conueniunt, quòd vestes telæque lineæ tingi purpureo colore his queant. Cum Theoph. autem ac Plin. Vitis Idæa descriptione haud quaquam conuenire satis manifestū: humilis enim est frutex, vix cubitum altus, paucis, breuib<sup>9</sup>, & nequaquam cubitalibus ramulis; haud racemos, vt Plin. ait, nec vuarum acinis similes fructus sed veluti Taxi baccas, profert; non dulces, sed subacidas & adstringentes; in quibus quoque non molles, sed multa exigua, cernida, plana semina: folium non rotundum, sed rotundo longius. Iam & credibile est hunc in Italia, Græcia, ac minore Asia non reperiri, cum Germaniæ proprium Matth. afferere videatur: tantū abest vt Vitis Idæa aut Alexandrina dici haberi queat. Porro non placet Dod. icon quam in hist. Gallica proponit, nec illa quam in Latina, quamuis priore melior videatur in eo tamen peccatum quòd adeò recta picta, in speciem arboris, nec foliorum serraturas expresserit.

*Airelle* du Choul non est ea stirps quam Dod. pro Vaccinijs nigris exhibet, vt ipse putat, sed ea de qua proximè egimus.

Ceterum Vitim Idæam, *Heidelbeer* vulgò dictam, esse à se primū obseruatā gloriatur Gesn. & viros aliquot cruditos consentientes inuenisse. Aduersari quendam de re herbaria bene meritum, & Vitim Idæam interpretari illam quæ Passillas Corinthiacas vulgò dictas ferat. Se verò nobilissimum illud vix passæ genus non in Ida, nec alijs præaltis niuisque montibus nasci putare: sed vel in planicie collibus apricis, magna hominū cura.

Idem de collectione stirpium Vitim Idæam Theoph. esse ex eiusdem descriptione se interpretari ait: quæ tamen opinio paulò antè refutata per Dodod. Item in Catal. plant. Dryophonium, Offic. nemoralis Myrtus: *δρυοφώνιον*: *Cusines*. Myrtus offic. *Ryff*.

Lonicerus qui pleraque sua Botanica ex Trago consarcinauit, eundem de Myrtillis tradentem parum diligenter legisse videtur, quando ait, posse itarui duplicem differētiam, magnam & parvam, ambas tamen eiusdem esse figuræ: nam apertè Tragus docet, maiorem & minorem figurā differre: *χαμαίφυλλον* & *Idæa*, (vt annotat Rob. Confidat Theoph. & in Lex.) Galeno *ἀπὸ τῆς αὐτῆς* planta est, id est, vna vrsina, in Apennino adhuc vocatur *Vigna dell' orso*, quam vult esse Vitim Idæam Theoph. Anguillara: Vulgò *Azeres*, alijs *Anrelles*, It. *Vua dolce*, apud Northmannos nihil copiosius prouenit, præsertim in Bellocasiorum agro vbi vocant



cant *Mourets*. Sed si Const. intelligit nostra n Vitim Idæam angulosam, vt suspicamus, dubii adhuc sumus an sit *Vigna del Orso* Anguil. siue Vua Vrina Gal. quia tribuitur ei fructus ruber, qui in hac purpureo violaceus & multis niger dicitur.

Quod nonnulli vnam vrsi Gal. à Theoph. Vite Idæa non differre putent, falluntur Clusii iudicio, cui Vitis Idæa nihil aliud esse videtur, quàm Myrtillus Offic. Germaniæ. Idem in Pan. tradit Vitim Idæam Theoph. rei herbariæ peritis esse Myrtillum Germ. vulgarem bacis nigris.

Et Aduers. Herbariorum Vaccinia nigra & rubra sunt Myrtilli Offic. An Idæa radix. Maturitatem (inquit) affecuta bacca nigra vineo succo rurgens, prædulci gustu: flores Erica aut Vnedonis, minores, pallentes, radix lignosa multa edit virgulta pede altiora. Folia effigie Myrti aut Ruscii rotundiora, molliora, sed hieme decidua.

Lob. Obf. Vaccinia nigra & rubra, Idæa Vitis Theoph. Dalech. Clus. Myrtillus Offic. Germ. & myrtus montana: Vua Vrsi Anguil. Gal. *Aurelle Airelle*. It *Vua Orsa*. At figura Lob. non placet, quia nullas foliorum serraturas ostendit, quarum hec in descriptione meminit: non placet etiam comparatio foliorum cum myro & Rusco: nec quòd duas plantas velit vnà eademque illà figurâ complecti, licet neutra conueniat. De Vua Vrsi Anguil. paulò post.

Audiamus Celsus. *Bagule* (inquit) vulgò in Alpibus quasi bacculæ, fructus dulces, subacidi, parvis visis similes, in maturitate nigri quos citant Alpini: fert eos parvus frutex dodrantali altitudine, ramulis virentibus & striatis, folioli in rotunditate oblongis, leuiter ferratis, sine pediculo annexis alternatim: flosculis radiantibus, concaui vt Arbuti, qui summis fructibus insident. Alteramgenus &c: Videntur hi fructus quasi humiles Mespili. *Hec ille*. Quæ tota descriptio satis conuenit cum nostra Vite Idæa angulosa, si excipias quod ait, Visis similes, & quod videantur quasi humiles Mespili. Nos sanè considerata eius descriptione ac etiam ipsa planta nihil videmus quod respondeat cum Mespilo, cuius folia sunt hirsuta, longa, rami nec virentes nec striati, sed rotundi: flores ex foliolis constant: fructus in totum diuersus, figura, colore, substantia, & sapore. Quid verò sibi velit cum flosculis radicanibus, in hac planta non apparet, nisi fortè legendum sit candicanibus.

*Hist. Lugd.* in ea est opinione, esse Vitim Idæam Theoph. & Vitim Alexandrinam circa Phalacrum Plin. In Auerniæ montibus (vbi prouenit) dici *Airelles*, Italis *Vua del' orso*: Germ. *Heidelbeer*: Vnam Vrsi Anguillaram vocare: Dod. Vaccinia nigra & *Confiner*: Ab hac Idæa Vite differre à Lob. pictam Myrtum Germ. foliorum incisuris, de qua tradat Matth. in Germ. & Bohem pharmacopoeis Myrtillum dici. Sed frustra *Hist. Lugd.* duas facit plantas, cum duæ sint figuræ vnus plantæ, quarum prior deterior.

Vitis Idæa minor passim in Hærcynia Saxothuringica, Thal. An Camer. in hort. Vitis Idæa nigra passim in siluis. Itm paulò post: Vaccinia nigra: Dodonæi Vaccinium nigrum. *Charaxanthos* Peuc. Myrtus terrestris seu Pumila: *Blauwe Heidelbeer* / *Staudelbeer* / *Rosbeer* Schuuenckf. Vitis Idæa siue Myrtillus L. Tab. Angl. *Blacke Whortles* vt *Whortle Berries* / Gerar. Myrtilli & Vua Vrsi Anguil. C. Bauh.

Nascitur tam in albis quàm in vastis desertis, viginosis & tenebrosis vallibus alijsque humectis locis Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Scutiæ inaccessis,

alpis Tridentinis, monte Fracko iuxta Lucernam Helueticorum, in sylua Hærcynia, testibus Trago, Gesn. & Lob. In Helueticis albis & syluosis non paucis locis obseruauimus, Itm Alatiæ, Burgundiæ, Sabaudiæ: speciatim in Burgundiâ propè Castellum *Mesche* vbi fructu vascuntur & *Beulser* vocant: Item in cacumine montis *R. sberg* propè *Beulser*. Mesocomium: circa Befordiam, in monte *Ballon* Locharingiæ vicino.

Fructus Augusto maturos legimus. Eodem Tempus mensè Richenvillâ proficiscentes ad fodinas à S. Maria cognominatas, multos pueros atque puellas obuantes plenosque calathos ad cibum referentes offendimus. Floret Maio. Fructus interdum etiam Iulio maturos edit.

Bacis etream & frigidam inesse substantiam ait Tragus, quare cibo quàm medicinæ accommodatioris esse. At nobis medicinæ quàm cibo aptiores videntur: si vera tradit Matthiol. fructus refrigerare, exsiccare, roborare, reprimere, cohibere, quæ omnes facultates medicamenti potius sunt, quàm alimentum. Dari baccas cum recentes, tum quoque siccas detorandas Dysentericis & Celiacis. Has igitur Germanis vnà cum Vniuersa plantâ haud inefficaciter Myrti vicem præstare idem censet. Cui hac in parte non assentimur: Myrti fructus aromatici sunt: hi minime. Præterea nostro iudicio math. perperam tribuit myrti vires Viti Idææ angulosæ, licet ei valde sint similes. Quare Dod. & Camer. potius subscribimus, quorum sententiâ si crudè edantur bacce ventriculum debilem & frigidum offendunt & aluum perturbant sua frigiditate, tantum abest, vt aluum adstringant, aut fluentem reprimant: quod succus illorum excoctus donec crassescat (*Rob* vocant) addito melle & saccharo, vt coferretur, haudquaquam efficit. Ideo ab aliquibus parari solet ad hæc mala siue ex ipsorum esu, siue aliunde contracta. Cæterum eodem

Dod. tradente Vaccinia hæc facultate secundo ordine, eoque satis intenso frigida sunt, & vnà cum manifesta adstrictione resiccant. Ventriculo æstuant conueniunt: sitim sedant: ardentium febrium calores mitigant: aluum reprimunt: vomitum sistunt: dysenteriam ex flaua bile natam curant: aduersus cholera morbum profunt. Sed ad hos vsus *Rob* seu succus cum saccharo vel melle inspissatus ipsis bacis longè præferendus, ob rationes dictas. Pueris tamen qui omnia deglutiant, itemque auiculis siluestribus ob dulcedinem & suauitatem cibo gratissima sunt. Paupercula quoque plebs, vt annotat Schuuenckf. in Silesia ex bacis pulles cū farina coquit, haud ingratas, vt ille ait: sapidiore, hercle, existimarem, absque farina, & in simplicem sapam, vel per se integras coctas, more cerasi fortum. Sed vt magis nutriantur, idem farinam addere putamus.

Lonicæ huic plantæ multas vires ascribit, parum rationi consonas, & fortè in eius cerebello natas. Folia & fructus in vino maceratos & epotos vrinam ciere, ac menses, pellere calculum vesicæ: quas vires qua ratione rei adstringenti, adeoque frigide & terreæ [vt ipsemet facit] tribuat, ipse viderit. Item tradit conferre ad effusionem bilis & dolorem capitis, quod partim adstringendo & cohibendo bilem, partim calores & vapores reprimendo præstare posse rationabilius. Foliorum succus in ore retentus aphthas mitigat. Sed quo consilio idem ait eundem succum mixtum cum lacte, & auribus illitum in ambitu, omnia eorum vitia tollere, atque aded visum acuere, iudicent docti. Succus cum saccharo epotos spato sanguinis resistit, & generationi calculi in renibus: sic enim

Tempus

vires &amp; visus.

Tragus vbi perit. Tèperam. Dysenteria.

Nath not.

Temperam. Ventriculi arder.

Cibus Puerosum.

Primum cit. Menses. Calculum. Loni. not. Bili effuso. Dolor cap.

Aphthæ.

Sanguinis spumum.

crimus erga demonstrantem.

*Hist. Lugd.  
repreh.*

*Radix Idææ  
Therionar-  
cis.*

*Erica baci-  
fera lar-  
cia.*

*Tabern.  
mar.*

*Chama-  
pyx.*

*G. Bauh.  
lans.  
Vaccinia  
Vrſi*

*Locus*

*Tempus*

*usus.*

Ast *Hist. Lugd.* more suo duas vel tres confundit, dum vni huic diuersatam stirpiam hæc nomina tribuit: Idæa radix, siue Idææ vitis species: Dod. Vaccinia rubra: Clusio Vua vrſi Gal. Italis Rhododaphne parua rustica: quibusdam Balsamum Italicum vulgare: Therionarcha Plin. Idæa radix Diosc. Plin. Gal. Tam egregie Chaos istud stirpes digerere consuevit.

Tabern. proponit figuram Ericæ bacciferæ latifoliæ nomine, quam & *Rausch* Germ. vocat, sine descriptione, quæ exprimere videtur nostram Idæam radicem. De *Vua vrſi* quam idem ex Clus. habet, iam diximus nostram sententiam. Chamaerhodendron Alpinam latifoliam & isanè confundit cum Ledo Alpino: Figuram etiam proponit Lobelianam, cuius natus iam deteximus. De Chamaepyxo eius idem dicimus, quod de Tragi Chamaepyxo, nobis videri eo nomine tradi Vitis Idææ speciem, cuius iconem si quis consideret, fortè suspicabitur potius accedere ad vitum Idæam rubro fructu, quam ad Radicem Idæam. Rem Ledonibus considerandam relinquimus. Quicquid sit, cum D. Casparo Bauhino Botanico veritissimo existimamus non esse ex genere Buxi.

Gerard. quoque Chamaerhodendros alpigena dicitur: Angl. *Swearff* rose Baie: Item Vaccinia Vrſi siue Vua vrſi Clus. *Beares* Desortle berries.

Ceterum *Vua Vrſi* Clusio non nisi vnico loco nascens visa arido solo & aprico, via regia in colle imminenti cuidam vieulo, *Ventra el babul* vocato, inter Guadix & Baza, regno Granatensi, iam florens Martio. Scrius tamen plerumque florere, fructum æstate maturescere, & in planta ad hiemem vsque perdurare ipsi incolæ affirmabant. Nos in montibus circa Genuam obseruauimus. Prouenit etiam Basileæ via quâ tenditur ad S. Christophoræ sanum iuxta vineas. Legimus etiam in Vegetarijs Narbonæ montibus.

III. Princeps noster Frid. Dux Wirtemb. misit nobis plantam siccam monens copiose reperiri circa Curiam Rhætorum, ferè baccas rubras: magni fieri hanc plantam à tinctoribus pro tinctoria nigra, ac eis dici *Rausch*.

### CHAMÆBUXVS SIVE CHAMÆPIXOS.

QUIBVS DAM.

CAP. IX.

*Descriptio.*



*Radix.*

missis radicanur: alioqui & radicem habet, sæ-

pè non multò ipsis virgulis breuiorè, lignosam, ex cuius capitibus (quæ plura possidet) ipsæ emergunt. Folia per ramis incondita, Buxeis quodammodo similia, magis acuminata, carnosa, pediculis brevissimis herentia. [gustantibus primùm ingrata, deinde amara & acra Clus.] amaricatia: ex quorum alis, in ramulorum extremis flores emicant Colutæ scorpioidis floribus similes, simul plures iuncti, qui, teste Clus. odoris expertes, nonnullis verò locis odoratissimi & Narcissimam quandam fragrantiam emulantes, tribus foliolis constant, quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, galeolæ exalbida illorum exortu integente, tertium folium in oblongum veluti tubulum conuolutum est, sursum per lanuginem apertum, per extremitatem bractæ modo efformatum atque luteum, & velsitate interdum omnino purpurascens aut rubescens: Floribus succedunt latæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolii siliquis paulò minores, virides. quæ bina plerumque [nunquam verò vnico tantum] continent grana, exigui Erui magnitudine, colore ex cinereo nigricante, hirsuta & veluti quoddam animalculi cernitæ, Polygalæ vulgaris maioris rubræ semini haud absimilia, sed minora, quæ apertis siliquis sese per latera oculis, spontè decidunt.

Interdum etiam pro loci natura floris colore variareprehenditur: nam bina illa folia alarum instar, sursum expansa, galeolæque eorum exortum tegens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex purpura rubent: tertium autem veluti in tubulum conuolutum statescit, eiusque extremà pars aurea est.

Cordum existimamus in Obs. silua de hac plara ita tradidisse: [licet Thalius aliò referat] Fructulus exiguus, humi prostratus, unceis viridibusque virgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, perennibusque: floribus papilionaceis ferè, diuerso colore, videlicet albo, flauo & rubente: extimum quidem albet, proximum flauet, intimum tubet. Nascitur in siluis montanis circa Egeram, in Bauaria & Vindelicia.

A'obvius Colutæ flore, siue elegans Clus. qui à nemine adhuc descriptam putat. At nos à Cordo. Quidam à perpetuà viriditate *vinergrün* appellari dixerunt, quod nomen aliqui & Vincè pervincè conuenit.

Anonymos Peruiç folio: Camer. Gesn. iam olim [cum ego Bauhinus ipsi conuierem] Chamæbuxu seu Chamæpyxon vocauit. Argentine vidimus inter Plantas D. Agerii siccas nomine myrtogeniste, quod nomen non displicet: nec sanè malè post Genistam ponit Clusius. Sed magis arrisit Chamæbuxi.

Frequens est prior teste Clus. non modò in montibus Calenberg, Medeling, & Badenibus thermis imminetibus, sed & in alijs ad Austriacas & Surtiacas Alpes excurrentibus, qui omni Resiniferarum arborum genere integuntur, inter saxa. Plurimis etiam Pannoniæ locis est obuia, veluti ad Pofonium, Sopronium & Zolonock. Altera verò rarior inuentu.


Florèt vtraque Aprili & Maio. Semen prioris [nam alterius non obseruauit] Iunio perficuit. D. C. Bauh. attulit Patauio in horto lectam, his nominibus: Vitis Idææ Theoph. cum baccis Myrti, Olea Æthiopica Diosc. Guilandino. Sed decepti fuere qui ita vocarunt, nisi nomina casu ad plantam fuerint adiecta. Tiguri etiam obseruauimus & collegimus. Locus particularis nunc non succurrit. Hactenus neglecta fuit hæc planta, nec in vsum Medicum vocata, quod sciamus.

VITIS



VITI IDEÆ AFFINIS POLIIFOLIA<sup>\*</sup>  
MONTANA.

CAP. X.



**O** Rta & facie est Polii nostratis, virgultis crebris, dodrante longioribus, lignosis, ex nigro rubentibus, magna ramorum sobole fecundis. Folia Polii nostratis, acutiora, nervosa, vncialia, angusta, superius viridantia, pronâ parte cinerea vel glauca, nervo clatiore per longum currere. Extremis ramulorum pe-

tioliscalyculi hærent perexigui, foliosi, rubentes, vnde angulosa pyramis exilit Conchylata, bæccæ alicuius rudimentum promittens. Pro radicibus passim ex ramis nascuntur capilli instar tenuis fibræ terram morfu comprehendentes. Appingi curauimus latiusculum folium, iuxta angulum; cuiusmodi pauca plântæ à nobis collectæ adhæserunt.

Hanc plantam reperimus vliginosis, muscosis, & frigidis locis cum alijs Vitis Idææ speciebus, Maij principio in montibus Hærcinæ siluæ inter vallem Gfiesbachianam vbi fontes acidi, & Kizelsauwen, vbi etiam fons acidus. Vidimus quoque cum flore apud D. Platrum Basileæ; sed siccam, collectam in monte Pilati.

Hanc eandem videtur Thalius in Hærcynia sua Myrti tenuifolia nomine sic descripsisse. Copiose reperitur in vligine illa, vltra Andersbergum vibem; Brockenbergum montem versus, quam nominant *Den roten Bruch*, hoc est, Vliginem rubeam, quod totus ille vliginosus tractus sub radicibus Brockenbergi, & & vicinorum montium rubro musco plenus sit, quâ videlicet ex Andersbergum via patet Gollariam versus. Fruticulus est lignosus, palmaris, viticulis multis, incurteis: folijs oblongiusculis, vncialibus, Myrti folijs angustioribus, quorum extrema plerumque in tergâ contorquentur. In exiguis recuruis pediculis profert circa autumnum flosculos paruos, rubicundiusculos ex albo. Fructum nunquam adipisci potuit, cumque serò admodum florearet, eo autem loco, vbi nascitur, hiems citius, quam alibi incipiat, citius etiam grandiores ibi nives cadant, opinatur ratio eius maturos fructus haberi posse. Cognatum fortè quid cum hoc habere putat fruticulus illius exiguum Cordi, folijs Myrtinis, quem nos diuersum censemus, ac Chamæbuxum præcedentem.

An Camer: Vitis Idæa rubra Bavarica, bæccis insipidis sine succo. Fruticulus est supinas, crassiflore candidæ quam vulgaris (ea fortè, quæ rubro fructu) quæ apud nos passim cum nigra [fortè angulosa] in siluis crescit, & Steinbeertlin voca-

tur: folijs item oblongioribus; acuminatioribus & angustioribus, per autumnum rubentibus. Crescit circa Monacum in campis asperis inter Ericas. In horto adhuc viuit & viget, nedum vt siluestres huiusmodi plântæ videatur interitura. *Hæc ille.* Quam verò nobis certò non constet; quò sit referenda hæc Vitis Idæa Bavarica, hic labuit eius descriptionem referre, donèc melius nobis innotescat.

OXYCOCCVS SIVE VACCINIA  
PALUSTRIS.

CAP.



Descriptio.

**P** Relongis viticulis, lignosis, ex atro rubentibus, lenticis & fractu contumacibus, inque adnatas propagines ductis serpit, quas folia vestiant crebra, posito ferè pinato, dura, serpylli folijs paria, superius viridantia, subius ex cinereo rubentia. Bæccæ figura, vt inquit Cordus, rotundæ & cordis modo infe-

Folia

Bæccæ.

rius iuxta annexum turbinatæ; colore foris primum candicantes, mox puniceæ & purpureis contiguisque maculis & punctis conspersæ, intus verò in candido modicè rubentes, & quatuor exiguis cavitatibus parua & veluti abortiua semina claudentes: eæ vnâ cum cauliculis humi procumbunt, nonnunquam etiam in musco tanquam absconditæ latent. Flores in extremis & capilli instar tenuibus furculis, Glycypteridos floribus similes, colore propemodum puniceo. Radicibus nititur breuibus, capilli modo tenuissimis & flauis, ex viticulis subinde demissis. Saporem coliculi & folia habent adstringentem; bæccæ verò egregiè & simpliciter acetosum.

Semina.

Flores.

Radix.

Sapor.

Dod. scribit se obseruasse radicem esse instar tenuis bacilli, obliquam, ex qua sursum complures coliculi & inferius fibræ aliquot demittantur.

Thalius autem hæc annotat: oxycoccon copiose in Brockenbergo & vicinis montibus humidioribus, folijs non ita subrotundiusculis, vt est eius icon apud Cordum, sed oblongioribus ac strictioribus, lenticulæ ferè, breuioribus tamen: quorum ambitus versus dorsum vtrinque leniter reflectitur. Longis lignosisque ac obliquis proreptit in vliginosis mulco viticulis; radicibus constants tenuibus, multifidis, lignosis, quibus capillaceæ fibræ multæ adhærent. Flosculi exigui sunt, purpurei, veluti exigui Citinij.

Vaccinia palustris Dod. videntur fortè eiusdè stirpis fructus esse; vel congeneris. Tantus autem radicem truncus nostro oxycocco non est, quantum icon Dod. sutorum vacciniarum exhibet. Hic idem in hist. Gal. Vaccinia palustris ait Belgicè vocari *Deenbesten* & *Deenedoren*: Gal: *Con-* *Vaccinia palustris.*  
*lines des marais*: nullumque aliud nomen sibi co-

Samolus.

Matthæa.

Matthæa ex-  
fusar. con-  
tra Aduers.  
Poterion  
Rhod. vlm.  
Acinaria.  
Acini palu-  
stres.  
Myrtus silu.  
Vitis palu-  
stres.Rosmar-  
nus.Hist. Lugd.  
error.Schuenc-  
k. sed reprob.  
Alter  
Schuenc-  
k. error.

Locus.

Tempus.

gnitum esse nisi sit Samolus Plin. At in post. hist. Plinij nomen omisit.

Pen. & Lob. in suis Adu. Matth. carpentes: Hanc inquit, cur commentator Ericam bacciferam indigitet, neque causam dicit neque ratio subest, neque quicquam illi Ericæ inest. Sed fallentur illi, ut merito confessus est postea Lob. in suis Obsl. nam dudum annotatum aliam plantam esse Ericam bacciferam Matth. de qua postea.

Eidem Lob. Palustris Vaccinia: oxycoccon Cordj. Poterium Dalech. Rhub. Plin. Dillio: Acinaria palustris Gesn. Heluetic Mosbeer, id est, Acini palustres. Batauis Deen aut Meerbesir. Rôslin. existimat myrti silu. genus, quodque melius pro vera substitui possit quam Heidelbeer dicta. Acinariam recte quoque Vitim palustrem, à vinofo acinorum sapore eadem ratione qua Vitim Idæam suffruticem vocari posse præterea annotat Gesn. in lib. de hortis: ubi addit Bernensibus Rosmarinū vocari. Idem in ep. ad Aretium ait, Rosmarinus palustris (ut vos vocatis) recte Vitim palustris appellabitur, à vinofo acinorū sapore eadem ratione, qua Vitim Idæam veteres vocarunt. Qua id ratione, nescimus.

Vitis Idæa palustris locis nascens Clus. Sed fallitur Hist. Lugd. existimans suam Ericam 6. Bacciferam esse Ericam bacciferam Matth. quam ipsa testatur depingi & describi à Dod. pro Vaccinio palustri. Multum enim differunt. Eius igitur Compiler Ericarum naturam non bene nouit, hanc in eorum censum referens.

In eundem errorem impingit Schuencck. Lobellum si consuluissent ab ipsomet reuocatum errorem cognouissent. Sed crassiori etiamnum errore se implicat Schuencck. tam confidenter scribens esse *αμύναντων* Thalii, quum ipsemet Thalius Vaccinium palustre describat nomine Oxycocci Cordi. Verebatur nimirum ille ne sibi nomen Græcum deesset. At Oxycocci nomine contentum esse præstitisset quod Mosbeeren / Gichtkraut / Affenbeer / Winterbeeren, Raufchgrün Gerin. dici notat Schuencck. quamuis vereamur ne & horum vnum aut alterum nomen paullo inconsiderantius subreperit. Iudicent Germani Rhizotomi.

Natales & hæc habet humida, vliginosa, opacaque loca, potissimum montana & conualles. Camer. teste, loco umbroso durat aliquantum, licet non admodum irriguo: sed vere ineunte aprium odit & tabescit. Non longè ab vrbe Norimbergæ propè piscinas magnas reperitur. Cordonatante, nascitur incultis, macris, humidis, putridis, vliginosis muscosisque locis, ac frequenter iuxta Salsitoram, plurimumque iuxta Wittembergam. In humidis & vliginosis sæpenumero apud Holandos. Dod. Vdis muscosis siluis Ericæque montium Suditorum passim luxuriat, & viticulis tenuibus muscum perrepat, Schuencck. Nobis copiose obseruata in cacumine montis Baln. paludoso loco, fructu maturo Aug. principio.


Maij sine etiam Tiguri obseruauimus apud stagnum dictum Bartsenec cum baccis & floribus humilibus Glycypticis etiam in montibus propè fontes acidos Griesbachianos & à D. Petro cognominatos. Aliquoties transfuimus in hortum Montb. sed non curauit. Dod. Baccæ Jul. & Aug. mēibus maturantur. Flosculi purpurei Schuencck. notante, Solani rubri, minores, apiculis flauescensibus Maio & Iunio hiscunt: Baccæ Autumnō marescunt, tota hyeme sub niue lantescentes incorruptæ, quas vno tempore pueri & pastores colligunt, ac pulpa molli tingescentes sine detrimento

comedunt.

Folia adstringunt: fructus acidum sapit & egregie adstringit, cum lenicula abstergendi facultate. Frigida autem, inquit Dod. & sicca huiusmodi Vaccinia, vna cum quadam partium ac substantiæ tenuitate, quæ tamen quandam adstrictionem coniunctam habeat, Ardentium febrium calorem atque in his sitim mulcent: bilis ardorem reprimunt: vomitum sistunt: ciborum appetentiam per biliosos corruptosque humores deiectione restaurant: pestilētibz morbis aduersantur. Coquitur verò & horum succus, donec crassior factus addito saccharo conferuari queat, qui ad omnia, ad quæ baccæ, etiam utilior est Foliorum quoque, ubi adstrictione opus, commodus vsus esse potest.

## ERICA BACCIFERA MATTH.

CAP. XII.



alios minores nullo ordine variè diuicatos. Totum suffruticem ab imo ad summam densus foliorum stipatus obidet. Thymi durioris foliolis, sapore nonnihil amaricante, cum læui quadam acrimonia: nec tamen adstrictionis vacua.

Matth. verò hæc de sua Erica baccifera tradit: Est planta in montibus nascens, qui Bohemiam à Silesia determinant, & à quorum fontibus Albis fluuius originē ducit, humi procumbēs, & latas occupās areas, folio penè vulgaris Ericæ, quæ baccas edit purpureas, in purpura nigricantes, Iuniperinis haud minores, sed molliore pulpa, lenta, & colore subuirefcente, ut in Pruno. Ramis est lignosis, ex atro rufescentibus, flexilibus, obsequiis: flores videre non licuit, sed ipsam tantum bacciferam mense Augusto.

Clus. in Pannon. Ericam coris folio primam vocat. In post. hist. vnde eam, quam sic describit: Humi diffusa est, & latas occupat areas, multis ramis lignosis, flexilibus tamē, constans, ex atro rufescente cortice rectis qui interdum fibras agunt, ut latius serpere, & sufficiens alimentum melius attrahere queant: assurgentes ramulos numerosa ambiunt folia, sapore primam linguam vellicante: pusilli ad foliorum exortus flosculi, tribus foliolis constantes, coloris ex herbaceo subalbicantis, purpurascētibz staminulis internè præditi. His succedunt rotundæ baccæ, iuniperinis haud minores, initio virides, maturitate nigra & purpu-



purpur eo succo, vti Mora, plenæ, in quibus multa inæqualia & veluti triangula grana. Radix lignosa & dura est. Hanc florentem, & viridibus bacis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas retinentem, inuenit idem in præcelsi montis, Vulgò *Dechse* lappellati, scopulis, quinto supra Neapolim Austriæ vrbe a miliari, mense Iunio: Postea etiam Augusto, immaturæ & maturo fructu plenam in *Sneberg* & *Sneßben* Cellissimarum Austriæ & Styriæ alpium iugis. Illius etiam arenosis Hollandiæ tumulis erutæ ramum suis bacis maturis & immaturis onustum misit ad eundem N.V. Io ab Hoghelander. Miramur verò in Clus. iconem ramos pingi hirsutos, nec tamen fieri mentionem in descriptione: alioqui icon angustis foliis melius conuenit cum *Erica* a nobis descripta, quàm icon Cameræ, a nobis proposita:

Iam antea monuimus Penam & Lob. & hos sequuntur Schuuenkf. existimasse *Vaccinia* palustria esse *Ericam* bacciferam Marth. quem errorem dudum deprehendimus. Sed quoniam idem Schuueck. feld. *Oxycocon* dicit esse *Ericam* bacciferam Marth. & *πυρροκακκον* Thalii, cum ex eo aperte cōtrarium pateat nempe *πυρροκακκον* diuersum esse à *Vacciniis*: placet eius historiam totam subiicere, quæ sic habet. *Erica* baccifera Marth. Nam hanc de qua nunc agimus, eandem esse censuimus. Angli verò in *Aduerlar*. *Vacciniorum* palustrium nomine eam proponunt, quamvis hæc nostra in palustribus non nascatur. Fruticulus est humi procumbens, in oblonga, multitudineque brachia rubetia, lignosa, obsequiosa ac foliosa latè super terram se prorependo explicans: foliis densè obuestitur breuib., oblongiusculis, strictis, suffuluis, læpè etiam nonnihil cœruleis, splendentibus, ex quorum alis in ramulorum extremitatibus ætate sub Syriæ æstu micant tenuissima staminula, breuiusque filamentorum mericorum ferè instar, quorū summis apiculis insident, coloris ex rubro nigricantioris aut spadiceiscentis ferè: hæcque filamenta & apicula florum vicem explent, usque decidentibus, emergunt bacæ splendentes, Iuniperinis minores, similes bacis *Vitis* Idææ seu *Vacciniorum* nigrorum *Dod.* rotundæ, ex purpura nigricantes, dulci pulpâ, constantes, cui infarctâ continentur semina purpurascencia. Prouenit copiosè in summo Broccenbergi iugo & saxorum aridorum fissuris. Saxones qui montem illum accolunt, vocant hosce fructus *Spencer* / hoc est, Simiarum bacças. Vnde, si quis neque *Ericæ*, neque *Vacciniorum* speciem stirpem istam esse voluerit, is nomine confecto *πυρροκακκον* appellare possit. Inde autem ei hoc nomenclatura inditum est, quòd esus ipsorum vberior capiti noxia inferat quædam symptomata, ad quæ delicia subsecquantur gesticulariones, ratione nonnihil interturbatæ, ut is, qui ipsis vsum fuerit copiosius, simiarum instar sese habere gestu risibundo videatur. Hinc plantulam hanc deleteriâ facultate minimè carere contendunt, & ab eius usu omnino abstinere, alijsque ipsorum vsum sanctè interdicitur. At amicus quidam noster Andreas Roselerus, pharmacopœus Halberstadiensis, vir opt. & rei herbariæ non triuialiter gnarus, hanc stirpem *Chamaetaxum* vocare solet, tum ratione qualitatis istius malæ, tum foliorum oblongiusculorum Taxî, sed breuiorum. Amilius eam olim, cum necdum illo tempore à quoquam esset hæc stirps descripta, Corios speciem faciebat, Corin Brockenbergensem nominans. Reperiuntur & vetule herbariæ in Saxonia, quæ hanc plantam *Gichtraut* vocitant, commen-

dantque eam muliercolis vti præsentaneum præsidium contra istiusmodi morbum, nempe Conuulsionem. Marth. fatetur se de sua *Erica* baccifera qualitatibus nihil certi habere.

## ANONYMOS FRUTICOSA,

FOLIIS ERICÆ BACCIFERÆ MATTH.

## CAP. XIII.



Elegantissimi Descriptio.

Lami huius fruticelli ramo pulchello nos donauit Cl. D. Agrius Med. Argent. & stirpium sagacissimus vestigator, qui ferculofus, lignosus, variè diuisus, imò parte rufus atque fuscus, annotinorum ramulorum principium dilute rubens, extrema flauescunt. Ex inæqualibus internodijs foliola emittit magna ex parte bina, nec tam numerosa ac densa agmine, ut in præcedenti, altero verò latiora, crassiora, & in totum maiora, dilute virescentia, & Buxi recentis in morem flauescencia. Ramulorum summa surrectis & longiusculis perfoliis rufis insidentia occupant vascula Ledi Narbonensis aut Nerij Sapor.

Montani quodammodo similia, foliis calyculo suscepta. Folia magis quàm præcedentia amara, nec sine adstrictione.

De hac Aduer. ut putamus sic scribunt: Chamaetaxum altera celsis & rigidissimis caubus, floribus purpureis perquam exiguis, Erica foliolis, non deciduis, prouenit: humilis tota, à nobis tantum sicca visa.

Gefn. de hort: Rosa alpinæ altera species, foliolis minimis, Acinariæ palustris nostræ foliolis persimilibus.

Nascitur in Adula monte Rhetorum: inde autumnò allata, in hortulo plantata, ubi nunc mediâ hyeme egregiè vires nec perdit folia: duraturam tamen vix spero, altissimis, siccis, ventosis & apricis frigidisque locis assuetam. Species hæc Rosa alpinæ rarissima est.

Ex Clus. Pat. desumpta est nostra icon, sed minus felicitè pictor imitatus est: titulus erat Anonymus folijs Thymî: de ea scribebat nondum sibi constare, quòd esset referenda, eam ob causâ etiam relinquere: nisi fortè ea sit quam Pena & Lob. in Adu. Alpinam alteram vocant, & statim post Chamaetaxum odorem collocant.

In post. hist vocat Chamaetaxum 7. Olim (inquit) non mihi constabat, quòd istam plantulam referre deberem, quòd mediam haturam inter Chamaetaxum & Cneorum Marth. obtinere videretur: eam ob causam inter vtriusque capita locaueram. Sed diligentius postea obseruatam, inter Chamaetaxi genera repõnere placuit, impel-

lentibus me aliquot caulis. Oblongis quandoque dodrantalibus rannū serpit ramis humi distilis, nigricantibus, in multos alios breues ramulos distilis: folia frequentia & conferta sunt, bina semper inter se opposita, [non semper hoc obseruatum in planta] exigua, serpilli minora, Thymi durioris folijs haud maiora, crassa, superiore parte viridia, infernè candicantia, amaranthis saporis. Extremis ramulis innascuntur bini aut quaterni flosculi simul iuncti, perpusilli è quinque foliolis compositi, carni quasi coloris. His succedunt capitula, maturitate in quas crenas sese aperientia, & semen exiite admodum ostendentia. Radix dura, lignosa, aliquot fibris donata: quinque etiam rami subinde tenues fibras agunt. Exiccata planta non iniucundo spirat odore.

**Locus.** Nascitur tenui solo inter saxa, in summis Sneberg, Snealben, & alijs Austriacarum Styriacarūque Alpium supercilij.

**Tempus.** Floret Iunio, interdum etiam paulò maturius, pro temporis, quo nix quæ iuga illa tegit maturè aut ferò soluitur, ratione.

## ERICA BACCIFERA LVSTANICA.

## CAP. XIV.

Descriptio.

Folia.

Fructus.

Non florere.

Camarinbara.

Acacalis.



riorum tum fortia tum colore referent, succulentū, sapore acido, tria granula dura plerumque continentem, qui exiccatus per se decidit. An floreat, nondum constat: incolæ negabant, & fructum paulatim intumescere amplioremque fieri donec maturefceret affirmabant.

Et verò hæc longè diuersa à Matth. Erica baccifera. Lusitani vulgò *Camarinbara*: fructum verò *Camarinhas* dicunt. Erica baccifera Lob. Erica baccifera tenuifolia Tab. qui & *Kausch* vocat. An verò & hoc nomen Germanicum, quod pluribus plantis tribuebaturs, & huic conueniat, considerandum.

*Acacalis*, Lat. *Acacalis* Amato in Com. ad Diosc. Est verò *Acacalis* eidem planta fructum ferens album, rotundum, paruis margaritis persimilem, quem Lusitani sua voce *Camarinham* appellant: neque putat fructum istum in Europa vniuersa, præterquam apud Olyssiponem excrescere. Planta media est inter Myricem & Ericen qua de causa Diosc. prudens fuit: cum de Myrice & Ericæ seminem fecisset, de hac illi de caput se-


quens constituit. Fructus est esui gratus: Verùm *Cacalia* herba longè alia est, quamquam Plin. illi quoque fructum margaritis simillimum inesse dicat. Quæ *Acacalis* conueniunt, *Cacalia* Plinium tribuisse deprehendimus, dicentem: *Cacalia* siue *Leontice* vocatur semen margaritis minutis simile &c. De *Acacali* Paulus quoque ex Diosc.

Bry fratres Hist. Ind. Oriental. notant quoque Lusitanis *Camarinhas* vocatas folijs esse equiseti, sed obscurioribus. Fructus esse baccas rotundas, perlacæ candoris, sapore subacido.

In vna Lusitania hanc plantam obseruauit Clus. non procul Vlyssipone inter *Riofrío* & *Aldea Catega*, & etiam supra Vlyssiponem, solo admodum arenoso, copiosè suo fructu albo onustam: ait initio *Manna* grana isti fructici in herentia existimasse, adeò procul ipsi insipienti imposuisse. Septembri & Octob. fructum fert, qui Nouembri exiccatur & per se decidit. Fructus Sept. & Octob. mensibus Vlyssipone inuenitur, febrientibus exhibent, ad sitim quæ premunitur, restinguendam: auidè etiam idem fructus à pueris & mulierculis expectitur. Si *Acacalis* est, aquam in qua maderit eius fructus, ad Collyria quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt, addi, testis est Diosc. Amatus quoque testatur fructum esui esse gratum, eoque mulieres & effrenatos pueros in cibo frequenter vi.

## LIGVSTRVM.

## CAP. XV.



**L**igustrū frutex est arborescens, radicem hinc inde per obliquum spargens, tres aut quatuor cubitos altus & maior, crebris virgis lentis & in ramos diuisis confans, cortice cinereo obrectis, præsertim verò stipites & rami crassiores tali cortice vestiuntur: nam ramuli virides leguntur, materie albida, dura. Folia bina aduerso situ ex interuallis oriuntur, oblonga, angusta, figura ad Salicis folia quodammodo accedentia, sed breuiora, crassioraque, atrouirentia, lauia, nitentia, gustu acri & subamaro, non sine adstrictione. Flores in ramorum summis proferit suauiter olentes, candidos, racematim congestos, quorum singuli quaternis, quinis, aut senis foliolis constant: apicibus ex luteo herbidis, qui decerpti statim flaccescunt: quos excipiunt Baccæ racematim quoque in Pyramidis figuram aggestæ. Hædææ baccis minores, læuiores ac nigriores, Iuniperinis æquales, initio virentes, per maturitatem nigricantes, continentes bina grana, hinc gibba, inde compressa, cortice spadiceo, carne exalbida, vel digitorum leni pressu fragilia: sapore amaro ac iniucundo, quamuis quibusdam aliquid dulcedinis habere videantur.

Tragus



Tragus annotat huius generis nonnullos fructes subluteo comari flore, atque eos quidem inuentu rariores esse.

Ligustri meminit Virgil. celebrato illo carmine: vbi flores intellexisse videtur.

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur. Et Colum. in hortis: *Fer Calathis Violam. Et Nigra permixta Ligustro Balsama* &c: ad fructum potissimum respiciens: vt censet Tragus.

Marcellus sibi persuadet, Ligustrum hoc vulgare idem esse cum Cypro Diole. vt satis aperte insinuat, quando ait: Quos Maro cecinit pastoribus negligi & inutiliter perire Ligustri Flores, medicina & Vnguentariorum Officina libenter exceperunt. Nostra æstate nulla aut exigua eius ratio est, cum alioqui vulgaris & ubique paratus fructus hic sit. Cifalpina omnis adhuc Gallia sic vocat, Hætruria corrupta appellatione *Ruusticum*. De Diole. & Plin. Cypro cap. seq. Sunt tamen qui & Plin. Cyprum eam esse Arborem censent, quæ etiamnum in Italia Ligustrum vocatur, vt dicitur in prolego.

Ipsismet Ligustri paucissimis meminit Plin. Ligustra inquit non nisi in aquosis provenire, tesseres vtilissima. Alex. ab Alex. tesseras hic luforias interpretatur: Dal. verò rectius nostro iudicio lignea signa, vinum, frumentum, oleum aut aliud quippiam significatia, & promittentia, quibus in congiariis & publicis largitionibus Imperatorum utebantur.

Porro magna difficultas orta est inter Herbarios *An Ligustrum sit Cyprus Diole. & Plin.*

Cyprum quidam, vt Plin. inquit, esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur.

Et Ruell. Ligustrum apud nos eadem est arbor, quæ in Oriente & Græcia Cypris, Gallis *Troenea*, Suefionibus *Dryna*, officinis ad Barbaros destinatis cum *Alcana* tum *Henne*.

Virgil. pro flore vsurpauit *Alba Ligustra*. Cyprid est, Ligustri, florem putat corollis intorquentium.

Scio, inquit Tragus, qui Phyliream Diole. velint, (vt Fr. Massarius Venerus & illius Simile) mihi verò est *ῥόσος*, Lat. *Ligustrum*, de quo Diole. Quidam immerito vocant *Harriigel*.

Cordus quoque scribit, Ligustrum sine dubio arbuticulam esse quæ Græcis Cypris vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquam pœniteat.

Annotat Corn. Posterioribus plerisque omnibus esse Cyprum: nec tam multis annis confirmatam opinionem velut errorem damnari debere, quum magna adeo sit inter Cyprum & Ligustrum affinitas & similitudo. Eidem aut Cypros est Italiae Ligustrum, aut Philireæ: eos tamen addit qui Italiae Ligustrum videntur magis Philyreæ simile id quàm Cypro depingere.

Eorundem sententiam tuetur Matth. & in errore versari tradit nouum quemdam Herbarium [Anguillaram] qui censet *Cyprum* & *Ligustrum* diuersas esse stirpes, fruolus argumentis ex Plin. desumptis. Hallucinari qui non videant Ligustrum omnibus suis notis referre Cyprum. Sed Anguillare argumenta non videtur math. sufficenter refutare, & nimis audenter pronuntiare hallucinari eos, qui suæ opinioni non assentiuntur de Ligustro.

Ab eorundam partibus stant Io. Agric & Turner. Hic speciatim, eius notas omnes cum Cypro Diole. conuenire scribit: ac quanquam Massar. Venerus lib. de Piscibus strenue neget Ligustrum esse Cyprum, rationes tamen quibus nititur, non eam habere vim, quin cōfutari possint. Ac optatissimus sanè refutatus est vinis rationibus, si potuisset, aut à reprehensione abstinuisset.

Amatus ne ambigendū quidem censet Cyprum Ligustrum esse, quum Plin. dicat arborem Aegyptio familiarem, in Italia Ligustrum vocari. Ideo omnino falli Mass. Venerum, Cyprum aliam arborem à Ligustro esse contendente n. Ligustri verò radicibus hodiè Mauros suos inficere capillos, velut equorum quoque crines, quod olim quoque fieri Diole. tradidit. Verum vel ex eo facile conuincitur Amatus, Ligustrum nostrum neque esse Cyprum, neque id lignum quo Mauri capillos inficiunt, quia nihil tale præstat Ligustri nostri lignum, sed *Henne*, quod Cyprum existimamus.

Amati errorem vtrumque ruminatur Lacuna, (vir nostro iudicio parum in re Botanica versatus) nempe & *ῥόσος* esse & Ligustri radicibus à Turcis tingi caudas equorum: additque Poëtas huius arboris flores vocare Ligustra, & fructus eius Vaccinias: sed dubium non est duas ab eo confundi plantas: non enim nostratis Ligustri, sed alterius exoticæ arboris radice, de qua postea, tinguntur pili equorum.

Ad vnius huius plantæ historiam idem Lacuna accumulat & tertium errorem. Ponit Ligustri iconem ex Matth. & aliam habet eiusdem plantæ nomine Halimi, cum quo nullo modo conuenit, Cæcis ita inponendum est, non nobis & diligentibus studiosis.

Monachis etiam *Cyprus* Græcorum & *Ligustrum* Latinorum vnum & idem sunt, quemad. & *Alcana*, vt legentes [inquirunt] Scrapionem, & Diole. cū Plinio conferentes non later. Addunt in oleo Cyprino Actuarius legi florum Ligustri, Græcis Cypris dicti.

Lonicero *Ligustrum* Diole. Philyra est & Cypris, cuius duas species facit, magnam & parua. Esse Virg. alba Ligustra, & Colum. Nigra Ligustra. Ita vides non minori ignorantia quàm omissantia ab illo vni plantæ tribui tria diuersarum plantarum nomina. Præterea vnius plantæ duas icones, minorem & maiorem ponit, & propter eas potius, quàm ex re ipsa, aut quodd viderit, vel ab aliquo didicerit, duas tradit species, à nemine hætenus, quod equidem sciamus, obseruatas.

Eius priorem iconem Ryff. prædicto non magis in re Herbaria versatus, pro Ligustro ponit, scribens: *Ligustrum* Plinij aliorumque Latinorum, cuius picturam damus omnes fore hætenus Diole. Cyprum interpretati sunt, sed illos nuper redarguit Massarius, demonstrans Ligustrum esse *ῥόσος* non Cyprum. Ryff. igitur qui incepte posuit pro Cypro iconem Ligustri vulgaris, vt dictū, cap. sequenti iconem maiorem eiusdem plantæ cum eodem Lonic. ponit pro Philyreæ Diole.

Altiùs sapuisse sibi persuadent Pen. & Lob. in Adu. quando *Ligustrum* Diole. nostras vocitant, subolfacientes fortè nostrum diuersum esse à Dioscorido, & nihilo minus ad illud reduci posse aut debere existimantes, vt equidem candidè interpretaremur nisi sequentia eorum verba diuersum proderent, quando aiunt: de florum fœtura Cypris dictus Græcis videtur: *ῥόσος* enim floreo est, quò allusisse visus est Maro, vbi *alba Ligustra* cadunt, canit. Auic. dicit baccas esu sanguineum lotium aut potius colore cruentum ciere, quod præstitisset Refractarius experiri, quàm Ligustrum verum inficari. Quæ tamen Alkana autem tur assule, vel baccilli, luteo sunt intus ligno, eoque si crinem (vt videtur Auic. ex Diole. velle) ruffant, sunt sanè aut melioris notæ Ligustri, aut diuersæ

Turner. ca. fig.

Amatus refut. Lacuna not.

Ligustra Poet. Vaccinia Poet.

Tertius Lacuna error.

Lonic. ca. fig. Alter eiusdem error.

Ryff. 1. error.

Ryff. 2. error.

Cyprus Græc. de.

plantæ, Quibus postremis verbis & notis non temerè ceu recidua quadam hæsitacione iactari nobis videntur, adeoque nihil certi statuisse. Non placet igitur eos prius *Ligustrum* & *Cyprum* idem dixisse: nec quæ huic nostræ ascribunt de vrina cruenta, quod decebat illos potius experiri prius, quam redarguere eos qui negant *Cyprum*, cum ipsi nec dubitent, vt apertè docent eorum verba de Alkana, de qua nos seq. cap.

*Castor Dur. error.* Denique *ligustrum* nostras etiam *Cyprum* Diof. faciunt Cast. Durantes, [qui non benè duas figuras & descriptiones vnius plantæ ponit, quasi diuersæ sint plantæ.] Taber. & Cæsalp. Lonic. addit Cyprum ab insula dici.

*Ligustrum non esse Cyprum Diof.* His omnibus strenuè se opponunt, iam sæpè citatus Massarius, Fuchf. Dod. Anguil. Rob. Constapud Amari, Goropius, Porta, alique quorum iudicio & rationibus sanè in hac re plus tribuimus, eisque hæcenus subscribimus, donec prodeat aliquis, qui nobis diuersum persuadeat. Quanquam Diof. Cyprum descriptio propius ad nostrum *Ligustrum* accedere videatur quam Plinii: quamuis nostram vix propriè & simpliciter arborem dicas, adhuc minùs peregrina. n. In nostri quoque *Ligustri* foliis nihil tale quid apparet, quod capillos ruffet, quæ notæ nostrum *Ligustrum* à Diof. Cypro potissimum distinguere videntur, quamuis & aliæ fortè sint circa vires, nondum obseruata. Sed quid multa opus velitatione, cum alia planta, nec frutex, sed arbor Recentiorum industria inuenta sit, melius cum Diof. Cypro conueniens.

*Nec Cyprum Egyptiam Plin.* Sed nec Cypro Egyptiæ descriptioni Plinii quadat nostrum *Ligustrum*. Plinii namque Cyprus semen habet Coriandri, peregrinaque est arbor. At *Ligustrum* nostrum grana non Coriandro similia habet, vt facillè ex descriptione nostra proposita conferenti notas cum Coriandro patebit. Nec sanè nostrum *ligustrum*, quod spontè in sepibus & senticetis passim occurrit nascitur in Egypto. Rectè igitur Fuchf. *Ligustrum* quo nomine Græcis appellatur sit, nondum certò nobis constat, neque enim, vt ferè omnes hodiè putant, Cypros est.

*Plin. not.* Dod. quoque ipsum in hac re adèd Plin. reprehendere audens, eum scribit perperam *Ligustrum* eandem arborem esse censere, quæ in Oriente Cyprus. Quam censuram mitigans Anguil. Cyprum, inquit, quidam volunt esse *Ligustrum* in Italia dictum: verum credere non possum *Conastrello*, quam habemus in Italia esse Cyprum: notæ non respondent. Plin. etiam non affirmat Cyprum esse *Ligustrum*, quamuis alio loco id asserere videatur. Verum fortè Plinio addita quadam aut deceptus Plinius sibi contrarius. *Conastrello* non potest esse Cyprus Plin. l. 12. c. 25. *Ligustrum* Latinorum non negari. Quæ planta sit Cyprus ignoro. *Conastrello* est Philyrea vt patet ex descriptione. Hæc ille. Qui existimando *Conastrello* esse Philyream, fallitur, de qua mox transigemus.

*Ligustrum Virgil. Non esse Ligustrum Columella.* Eadem ferè & Rob. Const. confirmat his verbis. Quid sit *Ligustrum* siue Cypros, profectò ignotum est his nostris temporibus. In hoc solum Diof. & Plin. consentiunt, quòd vterque dicat esse arborem quæ vel solà notà excluditur vulgaris illa planta ab huius consortio, quam nobis pro *Ligustro* & Cypro ostendunt Herbarij, quæ fortasse est *Ligustrum* Virgil. non autem Cypros Diof. aut Plin. *Ligustrum*, imò nec Columellæ. Hic enim frutex in sepibus maxinè communis, vix vnquam visus est arboris ætate: nos Galli vocamus du *Troesie*: sed Cyprus siue *Ligustrum*, id est, Arabum *Alcanna*, arbor rara est, & inter pretiosa

simplicia semper adnumerata.

Hic ac similibus rationibus motus doctiss. Goropius, *Ligustrum* alterum Veteribus dicere maluit, & apertè ait Virgilij *Ligustrum* non intelligendum esse de Cypro flore odorato. Sed cur *Ligustrum* alterum Veterum dicit, vbi duo genera *Ligustri* apud Veteres inuenit: sanè nisi id intelligat vel apud Plin. vel hoc nostrum *Ligustrum* ceu alteram *Ligustri* Veterum speciem agnoscat, quid aliud velit nondum olfacimus. Nam, vt dicebamus, præter *Cyprum* [cuius aliquoties meminimus] & *Ligustrum* sapius citat, vt in sequentibus patebit, nec tamen hoc idem esse cum illo categoricè affirmat: immò lib. 12. c. 24., vt & l. 23. c. 4. videtur ambigere, vtrum ea Cypros sit, quæ in Italia *Ligustrum* vocabatur: dum id ita esse, non ex sua, sed ex aliorum potius sententia pronuntiat. Certissimum quoque diuersitatis nostri *Ligustri* & Cyprum Antiquorum argumentum producit Porta, ab ipso experimento desumptum: nempe, inquit, *Ligustri* vulgaris folia non ruffum capillum reddunt: quare non est Cyprus Diof. sic igitur primam difficultatem excolimus.

Alterà difficultas est an *Ligustrum* nostras sit *Alcanna* & Henne Arabum.

Afferunt Ruell. Tragus, Matth. Lacu. Monachi, Lonic. Brunfels. Bouius, Comes à Neuenar, & Cast. Dur. ac in genere omnes ferè ij qui, nostrum *Ligustrum* cum Cypro Veterum idem faciunt, cum Arabes pleraque sua de *Alcanna* ex Diof. cap. de Cypro transcripserint. Sed hinc non sequitur nostrum *Ligustrum* esse *Alcanna* Arabum, sed verisimile tantum sit hanc & Cyprum Diof. esse idem. Idcirco fallitur, quisquis ille sit, qui apud Cordum annotauit *Ligustrum* Arabicè dici *Alcanna*, Henne: Nam vt dictum Henne quidem est Cyprum, sed non *Ligustrum* nostrum vulgare. Rectè igitur Bellon. Arabum interpretes Latinos Henne seu *Alcanna* falsò *ligustri* vertere notat, cum dixerit sit arbor. Quod verò idè Henne siue *Alcanna* differre tradit à Cypro aut *Ligustro* Gallicè dicto *Troesne*, quòd hieme Henne non deponat folia vt *Ligustrum*, nobis non probatur. Nam cum Henne & *Alcanna* Serap. sit Cyprus Diof. *Ligustrum* verò nostrum, vel ipso teste, non sit Henne & *Alcanna*, ne Cyprus quidem erit, aut rectè diceretur.

Cæterum cum (vt ex Adu. dicebamus) quæ *Alhanna* nomine importantur lignæ assule sint luteæ, satis patet à nostro *Ligustro* differre, si modò veræ & genuinæ sint *Alcannæ*.

Leoniceum carpit Agricola, quòd Cyprum similem *Ligustro* fecerit, nec se eum sequi, ait ipsemet tamen idem *Ligustrum* facit & Græcis Cyprum dictam: ac in eo hallucinatus est, quòd similitudinem negauerit, & quòd ipse cum plerique idem putarit. Melius igitur fecisset, si melius sentientem secutus fuisset.

Tertia difficultas est, an *Ligustrum* nostrum sit *Philyrea*, vt voluit Massarius, Fuchf. Anguil. Gesn. Euchar. Roesslin, Dod. (qui malè non tantum *Philyream* *Ligustrum* facit, sed & eam, quæ exiltimatur *Philyrea*, ponit pro Cypro.) Sed Gesn. ex aliorum potius, quam sua sententia id dixisse videtur. Fuchf. quoque parum fortè suæ opinioni tribuens, iudicium penes prudentem lectorem esse voluit. Apertè negant Tragus, Dod. & nos, apertis rationibus moti, quas suo loco trademus.

Baccas, sunt qui velint, dici Vaccinium, de quo Vitruu. Archit. l. 7. c. 14. verum certò affirmari non potest. Sunt qui & *Ligustri* baccas à Virg. Vaccinia vocari putent, sed malè, inquit Matth. Non defuerunt, qui existimarint *Ligustrum* esse Mauritanorum caprifolium, sed perperam. Sunt qui *Ligustrum*



strum dictum velint, à ligundo, quod sepius ligandis & muniendis conueniat: Alkanna & Henne omnibus ferè iis, qui Cyprum esse putant, vti dictum. Germ. *Beinhölzlin*, quod lignum ossis instar durum habet: propter duritiem dicitur etiam, *hartrigel*, sed perperam, vt notant Tragus. & Hier. Brunch. *Hertholz* Taber. Aliis dicitur *Mundholz*, *Geißholz*; *Reinweiden*, quod salici similis sit, & Rheni ripa copiosè nascatur: *Mundweiden*, quod oris vlceribus medeatur, quamuis Fuchf. Ligustrum officinis inusitatum dicat, vt reuera est, potest tamen commodè in vsum reuocari. At tamen math. sed male Officinis *Alkanna* dici, alii *Albanna* scribunt, & Mauritania *Kenne*, alii *Chenne* scribunt, *Henne*, seu *Hanne*. Belg. *Bectuyt*, *Kyntvaelgen*, *Shuuenck*, qui Ligustrum inter Silicis plantas hortenses refert, ait Germ. *Edelweiden* dici Gal. *Troesne*, *Frezillon*. It. *Hetrufcis Guistrio*, quod inibi etiam aliqui *Oliuetta*, nonnulli *Oliuella*, quidam *Chambrossene* vulgò vocant: alii *Callostro*. A mulieribus & pueris Romæ *Fior fratello* Alphab. scribit & *Chryslu*, dici: *Conastrello* Parauinis. Hisp. *Albena*, *Alfena*: *Cakil*, *Arbor de Parasso*, aut de *Albenna*: Portug. *Alfenheyo*. Bohem. *Ptacti* *Zob*. Vngar. *fagyalsa*. Apud Bollenfes in ducatu Wirtemb. *Schwarze Hungebeeren* vocant. Vt annotauit aliquando Solerius Delphinatibus dicitur *Sanguin blanc*, & Provincialibus *Chuter sauvage*.

Nascitur magna ex parte in locis asperis, potissimum vepribus & sepiibus, frequens admodum passim Germaniæ, Galliæ, Italiæ. Ad Rhenum abundat. Lob. ait nulli calidiorum regionum hodie deesse, paullo licentiosius: non enim inuenitur in Ægypto Ligustrum Italicum, teste Alpino vt dictum: copiosè provenit etiam in Diocesi Cantabrigiensi ad *scpes*, & propemodum in omnibus Londini viridariis. Quin & in frigidioribus regionibus in hortis colunt, quorum leptis & arboribus cingendis accommodata quia consilii, & tam floribus quam racemulis tota æstate læta. Floret Aprilis & maio, citius aut tardius pro locorum ratione. Flores tota ferè æstate durant, aliis prætereuntibus, aliis emergentibus. Septembri racemuli maturefcunt, & subinde per totam ferè hyemem restant, non sine singulari utique providencia Dei, præcipuum aucularum famis refugium per tenuissimas hyemes futuri. Folia ad hyemis initium durant, postea decidunt, & vere noua renascuntur.

Vitium Liguistri meminit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum, sic inquiens. Cyprici seu Liguistri folia, summaque germina in vsum veniunt, & facultatis & temperamenti maxime misti: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modicè calida: habentque etiam adstrictorium quiddam ex terrenâ substantia frigidas, &c.

Folia, flores & acini Liguistri vt prodidit Tragus, adstrictorium vim habent: hodie apud nos extrinsecus ferè vsurpatur. Aqua è teneris Liguistri foliis Maio mense, aut è floribus Iunio destillata, gargarisatu exulcerationibus oris auxiliatur, neque non feruidis inflammationibus, carbunculisque & pudendorum vlceribus ambustisque igni prodest collutu. Hoc enim remedio ad prædictos morbos Chirurghi penè omnes vruntur. Hoculi aceto macerati, frontique impositi, capitis dolorem sedant. Acinis Liguistri maturis quidam rubello Vino nigrum inducunt colorem, & vt crassius euadat efficiunt, quò magis sit vendibile. Solent etiam illi tam nigrum quam Ve-

nerum colorem præstare, quo nomine ab his, qui chartulas luforias, aliasque picturas coloribus variis illuminant, leguntur. Pueri bacculis inficiunt decoctis in aqua, & atramenti loco scriptitant, quod & se aliquando conficere solitum testatur idem: sed pictura in coeruleum quadamtenus spectat.

Aqua stillatitia, è floribus Liguistri, tradente Matth. potu menses superfluos constringit, vtilis aduersus hæmoptosum & diarrhoeam. Eadè perper se, aut cum Pompholyge in oculos instillata, rubores eorum & lippitudines tollit. Ex floribus cõficitur & oleum, quod ad inflammationes vulnorum insigne est, si calidum illinatur: idem dolenti à calore capiti benefacit. Hieme baccis vescuntur aues, præsertim Merulæ ac Turdi. Ex virgis flexilibus, solida tamen materie, caueæ fiunt ad canoras seruandas aues, ac virgæ ad instruendos equos. Nullum reperiri posse, insit idem, medicum tam inexpertum crediderim, qui non noverit Ligustrum iis omnibus præstare viribus, quibus pollere scriptum reliquerunt Diosc. & Gal. Atqui Herbario illi [Anguillaræ] venia danda, quod in noscendis tantum plantis, non autem earum facultatibus examinandis operam nauarit. Hæc Matth. vt iam nobis Scquianisteus quidam esse videatur, qui solus omnia invenerit, vel inuenisse somniarit. Sed quæ hæc temeritas, de re sibi incognita statuere, & alios insuper reprehendere, cum ipse potius redarguendus est quod præcipuam illam notâ Liguistri quod Cyprum existimat, non examinavit, an eius folia rufent Capilli, vt docet Diosc. Et vehementer profectò miramur quâ tam audacter ausit pronuntiare de viribus Liguistri, quod ex sua persuasione vult esse Cyprum quam novit.

Acinos Liguistri contra Phthiriasim & Gallinatum pituitam prodesse, scribit Schuuekf. qui ea desumit ex viribus attributis Cypro: Lectores, poterunt sine periculo experiri an nostrum Ligustrum hæc præstet. Iac. du Fouloux de venat. in cura morbi canum ad dolorem aurium commendat fruticem dictum *Troesne* qui nihil aliud est, quam Ligustrum. Zehriell in fulmine laudat ad Arthritidem intra median horam Oleum florum Liguistri, Veronensisibus dictum *Conastrello* factum ad Solem, aut in Balneo Mariæ, calidè applicatum. Frutex, vt dicebamus, apertissimus est sepiementis, propter lentâ & flexibilia vimina, ex quibus reticulato plexu Garyophyllei flores in valis circumsepiuntur à nonnullis, non sine elegantiâ. Sic & ad topiarias scenas expetitur à nonnullis, quas non ineleganter conuestit. Feliorum succum quidam celebrant ad oris vlcera & inflammationes. Nec vires à Matth. traditas negamus, sed ab eo potius effictas rationabiliter, & aliunde muratas censemus, quàm experimento cognitas. Ex gustu facile quivis vel mediocriter versatus vnicuique plantæ vires probabiliter assignare possit. At pro veris & compertis proderè non item.

Tantò minùs reprehendendi  
ii qui id non faciunt, nec  
facere volunt, nec  
debent.

\*\*\*  
\*\*

*Diarrhoea.*  
*Lippitudo*  
*Oleum florum luforias*  
*rum inflans*  
*dolor cap.*  
*Anium es-*  
*buc.*  
*ad caveas*  
*anum Fir-*  
*ga ad de-*  
*vandos e-*  
*quos.*

*Anguil vit*

*Phthiriasis*  
*et pituita*  
*Gallinatus*  
*Dolor au-*  
*rium canu.*  
*Arthritis.*

Descriptio.

Bacca.

Semen.

Folia.

Flores.

Perpetua  
Seres.Diof. test.  
Cyph.  
Ligst.Cyprus &  
gyptia Plin.

Ligustrum

Ligustrum:



magnitudine æquali, coloris rufi, faporis strenuæ adstringentis, idque citra omnem morium. Folia admista Ligustri nostratis satis similia, sed minùs lata & candidiora, sapore acidulo subadstringente. Flores autore Alpino, coloris cinericei, non albi, sambuci floribus proximi, minores tamen: odor admodum acutus, & Ligustri odore suauior. Flores Bauuolito ex luteo pallidi sunt, odoris suauis Moschi: concoloris floribus baccilli: tota hyeme virer: semen ei pulchellum, spadiceum, pyramidale, trigonum eleganter exprimens, basi ita æquali, ut iurectum latrunculi instat stet.

Hanc veram Diof. Cyprum censemus, quo tradente, *Klæss* arbor est foliis circum virgulta Oleæ similibus, sed latoribus, mollioribus & viridioribus: floribus candidis, muscosis, odoratis: semine nigro, sambuci fructui simili. Optima nascitur in Ascalone & Canopo. Idem Philycam tradit esse arborem similem Cypro. Pro muscosis floribus *Spudm* habent vulgata exemplaria: Ori-basius accommodatius videtur legisse *Spudm*, id est racemosos: sunt enim in racemi speciem digesti. Vetus utraque voce caret, & simpliciter *Spudm* dicit *Spudm*.

Cyprum Ægyptiam describit Plin. his verbis: Cyprum in Ægypto est arbor ziziphi folijs, semine Coriandri, flore candido odorato. Coquitur hic in Oleo, premittiturque postea, quod Cyprus [Cyprum Dal.] vocatur. Preterea ei in libras quinque. Optimum habetur è Canopica in ripis Nili nota. Secundum Ascalone Iudææ. Tertium Cypro insula odoris suauitate. [præcipuum Dal.] Quidam hanc esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur. Item alibi. Ligustrum eadem arbor est, quæ in Oriente Cypros. Monet tamen Corn. in vetusto Plin. exemplari legi: Ligustrum si eadem arbor &c.

Hinc ex Virgil. competere videtur: *Alba Ligustra cadunt* &c: Et Ouid. 13. Metam.

*Candidior siliu nives Galarbea Ligustri.*

Vt quod flor Virg. folijs Ouidius tribuat, quæ candicant in hac non in præcedenti: quamvis Virgilium de præcedenti locutum esse, nihil verat, vt qui in Italia vixerit vbi illa, non in Ægypto

vbi hæc, nascitur.

Hinc etiam competere censemus omnia illa nomina Arabica, à plenique præcedenti attributa, Apud Serap. Heme, id est *Alcanna*, cuius flos similis est floribus Myrti, sed racematim diglossus, albus, & nonnihil ad glaucedinem declinans, odoris acuti. Hæc ex Ilaaci testimonio. Citat & Diof. eiusque superscripta verba.

Cyprus Hebræis *Copher*, Cantic. 1. vt Græcus interpres reddidit. Hanc etiam intellexisse videtur Hieron. in Cant. Cant. homil. 2. his verbis: *Bortus Cyperi* [Cyperi] frater meus mihi in vineis Engaddi. [βόρτος τῆς κίτης] Quantum autem ad lictæ explanationem, habet aliquid ambiguum: quia & vna flosens Cyperus [Cyprus] *Bortus* appellatur, & species quadam extrinsecus virgulti est quæ Cyperus (Cyprus) dicitur, ferens etiam ipsa floridum quandam fructum, in modum florentis *Vux* prolatum. Sed videtur magis ad fructum Vitis respicere sermo, quandoquidem Vinearum Engaddi facta est memoria: &c: Hanc igitur cognitam habuisse quidem, sed non eam, verum ipsam Vitum in Canticis intelligi voluisse Hieronymum satis apertum esse arbitramur.

P. Berchorius in reductorio, Cyprum seu Cyperum, utrunque legi tradit: Cyprum esse arborem similem Oliuæ in folijs, quæ secundum Isidorum & Plin. suauissimi est odoris: cuius semen si cum oleo coctum fuerit &c: Sed Berchorius videtur ignorasse discrimen inter Cyprum arborem & Cyperum herbam, cuius radix quoque suauissimi odoris: quapropter confundit has duas plantas. Cyperus etiam ab Hieron. scriptus videtur, vt notauimus. Idem ibidem cetero: Cyprum inquit, cum Nardo, Nardus & Crocus, hirtula & Cinnamomum cum Vniuersis lignis Libani. Et Ioseph. historicus Lib. 4. *απο τοῦ εὐκαρυωτῆος φέρει διὰ τοῦ ἀλάσματος ὃ διὰ τῆς ἀσφαλτὸς τῶν καρπῶν, καὶ πρὸς τὴν ἰσχυρὰν ἀσφαλτὸν καὶ ὑπερβαίνει* & subdit esse *σπυρῆα ἀλὰ καὶ ἄλλα*. Vt videas Cyprum apud Veteres in magno pretio fuisse.

Theophr. *καρπὸς* dicitur vnguentum ipsius, quod & Cyprum vocatur, *καρπὸς τῆς καρυωτῆος* à Cypro. Sed an ab hac, an alia quadam herba Cypro dicta, vt magna securitate asserit Lonic. nondum ausimus statuere.

Placet iudicium Constantini, *καρπὸς*, inquit, arbor Ægypti affinis ei quam Ligustrum vocat Italia: quam quidam etiam cum Ligustro canda esse contendere Plin. temporibus: sic vt ferè in interpretes omnes eandem Ligustrum reddant, cum diuerse sint, vt rectè cenet Massarius.

Marcell. apud Diof. legit cypron, Romani Ligustrum dicunt: cuius lectionis nullam nec rationem nec autoritatē addit. Videtur Plin. lectione motus id fecisse. Quod si ita est, abutitur sanè eius autoritate, qui ne ipse quid id ex sua sententia sed aliorum pronuntiare sit ausus, quamvis id alio loco id fecisse quibusdam videatur: aliis ex veteri lectione, aliter: Sed Diof. coridi addere ex Plinio, tanquam gemina, nobis non videtur integrum, neque consultum. Equis scit, quid illud sit, quod olim Romani Ligustrum appellauerunt. Enim uerò sanè cum Italica planta sit Ligustrum vulgare atque adeò Romæ cognita, cyprus nequaquam, illam Romanum Ligustrum esse verisimilius, quam hæc.

Sed à Diof. & Plin. sententia recedit Bellon. fruticem solummodo dicens, non arborem. Sic autem scribit de ea, ac seipsum declarat. In Ægypto inuenimus paruum fruticem, nominatum Heme aut *Alcanna*, quem refecit & colunt diligenter. Latini



Latini interpretes Arabes dixerunt Gallorum *Trœfne* Latine dictum Ligultrum, sed id falsum est, quia arbor *Trœfne* diuerfab ea. *Henne* prouenit ad altitudinem Mali Granati verum sectus, profert tantum tenuis virgas, vt Salix. Magnus eius est reditus in *Ægypto* [ vt dicitur in viribus ] propter tincturam. Item alibi: Arbor *Henne*, nascens in *Ægypto* alio nomine *Alcanna*, in hoc differt à *Cypro* aut *Ligulstro*, quod Galli *Trœfne* nominant: huic enim folia decidunt: *Henne* vero retinet. *Hec ille*. Ergo cum *Henne* differat à *Ligulstro* vulgari, vt testatur *Bellon.* pater quoque non esse *cyprum*, cum *Henne* & *Alcanna* apud *Serap.* nihil aliud sit quam *cyprus Diof.* cuius verba recitat.

Alpin. sequens deprauatam Interpretum versionem, ait esse *Diof.* Ligultrum: & addit esse *Alcanna* Auic. *cyprum* Plinio, *Ægyptijs* *Elhanne* & *Tamarhend.* *Bellon.* & Alpin. sententiam approbat quoque *Rauuolf.* additque Græcis communem vocabulo *schenna* dici: ex huius radice Arabes vrere spodium, vt etiam meminit *Auic. c. 17.* Melius conuenire *cypro Diof.* de qua *Salom.* in cantico, quam nostras *Ligultrum*. *Figuræ* suæ titulum fecit, *Cyprus* Græcis.

*Amarus* & *Lacuna* hanc cum *Ligulstro* confundunt. Denique falluntur omnes, qui vel *Plin.* non intellecta mente, vel vulgata eius lectione, vel sua decepti opinione *aliquos* censent esse *Ligultrum* nostras, quos in superiori cap. sufficienter refutauimus.

Annotat *Dod.* à *Turcis* vocari *Henne*: cur verò in eius historia pro *cypro* ponantur duæ icones *Phillyreæ* nescimus, nisi *Cyprum* *Phillyreæ* putatis, quorundam Recentiorum errore secutus, qui *Ligultrum* *Italonum* & nostras, ac ipsius etiam fortasse *Plinij* cum *Diof.* *Phillyreæ* vnum & idem esse existimauerunt, *Cyprus* Græcorum *Hist. Lugd.* quæ præter sententiam Alpin. atque figuram quam habet ex *Rauuolfio* in descriptione sua dicit flores duobus digitis longiores.

*Ligultrum* huc *Cyprus* *Diof.* *Portæ*: quod è *Turcia* nobis adferret, vulgò *Alchenna* dictum, cuius folia contrita, crocea huc ruffa ruffum capillum reddunt, vt idem inquit, non autem vulgare *Ligultrum* *Marth.* Videat etiam *Leclor* quæ cap. præced. notauimus de *Alcanna* allulis. Iam ex *Diof.* dictum optimam *cyprum* nasci in canope & *Alcalone*. *Plinio* *Cyprus* in *Ægypto* nascitur. *Bellonio* *Alcanna* *Ægypti* incolæ est, vbi omnibus notissimam testatur *Alpinus*. Speciatim refert *Rauuolf.* *Tripoli* & potiss. in *Cairo* prouenire. Eam *Turcas* & *Mauritanos* propter gratum & suauem odorem *Moscho* similem, quæ flores exhalant, diligenter in vasis custodire, & hieme, ne frigore pereat, in cubiculis & subterraneis locis seruare. Et quia tardè noua folia protrudat, nempe *Augusto*, quosdam irrigare aqua sapone infecta; alios radici calce n. ad nouere, vt citius floreat. Ad nos multi baccilli adferuntur. Pulvis viridis in instructionibus habetur officinis faccis plenis ex *Ægypto* & *Africa* delatis. *Onustæ* naues deuehantur per *Turciam*, eode. n. teste. Eiusdem puluerem subtilissimum habemus munere *Valerandi Dourez*, cum inscriptione, *H. 1111* *Bellon.* Est is ex fusco fluescens. Verum cum n. femine nobis misit *D. Paladinas* no nine *Ello nne*. Pulchello stracemulos inter *venetia* nostra peregrina seruamus à *Cl. Alpino* nunc horti *Patauni* præfecto digniss. no accepta.

*Cyprum* folia, ex *Diof.* astrictoriam vim habent: quare oris vlcerà con. mandicata medentur, & illita tunc feruidis alijs indi nationibus, cum etiam

carbunculis profunt. Eorundem decoctum igni ambustis applicatur. Ruffant & capillos tritas, & illita folia, siue in struthij succo maduerint. Flos ex aceto tritus & fronti inductus capitis dolores sedat. Cæterum quod ex eo preparatur *Cyprum* vnguentum, odoratum est, ac neruos exaltat & mollit: siquidem feruenti natura præditorum medicamentorum misturam recipit. *Plin.* *Cyprum* oleum vocat, quo auctore, exaltat, mollit neruos.

Folia stomacho illinuntur: & vulgæ concitata, sanguinem emittenti vel procidenti succus quoque eorum apponitur. Folia recentia commandicata, vlceribus in capite manantibus, item oris, medentur, & collectionibus, condylomatibus: Decoctum foliorum ambustis & luxatis prodest. Ipsa rufant capillum tusa, adiecto Struthi mali succo. [ Fallitur *Plin.* quod vocis homonymia: *cockia* *χουά* habet. *Diof.* De Struthij herba seu Lanarie succo, non Struthij Mali intelligendum. ] Flos capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combustus in crudi olla no nas sanat, & putrescentia vlcerà per se & cum melle, Olor doris olet, qui somnum facit. Succus *Ligulstri*, seu *Cyprum* eodem teste neruis, articulis, algoribus; folia vbique [ vtique vet. ] veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationi profunt. Acini contra Phthiriasin, item contra intertrigines, foliaue. Sanant & gillinaecorum pituitas acinij. *Cyprum* arboris folia, inquit *Gal.* summaque germina in vsum veniunt, & facultatis sunt ac qualitatibus maxime mixta: habent enim quiddam digerens cum aqua substantia, modicè calida: habentque etiam astrictoriam quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quiddam ambusta fouent. Vtuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam absque molestia & morsu deiecant. Quinetium sponte prouenientibus in ore vlceribus, aphthodesi, & ipsi puerorum aphthis commensa accommodata sunt. *Paulus* in viribus hoc amplius quam *Diof.* *Cypro* tribuit, vt aptè remediis his misceatur, quæ ad lienem consueantur: quod demiretur aliquis, inquit *Marcell.* nisi quia mollit *Ligulstri* vnguentum, durato *Lieni* idè accommodatum sit. Nec mirabitur, qui, vt dicebamus ex *Plin.* aduertet, calida quoque medicamenta recipere, quæ vtique vim habent aperienti & discutiendi, præter vim remollientem, quam habet. *Serap.* præter ea quæ *Diof.* & *Gal.* habet, addit, in muliebribus affectibus idem præstare, quod sanguis draconis. *Cyprum* florem *Plutarchus* putat corollis intorquendum, quod placidum suauemque somnum pororibus accersat, quippe qui lenem auram & mitem expiret, quæ remulentorum salebrosas aspritudines sensim læuiget, ita vt conciliata tranquillitate hebes crapula retundatur, & caloris officio percoquatur. Folia madentia & inuncta discutiunt (vt ait *Celsus*) ea, quæ in aliqua corporis parte inhaerent. Vnguentum è *Ligulstro* *Alexandro* magno misit *Abdelonymus* *Sicyonius*, vt scribit *Pollux.* *Auic.* tradit, quod si quis nominem tinxerit *Ligulstro* quod producit florem album, *Alchannam* vocat ipse, eum micturum vrinam nigram: Sed durum est credere, id euenire ex illitione externa, nec apud vllum alium id legimus. Certum quidem est, apud *Turcas* admodum consuetam esse illitionem ex eo. Attamen de ea re nihil hæcenas accepimus: nec verisimile est. Magni potèd *Ægyptijs* (vt scribit *Bellon.*) ex *Cypro* reditus: folia enim rescicata in puluerem redigant ad tracturas flauas. Ex eo in *Turcico* imperio census 18000 ducatorum superat. Quin latè etiam patet *Turcia*, consuetum fore minis hoc

Oris Galie.  
In. Inflam.  
mationes.  
Ambusta.  
Capillorum  
tinctura  
Cyprum  
Vnguentum

Stomachij.  
Menstr.

Luxata.

Plin. error.  
Cap. dolor.  
Noma. Pl.  
cera putrida.

Contra ph.  
dichulos.

Temperam.

Ambusta.  
Inflam.  
mationis  
Carbunculi.  
Oris vlcer.  
Aphtha.

Lien.

Noma.

Auic. mor.  
Magni r.  
census  
Cypr.

pulueremantis, pedes, partesque pilosas flauo rufoque colore tingere, viris verò eodem vngues rūtare: additoque alumine capillos pueris tam maribus quàm femellis inficiunt: nec non equis pilos, pedes, muscarium. Regionum illarum feminis decorum habetur, femora, epigastrium, partesque pudibundas flauo colore tinctas habere, id quod hoc puluere efficiunt balneo egressè. Tunc enim tinctura facilius imbibitur. Tantus verò est eius vñs, vt non solum Turcis familiaris sit, verum etiam in Dacium & Bosseam exportetur. Sape fit vt Alexandria naues hoc solo onustæ Constantinopolim appulsæ de repente saburram diuendant. Vtuntur & ad alias res aureo colore tingendas, ad quem vñm magna sunt eius in Ægypto commercia. Flores apud eosdem, autem Alpino, sunt in vñu frequentissimo dolenti capiti appoliti, non tamen cum aceto, vt Diosc. atque alij meminerunt: quod si fecissent, manifestius, vt arbitror, ijs floribus iuuarentur, intus medicamenti vi, aceto penetrationem adiuuante, deducta. Ex folijs puluerem confectum, quem Archenda vocant, ad ruffandos ornatus gratiâ capillos, nō succo Lanæi vel Struthij, vt ait Diosc. sed simplici aqua mīscētes, aquam auream faciunt. Ex hoc puluere cum aqua mīssa parato Emplastro vtuntur ad humidos pedes, fluxionibus obnoxios, ac multum exudantes facientesque pedibus ipsi appolito, ac per horam retento: maxime enim pedes, & quascunque alias partes corporis appolitus pulvis exsiccat ac adstringit: nihil enim habent Ægyptij, quod exudantes pedes plus exsiccat, quàm prædicta isthæc massa appolita & aliquandiu retenta. Puluere etiam hoc ad Vlcera oris, gingivarumque & pudendorum maxime vtuntur. Vñs bacularum, vt refert Ratuolf. est, si contendantur extrema earum ad absterionem dentium, si affricentur. Idem folijs puluerisatis & mixtis cum Citrij succo scribit tingi rubro colore vngues & crines puerorum, qui color videtur interdum apud nos in crinibus equorum Turcicorum.

Dolor capitis.

Pulsis Archenda.

Aqua aurea Emplastrum.


Ad humidos &amp; facientes pedes.

## MOLLE.

## CAP. XVI.

Descriptio.

Folia.



...compositam alig... s, per ambitum equalibus, cā-

tillum nonnunquam per extremum serratis. Flores peculiari ramulo furculo hærent numerosissimi, perpusilli, stellati. Virgineis pares, quos bæcæ excipiunt, Asparagi bacis fere pares, ac similes, pingues, rugolum ossiculum inclatatum continentes, sapore & odore bæccarum Iuniperi, acricum amaro aliquo.

Clusius suo *Molle* folia tribuit serrata, quæ ab arbusculis reuulia, lacteo succo, eoque lento & viscido & odorato manant, & ipsa folia trita Feniculi odorem reddunt, gustataque adstringentis facultatis nonnihil habere videntur. Trunco erant arbusculæ, [adhuc tenellæ] ex viridi nigricante, multis conferto veluti maculis cinereis. Idem *Molle* suum, quemad. serrato folio describit, ita etiam pingit, vnde nos folia tria ex summitate auulsa mutati sumus: reliquam figuram ex nostra sicca planta, folijs non serratis, aut saltem crenâ vñâ aut alterâ per extremum donatis, delineandam curauimus: fierique potest vt naturæ lusus sit, quemad. in Sorbo aucuparia adulescente & adulta obseruamus.

Lob. quoque nouelas plantas profundè crenatas ait.

Porrò est nobis Resina Ill. E.C. Wirtemb. ad D. Paludano missa, Gummi *Molle* arbotis nomine, ceræ depuratæ instar, lenta, alicubi nonnihil friabilis, flauescens undique, odore pingui, resinoso & aromatico, vchementi, quæ candela adnota, in clarum incendium exardescit liquefcitque, manducata non adhærescit, sed lentescens magis magisque colorem album contrahit, sapore satis grato, obscure amaro. Et sanè magnam habet similitudinem cum eo, quod in Oinc. prostat nomine Gummi Elemi, nili quod paulò videtur candidior. Peritiores rem omnem diligentius perpendant. Hanc resinam ex arbore iam dicta, Romæ visa, detractam habemus dono eiusdem Coruini.

Videtur & Petrus de Olma apud Monar. vt sentit Clus. *Molle* describere, quando in epist. quadam ait: Fructus arboris cuiusdam, illicis magnitudine, cortice Cerri Ægyptopis simili, folijs Fraxini. Eiusdem descriptionem Petrus Cieca dat cap. 112. primæ partis Chronici. Sed quando Lob. *Molle* Clusij vocat, & addit, eius semen & herbam à D. Brancion communicata, credere visus, esse herbam quam tamen scire debui, vel ex alijs, esse arborem. Sed deceptus forte fuit vocis homonymia: non enim *Mollis* arboris erat illud semen & herba, sed herbe Mimosa, quæ etiam dicitur *Molle* herba: de qua suo loco.

Apud eundem lib. de Balsamo, Carpopalsami species eximie odoris fragrantia, cuius fructus apprimè quadrare videtur cum Galenico & Antiquorum Carpopalsamo: eoque merito Carpopalsami species censendus. Eius iconem proponit, & annotat, *Mollis* arboris annoæ frondes extremas prominentes nullis incisuris diuisas aut serratas esse. Ibidem *Molle* seu *Molly* vocat, eiusdemque trimestris & quadrimestris effigie habet.

Io. Fragos. Medico & Chirurgo regio de rebus ex Indijs importatis Hispanico Idiomate conscripto libro, Arbor *Mollis* seu *Muelle* cuius folia referunt Fraxini folia præterquamquod angustiora & minutiora, aliquantulum crenata versus terminum: Gummi albidissimum, Mannam referens: Hæc ille.

Huius Carpopalsami, id est *Mollis* fructus rufi & expressi liquor, eo modo paratus, qui dicitur, in aquam iniectus & agitur, vt scribit Clus. celerrimè liquor, diluitur & lactis modo albescit: quibus notis à Diosc. Syncerum Balsamum à vitato



tiato coarguitur: Vnde colligere licet, *Mollem arborem* esse veri Balsami speciem. Sic Lob. sentit. Verum quia ipsa arbor nulla ferè in re ad Balsami descriptionem accedit, cur ex ea sola nota & odoris suauitate ex fructu seminitque magmate expresso latic Balsami veri & genuini species censenda sit, nulla adhuc occurrit ratio. Sit quidem liquor Balsamodis & odoratus: an ipsam proinde arborem multum à Balsami veri frutice diuersam eius speciem dicemus? Sed odoratum tamen laticem *Βάλαμον* melius dixisset Balsami similem liquorem, quam *Mollem arborem* veri Balsami speciem.

*Molles* & Lenticulos Peruvianus Cast. Durantis, cuius figuram habuisse ait ab Odoardo Lopes medico quæ sanè multum differt à Clusiana & à nostra.

Abundatè nascitur in conualibus & locis planis Peruanæ regionis, vt referunt omnes, qui Occidentalium Indiarum descriptionem dederunt. Eius arboris pulillas duas plantas vidisse testatur Clus. in horto splendidissimo Ill. viri D. Ioan. de Brancion, sed quæ tertio anno perierit hyemis iniuria. Annotat Lob. enatam ex semine in Anglia, vt Londini. Camerario fata sequenti vere exaruit, cùm tamen magno studio ab eo fuisset asseruata: liquorem ybi folia decerpébantur, emittebat lacem, odoratum admodum.

Roma, vt dicebamus, proceram arborem obseruauimus in horto quodam à D. Coruino pharmacopeo Romano peritissimo culto: Maji initio nondum floruerat, vix ante finem eius floribus lecta futura, ut iudicabat nobiscum idem Coruinus quo tempore tamen aliàs citius florere referebat Vere calidiori. Ex eadem tamen arbore pulchros ramos, quales pictura ostendit ex parte, cū floribus & bacis dono accepimus ab eodem: Misit ad nos baccas recentes, vt putabat, Doct. Casp. Baulh. quæ tamen, frustanea specie satè Montbelgardi.

Refert Clus. ex Petro Cieca, *Molle* cortice adeo commendato esse, vt eius decocto crurum dolores & inflationes summa cum utilitate focueantur. Ex ramulis sunt densissima utilissima Ex fructu cum aqua decocto, pro cocturæ modo, fit aut vinum, siue potio admodum bona, aut acetum, aut mel: tantoque in pretio sunt apud Indos hæc arbores, vt quibusdam locis eas consecratas suis idolis habeant: addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causâ ortis auxilio esse. Gummi verò eius, quod Manne modo candidum esse tradit, lacte dissolutum, caliginem oculorum abstergere. Coruinus, qui nos eiusdem Gummi participes fecit, testabatur eius drach. vnam & semis, egregiè aluum ciere, seque experiètiâ vim eius catharticam cognouisse. M. Fumee in hist. Ind. gen. quoque testatur ex *Mollis* arboribus fructiferis fieri mel, & potionem. Notat Cardanus huius corticem adeo salutarem esse, vt si aquæ incoquatur, soluat lotio illa lassitudines ac tumores: ramuli, pergit idem, gingiuis ac dentibus viles sunt, cùm eis dentes trlicantur, purganturque: Fructum, quem fert exiguum, si iniicias aquæ, sola coquendi diueritate, mel, vinum & acetum facit. manifestum est autem, prius vinum fieri, quàm acetum: mel verò dulcedine vinum præcedit, crassitie subsequetur. Monarde quoque teste, magnis viribus pollet hæc arbor: nam corticis eius pulvis vulneribus inspersus, ea mundat, deinde carnem generat, & perfectè curat. Dentes eodem pulvere fricatos, stabiluntur, gingiue abscedentes sanantur. Foliorum

decocto intincti panni, & calidi vulneribus, aut puluere corticis illius inspersio impositi, curatio nem eorum accelerant, & humorum eò defluxum prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, qui fructibus adiunctus, sultibus idoneus est ad multos capitis marbos, & ad Emplastra. Eius quoque potio, quam ex fructu parant Indi saluifera admodum est. Ipsa arbor omni tempore odorata est. Scribit Io. Fragos. Corticem eius tantarum virium esse, vt crurum dolores, tumoresque ingentes (si eius decocto aliquoties lauentur) breui collat.

*Mollis* arboris fructus, inquit Lob. Carpopalissimum verum virtute longè superat, tum expressus ex fructu liquor vero Balsamo viribus quàm proximè accedit, eiusque defectu conuenientissimum erit succedaneum. Huius fructus vncie octo rusæ drachmas septem præstantissimi & utilissimi laticis, artificioso corcularis pressu, siliui ex atro coloris, crassamenti ouorum olei ferè & diuinæ fragrantia, similium ipsius seminis odoris inter tundendum, & saporis Xyloaloes optimæ notæ, nobis dedere, Hic liquor recens expressus albescit & spumat: in lancan vestem fusus, & simplici ablutione aquæ lotus, notam non relinquit. Ex magnate seminis iterum tuso, & paucioracea asperso, pressu forti, laticis vnguinofioris resinacei, instar grani Iuniperini drach. duas elicui, qui maculam non relinquit: quinetiam in aquam iniectus & agitarus, celerrimè liquatur, diluitur & lactis modo albescit. Quibus notis colligit idem *Mollem arborem* esse veri Balsami speciem, de qua re prius.

#### MOLLIS ARBORIS RESINÆ SIMILES, FOENICVLI ODORE.

##### CAP. XVIII.

Donabat mihi honestus vir Petrus Garetus [in-quit Clus. Exor. lib. 4. c. 8] succum octauum, quem acceperat ex navigatione longinqua anni 1600. Erat densa resina, nec transparentis, foris subruissa, inferiore parte alba, & digitis attrita satis friabilis, odorisque non iniucundi, sed foeniculi odorem quodammodo referentis, vt suspitionem mihi moueret *Mollis* Arboris resinam esse posse, sapor erat amariusculus & acrisculus: nec dēribus cedebat, nec ore retenta mollescebat, igni tamen admota liquecebat instar cere, atque splendida fiebat, flammam tamen non concipiebat.

Nonus verò, Resina erat cineracei ex albo coloris, adeo autem strigolâ & retorrîda, vt gleba aut lapidis fragmentum potius videretur, quàm resina: licet quispiam suspicari posset eiusdem generis esse cum superiore, sed magis impuram, quia simili odore & sapore prædita erat cū ea, nec dentibus cedebat, nec ore retenta mollis fiebat, igni tamen admota perinde atque illa liquecebat, & flammam non modò concipiebat, sed simul etiam ardebat.

#### ELEMI RESINA.

##### CAP. XIX.

Gummi Elemi in massas Cylindraceas cogitur, quas pollice & medio digito complectaris, duarum palmarum circiter longitudine. Substantia verò est ferè vniformi, ceræ flauæ & colore

& consistentia simili, facile flammam concipiens color alijs intentior, substantia resinacea, sub dentibus facillimè lentescit dealbaturque, sapore non ingrato nonnihil acris & subamaro, odore ferè Fœniculi. Obvolvatur autem glebæ, quæ ad nos importantur, pulchro folio, à cuius aërio medio parallelæ obliquè in margines creberrimæ feruntur venæ, quod canna Indica videtur esse. Funiculis præterea. Xylinis simul omnia cōstringuntur.

*Folium quo inuoluitur.*

*Vetussum quale.*

*Ar gummi Melle arboris.*

*Olea & Ethiopica. lachryma.*

*An Lachryma Cedri.*

*Resina est, non Gummi.*

Illud autè quod à tringita annis Gummi Elemi nomine asseruimus, magis est friabile & exsuccum, colore ferè croceo, quorum utrumque vetustati videtur adscribendum: alioqui folio eodem inuolutum est. Multa habet communia cum Resina, id quod Doctores & Peritorum trutina dignum est: eamque ob causam hoc loco de eo agere placuit.

Quidam Aethiopicae Oleæ lachrymam esse censent, Gummi Elemi dictum, ut annotat Cordus, & aere illum Hermolaus, quasi Enthemum: quod ut non negamus, inquit ille, ita etiam non affirmamus. Apud eundem in margine annotatum. Gummi Elemi suspicantur aliqui esse lachrymam cedri.

Marcel. Ficinus in Antid. Epid. ait Elemi quibusdam Gummi cedri esse.

Fuchsi de comp. med. Oleæ, inquit, Aethiopicae lachryma Officinis corruptè Gummi Elemi nominatur: videntur verò carere.

Nimium securè Ryffius in Diosc. scribit de lachryma Aethiopicae Oleæ Gummi Elemi ab Eleæ. vel corruptè Enthemum.

Ita vides nostrà etiamnū ætate obscuram admodum esse Elemi originem, quod & suo tempore annotauit Matthioli. qui negat Gummi Elemi Recentioribus Medicis & Officinis dictum esse Aethiopicae Oleæ lachrymam, quia gustu mordax non sit ea lachryma [etsi improprie Gummi appelletur] non in Gummi quidem, sed verius in resinatum genere recipienda.

Matthiolo ad stipulatur Hist. Lugd. traditque vehementer errare qui putant Oleæ Aethiopicae lachrymam esse. Gummi verò improprie dici, cum in Resinatum genere sit potius, ut ex eo intelligeret licet, quod igni exposita hæc lachryma statim colligescit ac diffunditur, non aliter quàm Resina, quæ ex Pino, Picea, reliquisque resiniferis stirpibus manat: nullū autem Gummi genus igni liquatur, nisi addito aceto, aut liquare alio, sed vritur.

Lacuna autor est, Gummi oleæ silu. siue Aethiopicae hodiè non adferri, quamuis aliqui credant esse Gummi Elemi vocarum, quod potius resina sit sed ex qua arbore, ignorari.

Amatus tradit dici hodie Gummi Elemi corruptè quasi oleæ, quum Oleæ Aethiopicae lachryma esse debeat. Quæ verò in offic. hodiè habetur, iucundi sanè si prunis inieceris odoris est, quæ an vera vel falsa sit dubitatur, quia Gummi Elemi offic. non habet asinitatem & similitudinem cum scammonio, & sit resina, ut iure censendum sit vero gummi Oleæ Aethiopicae nos carere.

Autore Cæsalpino Scribit Diosc. Oleastrum in Aethiopia lachrymam fundere Scammonio similem, mordaci gustu, fuluam, stillis constantem exilibus.

*Lachryma Theop. ad sist sang.*

In mari Rubro peculiarem describit Theoph. è cuius Lachryma Medici medicamentum componunt sistendo sanguini. Plin. Enthemum appellat Oleæ lachrymam in Arabia singula in effectum,

contrahendis vulnerum cicatricibus. Hoc fortè fuerit illud quod à recentioribus Chirurgis vocatur Gummi Elemi.

Io. de Vigo l. 3. c. 19. Oleum Hypericonis tradit, quod recipit Gummi Elemi. Cronemburg. exponit esse lachrymam Oleæ Aethiopicae apud Diosc. corruptum initio in Eleæ, postea in Elemi & Elemni doctam Medicorum scholam credere. Nostrum autem vulgare potius ab odore, resinam Piceæ siue Pinus esse censendum esse, quàm verum Gummi: qui ambigit, inquit, supra ignem experiarur, nam continuo colligescit ac diffunditur, resinatum instat, quod Gummi non faciunt, atque sic controuersie suæ ipse iudex sit.

Nescimus cur Alex. Bened. vulgare hoc gummi tertium genus Halimi censuerit, quum tamen Diosc. fruticem, alij plantam asserant, ac prorsus de lachryma nihil Apollo supra Ballampum artificiale: Gummi Heleni siue Elemi, quasi Enthemum, non usu venit nisi addito aceto aut vino, odoratum valdè. Verum ex quaman planta refudet, incomperum esse ait, nullam notam habere cū lachryma Aethiopica communem. Nos, inquit idè, quandoque suspicati sumus lachrymam esse Oleæ maritimæ Theoph. & Plinii Enthemum: Nos verò contra non probamus Apollinem marinam plantam dicere maritimam, Theoph. l. 4. c. 8. scribit in mari provenire, non autem iuxta mare: quæ occasio, ut nullo modo possit esse olea Aethiopica, nec etiam Gummi Elemi.

Cæsalpini sanè scripsit in mari rubro provenire Theoph. plantam: si ita est, ut sanè ex Theoph. apparet, non potest esse Gummi Elemi, ut ille etiam suspicatur, nec olea Aethiopica.

Lonicerus Elemi & Eleum esse gummi tradit, simile Gummi oleæ Aethiopicae, nimirum quasi utrumque tam probe notum habuerit, atque addidit maiori etiam temeritate viros ei tribuit lachrymæ Aethiopicae, non declarans interrim quid sit.

De Loco natali eius nihil adhuc certi accepimus, Indagabit posteritas.

Testantur plerique qui de eo scripserunt mirabiles eius vires esse in vulneribus capitis quo nomine tam apud medicos quàm Chirurgos celebratissimum habetur. Practici quoque in caluarie fracturis ac vulneribus nunquam id in suis Emplastris ac vnguentis omittunt, mirabilem eius usum continuo experimento edocti, quæ de causa ex eo & vnguentum & ceratum à pharmacopolis diligentioribus concinnatum habetur. Eius loco nonnulli officinarum mangones (notante id Amato) Hederae gummi non sine agrotorum detrimento accipiunt.

## PHILLYREA ET MAHALEB.

### CAP. XX.

DE Phillyrea & Mahaleb meritò hoc libro agimus, ut baccifera planta. Cuius tractatio cum maximè intricata sit, & apud Autores controuersa, primum more nostro in talibus consuetudo ex autoritate Veterum de ea trademus in genere, passim ubi opus videbitur Neotericorum nostraque placita intererentes. Distinguiamus autem à Phillyrea arborem quæ proptè quodam Græcis, Latinis *Tilia* dicitur de qua lib. 8. agemus. *quadrupla* Diosc. arbor est cypri magnitudinem æquans, folijs Oleæ similibus, sed latioribus & densioribus, fructu Lentici, [χίον] nigro, subdulci.



dulci, & quasi racemato. Locis asperis nascitur. Profrus autem hallucinatur Cordus qui ad Diosc. hunc locum annotat: *Que* hoc cap. ab eo descriptur Tilia omnino eandem esse cum Ligustro, quem oscitanter quoque Lonicerus secutus est, Eorum opinionem merito Matth. ante nos reiecit, qui errorem paullo post aperius detegemus.

Temerè quoque plerique interpretes Phyllyreæ vocem in Tiliam transmutarunt, non agnoscetes manifestum discrimen inter hanc *φιλύρεα* & Latinoſum Tiliam, quæ nostro sanè iudicio Theoph. est *ελάυρα*, ab eodem in marem & feminam distincta.

Sunt tamen qui apud Theoph. non absque ratione legant & intelligant hanc, quando ait: Ex siluestribus perpetuò virent *φιλύρα*, (sed illi *φιλύρα* legunt, Gaza vertit Philyca, quamvis in eius versione Philyca scribitur: an ex veteri aliquo codice, vel suo cerebello, nos laet; nec scimus ubi locorum Theoph. vel eius interpretes & imitator Plinius Philycam commemoret.) quæ in olympo monte provenit. Hæc l. i. c. 15, hist. Fortè & l. i. c. 2. legendum *φιλύρεα*, quando scribit: Quædam cortice tenui vt Laurus, *φιλύρα*, Gaza Tiliam reddidit: quam tamen nemo nescit cortice esse crassissimo) seu vt nos, Phyllyrea.

Plin. quoque Tiliam non distinguens à Phyllyrea, Tiliæ dotes eas assignat, quæ à Diosc. Phyllyreæ tribuuntur.

Sic & Paulus Aegin. vtramque manifesto errore confundens, eadem & quidem rotidem verbis suæ Phyllyreæ ascribit, quæ Diosc. Phyllyreæ.

Ruell. Gaze versione deceptus priore loco apud Theoph. legit Philycam. Verum enimvero quomodo Theoph. Tiliam folio deciduo diceret Philycam, vel vt nos potius legendum censemus, Phyllyreamque perpetuò viret?

Audiamus Arabes, qui *Mahaleb* vocant.

Mahaleb Diosc. (inquit Serapio) est arbutum simile arbori Alcanæ: dixit Galin. tractatu nouo quosdam putare esse Carpobalsamum. Scribit Albucarr, *Almahaleb* esse calidum & siccum, deferri ab Andargen & Nahand: Melius esse, quod simile Margaritis minoribus & boni odoris. Haec eben Amam Almahaleb diuerſas species tradit, album, nigrum, & viride: albo grana esse parua: maius esse magnitudinis Cicerellæ, adferri ex insula: Hispanicum autem minus esse. Melius esse albidius & nitidius, meliorisque odoris: deterius verò nigrius. Vsum esse medullæ sine cortice, qui niger est, & internè albus deferri ex monte Sebuen & Deibegen & de Nahand, cuius arbores grandes: colligi Septembri, vsum esse grani & corticis. Verum apud eundem Serap. in margine male scribitur Mahaleb esse Tiliam Diosc. præstitisset retinere nomen Græcum Phyllyreæ, de qua Serapionem scribere manifestum est ex verbis, quæ ex Diosc. citat.

Matth. [vt etiam indicauimus l. 2. c. de Ceraso amara, Mahaleb putata] non sine errore concedit errasse Serapionem, existimando Phyllyream & Mahaleb Arabum idem esse, quia facultates ex Arabibus sunt diuerſæ à Phyllyreæ facultatibus. Nos sanè nihil adhuc videmus in Serap. ex quo sententia Matth. confirmari possit. In viribus notandum Diosc. scribere de folijs, Arabes de granis. Quinimò quod Diosc. ait vrinas ducere, respondet viribus ab Arabibus traditis. Serap. id interpretatur de granis. Non concedimus igitur Matthiolo Serapionem capite de Mahaleb errasse,

sed hanc eandem facientem cum Phyllyrea.

Auicenna *Mahaleb* vel *Mihalab* eligit albu & purum. Bellunensi Mahaleb est granum fructus, simile ossi cerasorum, notum in Syria, & commendatum contra calculos renum.

Hermolaum, virum alioqui doctissimum, miratur *φιλύρεα* apud Diosc. interpretatum Tiliam, ac eandem cum illa facientem, vt ampliùs docebitur in historia Tiliæ. Maior etiam nummos admiratio habet, eundem secutum Marcellum, nullam alioqui occasionem omittere solitum, si quando Hermolaum carpere possit. Hos more suo sequitur Ruell. ac Hermolai verba propriis venditat. Mirum tantum discrimen à doctissimis viris non obseruatum, inter Phyllyream, inquam, & Tiliam seu Philyram. Sed quid non possit securitas ac confidentia tum sui, tum erga alios? Quanquam satis evidens sit eos parum in stirpium cognitione versatos.

Aegrius excusabitur Tragus, vir prope ætate in perſcrutandis stirpium historiis ac naturis sagacissimus. Nam nec is quidem distinguit.

Sed prædictos Diosc. interpretes alioſque nominis vicinitate deceptos putamus, nò agnoscentes Tiliam Græcis *φιλύρα*, non autem *ελάυρα* dici. Quid si eos Plinii quoque auctoritas in eum errorem traxisset? qui tradit Tiliam arborem esse proceritate perquam modica, cum ipſo ſensu constet contrarium? Forte & huic nominis similitudo imposuit. Inde factum, vt dicebamus, vt Tiliæ eas attribuerit vires, quas Diosc. suæ Phyllyreæ, quem errorem etiam Ruell. incautè secutus est.

Lonicerus asserit, nullà allatâ ratione autoritate, Ligustrum & Phyllyream vnâ & eadem esse plantam, contenditque caput hoc Diosc. de Phyllyrea spurium esse. Quid spurium? At codices Græci non solum imprælli, & ii quidem probatissimi, sed etiam Oribasii codex manu scriptus habent & caput illud, & Phyllyream nomine tenus, quemad. & Paulus, & Serapio, quem Arabico sermone Mahaleb appellasse diximus.

Imperitum in re herbaria Lonicerum decepisse videtur quòd Phyllyreæ descriptio à Ligustri, quod Græcis Cypros dicitur, non parum conueniat.

Porro *Macholebum*, inquit Cordus, seu vt Arabes vocant *Mahaleb*, nucleî sunt, figurâ, quantitate & colore cerasorum nucleis similes, gustu tamen teneriores, vehementiores & odorati, ideoque suauis odore oris halitum commendantes. Eligito recens, hoc est, plenum, in candido subrufum, odoratum, & minime verustate rancidum. Affertur ex Africa & Aegypto in Italiam, Galliam & Hispaniam: in Germaniam verò rarissimè, quia apud Germanos nullus adhuc eius vsus inualuit. Arbor autem in qua nascitur, qualis sit, nobis nondum constat. Hæc Cordus. Cui Gesn. addit iconem Cerasi amari, de qua egimus suo loco, non tamen existimauerimus Cordum hanc plantam intellexisse.

De eadem sic scribit Rauuolff. Halepi apud aromatarios vidi parua semina alba, Machaleb, quæ duro cortice continentur, longiuscula, acuminata, obducta tenui tunica, Pistachiorum modo. Ex istis regionibus multa transportantur in Syriam, quibus vtuntur ad odoratum saponem. Arbuticulas in quibus proveniunt, non vidi: quantum intellexi proveniunt in vicinia, potissimum in montibus itineris Persiani. Ab incolis hodierno adhuc die cum Serap. nominatur *Nahand* ille tractus.

Phyllyrea propriè quid Latine significet, se nesci.

Serap. desinitur aduerſus Machaleb. Hermol. Marcell. Tragus.

Blin. error.

Ruell. nos.

Lonicer. repreh.

Macholebum, Mahaleb. descriptio.

Locus.

Gesneri error. ad Mahaleb.

Nahand Serap.

*Mahaleb  
Spinofum  
Monachus.*

*Oleum.*

*Matth. re-  
preh.  
Alter eius-  
dem error.*

*Ligustri  
species  
Amat. nov.*

*Lacuna nat.  
Chamæce-  
rasus.*

*Gesn. repreh.*

*Theop. c.  
mend.*

cire farentur Monachi apud Mes. Arabicè autem esse Mahaleb, de quo præter iam dictos Arabes etiam Rhais & alij plures Arabicæ linguæ Scriptores pertractarunt. Mahaleb autem arbusculam in Syria notissimam esse, & t. odie ibidem vulgò Mahaleb vocari. Eam (quod illi sciant) non reperiri in Italia. Esse enim spinosam, folijs Oliuæ similibus, ferè grana quasi racematim in ramis, vt Lenticus, paulò crassiora tamen: è quibus Syri oleum exprimant, valdè odoriferum, ex quo conficiant saponem olfactu suaves, & alia plura. Sequè habuisse ramos eius allatos à sui ordinis quodam fratre, qui ex ijs partibus redierit. Ergo [addunt] Mahaleb non sunt fructus Cerasi sylvestris, vt ferè omnes iuniores hallucinantes interpretati sunt. Fortasse quia cum immediate post oleum de cerasis, Melues posuerit oleum Almahaleb, & in eius descriptione dixerit, oleum de Almahaleb fortius esse in omni re, quàm oleum de cerasis, inde fortè putantes, Mahaleb esse cerasia sylvestria: sed reuera facis differunt inter se. Ex quibus pater oleum de Almahaleb non esse oleum de cerasis sylvestribus. Quod si vera scribunt Monachi, Mahaleb spinosum in Syria proveniens, planta erit diversa à nostra Phillyrea, aut certè eo ipso varians, quod sit spinosa: nam cetera conveniunt.

Matthiolo assentimur, Cerasum amaram de qua suo loco egimus, à multis dictam Mahaleb, non esse Phillyream Diosc. sed esse Mahaleb Arabum non concedimus. Nec etiam scimus an vnguentarij, quod ille scribit, illius plantæ nucleis utantur, ad singmata odorata paranda, an potius vt nos censimus, ijs qui ex Syria adferuntur, eò aliunde illata, vt dictum. A nemine hæcenus annotatum, quod equidem scimus, ex ceraso amara colligi & reponi pro vnguentarijs grana. Nihil tamen certi adhuc statuere possumus, cuius plantæ sint illa semina cum eam, vt dictum, Monachi spinosam faciant, qualis sanè nostra Phillyrea non est.

Amatus Phillyream speciem Ligustri facit, & ait Hisp. *Otrasuerte* de Alhenam dici: forteque Germ. *Sarrigel*: Arab. *Mahaleb* & c. sed non docet quæ aut qualis sit illa Ligustri species, aut an cognitam habuerit. Nomen etiam Germanicum Phillireæ nostræ minime cõuenit. Tam hic quàm Lacuna erroris accusant eos qui per Phillyream Diosc. Tiliam intelligunt: & meritò, sed interim ij nuda figura contenti, quam Lacuna ex Matth. proponit, non docent quid sit.


Gesn. in epist. ad Collinum in fine descriptionum Cordi notat à Dalech. chamæcerasum nominari arbusculam, quæ Arab. Mahaleb dicitur. Aduchi ex Syria, quamvis ubique per sepes circa Lugdunum nascatur, sed fructu minus habito, vt ille ait, nucleo & semine tenuiore. Ast nos Chamæcerasum hanc non existimamus Mahaleb, quia Mahaleb & Phillyrea non differunt, Chamæcerasus verò multum differt à Phillyrea.

Adtipulantur quoque Pen. & Lob. frondosam illam patulam Theoph. *οκλαστειν* Tiliam esse, non hanc, malle tamen se legere *οκλαστειν* siue Oleæ asiaticam istam, quam Diosc. describit per congruam descriptionem, & Oleæ non modò similem, sed etiam fociam, vt ab Oleastris, quibuscum frequens reperitur, nihil ferè discrepet: cuius duo modi, de quibus postea.

Apud Theoph. *οκλαστειν* scribitur, non vt illi habent, *οκλαστειν*. Tamen & eius cõfessionem non de hac nihil tradunt, præter ea quæ acceperunt à Cludio, quæ tibi eo apta, mihi quod Græco.

Steinlinden vocent, quod nomen non placet. Quid Phillyreæ commune cum Tilia, quæ Linden Germanis: Steinlinden autem Tiliam saxatilem significat. Sed iam differentias à Neotericis & nobis obseruatas videamus.

# PHILLYREA ANGUSTIFOLIA: EIVSQVE VARIETAS.



**H**anc primò dicamus, tanquam notissimam hoc seculo, & ad Veterum Phillyream omnium optimè accedentem, vt ad eam eadem esse videatur, quod tamen nodum ita temerè pro certo & indubitato asserere ausimus. Ergo frutex, quem Monspeli nostro tempore Phillyreā vocant, nonnisi quam arbo-

rescit, cortice cinereo obrectus, materie alba, ramis sibi inuicem oppositis, folijs Oleæ sicut aduerso respondentibus, nigrioribus, nec vnà vt Oleæ candicantibus, modò angustis, & olearum folijs angustioribus, nunc mucronatis, aliàs subrotundis, interdum nonnihil in ambitu serratis, duris, acrimoniæ cuiusdam & amaritudinis nequaquam expertibus: ad quorum exortum flores multi utrinque ramulos coronant ex herbaeco albi. Succedunt bacce rotundæ, parvæ, ceruleæ, vel potius violaceæ, breuissimis pedicellis racematim ramulis adherescentes, dulces cum aliquo amaro: in quarum vnaquaque officulum paruum, in quo nucleus.

Vt verum fateamur, cum effemus Monspelii, minis diligenter obseruauimus an sint species diuersæ quæ ibi proueniunt, an tantum naturæ lus.

Camer. ad hist. Germ. & in Epir. Matth. proponit iconem ex nostra sicca iam olim depicta per Gesnerum, quæ angustio admodum folio pingitur, eadem tamen nobis videtur cum Clusiana à nobis proposita. Is Phillyream 4. facit, traditque humanam altitudinem æquare, ramos tamen minores & frequentiores habere quàm Phillyrea folio illicis & Phillyrea latiori folio non crenato, nigrior cortice rectos: folia Oleastris, angustiora, viridiora, amaritudinis non expertia: flores etiam exiguos albicantes, Oleæ similes, simul congestos, & inter foliorum alas circa ramulos nascentes: quibus succedit fructus, maturitate niger, baccarum Myrti magnitudine, officulo duro præditus. Abundè in Castella noua Hispaniæ, locis incultis, non procul à Tago flumine diffisis inuenitur, & frequenter agro Monspeliano in sepibus. Monspelianæ Academiæ studiosi olim, modò Oleastrum, interdum etiam Halimum appellabant. Hispani huic & sequentibus duabus indifferenter nomina dabant modò *Pradera*, modò *Laderna*, nunc *Lentisco*, nonnulli etiam *Tornisco*, quod Thymel-



leæ proprium.

Phillyrea quinta eidem Clusio dicta, iam descripta, forma & magnitudine similis, in hoc differens, quod eius rami tenuiores, rariore, minusque conferti; frequentiores etiam habet virgas à radice germinantes, fructu satis contumaces. Folia etiam ex aduerso disposita, paulò longiora & angustiora quàm prædicta, oleastrinorum modo firma, saturatius virescentia, subacris saporis. Hanc & fructu & flore carere incolæ affirmabant: sed utrumque superiori similem proferre non dubitavit se idem Clus. scribit. Nec alibi hanc vidisse, quàm in incultis Hispaniæ Castellæ veteris & Batiæ.

Non dubitamus de Phillyrea quam hoc loco depictam damus, scripsisse Penam & Lob. in Adu. ubi duas icones exhibent quæ minis placent: dubitamus tamen an per minorem suam intelligant Clusij quartam, & per maiorem, Clus. 3. de qua postea. Labet lectori eorundem verba proponere, quæ sic habent, Phillyrea duo modi arborefcunt in Galloprovinciæ viarum marginibus & oliuetis Massiliæ vicinis: & quæ maior, rarior persimilis pumilæ Oleæ, caudice ramisque nigrioribus, longioribus quàm oleæ agrestis, & foliis magis ad Ligustrum accedentibus. Baculæ multæ in ramis, etiam oliuæ agrestis minores, non amare (vt oliuæ) sed subdulces, nucleo intus Cerasi. Minor multò frequentior ipsam in naturalibus & Montpelij collibus glaucosis: folio æquè longo, sed angustiore duplo; duploque minor tota planta: similes acinij Lentiscinis & similiter racematim proximè hærentes admodum curto pediculo, quæ item maturæ subdulces sunt, aliquantum acres, sed neutiquam ingrata, vt sunt Oliuæ satiuæ & agrestes.

Senensis (Marth.) infarcit plaustra verbosarum autoritatum, nec tamen, quàm dā describit.

Lob. in obs. Phillyrea Narbonensis florida. *Varietates*: Belgicis hortis Hispano semine angustioribus folijs gemina Phillyrea visitur. Item latifoliam cristatam & tenuifoliam munere Georgij Rye plerique habent in Viretis Belgicis. Phillyrea angustifolia flores. Apud eundem pro Phillyrea Narbonensis posita est icon, de qua paulò post. Pro angustifolia ea quæ à nobis ex Clus. iam proposita duas figuras ponit Lob. in iconibus, omittis ijs quas habebat in Adu.


Scribit Cæsalp. *Ilustrum* vulgò appellari, alijs *Linternum*, fruticem in maritimis tractibus frequentissimum veluti oleam quandam parvā, multis ramis fruticantibus: foliis oleæ durioribus ac viridioribus, similiter perpetuis: florere à lateribus in alis foliorum, non oblongo racemulo, vt olea, sed aceruatim granulis fructum ferre nigrum, Ligustro similem: *Arice* intus officulo, tenui putamine, figura oliuari. Frequentior in hac sterilis, quasi in eo genere mascula, quàm Plin. Alaternum vocat inter steriles quæ fructum nullum ferunt, ei folia, inquit, sunt inter Illicem & oliuam. Vidimus tamen quandam angustiori folio quam olea, quandam latiori breuiorque, ad Illicem valde accedente. Hanc (addit idem) videretur Theoph. Phyllyream appellasse, perpetuò virentem, unde illi honor in alendo pecore, cum semper fronde abundet. Obdignissima est marces, candorque ei Celsatrum modo. Germinat incunte vere: Fructum reddit post occasum Vergiliarum. Montibus est propria. Diosc. Phyllyream vocat. *Hætenus Cæsalp.*

Phillyrea minor Penæ & 4. Clus. Alaternus minor Dalech. Hist. Lugd. Dodonæus in hist.

Lat. nomine Cypri proponit à nobis hic exhiberi, sine villa descriptione. Cui id faciat, nescimus: cum Cyprio sanè non conuenit.

Cypri.  
Dud. error.

# PHILLYREA LATIVSCVLO FOLIO.



**H**anc Clus. *Phillyrea* tertiam minorem vt plurimum tradit, ea, quæ folio est Illicis, ac ea cui folium Alaterni: illius tamen arbusculam vidisse, ait, duorum hominum altitudinem æquantem, & ab illa ramulum suis floribus ornatum auulsi se, è quo suam iconem delineari curauit.

Eius autem rami, inquit,

exalbido cortice reguntur, vt in alterâ, [quæ folijs Alaterni] aliquantulum rugoso: folia habet iam modò citatis angustiora, nullis crenis serrata, eiusdem vt in præcedente coloris, adstringentis gustus: Flores Oleæ similes, pusillos, ex herbaceo candicantes, confertim inter foliorum exortus nascentes: fructum deinde rotundum, superiori similem. Desertis Batiæ locis nascitur.

Eius etiam vnica arbuscula in Narbonensi Gallia ab eodem conspecta, ad ingressum pagi *Peraul* vicinij Volcarum stagno, secundo à Montipelio miliarivbi, inquit, libenè memini *Alader* dicebatur. Hispanis iisdem nominibus, vt præcedens.

An Pen. & Lob. Phillyrea maior de qua antè. Lob. sanè in Obs. iconem Clusij ponit pro Phillyrea Narbonensis florida Adu. p. 420. Idem in icon. Plantini.

Marth. more sibi consueto iconem habet sub titulo, *Phillyrea*: descriptionem autem nullam. Vnde conicere licet, nunquam ei visam. Ait quidem *Phillyream* arborem longè diuersam à *Tilia*, in Italia provenire, asperis tantum montibus, quibus maximè gaudeat, fructum *Lentisco* similem, racematim coherentem, rubentem, granis, quæ vocant *Paradisi*, non ab similem. Oportebat demonstrare vbi talem fructum viderat, alioqui vix ei credendum censemus. In epit. ait esse *Mahaleb Arabum*: nihilominus pag. seq. ponit aliam plantam pro *Mahaleb mauritanorum*, nempe *Cerasum amarum*: docuisset saltem appetere quid intelligat per suam *Phyllyream*: quanquam icon ab eodem proposita non malè respondere videatur iconi hic ex Clus. appositæ.

Lob. & Penam scimus Marth. *Phyllyream* ad frequentem referre. Nos verò cunctabundi hæremus, nec quicquam affirmamus, quia nescimus, quantum Lobeliana sequens differat ad hæc. An Cæsalp. *Ilustrus* latiori breuioreque folio, ad *Illicem* valde accedente, de qua antè.

Gesl. in fine hist. Cordi. à Marth. pictam Serap. *Mahaleb* vocat. An eidem de hortis *Phillyrea* Bellon. in hortis *Lutetia* constra, quæ etiam Ve-

Descriptio

Folia.

Flores.

Locus

Alader.

Marth. res.  
proh.

Illicem.

netis in horto xaphai & locis, saxosis & montanis Italia, ubi ipse natus est translata.

Hist. Lugd. Confaricator l. 2. c. 14. Matth. Phylireæ iconem proposuisse tantum, non descriptisse tradit, quia descriptioni Diof. haud parum convenire videatur: non affirmare tamen legitimam esse, quod eius baccae subdiles non sint: quasi nulla alia nota requireretur, ut legitima sit Diof. Phylireæ. Item alibi. c. 67. Phylireæ Penæ maior: Clus. Alaternus maior Dalech. Item: Phylireæ Dalech. Phylireæ inquit Græcis dicta, arbor Dalechamio esse videtur, Illyrici gentibus, Comorich. Galli oppido S. Spiritus nuncupato, ad Rhodanum sito vicini, in quorum sepibus frequens hæc stirps gignitur Alarders vocant. Monspelienfes seplasia Phyliream, ut & Penæ, de qua Theoph. εὐωδία δὲ φιλύρα, ἢ ἡ λυκόντης ἀσπὴρ τὴν ἀσπὴρ. Quæ sic Gaza vertit: Obedientissima Phylireæ est, candorque ei celestri modo: rectius firmissima: sed legisse videtur λυκόντης siue λυκόν, vel quid simile.

Gaza re-  
preh.  
Phylireæ.

Eadem Hist. Lugd. sic describit: Phylireæ Ligustri est magnitudine, multum fruticosa, comâ perperuâ, caudicis cortice cinereo, rugoso: folijs Lentisco ferè similibus, amplioribus, longioribus, carnosius, obscure virentibus, gustu adstringentibus: fructu racematim congesto, antequam maturescat anguloso, cum maturuit rotundo, nigro. Is constat pulpâ tenerâ, succosâ, gustu principè dulci, mox amaro, cum acrimoniæ tantillo, ac dum manditur, suave quiddam olente, quod cum baccarum Juniperi odore comparari possit: Pulpæ subiectum est lignosum, sed valde tenerum ac fragile putamen, nucleum continens rotundum, gustu amarum. In Gramontio luco haud procul à Monspelio, ac in eius tractus saxosi glaricosique sepibus crescit.

Locus:  
Hist. Lugd.  
pro.

Ita vides Compilatorem Hist. Lugd. duobus distinctis locis de vna hac tradere, totidemque figuras proponere, cuius etiam videri possit Phylireæ Matth. Sed & hoc ipso posteriori loco duas icones vnius plantæ habet: Priorem sub titulo Phylireæ Penæ maioris, quæ florem exprimit: posteriorem sub Phylireæ 3. Dalech. quæ fructum. Sed & nihilominus Phyliream angustifoliam seu minorem Penæ habet, sine vlla descriptione.

Dod. error.

De comoricha Illyricorum vid. cap. seq. de spinâ Burgi.

Variorum.


Dod. in hist. lat. Cyprus latiore folio. Cur verò iconem Clus. Phylireæ ponat pro Cypro, nec eius tradat descriptionem, ne cōiectari quidem licet, nec etiam Cypro conuenit. Sunt nobis rami optime respondentes iconi Matth. sunt alij, qui iconi Clus. alij folijs rotundioribus & breuioribus. Nos portionem iuxta iconem Clusianam ex sicca appingendam curauimus: fructum & florem quoque particularem ex iconi Gesneri quæ apud Camer.

Phylireæ  
Theoph.

C. Bauh. apud Matth. Phylireæ Diof. [inquit] videtur à Theoph. Phylireæ dicta, quam Matth. proponit racemosam, ad imitationem textus Diof. Nisi racemos haberet Phyliream arborem Galloprovinciæ Adu. Lob. & Lugd. herbarij diceremus. Camer. vna figurâ tres differentias ostendit, alteram latis, alteram angustis folijs, & tertiam medio modo se habentibus, ut nihil obstat Diof. descriptioni folia latiora Phylireæ tribuentis. Has diuersas species & adhuc alias circa Monspelium obseruauimus, cuius nomine ad Matth. figuram adiecit adhuc mediam, quæ Phylireæ Narbon. Lob. & 3. Clus. Phylireæ media apud Matth. Natrum Cælip.

Idem C. Bauh. in Animadu. in hist. Lugd. sic inquit: Sequitur Phyliream Mahaleb Serap. p. 154. Hist. Lugd. & p. 158 Phyliream Penæ maiorem, & p. 158 Phyliream Dalech. idem esse, vniuersque plantæ tres diuersas figuras, trique diuersa nomina. Licet verò C. Bauh. Matth. Phyliream diuersam faciat à Phylireæ Lob. nos tamen non separabimus donec demonstrentur nobis longiusculi racemi, quales habet Matth. in aliquo Phylireæ genere. Nihil noui est Matthiolo aliquid attingere suis iconibus, ut Diof. descriptionibus magis accedant, ut pluries hoc opere declarabimus.

## PHILLYREÆ ARBOR LOBELIO.



Phylireæ inquit Pö. & Lob. in Adu. quo loco & Phylireæ & Phylireæ scribitur) arbor Galloprovinciæ, verior Machaleb Serapionis: expressam de eius arbore iconem prorsus referit prior maiorque dicta Phylireæ. Repertur in Galloprovinciâ propè Tholiam. Aquar scapo & spatibus stolonibus Prunum aut Cerasum, folio planè Phylireæ, aliquantum latiore: flos liliis mucosus, albidus & pluculis vnâ acruatis baccis Terebinthi maioribus, nigricantibus, herbidis, dulciculis: nucleoli intus crassi, quales prorsus prostant herbidis, dulciculis: nucleoli intus crassi, quales prorsus prostant hodie in Officinis nomine Machaleb. Et certè si Ligustrum Serapionis sit Machaleb, erit hæc illius Ligustrum, non illa quam Matth. dat nec describit. Hæc illi: qui tres icones proponunt: priores duas pro antè dictis Phylireis maiore & minore, quæ parum placent: tertiam autem pro Phylireæ arbore, quæ planè displicet, cui bacce appinguntur bipartitæ, quasi intus duo latarent ossicula. In margine iidem annotant, desiderari in iconem multò plures congestas maculas, à pictore omiffas. Illa quoque eorum verba nobis videntur valde ambigua, atque adeò ipsismet repugnantia, quando aiunt, prior maiorque dicta Phylireæ: ipsius tamen antè aliam tradiderunt descriptionem & iconem. pro ea quam maiorem vocant: nescimus igitur quantum differat hæc à Phylireæ nodò dicta, quæ latiusculo non serrato est folio. Scirpium studiosi hæc diligentius perpendant. Quid sibi per Ligustrum Serapionis velint haud percipimus. in nostro Serapione nihil de Ligustro. Eadem Adu. icon sub iisdem titulis proponitur in iconibus Plant. & edit. Teut.

Tabern. vel eius historię compilator Nic. Brau nihil docens, iconem ex Lobeliana, sed more suo mutatam, ponit pro Machalepo Serap. nulla addit ad descriptionem. Fortè de hac scripsit Cordus lib. 5. c. 23. hist.



sua, (si præcedentem non intellexit) his verbis: Philyrea videlicet ea, quam Diosc. descripsit, non illa quæ Lat. vocatur Tilia, arbor est mediocris magnitudinis, caudice satis crasso, quæ ubi ad iustam magnitudinem adoleuerit, vitæque manu nemo complectatur, cum ambitu quatuor non raro dodrantes impleat. Cortex illi lævis, nec ita scaber ut alijs plerisque arboribus, præsertim in ramis & surculis, colore cinericeus, & Ligustro similis, qui etiam materiam habet non dissimilem. Ramuli minores, & surculi cruciformi & alternante positi aduersi sibi in geniculis seu exortibus respondent. Folia sescunciam longa, vel paullo longiora, semunciam circiter læta, breuibuspediculis hærentia, utroque capite in angulum fastigiata, Oleæ folijs similia, obtusiora tamen & proportionè latiuscula, nec ita candida à tergo nec in lateribus retrosum reflexa, sed æqualiter læta, glabra, nitentia, & egregiè viridia, multà circa ramulos frequentia, & iniquem aduersa sibi in exortu, crassiuscula ut Buxi, hyeme non decidua. Vere autem subnascens alijs nouis decidunt. Quæ verò circa nouellos stolones sunt folia, alijs plerumque duplò longiora existunt, & leniter per ambitum serrata. Flores, quibus singula succedunt bacæ, similiter ut flores in racemos digestæ, rotundæ, paruis Iuniperi aut Lentisci baccis similes & æquales, principio virides, in maturitate purpureæ, rotundo intus nucleo, gustu cum aliqua dulcedine adstringentes. Folia item gustu adstringunt, cum amaritudine & acrimonia aliqua, quemad. & immaturæ bacæ, eodem modo, quo Ligustrum, oleaster & olea. Materia arbori lenta, alba & satis solida. Radicibus nititur multifidis, non rectà descendentibus, sed per obliquum deorsum actis. Nascitur in montibus, asperis locis, iuxta fossas in aggeribus, ac fossis in Hetruria agro Florentino. Non vbiq; in arbore excrescit, sed Ligustri modo, parua manet & fruticosa.

## PHILLYREA FOLIO ALATERNI



CL. D. Agrii Medici Argentiniensis, & egregii Botanici munere est nobis parvus arboræus ramus, datus titulo Alaterni collecti in hort. Veneto. Differt à Spina Bourgi, Monsp. colore corticis cinerei ferè. folia etiam non ita virent, bino ordine per caulem procedunt, vnciam longa & læta,

in ambitu pulchrè & ordinatè serrata, serraturæ denticellis veluti in aculeos desinentibus, ad folia à Clus. pro Alaterno 2. piéta accedentia, differunt tamen latiori basi quàm ramis adherent, eo modo, quo Clus. pingit in sua Philyrea primo, quam nos

Phillyream Illicis folio cognominat, autem, Dissidet à Philyreis excepti 2. Clus. cum, icon non male accederet, nisi folia essent paullo longiora latioraque & pediculis haberet longiusculos: descriptio alioqui non repugnat.

Non ausimus tamen ex fragmento palmari tantum, atramen fenis foliosum oppositè coniugatorum versibus stipato, pro certo asserere esse à Clus. Philyream, quoniam ipse sic describit: Philyream dictam folio Illicis magnitudine superat, multis ramis candicante cortice obiectis prædita: folijs Alaterni priori penè similibus, firmioribus tamen, & minus nigricantibus, saporis quidem aliquantum acris, sed in quo amaritudo sentitur. Neque istius florem conspexi: ipsum autem fructum racematim inter folia propendentem, magnitudine granorum Pipepis, aut fructus Myrti, rotundum, nigrum, calidi gustus, ossium & durum nucleum, candido & fragili nucleo obductum continentem. Decembris inique legibam.

Varis Lusitanie locis, in sepibus, sed nusquam copiosior, quàm circa Temar insignem pagum, unde plurimum fructum in Belgium detuli. Lusit. dicitur Adorna.

Est item nobis ramus Philyrea Monspelio delatus, cuius folia benè respondent iconi Clus. quæ hic exhibemus, verum quædam folia non sunt serrata, alia medio tenus tantum serrata, quædam per totum ferè ambitum: ramuli tenuiores quàm in præcedenti, foliorum color etiam magis virescens. An diuersa sit à præcedenti, an eadem cum Clusiana hac, diligentibus inquirèdum relinquimus.

## PHILLYREA FOLIO ILICIS.



Ea verò quæ folio est Illicis, Clus. testis, alius asserit quàm Illex origera, ramulis habet pollicaribus vel etiam amplioris crassitudinis, cortice viridi, sed garlicantibus maculis albescentibus: folia Illicis coccige-re, maiora, viridiora, crassiora, in ambitu nonnihil spinosa, adstringentis quidem gustus, sed non ingrati.

Huius flos eidem non conspectus, sed fructus, Locust. Lentiscino æqualis è foliorum alis dependens, maturitate niger, ossiculum continens.

Frequens est in Lusitanie incultis circa Eboram. Quibusdam vernaculo Hispanorum sermone Aleb. dicitur, illius semen Oxyacanthæ nomine ad Belgas missum.

Hist. Lugd. Philyream Clus. priorem vocat. An Lob. obl. Philyrea latifolia cristata. An Cordo Philyrina, quæ sub \* [sic ille habet, Quid?] à rea latif. Philyrina

Arbustula est fruticosa, Philyræ aspectu similis: siquidem ligno, ramulis, corticis colore, & cruciformi ramulorum surculorumque positu,

nihil ferè, quod aspectu dignosci queat, à Ligustro & Philyra differt. Caudiculis assurgit pluribus in rectiores virgas diuissis. Ramuli item qui in exortu sibi ex intervallo aduersantur, concinniori ordine in cruciforme positum digesti sunt. Folia habet Philyra similia crassitie, colore, nitore paulò tamen breuiora, latiora; in medio antrorsum fastigiata; posteriore verò parte orbiculata, per ambitum leniter serrata; duris, & ceu modicè aculeatis, & asperis incisurarum eminentibus angulis, hyeme non decidua, sed Philyra modo contra hyemis iniurias contumacia, gustu adstringentia cum amaritudine & aliqua acrimonia; quemadmodum Philyra, Ligustrum, & atque Oleaster. Radicibus hæret qualibus Philyra.

Locus  
Philyre arbor  
in genere.

Prouenit in Liguria, agro Florentino, montanis, asperis, saxosisque locis, & ad fossas in aggeribus ac sepibus agrorum. Omnes autem Philyreæ species (præter eam quæ folio est Alaterni, ante hanc descriptam) non modò in calcissimis hortis Illustrum virorum plurimorum quondam in Belgio conspexit. Et priora quidem à nobis descripta genera, de sententia Clus, alias species peperisse videntur: nam quædam breuiore & latiore folio, aliè longiore & angustiore, quædam etiam serrato aliquantulum folio natæ sunt, à matre nonnihil degenerantes, vt idem obseruauit. Nos in diuersis locis vidimus: Monspelii portis, in silua *Aigremont* dicta florentem Vere, & baccas mense Augusto ferentem. Ferratiæ in horto ducis, à la *montagna*, colle arte factò, eandè, hoc est, foliis latis. Allata etiam ex horro Patauino nomine *Alaterni* foliis serratis, quæ manifestè differt à *Spina Burgi*. Stugardia accepimus semen, quod missum fuerat per hortulanum ducis Florentini, titulo Philyreæ leptophyllæ, quod tamen Montbatun nò prouenit. Accersitam tamen angustifoliam monsipelio habemus, sed hieme reponitur.

Tempus.

Philyrea  
leptophylla.

Vires &  
virs.  
Oris *Sterea*

Cæterum Philyreæ folia, tradente Diosc. perinde ac Oleastri astringunt, ideoque ad ea profunt quæ astrictionem desiderant, maximèque ad oris vlcera commanducata, tum etiam si decocto ea colluantur. Quin & porum decoctum, vrinas mensesque ciet. Serap. vertit, decoctio granorum eius prouocat vrinam & menstrua, vt dicunt alij. Iamdudum annotatum, Plin. Philyreæ vires exhibuisse sub nomine Tilie. Paulus eadè quas Diosc. habet sub nomine *capas*. Apud Arabes sanè confusam, ne dicamus penitus dissona, habes Mahaleb virium traditionem. Nam apud Serap. ex sententia Aben Mesuai Mahaleb est calidum & remollit: confert dolori Illiorum: bibitur contra nausæas, & vna est ex medicinis quæ superfluitates excutunt ex corpore, ipsumque impingunt, eiecit lumbricos & ascarides, & confert podagræ. Adamaſca scribit, frangere lapidem. Melarugie eadem temperatam resoluentem vim tribuit, & tamen ex quorundam sententia dicit esse frigidum & siccum. Ex Albalari verò iudicio Almahaleb calidum est in secundo gradu, siccum in primo, frangit lapidè tam renem quam vesicæ. Desertur ab Andargè & Nahund; præfertur id, quod margaritis minoribus simile est, & odoratum. Arabari temperatum dicit & resoluens, prouocare menstrua, sedare dolores. Ex Rhafi, calidum est, emollit membra indurata, & morbos inueteratos sanat à percussione obortos. Vfus est tam corticis eius quam grani, estque calidum in secundo gradu, siccum in primo: medulla eius immiscetur vnguentis. Cortex inter adstringentia refertur. Nuclei Ma-

Temperam.  
Alaca.  
Nausea.  
Inimbrici.


Calculus.  
Dilectus.  
Dolor.

haleb autore Auic. abstergunt & extenuant, resoluunt, dolores sedant, ideoque dorso & lumbis dolentibus vtiliter illinuntur. Bibiti ex qua multa, reuocant syncope comprehensos. Dantur similiter in doloribus Colicis & Nephriticis: Lumbricos necant; vrinam prouocant. Sic Arabes. Apud Neotericos nihil specialius de harum viribus obseruatam hæcenus reperimus.

## SPINA BOVRGI ET ALATERNVS.

### CAP. XXI

Spina Bourgi Monspelienſium.



Alaternus z. Clus.



Hicet istam arbusculam frequentem parium, cui facies & habitus superioris Philyreæ, sed llicis adulescentis folia, rigida, rotundiora, latiore quam olea ambitu, tantillum denticulis asperso: muscosis, numerosis, racemosis Lentiscoli flosculis subter folia aggestis: Bacculae sunt Lauri Tini didymæ, bino veluti gigaro v. uæ conflatae. Surtulis ramisque magnitudo t& habitudo etiam llicis. Gustu amaricant folia & tantillum astringant. Idem Obs. & icon. & Teur. Alaternus Plin. Clusio & An-

SPINAM  
Bourgi vo-  
cant Monspe-  
lii arbusculam  
magnitudine  
circiter Ligu-  
stri, cortice re-  
ctam nigro,  
ac ferè Ce-  
rasorum simi-  
li, materie ex  
lureo pallida,  
folia oblonga,  
subrotunda, nuc  
magna, firma,  
in ambitu sine  
ordine, nonni-  
hil spinosa, flo-  
res parui, simul  
multi, cuius  
coloris, nec  
nunc succurrit,  
nec ex sicca  
pronuntiare  
nobis integrè  
videntur tam-  
men fuisse al-  
bidi. Baccæ  
paruæ, nigrae,  
rotundæ, nu-  
merosæ, race-  
mum emulan-  
tur, in quibus  
semina tria, ita  
vt exiccata  
baccæ tricoce  
videantur.  
De hac Pen.  
& Lob. in Ada.  
vulgo Monsp.  
Bourgepine  
perpetuè vi-  
rens: an Aphar-  
ca Theophrast.  
Frontignanæ  
Linguagotiz



& Anguil. Spina certina quorundam. Lob. præterea locis citatis iconem ex Clus. ponit, cui cilius. Secunda Alaternus humilis lato folio Clusii. At nos dissentimus à Pena & Lob. in descriptione *Spina Bourgi*, qui baculas didymas dicunt. Nos non didymas obferuimus, sed femina terna in singulis bacculis.

Alaterni Clusii si non sunt iidem cum nostra spina, sanè valdequàm sunt similes, & congeneres nostro iudicio, ne tamen fallantur fortè Studiosi, totam earum historiam subiciamus, quæ sic habet. Alaterni fruticis perpetuò virentis duo genera: vnum arborefcens interdum, longis ramis, non admodum crassius, neque in multis alas diuisis, flexilibus deinde virgulis, quæ externo cortice candido, virefcence integuntur, latente sub eò membrana quadam flauescite quæ lignum ambit. Ramos vestiunt in còcondito ordine disposita folia, medià inter Oleæ atque Ilicis folia magnitudine, crassiuscula, leuiter per ambitum serrata, ex viridi nigricantia, gustu ingrata, & cum amari tudine paululum mordicantia. Ad singulorum foliorum, qui in ramulis nascuntur, exortus, flores oleæ similes, coloris ex herbido pallentes, racemati ex oblongis pedicellis dependent, vere, interdum etiam media hieme. Nullum in hoc fructum vidi. Alterum multò humilius est, ramis breuioribus, cortice qui eos ambit, ex albo viridi, & purpurascence, coloribus simul permixtis infecto. Folia illi superiore minora, magis circinata rotunditatis, in ambitu etiam serrata. Ex foliorum alis flores è logiusculis pediculis dependens, vt in superiore, illis tamen maiores, & coloris magis herbacei; quibus succedit fructus racemati coherens. Lenticini magnitudine, initio viridis, deinde nonnihil rubescens, qui tribus nucleis constare videtur. Pleniorem & nigri coloris maturitate fieri arbitror: nam immaturò fructu colligebam Aprili, & floribus onulsum febr. & Martii initio. Primum genus Vlysioponensi agro, locis quæ vicinis in Luthania obseruabam. Alterum etiam iisdem locis. Præterea in ilis Baricæ, tum Granatensi regno & Valentino.

Plin. l. 16. c. 26. Alaterni meminit, cui folia inter Ilicem & Oleam tribuit. Hæc ad eò causa fuit cur huic fructui *Alaterni* nomen dederim, non *Celastris*, quem Theoph. etiam inter perpetuò virentes recenset, & tardè fructum maturare ait. Nec refert quod Plin. Alaternum neget fructum ferre: Etenim in Arbore non valde sibi nota hallucinari potuit, quemadmodum in cæteris, quas eodem loco commemorat. Fructum, inquit, arborum sola nullum ferunt, hoc est, ne semè quidem, Tamarix scopis tantum nascens, Populus, Alnus, Vlnus Attinia, Alaternus, cui folia inter Ilicem & Oleam. Nemo enim rei herbariæ adeò ignarus est, qui Alnus ex semine, quod in globulis adulescentes ferunt, nati non sciat, cum & ipsis rusticis id sit notum. Tamarix sanè ex semine non semel nata, Populus, Salices feminibus pappo fa lanugine inuolutis prouenire, Vlnos item Attinias ex samaris ferunt enim semem sed minis quam latifolia, plerumque vsum.

An Alaternus Gesnero frutex qui Tiguri nascitur, rarissimus alibi, juxta Huuili, Sil. ripari, Persici arboris sapore foliorum ferè, fructu & semine nullo, quod is obseruauerit, quæ fruticem Persicum appellare licebit, donec aliud nomen reperitur, nam Alaternum esse nondum affirmauerit, quod folia latiuscula videatur. Sed quomodo hunc fruticem Persicum appeller non video, quum Persica Malus traxerit.

ferat, arborque sit.

Cæterum Alaternum eandem cum Theoph. Philyca esse, Bellon. l. 1. obs. c. 42. censet. Nemo est in monte Atho, inquit, cui arbor Plinio Alaternus dicta, veteri legitimo nomine, quo ipse Theoph. illam donauit, Philycæ, ignota sit: Corcyrenses vero & Cretenses *ἐλατριν* appellant, quia eius folium inter Ilicem, & Oleam medium est, teste Plinio.

Theoph. quidem varijs locis in sua plantarum historia *ἡ ἐλατριν* & *ἡ ἐλατριν* meminit, sed formam non describit: vtramque tantum maturè germinare, & serò fructum ferre, Philycæ honorem in ascendo pecore, semper enim fronde abundare, maxime flexibilem esse, candoreque Celastris.

Porro Lusitanis prior Alaternus, eodem Clus. tradente, *Cassia* appellatur, quibusdam *silguero* & *sanguento*: Callis Bellonio teste, *Dalader*, & *sanguin blanc*: Lucenibus *lêr*. Angul. Alaternum vocari tradit vulgari appellatione *Alaternus* & *Luterna*.

Quoad nos, non possumus dicere Philycam Bellon. esse Clusij Alaternum, quia Bellon. l. 1. obs. c. 17. dicit Philycam arborem glandiferam magnam, quam cap. 55. scribit nos non habere. Nondum reperimus apud Bellonium vbi Alaternus dicatur *Dalader* & *sanguin blanc*. Philycæ suæ, siue Alaterni Bellonii nomen Gallicum attribuerè nò potest, siue in Italia non proueniat, siue in vniuersum in istis Europæjs tractibus eo careamus. Ista diligentius perquirenda. Quæ de Philyca Bellon. scripsit, recensēbimus libro de Glandiferis.

Antè verò l. 4. scripsimus quosdam existimare Laurum Tinam Plinij eandem esse cum Philycâ Theoph.

Non omittendum Macrobio Alaternum *Sanguine infestum* dici. Infelices autem arbores Plin. teste, existimantur, damnataque religione, quæ neque feruntur unquam neque fructum ferunt. Vocantur & infelices, ad quam capitis damnatus suspensio necaretur, obrecto; vel ob quæ capite, quod constat ex illo prisco diro catmine.

*Caput obnubito, arbori infelici suspendito, sed in viam redeamus: tibi enim, antiquitatis studio illectum nonnihil deuiare.*

Quæ Angul. scribit de Alaterno, non malè conuenire videntur nostræ Bourgi spinæ: scribit autem, In territorio di Lanzano ad S. Vitum hanc plantam *Alaternam* dictam, & in Apulia *Luternam*: in Sclauoniæ [Illyriæ] insula dicta Vergada, *Comoricham*. Excrescere in arboris speciem, folio inter oleam & Ilicem medio, sed atro uirente. Baculas quasdam ferre paruas Lenticinis similes nullius usus, quod sibi constet.

Hist. Lugd. l. 2. c. 54. non hanc arborem intelligit, sed præcedentem. Phillyream. Dalech. hanc curauit depingendam, & Apharcam vocabat. Hinc Hist. Lugd. l. 2. c. 15. de hac tradit: Herbarii quidam Apharcam Theoph. esse putant, alii Lycium, alii Phillyream Græcorum. Monipel. Pharmacopœi *Bourgespine*, id est, Spinam Burgundicam vocant. Frutex hic in arborem etiam crescit, magnitudine Mali Punice, radice crassa, caudice ex cinereo albicante, aspectu tristi, folijs imà parte angustis, supernâ latiusculis, Portulacæ modis, obrulis aliquando, interdum in acutum fastigium terminatis, per ambitum infectis, incisurem eminentiis rigidiusculis, carnosiss, Ilicis, aut Oleæ modo, venosis, elatâ costâ per medium diuisa.

Synonyma.  
ling. 3.  
Dalader.  
Nero.  
Alaterna.  
Philyca gl.  
dist. RaRoll.  
Cinj. nos.

Alaternus  
sanguine  
infestus  
infelices ar  
bores que.

Comoricha.

Apharca  
Ticapi  
Lycium  
Phillyrea  
Græcorum  
Spinæ Bu  
gundi.

sis flore albo: baccis cædematim coherentibus: cum maturuerunt nigriti guttato subdulcibus. Arbor ista perpetua fronde viret, ea dote Laurum, licet, & cæteras sua comâ semper ornatas promouans.

De eadem nempe Spina Bourg dicta, & Cæsalp. prodidit in hunc modum: Philyrea mas Theoph. vulgo in agro Phimbihensi vocant *legno Puzze*, & *Pinne*, quasi lignum pitridum: copiosa ibi nascitur. Arbutula est, Lauro suffilis, folijs breuioribus, leuiter serratis, similiter perpetuis, leuibus, lentis: flosculos fert racematim circa ramulos herbaceos: baccas paruas, tenuissimas, offi-  
Philyrea mas Theoph. Cæsalp. lignum pitridum.

culis, rotundas, cortice interno pallido: mæriti-  
Theoph. Cæsalp. lignum pitridum.

rata, leuissima: medulla ruffa: putant quidam Philyream Diosc. sed magis placet vt Philyra mas dictam apud Theoph. seu Tilia mas, vt Plin. vocat nâ & multa steriles in suis reperiuntur, vt in Alaterno. *Halten* Cæsalp. In nostra Spina Bourg ferè lignum non obseruauimus, nec alij, quod adhuc legerimus. Monspelientes obseruent, & considerent an differat à Ligno putrido Cæsalpini, quod nullo modo pro Philyra siue Tilia mare recipere possumus quicquid scribat ille, habere conditiones. Nemo, hercle, nobis persuadebit Theoph. arbutulatam Lauro similem fecisse mare tantæ arboris, quanta est Tilia femina, cum qua nulla similitudo. Ecquæ enim possit esse inflexibilitas & durities in tenui cortice arbutulæ? Materies dura, qualis à Theoph. requiritur in mare, nobis multum differre videtur à rara & leuissima, qualis in ligno putrido, teste ipsomet Cæsalpino. Prouenit *Aphar-*  
Locus

ea, Hist. Lugd. tradente, in asperis & saxosis oræ maritimæ locis, non procul à Monspelienis vrbe, qua *vicum* iur, pagum Apiano vino percelebrem. Nos *Bourg spinam* Monspelienibus dictam in silua *Egremunt* abundè proueniẽtem obseruauimus. Floret mense Martio. Baccæ à Septembri in Aprilẽm & Maium, per hiemem in arbore sua hæret. Trecis quoque Gallo-Campaniæ celebri vrbe in hortu cuiusdâ Canonici cultam vidimus. Faretur ingenuè Clus. vtriusque sui Alaterni nullum se vltum nouisse. Sed Lulianos asseruisse eius cortice in aqua decocto piscatores sua retia subrutilo colore inficere: & tinctores è fragmentorum ligni, quod paller decoctione, nigrescentem è coerulesco colore concitare. Ex gustu, ad præscriptum Galeni, vbi occasio & necessitas requirat, industrius medicus & ad vltus medicos transferre rationis auspicijs possit.

## SAMBUCVS VULGARIS.

## CAP. XXIII.

Descriptio.

Non magnum descriptionis apparatus desiderat vulgatissimæ notitiæ Sambucus, nisi diligentis Historiographi esset, etiam peregrinis, & quibus ea non vulgata, morem gerere. Ea in arboreâ proceritate excreuit, caudice plurimâ parte lignoso, in quo exiguum admodum medullæ, tamen satis fragili, hincque facili, quâvis Cæsalp. quâdoque tamen ramis suis fruticosa permanet, cortice scabro, rimoso, cinereo colore sordescens. Rami tamen & bacculi, præsertim iuniores geniculis ex longiusculo intervallo articulati, materie pauca constantes, medulla plurima alba eaq̃ue leuissima facti, quorum cortex læuis, dilute cinereus, & quasi argenteus, sed nuper exeuntium viridans. Cinereo subest alius lignum immediate inue-

niens, medianus offic. dictus, torus herbidas ac virens, nervosis tan. en suis fibris neutiquam carens, quorum etiam materies caudici duritie multum



cedit, magisque exalbida. Ramos patulo obitu folia vestiunt, ternâ aut quina, interdum septena raro octona (gustu amaro & nescio quid propriæ nauseosæ habere, odore graui, viroso, sed contusorij gratiore) ad costam vnam annexa, oblonga, acuta, serrata, aristatula. Flores in patula umbella non ingrati odoris, albi, è foliolis  
Fol.

quinque totidem staminibus ad luteum vergentibus umbilicoque compositi, exiguo petiolo innixi & horum rursus grandifloro, donec tandem omnes in vnum communem ac insignem coeant. Baccæ initio virentes, per maturitatem atropurpureæ, succum concolorem reddunt, grana continentes exigua, plana, oblonga, communiter ternâ. Inextremitatibus ramulculorum & ad pedicellos horum solent sæpè nasci veluti pediculi nigri, de quibus alio loco. Multos stolonem emittit à radice.

Est & alia Sambucus iam descripta quoad frondem, flores, ac materiem similis, nisi, quod odorem attinet, ad Ebulum quodammodo accedere videretur. At insignis differentia nota est, quod acinos ferat albos. Tragus ex candido luteos dicit, ac in cæteris vulgari similem: nec multis visam putat.

Ad apud Theoph. descripta clarè Sambucus exprimit: atque vtinam omnes essent tales eius reliquorumque Veterum descriptiones, non tor difficultatibus implicari hæsitassent sæpe doctissimi Herbariorum. Sed in eius versione minus placet Gæza, qui quædam etiam omittit. Genina eius historia hæc est. Nascitur & sambucus [ad] maxime circa aquas, & vmbrosis locis: at tamen & in alijs quoque prouenit. Fruticosa est, virgis anniculis visque ad foliorum desinium in longitudinem excrelescentibus, postea verò in crassitudinem. Virgarum altitudo non admodum magna, sed senum ad summum cubitorum. Caudicum vetustiorum crassitudo quæ trabis in nauium protra super catinam positæ. [non meminit Gæza] Cortex læuis, tenuis, aridus. [non meminit Gæza] Male autem rufum verit Hist. Lugd. Materies fungosa, qua exiccata, læuis, medullam mollem habens, vt virgæ totæ concauentur, ex qua & baculos faciunt leuitate præcipuos. Vbi siccata est, valida fit, nec sentit vetustatem, etiam si maderat aquis, & cortice nudata sit. Amittit autem illum sua sponte, cum arefcit. Radices per terræ summam spargit, nec multas, nec magnas. Folium singulare seu particulare exit molle, oblongum, sicut Lauri latifolia, verum maius & latius, & circa media parteque inferiore rotundius, nam suprema parte in acutum contrahitur, in ambitu  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza  
Gæza



incurfus habet. [*χαλαροὶ, non ut pariter* vlt. Vulg. habet.] Totum vero crif vnum pediculum cralfum ac neruofum, ceu ramulum pendens, foliorum alijs hinc, alijs inde geniculatim coniugis, rimque adherentibus, atque fpatio quodā à fele diftantibus, vno ex pediculi falfigio exeunte. Obiter refufcult folia, molliaque funt atque carnofa. Defluit autem totum fimul. Quapropter merito quis totum illud vnum folium dixerit. Rami quoque nouelli quædam ad cuculorum fpæciem habent. Flos candidus, ex multis minutis candidis confans, fpæcie fua pediculi diuifus infidet. Validus huic odor, qualis Lirij, ac nonnihil grauius. Fructum non lecus pediculo crallo racematum hærentem profert, qui maturæ fpeciei nigrefcit. Immaturus opaquefcit [*μακρόδενος* : colorem intellige, alioqui acerbum rectius dicās] magnitudine Erui, paullo maior. Sequentia, quia depurata & penitus obfcura, omittit Gaza.

Miserrinum atque infelix lignum quibusdam  
dicta est *Sambucus*.

Eandem metri causa *Sabucum* dixisse putamus  
Q. Serenum, cum ait:

Conueniet tenera radix decocta Sabuci. Et alibi:  
Vngitur, & succis dederit quos parua Sabucus.

Quamvis & alia subfit plausibilior ratio, ut  
mox tradetur.

Apud Diosc. sambucus [*samb.*] gemina describitur: prius genus [nempe hoc de quo nunc agimus] in arbore affurgit, [*Sambucus racemosa*] furculos spargens arundinaceos, teretes, quadrantes cauos, candidantes, praelongos: folia terna, quatenus aue ex interuallis circa virgas singulas exeunt, nucis lugaldis foliorum similitudine, graucolentia, magisque incisa: in summis autem furculis ac ramis umbellæ sunt cinctatæ rotunditatis, in quibus flores candidi: tandemque fructus Terebinthi similis, ex nigro purpurascens racemosus, succosus, vinosusque. Alterum genus Chamæactes, de quo postea.

Ruell. *σπορίαις* furculos cauos vertens vocis  
ym non expressit, non enim omnino caui *δῆ* sunt,  
sed fungosa medulla facti. In vet. cod. *δῆ* *βα-*  
*ρύσσεια* τε *χ* *τῶν* *σπορίων*, legitur βαρύσσεια δὲ *χ* *σπο-*  
*ρίων*, vt inciluris amaritudo substituitur. Ac utra-  
que ferri posse videtur. Quamvis vix credamus  
Sambuci folia luglandinis amiora esse. Expe-  
riantur. Studiosi. Orib. legit *μακρότερα*, sed rectius  
Dal. *μικρότερα*. Sunt enim minora illis, non maiora,  
saltem magna ex parte.

Apud Gal. Acte magna & arboſa ab interprete dicitur. Apud Paulum Ἀκτὴ μεγάλη. Dicitur & Ἀκτὴς alicubi apud Theoph. & ἁλὶς à Dioſc. ſed annotat Conſt. in Lex. quamvis neutrum hactenus apud eofdem legerimus. Anonymo in fine Moſchionis μεροῦνδρα dicitur, quæ vox apud Nic. Myreſſ. ligni ſcobem denotat. Poſſis nouè leuili-gam vocitare: quamvis neutra vox arridat.

Sambucus verò à *Sambria* musico instrumento,  
quod alii pectida, vel magadin vocant, dicta. Vnde  
quidam Sabacum non Sambucum pronuntia-  
re maluerunt, vt Serenus, vti dicebamur, nisi carmi-  
nis ratione morus id fecerit. Alij ab Autore  
denominatam inlaut, cui nomen *Sambix*. Viam  
tamen eæ primum omnium Sibyllam perhibent.  
Alij *Pendyos* dixerunt, alij *Iuxen* vocant, Videtur autem  
*Aetæa* siue *dxyty* dicta, quasi littoralis, quod litto-  
rum, crepidinunque fer amans. Barbare fane Scra-  
pio de hac tradit, cum ait: Kameaticz & Iapheticz  
duæ sunt species, quarum vna dicitur Græcè A-  
ctis, & Lat. Sabuca: (voluit aut debuit dicere  
Sambucus) Secunda vocatur Græcis Kameaticis,

id est, terrena vel infima Actis: Latine Abolus  
[Ebulum intellige] estque arbor Ebuli. Cætera  
quæ apud Serap. sunt ex Diosc. & Galeno.

Hermol.& eius simia Ruell.annotant nonnul-  
los dixisse Sabucum [sic enim Q. Sereni autori-  
tate] scribunt] medullâ carere. Sed quid illi fu-  
erint non addunt. Oportet tanè eos vel aliam ab  
hac nostra intellexisse, vel ne hanc quidem nouis-  
se, vel denique quid medulla sit plantarum nesci-  
uisse.

De Plinii ossæ Sambuco dictum antè.

Marcell. apud Diosc. ab aliis reiecta retinet nomina, cum in sua versione scribit, Acten sunt qui *Yrsi arborem*, quidam fatiunt, Acten dicunt: Gal- *Sativa d-*  
*ite,*  
 lifebien: Daci *seba*: Romani *Sambucum*.

Idem annotat, primum & in templis religio-  
neque maximam Sambuco & Ebuli honorem feci-  
ſſe (ſanguine utriuſque baccas: quibus ante in-  
uentum minium & excoctatam coloris eius rationem ſuperſtitioſe deos, colentes homines non  
antè ad aras & ſacrificium accedebant, quàm ru-  
bente nativo aliquo colore, qualis in Sambuco,  
Ebulo, Anchufa & Moris eſt, facies tuas coloraſ-  
ſent: quaſi placere ſibi ſine coloris eius lenocinio  
numen non poſſet: aut ſe feminatum modo nollet  
deus niſi purpuriflo fucatus videri. Fuſſeque hinc  
Gentibus morem antiquitatis maximus auctor  
teſtis Verrius quondam fuit: cuius auctoritati  
credere neceſſe eſt dicentis, Iouis ſimulachri fa-  
ciem diebus feſtis minio illinere ſolitos, & à Cen-  
foribus in primis miniandum Ioſem locari inſti-  
tutum fuiſſe. Verùm non fuit hic Romanus vſus,  
niſi aucta vrbis maiestate, & cum iam incepiſſet  
minium in pretio & honore haberi. Rudi autem  
adhuc ſeculo, & in mundi nouitate natiuis herba-  
rum & pomorum coloribus ad eadẽ religionem  
vſi ſunt. Idque in Buccolis ſuis Maro rerum om-  
nium & antiquitatis peritiſſimus indicauit, canẽs  
ad lamentandos Galli amores veniſſe Pana Arca-  
dia deũ, quem videret ipſe ſanguineis Ebuli  
baccis minioque rubentem. Quod ex quotidiano  
deorum imaginum in templis ſpectaculo fictum  
ab eo eſt, Coeperunt deinde poſt inuentum mi-  
nium negligere homines, quod paratum vbique  
erat: tranſilataque ad rursus diſciplinam & neceſ-  
ſitates Sambucus & Ebulus ſunt. In Sambuco ex-  
cauata, aureum munus Apollini Delphico Gub-  
ernatũ obſcult, quò muncere Romani imperij bu-  
rnatationem promeruit. *Hec obiter.* Fructus racem-  
atim vnicò pediculo dependens *Aſcion* vocatur. *Aſcion fru-*  
*ctus.* Corticem quidam *Canopon* vocant. Alii eius flo-  
rem ita cognominant; vt Paulus. Gallis dicitur  
nunc *Sin*, aliquibus *ſuin*, quod Dioſcor. Sobin à no-  
ſtris dicit vocari, notante Ruellio, qui inepre-  
ſu nomine ſcribit & repetit quæ à Plin. male vel  
dicta vel intellectas; de qua re antea.

Amat. apud Auic. l. 2. can. c. 619. Per Sambucum *Sambac.*  
ait se non intelligere Sambucum commune, vel *lucimus.*  
Ebulum, sed *Sambac*, hoc est, Jasminum, vel *Viola*  
quas Kerri, Arabes Violas vocant.

Lonicera arbor æſe, Scobien, ſeba ſunt exotica. Guilielmo Saliceto Beza dicitur, reſte Dod. Sambucus vmbellifera Anguil. Sambucus arbo-  
reſcens Ryff. Sambucus campeſtris ſive vulga-  
ris, Camer. Germ. *Holder* & *holinder*,  
quod excauari facile queat, cum habeat medul-  
lam fungoſam: Alijs *Albern*. Ital. *sambuco*.  
Geliſen, ſ. ſean; Seb. Belg. *Vlierboom* & *Vlier*.  
Hiſp. *ſebugo*, *ſabuco*. Caſtil. *sauco*: Catal. *ſauch*.  
Portug. *sambigero* & *Sabugueiro*: quibudaſ &  
Cæſar. reſte Had. Iun. Gallobelgijs ſuyſ &  
Cæſar. Angl. *Elderree*, vel *Bouſtree*. Pol.

*Vrsi arbor.*  
*Saturni d-*  
*ite,*

Sambucus  
apud priscos  
hopos, &  
Ebuli.

*Action fru-  
ctus,*

*Ruell. nor*

Sambac.  
 Infimus.  
 Reira.  
 Viola.  
 Beza.

Bez. Hung. bozza fa. In post. com. Ital. Mith. cum magnis figuris figura Sambuci transposita ponitur sub titulo sambuci montani; mirum idem fieri in com. Lat. cum magnis fig. & in hist. Germ. non sine erroris suspitione.

Lob. pro sambuco alba nonam & diuersam, attamen non necessariam habet, cum facie tenus eadem sit cum nigra, & utramque vnâ commodè exprimat.

**Differentia.** Dicamus quaedam de differentijs. Nigram, hoc est, vulgatam, & Albam diximus. Vtramque obseruauimus nobiscum Dod. Pen. & Lob. item Traugot. Camer. annotat quibusdam in locis viridibus baccis inueniri. Hieron. Argent. in sua Apodixi Sambuci tres species dicit: *Sambucum, Ebulum, & Sambucum rubrum*. Et addit quosdam scribere de sambuco agresti omnino inegnoto. Verum sambucum esse altum fruticem: Ebulum verò herbam: vnde verius.

*Sambucus stellaris, sed Ebulum est bene satis.*

**Locus.** Nos præter iam dictas, hoc est, nigram & albam obseruauimus, *Sambucum herbaceum*, quam Ebulum vulgò dicunt: *Sambucum racemosum acinis rubris: Sambucum aquaticum: & Sambucum roseum*: quibus si addas viridem Camer. septem habebis differentias Sambuci titulo insignitas. Sed *Vulgatissima* historiam persequamur.

Sambucum aquarum esse accolam iam supra ex Theoph. dictum, qui eandem alibi minus durare ait, quòd aquis propinqua nascatur. Nascitur tamen & alibi eodem autore. Non temerè tamen in montibus visæ sambuci, teste Plinio. In Germania sanè inter arbores omnes, vt & Traugotus annotat, vix aliam quamcunque repetias vulgariorum, & quæ adeò sine nullo negotio & plerumque humectis & tenebrosis locis, iuxta muros, sepes alijsque incultis nascatur, atque Sambucus. Creberrima Basileæ & in toto tractu Allatico. In Italia & Gallia rarior, præsertim regionibus calidioribus, amat enim pinguiam. Monspelij tantum etiam obseruauimus. Mature germinat, cum tamen frigora patiatur.

**Tempus.** Ordine naturæ siluestrium, inquit Plin. primæ florent Sambucus, cui medulla plurima, & cui nulla, Cornus mascula, Vibanarum Malus post, vt simul videri possint Pirus, & Cerasus, & Prunus. At apud nos longè præcedit Cornus & Laureola flore deciduo, multò post Malus, Pirus, & Cerasus, & Prunus; potissimum siluestris: Sambucus verò Maio floret, interdum adhuc Iunio, atque adeò paulò ante vites florere solet, ex frigidiore pluuia aut pruina faciliè defluunt flores, non sequentibus baccis sinistro apud vulgum omine, ne idem vitibus eueniat. Gemmas & folia tempestiue admodum protrudit, vt Martio & Aprilis initio. Genevæ etiam Febr. principio folia exerentem obseruauimus. Appropinquante autumno, maturitate nigrescunt acini.

**Satis.** Ex semine sesamacedo frutices noui progigni queunt, si seratur, teste Trago.

**Cultus.** In horis si colatur, diu viuit, & in arborem satis crassam & proceram euadit: Eam quæ bacculas fert albas primùm vidimus Argentinæ cultam in orto instructissimo D. Frid. Meier, magistri armauentarij primarij, amici nostri singularis, ex qua semina legimus, & in Il. B. C. hortum Montb. semimus. Multò tamen ante vnicam & eam quidem spontaneam obseruauit Cherlerus Genevæ in vinearum sepius Basileæ ex traportam Cinereum ad dextram flectendo.

**Vires.** Hippocratis aucto in medicina celebris fuit *Sambucus*, quo auctore, acini poti, acerbissimi

menfurâ, vinam mouent. Coxendicibus, multorum vulnè morbis, vel earum locellis, plurimum inedentur, etiam semen eius. Manducati verò ac poti, aquas per alium educunt: folia idem præstant. Hinc idem in doloribus capitis oculorum & aurium à bile ortis folia comedenda, vel succum forbendum, præcipit, ad soluendam alium deturbandamque bilem. Quidam ex oleo & sale comedunt.

Dioscor. eandem tam sambuco quam Ebulum vires assignat, nimirum, inquit, exiccant & aquas alio derrahunt: at stomachum offendunt. Folia olerum modo cocta, pituitam bilemque purgant. Sed & caules teneri in patinis cocti, eadem præstant. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuvat. Prodest & contra viperarum morsus eodem modo pota. Decocta verò ex aqua ad infesum, vulum emollit, easque spiracula patefacit, ac ipsius denique vitia emendat. Acini in vino poti eundem præbent effectum. Denigrant & capillos iuuant. At folia recentia molliaque illa ex polenta, inflammationes mitigant: ambustis & canum moribus illitu profuse. Vlcera verò sinuosa glutinant, & his qui podagra remanent, cum seuo taurino aut hircino illita profunt. *Hæc Diosc.* Apud quem dubia lectio in voce *ἐμπαιον* pro, *ἐμπαιον* quâ alias legitur, quam vocem & Marcellus legisse videtur. Sic vertit: siccant, adstringunt, refrigerantque. At Actuarius. Sambucum & Ebulum, omnia siccandi vi, refrigerandi facultatem habere tradit, quod & Plin. confirmat, vt mox dicitur: immò & ipse adeò Diosc. qui & inflammationibus & ambustis adhibet. Quamquam doctissimi Sarrazeni iudicio neque Sambucus neque Ebulum per se refrigerare videantur, nisi fortè ex accidenti, dum bilem educunt: calefacere verò utramque certum est, inquit, licet in primo gradu duntaxat: id quod satis innuit Gal. simpl. Nos quoque Sambucum existimamus minus nocuum ventriculo, quam Ebulum. Folia etiam non ita foetè, bacceque non tantam euacuandi vim habent, vt Ebuli. Infecio est inspissatus & baccis, quo Germani crebro utuntur ad mouendos sudores, & pueris etiam præbent cum pane, quo & quidam non infelicitè vsuntur in iis qui ad hydropem procliuus fuerunt, Germani vocant *Goldermus*. Coquuntur bacce ex aqua, & cribro transmittuntur, denique coquantur ad saporem consistentiam, apud Helueticos vltatissimè ad vsus prædictos.

De sambuci viribus eadem Plinius quæ Diosc. habet. dixerat verò alibi: frigidissima, quæcumque aquatica: lentissima autem, & idè scuris faciendis aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, cluditque suum vulnus, & ob id contumaciùs transmittunt ferrum, in quo sunt genere Sambucus, Populus utraque. Sed non assensimus hac in parte Plinio omnia aquatica, hoc est, sectis aquas aut in ijs nascencia, frigidissima esse: nam nec Sambucum nec Populum, frigiditas existimamus, tantò minus frigidissimas, licet aquaticæ plantæ existimetur. Nec sufficit ratio à loci natura desumpta, inspicendus potius sapor, odor, & ipsi effectus: fortè Plin. intelligit tantum de ligno, & non de cæteris partibus. Galenus sanè ad amaritudinem & modicam eius astringentem respiciens, & huic & Ebulum siccantem vim tribuit, glutinantemque, & moderatè discorionem.

Galenum quoque sequuntur Fuchsi & Amatus, qui sic in his Dioscoridi Sambucus & Ebulum refrigerant, sicuti & Actuarius: nobis verò confiderato sapore, odore, ac operationibus, inuenimus potius





*Reponenda  
modus.*  
*Hg drops.*  
exhibitum. Recens collectum in aceto id mace-  
rari expeit, ac deinde reficari, commodè facis  
vini aridæ per pondus, & non nihil feminis Anisi;  
sic etenim citra omnem molestiam potentiam  
suam exercet, & hydropicis subuenit. Continuis  
autem aliquot diebus exhibendum, cum modi-  
to vini, quibus placet.

*Mira Sic  
femini  
Sambuci.*  
*Hg drops.*  
Bouius mirabilem, inquit, comperio virtutem  
& efficaciam in semine Sambuci & Ebuli: soleo  
dare de his duas aut tres drach. optimè tritas,  
mixtas cum Zuccaro rosato, aut diantho, aut  
Diamarindo, aut simili aliquo medicamento æ-  
gro grato, debeatulis do drach. Ol. horum sem.  
extracti per express. cum vino odorato aut insu-  
culo. Mira eius efficacia in phlegmaticis natu-  
râ, aut per accidens, & in hydropicis: colligi-  
guntur bacca maturæ priusquam flavescant; Aut  
siccentur. Detrahis pediculis, imponuntur in  
aquam multam, confringuntur, postea incli-  
nato vase, effunditur aqua, ac noua affundi-  
ditur: & iterum effunditur, id toties fit donec se-  
mina munda remaneant, quæ deinde sicantur  
& reponuntur. Semen primi anni mouet  
vomitum, secundi minùs, tertii adhuc minùs,  
sed per inferiora purgant multam pituitam &  
ferum. Genus est baccis Sambuci & Ebuli li-  
quorem aq. vitæ similem destillari posse cre-  
dit.

*Medulla  
Sis.*  
Nouellorum ramulorum medulla qualitatis  
expers est: hæc reficcata, atque nonnihil com-  
pressa aut concertata, ad fistularum angustiora ora  
dilatanda, i. posita, conducit.

*Hg drops.*  
*Scabies.*  
Scribit Camer. succum acinorum admixtum  
iufculo gallinæ, in quo multum radices Petrose-  
lini decoxeris, & expressum, plurimum conferre  
Hydropicis. Cortex medius scabie vexatis vit-  
liræ administratur. Flores odorati, inquit  
Schuuenckf. caseis inferuntur. Saccharo etiam ad  
hepatis affectus conferuntur. Rob ex succo  
baccarum per se vel cum saccharo parato plebe-  
cula vitur in alui fluxibus biliosis & Dysenteria.

*Diarrhoea.  
Dysenteria.  
Purgans.  
Extractum  
granorum  
maturorum  
Sambuci.*  
Nuclei abstergant ac per alium & vomitum pur-  
gant vehementer. *Russicorum medicina.* Ex granis,  
vt docet Quercetanus in Pharmac. Dog. nat. Sam-  
buci fit extracti genus, siue sapa quaedam hydro-  
pici congrua & salutaris, Chymici vocat Extractu  
granorum, actes, cuius preparatio sequentibus  
verbis continetur. Collige magnam copiam gra-  
norum Sambuci optimè ad umbram exsiccatu-  
rum cæterisque omnibus abiectis sola grana ac-  
cipe, quibus ad mediam partem imple marta-  
cium magnum cum longo collo, superaffunden-  
do fortissimum spiritum vini, acidulum redditum  
cum liquore acido vel vitrioli, vel, Sulphuris, vt  
materiam tres quatuorve digitos supernaret. Va-  
se clauso vt nihil expiret, fiat digestio in B.M. per  
5. aut 6. dies, donec spiritus vini in colorem rubi-  
ni tinctus apparuerit, quem separabis per in-  
clinationem, cauendo, ne quid ex fecibus aut  
turbulenta materia simul transseat. De qua tinctu-  
ra iam, non etiâ separato prius menstruo, hoc est,  
aqua vitæ, quæ sine corruptione aut alteratio-  
ne ulla diutissime adseruabitur, & cui, si voles ad-  
des parum sacchari gravioris gultus causa. Exhi-  
bemus semicochlear argenteum, aut cochlear  
plenum, mulieribus, quæ ex vteri præfocatione  
miseris modis excruciantur, & subitò effectus  
sequitur exoptatissimus. Ex improviso enim  
& quasi miraculose expurgent, pristinaque  
valetudinis integritati restituentur, estque *S. æ-  
cificum histericum.* Rursus si velis, separa inde  
aquam vitæ per Alembic in balneo vapo-

*Dose.  
Vteri suffo-  
catio.*  
rofo, donec in fundo remaneat extractum ru-  
bicundissimum de quo exhibebis scrup. ii. pro do-  
si: idque dissolues in sua propria aqua destilla-  
ta, aut in quibusdam aliis conuenientibus, aut  
vino albo quod inde rubescere incipiet. Huc  
usque Quercetanus, cuius verba de verbo aduer-  
bum recitare nobis visum est, vt habeant Chy-  
miatri sub hoc exemplo veluti tractatum in-  
tegrum parandi extracta, eadem enim ratio  
est reliquorum. Ebuli sc. baccarum Iunipe-  
ri &c. sicque elicere poteris ex hoc nostro The-  
sauro totam artem Chymicam, nec non phar-  
maceuticam, vbi dabitur occasio. Sunt qui  
& Oleum parent ex infusione florum, vel iis in  
oleo decoctis. Folia contusa scabiei & digitorum  
Paronychiis imposita breui sanare tradit Lonic.  
Folia & baccas ex aqua falsa decocta, tollere tu-  
mores pedum. Corticis vsum potissimum se-  
nibus vtilem esse ad absumendas humiditates  
superfluas. Odorem capiti molestum esse  
& ex facili sanguinis fluxum narium ciere, po-  
tissimum ab homine calidi temperamenti o-  
doratum. Constat & nobis Sambuci tam fo-  
liorum quàm florum odorem aliquibus mole-  
stum esse, & caput tentare. Superfluum verò  
illud eiusdem putamus, quando ait: si Sam-  
buci furculus capiti equi inponatur, non nociu-  
rum etsi si bibat in æstu. Quæ enim huius rei ra-  
tio esse queat, & quis adeo confidat ei, vt con-  
trarium euentum non mereat?

Triplicis aquæ modum & vsum habes; ex coctice  
viridi: ex foliis, ex floribus. Primæ vsum ter itatus  
in die ad vnciam vnam & semis, nepe mane circa  
meridiem & vespere, apprimè ptodest hydro-  
pici. Trium vnciarum dosi pota à ieiuno, po-  
tenter sed sine noxa alium cit: & itidem hydro-  
picos leuat. Extrinsecus admoda calores euo-  
cat. Secunda æstuantibus tibiis ac pedibus &  
corruptis fracturis multa & iterata lotionè spon-  
taneaque exiccatione benefacit. Tertia maræ  
& vespere ad vnciam vnam & semis hausta, re-  
molliat pectus, & in eo infarctus, tumores  
hydropicos & oedematosos exhaurit, hepatis  
obstructiones referat Lienis ac renum, & tertia-  
nam abigit, fluxus Melancholicos emendat, &  
stomachum confortat. Trium vnciarum pon-  
dere sumpta egregiè & absque molestia purgat,  
& alleviat corpus. Oculis infusa, ardores ex-  
tinguit. Manus tremulas sepius iterata lotio-  
ne firmat. Vetera & frigida vlcera sanat, si lin-  
teo in ea madefacto sepius foueantur. Placet  
Cæsalpino flosculos panibus inspergi cum oleo:  
Sambucum multas virgas ferre à radice diceba-  
mus: idè ad hortorum septa à nonnullis quæri-  
tur, quamvis non magnam firmitatem habeant.  
Ex virgis parantur cominoda candelarum emun-  
ctoria & retinacula foliorum librorum apertori.  
Curtius pollicetur aquâ macerationis [malimus  
decoctionis] cauliculorum asperfa, necari pul-  
ices: foliorum decocto abigi muscas. Inuenit  
& inter pastores gratiam calamus Sambuci-  
nus, ex eo canoras buccinas, tubasque con-  
ficientes, utilioresque in eo vfu existimantes, vt  
iam prius obiter attigimus. Denique quouis  
anni tempore nihil aptius inuenias ex quo  
ciliis tubulos vel canaliculos con-  
ficias ad quosvis vsum,  
quàm ex virgis  
Sambucinis.

\*\*\*\*\*  
\*



## SAMBUCI FVNGVS.

**A**dnascuntur ut annotat Tragus interdum Sambuci veteris præsertim radicibus fungi quidam incani, quos gummi quoddam vocat Dodon. & fruticum caudicibus quoque adnasci ait, molle, nigricans, tenue membranofumque, hominis auriculam quodammodo subinde referens, quod ablatum resiccaturque contrahitur ac durescit.

Huiusmodi & nos aliquando è stipite nascentem obseruauimus, sed fungi potius membranae speciei, quam gummi, & colore nec albi nec nigri, & obsoleti, hoc est, ex utroque quodammodo mixti.

Pena, & Lobel. excrementum corticosum vocant coriaceumve, & annosis arboribus apud Boreales præsertim accrescere tradunt, multis dotibus cognitu dignissimum, plebique Anglæ & Germanæ *Iudæ aures* vocatum, propter effigiem auris, quam cartilagineo plexu multis plicis & mæandris æmularur: sed colore pullo, prædurum, aquis in eum mollescens, spongæque ritu tumens, gustu penè insipido, cutis elixæ aut corii.

Fungus Sambuci, & Auricula Iudæ ad imam Sambuci caudicis sedem oriens. Germ. *Holunder Schwemlin*: *Kraßn holder schwam*. Acini rubri in aqua florum Sambuci aut rosacea prius macerati, deinde impositi maxime conducunt ad arduos & subitis capitis dolores & quascunque inflammationes, teste Trago. Adstringendi ac resiccandi vim obtinet, ut vult Dodon. dilutum eius in quo paucis horis maceratum fuerit collutione ac gargarisatione oris tonsillarumque incipientes inflammationes sedat, & collumellam laxiorem reprimat: quin &, si Pen. & Lobel. credimus, Anginis certissimo experimento utilissimum, & tumoribus intus forisque nunquam satis laudatum. Lonic. aquam ex eo destillare suadet, aut ipsos etiam in aq. ros. maceratos inflammationibus oculorum efficaciter remedio infundere, & imponere. Annotat Camer. præcipue notæ medicum quandam eosdem puluerisatos aduersus hydropem propinasse.

## SAMBVCVS LACINIATA.



**S**ambuci elegantissima speciem foliis admodum fissis, & multum laciniosis, vidimus in cultissimo horto Robini Botanici Regii, Lutetiæ à quo & semina accepimus pro horto illust. E. Witeb. Flores alioqui & bacca iam descriptæ vulgari, quæ baccis nigrescit, similissima.

Eandem & Dod. & Lob. obseruauerunt. Hic speciatim in hortis Belgii. Taber. Germ. *Holder muss* an *ge schmetten* blettern

## EBVLVS SIVE SAMBUCUS

HERBACEA.

CAP. XXIV.

**E**A Ebulo Descriptio.

**E**magnitudo ut inter herbaceum genus & frutices ambigere quis dicat, verius tamen de tribu herbacea, adeo tan. en Sambuci amula, ut illius nomen pumila adiectione apud Græcos, sub voce *χαυαν-7η*, promeruerit: siquidem non ut illa in arborem grandescat, raro hominis pro-

ceritatem æquans, plurimum infra subsistens, & magna ex parte selquicubito non altior: caule herbaceo, striato, Sambuci ritu medullosio, hibernis mensibus contabescente: ad quam accedunt & folia, ordinatius disposita, è tribus quatuorue coniugationibus ad rachin annexis, imparique extremo folio composita, odore grauiore: quorum singularia Sambucinis longiora, acutiora: partes tamen umbellæ albae flosculorum quinquepartitorum, odoratorum, & nescio quid nucleorum Perficorum magnatis spirantium, sed esu vix ferendorum, ferrugineis apicibus, quos stamina sustinent candida: quibus fathiscibus acini succedunt per maturitatem nigri, & thorulis multis angulosi ante maturitatem, & penè trianguli, post verò magis rotundantur, succo suo, minus rutila quadam purpurâ inficientes, semina continentes terna, altera parte gibba, altera angulosa. Radix longa, digitalis crassitudinis, non lignosa, latè sparsa.

Hæc Diosc. *ἡ δὲ δὴν ἡ δὴν ἡ δὴν* dicta, humilis est ac longè Sambuco breuior, & ad genus herbaceum [ *ἡ δὴν ἡ δὴν ἡ δὴν* ] propius accedens, caule quadrangulo, crebris distincto geniculis: foliis per interualla circa singula genicula utrinque expansis, iisque Amygdalinis, at in ambitu serratis, longioribusque & graui odore. In cacumine verò umbellæ, flore ac fructu Sambuci. Radice nititur longa, crassitudine digitatili.

Plinio Sambuci alterum genus, magis siluestre, quod Græci *Χαμαίη*, alii *Helion* vocant, multò breuius. Et alibi *Actæ*, quam quidam esse Ebulo putant. Rursus alibi: *Actæa* graui odore, caulibus asperis, [angulosis ver. quædam exēpl. legūt Anisi,] teste Hermol. geniculatis, semine nigro, ut Ederæ, baccis molliori luis Virg. quoque meminit in Gallo.

*Fau Deus Areadra veni, quem vidimus ipsi*

*Sanguineis Ebuli baccis minoque rubentem.*

Cuius rei originem & Veterum consuetudinem diximus antè. Baccas quoque floresve Ebuli aut Sambuci videtur intellexisse Plaut. cum dixit in *Capitulis*: Laridum atque Ebulum foveri foveculis feruentibus: nisi quis herbulas in eo versu lectitare malit: aut quod propius est verò, copulas.

Hermol. hanc aut valdè similem putat esse quam Plin. *Actæam* vocauit: nos eandem censemus

*Sambucus  
pumila.  
Mecon A-  
phrodes.*

*Apul. nos.*

*Sambuci 2.  
genus silu.  
Thamniates.  
Sambucea.  
Hieblum.*

*Plin. nos.*

*Plin. defid.  
contra Sur-  
sum.*

*Heliosacta  
silu. Euboica  
Sambucus.  
Chamae-  
dite.  
Altea.  
Kameactis.  
Heliosacta.  
Agria albe*

*Locus.*

*Viros &  
vius.*

*Stomachp  
nocet.  
Purgat.  
Ambusta.  
Capillorum  
rimatura.*

quamvis Leoniceus diuersam opinionem tueri, videatur. Idem Hermol. Sambucum pumilam vocat.

Chamaecten, inquit Apuleius, alij Chamacten, alij Mecon Aphrodes, alij Agria Acten, alij Eubicea, Galli Durone, Daci Olma, Itali Ebulum vocant: ramis rotundis, (nobis striati & angulosi obleruati) digitalibus, terræ prostratis (surrecti sunt, quamvis humiles, & paruli) succo plenis, folijs lenticulatis, fructu siue semine rotundo, radice tenui. Vt videas Apuleium hoc loco manifestè duas diuersas plantas, & nomine & descriptione cõfusas miscuisse: vnde insignem rei herbariæ ignorantiam cernas Apulei, tam differentes, & vix quicquam commune habentes herbas, Ebulum inquam & Chamaecten confundentis; hinc factum vt à viribus quas ille recenser, transcribendis nobis temperauerimus, ne forte posteritati cum ipso imposeremus, qui ipsemet nesciuit, quid scriberet, vt taceamus vanitatis plenum illud remedium (si Dijs placet) quod ad colubri morsum ex Ebulo præscribit.

Serapio nihil habet de Ebulo præter ea quæ à Diosc. tradita, & nomina præced. cap. allegata.

Platina in opusculo suo de honesta voluptate, sambuci alterum genus magis siluestre dicit, addiditque alijs Thamiatem, alijs Ebulum vocari.

Ruell. Acteam quasi Sambucam interpreta-  
tur, & Gallis Hieblum dicitur: Meation, Brun-  
chueig.

Iniquè fecit Curtius Ebulum à Plin. & alijs qui  
balsam Sambuci 2. genus statui, seque scribit  
inter frutices, quod herba sit, ne numeraturum  
quidem. Age verò sit herba: at idè non negabit,  
opinor, Curtius, & specie, & viribus sambuco  
simillimam, vt nihil in eo peccatum sit, si vel  
Sambucum 2. cum Plin. vel humilem cum Diosc.  
vel Sambucum herbaceam, nostro titulo vocite-  
mus.

Heliosacta silu. aut Euboica Sambucus, Tra-  
go; qui & sambucum æstiualem dici posse tradit:  
Summer holder aut Heilender. Chamaecte  
(quædam silu.) Galeno: & Paulo: Kameactis A-  
rab. Durone & Olma Barbaris, teste Lonice. Ebu-  
lus, & Ebulum Lat.  
Dod. Pumila humilis silu sambucus Diosc. Pen.  
& Lob. Germ. Attich: Kurner feldholder: Vider-  
er holder. Belg. Wilde Olier / baddick: Gal.  
Sieble: petit Sambucus, Valeriol. It. Ebulu. Hisp.  
Hiezguos, vel vt Castil. Tezgos, Sabuco pequenno:  
Portug. Engos: Angl. Waltrunt / & Bloetunt /  
& Dauvunt: Boh. Ebeidii. Vngar. fodi bozza.

Nascitur in opacis aquisque locis, atque etiã  
asperis, si Plin. credimus. Lato gaudere solo Co-  
lum. restatur hoc carmine:

Atque habilis natura soli, qua gramine lato  
Parrurit & rutilas creat Baccas.

Sic passim Germaniæ, Heluetiæ, Galliæ, ac Ita-  
liæ, potiss. Lombardiæ videas nasci vdis, incul-  
tis & palustribus locis, sæpissimè ad aruorum mar-  
gines, florentem. Iunio & Iulio, baccas Augusto &  
Sept. maturantem.

Quas Diosc. Ebulo vires assignat, cap. præced.  
diximus, qui easdem ei cum sambuco tribuit. Plin.  
quoque vtriusque iunctim tradit, quando sic scri-  
bit: Sambucus habet alterum genus magis silue-  
stre, quod Græci Chamaecten, alij Helion vocant,  
multo breuius. Vtriusque decoctum in vino ve-  
teri foliorum, vel seminis, vel radices, ad cyathos  
binos potum, stomacho inutile est, alio detra-  
hens aquam. Refrigerat etiam inflammationem,  
maximè recentis ambusti: & canis morsum cum

polenta mollissimis foliorum illitis. Succus cere-  
bri collectiones, priuatimque membranae, quæ  
circa cerebrum est, lenit infusus. Acini eius in-  
firmiores, quàm reliqua, tingunt capillum. Poti  
acetabuli mensura, vrinam mouent. Foliorum  
mollissima ex oleo & sale eduntur, ad pituitam  
bilenque detrahendam. Ad omnia efficacior quæ  
minor. Radicis eius in vino decoctæ duo cyathi  
poti, hydropicos exinaniunt, & vulvas emollit, &  
folijs insidentium decoctæ. [al. & foliorum deco-  
ctæ insidentium] Caudes teneri minoris Sambuci,  
in patinis cocti, aluum soluunt. Relinunt folia &  
serpentina ictibus in vino pota. Podagricis cum  
seuo hircino vehementer profunt cauliculi illiti,  
lidenque in aqua macerantur, vt eâ sparsa pul-  
ices necentur. Foliorum decocto si locus sparga-  
tur, muscæ necantur. Cortex interior tritus, ex vi-  
no albo potus, aluum soluit. Idem alibi: Ebuli  
quoque quem nemo ignorat, fumo fugantur, ser-  
pentes. Ebulum tenerum cum folijs tritum, ex  
vino potum calculos pellit, impositum testes san-  
nat. Inter ea quæ hydropicos sanant, habetur  
Ebuli recentis radix, excussa tantum, nec coacta,  
quantum duo digiti comprehendant, ex vini ve-  
teris calidi hemina. Et mox: A hæc quam quidam  
esse Ebulum putant, radice contrita in vini cy-  
athis tribus, si febris absit: vel semine ex vino ni-  
gro. Præcipue tamen Chamaectes succus aptissi-  
mus creditur. Et rursus: Ebuli folia contrita, & è  
vetere vino imposita, etiam boam sanant, id est  
rubentes papulas. Datur & Actæa acetabulo pleno  
interioribus seminarum morbis. Si verum est E-  
bulum refrigerare, vt vult Plinius, non consilium  
est applicare morsui canis, vt Diosc. facit, qui sem-  
per suspectus esse debet, non enim est tutum frigi-  
ditate occludere vulnus, & repellere ad inte-  
riora.

Scribit Platina florem Ebuli in cibarijs sum-  
ptum, hepaticis, splenicis, cardiacis atque hy-  
dropicis prodesse. Nos nolumus cum Platina in  
cibarijs dare flores ob ingratitudinem.

Gal. huic, vt & Sambuco potentiam tunc defic-  
candi tunc conglutinandi, modicèque digerendi  
tribuit.

Ebuli semen vt prodidit Matth. per diutinas a-  
que lotiones à nigro circumstante succo expur-  
gatum, datur vtiliter drachmæ pondere ex Cha-  
mæpyrios decocto, podagricis, ischiadicis, &  
Gallica Lue laborantibus: mulcet enim deiecto-  
ria vi mirificè eorū dolores, cum humores ed de-  
fluentes tum reuocet tum deiciat. Sunt qui Ebu-  
lo albugines ictusque oculorum sanent hoc mo-  
do. Ebulum contundito, eiusque succum penna  
in oculum instillato, per triduum, & persanabitur.  
Sunt etiam qui ex Ebuli radicibus succum e-  
liciant, insolentque subinde, & in pastillos di-  
gant, seruenteque ad vsus. Hic clistere infusus  
tam intestinorum, quàm coxendicum dolores tol-  
lit à frigiditate & flatu genitos. Supponitur con-  
uenienter seminarum locis ad euacuandos men-  
ses, præsertim si lana exceptus intromittatur. Suffi-  
untur Ebuli decocto commodè ii, qui diuturna  
tussi vexati ad malum deueniant habitum, si ta-  
men ventriculus & iecur interea roboretur odo-  
ratis adstringentibus, & ad id conferentibus me-  
dicamentis. Stillaritia cum Ebuli tum Sambuci  
radicum aqua hydropicis timpanite laborantes mi-  
rificè iuuat, si huius quaternas vncias, illius vero  
duas binas vtriusque simul mistis hauriant affecti,  
diebus triginta continuis. Illitus Ebuli radicum  
succus procidentem sedem reprimat, & angustia  
tollit, vbi circa gulam calidum cum lincolis il-  
lina-



linatur.

Temperamentum, inquit Dodon. Ebulus habet calidum ac siccum, utrumque ordine tertio, & facultatem non modò, quam ei Gal. tribuit, digerendi exiguum; sed & purgandi per alium eviniam & validam habet: efficacissimæ radices sunt: folia digerendi ac discutiendi potentia præstant. Educunt autem radices non modò pituitam, verum & aquosos potissimum humores: vitles iccirco ad hydropicorum purgationes, vti dictum, sed tamen correctæ, & vbi vires suffecerint. Purgant enim cum molestia: Ventriculum subvertunt: interioraque viscera omnia perturbant. Malè omnibus vltus earum succedit, quibus hepar obduruit: vt quando ex regio morbo Ascites successit. Scimus cuidam nobili fœminæ, arthritidi obnoxia, & quæ non facile medicamenta assuimebat, sæpius de ventriculo conquærenti, cum in purgatione semen Ebuli additum fuisset, excelsæ magnos dolores ventriculi & molestum vomitum. Quamobrem nec temerè, nec nisi valdè robustis ex Ebuli radicibus medicamentum aut potionem dandam censet Dod. Acinos verò ait, & semina multò clementius ac minori cum molestia purgare, præsertim prius aceto infusa, ac deinde semine Anisi vel alijs aromaticis vnâ permixtis. Radix in vino decoquitur, si causa morbi frigida, & febris abest: aliàs pro affectus natura temperanda potio est. Folijs tumores oedematosi discutiuntur, cataplasmatibus vel fomentis additis.

Lacuna longè maiores vires tribuit Ebulo, quàm sambuco, traditque magnam habere proprietatem ad mitigandos iuncturarum dolores, & resoluendos membrorum tumores, potissimum à frigiditate obortos: eius radices decoctum ad tres quatuorve vncias, calideque potum omnis generis obstruções reserare, quamvis noceat ventriculo. Paululum spicæ Nardi addendum suadet. Folia & radices coquit in forti lixiuo aut aceto, addito sale, & cum eiusmodi decoctione calida fouendum iubet ventrem hydropicorum totum & pedes spongiis: non esse præstantius remedium in eo casu. Imponit postea & folia. Parat & vnguentum hoc modo. Vncias duas succi radicis, toridemque succi foliorum & cum sex vncijs olei Chamæmelini decoquit ad succorum consumptionem, tandem & ceræ vnciam semis addit & aliquid aceti rosacei ad maiorem penetrationem. Vnguenti huius efficacissimam pollicetur vim ad resoluendas omnes humorum superfluitates in doloribus podagricis cuiuscunque membri, siue à frigida siue à calida causa obortis.

Oleum etiam paratur ex Ebulo, quod apprime conueniens est in quouis articulorum dolore mulcendo, si eo articulorum regiones, iuncturaeque illinantur. Oleum quidem præparat Bouius ex semine Ebuli per torcular, mirabilis, vt affirmat effectus: consuevit dare agris drachm. cum medio cochleari iusculi. Vt verò paret oleum diligenter, terit semen, aspergit pauco vino albo, dein terculari subijcit. Ex li. i. feminis Ebuli, extrahitur Ol. vncia.

Vt porro, quod equidem Fernelius testatur, Sambubi & Ebuli confusa folia & apposita ambustæ parti persanant, sic & Oleum, sale tamen addito. Ebulus, inquit idem, meth. meden. calidus ac siccus ordine secundo, hydropicorum aquas facillè per alium deducit, nonnunquam & vomitione rejicit. Est autem ventriculo aliquantum gravis, succi vis efficacior purgat vncie vnius

pondere. Elicientur autem vel è radice, vel è mediano cortice stipitis contuso, affusa aqua hordei vel vuarum passerarum, cum Cinnamomi, vel nucis Moschate momento & cum Saccharo. Cocturâ vis eius purgandi perit & exoluitur, neque, vt Dioscorides scribit, eam persistere vlti compertum est; Fructum nonnulli condiunt duplo sacchari & Cinnamomi parte octaua, exhibentque vnciam vnam: acinorum verò drachm. vna tula, idem ex mulla aut vino albo præstat. Sambucus eodem temperamento iisdemque pollet viribus, sed Ebulo aliquantò infirmior. Inter ea quæ aquas ducunt ebulus imbecillis & prægnantibus, sed ne temerè quidem decerni potest.

Lonic. quoque non esse aliud efficacius & præsentius remedium scribit ad hydropem, quàm Ebuli radix, si ex ea bibatur. Eandem & in tussi frigida celebrat. Folia ex aqua cocta, & ea pota tussim siccam sanare promittit, & conferte angina. Item ad vuulam, addito in eius decocto Pyrethro. Succum Ebuli cum puluere Tithymalli radicis, addito saccharo, quotidianis febribus commodum medicamentum prædicat: Eius tamen vltum minus tutum & non nisi magnâ cautellâ administrandum censemus. Folia podagricis doloribus imposita, eos mitigare ait. Aqua distillationis foliorum ad vncias duas aut circiter, aluum mouet. Eodem modo manè & vespèri pota hydropicos tumores exhaurit, quotidianam febrem abigit, & laterum dolores mitigat. Prodest & extrinsecus linteaminibus in ea madefactis imposita. Cento experientumum Wirtenbergicus inter alia habet, Ebuli radicis in vino coctæ succo sæpius abluto capite, crispari capillos. Io. de Monte Experimentum est, si capta nutria tur Ebulo per diem & noctem, lacte eius ventriculorum repurgatum sit. Camer. annotat mures fagore Ebulum. In Vicentinis, & Taruinis refert Scal. oltim vina ex Ebulo heri consueisse coloratiora: alioqui plebecule nimis venalia.

SAMBUCVS RACEMOSA, ACINIS  
RUBRIS.

CAP. XXV.



Quæcumque vulgari Sambuco multa habeat communia, sic vt floribus aut baccis viduas, in re Botanica non versatosacillè imponere posset, folijs tamè est paulò nimis fastidis: at in floribus & baccis clarissimè discriminem. Flores enim nullam vmbellam faciunt, vt in vulgata, sed in racemum ob-

longum digesti, stellati, colore ex albido in luteolum inlingente. Baccæ consimili modo racemati & frequentes succrescunt ex rubenubus pediculis

ipſæ quoque per maturitatem coccineæ, inlucun-  
di planè ſaporis, è quibus nouæ plantulæ ſi ſeran-  
tur, proſpiciuntur, teſte Trago. Matthiolo verò  
perpetuò rubefcentes, vinolæ ac ſucci plenæ. Lo-  
belio odoratæ, puniceæ, non inſuaues per Augu-  
ſtum eſſi.

Hanc eandem Curtium intellexiſſe cenſemus,  
quam deſcribit arborem generis fruticoſi, fru-  
ctum racematim producentem, colore per mätu-  
ritatem rubeo, non, vt in noſtra, nigro. Sambuci  
genus minus, floribus & baccis in racemo conſti-  
tutis, Cordo Sambucus ſilu. & Ceruina, Trago.  
An Hieron. Brunſchuiſci. in apödix. Germ. apud  
Brunſ. Sambucus rubens, & ſilu. & agreſtis docto-  
rum quorundam? Sambuci 2. genus montanum &  
ſild. Matth. apud quem in poſt. comm. Ital. cum  
magnis iconibus cap. 175. figura huius tranſpolita  
ponitur titulo Sambuci, qui idem error quoq; cõ-  
miſſus in Hiſt. Germ. vbi vocatur Sambucus mon-  
tana. Tertia Sambuci ſpecies Alpina, ceterà  
Sambuco ſimilis, baccis rubris, Turnero. Sambu-  
cus montana vel rubra, Gefn. Sambucus cum ra-  
cemo Anguil. Sambucus montana racemboſa Pen.  
& Lob. qui in edit. Teut. duas icones proponit.  
Sambucus 4. ſilu. & Sambucus Ceruina. Dod.

Lonic. eius iconem ſub titulo Aceris ponit,  
Germ. Zborn: & eandem rursus ſub nomine Sam-  
buci Ceruini, quod vtrique eius ignorantia tribu-  
endum cum ſimiles errores paſſim in ſuo Herba-  
rio committat, quippe qui in ſtudio Botanico, tan-  
quam Venator Heluctius in ſilua Bohemica ver-  
ſatus fuerit.

Plin. quoque montanum ſambuci genus vide-  
tur cognouiſſe, cum in montibus etiam naſci tra-  
dat. An Cæſal. Sambuci 2. genus in montibus, vm-  
bellis paruis, baccis rubentibus? Sambucum ſilu.  
ſiue montanum Dalech. eam ſuſpicatur, quam  
Theoph. ſignificat L. 3. c. 14. quamuis Pygos in  
verſione Gaza omiſſa ſit. Sambucus *ἐπὶ δρυὶν* *αὐτὸν*  
aut *πορφυροειδὴς* Thaliø; qui annontat, in Harcy-  
nia Saxothuringica eius folia ignaris vetulas pro  
Ebuli folijs obtrudere, ac diſtendere, atque aded  
vulgo *Ärth* vocari. *Ärth* *baum* Germ. Sd ataz  
ſter. Bergholder/ Wilder holder, Waldholder,  
Eiſchholder/ Bergholunder.

Annotat Camer. in Palatinatu verſus montes  
Bohemicos inueniri interdum cum baccis albis.

Matth. teſte in montioſis & algentibus locis  
naſcitur. Prouenit maximè in opacis vliginoſil-  
que ſiluis, ſerarum luſtris inuijs, in Harcyia Sa-  
xothuringica circa Stolbergam & Honſtenium,  
Thal. in Coraſſiana propè Symphorianopolim  
agri Lugdunèſis ditionis. In Latorijs ab vrbe  
Norimberga ad mille paſſus ſitis copioſe crefcere  
teſtatur Camer. & in Italia monte Veronenſi  
Baldo, Anguil. Paſſim in opacis Comitatus  
Montbel. & Burgund. ſiluis & montibus obſer-  
uauimus, poſſiſſimum etiam in montibus Lotha-  
ringicis, in monte Roſſbero circa Maſſinünſter,  
vbi mēſe octobri cum pulchris acinis coccineis,  
decidentibus folijs videas, quas & Auguſto ma-  
turas legimus in Lotharingia, & Iunio circa Ge-  
nevam in monte *ſalene*, & in Rhætia pluribus.  
Veronæ quidam in hortis colunt. Florit mēſe  
Aprilii.

Stipites aliquot ex vicinis locis, in hortum  
E. C. Montbelg. plantandos curauimus. Trædit  
& Curtius ſe in hortum ſuum (Lugdun.) in or-  
dinem cæterarum decuſatarum arborum redegiſ-  
ſe, verum diu non duraffe, quòd loca amara opa-  
ca, & manus aſpernaret.

Experimento didicit Tragus Ceruum Sambucū

ſilueſtrem, ſicut & ſolanum (ſhiaticum) magno  
deſiderio inquirere. Solent binæ hæ ſtirpes ple-  
rumque eodem ſitus occupare: folia vtriuſque,  
non bæccas decerpit. Vnde intelligi poſſe, fru-  
ctus hoſce frigidioreſ eſſe qualitatibus ac feris, ne-  
dum alijs iumentis & hominibus minùs ſalutares  
obſeruauit idem. Ceruum ſolan ſolijs haurit  
plantarum veſci, non autem Ceruam, niſi ea  
prægnans fuerit, & ceruum in vtero geſtauerit.  
Ideo ſambucum ſilu. frigida natura eſſe iudicat,  
ita quidem, ut pro Mandragora, in illa deſit,  
uſurpari queat. Sic & Lonic. Sambucus ſilu. in-  
quit, ſimilem naturam habet cum vulgari Sola-  
no: frigida eſt, poſſit. bæccæ. Somnum concil-  
liat. Multus uſus nocuus eſt. Matth. ſcribit vi-  
res vrbano ſambuco imbecilliores habere: ipſe  
ſibi ipſi & prædictis autoribus contrarius: nam  
in hiſt. ſua Germ. eiſdem naturæ cum vulgari  
Solano dicit. Camer. quoque teſtatur, frigidas  
eſſe bæccas, ſoporofos reddere edentes, multum-  
que earum eſum eſſe nocuum: Lob. quoque  
ſubſcribit, & veterum quoque inducere teſta-  
tur, præſertim bæccarum eſum. Scribit tamen  
Schuenckfeld. à nonnullis ſuccum bæccarum cum  
melle ad intinctus coqui. Nos ſic paratas non  
parum mellis calore caligare cenſemus. Tutius  
tamen abſtinere.

## SAMBVCVS AQUATICA.

## CAP. XXVI.



A Quaru  
Annotat  
hæc ſambuci  
ſpecies inde-  
que cognomi-  
nata, arbutula  
eſt quinq; aut  
ſex cubitorum  
altitudine, cau-  
dice craſſita-  
dine ſua ma-  
num cõplen-  
te, ligno tene-  
re, candido,  
fragili, fungo-  
ſa intus me-  
dullâ, polito  
cortice cine-  
reo obtecto,  
geniculatis ra-  
mis gemellis,  
ordine vtri-  
usque

que vno brachiato: ex quorum geniculis folia  
exeunt lata, anguloſa, rugoſa, Aceris minoris fo-  
liorum æmula, vel Sorbi Terminalis. Flores non-  
nihil odorati, in umbella candidi, tam lati aliqû-  
do, vt pollicis vnguem æquent, quinquepartiti  
[Trago verò quadripartiti] ſed circa vmbilicum  
continui, maximè verò ij qui extimi in ambitu  
ſunt, expanduntur, medijs intra vmbellam exi-  
guis conſiſtis, ſeriuſque ſe expandentibus, fla-  
ſcentibus. Acini rubri ſeu ſanguinei, magnitu-  
dine bæccarum Spini albi, ſemen continent plan-  
num, latum, rubrum, cordis eſſigie. Caſalpino  
nuclei duo, ſimiles ſemini Atriplicis, compreſſi.  
Hæ bæccæ, autore Trago, ingrati planè ſunt ſa-  
poris, ita vt deguſtanti nauſeam & ſaſtidia conti-  
nua pariant: Matthiolo, vinoſo & amaro ſucco  
reſectæ: Caſalpino ſiccæ, vniſ paſſis ſimiles, cum

Sambuci  
genus mi-  
nus.  
Matthiol.

Alpina.  
Montana.

Pygos  
Theoph.

Varietas  
nunc baccis  
albis.

Locus.

Satio.

Cultum af-  
pernatur.

Vires &  
vſus.

..



dulcedine austeræ: Cordo baccarum succus Autumno amarus, modiceque dulcis & acetosus est, infrequenti autem Vere, cum hyeme passus factus fuerit, magis astringit. Cortex amari & astringentis saporis.

An Ruell. Opulus: Corno similis (inquit) arbor arbutio Gallico faciendo idonea: *Obierus* vel *Opierus* apud nos ruri dicitur: Vltimi proceritate adolefcit, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferè vitagineis, baccis racematim dependentibus, prima pubertate viridibus, à maturitate puniceis. Vitem Opulus alit: verum quoniam frondem non habet idoneam, à plebique repudiatur. Ieiunum solum horret &c. Si Ruell. per *Obierum* intelligit Sambucum aquaticam vti nobis videtur, male sanè describit: non enim adolefcit ad altitudinem Vltimi, nec caudice recto est: is aliquot plantas confundit.

Curtius cap. proprio eandem Opuli descriptionem habet, ex Ruell. vti existimamus, desumptam, citans Varro nem & Columellam. Nondum legimus apud hos vel apud alios Opulum ferre baccas: idè Ruell. & Curtium hanc cum Sambuco racemosa confudisse modò diximus. Nos de Opulo alio loco trademus.

*Sambucus* apud Theoph. l. 4. c. 1. hist. Sambucus aquatica siue Palustris, vulgò (Gallis) *Obier* putatur, vt annotat Rob. Conf. cuius opinionis etiam Dalech. fuit, & multi alij vt notat Hist. Lugd. sed hæc coniectura incerta, quum nulla sit descriptio: paucula enim tantum hæc verba habet Theoph. Taxus quoque & Thraupalus maximè gaudent vmbrosis. Quis inde certi quiddam statuat? Est hæc igitur vna à nobis pro derelictis habita, sitq; primi occupatis, vt sit quum incerta est vacua possessio, ne omnia occupasse aut tenuisse videamur.

Lycostaphylos fœmina Cordo, qui figuram Tragi habet, cum hac annotatione: nostri Sambucum aquaticam vocant: Saxones lupinam vnam, quod nomen Græcè exprimere voluit Cordus.

An Anguil. epist. 4. Aceris species 3. dicta *xylopergon*. Patauij & in Patauino agro *Piedoca* & *Platanus aquatica*.

Dodonæi sententia est, de sambuco aquatica siue palustri nihil Veteres memorie prodidisse: neque enim Opulum esse, vt nonnulli temerè suspicari contigit: multò minus Platani speciei. Sambucus palustris vel aquat. flore simplici Gesn. qui fruticem esse ait, & si cicuratur, arbutula fieri. Nec probat eos qui Chamæplatanum vocant.

Acte & sambucus aquat. siue rosea, Penz. & Lob. & Tabern. *Wasserholder*. Germ. *Wasserholder*. *Bachholder*. *Schmelchen*. *Schmelchenbaum*: quibudam *Nassholder* / *Schneeballen* / Tabern. Siles. *Kallinschenbaum*, *Kallinschenbeer*: Belgis *Gelders rosen*. Gall. *Obier* vel *opier*. Sambucus palustris fœmina, Camer. Sambucus palustris folio Opuli, Cæsalp. Hist. quoque Lugd. negat opulum esse. Patauij cum essemus D. Presburgius indicauit vocari *clonotrichon* Theoph. Lectirotariam; Sambucum aquat. & Platanum fœminam Guilandino.

Nascitur in siluis & dumetis, & vmbrosarum amaram; riparum quas blandè rigant aquæ accola communiter inter Alnos visitur in Germania, Gallia, Anglia, Italia. Pedemontiumque pratensibus, vdis, conualliumque marginibus. A loco & hanc *Acte* nomen sibi adiuuasse Lob. memorat. In Heluetia, Burgundia & circumiacentibus locis non rara. Nascitur & in palustribus Pisanis: Basilæ in monte Murenfi stipidina varietate Studiosis qui illic quotannis con-

sunt clarissimo.

Nos eam in horti Montb. translata ele-ganter topiario operi, præsertim contegendis Adonidis domunculis hortorum aptandam cura-  
*Cultus.*

uimus, vbi non inelegans visitur tota hieme, absque corruptione, coccineas baccas ostentans.

Vmbellæ cum floribus Maio lætè conspiciuntur:

Autumno baccæ perficiuntur: nihilominus in-  
*Tempus*

tegra hieme durantes: quo tempore cum reliqua tum potissimum Bonoriæ aues [ *baselbuncer* ]

summo petere eas expetunt, vt non raro etiam illis inescatæ decipiantur ab aucupibus, notante Trago: cuius iudicio in Eclegmate exhiberi possent ad vomitiones ciendas. Flores cum suauiter odorati sint, solent æstate voluptatis gratiâ legi & conclauius inferri. Matthiolo baccæ deuorata vomitionem cient, succo vis inæst abiterforia, qui cum melle (inquit Schuuenkf.) ad syrapi coquitur consistentiam, aduersus tussim, vulgi experimento. Tradit Rob. Constat. nescimus quo autore, Aquatici sambuci destillatos flores ad frangendum calculum efficacissimum omnium esse remedium.

*Vires & vltus.*

*Vomitoria.*

*Ad calculū.*

## SAMBUCVS ROSEA.

NB Huius Sambuci Icon Errore typographico paulo antè sub titulo Sambuci Aquaticæ posita fuit: Sicut Sambuci Aquaticæ Icon sub hoc.

Descriptio.



**A** Mabili florum candidiorum magnorum, quinquepartitorum, vnaque se expandentium, glomeratorum, pile nuce [vnde nomē apud vulgus Germanici inuenit] instar, spectaculo, hortos decorat frugiperda ista aquatica Sambucus: floribus parvis destituitur: cetera præcedenti similis, nisi

quòd flores propemodum odore destituti videantur.

Gesnerus annotat sibi relatum etiam purpurei coloris flore Basilæ in hortis reperiri. Verum quanquam ibi multoties, & quā est illic frequentia pluribus hortis viderimus, nusquam tamen nobis purpureo flore obseruata. At Montbelgardi Anno 1600. in horto E. C. Wirtemb. vbi albam abundè habemus, semel ex improviso visi sunt ex quadam aeris constitutione omnes flores purpureascentes: qualem colorem in ea antè non obseruaueramus.

Lycostaphylos mascula Cordo. Rosa Menapia, & Sambuci aquatici siue palustris species, Dodo. Sambucus palustris, hortensis flore multiplici albo, Gesn. qui aliquibus Schönballen / id est, Globos formosos nuncupant. Basilienfes globos nivosos, à figura & colore, Schneeballen vocant. Sambucus rosea siue aquatica Penz. & Lob. Sambucus palustris mas, flore congobato Camer. Sambucus aquat. polyanthos, Gesf. Item Schneeballen: Item Sambucus 6. rosea, flore purpureo multiplici Tabern. quæ non necesse erat

*Fructus carer.*  
*Flores albi.*

*Purpurei Flores.*

*Tabern. non videt.*

quibus figuris opus suum stipare, vnius eiusdemque plantæ floris colore variantis : quem tamē nun videt dubitamus. Sanē nihil indicat ipse.

Cæterum, tota hortensis creditur hæc, inquit Dod. & cultura mangonio talis facta, apud Germanos superiores & Belgas haud infrequens hortorum incolæ. Cordus refert nasci iisdem locis, quibus præcedens simplex, sed in Germania præcuius, ideoque in hortos propter florum elegantiam translatam, præsertim Angustæ Vindel. Ratibonæ & Norimbergæ. C. Bauh. scribit in Gallijs & Italijs sibi nuppiam vîam: nec nobis sanē quod recordemur, nisi in hortō instructissimo Robini Botanici Regij, Lutetiæ, ( Lugdunum enim & Geneuam à nobis primū introductas ) Item Vesuntij in cuiusdam Canonici hortō, qui perhibebat Gallis *Roses de Guelres* vocari.

De huius vîu & viribus nihil hætenus innotuit nobis. Attamen corticum sapor subastringens est & deterforius cum modica quadam amaritudine: vnde rationabiliter coniungunt, id eodem cum præcedenti vîu aptari posse, præsertim cum eius species & varietas esse videatur.

#### AZADARACHENI ARBOR. CAP. XXVII.

Descriptio.

Folia.



Flores.

Baccæ.

Nuclei.

Barbæ captinæ folia comparat.) Flores ex longo pediculo, dodrante maiore, in ramusculorum extremis ad exortum foliorum copiosi, racematim coherentes, parui, odorati, sapore nullo, ex quinque foliolis expansis constantes: in quorum medio veluti calyx longiusculus, ex purpureo nigricans, in quo stamina. Floribus succedunt baccæ multæ, luteæ, magnæ, amara cum dulcedine quadam, initio virides, maturitate candicantes, magnitudine Mespili Aroniz, foetida, ingrati saporis, in quibus nuclei duri, eleganter angulosi, nunc pentagoni, nunc hexagoni, medullam continent albam, valde ingratam.

An de hæc Aucennas l. 2. tract. 2. c. 17. *Azedaroth*, id est, *Azedarach*: arbor nota, cui fructus similis Nabach [ id est Loti quibusdam. ] In Rechi vocant Arborem Myrobalanorum &c.

Monachos aliosque qui eandem cum Sycomoro faciunt, reprehendunt ræritè Gesæru's & Marthiolus: Ballonius Siliquam nominat, quod mireris, cum baccas non siliquas fecit.

Monspelij meo tempore, inquit Clus. *Arbor sancta* dicebatur, Pellicerio Episcopo *Lorus alba* Arbo existimabatur, alijs vero *Zizaphis alba*: quam opinionem adhuc retinere magni nominis viros miror, cum nullas notas habeat, quæ alba Zizapho conueniant: Italis Hebraijs ineptè & impetite Sycomorum vocari audio. Bæticis vulgari sermone. *Arbo Parayso*, Castellanis *Zyziphus alba*, Italis *Perlaro* vocari audio. Tripeli, vt notat Rauuolff. *Zenfelach*, Rhazi & Auic. *Afargir* aut *Afargir* & *Azadarach*. Lob. & Pen. *Adu. Zizapha candida* Monspel. quæ perperam Venerorum Sycomorus.

Apud Hist. Lugd. *Ziziphus alba* Dalech. & Matth. fones duas habet, quarum Dalechampi de-terior: folia enim falsa.

Non parum errarunt, ait Dod. qui Lotum arborem affirmarunt. Taber. Catapino.

Nic. Braun male *brusberlia*: hac nimirum Germanica voce, quæ thoracis bacculas significat, incautis periculum præparans, qui iuuubarum loco in thoracis affectionibus vti vellent. Apagè vèrò istos Rhizotomos cum suis *perstribus* ceteris, quod idem est, ac si albas iuuibas dicas. Dolendum, hercle, vnicuique statim se Medicum aut Herbarium proficenti, statim fidem adhiberi, cum in nullo mendacio periculum sit maius.

Porro *Azadarach*, teste Bellan. reperitur Venetijs, Patavijs & in Syria. Gesnero è semine prodijt: sed dodrantelem spondyli exola radice perdidit. Hieme repou debet sub tegum. Belkonij curâ Lutetiæ aliquot huius arboris plantæ iam dudum spectari ceperunt. Plerumque vîuit in Monachorum claustris & in templorum plateis, si Matth. credimus. Clus. nusquam spontè nascentem vidit in multis Bæticæ vinearijs, atque etiam secudum vias regias alitur: sed nullibi maior eidem conspecta, quam Hispali in Regio Palatio. Tota hieme perdurat, nullis degustantibus aîibus, vnde facile venenatam & malignam eius qualitatem intelligas. Tripeli in vrbis plateis ad vmbra excolunt: Rauuolff.

Camerario prouenit ex semine. Vidimus Nemausi elegantissimam arborem cultam, quæ hyemes rigidiusculas tulerat. Sed & Monspelij in hortō quodam vidisse meminimus. Alebat & aliquando Platerus Basilæ in elegantissimo suo hortō. Nobis etiam ex semine prouenit Montbelgardi in hortō E.C. Wirr. Patavio misso, verum non ritè reposita frigore interijt: Est enim durioris frigoris impatiens. Primum omnium, quod equidem sciamus, vîsa nobis Monspelij in hortō Celeberr. præceptoris nostri Guî. Rondeletij. Arelatæ in Prouincia maximam arborem ostendit nobis insignis Medicus Valleriola, qui Sycomorum nominabat: postea vidimus Patavij hortō publico & alijs baccis onustam mense Ianuar. & Febr. Ferrariæ in hortō Ducis (vbi Struthiocamelos tres conspeximus, multas arbores Folia & flores simul erumpunt mense Iunio. Baccæ autumnō maturæscunt, totaque hieme in arbore durant, maxime in Italia. Sturgardiz in hortō Ill. E.C. vidimus Iunio & Iulio pulchrè florentem. Eleganter etiam videas Hiedelberge in hortō Electoris instructissimo, qui hieme tegitur. Narbonæ frequens est, teste Lob. Belgis colitur in hortis. Merebatur rara arboris elegantia, paullo specialius loca designari.

Azedarach Rhazæ calida & sicca est, conuenit obstructionibus capitis, capillos prolongat, fructus ventriculo valde nocuus, & interdum permi-





arbuscula partibus coriarii ad depandanda coria utebantur, ob id *Rhus* *Syriacus* Græcis dicta: quam Colum. *Rorem* *futorium* semel dixit, alioqui & Sc. *tolepiscos* dicitur, & notat Hermol. qui tradit habere se, vnde hoc *Rhus* *Syriacus*, (nam in argillosis Syria potissimum nasci ait: alias ubique) siue vt Colum. & Pallad. appellant *Rhos* *Syriacus* parum distare videatur ab hoc nostro, qui frutex excoriarius, & *Rhus* *crythros* à colore subrutilo vocatur Dioscor. & Plin. crassitudine digitali, altitudine bicubitali: quāquam Plin. nisi librariorum ea sit incertia, cubitali prodidit. Duo faciunt omnino Græci genera: *Magirikom*, quod additur in obsonia: idem est cum *Syriaco*, vt opinor: alterum quod *Cyrenæicus*, id est, excoriarium. (notabis utrumque ex eadem planta esse, vt ante dictum, vltus tantum differētes, in quo deceptus videtur Hermol.)

Marc. Virgil. in Colum. lib. 9. capit. 13. malè *Rorem* *futorium* legi tradit: *Rhun* enim non *Rorem* legi illic oportere. Considerandum igitur qualis sit eius *Rhus* in Etnuria folio Myrti, illaque quam panī nautico condimentū loco inspergi tradit. Vera *Rhus* Theophrast. & Diosc. non habet folia myrti, sed potius Vlmi: nullam nouimus plantam folio Myrti, quæ ferat baccas viles pro pane nautico præter veram *Rhoen*, cui non sunt folia Myrti, sed Vlmi. Suspiciamus Marcellum non intellexisse quæ scripsit. De *Rhoen* Myrtifolia Plinii putata, postea trademus. Actuar. in quibusdam compositionibus *Sumachum* tradit *Rhon* appellari, quod nomen omnes vsurpant officinæ, à barbaris emendicatum quibus *Sumach* dicitur, quæ vox etiam coriis communis aliquibus locis est: non aliunde, vt credimus, quā quia ex foliis huius fructibus confecta fuerint.

Ruell. *Rhois* descriptiones conuenientes ponit quidem: Verum in fine addit: rura nostra *Viurnam* appellant, flexu ferè inuictam: vnde satis apparet eum *Rhoen* cum *Lantana* confundere de qua postea.

Ruell. error.

*Rhus* *Culinaria* Cordo. oportet autem (inquit ille) enucleatum & pulpam eius accipere. Verum minus placet, quando ei Laurinos ramulos alternatim geniculatos tribuit, Per errorem *Syriacum* Celsi Crinitus intelligit *Manardum* eo nomine reprehenditur. *Manardus* enim intelligi non potest apud Celsum, nisi incertū rei medicæ Celsus ipse notetur. Quæ enim vis *Manardæ* nostræ, vt mala vlcera oris, de quibus inibi scribit, per eam sanescant, Sed fortè deprauata lectio Celsi, vt vult *Manardus*.

Celsi ab errore vindicare conatur *Amatus*, non solum *Crinitus*, sed & *Manardo* ipsi errore imputans his verbis. *Ros* *Syriacus* siue *Ciriacus*, siue *Cyrenæicus* aut *Medicus* dictus, *Laserpitii* succus est. *Manardum* non minus ac *Crinitum* erraticum est: illum per *Rorem* *Syriacum*, *mannam* intelligentem, hunc verò *Rhun* *Sumach* dictum. *Hæc ille*: temerè, & imperitè, vt parebit legenti ipsum Celsum l. 6. c. 11. à quo *Ros*, vel (vt rectè legit Platin.) *Rhus* *Syriacus*, præscribitur pueris vel lactantibus infantibus, & pleuræ aut vlcibus oris laborantibus. Quis verò præscribat *Laserpitium*. Quare *Cornel.* Celsum rectè à *Manardo* interpretatum omnino nobis persuademus.

Cotereau in sua versione Gall. apud Colum. l. 9. c. 31. non benè vertit Benioin: Nos cum doctoribus *Rhoen* *Syriacum* legendum censemus.

*Rhus* *Syriacus* cum.

*Rhus* *Syriacus* cum. Frutex excoriarius.

Plin. emend.

Hermol. not.

Marcellus not.

*Sumach*. Aliquæ. *Sumach*.

Viurnæ.

Ruell. error.

*Rhus* *Culinaria*.

*Cordi* *Lep.* *sum.*

*Amatus*. reprob.

Cotereau seminum error.

Idem Cotereau lib. 12. cap. 41. Colum. malè vertit *Rouffe de Syrie*; vbi traditur conditura ex Cydoniis. In nostro sanè quoque exemplari non benè legitur *Rôris* *Syriaci* pro *Rhois* *Syriaci*.

Monachi tradunt *Rhos* *Ponticum* quale ipsi Patauī ostensum fuit, habere fructum in racemulis. Verum suspicamus Monachis Patauī demonstratum *Sumach* siue *Rhus* *obsoniorum*, quamuis dicant: aduerte quod *Rhus* *Ponticum* differt à *Sumach*, quod est *Rhus* *obsoniorum*.

*Eupatoricam* & *Ponticam* *Rhun* *Damocrates* probat vt l. 7. comp. med. ostendit Gal. Eam autem à loco natali sic cognominatam existimamus, non quod species sint distinctæ: nam & paulo post hunc locum Gal. inter parabasia astringentia recenset *Culinarium* & *Coriariū* *Rhoen*, & succum qui ex Syria adfertur. Habetur & apud Marcellum medicum *Rhus* *marinus*, siue *Rhus* *Orientalis*: vt etiam apud Colum. *Rhoen* *marinum* legi possit, pro *rorem* *marinum*. Num igitur tot species dicemus: si tot diuersa sint nomina, & ea quidem patria?

Nec intellexit *Lonicerus* quid scriberet, quando *Rhus* duo genera dicit: *Mageiricum*, hoc est, *Rhus* *obsoniorum*: alterum *Byssodepsicum*: & à Diosc. describi arborem: à Ruell. fruticem in Gallia prouenientem: ponitque duas icones, quarum posterior est *Ryffij* similis, pro posteriore Ruellii, quam ineptè *Viburnum* vocat, & tamen descriptionem ex Ruell. habet, quæ nequiquam *Viburno* Ruellij conuenit, sed *Rhois* est eiudem.

Tam *Ryffiana* quàm *Euch. Roslin.* icones nullius momenti sunt.

Esti autem *Galenus*, vt annotat *Matth.* plura *Rhois* nomina & genera explicasse videatur, vt qui id modò *Syriacum* appellet, modò *Ponticum*, modò *obsoniorum*, modò *coriariū*, modò *rubrum*: non tamen propterea censendum, *Rhois* arbores inter se genere vel specie differre. *Rhus* *obsoniorum* nihil aliud est, quàm semen: *coriariū* verò nil aliud, quàm folia & fructus ramulculi. *Rhus* *rubens* nihil aliud est, quàm eius semen immaturum, cui maior adstringendi facultas inest, quàm maturo, cuius acini quadantenus nigricant. *Syriaca* præterea atque *Pontica* *Rhus* nihil genere distat ab *Italica* & *Iberica*.

Hallucinatur ergo *Monachi*, qui *Rhoen* *Ponticam* alterius esse generis crediderunt ab ea cuius vltus exiit apud Antiquos in *obsonijs*, Plin. fortè lectione vulgata decepti.

Errat & *Fuchsius*, qui præter *Culinarium* & *coriariū*, etiam tertium genus *Syriacum* inter se omnia differentia putat.

Fatetur *Matth.* id, quod *Gaza* *Fluidam* interpretatus sit, sibi errandi animo præbuisse, vt putarit *Fluidam* Theoph. esse eam arbusculam, quæ vulgò *Lantana* vocatur, idè postea eandem errorem reuocat.

Miramur etiam doctiss. *Casal.* separasse Theoph. *Rhun* à *Dioscoridis* *Ros* & *Ros*.

Lat. *Rhus*. *Rhus* *terginus* vel *tergorarius* *Cal.* *Aurel.* l. 4. *Chronic.* ita namque minore lectionis fraude cum *Had.* *Iun.* legimus, quàm, vt vulgati codices habent, *Vurberginario* incompta & barbara voce pro *thoë* *tergorario*, quo tergora, id est, coria depere mos est.

Arab. *Sumach*, *Adurion*, *Rusbar*, *Sadisticos* seu *Rosaidicos*. It. *Rhu* & *Samacho*. Belge contracta Arabica voce *Smack* vocant: It. *Ren*, *Rin*. Gal. *Roux* vulgò quibusdam *Change*, alij *Rhon*. Hisp. *Castil.* & *Catal.* *Sumaque*. Port. *Sumagre*. G. *Gerberbaum*. Seminis

Colum. emend. Monachi rum eri

Rhus marinus, Rhus Orientalis, Rhus, Rhus

Ryffij

Roslin.

Non dicitur non dicitur facit

Rhus bene

Fuchs

Casal. ros. Syn. ling.

Cal. loci. rel.

Seu



seu acinorum color coccineus flammeusque nomen imposuisse videntur, vt per ipso diceretur: Semen aliqui *em per* *7a dila* vocatur.

De hac arbutula Italia, potissimum Gallia Narbonensis, Gallo proin. & Hispania gloriantur. Speciatim Monspelii vidimus circa castellum nouum locis glareosis & macilentis, Sorbo vulgari adeo similem, vt vix sit internoscere, nisi attentius perpendenti. Quo loco multo procerior, quam Diosc. memorat, nascitur, ac penè Sambuci maioris magnitudine, vt obseruauit Lob. Locis Galloprovinciæ aridioribus & ruderosis, desertis, incultis, pumila, & quanta qualisque apud Dioscor. descripta bicubitalis arbutula vultur. Incolæ territorii Siderocapsæ dicti, copiose colligunt folia, ad depandanda coriâ, teste Bellon. Notissimum quoque Rhus nomine Sumach ad Maranum Castellum Mariæ, Lanzanæ & per Vmbram Anguil.

Clusius in Hispania sua peregrinatione magnam eius prouentum Salmaticensi agro esse, istique quæstus gratia diligenter coli obseruauit. Multi, inquit, agri eo coniti, nec minore ibi cultura coluntur quam vineta, aliqui nec tam late assurgit, aut si cultura ablit, degenerat & siluescit. Imò non desunt qui vitibus interferant, cultura compendium querentes, vt eadem opera cum vitibus fodiantur. Caduntur singulis annis enati surculi cubitales ad radicem vique aut summam tellurem, deinde desiccantur, in pollinem rediguntur, & in vsum conuertuntur ad paranda coria, quo vsu in tota Hispania celebratissimum habetur.

Camerario ex femine prouenit, quemad. & nobis aliquando in hortu Montbelg. fata, & multis annis in scitilibus asseruata, hiemeque reposita tandem exaruit. Felix Platerus etiam non repositam hiemes aliquot annis in cultissimo suo hortu aluit. Monspelii Augusto florentem vidimus.

Tardè fructus suos perficit ad perfectam maturitatem: rubros tamen racemos circa autumnum tempus vidimus & legimus ibidem, quos & apud Pharmacopolas diligentiores inuenias, quemad. & ex eo vel foliis expressum succum ipsum rubentem, ex Hispaniis, vt putamus, illatum. Alioqui in Germania cæterisue Septentrionalibus prouinciis spontè non nascitur.

Iam ex Diosc. dictum, fructus corticosam tunicam perquam vilem esse, atque acinorum etiamnum hodiè ad condimenta multus in culinâ vsus. Eodem tradente, folia vim habent stringendi, & Acaciæ effectus præbent. Decoctum eorum capillos denigrat: dysentericis infunditur, ab ipsdè bibitur, & ad infesum vsurpatur: nec non & purulentis auribus instillatur. Pyerygia & Gangrænas cohibent folia, ex aceto aut melle illita. Succus elicitur Lycij in modum, aridis foliis ad mellis crassitudinem in aqua decoctis: & is quidem ad eadem ad quæ Lycium conuenit. Quin & fructus eosdè exhibet effectus, ac Cæliacorum Dysentericorumque obsonijs commodè inspergitur. Contusa, desquamata, liuidaque ex aqua illius ab inflammatione vindicat: linguæ asperitates cum melle abstergit, alba feminarum profluvia sistit, & hæmorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito impositus. Huius quoque dilutum si decoquatur, cogitur coitque ipso etiam fructu efficacius. Gummi quoque profert hæc arbutula, quod erosum dentium cauis inditur ad dolores finiendo.

Cæterum, Hipp. ad fluorem muliebrem & quemuis vteri morbum Rhoë diuersimodè vitur.

Qua de re si certior fieri cupis, eum consulito. Illud duntaxat examinandum, cur de nat. mul. ad vteros purgandos eius folia præscribat, & fructum ex vino bibendum det. Titulus fortè transpositus, & quædam confusè transcripta. Ad hæc non intelligo Hippocratem, quomodo dicat medicamentum sanguinem ex vtero explere. Fortassis error quidam librarius. Aridis foliis, inquit Plin. vt Malicorio, coria perficiuntur. Medici autem rhoicis utuntur ad contusa: item cæliacos & sedis vlcera. At quæ phagedænas vocant, folia trita cum melle, aut illita cum aceto sanant. Fit & Stomatice decoctis ramis ad eadem, quæ ex Moris, sed efficacior admisto alumine. Illinitur eadem hydropicorum tumoribus. Semen (Rhois Erythru) vim habet astringendi refrigerandique. Aspergitur pro sale [cum sale. vet. nec aliter sapit palato Cornar. quamuis & sine sale condimentis inspergi possit.] obsoniis. Aluos soluit [malinus, stringit.] omnesque carnes cum alphis suauiores facit. Hæmorrhoidibus medetur manantibus cum melle: asperitati linguæ, percussis, liuidis, desquamatis eodem modo. Capitis vlcera [vulnera. CH.] ad cicatricem celerimè perducit: & feminarum abundantiam sistit cibo.

Rhus, inquit Galenus, fruticosa planta astringit, desiccatur. Nam & Coriarij tinctores ad desiccandum & astringendum coria vtuntur: vnde *Burseri* *7a dila* Græcis dicta. Porro medicis in vsu sunt imprimis fructus eius & succus multum austere qualitatis. Consentaneus est vsus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit igitur ex tertio ordi ne exiccantium, & secundo refrigerantium. Vtilem vero præsertim se experimento agnouisse tradit ad crustas, vultus inflammationes, aluum

fluidum, fluxiones, & sanguinis eruptiones. Foliorum decoctum vtilissimum habetur ad confirmandos dentes. Colum. ad profluvia alui apum præscribit vvas passas cum Rore Syriaco [leg. Rhoë syr.] pari mensura pinritas & austero vino infuccatas. Nonnulli Rorem marinum (Rhoë marinum legit Corn.) aqua multa decoctum, cum gelauerit imbricibus infusum præbent libandum. Turcæ, inquit Bellon. habent officinas, in quibus arietum capita & pedes cocti profiant, quos calidos aceto & sale aspersos Embamate ex semine sumach, aliorum succo cum pinguedine optimè conditos ementibus offerre ex tempore norunt. In Heraclea etiam, vbi in vicinis montibus abundat, magnos saccos venales videas huius fructu plenos, quibus contusis cum sale & allijs suis cibis non infuauem gratiam conciliare norunt, asperso hoc condimento tam assis quam elixis cibis.

Notat Syluius Rhois succum esse vice Omphacii in Gallia Narbonensi.

Rhois vice obsoniis immisceri docet Diosc. inmaturo Mora sicca & tusa.

Ad vsus medicos verò varia eius habes succedanea apud Gal. l. 6. comp. med. *7a dila* *7a dila*: quem consule.

## LANTANA VVLGO, ALIIS VIBURNVM.

### CAP. XXIX.

**H**ic frutex arborecens est grandis quādoque dicit in amplitudinem magis distan-



Folia.

Flores.

Bacca.

Rhus.

Ruelli mult.  
plex error.Alius Ruell.  
error  
At arch. nos.

Lonie. com.

alpinam accedentia, opposita & lata, sublonga, crassiuscula, in ambitu crenata, hirsuta, & pulvisculo albo, maxime internâ parte; quæ ob id etiam magis cantilicat, conspersa; gustu astringente. Flores in umbella odore florum Sambuci, candidi, caduci, quinque foliis extorsum modice reflexis, constantes, singuli, in quorum medio stamina quina surriguntur longa, albicantia, apicibus luteis. Quos excipiunt superuenientes bacca, primùm virides, dein rubra, per maturitatem nigra, compressæ, dulces & viscosæ, sapore tamen nostro palato minus gratæ, senem vnum continentes, latum, compressum, & striatum, osseo cortice intectum.

De hac Ruell. lib. 1. cap. 35. Halymus in sepibus apud flos Gallos frequens frutex, quem *Blanche putain* rura vocant. Et lib. 1. c. 125. *Rhus* Diosc. Theophr. Plinior. *Rhus Syriacus* Colum. Actuarius *Sumach* Offic. *Sumach*. Rura nostra *Viurnam* appellant, flexu ferè inuictam, & ob id fascibus ligandis vtuntur. Sed folia & frutex incano ferè colore nitent, ruborem tantùm procidentia præ se ferunt: Ita benè onustus Veterum incepte corrasis nomenclaturis abit Ruellius, & ignotus recipit. Ecur non descripsit suam *Blanche putain* quam præter rationem putat Halymum. Reliqua *Rhois* synonyma tam conueniunt huic plantæ, quàm verum est, ipsum vtramque cognitam habuisse. Enimverò sanè, si *Sumach* Offic. contulisset cum bacis *Lantanæ*, discrimen facile animaduertisset, nec inordinatam illam appellationum congeriem discendi cupidis studiosis obtrussisset. Idem lib. 1. cap. 152. de *Vire silu.* eam *Viorne* & *Hardeau* à Gallica voce *Hard*, quæ vinculum & funem significat, nominari tradit. Vt necesse sit aut Ruell. hæc obliuione confudisse, aut duas illas plantas, Halymum inquam, vel *Rhoem* suum, & *Vitem* silu. æquè vocari à Gallis *Viorne*: quo nomine appellari iure possunt aliæ quæuis lentæ, flexiles, viæ, vt annotat Hist. Lugd. Parum quoque decebat tantum stirpium Commentatorem Marth. dicere: Halimus, si Ruellio credimus: vel illi subscribere etiam non intellecto, quid per Halimum & *Rhoem* intelligat.

Lonie. quoque duobus locis eandem tradit plantam, nempe l. 4. c. 82. vbi & *Rhoem* & *Viburnum* Virg. ex Ruell. sententia dicit: & lib. 4. c. 71. Vbi *Blein* *Meelbaum* vocat, additque quoddam yelle esse *Sanbichen* / [Fogum sepium]

datur quàm in altum assurgat, lignoque constat fungoso & medulloso. E radice tammo caespice uagante ramos digitali crassitudine emittit bicubitales, etiamque longiores, cortice ruffo, farinaceo, pulvisculo consperso, materie paucæ ac viridi, medulla amplissima & alba. Folia ad Alnum vel potius Sorbum

adit *Edins* / [Alnum] Sed quid quæstio commutane habet hæc nostra cum *Fago* septem. *Alno*?

Annotat Clus. nonnullis *Arceuth* Theophr. putari. An verò *Spiræa* *Viburnum* sit Virg. in potius vitis silu. parum refert, inquit Hist. Lugd. cum utraque planta, si cum *Caprifoglio* comparetur [ve facit Virg.] humilis sit, & altitudine longè inferior. Flexus tamen lentior [addit eadem] Viti silu. magis conuenit, quàm *Spiræa*. Præterea obliuionem monet, quod Ruell. non animaduertit, *Rhoem* & *Vitem* silu. coriarias esse plantas, sed à *Vite* tunc coria depolari, à *Rhoem* perferri. Dixerat autem eadē l. 1. c. 62. Ruell. de *Rhoem* scriberet, vt *Rhoem* quā non nouerat, in Lutetia suburbanis reperiret, fruticem depinxit, quem antea l. 1. c. 37. solo nomine Halimi indicauerat, & à Gallis *Blanche-putain* vocari dixerat. Verū du n Hist. Lugd. notat Ruellium *Rhoem* non nouisse, simili reprehensione digna videretur dum *Blanche-putain* non describit: descriptio namque Ruellii vt diximus, est ipsius *Rhois*, non *Spirææ*, exceptis postremis verbis Ruellii de vitina, de qua eodem cap. scribit Hist. Lugd. Præterea enim hunc *Spiræam* esse Theophr. primus animaduertit Dalech. cuius sententiam approbat Rob. Constant. in Lex. annotans *Spiræam* fruticem esse lentum & vitilem, ita ut in *Spiram* torqueri possit; vnde & nomen dno *Spirææ* de qua Theophrast. & Plin. eam plantam Ruellium pro Halimo deceptum accepisse.

Videamus ergo quid Theophr. & Plin. de *Spiræa* tradant. Ille lib. 1. cap. 12. hist. Arborum aliæ in cacuminibus fructum gerunt, aliæ à lateribus, aliæ utrinque. Verū n plura ex cæteris generibus fructum in cacumine ferunt, quàm in arborum genere: ut frugum, quæ spicam pariunt: fruticum *Erica*, *Spiræa*, & *Vitex*. *Spiræa* habet verus codex: Basil. *ruella*: Vnde Gaza: *Piræa*. Sed magis placet Dal. & Const. *Spiræa* legi: sanè verò & nobis. Pro vitice Gaza Amerinam substituit: In Græco enim est *ῥοῖα*. Alius locus est lib. 6. cap. 1. Eorum quæ non aculeata sunt, diuisio nulla generalis dari potest: quid foliorum in iis diuersitas, amplitudine, paruitate & figura, immensa propemodum sit atque incerta. Quapropter alia ratione diuisio eorum tentanda. Sunt verò eorum genera compluræ magnas differentias sortita, vt *Hedera*, *Melochrum*, *Erechtodanum* [alii *ῥοῖα* de *ῥοῖα* v] *Spiræa*, [corrupte habetur in Græco *Spiræa* pro *Spiræa*: nec alii rectè emendarunt, *πικραῖα*, & Const.] *Cneorum* [Gaza, *Casia* ex Plin:] *Origanum*: pro quo Plin. videtur legisse *ῥοῖα*. Sic enim lib. 21. cap. 9. Ergo in coronamenta folio venè *Melochron*, *Spiræon*, (quasi *σπῆρον* legisset: Const. *Spiræon* legi vult.) *Trigonon*, (an *Origanum*?) *Cneoron* quod *Casiam* Hyginus vocat. Hæc *Vereres de Spiræa*.

Verū ex his tam paucis difficile est asserere nostram *Lantanam* esse *Spiræam*. Habemus tamen quoddicamus, hanc in cacumine fructum gerere, fruticem esse, & non aculeatum: Imò & lentum & vitilem, vt in *Spiras* torqueri possit, vnde & nomen accepisse videtur dno *Spirææ*. Sed ad hanc opinionem obest potius quàm prodest Plin. Nam quis eredit *Lantanæ* folia vnquam in coronamenta venisse? Nisi fortè intelligamus folia (quæ tamen per se satis quoque speciosa) cum floribus seu bacis pulchrè sanè & venustè coccineis: tandem & ni-



& nigris. Clus. pro Spiræa aliam proponit, de qua paullo post.

Inculto maxime solo inter reliquas vepres & sentes in dametis nascitur, humo gaudens argillosa & forti. Interdum & inter lepes nasci videas. Quanquam verò non ubique locorum in Germania hic frutex gignatur, tamen in Alsatia & apud Mediomatrices, nec non in monte tonitruus magna in copia reperitur, Trago teste. Basilæ in monte Montez stirpium varietate celebrato, item eundo contra Rhenum versus pagum Brentsch, & opposita eiusdem Rheni ripa piffin, alibi que. Frequens quoque circa Norimbergam, Tiguri & passim in Heluetia, Burgundia, circa Montbelg. In Italia inter Vesonam & Castelfranc Martio mense penè floridam observaui-mus:

Lugduni Aprilis: Genève Maio: In Heluetia & Alsatia Iunio: Imò circa Basilæam Octobri adhuc florentem vidimus, & propè *Leurach* in monte cum fructu maturo mense Augusto. Magna tamen ex parte acini rubescunt Iulio: Augusti fine demum & Sept. n. grescunt.

Viburni fructus, inquit Märth. vbi ad ultimam provenit maturitatem, alium exoluit. Folia adtingentis sunt facultatis, ideoque præstant ad vacillantes dentes confirmandos, & gingivarum rheumatismos, si decoquantur in vino austero: atqui longè magis valcbit, si cum Oliivæ foliis decoquantur in aqua & aceto, & ex hoc decocto sæpè foueantur dentes. Gargarizatur idem ad columellæ procidentiam & ad faucium fluxiones. Vuarum acini arefacti antequam maturef-cant, & in puluerem triti ac poti, alui fluxiones sistunt. Patatur è radicum corticibus sub terra maceratis, & subinde decoctis, & diutius, viscum ad aucupia hæud inutile. Folia in lixiuio decocta, capitulum denigrant, & eisdem fluentes sistunt. Sed peritis considerandum relinquimus quæ Matth. tradit fructum alium foluere, & acinos eandem sistere. Res est experimenti, quod vix credimus hac in parte Matthiolo compertui. Veremur ne multa tribuerit Viburno quæ sunt Rhois, cum eisdem aliquando putarit, vti dictum. Eas tamen, quas diximus, vires; Viburno neutiquam denegamus: maxime cum ipse etià Dodon. proprio nomine similes eidem attribuat vires, qui scribit Lantanæ & folia & baccas refrigerantis, resiccantis, & astrigentis esse facultatis. Quomodo igitur baccæ alium mouebunt vt prodidit Matthiolus? Ex fortuitis paratur optima aqua ad oculos. Camer. Rustici nostri, & alibi sæpè passim vbi provenit, virgis commodè vtuntur in ligandis sepiibus & lignorum fasciculis. Multi etiam vescuntur baccis, quas, vt citius maturef-cant, supra paleas aut fœnum reponere alterno strato solent.



1586. qui in meo horto repositus, egregie provenit. (vmbroso enim loco collocari vt facilius comprehenderet) & sequente anno, flores semina præstet. Datur in autem cubitorum altitudine assurgit, tenuibus ramis seu virgis præsertim certice obductis, per quos illic videri possunt sunt frequen-

D. sc. pto;

tia, longiuscula & angusta folia, salignis, proxima, per ambitum serrata, superne dilatare viriditate prædita, inferne veluti æruginè aspersi, exsiccantis cum quadam amaritudinis coniuncti gustus. Extremi ramuli, digitalis, ferè longitudinis, satis crassam spicam ferunt exigentium florum, vix in modum coarctatorum, quibus foliis constantium, è quorum vimbilico multa staminula prodeunt, coloris cum suo flore ex albo rubescentis sine carnei, nullo peculiari odore prædiorum, nisi qualis ferè in flore Olea est. illis enascentibus succedunt pusilla pentagona capitula, quæ ad plenam maturitatem peruenientia tenuissimè & pulcreum quodammodo semine flauescens effundunt. Mense Iulio floret. Sub Aug. finem semen maturef-cit. Qui mirebatur Sebizijs, percontabatur an ad Syringam referri posset: propter pentagona capitula fortitan quæ Syringe albo flore capitalis haud ab similia, minora tamen, pollinein potiùs, quàm semen effundentia. Sed ego, inquit Clus. ad *Syringam*, cuius Theophrast. lib. .cap. 23. hist. inter frutices qui spicam pariunt meminit, commodè referri posse iudico: [verba Theophrast. præced. cap. citauimus] & fortasse commodius quam Viburnum Matth. quod nonnulli *omigias* esse volunt. Hæc ille.

Folia.

Spica floræ

Semen.

Temper.

Syringæ.

Sed nondum vidimus cur hæc planta commodius referri possit aut debeat ad Spiræam Theophrast. quàm Viburnum Matth. seu Lantana à nobis propòsita; nisi fortè quia spicata est, & in eo magis accedit ad Ericam & viticem. Verum si hæc tantum nos nota moueat, cur non potiùs Ligustrum dicemus Spiræam, quippe quod verè *ἀνθράκων* & *καρπόδης*. Si *σπειρα* Theoph. dicitur *ἀνθ' ὅτι σπείρει*, vt dicebamus & verisimile videtur, considerandum an hæc à Clusio descripta planta quadret: Nihil enim docet an sit sequax & flexuosa. Alioqui nostro iudicio satis benè conuenit Lantana siue Viburnum dictum.

Antorum iudicium

Ligustrum.

# SPIRÆA THEOPH. FORTE, CLVSIO.

CAP. XXX.

Nominis similitudo, vel potiùs identitas, vt sic loquamur, hanc non bacciferam, sub hanc classem coëgit: quippe qui n. Clus. Spiræam; [quam nos cum nonnullis doctis præcedentem potiùs credimus] Theoph. aspiciat, cuius hanc tradit historiam.

Brigæ Silesiæ mihi Viennam misit elegantem hunc fruticem D. Sebizijs, ipso Vere Anno

## RHVS PLIN. PVTATA

CAP. XXXI.

Rhus Plinii quibusdam dictus frutex; & etiam n. hodiè MonsPELLi pro eodem

Aaa 3





*Faulbaum* & *Leißbaum* à foetido cum colore tum sapore.

Alnus nigra plerisque, vt Dod. Pen. Lob. Hist. Lugd. Thallio & alijs plerisque. *Alnus bacifera* quibuldam. *Frangula*, Marth. & Camer. Dicta autem frangula quod ejus bacculi, recentes præsertim, facile franguntur. *Aornus* Petro Crescen-  
cio: *Siler Pliny* secundum nonnullos. *Arbor sativa* Lonic. & Schuonckf. Pen. & Lob. suspicatur esse *Calyptam Theoph.* Quod verò Lob. dicit flores albos, nobis non obseruatum. *Tragus* autem ex palido albicantes, Dod. inalbescens.

Anagyris, inquit Cornar mea sententia est arbor parua, quæ nostris *Scheyßbeeraum*, id est, *gratum cactationis arbor*. Si intelligit Alnum nigram, vt suspicatur, & quæ Germ. ita dicitur, excusari sanè non potest. Considerandum tamen an non intellexerit Cornum fœminam, aut cum ea confuderit. Vide cap. de Corno fœmina. In hanc suspitionem nos traxit quod eodem serè nomine Cornum fœminam vocat, quo *Tragus* hanc plantam de qua nunc agimus.

Ligultrum aquat. Geln. Vocatur & Germ. *Berenholz*, Belg. *Spörtenbau*, & à pueris *Dijlbout* dicitur, quia pueri inde suas sagittas conficiunt, testibus Dod. & Hadr. Lug. Gal. *Aulne noir*: Hericurie oppido Ducis Wirtemb. ad comit. Montbelg. fito, vocant du *fiuerne* aut *piffesang*, quia vulgò sibi persuadent animalia eo ligno verberata sanguinem mingere. Rob. Conf. inter Lotos referbat: quod opinio non placet. Bohem. *Bräsenä*. Bacca non suat gemellæ, vt pingit Marth. ex planta sicca.

Hist. Lugd. more suo duobus distinctis locis, diuersis iconibus & nominibus de hac tradit. 1. sub Alno nigra. 2. sub *Frangula* Marth. Figura quæ sub Alno nigra posita meliorem est. Eandem Hist. Lugd. caput C. Bauh. In suis animaduersionibus profecto in eam editis, quod in sua descriptione non meminerit in bacis quandam fissuram apparere, quasi ex duabus coaluissent: item sequenti libro nempe secundo, huius figuram aliam *Frangula* nomine exhibere, assumpta Figura Marth. nulla interim facta planta mentione, in posteriori figura in bacis fissuram eleganter ostendit. Scrupulosa profecto animaduersione, quæ si locum habet eodem errore culpandi Trag. Dod. Pen. Lob. alii quæ qui elegantis istius fissuræ non meminerit. Nobis sanè non placet in iconem Marth. vt iam diximus, ita opère apparere quasi gemellæ esset bacca. Nam quod Marth. scribit fructum per medium diuisum, adeo vt duabus simul bacis consistere videatur, quodam artificio simul coniunctis, existimamus ab eo non obseruatum nisi in sicca planta: tales enim apparent in sicca. At ipsemet C. Bauh. in expolito & recocto suo Marth. ponit iconem ex Taber. in qua nulla apparet fissura.

Fallitur quoque Marth. qui flores albos dicit. Nobis, vt iam plus satis inculcatum, in luteolum pallescentes obseruari.

Videtur *Thalius* duas species, aut varietates obseruasse in sua Hircynia. 1. Alnus hanc nigram, quam *Spöcher* ait vocari. 2. Alnum nigram pumilam, in Brockenbergi vertice: nisi id loci naturæ tribuendum videatur. In saxosis namque provenientes plantæ, vt plurimum pumilæ esse solent. Considerent diligentius qui ea loca adi-  
bunt.

Nascitur magna ex parte in siluosis, montosis, vdis, vt circa *Basileam* in monte *Mutensi* & *Aquacida* vulgò *Wasserfall* dicta, in monte prope *Krenschach*, & in *Le* rad. quoque. Prope

Montbelg. in itinere versus pontem *Vandancourt* in siluis: item inter *Arbouan* & *Adincourtium* pagos, inter sentes & fruteta Meridiem spectantia. Habetur & in horto E. C. Montb. nostra cura plantata. Geneuæ in monte *salena* obseruamus florentem Maio: in monte *Mutero*, fructu maturo Octobri. Geln. ait Septembri quoque fructum habere. Nascitur etiam passim in Bohemiæ siluis & nemoribus. Marth. Scribit Lob. obuiam paucioribus locis, nisi ad Septentriones, vt Angliæ, Germaniæ, & Northmanniæ siluosis & vdis.

Flauis huius arboris & medius cortex ritus cum aceto, & scabici illitus, intra paucos dies illam sanat & exsiccat. Et sique hoc experimentum singulare. Idem cortex in aceto decoctus putridis dentibus collutione prodest: nam & dolorem mitigat, & dentes ipsos purgat. Cortici vis inest non modica cum exolens, cum etiam astringens. Ideoque *Rhabarbari* modo alium deicit, & viscera roborat. Idem bilem & pituitam expurgat: quinetiam hydropicorum aquas ducit. Decoquitur cortex cum *Eupatorio* communi, *Pontico* *Ab-  
sinthio*, *Agrimonia*, *Cuscuta*, *Lupulo*, *Cinnamomo*, *Fœniculi*, *Apij* & vtriusque *Intybi* radici-  
bus, ad hydropem, matum corporis scabium, & *Ictericam*: daturque potandus ita affectis quin-  
que viciatum pondere, magno sanè auxilio. At-  
qui operæ pretium est, vt prius excrementi hu-  
mores, qui in ventriculo, & primis locis moris ye-  
nis, decumbunt, expurgentur. Soluti enim alium sine villo incommodo, belè iteù expurgans, ac  
roborans, adeo vt quidam, qui scythoso rectoris  
& *Lienis* affectu laborabant, hoc medicamento  
curati sint. Aperit enim omnium viscetum ob-  
structiones, & vasa omnia à crassorum excre-  
mentorum infarctu expedit. Extinctio cordis facultas  
est adstringens: intimo autem exsoluens. Vtque  
simul ab arbore delibrari debet, in ipso statim Ver-  
ris principio, ac deinde in vmbra licari. Siqui-  
dem viridis nullus debet esse vltus, quod vomitio-  
nes moueat. Bohemis vltus ejus vulgaris est. De-  
coctum quod hinc paratur, quiescat prius oportet  
antequam propinetur, duobus aut tribus diebus,  
quoultque flauis color in nigrum vertatur, aliàs  
vomitones mouere quandoque solet. Idem po-  
tum, vbi alium non exsoluerit, appetentiam pro-  
uocat, ob eam quam possidet astringendi facul-  
tatem. *Ad febrem quotidianam*. Cortex interior  
Frangulæ, *Absinthii*, *Cichor.* *Lupul.* rad. *Fœnic.*  
*Apij*, *Asparagi*, omnia simul coquantur, addito  
que *Cinnamomo*, *Saccharo*, *Oxymelite*, fiat potio.  
*Ad Tertianam*: Idem cortex coquitur cum *Endi-  
uia*, *Borrag.* *Cichor.* *Oxalid.* rad. *Fœnic.* & bibitur  
decoctum. Præ cæteris autem facit hic cortex ad  
*Splenis affectus*, coctus cum *Asplenio*, *Ruta* mu-  
rar. corticib. *cappar.* & *Fraxinæ*, rad. *Fœnic.* & *Pe-  
tros.* Atque hæc quidem potio, vt maximè non  
soluat alium, appetentiam tamen excitat: id quod  
non facit, si purget. Notandum tamen ante huius  
vltum, Venam, si opus sit, esse prius aperiendam,  
& corpus purgandum, vt dictum. Præstat cortex,  
Marth. iudicio radici quàm tunc detractus.  
Præcedentia de interiore cortice flauo intelligen-  
da: exterior enim qui nullius efficaciz cultello  
abradendus, retento flauo, exsiccat, & ad vltus  
reposito.

Hic, vt scribit Dodon. sicci temperamenti est:  
in vino maceratus aut cereuisia, deinde epotus,  
potenter vomitum mouet, pituitam & humores  
putridos contentos in ventriculo pellit. Interior  
cortex apud rusticos nonnullos in usu est.

Vires &amp;

vltus

Ad febrem

expurgen-

tiam

Fæperam.

Purgans

Hydops.

Icterus.

Viciatum

Viciatum

Observatio.

Obsert.

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

Viciatum

*Rusticorum  
medicina.*

№ 206.

*Dofus.*

Contraſca  
ſtem.

'Cause

*capillus gra-*  
*vis fluit,*

qui eius vtritur dilato, quando corpus expurgare cupiunt. Expurgant enim, vti dictum, tum crassos & pituitolos humores, tum & biliosos: & non modo per anteriorem sedem, sed frequenter etiam vomitione, cum magna ventriculi perturbatione ac molestia. Rusticorum ideo magis est medicamentum, quam vrbanoꝝ: & eorum qui crassi videtur ratione vtruntur, quam delicatè viuuntum. Plerique tamen cum Matth. & Camer. afferunt, corticem aridum mioriem esse, & minores molestias excitare: recenti siquidem ac nondum reficcato humiditatem quandam superfluum adesse, quæ toriones adferat ac vomitiones exciter, ventriculorum perturbet. Taber. ad duplum Rhabarbari dandum suadet. Sed malinus paulò inferius subsistere, si tam forte sit medicamen, vt ille ait.

In multis locis Saxoniae hoc tempore videntur loco Rhabarbari; recte Camer. quod interdum propter immensum pretium non cuius praescribi potest: possunt corrigi & castigari adiectione anili, cinnamomi, spicae, aut similium. Vulgus Silesiorum corticem luteum flore lactis incoquit, contra scabiem praesentissimum remedium.

Nouit tamen, inquit Schuuenckf. eius vsu Agricolas hydriopicos tactos & penè suffocatos fuisse repentina malignæ materiæ repercussione. Ea propter ab eius vsu abstinendum fundeo, nisi prius fuerit probè euacuatum corpus. Flores apibus grati. Folia lætam feruntur bubus, ac præcipuè vaccis p̄bolum, quæ horum pastu lac reddunt copiosius. Ex ligio digitas parant.

ALNUS NIGRA BACCIFERA,  
RUGOSIORE FOLIO,  
SEU MAIOR.

## CAP. XXXII. — 1.

Description.  
Erick.



Feb.

*Flo/cupls.*

*maro*. Folia, quàm in vulgari *Alno* nigriora, sul-  
cò ampliora, palmo longiora, duas vncias & 6  
missim lata, lubrotunda, rugosa, atrouirentia,  
splendida, crenata. Flosculi, biniflori, singu-  
laris ex petiolo non longo adhaerent, colore her-  
baceo, in quatuor laciniis mucronatis diuisi, to-  
tidem apicibus virefcentibus interiectis, stylo in  
trij cornicula extoriformi reflexa disco.

AnLonic. *Creutzbeer* seu Rh. mini Diosc. . species? Eius Icon huic nostrae quadraret, si bacca

numerosiores non essent simul iunctæ. Rhamnus esse non potest nostra Alnus quia non spinosa: is etiam suam spinosam negat, & tamen cum Rhano in idem cogit caput, nescit fortè quid scribit, nec cuius plantæ iconem exhibeat non enim describit.

Propè S. Hippolytum, Burgundorum asperis locis, montosis, Soli meridiano expofitus, promeruit. Obferuauimus etiam inter *B. m. & Lasse* ciuitatem Burgundiæ montosis locis ad Dubim, & iuxta caftellum *Meche* item inter *Lereual* oppidè E. C. Wirt. Burgundicum, & *Batline* eidem montosis & lapideis. Nec non propè *Cauernam* itam admirabilem *Passauerinam* in Eiusdem C. Wirtemb. ditione sitam, [in qua altiffimis æstatis tēporibus glacies concrefcit] quæ eidem Principi currum plenum reditu annuo debet Montbelgarum deferenda, ad vinorum refrigeria æstius, caniculae diebus : hye. ne verò liquefcit glacies, & cauerna calet, cum extrinsecus omnia rigent glacie ac niubus.

Aiunt S. Hippolitani ligna colligi ad puluerē  
bombardicum parandum, eorumque carbōnes  
ad eam rem vehementer commendari prædicāt.

## DAPHNOIDES ET LAVREOLA.

## CAP. XXXIV.

**A**Ntequam Laureolan vulgurem folio perpetuo proponamus, quæ accedit ad Daphnoidem Veterum, sit non eadem: placet prius generalia & Veterum placita de ea præmittere.

De ea igitur sic scribit Diosc. D. phnoides ali-  
qui *Eupetrum*, aliij *Chamedaphnion* alij *Elaion* n o-  
cant. Exiguus frutex est, *Quercus* *puberula*, tra-  
mis mulis à medio sursum versus tori modo flex-  
uilibus & obsequiosis, iisque foliosis. Ramulos  
vestiens cortex supra modum viscosus est: as-  
tia sunt Lauri, verum molliora, fractuque contu-  
macia, quorum gustatu os fauceque mordentur  
& accenduntur. Flores candidi: fructus cum e-  
maturuit, niger: radix superuacua. Narcitum  
in montosis. Sed in Diosc. lectionis varietas oc-  
currit. *Basil.* & vulg. codices folia huc *Lauri*  
*phnoides*: Ver. cod. auctore *Lacuna phnoides* habet,  
quod magis placet. Nam & *Quin.* quoque *Daph-*  
*noides* clariorem, mollioremque quam *Laurum* fo-  
lio esse prodidit, vt mox patebit. *Q. in* & *Serap.*  
*phnoides* potius, quam *phnoides* legisse discussi ad-  
uertit eius interpretationem tenaciora conuersit.  
Marcell. validiora vertit, mimimum veterem lec-  
tionem secutus, quæ naturæ foliorum *Lauri* auro-  
lugo dictæ magis conuenire videtur.

Plin. l. 16. c. 4. de Lauri generibus tradens : Id  
quoque, inquit, quod Diphnoides vocatur genus, <sup>rele</sup>  
in nomen am. bitu est. Alij enim Pelagu <sup>rele</sup>  
Euperalon, alij Stephanon Alexandri vocant. Et  
hic frutex est ramulos, crassiore, [graciliore, Dal.]  
ac molliore quam Laurinis folio, cuius gustatu  
acceditur os atq; guttur, baccis è nigro rulis. Idè  
& alibi præti hæc nomina & siluestrem Lau- <sup>Sibi</sup>  
rum dici ait. Quidam legunt: baccis nigris & ru- <sup>ru.</sup>  
lis: nigris vel rulis : Vt. Dal. At si vulgatam le-  
ctionem retinere lubeat, dicere quas Plin. de  
baccis nondum perfecte maturis intelligendum  
esse aliqui nec ne nec Dioscoridi consentiret.

De Laur. ola nihil Theophrastus, nisi fortè hæc  
 quæ habetur l. 9. c. 15. Nascitur apud Arcades  
 Elleborus uterque, albus & niger item d. 1. m. 3. Δα-  
 γγοειδής & κρότος : ( Sic enim legimus & distingui-  
 mus apud Theoph. ) id est Daucus, Daphnoides  
 croceæ:



Crocea: Gaza nō de croceis non separat à daphnoidē, sed Dauci siue Pastinacae speciem facit. Celsus quoque ad Dancum siue Carotam refert, ut dicitur suo loco de Pastinaca: Marcell. & Curtius, ut in sequentibus patebit, intelligunt Daphnoidem, diuersam omnino plantam à Dauco.

Hist. Lugd. scribit: Albam seu foeminam Laureolam nostram, Daphnoidem alteram esse ignoraremus, si Theoph. aperte non docuisset Daphnoidis esse genera duos; fructu praecipue distincta, qui niger in altera est, in altera Croci colore, nempe itaminum, quae à flore Croci auulsa reconduntur, non autem Croci liquore diuti, ut meritis haec Daphnoides, crocea nominari possit. *Hæc illa:* Nobis autem nondum occurrit adhuc locus, ubi Theoph. meminerit Daphnoidis nigrae.

Sed quam aut qualem Daphnoidem intelligit Galenus? quando l. 6. simpl. sic ait: Chamædaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem per similes Daphne Alexandrinae sicut fanē & quod Daphnoides nuncupant. Certè non existimamus eius germina posse edi, si eandem cum Dioscorideā intelligit. Dalech. sententia fuit Galenū similitudinem Daphnoidis cum Chamædaphne & Lauro Alexandrina ostendisse absque Diosc. testimonio, sic tamen ut ei fides constet, si vel *daphnoides*, accipiamus non quidem vicerantem & vrentem fructum Laureolam nostram, sed Clematiden Galeni secundam, quam paulo post *daphnoides* etiam vocari testatur. Ambabus enim vis est astringens & sicca. Vel si parem vtriusque vim, Chamædaphnes, inquam, & Daphnoidis cathartica, in prouocandis tantum mensibus intelligit: mensis enim & hæc & illa ciet. Proprio capite ostendimus clematiden secundam speciei dici à Diosc. Gal. & Plin. Daphnoidem.

Apuleius more suo nominum fasciculum confarcinat, sic scribens c. 58. Herba Victoriola. Eupelios Græcè, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetolon, Diglossos, Nycophyllon, Pelleon, Idea Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina Daphne, Mitrion, Danaë, Stephane Alexandru, Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis, Latine Peruinca, Victoris folium, Laurus Alexandrina, Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris vocatur. Et addit frutex est sapius cubitalis, folijs vt Myrtus, in omnibus exēpl. sine intellectu legebatur, mutia: nos reddimus Myrtus. Humelb. ] paulo maioribus, & non infractis, id est, non facile fragilibus, sed lentis. Hum. ] gustu remordentibus & incendiosis. Herba Victoriolæ folia pinfabis, & succum eius cyathis duobus dabis cum melle bibere ieiuno, mox phlegmata interciderit. (hoc est, dissiciet, dissipabit, deducet, purgabit. Hum.) Quod si prædictorum nominum rationes scire cupis, tradit eas idem Humelbergius in suis ad Apuleium notis.

Nobis fanē Apul. diuersas plantas confundere videtur: inter alias Daphnoidem, Laurum Alexandrinam & Peruinca, cum in nominibus, tum in descriptione. Potissimum tamen videtur nobis scribere voluisse de Daphnoidē, quod apparet ex descriptione cum ait, folia incendiōsa: & ex viribus, si interciderit interpretandum vt Humelbergius vult. Fuchs. tamen aliter sentit: Victoriolam Apulei existimat Laurum Alexandrinam, & hanc cum illa confundi ab Apuleio. Profecit Apul. posse creare temerarijs magnum periculum vitæ. Si intelligit Laurum Alexandrinam, de eius succo dari posse concedimus: verum non duos

cyathos, vt ille vult. De daphnoidē verò nequaquam. Quis enim plenos præbeat cyathos eius succi, cuius foliorum aut corticis masticatum absque magno incendio lingua & fauces ferre nequeant? Verisimilē in Apuleium retorqueri potest, quod scribit in præfat. sui libri aduersus medicos: nimirum eius scripta de medicaminibus herbarum, earumque viribus, esse vendicationes potius quàm curas: ipsūque inertia plerūque & imperitiā enixum, lucipetam verum, aut sine literata scientia, de qua so iactat, temerarium nuncupandum, quique adeo ipsi sauior morbis existat. Ipse enim tantā & tam supina quadam imperitiā & temeritate, confundit plantas & earum vires salubres cum insalubribus, cum immenso vrentium periculo, vt ex hoc loco & alijs quamplurimis hoc opere detegendis patebit, vt satis fuisset, si obsceni sui Alui metamorphosin suæ fortis hominibus explicasset, quā in re tam sacra, hominumque vīsibus adeo necessaria temerarium & iactabundum suum iudicium & stylum adhibere. Apagē verò pestilētes hos scopulos. Nos certiora meditamur turioraque. Discant verò interim herbarum & medicinarū Studiosi, nullibi huic herbarum alieno Commentatori temerē fidendum esse, donec illud clariū & ad oculum cunctis patefaciamus.

Ipse verò etiam Humelbergius nobis non videtur melius intellexisse historiam Daphnoides, quā Apuleius, dum asserit, Laureolam & Zyland esse, & talem quidem, qualem Apul. describit, ecur non declarat quā Laureolam intellexerit, folio perpetuo an deciduo? Quæ proprie Laureola dicitur, ignota est Cordo: quæ folio deciduo, eidem est Thymelæa, Fuchsio verò Daphnoides & Zeilant, quā suspicamur Humelburgium intelligere. Quicquid sit, neutra conuenit cum descriptione Apulei. Neutra enim folia habet Myrto vllatenus similia: per Myrtum autem apud Apuleium intelligimus siluestrem, id est, Ruscum: quæ similitudo cum Rusco non tribuitur à Veteribus Daphnoidi, vel Laureolæ, sed Lauro Alexandrinæ: præterea in Laureola folio deciduo, folia non sunt lenta, sed facile fragilia. Neutram Laureolam coronis adhibitam fuisse censemus, & Laurum Alexandrinam potius in eum vsum vocatam, quā malignæ istæ plantæ: Hypoglossium malè dici de Daphnoidē, clarum nobis videtur. Si quis consideret Apulei caput 27. de Chamædaphne, hanc eum à Daphnoidē distinguere vix animaduertet. Carpophyllon non potest dici de Daphnoidē, quod id nomen proprium sit Lauro Alexandrinæ & Rusco. Hæc fructum supra folium gerit; non illa. Peruinca quoque vocabulum minime Daphnoidi conuenit, vt apparet ex Plin. sed clematidi secundæ, quæ etiam Chamædaphne dicitur. Cur Apuleius Mustellaginem terrestrē vocauit suam Victoriolam, cum tamen aperte scripserit c. 27. Chamædaphnen dici Italīs Mustellaginem?

Sed quid multis stirpium ignorantissimo refutando inhxeremus? Audiamus Serapionem. Laurus Daphnoides: Est & Gar species alia, quæ dicitur Daphnoides &c. ex Diosc. Ortus eius alij & rectius. Virtus eius ] est sicut Chamædaphnes, & ex Galeno.

Hermol. de Daphnoidē pauca habet hæc. Daphnoides & ipsa Laurus silu. Herbarij nostri Laureolam & hanc & Chamædaphnen Diosc. vocant. Folio huius crassiora Plinio quā Laurus, graciliora Dioscoridi: cuius verba mihi nō videntur, quibus dicitur: Alypo similem hanc herbam

C. n. s. r. d. Apulei.

Humelberg. taxatur.

Neque car. pobyllon.

Gar.

Laurus silu.

*Alypoides.* esse, floribus Nymphaeæ. Inuenio & qui Alypoides hanc vocent. *Hæc ille.* Verum non docet quā plantam per Laureolam intelligat.


Non Laurum, inquit Marcell. in Diosc. sed Lauri formam & speciem: neque eam toto corpore, Verum in folijs & fructu tantam habentē herbam Græci *Daphnoides* dixerunt. Laureolam vocant. Explosimus quod à capitis principio apud Diosc. statim legebatur Alypo simile Daphnoides: & florem Nymphaeæ habere: & quod sequitur in medio floribus esse Cono simile quiddam, in quo semens quoniam non responderent Daphnoidis historiæ, & nullibi in antiquissimis Græcis & Latinis ea legerentur, & paulo post de flore eius, legitimo loco ageretur. Nasci multum Daphnoides hoc Theoph. in Arcadia testatus est, numeraturque ab eo inter ea quæ præcipuam purgandi vim habent. Ceterum non videmus cur Marcellus Daphnoidem dicat herbam, cum existimet Laureolam, quæ frutex bicubitalis & maior interdum, & ipse Diosc. dicat *δαιμονιον*. Addendum & illud: Daphnoidem à Theoph. nō solum numerari inter purgantia, sed etiam inter alia non purgantia. Ruell.

*Ruell. raxar.* Ruell. Daphnoidis historiā non illustrat, sed cum Hermolao, cuius consuetudo sibi more verba transcribit, non citato eo, dicit Herbarios nostros appellare Laureolam, eiusque descriptionem subiungit, non ad ipsam plantam factam, sed ex Diosc. inutiliter repetitam.

*Stephanus Alexandri.* Curtius notat Alexandri Stephanon à nonnullis vocari, quod eo Alexander Magnus coronari solitus sit. Hic velimus Antiquitatum studiosos exerceri, nos certe ipsi, absque auctore, non credimus. Sic & de eadem Daphnoide ex Veterum placitis historiā pangit, ac si sua essent, non dignatus eos citationis honore, quod plagiarium est. Sed quid ille curat, qui passim plagio ita attritus, ut iam dudum durissimum contraxerit calum. Nunc Laureolam nostram vulgatam describamus.

#### LAVREOLA SEMPERVIRENS, FLORE LVTEOLO.

*Descriptio:*



*Ruell.*

*Flares*

la, nec per hiemis asperitates caduca, ex angustiore principio cœu ceruice sensim dilatata, tandemque in mucronem desinentia, crassa, glabra, nigricantia, splendens, Laurinis ferè similia, sed mi-

nota, inter quæ longiusculos, graciles, cautos & multos stellatos profert flosculos luteos, [Dod. è virore subcandantes: Lob. ex herbaceo albos vel luteolos] succedentibus baccis glomeratim proximè ad ramos coherentibus, Juniperinis paribus, nonnihil oblongis, primùm viridibus, per maturitatem nigris, nucleo intrus duro, cannabis femine paulò longiore, medullâ interiore candida. Radix subest in aliquot partes diuisa, longa, crassa, lenta, quæ difficulter euelli potest. Sapor toti frutici feruidus.

An Hermol. Herbariorum Laureola, cuius verba paulò antè citata.

Scribit Marcellus Daphnoidem Diosc. nostræ ætatis peritiores Herbarios priuam Laureolam vocare, ac ostendere Laurinis folijs surgentem à terra surculosum fruticem confertis coaceruatque sub folijs seminibus, quæ Laurinarum baccarum figurâ sunt, nigris maturitate. Florem videre non licuisse, Quod si Marcell. intelligit Laureolam quam nos hîc, hæc repugnant. 1. Quod non sit herba, qualem ipse dixit Daphnoidem (ut antè dictum) præter tamen Diosc. 2. Flores non candidi. 3. radix non inutilis, quibus notis designatur à Diosc. Daphnoides. An etiam huius nostræ folia molliora sunt Laurinis, ut de sua Daphnoide Diosc. ait, dubitamus.

An Ruell. hanc pro Daphnoide & Laureola Herbariorum intellexerit, vix sciri potest, quia Laureolam imaginariè, nec sibi visam aut cognitam describit, ut dictum prius.

Candidè & apertè Cordus *de vniuersis* Recentiores Laureolam vocant, quæ in nostris omne non habetur, nec ego quæ sit compertum habeo. Hic Germanus fuit sicut & Cornar. ipsi coræus, qui tamen duobus distinctis locis apud Diosc. magna securitate tradit. Daphnoide Officinis Laureolam vocari: Germ. *Zeitlant*. 2. cap. seq. Officinis & herbarijs Chamædaphnen etiam Laureolam vocari. Et postea inferius alio cap. ait, esse hodie apud suos, qui cum Daphnoide Chamælæam confundant, itidem Zeitlant appellantes: qui sanè non ritè nobis videtur distinguere has plantas: & ut verum fateamur, nescimus quam Laureolam intelligat pro Daphnoide.

Monachi quoque Laureolam vulgò dictam Daphnoidem vocitant. Ac eos (inter quos Pandectarius) hallucinari scribunt, qui Laureolam volunt esse Mezeronis speciem.

Quin & Anguil. Daphnoidem ait hodiè vocari *Laureolam, Oliuellam, Oriolam*, & notissimam esse in Italia.

Chamædaphne, inquit Matth. quam Laureolam marem plerique vocant, folijs ac fructu à Daphnoide non longè differt: verum hæc tantum intercedit differètia, quòd Chamædaphne singulari rectoque caule constat, cui folia circumquaque prominent, adeò ut in cacumine in orbem umbellæ instar diradientur, semine inde prodeunte Daphnoides modo. *Hæc Matth.* cuius icon habere videtur aliquid commune cum Laureola folio semper virente. Sed quæ hic tradit non distinguunt à Daphnoide. In Epit. nullam ponit descriptionem præter Diosc. & iconem, scribens Italis dici *Laureola minore*. In Com. cum magnis com. Lat. & Ital. aliam ponit iconem cum folijs acutioribus & tribus virgis additis floribus. In hist. Germ. omittit & iconem & descriptionem Diosc.

Camer. in sua Matth. epitome posuit iconem iam dictam cum tribus virgis, addens, sibi reperi- tam similem aliquando plantam in montibus



Silefæ altissimis versus Morauum, sed folijs crassiss, duris, & caule factis densis, baccis nigris. Quapropter verisimile esse, potius ad Daphnoidem referendam: nec immerito de hac stirpe, tanquam incognita, nonnullos dubitare. Idem in hist. Germ. ait, provenire cum baccis nigris, folijs latis, in quidam montanis locis prope Lacum Lemanum & ad Rhenum: videri speciem Chamædaphnæ Marthioli.

C. Bauh. apud Matth. Chamædaphne, inquit, Marthioli: Daphnoides seu Laureola Lugd. de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen ad Daphnoidem referunt: suspicantur Matth. Laureolam Offic. exprimere voluisse. *Hæc ille: vbi incuria typographica pro Chamædaphne, posita icon Lymanachæ siliquosæ speciosa flore.*

Vt liberè dicamus, quod sentimus, videtur nobis Marth. non novisse discrimen inter Laureolam folio deciduo, & folio semper virente, atque adeo nescivisse, quas plantas suis nudis iconibus proponeret. Si pro Chamædaphne intelligit Laureolam semper virentem, id fit cum summo periculo. Quis medicinæ peritus volet exhibere ad ardores stomachi mulcendos, & sedanda tormina, menses & virinas ciendas, & in pennis (ad quæ omnia Chamædaphne commendatur) tam feridam & malignam stirpem, qualis Laureola: Ea præterea non responderet descriptioni: fructus non est *ἰσχυρὸς*, ruber: nec *καρπὸς τοῖς φύλλοις ἑπικρανεύς* habet.

Lacum. iconem Marth. proponit nomine Chamædaphnæ, dicens, vocari Laureolam marem, non demonstrans quæ sit, aut qualis. *Cactus cactus sequitur.*

Eadem censurâ dignus Lonic. qui Chamædaphnæ iconem Marth. proponit, nihil addens de suo: sed cautè evitavit hos scopolos: melius tamen suæ existimationi consuluisse, si Diosc. & Matth. citasset, ex quibus sua assumpsit & transcripsit nullo plagij metu. Videri nempe voluit probè novisse sibi ignotam stirpem.

Dod. eandem facit cum Diosc. sic tradens: *ἡ δὲ ὀνόματι* Latini posteriores Laureolam dixere. Vocatur & *εὐπείλαιον* ac *πέραιον*. Huius baccas Piper montanum ab Italis nuncupari, sunt qui affirmant: alij à Germanis etiam *Zeilande* dictum volunt.

Idem putat Theoph. Cneorum nigrum esse posse, folio siquidem Myrtum satis referre: (quod ei nunquam concesserimus) & ramosam, [stirpem etiam vnicaulis est] lentam, obliqueosamque stirpem, albæ radicis, absque odore, fructu nigro, quæ potissimæ notæ sunt Cneori nigri Theoph. Nos pro eo etiam proponemus suo loco. Placet aliqui Dod. figura, quam hic proponimus, quanquam magna ex parte vnico caule à nobis sit conspecta.

Gesl. in horto ait Laureolam seu Daphnoidem spontè circa Lacum Lemanum nasci folijs ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis. Item in append. Daphnoides, inquit, è Sabaudia missum, vbi ad Lacum Lemanum spontè provenit, autumno superiore plantatum viret adhuc, sed non satis lætum & tenuioribus folijs, quæ ad Daphnoides nostrum vulgare ferè accedunt. Quibus verbis sanè duas species insinuat, hanc ut putamus, quæ Sabaudica, & per vulgare eamque folio deciduo.

Croneimb. ad pilulas Mezereonis Pandectarium & Dinum reprehendit, qui Mezereon putarint Laureolam esse, ut copiosius postea dice-

mus in hist. Laureolæ folio deciduo. Nos verò per Laureolam cuius mentionem facit Cronenberg, existimamus intelligendam, quæ perpetuo folio.

An eandem intelligit censor Apollo quando ita inquit Rad. i. Serap. & Mesue non implicant cū Mezereo Laureolam & Loriolam vulgi, cuius historiam reddidit Diosc. l. 4. Daphnoidem dictam non admiscet: quanquam Marth. nescio quâ mente huic capiti insitam asseverare audeat: eius enim feminiscitur Serap. cap. de Lauro: Mesue cōtinet &c. Præterea in commento Daphnoidis, Marth. ut etiam Fuchf. aliud esse Mezereon à Chamæla scriptum reliquit: huius verò sententiæ immemor, cap. de Chamæla, idem esse Mauris Mezereon, quod Chamæla, Thymelea ac simul admixta Laureola, comminiscitur.

Idem Apollo rad. 10. Daphnoides Offic. Laureola ex Diosc. Laureola femina medicamentariis. Verum Apollo ita irradiat nobis, ut non possumus asserere, quæ sit eius Laureola, nedum intelligere de qua planta loquitur.

Lob. & Pen. Daphnoidis siue Laureolæ vt nomenclatio, sic natura profum Pusillam Laurum imitatur, vt plebecula vix conspectam dicitur Laurum. Vbiuis fermè Germaniæ, Galliæ & Angliæ, præferrim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimis quam nota, ut mirum sit Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse, certo indicio ignorationis: quippe figura quam nullis floribus dat, fortè Mezerei Germanici furculum refert potius quam Laureolam.

Lob. Obs. Daphnoides siue Laureola, Germanicè *Zeiland*: Gall. *Laureole*, Ital. *Olivella*: perperam Thymelea Tragi. Sed fallitur Lob. non enim Tragus hanc posuit de qua hic agimus pro Thymelea, cuius nec icon nec descriptio hanc nostram ostendit. Clusius scribit Pyrolæ fruticantis folia carnosa, supernè saturatius virentia & splendentia Chamædaphnæ, quam vulgus Laureolam vocat, folijs, formâ & magnitudine propè similia.

Schuenckfeldius Chamædaphnen Clusij quæ perpetuo folia est cum alia confundit, vt postea dicitur.

Hist. Lugd. tradit Dale champ. cum Dodon. Laureolam Offic. siue Laureolam marè Diosc. Daphnoidem esse rectè censuisse, quæ Marth. sit Chamædaphne. Hisp. *Loiola*. Iconem quoque habet Chamædaphnæ Marth. titulo Daphnoidis seu Laureolæ: habet & aliam titulo Daphnoidis seu Laureolæ cum flore: & cap. sequenti pro Laureola folio deciduo cur posuerit iconem Dodon. titulo Laureolæ cum fructu, nec nos scimus, nec illa excusabit: erat enim ponenda pro sempervirente. Sed ita evenire solet de sibi incognitis commentantibus.

Tabern. *Kellerhals* Germanicè vocat.

An Cæsalp. Daphnoides Italici Laureola dicta? Gignitur magna ex parte in silvis ac montibus vmbrosis incultis & frigidiusculis. Tamen in Italia circa Patavium observavimus inter montem Gemulam & di-venda, necnon in huius descensu versus Balneum Apōnense, sed quæ & ipsa loca frigidiuscula sunt respectu reliqui tractus. Florebat mense Februario stoculis parvis luteolis stipata. Vidimus etiam Patavii, Veronæ, Ferrariæ, & Bononiæ in hortis cultam. Genetæ circa Castellum *la Bastie* dictum iam Decembri florere incipientem, vbi & Feb. & Martio aliàs florere solet Basileæ prope Dornacum, & in horto D. Th. Zuing.

*Laureola non est Mezereon.*

*Laureola vulgi.*

*Marth. reprobat.*

*Fuchf. nos.*

*Apollo nos.*

*Marth. nos.*

*Tragacella contra Lob.*

*H. Lugd. non.*

*Daphnoides Cæsalp.*

*Locus.*

*Tempus.*

Satio.

Zuingeri, ex quo & Montbelgardum in hortum translulimus, vbi & floruit & baccas tulit. In Burgundicis etiam montibus aliquot obseruauimus, vnde etiam transplantauimus. Iam prius dictum apud Lemanium lacum reperiri, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosâ locis. Flores, inquit Dod. præmaturè germinant, paulò post Autumni æquinoctium: hyeme aut primo vere perficiuntur: fructus Maio & Iunio Lob. autore: media ætate etiamnum virent, demum æstatis fine & aduente Autumno maturitatem assequuntur, & nigrae fiunt. Tota hyeme viret, foliaque obdurant, vt in cæteris stirpibus perpetuò virentibus.

Vires &amp; vñs.

Et si pro certo & indubitato asserere non possumus hanc esse ueram & genuinam Diosc. & Plin. Daphnoidem, reclamantibus superscriptis aliquot notis: quia tamen vires ab iisdem traditæ apprimè huic conueniunt, lubet eandem hic recensere. Folia gustatu os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia potu pituitosa per alvum deiciunt: vomitus quoque ac menses crient: quin & commanducata pituitam à capite extrahunt, & sternutamenta mouent. Ceterum & quindena ipsius baccæ pota, purgat. Paulò aliter Plin. Daphnoides, inquit, [siue his nominibus quæ diximus] sylvestris Laurus prodest, alvum soluit, vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinae denariis, purgationis causa sumuntur.

Purganti.  
Vomitoriis.  
Menstr.  
Capitis pituita.Dolens Oculum  
lento defen-  
ditur contra  
Serae.

Sunt tamen qui Plinii lectionem ad Diosc. aptadam & emendandam censeant, vt Sarracenus. Nos sanè in Plin. nihil præter rationem dictum inuenimus. Nam & stomacho incommoda hæc plantam censemus, insignis suæ acrimonie & ardoris gratiâ, & quinas baccas malumus quàm denas, has quàm quindenas, purgationis ergo exhibere: quod vel paulò maior dosis in talibus nobis semper suspecta videatur, præsertim cum Dei beneficio mitiora tutioraque habeamus.

Cautio.

Tèperam.

Correctio.

Laureolam certè Dod. in Hist. Gall. calidam & siccam ad tertium gradum, accedentem ferè ad quartum tradit, subuertere admodum ventriculum, inflammare, lædere, & adurere partes internas. Folia eius corrigi & ad sumendum commodiora reddi eo modo quo Chamæla. Idem in Hist. Lat. temperie & facultate similè facit Chamæla Germanicæ ca vniuersa suâ subitantiâ acré & feruidam esse. Vt non temerè sanè hanc præscriperimus, propter insignè eius acrimoniam.

# LAUREOLA FOLIO DECIDVO, SIVE MEZEREON GERMANICVM.

## CAP. XXXV.

**Descriptio.** Qvæ verò deciduo est folio Laureola, frutex est interdum ad trium cubitorum altitudinem excrefcens, radice in aliquot partes diuisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiore, longa, atque se demittente, albâ; ex qua assurgunt plerumque virgulæ singulares, lentæ, teretes, tenues, obliquiosæ, cortice duplici rectæ, exteriore cinereo, tenui, fragili, interiore exteriùs virente, interiùs albicante: valdè lentæ, & fracta còrumbaces, lanuginem quandam bombycinam, dum diuelluntur ostentantes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ pauca præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul iuncti, ex nodulo

Radix.

Virga.

Cortices.

Lanugo.  
Lignum.  
Flores.

anted folia procedunt pulchelli, ex rubello purpurascētes, colore ad flores Persicæ accedētes, oblongi, in quatuor foliola mucronata reflexa diuisi, odore suauj: in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plarūque plura simul, colore herbaceo, Laureolæ folio perpetuo accedentia, molliora, nec vt illa, splendidantia. Baccæ cum maturitate rubentes, quæ resiccatæ, nigricant, (inquit Dod.) quarum interior nucleus Cannabis semini similis, medulla candida. Tota planta vt odore graui est, exceptis floribus, ita sapore acerrimo & vrentissimo. De hac Ruellius sic scribit: Chamælam Romanam Cilibracam, alij Oleaginem vel Oleastellum vocant. Olea Cilibraca vocatur autore Colum. sed Calabrica legendum puro. Recentiores Oliuellam appellat. Otic. Mezereon, quasi lethale in & viduiteram. Oliuella furculosa fruticat ramis palmaribus, folijs Oleæ similibus, tenuibus, amaris, quæ gustata linguam acriter mordent, faucisque ac guttur vellicatu laceffunt. Lactè manat copioso, animalibus cunctis intacta. Baccas fert si benè memini virides, per maturitatem ex parte rubescentes. Ex hac granum Cocci plerique falsè nasci existimauē. Recentiores Chamælam cū Thymelæa, & vtramque cum Daphnoide turpiter confundunt. Hæc ille: qui dum alios reprehendit, seipsum accusare videtur: dubitamus an vllam harum plantarum nouerit. Fortè intelligit nostram hanc Laureolam folio deciduo. Non conuenit tamen, quod ait lactè manare copioso: nec etiam Chamæla est, multò minùs Olea Cilibraca Columellæ. Quando folijs Oleæ dicit, & postea baccarum rubrarum meminit, Chamælam cum Laureola confundens, neutram sibi cognitam fuisse satis clarè prodit.

Brunfels. nescit quæ scribit Tom., dum Laureolam Teut. Bellerophals dici ait, Græcis Daphnoiden, flores illi candidos radicem inutilem: passim per siluam. Et cap. sequi. Thymelæam vel Coccum Cnidium quoque Bellerophals vocat, floribusque esse candidis. Quis hanc incuriam ferat? Dioscoridis descriptiones sublegetis cum Bellerophals Germanorum confundit, nec docet quæ ea sit: nec existimamus reperiri Laureolam flore albo in Hircynia. Vbi quis fide dignus mouerit, aut miserit, credemus.

Cordi opinio non opus habet longa refutatione: ipsa per se satis ruit, quando apud Diosc. tradit Thymelæam quoque Mezereon & Coccognidium, & grana quoque Mezereon vocari: nimirum nostram Laureolam vult esse Thymelæam, & seque cap. hanc fruticem esse dicit quem Germ. Zebast & Bellerphals appellant, ex quo Granum Cnidium colligatur, quod etiam Coccognidium vocetur. Quasi verò.

An Cornat. Thyracæa ex qua granum Cnidii, oñc.

Folia.

Baccæ.

Nuclei.

Odor.

per.

Cham.

Cilibra.

Olea.

Cnidium.

Mezereon.

Ruell.

preh.

repr.

tur.

Mol.

eius.

Brun.

forn.

Fru.

incur.

Cordi.

erron.

Thym.

Mezereon.

Cocc.

dum.



offic. & notum & in usu: sanè videtur esse: nam addit, Barbara voce Mezereon, Germ. *Kellerbale* dicitur: fortè ab eo quòd collum, id est, fauces ostendit & vrit. Sed cèpiat. Differunt enim multum Thymelæa & Mezereon, quo nomine à Scirapione & Mesue vocatur.

Tragus horrenda nomina tribuit: Ex mesue dicitur, infit, *Rapiens vitam: faciens viduas*: (sic & meliora sperantibus per accidens prodesse posset, si iocari liceat) *Seidelbass* aut *teuffraut* Germ. Baccas Asi baccis confert: sed non probatur nobis quando folia per omnia Ligustro aut Oleæ similia tradit: immò vix vllam similitudinem aduertimus, quæ dici mereatur. Neque etiam est Diofco, Chamelæa, vt sibi persuadet. Cur verò apud eundem huius Laureolæ alia icò posita sit, sub titulo Thymelææ, Zelandi & *Kellerbale*, nos latet: quam autem plantam suspicemur cum intelligere paulò post dicemus.

Neque concedimus Fuchsiò huic, (quam *Seipio* vocat, Daphnoidem, offic. & Herbariorum Laureolam): omnes Diofco. notas præter floris colorem conuenire, vt ille scribit: quia Diofco. suæ tribuit folia *ὡς δρυϊνάς*, fractu contumacia: talia non sunt folia huius nostræ: nec habet *ἔσπερον* *ὑβήκας*, fructum nigrum, sed rubrum, ac potius coccineum: folia quoque vix propriè Lauri folia dici posse putamus. In eodem censura dignum, quòd, quam priùs fruticem dixerat, postea in annot. herbam vociter facientem viduas. Dubitamus quoque an hæc fuerit Offic. Laureola. Probamus quòd taxat, mirum in modum errare Officinas, quòd folijs Daphnoidis pro Mezereone vtantur: & eius fructu pro Cocco Cnidio, qui Thymelææ fructus est Thymelææ verò non esse Laureolâ hodiè appellatam herbâ ex eo colligi potest, quòd Diofco. autore Linum nonnullis nominata sit.

Matthiolus, vt passim varius à seipso & fluctuanti similissimus, ita & in huius plantæ historia, sic ut ex diversis eius editionibus & historis patet. Videtur itaque Camer. nō accipere pro Daphnoide Matth. nostram Laureolam folio deciduo, sed fortè eam quæ est folio perpetuo, vel æsam aliquam. At C. Bauh. apud eundem ponit eam quæ est folio deciduo.

Quod ad nos attinet, satis colligimus ex ipsis Matth. verbis, ei non bene cognitam habere, sed ac ab eo confundi, quamvis eius icones & descriptiones meliùs cōueniant cum nostra Laureola folio deciduo. Reclamant tamen notæ quedam ne sit Daphnoides Diofco. quicquid dicitur Matthiolus, sicuti antè dictum aduersus Fuchsum. Cur verò folia in eius edit. Germ. dicantur viscosa, seu glutinosa, ne suspicari quidem liceat: in neutra Laureola hæc obseruauimus. De Amari quoque sententia omninò falluntur, qui Daphnoidem Laureolam dictam Mezereon esse credunt. Esse enim, inquit, Laureolam herbam siue fruticem [differunt hæc duo] cui flores albi purpurascetes insunt, & eam pharmacopolas omnes satis cognitam habere. Sed an ipse etiam Amatus probè cognitam habuerit vtramque Laureolam & Chamelæam est cur multum dubitemus. Scribit enim L. A. *χαμαίλεα*, Lat. Oleastellum, Arab. Mezereon, vulgò Mezereon, Gall. *Bays gentil*: Non describit. Nomen Gallicum conuenit Laureolæ folio deciduo: figura quæ apposita, est alterius plantæ, de qua non videtur locutus Amatus, nempe Chamelææ tricocca, de qua postea.

Lacuna Matthioli finia diuersam ab eo habet figuram pro Daphnoide, quæ potius semperiuirentem Laureolam exprimit, quam hanc: interea tal-

men Matth. imitatus, vel potius, more suo, ex eo transcribens ait, Daphnoidem nonnullos, vocare Laureolam fœminâ. Aliquos confundere cu Mezereon, quòd non differat à Chamelæa Diofco. Sed faciliè patet non oculatiorem fuisse magistro suo in istarum stirpium dignotione ac historia.

Piper montanum, infit Arguil. quod quidam existimant Chamelææ, sine dubio. est Chamelææ, potius dixerim Coccum Goldian Theoph. Nos de Cocco seu Grano Cnidio Theoph. poitea trademus.

Dodo. vocat Chamelæa Germanicâ. ac videtur ei esse Cneorum album Theoph. nihil tamen affirmare posse dicit propter breuitatē. Ast qui Cneorum album Theophrasto candido dicitur folio, figura quodammodo Oleagineo simile, vix concesserimus nostram hanc Laureolam esse Cneorum, licet id sibi persuadere videatur Dod. dicens non multum dissimilem esse Oleæ. At nos multum dissimilem dicimus. Etli etiam similis esset, desiderantur & aliæ adhuc notæ. Et vt reliquas omittamus, quis, nisi luscus fortè aut parum oculatus, Laureolæ folium candidum dicat?

Negar Gesnerus in hortis, Piper montanum Italis dictum, & Germ. *Zyländ* etc. Laureolam vocari: cui sanè haud grauius subscriberemus, nisi iam dudum apud omnes penè Herbarios istud nomen inoleuisset, & in quibusdam cum Laureola haberet similitudinē. Alioqui non semper uir est, quā in re differat à Laureola æquē ac Lauro temperuissentibus. Quapropter & ipse quoque Gesner. alibi non vno loco, latè vulgi incedens viam, odò Daphnoides nostrum vulgare, modò Laureolam vulgarem, modò Daphnoidem Fuchsi vocitat, Thymelææ tamen speciem potius esse, iteratò diuersis locis inculcat.

An Apollin. Rad. ro. Chamædaphne, Laureola etiam medicamentariis dicta, eaque mas? nimirum ita irradiat nobis more suo ambitiosis suis radijs, vt non aysimus asserere, nec alius fortè id faciliè ex eius verbis queat, num hanc intelligat vel aliam: non sine suspitione ipsummet id neceuiisse.

An Altomari de med. c. 91. Mezereon seplasia: riorum communiter dicta, & propriè ea, quam Diofco. nuncupat Chamelæam, vt ille vult, qui ex ea parat pilulas, quas summè laudat ad eductiōnem aquarum. Si hanc nostram intelligit, fallitur quòd Diofco. Chamelæam putet.

Cronemb. l. 5. comp. ad Pillulas ex Mezereon Mesue: Mezereon, inquit, frutex omnibus officinis & quibusdam alijs Almezereon vocatus in magnam controuersiam agitur, dum quidam Chamelææ Diofco. alij Thymelææ eam vocem tribuendam contendunt. Auic. 2. can. c. 467. & Scirap. simpl. c. 164. quos, vt præceptores suos, sequitur Mesue, Chamelæam cum Thymelæa turpiter confuderunt. Tragus Pandectario & Leoniceno subscribit elegantè vulgarem Mezereonem picturâ suâ ob oculos ponens, dum ait: In Ianuario plantam antè folia germinare, flores purpureos edere. In c. p. præced. Thymelæam Germ. peculiariter *Kellerbale* referens ex Diofco. sine dubio fideliter ea grana pingit, quæ nostri [Germanicæ] Pharmacopolæ ex Mezereon vulgari colligunt: nam rotunda esse dicit, maiora canabinis, linguam vrentia. Diofco. clariùs, fructum habere Myrti in modum rotundum &c. Hæc si uera sunt, vt omninò iudicari debent, non iam Mezereon Chamelæa, sed Thymelæa, ex qua granum siue Coccon cnidium colligi & Theoph. 4. 9. c. p. 22. & Diofco. autor est. Constat hinc Tragum hic pa-

Cneorum album.

Dod. opinio resistit.

Non rectè dicit Laureolum.

Laureola vulgaris.

Chamædaphne. Laureola mas.

Mezereon sup. hier. Chamelæa.

Aus. Scirap. ex Mesue argumitur

Thymelæa Tragi

Tragus callig.

rum attentum fuisse, dum floribus quidem Meze-  
reoneum vltatum, setinibus aut fructibus Thy-  
melæam repræsentat.

Sylvius Mezereo Mesue Thymelæam rectifi-  
simè decreuit.

Pand. G.

causura.

Laureola.

Daphnoides

D. Florent.

error.

Arabum la-

bes deterf.

Lactariarum

maxima.

Lactici-

um magnu

Monachus

crepantur.

Vitam ra-

piens. Vi-

duas faciem

Cautio.

Agyrtarum

impossura.

Caer ac pe-

riculosi er-

roris Eoda-

ceri deter-

guntur.

hanc malè Laureolam cōstituit: deinde c. 170. eos  
improbat qui Coccogitidū (quod aliās semē Me-  
zereonis dixerat) semē Laureolæ putant. Amplius  
c. 483. disertè Laureolam Laurum Alexandrie &  
Daphnoidem interpretatur: vnde manifestum fit  
quantoperè sibi dissidat. Simili quoque errore  
D. Florentinus includitur: c. 1. in Mes. cōmēti-  
tans: Vterque facit hinc arguitur, quod Diosc. di-  
uersa capita omnium earū herbarū instituat, quodq;  
Arabes omnes (Si Serap. excipiamus) Meze-  
reoneum copioso lacte manare scribant, quod tamen  
nec profert Laureola, nec etiam Meze-  
reoneum vul-  
gare. Et quamvis Mesue Lactarium maximam  
dixerit, & Auic. Lacticiniam magnam, id esse fal-  
sum oculari fide monstratur. Nihilque moror  
Monachos in Mes. vbi confidenter Lonicum &  
Fuch. caullantes, ac Serapioni iniquo iure patro-  
cinantes, idem contendunt.

Non dubium quin Diosc. Chamelæa sit Sera-  
pionis Meze-  
reoneum, quia Arabes & eorum discipu-  
li non tantum multiplici verborum imperitiā  
confuderunt, sed insuper cum Chamelæone al-  
bo ac nigro lethali errore commiscuerunt. Atqui  
illud horrendum quod Mesue in initio sermonis  
Meze-  
reoneum rapere vitam, ac viduas faciens dixerit,  
vnde scrio vltus eius ab agyptis & circumforaneis  
formidari debet, qui integra grana (quia pancu-  
lū ore comminuta, fauces accendunt & linguam  
miserè vellunt) transglutienda exhibeat, extre-  
mo hominis periculo. Noui (addit Cronemb.) im-  
pudentissimam ostetricem Nouiomagii (quæ pri-  
maria vrbs Geldriae) Gretam nomine, quæ passim  
quibusvis: & quod intolerabili scelere fit, etiam  
gravidis ac pueris propinat: o flagitiosam femi-  
nam! Quare, prudenti etiam necessario consilio,  
Mesue acetō corrigantur folia. Hac ille. Ceterum  
Cronemburgium per Meze-  
reoneum vulgare in-  
telligere Laureolam nostram folio deciduo satis  
clarum: Laureola autem eius facit fortè ea, quæ  
folio perpetuo virent. Quæ autem sit Thyme-  
læa vtræ, & Meze-  
reone Mesue imponendum in  
pilulis Mesuei, non indicat. Apud Theophr. ut  
citatur à Cronemb. nupiam inuenimus in qua  
planta colligatur Coccoenanthium. Verum de  
hac re postea.

Nunc cæci ac periculosi errores Lonicer. dete-  
gendi. Is lib. 4. c. 4. 9. suæ historiæ sic scribit: Bel-  
lerphals, aut Zyland, aut Zebast/Diosc. Thyme-  
læa, fructus Granum Cnidium aut Cocco eni-  
dium: alii Daphnoides Diosc. volunt, quamvis  
non respondeat descriptio huic Bellerphals.  
Quo loco Lonic. posuit falsam figuram Matthiol.  
Thymelææ, cui appictæ bacæ tricoceæ: quam  
plantam intelligat nescimus, nec ipsum sciuisse  
existimamus: nomina tamen Germanica conue-  
niunt nostræ Laureolæ folio deciduo. Cap. seq.  
quod so. sic tradit: Stridelpast/Læusfrant/Diosc.  
Chamelæa, Barbaris Arabibus & Offic. Meze-  
reone, Rapiens vitam, faciens viduas. Quidam con-  
fundunt hunc fruticem cum Bellerphals cap.  
præced. descripto, propter similem figuram & vi-  
res. Ambas indiscriminatim vocant Meze-  
reone. Hoc cap. Lonic. ponit figuram Chamelææ Marth.  
descriptio autem est Laureolæ folio deciduo ex  
Trago, cui dicitur Chamelæa, ut ante annota-  
rum. Sic ille, magis etiam cæteris, more suo omnia

confundit. Lib. 5. cap. 208. iconem Laureolæ folio  
deciduo ex Matth. ponit pro Lobelia aut Daph-  
noide: ascribit quosdam velle esse Bellerphals  
Zyland. Is præterea malè scribit. Coccoen-  
dium semen esse Thymelææ apud Myropolas in  
vfu.

Riffius quoque apud Diosc. notat Chamelæam  
G. dici Zyland/ Gallis Bois gentil & cap. sequenti  
Thymelæam esse Meze-  
reone Mesue & officina-  
rum, cuius granum Cnidium Diosc. Officinis sit  
Coccoenanthium Germ. Bellerphals.

Sed eadem ignorantia nota inuenditur est  
Ryffius, qui eandem plantam facit Chamelæam &  
Thymelæam, cum tamen neutra sit.

Lectores perpendant in quanta pericula isti  
ignari Herbarii concitant non solum miseram  
plebem, verum etiam Medicos stirpiū ignaros,  
quorum maiorem numerum scimus, quam vulgus  
crederet.

Pen & Lob. Aduers. Chamædaphne siue pusilla  
Laurusian Germ. Meze-  
reone granum vocitant Pi-  
per rusticum, & Cnidium granum Pharmacia  
inficitia, quæ ponit iamdu Senensis, decipitque de-  
ceptus, sibi incognitis, h. v. s. n. prorsum, confundit.  
At ipsi interim Aduersarii dubii hærent, an sit  
Chamædaphne. Corrigit tamen versionem, &  
vires Diosc. exponunt, ut suæ opinioni accommoden-  
dent, ut apparebit infra inter vires. Nec ullam  
vidimus eam similitudinem, ut inereatur nomen  
pusillæ Lauri.

Camæ. annotat Chamæleam Germanicam (sic  
enim vocat) flore quādoque reperiit albo. Sed  
vbi? & si vidit, cur locum non indicet?

An Turner. Daphnoides, quibusdam dicta Lau-  
reola? Angl. Lauriel vel losby quam in Germa-  
nia se vidisse negat: in Anglia tamen ad sepes  
propè Cantabrigiam & Bardway frequenter.  
Viderit Turnerus intelligere Laureolam semper-  
virentem: quamvis figura non respondeat, nec  
quæret ex Diosc. flos albus.

Chamelæa, inquit Cæsalp. quam vulgò in alpi-  
bus Oliuellam vocant, duplex est: vtræque paulo  
minor Daphnoide obsequiosa, &c.

Qualem autem suspicemur Cæsalpini priorem  
Chamelæam dicemus. Altera videtur nostra Lau-  
reola folio deciduo.

Histor. Lugd. pro Laureola femina proponit  
iconem Marth. præterea eodem cap. habet iconē  
sub titulo, Laureolæ cum fructu, quam Dod. ex-  
hibuerat pro Laureola siue Daphnoide quæ per-  
petuo viret, diuersa ab ea de qua Hist. Lugd. eo  
loco agit.

Schuench. in Cat. Silef. Laureola, xaxen Sagen  
Diosc. Chamædaphne Clus. At non videmus cur  
hæc planta simpliciter Laureola dicenda sit, nulla  
tanta similitudo. Chamædaphne Clus. non est,  
ut prius dictum. De Diosc. Chamædaphne postea.

C. Bauh. apud Matth. Daphnoides: Laureola  
folio teneriore & deciduo. Glycyrrhizam mon-  
tanam nominare solemus, ut rei herbariæ ignaros  
fallamus.

Castor. Daphnoides & Laureola maior. Plæ-  
raque linguarum nomina iam supra dicta spar-  
sim Hist. & Ital. Laureola. Gal. Laureole. Germ.  
etiam Scheißelbeeren quasi cacaniis Lauti  
bacæ, quia sedem poterit mouere. Silef. Zeis-  
lang/ Ziegli. Sequanis & Montpelgardensibus,  
Bois gentil. Rustici circa Basileam, vtræ Gl. D.  
Fel. Plateto accepimus, nominant Samar. Belg.  
quoque ut Germ. Bellerphals dicitur, his etiam  
Læusfrant: pediculorum herba, fortè quod eos  
abigat. Boh. Wlen Laybo Wetjy / teste Marth.  
Eadem.



Eadem ferè loca cum præcedenti amat, siluatica, montana. Plurima cum in Germania & Heluetia, tum in Allobrogum & Ligurum Delphinatibusque montibus & collibus siluosis, opacis, in vallis Anoniæ montibus Tridentini agri reperitur in monte Amano, teste Bellon. quam ille *Kellerfraut* Germ. dici ait, quamquam tenerè herbam vocitet. Circa Basileam in Mouteto monte. Denique in plerisque pinguibus & opacis, asperis atque desertis Germaniæ locis. In Italiæ hortis quamplurimis cultam vidimus. Translata enim ad frugem peruenit ac diu durat, quales plures in hortum E. C. Montb. transferri curauimus, quæ adhuc vigent, vbi & Ian. & Feb. Martio atque Aprili florentem obseruauimus, pro natura & clementia hiemis. Communiter tamen Martio floret: Sed dorum gemmas seu germina statim post autumnum promete solet, qui mox hieme, si clemens sit, aliqui incunte vere, panduntur. Folia post flores demum exeunt. Tandem æstare & bacce quæ Augusto magna ex parte rubræ factæ maturantur. Subinde folia amittit.

Prodidit *Tragus* se *Chamelæa* [intelligit autem hanc de qua hic agimus] quosdam agytas & impotentes non paucos ad orcum mittere vidisse. Eiusdem iudicio *Pilulæ* quas & *Chamelæa* Mes. & *Serapio* conficiunt, ad hydropem maximi sunt momenti. Existimat decoctionem florum tutioris & minùs noxijs vsus esse. Nemini tamen autorem aut magistrum hac in parte se velle esse, proficetur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgari. Mulieres quæ formæ student, hoc medicamento vti posse: nam faciei maculas intra paucos dies illiux ererere & purgare. Notum consilium est, ne quis temerè vtiatur *Pilulis* de *Mezere* dictis, præsertim si imponatur *Chamelæa* Tragi, quia non paratæ sunt vt decet. Qui singula Tragi vult vsurpare in magmatibus, caueat nec inflamet faciem, & puitulas excitet ipsi maculis deteriores. Nam erodentis & admodum inflammantis est facultatis. Folium vnũ suæ recens sine sicum comestum pituitam viscidam per diæctiones vacuare, vomitum mouere & menses Matth. tradit. Baccas quindecim potu assumptas efficaciter purgare. Folium in nares inditum sterutamentum excitare. Cum passulis folium vnum masticatum, à capite pituitam & salium ducere. Nimirum hæc ipsa sunt vires quas suæ *Daphnoidi* tribuit *Diosc.* quas mutuatus Matth. suæ *Laureolæ* applicat. Vt iam apertè videant *Studioli*, quantum ei sit fidendum. Dosis baccarum periculosa, & quam ipse non sumpsisset, nec sine noxa alijs propinasset.

*Dodonæo* folia, cortex, radix, & fructus sunt calida & sicca ad tertium ferè gradum, eiusdemque ferè qualitatris cum *Thymelæa*. Folia, inquit, purgant potenter & violenter per inferiora pituitam & humores biliosos ac aquosos, his vti officinas loco foliorum *Chamelææ*. Easdem vires habere baccas, easque commanfas tantum calorem ac fequorem in faucibus relinquere, vt vix potùs copia restinguì possit. Ideò hanc plantam sine dubio nocuam esse hominibus, cum sit vsque adeò calida, vt vehementer violentèrque operetur, ideoque lædat & noceat partibus internis. Huius folia præparari vt folia *chamelææ*; eademque ratione præparandos esse fructus & corticem, si sumendi exhibeantur in aliqua medicina. Idem in hist. lat. scribit, officinas Germaniæ & Belgij huius folijs (si quando opus sit) vti pro *chamelæa*, quod citra errorè fieri possit, quod & Cam. reperit. Menses quoque ducit, vt perhibet *Schvencckf.*

Cortex verd aduersus *Quartanam*, *Hydropisum* & venena pro se cū *Saccharo*, vel liquore aliquo bibitur, corrigitur *Lactè*, vel *Aceto*. Experietur qui volat? Nos non facillè periculum fecerimus, nisi deficientibus alijs medicamentis, aut in casu desperato eius vsum suaserimus idque cum magna consideratione.

Suspectum porrò nobis est & illud *Anr. Roier* medicamentum, quod peste laborantibus exhiberi tradit. Foliorum, inquit, *Laureolæ* calcicatorum a pondus coronati, plus minùsve pro ratione virium ægroti, per biduum in aceto macerant, & bibendum præbent, quod sudorem mouet, vomitum & aluum: & hac ratione venenum expellit. Suspectum vt diximus, est nobis hoc medicamentum: si eo vtendum esset, velimus potius folia *Laureolæ* macerata per biduum in aceto cum alio liquore propinare.

Nam vel *Pen.* & *Lob.* testibus, ac ipso adeò sensu, fauces, œsophagumque [aliter quàm *Euphorbium Gesner.*] adurit, diu multumque vexante impressione. Non minùs hæc per aluum deiecit crassum viscidumque *Phlegma*, & intestinorum ramenta abradit quàm *Laureola*, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim vtuntur etiam *Medicorum* quorundam præcepta *Pharmacopœa*. Quare [inquit] idem] facit hæc virium expensio, vt minùs quis putet *Chamædaphnen* legitimam. Quippe quam *Diosc.* *κινναλάρχη*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, vt interpret vertit. At si vlla ratio iniri queat, quàm tam feruida planta pro *Diosc. Chamædaphne* agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita: namque *κινναλάρχη* id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, veritas, non incommodo sensu intelliges folia rufa admotæque capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vitionibus faciendis adiuuere, ad diuturnas fluxiones sistendas aque stomacho auertendas: vt *Paulus* ex *Antiquis* docet faciendum, lib. 6. de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri *Agarici* frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque folijs huius vti sunt *Antiqui*. Sic *Diosc.* magnum præsidium putat *Arabicam* vocatam vitionem à Græcis, quæ fieri solita fuit spirillis caprinis, oleo feruenti immixtis, & pollicis cauo inuultis. Sic illi.

Nobis nondum verisimile videtur hanc esse *Diosc.* mentem, estque valdè longè petita hæc interpretatio, nec consuevit aut opus habuit *Diosc.* ab *Arabibus* discere, quos nec vidit nec agnouit. Quæ nostra sit aliorumque hac de re sententia cap. de *Chamædaphne* declarabimus. Non enim concedimus, hanc de qua hic agimus, esse *Chamædaphnen* *Diosc.* Nec tacendus tamè alius eius vsus quem *Moibanus* inuexit, in cuius Antidotum aliàs *Saxonicam* vocatam aduersus venena eius radix quoque in aceto macerata venit, quam antidotum alio commodiore loco referemus.

## CHAMELÆE HIRSVTÆ NOMINE DATA.

### CAP. XXXVI.

**C**HAMELÆE nomine, & Gallicè *Bois Gentil*, id est, Ligni nobilis nobis datam (non



recordamur : a quo] plantam in sicco nostro herbario inuenimus & etiamnum asseruamus. Fruticis parui speciem habet ; vti praecedens : Caudex lignosus ; rami palmares, nigricantes ( in sicca. ) Folia similia ferè cum praecedenti Laureola folio deciduo, breuiora tamen, & multo angustiora, in acumen desinentia, nonnihil hirsuta.

## THYMELEA MINOR CORDI.

CAP. XXXVII.

Descriptio.



Folia.

Sapor.

Flores.

Radix.  
Sapor.

Locus.

Chamelæa  
falsa.

**T**hymelæa minor Cordi, paruulus est frutex, plures ab vna radice imitens virgas, longitudine pedales aut dodrantes, per terram stratas, lentas, flexiles, & distractu contumaces, foliis numerosis, vndeque vestitis, figurâ oblongis, vtrinque acuminatis, crassiusculis, superius viridibus, inferius pallidioribus, Oleæ

Myrtigæ foliis multo minoribus, ac potius fruticoso Polio similibus, paulo tamen maioribus, gustu glutinosi. Flores, Sole Taurum occupante, producit in summis virgis oblongos, inferius angustos, superius in quaternia folia parua se pandentes, è purpura in puniceum atque candicantem colorem vergentes, densos : & ab vno principio sese in Corimbos diffundentes, sitaui ter odoratos ; & mellis aliquem odorem redolentes. Floribus singule succedit bacce : Radice nititur longa, candicâte, neruosa, lenta, flexili, infragili & perenni : gustu ad aliquot horas faucis & palatum Coccognidii modo exalfaciente & scarificante. Nasctur frutetosus & muscosus tam planis quam editis locis : nonnunquam etiam sub Iuniperis. Copiosa autem circa Vindelicorum Augustam, & Ratibonam.

An de hac Gesn. de hort. Pipér montanum in Italia multis vocatum ; quod nostri Zyland, Dod. Chamelæam falsam : eiusdem speciei alpina minor superiore autumno hortulo meo commissâ, virer etiamnum. Vis vtriusque caustica ; omnibus partibus os & palatum non aliter quam Euphor-

bium accendens. Aliqui non rectè Laureolam vocant. Facile nascuntur : crassior enim radice & tenax est cortex. Item de Collect. simpl. Laureolæ putò species in monte prope Curiam, paruas, angustis folijs, paulo maioribus, quam Rosmarini, strobilulis purpureis odoratis, vt in Zyland. Cauliculus lignosus est, non ultra septem digitos altus. Floret Iunio. Considerent periti an Gesn. de duabus plantis scilicet, an de vna tantum. Item an intelligat Thymelæam Cordi vel Cneorum Matth. fruticosum, potissimum per eam Laureolam, quæ provenit Curia : Icon à Gesn. addita Thymelææ minori Cordi non quadrat cum Cneoro Matth. Scirpium studiosi obseruabunt circa Augustam Vindel. & Ratibonam, Thymelæam minorem ; & conferent cum Cneoro fruticosa Matth.

Tragus de sua Thymelæa sic scribit : Kelleræ h. & Zeilande Germ. Latinis nonnullis Linum sili. Olinella & Leo terra : apud Diof. Olinella & Zeilande : Plin. Proscaphne. Cneutron & Cneorum vocari tradit. Syri Apollinium nuncupant : Hyginus Cassiam. Liparionis cuiusdam Actius mentionem facit, qui & Cneutron nominari tradit. Num vero ad hunc fruticem & pertineat appellatio, minime constat. Fructus Thymelææ Cneorum Gnidium vel Coccum Gnidium, vt loquuntur Offic. appellatur. Errant Recentiores, qui Coccognidium ex Chamelæa nasci existimant. Multo maiori in errore versantur, qui Chamelæam cum Daphnoidæ seu Laureola confundunt, ac si ad vnam & eandem herbam vtraque appellatio referenda sit. Vid. Cristoph. de honestis & lac. Manlium, super Confect. Mezerion. Frutex est, arbutulae instar, proliens, virgis multis, tenuissimis, tripedaneis, aut breuioribus, folijs exiguis & pinguibus, flore candido, fructu rotundo, seminibus Cannabis haud maiori, linguam si mandatur adurent, non aliter atque Chamelæa de qua proximo capite. Non vbiq; obuia est, sed incultis, altissimisque montosis & siluis provenit. Hac Tragur cui id euenit quod reprehendit in alijs. Laureolam folio deciduo bis pingit, pro Chamelæa & Thymelæa vti dictum ; licet neutra possit esse : nec eius Thymelææ descriptio respondeat iconi, quæ fortè ex Diof. desumpta, ipsis plantis non probè eicognitis, vel sanè superficialiter consideratis. Considerandum tamen an fortè intelligat Thymelæam minorem Cordi modo dictam.

An Apollo de hac Rad. n. p. 96. Thymelæa ex qua Granum Gnidium, Chamelæa similima : An item Anguill. in epist. Thymelæa ex qua fructus Coccum Gnidium dictum. Aded superficialiter vel intricatè de his tradent, vt quid statuerent nesciamus.

## CNEORVM MATTH. SVFFRVTEX

CAP. XXXVIII.

**P**ro Cneoro, exhibet Mach. plantam Thymelææ Monspessulanæ aliquatenus similem, ex radice crassa, nigra, plura lignosa virgulta, dodrantem circiter alta, ramola, cortice nonnihil rufescente recta proferentè : in quibus potissimum circa fastigium folia conferta, viridia : Thymelæa multo breuiora, obtusiora, glabra, neruo vno secundum longitudinem donata. Flores ramulorum extremis insident multo, simul congesti, purpurascens, ac interdum albi, quorum singuli Latæß Marthioli floribus formâ non absimiles, ex oblongo tubulo in quatuor





tuor lacinias radiacim dispositas facellentes. Placet & diligentissimi & peritissimi Herbarii Clus. descriptione subiicere. Elegans, inquit, suffrutex, cui multi sunt rami graciles, flexibiles, lenti, sirculosi, ab ima protinus tellure emergentes & humi diffusi. Folia nullo ordine disposita ramulos am-

biunt, viridia, cutanea, Thymelææ veræ proxima, ingrati primum, deinde amari saporis, nulla aut perexigua (quantum quidem gustanti deprehendere licuit) acrimonia prædita. Flores in summis furculis, sex, septem, aut plures, conferti, quatuor foliolis constantes, ex rubro purpurascetes, Centaurij minoris florum penè æmuli, ingrati etiam & amari saporis, aspectus tamen pulcherrimi, atque odorati, caput (si diutius natibus admoveantur) tentantes; si succedit fructus exiguus, Thymelææ fructui haud dissimilis, non ruber quidem, sed candidus: oblongiusculus, semen continens cinereâ membranâ rectum, rotundum, Thymelææ grano par. Radix longa, minimi digiti vt plurimum crassitudine, interdum nigricans, maiore verò ex parte flavescentes, lenta, supernâ parte nonnunquam gracilior, vnde rami flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde secundum alarum cava, latis crassas fibras flavescentes agunt.

Matth. in com. cum magnis icon. Lat. & Ital. iconem proponit huius plantæ nomine cneori Matth. ubi scribit: inuenisse in Bohemiæ silvis plantam, quæ omnibus partibus suis cneorum candidum referat flores in furculorū cacuminibus purpureos, odorati Testiculi odore &c.: In epit. sua iconem ponit diuersam à præcedenti, pro cneoro candido: de quo agemus suo loco, nempe capite de Ocymoide vel saponaria minore. Hanc non describit, sed tantum ait: cneori candidi, de quo meminit Theoph. hic imaginem damus, vt qui chamæleam faciunt, ad mentem redeant. Profecto in ipsomet mens requiritur, qui sibi parum constans quod affirmavit audacter in dubium reuocans, aliam plantam pro Cneoro, nempe herbam, à prædicta toto genere differentem exhibeat, parum memor eorum quæ prius traderat. Certe camer. in Epitome Matthioli figuram omisit. C. Bauh. in auctis & illustratis Matth. commentarijs l. c. 17. Cneorum prius fruticolum posuit, addens: Cordum fortè nomine Thymelææ minoris exprimere voluisset nihilominus illustrans Matthiolum, l. 4. c. 167. cneori titulo herbæ iconem ponit adiectis adde his Matth. verbis: Cneorum de quo meminit Theoph. nullis deficientibus notis misit ad me Roma vir quidam nobilitate clarus, cuius imaginem hic appingi curauimus, vt qui chamæleam & Thymelæam cneorum faciunt ad mentis sanitatem redeant. Est autem ea icon reuera Ocymoidis minoris. Verum

iam verum erit cneorum Matthiolo? frutex ne hic descriptus, au dicta iam herba? Vt merito de stirpiū historiis meritis Clusius in hac verba proruperit. Matth. hunc fruticem pro cneoro albo Theoph. proponit. Cum verò quale sit difficulter indicari possit, cur huic stirpi cneosi nomen accommodare voluerit, multi mirantur.

Postrema Com. editione 4.4. aliud nobis Theophrasti Cneoron adfert, nullis, vt ipsius verbis vtar, deficientibus notis. Sed cum huiusmodi tantum imaginem, addidit, cneori nomine oculis subiiciat, illiusque historiam planè subiceat, si parum fidei ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, vt opinor vitio vertet. Cæterum, addit Clus. nisi in hac plantâ, (cuius & ipse satis elegantem figuram exhibet) acrimonia, quæ quidem sensu percipi possit, abesset, ad Thymelææ genera aut ipsi congenere, n suffruticem referendam esse censerem. Nonnulli rustici Scirnoselin / hoc est, Petraam Rosulim vocant. Nos autem antè monuimus cap. de Thymelæa minore Cordi considerandū esse, an Gesnerus hanc fortè intellexerit nomine Laureolæ parue, cuius descriptionem ibi posuimus.

Est verò id notatu dignum, quod obseruauit Myconus, medicus Barcinonenis, rei herbariæ studiosissimus à nullis animantibus, fruticem hunc attingi aut arrodi. Et cum mille huiusmodi plantas folijs & floribus onustas viderit, nullam vnquam reperire potuisse asserit, in qua præcisum aut arrosus aliquid fuisset.

Braun apud Tabern. ponit iconem hoc titulo: De Hellerßhale aut Zeiland Cassia Matth. Chamelææ species: subiungit duas descriptiones, & postea duas icones Thymelææ, de quibus postea. Cassia, quam vocat, Matthioli, descriptionem omittit, quam intenuisset apud Matth. sub Cneoro, sic parū oculatus vno capite diuersas plantas confunde nse & alios fallit: qui leget caput eius quod gr. est λ. vix intelliget an in descriptione priori intelligat Cassiam, vt vocat, an Thymelæam.

Provenit Cneorum Matth. vt tradit Clus. in multis montibus Viennæ vicinis tantâ abundantia, vt rusticæ mulieres, dum floribus abundat, multos eius manipulos in forum venales adferant, cum alijs varijs generis floribus, exornandarum tricliniorum gratiâ. Nascitur etiam in Pannoniæ silvis editiore loco sitis ultra flumen Rabinum siue Arabonem. Frequens etiam crescit quibusdam siccioribus pratis Francuforto ad Moenum vicinis, præsertim silua quadam quercubus confita, circiter miliare infra eam urbem ad sinistram fluminis, inter Ericas, vbi illam candidis etiam floribus variantem conspexit Clus. cuius etiam manipulos rusticæ mulieres in foro venales proponunt.

Aprili plerumque florere solet, nonnunquam etiam Maio. Fructus maturus est Iunio. Adde autem fecundus est hic suffrutex, vt sæpe numero ter eodem anno floreat, nouis floribus semen sæper consequentibus, quod probè maturum, bis eodem anno de vna eademque planta collegit idem Viennæ Austria.

Camæ. testatur Cneorum Matth. sibi in horto Satio. è semine natum: sed non docet an herbaceum intelligat, an fruticolum. Duo enim Cneora habet Matth. eaque valde differentia, si probè meministi quæ antea scripsimus. C. Bauh. suffruticem intelligit.

Toscanus Carolus pharmacopoetis Burgundus in Campagniola, diligens stirpiū indagator, flore albo & purpureo ad nos misit nomine Balsami

Clus. parum fide Matthiolo tribuit.

Petraa Rosula.

A nullis animalibus attingit.

Braun ca. ade.

Locus.

Pro coronaria venditur.

Flore candido.

Tempus.

alpini, quas in hortum E.C. Montbelg. plantari curauimus.

CHAMÆDAPHNE, LAVRVS ALEXAN-  
DRINA HIPPOGLOSSVM, RADIX  
IDÆA, 'BISLINGVA', SIVE  
BONIFACIA.

## CAP. XXXIX.

**Q**uandoquidem multi ad Laureolam referunt Dioscoridis Chamædaphnen, vt ex præcedentibus liquet, quam ipse subnectit suæ Daphnoidi: nos cum secuti, hoc loco trademus eius historiam, addentes & subnectentes his *Laurem Alexandrinam*, *Hypogiossum*, *Radicem Idæam*, quæ à Diosc. pro quatuor distinctis plantis traduntur, ab alijs verò nã eademque stirpis existimantur, ac putantur esse, vulgò dicta *Bislingua* siue *Bonifacia*. Quod si cui videatur hæc planta interrumpere nostrum ordinem, quo similes plantæ; quantum fieri pote, iungere studemus: is sciât, facilioris doctrinæ & vitandorum repetitionum ergo non quasi coactos de ea hic tradere. Idem tamen aliqui in quo conueniat cum præcedentibus: videlicet, nomina, baccas, & quòd sit fructuosa planta, constans virgis hieme non pereuntibus.

CHAMÆDAPHNE.

Defcriptio: **C**hamædaphne, quam & Ἀλκιδάφνη aliqui  
vocaunt, autore Diosc. virgæ promit  
lingulari ramulo constantes. [σκηλαίνου: decerati  
vulg. exempl. Latinum Ruell. ex Plin. Græcam vo-  
cem Sarac. ex vet. cod. adiecit] cubitales, rectas,  
tenues ac læues. Et huic quodæ folia sunt Lauri  
similitudine, sed multo læuiora. λεπτότερα addunt  
ex veteri codice Lacuna & Saracenus) te-  
nuiora quæ ac viridiora: fructus rotundus, rubens,  
folijs adnatus: [τὴν φύλιν ἐπιμαρτυροῦσι.] Huius fo-  
lia trita illigata capitis doloribus & stomachi  
ardoribus [ἐν σιμυλῇ γὰρ καὶ σιμυλῶν] vulg. codices habet.  
Sarrac. legit ἰσχυροὶ καὶ σιμυλῶν & inflationes vertit, ex  
auctoritate Serap. qui est ipse inflationes reddit.  
quodd verisimile non sit, Chamædaphnen, cuius  
eadem est, Gal. teste, natura, quæ Daphnoidis  
& Lauri Alexandrinæ (quas vocat) ardoribus sto-  
machi succurrere: quæ eximio fu calore sto-  
machi potius ardorem excitare debeat. Fucit au-  
tem vero similius illam vt tormina à flatibus con-  
citata, ita & stomachi inflationes discutiere. Vbi-  
nam legit Sarrac. Lauryum Alexandrinam eximi-  
um calorem Daphnoidem habere: Galen. non vi-  
deretur per Daphnoidem intelligere Dioscoridis  
Daphnoidem, sed elematidem &. Præterea non  
omnes ardores sunt à causâ calida, sed passim à  
frigida: facilius potuit esse lapsus Scriptoris, vel  
Correctoris apud Serapionem, qui scripsit in  
inflationis, pro inflammationis. Plinius etiam Dio-  
scoridis lectionem comprobat. Quæ hac de re sit  
Aduerf. sententia seu opinio, superius dictum  
succurrunt. Eadem pota cum vino tormina [ἐν  
πρῶτῳ] sedant. Succus cum vino porus, menses vrinæ  
que ciet: idem quodque subditiis in pello præstat.  
Dixerat autem Diosc. cap. præced. Daphnoidem  
quoque nonnullis chamædaphnen appellari, de  
qua Daphnoide purgante vt ab hac chamædaph-  
ne differenti, paulo ante agimus.

Da phnæ Alexandrinæ, sicut sanè & quod Daph-  
 noi, les nuncupant. Quale igitur hoc fuerit Daph-  
 noi des Galeni? Certe Daphnoides Diosc. mordet  
 fauces, nesci existimamus quæ germina à quoquam  
 cum edi possit. Quidam [ Paulus & Serapio ] intel-  
 ligunt ut per Gal. Daphnoidem eam plantam, quæ  
 dicitur clematis Daphnoides, & clematis secun-  
 da.

Daphnæ  
 Alex.  
 Galen. illi  
 Clematis  
 Daphnoides

Plinio Chamædaphne vino râmulo est, cubi-  
tari teret, folio tenui, Lauri similitudine. Semen Chamædaphne!  
rubens admixtum : annexum: nichil ex vet. cod.  
testibus Corn. & CH. Jolisi illiatur capir. dolo-  
ribus recens. Ardore refrigerat : Ad tormina  
cum vino bibitur. Menes succus eius, & trinum  
ciet potu : partuque difficiles in lana appoluit.  
Quæ sanè Plinij chamædaphnes descriptio ita  
cum Diolè conuenit, ut ex eo desupta videatur.

Caterum idem Plin. vbi de Lauri generibus  
scribit: Est, inquit, & Chamædaphne siluetris fru-  
tex, est & Alexandrina [videl. Laurus] quam ali-  
qui Idæam, alii Hippoglotion, alii Daphnitin,  
alii carpophyllon &c. quæ postea dicentur sub  
Lauro Alexandrina.

Merito autem Leonicius Plinium carpit,  
qui l. 15. Chamædaphnen describit, & eandem l.  
24. iterum: eidem plantæ differentes descripti-  
ones affert. Est enim prior descriptio in Daph-  
ne Alexandrina, non autem in Chamædaphne.  
4. à Diof. tradita. Effe verb Chamædaphnen à  
Daphne Gal. pariter & Paul. ostendunt. Cha-  
mædaphne tamen, vt à Diof. describitur non  
multum ab Alexandrina Lauro. differt: hodie,  
inquit Cornar. non cognoscitur, si alia & diuersa  
est ab Alexandrina Lauro.

Chamaedaphnec Græcis, quam Vincam Peruin-  
cam vocant, Plin. tradit l. 11. c. 11. & c. 27. de qua  
nos cap. 6. de cleamatide altera fuit Daphnoide.  
Fortè hæc iacula fuerit de qua Theoph. l. 3. hist. c.  
18. ubi tradit: arborem Euonymum magnitudi-  
ne esse Mali Punice, atque folio eiusdem, sed  
maiori, quam Chamaedaphnes. [ *hæc iacula dicitur*]  
Gaza more suo audacter lasciuens Vincam per-  
uincam reddit, Relinquendum nomen suo aucto-  
ri, in re præferent non probè cognita: sed hoc  
nomen ipsi, interpretis fidem excedere. ]

Chamædaphne, inquit Apuleius, à Graecis quibundam *Daphnæ*, aliquibus vetò *Daphne*, alijs *Hydragog* seu *Caragog*, dicitur: Itali *Mustellaginem* dicunt, alijs *Lactilaginem*: Galli *Eugubim*, *Ysiben*: In puluerem redacta mollissimum, & in aqua calida potui data aluum concurat. Annotat apud eundem Huneib. Qualis sit herba chamædaphne nos docet Diosc. & Plin. ex quorum descriptione facile intelligere est, non esse vulgò Lauroleam Germ. Zyland, neque est herba quam nostri temporis Herbarij Vincam peruncam appellant. Hydragogos Apuleio dicitur, quasi aquæ & humorum subductiua: in vetustis exemplaribus non Hydragogos sed caragogos scripti est: sicque dici potuit, quod caput, quod Græcè *κατα* dicitur, a noxijs humoribus expurger. Mustellago nomen à Lauro sortita est, quam Pompon. Lenæus, eo quòd Mustaceis subijceretur, Musticæm appellauit, vtrout est Plin. Lactilago dici potuit, quòd inueniunt sapore, cum Lac in cibis vili aliquando succundo, quod & Paul. *Ag.* tabern. l. 6. & l. 1. Apuleius porro remeare, nec exlitterata scientia, inuitis aded medicis, chamædaphnen dici alium concitare: si ex aliquo autore id habet, cur non monet, nequam non putandū, periculum hunc Herbarium pariter ac medican.



[ si credere fas est ] quicquam ab vilo autore mutasse, qui remedia, quæ ciuibus suis, iniucis etiam medicis profuisse iactat, promulgat. At saltem docuisset nos, aut didicisset ipse, si nesciuit egregius Herbarius, quæ in re differat à Vitoriola sua, quam etiam Daphnina, chamædaphnem & Mustellaginem silu. cognominat. Quid si confundat chamædaphnen cum Daphnoide? quod ei non nouum. Dubium igitur relinquatur nobis, quæ sit chamædaphne Apulei purgans, & an eadem cum Diofco. Plin. & Pauli vt censet Humelbergius.

Hermol. dum nimium Plinianè scribere studet, obfcuriorem reddit Chamædaphnes historiam ac suo nomine pronunciat, quæ Plin. prodidit: Chamædaphne Diofco. & Plin. quæ sit, non demonstrat Hermol. fugit hos scopulos, quemad. & Ruell. qui suo more ex Hermol. eo non citato sua decerpit & suffurat.

Chamædaphnen Marcellus humilem & terrestrem Lauri interpretatur, atque Latinis Vincam peruincam dici, ac eius meminisse quidem Theophrastum, sed tam breuiter, vt nihil possit ab eo intelligi, quam ferre chamædaphnen fructum folijs adnatum [ vbi autè id scribit Theoph? locum sanè nondum inuenimus apud eum, & vix credimus extare: neque enim aded alieni aut peregrini sumus in lectione Theophrasti, vt si hæc diceret non alicubi id obseruassimus: indagandum tamen etiam in posterum.]

Apertè & ingenuè Anguil. fatetur, nondum sibi perspectum esse, quænam sit chamædaphne.

Amatus in Diofco. dicit Chamædaphnem Hisp. Laureolam dictam, affinem esse Daphnoidei, non esse Vincamperuincam, vt multi fallò rentur, sed aliam herbam cubitalis altitudinis, vt Plin. describit: interim quæ sit illa non docet, vnde satis patet ei non cognitam fuisse, præsertim cum nec doceat in quo differat à Daphnoide. Cornar. & Chamædaphnen, & Daphnoidei, vttramque, Plinii, Officinis & Herbariis Laureolam vocari tradit. Sed iam antea dictum nobis videri Laureolam Cornario ignotam fuisse. Præterea Chamædaphne videtur à Laureola non parum differre.

Et, vt tandem & nostrum iudicium de Chamædaphne dicamus, placet nobis opinio Fab. Columnæ, qui vult Chamædaphnen Diofco. Plin. & Galeni esse *Bislinguam* siue *Vulariam*, de qua paulò post.

#### LAVRVS ALEXANDRINA.

**H**uius Theoph. meminit l. c. 17. sc. scribens: Illa quoque propria Idæ sunt, Laurus Alexandrina dicta, & Ficus quadam, Vitisque Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum gerat [ *ἐπεὶ οὐκ ἔχει φρούς ἐν τῷ φύλλῳ* ]. Vtrique enim fructus ex folijs ipsius dorso [ *ἐκ τοῦ ὀπίσθεν τοῦ φύλλου* ] nascitur. Hic obiter Theophrastum ridens Scal. Festiuum vocat *εἰς οὐρανὸν*: Nam (addit) Quomodo Idæ fuerit propria Laurus ea, quæ Alexandrina nominatur? Pro Theoph. & pro se responsum habes apud Plin. l. 5. c. 30. quem consules. Idem Theoph. eadem paulò aliter circumferibit, cuius verba Græca lubet ascribere, non ad ostentationem, vt quibusdam id soleme visum, sed quia vel ipsi Latinis sint magis significantia, & nescio præ iis quam *ἑρπυλλίαν* habent.

sic ait: *ἔστι τῶν φύλλων καὶ τοῦ ἰδίου περιεχομένη τὸν καρπὸν, ὥστε καὶ Ἀλεξάνδρεια δὲ φησὶ ἐπὶ τοῦ ὀπίσθεν τοῦ φύλλου*. Quorum verborum sensum minus fideliter expleuit Gaza, sic inquiens: fructiferæque nonnulla fructum in folijs interceptum vel pediculo tenus tantum gerunt, quales sunt eæ, quæ ad foliorum inflectionem seu exortum angulum, fructum exerunt. Pleniùs ita: Quædam fructifera eo modo, vt fructum veluti sinu foliorum suorum comprehendunt. Lenocinium addis cum Scal. mollisculè sic: Quorundam inuolucro, aut sinu fructus obducitur aded, vt ipsa (folia) fructifera dici mereantur, quemad. Alexandrina Laurus, in folijs vel super folijs fructum ferens.

Audiamus & Plin. Est inquit (& chamædaphne silu. frutex: est & Alexandrina, [ Laurus ] quam aliqui Idæam aliqui Hippoglortion, alii Daphniti, alii Carpophyllon, alii Hypelaten vocant. Ramos spargit à radice dodrantales, topiarij ac coronarij operis, folio acutiore quam Myrti, molliore & candidiore ac maiore, semine inter folia rubro. Plurima in Ida, & circa Heracleam Ponti, nec nisi montosis. Id quoque quod Diphnoides &c. Dixerat autem iam priùs: accedit in topiario opere Taxa [ Laurus ] excrecente in medio folio paruulo, veluti lamina folii. *Item alibi*. Laurus Alexandrina siue Idæa partus celeres facit, radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus: secundas etiam pellis, mensesque eodem modo pota.

Adeamus Diofcoridem: Laurum Alexandrinam, inquit, alij *Ἰδαία*, alij *Δαφνὴ*, alij, *τὸ πύλλον τοῦ αὐτοῦ ἑρπυλλίου*, alij denique *εὐφρασίαν* vocant. Folijs est Myrti siluestris [ *ἑρπυλλίαν* ] seu Rusci similibus, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in medijs folijs [ *ἐν τοῖς μέσσοις* ] Ruell. inter folia: maluit cum Plinio loqui, quam fidem præstare auctori [ rubro, ciceris ] magnitudine. Ramos verò per terram [ *ἐπὶ τῇ γῇ* ] spargit (forte rectius è terra emittit, aut supra terram profert) dodrantales, interdum etiam maiores: radicem similem Rusco [ *ἑρπυλλίαν* ] maiorem tamen, odoratam & molliorem. Nascitur in montosis. Eius radix succurrit in difficili puerperio drachmarum sex [ alij quinque ] pondere in vino dulci pota. Succurrit & vrinæ stillicidio vexatis, & menses educit. Pro quibus postremis verbis habetur: *ἀπὸ δὲ τῆς αἵμα* Sanguinem extrahit: Sarac. per quem nihil aliud quàm menstruum cum Plin. & Cornar. intelligimus. Illud non omittendum: pro eo quod folijs quàm Rusci maioribus diximus, in Græco haberi *μεγίστην*. Marcell. vertit minoribus quasi legisset *μελά*: sed malè, ad stipulante etiam Cordo, immò Plin. quoque & Serapione, hoc spectati n. qui Laura Alexandrinam & Gar Alexandrinam vocans nihil præter Diofco. & Gal. verba transcribit. Cornupri igitur codices putandi qui *μελά* habent. Galen. Daphnen herbam vocat *δαφνὴ τῆς ἰδίας* inquit, quam & Daphnen Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara, potaque cum vrinas tum menses prolicit.

Apulcius cap. de Vitoriola sua Laurum Alexandrinam cum Daphnoide confundit, ac etiam, vt suspicamur, Chamædaphnen, vt iam priùs latius ostensum.

Cætèrùm Laurum Alexandrinam & Laurum Taxam eandem plures esse cum Hypoglossio & Bonifacia seu Bislingua statuunt: de qua re postea specialius trademus. Cornar. verò negat Laurum Alexandrinam esse Hypoglossum, sed

diuerſas eſſe vult, illamque hodiè ignotam.

### LAVRVS ALEXANDRINA.



Item diti-  
mens de Lau-  
ri Alexandrinæ e-  
legantissima plan-  
ta ingenuè profe-  
ram [inquit Lob.  
Adu. part. 2.] quæ  
vidi opéra Ioan-  
nis Parkinsoni Phar-  
macopœi Londi-  
nensis, qui ramu-  
lum eius non dis-  
similem Bilinguæ  
mihi communica-  
uit, clarum ex  
horto Medico Pi-  
fano. Hæc ramuli  
pars non excede-  
bat longitudinem  
vinciarum quin-  
que, septenis foli-  
is alterno situ,  
non exaduerso, vt haber effigies Matthioli & Lug-  
dunensis, prædita; nervosis vtrinque, rigidis vt  
Hippoglossi: inferioribus ternis, aut quaternis,  
vncias duas longis, & plus vnâ latiss, in mucronem  
Ruscii modo, fatigatis; medio averso folii cras-  
siore nervo, specimine flosculi pallidi gemmato,  
sine pediculo, & ligulato, bilinguæ foliolo, (fru-  
ctus enim mediis foliis amplectitur Theoph. au-  
tore) vbi semen Bonifaciæ, siue Hippoglossi mi-  
nus præferre dicitur, donatis; ternis vero superio-  
ribus vnciam latis, & sesquinciâ longis, mu-  
cronatis, vtrinque item nervosis sine flosculorum  
rudimentis.

### HYPOGLOSSVM, SIVE HIPPOGLOSSVM.

Dioscoridi ἵππογλωσσὸν διαίτησις ἐστὶ, exiguis  
frutex, foliis Myrto silvestri [μαρτίνη ἀγρία ἔ-  
στιν] λικὴ alba Dal.] & tenui similis. Comam  
[χόμην δὲ. Adu. putant leg. ex Plin. κομὴς id est,  
concaua.] verò spinosam habet, & in summo ceu  
lingulas secundum folia. [ἔξ ἐπ' ἀκρὸς ὁσπὲς γλω-  
σσίδων, ὅθεν τοῖς φύλλοις. Dal. moner sic habere quæ-  
dam exemplaria: ἐπ' ἀκρὸς ἔξ ὁσπὲς γλωσσίδων ὅθεν  
τοῖς φύλλοις: sicque legendum putat, Lacun. ex vet.  
cod. sic. ἔξ ἐπ' ἀκρὸς ὁσπὲς ἐπ' γλωσσίδων ὅθεν  
τοῖς φύλλοις. in foliis. Quidam al. γλωσσί-  
δων ἐκ φύλλων μικρὰς. vet. addit μικροῖς. Coma caput  
dolentibus vtile amuletum creditur. Malagmaris  
radix expressusque succus admiscetur.

Diosc. varia  
lectio.

Cap. alior.

Diosc. com-  
reli.

Cæterum diuersimodè scribitur ab Autoribus.  
Bas. cod. & Paris. ἵππογλωσσὸν habent, & Marcell.  
Hippoglosson. Apud Gal. & Paul. ἵππογλωσσον. quæ  
lectio nobis magis probaretur, maximè cum ei  
consentiat ezymon à Gal. simpl. reddidit, his  
verbis: ἵππογλωσσὸν διαίτησις ἐστὶ τῶν ἐκ τῆς  
ἐπ' ἀκρὸς τοῖς κορυφαῖς πέντε γλωσσίδων: Hypo-  
glosson ex eo nomen traxit, quodd summis illius  
Corymbis proximè velut ligulæ innascuntur.

Plin. Hypoglossam vocat, quamvis quidam Hypo-  
glosson in vet. cod. legi notent. Folia habet  
[inquit] silvestris Myrti, concaua, spinosa, & in  
his ceu linguas folio paruo exeunte de foliis. Hæc

malè à Plinio dici Dalech. annotat, quodd id nuf-  
quam dicat Diosc. de Hippoglossi. Lauro taxæ fo-  
lium paruum exire de foliis, quod in alio nullo  
genere Lauri videatur. Quasi verò Plinio nihil a-  
liud scribere permillum sit quàm quæ Diosc. ha-  
bet. At habet Hippoglossum, saltem quod hodiè  
vulgò Herbariis ita dicitur, folium paruum ceu  
linguam maiorebus foliis exeuntem. Aut docere  
debet Dalech. in suis annot. in quo differat Hypo-  
glossa à Lauro Taxa Plinii, aut tacere. Næ faci-  
cit interdum Dalech. intelligendo, vt nihil in-  
telligere videatur. Qui si hunc accusat, quod lin-  
guam tuæ Hippoglossæ tribuat, idem est, ac si ne-  
garet, nominis vim clarè id exprimere, quod mi-  
ramur aliqui in tanto Græco & Herbario, qua-  
lem ipsum fuisse constar. Pergit Plin. Capitis do-  
lorem ex his [foliis] impōita minuit. Item pau-  
lò post idæ herbe folia sunt, quæ oxymyrtines  
&c. vbi sanè hanc eadem intelligere videtur.  
Iamdudum verò Alexandrinam Laurum ab ali-  
quibus Hippoglotion vocari monuerat. Vide sub  
Lauro Alexandrina.

Marcell. in Diosc. suâ versione retinet nomina  
quæ postea ab alijs reiecta fuere, nempe hæc. Sunt  
qui (Hippoglosson nepi) Antirrhinò, qui Anarrhinò  
qui & hanc Lychnidem agrestem vocent. Romani  
pariter Græcis Hippoglossum appellat. Idem addit:  
Ruscii, quæ silvestris Myrtus est, folia habere Hip-  
poglossum omnes testantur. Ea non aded gran-  
dia sunt, & præter id in cuspidem acuminata de-  
sinunt. Eam ob causam, siue magnitudinem, siue  
eorum linguæ figuram in ea voce [Hippoglossi]  
intelligas, nulla in folijs ratio erit. Nec  
si etiam, vt in Plin. adhuc legitur, Græcam præ-  
positionem, in coniunctam linguæ à Græcis fuisse  
credideris, Dioscoridis historiae respondebit:  
ἐπ' ἀκρὸς enim, id est, in summo lingulas exire hic  
ait ὅθεν τοῖς φύλλοις, id est, secus & secundum folia:  
quæ hic intelligit in caule suprema. At caulis  
desinens non folia profert, sed conferat lanugi-  
nis potius quàm foliosæ comæ in latitudinem se  
aperiens inuolucrum: non aliter quàm in spicatis  
aliquibus seminibus & floribus sit. Differetamen  
à spica quodd rotundæ, quatuordec plerumque an-  
gulis spicæ surgunt in hac quod vltimum in cau-  
le exit, in latitudinem se explicat. Et quoniam  
humanam linguam imitatur, ided Hippoglossum  
quasi grandis lingua dicta. Hæc Marcello origo  
nominis & causa est. Quæ licet Plinij histonæ  
aduersari videantur, (ait enim, & in ijs ceu linguas  
folio paruo exeunte de folijs) memnerint tamen  
omnes, insit Marcell. sequi nos Græcos Scrip-  
tores, præcipueque Dioscoridem, & in vertendis,  
eius verbis, quam debemus illi fidem præstare,  
qui ἐπ' ἀκρὸς ὅθεν τοῖς φύλλοις, prodire linguas ex  
Hippoglossi dicit, quod est in summo & secun-  
dum folia: non ex folijs, sed ex summo caule,  
qua parte desinunt folia, exire ea dixit. Id enim  
ἐπ' ἀκρὸς aperte significat. Cæteræ appellationes,  
vt idem sentit Marcell. ex similitudine aliqua, ve-  
rò importunè, illi accreuerunt. Vult igitur Mar-  
cellus, Hippoglossum neque à foliorum quæ Rus-  
co similia habet magnitudine, neque ab Equina  
linguæ figura dici, neque Hippoglossum à Plin. re-  
cte nominari, cum ἐπ' ἀκρὸς id est, in summo caule  
proferat, quæ humanam linguam imitantur, va-  
de Hippoglossum, id est, grandis lingua, munc-  
pandum.

Cordò autem quædam Diosc. exemplaria Hip-  
poglossum habent, sed malè. Nam nomen suum  
ab Hippoglotione inuenit: propterea Marcellus  
malè Hippoglosson legi censet, qui nequaquam  
etiam



etiam verum Hippoglosson in suo commentario indicat. Nescio enim quam spicatam lanuginem inducere conatur, cum tamen nullus nunquam auctor alicuius lanuginis, vel spicæ, in hac herba mentionem faciat. Mihi profecto Hippoglosson, siue Hippoglossidion, siue Hippoglossotron eadem esse videtur cum Lauro Alexandrina. *Hæc Cordus*, cui partim cōsentit, partim refragatur Hist. Lugd. scribens: Marcelli mentem non satis intellexisse videtur Cordus, quum scribit: Marcellum Hippoglossum malè legi censere: imò Hippoglossum legi vult. Multo verius dixit ille, Marcellum nequaquam verum Hippoglossum indicare: præterea cum eodem Cordo sentio, cum præpositione Græca *ὑπο* scribendum esse. Ita ab eodem dissentio dicente, Hippoglossum eandem esse plantam cum Lauro Alexandrina, eam nimirum, quam pro Lauro Taxa exhibuimus[ videlicet Bisslinguam. ] Hæc Hist. Lugdunensis.

Nos comperimus apud Marcellum ei placere Hippoglossum dici, quasi grandem linguam, sed nescimus ubi velit Hypoglossum legi. Vnde autem Marcellus opinionem desumpserit, lanuginem requiri in Hippoglossio Dioscoridis, nondum intelligimus. Hist. Lugd. exhibenti Polygonati genus pro Hypoglossio assentire non possumus, ut copiosius dicemus, suo loco.

Cornarius approbat Cordi lectionē, cum scribit Verus noster codex aperte Hippoglosson habet, & non Hippoglosson, velut ferè vulgata Diosc. exemplaria. Angul. hic rursus aperte proficitur qualis planta sit Hippoglossum dicere se non posse: nullam plantā sibi viam quæ respondeat descriptioni, nulloque modo respondere Bonifaciam. Penæ & Lob. in Adu. Laurus Alexandrina Diosc. quæ Theoph. Ruscifolia *ῥυσικη* siue super folio baccifera, ab Hippoglossio differt, ut in promptu esse dicunt ex Theoph. & Diosc. noscere: quippe fructum siue baccam coccineam medijs in folijs hærete, nullius ligulæ facta mentione uterque asserit: foliaque molliora, maiora, & albidiora quam Rusci inesse Diosc. subdit, viresque diuersas reddit, & radicem maiorem, odoratam. At Hippoglossi radix minor &c. Vide postea de Bisslingua.

Fabius Columna in Hist. Lugd. inuenerit, quoddam existimet Hippoglossum ab Hippoglossio differre, inque doctiores insurgat, malè illos Hippoglossi etymon intelligere asserens. Nullam quidem aliam inter illarum historias esse differentiam, nihilque ad plantæ cognitionem facere, ut *ῥυσικη* vel *ὑπο* dicatur, cum sciamus Plin. Diosc. & Galenum eandem plantam designare voluisse. Quod verum quidem est: sed interest tamen Dioscoridi classico & probatissimo auctori genuinam & veram, non adulterinam lectionem restitui. Si *ῥυσικη* & *ὑπο* nihil facit ad plantæ cognitionem: at facit etymon, ad quod & Gal. respexit, exactam cognitionem, atque adeo ad ipsam adeo plantæ formam. Nam quicquid ille dicat, aliud est si sciam *ὑπο*, id est, infra folium linguam esse: aliud, si sciam *ῥυσικη* *ῥυσικη*, quasi equi linguam esse. Quid enim aliud denotet *ῥυσικη*, nostri magistri nos non docuerunt. Sed hæc ad prædictas Grammaticos releganda.

Ut tandem concludamus, hoc Hippoglossum multis idem videtur cum Bisslingua, de qua paulo post specialius differemus: alij negant.

#### RADIX IDÆA VETERVM.

Et hanc quoque distinctam facit Diosc. à prædictis, distinctoque capite de eâ tradit. Idæa

radicis, inquit, folia Oxymyrinen (Ruscum) referunt: iuxta ipsa verò exigui sunt veluti capreoli seu pampini [*ῥυσικη*] ex quibus etiam flos emergit. Radix valde altringens est, sis proinde conueniens quæ adstrictione indigent. Bibitur & aduersus alui profluvia, Austoremque muliebrem, & omnem sanguinis eruptionem facit. Sunt autem *ῥυσικη*, ut censet Fab. Columna, viticulae parua seu petioli, ab Hist. Lugd. (cuius auctorem, *ῥυσικη*, Autorem plantarum passim vocat, quasi nemo ante eum de plantis scripsisset) perperam *ῥυσικη* putati, verborum proprietatem suæ opinionis improprietate extorquebat, ut planta ab ipsa depicta Hippoglosson videri potuisset.

Plin. non Idæam radicem, ut Diosc. à parte posteriori, sed herbam Idæam vocat, eademque dicit: nempe Idæa herba folia esse quæ Oxymyrines: adherere his veluti pampinos, in quibus flos. Ipsam autem alium, mentesque, [*ῥυσικη* pro *ῥυσικη*], hoc est, fluxu mulierum transcribit[ & omnem abundantiam sanguinis silitere. Spissandi cohibendique naturam habet.

Idæa radix, inquit Gal. gustu admodum acerbata est: ac, si opere periculum facias, eandem vini præferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, Dysenterias, profluvium mulierum, & quæcunque eius sunt generis, tum pota, tum foris imposita curans. Quibus sanè verbis, ut annotat Columna, Gal. Idæam radicem non cognouisse videtur, cum taceat vim calefaciendi & frigefaciendi, quarum aliqua præditam esse hanc plantam necesse est: nec quo ordine, siue excessu, scribat, ut in alijs solet, calefaciat, refrigeret, & an moderata sit, vel contrarijs constet facultatibus.

Conqueritur Clusius Idæa radicis descriptionem apud Diosc. valde multam esse, ut difficile sit certi quippiam statuere. Quapropter non abs re alicubi maximorum ingeniorum æmulus Scalliger Dioscoridem aliquantulum negligentem fuisse prodidit.

Fab. Columna Bisslinguam, de qua paulo post, vult esse Radicem Idæam. Sunt alij qui velint esse plantam Viti Idæa quibusdam dictam affinem, de qua antea egimus titulo Radicis Idæa, cui vires melius conuenire videntur: non item figura folij Rusci.

#### BONIFACIA SIVE BISLINGVA.



N Eoteticis Descriptio  
Bonifacia  
siue Bisslingua  
nuncupata scilicet  
quicubitalibus,  
lentis, hilari vi-  
rore perfusis,  
striatis vimini-  
bus multis à ra-  
dice adolefcit,  
per quos alter-  
nata ferè folia,  
interdum plu-  
ra veluti ex ge-  
niculo radiata  
visuntur, nunc  
latiora, nunc  
angustiora, pul-  
chre virentia,  
crassiuscula,  
neruosa, verè a

Flores.

Bacca.

Turiones.



semel tantum vidisse meminimus Romæ in horto quodam, ubi colà à multis solet, quæ primulum rubere incipiebat. Fab. Columna paulò specialius describens Radicem Rusci similem dicit maiorem verò, à qua plures turiones, Alfaragi, vel Rusci modo exeunt, cibo apti, qui postea in virgas distendantur, cubitales ferè, vel cultu maiores, læves, virides, flexibiles, à medio ad summum vsque folia habentes formà acutæ Myrti, Rusci scilicet, similia, maiora verò & formà parum angustiore, ad nouella Rusci folia accedentia, viridiora & molliora: nec ita pungentia, etia acuta sint: alternatim virgas circundant, sed quæ proximiora sunt terræ, Rubiæ modo ternâ circum virgas hærent. In ipsi folijs viticulae parvæ seu petioli enascuntur, tenues, breues, sed Rusco longiores, in quorum extremo vere flos exit herbaceus, stellatus, sex foliolis constructus, medium habens purpureum, non dissimile Rusci flori. Fructum edere minimè vidit, sicuti & amici multi, qui plantam viginti annis coluere, nec unquam nisi florem edere animaduertunt. Quod solo & cælo imputandum est: alibi enim fructus perficere rubros ciceris magnitudine, ut Ruscus asseritur. Ligulam è folio exeuntem etiam alij non observarunt.

Hippoglosson.

Hernol quoque acinos rubentes Rusci modo sibi visos testatur. Hippoglosson & Hypoglossam vocat. Cborallæ genus Hypoglossidas vocari ait, aut ex Lauro Alexandrina, quam & Hypoglossida appellabant.

Laurus.

Marcel. Laurus Alexandrina est: ἡ ἀνδροειδής, ut ait Theoph. idem Laurus etiam dicta. Stephanon itidem, id est, coronam, quod pro Lauro ad coronas fortè vterentur, dictam ait: censetque Alexandrinam Laurum dictam quòd Alexander victor ea usus fuerit, etia Plin. Daphnoidi id tribuat.

Alexandrina Laurus inde.

Sciendum illud etiam, inueniri aliquando in ea simplicia folia, quæ super natum illud folium minus non habent: Sed sterilia ea sunt, manifesto argumento superhæsi illud folium fructus causa.

Varietas.

Hypoglosson & H. poglossidion à quibusdam vocari eandem Diosc. ait: idem monuit Plin. factumque id nomen à lingua est: nec aliud significat quàm quod sub lingua habetur aut huiusmodi quippiâ. Credit Marcellus potuisse quondam sic dici, quòd ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris fortè vterentur. Idem Laurum Alexandrinam non separat ab Hippo-

glossio Diosc.

Hippoglosson hodiè vulgus Italicam Bonifaciâ vocat: multi paganam Linguam, autore Ruell. Hippoglosson vocat: multi paganam Linguam, autore Ruell. Epiphyllocarpos eident: cuius duo genera constituit: vtrum quod duplici folio constat: aliud quod simplici folio est: duas quoque figuras habet distinctas, nomine maris & feminae.

Tragus quoque Laurum Alexandrinam Diosc. dicit, & à Theoph. ἐπιφύλλοκαρπον eleganter dici ait: Hunc secutus est Eurius Cordus in colloquio suo de herbis: Ruellium notans quòd non cognouerit Laurum Alex. cum Hippoglossio eandem esse à foliolo, inquit, Lingulæ aut Vuulæ appendicæ similimo apud Germ. nomen inuenit Zappflintraut, hoc est Vuularia: dicunt etiam Zappflinblatt & Kockenblatt. Suspiciatur etiam canescere esse Chamædaphnen Diosc.

Fuchsius quoque Daphnen Alex. & Idæam vocat, Germ. haueblatt & Aussenblatt Theoph. ἐν δούλλοκαρπον & Apulei ἰσχυρίδιον: quòd nimirum ea pro Lauro in triumphis & victoriæ signum vterentur, quamquam in eo capite Apul. Daphnoida cum Victoriola confundat.

Cornar. nimis audenter pronuntiat in Vuularia nullum fructum compærere, alij viderunt, ut Tragus, nos &c.

Hippoglossum, tradente Turnero, Offic. & Herbariis Vuulariâ vulgò dicitur & Bonifacia. Accedit multum ad Laurum Alexandrinâ dictâ: sed illud lingulas & semen habet in foliis: Hæc verò duntaxat fructum inter folia, non autem lingulas. Videntur ergo in hoc differre. In monte Athos, ubi Hippoglosson frequens, teste Bellon. dicitur Curaco Vutano, id est, Gallicè herbe de la Corneille: Herba cornicis.

De Lacunæ quoque opinione, Hippoglossum, seu ἐπιφύλλοκαρπον, ut legi ait in quibusdam codicibus, non est idem cum Lauro Alexandrina, ut quidam putarunt, quia, inquit, ea non producit ex folijs parua folia, sed tantum fructum. Is duas icones proponit ex Matth.

At Amato Hippoglossum, Hisp. Lengoa de Calahor est idem, nisi, inquit, quòd plerumque in Hippoglossio ex maiori & vero folio minus folium è medio non oritur: quod si illi inesse aut nasci contigerit, nunquam inter illâ duo folia, fructum illum rubrum gigni videbitur, qualem in Lauro Alexandrina oriri percipimus. Eâ de causa Laurus Alexandrina à Theoph. Epiphyllocarpos nominatur, quam nonnulli masculinum. Hippoglossum verò feminam dicunt. Lauri Alexandrinæ folia longè quam Rusci sunt maiora, quamvis in nonnullis exemplaribus Diosc. per Marcellum versis non sine mendo legatur minora folia quàm Rusci.

Guiland. quoque suam opinionem habet. Laurum Alexandrinam (inquit) fructum inter folia ferre contra veterum autorum sententiam dixit Matth. Diosc. ἐπιφύλλοκαρπον sic nasci cum rectè tradente, atque Theophrasto ἐπιφύλλοκαρπον asserente, quicquid dicat Plin. Non modò non differt, quod Matth. negat, Laurus Alex. & Hippoglosson, sed nec Chamædaphne. Hippoglossidis coronæ mentionem fecere Plato comicus in Ioue: Theodorus in Atticis dict. & Pamphylus in libris de nomenclum compositione, quam ex Hippoglossi foliis conficisse satis apparet. Nec me mouet Gal. Paul. & Diosc. separantes. Doâ. duas species tradit reperi, nempe præter Hippoglossi, Bilinguæ aliâ adhuc species, in qua ex doctorum testimonio



nio foliolum non accrescat folio: hanc hippoglossum foeminam, illum, marem dicitamen vnam tantum figuram habet. Idem ὑππογλωσσόν, Recentioribus Victoriam, & *duplex alexandrina* & *duplex* ab Ida Troadis monte, quæ & Alexandri Troas dicta est, eandem indicat. Nec referre ait, quod Diosc. de Hippoglossis vno loco, alio verò de Lauro Alexandrina scripserit. Nam de vna stirpe, quandoque sub diuersis appellationibus separatimque locis agere Dioscoridem & alibi à se ostensum, veluti cap. Tusilagine. Nec etiam refert (addit) quod Ruell. vñso habet semina inter folia exire, aut quod talem iconem Ruellianæ interpretationi respondentem Matth. exhibuerit, fructu videlicet & longis pediculis. Ruellii autem conuersionem non esse fidelem & ipse Matth. postea agnouit. Mirum tamen tam falsam & imaginariam iconem in suis commentariis reliquam fuisse. Hæc illi. Verum de hac Matth. iconi plura dicemus cap. de Polygonato ramofo.

Lonicer. in sua historia more suo duas icones Bilinguæ ponit pro diuersis plantis, nimirum priori titulum faciens *Zapfenfrant*, quam dicit Laurum Alexandrinam & Victoriam: alteri capit. seq. *Zungenblat* / Hippoglossum. Idem in comment. l. 4. c. 12. in Diosc. euidenti repugnantia dicit Hippoglosson, id est, equinam linguam sibi incomperat: & c. 142. tradit Laurum Alexandrinam Germ. vocari *Zapfenfrant* & *Hochenblat*. Inunc si lubet, & cuiusmodi varianti Scriptori vel potius nugarioris nescio, fidem adhibeto.

Ryffius quoque in Diosc. bis ponit eandem iconem, sed non pro diuersa planta: scribit se Laurum Alex. Diosc. eandem putare cum eius Hippoglossi. Verum nescimus quid sibi velit cum ait, Nec me fugit nullam in ea quæ vix medeatur familiaritatem inueniri, à qua tamen ei inditum nomen, vt hinc etiam Germanis Vuulæ folium dicatur: immò ne aliquem quidem foliorum vsu. Quid hoc est: quomodo conueniunt cum his quæ sequuntur? Sub lingua teneri solita sunt folia, vel hodiè, non tantum apud Infubres vt Marcell. ait, alique Gentes, sed etiam in Germania nostra sit, quoniam abundantem puerorum saluam & distillantem in fauces humiditatem, vnde vel prolixæ columella, id est, vuulæ, vel fauces babuæ lingue impedimentum oritur, cohibere & siccare opus est. Sanè, vt ipsa locutio satis obscura, sic contradicção satis manifesta apparet.

Género meliùs Hippoglossus, quam Hippoglossus scribitur, quam & Laurum Alex. vocat, & cum Rusco aliquid cognationis habere censet. Ceterum Laurum Alexandrinam Diosc. quæ Ruscifolia Theoph. (vt annotant Aduers.) aliam esse ab Hippoglossi, cuius in promptu est: De Theoph. & Diosc. nosce: Hippoglossi siue Linguae radix minor, gracilior, breuior: foliū tenue, paruum, cui medio quasi cauo aliud foliolum, lingule instar, insitum: aculeo rigido, infesto, mucronatum vtrumque, inter quæ bacula etiam rubra Rusci videntur, suspiciendo naturæ, propter raritatem, opere. Quare versionem Plinij legenti, satis liquet, diuersas esse plantas, lectionemque Hippoglossi apud Diosc. luxatam fuisse: videturque Plin. legisse, non *rouis*, sed *zax*, id est, non comosa, sed caua folia, siue inflexa, cuiusmodi planè sunt etiam nostratis Bilinguæ siue Bonifaciæ.

Senensis quæ ingenij est opulencia & liberalitatis, vbi ceteri Scriptores putant descripio-

nem, nomenclaturamque geminam esse, duntaxat vnus & eiudem plantæ, non solum dedit, vt par fuit, *Bonifaciam* pro *Hipp. glossi*, sed insuper duas commentus fuit. Alteri nempe affixis affabrè lingulis, quam postea, prudentior factus, delendam curauit: Alteri datis in petiolis longis baccis, quam Sigillum Salomonis merito suspicantur, in illumque quasi impostorem ignarum debacchantur isti Critici, quod toties, totque annos, cum versaret aut versare debeat diligenti, ac fideli manu, oculis, ac ingenio hæc plantam, tandem non animaduertit Theophrasto & Diosc. Lauro medijs in folijs fructum, non in petiolis inesse: sed illam demptam, quali foret à se fictam commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cap. similior est ea, quam quidam Herbariorum peritissimi in hortis colunt & veram affirmant Alex. Laurum.

Sed argumenta quibus negant Aduers. Bonifaciam seu Hippoglossum esse Laurum Alexandrinam, nobis videntur parui momenti: & quod aiunt, folia Hippoglossi esse spinosa, quod & Clus. dicit, id negant Casalp. Dod. & Fab. columna: Verum hi fortè describunt cultam, illi siluestrem & spontaneam, cuiusmodi fere cultis solent esse rigidiores aut hispidiore. Lectiores videant, quæ antea de Lauro Alex. tradita.

Anguillæ iudicio Laurus Alex. nihil aliud est quam Bonifacia: & alibi tradit Hippoglossum non conuenire vllò modo cum ea quæ dicitur Bonifacia & Bilingua: nullam ferre comam spinosam, nec ex corymbis prodire vllas linguas. Matth. in com. in Diosc. l. 4. c. 142. Bonifaciam seu Bilinguam scribit non esse Laurum Alex. aut Idæam, vt existimat Fuchs. in suo com. de plant. historia. Quippe Laurum Alex. è foliosumymbilico nullam exercere linguam: sed tantum fructum rotundum, Tiliæ modo, longiōssipediculis appensus, proferre. Idem postea c. 143. Siquis, Laurum Alex. & Hippoglossum vnam & eandem plantam esse sensisset Diosc. vt quidam existimat, superuacuum erat de ipsius diuersis & proximis capitibus differere: diuersas quoque vtriusque notas assignasse. In Lauro Alex. nec linguarum meminisse nec aculeorum è folijs prodeuntium: ferre fructum rubeum inter folia, non autem in medijs folijs. Ex his notis, tum ex viribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehendantur, omnibus abundè constare arbitrat, hallucinari eos, qui putant vnam & eandem plantam esse. Se equidem illam, cuius dat figuram, legitinam Laurum Alex. censere. Huic alteram adiecit, quam & ipsam haud dubiè Laurum Alex. fore: si huic fructum in medijs folijs innasce concedatur. In Epit. primo pro Hippoglossi ponit, & postea pro Lauro Alex. 2. Sed sciat lector primam omnium iconem Matthioli pro Lauro Alex. positam esse Polygonatum ramolum, de quo alibi trademus. Secunda similis est Hippoglossi, sed in ea fructus appingitur sine foliis, quam in comment. cum magnis fig. Lat. & Ital. omisit, fortè quia contrariari videbat (suis verbis, quibus dixit, Laurum Alex. non ferre fructum in medijs folijs, sed inter folia, contra manifestum textum Diosc. & Theoph. Plinium potius & Ruell. sequi maluit, vt tueretur suum Polygonatum ramolum, cui malè in hist. Germ. tribuit nomina & vires Vuulæ, seu Bonifaciæ. Camer. in epit. eiusdem Matth. omisit quoque alteram Laurum Alex.

C. Bauh. in vltima Matth. editione tradit Hippoglossum duplex esse, alterum in quo fructus pediculo, alterum in quo folio insidet: quod etiam

Matth. im.  
postura.

Pena ex  
Lob. epini o  
reseda.

An folia.  
spinosa.

Bonifaciam  
non esse  
Laurum  
Alex.  
Fuchs. mot.

Matth.

Hippoglossi.  
sum alius  
C. Bauh.

ponit in sua Matth. editione nomine Lauri Alex. 2. Idem insuper in Animaduersionibus in Hist. Lugd. monet Laurum Taxam cum Lauro Alexandrina vera non confundendam esse, cum diuersæ sint, utramque se à D. Agerio habere: aliam fructum habere cum pediculo, in altera fructum infidere folio. Sed num Bilinguæ vulgaris, quia pediculum habet fructus, ideo folio non inhidere dicemus? Cæsalp. & Clus. meminerunt quidem Hypoglossi siue Bilinguæ sine medio folio aut glossario, fructu ex petiolo pendente. Glossaria nobis videntur facere differentiam, non pediculi.

Cæsalpin. equidem, ut industrius Botanicus, mirari satis non possumus Laurum Alex. Diosc. à Lauro Alex. Theoph. & Plinii distinguente, ac putantem polygonatum ramosum eam esse, atque adeò Rusco affinem dicere, quam longè differentem alio loco trademus. Paulò antè dictum Penæ & Lob. Bilinguæ folia esse pungentia, quod negat Cæsalpinus.

Manardus, ut obseruauit Hist. Lugd. pro Lauro Taxa Plin. Laurum Fraxineam vel Fraxinum Lauream (vtrum enim velit non satis explicat) legendum esse censet, quoniam Lauri folio Fraxineum simile sit. Sed cum inter tot Lauri genera nemo vnquam Fraxinum retulerit, nec Lauri Fraxineæ vilius vnquam meruerit, periculi debuerat, quænam esset illa Laurus Taxa, potius quàm Plinii lectionem sine ratione mutare.

Laurus Taxa Dalechampi ea est, quæ Matth. & Dod. Hippoglossum. Lauri & Taxæ appellationes optimè conueniunt: Lauri quidem à Laurinis foliis figurâ: Taxæ verò à colore, figurâ, magnitudine fructus, qui Taxi baccas omnino refert. Dalechamp. chamædaphnem esse non sine multis & validis rationibus arbitratur. Ex eiusdem sententiâ, Hippoglossum Diosc. ac Galepi & Hippoglossa Plinii est frutex diuersus à Bilingua: (intelligit polygonatum) Laurus Alex. Diosc. & Theoph. etiam diuersa. Hæc Hist. Lugd. vel eius conscripserunt Molinæ: qui pro Lauro Alex. ponit iconem Matth. in qua fructus sine ligulis foliis appicti: nescimus an Dalechamp. fuerit eius sententiæ quam ei attribuit: si ita est, indigna profectò opinio: docto viro: aliquid statueret ex sola iconè à Matth. proposita, cuius nulla extat descriptio, ac ne loci quidem notatio, ubi vel à Matth. vel à Dalech. visa, temerarium iudicamus: quamvis fortè possemus. Nolumus tamen ex umbra metiri rem, quod aiunt. Præterea Hippoglossum illud quod exhibet, de quo cap. de polygonato agemus, non est frutex. Argumenta eius contra Cordum putantem Hippoglossum & Laurum Alex. eandem esse plantam, cum F. Columna parui facimus: quandoquidem pro iis proponit icones plantarum sibi incognitarum, ut suam struat opinionem.

Clusius veram Laurum Alex. nunquam vidisse ingenuè fassurum se scribit, si ab eâ quæ vulgò Bilingua dicitur & Hippoglossum Dioscor. esse censetur, diuersa sit. Theophrastus enim nusquàm Hippoglossi meminit, sed Lauri Alex. duntaxat. Eidem Clusio Dalechampi Laurus Alex. quam baccis in medio foliorum impressis, nec vlla epiglottide tectis exhibet, valde suspecta est; an ipse similem viderit dubitare videtur, sibi sanè nusquam inspectam fatetur. Memorat in vit. sua historia, anno 1596. misisse ad se virum eruditissimum Sim. de Tovar Hispanensem medicum, speciminis gratiâ veræ Lauri Alex. folia cum suis baccis, ad Theoph. descriptionem paulò superius memoratam ad amussim congruentia: atque postea

ab aliis qui ex Italia redierunt; istic in quibusdâ hortis satis frequentem eam plantam admonitus fuit.

Tabern. quoque Hippoglossum & Laurum Alex. eandem censet, duplicem faciens marem & feminam, quæ mari valde similis sit, nisi angustioribus & acutioribus esset foliis. Duas icones habet satis bonas c. 137 & 138: Nostræ sunt ex Guarinianis emptis.

Nic. Braun apud eundem Tabern. posuit iconem Bonifaciæ sine foliis ex folio, addens hæc verba: Cur Autor (Tabern.) hanc herbam Laurum Alex. Matth. nominet scire non possumus, quandoquidem ille improbat eorum opinionem qui hanc herbam Laurum Alex. vocant. Matth. Laurum Alex. posuit Tabern. inter Polygonatas, vnde vult 3cl.

Sed notari poterunt, ait Marantia, qui Bonifaciæ vulgarem pro Lauro Alexandrina depingunt quando hæc ramos in terram spargere debbat, at Bonifaciæ in rectum magis ramos profert, ac propterea Hippoglossum potius censenda. Tandem & industrius herbarum exploratorem Fab. Columnâ paucis audiamus. Is tradit nullam sibi repperit plantam, quæ ad radicem Idæam Diosc. folio Rusci referri queat, quàm illam quam depictam exhibet: [est autem Bilingua: eadem nimirum cum eâ quæ à nobis proposita.] Eandem, inquit Veteres, Diosc. & qui sequuti sunt ipsum Gal. & Plin. Hippoglossum appellarunt. Hippoglossum autem, Laurum Alexand. Laurotaxam, & Chamædaphnem eandem plantam cum Radice Idæa censo: nec nisi nominum diuersitatem habere à Scriptoribus diuersis impositam, quam Diosc. & qui sequuti sunt eum non animaduertuerunt. Valerius Cordus in eâ est opinione, ut Hippoglossum & Laurus Alex. eadem planta sit, quam etiam Hist. Lugd. auctor reicere conatus sit, non tamen suum consecutus est finem.

Gaudet vmbrosis & montanis: frequentissima in Liguria alpibus, Vrbinari agro, & quibusdâ siluosis montibus, Matth. spontè etiam nascitur montosis, saxosisque & asperis, incultis Genæ, Portus Lunæ, Saonæ, Nicæ, atque alpinis sterilibus calidiorum tractuum: Aduerit. Est & in monte Athos frequens: Bellon. Apud Germanos non prouenire Brunfels. scribit, causam suspicatur cæli qualitatem illi contrariam. Ex Vngaria adfertur. Clusio auctore, in montibus nascitur, & abundanter quidem in monte imminente oppidulo cui nomen D. Georgij, in Transdanubiana Pannonia, tribus ab vrbe Posoniensi miliaribus, inuenitur: vnde Rhizotomi plurimam adferunt Viennâ. & eius vrbs mulierculis vendunt: nam magno illis est in vsu, præcipuè autem ad vna procidentiam. In Silesia hortis viret ex collibus Pannoniæ Danubianæ allata: teste Schuenckf. Patauii quidam in hortis colunt: Romæ abundant horiti, ut notat Lacuna, ubi & à nobis visa sub Maij finem baccula iam rubere incipiebat. Visa nobis etiam Florentiæ florens Aprilis: Ferrariæ in horto Monasterij S. Dominici al' Angeli: Bononiæ in horto di S. Saluator aliique. Habuimus aliquando in horto Illustriss. Cell. Wirtemb. Montbelg. missam cuidam industrio Botanico & Pharmacopœo ex Burgundia: verum non diu durauit. Gesnerus refert in hortis latam prouenire quidem, sed pumilam manere neque fructificare. Radix quidem satis crassa, carnosa & geniculata cum sit herbam viuacem offendit. Raro tamen si Camer. credimus vltra annum vel alterum in horto, ut pote nimis montana, durat,

C. Bauh.  
not.

Cæsalp. opi-  
no reiecta

Polygonatum  
ramosum.

Laurus.  
Taxa.  
Manardus  
not.  
Laurus  
Fraxinea.  
Manardus  
repreh.

Taxa unde  
dicta.

Chama-  
daphne.

Laurus  
Alex. diuer-  
sa à Bilingua.  
Hist. Lugd.  
error.

Alter error.

Tortuosus  
lup.

Laurum  
Alex. esse  
Hippoglossum.

Dalech. not.



Quæ Veteres de Lauri Alex. Hypoglossi, & Chamedaphnes virib. tradidère, licebit vidère in præcedentibus. Libuit enim ibi particulatim cuique suas, vt illi fecerunt, tribuere, ne in re dubia & tam controuersa, vt patuit, temerè & præter mentem illorum Veterum scripta, quod plerique magna securitate facere solent, temerè dispensemus.

Sed quid Recentiores de Bonifacia viribus tradiderint, nunc videamus. Est ei, teste Marcello Virg. acrimonia & calefaciendi vis, idèoque Priscis ad siccam linguæ nimiam humiditatem in pueris adhibebatur, vnde Hypoglossi dictam putat. Insuores aliquæ Gentes aliquæ eodem autore. in balbutientibus pueris vtuntur eà: inbentque tub lingua habere mares duplex eius solum & fœcundum: simplex verò & sterile illud fœminas: quod superstitione carere vix credimus. Germani, vt obleruat Tragus, in faucium Viceribus & humectâ supra modum Columellâ & agginâ duntaxat hodiè vtuntur. Herba & radix in puluerem redacta, exsiccat manantia & fluentia vulnera ac vlcera, quemadmodum vulgaris Aristolochia. Cornusum eius ad Columellam prolapsam leuandam prædicat. Constat, inquit Cordus, certissimis vulgi experimentis Vuulariæ radicem etiam siccâ bubones in peste maturare. Hinc est, quod malacticam vim Hippoglossi radicis Autores tribuunt. Vuularia difficulter parientes epota adiuuat, niſes cit, & calculus pellit, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen easdem etiam facultates Lauro Alexandinæ Autores ascribunt. Tradit ex vino potam strangulatis vteri succurrere: herniis ab prolapsu interaneorum extuberantibus mira celeritate mederi: siquidem diffidentia iungit protinus, sed insubulandus est æger, aut sciendus primis diebus, ne rursus foras intestina prorumpant, fuasente Ruellio. Ergo Recentiores, vt annotauit Matthiol, longè pluribus commendant viribus Hippoglossum, quàm fecerint antiqui Scriptores: nam vt illi tradunt, in veteri ætate magno datur iuuamentum. Quo sit vt strangulatu vulua laborantibus mulieribus radicis aut herbæ puluis cochlearis mensurâ ex vino vel iure haustus præsentaneo remedio operam ferat. Est & ad puerorum enterocelas, si eadem & Cæsalpino credimus, præstantissimum medicamentum, si diutius diluculo hauriatur puluis idè sesquidrachmæ pondere ex maioris Symphyti decocto. Verùm id fumentibus euenire scribit, quod primis tantum diebus ad eam radicem pulsare percipiant, vt intestina foras prolabi velle videantur: quare subcingulis, fasciis & fibulis reprimentibus, roborantibusque primis diebus vtendum esse. Mira sanè eius vis, si his Autoribus habenda fides, ita protrudit intestina. Suspiciamur bonos hos viros ex malè intellectis Ruell. verbis ita dixisse, cuius tamen nec is nec alius meminit, quod legerimus. Huius etiam tam rare facultatis non meminit Dod. qui ex Baptista Sardo recitat vires huius stirpis ad suffocationes ex vtero, & intestinorum rames vehementer commendatas. Pen. & Lob. vires eius ad calculum dyfuriæque eximias celebrant.

Nonnulli appendunt hanc herbam pueris, vt nimia illorum humiditas exsicce-  
tum humiditas exsicce-  
tum.

\*\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*

Tom. I.

## RVSCVS.

## CAP. XL.



**R**uscus duorum do-  
drantum, non-  
nunquam etiâ  
duo à cubito-  
rum altitudine den-  
sis viminibus,  
lentis fractuq;  
contumacibus,  
& striatis fruti-  
cat, iisque in  
multos ramu-  
los ductis in  
quibus confer-  
tissima folia,  
Myrtinis paria,  
rigida, seruo-  
sa, mucrone in-  
festo pungen-  
tia, nullo pedi-  
culo ramis ha-  
rentia, parte  
prona ad latus inflexa, vt non sursum & deorsum,  
sed dextrorsum sinistrorsumque spectare videan-  
tur, dura & robusta: sapore amara, & adstricto-  
ria vi efficacique pollentia, ad quorum medium  
flos minimus, periculis pediculis haerens, exaspi-  
tur, qui vbi primum oritur, aciculæ nodulum si-  
gura sua exprimit: expansus verò trina latiuscula  
foliola, inferiore quidem sui, auersâque parte, foli-  
um, cui quasi stragulo incumbunt, respicientia,  
linitis in modum excavata, sinuataque ostē-  
tat omnia, reliquis interim tribus, quæ trinorum  
inftar radiorum sunt efformata, in angustum a-  
picem desinentibus. Florem deinde fructus se-  
quitur rotundus [non item solum] Asparagorum  
baccis maior, rubescens, subdulcis, sub cuius pel-  
licula bina latent femina magna, silula, alterâ  
parte gibbosa, alterâ plana, insignis duritiei, ita  
vt si in paumentu coniciantur resiliunt, & vt ait  
Lob. vix vlli frangenti ictui cedunt. Succrescit  
quotannis noui Asparagorum similitudine propa-  
go, aromatica aliquantulum, amara, vt annotat  
Lob. Radices crassæ, obliquæ, implexæ, fibras de-  
mittunt crebras, Asparagorum fibris similes, ab-  
bas, longas, & amaras: Trago: Dod. verò gustu dux-  
ce quidam respicientes.

Hanc ipsam plantam Dioscorid. *μυρτίνος ἀγρίαις, Myrtus*  
Myrti sylvestris nomine describit: Quidam & *βλα*  
Oxymyrinen dicunt: solum inquit, fert Myrti,  
sed latius, ad formam lanceæ mucronatam: sili-  
um rotundum, medio folio inhaerentem, qui  
per maturitatem rubet, nuda scumq; ossis inftar da-  
rum complectitur. Ramuli ab vna eadèque ra-  
dice numerosi exeunt, vitilium modo lentis, fractu  
contumaces, cubitales, foliosi. Radix Graminis  
similis, gustanti acerba, & subamara.

Ruell. in sua Dioscor. versione minis apposi-  
tè conuerit, baccæ à medio folio pendentes, cum  
Genè legatur, *αγροῦ Νέου μέτω τῆ πετάλι πτερύγι*,  
id est, habet in medio folia rotunda: neque enim  
ex foliis pendent, sed ipsi adhaerent, vt *αἰν-ῆα* te mend.  
docebit. Aut quid si cum doctissimo Saraceno  
legamus *περὶν*, alioqui ex his vocibus, *εργυλῶν* &  
*περὶν* alterutram redundare necesse fuerit.

Serapio verò, postquam fructum hunc itidem  
Ccc





Ryffio dicitur Ruscii 2. genus, & Ruscus arbore-  
scens, de quo suo loco.

Apud Ryffium est talis icon: nec unquam eum  
vidisse talem Ruscum certum est. Et tamen au-  
sus est Lonicerus eandem iconem ponere sub ti-  
tulo Ruscii Officinarum, & ignorantia maiori ad-  
didit, Ruscum quo Pharmacopœi apud nos v-  
tuntur, differre à Rusco vero, non enim ferre fru-  
ctus, ut ille ex foliis, sed ex particulari pediculo:  
quanquam ubi hunc pediculum viderit, incom-  
pertum habeamus. Profecto ridiculum quod ait,  
Ruscum horrendo suo aspectu Vespertilioes abi-  
gere seu arcere, qui non consideravit id accidere,  
ab infesto foliorum dense harentium spiculo,  
quorum compunctu abiguntur.

Turn. conqueritur Matthiolum Ruscum nimis  
angustum, Myrtum nimis latum foliis pinxisse.  
Sed in ipsa quoque Turneri historia error com-  
missus, in qua figura apposita nomine Sabinæ,  
videtur ad Myrtum referenda, quamvis parum  
bona.

Fab. Columna aperte testatur, nullam aliam  
Myrtum sylv. apud Dioscor. atque Plin. esse præ-  
ter *Myrtus* & *Myrtus*, à Romanis Rus-  
cum dictam, ut idem Dioscor. ait, & Plin. etiam  
testatur, sic à Castore dictam, atque nominis tan-  
tum varietatem esse, est plantarum historiae Lugd.  
compilator aliter somniat.

Pro Rusco apud Dorst. malè ponitur icon Vi-  
tis Idæ angulosa, malè etiam Ruscum Germ.  
*Heydelbeer* vocat.

Potèd Ruscum, quem ineptè officinæ *Brusum*  
vocat, à nonnullis *Scopam regiam* vocari scribit  
Marcell. empiricus vetus autor: Scribonius Lar-  
gus quoque sic vocat, & *Myrtum sylvestrem*. Germ.  
*Neußdorn* / à murina spina nomine mutato  
Item *Ruschfen* / *Brusch* & *Brusfen* / *Myrtens-  
dorn* / quasi Myrtum spinosam dicas.

Had. Iun. *Aerbesien* Belg. id est, Scopas vo-  
cat. Cordus apud Germanos nomine carere tra-  
dit, ut mirum sit Cornar. iisdem *Wilbe Myrten*  
dici, asserere audere. Vbinam audiuit? Belg.  
*Steevende Palm* / Autore Had. Iun. quod no-  
men, nostro iudicio rectius *Agnifolia* competere  
& alias iisdem *Neußdorn*. Gallis *Brusco*, inquit  
Matthiol. fortè quia ita à quodam novitio Phar-  
macopœo nomine à Latino deslexo audierat. A-  
lioqui hic sonus Gallorum non est, qui potius  
du *Bruscus* aut *Brusi* dicerent, sed Italorum, qui  
Rusco vocant. Sunt tamen qui iisdem Gallis *Brusi*  
dici notent. Item *Meurte saunage* : *Frellon*. Qui-  
busdam *Bouys piquant* : id est, Buxus pungens. He-  
truscis *Pungitropi*, eo quod circumligatus à carni-  
bus mures arceat. Hisp. *Brusco*, teste Had. Iun.  
Sed Lacuna notat Castil. *Iusbarba*, Portug. *Gil-  
barbey* dici. Amatus scribit Lusit. dici *Silendro*.  
Angl. *Encholine* vel *Enchull*: aliis *Bucher brow-  
me* / vel *Bochers Browme* : quibusdam *Peti-  
gre*. Bohem. *Geblicerylacta*. Burgundi du *Eri-  
con* vocant.

Dioscor. prodidit, nasci in asperis & præruptis  
locis. Cordus notat in Germania nascentem à  
se non visam, nec ab aliis ibidem nasci audivisse:  
propterea nullum eius Germanicum nomen ex-  
piscari potuisse. At in Italia facile & spontè sua  
gignitur multis in locis, secus itinera aspera & se-  
pes præcipue propè Bononiam.

In Germania nostra feri se quidem patitur, & à  
satu profilit. Semen eius & observatum Tragus per  
triennium sepe intra terram delitescens, tandè  
erumpit, & in mediocrem euadit fruticem, sed  
Tom. I.

fructum non profert, quod rigidiori apud nos  
hyemi ascribi debet.

Norimbergæ hiemem nisi clementiore non  
ferre, inquit Camer. sed locis subterraneis asser-  
uatam & ineunte vere loco umbroso collocatam  
baccas rubras in hortis suis producere. Ruscum  
plantavit Tiguri Gesnerus: qui cum fructum non  
ferret, & multi ab vna radice coliculi prodirent,  
distraxit in quinque plantas, & partim loco um-  
brosiore, partim magis aprico posuit. Crescunt  
autem [inquit] omnes, & nullum videntur solum  
aspernari. Ideoque suffruticem vniuersissimum di-  
cit alibi, additque: Plantam vnam ante 18. annos  
è Sabaudia horto secum attulisse, nescire cuius tū-  
atatis. Ab eo tempore in hortulo suo pulchrè vi-  
ruisse per totum annum, [quamvis bis aut ter in  
hortos translata diuersos fuisset] Vere germinasse,  
& veteribus arcentibus coliculos novos prom-  
pisse: floruisse etiam aliquando, & florum rudimen-  
ta vel hyeme in mediis foliis ostendisse. Fru-  
ctum quidem toto illo tempore nullum nè in-  
choasse quidem. Radicem videri talem esse, qualis  
ferè Hypoglossi & Polygonati: ideòque tam  
diuturnam pedis altitudinem non excessisse: nec  
minutam nec multiplicatam, nisi ut dictum. Re-  
fractos à radice coliculos leotium germinaturos  
arbitratur.

Copiosè etiam prouenit in Anglia Effexia,  
Cantio & Barcia, teste Turnero. Nos Montspelli  
passim crescentem obseruauimus, etiam ad altitu-  
dinem duorum cubitorum, maximè propè castel-  
lum nouum. Inter Lugdunum & Viennam Al-  
lobrogum spontanea frequens, & toto etiam tra-  
ctui Narbonensi. Vidimus & plantas è semine  
natas Tiguri in horto D. lo. Funckii. In Burgun-  
dia quibusdam montibus asperis & saxosis nihil  
frequentius, potissimum circa Clareuallum, op-  
pudum elegans E. C. Wirtemb. vnde in hortum  
Montb. plures transtulimus, quæ à multis annis  
iam durant: sed raris florent, fructum nunquam  
protulere. Et quasi in eodem semper statu perman-  
nent. In Italia sepibus & saxosis passim obserua-  
uimus, in Euganiis montibus cum baccis Februa-  
rio vidimus. In Belgio non nisi hortis colunt, ut &  
Basileæ D. Platerus. Floret hyeme, & fructus ser-  
uat (ubi ferre solet) vsque ab alterum prouen-  
tum.

Primo vere virentes & teneros admodum tu-  
riones promit, qui edi aliorum Asparagorum mo-  
do possunt, ut dicitur mox. Autumno semen per-  
ficitur. Radix & tota adeò planta Patauii & Ve-  
netiis copiosè vendi solet.

Folia & bacca in vino potæ vrinæ cient, men-  
ses pellunt, & calculos vesicæ frangunt. Morbo  
quoque regio, vrinæ stillicidio, & capitis dolori  
medentur. Sed & radicis decoctum in vino po-  
tum, eosdem illos præbet effectus. Potèd & cau-  
liculi pullulare incipientes Asparagorum vice ac-  
olerum modo in cibo sumuntur: sunt autem ama-  
ri, vrinæque cient. Dioscor. Ruscii radix deco-  
cta (inquit Plin.) bibitur alternis diebus in calcu-  
lorum valetudine, & tortuosiore vrina vel cruenta.  
[Sic *spargelac* reddit. Tortuosiore igitur cum Dal.  
intelligimus molestatam, torquentem, quæ velut  
tortuosa exit ac procursu veluti diuisa, ob crassum  
humorem impactum vrinario meatui, vel ob hyper-  
periscolin in vrinæ via extumescens, lotiq;  
meatum impediens.] Radicem pridè erui o-  
porter, postero manè decoqui: ex ea sextarium  
vini Cyathis duobus misceri. Sunt qui & crudam  
radicem vitam ex aqua bibant, & in totum ad vi-  
nalia, [virilium morbos, præsertim vrinæ difficul-  
tem.]

*Nephritis.*  
*Vesicae-*  
*sentis.*

trates & calculos. D.] cauliculis eius in vino & acetato tritis: nihil vitulus putat: Radix eius in honore est, decocta vino ad remedium dolores pota, & difficilis vino, precipueque crassa, & graue olentis: morbo regio, & vultuum purgationi trita cū vino. Cauliculis quoque incipientes, Aparagorum modo in cibo sumpti, & in cinere cocti: semen cum vino potum, aut oleo aut acetato calculos frangit. Item in acetato & rosaceo tritum, capitis dolores sedat: & potum morbum unguem.

*Plin. error.* Ceterum vehementer errat idem Plin. quando Chamæmyrines siue Oxymyrines eandem naturam tradit, cum Oleo Myrteo, nempe adstringentem, nimirum nominum similitudine deceptus, in quem errorem bis & diuersis locis impigit, nempe lib. 15. cap. 7. & lib. 23. cap. 4. Cum protius diuersa sit ac potius contraria natura Oxymyrines seu Rusci, quæ aperiens & Diuretica : & Myrti, quæ cohibens & adstringens. Præterea ex Oxymyrine oleum fieri à nullo alio Authore proditum, non leui argumento ignoranter Plinium hac inter se confudisse, de qua re & supra plura dicta sunt. Idem Plin. Herbis sponte nascētibz inquit, videntur in cibus : In Italia nouimus, Fraga, Tamui, Ruscum &c. verius oblectamenta quam cibos. Potuit, [inquit Marcellus Virg.] in v. medicine al quo & sanatus quondam, vt Dioscorat. fuisse. Nunc in nullo honore est. Aliquibus locis tamen scopæ ad purganda pavimenta ex ea fiunt. Pueri etiā rubentes baccas ex folijs eius decerpentes ceu Ceratui per ludum se illis orant.

Rufista postremo plebs in carnario suspendit:  
tuturque eo à murium iniuriar-pernas & caesi sui  
ficillae: neque enim acuminata in cuspidem  
foliorum eius cacumina penetrare animalia illa  
audet. Sed dicat quicquid velit Marcellus, qui  
cum Medicus non fuerat, non mirum senium lo-  
bilissimæ, huius stirpis vel nesciuerit, vel hodie  
nullum esse crediderit. Ita igitur si ab eo aut Ita-  
lisin vsum non vocetur [ de quo tamen vehemen-  
ter dubitamus, qui scimus Italos ad feligen-  
da vilissima quæque medicamenta solertissimos  
esse: occur enim hanc neglexerit, quâ tam præ-  
stanti tanto perè abundant?] idè in nullo viæ ac-  
in nullo honore esse dicemus. Amatus sanè Lusi-  
tanicis radicem vsum quotidianam prædicat ad in-  
farctus & obstructions tollendas, in quo casu  
& ipsi non parum conferre multoties experti fu-  
imus. Huius quoque præcipuum vsum celebrat  
D.D. Temperatè calidæ liti, ac essentia tenuita-  
te modicioriter quoque reficantur. Vt non in I-  
ctericis modò, secundum Veteres, sed ipsi adeo  
hydropicis obstuacionibus, magna utilitate præ-  
scripti posse & solère sit certum.

Dignum profeſſo notatu Bartholom. Cabrol  
non ignobilis Chirurgi Monſpelienſis experi-  
mentum. Is Ruſci radicē copioſe inſuſā in aqua,  
potāque manē & ſerō perſe, & in paſtu vino per-  
mixta, aliſque cibis, vt ruſculus, ipſique adeo pa-  
ti, vnius menſis aut quinque ſeptimanarum ſpa-  
tio aſciten curauit Ioannem laninam filiam Moſ-  
pelienſem. Nam ſub finem prædicti temporis ad-  
perit & hianſe vuluſ magnō impetu profluxe-  
runt aquæ creteret hiberi [ſcilicet ſcibit] octoginta,  
ſine vlla intermiſſione. Eodem morbo & re-  
medio curata Catharina Turle, & ſimili planē e-  
uacuationis modo. Acta perſectē ſanata, vt vi-  
genti etiam annos ſoſpes & incolumis ſuperuixe-  
rit. Sic ille notauit. Nos ex euacuationis modo  
ac impetu potiùs hydropem matricis diceremus,  
cūm vix credibile nobis videatur tantam aquæ

vim ex abdominis capacitate impetuoſo & con-  
tinuato fluxu, ſine immenſa virum ac fortè et-  
iam vitæ iactura euacuari poſſe. Iudicio tamen  
& fidei ſenis ac ſerè octogenarii Chirurgi nihil de-  
tractum volueris. Ipſam interim rationem Medi-  
cinæ quæ ~~reſponſum~~ obiter inſpicari fuit. A nobis  
verò euulſæ radicis & Indis atque ſenili de-  
cocti ex aqua continuato vſu, [exhibitis interim  
etiam eradicatis purgantibus aliquoties, admi-  
niſtratiſque catenſis ad rem perſeuerantibus, poſſi-  
mum omni præteritam diſtō, interdico potui  
] Textorem ſclerurcinarum [ pagus eſt Comitatus  
Montebel. ] ſexagenarium, cui pedes & ab-  
domen totum in immenſum propemodum tu-  
mebant, ipſumque adeò ſerotum capitis pueri  
amplitudinem æquaret, vnius tantum menſis  
ſpatio D. G. tanta felicitate perſaſſe, vt iſpſemet,  
ſub menſis finem pedes ad nos, & ſcapitis poſtea  
gratiam habiturus & relaturus profeſſus ſit. Sed  
per vrinās pariter ac ſedem ordinatis propemo-  
dum intervalſis exhauſta fuit aqua moles, & vi-  
ſcerum inſarctus reſeratus. Aliquot tamen annis  
poſt, ſatis ſalubriter tranſaſſus, cū ad genium  
rediret [ erat enim homo apprimè deditus vino ]  
eodem morbo correptus, ſed tam grauiter iam in-  
grauelcente ſenio, & calore nativo propemo-  
dum ſuffocato, nec his, nec aliis eſſet remediis  
locus: quod in iuniorum gratiam hic annotare  
placuit.

Turionum quoque propago, viscerum & ductum fædæ vitatissima, nec secus ac in Officinis Asparagi usurpata solita. Semen etiam miscetur eodem scopo Benedictæ laxatiuæ & Lithontribis, monente Lob. Verdm quia Asparagi non obsecum amaroris gustum relinquunt, in medicamentis potius quàm in cibis expetuntur: sunt enim cienda vitæ ætendiueque obstructionibus perquàm idonei, teste Mach. In Italia passim pluri fruticem in scopas concinnari vidimus: deinde fronde eius de industria carinibus, caseis, & cæteris eiusmodi circumligatâ glires, mures ac vesperationes arceri, qui vsus & Pungi topi, vt dicebamus, apud Hærricos et nomen dedit. Eiusdeni lentis ramulis ad colligasdas vites utebantur Antiqui, vt discimus ex Virgilio. Serapio ex autoritate Pauli dicit bonum gutturi esse, & ad stringere ventrem: vbi autem Paulus id dixerit de Rusco huc Cubebis, vt vocat Serapio, nondum obseruauimus: fortè confundit ex Paulo plantam aliquam cum eodem Rusco, vti confundit, quod antè dictum, Carpesium Galeni.

CHAMÆLÆA.

## CAP. XLI.

**T**Am obscura, & tanque intricata est Char-  
læ historia, aut Aetheribus tradita, vt coe-  
simus, cuiusdæ fallacæ & obcuritatis graui  
antequam ad plantas nobis cognitas denueni-  
mus, primum ex Veterum placitis, & in genere,  
de ea tradere, & quidem hocipso loco, ob no-  
minum asinitatem & confusum in præceden-  
ti cap. plus falsis expositum: quamquam aliis Lau-  
reolis quoque haud infusidè subiuncta fuisset.

Diofcoridi *χαμαία* [inter reiect. aliis *χαμαί*  
*χαμαία*: aliis *πυγ*: *αχμ*, aut *αχμυς*: aliis *καμαί*  
*αχμυς*: aliis *πυγμαχμ*: aliis *αχμ*: a Romanis *Cr-*  
*rocacium*: aliis *Elaeag*: aliis *Oleaefellus*.] frutex est  
et cremiorum genere, ramis dodrantibus, foliis  
*Olea* similibus, sed tenuioribus, densis & amaris,



gustatu linguam mordentibus & arteriam lancinantibus. Idem ait Thymelæam aliquibus Chamelæam dici: ex Thymelæa esse granum Cnidiū, fallique eos, quid id Chamelææ fructum censeant: foliorum similitudine decepti.

Plin. quoque Chamelæam similitudinem foliorum Oleæ habere tradit: esse autem amara, odorata (quidam Codices legunt nigra, odorata: alii amara & odorata Herm.) in petrosis, palmum altitudine non excedere: hæc lib. 24. capite 15. At *alibi*, nempe lib. 15. cap. 7. dixerat: Oleum fieri ex Oleastro, tenue id, multoque amari, quam Oleæ, tantum ad medicamentum vile: cui similitudinem fit ex Chamelæa frutice saxoso (saxamentoso Cornar.) non altiore palmo, foliis Oleastri, baccisque. Hic Dalechamp. scribit: Oleæ similitudine, quæ Baccifera est, Plinium deripit: baccas non gignere Chamelæam. Verum Dalechampii censuram nobis nullius ponderis videri, indicabitur capite de Chamelæa tricocco. Plinius lib. 13. cap. 2. de Thymelæa agens, eam aliis Chamelæam dici scribit. Vnde manifestum videtur, eum lib. 25. cap. 7. per Chamelæam herbam intelligere Thymelæam, de qua post. Multum, inquit, infra hunc succum [Euphorbi] est qui in Gallia fit ex herba Chamelæa granum Cocci ferente. Fractus Hammoniaco similis est, etiā leui gustu so accensum diu detinens, & magis ex intervallo donec fauces quoque ficeat.

Placet & Dalechamp. iudicium: ex Chamelææ foliis tuis succus exprimi potest: verum quod legimus, præter Plin. alius nullus autor id prodidit. Eum exilimat idem noluisse id vertere quod Dioscor. scribit: Thymelæam fatinam vix acerbæ succo excipi & in pastillos digeri.

Ex his Plinii placitis suum illud figmentum prodidit Hermol. quando ait Chamelæam fruticem esse petrosolum, similitudinem ei Oleum inesse vt Oleastro, ob id à quibusdam Oleastellum & Oleam Glibracam vocari, auctore Columellā, Sirapam (Oliarum condituræ antiquum genus) inde cōdi solitam scribente. Addens pauld post, nostri & hanc, & Thymelæam præcipue Casiam videntur appellasse Theophrast. Cneoron, Higinio id apud nos Casiam interpretante, cuius duo genera feruntur &c. Hæc Hermol. Vt videat & aduertat lector in quanta pericula se aliofque coniciant, qui tantā securitate aliorum scripta pro suis venditāt, nec illa tamen probè intellecta, aut suis interfuta, quod passim Hermol. facit. Quis ferat eum similitudinem Chamelææ oleum facientem cum Oleastri Oleo. quanquam quid oleastrum vocitarit, eum nesciuisse facilè deprehendimus. Sed longè periculosior eiusdem error, quando putat Chamelæā esse Oleam Cilibracā Colum. lib. 12. cap. 49. quamuis in nostro Basil. codice legatur Calabricam, quam scriptor ille propter similitudinem Oleastellum quibusdam vocari ait: quem Hermolai errorem, doctè sanè & solidè refutat Marcellus.

Heracleam, (inquit idem Marcellus) id est, Herculeam vocari etiam Chamelæam ex Dioscoride dictum, credimusque nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro suo loco retulimus, quod scil. Hercules ex Scythia Coronatus Oleastro in Græciam redierit: & quoniam similis Chamelææ Oleaster sit, & Oleastro Chamelæa: idè similitudine decepti aliqui non Oleastrum, sed Chamelæam Herculeam vocauerint fruticem & Coronam.

Adicimus quod alii omittunt, & hoc nomen, *χλωράδα, χλωράδα*: chamelæa nigra: error tamen is

eorum est, qui Græcarum vocum similitudine decepti, chamelæonem cum chamelæa miscuerunt. Neque enim nigredo chamelææ competit: qui colore nigro à candido discernitur, chameleon est. Et quoniam nihil in chamelæa id causæ haberet, inutiles eas voces & Marcell. & plerique interpres expunxerunt.

Errasse autem in duabus his plantis non Græci tantum, sed & Arabes, & hi quidem inter medicos probatissimi Serap. & Auic. videntur: quæ Mezereon, quæ Chamelæa hæc Barbaris est, describentes, multa quæ Chameleoni debentur illi attribuerunt: & è diuerso: Poteruntque volentes id certius in Chameleonis & Mezerci historiis videre.

Sunt chamelææ huius appellationes aliæ quoque adductæ, sed improprie, & ex aliis plantis importunè ad hanc relatæ, vt specialius quoque in Thymelææ historia patebit.

Ruellii errorē, chamelæam cum Laureola folio deciduo confundentis, in huius historia deteximus, quem, licet grauissimum, more suo ex Hermol. fluxerat: & ex Ruellio Tagaultius, doctus alioquimedicus. Tam lubrica solet esse securitas sui, & oscitans confidentia in alios, vt quā primum data porta est, testis oculorum & rationis facibus, præcipites agamur in hiatum erroris.

Sic autem hic ait: Mezereon Serap. indubiè chamelæa est Dioscor. Mesue verò, vt pleraque omnia chamelæam cum Thymelæa & vtramque cum chameleone nigro pudendo errore commiscuit: in quo etiam grauitè peccauit eius præceptor Auic. Itaque nihil certi de Mezereone eorum scriptis statui potest. Theophrast. verò chamelæam Cneorum & Cnestrum vocauit: ita à Cneoro, vt puto, deriuata est vox Mezereon, quam vocem factionis Arabicæ Scriptores & Barbaræ eorū officinæ quasi lethalem & viduificam interpretantur. Veneno enim proximum esse Mezereon scribit Mesue, quod tamen de chamelæa vel Thymelæa nusquam, quod sciam, legitur. Sed de chameleonte nigra scribit Gal. quod radix eius habet quid venenosum. Falluntur qui Granum Cnidium vocatum ex hoc fuculoso frutice, chamelæa inquam, nasci autumant, foliorum similitudine decepti. Thymelææ namque fructus est, quæ folia habet chamelææ, angustiora tamen. Quo fit vt Mes. turpiter lapsus, si per Mezereon, vt quibusdam videtur, chamelæam intellexerit. Scribit enim folia eius similia esse foliis Oliuæ, sed maiora. Hæc Tagaultius. Qui dum Mesuem erroris insinuat, ipse quoque parum oculatus reprehensionem meretur. Confundit quippe plantarum diuersarum nomina & descriptiones, quas ex aliis vt ex Ruell. transcribit, speciatim Chamelææ, quam dicit cum illo lacte manare: vbi autem talem lactis suam chamelæam viderint non demonstrant. Ruellii Chamelææ descriptionem posuimus antè cap. de Laureola decidua. Aut potius ex ipsomet Mesue huic erroris vterque hausisse videtur, qui Mezereon Lactariarū maximam dixit, quod hi ad chamelæam, cui neutiquam id competit, ex Veterum historia retulerunt.

Monachi etiam Chamelææ & Thymelææ tribuunt lac, vt suo loco dicitur. Mesuem longè aliter interpretatur Cæsalp. vt annotatum cap. de Mezereone. Syluio Mezereon Serap. est chamelæa Dioscor. Mezereon autem Mes. est Thymelæa Dioscor. cum verò differentias eius describit Mesues, Mezerei nomine vtramque & præterea chamelæontem vtramque comprehendere videtur cum Auic. Cordus quoque testis est chamelæam

*Chamelæa nigra. Quorundā error refut.*

*Græcorum & Arabū error refut.*

*Nomina rescripta.*

*Ruell. error. Item Hermol. & Tagault.*

*Mesue error.*

*Cneorum Theophrast. Cnestrum.*

*Granum Cnidium.*

*Mesue error.*

*Tagaultius repreh.*

*Monachorum lapsus.*

*Mezereon, Chamelæa.*

ab Arabibus & Pharmacopolis Mezereon appellatur.

Cornu ex-  
plod.

Clamitat Cornu. esse hodie qui cum Daphnoides Chamelæam confundant itidem Zeilandi appellantes: vulgi in eo morem secutus, quod publica delicta carpens ipsum tamen remedia adferre nescit. Nam nec ipsum eas plantas probe distinguere potuisse, sub Laureola decidua dictum.

Brunfels.  
derisus.

lactat se Brunfels. in Exegesi sua simplicium, Diosc. Chamelæam, id est, Mezereon herbam vidisse se in Officina aucuparia, ne per latum quidem vnguem discedentem à Diosc. descriptione.

Nihil ei restabat, quam ut clamitaret, *supra*, *supra*. Sed sibi vidit, nec cuiquam alteri, dum qualem & quantam viderit, propria descriptione non declarauit, quod optassemus sanè: alioqui suspecta nobis ab eo pro legitima Diosc. Chamelæa habita, qualis certè, quæ ad amulsum eius descriptioni in omnibus satisfaceret, nondum nobis hæcenus innotuit.

Qua sit ge-  
nina Cham-  
elæa

Diosc. ad-  
huc dubi-  
tatur.

Pyros O-  
chne.

Belyra.

Citracanth.

Humilis O-  
lea.

Acquiuoc.

Olea Cala-  
brica.

Lignum  
Rhodium.

Chamelæa  
hirsuta.

Thymelæa.

Chamelæa  
triccoca.

Chamelæa  
incom-  
muni Ner-  
ium alpi-  
num.

Sticticæ.

Fuchsi ab-  
surdus er-  
ror.

Vires & v.

Noxa.

Purgantis  
pilula.

Mora pil-  
ularum  
ratio.

Vlcera for-  
dida.

Fimul Cham-  
elææ.

Et in suis.

Lonicero Chamelææ etiam Pyros Ochne dicitur, si [inquit] *triccoca* scriberetur, esset Tritici palea. Belyra quoque dicitur, id est, execrabilis. Citracanthum ab effectu laxandi. Hebraicè dici possit *Sath scaphlazid* est humilis Olea.

Ceterum Chamelææ vocem multis plantis attributam manifestum est. Alicubi enim pro Oleæ genericæ specie loci tantum differentia distincta, posita: ut Olea Calabrica Colum. ut dictum. Item de Olea Aethiopica & Ligno Rhodio, ut notatum lib. 3. Hæc autem plantæ nihil habent commune cum Chamelæa de qua hoc capite. Sunt verò & aliæ, quæ in quibusdam accedunt, ut Laureola folio decidua, quæ quibusdam Chamelæa dicitur, ut ostendimus. Chamelæa hirsuta nomine fruticem proposuimus à vera Chamelæa tamen diuersum. Daphnoidem confundi cum Chamelæa per Arabes, existimant aliqui, ut antè declaratum. Chamelæam dici de Thymelæa, clarum fiet ex capite proprio. Est præterea Chamelæa Monspelica triccoca, de qua paulò post. Sequetur Chamelæa subtus incana. Sesamoides minus Dalech. aliqui Chamelæam faciunt, de quo proximo capite. Nerium alpinum ab aliquibus Chamelæefolia dicitur.

Fuchsius absurdissimo errore Chamelææ sub-  
sticuit Polypodium, locutus auctoritatem suppo-  
siti libri Galeni de succedaneis, quem errorem ante nos & Syllius reprobauit. Camerit. & ante eum Dod. substituit Laureolam folio decidua, ut dictum iam suo loco.

Vires Chamelææ ex Veterum præscripto hæc sunt. Folia gustu linguam mordicant, & arteriam abradunt. Eadem per inferna pituitam bilémque detrahunt, maximèque si in catapotio assumantur. Vni siquidem Chamelææ parti duplum Absinthii adiicitur, ex hisque aqua aut melle exceptis catapotia finguntur: & ea quidem in ventre non liquefunt conficiunturque: sed prout deuorata fuerint, ita per aluum egeruntur. Eadem folia trita mellèque excepta fordida & crustola vlcera repurgant. Hæc Dioscor. apud quem & vinum chamelæutes fit, si, ubi floret, chamelææ fruticem cum foliis confusum cribratumque duodecim drach. pondere in multo congium mittas, & post duos menses vinum transfundas. Hydropicis, hepaticis, delassatis auxiliatur: itemque feminis, quæ à partu ægrè purgantur. Alios & ab isto discrepans chamelææ vltus est apud Plin. quando ait: aluum purgat, detrahit pituitam bilémque, foliis in duabus Absinthii partibus decoctis, succoque eo cum melle poto. Foliis impositis & vlcera

purgantur. Aiuunt, si quis ante Solis ortum eam capiat, dicatque ad albugines oculorum se cape-

re, adalligatà discuti id vitium. Quoquo modo collectam iumentorum pecorumque oculis salu-

tarem esse. Sed superstitionum & vanitatis ple-

num est remedium Plinij ad albuginem, ut mi-

rum sit, tam grauiusculum virum eiusmodi nugis

fidem adhibuisse. Gal. chamelææ amaram qualita-

tem prædominantem tribuit. Quare & fordida

valde vlcera, & quæ maximas crustas habent, vlcera

cum melle repurgare posse. Paulus drachm. qua-

tuor chamelææ in aqua mulsa cotylis duabus co-

ctas, donec quarta pars supersit, dat: & catapotia

ex duabus Absinthii partibus & vna chamelææ di-

cit purgare, ut Elleborum.

CHAMELÆA TRICOCOS.



Rutæ est

Chamelæa

triccoca cubita-

lis ac bicubitalis,

minor quam

Thymelæa Mō-

peliaca, magis

laxamentosa, cu-

gulosus, lignosus,

intortus, in ra-

mulos plures di-

uisus: foliis retu-

sioribus, latio-

ribus, viridioribus,

& tenuifolium

Phylæam refe-

rentibus: inter

quæ flores parui,

luteoli, foliolis

tribus conitan-

tes quibus succedunt

semina tri-

coeca, primum viridia, maturitate verò ruborem

induentia, in frutice suo perennia, ut sunt La-

thiridis, Tithymali, siue Heliotropij verrucosi,

dura, dentibus fracta contumacia, medullam al-

bam continentia. Dentibus frangenti apparet ma-

nifesta amaritudo.

Lib. rebenx baculas triccocas dicit. effectus

prædictis, lignosis, gustanti medullam feruidam

& præscam exhibentibus. Radix lignosa.

Clusfic depingit: Succulentus est frutex, ramis

palmaribus, interdum minoribus, præsertim ca-

lidis regionibus: foliis perpetuò virentibus, &

Oleæ similibus, minoribus tamen, nec incanis, sed

viridibus, gustus inixtus amari, deinde linguam

vellicantis: flores habet exiguos, pallidulos aut

flauos, tribus foliolis constantes, ex foliorum aliis

prodeuntes: fructum triccocum Tithymali mo-

do, pellicula primum viridi, deinde per maturita-

tem rubrâ, amari & feruidi gustus, obductum, du-

rum, & ubi exsecutus fuerit fuscum.

Monachin. Mel. fortè hanc Chamelæam tra-

dunt his verbis. Chamelæa quæ etiam Mezereon

est, & vulgò Oliuella & Oleastellum dicitur, &

non remota ab vrbe [fortè Româ] versus mare

plurimum prouenit. Folia Oliui similima, mino-

ra tamen & quasi decurtata habet. Rami eius

multi, tenues, duri, non recti, sed per terram cir-

cumquaque replurimum deieci, foliis pleni sunt,

omni tempore. Videntur è longinquo monticu-

li foliorum speciosi, quasi arte parati: hodie

quamplurimis cognita est. Hæc illi. Moxum est eos

negit



nihil de fructu & floribus trādere, ac ne saporem quidem foliorum dicere. Nostra etiam non ita humi deiecta procumbit, vt de sua tradunt. Quæ difficultates cauent, quominus confidenter audeamus asserere eandem esse cum hac nostra.

Matth. in suis com. in Dioscor. Chamelææ huius fructus tricoctos appinxit Thymelææ, euidēti fūco, sed sibi non insolenti. In post. com. & hist. Germ. reiecit totam figuram, vel nullam ponit, fortē quia pōneret figmenti.

Camer. in epit. Matth. & historiam eius Germ. ponit iconem Chamelææ tricoctæ ex Gesnerianis figuris depictam ad mēam plantam missam Gesnero ante 40. annos, quod non placet, vbi nam de ea aliquid prodidit Matth. Idem in horto Chamelæam veram alius tricocton & Mezereon dici ait. At apertē in hist. chamelææ lac denegat, quod tamen Arabes in suo Mezereon expetunt.

Nec probatur nobis Casp. Bauhin. in Matth. Comment. non sūmē sub incudem reuocatis pro Matth. iconē Chamelææ supposuisse iconem Tabern. in qua fructus tricoctos: (quæ fictitia nobis videtur, vt postea dicetur) maximē cū in idem nihilominus retineat Thymelææ iconem absurdā cum fructu tricocto. Item addit hæc verba: Inter Chamelæam & Thymelæam Dioscor. differentiam fecit: at Serapio utramque Chamelææ, sic Mes. Thymelææ, & Arabes Mezerei nomine expressere. Chamelæa latifolia alba Serapionis. Thymelæa foliis magnis & teuibis Mesur: Chamelæa Matth. Lac. Cordo in Dioscor. Dod. Gal. & in fol. Lugdun. qui duas habet figuras: Chamelæa 2. Catilpin. Hæc illē à quo in pluribus dissentimus, apud Serapionem cap. 35. de Mezereone ex Dioscor. & Gal. referuntur quæ illi de Chamelæa tradiderunt, nequitiam verō quæ de Thymelæa. Mesur quidem de Mezereone scribit, quam vocem Sylius Thymelæam interpretatus est, quod multi docti improbant: non enim de sola Thymelæa eo cap. scribit. Cordus Chamelææ tricoctæ nullam fecit mentionem apud Diosc. cap. de Chamelæa. Lacuna quoque hanc non habet, sed tantū iconem fictitiā ex Matthiol. & præterea malē eiusdem iconem Thymelææ cum fructibus tricoctis. Vtrumque errorem & Lonic. commisit. Sic vnus error plures parit errores. Præterea Hist. Lugd. non habet duas icones Chamelææ tricoctæ: vna est Dod. altera autem Matthiol. quæ non vera icon tricoctos. Quare non admittenda Casp. Bauh. reprehensio in eius Animagadu. quā autumat duas figuras & totidem descriptiones vnius plantæ ab eadem positas. Matth. scribit, suam chamelæam fructum ferre Myrti bacis similem, longiorem quadantenus & Oliuæ formam referre. Quod vel ex Plin. verbis fortē extorsit, de Matth. cō Chamelæa pōst.

Apud Amatū quidē in Dioscor. satis apta huius Chamelææ tricocti figura quamuis hanc nō intelligat Amatus cum apertē Mezereon vocet, & quæ huic competunt tribuat illi.

Merito quidē Aduersa. increpant Matthiolū, quod hæc planta illi non fuerit cognita: ipsi interim carpenti qui flores quinis foliis fingunt & pingunt, cū sint tantū ternis.

Inquirendum an sit Chamelæa Bellon. quam in Crete monte Ida vulgō Psiloriū dicto cum Thymelæa vidit, cuius meminit Obs. lib. 1. cap. 16. Item an de hac Maranth. Meth. lib. 2. cap. 5. scribat. Idem lib. 1. cap. 8. vult Cneorum Theophrast. esse. Nec pro certo asserere ausimus Fuchium l. 1. c. 4. de comp. med. de hac scripsisse, cū ait: Chame-

læa Sepalsis Mezereon nominatur. Paucis autem hodiē vera chamelæa cognoscitur: Seminata quidem nobis est aliquoties, verū nunquam prodit.

Dalechamp. apud Plin. annotat eum decipi, neque enim chamelæam baccas ferre, vt ille ait, sed fructum triangulum: Bellam verō, mehercle, & oppidē festinam subulitatem: quasi verō non & tricoctos queat esse bacca. Sed esto non esse baccam: quis scit hanc Plinium intellexisse aut quo autore nos docebit chamelæam Plinii quæ & Dioscor. est, baccas non gignere, sed fructum triangulum. Sed videtur nobis nimā quadam confidentiā præsupponere hanc nostram esse Veterum chamelæam, de qua tamen est, quod dubitemus, quamuis Dod. omnia Veterum nomina, etiāque reiectitia superiūs ex Dioscor. posita huic tribuat.

Idem ait in hist. Gal. folia valdē similia Oleæ, sed minora. In hist. lat. scribit oleæ similia, minora & nigriora: fructus decerptos nigrescere, oleosāque pinguitudinem contrahere Oliuarum instar, fauces exurere veluti & folia ac cortex.

Auic. & Serap. Chamelæam Mezereon vocant, sub quo tamen nomine Chamelæonem vtrumque complexi quoque sunt: ita Chamelæam cum Chamelæonibus, atque vnā etiā Thymelæam confundentes.

Mezereon Mesur Dod. Chamelæam, Sylius Thymelæam reddit, vt antehac annotatum. Ita vides & huius historiam satis confusam apud auctores. Tabern. sensibus nostris imponit, quādo Chamelæam Arabum tricocton vocat, quamuis huius rei etiā Lobelium autorem ceteros, addens Mezereon quoque esse Arabum in Aduersa. Sed ubi locorum Arabes Chamelææ tricoctæ meminerit? Aut vbi nam locorum vidit Tabern. Chamelæam qualem pingit, compositam ex fructibus oleæ & limā Matthiol. picto pro Chamelæa, [nunc autem reiecit] & nescio quibus figmentis, granis tricoctis, floribus quinque partitis? Aut quā fronte suæ quoque Thymelææ eidē granatococci, qualis Thymelæa nunquam in rerum natura exstitit, appingere est ausus. *χρυσόλευκα*, siue vt alii scribunt, *χρυσόλευκα* tricoctæ. Græcē non malē dicitur. Quidam Hispani *Oliuella* vocant: Prouincia Narbonensis *Garoupe*, teste Clus. Germ. *Seidel past*, si Tabern. credimus. sed addendum *Strembd* vel *Welsch* id est peregrina.

Chamelæa tricoctos ferendi squalidæque soli, maritimæque amasia, vbi nōque suæ spontis est, saxosa amat. Proinde in collibus Narbonæ arentibus, saxosis, Montpelii & Frontignanæ vberē fructuat: in cultis etiā Oliuetis, potissimū ad margines, aut si ipse ager paulō saxosior fuerit, inter alias stirpes. In Galloprovincia, vbi tamen nascitur, haud multo produit & prouentū, Lob. obseruat. Nascitur etiā [inquit Clus.] Hispaniæ Valentino & Arragonum regione, totaque Catalonia: verū multo breuior & candidior, quā in Gallia Narbonensi. Certē Montpeliano agro citra *Mirauaux*, & vicinū illi collem, viāque ad Frontignanum oppidum, Setio monti, quod vulgō *cap de Sete* dicitur, in ipso mari sito, proximam, frequens est, vbi multo vegetior & vindiior quā in Hispaniis. Nunc etiā rei herbariæ studiosi in Germania & Belgio colunt. Sed in locis frigidioribus difficulter feruatur, idē subterraneis per hyemem habenda.

Geneuē à nobis femine fata altero primū anno prouenit, ac non recondita asperam hiemem pertulit. Basileę in hortis D. D. Plæri & Zuingeri

Plin. de.  
fend. contra  
Dale-  
champ.

Arabum  
error.

Tabern.  
et Lob. ac-  
cusantur.

Tabern.  
icon si-  
na explosa.

Locus.

Cultus.  
Satio,

Propaga-  
tio  
Tempus.

plures & pulchras plantas obseruauimus, sed hyeme reponunt. Ad fruge n peruenisse scimus & Basilea & Pfortzeim, & vtroque semina probe matura decerpimus mense Nouembri. Propagatur etiam furculis telte Camer. Floret Aprilis, Clus. estate, æstusque summo, Lob. Nos vtroque tempore florentem, ac certè etiam Augusto partim florentem, partim fructus ferentem vidimus. Augusto fructus perfici solet, subinde per totam hyemem plantæ lux adhærens: nam & Aprilis mense semina præcedentis anni collegimus. In Italia reperitur culta in hortis instructioibus.

Vires & frus  
Purgat.  
Hydriops.  
Cautio de  
noxia eius

Calida est, iudice Dod. & sicca tertio gradu, accedens ad quartum. Folia purgant per inferiora magna vi & violentia pituitam & humores biliosos, maxime serofos: Vitia sunt hydropicis, si cum iudicio & ratione exhibeantur. Huius enim qualitas accedit ad vim veneni, nocua & praua homini multis modis: lædit ventriculum, hepar, partes omnes nobiles, eas calefaciendo, et odendo, & vlcera inducendo intestinis, tandem vacuat aluum ad sanguinem vsque. Hæc Dod. quæ vitia hinc et in Thymelæa, sunt communia: postea tradit Chamelææ correctionem cum ait: Folia viridia Chamelææ maceranda per 24. horas in aceto generoso, deinde exiccanda & in vsum reponenda. Acetum autem melius esset ad hanc præparationem, si ante in eo macerata essent Cotonea mala, aut Berberis semina. Folia autem præparata exhibenda sunt in puluere cum semine Anisi & Mastice, aut decoquenda in sero lactis potissimum caprini, aut in iusculo caponis, deinde propinandum serum aut ius. Melius ex Mezereon, id est, Chamelææ, ut vult Dod. Syllus verò, vt dicebamus Thymelææ reddit foliis catapotiorum descriptionem habet, ex corticibus Myrobali, lutearum & Cepularum, & Terenabini, id est, melle aëreo [Manna] & Palmulis acidis, quas Tamarindos vocant, in stillatitio liquore dissolutis efformat: ipsaque folia prius in aceto acerrimo temperata resiccan præcipit. Commendantur catapotia hæc ad hydropicorum purgationes: a quolos enim humores educunt. Sed violentiam naturæ inferunt, idcirco ab iis quantum licet abstinentum. Bacculæ tricoceæ medullam habent feruidam & præficcam, inquit Lob. Radix lignosa inutilis. Magnus tamen succi totius plantæ vltus, etiam hodie, præsertim Monspelii, vbi Pharmacopæi pressum siccatumque habent, monente primùm Rondel. cuius imitatione & nos sæpius densati succi recentis dr.i. & dr.ii. dedimus per se, & sæpius aliis Catharticis hydragogis mixtas, per bono sanè euentu. Sed non admodum multum excernit, nec vilo effreni motu, vt solent Laureola, Mezereon Germanica, Gratiola, & alia. Quin per partem aut nihil interdum mouet Chamelææ succus concretus, nisi remixtis quibusdam lenientibus, aut similibus catharticis. Cuiusdam arthritico habitori, toroso, proceri homini, tres drachmæ nullum excrementum mouerunt. Pueris etiam datus, nec tormina nec vomitiones facit, sed aquas educit & serum. Admotus pubi & abdomini hydropico, non vllum præstantius ad vrinas proliciendas, quo modo lubentius utebatur Rondel.

Chamelææ  
Exhibenda  
modis.

Catapotia  
Mejua.

Hydriops.

Succus ex-  
ficatus.  
Dosis.

Haud a leu-  
maximo ef-  
fectu huius  
denotatur.  
Arbitraris.

Hydriops.  
Exterius  
impositus  
Grimæ cit.

nomine chamelææ speciei, Neapoli Mezereon di-  
cti, ad nos misit. Folia sunt aliquatenus similia  
Laureolæ folio semper virenti, multò tamen mi-  
nora, vncias duas ferè longa, alia multò minora,  
ad Vitis Idææ semper virentis dictæ folia acceden-  
tia: latitudo maiorum vnciæ vel digiti, in acumen  
non desinunt: crassa sunt, vt in Laureola dicta,  
supernè viridia, infernè lanugine candicant.

Eandem quoque in horto D. Cortusi vidisse  
suspiciamus, ante 40. annos, nam hæc inter nostra

annotata scripta  
inuenimus. Cha-  
melæa à Cortulo  
vocatur frutex  
cuius folia viri-  
dia, vt in Laureo-  
la semper virenti,  
oblonga, multò  
minora, quæ  
summè acris di-  
cit, ac baccas fer-  
re. Differt à Cha-  
melæa Monspel-  
sulari a tricoeco.



Chamelæa  
Cortusi.

Eandem Clus. Descrip-  
tione diligenter descen-  
dit, his verbis:

Aliud Chamelææ  
genus nobis ex  
Italia deferitur, à  
prædicta planè  
diuersum. Id re-  
cto stelo fructu-  
ticat, ramisque habet admodum flexibiles, tenaci-  
cor cortice, & qui difficile dirumpi potest, obdu-  
ctis: folia admodum coriacea, carnosa, Daphnoi-  
dis foliorum formam imitantia, multò tamen mi-  
nora, & incanè lanugine, infernè præsertim, pubes-  
centia: flores singuli congestos, quatuor folio-  
lis constantes, dilutissime purpurascens, ex lan-  
uginosis, colorisque argentei, calyculis prodeun-  
tes. Fructum non tricoecum, vt superior, sed vni-  
cum, oblongiusculum, tenui miniata membrana  
tectum, succulenta carne, & fruidum nucleum  
in se continente præditum. Eum fruticem duntaxat  
apud nos videbam, in Belgio in hortis cultum,  
bisque interdum eodem anno florentem. Viennæ  
Austriæ aliquoties illius semen teritè credidi, &  
natas plantulas diligenter summaque cura conseruare  
vulgi, sed subsequens hyems semper corruptit. Pena &  
Lob. in Aduers. huius iconem exhibent titulo  
chamelææ Alpitæ incanæ, ex qua & nostra facta.  
Ceterum ignoramus adhuc quoniam sit recte  
tenda Chamelæa incana Bononiensium Lob. quam  
proponit in Obl. in eorum agris maritimis proueniens,  
facie & vultu Dorycnii Monspel. eubitalibus virgultis,  
quam reperit eruditiss. D. Hermes le Clerc M. Neri-  
ensis, qui eadem plantam aridam impertit.

Considerandum etiam an Cæsalpin. chamelæa Cham-  
vulgò in Alpibus Olivella prior, flore purpureo  
ex Sicilia, non sit eadem cum hac nostra incana.

Cæsalp. descriptio posita est cap. de Laureola folio  
deciduo, quam Lectores considerent, & quæ ibi  
annotata. Fortè de hac intelligit Matthioli, in  
Com. in Diosc. in hunc modum scribens: Chame-  
læam pariter & Thymelæam Arabes confusè fa-  
tis ac perplexè Mezereon appellant, cuius et si fa-  
ciant duo genera, vnum album, alterum nigrum:  
tamen iis etiam Daphnoidem admiscunt, & hæc  
omnia confundunt & implicunt. Illarum planta-  
rum vis furiosa, quare non temerè eas Maurita-

#### CHAMELÆA INCANA ET LAN- GINOSA.

Cap. XLII.

Nno 1594. Cl. D. D. Casp. Bauh. frater ramum  
pulchellum huius fructicis ex Italia acceptum



ni terra Leones, & plantas viduificas cognominant. Proueniunt hæ plantæ numeroſæ in vallibus Ananiz montibus, Tridentino agro: & vtræque, licet hoc in Chamelæ præterierit Dioſc. fructum ferunt Myrti baccis ſimilem, quamuis Chamelæ quadatenus longior ſit & Oliuæ formam repræſentet: vtrique fructus initio ſui exortus viſciſcit, mox per maturitatem rubefcit, denique exiccatus niger conſpicitur. Cæterum baccam, quæ ex Thymelæa decerpitur, quoniam ſiccata Piperis faciem præ ſe ferat, acrimoniamque non obſcuram guſtantibus relinquat, rura Ananienſia in diſſertum cum Laureolæ ſemine Piper montanum vñ ætiam nominant: Theoph. Gnidium granum. Frequenter videntur incolæ in ſuis purgationibus aduersus omnes ſerè morbos, ita medicos & pharmacopolas fallere credentes: ſed ſæpè euenit vt ſibi mortem conſciſcant. Et certè hoc teſtari poſſum, quod ex montani illius Piperis aſſumptione plures perſiſſent, niſi antidotis noſtris ſuccuriſſent. Habentur tamen paſſim in Pharmacopoliis Catapotia, quæ de Mezereon appellantur, quibus aliquando medici vtuntur ad aquam inter cutem extrahendam. Verùm ea non audent exhibere [quam medicamentum ſimul receperint, quibus eorum malitia reprimitur] niſi robuſtis ac fortioribus hominibus. Chamelæ Germ. dicitur Zylandi: Galis. Bois gentil. Hæc Matth. Sed nec chamelæ, nec Thymelæa eius adhuc nobis perſpecta eſt: cõfundere eum cum Laureola folio deciduo, quam Daphnoidem fecit, oſtendunt nomen Germ. & Gallicum. Icon chamelæ Matthiol. accēderet nonnihil ad noſtram plantam, niſi paulò acutiora viderentur eſſe folia. Eandem habet in epit. ſine deſcriptione. In com. cum magnis icon. Lat. & Ital. iconem habet, quæ paulò melius placet, quæque planè demonſtrat plantam à Laureola folio deciduo diuerſam, licet ibidem adhuc retineat nomina prædicta. In hiſt. Germ. eandem hanc iconem habet nomine Germ. Scidelbaſt / nectamen monet an & vbi viderit in Germania.

Non placet Camer. in epit. Matthiol. & hiſt. Germ. planè diuerſam ponere figuram, nèpe chamelæ tricocci [de qua præced. cap.] ibi tamen ſcribit chamelæa inueniri aliud à Tricocco genus, multò mollioribus foliis & cinereis, flore purpureo, ſemine ſimplici abundare in Sicilia & propterea vocari Siculam chamelæam: ſe quoque inueniſſe propè Neapolim, non eſſe ita commodè vſui vt Tricoccos. Perquirant ſtudioſi an Camer. eandem quam nos intelligit.

Nec probatur nobis Caſp. Bauhin. opinio exiſtimantis Chamelæam Matthiol. eandem eſſe cum Tricocco, nec quod in ſuo adaucto Matthiolo exhibet iconem ſalſam Taber. vt ſpecialiùs dictum cap. de chamelæa tricocco.

Hiſt. Lugd. hanc noſtram proponit titulo chamelæa Alpine incana Penz: habet etiam eodem cap. iconem priorẽ Chamelæa Matthiol. quam & Lonic. poſuit pro ſua chamelæa, adiuncta deſcriptione Laureolæ fol. deciduo, quam & ineptè confundit cum Thymelæa, vt ſuo loco copioſius demonſtratur. Eodem errore implicatus caſpitat Lacuna, quamuis vbiq̃ue notiſſimam dicat, ſibi tamen incognitam fuiſſe fatiſ patet, cum non doceat, quam intelligat plantam. Nam quod Piper montanum dici ait, ex aliis habuit.

Denique & Portam Neapol. hanc noſtram intellexiſſe putamus, cum ait: Albiſſore plantæ ad pitiuitam valent, Chamelæa & Thymelæa cognatæ naturæ & figuræ: nam & Chamelææ alterius

ſpeciei pallent flores & lagenulis argenteis phlegmauſ vim deiciendi retinent.

Chamelæa cum lagenulis argenteis.

## MEZEREON ARABVM.

**A**liquoties Mezerei Arabum mentio incidit, ſed obiter tantum & per accidens: Nunc qui hi alique Auctores ex profeſſo de eo tradant videndum.

Anicen. Mezereon eſt Lacticinium magnum, idque duum generum. Vnum, magna folia habet & ſubulia: [aut anguſta, aut tenuia.] Alterum foliis exiguis, ſed ſpiſſis, quod poſterius deterius eſt priore: nigrum eſt & pernicioſum. Melius Mezereon eſt, in quo plurima folia exigua. Peſſimæ notæ in quo criſpa. Sed quando malitia Abnezerion frangitur cum reſolutione. Calidum eſt & ſiccum, ordine quarto. Mundificat, excoriat, & potenter adurit & in viribus. Nigrum Mezereon lethale eſt.

Lacticinium magnum.

Mezereon auctore Meſue, Perſis Vitam rapiens dicitur, aliis Faciens viduas, multis Lev terre, planata eſt Lactiarum maxina, caule cubitali, foliis Oliuæ, ſed maioribus, fructu nigro: Myrtarum magnitudine: & quæ multiplex. Vna foliis magnis, tenuibus: Altera, foliis quidem paruis Oliuæ modo, ſed multò ſpiſſioribus: Alia foliis criſpis, aſperis. Ex his item quædam foliis virentibus, alia nigricantibus, colorem pauonis referentibus. Præſtantior quæ foliis eſt magnis, tenuibus, virentibus, in loco libero nata, prope alias, ſpeciei eiuſdem. Quæ verò ſola (ſortè ſpontanea.) in magno agri ambitu oritur, pernicioſa eſt: vti etiã quæ prope thermas, & quæ foliis eſt paruis & ſpiſſis: item quæ nigricantibus. Calida eſt ac ſicca ordine quarto potiùs quàm tertio, vt filius Zazar cenſuit. Viſ enim ineſt valenter acris, ignea, victrians, mordens, inflammans.

Temperamentum. Mezereon nigrum. Viti m rapiens viduas faciens. Lactiarum maxina. Vires. Nigricans. Delictus.

Apud Serapita legimus: Mezereon, id eſt, chamelæa Dioſcor. & Gal. Bedgoras ait proprietatẽ eius eſſe, purgare melancholiam & aquam citrinam, quemadmodum faciunt ſpecies Lacticiniorum, (Tithymallorum.) Liber venenorum habet, pondus drach. minùs occidere deſiccando humiditatem hepatis. Paulo verò Mezereon nigrum purgata aquam & album ſimiliter, & educit alcatides: melius eſt nigro &c. Dixit Cuſenu ſiccum eſſe in quarto gradu. & facere hydropſyn. Aben Meſui quoque duas ſpecies dicit: vnam folio grandi: aliam folio paruo ſed craſſo rugoſo, quam tident deteriorem ait: eam verò cuius folia ſunt grandia, meliorem, nec intelligi vult vtrumque foliorum genus ex vna eademque arbore colligi, ſed ex diuerſis ſpeciebus. Reliqua in viribus.

Qualitas.

Venenum.

Hæc ille. Ita habes ſanè obſcuritatem magnam, non ſine barbarie, quam vt potuiſmus, re inuiolata, nonnihil abſterſimus. Dicat nobis nunc egregius quidam & ſeſtius Botanicus, quænam ſint hæ ſpecies Mezerei?

Manardus in annotat. in Meſ. Mezereon, inquit, eſt abſque dubio chamelæa Dioſcor. A Meſue autẽ deſcribitur Thymelæa: quum Meſue ſcribit, folia eius ſunt ſimilia foliis Oliuæ ſed maiora, eſt error maniſeſtus. De Thymelæa ſiquidem ſcribit Dioſcor. anguſtiora: licet Meſ. voluiſſe viſuſ ſit deſcribere Thymelæam, tamen per verba, ſpecies ſunt plures, putare videtur Mezereon eſſe genus ad Thymelæam & Chamelæam: & quod magis abſurdum, ad album & nigrum Chamelæon

Chamelæa Dioſc.

Meſue reſcrib.

Alter Meſ. error.

*Auc. ta-  
vit.*

*Chamelæ  
Thymelæ  
Laureolæ  
M. Zereon  
M. Zereon  
Pandeolæ  
Pandeolæ*

*Ensis. Cy-  
lonic la-  
ber.*

*Chamelæ  
Thymelæ  
Laureolæ  
M. Zereon  
M. Zereon  
Pandeolæ  
Pandeolæ*

*Gortius  
argutus.*

*M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon*

*M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon*

*Cocculus  
Gortius  
Scleranthus  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon*

*A. Zereon  
Gortius  
Scleranthus  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon  
M. Zereon*

ta : quem errorem & Auc. comitissit in 4. & ali-  
quatenus in 2. maxime ubi vires enumerat.

M. machi in Mel. Arabibus [aiunt] Mezereon  
modò videtur Chamelæ, modò Thymelæ, mo-  
dò Laureolæ vulgò dicta, id est, Daphnoides, &  
aliud diuersum ab istis. Serap. per Mezereonem  
non intelligit Laureolam : quippe ea non lacte-  
scit, vt Arabum Mezereon. Et licet Mesue confu-  
se Mezereonis plures describat species, nullata-  
men ipsarum potest esse Laureola, vt Pandeola-  
rius, & alii volunt: ea lacte caret. Arabes prædicti  
omnes cum cæteris Mezereon in numero Lacti-  
ciorum ponunt, quod quidem à Diosc. de Cha-  
melæ & Thymelæ minime scribitur: licet Fusch.  
Leoniceum secutus dixerit Serap. non scripsisse  
Mezereon lacte fluere. Dixit enim id ex autori-  
tate Bedi goras, & cap. de Thymelis, & abbreui-  
ari cap. 16. & c. 24. Iisdem folia maiora eius quàm  
Melastris præsert, longiora interpretantur: &  
addunt: plures collegimus Chamelæam & Thy-  
melæam, & obseruauimus non carere lacte,  
quamuis paucum habeant. Thymelæa tamen lac-  
te magis abundat, potissimum in ramulis: ali-  
quando in foliis non videtur.

Locum tradit Med. los Arabes Chamelæam &  
Thymelæam vocare Mezereon, hocque confuse  
diuersum ab istis. & arguit: hanc eandem diu-  
niti: ut quia non competere Chamelææ & Thy-  
melææ dicitur Chamelæon.

Gortius in Definit. Medicis *gortius* dicit Offic.  
Mezereon appellare scribit, verum non demon-  
strat, quam plantam intelligat: si vulgarem in-  
telligit, nempe Laureolam folio deciduo, dupli-  
ci etiam in p. p. hæc ea Chamelæa est, neque  
Mezereon. Sed quid Cæsalp. Arabes [infit] Me-  
zereon vocat omnes has plantas, scilicet Cha-  
melæam, Thymelæam, & amplius ipsam Da-  
phnoidem, & fortè Cneorum.

L. C. Manlius in Luminari maiori supra Hieram  
Hic inter scribit: Mezereon. Nomen ipsius [aiunt]  
Bunseif. T. a. pag. 28. malè legitur [Semen Allii.]  
quod appellatur Coccus Gnidius. Diosc. Chame-  
læa, non est semen Laureolæ, vt dicit circa in-  
fars, cap. de Laureola. Alexander cap. de Hy-  
drope Chamelæam dicit, ex qua colligitur Coc-  
cum Gnidium, esse lacticinum folio Olinæ, vt  
est: & propterea multis dicitur Oliuella. Item  
supra Confect. de Mezereon ex sua inuentione,  
scribit: Confectio apud nos in vfu est: Mesaliam  
habet si n. m. : Almezereon vel Mezereon est  
Chamelæa vel Coccus Gnidius: Auc. c. 4. fen. 6. vi-  
detur distinguere: Mesue est planta vocata apud  
Persas, Rapiens vitam &c. Christoph. de Hone-  
stis errauit, dicens, confectioem de Almezereon  
esse de Laureola. Idem supra Oleum de Mezereon:  
Mezereon, inquit, est Chamelæa Diosc. Quid  
multis? miram hanc & discordem barbariem in-  
uexit professio bene fundatæ medicinæ, & potissi-  
mum stirpium omnique matris medicæ igno-  
rantissima schola Arabica, quæ vtinam non & hoc  
nostro seculo adhuc duraret, cum magno vitæ  
hominum periculo. Nimirum hic Manlius existi-  
mans arti Pharmaceuticæ lucem se restituisse ma-  
gnam, [nam idè opus suum Luminare maius vo-  
cauit] eam ita perplexam & confusam suis in-  
ceptis coniecturis & scriptis reddidit, vt potius  
Barbaræ tenebræ, quàm Luminare magnum sit  
vocanda. Mezereonis folia & Oleum in sua con-  
fectione imponit per os exhibenda, cui vel dictu  
exumescenda fastidiendaque ex Mesue nomina  
attribuit, ac Lacticiniam plantam esse concedit,  
interim cæco & periculoso errore nihilominus

vult esse Chamelæam Dioscor. quum apud hunc  
nulla lactis fiat mentio. Et quoniam alios capite,  
qui volebant esse Laureolam, ipsum demonst-  
rare par erat, quam intelligeret plantam per Meze-  
reon, quo utebatur.

Ex Fr. Alexand. quoque radiato Apolline non  
possumus intelligere quam plantam existimet  
pro Mezereone imponendam in Hieræ Heme-  
tis & Pilulis, licet de Mezereone multa scripti-  
ter, vt in præcedentibus dictum: nimirum ma-  
luit tum prudentis quàm scientis aut docentis  
munus subire, quando tam sollicitè, tam cautè &  
oppidè circumspicte, ceu Apollinis edicto, pro-  
mulgat: ei qui omnis inficitia & calumniæ occa-  
sionem refugit, ac ægri salutem opportunè tueri  
cogitat, maturo vtendum esse iudicio. Dictum  
puta. Id nos antea latebat.

Altomarus de Medend. morbis cap. 91. mirabiliter  
extollit ac prædicat suas Pilulas de Mezereon, quæ,  
vt ait, serolos purgant humores citra aliquod no-  
cumentum notatu dignum, seque iis intercute  
laborantes perfecte curasse: confici autem ex so-  
lus plantæ, quam communiter Sepalsarii Meze-  
reon appellant, & propriè eius quam Diosc. cha-  
melæam nuncupat, &c. Verum insignis Medicus  
Altomarus nobis valdè imprudenter hic de Me-  
zereon scribere videtur. Mezereon communis vsus  
Sepalsarii, quantum obseruari possumus ex  
plurimis Autoribus, & Herbariis doctissimis, est  
Laureola folio deciduo, hanc si per Mezereonem  
intelligit, grauius errat, dum Chamelæam putat:  
sin intelligit aliam, decussit sanè tantum vitum  
in tam generoso medicamento graphice designa-  
re quam plantam per Chamelæam intelligat,  
quod nomen non minus dubium est, & vagum  
apud Antiores quàm Mezereon: vane enim plan-  
tæ eo donantur. Qui Neapoli degunt Medici &  
Pharmacopœi rem gratam & nobis & posteris  
facient, quales herbe Mezereon loco  
apud eos sit vsus. Sic & ab Antidot. sine Dispens-  
sario Italico à Clus. Latinitati donato non docto-  
res redimus, dum tantum dicit: Mezereon aut  
Diosc. Thymelæa, quo nomine aliqui etiam cha-  
melæam complectuntur, vtrique nota: cætera quæ  
addit, sunt ex Diosc.

Nec probamus Schyvenckf. in suo Thesaur.  
Pharmacopœico scriberem, Mezereonem esse  
Chamelæam Diosc. & Oleastellum: nec iudicare  
possumus, quam plantam intelligat, atque aded  
nec ipsum quidem scuisse facile patet ex eo, quod  
prius de Laureola folio perpetuo dicit: Laureola-  
m, de qua Diosc. dicitur Chamelæa Germ. Pharma-  
copœorum. Quam igitur plantam assumeret im-  
ponendam Pilulis de Mezereon ex Mesue: cuius de-  
scriptionem ipse Schyvenckfeldius ponit lib. 2.  
cap. 10.

Trincaul. lib. 1. c. 19. de Comp. meminit Pilula-  
rum Mesue ex Chamelæa, quam Mezereon ipse  
vocat, in suo Grabadin: verum nec is docet, tur.  
quam plantam intelligat. Nec Foesius in sua  
Pharmacopœia quicquam docet scribens: Rec. folio-  
rum Mezereon aut Thymelæ: quasi verò hæc  
duo sint vnum, aut earundem prorsus vitium.

Brassauolin Exam. catapotiorum pro Mezereon  
censet sumendam Thymelæam, minime verò  
Laureolam: in Exam. herbarum scripserat: Non-  
nullos Mezereon & Laureolam confundere, Lau-  
reolam lacte carere, Mezereon eo abundare, vt  
Arabes imponunt: eisdem vno cap. confundere  
Chamelæam & Thymelæam: iubet suum senem  
Pharmacopœum ex monte [fortè vbi Ferrarien-  
si proximo,] colligere Chamelææ folia: Thyme-  
læa

*Apollo in  
crepant*

*Saintus  
Apollinis  
consilium*

*locus.  
Pilula  
Mezereon  
Altomarus*

*Altomarus  
halluc.*

*Mezereon  
Neapoli  
na quæ  
Antidot.  
italico*

*Schyvenckf.  
opinio  
citatur*

*Alca-  
demus*

*Trincaul.  
& Fa-  
acutus*



lae autem folia & semina condere: interea non docet quas plantas intelligat: quinimo nec quam Laureolam putet, declarat, quam ante scripserat malè à D. Florentino in Mef. commentanti esse Mezereon.

Cordus, diligentissimus aliqui Scriptor quæ planta M. zerei nomine intelligendamponendâue siq. non monet.

Fuchf. de comp. med. Pilulas dictas vocat catapotia ex Thymelæa Io. Damasceni. Annotans, Arabes Mezereonis appellatione Thymelæam & Chamelæam confundere. Thymelæam à paucis agnoscere reus semen esse Coccum Gnidium, pro eo tamen officinas fructu seu semine Daphnoidis vti, quod Seplassariis Laureola nuncupetur: eam quæ fol. deciduo est intelligit ac eius etiâ folis Germ. officinas vti. Audimus hæc quidem. At his non docemur quid iniiciendum in pilulis pro Mezereone: nec etiam, vt prius monuimus, Daphnoidem censemus quam ille putat.

Et, siquidem Adolph. Oconis institutum, vt ipse ait, fuit, docere, quomodo tutò parari debeant compositiones medicamentorum, ecur non declarauit suis Augustanis quam plantam pro Mezereone fumere debeant?

Apud Cronenburg. de comp. med. multa dicuntur de Mezereone, vt ostensum cap. de Laureola fol. deciduo: inter alia dicit, eleganter depingi à Trago vulgarem Mezereonem, [quam alii Chamelæam, alii Thymelæam volunt] sed an ea ipsa, vel qualis imponenda sit, ne verbulo quidem insinuat. Weckerus pro Mezereone scribit Thymelæa: quod nomen cum æquè ambiguum sit apud Autores ac illud, quam vellet nemo intelligat.

Ex dictis apparet incertus, temerarius, & periculosus vsus Pilularum de Mezereone. Monemus igitur iuniores, & seniores Medicos, [quibus hominum vita in manu est,] eos præsertim quibus exacta stirpium, & potissimum eiusmodi periculorum cognitio non est, [vt sanè paucis est,] vt abstineant ab his Pilulis & similibus medicamentis compositionibusque, quæ recipiunt simplicia pharmaca, ipsis incognita, donec perspecta & probè cognita habeant ea, quæ Pharmacopœi iniiciunt, ne horum vel sua etiam graui ignorantia miseris ægris venena exhibeant pro medicina: & dum sperant *ex*, his adferant *ex*, quod [heu] nimis crebro euenit, vt nos multoties sumus experti euenisse medicis, aliqui non indoctis, sed imperitis botanicis, vt suâ negligentia & imprudentia, in præscribendis iis, quæ ne minimo quidem cognita habeant, cum ingenti infamia decepti, deceperint, ac etiam in funesta pericula conicerint alios.

Speciatim, vt ingenuè fateamur, Pilulæ de Mezereone non placent, ob adstringentia admixta, qui mos est Arabum pro correctione acrimium, violentium & malignorum purgantium: quæ nostro iudicio contra rationem, atque adeo cæco & periculoso errore. Quod si cui tamen libeat his vti, suaserimus potius lubricantibus quam adstringentibus emendanda esse, probè gnari, quò citius è corpore exeant, eò minus nocitura, quò diutius hæreant [nam moram sanè adstringentia faciunt] eò periculosiorem futuram vacuacionem simul ac lationem. Aut si quis etiam Altomari experientia tantum tribuens iis vti velit: saltem prius certior fiat quo Mezereone vel Chamelæa sit vsus, sed eo modo curet præparandam, quo ille præparauit: vel vtatur Chamelæa triccoco Monspelienfi, consideratis iis quæ superiori cap. ex Lob. anno-

tauius, qualis eius succi inspissati vsus sit apud Monspelientes. Caueant interim à Mefue *Vitam rapiente, viduas faciente, & Leone terra*, quod nunc semel monuisse sit satis.

Cæterum Mezereonis nomine, vt dictum, plures plantæ obtruduntur: in primis Laureola scilicet peritens & folio deciduo, de quibus paulò antè. Chamelæa triccoco, ac etiam aliæ plantæ pro Thymelæa vel Chamelæa. Quinetiam Lathyrus posset dici Mezereon, quum dicitur Lathyriniorum maximum. Talis enim illa est. Chameleon niger & albus, vt dicebamus, confunduntur cum Thymelæa & chamelæa. Bene igitur nostro iudicio Camer. apud Matthiol. in huius Germ. ait: non facile licet colligere, quid Mezereon sit apud Mef. iuxta Græcos medicos, quia dicit habere lac, quod non reperitur nec in chamelæa, nec in Thymelæa, nec in Daphnoide nostrate.

Aequiuocè  
Laureola  
folio peritens  
tuo & de  
viduo.

Quid Mezereon sit  
ad hoc  
festum.

## THYMELÆA.

## CAP. XLIII.

Veterum placita de Thymelæa & Cocco Cnydio, & quædam in genere præmittamus, antequam de Thymelæa Monspelica specialius tradamus.

Thymelæam, autore Dioscor. alii Chamelæam, alii *myrs* *ex*, alii *xylen* sic cod. Bal. habet: Hermol. fructus auctor Hipp. & Gal. & cod. vet. legit *xylen*, aut Cneoron vocant. Ex hoc granum Gnidium, quod semen ipsius est, colligitur. Hoc Eubœenses *Ætholum* [sic cod. Bal.] Corn. Apollinon vertit. ] vocant, alii Linum, eò quòd fati-uo Lino [*σπάρτυ λην*] scutex natura similis sit. Virg. edit speciosas, numerosas, [Vt addit *xylen*, tenues.] bicubitales: foliis chamelæe, sed angustioribus & pinguioribus quæ inter mandendū quadantenus viscosa & glutinosa percipiuntur: floribus candidis: ac inter ipsos fructu, ceu Myrti paruo, rotundo, inter initia quidem viridi, tandem verò rubente: cuius inuolucrum durum ac nigrum est, medulla autem alba.

Et mox sub finem cap. addit: Nascitur in montosis & alpeis. Palliunt qui Granum Gnidium fructum esse putent, per foliorum similitudinem decepti.

Gal. in gloss. *xylen* exponit *xylen*. Plin. quoque Cneestron legit: sic enim habet: in principio cap. 21. lib. 13. Et in quo nascitur granum Gnidium, quod aliqui Linum vocant. Fruticem verò Thymelæam, alii chamelæam, alii Pyros achnen, alii Cneestron, alii Cneoron. Est sim. his Oleastro, foliis angustioribus, gummosis si in ord. antur. Myrti magnitudine, semine, colore, & specie factis, (foris. Vet.) ad medicinæ tantum vsum.

Hermol. quoque Cneestron legi vult. & foris pro factis. Liparonis herbe meminit Actius, ex Alexandria sic vocante, quam aliqui Cneestron, inquit, nominant, ad vlcera capitis manantia vehementer utilis. Nec indicatis auctor, qualis ea sit, vtrum uè à Thymelæa siue Cneoro diuersam an eandem putarit.

Recentiores vt pleraque omnia, chamelæam cum Thymelæa, & utramque cum Daphnoide turpiter confundunt. Theophrast. [inquit Marcell.] Cneoron Thymelæam vocauit. furculosi generis herbam & carnosu folii: quæ in Dioscor. conicienda magis quam manifestè intelligenda, siquidem virgas in ea dixit, & Lino comparauit, & folia pingua gummosaque descripsit: Quod totum

Chamelæa  
Diosc. corr.  
reft.  
Pyros achne  
Cneestron  
Cneoron.

Folia.

Flora  
Fructus  
sem granum  
Gnidium.

Cneestron  
& Cneoron  
rum Gal.  
leno  
Thymelæa  
Plin.

Plin. emend.  
& Hermol.

Liparonis  
herbæ  
Actii.

Recentiorum  
error.  
Cneoron  
Marcell.  
Thymelæa.

Curium  
granum  
Theop.

Py. epist.  
Scrip.  
Diosc. ill. ap.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Thymelæa  
vna.

Plin. ex Theoph. acceptum eodem loco retulit, si-  
millem Oleatrio Thymelæam faciens. Theoph. l. 9.  
Cnidium granum vocavit, Et hæc nomen in di-  
versitas in Theoph. Thymelæa est. Quibus addi-  
derunt alii alia, vocaruntque Pyrosachne ab v-  
tendi vi, quam habet: nec aliud Pyrosachne  
compositum ex igne & tenui stipula nomen in-  
dicit, quam quod egredi vit. Chamelæa eadem  
dicta fuit, quoniam vt Plin. ait, Oleastro similis  
sit. Cnestron postremò eandem hanc Thyme-  
læam vocarunt Hip. Gal. & plerique alii. Nobis  
tamen ignota eius vocis origo & causa. Sed quan-  
do Dioscor. Thymelæam *αἰνῶν σπέρμα* comparat,  
querendum Linone satiuo simpliciter, an fuit u-  
loso fructu, quem Sparton omnes vocant. Nobis  
in hanc partem inclinat animus, etsi aliorum In-  
terpretum modo & nos satiuum Linum verteri-  
mus: Geniste enim similior, quam Lino, ex hi-  
storia descriptione que eius videri potest. Vniuer-  
sa plantæ nomen factum videtur ab Olea cui si-  
milis est, & à Thymo herba, cuius habet flores.

Lin. M. & L. l. d. c. Præterea que in Dioscor.  
legantur, Paulus radicem eius contra sangui-  
nis profluuium commendavit, sapore acer-  
bo: eique mulo prodesse potam & sitis imposi-  
tam. Sed ubi nam Paulus hoc ait? quod si fecit,  
constanter hoc etiam Thymelæa in plantam a-  
liquam: quis rationis compos ut hæc plantam  
Dioscoridi vrentem, purgantem, stomacho in-  
commodam, vel noxiam, vt vertit Marcell. vti-  
liam esse putaret? guis prædixit. Iam ipsemet  
Paul. lib. 9. Cocco Cnidio fructui Thymelææ tri-  
buit facultatem vrentem & purgantem: & eo-  
dem lib. 10. de Thymelæa dicens, ei non tri-  
buitur eiusmodi vim, imò dicit similem grano Cni-  
dio, vt apparet ex verbis à nobis citatis de Grano  
Cnidio. Neque audiendas Plin. qui Cocco Cnidio  
alium sistendi vim tribuit, nisi forte mendum  
subsistit, legendumque sit ex Vet. Cod. quod facit  
Dalech. alium sciendi.

Herbarii, inquit Ruell. Thymelæam nunc O-  
liuellam, vt Chamelæam, nunc Leonem terræ,  
aut Linum silvest. granum vocant Cnidium, vel  
Coccon. Sed docere debuit Ruell. quam plantam  
per Oleellam intelligat. Ruellum sequitur Ta-  
gautilus. Syluio Mezereon Mel. Thymelæa est,  
vt antè dictum c. de Chamelæa. Sed Mel. nomi-  
ne Mezerei cum Auic. comprehendere videtur &  
alias plantas.

Thymelææ semina, aithora Dioscoridi, bi-  
lem, pituitam, aquasque detrahit, si viginti gra-  
norum pars hæc interna bibatur: verum fauces  
adurit: atque idem cum farina polentæ, aut in  
vux acino dari debet, aut cocto melle obducta  
deuorari. Quibus autem ægrè sudores eliciun-  
tur, eadem trita cum nitro & aceto inungitur. At  
folia, quæ peculiariter Cnestron appellantur, per  
messes colligi debent, & siccata in vmbra recon-  
di. Sed si cui exhibere placet, prius ea tundere, ac  
ipsorum quoque fibras eximere conuenit. Vino  
diluto inperfa, acetabuli modo aquosa detra-  
hant: sed moderatius purgant, admista lenti co-  
cta, & contritis oleribus. Eadem trita vux acerbæ  
succo excipiuntur, & in pastillis coacta reponun-  
tur. Herba stomacho infesta: partus subdita necat.

#### COCCOS SEV GRANVM CNIDIVM.

**K**nidion *αἰνῶν*, quod est granum Cnidium  
Theoph. rotundum est, colore rubrum, ma-  
ius Piperis, sed multo validiore caliditate. Quare

in potu dantes, [exhibent verò ad alui solutio-  
nem, *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν*: Gaza Plinii vulgati codicis  
periculofum potius errorem secutus, quam Theo-  
phr. lectionem, nisi fortè ea corrupta fuerit, con-  
uertit: dari enim contra alui solutionem solet.]  
in pane aut farina lubacta obductum exhibent:  
nam aliqui fauces adurit. Ex quo & Plin. trans-  
scripsit: Cocco Cnidio color cocci, magnitudo  
grano Piperis maior, vis ardens. Itaque in pane  
deuoratur, ne adurat cum gulam transsit. Huic  
vis præsentanea contra Cicutam. Sistit [ciet. Vet.]  
alium. Dalech. scribit Plinium foedè lapsum, quod  
de ipso Plinio dicere non possumus, quandoqui-  
dem in Vet. Cod. Plinii legitur ciet, vt ipsemet  
Dalech. annotat: id scribendum erat aducius Ga-  
zam. Qui siem potest, inquit Casalpini. vt quod  
vehementer soluit, alium sistat?

Galeno quoque *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν* purgat, facul-  
tatisque est acris & causticæ. Et Paulo, Thymelæa  
ex qua granum cnidium est, similem ipsi [grano]  
vim habet. Et postea: coccus cnidius, fructus  
est Thymelææ, non chamelææ, velut quidam pu-  
tarunt: estque acris ac vrentis facultatis. Pocum  
autem aquam deorsum purgat.

Euchar. Roslin more suo variarum plantarum  
nomina confundens, hæc habet. *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν*  
descripti: *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν*: Coccon Cnidium:  
Thymelæa: Daphnoides, Grana Cnidia: Mezereon:  
Laureola. Pingit tamen Laureolam flore deciduo,  
sub titulo *αἰνῶν*.

Gelin. in suo libello de herbis Lunariis: Mi-  
ror, inquit, quæ granum Cnidium gignit, igno-  
raffe Plinium. An ignorant Plin. vel non cognou-  
erit Plin. Thymelæam, iudicium suspensum te-  
nemus. Illud scimus, satis manifeste apud cum  
legi, fructicem, ex quo Granum Cnidium gigni-  
tur, appellari Thymelæam, quam etiam sub cha-  
melæa tradit. Rob. Const. apud Amatum: cocci  
nomen, inquit, apud Græcos, res duæ admodum  
diuersæ significantur. Nam vt Author Galen. in  
Hippocratis sine adiectione vocant Granum Cni-  
dium, siue Cnidium, & Granum infectorium.  
Tamen & separatis utriusque nomen usen-  
tuntur. Siquidem Gal. apud ipsum Hippocratem ex  
Diosc. [apud quem tamen hanc vocem nondum  
legimus] exponit Coccum Cnidium: Et per  
*αἰνῶν* apud hunc ipsum Scriptorem, idem Gal. in-  
telligit commune granum, hoc est, tinctorium. I-  
dem in Lex. *αἰνῶν* *αἰνῶν* apud Hip. Granum Cnidium,  
*αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν*, huius Thyme-  
lææ: Coccus Cnidius Plin. Item *αἰνῶν* apud Hipp.  
Granum Cnidium.

Catecium Cocco Cnidii nomine, variarum stir-  
pium fructus exhibentur, vt ab Antiquis fiebat,  
qui fructum Chamelææ malè pro Thymelæa per-  
hibebant, quod hoc & præced. cap. ex Diosc. an-  
notatum. Thymelæa autem fructum ita dici, pa-  
tet etiam ex hoc & præced. capite: & cap. de cha-  
melæa tricocco, & de Thymelæa subtus incana.  
Quosdam etiam existimare coccon Cnidium col-  
legendum esse ex frutice Laureola folio deciduo,  
videre est antè cap. proprio. Trago & Dod. *αἰνῶν*  
Theophr. est Tithymalus paralis, de quo alibi.  
At guillaux verò *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν* *αἰνῶν*  
coccos est Lathyrus, aliis Chamelæa. Humelb. in  
Annot. ad Apul. Lathyrus, inquit, videtur esse,  
quæ nunc Cataputia minor. Coccus Cnidios ex  
Thymelæa propriè est: huc aderevit ista appel-  
latio, quæ causa fuit, vt Chamelæa diceretur.  
Trag. & Dod. tribuit quoque chamelæoni nigro  
nomenclaturam cnidii cocci, de quo suo loco.

THY.



## THYMELÆA MONSPELIACA.



**T**hymelæa Monspeliensis dicta, frutex est plerumque procerior, quam chamelæa tricocco vnum aut duos circiter cubitos altus, odore gratiis. Folia per ramos, molliora & acutiora quam Chamelææ. Flores in virgularum extremis durtaxat acervatim fert paruos, cãdidos, succulentibus eodẽ ordine baccis: in quibus non observauimus

το σπυρίδιον σκληρόν ἔχον μέλαν, quale Dioscor. Thymelææ fructui tribuit.

Diligentiùs paulò Cusius sic describit: Frutex pollicaris interdum crassitudinis, cubitalis verò altitudinis aut amplior, & in multas virgas diuisus: cubitales, pulchras, tenues, rectas: quas sepiunt perpetuò virentia folia, Liniferè, sed maiora, lamiora, non obtusa cuspidè vt Chamelææ, neque adeò fragilia, sed mucronata, lenta, & gumosum quiddam, si dentibus attrantur, præbentia: flores fert in extremis virgis copiosos, quatuor foliolis constantes, Oleæ ferè similes, candidos, racematim ferè propendentes: deinde fructum baccarum Myrti interdum magnitudine, paulò longiorem, initid viridem, postea Corallii modò rubrum, carne succi plenè Cerasorum instar, sub qua latet vnicum semen, nigra fragilique pellicula, albam & feruidi saporis medullam obuoluens. Radix lignosa est & dura, in tenellis plantis Raphani modò efformata, crasso cortice testà, sed quæmadmodum tota planta, lento, & admodum tenaci.

De hac ipsa ni fallimur, Monachi in Mel. sic scribunt: Serapioni, Auicennæ, Mesue, Mezereon siue Mezerion, magis commendatum est Thymelæa, cuius semen est granum Cnidium siue Gnidium, id est, Coccognidium, testimonio Dioscor. Gal. & aliorum &c. Non longè ab vrbe, [Roma fortè] vbi maxima copia: incolæ Tribiscum vulgò nominat, ac in virgis siue ramulis visum lac asserunt iidem, vt cap. de Mezereomouimus.

Videtur quoque esse Thymelæa Bellon. quam ait provenire cum Chamelæa in Cretæ monte Ida, vulgò dicto Psiloriti.

Quæ Matthioli in suis com. in Dioscor. de Thymelæa prodidit, retulimus sub Chamelæa incana: vbi ait vocari Piper montanum, nec interim describit plantam: iconem quidem proponit, quæ repræsentare videtur, vt dicebamus, Thymelæam Monspellulanam, exceptis fructibus tricocco, secundum ramos sparsis, qui sunt Chamelææ Monspellulanæ: flores etiã per ramos sparsi non conueniunt cū Thymelææ Monsp. quæ eos in summitate gerit: vt merito nobis ea icon à Matth. effi-

Tom. I.

cta videatur ex duabus illis dictis plantis, & nesciuisse quid scriberet, vt manifestè apparet, quòd in com. Lat. & Ital. cum magnis fig. eam reiecerit substitutà alià nouà, multum à priore differente, [quàm tamen & in epit. sua retinuerat] in qua fructus singulares per ramos sparsi, quam figuram eidem fictitiam censebimus, donec aliquis limitem nobis plantam ostenderit.

In hist. Germ. eandem habet iconem sub titulo Bellerphals / Zeiland / Thymelæa, Granum Cnidium, Coccum Cnidium: nomina autem Germanicant Laureolæ fol. deciduo: florem aut album aut arneum, qui colos conuenit quoque eidem Laureolæ.

Camer. reiecit Matth. [quem aliqui sequi magna ex parte consuevit] iconibus in epit. eius, & in hist. Germ. reponit iconem genuinam Thymelææ Monsp. ac dicit: fructum siue baccas dici propriè Coccum Cnidium, licet ita denominetur vulgare Bellerphals, qua occasione & Matth. denominarit hanc plantam Bellerphals.

Calp. Bauhin. apud Matthioli. posuit iconem C. Bauhin. falsam ex Tabern. in qua pro baccis tricocco per ramos sparsim appicti fructus simplices.

Picturam quam antè diximus Matthioli non esse veram, apparebit etiã ex seq. Maranthæ verbis, lib. 1. cap. 8. Meth. sue sic scribentis: Cneorum Theophrast. per quod Thymelæam & Chamelæam intelligit. Et lib. 2. cap. 15. In Thymelææ historia summi Viri prolapsi sunt, cuius fructus inuolucrum cum Dioscor. dicat foris esse nigrum, intus album: illi nigras baccas per maturitatem in Thymelæa quæsiere: non animaduertentes ibidem Diosc. Thymelæam fructu Myrti depingere, qui inter initia virescit, & tandem rubescit: vnde plantam quandam nigro fructu pro Thymelæa ostendunt, quæ tamen ipsa non est, licet ei congenere esse negari non possit, tum ob foliorum & ramorum similitudinem, tum etiam ob easdem facultates. Sed veram Thymelæam vidimus nos vberimè prouenire in campis inter Caietam & Fundanum oppidum, in maturitate rubicundos fructus ferentem: vidimus etiam in Apulia prope Barum: & in Sicilia inueniri scio: fructus autem, & flores in summis virgis racematim proueniunt, non, vt pictura Senensis ostendit, per virgas ab infima earum parte ad summum. Verum quod in hoc erratum præclaros hosce viros induxit, inter alia est minis proba Græcæ dictionis

versio: nam vbi habet Dioscor. τὸ σπυρίδιον σκληρόν ἔχον μέλαν, τὸ δ' ἐν τῷ λυκῷ: ita verti debet: fructus inuolucrum durum & nigrum, pars autem interior alba: non, vt omnes ferè interpretantur, inuolucrum fructus durum, foris nigrum, intus album: quia illa dictio, foris, non est in Græco: neque per pericarpium intelligere possumus carnem fructus exterioriorem: quia illa rubicunda est, & tenera: hoc autem Dioscor. vult esse durum & nigrum, sed intelligamus nucleum carne nudatum, &c.

Amatus notat Hisp. dici Thornisco: Ital. Peperino: Gall. Lin Sauvage: Germ. Bellerphals, sed nec nomen Italicum, nec Gal. nec Germ. placet. Placet verò ibidem ex Dalechamp. figuris apponi Thymelææ Monspellulanæ iconem.

Lacuna, qui falsam figuram Matth. habet ait Castil. Toruisco: Portug. Trouisco: Ital. Treuisco dici: Piperis verò montani nomen omittit.

Lonic. quoque fictitiam Matthioli. figuram habet, cui tribuit nomina Bellerphals aut Zyland / aut Zebast: addens Thymelææ Dioscor. descriptionem in omnibus conuenire cum Germano-

D d d

Matth. inconstantia & signum aliud.

C. Bauhin. not. Tabern. signum.

Cneorum Theophr.

Vera Thymelæa.

Matth. carpitur.

Lonic. ne sit corruptum.

Amatus repreh.

rum fellerßhals, se aliis suam opinionem de Daphnoide relinquere, cum eo non conuenire. Sed facile imperitiam suam in re herbaria prodit, quando iconem Matthioli. quæ nihil habet cum fellerßhals siue Laureola folio deciduo commune, etiam pari ineptiâ ponit sub nomine Sidelbasi, assumpta Chamelææ Matthioli. iconem.

Gefn. ut supra dicebamus, miratur Thymelæam suffruticem, qui granum Gnidium gignit, quamque in Gallia uidisse ait, & in Italia nasci, ignorasse Plinium.

Thymelæa  
Dul. est  
semper vi-  
rent.

Dodon. Thymelææ fructum similem dicit spinoso albo, ubi maturuerit, rubro, & in eo granum album obductum pellicula nigra, feruidum & vrens linguam: hanc stirpem non amittere folia, sed semper uirentem remanere: granacius *phoscoranthus*. Olfic. incognita esse. Hæc in Hist. Gallici. In Lit. addit, Theophr. *phoscoranthus* à Thymelæa differre, nisi nigrum Cneoron Thymelæa sit.

Cneoron.

Pena & Lob. cognatæ figuræ & naturæ dicunt Chamelæam & Thymelæam, quam dictam æstimaunt quasi Tithymelæam, id est, Tithymali & Oleæ mixtâ facie: Corticose describunt amictu, tenaci, cinereo, à summo ad imum deglubenti sequaci, instar Laureolæ corticis: grana Antiquis Gnidia vocata, nouena aut dena, primum viridia, deinde ex fluo rubentia. tenella cuticula, succo aqueo turgida, vnum gygartum amiciente.

Thymelæa  
Gnde.

Matth. co-  
preh.

Perperam edoctus [addit idem] cum Pharmacopœorum plebe Commentator [Matth.] qui hanc non nouerat. Mezereci Germanici granum feruidius multo & planè crustas inurens, tum fortis, tum intus nobis, quâ solet fiducia, fugillatim Dioscor. cum Rec. nitorum omnium Dilectorum sententiâ temerè obtulit. Nam non cocum ipsum rubrum dat, aut purgate asseuit, cui vni [albam] nuncupat, vim deiciendi attribuit, & abundè explicat, ut ex eius verbis liquet. Vnde nec ipsas plantas, nisi superba animi inductione à Senensi infertat, & codicis Dioscoridei, nulla nisi triuiali lectione, cuius tamen admodum accuratum vindicem se fore voluit videri initio, assecutas, magno multorum detrimento, qui illius freti commentis ad Hydromen sunt vsi, rati esse Diosc. veras Thymelæas, Chamelæas, Daphnoides, & Chamædaphnes, quarum nullam nec legendo quidem, nedum facie, vel viribus cognitam habuisse tantum biatorem Senensem, cuiuslibet vel Pharmacopœo iam liquet.

Matth. de  
sua inco-  
gnita jeri-  
bit

Chamelæa  
Anguil.

Clus. huic omnia prisca nomina, quæ apud Veteres leguntur attribuit, eandem sine dubio cum Veterum Thymelæa faciens, quod ut temerè negare nolumus, ita etiam pro indubitato habere nondum ausimus. Casp. Bauh. existimat chamelæam Anguillæ eandem esse cum ea de qua hoc loco agimus: quod nec ipsum adhuc pro certo asserere velimus: ait enim folia infernâ parte alba, quod non obseruatur in Thymelæa Monspefulana: fortè melius responderet illius Thymelææ.

Thymelæa  
forti spe-  
cies.

Irradiemur parumper Apollineis. Fr. Alexandri radiis. Is inter alia hæc habet.

Quandoquidem Chamelæa Apulis Græcisque cognita, suffruticem æmulatur, ramos tenaci viscidoque libro conuestiens, Oleaginis foliis exiguus, tenuibus, duriusculis, floribus candidis, in furculorum cacumine aggestis, è quibus nigra bacculæ exteriùs, carne videlicet nudata semina Berberorum instar, Myrtorum figurâ, & rubentia continentes, radice inutili, foliis, floribus & fructu amaris, acriterque fauces vellicantibus. Thy-

Thymelæa.

melæa, è qua granum Gnidium, Chameleæ similima, hoc tantum differt quod virgine bicubitalibus, rectis, ab vna radice multis, non furculosis: nec fructu ab imo ad summum, ut Matth. salitur. Foliis angustioribus constat, pinguioribus, viscidisque, radice cubitali & crassa, Raphani magni unitat, cortice crasso vestita, & venenata. Granum verò Gnidium Theophr. lib. 9. cap. 22. Piper montanum appellari potest. Huc usque radiat Apollin. Verum nihil elatius videmus quid velit per Chameleæ duplicem plantam, quæ baccis est raris Thymelæa creditæ, [id est, nostro iudicio, Laureolæ folio deciduo] quæ montanum Piper vulgò dicitur: præterea non intelligimus, quantum ea Apollinis planta differat ab illa Thymelæa creditæ. Præterea si ipse veram Chamelæam tradidit, cur alterius meminit, nempe Apulorum & Græcorum, quam descripsit ex Anguill. sicuti etiam Thymelæam Raphani radice, quæ fortè, ut antè dictum, eadem cum nostra Monspefulana. Rogamus peramanter peritos Botanicos Italos, ut nos ex his Labyrinthis extricent, quod erit illis facile.

Casalp. Thymelææ folia mediâ quadam magnitudine dicit inter Oleam & Linum, dura & Castaneis exurentia. Baccas oblongas, tenuiores Myrto, flauescens ex rubro, semine intus nigro, sed medulla candida & oleosa: radicem crassam. Dioscoridis & Plinii Thymelæam dicit, dubitatque an etiam sit Chamelæa granum Cacci Chæferens. Idem Cocum Cnidium vocat colore Croci. Hist. Lugd. Thymelæam [inquit] hic appinximus. Mezereon quidem ille [Matth.] Germanicum potius, cuiusque semen Piper rusticum seu montanum appellatum, quam Thymelæam veram cuiusque granum Cnidium nobis proposuit. Geminam Thymelæam descripsit Dod. & Clus. Hæc illa, quæ tres figuras habet: poterat sufficere vna.

Camer. Thymelæam foliis Lini vocat. Cæterum præter Thymelæam Monspeulensem, Aegæde qua longa & satis tediola hæc narrationis ferie agimus, aliæ sunt etiam plantæ, quæ id nomen obtinere: ut *Sanamunda glabra* existimatur Thymelææ species, quæ sequetur. Quæ sit Thymelæa minor Cordæ nondum nobis constat. Quapropter antea cap. peculiari de ea egimus, eidem capiti obsecramus historiam Tragi de Thymelæa subiungentes, *Chamelæam Anguillæ* quidam Thymelæam existimant, quod asserere non audemus, ut antè dictum. Cneoron si fuffrux Matth. à quibusdam Thymelææ species ex se nata ob foliorum quandam similitudinem: & struitur tamen acrimoniâ. De eâ priùs, Tartonairæ siue *Sanamunda* Tragi prima Clus. Thymelææ congener existimatur. Item, *Sanamunda ensifem* secunda, de quibus pauld post. Item *Sesamoides minus* Dalecham. siue *Sanamunda terria* Clus. Multa Laureolam folio deciduo melle existimant Thymelæam. Sunt qui Laureolam folio perpetuò virente eandem cum Thymelæa Tragi existimant, quod nobis non videtur.

Scitbit Adolphus Occo supra Hieram Logad. non multum peccaturum, qui Lathyridis grana pro Thymelæa acceperit. Idem præterea dicit: pro semine Thymelææ se Laureolæ Germanicæ, quam *zeiland* vocant, accepturum: Thymelææ enim & Chamelææ Germanos carere.

Thymelæa non modò in Galloprovincia & toto Narbonensi littore tractu, sed etiam Italicis montibus longiusculè à mari Tyrreno diffusis, ut sunt mons D. Iuliani, & Pisani Lucensæque col-




colles, vbi nusquam Chamelæam vidimus. Quin etiam in Occiduo Oceano Gallæ & Xantonice ad Rupellam insulam, *des Rat* vocatam, id est, murium. Lob. Clus. per totam Hispaniam locis asperis nasci tradit. Floret Iulio, & toto nonnunquam Autumno, semēque lubide profert. Camer. circa Neapolim ad vlnā vnius & semis crescentem obseruauit. Talem & nos copiose circa Montpelium.

Thymelææ succus, inquit Aduers. difficiliter premitur & eicitur quàm Chameleæ, propter glutinosum virus: nec nisi tepente affuso vino, aut consimili quopiam liquore, vt facilius dum succū Brassicæ marinæ educant, quo quilibet vti poterit, eo modo quo & de Chameleæ succo dictum est. Tunduntur tenella folia, flores, & diu, & vehementer, seorsūque tantillum tepentis vini affunditur inter tūdendum: tunc prælo ligneo vehementius vrgentur, dum trans colum expirēt: tunc igne lento aliquandiu bullit, dum Loch crassitudo affluatur. Demūque Soli feruido obiectum durāuit, addito Saccharo, ne mucoscat, sicque coctum reconditur. Cortices Thymelææ feruntur pro ligandis scopis & fasciculis. Fructu maturo rubro Perdices & auiculæ auidiſſimè vescuntur. Rustici Hispaniarum singulis annis propē infinitas auiculas hoc semine curuatis virgis & quibusdam lineis dispositis venantur, testibus Amaro & Clusio. Cautet Camer. ne quis radice vtatur, quia paucis horis perimat. Thymelææ vires ex Veteribus antea diximus.

## SANAMVNDÆ GLABRA.

CAP. XLIV.



**F**Rutex quē in tractu martimo Narbonensi, prope Ardes oppidū collectum hoc nomine donare placuit, Lentis & obsequiosis est ramis, cortice tectis flauescēte, in fila Mezerei Germanici in morem ductilibus: per quos agminatim conscendunt folia crebra, Myrtis similia, vnciali plūs minūs longitudine, vix semunciam lata,

in acumen desinentia, glabra: ē quorum sinu, per integrum ferē ramum flores oblongi, parui, ex luteo herbacei, quatuor foliolis decussatis constantes. Succedit granum rotundum singulare.

Eadem nostro iudicio videtur planta, quam inter siccas nostras inuenimus à Valeiādo Dourez: radice dodrantali, digitalis crassitudinis, foris facta, intus candida, lenta, & Xyli instar quodammodo in fila ductili, quemadmodum cortex Mezerei Germanici, siue Laureolæ folio deciduo: infima parte in fibras crassas finditur. Superius itidem in capita multa diuiditur, ē quorum vnoquo-

Tom. I.

que ramus exit palmaris circiter & breuior [tenellus, vt apparet, & primum se renouans] foliis ornatus posito & fortā foliorum Sanamundæ, qualia appinguntur Alypo Matthioli, vel etiam Apio primūm prouenienti, vt à Dod. pingitur.

De hac planta, ni multū fallimur scribit Hist.

Lugd. hoc modo: Fruticem & iconem ex Hispania misit Myconus, quem Thymelææ speciem esse suspicatur: folia Myrti: flos luteus: radix crassa: cortice à nigro rufescente, crassitudine pollicari, flexili gustu valde ingrato, cum acrimonia, amaro, & fauces abradente. Totius fruticis odor grauis & sapor insuauis. In Hispaniæ Monteferrato & locis vicinis frequens, & Catalonis Arragoniæ finitimis. Hispani agricolæ vocant *Herbam de Monteferrato*: Catalani *Brisalagiam* & *Ciegegat*.

Calp. Bauhin. in Animadu. in Hist. Lugd. Thymelææ speciem dicit, & describi Myconi verbis: sed proponi aliam ex Clus. Sanamundæ primæ nomine. Nobis verò Thymelææ hæc species diuersa est à Sanamunda Clusii, ideò prudenter Hist. Lugd. utrāque posuit descriptionem & dixit, videtur: nihil temerè asserens.

Sanamundam igitur hicutam planè aliam plantam ab hac glabra censemus, de glabra & Matth. scripsisse suspicamur in hæc verba: Tithymalo Paralio similis planta, quæ in Hetruria vulgè appellatur *Herba mora*: cuius radicibus prius contusis, ac deinde fluminibus demersis pisces protinus enecantur. Sed caret hæc lacteo succo: quapropter eam inter Tithymalorum genera iam non esse annumerandam cognoscimus, cū alias aliter senserimus, quod aliis notis neglectis, Lini folia videntur & caules subrubentes. Si hæc defuerit, Platyphylli radices sumant, quo vniuersa regio scatet.

Mycono autote, vis purgatoria ei vehemens, & quàm in Chamelæa valentior: nam drach. dimidiæ pondus potentissimè aleum soluit: ac aquas potentissimè vacuat, non sine torminibus & magno cruciatu. Datur in iure aut vino. Hoc remedio Hispani agricolæ vtuntur.

## TARTONRAIRE MASSIL. SANAMVNDÆ I. Clus.

CAP. XLV.



**V**OCANT Massilienses, apud quos vber eius prouentus, Tartonraire suffruticem quēdam cubitalem, valde ramosum, radice nitentē altè actā, crassā quem cortex tegit, mirè obsequiosus & lentus: in minima stamina non sine floccis quos lanam dicas carptam, ductilibus, quali etiam cortice vestiatur rami, sed

superstrato denso tomento albedo, & quasi argenteo.

Ddd 2

Folia

teo. Folia numerosissima, Myrti Tarentinae magnitudine, nisi quod per extremum sunt paulo latiora, in acumen tamen obtusius desinentia; vtriusque lanuginosa, & rassa mollia, albida vel argentea, lucida: inter quae flores exeunt, Oleae similes, ait Clus. oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteo. Fructus squemad, ex relatu accepit] Thymelegerè, sed nigricante colore.

Idem Clus. folia carnosa dicit, aliquantulum hirsuta, gummosa, si mordeantur amara initio, deinde acra & adurentia. Ramos cortice exterior nigrescente obduci, alio interiori lento.

Tartonn-raire Lob.

Quoniam verò Lob. Tartonn-raire separat à Sanamunda Clus. lubet eius descriptionem hic subnectere, quae eiusmodi est. Noua nostrae aetati iuxta ac elegans aspectu fruticat: virgae edit rectas, crassiores, vixenas, tricenae, aut plures, cubito longiores, incana lanugine oblitae: foliis candidis, nitentibus: foliis in summo pifilos, & [ni labat memoria] pallidulos ex albo, semine pullo, rotundo, Arthemisiae aut Ambrosiae. Radix proluxa pedem, simplex, cortice albigante foris, intus candida, lineo aspectu & fibris dura, lignosa, gustu non admodum calida, nec amara, nec ingrata, non nihil tamen caloris impressi postremo relinquentis, & quadantenus Turbith Alexandrinum sine vulgare referente, inodora, tota lactis expers.

Sesamoides maius quoniam runda Hist. Lugd. Loc. Descriptio

Permuli, inquit, Hist. Lugd. opinantur Sesamoides maius esse eam herbam, quae in tota ora Massiliae & Liguria, Corsica ac Sardinia gignitur, illicque vernacula lingua Tartonn-raire appellatur. Eadem sic depingit: Fruticosa est, pede non altior, radiculis sub flauis, gracilibus, tenuibus, si totam spectes plantam, superuacuis: ramis multis, rotundis, densa lanugine villosis, furculosis: foliis Rutae similibus, numerosis, hirsutis: candidis: flore in summis ramis copioso, exiguo, candido, densius congesto, intra lanuginem delitescente: semine paruo, nigro, gustu tam feruido, vti si quis herbam mandat, diutius ardere fauces videantur, tam pertinaci vredine, vti nulla oris collutione deleri possit. Minger sanè est in Chamela, Thymela, Laureolaque generibus acrimonia, ac vrendi vis, quam in hac planta.

Semen Sapor acedimus.

Hist. Lugd. fallitur.

Alter eiusdem error. Sanamunda prima differens à Thymelege specie C. Bauh.

Tartonn-raire vnde.

Mierda-cruz.

Sesamoides maius Scalig. Lob. not.

Chamelaa Solerio.

Tartonn-raire.

Retumbet:

Porro quod pede non altior dicit, pusillas tantum aut vidisse aut habuisse Hist. Lugd. Autore in opoitet, nam & cubitales habentius, & eas quidem non integras. Sunt nobis & pede breuiiores, sed non tenuibus radiculis. Idem fallitur dum putat Sanamundae tertium genus Clus. de quo paulo post: nostro autem iudicio est Clusii quoque plantam vnam eandemque putante.

Pena & Lob. tradunt Tartonn-raire dici Galloprovinciae & Massiliensis, ab exuperanti purgandi vi, ob eandemque causam Mierda-cruz Hispanici Clus. Autor est.

Sesamoides maius Scaligeri, vti vult Lob. de quo tamen apud Scalig. aliquid legisse non meminimus.

Nec placet icon Lob. qui non agnouit Tartonn-raire idem esse cum Sanamunda Clus. qui probam iconem habet, qualem & nos proponimus.

De hac planta aliquando scripsit Solerius hac verba: Chamela, Massilitanis & Beterrensibus [qui Berro & Barsegue locum vocant, vbi praenit] dicitur Tartonn-raire, id est, sardè aluum labricans: Arelatensis Retumbet: Aquafestianis, Herba-luarino, Montanis Buekin, haud procul à Ni-

cea Renis Patris. Semina quoque ab insigni M. dico Belgae D. Iac. Vtenhouio, cum esset in Gallia Narb. Retumbet nomine nobis missa. Neapoli Sporchina Gallina dicitur. Iac. Rainaudetus Pharmacop. nobis misit hunc fruticem in litore maris Massiliae natum, scribens Tartonn-raire ibidem vocari, quod aluum mitificè soluat.

Circa Massiliam locis ad mare deuexis, praeterimque collem vulgò Mont-rond vocatum, squalidum, aridum, glareosum, plurimè fruticat, vti ante nos Lobelius annotauit. Nihil lucundius aspectu quam colliculi aut areolae argenteo huius herbae nitore vestitae. Neapoli quoque nobis missa. Frequens quoque, inquit Clus. regnis Granatensi & Valentino in apricis & Sole illustratis locis. Vero tempore floret, hoc est, Martio & Aprili. Aestate fructum perficit.

Folia sunt adurentia, vti dictum: ob purgandi facultatem rusticis Hispanis magno in vsu. Sed effrenis & exuperans eius purgandi vis, inquit Lobel. non raro Dysenterias fluxusque immoderatos accersit. Praeterim si quis minus peritus, huius folia in puluisculum reducta, vel quopiam liquore diluta, propinaret: vti faciebat ille necator Tmiso, qui nobis primum eam, eiusque vires, vti dicebat arcanas detexit. Hodie impossibiles, ac quidam ignari, notante Dalechamp. quanta sit huius plantae vis, & corporibus nostris noxia, ex vino albo, vel Cicerum decocto, vel elixir carnis iusculum bibendum propinquant drach. i. vel ii. in validissimis naturis, tanta purgandi potestate, vti saepe ob hypercatharism sanguis erumpat. Educit autem sic sumpta biliosa, pituitosa, aquosa, id quod & Diosc. testatur de suo Sesamoides: vti mirum non sit, eodem teste, in Anticyra dictum olim fuisse Elleborum, admissereque solitum positionibus ex Veratro albo paratis, vti facilius & citius Veratrum, quod vomitiones magis citius deiectiones, aluum commodius detraheret. Hoc idem Dalechamp. Elleborum suspicatur, quod fructum Sesamoidis similem edere Theophr. scripsit, quo in Anticyra purgationes fiebant. Quamquam non solum fructu, sed etiam radice vile esse scribit: quod negat Diosc. qui radicem ἀπαυτον, id est, imbecilem & inefficacem, seu ignauam, suo Sesamoidi maiori tribuit, semineque purgandi vim, quam etiam foliis & ramulis inesse experientia docuit.

SANAMUNDA II. CLVS.  
CAP. XLVI.

Tartonn-raire Affinem fruticem Sanamundam fecit Clus. quem & circa Calpen, vulgò Burthalaga appellari ait, altitudine cubitalem, ramis lentis, flexilibus, carnoso & denso cortice interdictis, qui [sublatà extenore cute] per totam plantam, praeterim circa radicem, Lini aut Cannabis modo in fila diduci potest: superius ramulculi densi-




rum, confertorum, lanuginosorum, & veluti tomento quodam oblitum foliorum comam pariunt, superiore minorum, & mucronatorum, falsi non nihil gustus, sed deinde acris & calidi. Exornatur hac coma flavescentium flosculorum Oleæ similium numerosa fobole. Radix crassa & lignosa superiori similis est. Eius fructum observare non potuit: quandoquidem Febr. florentem inveniebat petroso & salebroso loco, maritimis Bæticæ inter Calpen & Estepona, montibusque Granatæ proximis.

Granatensibus Mauritanis Samundam vocari ait, apud quos purgandorum corporum gratia frequenter vsurpetur. Drachmæ enim pondere cum decocto Cicetum sumptam, misicè purgare per inferiora. Circa Calpen verò nullus esse vltus, præterquam ad excalefaciendâs fornaces.

# SESAMOIDES PARVVM DALECH.

Sanamunda III. Clus.

CAP. XLVII.



**C**oncinna est planta, ramis crebuis, lignosis, inconditis, inque fili tenuitate tandem abeuntibus donata, quos farctim densa, candida, cineracea lanugo obvoluit, quæ in maioribus virgis paucior. Folia confertissima ramulis sine pediculis hærent, Thym aut Vacinæ palustis, acuminata, infernâ parte ru-

gosa, virentia & in sicca nigricantia, glabra, superna verò [qua parte contrahuntur & velut alucolum efficiunt] tomento albedo penitus obducta.

Clus. sic describit: Sanamunda 3. duas priores magnitudine excedit, candidioribus & multo lætioribus virgis, quarum cortex supra modum lentus est, & frangi contumax. Extremi ramuli frequentes, & ferè omnino tomentosi, procumbentem comam habent, & frequentibus foliis obfiti sunt, carnosis, parvis, Sempervivum minori Dioscor. quod nonnulli *Illecebram* vocant, valdè similibus, vrentis etiam facultatis. Flores superiores similes, interdu herbacei sunt, aliquando pallentes, Sed neque istius fructum observare licuit. Floret autem cum superioribus. Quo porro nomine vulgari appelletur, ignorate se ait. Similem autem fructum siccum ad se aliquando misisse C. V. Alfonso Pantium, Med. & Prof. Ferrar. & Cortusum Patauinum, hic quidem Ericæ Alexandrinæ nomine, ille verò Cneori. Verum Cneorine, an alio nomine Veteribus descriptæ sint hæ stirpes, aliis iudicandum relinquit. Certum tamen esse dicit Thymelææ congenere esse, & iisdem facultatibus pollere. Nos Sesamoides minus Dalecham. idem existimamus cū

Tom. I.

Sanamunda 3. Clus. de quo sic tradit Hist. Lugd.

Sesamoides minus quidam nominant, non ad Dioscor. quidem historiam referentes, sed ad Sesamoides maius multorum Dalecham. [sic Tarconraire & Sanamundam 1. Clus.] cum quo cognationem habet originis, saporis, facultatis cathartice. Quidem Phacoides volunt esse Oribasii, ob foliorum cum Lente similitudinem. In maritimis, vt & alterum provenit, sed Corsicæ magis quam Galliz, Liguriæ: caule pedali, in ramulos plurimos & graciles diviso, lanugine molli vestitis superioris modo: foliis numerosissimis, minimis, lætids virentibus, Lenticulæ similibus; circa ramos densissimè coaceruatis, vt ramorum conspectum adimant, Aizoæ acris specie: flore copioso, tenui, candido, per totos ramos foliis intersperso, suavissimi odoris, nec molesto dissimilis, & quasitæ acres plantas superantis. Purgat, & eisdem humores educit, quos Sesamoides maius: sed laboriosius, præsentiorque nimirum vacationis discrimine. Eius tussæ ac cribratæ drachmam potissimè immixtam sorbendam dedit Dalecham. cuidam neruorum distentionibus laboranti Lugduni in valetudinario, cui non insignis alius deturbata est, quàm si Colocinthidem sumpsisset, restitutaque sanitas. Suspicamur eandem Hist. Lugd. huius aliâ habere descriptionem & iconem nomine Cneori nigri Myconi, de qua scribit: Plantam, Cneorum Pala marina vulgò dictam à Barchinonensibus, ad nos misit pro Cneoro nigro depictum & descriptam, his ferè verbis: Frutex est duorum cubitorum altitudine cum multâ n adolevit, caule rotundo, flexili, aliquantulum âlpero, & ferè nodoso, qualis in Aizoæ foliis detrahit cernitur, ramulis multis similiter nodosis brachiato, in quibus folia minuta, perpetuè virentia, quæ quò fructus summitati propiora, eò minora cōspiciuntur, vt quæ in summitate sunt, Cupressi foliis similia sunt, paulò tamen latiora: omnia nonnihil crassa sunt, carnosa, incana, caulem complerentia. Flores in viridi lutei: radices crassæ, digitales, lignosæ, albo cortice vestitæ: satis in terram descendentes. Totus frutex, & maximè cortex manu tritus, grauis est odoris: sed vigente cunicula folia si

l'us. Purgat.

Doli.

Neruorum.

dissensio.

Cneorum

nigrum.

Pala mari.

na.

Radix.

Zibetis odor

Locus

Tempus

Super.

Sanamunda

da 2 Clus.

Sanamunda

da 3 Clus.

Cneorum

Casalpino

Miccia.

Funiculi

belluci seu

sceloparij.

Flores

Fructus.

Radix.

Ddd 3

varietas.  
Cneoron  
Theoph.

odorata & candidior. Theoph. Cneorum appellat: eius duo genera, candidum & nigrum &c. Plin. Casiam à Latinis appellari testatur. *Hec Casia.* Quamvis autem ex Clus. Myconio, Dalecham. & Casalp. descriptæ plantæ vnam eandemque stirpem denotare videantur, nondum tamen illud pro certo asserimus, cum hanc plantam integram & in suo natali non viderimus. Malumus igitur de non probè cognitis iudicium suspendere, quam temerè aliquid, quod quidam faciunt in suis Annaduerf. pronuntiare.

Autores de  
non satis  
aut non  
probe co-  
gnitis non  
temerè pro-  
nuntiant.

Sanè si diligenter consideremus descriptiones allatas, quædam dissimiles deprehendemus, & maxime in Myconii & Dalech. & potissimum quoad vites & icones. Multi & peritissimi Botanici circa similitudinem decepti sunt, præstat ergo occasionem præbere diligentius inquirendi, quam posteritatem decipere non sine graui periculo.

Eritia Alex-  
andria Lob.

Ericam Alexandrinam vocant Itali, teste Lob. nimirum, ut ille ait, hoc specioso nomine mittunt & obtrudunt Itali quidam peritiores peregrinitatis & nouitatis titulo, cum tamen in Gubernio & Hispania eius sit facilis promentus. At is inter varietates Vermiculati fruticis actus occurrunt in Obf. & Aduerf. ut ipsemet testatur. Verum non possumus nobis persequere Lobelio bene notam fuisse Sanamundam tertiam Clus. Si quis consideret eius icones, quanta diu sit:

Locus.

Vermicula-  
tus frutic.

Nos existimamus plantas depictas in Aduerf. pag. 153. & Obf. p. 207. diuersas à Sanamunda tertiam Clus. de qua hic agimus, quamvis pauca, quæ scubut in Obf. pag. 203. nomine Vermiculatæ videantur, post Sanamundam conuenire: scubut enim folia alba densissimè conferta denticulis Vermiculatis acris, maioribus. Quas autem plantas censuimus exhiberi per prædictas icones, dicemus sub huius operis finem, ubi trademus de Vermicularibus marinis.

Locus.

Sesamoides  
manus.

Cneorum  
album Guil-  
laud.

Aproxia  
Plin.  
Focaledi.

Ad pulu-  
re pyram.

Plin. illust.

Aproxia  
Nide.

Ceterum, inuenitur etiam hæc planta, inquit Clus. in toto illo tractu maritimo Meridiei obiecto, qui ab Herculeo fieto, ad Pyrenæos usque excurrit. Nos pulchrum ramum cubitalem habemus in Herbario nostro sicco, à Valerando Dourez, insigni Pharmacoopæo, adf. nostro, cuius manu adscriptum est: *Sesamoides forte minus ex Syria:* & ibidem manu Dalech. nobis hæc planta picta aduocata è Corsica D. Casp. Bapth. attulit ramulum nomine Cneori albi Guiland. collectum in horto S. Pontificis Romæ. Nos & in horto serenissimi Magni Ducis Hetruræ legimus Florentiæ, ex satis alto & eleganti frutice, cum hac annotatione à non indocto hortulano accepta: *Aproxia Plin. aut Focaledi.* Milcent cum puluerem bombaceum parant.

Scribit autem Plin. à Pythagora Aproxia appellari herbam, cuius radix è longinquo concipiat ignes, ut Naphtha. Idem tradit: si qui morbi humano corpori acciderint flore Aproxia [Brassica. ch.] quamvis sanatos, admonitionem eorum sentire, quoties flores eam contigerit [flore eum tetigerint. M.] Sed mittamus Pythagoricas has nugas, quarum Author, vel ipso Plinio teste, Magorum studiosissimus fuit. Sed quantum portentosiora tradit Plin. eo loco? nempe lib. 24. c. 17. Annotat Dalech. ad c. 17. dici, quod metu & pauore accedere propius non auderent: *proxia*, accedere est.

## CNEORVM.

## CAP. XLVIII.

Quum certum sit tam Chamelæam quam Thymelæam à Veteribus Cneorum fuisse appellatam, non insubidè hoc loco, opinamur, de eo trademus. Verum quum non solum de modò dictis plantis dicatur hoc nomen, sed & pluribus aliis plantis à Neotericis attribuat, [ut iam in præcedentibus ex parte dictum] statuimus hoc loco prætere quæcunque Veteres de eo prodiderant, subinde demonstrare quales plantæ eo nomine à diuersis donentur.

Theoph. inter ferculosa quæ carnosio folio constant refert Cneoron, & inter herbacea, Sedum, quod *delizum* nuncupat. Cneori verò duo genera statuit: album & nigrum. Albi, inquit, folium cutaceum est [squarrosius] oblongum, figura quodammodo Oleagineo simile. Nigri verò quale Tamarisci, carnosum. Album supra terram minus se attollit, [μαλλον ὑψηλὸν ἐστίν.] & exiguum quid olet: Nigrum autem valde odoratum est. [ἰσομεν] habent vulg. Cod. Gaza. Cornar. & Guil. legunt *αὐροῦ*. Rob. Const. *αὐροῦ*, omnes Plinium secuti. Vtrique radix alta, magna. Rami multi, crassi, lignosi, scæ statim è terra diuisi: [Græcum addit *ἐκ τῆς γῆς*, *ἡ δὲ γῆς*: melius tamen legisse videtur Gaza cum omisit hanc vocem, & *ἡ δὲ γῆς* tantum legis, lenti admodum. Quamobrem hisce vtuntur ad colligandum, & comprehendendum modo salicis & Vitilium. [ὡς ποτὶ τὸν ἰσχυρὸν ὁ δὲ ἰσχυρὸς ὁ δὲ ἰσχυρὸς ὁ δὲ ἰσχυρὸς] Gallia sua lingua adhuc vocant *Osser*. Gaza, Iunci modo vertit.] Germinant florēntque post æquinoctium Autumni, & diu florent. *Idem* quoque prius alibi Cneorum inter ea recenset, quæ aculeis carent. Gaza utrobique morte suo interpretis fidem excidens, *αὐροῦ* Casiam vertit, Plinium secutus quidem: sed eadem malâ fide. Nam & hic Cneoron dixit, quamvis addat Casiam Hygino vocari. Reliqua paucissimis expedit, his: Cneori duo genera, nigri atque candidi. Hoc & odoratum. Ramosa ambo. Florent post æquinoctium Autunnum. Dixerat autem prius: Fruticem Thymelæam, aliis Chamelæam, aliis Cneoron dici: similem esse Oleastro &c.

Et Galen. lib. 9. cap. 3. de Compon. Med. floc. Ex Archigene, *αὐροῦ* [inquit] *ἡ δὲ γῆς* *αὐροῦ* *αὐροῦ*. Et Hermod. Nostri (ait) Chamelæam & Thymelæam præcipuè Casiam videntur appellasse. Porro quod Cneoro Theoph. carnosum folium veluti Myricæ attribuit, hoc, inquit Cornar. ad Cneoron Diosc. quod nomine peculiari Thymelæa appellatur, non pertinet, sicut neque ea, quæ de duobus Cneori generibus scribit: sed referenda sunt ad aliud Cneorum, quod foliis in coronamenta venire & Casiam ad Hygino vocari Plin. ait.

Vidimus doctos viros hac parte rerum confusionem fecisse. Tagaultii in lib. de Purg. opinio est, folia Thymelææ usque ad Theophr. tempora Cneorum vocata fuisse: ipsum verò Theophrast. plantam Cneoron & Cnestron vocasse: ita à Cneoro putat derivatam vocem Mezerei, Hyginiq. Casiam à Latinis Oliuellam dici. Sed longè petita Mezerei derivatio, quam vix emundior Grammaticus admittat. Interim non docet, quam plantam intelligat, aut exhibeat.

Marantha in sua Meth. tradit Theophrast. per Cneo-



Cneoron, Thymelæam & Chamelæam intelligere, quæ nomina Dioscoridi vſitata dicit, vt prius illud Theophrastus.

Matthiol. in Dioscor. Casiam Virgili putat eandem cum Cneoro Plin. & Theophrast. Sed quænam plantæ oriatur in Italia vel aliunde eò afferatur; quæ Cneoron referant, quid referat, se non habere ait: Guiland. in Theone, Cneorum vtrumque Chamelæam & Thymelæam esse ex Aretæi, Dioscor. Plin. Gal. & Actii traditione ignorare demiratur. Matthiol. respondet in Epist. ad Cratonem: Cneorum, quoddam videat Guilandinus inter adulterinas Thymelææ nomenclaturas habere Dioscor. quodq; habeat Gal. & Plin. ad quod me adnotasse ignorabat, non sine ingenti latratu barbarus ille Canis me adortus. Verum Theophrasti Cneoron à Dioscor. & Gal. Cneoro pluribus differt notis: Thymelæa Chamelææ ambæ graucolentes sunt: grandis atque radice haudquaquam nituntur, nec florent, nisi Vere inchoante, nec humi procumbunt. Adde quoddam Cneoro nigro folia Tamaricis reddidit Theophrast. Sede eius nodi folia nec Chamelææ nec Thymelææ insunt. De albi Cneori genere meminit Plin. inter odoratas plantas: de altero vero Cneoro, de quo Dioscor. & Gal. meminit in loco superius citato. Scribit de Gnidio grano Theophrast. statim simul ac de Piperi egit non autem vbi tam diligenter Cneori historiam describit, vt pote, qui Gnidium granum non ignorabat Cneori non esse fructum. Idem in epist. ad Marantham similibus argumentis conatur refutare Maranthæ opinionem: addens, nullum esse inter Thymelæam & Chamelæam coloris discrimen, quo nigra altera appellari debeat, altera vero alba. Pro Guilandino rursus respondet Paul. Iellus aduers. Matth. Probl. 8. in hunc modum: Multa sunt quæ sententiam Matthiol. de Cneoro infringunt, quod nullius rationibus cuiusvis prob. posse puto, quàm ipsiusmet Dioscor. & Theophr. autoritate, cui ille inniti quàm maximè videtur. Neque enim Cneorum inter adulterinas solum apud Dioscor. nomenclaturas legitur, quemadmodum Matthiol. commentari fuit ausus, neque etiam verba Theophrast. de vtroque Cneoro & Dioscor. de Chamelæa & Thymelæa adeo longè inter se diffident, quin ambo de iisdem locis esse plantas docere queant. Pluribus rem prosequitur Hæssus, quem consulere poterit Lector, cum solum huius controuersie tractationem, ex illius scriptis integram huc transferre non permittat breuitatis studium. Nos (anè nequitiam legimus apud Veteres Thymelæam & Chamelæam grandis atque radice haudquaquam esse, & non florere nisi Vere inchoante, vt Matthiol. ait. Hoc quidem conuenit Laureolæ folio deciduo, quæ non floret nisi vere, quam Matth. videtur confundere cum aliis plantis, vt antehac demonstratum.

Mirum etiam Matth. ita inconstantem sui que immemorem, vt exhibeat pro Cneoris plantas cui folia nullo modo similia Tamarici, quale eius Cneoron frutex, de quo nos antè: & Cneorum herba, de qua etiam suo loco, titulo Ocymoides vel Saponaria minoris.

Doctissimorum quorumcumq; iudicio, inquit Clus. Cneorum Theophrast. à Thymelæa & Chamelæa Dioscor. non differt. Quin & Cæsalp. Plinius [inquit] Chamelæam petrosi nasci tradit, non vltra palmi altitudinem, foliis Oleæ amaris, odoratis: videtur autem intelligere Cneorum candidum Theophrast. quæ inter Coronarias Casia à Latinis vocatur. Idem Cæsalp. eo cap: quo hæc

tradit nempe 7. lib. 4. duas plantas describit, quas ambas descriptiones possumus cap. de Laureola decidua, vt qui dubi sumus, quas plantas intelligat: quartum vna fortè Chamelæa folio subtus incano, altera Laureola folio deciduo. Idem tamen cap. 9. tradit, Cneorum Hisp. Miccam vocatum: [de quo prius actum, cap. de Sefamoide minore Dalechamp. siue Sanamunda 3. Clus.] ibidem Theophrastum dicit Cneorum appellare.

Rob. Const. in Lex. *αρωματίζον* vel *αρωματίζουσα*, Casia herba, differens à Casia frutice aromato, de qua Virg. De hac intelligit Plin. lib. 2. cap. 12. & lib. 12. c. 19. Vbi Cneorum quod Casiam Hyginus vocat Cneorum Hipp. etiam *αρωματίζον* vocat, vt pluribus dictum in superioribus.


Ceterum Cneori nomine has inuenimus plantas exhiberi: *Chamelaam tricocon*: *Chamelaam folio subtus albo*: *Thymelaam Monspeliensem*: *Laurelam folio deciduo*, ac etiam *folio perpetuo*: *Cneorum Matthiol. frutex*: *Tartouaire siue Sanamunda 1. Clus.* *Sefamoides nigræ Dalechamp. siue Sanamunda 2. Clus.* *Casia Monspel.* de quibus omnibus abundè actum distinctis locis & capitulis.

Dalechamp. *Cneorum album* facit plantam dicta *Argentæam*, de qua mox. Item *Nerium alpinum* quorundam de quo 113. *Rosmarinus tor maris* lib. eodem. *Lanendia* siue *Pseudonardus* lib. 28. *Cimphorata Monspel.* lib. 29. Eodem etiam *Ocymoides minus* siue *Saponaria*. Dod. inter Synonyma *Dypfaci* ponit Cneorum.

Ita vides in quantam confusione n Cneori historia ab Herbariis fuerit coniecta, singulis serè nouam quandam, ne nihil dixisse viderentur, pro Cneoro obtrudentibus. Nos vt speramus, aditū patefecimus posteritati hæc omnia diligentius examinandi ac diiudicandi.

#### CNEORVM ALBUM DALECHAMP. aliis Dorycnium.

Cneori albi Dalechamp. plantam in hortis A- Descriptio  
Cdonidis aliquando aluimus, cuius rami tomentosi, albi: folia quàm vel Chamelææ vel Thymelææ maiora nonnihil, ad magnitudinem foliorum Mezerei Germanici siue Laureolæ folio deciduo propius accedentia, argentea lanugine



utrinque nitentia, mollitie holosericea, per extremum obtusa.

Dalechamp. autore, in summo ramorum vertice velut in Corymbos acervatus emicat: Semen nigrum, crassum, in folliculo tanquam glumà reconditum. Radix grandis, in profundum subiens.

Imperatus scribit, folio esse simili Oleæ, & flore integro.

Dorycnium Imperati.

Semper-  
rens.

Fructus.

Dorycnium  
A. gentium.  
Argemone  
flore par-  
pareo

Locus.

Ornati-  
vatis.

instar Campanu-  
lae, quem pul-  
chre depictum  
exhibet, sicut &  
Clusius in Ap-  
pendice Operis  
sui Botanici, qui  
plantam hanc d  
duorum aut  
trium pedum al-  
titudinem assur-  
gere, & multos  
ramos ligulos  
spargere tradit,  
non valde dissi-  
miles tenellis ra-  
mis Ziziphæ al-  
bae, & flores  
Convoluuli aut  
Stramoniae, sa-  
tis fugaces, quia  
vix marcescere  
alter sese expan-  
dere incipiat:

fontem esse sempervirentem, & hyeme folia  
non abscidunt.

Casalpino quoque herba fruticosa est, multis  
ab eadem radice cubitis simplicibus, altitudine  
dimidii cubiti, numerosis foliis circumdatis Oleæ  
figura, paulò angustioribus, molli lanugine, colo-  
re argenteo, in summis virgis coma prædens, in  
qua flores candidi Calathii effigie, & fructus  
Convolvuli miror.


Hist. Lugd. scribit esse Cereorum album Dale-  
champi, & eandem Herbariorum sententiã  
cum quodam de fructu Theophrasti.

Casalp. & Dorychnium vocat. & ex Sicilia habe-  
re scribit, vulgòque Argentinam vocari. Sed quæ  
sic altera eius Argentinæ præsumimus: quam tradit  
otum in asperis collibus & montibus, brevioribus  
ramulis humi sparsis, triquetris, foliis pinguioribus  
brevioribus, & liliis: sicibus purpurascens, his  
pluribus ramos distinctis. Doctor Dorycnium  
tradit Oleæ nuper nascenti similem &c. foliis O-  
leæ angustioribus, ubi solum legendum esse i-  
dem vult Casalpini. Imperatus quoque Dory-  
cnium Dioscori putat, & Iacobus Plateau, ut annotat  
Clus.

Nascitur in locis lapidosis & saxosis maritimis  
teste Hist. Lugd. Nos pulchrum ramum inter sic-  
cas nostras habemus. D. Casp. Bauhino quoque  
missi fuit titulo Dorycnii Dioscori. Sata nobis ex se-  
mine aliquando provenit in horto E. C. Montb.  
De vitibus eius nihil adhuc cognitum nobis: si sit  
Dorycnium quod non negaverimus, sed iudicio  
Lectorum relinquimus, eius vires reperient Le-  
ctores in nost. Hist. lib. II. cap. de Dorycnio Vete-  
ribus dicto, ubi etiam comperient æquiuocationes.

Ceterum de Cneoro non baccifero frutice vel  
suffrutice hoc loco egimus, propter historiam  
eius communem cum Chamelæa & Thymelæa,  
quæ & Cneorum plerisque Doctis putantur, &  
baccifera sunt. Non male quoque facturi vide-  
bimur, si sequentem fruticem, foliis non vsque  
adeò diuersum à prædictis, licet non bacci-  
ferum, sed facultate ad eisdem pluri-  
mum accedentem, ideòque terribi-  
lem herbam dictum, cum sit  
frutex, hoc quoque lo-  
co tradi-  
mus.

ALPYM MONSPELIANVM,  
SIVE FRUTEX TERRIBILIS.  
CAP. XLIX.



**A**lpyum De  
Monspe-  
liensisbus pa-  
tatum; frutex  
est cubitum  
aut sequicubi-  
tum altus, in  
multos diuisus  
ramos ligno-  
sos, satis ten-  
ues, ruben-  
tes, vel ex ful-  
co purpurascen-  
te cortice te-  
ctos; per quos  
folia concolo-  
ria ferè nascu-  
tur, Myrto vul-  
gari acceden-  
tia, magnitudi-  
ne sua non ite-  
penitus formã.

Ex angustissimo enim principio ad extremum us-  
que propemodum dilatantur, ubi interdum & vnã  
aut altera crenã incisã, obtusum mucronem effi-  
ciunt, crassa, folida, amara. Flosculi extremis ra-  
mularum plurimum, aliàs ad medios ramulos  
glomeratim congesti hærent, purpurei, ex tenui-  
bus staminulis contexti. Radix crassa, dura, nigra  
lignosa. Cuncta planta, inquit Lob. amara & ina-  
maria Thymelææ aut Chamelææ gustu, aut ve-  
hementiore etiamnum à sexto anno.

Quonia vero Clus. in Hispania natam descri-  
bit, & quædam habet in sua descriptione, à nobis  
non annotata, lubet & illam subiungere. Suffru-  
tex hic potius, quàm herba, cubitali aut ampliore  
altitudine allurgit, multis ramis lignosis, duris,  
fragilibus, ramis & nigricantibus præditus, circa  
quos ex tuberculis interdum multa confertim  
& simul iuncta folia nascuntur, in tenerioribus  
verò ramulis, qui plerumque rubescunt, rariora,  
Myrti ferè, longiuscula, ex cæruleo nigricantia,  
carnosa, nigricante pediculo, acuto mucrone, ex-  
tremè amaritudinis. Summis ramulis singulares  
inhærent calyces squammarum compacti interiori-  
bus orbis florum Scabiosæ aut Morfii Diaboli ma-  
gnitudine, qui florem continent villosum & la-  
nuginosum, ex cæruleo candicantem in meditul-  
lio, at in ambitu omnino cæruleum. Semen se  
ignorare ait, & florentem tantum conspexisse.

Alpyum Montis Ceti Narbonensium, Herba  
terribilis vulgò: si iniquum Aduers. vti nonnul-  
lis eruditius persuasum fuit, Arabes vocitant  
Turbiti quodlibet Phlegmagogum, paulò vehe-  
mentius pituitam educens, meritò & istum fru-  
ticem possit quis Turbiti vocare, nec enim mi-  
nus male ominato nomine, quàm Turbatorium  
Turbiti vocat istam herbam Terribilem vulgus  
Narbonensium, ubi Impositores valitudinis cau-  
pæ, & alijs atque tribades muliercula ter-  
ribiles, ut vocant, illic moluntur purgationes  
istius terribilis fruticuli folijs, floribus & se-  
mine.

Tant si Scabiosam prorsum stulisset, nec pingen-  
do deprauasset, melius suo honori Lectorique  
consultisset. Hanc enim cap. de Tripolio, sibi etiã  
ignoto, ubi multum ineptit, & Alpyum plantam  
tenui-



tenibus Ferulae folijs esse dicit, non istam: Dioscoridi imponit, Brassiculae & alijs doctissimis conuiciatur & obtestatur, argumentis ab illorum monumentis mutuo sumptis, etiamque vestigatore ingenio indigna prorsum & vecordia plena verba illa inseruit: Non refert, cuius sit plantae radix Turbith Alexandrinum, cum eius facultates à Medicis optime sint perspectae. Sic scamnidicum vel aratoreum, non commentatorem loqui decet. Nullam hodiè nostra aetas novit plantam, ut eadem Aduers. tradunt, cui Diosc. Alypum assimilari queat, neque ullam plantam habemus, quae aequè bene, imò vilo modo (præter Ferulas) Alypo congruat, siue lineamentis, siue efficaciam purgandiarque hic frutex Maritimus.

Sanè hanc quominus asseramus genuinum Alypum, vna notula non tam obstrepat, quam deest, foliorum nimium: quae non fuerunt expressa à Diosc. aut fortassis fuerunt labecula codicis peruersa: mutata nempe voce *υδαδεις* in *υπερβειδεις*, vel sic non sububer, sed fœniculaceus frutex. Hincque Mesue suum Turbith ferulaceum fecerit, vel Tapsiam cum nonnullis.

Eadem Aduers. tradunt non esse Ptarmicam. Lob. in Obs. dicit esse Ptarmicam, & Conyzam tertiam quorundam. Quærit etiam an sit Calcifraga Diosc. At si corrigeretur Diosc. lectio, & pro voce *υπερβειδεις* reponeretur, vel *υπερβειδεις*, vel *υδαδεις*, ita enim esset corrigendum, multò minus herbae terribili responderet Diosc. descriptio. Nam quæ obsecro similitudo eius cum Fœniculo? nulla omnino. Nec etiam potest dici *λεπτοφυλλος* radix Betæ: nec plena succo. Immo nec nobis propriè videtur dicenda *πικρα*, siue herba, cum reuera sit frutex lignosus, cuius & radix & virtulenta lignosa.

Vix putamus Matth. hanc plantam voluisse exprimeret, id tamen poterit suo loco diligentius considerari.

Batici, teste Clus. *Coronilla de fraytes*, hoc est, coronulam Fratrum siue Monachorum vocant, quasi eorum orbicularem tonsuram flore referentem, & *semper exorta*, quia semper arida & exsucca videtur. Murciani verò & Valentini vulgari voce *Segullada*. Nonnulli Valentini Academiae Professores *Hypoglossum* esse censebant: sed nihil cum Hypoglossa à Diosc. descripto commune habet, nisi quis fortè ob foliorum eius cù Rusci folijs affinitatem ei hoc nomen donandum putet, quæ tamen in hoc frutice circa pediculum oblongiora & angustiora, sunt: præterea dissimiles utriusque facultates.

Hist. Lugd. *Empetrum phacoides* dicitur, & *Herba terribilis* Narbonensium. Scribit tamen: Divinare potius quam certò statuere licet, quæ planta legitimum Veterum Empetrum asseri possit. Si tamen coniectura locus sit, Dalech. Empetrum esse opinatur plantam, quæ à vulgo Narbonensium Herba terribilis vocatur, cuius cap. de Alypo mentionem faciemus, ob violentiam in corpore purgando facultatem. Ea nunc in ipso maris litore provenit, salsum humorem bibentem eius radice ac tum salso gustu est, ut cætera plantæ, quarum radix marinam aquam fugit: nunc in montibus mari vicinis, ut in monte Cestio, vulgò *Cap de Ceste*, prope Athagham, nullo maris succo imbuta, sed tantum obiecta eius afflatui, ac tum saluginis expers, gustanti perquam amara sentitur.

Eadem Hist. Lugd. sic depingit: Cubiti esse magnitudine, & eo maiorem, cortice purpurascente ramosum, folio Lentis, sed Lentis modo

per æquales versus non disposito, per ramis & turculos nullo ordine procedente, superne viridi, inferne candicante, capitulis in ramorum vertice purpureis & rotundis, Aphyllanthi non dissimilibus. At nobis sanè valdequam affectatè, ne dicamus fictè Lentis folio dici videtur, propter vocem *phacoides*, attributam Empetro apud Diosc. cùm alij *acarioides* vocari tradant, ut postea ostendetur. Profectò parum nobis videtur in folijs Herbae terribilis esse similitudinis cum Lentis folijs. At non idèd prorsus rejicimus esse posse Empetrum Veterum. Considerentur quæ mox tradentur de Empetro.

Miramur quoque cùm Hist. Lugd. capiti de Empetro non subiunxerit caput de Alypo, sed inteposuerit utrique caput de Cucumere silu. & cap. de Colocynthide. His demum subdit iconè Alypi Matth. quam ex Penæ autoritate corruptit & deprauavit: nihilominus tamen denud proponit suam Empetri iconem titulo Alypi Penæ & Herbae terribilis Narbonensis. Præstitisset nostro iudicio, vno capite fuisse scripta & tradita, non quòd existimemus Alypum Matth. idem cū Herba terribili, licet hanc opinionem non reprobet C. Bauh. in sua Aninadu. in Hist. Lugd.

Tabern. quoque duas ponit figuras huius plantæ: pro diuersis, & sub diuersis titulis, Alypi, & Hypoglossi Valent. Clus. Camerarii: Alypum autem apud Matth. vix putamus idem cum Herba terribili seu Alypo Lob.

Cæterum Alypum potissimum in monte Cestio Frontignano oppido versus Austrum opposito, & in mare sito frequentem obseruauimus & legimus. Quamvis & in alijs Narbonæ & Galliprouinciæ locis ad mare & Austrum deucis, & præcipuis maxime, ut annotat Lob. natales suos delegerit. Flores in prædicto monte vidimus mense Aprilis. Febr. mense floribus onustum inuenit Clus. in Batice solitudinibus circa Antequeram. Martio autem inter Velez, & Rubio, & Lorca, quæ Eliocrota Veteribus dicitur, Murciani regni vrbes, totoque Valentino regno.

In Italia quibusdam instructioribus hortis cultam, & proceritate foliorumque amplitudine speciosiore paulò obseruauimus. D. Calzolari Verona nobis ostendit pro Ptarmica: quo nomine & doctiss. Medico Rantzio in horto Florentino lectam nobis attulit, & ex Prouincia misit Jac. Rainauderus industrius Pharmacopæus. Vim cætharticam violentam huius stirpis antè diximus. Circumforanei Batice Medici, norante Clus. eius decoctum propinare dicuntur iis qui Gallica scabie siue Venerea Lu laborant, non sine magno, ut aiunt, successu. Hist. Lugd. quoque purgandi vim Sefamoide utroque intelligimus Sanamundam 1. & 3. Clus. non imbecilliorè habere testatur. Purgare autem bilem, pituitam, & aquas, non aliter quam Tithymalus. Quapropter ea non temerè vtendum censemus.

## EMPETRVM PURGANS.

### CAP. I.

Paulò antè dictum, quibusdam videri Alypum esse Empetrum. Videamus ergo quid Veteres de eo tradiderint, potissimum de purgante, Empetron, inquit Diosc. aliqui Phacoides vocant. Nascitur in maritimis & montanis, salso gustu. Quod verò propius terræ fuerit, amarissimum sentitur. Trahit pituitam, bilem & aquam, da-

Hist. Lugd.  
jugilur.  
eius, si que  
multiplex  
error.

Tabern. nos

Locus.

Tempus.

Cultus.

Ptarmica.

Vires &  
vius.

Purgans.

Cultus.

Vius.

tum in iure aliquo, aut in hydromelite. Obiter verò notandum caput hoc empetri in quibusdam exemplaribus deesse. Empetron verò Gal. Paul. &

*Calcifraga.* Actius non *gaxosus* sed *gaxosus*, alio nomine vocari tradunt, ita ut non temerè quidam suspicentur ita apud Diosc. legendum esse. Porro ea verba quod *propius terat*, amari sentitur, aliter reddidit Plin. sic scribens: Empetrum (Empetros. CH.) quam nostri Calcifragam vocant, nascitur in montibus maritimis, fere in saxo. Quod propius mari fuerit minus falsa est potaque bilem trahit ac pituitas: quod longius magisque terrenam amari sentitur. [Sed quidam, ut Plinium cum Diosc. concordent, sic legendum censent: quod propius mari fuerit, magis falsa est &c. Verultate vires perdit. In iis verò quæ proximè sequuntur] Recens vinas ciet decoctum in aqua vel tritum, calculosque frangit. Qui fidem huic promisso quærent affirmant lapillos qui subfuerant, vna rumpi. In his, inquam, videtur Plin. Empetrum marinum cum Saxifraga confudisse deque hac illa inaudienda accipiendaque esse, ut ante nos & Marth. & Dal. obseruauerunt.

*Empetra duo Herm. Epipetron.* Empetron ad solas purgationes commodum iudicat Gal. bilemque ac pituitam educere. Gustu salum esse: proinde ad alia quoque vtatis licet, ad quæ pollere docuit substantiam salam.

*Eryma.* Paulus quoque Diosc. securus, mentiones duas Empetri habet, quasi duorum generi. Gal. vnicū. Actius etiam Empetron vocari solitum affirmat.

*Saxifragia Mar.* Porro Empetron dictum videtur quod nascatur in petris, eademque origine *Epipetron* ab Antiquioribus. Nec solum quia lentis figuram & speciem refert, Phacoides, sed quia Marrubio si mile Praefoides est, inquit Marcell. Plinius Saxifragam à Latinis vocari ait, miscetque eodem notante cum ea quæ priuatim & seorsum à Diosc. Saxifraga descripta est. Ex quo suspicatur, quod in Saxifragia dictum, non esse illud in Diosc. eo nomine recipiendum; aut si sit, quod tamen verisimile non sit, variantibus historia & medicina: bis de eadem actum fuisse, antè sub titulo Saxifragiæ, & iterum sub Empetri. Paulum quidem Empetri manifestè, Saxifragiæ autem nusquam meminisse. An verò Empetron idem sit cum Saxiphago, vel diuersum, non faciliè quis indicabit, inquit Cordus. Vt cumque fuerit, nulla iam hoc nomine extat herba.

*Phacoides Corn.* Cornario Phacoides in Diosc. suspecta est: & caput quod de Altero Empetro Diosc. habebat, de Saxifrago inscriptum, à se inter suppositicia relatu testatur, ac quod Græcam inscriptionem non præferret, illegitimū iudicatum. Habere tamen & *Saxiphages* Paulum Saxiphages, idque vrinam ciete & calculos atterere. Quare à Plinio confusa duo Empetra diligenter esse distinguenda. Quin & Herbarii nostri multas saxifragæ species ostendunt, quas omnes Steinhof appellat, ut in ipsis diligenti distinctione sit opus.

*Epipetron. Arist.* Arist. l. 4. de part. anim. Epipetri ab aliquibus vocati meminit, quod ad præsens Empetron pertinere autumat Cornar. & nos Cuscutam censemus, de qua suo loco.

Non desunt, inquit Marth. qui Oedipum se faciant, & Diosc. obscura quasi ænigmata de Empetro audeant soluere. Plinius fortasse similitudine deceptus, quod Empetrum Saxifragiam existimauerit. Vires quas vtrique tribuit Diosc. pui vni impetro attribuit. Hac ille. Sed si Marth. suæ opinionis auctores citasset, non in eum hæc scripserit Rob. Const. in suo Lex. Plinius Empetron non confundit cum Saxifrago, ut criminatur

Marth. sed disertis verbis distinxit lib. 22. c. 21. iniquiens Saxifragum Adianthi genus esse.

## EMPETRYM SARXIPHAGVM.

**M**eminit & alterius Empetri Diosc. his verbis: *Σαρξίφαγον* alius *Σαρξίφαγον*, aliis *Λυμ-Λον*, Romanis *Σαρξίφαγον*: Frutex est furculosus, (*βόλινος σαρξίφαγος*) in petrosis & asperis locis nascens, similis *εμψύκω*. Marcell.

Vim habet in vino coctus & potus, ut febricitantibus [ut febricitantibus omittitur in vetustiss. cod. Marcell.] opuletur: vrinæ item stillicidi & singultui, & ut in vesica calculos atterat, & vrinam ducat. Hermol. hoc caput retinet, sed vocem Epithymi non habet, nec etiam cod. Basil. nec Paris. Ruellius & Cornar. addunt quidem, Epithymo, sed ipsum caput, ut subreptitium & adulterinum rejiciant.

Saxifragum, inquit Hermol. & Saxifraga Lar. dicitur. Item Calcifraga; si modò hæc est, quam & Plin. & Diosc. alio loco Empetron appellant. Corrosi & ambusti sunt hac parte Græci Diosc. codices, nec quale sit huius herbe folium, animaduerti vilo modo potest, & in ipso verborum textu spatium inane vacat. Porro veterem in Diosc. picturam huius herbe vidisse se testatur Herm. non plus folijs, quam cirris minutis & c: Recentioribus de hac herba parum conuenire, alios Tritici foliorum figuram, alios marinæ Bati similem dixisse, alios Tormentillæ vulgò dictæ

Marcellus peregrinam Græcis & alienam vocē esse rectè annotauit. Idem ait: si negaremus Diosc. esse hoc caput, contra Græcos Latinosque codices omnes & Posteriorum decreta id erit: inclinatur tamen animus non esse Diosc. legitimum illud caput, aut non Saxifragam Latinam appellatione à Græco homine dicendam fuisse: sed quo in plerisque adhuc indicatur, Saxiphagon, à minuendis & erodendis carnibus, et si appellationis huius nulla sit nobis causa aut ratio. Paulus, ut idem notat, qui totum in sextum suæ Medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse videtur, Empetri manifestè meminit: Saxifragiæ autem nusquam: quod non relinquendum ab eo fuerat, si tunc in Diosc. Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam recepisset. Crederemus nos etiam eandem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus vtriusque historia & medicina esset. Ruellius dicit Saxifragon à Paulo Saxiphages nominari, sed id caput non esse legitimum Diosc. facile eo persuaderi posse, quod Latina appellatio contra Scriptoris morem Græcæ præferatur. Verùm nullius id argumentum valoris esse, inquit Cordus: & addit, hoc Saxiphagon esse, quod Gal. Cestron etiam dici testatur, quodque Paulus Pulegio simile esse dicit, sed minus. In Cestri, id est, Beronicæ capite cum Epithymo comparare: [non inuenimus in Diosc. capite de Beronica, sed in hoc cap. de Saxiphago.] Ille verò suspicatur non legendum esse Epithymum, quoniam nulla sit inter Pulegium & Epithymum similitudo. Quare Thymum pro Epithymo legendum esse, non sine ratione coniecit.

Lonicæ coniectura est nominum ratione eundem esse fruticem & hunc, & qui deinceps alio loco à Diosc. describitur, nisi diuersæ vtriusque essent medicinæ. Rectè tamen esse diuersas.

Marth. in Diosc. retinet caput Saxiphagiæ, lijs Empetri, dicti, At Const. apud Amat. aperte scri-



bit, supposititium & spurium esse illud caput de Saxifraga, non enim in antiquis Diofco. exemplaribus legi. Quin hæc, quæ à Falsario quodam interposita sunt de saxiphragia, ita deprauatæ & corruptæ Græcè tradi, vt qui hæc interiecta & non legitima non possit agnoscere, nesciat planè quid dulent æra Lupinis. Plinium vocare Adiantum Saxifragum, quod calculos comminuit.

Cæterum plurimæ plantæ pro Veterum Empetro habitæ sunt, vt frutex ille, quem supra Alypi Monspel. nomine descripsimus. Anguil. epil. 14. meminit Empetri in Grecia, dicitur *Prosatis*, voce corruptâ à Præloide folijs Alchali purgantibus, alibi post Cali. Antea considerandum proposuimus an Sesamoides minus Dalech. siue Sanamunda 3. Clus. possit conuenire cum Empetro Diofco. Amatus ignauiam suam satis prodit, quando non ausus sit describere suum Empetrum, de quo in suo in Diofco. com. scribit, confundens diuersarum plantarum nomina, quando sic tradit: Empetron, Calcifraga, Gal. *Percipierre*: Germ. *Steinfrant*: mox addens: Empetri historiam tam succinctè narrasse Diofco. vt quæ illa sit herba, difficile sit addiuinare. Olim verò apud Antuerpienses agebat, apud quos magnâ diligentia simplicitia medicamenta inuestigasse ait, Cornelium Medicum Antuerpiensem sibi herbam cæspitosam, sapore salisam, prope mare nascentem, obtulisse, quam Empetrum esse contendit: Nam & pastorem, qui illam ad eum attulerat, iureiurando affirmasse, Oves quum malè haberent, ad illam tanquam ad certum salutis asyllum confugere: eiusque esu munitas, morbum propulsasse & immunes mansisse.

Considerent periti, an Crithmum 3. Matth. in com. cum magnis fig. siue Chrysanthemon marinum esse possit, de quo agemus suo loco. De ea autem scribit Marth. Non deesse qui Empetron faciant, sed se ipsi haud subscribere autem. Sylu. in Mes. annotat Sennam quosdam Empetron Diofco. putare. Crithmum siue Fœniculum marinum aliqui esse Empetrum: Verum esse nequit, cum non purget: de eo agemus in libro umbelliferarum. Ruell. Empetrum seu Calcifragam Lat. multis esse Cristam marinam: & retinet vitiosam Plin. lectionem de Empetro.

Matth. pro Saxiphago, alijs Empetro, exhibet herbam Fœniculi vel Anethi folio, de qua lib.

Vmbelliferarum saxifragæ nomine, quæ non frutex est, sed herba. Is etiam in post. suis com. alias etiam nobis obrudit plantas pro Empetro, & potissimè de saxifragijs.

Hallucinantur, inquit Ryff. apud Diofco. qui eam herbam, quam Olfic. Saxitragam albam *Weyß & Bohensienbrech* appellant, Empetrum esse contendunt. Sed Ryffius, vt suo loco copiosius dicetur, dum alios reprehendit, nec malè ipse tamen quoque hallucinatur, pro saxifraga alba, Icone exhibens Polemonium petraeum, a quo non distinguit.

Inceptè quoque Thurnisius in suo Pisone Saxitragam albam vocat Empetrum Diofco. & Lonic. Empetrum Galenicum nihilo aptius Saxitragam & *weisse Steinbrech* Tragi dicit. At ipsemet lapsus est Empetrum esse fruticem: non igitur saxifraga alba fuerit, quæ herba est. Cur Galenicum dicat nescimus. Præterea non purgat: quod tamen in Empetro requiritur. Muldò ineptius idem alibi ad Empetrum refert Germ. *Sarnkraut / widentod, & Jungfrauhar* / addens ex Gal. ad solas purgationes commodare. Quanta quæso confusio diuersarum? Aut quid purgantis facultis vel is vel alius in his plantis oblerauit. Quis item minutissimas herbulas frutices dicet?

Tragus Polytrichum suum alterum ac etiam tertium ad Empetrum refert, Item Polytrichum suum primum, siue Rosellam Cordi. Ruell. Parisiensibus saluam Vitæ dictam, nobis Rutam murariam Empetron suspicatur. Euchar. Rosellin Herniariam. Et Gesl. ait, Herniaria Empetron, Trago, nescio quàm rectè. Nos planè reijcimus ob antè dictas causas. Casp. Bauh. in Phytop. Polygonum 6. minus seu Millegranam maiorè Tragi Empetrum dicit. Empetrum album Paracelsi, cuius Thurnisius meminit l. 6. c. 14. in Pisone, titulo de Saxifraga alba, fortè Milium Solis.

Multi hallucinari mihi videntur, insit Ruell. quoddam huius herbe [videl. Calcifragæ siue Empetri] fidant picturæ, notis omnibus reclamantibus nempe cirris minutis &c. de quo suo loco, sub saxifraga. Hæc autem sunt contra Hermol.

Cornarius Empetrum idem putat cum Epipetro Arist. quod nos, vt dicebamus, Cuscutam ceteris scimus.

Matth. re-  
preh.  
Saxifraga  
tennisi.

Ryffius not.

Polemonium  
Petraeum.

Ros Solis.

Ruta muraria  
Herniaria.

Milium  
Cuscuta.

FINIS LIBRI QVINTI









# HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER SEXTVS.


CCXX

BACCIFERAS SPINOSAS EXHIBENS, TAM  
ARBORES, QUAM FRUTICIS.

**B**ACCIFERARVM nondum est finis. Nam & talium haud parua restat classis, sed quas natura spinis armavit, siue ut occursum impartiri ardeant, siue ut in eas abeat alimentum terrestrium purius siue alii d quippiam in sam rem humana temeritas, vel potius fragilis comminisci audeat, non contenta suuiss, quod sit: sed cur ita fecerit Deus parvisque verum in natura, sciscitari ausa, et tandem intelligat se nihil scire. Dignitatis ordinis, quae prerogatiua tribi: atur omni eo, in quibus arboribus decantatissima Olea: quae, ut serua & culta, et si spinosa non sit, natura tamen talis esse videtur, cum sterilem in Oleastrum abeat, qui spinosa est arbor.

DE OLEA. CAP. I.

## OLEA SATIVA.



humani plus minus crasso, magis ex parte nodoso, materiae aequaliter spissa satis solida, alicui & crispa & contorta, gustu amaricante, colore in-

Tom. I.

ter flavum & spadiceum ferè medio, nonnunquam etiam maculis utriusque coloris in vicem convolutis conspersa, praeter etiam cum ad iustam aetatis consistentiam pervenerit, teste Cordo: Cortex tam truncum quam ramis obducitur coloris cinerei, laevis glaber. (Cordo in his flavus.) Folia oblonga & arguta, salignis foliis similia, acuminata, inaequaliter manifestis venis (excepto unico nervo insigni à pediculo ad acumen oppositum excurrente) crassa, rigida superne ut nobis quidem videbatur, coloris atrovirentis, aut certe saturatius virentis, (a tamen Cordo, [Vig. f. red imitatus, fronde quae flava dicitur, in viriditate flavescentia, superne quàm inferne pallidiora cortex aliarum arborum naturam] inferius capessunt: nullis tamen pilis obsita, tam brevibus pediculis haerentia, ut surculis quasi inserta videantur: ex quorum alis proferuntur pediculi, quibus Flores. rursus racemati cohaerentes sustententur, albicantes, Sambucinis similes, & quatuor foliolis fustis rudimentum complectentibus contexti: Cordis aspectu mucosos dicit, & propemodum racemosos: qui non omnes ad usum perveniunt in Europa. In iis vero locis quibus propria est hae arbor, proveniunt, deoque congestius haec confertas uvas amulantur. Flosculis succedunt Fructus, figurae ovalis aut glandiformes, magnitudinis variatae: nam in Hispania nascuntur, quosque Olivae Hispanicae vocant, mediocriter praequant. Italicae pleraque & Narbonenses vix mediocrem glandem superant, quoniam vis ea sunt habet olescentiorem, & quae, primum viridis, postea flavior, & ruginosa, quaedam enim ex purpureo puricantes, sed rarius sunt & quae in Hispania nascuntur.

Correa.  
Folia.

Flores.

Fructus.

Fructuum  
varietas.

A

# HISTORIAE PLANTARVM.

2

ut annotat Clus.) sapore valde acri & amaro & ne-  
scio quid acerbioris ac nauseo si mixtum habente,  
etiā in maturis & iam mollioribus, carne primū  
dura, maturitate molli ac pingui, ossiculum ligno-  
sum, oblongum utrinque acuminatum, & in hoc  
proportionatum nucleum unicum habere. Qui v.  
in iis continetur succus pinguis, Oleum fit dulce,  
aqueosus qui amarus, Amurca. Foliorum quoque  
sapor amarus est, non sine acrimonia tamen. Ra-  
dicibus nititur, inquit Cordus, partim rectis, partim  
obliquis in summo caespite obhaerentibus, materia  
trunci modo solidā.

*Throph. de Oleo.* Theoph. variis in locis de Olea hæc habet: Virer  
ex urbanis perpetuū radicem habet: quæ ex mō-  
dio tendit parvam, cæteras grandiores & cancro-  
rum modo velut flexuosas, inæquales, nodosas ac  
fimbriatas, obliquis, quod, non tantum loci ratio-  
ne evenit, sed naturæ quoque ipsius proprium est:  
parvam incertamque habet medullam: quamobrem  
quidam Oleā, ut Buxum, medulla omnino carere  
existimant: materies spissa, sed obliquitate atque da-  
ritia fragilis: folia angusta, pediculus habet bre-  
uem: verruntur æstivis solstitiis: nam peculiare  
illud sanè quod Oleæ Tiliæ, Ylmo, Populo, eveni-  
re videtur: Verrunt enim partes supinas mox post  
solstitium æstivum: eoque argumento rustici sol-  
stitium transactum ut intelligunt.

*Olea folia ram pecu- liaris natura.* Omnia folia parte prona, supinæque inter se di-  
stant, ac cæterorum pars supina pinguior. Gaze  
viridior emittit, atque levior est. Prona  
enim parte, seu ima, qua terram versus spectant,  
habent nervos, ac venas sicut manus. Oleæ ginorū  
verò pars caipia cædidior minusque, levis: Eius fructū  
natura ligno operuit, seu lignoso putamine,  
& hoc rursus mole quadā carnosa obduxit: Et tu-  
nica prætenui inuestiuit: Florē verò circa fructum  
ipsum producit integro principio, & in ambitu di-  
visio, ita ut prostrati flosculi perforati spectentur,  
quo argumento intelligitur arborem propē de-  
floruisse: nam si exaruerint, aut madefacti fuerint,  
unā cum fructibus defluent, atque ita nullatenus  
perforabuntur. Maior enim ferè pars fructum in  
medio floris continet.

Oleam Diosc. non describit, sed vires tantum  
eius recitat. Ait Plin. si quisquam alius, amplius &  
copiosius in eius historia est: quippe, qui ex variis  
prætorum monumentis & observationibus sua  
concinnavit, quæ suis quibuscumque locis referemus.  
Speciatim Oliuæ [ait] constant nucleo, oleo, carne,  
amurca. Sanies hæc est earum amara: fit ex aquis,  
ideo scitatis minima, riguis copiosa. Suus qui-  
dem Oliuæ succus Oleum est, idque præcipuè ex  
immaturis intelligimus, sicut de Omphacio do-  
cuimus. Augetur Oleum ab Arcturi exortu  
xvi. Calendas Octobris: postea nuclei incre-  
scent, & caro. Huic arbori folia non decidunt, quæ  
superne candidiora, & minus lævia, angusta, pedi-  
culo brevi. Cariem vetustatemque non sentit eius  
materies: æstimam fissuramque non capit spontē.  
Nec alia maior in Bætica arbor. Cæterum in sum-  
mo honore habita olim Olea, ita ut eam in sacris  
accendi fas non fuerit: Vnde Plinius. In profanis  
usibus pollui Laurum & Oleam fas non est, ut ne  
propitiandis quidem numinibus accendi ex his  
altaria arve debeant. Olea Minervæ sacra dicata-  
que cuius rei multæ rationes aut coniecturæ ab  
autoribus asseruntur: Quod Olea venia pacif-  
que index sit, & quod illius inventrix fuerit Mi-  
nerva: Vnde Virgil.

— Oleaque Minerva.  
Invenit.

Volunt enim Oliuam nann nigrae satam & ex-

cultam, uberioribus fructibus præbere. Habebatur au-  
tem Minerva pacis amatoris, labisque au-  
scia, proinde Oleam ei dedicatam volvere. Credi-  
ditque antiquitas non nisi à castis recte & felice-  
ter feri. Ferunt etiam in Anazarbo Ciliciæ pueros  
castos Oleam colere, & propterea Oleam apud  
ipsos fertilissimam & fructuosissimam esse. Cicero  
verò de natura Deorum, Aristæum Apollinis si-  
lium Olea inventorem scribit. At Dioscorus Mar-  
curium eius autorem facit, non Minervam, ut  
Græci: quamquam alibi huic & Oleæ & Olei edu-  
cendi exprimendique in ventionem attribuat. At-  
que ante Minervam, cum cæteris sylvestribus  
spiciat ignotam, vilēque habitam fuisse, scribat.  
Martianus quoque Capella, Minervæ sacra dicit,  
quod artes & disciplinæ, quæ illa Dea est, O-  
leo, ac lucernarum lubricationibus perficiantur.  
Sic enim ait:

Hic nam vernicoma frondent tibi munera Olive  
Arcturi vigili per te quod discat:

Phurnatus præterea scribit Oleum Minervæ mu-  
nus esse, idque ab ea mortalibus largitum. Cate-  
rium Olea venia & pacis supplicium ac con-  
tristantium index fuit olim atque symbolum: ut  
qui veniam poscerent, Oleam manibus gestarent:  
Athenienses enim contra Timocratem sordidatis  
& Olivam gestantes, supplicare soliti fuerant, au-  
tore Demosthene. Artaxerxes Ochus, ut in vita Phi-  
lippi autor Siculus, Sidonem obsidente, quingenti  
ciuitatis primores, Oleæ ramos ferentes. Artaxe-  
xi obuiarunt, pacem postulantes. Xerxes in Athe-  
nienses expeditionem ducente, Timon & An-  
drobelus, cum primū oraculum consulissent,  
& infatum responsum ab eo accepissent, ra-  
mos Oleagineos ferentes, pacem & salutem pe-  
tunt. Deuictis item Carthaginensibus, consulente  
Annibale, ad Scipionem ad deprecandam pacem  
& misericordiam, decem ei ciuitatis principibus il-  
li seligunt, quos navis Oleæ ramis velata, defere-  
bat. Sic & Romanis cum Perla Macedonia Rege  
bellum gerentibus, Alexandrini Legati sordidatis  
barba & capillis promissis, & Oleæ ramos ferentes,  
in Curiam Romanam progressi ad miseratio-  
nem procubuerunt, ut scribit Livius: quo item at-  
tores, eodem etiam rege detestato, Rhodiortum Ora-  
tores, habita prius oratione, veniam deprecantes  
& ramos Oleæ gestantes, universi prociderunt.  
Apud Apuleium mulieres propter homicidium  
viduæ, sui à iudicibus comisereri, cupientes, ramos  
Oleagineos ferunt.

Quare autem pacis & misericordiæ signum  
sit Olea, apud neminem hæcenus legimus. Cur-  
tius lepide satis & ingeniosè hanc excogitavit  
causam, nempe quod hæc arbor Minervæ Deæ,  
mulieri & virgini dicata sit, à quibus facilius ve-  
nia impetratur. Sed iam ad Poetas diuertamus, ut  
ipsis fides (quam frequenter alioquin detrahunt)  
hæctones) propter ea quæ modò, ex historicarum  
schola, retulimus, maior habeatur. Vt autem à  
principe Latinorū, videlicet ipso Virgilio in Æpia-  
mus, utpote qui longioribus hæc rem patefecerit:  
Sic ille de Æneæ tempestatibus oblectante, eiusque  
leniendæ sagiente.

— Ut tempestatis agnam

Cedere deinde iubet: solvoque ex ordine funes,

Ipsæ caput tonsa filius evinctus Oliva,

stans procul in prora pateram tenet: extraque  
salsis.

Proicit in fluctus, ac vicina liquentia fundis.

Prosequitur surgens à puppi ventus euntes,

Certatim socii feriunt mare, & aquora vertunt.

Et idem Æneas apud eundem.

Centum:



*Centum Oratores angusta ad mania regis*

*Ire iubet ramis velatus Palladis munes :*

*Donaque ferre viro, pacemque exposcere Tenebris :*

*Et ridem Pallanti occurrenti Aeneas :*

*Paciferaque manu ramum praeendit Oliva.*

*Rursus alibi: Iamque Oratores aderant ex urbe Latina*

*Velati ramis Olea, veniamque rogantes.*

Vbi Servius, non coronatos incesisse ait, quod lugentes non decebat, sed in manibus tantum ramos detulisse, quod miserantium erat. Statius in 12. Thebaidos.

*Mite nemus circa, cultisque insigne verendo.*

*Vittae Laurus, & supplicis arbor Oliva.*

Reliquum, ut hanc rem insigni Davidis Regis testimonio finiamus. Ait enim Plates ille regius. Ego autem sum sicut Oliva fructifera in domo Dei. Speravi in misericordia Dei, in aeternum, & in seculum seculi. Aliud nobis elogium superest, ad modum dicta apprimè faciens. Columba enim, post commune omnium animalium naufragium, à Noë ex arce ergastulo tertio emissà, rostro Olivæ ramum retulit: Geneti videlicet humano à Deo Opt. Max. pacem redditam significare volens. Est & græcum adagium Aristoph.

*Ἰδὲν ἔστιν ὁ θεὸς ὡς ὁλὴν ἔχει ἐν τῇ πόλει.* Non est Oleum in lecytho: id est, in domo, & in civitate. ubi precibus iam non est locus. Hæc & sequentia à nobis relata, à Curtio magna ex parte collecta sunt. Sed & victoriæ signum Oleam esse scribit Dionys. Halicarn.

in præceptis orationis panegyricæ. Epimenides sanè Phœsius, ab Atheniensibus acceptus, Solonis ad legem condendarum rationē adiutor fuit, in quibus nonnulli, propter illi tanquā summo & sapientissimo viro minimè visā idonea, commutavit, multaque ad Deorum cultum, & religionem, statimque Reipub. instituit. Discedens verò ab Atheniensibus honores & opes largientibus, nihil aliud, quàm ex sacra Olea ramum poposcit. M. Antonius, accepto, de Ventidij in Parthos victoria nuntio, & Labieni ab eo interfecti, Athenis, Græcis epulum dedit, & ludos in urbe fecit quibus & ipse [depositis in signibus] cum iuvenibus præsuit, atque saltavit. Ab his verò contra Anthiochum Comagenem proficiscens, sertum ex Olea sacra excepit. Tanti omnis Græcia hanc arborem fecit, idque propter primariæ urbis, Athenarum inquam, nominis impositionem, cuius historia vel potius fabula, referente Cæs. Constantino, ita habet. Oleam fabulantur, Athenis, terra a

quis adhuc obruta, primùm emeruisse. Cùmque de loci principatu, deque civitatis dicendo nomine certarent Neptunus atque Minerva, loci illius amantitate ille citi: Iupiter controversiam dirimens, pronuntiavit cum potiturum dominio, qui de civitate melius mereretur, eamque pluribus ditaret opibus. Mox singuli certatim sua dona conferentes, Neptunus hanc portum & navalibus ornat. Minerva autem in Acropoli, cùm latam vi-

rentem, tum fructiferam Olivam edit, qua se coronans, omnium calculo victrix salutata est. ideoque civitatem suo nomine nuncupavit. Quippe, Minerva abhinc dicitur. Hinc spectatores Oleastro, eos qui certaminibus visissent, coronabant. Multi Areopagorum iudicio id sanctum arbitrantur.

Oleæ honorem [ut scribit Plin.] Romana maiestas magnum præbuit, tūmas equitum Idibus Iulij ex ea coronando. Item minoribus triumphis ovantes. Athenæ quoque victores Olea Coronant. Græci verò Oleastro Olympe. Hec Plin. Theocritus interpretæ & Aristophanis Aristoteles in Pantheo Callistephani, O ex rapis, & Oleastri, coronatos fuisse tradunt. Atheniensium daces ad bellum profectu-

ros, sponde ex Olea sacra sumpta coronari solitos, scribit Alex. ab Alex. & Fab. Rutilianus, Equites Romanos equis insidentes & Olea coronatos, Idib. Quintilib. ab ade honoris in Capitolium transire, & transvehi statuit, ordinis eius recognoscendi & probandi gratia. Porro, quod de Minervæ & Neptuni certamine supra diximus, aliter ab Hygino refertur, aliter autem à Servio. Scribit enim ille, decertatum inter eosdem Deos fuisse, qui primus eorum in terra Attica oppidum conderet, secundumque Minervam à Iove, quid in ea terra Oleam sevisset, indicatum. Ille autem, hoc modo: Post illorum longam contentionem Ivis placuit, ut eius nomine civitas appellaretur, qui munus mor'alibus melius protulisset. Tunc Ictus percussit Neptunus, & tellus equum animal bellis aptum produxit: Minerva autem iacta hasta, Olivam procreavit, quæ res melior comprobata, quod pacis insigne foret. At nonnulli Neptunum tridente arcem percussisse, & inde salsi haustus aquarum scatebunt: unde possessiones qui in arce fuit, fons Neptuni dictus] protulisse: Minervam verò in eadem cuspide, hactenus istu, Oleam evocasse, quæ, quia utilior omnibus visa est, ut ei Athenæ cederent, arbitratum.

Alij aliter, nempe post longam altercationem, in id, à Iovem dicuntur bus convenit fuisse, ut ambo simul Athenis præsiderent. M. autem Varro, hanc fabellam ad rem veram, hoc modo, traducit. Edificatis Athenis, & ibi imperante indigena Cecrope, in arce sponte enata Olea, & ibidem alio loco, aquarum scaturigo. His verò prodigijs per-

territus Rex, atque timens, ne hæc portenta futurarum calamitatum forent præsentia, certos Apollinem Delphicum sciscitatum misit. Quibus tandem respondit, uti bono essent animo, neque ostentum illud mortalium malo aliquo evenisse, verum binorum Deorum de nominis super urbe impositione decertantium contentione. Per Oleam enim Minervam, per undam verò Neptunum significari: liberumque nunc esse Atheniensibus, ex alterutris Dei appellatione civitatem suam denominare. His autem à Legatis Cecropis renuntiatis, mares & feminas, ad conferenda suffragia convocat. Per id enim tempus, mulieres ad publicas consultationes advocabantur. Mares autem pro Neptuno, mulieres pro Minerva sententiam tul-

lère: & quia numero plures, ut ferè ubique est in sexu femineo, pro Minerva vicerunt. Quare Neptunus indignatus, marinis fluctibus Atheniensium omnem terram inundavit, ut, visa sit mari per similes quædam facies. Quem, ut triplici mulierum supplicio placarent, censerunt Athenienses. Primum, ne quis mulieres ἀνδρας vocaret:

2. Ne nascentium ullus materno conferret nomine. 3. Ne post hæc mulieres suffragia ferrent.

Horum verò nonnulla, D. August. dum Dei magnam pluribus doctrinarum variarum cæcantis fuit civitatem.

Fabulæ autem locum, ex re ipsa Themistoclem Theophrastum dedisse, Plutarchus est autor in vita eius. Etenim summo labore effecit is, ut ciues omnia navigatione, ac maris studio, arbores conferrent, & regionem illis adimplerent, fertilioremque redderent, maxime verò Oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, & ex illarum fructu non minimum quantum facerent. Unde lex postea apud eos lata, cuius Demosthenes contra Macartatum meminit. Ne quis Athenis Oleam effoderet, nisi ad templorum Atheniensium structuram, vel ad municipalia munera, aut cùm ad funus eundem eff-

feret. Ad suos verò usus, quotannis binis Oleas tollerent.

Fabulæ autem locum, ex re ipsa Themistoclem Theophrastum dedisse, Plutarchus est autor in vita eius. Etenim summo labore effecit is, ut ciues omnia navigatione, ac maris studio, arbores conferrent, & regionem illis adimplerent, fertilioremque redderent, maxime verò Oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, & ex illarum fructu non minimum quantum facerent. Unde lex postea apud eos lata, cuius Demosthenes contra Macartatum meminit. Ne quis Athenis Oleam effoderet, nisi ad templorum Atheniensium structuram, vel ad municipalia munera, aut cùm ad funus eundem eff-

feret. Ad suos verò usus, quotannis binis Oleas tollerent.

Fabulæ autem locum, ex re ipsa Themistoclem Theophrastum dedisse, Plutarchus est autor in vita eius. Etenim summo labore effecit is, ut ciues omnia navigatione, ac maris studio, arbores conferrent, & regionem illis adimplerent, fertilioremque redderent, maxime verò Oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, & ex illarum fructu non minimum quantum facerent. Unde lex postea apud eos lata, cuius Demosthenes contra Macartatum meminit. Ne quis Athenis Oleam effoderet, nisi ad templorum Atheniensium structuram, vel ad municipalia munera, aut cùm ad funus eundem eff-

Ierem: annexa etiam pœna. Quod si contra quifquam fecerit, pro singulis Oleis, drachmas centum ætario publico pendunt: cuius multa decima pars Minervæ sunt.

Terra A-  
rica Olea  
feracissi-  
ma.

Ab hac autem, de nomine Athenis imponendo controuersia, siue etiam propter Oleæ arboris in illa regione feracitatem & utilitatem, postea semper Athenis in maximo honore fuit: atque in dies inolevit, & victoriam redoluit: unde factum, ut eum meliorem significare velimus, cui Olivæ ramum porrexerimus. Quod expressit Virgilianus Æneas, cum ait:

*Optime Gratigenum, cui me fortuna precari  
Et victam, compros voluit prætere ramus.*

Ab eo item certamine, ferunt, postea Oleam illam à Minerva excitatam, per longissima tempora in arce perdurasse. Quæ summa religione, ac veneratione, si qua apud gentes omnes unquam alia, ab Atheniensibus & cæteris Græcis habita.

*Olea sacra.* Sophocles in Oedipo Coloneo sacras Oleas Athenis fuisse scribit, quarum Iupiter cognomento *Olea Moris* Morios custos erat, cuius sacellum prope Academiam erat, quod ibi primum, sicut & ficus inuenta sit.

Dicitur Halirrhottus Neptuni filius, Oleas in ædium Palladis excidere voluisse, atque cum id tentans aberrasset, sibi met securim impegisse, indeque occubuisse: A quo casu ille Oleæ nomen desumpserit, hæc verò (siue ob prædictum Iovis cognomentum: siue à portione [quæ Græcis *αἰὲρος*, *μῆρος*, *μῆρος*, *μῆρος*, *μῆρος* & *μῆρος*] quamque Panathenæis perfoluebat quifquis Oleas possidebat) Morias dicta.

*Olea Minervæ.* Herodotus autem in arce Athenarum templum Erechtheos terrigenæ fuisse scribit: & in eo Oleam Minervæ, & mare, in Neptuni & illius testimonium disensionis. Hæc autem arbor, cum Athenæ Medorum incendio conflagrasset: sed eodem die ad duorum cubitorum altitudinem repullulasse autor Pausanias. Perse iterum cum Xerxes Græciam invasisset, illam exusserunt. Ad quam quum Athenienses, altera ab incensione die, ad rem divinam missi templū ascēdisent, fructificasse invenerunt, edito à stipite, virgulti instar. In foro quoque Oleæ ara fuit, ut in Atticis Pausanias meminit, quam præ cæteris aliis Græcis Athenienses magis colebant, quoniam humanæ vitæ & rerum difficultati potissimum conducatur.

*Olea Nilæ.*

*Oleam ex Olea fluens.*

Fuerunt & aliæ apud Græcos Oleæ sacræ: ut illa apud Milesios, quæ post divitum ac popularium in testina & perniciofa bella, spontè exaruit. Apud Sicyonios ante Minervæ templum ab Epepeo exstructum, effluxisse Oleum, à multis observatum.

Inter autores eodem referente Curtio, non benè convenit, sub qua arbore Latona Apollinem pepererit. Euripides enim in Hecuba, Palmam primum in Delo insula natam prodidit, Latonamque eam amplexatam Apollinem edidisse.

Tacitus autem, lib. 3. de Ephesiolorum legationibus ad Senatum missis, Latonam partu gravidam, aquæ Cenchrium annem prope Ortygiæ Oleæ adnixam, Dianam & Apollinem enixam scribit: Ephesiōsque, Tiberio imperante, Romam venisse, memorantes, non [ut vulgus crederet] Dianam atque Apollinem in Delo genitos, esse apud se Cenchrium annem, lucum Ortygiæ: atque ibi Latonam partu gravidam, & Oleæ, quæ tum etiam maneret, adnixam, edidisse numina ea, deorumque monitu sacrum nemus.

Sed arborum harum duarum dissidium Ælia-

nus diremit: nam in Delo esse & Oleam & Palmam tradit, quibus à Latona tactis, ipsa subito pepererit, quod antea facere non potuerit.

De Dianæ atque Apollinis nataliciis alij aliter: Sed iam, ne quid præter, omisissis Græcorum commentis ad naturalem Oleæ historiam redeamus, atque Olearum differentias tradamus.

Olivarum, inquit, Theophrastus, lib. 6. ca. 12. multa sunt genera, ut in historiis dictum: & paulo antè Olearum genus, quod Ægyptium vocamus, vbertate ac magnitudine fructus excellit. Alterum verò Oleiferum, [ *ὀλῆφορον* & *ὀλῆφορον* ] Sed sibi non admodum constare videtur, multa dicens genera, & duas tantum notas tradens: nisi, ut Scaligero placet, duo constituat Olearum fastigia summa, *ὀλῆφορον* & *ὀλῆφορον* sub quorum altero, scilicet Oleifero, multas esse species agnoscat, quamquam, ut ingenuè fateamur, locum nondum observaverimus, ubi tot specierum meminerit.

Arist. meminit Oleæ in Pantheo *καλλιστέφανον* dictæ, de qua postea seorsim trademus.

Videntur autem Olearum differentia defumptæ, vel à forma, vel à colore, vel à succo, à loci varietate, à magnitudine fructus, eiudemque saporis ac bonitatis diversitate. Neque verò ad Olearum censum pertinet Olea lapidis specie, quæ Theophr. autore, cernitur in sinu Heroo ad quem descendunt Ægyptij, parte à mari eminente: non viridis, similis tamen viridibus, tam foliis, quam germinibus. Columella Olearū sicut Vitium plura genera esse arbitrat. Sed in eius notitiā decem tantum pervenerunt, quarum hæc nomina: Pausia, Algiana, Liciniana, Ciniana, Curt. [Sergia, Nevia, Culminia, Orchis, Regia, Circites, Murtea, Myrtea Curt.] Ex quibus bacca iucundissima est Pausia: speciosissima Regia, quæ potius escæ, quam Oleo est idonea. Pausia tamen Oleum saporis egregij dum viride est, vetustate corrumpitur. Orchis quoque & Radius melius ad escam, quam in liquorem stringitur. Optimum Oleum Licinia dat, plurimum Sergia: omnisque Olea. Et maior ferè ad escam: minor Oleo est aptior. Idem tamen & Calabricam Oleam citat alibi, quam quidem propter similitudinem Oleastellum vocant.

Genera Olearum tria dixit Virgil. Orchites & Radios, & Pausias:

*Nec pingues unam in faciem nascuntur Olive,  
Orchite, Radique & amara Pausia baccæ:*  
Nec desiderare rastros, aut falcem, ullamve curam.

Audiamus & Plinium: sic illa, libri decimi, capite tertio. Omnino in vita error esse publicus, tumore Olivæ crescere Oleum existimantium: præsertim, cum magnitudine copiam Olei non constare, indicio sint quæ Regia vocantur, ab aliis Majorinæ, ab aliis Phauliæ [tales afferuntur ex Hispania & Africa] grandissimæ, alioquin minimo succo. Et in Ægypto carnosissimis Olei exiguum. Decapoli verò Syriæ perquam parvæ, nec Cappari maiores, carne tamen cōmendantur. Quæ ob causam Italicis transmarine preferuntur in cibis, cum Oleo vincantur. Et in ipsa Italia cæteris Picenæ & Sidicinæ. Sale illè primum [privatim. M. Vet. & CH.] cōdiuntur, & ut reliquæ, amurca [Muria Vet.] lapavæ. Nec non aliq̃ Oleo suo, sine accersita commendatione putè innatant, Colymbades. Franguntur eadem, herbarumque viridium [præcipue feniculi, in Narbonensi Gallia. Dal.] sapore cōdiuntur. Fiunt & præcoces ferventi aqua persusæ, quamlibet immatura [hæ Postremæ factiæ sunt: de quarum cōdiendi modo infra dicetur.] Mirumque, dul-



cem succum in Olivis [immaturitate acerbis. Dil.]  
hibere, & alieno sapore infici. Purpureæ sunt &  
in iis, ut uvis in nigro colore transeuntibus.  
Pauliæ. Sunt & Superbæ præter iam dicta genera.  
Sunt & prædulces, per se tantum [nulla conditu-  
ra] siccata, uvisque passis dulciores, admodum ra-  
re in Africa, & cetera Emeritam Lusitaniam. In Africa  
verò (fides penes autores erit) Militarias vocari  
multas narrat à pondere Olei, quod ferant an-  
nuo proventu. Ideo lxxv. pedes Mago intervallo  
dedit undique: etiam in macro solo ac duro, at-  
que ventoso, cum minimùm xlv. Laudatur & Af-  
ricana, Aquilina, & Alexandrina, ut annotavit Cur-  
tius.

Dicamus & Etyma. Grandis, inquit Varro, Olea  
vocatur Orchitis, à similitudine ut credo testina:  
antiquitus Archemora. Probus à magnitudine sic  
dicta vult, quod testib. ferè par sit, Archemorà verò  
itidè, quia grandis est. Radius à longitudine dici-  
tur, ut ait Servius, unde Varro Radium maiorem  
dixit. Pausia à Catone Possia, exlterarum co-  
gnatione, & à Probo Possia appellata. A pavien-  
do, id est, tundendo dictam Servius autumavit,  
aliter enim Oleum non reddituram. Alij tamen à  
sapore dictam volunt, quod fiat, ut ait Curtius  
miser. Sunt etenim bacce eius succi amarioris, ideo  
incomestibiles. Sergiam Columellæ, Sergianam  
vocat idem, & Colmeineam quam ille Culminiam,  
cui Plin. præcipuam gloriam tribuit, & quæ Lici-  
niam Oleum in Venafano Italia agro ferret. M.  
tamen Varro eam, quæ in agro Cassinate, præfert,  
etiam aut re Virgilio.

*Non segnes iacent terra: iuvat Ismara Baccho  
Conferere, atque Olea magnus vestire Tabur-  
nim.*

In Sabinis etiam laudatissimæ. Bætica item Hispa-  
niæ regio Olivis fertilis. Silus:

*Palladio Batis urnatus cornu ramo. Et alibi.*

*Nulla Palladia sese magis arbore colit.*

Liciniæ unguenta palinam dederè, accommodato  
ipsis odore: dedit & palatum, delicatior senten-  
tia. De cætero etiam Liciniæ baccas nulla avis ap-  
petet.

Præter antè memorata Plin. & Albigerem &  
Salentinam posuit, inquit Curtius, quamvis neu-  
trum adhuc legerimus. Idem Radium ab alijs Ma-  
jorinam dici putat à magnitudine. Græcis etiam,  
autore Polluce *φάβλη*, quam hic Colinidam &  
Trabellum vocat. Apud eundem, Pherecrates  
Trambellos in Oleastro insitas Oleas vocabat. Est  
& Echinus genus Oleæ, & Ichades, & Gergerimæ.  
Apud Pollucem etiam reperiuntur Drypetes, & Ni-  
ctrides, quas Pherecrates Cotnidas vocavit. Erit  
ergo ex Polluce eadem cum Ph. ubi. Hæc Curtius.  
In Mari rubro, inquit, Hermol. vivit Olea, quæ vo-  
catur Atabica, bacis fætè nostratibus, singos cum  
largi ceciderunt imbres, educans, qui tacti sole in  
pumicem durantur, ex qua manat lachryma inhi-  
bendo vulnerum sanguini expetita medicis, de  
qua specialius postea. Celebratur & cognomi-  
nata *σπυγλή*, ab intorta specie: sed ea loci nomen  
est circa Epidaurum, adiecta fibula, evanisse ita et  
circumactu manus, Hercule illac meante: Nam  
reverso ex Hyperboreis, volunt ex Oleastro,  
Græciæ prius ignoto, fuisse clavam, quæ mox  
apud Troezenios, aut certè ad Alpheum annum  
restituit: si Pausanici credendum est, homini qui-  
dem satis docto, sed superstitioso, qui divi A-  
driani & Antonini temporibus floruit.

In Arcadia spectari solitam affirmat ille arbo-  
rem, è cuius radice anà Illex & Olea nascetur in  
quodam fano.

Tom. VI.

Syraculis, ut Diodorus autor est, in frondibus *Syraculis*  
Olearum, scriptis optimatum nominibus, discel-  
sione facta, irrogabatur quin quennale civibus exi-  
lium: de quo argumento genus id mulctæ *πυγλή* Mulctæ  
appellabatur, ut Athenis Ostracismus.

Nunc ad ea genera, quæ ex hominum artificio  
sunt, provt à Curtio, & à nobis ex diversis auto-  
ribus collecta fuerunt. Colymbades (perperam  
nonnulli autores Columbares) conditæ erant,  
ideo sic dictæ, quod oleo suo puræ, non ex-  
quista commendatione innatent & quasi urina-  
ræ. De quibus & Diosc. ut dicitur in vitibus. Hæc &  
Polluce, *ἀνὰ τὴν ἡχοῦσαν* quod innatent Oleo, ut  
annotat Const. Sunt & Netrides appellatæ, quia  
natent, apud Pollucem. Idem autor Corinidas no-  
minat, quas & Phaulias & Trambelos dici ait.

Halmades sic rancupatæ videntur, quod sile  
condiantur, cum *ἀλγυν* muria sit: easque malè cum  
Colymbadibus confundi tradunt Hermol. &  
Curtius: siquidem, ut inquit Paulus, Colymba-  
des oleo suo puræ, hoc est, sine accersita com-  
mendatione quasi urinabundæ innatent: Hal-  
mades verò cum fœniculo condiantur, ut scribit  
Hermippus.

Pityridæ sive Pyrenæ, sunt genus Olivæ fractæ:  
Erem. nucleos & tielæ, & futuræ accas interpretat-  
ur: Epityra falsò dixerunt quidam, cum sit Epity-  
rum, ut Varro inquit, Siculum edulium, de quo  
alibi plenissimè dictum. Oleas autem coraculæ  
Comici *κρηβας* vocarunt: de quibus in Nisus An-  
stroph. Nunc Thlailas vocant. Sunt & Stenophyl-  
ides dictæ. Græci enim quæ pressæ Olivis superest,  
στυφύλα vocant: Latini fraces. Stenophylides A-  
then. 1. etiam Olivæ nigæ.

Posteritas hac cura & satagentia perquirenda-  
rum Olivarum, vel etiam colendarum non tene-  
tur. Cæterum tam Diosc. quàm Galen. iuc re-  
centioribus Herbariis Olea alia domestica, de cui-  
us differentiis nunc agitur: alia sylvestris, de qua  
postea specialius tradetur.

Nobis verò, ut & aliis Olearum differentiæ  
ἀντιδωτῶν observatæ, sunt. 1. Olea cômunis, pas-  
sim in Italia, & Gallia obvia: in qua varietas que-  
dam, ut in descriptione observatum. 2. Quæ fru-  
ctus fert albos. Sed à fructus magnitudine & lo-  
co hodie tam Olearum, quàm Olivarum potissima  
differentia. Lusitanicæ Oleæ, testæ Clus. minores  
Olivas produunt, sed multum Olei eiusque præ-  
stantissimi præbentis. Sic etiam nonnullæ, quæ in  
Narbonensi Gallia & Bætica nascuntur Oleæ, mi-  
norem fructu ferunt, ex quo plus Olei exprimitur:  
etiam illi quod è maioribus Olivis elicetur, longè  
præferendi. Circa Hispalim, & crassior Oliva at-  
que etiam minor, nonnunquam & alba: quam &  
circa Vlyssponem nasci, Cleques Damianus de  
Goes, idè quæ vir doctissimus. in quodam suo  
prædio asserbat. Olivis Comensibus, ad Lacum,  
inquam, Comensem propè Mediolanum natis, nil-  
que conditis nihil sapientius & suavius, quamvis &  
macræ sint, & propemodum respectu maximarum,  
quas Hispanicas vocant, exueræ videntur.  
Eoque nomine & à delicatioribus Italis celebra-  
tæ. At magnæ illæ, etsi succulentæ amaritudinem  
insignem habent, dulcoris minus: acerbicatis  
amaræ, hoc est, amuræ, magis. Diversæ magni-  
tudinis Venetiis, & Genuæ vidimus & gustavi-  
mus, magnas, mediocres, parvas, quæ semper no-  
bis sapore istis præferbantur, quippe minds a-  
maræ.

Heturia, teste Mar. h. plura non novit Olearum.

*Tria genera* rum genera, quàm tria, præsertim Senensis ager. *Primum* genus earum est, quæ licet à minoribus

1. Olearum plantis proferantur, sunt tamen spectata forma & magnitudine, Bononiensibus quidem non inferiores. His tantum muria asservatis utuntur in cibis, quandoquidem Oleo minus apte sunt, quod multò plus amuræ quàm Olei fundant Proximæ tum colore, tum magnitudine præstantes, quamvis prædictis longè minores sint, sunt tamen omnium aptissimæ ad Olei conficiendum, quippe quoddam Oleum ex eis expressum sit non modò flavum, dulce, pellucidum, ac cæteris præstans, sed etiam copiosum. Gignuntur hæc à procerissimis Oleis, prægrandibus, Juglandium Nuncum instar, ramos in altum latumque amplissimè fundentibus. Eas rura Olivætricæ vulgò vocant. 3. Tertij generis ex sunt, quæ passim in Italia nascuntur, & omnium vulgarissimæ habentur. Laudatissimæ Olivæ Bononiensibus & Hetruscis crassiores, muria asservatæ Romam, Venetias & ad alias complures Italiæ clarissimas urbes, ubi optatæ & magnificæ parantur mensæ, ex Hispania importantur.

*Differentia* Olearum differentia, inquit, CÆSALP. ex fructu

*Cæsalp.* magis, quàm arbore spectantur, scilicet pro magnitudine, pinguedine & probitate. Idem veterum & Plinij differentias quasdam illustrat, suis applicat, & legendi tempus addit. Pausias primò

*Pausa.* purpureas, deinde in nigrum transeuntes, plurimum carnis habentes, Autumno colligendas dicit, sicut & Orchites. Radios tenerimas, unde citissimè eas occupat æstas, & amurca cogit decidere.

*Orchites.* *Radij.* Liciniam in agro Venetiano callosam in Martium mensem durare, probatissimum Oleum fundere: eius baccas aves non tangere. Cominiam similiter callosam. Regiam, quæ & Phaulia, & Maiorana

*Cominia.* *Regia.* grandissima, non nigrescere ante Februarium, eodemque tempore & Sergiam. Hodie grandissimas ex Hispania Nucis magnitudine adferri solitas, meritò Superbarum titulo decorandas. Italicas, quæ minores rotundioresque plurimum Olei habentes, Olivolas vocari: quæ majusculæ & oblongæ dulcissimum Oleum reddentes, sed parcius, Raggiarias à radiis nomine deflexo: Et Regias quæ majores adhuc pulposioresque ad condituras tantum quæsitæ.

*Sergia.* *Superba.* Sunt & quædam, quarum caro abscedit ab osse cum franguntur virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colymbades putat idem.

*Colymbades.* *Drupa.* Olivæ omnes, cum nigrescere incipiunt, quævis Græci, Drupas Latini vocant: quæ optima ætas ad decerpendum: nam maturiores pinguiori quidem succo constant, sed minùs grato, immaturiores Oleum reddunt præstantissimum, quod Omphacinum vocant, sed exiguum.

Meminit Serapio Olivarum aquaticarum, sed quales illæ sint, incertum adhuc. Item Olivarum novarum, colore Smaragdino: hæc recentes videntur, & immaturæ, & virides: dicit enim Smaragdinas, & subdit mox. Et Olivæ nigre maturæ sunt paratæ corruptioni: & in viribus. Ita ut hic non species, si aquaticam eximas, sed maturitatis gradus & perfectio intelligenda sit. Scribit enim Bellon. in Græciæ monte Athos Monachos veli Olivis nigris conditis, quas vocant Demarties: sed eas non peculiarè quandam speciem, & à superscriptis distinctam censemus, cum iam olim in usu fuerint, & eas condiendi modus tradatur à Columella: atque ex Pausia vel Orchitis, nonnullis etiam Nævii dictis, parari solitas. Ad nos raritùs importantur, aut certè vix, nisi fortè magnatibus. Sed & in Italia insolentiores esse putamus.

*Nigra condita.* *Pausia.* *Orchitis.* *Nævii.* *Minima.*

In Galliam, notante BRUYERO comporian. tur Capparium amplitudinem vix excedentes: in cibis autoritatis non obscuræ. Hispanicas illas grandissimas præ cæteris ideo expecti censet, quia ex longinquis terris quæsitæ. Medix magnitudinis esse Narbonenses. Italici tamen transmarinas præferri in cibis, Oleo ab eisdem vine.

Illæ Olearum differentia: à forma & sapore potissimum desumptæ sunt: reliquas præterimus: nam, quæ à locis & inventonibus petuntur explicare, infiniti esset laboris.

Nominis originè quod attinet: Olea Græcis dicta, & Oleum à *oleo*, ab *oleo*, ut quidam volunt id est, misericordia. Nam supplicantium symbolum esse Oleum, supra dictum. *olea* *oleo* Diocle. & Gal. Olea sativa, live domestica. Dicitur & *olea*, quam nos sativam, ut ab Oleastro differat, quem vocant *oleastro*. Oliva Virg. Palladia arbor: *olea* Platoni de Repub. fructus Oleæ est: *olea* verò arbor, *olea* *oleo* Herod. *olea* Aristoph. Latini etiam quandoque Termitem, quasquam etiam Termes vocentur vermiculi qui carnis & lignis ingenerantur. Vt Crædæ Fico, ita Thalex tribuntur huic arbori, utique apud nos [italos] inquit Hermol. At Græci, ut scribit Pollux, Thalos non Oleagineos solum, sed vitigineos quoque ramos nominant interdu.

Erephonem porò Athenis vix Erephonem vocabant plantam Oleagineam, velleribus & corollis involutam: unde & nomen, contra pestilentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristoph. quam etiam Corythalon dicebant, & qua (ntu teste Hermol.) Romanis non incognito) in Lustrationibus utebantur.

Græci etiam Oleam, ut dicebamus, in Academia satam, Moriam vocabant. Alij notante Curcio, sic distinguunt, ut Oleas publicas, Morias vocitent. Cæteri Moria stipitem *olea* dici volunt.

Caper Grammaticus Olivam arborem esse dicit, Oleam verò fructum, Oleum liquorem. Sed ea differentia parum observationis in duobus primis apud classicos auctores habet: quod Virg. testimonio demonstrare facile est. At enim, Georg. 2.

*Sed truncus Olea melius propagine vires Respondens.*

Vt & Varronis, apud quem Oleam conditancam pro conditiva Olivalegas: frequentior autem & usitatissimus modus est, ut Oleam pro arbore, Olivam pro fructu ponamus.

Audaxis, dicta quod perpetuè niteat. Hinc Ovid. — Ramis semper frondentis Olivæ. Poëtæ Paciferam, Pacalem, Pacatam, Infontem, Pacificam, Liciniam, Pisicam, Picenam, Atticam dicunt, & quamplurimis alijs Epithetis ornant. Arab. *Zaitron*, vel *Caiton*, vel *Zaitron* est Oliva, & *Cair*, vel *Cair*, Olei, ut à quibusd. scriptis invenitur. Germ. *Oelbaum*, *Olivenbaum*, *Olbeerbaum*, B. lg. *Olivenboom*, Gal. *Olivier*, It. *Olivio domestica*. Hispan. *Azayrune*, Castil. *Oliva*: Catal. *Olivera*, Port. *Oleyvera*, Angl. *Olive tree*. Bohem. *Oliva* / Hungar. *Olajfa*. Nucleum vocant veteres Samia, vel Samia, ut videre est ap. Colum. Quidam Naucum, unde proverbium nauci facere. Nodos Oleæ rustici Itali *Ova Olearum* vocant, de quib. in morbis. Oleæ, ut scribit Theophrastus, competit solum Campestre, ita ut meridiem præcipuè spectet, argilaceum, atque etiam magis candidum, in quo fertiliores evadunt: id enim multum vaporis, statutque continet, quod natura Olearum desiderat. Nulla ex iis generibus, quæ ex Colum. diximus, ut ipsemet prodidit, aut perfervidum, aut gelidum statum Cæli patitur. Itaque æstuosis locis, Septen-

Nomen & Symma Liguar.

Nomen & Symma Liguar.

Termin & Thales.

Erephon.

Moria.

Olea.

Zaitron.

Samia.

Locum.



Septentrionali colle: frigidis, Meridiano gaudet. Sed neque depressa loca, neque ardua: magisque modicos divos amat, quales in Italia Sabinorum, vel tota provincia Batia videmus.

Hanc arborem plerique existimant ultra miliarium sexagesimum, quadagesimum. Plin. à mari, aut non vivere, aut non esse feracem. Sed in quibusdam locis recte valet, ut abunde videre est in toto tractu maritimo Narbonensi, Liguriæ, & reliquis Italiz.

Optimè [ addit Colum. ] vapores sustinet Paustia, frigus Sergia.

Apertissimum genus terræ est Oleis, cui glareæ subest, si superposita creta sabulo admista est. Non minus probabile est solum, ubi pinguis sabulo est. Sed & denfior terra, si vuída est & lata, commodè recipit hanc arborem.

Crete ex toto repudianda est: magis etiam scaturiginosa, & in qua semper uligo consistit. Inimicus est etiam ager sabulo macer, & nuda glareæ. Nam etsi non emoriatur in ejusmodi solo, nunquam tamen convalescit. Potest tamen in agro frumentario feri, vel ubi Arbutus aut Ilex steterant.

Nam Quercus etiam excisa radices noxias Oliveto relinquit, quarum virus enecat Oleam. Hanc ita Quercum averfari Cossæus quoque scribit, ut in fovea posita, in qua Quercus crevit, non vivat. Et Plin. Olea ubi Quercus effossa sit, malè ponitur: quoniam vermes qui Rauca [leg. Eruce] ex Theoph. ] vocantur, in radice Quercus nascuntur & transeunt. Et si Olea consitum in confinio Quercetum habuerit, non solùm non feret, sed etiam fugiet, introitumque se in fundum abiiciet, si Hermol. credimus. Et rursus alibi Plin. Quercus & Olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depactæ moriantur.

Glareosum Oleis solum apertissimum in Venafano, pinguisimum in Batia. Nec omittenda quæ Florentinus Græcus scriptor Geoponicus de Oleæ loco natali prodidit. Aer inquit calidus & secus Oleæ commodus est, quod ipsum in Libya & Cilicia videre est, & provenientibus in ipsis Oleis. Auxiliantur autem ad aeris commoditatem, etiam terræ figura acclives & altæ. In talibus enim propterea quod superexcellens solis ardor à ventis perfrigeratur, optimum Oleum provenit, & ejusmodi quale Omphacium & Omotribes appellatum præparatur. Quæ verò in Campestribus sunt Oleæ, & minus à ventis moventur, & vehementius à sole incumbente aduruntur, atque propterea crassum Oleum remittunt.

In universum autem observandum, quod venti non plantas modò, sed omnia vivificant, quemadmodum vehementes & impetuosus venti omnibus sunt contrarij. In totum verò plantis quidem maximè omnibus, præcipuè verò Oleæ conferunt. Virides igitur potissimum illas Olearum plantas reperies, ad quas venti flatus ingreditur, latis spatii in medio plantarum relictis, per quæ ventus liberè inspirare potest. Ob id enim & ardua & acclivialoca Oleæ valdè commoda esse diximus, quòd videret semper ventum tepidum suscipiunt, ut nihil præterspirare possit, sed æqualiter per singulas arbores penetrare, ipsiusque plantæ augmentum excitare ac cæ connutrire. Humidior sanè terra floridiores & pinguior Oleas producit, ob quam causam, hæc terra preferenda est. Secundum locum habet argilla alba. Tertium argilla dura. At verò profundam terram non laudamus, neque item rubram. Calida enim existens plantas comburit. Multò verò magis fugienda est desolata. Fru-

Tom. VI.

um enim macrum fert, & germen aquosum. Apertissima autem est Oleis terra tenuis, cui testimonium Attica præbet. In Cyrenensi agro, autore Theoph. Olea optimè prodit, Oleumque plurimum fit: Circa agrum Thebanum quoque Olea gignitur, non aquis fluvij rigua: (distat enim plusquam trecentis stadiis) sed manantibus spontè aquis: multi enim fontes in eo sunt tractu. Ipsum verò Oleum nihilo deterius nostrate, nisi quòd deterius olet, quoniam naturæ sale rarò utantur.

Oleam porò Theophrastus [ut refert Plin.] è celeberrimis Græcorum autoribus urbis Romæ anno circiter ccccx. negavit nisi intra xl. [lx. Colum. & M.] passuum à mari nasci: Fenesella verò omnino non fuisse in Italia, Hispania atque Africa, Tarquinio Prisco regnante ab annis populi Rom. c. lxxxiii. Quæ nunc pervenit trans Alpes quoque & in Gallias Hispaniasque medias. Urbis quidem anno dv. Appio Claudio Cæci nepote, l. Iunio Coss. Olei libræ duodenæ [duodenis Vet.] assib. veniére. Et mox d. c. lxxx. M. Seius [aliis Seruius] l. f. Ædilis curulis Olei denas libras singulis assib. præstitit populo Rom. per totum annum.

Minus ea miretur, qui sciat post annos xx. Cn. Pompei 1111. Consulatu Oleum provincis Italianæ misisse. Hædodius quoque in primis cultum agrorum docendam arbitratus vitam, negavit Oleæ fatorem fructum ex ea percepisse quendam.

Tam tarda tunc res erat. At nunc etiam in plantariis ferunt, translatarumque altero anno decerpuntur bacca.

Fabianus negat provenire in frigidissimis Oleam, neque in calidissimis. Habetur tamen etiam in solo & cælo Septentrionali, sed fionde flaccidiore, latiore & ferè saligna, ubi nihil olecius perennis viroris est, sicut Londini in Cæclij viroto operis & stirpium novitate visendo, ut annotarunt Adu. Stut. gardiæ in horto, si quis alius in Germania, regio, plures & pulchras videas arbores, nec exiguas etiam Basil. in horto D. D. Plateri. Sed & nos aliquando aluimus Montbel. Verùm hyeme reponendæ in omnibus his dictis locis frigidioribus.

Alioqui eius lucos perennes densissimos & æternissimos alunt apricæ tepidiores convalles Hispaniæ, Gallo provinciæ & Narbonæ. In Italia nihil ea frequentius. Bellonius in Lemno paucas Oleas reperiri scribit, in hortis verò Crete colit, atque in Syria lætas provenire, ut & in agro Hierosolymitano.

Mons ille altus, inclytus & sanctus vocatus, è regione Hierusalem ad Orientem situs, in cuius vertice Rex David à facie filij sui Absalon fugiens, flens & nudis pedibus Deum adoravit. In quo filius ejus Salomon omnis pietatis oblitus, Astartoth idolo Sidoniorum (è regione Hierosolymitani Templi ex quo omnis quæ ibi peragebatur idololatria prospici poterat) Fanum erexit: Et quem Christus orationis & quietis gratia sæpe frequentavit, atque è cuius summitate in cælum ascendit: palmis quidem, myrtis aliisque fructiferis arboribus abundabat: sed tamen ab ubertate frequentium in eo crescentium Olivarum, Mons Olivæ & mons Olivarum, Latinis: Græcis verò ὄρος τῶν ἐλαιῶν dictus est.

Plurimæ circa Benacum nascuntur: multæ etiam circa Roboretum apud confederatos Helveticorum Rhatos: propè sed ultra alpes, Infubriam versus.

Olea florentibus iam Punicis germinat. Concipit Vergiliarum exortu. Hoc fidus illarum est. Floret autem paulò seriùs quàm Vitis, quæ Sol-

A iij





[addit Plin.] eximere Oleam oportet, & radices quamplurimas cum terra ferre. Vbi radices bene operueris, calcare bene, ne quid noceat. Si quis querat, quod tempus Oleæ ferendæ sit? Agro sicco per Sementem, agro læto per Ver. Cato in Calido & pingui solo Radium majorem, Salentinam, Orchitem: Pausiam, Sergianam, Cominianam, Albiceram feri jubet. In frigido autem & macro Licianam. Pingui enim aut ferventi vitari ejus Oleum, arborēque ipsa fertilitate consumi. Musco præterea rubro infestari. Spectare Oliveta in Favonium loco exposito Solibus censet. Mago, ut tradit Plin. in colle & siccis, & argilla, inter autem nunc Vere maximè ferit. Sed hi & autumnō libeat, post æquinoctium x. diebus ad Virgilium occasum. xiiii. foli dies sunt, quibus feri noceat. Græci Oleas plantandas præcipiunt à Sicularum occasu usque ad solstitium hybernū, hoc est, à 15. Novembris, usque ad 8. Decembris. Plantandas tamen & in Vere suadent, quod se mutuo imitentur hæc tempora, humidam habentia & calidum. Autumnus enim calidam adhuc terram habet à sole, humiditatem à pluviis prægressis: assumit autem caliditatem à solari accessione.

Oportet autem Olearum plantas à commodis locis, & arboribus novellis, quæ singulis annis fructum ferunt, desumptas esse, crassitudinem habentes rami, aut crassiores, levēque ac rectas esse.

Multis porro modis Olea plantantur. Quidam à scytalis plantant: acceptis enim ramis crassioribus, & his in magnitudinem cubitalem confectis, ita plantant. Quidam à talis plantant hoc modo. Ramos crassiores in magnitudinē cubitorum duorum confecant, & in fundum scrobis lapidem latiorē immittunt, deinde plantam super ipso rectam statuunt, ac terra adobruunt. Alij generosissimas propagines unā cum trunco plantant. Alij plantas, quas accepturi sunt in ipso adhuc trunco existētes falce circumpurgant, & circa Arcturi ortum in scrobes imponunt. Alij Tropea appellata plantant hoc modo. Rubrica notant situm ad Orientem & Meridie, & de trunco refecant ad longitudinem cubitorum quatuor, sive quinque, & in scrobes immittunt, aliam omnem diligentiam adhibentes. Hic modus plantationis citius vivificat, & citius fructum producit. Quidam à truncis plantant sic. Concidunt truncos ipsos in stipites majusculos, eosque scrobi imponunt, corticem sursum versas habentes, & aggesta terra stercore mixto ad palmi altitudinem sinunt. Quidam ex partibus trunci in terra, segmēta quatuor palmarum magnitudine, unā cum cortice excindunt, & lapidem in fundum scrobis permittunt, & circa hunc tria aut quatuor segmenta ponunt, & ad palmi altitudinem obruunt. Quocunque autem plantationis modo ipsa plantatio fiat, cum terra quæ plantanda sunt, secentur, observandum est diligenter & cavendum, ne cortex dilanietur. Acuta etiā falce celsura leviter facta, cortice illæso & incolumi conservato, stercore quoque bubulo admixto, cinere infernam rami partem illineamus. Et in primis vitandū est, ne secundū verticem inverfus ramus pangatur. Torquebimus enim plantam, si secundū verticem plantaverimus.

Oportet autem & stercur in scrobes injicere. Omne autem stercur Oleæ aptum est, præter humanum. Convenit autem non ad radices injicere ipsum stercur, sed paulo longius à trunco. Ster-

coratio autem Oleæ quarto aut quinto quoque anno fiat.

Nunc de insitione. Africæ scribit Plinius peculiariter esse Oleastro inferere: senescentēque ad optivas virgas, quoties opus sit, proximè emittere: quibus iterum juvenescat: ut ævis eadem Oliveta consent: sic enim intelligendus obsecutus ille Plinij locus, quem Dal. ipse non satis perspicuum reddidisse videtur. Pallad. de insitionibus libello, non tantū Oleastro, sed & Robori, inferi (quod mirum) docet hoc carmine.

*Robora Palladij decorant sylvestriarumi,*

*Nobilitat parvus, bacca superba seras.*

*Fecundat sterilis pingues Oleaster Olivæ,*

*Et qua lata novit munera ferre docet.*

Per Robora sylvestria stipitem Oleastri hic intelligi licentia poetica censemus, quasi stipitem & scutem ejus. Vix enim verisimile nobis sit, unquam Robur sive Quercum societatem inituram aut, ut verius dicamus, colituram cum Olea, præsertim cum Quercus tam inimica sit Oleæ, ut antè demonstratum. Adde quod hujus coniugij nullus alius meminit, ac ne Palladius quidem ipse alio loco.

Inferitur autem calamo & inoculatione. Idem modum præscribit hunc. Mense Aprili iocis temperatis, inferatur Oliva inter corticem more Pomorum. Sed ut Oleastro inferas, contra illud, quod ex Oliveto insito, & casu incenso renascitur Oleaster infelix, sic providendum est. Positis prius Oleastri brachiis in scrobe, in qua disponemus inferere, scrobes ita replebimus, ut media vacua sint. Cum comprehenderit Oleaster, inferemus in infimo, vel insitum ponemus, & insitionem probè infra terram nutriemus. Deinde sicut adolescit, terram subinde colligimus. Ita commissura in profundo latente quisquis urit aut cædit, Olivæ locum non aufert pullulandi, quæ & apertam redeundi felicitatem de Olea, & occultam valendi feracitatem de Oleastri connectione retinebit.

Aliqui Oleas in radicibus inferunt, & ubi comprehenderit, cum aliqua parte radicis avellunt, & dū transferunt more plantarum.

Græci Oleas ab v. iiii. Cal. Aprilium, usque ad xii. Non. Julij, inferi debere præcipiunt, ita ut locis frigidis feriis, calidis maturius inferantur.

Verū ex qua arbore inferere voles, & furculos ad insitionē sumpturus es, videto ut sit tenera, & ferax, nodisq; crebris. Et cum primū germinat, tumbunt de ramulis anniculis, qui solis ortum spectabunt, & integri erunt, eos legito, crassitudine digiti minimi. Surculi sint bifurci, vel trifurci. Arborem, quam inferere voles, terra diligenter exsecato ea parte, qua maximè nitida, & sine cicatrice est, dabisque operam ne librum lædas. Cum deinde truncum recideris, acuto ferramento plagam levato, deinde cuneum tenuem ferreum, vel osseum inter corticem & materiam, ne minus digitos tres, sed consideratè demittito, ne lædas, aut rumpas corticem. Postea furculos quos inferere voles, falce acuta ex vna parte deradito tantum, quantum cuneus demissus spatij dabit, atque ita ne medullas, neve corticem aliāve partem lædas. Vbi furculos paratos habueris, cuneum vellito, statimque furculos in ea foramina, quæ cuneo adacto inter corticem & materiam feceris, demittito. Ea autem sine, qua adraferis, furculos sic inferito, ut semi pede, nec ampliūs de arbore extent. Supra deinde mulsam imponito, & ita ligato, ne pluvia dilabatur. Quosdam tamen magis delectat in trunco arboris locum semini-

*Institio.*

*Plinius &*

*Dal. emend.*

*Inferendi  
modus &  
tempus.*

*Ne insitione  
ne infelicitur  
Oleaster.*

*Alius mō.  
& dū.*

*Surculorū  
delectus*

*Inferendi  
modus a-  
lius, qui &  
omnis. re-  
quis ar-  
boribus ap-  
tari potest.*

*fer-  
Olea  
modis.*

terra facere, infestis que partes tenui scalpello leuare, atque ita furculos aptare: si pusillam arborem inferere uoles, imam abscondito, atque ita sequipe de terra extet, & cum præscideris, plagam diligenter levato, & mediū truncū acuto scalpello permodicè sindito, ita ut fissura digitorum trium sit in eadem: inde cuneum, quo diducatur, inserto, & furculos ex utraque parte deraso demittito, sic, ut librum feruoris libro arboris æqualem facias. Cum furculos diligenter aptaueris, cuneum eximito, & arborem, ut mox dictum, alligato. Deinde terram circa arborem adaggerato usque ad ipsum insitum, eares à vento & calore maximè tuebitur.

Hoc ultimum genus infitionis, cum sit subtilissimum, non omni generi arborum idoneum est, sed ferè recipiunt talem infitionem, quæ humidam, succosamque, & validum corticem habent. Hæc Columella. Florentinus uero: Ex Oleis, aliæ quidem tenui cortice præditæ sunt, aliæ uero crassæ. Quæzigitur crassum librum & humidum habent, iuxta corticem inferantur: quæ uero tenuem & aridum, in ipsum lignum. Tempus autem infitionis huiusmodi, à x. Cal. Jun. hoc est xxiii. die mensis Maij, ait esse, usque ad Iunias Calendas. Oleæ uero insitæ multoties aqua rigandæ sunt, quippe, quæ aridæ existentes rigari desiderant.

*Olea calla-  
no cum Vi-  
nea, quoad  
cultura &  
impensam.*

Cæterum exiguum admodum impensam ad sui cultum longèque minorem, quàm Vineæ, desiderat Olea, quæ prima arborum est, ut prodidit Columel. Nam quamvis [eiusdem uerba sunt] omnia hæc de cultu] non continuis annis, sed ferè altero quaque anno fructum afferat, eximia tamen eius ratio est, quod leui cultu sustinetur, & cum se non induit, vix ullam impensam possit. Sed & si quam recipit, subinde fructus multiplicat, neglecta compluribus annis, non ut vinea deficit, sed eo ipso tempore aliquid interum patrifamilias præstat, & cum adhibita cultura est, uno anno emendatur.

*cultura.*

Ergo factis & instituto Olearum seminario biennio à putatione abstineri: tertio anno singulis feminibus binos ramulos relinqui, & frequenter siccari seminarium, conveniet. Quarto anno ex duobus ramis inferior amputandus est, sic exultæ quinquennio arbusculæ habiles translationi sunt.

*Quando  
transfere-  
ntur.*

Plantæ autem in Oliveto disponuntur optimè siccis, mitimèque uliginosis agris per autumnum, lætis & humidis uerno tempore, pauld antè quàm germinet. Atque ipsis scrobes quaternum pedum præparantur anno antè: vel si tempus non largitur, prius quàm deponantur arbores, stramentis incendantur scrobes, ut eos ignis putres ficiat, quos sol & pruina facere debuisset. Spatium inter ordines minimum esse debet pingui & frumentario solo sexagenum pedum in alteram partem, atque in alteram quadragenum: macro, nec idoneo segetibus, vicinum pedum. Sed in Favonium dirigi ordines convenit, ut æstivo proflatu refrigerentur.

*Mod. tras-  
ferendi.*

Ipsæ autem arbusculæ hoc modo possunt transferrî. Antequam explantes arbusculam, rubrica notato partem ejus que meridiem spectat, ut, eodem modo quo in seminario erat deponatur. Deinde, ut arbusculæ spatium pedale in circuitu relinquatur, atque ita cum suo capite planta erigatur. Quæ postea emendando ne resoluatur, modicos furculos virgarum inter se connexos facere oportet, & quæ pilæ quæ eximitur applicare, & raminibus ita innectere, ut constructa terra velut inclusa teneatur.

Tum subruta parte male inter ipsum commovere, & suppositis virgis alligare, atque plantam transferre. Quæ antequam deponatur, oportebit solum scrobis imum fodere bidentibus, deinde terram aratro subactam (si tamen pinguior erit, summa humus) immittere, & ita hordei semina substernere, & si consistet in scrobibus aqua, ea omnis haurienda est, antequam demittantur arbores, deinde ingerendi minui lapides, vel glarea mista pingui solo, depositisque feminibus latera scrobis circumcidenda, & aliquid stercoreis interponendum.

Quod si cum ea terra planta non convenit, tum optimum est omni fronde privare truncum, atque levatis plagis, simoque & cinere oblitis, in scrobem vel sulcum deponere.

Truncus autem aptior translationi est, qui brachij crassitudinem habet. Poterit enim longè maioris incrementi & robustioris transferri: quem ita convenit poni, ut, si periculum non à pecore habeat, exiguus admodum supra scrobem emineat: lætius enim frondet. Si tamen incurfus pecoris aliter vitari non poterit, cellior truncus constituitur, ut sit innoxius ab injuria pecorum.

Atque etiam rigandæ sunt plantæ, cum siccitates incesserint, nec nisi post biennium ferro tangenda, ac primò furculari debent, ita ut simplex stylus altitudinem maximi scrobis excedat, deinde arando ne coxam bos, aliamve partem corporis offendant.

Optimum est etiam constitutas plantas circumvenire caucis, deinde constitutum iam & maturum Olivetum in duas partes dividere, quæ alteris annis fructu induantur. Neque enim Olea continuo biennio uberat.

Cum subiectus ager consitus non est, arbor colliculum agit. Cum feminibus repletur, fructum affert. Ita sic divisum Olivetum omnibus annis æqualem redditum adfert. Sed id minimè bis anno arari debet, & bidentibus altè circumfodiri.

Post Solstitium cum terra æstibus hiat, curandum est ne per rimas sol ad radices arborum penetret. Post æquinoctium autumnale ita sunt arbores ablaqueandæ, ut à superiore parte, si Olea in clivo sit, inclia excitentur: quæ limosam aquam ad codicem deducant.

Omnis deinde soboles, quæ ex una stirpe nata est, quotannis extirpanda est, ac tertio quoque, si modo pabulandæ sunt Oleæ.

Stercus autumnum debet injici, ut permistum hyemi radices Oleæ calefaciat.

Amurca valentibus infundenda est: nam per hyemem, si vermes, atque alia suberunt animalia, hoc medicamento necantur.

Plerumque etiam locis siccis, & humidis arbores mulco instantur, quem nisi ferramento rescueris, nec fructum, nec frondem lætam Olea inducet.

Quin etiam compluribus annis interpositis Olivetum putandum est: nam veteris proverbij meminisse convenit: Eum qui aret Olivetum, rogare fructum, qui stercoret exorare, qui cadat cogere. Quod tamen satis erit octavo anno fecisse, ne fluctuarij rami subinde amputentur.

Solent etiam quamvis lætæ arbores interdum fructum non afferre. Eas terebrari convenit, atque in foramen viridem talem Oleæ stirpi deponi: sic velut initiata arbor, secundo semine fertilior extat. Pauld aliter & specialius Africanus, Oleam fertilem facere docet. Truncum inquit, terebra per totum terebrato, & acceptis ab altera fluctu

*Truncus  
translati-  
us aptus*

*Truncus  
translati-  
us aptus*

*Quando  
stercus  
injicitur  
aut  
Amurca  
vermes  
rescueris  
munda*

*Verbis*

*Quomodo  
Olea fer-  
ta put-  
rebrant*



fructuosa Olea duobus ramulis, principia ramulorum ex utraque parte immitte, ac transfige, & apprehensos utroque ramulos fortiter attrahere.

Quum autem optimè fuerint adacti, & quasi incuneati, redundantia, ex utraque parte reseca, & luto paleato cavernas utrinque obline, & fiet Olea multum fructuosa, & quæ optimam producet Olivam, Oleumque præcellens.

Sed & sine ablaqueatione adjuvanda est, inquit Colum. Amurca infusa cum suilla, vel nostra urina vetere, cuius utriusque modus servatur. Nam maximè etiam arbori, ni tantundem aquæ miscetur, urina abundè erit.

Solent etiam vitio soli fructum Oleæ necare: cui rei sic medebimur. Atis gyris ablaqueamus eas, deinde calce pro magnitudine arboris plus minùve circumdabimus: sed minima arbor modicum postulat. Hoc remedium si nihil fuerit effectum, ad præsidium infusionis cōsugiendū erit. Non desinet Olea, ut pollicetur Democritus, si fabam, quæ pedunculum habet acceperis cauernamque cera occluseris, deinde accepta à radice gleba fabam in eam indideris, & sic eam operueris.

Nonnunquam etiam in Olea unus ramus cæteris aliquantò est lævior, quem nisi recideris, tota arbor contristabitur.

Solent & fructus amittere Oleæ, si florentibus ingruat imber. Verùm contra vim mortis non est medicamentum.

Oleas putandi modum Cato hunc docet. Olivetum, inquit diebus xv. ante æquinoctium verum incipito putare. Ex eo dies xiv. rectè putabis. Id hoc modo putato. Quia locus rectè ferax erit, quæ arida erunt. Et si quid ventus interfegerit, ea omnia eximito. Qui locus ferax non erit, eum plus concidito [sil. gentiùs fodito, subigito, aratro proscindito.] aratroque benè enodato, stirpèque leves facito. Circum Oleas autumno ablaqueato. [Hæc Plin. addit] & sterus addito. Qui Olivetum sapientissimè & altissimè miscbit, is tenuissimas radices exarabit. Radices si sursum abibunt crassiores fient, & eò in radices vires Oleæ abibunt. Varro sanè Oleam post ablatum fructum putare suadet, neque putandum esse ait, ablati manifestis & conspicuæ magnitudinis ramis pauciorum fieri fructum. Multò enim copiosiore fructum ex recentium ramulorum ubertate proditurum.

Vnde Palladius unoquoque anno sicca & fructuosa, & cum aliqua debilitate nascentia rescindi debere statuit.

Porò Oleas in materiæ multæ effusione eluxuriantes & velut infanientes, hoc est, folijs quidem ferentes multa, fructum verò modicum, sic curabis. Paxillum Oleæ sylv. aut Pinus, aut Quercus in radices adiges, aut etiam lapidem impones.

Eis verò quæ multum fructum ferunt, non autem maturum faciunt, & florem malè perdunt, sic medeberis. Circumfodito truncum, & majoris. Alge corbes duos, minoris, minùs circumciice: deinde amurcæ aqua potabili permixtæ quatuor congios singulis truncis affunde: quod si Alga haberi nequeat, sola amurca utere.

At verò curam contra infestantes bestias, & lesiones ex ambiente acedentes, in tractatu de Viribus universim docebimus.

Quod si tamen arcescentes radices & ægrotantes animadvertaris, vermiculos in fundo generatos causam iudicabis, quos multis quidem modis disperdere poteris, ut eo loco tradetur.

Morbus & ille Oleæ peculiaris, *ἄλας* dictus, hoc est clavus quem alij Fungus & Patellam vo-

cant: Vnde lib. xvii. cap. 24. Plinius. Olea præter vermiculationem, quam æquè ac ficus, sentit, Clavum etiam patitur, sive Fungum placet dici, vel Patellam: hæc est solis quædam exustio, quamvis propter nimios imbres contrahi dicat Hermol. Videtur autem hoc ipsum esse, quod supra diximus ab Italis rusticis Ova vocari: sunt enim nodi.

Nulla post ficum arbor uredini magis obnoxia est.

Est & impetigo peculiaris ei morbus, ut scabies Fico, & Vitibus fluor. Remedium esse potest, cum nimia nutrimenti ubertas detrahitur.

Solet & mox post sationem Oleæ officere frigus hyemis, corticem enim detrahit: quapropter diligenter munienda.

Sed & ipse fructus Vermiculos sentit. Illi vel sub cute nascuntur, vel in ipso fructu augentur, nam caro non tangitur: cuius rei causas, & alia, vel his subtiliora excutiemus in opere de insectis.

Oleæ Arachnium quoque innascitur, hoc est, Aranea, fructus absumentes vermis, tela furculos, obvolvens: gignitur humiditate quadam aëris proximi.

Amititur, & fructus, si germinetur ramis anniculis ingruentibus imbribus. Quoniam enim pabulum, eò fluit, antè quàm fructus vires conceperit, humore aggerato, mox germen proflit, & fructuum proventus impeditur.

Atque in genere circa Vergilias (quæ octavo vel nono Maij oriri solent) quidem plueret, inimicissimum & Viti & Oleæ, teste Plin. quoniam, tunc coitus est earum. Hoc est illud quadriduum Oleis decretorium, hic articulus nubilij spurti, quod diximus.

Olivam lambendo quoque sterilem fieri, aut tor est Varro: eaque de causa Minervæ non immolabantur, nec in arcem Atheni s agebantur capræ præterquam semel ad necessarium sacrificium: ne Oleam ibi primùm editam, (de qua antea) violarent.

Eruca quoque alia frondem, alia florem Olivarum (ut in Mileto) erodunt: ac depastam arborem turpi facie relinquunt.

Olea tamen, folijs amissis fructificavit, inquit Theoph. sed inter rara & ostèta refert. Nonnūquā [addit idem] ratione hyemis, aut alias ob causas quædam accidunt, quæ ordini naturæ, incongrua iudicantur, cum tamè non ita sit: Vt Olea penitus aliquando adusta, regerminaverat tota. In Bæotia verò germinibus omnibus à locustis derosis, iterum germinavit. Sed hæc haudquaquam pro absurdis haberi forsitan debent, quippe, quorum manifestæ causæ reddi possint.

Novellæ quoque Oleæ pereunt ex fertilitate quod prius, quàm perficiantur, alimentum incrementi sui ad fructificandum consumant.

Evenit etiam, ut cum Oleæ benè germinant, malè fructificent: cumque benè fructificent, malè germinant: tanquam natura utrique satisfacere non valeat: sed necesse habeat absumere alterum, ut alterum faciat.

Olea quoque Gongros à quibusdam vocatos habet, vel aliquid Gongris simile, propriissimum enim huic illud nomen, quòd, hoc morbo magis quàm cæteræ arbores laborare videatur. Prem non etiam quidam vocant id vitium alij Crotonam, alij alio nomine. Id vitium rectis, & vnicæ radice nitentibus, ab imo stolones non mittentibus, aut nullo pacto, aut minùs, accidere solet.

Olea verò & Oleaster has caudicum concavitates peculiariter habere videntur. Hæc T. copia





dam. Ergo ut primū n̄ discitū fuerit Oliva, sub-  
stratis tegetibus, aut pannis, expandi aut cribrari  
debet, quō aquositas ex ipsis recedat, & à so-  
lis ac virgultis repongetur. Hæc enim commista,  
Olei diuturnitati obliunt. Tum diligenter man-  
data protinus in torcular deferri, & integra in  
siccis novis includi, præliſque subici, ut quan-  
tum possit paulisper exprimat. Postea resolu-  
tis corticulis emolui debebunt, adiectis binis  
sextariis integri salis in singulos modos. Quod  
defluerit in labrum, protinus decapulato de-  
pleat, & in siccis labra, huic usui præparata, de-  
fundat. Hoc enim suavisimum est, & tenuissi-  
mum. Nam æreis & plumbeis vitatur Oleum.  
Longè melioris saporis est Oleum, quod minore  
vi præli quasi lixivium defluerit. namque si nu-  
clei confringantur, olei saporem vitant. Cū ver-  
o paululum constiterit, subinde decapulandum  
est, quamvis Cato bis tantum in die præcepit.  
Nam quō sapius translatione illa ventilatur, tan-  
tō magis eliquescit & amurcā liberatur, cui quō  
diutius hæret, eō deterius sit. Solet etiam cum a-  
murcā frigoribus congelari: tum inspersus sal co-  
ctus resoluat Oleum, & separat ab omni vitio. Si ne-  
sic quidem resoluatur, præsertim cū maiora frigi-  
ora incesseint, nitrū torretur, & contritum  
inspergitur. Eas res eliquat amurcam, quæ inimi-  
cissima est Oleo, & si remanserit in eo, saporem  
eius corrumpit. Neque verendum est ne falsum  
fiat: nam quantumcumque salis adieceris, nun-  
quam saporem eius recipiet Oleum. Debet itaque  
Oleum Cibarium fieri protinus illata de oliveto  
bacca. Minus probatur oleum ex oliva quæ deci-  
dit, vel tempestatibus aut pluvius in lutum deflu-  
xit: nam immunditiarum saporem trahit. Quare  
ad præsidium aquæ calidæ decurritur, quæ im-  
munda bacca prius eluantur, quàm molæ aut  
torculari credantur. Habes igitur veluti tres gra-  
dus Olei. Primum & nobilissimum, quod sponte  
vel minore pressuræ vi, quasi lixivium defluerit.  
Hoc seorsim ad servator. Secundum, quod ex re-  
liquis fratribus premitur, sed paulò graviore pon-  
dere & mole fortiore quassantur. Hoc tertium  
non male dixeris Oleum, quod, velut secundæ  
pressuræ, privatum in alia vasa transmittitur. Hac  
iteratione invalidius, sed tertiatione multò de-  
terius oleum exit. sed utrobique decapulandum,  
& oleaginea rube movendum, & ab amurcā, seu  
aquola sanie, repurgandum. Vbi oleum in labris  
paululum consistit, denud in alia vel vitrea vel  
vitrea transferendum, ut à sanie illa, aqua, quæ  
subsider, penitus repurgetur. Imò sapius iteran-  
da, ut dictum, hæc translatio, donec mundum ad-  
modum & sincerum evadat. Sed plurimum refert  
non miscere iterationem cum prima pressuræ,  
quæ longè melioris saporis est: tantòque minus  
tertiationem. Vitreata vasa omnium optima sunt  
ad hanc rem, vitrum enim Oleum maximè con-  
servat, quippe, cū frigore lætetur Olei natura.  
De olearia cella, torculari, & reliquo apparatu ad  
hanc rem necessariū instituendo, consule supra-  
scriptos Geoponicos, maximè Columellam lib. 12.  
c. 50. & alibi passim.

Ceterum, multa incommoda oleo vel nuper  
facto, vel dum sit, vel deinceps ætate solent acci-  
dere. Quod gelatur, plerumque fracescit. Cui  
præscriptis præliſ, sale & nitro commodè obli-  
stemus. Sordenti quoque frictis & adhuc calen-  
tes sales Tarentinus inicit suadet, & diligenter o-  
periri: ita mundum, reddi brevi tempore pro-  
mittit. Oleum quoque sordidum purgat Pinea-  
pux, quæ igni candens, oleo restinguatur. Emun-

dat & citri radix in Oleum demersa. Oleum quod  
suis fratribus torridis fuerit inustum, limpidus e-  
liquescit. Oleum rancidum idem pollicetur cor-  
rigi, si cera alba mundo & optimo Oleo resoluta,  
& adhuc coctura liquens, in oleum mittatur, &  
mox sales fricti calentes addantur: sic fieri, ut O-  
leum purgetur, sapore & odore murato, sunt qui  
& sole vel igni, aut etiam aqua fervente simul in  
vasculo mixta restitui posse asserant.

Item. Non rancescere Oleum in quo  
prius anisum maduerit. Si graue oleat, præcipit  
idem virides Oleas sine offibus tundi, & in vasa  
per solis calorem mitti: si bacce defuerint, cau-  
les tenerimos Oleæ similiter esse tundendos.  
Nonnulli utraque permiscant, adiecto etiam sale,  
sed omnia inter linteum clausa suspendunt, acque  
ita in vasa Olei demittunt, postea tribus diebus  
exactis auferunt, & agitant, ubi conquievit in  
alia vasa transferunt. Alij immittunt vetustum  
laterem torrefactum. Quidam panes hordeaceos  
breuiter friatos, & raro linteolo inuolutos, im-  
mergunt, & novos deinde permutant: Vbi hos  
bis aut ter fecerint, salis callos aut micæ in-  
iciunt, & in alia vasa translatum paucos dies sub-  
dere permittunt. Quod si mus, aut aliud fortè ani-  
mal deciderit, & Oleum putri nidore vitaverit, iu-  
bet Democritus Coriandri manipulum in Oleum  
suspendere in aliquot dies. Si nihil remisit ni-  
dor, denud nouo Coriandro iterandum, donec  
expellatur nidor. Quidam in umbra prius exsic-  
catum iniciunt. Alij Pœnugracum itidem in  
sole siccatum in vasa mittunt. Præstat autem car-  
bones signitos ligni Oleaginei in Oleo exstingue-  
re. Alij utas passas demptis vinaceis tulas immi-  
tunt, & post decem dies rursus exemptas expri-  
munt & Oleum in aliud vas transfundunt.

Si acerbus odor facit, vix incrementa præcipiunt  
Græci tusa, & in Massam redacta mersari. Si  
Oleum turbulentia vexet, Tarentinus vul-  
in fidelia oris ampli coniectum oleum in ser-  
uare, tenuissimumque sale frictum inspergi, &  
ubi subsiderit, spurcum oleum elutriari. Oleum  
Istrio aut Liburnico simile fieri promittunt Græ-  
ci, si in viridi Oleo, quod omphacinum vocant,  
aut aliis optimo, Enulam siccam & Lauri  
tusa, & subtiliter creta permisceas cum salibus  
torrefactis ac tritis, & diu Oleo iniecta perturbe-  
dein tribus aut pluribus decursis diebus, cū  
quieverit, utaris. Hoc est oleum Liburnicum ap-  
pellatum, & ipsum ad eod. Istrium. Damegeron  
Oleum Hispano simile faciebat, hoc modo. Oleo  
sincero & omni amurcæ spurcia repurgato, ubi  
efferverit, triplum aquæ quàm fervidissimæ, &  
salis modicum probè tritum commiscebat multa  
agitatione, dum incorporari & in unum coire  
perciperet: tum spatium quodam conquiescere  
patiebatur, donec iniecta aqua amurcæ in mo-  
rem subsideret. Deinde existens Oleum concha  
deplebat, rursus, cum aqua tepente movebat,  
denud quæ subsidentem aquam ab Oleo sincero  
emergente separabat. Deinde succum foliorum  
Oleæ tenerorum contusorum admiscebat, quod  
acrimoniam quandam & amaritudinem inde con-  
traheret oleum, quod post triduum, ubi consti-  
tisset, ad usum deprimebat. Alij post diem uteban-  
tur. Alij etiam Omphacinum Oleum, aut alias bo-  
num, in mortarium mitebant, ac in eodem sugco  
terendo præli, ubi opus esset, ad usum vocabant.

Diophanes autem odorati Olei faciendi ratio-  
nem ita docuit Musti sextarios octo cum  
duobus Olei, & bonam Iridis tuse portionem,  
linto involutam misceant in vase, & exactis

decem diebus excolatum recondant, hoc autem mulieribus poti gratissimum. Plures Oleorum factitios modos postea dicemus. Nunc baccas seu Olivas condiendi & conservandi rationes tradamus.

*Olivæ ed-  
denti mo-  
du sunt.*

Olivas condiendi soliti fuerunt veteres, quam revera nihil aliud sint quam palatus blandimenta. Tamen ingeniosus fuit venter, ut & amara, nec ab ipsa natura percocta, suæ quoque voluptati placere cogerit. Quid quæso gustu horridius Oliva, sive matura, sive immatura? At suavitatem inexit ars, quam non potuit natura. Cato, Columel. & Pallad. in harum conditura præcipuam operam locarunt. Ex quibus eas seligemus, cōdiuras, quæ unicuique generi communes esse possunt. Peculiares parum necessarias arbitrati, quod Olearum hodie genera, neque omnia, neque fortè multa, omnibus sint nota, ita ut & nomina esse desierint. Bacca igitur etiamnum hodie, sicut olim, conviviorum epulis præparantur: quarum conditura diversa: nam alia cædis, alia lectis, alia albis, alia nigris debetur, ut condiendi modus peculiare etiam tribuat nomen. Iam supra dictum Colymbades dici, quæ oleo suo puræ, & si nec accessita commendatione innatant. Halmades verò, quæ muria propriè condiuntur, etiam si Græci harum sæpè nomina cōfundant. Plura nomina dicta superius. Caducis, quia spontè cadunt, nulli nec collectionis, nec temporis observatio debetur. Has iam rugosas [exsiccatas nempe iam in ijs extremitatibus illa sanie seu amurca] colliges, & sale trito asperfas, donec inarescant sole expandes. Tum strato cratibus Lauro, baccas dein ordinabis, & pluries invertes, ut probè siccetur. Demum aquam, tribus aut duabus undis, cum defruto, & saturæ manipulo servetactam, & rursus tepefactam, iniecto pauxillo salis cum origano superinfundes, & ad usum recondes.

*Olivæ alba  
conditura.*

Lectæ diverso tempore condiuntur. Prius enim albescunt Olivæ quam nigrescant. Hoc autem summæ maturitatis, illud uirescentis, sed iam ad maturitatem mox inclinaturæ Olivæ signum, quod circa vindemiam esse solet, autore Catone. Hic lectam albam contundi prius præcipit (quod fieri censemus, ut amurca & austerus ille liquor evocetur) tum in aquam inicii [secundum quosdam calidam] Crebrò autem aqua mutari debet, & ubi satis macerata est, exprimi, atque in acetum immergi, oleumque addi, & salis selibra. In modicum Olearum Fœniculum & Lentiscum seorsim condes in acetum. Si unâ admiscere voles, citò utitor. In orculam caleato manibus siccis. Cum uti voles, sumito. Oleam albam secundum vindemiam, quæ uti voles, sic condito. Musti tantundem addito, quantum aceti. Cætera item ita condito, ut supra dictum. Res eò redit, ut probè maceratas in fideliâ, cum Fœniculi & Lentisci ramusculis & cocto modicè sale permistas recondas, & mustum quàm recentissimum infundas cum media parte aceti, ita ut ius superemineat. Quibus sic conditis tertia die uti poteris. Oleas albas, inquit Varro, quas condire vis, novas, celeriter condito, ut promas: nisi condieris, propter amaritudinem, illas respuit palatum. Item, nigras nisi prius sale maceraris, non libenter in os recipiuntur.

*Maiores  
sem Regia  
conditura.*

Regias quoque seu Maiorinas illas, quàm candidissimas eligunt, deinde substrato arido Fœniculo, in amphoram coniciunt, atque Fœniculi & Lentisci ramusculos intermiscunt. Cum autem ad fauces usque amphora repleta fuerit, duram muriam adiciunt: ac spissamento de arundinum

foliis facto, uti infra ius mergatur, premunt: & iterum muriam duram, dum ad summum amphoræ labrum devenierit infundunt. Alij aqua marina ad dies sex macerant: deinde in vas mittunt, & recens mustum superfundunt, ita, ne omnino vas repletur, ne videlicet in illius fervore effundatur. Quod ubi efferverit, oblinunt.

Nonnulli non contundunt, sed acuta arundine [quod quidem operosius] infecant: nam, à ferro cavendum, ne sapor inde perverfus contrahatur.

Quidam verò sive contuderint, sive infecerint, modico sale cocto, & prædictis feminibus immixtis, sapam deinde, vel passum infundunt.

Olivam autem Pausiam cum iam decoloratur, & antequam miscetur, cum petiolo legunt, & in oleo quàm optimo servant. Hac enim ratione viridem, etiam post annum, Olivæ saporem representare promittunt. Plures etiam cum de oleo trito exemerunt, asperam sale pro nova apposuerunt.

Familiaris est hic modus Florentini. Olivas magnas & intactas, manu decerptas, acuta arundine circum circa incide, & in vas novum immixtis, sale tenuissimum insperge: quo colloquato, in alio vase mel vel sapam in promptu habe cum foliis citri, & in hanc condituram mitte, ita ut liquor ipsis innatet.

Quidam etiam Fœniculi semen & Apij admiscunt, & condituram faciunt pergratam, admirabilem, vulgò que ignotam.

Familiarissimus iste Didymi. Vinacea recentia priusquam exprimantur unâ cum olivis vicissim interpositis in vas condes, deinde oblines.

Nunc de nigrarum conditura, quæ ubi iam nigrescant, nec tamen adhuc perimaturerint, legendæ sunt, & cribrandæ, exemptis impuris & maculosis. Tum in singulos Olivarum modios salis integri heminas ternas adicies, atque in vimineos qualos confundes, copiosè superaddito sale, ut baccas contegat, atque sic 30. dies consudalcere permittes, ut omnem amurcam extillent. Postea in alveum diffundes. Tandem in vas recondes, & illud sapa ac defruto replebis, aridi fœniculi spissamento superposito, quod Olivas deprimat.

Alij lectas, uti dictum & compositas, muria diluunt, atque in ollam deiciunt, & mellis partes duas, defruti dimidiam, vini unam. Quæ ubi semel omnia deferverint, abiciunt, & acetum admiscunt, ac permovent: & ubi refluxerint, origani surculos insternunt, sed, ita ut liquor superemineat.

Alij cum pediculis & agnatis ramulis diligenter lectis, aquam triduo aspergunt, & per duodecim dies in muriam demittunt, & exemptas, in vas cum aceti & musti æquis partibus deiciunt, & repletum vas ita operiunt, ne aliquod spiraculum super sit.

Alij easdem lotas & sale maceratas aceto multo, modo prædicto, condunt, affuso etiam oleo, & asperso sale trito. Fœniculique ramulis iniectis in vas probè obturatum recondunt.

Didymus Olivas antequam nigrescant lectas, & contractas in aquam calidam mittit, deinde in sportam transfert, & exprimit additque salem non tritum, cum comino & Fœniculi ramulis. Deinde in mustum immergit & diligenter operit. Olivas contusas & fractas vocat.

Idem Olivas Colymbades sic parare præcipit: has plenas & perfectas, quæ in vigore fuerint, & prope maturitatem extiterint, unâ cum exortu ex quo pendunt accipito, & ne frangantur ac con-

*Alia  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Ciri  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Nig  
condi  
dum.*

*Orig  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Orig  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Alia  
dum.*

*Oli  
dum.*

*Cal  
des  
reg.*



tandantur in magnum vas coniectæ quum de-  
feruntur, diligenter prospicito: deinde frigida a-  
qualotas, paulatim in umbra per diem unam in  
calathis ac cratibus vimineis assiccato, & quo æ-  
qualiter siccantur, leniter convertito. Deinde  
præmissio in fundum vasis salis triti pugno, &  
postea muria congis quatuor cum aceti heminis  
tribus infusis, Olivarum chœnices viginti im-  
mittito, & ubi expletum est vas, commoveto. Li-  
quor autem supereminet, & obturatione per  
Fœniculi fasciculum facta, vas obturetur. Cæ-  
terum muria ea gratia præinfundi debet, ut Oli-  
væ, dum immittuntur, non contendantur.

Alij cum teneris ramulis decerpas Olivas  
in vas marinam aquam habens immittunt, & ad  
dies quinque vel sex relictas eximunt, & in vasa  
conjectas, unâ cum muria reponunt & oblinunt,  
qui modus est omnium simplicissimus.

Columella sic fieri docet. Maturam Olivam, in  
statura, factam Colymbadem, de muria tollito,  
spongia tergit: deinde canna viridi scindito  
duobus vel tribus locis, & triduo in aceto habe-  
to. Quarto die spongia extergito, in urceum aut  
cacabum novum mittito, substrato Apio & modi-  
ca Ruta. Concisis deinde pleno vase Olivis, im-  
mitte desrutum usque ad os. Lauriturionis in-  
hoc usu mittito, ut Olivas deprimant: post dies  
viginti utere.

Ex hoc Colum. loco facile iudicabis quid pro-  
priè sint Oliva Colymbades, nempe, quæ iam se-  
mel condita fuerint, sed proprio Oleo. Ideo di-  
cit: Olivam in statura [id est repositam & su-  
met Oleo innatantem] factam Colymbadem:  
quam tamen, uti vides, denuo condiendam do-  
cet, modo iam præscripto.

Palladius sic docet: Olivas muria per 30. dies  
macerabis, pòst universam fundes, & duas de-  
fruti partes, aceti unam, cum Mentha minutè in-  
cisa vasculo adicies, & ita replebis, ut iusta in-  
fusione liquor supernatet.

Εὐρύπια quidem fraces & Oliarum magmata  
vocat Helych. At M. Cato. Εὐρύπια Oliarum con-  
ditura est, de qua sic tradit.

Epityrum album, nigrum, variûmque sic faci-  
to. Ex Oleis albis, nigris, variisque nucleis eiici-  
to. Sic condito. Concidito ipsas, addito Oleum,  
acetum, coriandrum, Cuminum, Fœniculum, Ru-  
tam, Mentham, in Orculam condito: Oleum su-  
pra fiet: ita utitor. Alium modum habet Co-  
lum. l. 12. c. 47. Cuius usum maxime dicit esse in ci-  
vitatibus Græciæ. Alij eius usum olim frequen-  
torem in Sicilia quàm Italia fuisse tradunt. Falli  
verò videtur Varro, dum l. 3. de ling. Lat. Εὐρύπια,  
ab Εὐρύπια, id est caseus, compositam putat: nisi  
fortè eadem vox & aliud edulij genus ex caseo  
paratum olim significarit: sicut Εὐρύπια erat edulij  
genus: quod, ut lib. 14. scribit Athen. fiebat, mel-  
le iniecto lacti dum coagulatur: alioqui reclamât  
& modo citatorum Catonis & Colum. autoritas,  
& ipsa componendi ratio præscripta. quin potius  
Epityrum à contracta Oliva, quæ Græcis ἰνύρες  
est, dictum, De quo Plaut. Milit.

—Ego me illi mancipio dabo,

Si [ali] legunt nisi] unum Epityrum edam apud  
illum εἰς ἰνύρες infans.

Tot itaque modis vides anxios fuisse veteres  
Olivas ita concinnandi, ut diversimodè place-  
rent palatui. Sunt verò & longè plures apud ci-  
tatos autores, quos studio omisimus, quemad-  
modum & Sampsam, Syrapam, & alia id genus,  
quorum parandi rationem abundè docet Colum.  
Quæ omnia eodem modo hæc ævo parari vix pu-

Tom. I.

tamus. Nam & simplicissimo tantum modo con-  
dita Olivæ, muria, vel [quod rarior] aceto &  
Oleo, interjectis interdum Olivæ aut Lau-  
ri folijs ad nos importantur ex Italia & Gallia  
Narbonensi, itinere terrestri, sed pleræque mino-  
res. Nam majores ex Hispania per mare afferun-  
tûr, si insitoribus credimus, itidem muria condi-  
tæ, & ut plurimum arboris suæ frondibus aut  
Thymi foliis interstratæ.

Delictantur firmiores ac solidæ, non flaccidæ, non  
maculis affectæ, compressæ, aut ulla putredinis la-  
be inquinatæ, succulentæ ac minimè rugosæ, sed  
superficie probè tensa, pediculis adhuc herenti-  
bus, in quocunque genere.

Et si delictarum potius causa Olivæ condiri vi-  
deantur, tamen & usum habent in medicina, & vltus.  
venditori non exiguo compendio sunt ad rem  
augendam.

Nigras Olivas stomacho inutiliores putat Plin.  
veteri minis: præclarumque habere antequam con-  
diantur. vltus, recentes per se tibi modo devora-  
tas. Mederi arénosq; uringitem dentibus, aut attri-  
tis, aut conuulsis. Albam Oliam faciliorem sto-  
macho, sed ventri magis alienam.

Fructus Oleæ inquit Gal. si liquidum ad vnguem  
maturuit, moderatè calidus est, sin immaturus est, Tempe-  
ram. magis tum alstringit, tum refrigerat.

Olivas albas priusquàm insit Oleum, Hip. sicca-  
ri & tundi iubet, ac cibrari, & cum vino propi-  
secundina. Hoc autem & menses & secundas  
hæit.

Olivæ Colymbades trita, autore Diosc. & am-  
bulis illita, pustulas gigni prohibent, ac sordida  
etiam ulcera purgant. Succus autem ipsarum ex  
muria, collatione gingivas contrahit, emollosque  
dentes stabilis. Est porro Oliva subfusca ac re-  
cens alvo incommoda, sed stomacho utilis. Ni-  
gra verò & matura corruptioni oportuna stoma-  
choque adversa est, ac tum oculis maxime conve-  
nit, tum capitis etiam dolores inducit. Torrefa-  
cta ac illita nomas sistit & carbunculos emar-  
ginat.

Olivæ, quæ maturæ sunt, ex sententia Sim. Se-  
chi, temperatè calidæ sunt, non maturæ verò, a-  
stringentes, & frigidæ & siccæ sunt, ventrem ro-  
borant, aliumque sistunt: at pulmone noxia. Nig-  
ræ verò & maturæ faciliè corrumpuntur, ven-  
triculôque ac oculis noxiæ & vesicæ. Calidæ tem-  
peraturæ sunt, & ad siccum magis inclinant. Co-  
lymbades verò quæ dicuntur, frigidæ sunt & siccæ  
quæ si cum garo ante cibum sumantur, alium  
proritant. Immaturæ autem adstringunt & refri-  
gerant, siccæque sunt.

Diogenes cum vidisset iuvenem in diversorio  
Olivas esitentem, si sic prædixisset (inquit) non ita  
cœnares. Idem etiam cum Platonem in lautissimo  
convivio degustantem Oleas intuitus fuisset, il-  
lum percunctatus est, quamobrem in Sicilia  
huiusmodi mensarum gratia profectus, appositis  
modò Oliis non fuisset. Cui ille. At Hercu-  
les, ô Diogenes, illic & Olivis & reliquis huius-  
modi vescabar. Cur igitur, ait ille, Syraculas  
adnavigare te oportuit? An Attica tunc Oleam  
non ferebat? Quibus verbis Platonis navigatio-  
nem subarguere videbatur.

Demost. in Orat. pro Ctesiphone contra Æ-  
schinem. Solebas aliorum [inquit Adagialiter]  
Olivas & uvas colligere.

Olivæ etiamnum hodie non solum in Italia &  
Hispania, sed nostra etiam Germania ditiorum &  
magnatum mensas opulentant, gulosorum in-  
vento, ad aviditatem excitandam. Quanquam





**O**livarum liquor Oleum est, cui honorem Veterum majestas magnum præbuit, ob insignem ejus utilitatem. Hujus inventorem Plinius dicit Aristum Atheniensem.

Fitaurem & Oleum ex acerbissima & nondum  
matura bacca, quod Græcis *ἄγριος ἄμυγδα*, dicitur, Lat.  
acerbum, æstrivum & vinde, cuius meminit  
Theophr. Id. Odoribusque fieri tradit ex Oli-  
vis Phauliis: non *ἄγριος ἄμυγδα*, ut habetur apud  
Athen. ita enim restituendus ille locus Athen.  
Theophrasti. Græco codice, quem ipsemet  
cit.

Acerbum autem Oleum facere, nisi bacca tem-  
pestaibus in terram deciderint, & necesse sit eas  
sublegere, patris familias rationibus non conve-  
nit, inquit, Columell. quia exiguum fluit.  
Elibatum utique Oleum faciendum modo  
prescripto, Samici Olei meminit Antiphanes  
apud Athen. quod reliquorum esset candidi-  
ssimum.

Lubet hic Olei candidi parandi rationem ex Dioſc. adſcribere. Candidatur hunc in modum. Sumito album colore, nec anniculo vetuſtiſſi-  
mũ Oleũ novum lati oris inſundito centum hemi-  
arum meſura. Mox in ſole expoſitum quotidie  
circa meridiem concharẽſundito, ex altũ detur-  
rans, ut frequenti volutatione ac verberatur agi-  
tetur alteretur & tumefcat. Oſtrea deinde die  
ſequenti purgatum drach. ʒc. pondere, a-  
que calida maceratum, atque adeo remolli-  
tũ aqua interius nec iquam ex præſſi in ſupradu-  
ctum Oleum conſicito: tendam quoque Pineam  
tepinguem & in tenues aſſulas conſicam pari  
pondere inſuper addito: atq; ita dies octo alios ce-  
ſabi ſinito. His tranſactis concha Oleum denudũ  
inſundito. Poſtremo li ſinem aſſecutum fuerit,  
& ſis novum priuſ veterẽ vinũ elutum, ſubſta-  
tis antea Meliloti floſculis ad drach. undecim,  
um fridis pari pondere: decapitalũ atque re-  
coctũ. Sin autem candorem nondum con-  
ſaxerit, Oleum ruruſ inſolandum, & opus  
ipſum repetendum, dum candidum illud eya-  
pẽit.

Lavande S. candef. ciend: Olei longè simpli-  
Tom. I.

Reperitur, inquit Cordus, natura etiam candidus  
Oleum, sed Dioscorides eo tractat, quod arte & indu-  
stria humana candorem contrahit. De albatro  
etiam pura tantum, crebroque affusa & refusa a-  
qua, idque duas ob causas. Primum ut acrimo-  
niam, amurce reliquias, & pinguedinis rancorem,  
si quis sit, in aquam deponat. Deinde etiam ut  
aspectu candoremque magis placeat, ne fusco aut  
profundiore colore candida vnguenta in faciat.  
Lavatur præterea & alii modis, habito diversarum  
affectionum respectu, æquis odoratis, Rosarum,  
Lavendule, aut similibus.

Vt autem cum Galeno rem paucis complectamur, illud quod propriè Oleum dicitur, de quo hoc loco agimus, differentias habet vel ab ætate, quoddam aut recens sit & velut mustum, aut ætate vigente, aut vetus.

A diversitate fructus, cum is aut maturus aut immaturus exstiterit.

Oleum cum aqua mistum ὁ ἀροῦλαιον vocant.

Oleum vero quo luctantur perungebantur, *ῥύλλον, & κηρίμα, & πηγε* dicebatur: verum hoc alium propter cœnum, pulverem aut certum erroris genus, quod defendi atque roborandi corporis gratia luctantur post Olei illitionem ascribatur *ἑλαιον ἄγαλον*, Oleum insulsum vocatur apud Galen. *ἁπλ. τι πῖπτε*, lib. i.

Oleum, olivum vocat Horat. *Ἴλαιον* Græci. S  
Germ. Baumöl. Belg. Boemelie: C'hevan d'Oli  
ne/Gal. Huile d'Olive. It. Ooglio d'Oliwa. Hisp. A  
ceyte de Azeyrunas.

Olei vires nemo facit, quamvis disertus, quod  
 sit explicabit. Plinius sanè paucissimis ver-  
 bis Olei & vini usum prædicauit, quando ait: Duo  
 sunt liquores corporibus humanis gratissimi, in-  
 as vini, sors olei, arborum è genere ambo præ-  
 pui. Sed olei necessarius.

Videtur autem alludere ad Pollionis Romuli  
stivum responsum, cuius alibi meminix: eum  
ntesimum annum excedentem, cum D. Augu-  
us hospes interrogaret, quānam maximē ratione  
gorem illum animi corporisque custodisset: re-  
pondisse: intus mollior, foris oleo.

Eadem propemodum sententia, Democritus  
interrogatus, qua ratione homines in offensa va-  
tutine degerent, ac vigorem illum animi custo-  
rent, respondisse ferunt: Si corporis externa o-  
s interna melle linrentur.

Plato in Menexeno Oleum πρῶτον ἀγνόν, id est, O  
borum subsidium & adiumentum hominibus  
Te datum ait. Oleo enim natura tepefacere cor-  
pus, & contra algores munire; eidemque fervo-  
res capitis refrigerare.

Vsum eius, inquit Plin. ad luxurię vertere Gręci  
tiorum omnium genitores, in gymnasijs publi-  
cando. Ideo & Anacharxis infantię pharmacum  
dixit, quod eo cuncti Athletę invicem ferventijs

Differen;  
tiae.  
*Ab arate.*

A propa-  
randi me-  
do.  
A diversi-  
tate fru-  
ctus.

Olei vires  
& usus.

*Pollionis*  
*Romuli*  
*responsura*

Democriti  
responsura.

Oleum la-  
porum sub-  
siduum.

Graci Si-  
iorum ge-  
110 cs.  
n/ansae?  
pharmacō.

Scardentibus atque furiosis insultarent.

*Infamia*  
*plumma-*  
*rum*  
*Oleum in*  
*Aegypto*  
*nilum.*  
O cum & oleum emere oportere Aristoteles autumavit, unque quod idem neque ad prorogandum vitam quam nunc de conducere:

Invenimus Aegyptum penè universam Oleo carere: esse verò quosdam hortos circa Alexandriam, in quibus Olea sint, verum Oleum non reddere.

*Solum O-*  
*leum hu-*  
*midu Ho-*  
*meco.*  
*Ratio.*  
Fons illè inferiorum Homerus, inter tot liquores, qui ex fructibus quos terra patens nobis producit, solum Oleum *Oleum*, id est, humidum, [Metaphoricè etiam molle, laxum remissum, lubricum] dixit. Quare sic Plutarchus optimus huius rei & gravis interpres in *Symposium* rationem reddit, Quod videlicet in Oleo nihil asperum sit, ut ne ad motum quidem percussam, quemadmodum, ceteri liquores, strepat, ut, quod cum igne minimè luctetur, verum nullum exci: de pascat. Nec alius etiam liquor, qui tam latè diffundatur, si corpori inungatur, aut qui ferilis sit esse facit.

*Tardè sc-*  
*catu.*  
*Speculi*  
*vi*  
*exuperet.*  
*Tingunt.*  
*Hum.*  
*Præparato*  
*rum.*  
Imagines speculorum non morè reddit. Tranquillitatis etiam nomine, eius natura inchoata in propemodum non commendata est, ut mare etiam, omnium rerum in seivissimam tranquillitatem. Aque ob id Viriatores ore Oleum spargere aiunt, quod mitiget Elementi naturam, lucemque deperit. A qua quidem natura tractum adagium, Oleo tranquillo. Plautus in *Poenulo*: ita hanc ego canem faciam tibi Oleo tranquilliorum. Oleum in auricula ferre dicit Martialis:

*Adagia.*  
Narratur quod ambel. *Narrasse Martialis,*  
*Qui referre Oleum dixit in auricula.*  
Quod si silentia res quid nunc refert.

*Humidum non*  
*permi, curat*  
Humidis autem permisceri nullis Oleum patitur quia lentum suique pertinax est.

*Spirituosum.*  
In partes quoque dividuas secari se non sinit, reliquique commisceri liquidis. Multum spiritus habet, pingue enim est, ut propterea neque terrene, neque aqueæ substantiæ, sed æræ perhibeatur: Ex quo fit ut per summam aquæ fluat, & levitatis indicium præbeat, quamvis revera per se non sit leve, sed copiosum etiam admistam habeat densam & terrestrem portionem.

Sed calor & spiritus eius substantia prohibet, quominus congelescat. Crascescit tamen frigore, ut hyeme, tum flavum tum citrinum conspicitur. Æstate, liquidum & subviride.

*Ferrum remollit.*  
Qui autem ferrum remollire cupiunt. Oleo tingunt,

Ceterum omnes Olei utilitates hic persequi, nec volumus, nec possumus, maximè, cum sciamus, Galenum in eo genere plurimum præstitisse, nec tamen potuisse omnia.

Quod si quis tamen eius utilitatem altius perscrutari velit, vix ullam aliam rem maiorem, post aquæ & panis usum, inveniri deprehendet, siue ad rem familiarem spectet, siue ad rei medicæ necessitatem, siue ad luxum & ornatum.

*Odores co-*  
*feruat.*  
Nam ipsam, cum per se propemodum in odorem sit, omnium tamen rerum vinum, odorem, & facultatem recipit, illas verò nulla ratione inficit, quod Lucretius insinuasse videtur, cum ait:

*Ac ipsa reperire inolentis Olivi*  
*Naturam, nullam qua mirrat naribus auram. &c.*

Hinc Vnguentarum odores in Oleo reponunt. Nam odorem servare omnium maximè potest. Sed iam reddenda est medicæ eius ratio.

*Ufus medicus.*  
Oleum ad usum per sanitatem optimum, inquit Dioscorus, quod, quia ex crudis seu acerbis & immaturis Olivis exprimitur, crudum, & omphacinum dicitur. Excessit in hoc genere recens, mi-

nimè mordens atque odoratum. Tale ad unguentorum compositionem utile. Quinetiam propter astringendū vinum stomacho accommodatum. Ore si continetur, gingivas contrahit, dentèque firmit: sudores denique cohibet. Quod uestitus ac pinguius est, ad medicamentorum usum est accommodatum.

*Temper.*  
*Laxat.*  
*Addece*  
*Tonant.*  
*Laxat*  
*fluat*  
*fluat*  
*fluat*  
*fluat*  
*fluat*  
In universum autem Oleum omne calefacienti vim habet, carnem emollic, corpus contra algres munit, ipsa neque ad actiones obeundas expeditis reddit. Bonam etiam aluum facit, estque molliendi vi præditum. Exulcerantium medicamentorum vires, permissum, hebetat. Exhibetur quoque contra venena, sic ut subinde bibatur ac revocatur. Purgat hominè mensuram, cum pari pisanæ succo, aut aqua, epotum. Tormentosis utiliter datur in potu cum ruta decoctum, sex Cyathorum mensuras, lumbri, & que pellic. Infunditur & id ipsum ad ileos maximè affectus. At vetus tum magis ex illo facit, tum etiam vehementius dicitur, & ad exatundam oculorum aciem sublinium prædest. Sin desit vetus, hac præparatione opus est. De eo cuius est copia, quod præstantius erit in uas defundit, & ad mellis crassitudinem decoquit, atque ita utitur. Eandem enim cum prædicto vim accipit.

*exple*  
*fluat*  
Plin. quoque testatur in Oleo odores maximè conservari. Et Oleum, liquor recreans membra, eodem dicitur. Et alibi: Omni oleo mollietur corpus, vigorem & robur accipit. Stomacho contrarium, ubi omphacinum non comprehendisse videtur, quod stomacho gratum esse Dioscorus dixit. Sed quando Oleo, ut uino, palati gratiam nullam dicit, sola comparatione detraxit Oleo, quod alioqui recens & dulce est, & oleosa lenitate gratum. Alioqui, unimodo, insigni quodam sapore palatum nec inquit hec titillat. At Oleum recens & dulce, panis segementis costis, cum sale infusum, præcipuum suavitatis gratiam nobis habere videtur. Vulgissimum, eodem teste, est Omphacinum: proximè viride. Præterea quam maximè recens, nisi cum uestitissimum quæritur, tenue odoratum, quodque non mordet, è diverso quam in cibis eligitur. Omphacinum si continetur in ore, colorem dentium custodit magis quam aliud, sudoresque cohibet.

*Oleum*  
Omne autem oleum auget ulcerum incrementa: Fauces exasperat, & venena omnia hebetat, præcipue *Plumbythi* [Cervilla], & *Gyph* in aqua multa, aut *Ficorum* siccatum decocto potum, contra *Meconium* ex aqua: contra *Cantharides* *Buprestin*, *Salamandras*, *Pytiocampas* per se potum, redditumque vomitionibus, contra omnia supra dicta laudatissimum. Et lassitudinum persudatione retento est. Vultu etiam emolliat utile. Faciem purgat, & rebus omnibus nitorem & lucem addit: Vnde tractum adagium: Oleo nitidius.

*Adagia*  
*Narrat*  
*inducit*  
Vetus porò magis exalfacit corpora, magisque deservit sudores. Duritias imbris diffundit. Lethargicis magis auxiliare, & inclinato morbo. Oculorum charitati confert olei quid, cum pari portione mellis acapi. Capitis doloribus remedium est. Item ardoribus in febris cum aqua. Et si uestitus non sit occasio, decoquitur, ut uestitatem repræsentet.

*Durum*  
*Letha*  
*Oculu*  
Oleum novas à uestis tuetur: picem è pannis extrahit: eo apes & reliqua insecta exanimantur.

*Contra*  
*Sepas*  
Oleum solum calci miscetur, quando utrumque aquas odit.

*Oleum m-*  
*Su.*  
Eodem extinguuntur quedam, quæ aqua accedunt, ut *Thracius lapis* & *Gagates*. Hæc Plin. Boues,



Boues, inquit Arist. pedum dolores non sentiant, si eorum cornua vel pice vel Oleo illinantur.

Item ubi bos aqua hirudinem hauserit, & ea faucebus inherens, manibus detrahi non possit, futilam vel arundinem aut tabulum infert, & ita calidum Oleum infundit. Nam eo contactu animal confectum decidit: quod remedium & hominibus simili casu accommodare possis. Bubus etiam infusum per nares, donec ruerent, infusum sedat. Oleo potius etiam Elephantis tela, quæ eorum corpori inhererent, eiiciunt.

Olei temperamentum eleganter declarat Simeon Sethi, his verbis: Oleum mediocriter calidum est, magis humefaciens. Inmutatum verò, quò magis altit, eò magis frigidat: quod autem elutum est, minus mordicat. Vetus tum quoque quò vetustus est, antè calidus est, & magis discit, eòque maxime, si à principio tenuum partium fuerit, quò cognoscitur, si purum est & perspicuum, & si eius in odora pars maximam corporis partem perurgat, & facile ab eo imbibatur. Dignoscitur vero & conditatis & frigiditatis Olei gratulus gustu: quod enim dulce est, mediocriter caliditate habet: quod autem altit, frigidum est. Tale autem in omni bonum est. Quod autem calidum est, celestem inflammatur.

Olei suprema [ex Plutarchi sympos.] regio melior est: nam immixta amara turbatur. Summum vero optimum, quod remanet summam loci partem, nec magis spissitate ab ære turbatur.

Nouum præstantius, illi enim senium inutili. Transpiratum carens ob lentitiam inueterat, & tandem tanceat, quod ad vomitum erudum, ob tenuitatem saporem, tam odorem ab aëre quibus præfertur. Atque nil ad uobis inspectu, quòd uisiosa qualitate stomachum nimis vellet, & molester. Recens laxando, lunctando, atque ad uolui suo motu & fluctuatione abutit: id præstare posse consensum, maxime si præbeatur cum aqua tepida.

Querit Alex. Aphrod. cur epotum Oleum vomitum, possit in fluxu bilis moueri? Quod suapte natura semper ad superiorem locum tendat. Quotiens enim cuiquam humori permiscetur, ad superiorem se recipit sedem, innatque, & cibos ad stomachum inuocat, effertque: quibus aggrauatus & oppressus vim excernendi ad euocandum incitat: præsertim verò fluxum bilem, quæ cum levis, atque tenuis sit, ad ceteros facilius superiora petit.

Olei, præter rem etiam ipsam medicam, plurimus usus, quod omnes ipso usu experiantur, qui tantum, tamque in rebus multis, ut eius commoditates, multiplicisque utilitates enumerare perdifficile sit.

Et quoniam supra dictum Oleo corpora munitur contra frigorem, & frigus remittit, & illud tunc corpus persicillionibus, quoniam nihil reddendo, & ad motus habilius. Nam ubi corpus arefactum fuerit, vel à sole, vel à frigore, vel à re quadam erodente vel acti, vel extra vel intra corpus, aut si cutem prurigo infestet, Olei dulcis inunctione nihil præstantius, præsertim si in balneo, vel post id fiat, quod apud veteres Romanos tam consuetum fuit, ut exemplis illustrare pigeat, eam oleum sint, tamen medicorum quam historicorum libri. Inde & excogitata medicamenta Latine Achna sive & etiam Græcis Αχνη dicta ad tollenda lassa membra, & robur agilitatemque corpori inducendam. Hinc lassa tamen quoque eo

perangebantur, ut eius vnguinis lubricitate diffusor foret inuicem bacchorum connexio. Hinc lassa succurrere Oleum dixit Philostratus, apud cuius icones, pictor apponit tantum Oleagineum in Palæstra Marcij filii & lassa inventricis nudos non leuauit. Ludorum vero Olympicorum nuntiationis ad eosdem, Herculeum autorem faciunt, cuius consilio factum fuit, ut ludatores Oleo obliuiscerentur. Quod & Lucanus testatur lib. 4.

*Ille Cleonæ protegit terga leuus,*

*Anteus Læbyis perfudit membra liquore.*

*Hæc spe Olympicæ seruauit mare Palæstræ.*

Hæc in Antæ & Herculis pugna.

Propterea Anacharsis Scythia, ut dicebamus, Oleum infans pharvacum esse dicebat, quoniam eo peruncti athletæ feruentius inuicem la-

*Ensis sua  
currit olea  
Emblema  
Philostati.  
Lassa in-  
uentrix.  
Ludorum  
Olympico-  
rum igne-  
tor.*

*Essorum  
moi.*

E contra Effros è ludorum genere, ungi oleo non pati ait Porphyrius in libris quos de abstinendo a carnibus scripsit, ut est apud Eusebium de præparatione Evangelica. Quod si verò quis Oleo tactus fuisset, diligenter, tamquam à magna corporis macula, corpus abitegit, hancque eos corpore audos, non moles, si oportet. Possidonius Stoicus, in suis historiis tradit ut ceteri Athenienses, Gallis quoque omnia non fuisse viros Oreo, propter raritatem, quin & quod insuane sentirent, viui eius non assuec. Hodie tamen in Gallia Narbonensi & Prouincia Olei maxime visus: quibusdam enim in locis non quadragesimali dantur taxat tempore, sed per totum annum cibos omnes cum oleo coquunt. Vere tostus panis cum Oleo & Mentha gratus est cibis, nisi quis labores Antipathia, sicut fuerunt mihi aliquando duo commensales, quorum vnus abhorrebat à cibis coctis cum Oleo, alter à coctis cum Butyro.

Epimichordis quoque impensum rationem Coquinum collegi: reddere iussisset, & olei multitudinem moleste tulisset, admirantibus illis ait: Non impendij magnitudo me mouet, sed quòd tantum Olei intra corpus receperat.

Velabrum, autore M. Varrone, Romæ locus fuit, in quo Olearii oleum distabant. Mos autem huic hominum generi fuit, ut inter se de pretio conspirarent, quo plures venundarent: unde tractum adagium: Ut in velabro Olearii. De his dictum, qui conspirant, tamen ex composito gerunt Plauti in Captiuis.

*Pergo ad alios, venio ad alios, deinde ad alios, unares,*

*Omnes cum pacto rem agunt, quasi in Velabro Olearii.*  
Non prætereundum etiam, quod usus Olei erga Deos ac illorum sacrificia non infrequens fuit: Vnde Lebasion poculum, quo in sacris Oleum libaretur, ex Curtio.

Fuit etiam Romæ olim Saturni simulachrum Oleo plenum, teste Plin. fortè quod ex Eboze collectum erat: nam prius dixerat existimari ebore à carie vindicando vitale esse: & quasi pro ratione subdiceret simulachrum Saturni Romæ intus Oleo repletum est: in quam rem inquirant Antiquarij.

Et taberna etiam meritoria trans Tyberim, Augusti temporibus, Oleum è terra erupisse, ac tota die nullâ intermissione fluxisse proditum est. Quo significatum volunt grauissimi autores IESV CHRISTI eiga gentes gratiam & natiuitatem,

*Olei esse  
maximas  
hodie apud  
Gallos.*

*Galli oleum  
abstinere  
ab oleo.  
Epaminondas  
responsum*

*Velabrum  
olei compo-  
ritum.  
Olearii  
mos.*

*Adag.*

*Lebasion  
poculum.*

*Eyming*

## OLEVM SICYONIVM.

Sicyonium Oleum dictum, in Sicyone Achaia Syrie præparabatur, unde nomen accepit, illud

ex candidato Oleo, de quo suprà egimus inter

differentias, docente Diosc. hoc modo parare licet. In lebetem oris amphitanno inductum re-

centis Olei candidique congiungit unum, aqua verò dimidium infundito: tumigne levi coquito, leniter agitando. At cum primum bis effuerit, ignem subtrahito, & ubi refrigerit, Oleum decapulato. Tandem alia adjecta aqua simul iterum fervefacto: ac reliquis, veluti pram instratum est, peractis, reponito. Vinum habet leviter calfactoriam, in febribus ac nervorum affectibus accommodatum. Utuntur & eo mulieres ad inducendum cuti nitorem. Cæterum, pulvis maxima cura erat, Oleum parare albissimum, quia illo quotidie, ut notat Amatus, universa corpora inungebant, ut agilia, prompta & expeditissima ea haberent.

Cæterum ne lebetem vocem ambiguitate aut simili udine fallatur, notandum duplex esse Oleum Sicyonium, vacca tandem litera mutata: Sicyoniorum & Sicyoniorum. De priori hic agitur. Posterius à A vocabulo sicyon, vel sicyon Cucumis, nomen invenit, ut hinc Dioscor. nullam facit mentionem. Prius illud in nostro intelligit Paulus, l. c. 9. de Lethargi cura: & eodem lib. c. 20. in cura Tetani. Ad hos enim affectus commendat. Posterioris meminit, l. 3. c. 77. in cura Coxendicis. Porro tu nbi, l. 7. c. 20. Tem Aëtius Tetrab. 1. Semina tum Myrsinus, l. c. 15. cap. 24. & Aëtius meth. med. l. 6. tam simplices quam compositos molos nec parum inter se discrepantes parandi Olei Sicyonij habent: sed omnes sicyoniarum, hoc est, Cucumeris sylvæ, succum aut certe radices in se recipiunt, unde & illi Sicyonij nomen, uti dictum, indepti. Apud Græcos verò per o μικρόν scribitur, quemadmodum hoc Diosc. per o μικρόν

Vitis & vires.  
Febrer.  
Nervorum affectus.  
Fucus.

Leithargia.

Tetanus.

### OLEVM EX OLEÆ furculis.

Delectus.  
Vires &  
Vitis.  
Oculorum caligo.  
Lepra.  
Nervorum dolor.

Paratur & ex Oleis surculorum [Saxile] pinguedine Oleum, teste Diosc. qui optimum in hoc genere esse dicit vetus, crassum, pingue, non turbidum. Calidare autem paratumque supralitum ficere ad ea quæ pupillis caliginem offundunt: quin & ad lepras nervorumque dolores illatum confert. Et tamen enim [Saxile] & [Saxile] nia, Saxilia, vel Saxile] quidem communiter cuiusvis arboris virentem ramum ac tenellorum furculum denotat. Articuli vero hoc loco & [Saxile] pro Olagineo accipitur.

Similis Olei mentionem facit, Gal. l. 6. simpl. licet non videatur de germinibus solis id Oleum fieri voluisse, sed tantum in Oleo illo consistendo addi solita Oleorum germina. Ait enim: Quinetiam quicumque in præparando Oleo ramos oleagineos iniiciunt, ij & ipsi Omphacino simile Oleum faciunt. Et Meth. 11. Sit tibi Oleum alitum, quæ est Hispania dictum, & quæcumque alia de germinibus oleagineis parant. Suprà tan ubi Olei Hispani parandi rationem de Damogeronte proposuimus, dictum, fuit, addi etiam debere succum foliorum Oleæ tenellorum contusorum, quo ab iis amarorem & acrimoniam quandam auferat.

Differtigitur in eo à Diosc. quod ille [Saxile] quodam adiciat cum Galeno: hic verò simpliciter [Saxile] Oleum fieri dicat. Quamquam totis Marcellus [Saxile] regat, id est, ex cortice.

Lepra.  
Dile.  
Fucus.

### AMVRCA.

Amurca expressæ Olivæ fæx est & crassamentum, Oleo inimica, cuius color Olivam cogit nigrescere: & sapor amaram reddit. Ideoque incipiente nigritia Olivæ, minime à nuce, ante eam nihil. Error hominum est, ut antea dicebamus ex Plin. existimantium maturitatis initium, quod est vitio proximum. Saniem Olivæ amaram, Plin. dicit. [Saxile] Diosc. [alio] & Gal. [Saxile] etiam teste Polluce: alio [Saxile] ut notat Curtius.

Nonnulli Tragædiam primum denominatam dicunt, inter quos Donatus, quod Scenici ad personarum usum, ora sua ea perluerent: quod primum reperisse Æschylum aiunt. Præclara, mehercle, inventio. Hoc tamen in arte innuit Horatius.

Ignorant Tragici genus invenisse Camanæ.

Dicitur, & plausit vixisse poemata Thephis:

Que canerent, agerentque peruncti sœcibus ora.

Dicitur & [Saxile] Helych. apud quem corrupte legitur [Saxile]. Servio autore, Amurca est ex Olei sordibus: sed iis quæ præcedunt: nam sordes quæ Oleum sequuntur fæces vocantur. Colum. Amurcam Palladium dixit, satis honorificè:

Palladia sine frigoris salis confingere amurca.

In qua, teste Catone, quo diutius fuerit Oleum, eo deterius fuerit. Germ. Oeltrüfen, Olhappf. Bel. Proscem est Proscen van d'Ole. Gal. Lie d'male, It. Feca d'Oglio, Hispan. Alpechin, Borras de Aceite.

M. sanè Varro & fructus titulo dignatus est, sic scribens: Ex Olea fructus duplex: Oleum, quod omnibus notum, & Amurca, cuius utilitatem ignorant plerique.

Super omnia autem celebravit, Amurcam laudibus Catofinquit Plin. [Saxile] D. N. Olearia, [Saxile] cadōque illa imbui, ne bibant Oleum. Amurca subigi areas terendis messibus, ut formicæ rivæque abiciat, & ne Curculio noccat, neve muræ leddant. Quin & lutum parietum ac testoria & pavimenta horreorum frumētū, vestiarum etiam contra Terebines ac noxia animalia, Amurca aspergi: semina frugum perfundi: morbis quadrupedum quoque illam ad medendum efficacem, ut & ad ulcera interiora humani oris. Lora etiam ac coramata. & calceamenta, [Saxile] decocta ungi, [Saxile] atque aramenta contra ruginem, colorisq. gratia elegantioris: & totam supellestem lineam, ac testia, in quæ pecum audam libat afferre. Aut si Olivas baccasve Myrti, aliudve id genus simile. Postremò ligna macerata Amurca, acapna fieri, hoc est, nullius fumi ardore. Vitis & Amurca Apothecarum & officinarum fabricis, ubi lana vel serici panni reconduntur. Nam si calida immisceatur & et. exinde parietes incrustentur, oblianturque, item laquearia & pavimenta: non modò parietes corruptos, vel ad venientios humores nunquam collachrymant, & sunt minime contrahunt, sed nec blait. nec aranei, nec cuiusvis generis vermiculi ibidem gigni possunt.

Licet videre inquit M. Varro, de torulis, [nonnulli torculis] Olearis flere in agros, ac non lo- Denigra-  
lū denigare terram, sed multū dñe facere ste-  
rilem, cum tamen is humor modicus, cum ad mul-  
tas res, tum ad agriculuram pertineat vehemen-  
ter. Nam circum arborum radices infundi solet. Herba  
maximè ad Oleum, & ubiunque in agro herba  
nocet.



neet. Rectè igitur Amurcam petiti agricolæ tam in ollis condant, quam Oleum aut, vinum.

Expressa Oliva, ejus quod effluxerit de ea, decoquantur duæ partes, ac reliquum refrigeratum conditur in vasa. Quidam expressi Oleo, per xv. dies amurcam custodiunt, tum, quod est levissimum ac summum, deplent & decapulant, ut trajiciant in alia vasa, & hoc iisdem intervallis duodecies. In sex mensibus proximis id faciunt. Cum id novissimè faciunt, potissimum trajiciunt cum senesceat Luna: tunc decoquant in ahenis leviigne, & ad duas partes regerunt. Tum demum ad usum rectè condunt.

Nunc medicæ quoque virtutes dicendæ. Ea, in aheni cupreo ad crassitudinem mellis decocta, astringit, eisdemque quos Lycium præbet effectus, insuperque etiam facit ad denuum dolores & vulnera, cum aceto, vino aut mullo illita. Additur & in oculorum medicamenta, & que spiracula cutis obstruendi vim habent. In veterata melior evadit. Scdis, genitalium & vulvæ exulcerationi utilitar infunditur. Dentes quoque corruptos extrahit, cum Omphacio ad aëlis crassitudinem cocta & oblita. Scabiem iumentorum cum Lupinorum & Chamæleonis decocto illita sanat. Cruda verò & recens, podagricos & arthriticos calente fotu iuvat. Velleri inducitur & hydropicis inposita tumoris molem repugnat.

Eadem ferè & Plin. habet, & præbet & hinc Gingivis & oris ulceribus, dentiumque stabilitate efficacissimè subvenit. Item ignibus sacris infusa, & his quæ serpunt. Pernionibus nigrae Olivæ amurca utilior: Item infantibus fovendis. Albæ verò, mulierum vulvæ in lana admovetur. Multid autem omnis amurca decocta efficacior: usus ejus quoque in curatione aurium, ulcerum manantium, rhagadum. Vulneribus in lintolis imponitur: luxatis in lana. Ingens hic usus, utique in veterato medicamento. Tale enim fistulas sanat. Illinitur podagris incipientibus. Contra limaces & culices, cæterisque ejus generis noxiis bettiolas vim habere maximam passim apud Geoponicos legimus.

Colum. quoque tradit, ovium scabiei illitu valde prodesse præteritum decoctam.

Amurca, Galeno, terrestris est substantia, & calidè, non tamè tantum possidet caliditatis, ut palam mordicat. Cocta multò terrestrior fit, crassarum partium & sicca: & fuerit sanè ex secundo ordine exsiccantium & siccantium, intenso quodammodo magis. Sic & ulcerà corporum sicciorum curat: quæ verò in albis omnibus sunt, exasperat. Siquidem contrahit, perinde ut resina, & pix sicca, & bitumen.

Cainer. quoque Amurcam ad multos morbos utilem prædicat, & non sine commodo sæpè usurpari ait, siquidem facillè comparari possit, faciliusque, quam Lycium vel Acacia, quæ ambo plerumque adulterata ad nos importantur. Imprimis verò aliquibus locis utuntur cum Lithargyro, Ceraussa & pulvere ex foliis Vlmis, ad ulcera antiqua.

## OLEÆ VISCVM

Vix emerit ex Olivetis, nihilominus Viscum adhuc adhaeremus. Hoc non procul Hispani, in Oleis copiosè nascens observavit CLEVS. mense Ianuario, olivetorum dominos, magno damno afficiens. Integros enim Olearum ramos, crebre etiam maximam earum partem cade

re coguntur, ne latius vitium serpat, alioqui totas arbores occupaturum & steriles redditurum. Habet verò id viscum baccas non albas, quales in aliis arboribus natum, sed ex rubro purpurascens, cuiusmodi nuppiam abbrevisse se idem testatur.

Has cum in Belgum rediens columbis & aliis avibus devorandas daret, ut experiretur, an nasci vellent, arboribus impolito avium illarum simo, operam lussit. BELLON. quoque Obf. 12. simile Viscum in Oleis, Hierosolymitano agro crescere scribit, sed eas Oleas d. forte putat à cæteris Oleis, quòd Viscum ferant, baccis rubris abundè refertum, magno incolarum damno, quippe, quod Oleas steriles reddat.

## OLEASTER, SIVE OLEA SYLVESTRIS.

## CAP. II.



AT verò quæ *Descriptio*  
culturam nō  
sensit, suæ spontis *spem*.  
Olea sylv. sive can-  
tium Oleaster, ut vt  
Sativæ magnitudi-  
ne non cedat cau-  
dicis & ramorum,  
horum tamen fre-  
quentia supera-  
tur: adde quòd &  
spinas per ramos  
possidet. Folia mi-  
nora, non dissimili  
interim figura. Ita  
quoque & flores  
racematim compa-  
cti fructum præce-  
dunt, Olivæ simi-  
lem, sed minorem,  
strigiosorem, succo

purpureo mordaci præditum.

Quoniam verò Cl. L. Lustranicam Oleam sylvestrem describens, spinarum non meminit, neque picturâ suâ exprimit, ejus quoque descriptionem ascripsimus.

Oleaster inquit, instar Oleæ adolescit, illique per omnia ferè similis est, cortice tamen læviore, rarioribus ramis, minùs frequentibus, & brevioribus angustioribusque foliis, licet eorum modo circa ramos dispositis. Flos, ut in Olea sativa racematim coherens, fructus exiguis olivis similis, pauca tamen carne præditus, mucrone recurvo, è longis petiolis racematim dependens, primum viridis, deinde purpureus, postremò ubi maturuit niger, signo prægnans purpureo, qui gustatus nonnihil linguam vellicat. Tota arbor insigniter amara est. Præter nos sanè etiam Matth. spinosam observavit & annotavit, & Dod. Horridam aspectu dicunt Adu. & sentiosam. Hist. quoque Lugd. habet iconem Oleastri ualde spinosi, ex Matthiolo. *In quo differat ab Olea sativa*

Oleastro Theoph. [*ἀλυστρον* vocat] longiorem vitam tribuit quàm Oleæ: & Oleastrum Olympiz æquè à famæ & fabularum autoribus celebratum dicit, ac Oleam Athenis: Vitz autem diuturnitatem ex communi ratione sylvestrium deducit, quod robustiores sint, spissiores, fructuque infecundiores. Caudex quibusdam peculiaribus cavennulis detusis, quod & in Olea quoque deprehenditur. Eandem, cum Olea, neque terebinthi-

sentire, neque tineam ait, propter amaritudinem. Materies ei perpetua, spissa, crassa in totum Oleastrum nodo. Ex sativæ nucleis nascitur.

*Oleastro Olympionice coronati.* Supra diximus, vix adduci Theoph. posse, ut credat Oleastrum mitem fieri, quamvis Oleam neglectam in Oleastrum abire nequiquam neget. Plin. verò Oleastrum Buxi genus facit. Ex quo supra dictum, Oleastri corona Olympiorum victores coronati solitos apud Græcos: Idem tradit Oleastrum Olympiæ, ex quo primus Hercules coronatus est, ad sua usque tempora durasse cultum religiosè, quemadmodum & Oleam Athenis, quæ traditur edita in certamine à Minerva, de qua re supra plus satis. Quanquam Theocriti & Aristoph. interpretes, Callistephani Oleæ ramis, non Oleastri, coronatos fuisse Græcos tradat, cum Aristot. dicebamus, & dicitur amplius postea. Lepida est fabula Appuli pastoris Nymphas saltantes conspicientis, & sicut etiam in agresti saltu iridentis, obscenæque convicia rustica addentis, ac proinde in Oleastrum commutari:

*Metam. 4.* Arbor enim est [inquit Ovid.] succoque licet cognoscere mores.

Quippe notam lingua baccis Oleaster amarus Exhibet: asperitas verborum cecit in illis.

*Fabula Appuli in Oleastrum commutari.* Marcellus tamen etiamnum instat, fuisse universæ Græciæ quondam in maiore honore Oleastrum quam Oleam, etsi hanc Pallas maior & sapientior dea: illum Hercules heros tantum & fortis in eam intulerint gentem: alteramque Athenæ doctrinarum omnium quondam emporium, alterum Olympia, ludis Circensibus aptus campus ostenderit: ille decerptis post certamina ad coronas ramis paulatim periret, hæc verò ad pacem, erescereque, nunquam pereuntes ramos [ut aiunt] suis continuè civibus porrigeret, nihilo deteriore fortuna & honore, quam, qui ad infestos descendentes aureus in silva quærebatur ramus, quo aulico non desiebat alter. Ut illdem semper ramis fronderet in Atheniensium arce arbor: quæ æternum pacis tranquillitatisque symbolum inter homines habuit: tantò aciores ambitionis quam pacis stimulos aut natura dedit, aut ipsi sibi fecerunt.

Vno hoc gloriæ studio incensa quondam omnis Græcia, Oleastrum magis quam Oleam amavit, plûsq; ex agrestis quam ex sativæ Oleæ commodi & honoris libi speravit, non in sanitate nec in curandis tot vitæ nostræ malis, sed ut esset corruptibilis corona illa, longioris & melioris post mortem vitæ sine sensu, speciosum victoribus in Olympia monumentum. Quod æterno carmine Pindarus Lyricorum omnium maximus illustravit. Agnigentino Theroni iterum scribens: laudansque, capiti circumposuisse ex Glauca Oleæ ornamentum, quam ab umbrosis Histri fontibus in Græciam Amphititioniades Hercules importaverat honestissimum in Olympia certaminum ornamentum & præmium. Et hæc quidem Oleastri laudes in antiquis Græcorum poetis sunt. Eum quidem infelicem vocavit Virgilius noster,

*Georg. 2.* Infelix superat foliis Oleaster amarus

Sed tamen sacrum dixit Æneid. 12.

Fortè sacer, Fauni foliis Oleaster amarus

Hic steterat, nautis olim venerabile lignum,

Servati ex undâ ubi figere dona solebant

Laurenti divo, & voras suspendere vestes.

*Græcorum superstitio.* Quem locum enarrans Turnebus. Ex ritu, inquit, præter superstitionis leprosit, id Virgil. & præcipuè Græcorum, qui ante fana in Oleastris suspendere dona solebant & affigere. Illius enim

*Oleastris Servatiis, Adag.*

arboris vivacitas tanta est, ut, si multis configuetur clavis, nihil tamen ladatur. Hinc Adagium Aristoph. Plauto: *ἀσπιδόκετος πᾶσι*. Id est, in Oleastro adfigam illi, & Verrina 5. Synonym. Cic. Suspendi hominem in Oleastro iussit Verres. *Georg. 2.*

Græcis autem & dicitur, ut & *ὀλεάστριον*, vel *ὀλεάστριον*: quibusdam etiam *ὀλεάστριον*, ut scribit Diof. Lat. oleaster, Olea agrestis, vel sylv. *ἄγρια ὀλεάστριον* in Olympia, ut scribit Stephanus. Ethiopica Olea quibusdam. Photion teste Hermol. Oleastrum quandoque Phauliam dici existimat: Certè, Phaulia Olivæ genus est Colum. Plinio, Græcis omnibus. Deputato autem Oleastro, quod inde nascitur Phaunos appellatur. Streptos dicitur oleaster, cui implicite, involutæque fuerunt Hippolyti habentæ, currûque eius inversus. Hyrnition autem locus non procul ab Epidaurio Oleastris constitus, notante Curcio. Hebræi dici potest *Saib haiaar*, teste Lonic. Germ. *Yulder Oelbaum*: Ital. *Olivastro*, oliva selvatica: Gal. *Olivier sauvage*: Hisp. *Azebuche*, sed frequentius *Azuche*: Item *Azambuyero*.

Est & Oleastrum Buxi genus apud Plin. nisi mendosus sit codex, aut apud Græcum aliquem autorem ipse vel libertus eius legerit *ἀγρια ὀλεάστριον*, pro *ἀγρια ὀλεάστριον*, quod & Dal. suspicatur, ut suo loco indicatum.

Cæterum Oleastrum æquè argillas & calculos amare ac oleam ex his Virg. verbis intelligitur:

*Difficiles primum terre, sollesque maligni,*

*Tennis ubi argilla, & dumosi calculus arvis,*

*Palladia gaudent sylva vivaci Olive.*

*Indicio est tractu surgens Oleaster eodem*

*Plurimus, & strati baccis sylvestribus agri.*

Nascitur sanè talibus in locis ubi proventus in agro Narbonensi, Hetruriz locis quamplurimis cæterisque, tam Italiæ, quam Hispaniæ. Item in Dalmatiæ tractu, & in perlisq; Adriaticis insulis, teste Math. In quibusdam etiam collibus, iuxta Tagum, notante Clus. & multis Lusitaniz desertis, confragosisque locis inter ingentia faxa, præsertim non procul à Cerba, ubi magnæ eius sylvæ, in quibus Ian. mense fructum colligebat, quem cum Olea maturati dicit, sed magna ex parte ab incolis negligi, & in Sturnorum aliarumque avium escam cedere.

In convallibus montis Athos altæ arbores Olearum sylv. reprimunt sua umbra ingentem solis ardorem teste Bell.

Nascitur, uti dictum, ex sativæ nucleis. Eadem & optimè sativam recipit insitione.

Manuscelere eam tractatu, atq; in oleam abire decisis circa tales, aut omnino trāslatione, ferunt.

Ex Oliveto etiam iam insito, & casu quodam incenso, infelicem renasci Oleastrum, supra dictum. Sed & Adv. notant, alteram in alteram, transmutatione aut inoculatione, aut neglectu abire. Rigiduscula enim sit Oliva, impexo atque horridiore aspectu: interdum senticosâ, quando in saxosis defitis ejus radix pastinatio non diffilatur, aut nocturna pullulatio, & senticosa ad caudicem folioles non interlucatur.

Valdè laborat frigore Oleaster ut Theoph. annotavit.

Huic eadem vis quæ Oleæ, verum aliquantò efficacior hæc: quamquam Plin. Vires quas Diof. Oleastro attribuit, Oleæ assignaverit:

Sic autem Diof. de Oleastri viribus. Folia astringendi vi prædita sunt, quæ trita & imposita, Erythelata, Herpetas, Epinyctidas, carbunculos, nomas, redivivisque cohibent. Cruistas eadem emarginant cum inelle illita. Quin etiam

*Callistephani*

*Phaulia*

*Olea*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*

*Phaulia*



etiam ulcera sordida repurgant, panos & inflammationes cum melle imposita discutiunt, & cutem in capite avulsam conglutinant. Oris etiam ulceribus & aphthis commendata medentur.

Sed & eorum succus, ac ipsum etiam decoctum eisdem habent effectus. Admotus enim succus sanguinis eruptionem, fluxum muliebrem, oculorum staphylomata, pustulasque inhibet: insuperque ulcera veteresque defluxiones sistit. Quapropter etiam in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Ad exprimendum verò succum folia tundere oportet, & affuso vino aut aqua exprimere, illumque sole siccatum in pastillos digerere. Est porro qui cum vino exprimitur tum valetior, tum ad recondendum aptior, eo qui cum aqua expressus fuerit. Facit & ad aures purulentas atque exulceratas: Folia cum hordeacea farina illita Cæliaciis conveniunt. Videntur, autem, cum Floribus folia, ut spodij vicem præsentent, in olla cruda, cujus os luto sit oblitum, usque dum signum percoquatur: deinde vino resinguntur, iterumque vino subacta, eodem modo cremantur: postremo cerussæ modo lavantur, & coguntur in pastillos. Cæterum creduntur unctionis ejusmodi ratione in medicamentis oculorum spodio minimè cedere. Quare & iisdem viribus pollere censendum est. Hæc Diof.

Hinc patet appetere falli Amatium, & immemorem verborum Diof. fuisse, quando ait, Flores & folia Oleastri combusta, pro spodio usurpari, Arabum in vento.

Elephas Chameleonte concolori frondi devorato, occurrit Oleastro, huic veneno suo, inquit, Plinius, qui reliquis quoque Oleastri vires his complectitur. Foliorum eadem natura, [scilicet cum Oleæ foliis.] Spodium è cauliculis vehementius inhibet rheumatismos. Sedat & inflammationes oculorum, purgat ulcera, alienata explet, excrecentia leniter erodit, siccatur, & ad cicatricem perducit. Cætera ut in Oleis. Peculiare autem, quod folia decoquuntur ex melle, danturque cochlearibus contra sanguinis excreationes. Oleum tamen acritus atque efficacius: Et os quoque colluitur illo ad dentium infirmitatem. Imponuntur folia & Paronychiis, & carbunculis, & contra omnem collectionem cum vino: ijs verò quæ purganda sunt, cum melle. Miscantur oculorum medicamentis, & decoctum foliorum & succus oleastri. Vuliter etiam auribus instillatur cum melle, vel si pus effluat. Flore Oleastri condylomata allinuntur & epinyctides. Item cum farina hordeacea venter in rheumatismo cum Oleo, & ad capitis dolores. Cutem in capite ab ossibus recedentem cauliculi decocti, & cum melle impositi, comprimunt. Ex Oleastro maturi [fructus] in cibo sumpti sistunt alvum. Tosti autem & cum melle triti, nomas repurgant, carbunculos rumpunt. Hæcenus Plin.

Hipp. l. 2. morbum, mul. ad fluxum rubrum inter reliqua medicamenta sapas agere appellans, id est, Oleæ agrestis scabiem habet. Sic enim Plin. l. 17. cap. 24. *Sapas*, interpretatur, quam dicit morbum omnium arborum communem. Eandem, l. 23. c. 7. Lichena appellans. Quid si impetigo intelligenda, quam supra ex Theoph. diximus oleæ peculiarem, ut scabies in Fico?

Gratam etiam oleastri frondem Capris esse Lucretius testatur, qua homini nihil amari:

*Barbigeras Oleaster ed inuat usque capellas*

*Effluat [Ambrasia] quasi vero necesse tunc.*

*Ar. nihil est homini fronde hac, quod amarum esset.*

Oleastri materiz perpetuam naturam tribuit Theoph. & propter amaritudinem, à nulla neque terebine, neque tineæ erodit.

Minora etiam simulachra, tam ex huius quam Oleæ radicibus sculpi solita, quod rimas non admittant, & materiz æqualitate quodammodo constare videntur. Ex Oleastro etiam breviores marculi & terebris vaginz sunt, quod in totum Oleaginea nodosior sit crispa, & spissa. Ac etiamnum hodie ex Oleastro delicatiora fieri operari Germania. Cordus testatur.

Cæterum, quod ex fructu Oleastri exprimitur Oleum, potentius astringit, inquit, Diof. quam Oleastri res. vel omphacinum, & ad usum sanorum secundum, sibi locum vendicat. Caput dolentibus, rosacei vice, convenit. Sudores sistit, & defluos capillos inhibet. Quinetiam furfures & capitis ulcera manantia, Scabiem & lepras extergit: moraturque canos, si quotidie illinatur. Idem & ad gingivas uligine putri laborantes colluitur; dentibusque labantes confirmat. Eiusdem calastri & excolati foci gingivis fluxione tentatis est accommodatus. Nam specillo circumdatam in Oleum demergere oportet, ac gingivis tantisper adhibere, dum albz conspiciantur.

Plin. Oleastri Oleum tenue dicit, multoque amariùs quam oleæ, tantumque ad medicamentum utile. Gal. & cum secutus Paulus, non simplicem ei temperatam tribuunt, quippe, quod astringat simul & extergat, sed admodum squallidum dicunt. Curtius calidissimum dicit, ex omni Oleorum genere. Hoc in cibis non venit. Si quis tamen eo quotidie barbam vel capitis capillos inunxerit, canitiem remorabitur, teste Amato.

## ELÆOMELI.

IN Palmyreno Syriæ tractu, ut scribit Diof. quod Elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, Oleum crassius melle, sapore dulci. Id cyathis duobus bibitum cum una aquæ hemina, crudum biliosumque humorem alvo detrahit. Sed qui assumpserit torpescunt, vinibusque destituuntur. Attamen eo minimè terri oportet. Quin excitandi sunt, neque permittendum ut somno graviore consopiantur. Eiusdem meminit & Plin. his verbis: sponte nascitur in Syriæ maritimis [in syriæ Palmyris vet. & Diof.] quod Elæomeli vocant. Manat ex arboribus pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci, & hoc medicis. Item alibi: Elæomeli, quod in Syria ex ipsis Oleis manare diximus, sapore melleo, non sine nausea, alvum emollit. [solut vet. & c. n.] Bilem præcipue detrahit: duobus cyathis in hemina aquæ datis: qui bibere, torpescunt, excitanturque crebro. Potiores [pugnatores, alij] certaturi præsumunt ex eo cyathum unum.

Aurelian. Oleum Syriacum vocat, laudatque in Paralyti, ut mordicans, accendens, emolliens.

Hermol. reprehendit Plin. quod in maritimis Syriæ nasci scribat, cum tamen Palmyra longè à mari absit: idèò, non maritimis sed Palmyris, legendum coniecit: nisi quis, locum unde id excerpit, non Palmyris, sed Almyris, legisse Plinium existimet: quod in tanto se viro dubitare nullo modo posse ait.

Cæterum Diof. arborem ex qua manat Elæomeli.

Capit. doli.

Sudor.

Capit. doli.

fluum.

Furfures.

Scabiei le.

ppa.

Gingiva.

parulenta.

Temperat.

Liquor.

Substantia.

Sapor.

Vilus.

Purgat.

Plin. l. 24.

rest.

Oleum Syriacum.

Temp.

Plin. Cap.

Aug.

Marcelli  
epinio pe-  
culiaris.

meli ignorare videtur, non enim nominat, sed indefinitè tantum ex quodam caudice dicit: At Plin. apertè Oleas eius regionis esse testatur. Sed ad hoc cap. Diosc. Marcellus peculiarem opinionem habet: Nam [ait] Dioscoridem dicere, & sponte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici eundem docere. Imò sibi ipsi non conuenire putat, quòd primùm dicat ex quodam trunco fluere: mox humano opere etiam confici *ἐκ τοῦ κορυμνίου*: quasi Olearum furculos indicaret, quæ apud Athenienses *τὸ κορυμνίον* significatio est. Atque adeò difficile putat diversam Diosc. & Plin. historiam in hac concordem facere. Quapropter *τὸ κορυμνίον* voce corticem furculorum eiusdem arboris intelligit, quæcunque tandem ea sit: sed pro *κορυμνίον*, legendum putat *ἀλφύον*, i. cortice, idq; hac ratione: nam, inquit, ubi ex trunco arboris humor per se fluit, expressis eiusdem corticibus fluere etiam poterit: persuasitque id præcipuè, quòd, conficere verbum, eam hominis operam indicat, quæ, quod nondum est efficiat. Vnguen autem per se proprius ad Olei naturam & habitum accedit. Næ ratione caret, ut, quod in ima arboris parte per se fluit, in summo lateat, nec nisi vi & humana opera extrahi & colligi possit: præsertim, quæ ex corticibus, qui copiosiores, quàm interiores partes in pluribus humore abundant. Hæc Marcellus, qui se tamen non ad hoc decernere fateatur, ut illud penitus damnet. Ingeniosè sanè atque modestè, Nam & imperitis reuerenti rationabili-ter uideri posset, & rectè ab eo factum ut non pro indubitato decerneret. Certè nec etiam potuit. Posterior enim illa pars capitis apud Diosc. de Elæomeli, vel potius huius capitis appendix, quæ docet, ex furculis Olearum & Oleum fieri, non commiscenda neque confundenda est cum prioribus. Nam, ut dicebamus, in genere de Olea intelligendum, quod de Oleo furculorum scripsit Diosc. non de peculiari illa arbore, siue Olea ea sit, ut e quidem censemus, & specialius mox explicabitur, siue de alia quadam hæcenus incognita.

Marcellus  
not.

Diosc. ex  
plum. & il-  
lustr.

Manna.

Oleomeli  
Cordi.

Oleomeli  
duplex.

Cordus re-  
preh.

Plin. iuxta Elæomeli non meminit eiusmodi Olei.

Hæc Manna [inquit Ruell. Elæomeli: de quo loquitur, intelligens] pertinaciter iis, quibus se inserit, hæret: sic, ut non nisi cum fragminibus decerpatur. Oportuerimus sanè declarasset, ubi uiderit, unde profuxerit, quid denique de eius parente sentiat, si quidem specialem hanc adhesionis notam emulgare ausus sit.

Cordus Oleomeli [ita vocat] quòd in Syria, orbe alieno nascatur, nec authoribus constat è quam emanet arbore, atq; difficile sibi esse fatetur rē peregrinam indicare. Nouisse tamen oportere duplex esse Oleomeli, alterum quod sponte sua ex caudice defluat, & alterum, quod ex eiusdem arboris furculis humana arte eliciatur. Oleomeli similem esse liquorem, qui apud nos veris tempore è Betullæ & Quercuum caudicibus sponte sua distillat humor liquido melle crassior: & alium ab hoc esse, qui sauciat Betullæ & Ostryæ arborum caudicibus aquæ modo liquidus. Verum, quod antè diximus, id repetimus, non videri nobis duo Elæomeli tradi à Diosc. statuimusque secundum Elæomeli Cordi non dicendum Elæomeli, sed oleum.

Cornar. apertè fatetur Elæomeli hodie penitus ignotum esse, quod & Lonic. & Ryffius aiunt, magno errore implicari eos asserentes, qui Man-

nam existimant.

Lonic. non necessariam dicit quod Marcell. apud Dioscor. *ἀλφύον*, id est pinguedinem in *ἀλφύον*

mutet. Cui enim [insit] ex frondibus vel ramis arboris, cuius truncus Oleo fluat, non etiam Oleum expresserit humana opera: Quamquam, eum Oleomelle careamus, quid refert, siue ex cortice vel germinibus seu ramulis Oleum exprimatur?

Quamquam verò quotidie plura, varique mercumoniæ genera nobis ex Syria conuehantur, Elæomeli tamen, inquit Marth. quod sciat, non modo non conuehi, sed ne ullum quidem audivisse, qui ipsum viderit vel noverit. Idem ait & Diosc. & Plinium communiter eorum sententia, quibus eum longam contraxerant consuetudinem, scribere, Elæomeli Oleum esse: & Diosc. addere non modo Elæomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi tuis furculis. Quibus sanè verbis bis impingit Marth. Non enim scribit Plin. quod hæcenus quidem legerimus, Elæomeli esse Oleum: Nec etiam Diosc. dixit ex furculis fieri Elæomeli. Apud Diosc. suspicamur *ἰλαίον* vocem superfluum, quandoquidem à Plinio omissa.

Amatus quoque Elæomeli Europæ incognitum dicit, & quærit in India ex Nuce uel Palma Indica.

Sed huic historię maximam lucem attulerunt Pena & Lob. eum scribunt. Olea Montpelij in vinetis duplicem perquam nobilem fundunt laticem: nimirum Oleum bacæ callo: & mel siue Elæomeli, quod mirum dictu, sed verissimum, caudice vulnerato. Atque ex Olea arbore vulgari perquam amara tota & ingrata, cortice, caudice, fructu nondum sale condito, emanare verè melleum, non solum colore, sapore, sed etiam duratione incorruptum experti sumus. Habemus namque, partim iam duodecim abhinc annis collectum à 'Rondeletio præceptore, partim à nobis quinque ab hinc annis, cum eò nos duxisset Stephanus Barralius, Montpelienis Dioscorides, vocatus, atque in tenellis ramis & stipitibus Olearum arborum, tam in foliis diutius affatum nos latere monuisset. Tunc enim timosis è corticibus, partim scalpello sauciatis, satis excepi-mus, non modò ad explorandum, sed etiam ad amicis impartendum. Verum, non nisi propemodum penè matura Oliva ac nigricante vel purpurascante, quam Novembri & ingruente hyemis sæuitia decerpunt, quicquam reperiet mel istud, ut nos plebecula monebat, quæ interdum tantam copiam ramis aggestam se vidisse una aut altera die ante vel post D. Catherine festum aiebat, ut, aviditati explende, pueri & mendici eò certatim confluerent. In proximis vinetis pone sanum fune cinctorum Franciscanorum, via ad Latræsem portam, etiam non nihil emanabat, & plurimum ferebatur Lunellæ extillare, præsertim se ætis maioribus truncis, è quibus initio melle liquidior latex glutinosus effluebat, postea inibi residens aliquandiu, frigore densior evadebat, atque, non tam mel quàm Mannam veram præ se ferebat, specie, gustu, sapore, concre-tione, omnium commilitonum iudicio qui degustarant, inter quos Jac. Vtenhouius Candauensis, generosus, & multatū literarum medicus doctissimus. Quin iam, dum hæc proderemus, eum multalij degustarant & mirati sunt, tum Medici singulae eruditionis, vniuersæque materię medicæ consulessim D. Parisiensis Drouetus, & D. Pomus Anglus. Hæc illi.

Ceterum, quidam, [ut Hermol. suspicati sunt] Aeromeli siue Mannam, esse Diosc. & Plin. Elæomeli siue Oleomeli: sed multi eam opinionem rejiciunt, nec sine ratione, ut ostendimus l. 8. c.



de Manna. Eorum verò opinio, qui existimant E-  
lzeoneli esse ex Palma Indica nucifera, recta est  
13. ubi de illius Palmæ liquore traditur.

### OLEA ÆTHIOPICA EIVSQVE Lachryma CAP. III.

STRABO Geograph. lib. 16. scribit esse infulas in  
Arabia tres desertas, Oleis obitas, non no-  
stratibus, sed indigenis, quas Æthiopicas vocat,  
earumque lachrymam medicam vim habere: quæ,  
autore Dioscor. [qui *ἰατρικὴν τῆς Ἀλφειοῦ τοῦ ὀλέου*  
Æthiopicæ Oleæ lachrymam vocat] scammonio  
quodammodo similis est, fulva, stillis constans e-  
visilibus, æque mordax. Quæ verò gummi & am-  
moniaci similitudinem refert, colore nigricans,  
nec gustu mordens, inutilis censetur. Nostrates  
Oleæ Oleastricæ talem lachrymam fundunt. Facit  
porro illa ad visus hebetudines, & oculorum  
cicatrices abuginæque illita emendat, utinas  
mensetur, ciet. Erosorum dentium cavis indita, ad  
eorum dolores efficax est auxilio. In medicamen-  
ta quoque extulsi prædicta refertur patulique  
etiam pellit: & impetiginibus ac lepræ medetur.  
Appellatur autem Æthiopia Olea etiam Olea  
sylvæ estis. Hæc Diosc.

Verum Paulus, l. 7. rei Med. Oleæ Æthiopicæ  
lachrymam non Scammonio, sed Ammoniaci tenui,  
hoc est, gutta Ammoniacæ, quam vocant,  
assimilavit. ut *ἰατρικὴν τῆς Ἀλφειοῦ τοῦ ὀλέου*  
apud Diosc. non inenpestivè Sarracenus,  
*ἰατρικὴν τῆς Ἀλφειοῦ τοῦ ὀλέου* legendum suspicetur. Nec ob-  
stare putat, quod paulò post subdit Dioscorid. lachrymam  
Ammoniaci similem inutilem & inefficacem esse. Nam de ea lachryma, quæ Ammo-  
niaci vulgare, nimirum crassius, fordidius  
impuriusve refertur, hoc accipiendum existi-  
mat.

Hermol. annotat Oleæ Æthiopicæ lachry-  
mam in pretio esse. Et tamen nescit quid sit.  
Subdit enim: Sit hæc Arabica quæ & ipsa dotatur  
lachryma, nondum constat mihi, quamquam pu-  
to eandem esse, quoniam in Arabici sinus deser-  
tis tribus infulis, ut inquit Strabo, nascitur: ut-  
cunque in Arabia stillat eam Olea, qua medica-  
mentum conficitur *ἰατρικὴν* appellatum, singulari  
effectu contrahendis vulnerum cicatricibus.

Sunt qui hoc esse putent gummi genus illud,  
quod Neoterici Elemi quasi Enhæmi appellant:  
ad ossa etiam fracta calvæ conglutinanda cantari-  
ssimum. Oleas autem has in Arabia nasci ait  
idem, in maritimis & fluctibus, æstique operiri  
Rubro mari: nec bæccæ noceri, cum consistet &  
in foliis silem relinquit.

Ex Æthiopia usque [ut ex Comico ait Mar-  
cel.] Æthiopice oleæ lachryma quondam Græ-  
ciz importabatur.

Non, ideo, parum certam eius in Græcis & La-  
tinis gemirabitur aliquis historiam, quam ab ex-  
tremo orbe & incosui calore Solis gentib. didi-  
cisse oportebat. Neque à nobis desiderabit quis-  
piam, quæ in tam longinquo & inaccessio orbe  
nascenda cognosci ætate nostra non possunt.  
Nescimus enim nos an ad mare hæc lachryma Ole-  
æ sit in Arabia nascentis quæ in rubri maris,  
litoribus vivens, fluctibus & æstu aliquando o-  
peritur, saltemque in foliis ostendit.

Plin. inter Æthiopia arbores eius non memi-  
nit: distantque tam longo intervallo inter se  
Æthiopia & Arabia, ut non verisimile sit, quod

in Arabia nascitur, Æthiopiæ à Diosc. tributum  
fuisse. Nec mirum ignorari hoc tempore rem,  
cùm Paulus ex aliorum fama potius, quam ex  
plantarum historia dicat, dicere quosdam Olea-  
strum esse Æthiopicam oleam, quod utique ex  
Diosc. hausit. Ruell. tamen Oleam Æthiopicam  
omnino separat à sylvestri olea.

Oleastrum in Æthiopia lachrymam hodie inco-  
gnitam Cordus quoque fatetur: quosdam tamen  
esse dicit, qui existimant esse Gummi dictum Ele-  
mi, sèque id neque negare, neque asserere.

Nos verò de Gummi Elemi egimus, l. 5. post  
arbores Molle, cujus lachrymam esse puta-  
mus.

Quid verò ipsam arbores oleæ Æthiopicæ  
attinet, idem Cordus ait, considerantibus eam,  
eiusque mareem, nullam inventam esse, quæ æ-  
que eius habitum referret, ut lignum quod Rhodij  
aut Rhodisij cognomine circumfertur. Sæpil-  
simè autem ignaris pro Agallocho, hoc est, Xyloa  
loc substituitur, de quibus suo loco.

Ex eadem aut simili coniectura Cæsalp. Ad si-  
mulachrum, inquit, perpetua hodie Oleastrum Rhodij  
maximè expetitur, maculosa facie, præden-  
sum, ut quodam modo Agallochum Indicum  
æmuletur, impostoribus adulterandi artem præ-  
bentibus. Et addit: Oleaster, id est, sylv. Olea in  
Æthiopia lachrymam fundit. In mari rubro pecu-  
liarem de scribit Theoph. è cuius lachryma  
medici medicamentum componunt sistendo san-  
guini. Plin. Enhæmi non appellari scribit Oleæ lachry-  
mam in Arabia. Fortè fuerit gummi Elemi.  
Hæc ille.

Verum has coniecturas alibi explosimus, præ-  
sertim de Elemi resina, sicut & Apollinis. Quod  
de mari rubro peculiari addit ex Theoph. sciat, aliud  
esse marinum, sive in mari: aliud iuxta mare,  
sive maritimum, quod in littore vel tractu mari  
vicino nascitur. De olea, autem marina Theoph.  
trademus ultimo hujus operis libro D. V. inter  
marinas plantas.

### OLEA ΚΑΛΛΙΣΤΕΦΑΝΟΣ ARISTOTELIS.

#### CAP. IV.

IN Pantheo inquit Arist. Olea est, quam Calli-  
stephanum vocant, omnia folia reliquis Oleis  
contraria forma producent: Quippe, quæ supi-  
nam non pronam partem habeant viridiorum:  
ramos mittit quemadmodum Myrtus, unde &  
sumpta plantula Hercules in Olympiis Oleam  
plantavit, athletis coronas suppeditantem. Di-  
stat ab Ilisso fluvio stadiis LX. muro circumje-  
cto thunita. Ac ne quis tangat, grandi pœna ca-  
vetur. Hinc & Oleæ excerptum furculum, in O-  
lympio campo plantarunt, ut victores inde coro-  
nis donarentur. Apud Pausaniam quoque legi-  
tur Oleastro Callistephano victores Olympios  
coronari solitos, siquæ solam eam Oleam quæ in  
Olympia nascebatur vocatam, quemadmodum in  
Academia satam, Moriam Græci dixerunt, ut A-  
ristoph. & Pollux prodidere. At Theocriti in-  
terpres cum Aristoph. & Arist. Callistephani Ole-  
æ, non Oleastri, ramis coronatos fuisse una-  
nimi consensu scribunt. Mirum verò à solo  
Aristotele annotatum Oleam hanc à cæteris di-  
versam, & à nullo alio, præter iam citatos auto-  
res, qui tamen differentiam hanc non tradunt, il-

Descriptio]

Herculis  
Olea.





Ariana appellatur, cuius spina lachrymarum pretiosa, Myrrhæ similis, accessu propter aculeos anxio. Ex sole nimirum accessum anxium fecit, & pro Illyria, ut in vulgatis nostris habetur, Myrrham apponit, nisi quis hanc ipsam Illyricam lachrymam dicendam velit. Strabo l. 15. Gedrosiam ferre Myrrham & Nardum scribit. Est autem Gedrosia Arianae contermina.

## NIMBO FOLIO ET FRUCTU OLEÆ.

## CAP. VIII



AB omnibus India incolis Nymbo vocatur, inquit, Garcias, arbor quædam Fraxini magnitudine, folio Oleæ, acutiore tamen, per ambitum serrato, utriusque parte viridi, non cinereo aut villosa. Multis luxuriat foliis. Flos cæcidus est, & Fructus exiguis Olivis similis. Eodem ferè modo & Costa describit, & ait procul aspicienti Fraxino perisimilem hanc arborem videri, folia esse mucronata, gustu amaricante: ramos multis foliis luxuriare, floribus abundante exiguis, albis, quinque foliolis constantibus, flavis in medio staminibus, Lotus sylv. five Trifolij odorati odorem referentibus: fructus parvis Olivis similes esse, subluteos, cortice admodum tenui præditos, & nasci ex ramulorum alis. Miramur porro à Costa hanc arborem Fraxino perisimilem dici, cum tamen id ex icone non appareat. Sed nec Oleæ foliorum similitudo hic conspicitur, quam Garcias, tribuit, quod Costa tacet. Castor Durantes ab omnibus Indis Nymbo vocari ait, Malabaris verò Bepolo etiam, teste Costa.

Vtilis est hæc arbor, ipsædem autoribus, in usu medico. Nam folia trita & vulneribus, cum hominum, tum iumentorum cum succo Limonum imposita, miraculosè ea sanant. Foliorum succum vtilem esse ferunt lumbricis necandis, cum Balaguat incolæ, tum Malavarenses, quod rationi consonum est, cum non nihil amaritudinis possideant. Exprimitur in Bismager & Malavar Oleum ex eius arboris fructu, quod huc mercimonijs gratia deportatur. Vtilissimum, id est, adversus nervorum dolores, si eo calido inungatur. Rara admodum est hæc arbor & in medico usui admodum commendata tam à Christianis, quam à Gentilibus, reliquisque India provinciarum incolis. Folia cum prædicto succo imposita, non modò simplicibus vulneribus, sed & sordidis, cupiculosis callosisque misicè conferunt: digerunt enim, emendant, sarcotica sunt, & ad cicatricem perducunt. Foliorum item succus ad necandos & expellendos omnis generis lumbricos, vel per os solus sumitur, aut ex vino, aut aqua, aut gallinæ iusculo, sive umbilico impositus solus, aut

Tom. I.

cum fellis bubuli momento, aut aceto, aut aloë. Quamobrem familiare admodum & perquam salubre medicamentum est omnibus illius regionis incolis, præsertim Malabar provinciæ, quoniam lumbricis valdè sunt obnoxij, Magnus est etiam eorum usus, tum florum & fructus in articulorum doloribus, tumoribus, membrorum debilitate, & apostematibus. Oleo quoque Malabarenses & vulnera, & nervorum puncturas atque dolores & contractiones curant.

Arthritis  
Tumores  
Apostema

ZIZIPHVS CAPPADOCICA:  
quibusdam Olea Bohemica.

## CAP. IX.



MULTORVM Descriptio.  
Mensis Ziziphum albam hæc dixit arborem iustæ magnitudinis, cuius patulos ramos cortex levis, cinereus vel candidans obteguit. Folia mollia longius à Ziziphi folijs recesserunt, saltem propiora, aliàs alternatim, aliàs ordine nullo per ramos nascentia, se scundiam circiter longa, unciam ferè lata & angustiora, tota albicantia, potissimum

parte inferiore, brevique & molli lanugine prædita, modicè obtusa, brevi pediculo herentia. Ex quorum alis flosculi emicant argenteo pallore renitentes, odorati, vel ut Clusius ait, gravem, non tamen iniucundum odorem spargentes, & caput ferientes. Bacce sublongæ, exiguis Olivis aut Ziziphis similes, albæ, fungosæ & dulci carne sive pulpa, saporis aciduli osseo intus nucleo canaliculato. Rami interdum spinosi sunt. Materies flavicat, non admodum firma.

Flosculi  
Odor.

Bacca

Materies

Colum. hanc albæ Ziziphi nomine intellexisse videtur, l. 9. c. 4. ubi & rutillæ meminit. Plin. Coronarum [inquit] quæ varietate sola placent, duo genera, quando aliæ Flore constant, aliæ folio: Florem esse dixerim Genistas item Rhodendron: item Zizipha, quæ & Cappadocia vocantur: his odoratus similis Olearum floribus. Idem alibi Cyprum Ziziphi folia habere dicit. At Diosc. Cyprum dicit habere folia Oleæ. Scribit Bellon. In Insula Lemno duas species Iuiubarum provenire, quarum una satis cognita sit in Gallia, quæ falsò multis in locis, tum Parisiis, tunc alibi dicatur Olivaster. Sed Iuiubar albas dicendas, quas Colum. non ignoravit. Idem alibi scribit, apud Heracleam agrorum sepes ex arbore Zizipho albæ [Iuiubar blanc.] Columellæ dicta, factas, cui fructus similis sit Zizipho rubræ, excepto colore, quem Græci in urbibus venalem proponant, & vulgari nomine corrupto Ziziphia vocitent. Idem libello de ratione curandi arbores sylvestres, à Plinio Zizipham Cappadociam appellari censet. Hanc etiam intelligit Amatus, cum ait: Salix Amerina dicta, quam Hispani arborem Paradisi vocant longè differt ab Agno Casto seu Vitice. Gesn. &

Olivaster

Ziziphia

Salix Amerina

Paradisi

C 2

*Ziziphum album* & *Oleastrum* speciem quibusdam dictam notat.

Math. tradit arborem quandam nasci & vocari in Bohemia *Oelbaum* : sed non esse veram *Oleam* : se existimare esse *Elaeagnum* Theoph. ac omnibus ejus notis adscriptari. Esse enim fruticosam, folio *Vitis* simili, molli ac lanuginoso : flore albo gradatim virgis propè foliorum exortum prodeunte, odore non infirmi, & quo nullus proveniat fructus. Huic aliam per omnia similem haberi Viennæ Austriae in vindario Sereniss. Cæs. Ferdin. quæ baccas profera. *Olea* figura sed longe minores, apice in summitate aculeo simili. Ac addit hanc quoque sibi *Elaeagnum* videri appellari posse, quoddam folio ac virgis *Agnum*, fructu verò *Oleam* referre videatur : uti licet Theoph. *Elaeagnum* non esse, quoddam sterilem sit, non fructum ferens, nisi fortasse deceptus sit Theoph. vel eius codex depravatus.

In Histor. Germanic. eandem Bohemus *Oleam* dictam ait ramos habere similes salicis cum aliquibus spinis : Florem album esse, fere fructus vel locis ubique similis, virentis, nisi essent minores, & superius acutæ. *Oleam* & *Oliua* a Bohemice vocat, Germ. *Behemischer Oelbaum*. In Epitome, Matth. icon proponitur sine descriptione pro *Elaeagnum* Theoph. quasi craticulum quoddam Apollinis. Sed neququam convenit descriptioni Theoph. Florentiam enim non est *Potuli alba*. Et distinctio illa quam putat, parvi est momenti. In Hist. Germ. non distinguit & ait *Oleam Bohemicum* fructum ferre, quod prius negaverat. Aded constans sibi est, uti passim.

Solent quoque volebat *Elaeagnum* esse, & in Diosc. pro *ῥαῖς* legendum esse, quod *ῥαῖς* non est vel *ῥαῖς* non est.

*Scissum* Aethiopicum, ut tradit Rauwolf. in suo itin. Arbuscula est, vel potius frutex spinosus, cuius folia *Sassa* [de quo suo loco] dicti foliis utrinque similia. Locis gaudet udis, viarum item marginibus & arbutivis sepibus. Ex unica radice plures erigunt stipites, levi rufoque cortice textos, in varios brachiatos ramos, oblongos, firmos, spinis hinc inde munitis, quibus adherent flosculi foris candidi, intus luteoli, tergemini, 3 drey vnde drey] & foliorum geniculis emicantes. Fructus sibi non visus. Non sine coniectura tamen putat *Olea Bohemicam* fructum, aff. brè à Matth. depictum, æmulari. Caterum tam suavem primo Vere spirare odorem, ut prætereuntibus, licet ignota, facillimè innotescat, eosque ad se alliciat. Ideo à Turcis & Aethiopicis in farta concinnari atque corollas, ut suis conclavibus parlem odoris suavitatem conciliant. *Scissum* dictum videtur atque detorto à *Zizipha* nomine.

Non desunt, inquit, Clus. qui *Ziziphum album* Iovis barbam, Plin. l. 16. c. 18. esse existiment. [Anquil. tamen duas alias proponit] Nonnulli etiam *Elaeagnum* Theoph. (quam tamen describit) vident, nihil aliud, quàm *Salicis* genus esse, & aliquando existimavi *Salicem laurifolium*. Sed perlecto Rauwolf. & Hodep. perico, animadverti ipsum aliam arborem observasse, *Sassa* appellatam, quæ ad *Elaeagnum* magis accedere videtur. Vulgus plerisque in locis *Oleastrum* appellat, & legitimum esse putat. Castellani & Granatenfes *Arbol Paraiso*, hoc est, arborem *Paradysi*. Galli, *Laurier blanc*, & *Olivastre* *Olea sylv.* septentrional. & *Elaeagnos* Theophrast. foliis viticis, Lob. Ital. *Zeingale*. *Ziziphus* Cappadocia Dod. & Cramer. qui & *Ziziphum album* esse Colum. consen-

tit. At Schuenckf. aliorum nixus iudicio secutus. Schuenckf. *Zeingale*, Theoph. pronunciat, eique flores *Salicis* affinxit luteos.

Caterum libet huius plantæ historiam quondam à Doctis. DALECHAM. cui cinnamomum, qualem ab eo accepimus, huic nostræ intertexere, quod multa in ea trulantur ab aliis non observata, & ut is suo labore ac honore non defraudetur : Illa autem sic habet.

*Ziziphus* Cappadocia Plin. in hort. s. quibusdam Lugdani visitur, ex Rhodo, [quod narrant] ab Elagium Rhodiorum procuratore & quæ flore ætatem, olim advecta, priusquam Solimanus Turcarum imperator, in potestatem suam eam insulam redegisset. Arborem *Paradisam* vocant, ob suavissimum floris odorem. Quamquam & hoc nomen alijs etiam tribuitur, ut, Thui odorata. Quidam *Salicem peregrinam*, ob foliorum cum *Salice* similitudinem.

Crescit ad magnitudinem *Salicis*, radicibus multis, crassis, huc illic diffusis, & loci plurimum occupantibus per summam terram vagis, stolones multos mittentibus, qui nisi tollantur matrem emaciant, & absumunt : avulsæ verò & depactæ vivunt & arborefcunt : cortex albicat, in stipite valde rugosus & crassus, in ramis tenuior, & molli quadam lanugine pubescens. In multis porro & longos ramos arbor finditur. Folia candida densa, oblonga, *Olea* sativæ similia, multa uni furculo adnexa, qui in longam validamque spinam desinit. Flos *Elaeagnos*, aureus, in sex cuspides dissectus, priusquam se pandat, in alabastrum fastigiatus, ex viridi candicans, parvus, Rhamni 2. nostratis aut *Mali Citriz* figura, velut flosculis confertis, pendulus, ternis ferè simul ad imam foliorum partem emicantibus, odoris iucundissimi, mea quidem sententia suavitatem floris *Mali Citriz*, quæ summa inter nos habetur, superantis. Pro fructu parva bacca est, *Olea* sylv. similis, sed minor, brevi pediculo alligata, viridis, & qua patte magis solem excipit, rubescens, lanuginosa quodam pulvisculo obrita, gustu subacido, sed carne valde sicca & exucca, qualis est caro *Oxyacanthos*, cum maturuit. Talex huius arboris excise, & in terram defixæ, *Salicis* modo facillè comprehendunt & radicantur. Belluneosis Avic. interpres Chalef arborem describit, quam quidam hanc ipsam esse volunt. Ego equidem discrepare puto, quamvis in utriusque flore par sit odoris gratia, quod editis iam folijs *Ziziphus* hæc floreat, Chalef verò antequam folium exoriatur. Item, quod baccis *Ziziphus* hæc gravari solet. Chalef autem nullum fructum præbeat. Non tamen dubito quin ex huius *Ziziphi* floribus in operculata concha præstantissimi odoris aqua stillare possit. Oleumque ex iis cum Amygdalis tritis præparari, modo à Belluneis recitato, odoris fragrantia excellens & pretiosum. Hæc ille.

Pro apum pastu probatissimos flores dicit Columella alba & rutile *Ziziphi*.

Hist. Lugd. aliam habet titulo *Ziziphi Cappadocicæ*, in qua plures spinæ. Eadem & aliam iconem proponit nomine *Oliæ Bohemicæ* siue *Elaeagn.* Matth. quæ eadem ab ipso meto autore historice existimatur cum *Zizipho* Cappadocia. Clus. quoque aliam habet.

Placet ramus apud Cramer. in Matth. epitom. depictus, & in Histor. Germanicæ desinit spinæ.

Censor hist. Lugd. in suis Animad. scribit: duas in ea esse figuras unius plantæ illam novam, hanc Matth. oli,

*Olea Bohemica*  
*Elaeagnos*  
*Theoph.*

*Alea.*

Non esse *Elaeagnum*.  
*Theoph.*

Matth. error multiplex.

*Scissum*  
*Aethiop.*

Locus.

*Ziziphus*,  
*al.*  
*Iovis barba*  
*ea.*

*Oleastrum*  
*laurifolium*  
*vulgi.*

*Olea sylv.*  
*septentr.*



Matthioli, hancque sufficere potuisse, siquidem non ostendit differe. At sufficere non potuit nec placuit Dalechampio, quod flores in ea non pingantur eo ordine ac numero, quo solent provenire. Dalech. equidem maluit spinosam pingere, quod ab eo factum antequam Matth. Olive Bohemicæ meminisset. Cur igitur non exhibuisset utramque, siquidem fuerint ad manus.

Hoc est nodum in serpo quarere, ut ne quid gravius excidat. Imò in renovata quoque Matth. editione nova apposita icon cum spinis à priore diversa. Cortusius aliquando Patavio ad nos misit pro Cypro quorundam.

Luteæ & in aliis urbibus vicinis magna copia est non ferentium fructum, aut si ferant, non perfectè maturescit. In Syria quoque nascitur. Apud Heracleam sepes ex ea sunt, teste Bellon. Provenit etiam in Æthiopia, & in monte Libani, notante Rauwolf. Lugduni, in horto Cænobij D. Eizenro sacri, lætissime & nuditissime arbores hoc genus aliquot luxuriant. Spontè provenit in Bohemix sylvis & hortis circa domos, Matth. Londini, Antuerpiæ & alibi in Belgio passim hortenſis est, sed fructus in Belgio non matureſcit. Laufannæ & Geneva alibique in Sabaudia in hortis colunt, ut & Norinbergæ. Crescit spontè in sepius cum Rhamno & Vitice iuxta urbem Guadix in regno Granatensi: & in omnibus ferè vitidaris alitur non modò per Hispanias; sed etiam per Galliam & Germaniam.

Floret æstatis initio fructus autumnò matureſcit: sed rarè admodum frigidis regionibus fructifera est. Clus. Apud D. Baronem à Schuendy bæccas plures Septembri maturas legimus in Alſatia.

Plures furculos in horto E. C. Montb. pangi curavimus, ab Hugone Bauhino celebri Chirurgo Patris nostri ex Matrifodinis missis, qui penè omnes feliciter provenièrè, & quidam etiam iam in arbores adolevere, annua iam florescentes, quamvis rariùs fructum perficiant. Hyemem ferunt, licet extrema interdum frigore adurantur, subinde tamen repullulat, vel caudex, vel radix.

## ZACCON HIERICUNTEA, FOLIIS OLEÆ.

### CAP. X.

**C**AST. DURING. memoriæ prodidit, quod Zaccon de Hierico arbor sit magna, ut Aurantia Malus, spinosa, cum paucissimis foliis, Oleæ similibus, angustioribus, acutioribus, virentibus, ut Aurantia. Cui Flores albi: fructus verò magnitudinis Prunorum, rotundi primò virides, luteoli maturi: ossiculum, in quibus, ut in Pruno. Provenit in planitie Hiericuntea. Oleum ex fructu utile affectibus frigidis.

## DE RHAMNO.

### CAP. XI.

**M**VLTA hodie Rhamni species innotuere, quas omnes ad priscorum scripta referre difficile est. Quapropter ut confusio evitetur, libet primùm veterum tradita de Rhamnis, aliisque nonnulla generalia in medium proferre.

Tom. I.

Thephrasio Rhamnus duàm generum: niger & candidus: diversisque eorum fructus. Vterque tamen spinosus. Hæc in historiis. At in de causis Rhamnum in genere sempervirentium, collocat cum Hedera, in quo, genere rara esse dicit quæ germine ac fructu præveniant, hoc est, tempestivè germinant, fructumque proferant, ut modò dixi. Quoniam verò Theoph. Rhamnis subiungit Paliurum, quem Diosc. tertium Rhamnum facit, dicenda quoque sunt quæ veteres de illo Paliuro scripsèrè: postea verò cap. de Rhamno folio Iuviuno demonstrabitur, an differant, nec ne.

Sic igitur scribit Theoph. de Paliuro isto: Paliurus fructum habet in siliqua quadam veluti folio, vel foliaceæ: sic enim legimus apud Theoph. in loco tibi non oportet in hunc modum scribere: non utin vulg. legitur quod tibi non oportet in hunc modum scribere, ut sit hæc tibi non oportet in hunc modum scribere, ut dixit Diosc. de tertia Rhamni specie, quæ nihil aliud est, ut dicebamus, quàm Paliurus hæc Theoph.] in qua terna aut quaterna gignuntur semina, quibus confusus medicatur ad tussim, quippe quæ lentiora quendam habeant cum pinguedine coniunctum, velut semen Lini. Nascitur locis humidis pariter atque siccis, sicuti Locus Rubus: nec minùs etiam iuxta aquas provenit. folis est deciduis, non perpetuis sicuti Rhamnus. Germinant ineunte Vere, & reddunt semen circa Vergiliarum occasum Paliurus. & Oxyaca: thus.

Inter genera Ruborum, inquit, Plin. Rhamnus appellatur à Græcis candidior & fructicolis. Is floret [has duas voces omittit Corn.] ramos spargens rectis aculeis, non, ut cæteri, aduncis, foliis maioribus. Alterum genus [eius, Corn.] sylvestre, nigrius & quadantenus rubens. Fert veluti folliculos. Huius radice decocta in qua fit medicamentum, quod vocatur Lycium. [Hoc salum & à nemine prodictum, Dal.] Semen secundam trahit. Alter ille candidior attingit matris, refrigerat, collectionibusque & vulneribus commodatur. Folia utriusque & cruda & decocta illinuntur cum Oleo.

Nicander in Theriacis ἀλεξάρην ῥάμνον vocat: ἡ γὰρ ἀλεξάρην [inquit] πρὸς τὸν ἀπομάρψαι ῥάμνον. Tradit autem ieiuniis datam, interitum à venenatis repellere. Interpret. ἀλεξάρην ῥάμνον ἢ ῥάμνον ἐστὶν ἀραδὴ ἐστὶν ἀραδὴ τὸς ὑπὸ ἐπεταῖν πινυλῶς τῷ πρὸς τὸς, ἀλλ' ὅτι κίς φαντάσματος γενέται: Alexiara dicta est, non modò quòd bona contra serpentium ac reptilium ictus, sed etiam quòd defendit adversus spectra: nempe, quia nocturnos Incubos, Leuantes, Striges avertit efficaci amuleto: quo argumento in parentationibus antè fores suspendebatur.

Meminit & Lycophron & Euphorion his verbis: ἀλεξάρην οὐβὲ ῥάμνον. Spinam Ianalem hunc esse volunt celebratam ab Ovid. in Fastis. Vbi de Iano & Carna.

Nympha iubet quare de more remotius antrum

Vrque comes sequitur, destruitque ducem:

Strata [videt] Ianus qua post sua terga gerantur]

Nil agis & latebras respicit ille tuas.

Nil agis eni dixit: nam te sub rupe latentes

Occupat complexu, & teque potius ait:

Ius pro concubitu nostro tibi Cardinis esto:

H. c. pretium posita virginitatis habe.

Sic facis spinam, &c. Vid. pag. seq.

Eadem hæc causa fecit, ut à Proserpina, inferno Numine, spina hæc Persephonias dicta ab aliquibus fuerit. Persephonem enim Græci Proserpinam dicunt.

A colore Leucacantha, & est, alba Spina, & Cer. Spina






Ita sat rationum adduxisse videbimur, cur veterum de Rhamnis & Paluro placita, specialiori historiae præmittere voluerimus.

Cæterum *Rhamni* nomen variae plantæ à variis autoribus obtinere. In primis est ille, quem vocamus *Rhamnum cortice albo Monspeliensem*, de quo mox. Cuius duæ fortè species Bellonio, fructu rubro, & nigro. Traditur etiam dicti *Rhamni* alia species. Sequitur *Rhamnus sive Oleaster Germanicus*. Tum *Rhamnus* 3. *Clus.* cortice nigro, flore herbacei coloris. *Rhamnus* 3. *Diosc.* sive *Palurus folio luteo*. *Rhamnus* etiam 3. *Dioscor.* existimatur frutex dictus *Pyracantha*. *Rhamnus Catharticus*. *Rhamnus Bavaricus*. *Rhamnus solutinus* sive *spina insectoria Pannonica*. *Vea crispa* sive *Grossularia* à quibudam putatus *Rhamnus*. *Rabum caruleo fructu* quidam fecerunt *Rhamnum*: de quibus omnibus suis locis traditur. Nunc autem eas trademus differentias, quæ proximè ad veterum descriptiones accedunt, aut similitudinem aliquam cum iis habent.

### RHAMNVS CORTICE ALBO Monspel.



**R**hamnus primus, frutex est magnus totus spinis armatus, in caudice quidem magnis, ut *Oxyacantha* Matth. in ramulis minoribus, cortice albicante: & quod observatione dignum, grandiores illi aculei, palmarum circiter longi, rigidi, acuti, ex ramis enati, alios pariunt aculeos parvos, non minus rigidos pungentique, eodemque loco folia

magnitudine varii. Rami unâ cum spinis cortice teguntur cinereo, folia sustentantes Salicis, terna vel quaternâ, indidem orta, fragilia, candidantia, succulenta, nullo insigni sapore prædita. (Vere naturæ ramorum rationem folia magna, spinæ parvæ) Flores pauci, Laureolæ folio deciduo similes, parvi, subcæreulei. Fructum non observavimus, nec etiam *Clus.* qui ait rudimentum, ut in *Iasmino*, relinquit: crassaque & multiplici radice firmari. *Cæsalp.* dicit baccas ferre parvas, Oleæ figurâ.

An autem *Theoph.* & *Plinij* hic sit *Rhamnus* candidior considerandum. Item an *Dioscor.* primus? *Plurimi* senè ita statuunt, ut mox apparebit. Nos quoque non negamus. Videtur autem nobis *Marcel.* hunc intelligere, cum scribit: si quis diligentius quaesiverit, facillimè deprehensum offendere volentibus poterit. Videtur autem insinuare voluisse, inventu facilem esse *Florentia* ubi ille sua commentaria scripsit. Si *Dioscor.* in describendis suis *Rhamni* speciebus duabus, meminisset foliorum facilitis eius *Rhamni* nostros conferre aut accommodare possemus: in quo sanè fatendum, cum fuisse negligentior. Opinione communem esse scribit

*Anguil. epist.* 3. Primam *Diosc.* *Rhamni* speciem esse eam spinæ speciem, quæ Romæ vocatur *Spino* no santo, & in *Abruzzo* *Spino di Christo*. Intel-  
ligit autem hanc nostram. Eadem à *Marcello* lib. de re medica. ali vocatur *Salutaris* & spinæ alba: sive herbæ fasciculum: id est, spinæ albae quæ *Christus* coronatus fuit. Secunda in omnibus huic primæ similis est, nisi quod albidior & folia longiora & angustiora. Iam multis in locis *Sclavoniae* reperitur, acibi sepes ex ea fiunt. Potest etiam *Patavij* in port. *Zurra* videri propè veteres muros.

In insula *Lemno*, inquit, *Bellon.* facile provenit frutex *Rhamnus*, ex eo constantem eorum sepes retinet nomen antiquum, ac dicitur *Rhamnos*. Item alibi. In *Macedonia* agri, potissimum colles, fruticibus *Rhamni* & *Paluri* occupantur, ita ut arva etiam culta rependo invadant. Agri quoque in *Egypto* separantur seculis ex hanc o. in cinere *Castr.* ad montem *Sinai*, circa *Sues* in planicie *Arabia*, duæ *Rhamni* species ab eodem observata. Et inter *Castrum* & *Hierosolymam* vidit planities, steriles alioqui, sed abundantes *Rhamni* specie, quæ baccas rubras fert, differente à *Græco*, cui semen nigrum. In *palestina* quoque sepes ex *Rhamno* factæ separant agros. Et rursus alibi: Circa *Hierosolymam* [inquit] perquisivimus spinosus plantas, ut investigarem quæ spinâ coronatus fuerit *salvator* noster: quum autem nullam frequentiorē inveniremus *Rhamno*, existimamus ex eiusmodi arbore factam coronam: nullos ibi vidimus *Rubos*, aut alias spinosus plantas, præter *Cappares*. Considerantes etiam *Italos* *Rhamnon* vulgo vocare spinam sanctam, potiss. circa *Maceracam* & *Peluri*, ubi sepes non struunt ex aliis arboribus, ut & *Hierosolymis*, noti sumus, ut crederemus, hanc illam esse spinam ex qua *Christo* *salvatori* *Iudæi* coronam imposuerunt. Arabes quoque antiqui, arborem ex qua facta fuit ea corona *Alhagel* vocant. Interpretes *Latine* dixerunt, Coronam spinæam.

*Matth.* capit. *Ruellium*, quod non declarat *Leucacantham*, & lubrico lapsu, simplicius oblitus, in *Capitis* spinæ albae calce, aculeata illius arbusculæ radicibus, quam ille candidum *Rhamnum* *Diosc.* putat, omnes tribuat facultate, quibus legitima *Spina alba* à *Dioscor.* commendatur. Verum *Matth.* non benè intellexit *Ruellium*, qui per *Leucacantham*, non intelligit *Rhamnum* candidum *Matthioli*, sed eius *Oxyacantham*. Præterea, *Matth.* non describit suum *Rhamnum*, sed descriptionem *Diosc.* repetit: duasque icones unius plantæ obtrudit, quæ ludit tantum ramis pro temporis diversitate, qui diversimodè ab eo fuerunt picti, dum varietatem ignoraret.

Illud notatu dignum, *Diosc.* dicere folia *Rhamni* parva: *Hermol.* [Marcell. & Cornar. vertunt mollia: *Ruell.* autem tenera] quam versionem retinuit *Matth.* licet describens *Hetruriam* suæ *Rhamnum* dicat habere folia mollia, quod non competit *Rhamno* ab eo exhibitio. In *Ital.* edit. dixit *Lavia*. In *German.* omnia mutavit, folia dicens *Salicis*, quod competit *Rhamno* sive *Oleaastro* *Germanico*: Flores autem albi odorati respondent *Spino albo*, sive *Oxyacanthæ* multis dictæ, nequitiam verò *Rhamno* 1. Quæcumque etiam tradit in eadē *Hist. Germ.* de *Rhamno* 2. coveniunt utrique modò dictis plantis & non *Rhamno* 1. Et, quod magis notabile, in *Com.* in *Diosc.* scribit, *Rhamni* secundum genus candidius à *Luca Ghino* missum: in *hist. Germ.* tantum in *German.*

nia visum. Nos verò Rhamnum Germanicum longè diversum censemus à Luca Ghini misso Rhamno, cuius effigiem exhibet Matth. Descriptio quam idem in Epir. sua habet, fictitia est, nec facta ad plantam à Ghino missam, cuius tamen iconem adhuc retinet. Cui non ex ipso ramo descripti, quem missum accepit? Sic & Rhamnum suo secundo adpingit vel affingit baccas fortè nunquam à se visas, quemadmodum & Gallic nomina quæ sunt Rhamni cathartici.

Diligenter etiam perpèdenti Matth. scripta, facitè apparebit, ne eas quidem plantas de quib. scribit, ei probè fuisse cognitatas, quòd supra lyrum de Eupat. dixerit Leucacantham arbusculam esse sepibus conficendis idoneam. Cuius apud Matth. in hist. Germ. ait diversas esse opiniones de Matth. Rhamnis: eius secundum idem videri cum Oleastro Germanico Cordi: ex iconem tamen non posse facillè colligi, propter spinas nimis aduncas. Hæc Cumer. qui iconem habet cum aduncis spinis, quales non sunt in Matth. iconibus. Nos igitur dicimus iconem Rhamni 2. Matth. esse ex ramo Rhamni 1. eiusdem Matth. factam. C. Bauh. apud Matth. ait Rhamnum 2. Matth. multum similitudinis habere cum Rhamno Germ. nisi sit idem. Nos contrarium sentimus. Nec placet icon ab eo addita cum aduncis spinis. Eiusdem sententia est, Rhamnum 1. Diosc. Rhamnum nigrum Theoph. & Rhamni 2. genus, sylvestre nigrum Plin. esse. At Rhamnum 2. Diosc. candidum Theoph. & candidiorem Plinio. An hic noster Rhamnus albus Amati, quando apud Diosc. ait, Rhamnum tam album quàm nigrum, & in Hispania, & Italia prosperè crescere animadverto, qui sepium ornamentum sunt, præsertim albus, cuius spinæ Oxycanthæ sunt similes, folia verò crassa, pingua, oblonga, Olivæ magnitudinis. Quanquam, si Amato Rhamnus albus tam benè notus fuit, cur non plures quàm unam, descriptioni suæ inservit notas, repetens tantum Diosc. verba: cur etiam non differentiam inter utrumque doceret in titulo etiam diversarum plantarum nomina confunderet.

Imperitus stirpium Lacuna pro Rhamno 1. 2. & 3. proponit icones ex Matth. & valde notas ait, licet ipsi Matth. fuerint incognitæ, ut antè demonstratum. Gesn. Rhamnum 1. facit. Pena & Lob. in adv. Rhamnum 2. Monspelien. cum iconem, in qua falsi Flores, addunt: Secunda species Matthioli mirè exquiritè respondere Diosc. notis videbitur illis, qui Rhamni 2. speciem Monspelij, sepibus muniendis aptissimam, viderunt: nam tota planta alba & minoribus floribus, foliis Oleæ, sed candidioribus Iesamini pubet, at herbacei coloris: cortice ex viridipallio scæte. Monspelien. (se Rhamnum 2. vocant. In obs. annotat Lob. Rhamnum 2. Monspel. dictum, esse Rhamnum 1. Diosc. Clusio. Verùm non animadvertit Lob. Matthioli Rhamnum 1. eundem esse cum Monspelien. & Matth. 2. esse ramos primi, quales planè observavimus & secos habemus. Ergo non magis convenit Rhamnus 2. Matth. quàm, Monspelien. cum Diosc. 2. quem à primo ipsemet Diosc. solo colore distinguit.

Hist. Lugd. ponit quatuor icones, quantum iudicamus, unus huius plantæ sub his titulis: 1º Rhamnus 1. Matth. 2º Rhamnus 2. Matth. 3º Rhamnus 3. Misp. 4º Rhamnus 1. Clus. Rhamnum verò five Oleastrum Germ. confundit cum Rhamno 1. Matth. Nec placet opinio C. Bauh. existimantis in suis animadv. in eandem. Hist.

riam, iconem Rhamni 2. Dod. & Rhamni 2. Matth. duas icones esse unius plantæ: nos verò censemus, ut antè dictum & post dicetur, Rhamnum 2. Matth. eundem esse cum primo Dodonæo.


CÆSAL. Rhamnum quæm putat candidum Theoph. & Diosc. 2. & Plin. 1. describit, fruticem virgas ferentem albas, foliis Oleæ pulposis. Floribus specie Gelsemini ex purpura candicantibus, baccis parvis Oleæ figura: videturque nihil aliud, quàm hanc ipsam descripsisse.

Scribit RAVVOLF. in itin. circa Tripolim proveniente satis copiosè Spinam cuius sit mentio lib. Iudicum, c. 9. & Plalm. Davidis 58. incolis dictam Hausseit: Arab. Hauslegi: Lat. Rhamnum. Alii Nausleg, five Nauslegi Maurit. dici tradunt. Ital. Rhamno & Marraca: Rhamno 1. hale fronde Olivari, liscie & grassette, &c. Hisp. Castil. Cambron, Portug. Cambrons, Germ. Storchborn 1. Bohem. Bidlak.

Natales plures divimus in historiarum decursu. Nascentur etiam, ut Clus. refert, multis Hispaniæ, Lusitanæ & Galliæ Narbonensis locis. Monspelij abundè observavimus circa urbem, nec non in Aquis mortuis & circa Florentiam. Monspelio allatus & in horto E. C. Montb. confitus, egregiè radices egit, & iam aliquot annis duravit: sed hieme reponendus. Autumno nova succrescunt folia, interdum decidua. Floret Martio, pariter atque Autumno.

Huius Rhamni prioris folia Salmantica & alijs quibusdā Castellæ locis, auctore Clusio, cum turionibus ex oleo & aceto edunt primis mensis: nonnulla tamen acrimoniam cum aciditate coniunctam habent, quæ saporis gratiam conculcat. Vires quas Rhamno veteres tribuunt antea proposuimus.

#### RHAMNI PRIMI SPECIES AL- tera Clus.



RHAMNI prioris alteram speciem observavit Clus. similem ferè primo, sed humilioris & frequentioribus ramis fruticantem, minoribus foliis, & magis carnosissimis, saltoque gustu, superiore cadidiorem. Floribus, eiusdem cum illo formæ, sed purpureo planè colore.

An de hac Belloni 1. 2. obs. c. 59. Arbuculam invenimus Rhamno

alteri similem, secundum littus maris Rubri, foliis admodum densis, salis, albicantibus ramis spinosis, sed spinis obtusis, ut in Rhamno Europeo.

Vno tantum loco invenisse tradit idem Clus. iuxta Horivelam urbem, Orcelita veteribus dictam ad flumen Serabin, Segura vet. regni Valentini extremis limitibus.

RHAMN



RHAMNVS VEL OLEASTER  
Germanicus.

CAP. XII.



**R**HAMNVS quem Germani Oleastrum suum fecerunt fruticem est tri- bitali altitudine, quibusdam locis arborescens, at ramis rigidis ac frangitum aculeis, leuifolius, dant gustibus, superne vidibus, ima sui parte quaterra spectant, albicantibus bacis seu acinis rotunditate ac magnitudine Myrti, in se numerosa congerie racema-

tum compactis, ac ramis arde implicatis, affixisque perexiguos petioli appendice, colore flavescens ac luteo, maturitate crocato, sapore acido ac peracido, unico iatus nucleum aut vinaceo, non lapidoso, ut Corni aut Oxyacanthæ, sed qui dentibus facile atteratur. Sic LEMNIUS describit.

Eundem arboreum fruticem Oleastri Germanici nomine Cordus, ita describit: Arbor est non non adeo procera, cum ad iustam magnitudinem pervenit, quatuor, quinque aut sex cubitorum altitudine, nonnunquam etiam procerior. Caudice aliquantulum intorto, ramis, furculis, corticis colore, aculeis, & toto propemodum habitu Sylvestri Pruno, hoc est, Spino pruna ferentis similis. Siquidem cortice vestitur, foris colore, spadiceo: aculeisq; armatur longis, fuscis, aculeis aut sextantibus, colore ut plurimum cinericeis. Folia totis ramulis furculisq; adnascuntur, oblonga, Oleæ similia, minora tamen tenuioraque atque brevissima, tenuissimæque lanugine subius canescencia, superius autem in viridi cineracea, longitudine sesquiciam, latitudine vero tertiam digiti partem æquantia, sapore modice astringente, odore nullo. Flores totis ramulis adnascuntur, quibus singulis succedunt bacæ Myrti bacis similes, paulo tamen maiores, oblongiores, multo tamen molliores, tenui, glabra fragilique cute & succo constantes. Succus autem triplicem misturam sortitus est: videlicet Oleum, aquam, & carnis parum, qui è bacis expressus in tria medicamenta, seu Oleæ succus, seipsum dividit. Caro enim fundum vasculi petens, in fraces transit gustu astringentes & acrescentes. Aqua medium locum occupat, supra fraces, & infra Oleum constituta, atq; in amurcam convertitur, consistentia tenuem, sapore valde acidam, acipsum acetum æmulantem. Quod autem pingue in hoc succo est, propter levitatem in summo amurcæ suæ supernat. pinguedine nihil à vero Oleo distans: tenuius tamen, gustu pingue, subacidum & modice astringens, odore Olei acetæ commixti. Tota autem bacca digitis contrita, naribusque admota propter acidam amurcam, magis quam Oleum acetum redolet. Quæ verò tota hyeme in arbore re-

manerunt bacæ, si terantur, succum remittunt aspectu & colore pus imitantem, odore acetæ veteri rancido Oleo commixti: corrumpitur enim, putrescitque gelicidius in bacis Oleum, ut odore tantum inesse cognoscatur. Semina bacis sunt singula, parva, oblonga, utrinque acuminata, pallenti tunica involuta; aspectu foris fusca, intus verò candicantia. Radice arbor nititur multifida & diffusa. Materia eius à Spina, Pruna agrestia ferenti, sola mollitia differt.

Idem Cordus in com. ad Diosc. Oleum ex eius bacis expressum acetosum & acerbum dicit, quod recens gustatum on sit gratum: at vetustatem ferre non posse. Existimat autem hanc Oleum esse quam Columell. Ciliatricam appellat. Idem in Obs. Sylva annotat fruticem tenuib. multis aculeis acutis spinosum, virgis & furculis tenuissimis, foliis parvis, oblongis, candidis, hirsutis, pro P. liuro sibi missum ex Gallia: sed videri potius Rhamnum esse. Quid verò sit Cordo Rhamnus hic dubitamus. Considerent lectores an forte intelligat Oleastrum hunc Germani. Verum quod folia dicit hirsuta, dubium nobis non parum movet. Nec opinio eius de Oleo Ciliatrice nobis placet. Mirum industrium Botanicum id ausum se habere! Qui leget verba Colum. quæ supra citavimus inter Oleæ differentias, facile agnoscat huius fruticis parvas baccas nihil habere commune cum cæteris generosis Olivis, inter quas enumerantur Ciliatrice seu Calabrice: Videtur porro ANGVL. epist. 2. hanc secundam Rhamni speciem facere, de qua sic tradit. Secunda Rhamni species omnino pumæ similis est, nisi quid candidior sit, foliaque habeat aliquantum longiora, tenuioraque. Passim abundat in Illyris, & in hac regione scpes ex ea faciunt. Patavij etiam conspiciatur extra portas vicius rudera & muros antiquos.

Meminit huius fruticis David, qui multis locis appositissimas similitudines, ad persuasionem profert in religionis negotio, ex naturæ rebus concinnè petitas. Antequam pinæ vestre inquit, Plin. 5. adoleverint, atq; obdurescant in Rhamnum, conteret ac convellet vos dominus, & liquescere faciet, ut limacem, ac partum abortivum. Quo designat improborum factiones, tyrannidem, minas, potentiam, conatus, molimina irritæ fore atque invalida: à Rhamno desumpta similitudine, frutici ubi adolevit, aculeis infesto: nam ineunte vere tener est, mollis, tractabilis, ac minus noxius.

An Bell Rhamnus Europæ de quo, l. 2. obs. c. 59. Dod. in Hist. Gal. Rhamnum secundum facit: nec describit, cum tamen peculiarem habeat iconem. At in hist. lat. Florem eius ait herbaceam, baccas colore flavescens, succo interius luteo, foliis perpetuo virentibus, bacis etiam hyeme fructi adherentibus.

Cordo dici Oleastrum Germ. Lob. & Pena Rhamnum Diosc. dicunt, quod à nullo alio sit, excepta Hist. Lugd. quæ duas plantas confundit, ut mox apparebit. D. Cortusius nobis aliquando pro Dioscor. Rhamno 2. misit eiusdem ramum, non pro primo. Io. Peha tamen in descriptione Baldi, Oleastrum Germani Cordi, multis Rhamnum 1. Diosc. videri notat.

Rhamnus 2. foliis perpetuis, Clus. qui addit totum fruticem videri ac si pulvere respersus esset.

Quoniam verò Hist. Lugd. putat Rhamnum hunc eundem cum Matth. Rhamnum 1. Lubet illius descriptionem ascribere: Spinosis inquit Matthioli frutex, sive Rhamnus 1. ad Rhodaniripas & glareosa vada sequentiſſimus visitur, sepè

Semina.

Radix.

Materia.

Olea Ciliatrice.

Folia hirsuta.

Cordi opio.

Rhamnus 2. angustifolia.

Rhamnus Europæ.

Flos herbæ.

humilis, nonnunquam ad hominis proceritatem  
 assurgens, cortice cinereo, ramis firmis, ex quibus  
 furculi hinc illinc oriuntur, per intervalla profe-  
 rentes, & semper in rigidam spinam desinentes,  
 qua nota à cæteris discrepat. Fructus est circum  
 ramos copiosus, rotundus, cum maturuit phœni-  
 ceus, folliculo aut vesiculæ similis, succo lento  
 viscoso, acidi gustus, nec ingrati, cuius, omphacij  
 vice, ad ciborum condimenta usus esse possit.  
 Hæc sanè descriptio satis apertè declarat hunc no-  
 strum, quem tamen Historia malè eundem putat  
 cum Rhamno 1. Matth.

*Hist. Lugd.  
 error.*

Eadem verd huius & aliam ponit descriptio-  
 nem ex Pena, & iconem, titulo Rhamni 2. Dod.  
 & primi Penz.

Cæsaro Bauhino in suis animadver. Rham-  
 nus: 2. Matthioli. & Rhamnus 2. Dodonæi  
 videntur duæ figuræ unius plantæ, posterior ta-  
 men melior: nos contra existimamus, Rhamnum  
 2. Matth. diversum à Dod. secundo, ut ante di-  
 ctum. Rhamnus Germanicus eidem C. Bauh. qui  
 annotat semen esse ex rotunditate oblongatum,  
 splendens, tunica foris fusca, intus candida, invo-  
 lutum includi. In aquis ad Rhenum infra  
 Hunningen Basilicæ suum ludere: unam, latio-  
 ribus esse foliis & longioribus baccis singulis vel  
 binis stipiti annexis: aliam, foliis angustioribus &  
 brevioribus, baccis multis velut conglobatis, quæ  
 & hieme fructus adhærent: quæ satis conspicua  
 varietas est.

*Bauh.*

*Semen.*

*Varietas.  
 Latis folia.  
 Angusti  
 folia.*

*Camer.*

*Rhamni 2.  
 genus sine  
 flore Ca-  
 salp.*

*Folliculi  
 Flore ca-  
 vere.*

Camer. Rhamnum 2. Matth. videri quidem O-  
 leastrum Germ. Cordi scribit, verum non posse ex  
 figura Matth. cognosci, atque eò quoddam spinæ nimis  
 curvæ sunt, dubitat an Matth. hanc intellexerit.  
 Ideo meliorem figuram apponendam curavit. An  
 Cæsarp. Rhamni 2. genus sine flore: quod dicit  
 esse Theoph. Rhamnum nigrum, & Plinij 2. ge-  
 nus sylv. nigrum, & Rhamni 1. genus Diosc. sicque  
 describit: Rhamni 2. genus arboreum ramis re-  
 ctis, foliis modo, cortice minus candido, foliis  
 angustioribus longioribusque [quàm Rhamnus  
 Monsp.] non pulposis, veluti pulvisculo ferrugi-  
 neo, infernè oblitis: iuxta folia folliculos quos-  
 dam tenues sine flore fert, Hordei figura & ma-  
 gnitudine, pulvisculo scintillante oblitos, colore  
 ferrugineo: ij in maturitate parvæ Olivæ spe-  
 ciem gerunt, rubentes: succo intus croceo, tenui  
 tunica incluso: maturantur hyeme: semen uni-  
 cum continetur nigrum, aculeos ratiore habet  
 acutiorisque, sed infirmiores. Peregrina hæc in  
 Hetruria. Multa conveniunt cum nostra, quæ-  
 dam etiam cundationem iniiciunt, quominus  
 temerè affirmare audeamus. Indagabunt dili-  
 gentiores.

*Rhamni  
 specier 2.  
 Rucl.*

*Folia Ligu-  
 stri.*

Hactenus quoque nos latet, quoniam sit refe-  
 rendum Rhamni genus illud, cuius meminit  
 Ruell. l. i. c. 123. Lubet itaque huic referre, donec  
 melius innotescat. Hæc eius sunt verba: Aliud  
 Rhamni genus in afflatu maris nascens, quod pu-  
 taverim Rhamni fastigijs, annumerandum, fruti-  
 ce nonnunquam arborecente, prælongis ramu-  
 lis, qui rigidis armantur spinis, aculeis mucrone  
 æviuentibus, folijs, tam æmula facie Ligustrum  
 exprimentibus, ut pro illis fallant, bacca, follicu-

lari specie, verticillata, primum candida, post  
 maturitatem rubescente, foris flaccida, intus ubi-  
 ginosa, quam pastores pecorum pabulo decuti-  
 unt. Ausus est tamen Ryffus Ruellij hunc  
 Rhamnum suo nomine proponere, cum ait,  
 Rhamni fastigijs genus 2. annumerandum in af-  
 flatu maris &c. quod morosior quis plagiatum  
 diceret. Cæterum, de quo hic agimus, Rhamnus  
 Germ. Sandthorn/ weydenborn: quali spinam  
 arenariam, aut salicem spinosam dicas: Batavis  
 Scerbesien/ id est, ad purgatrices, teste Lobe-  
 lio, Galli Graunopolitani vocant, des argouf-  
 ses.

*Bacca  
 Ruellij.*

*Ryffus  
 plagiat.*

Nascitur circa fluvios & amnes, solo lapidoso, Locum  
 arenosumque, copiosissima autem in Germania ad  
 Lycam Vindeliciæ amnem, & ad Danubium ab  
 eiusdem Lyci ostio, usque ad Petreas fauces, per  
 quas Danubius fluit, tribus millibus passuum su-  
 pra Kelheimium oppidum sitas: Cord. In Ho-  
 landiæ ac potissimum Flandiæ maritimis littori-  
 bus. Repertur verd & alibi in convallibus, ac  
 iuxta profuentes amnes. Dod. & Clus. Lob. ait  
 Italæ, Galliz & Hollandiæ maritimis plurimis lo-  
 cis provenire: Zelandiæ, Lemnius. Circa Rhe-  
 num multis tractibus copiosè, potissimum circa  
 Basileam, Curiam: Genevæ ad Arar & Rhoda-  
 num loco valde glareoso frequentissima. Provenit  
 etiam in monte Baldo, in Alpibus Rhetiis, in  
 valle Tellina propè Meyenfeld, & Drusiana propè  
 Fedkirch, Campus D. Petri dicta, & pluribus  
 alijs Helvetiæ locis, tam montosis quàm convalli-  
 bus. Scribit Io. Fabri. in cõ valle circa Curiam Rhe-  
 torum fuisse Rhamnum præ magnitudine: spi-  
 nis arborecentem & magnitudine truncos adæ-  
 quatæ. In Cl. D. Plateri orto in arborè crevit  
 & fructus tulit, qui tamen à nobis satis non pro-  
 venit. Iamdudum etiam in orto Month. cultus  
 egregiè repit, nondum tamen fructum protulit.  
 Allatus fuit Lugduno, ubi in prato Aine dicto ad  
 Rhodanum abundat. Hyemem fert. Floret Iu-  
 nio: Post autumnum demum bacce maturan-  
 tur, & subinde tota hærent hyeme.

*Tempi*

Adornantur in Belgio huius virgultis Coeha-  
 cula ac triglinia ineunte autumnno, quo bacce usui.  
 luteo colore suffundi incipiunt, atque in multam  
 hyemem spectaculo sunt, oculisque reficiunt, at-  
 que acido sapore nauseanti ac fastidioso palato  
 gratificantur. Assatim salivam eiciunt, ac febrici-  
 tantibus sitim compescunt, teste Lemnio, qui  
 hanc Rhamni speciem Zelandis *Duin besjen*, dici  
 ait.

*Vireo  
 usus.*

*Salta  
 me.*

Cordus tradit frondes eius in cubiculum pro-  
 iectas, mures allicere, prælestum siccitas. Notat  
 Hist. Lugd. succi usum omphacij vice ad ciborum  
 condimenta esse posse: aliud tamen nomen Bel-  
 gicum suprascriptum Lobelij insinuare videtur.  
 Scribit sanè Camer. in epit. Matth. acinos purga-  
 tricem habere facultatem à quibusdam affirmari.  
 Addit tamen parani exiis Rob. quod vehementer  
 acidum sit, & attenuans & incidens, ut Berberis  
 fere, commendarique ad Dysenteriam. Hunc  
 nodum solvant experti: si tamen purgant, ut scri-  
 bit ille, Tamarindorum ferè in modum id præ-  
 stare quis coniectare possit.


*Purga-  
 Rob.*

*Dysen-  
 teria.*



## RHAMNVS III. CLVS.

## CAP. XIII.



**R**HAMNVS  
tertius di-  
ctus Clusio fruti-  
cosus est frequen-  
tibus ramis, Spini  
magnitudine, cor-  
tice nigro tectis,  
& spinis longis  
armatis. Folia ex  
quibusdam tu-  
berculis, ut in  
priori, multa si-  
mul enascuntur,  
oblonga & angus-  
ta, carnosa, colo-  
re viridi, gustu  
adstringente, &  
Rhabarbari sapor-  
em satis referen-  
te, semper viren-  
tia. Flos veris

initio parvus, iuxta folia plurimus, & confertim  
nascens, colore herbaceo.

Æstate nigrum fructum fert. Pruno sylv. si-  
milem, rotundum, acerbum. Hisp. *Spino negro*  
dicitur. Hic fortè est, inquit Clusius Bellon.  
in Creta inventi ait, fructu nigro. Ad nos eius  
fructus ex Hispaniis postea missus est Lycij no-  
mine, & in fruticem excrevit. Forstnan ad Rham-  
num nigrum Theoph. refert possit. Hæc Clus.  
Bellon. verò, l. 2. obs. 76. dicit in itinere inter Cai-  
rum & Hierosolimam Rhamni speciem se obser-  
vasse semine rubro, differente à Græco, cui niger.  
Ingenue fateamur, nos nec Clusium, nec Bell. hac in  
parte intelligere. Lycium Hisp. inquit Lob. Spine  
Burgundica aut Phyllireæ angustifolia non ita  
absumilem perelegantem fruticellum, foliis tamen  
multò angustioribus & ramulis exilioribus stu-  
diosè alunt in Belgio, &c. Extrema infesta spicu-  
lis virgula: folia Thymelææ Monspeliens. exi-  
liora, atrovirentia, gustanti adstringentia. A-  
pud Belgas nullum fructum edit. Et mox supra  
figuram ex Clus. appositam. Rhamnus primæ  
speciei tertius, & fortè Rhamnus niger Theoph.  
apud Clus. Hisp. Spino negro. Non diversum opi-  
nor à Lycio Hispanico Belgij nuper inquilino fa-  
cto. In append. aliam figuram habet eiusdem Ly-  
cij Hisp. nomine. In iconibus Plant. Lobelianis  
duæ ponuntur figuræ: uni titulus Lycium Hisp.  
alteri Rhamnus primæ speciei tertius. Fortè Lob.  
duas descriptiones & figuras unius plantæ, licet  
diversæ videantur figuræ, ponit. Clus. sanè unius  
tantum plantæ ex suis Lycij nomine donatis, in  
Belgio provenire tradit, non duas. Rhamnus 3.  
Dod. Hist. Lugd. scribit pinxisse Lob. Lycium Hi-  
spanicum, quod Clus. descripsit his ferè verbis:  
frutex est spinosus, folia Myrti Tarentinæ vel  
Buxi. Figura quam Lugd. ponit prior loco est  
Clusij: altera ex appendice Lob. pro Lycio Hisp.  
quæ non habet folia Myrti, sed longa. Quin  
ipse quoque Lobel. folia Thymelææ habere  
scribit.

Frequentem Granatensium & Murciano regnis,  
locis incultis inter alios fructes invenit Clus. cui  
in Belgio lata provenit.

Fructus decocto, eodem teste, membra relaxa-

ta & dissoluta, atque etiam podagræ dolores uti-  
liter soveri incolæ referebant.

RHAMNVS SIVE PALIVRVS  
folio Iuubino.

## CAP. XIV.



**N**ON semper  
humilis est, Descrip-  
verum interdum  
aded excrevit, ut  
arboris tueri no-  
men possit, mate-  
rie perquam du-  
ra, virgas emittit  
rectas, & ab his  
ramos patulos,  
deorsum infle-  
xos, subruben-  
tes, quos tenues,  
rigida & morda-  
ces armant spinæ.  
Folia Iuubinis  
tàm similia ut ni-  
hil supra, quibus  
tamen nonnihil  
videntur minora,  
nec ita profundè

per oras crenata, sed minimùm, ac interdum ferè  
nihil: ceteri qui Iuubini folij nervos tres se-  
cundum longitudinem decurrentes possident.  
Iuxta quæ flores emittant parvi, stellati: orbicu-  
lati: Succrescunt Fructus, lati, per margines mem-  
branci, compressi, prominente utrinque um-  
bône lignoso, cuius medio pediculus inferitur,  
qui diffracti, in geminis vel ternis loculis toti-  
dem ostendunt semina, lubrico lævore & colore  
seminum Lini, sed rotundiora, torosiora, pulpa  
dulci, coloris ferè porracei. Fructus, [ut describit  
Cæsalp.] depressus ex tenui pediculo pendet,  
pulpa quadam fungosa circumducta, officulo in-  
tus duro, intra quem tria feminis cœceptacula sin-  
gulis feminibus donata, quæ in suis alveolis tin-  
tinabuli modo sonant. Facile autem nobis per-  
suademus Theophrasti Paliurum esse hanc plan-  
tam de qua, l. 3. hist. cap. 17. & Paliurum nostratem  
Græcum ab eodem vocari, l. 4. histor. c. 4. Denique  
eamdem hanc à Diosc. uno capite dici Rhamnum  
3. alio verò Paliurum, quorum omnium verba  
posuimus antè, in genere de Rhamno tradentes. Theoph.  
Dioscoridem [inquit Guiland.] de iisdem plan-  
tis in diversis locis pertractasse sub diversis no-  
minibus, apertissimum: ignorantemne, an abun-  
dè diligentem nescio, exemplo sit Rhamnus  
3. Idem & Virgil. dictus Eclog. 5.

*Carduus, & spinis, surgit Paliurus acutis.*  
Supra quem locum apparet Servij lapsus, qui Pa-  
liurum ait herbam esse asperam & spinosam,  
ut rectè quidem notat Thes. ling. Lat. ipse tamen,  
in alium similem incurrit, cum ait, Paliurum her-  
bæ nomen esse Galeno, l. 8. c. 33. simpl. quod falsum.  
Nam nec herbam ibi dicit, nec fruticem, et si, reve-  
ra, frutex sit arborefcens. Eundem Paliurum intel-  
ligit Columel. l. 3. c. 3. ubi docet rationem paran-  
dæ vivæ sepi, ubi inter vastas pinas recenset cum  
Rubo & Cynosbato. Et Paliurum acutis spinis  
vocat, l. 10. & ab hortis cultis exterminat.

*Nec manibus mita Ferulas, nec cruribus aqua  
Terga Rubi, spinisque seras Paliuron acutis.*  
In S. Scriptura non magnus honor sit huic fructici,

quandoquidem cum impiis conferatur, ut supra  
 ex regis & alt. retulimus, atque etiam, u. notat D.  
 Hieron. Micheam, c. 7. Qui optimus in eis est, quasi  
 palius\* & qui rectus quasi spina in sepe, &. quasi  
 palius pungens & retinens: vulnerans appropin-  
 quantē sibi aduncō dēte cōprehendens, &c.

Cordus Patrum ait vulgò non cognosci, nec quicquam pro eo exhibet. Rhamni autem duas species agnoscit, candidum & nigrum, utrunque Theophrasti, ut ille ait, à se aliquoties visum: qui tamen non in Germania nati sunt, sed ex Italia & Gallia allati. Et addit: fructus candida candidus: nigræ niger: quemadmodum & folium, quod oblongum parvumque est: Fructui orbiculata est figura, sique in medio turget, in margine verò tenuior est & veluti foliaceus, in summo verbo, verticillo, quo, ceu pondere fissus infir, utuntur mulieres, similis est, non tamen perforatus. Dioscor. & tertium Rhamnum recenset, cuius semen in quibusdam Diosc. exempl. spondylo, in quibusdam etiam Alphodelo comparatur diversis naturæ plantis spondylo, hoc est, verticillo, similem esse iam ostendimus: quare non Alphodelo, sed spondylo legendum censemus. Idem in sylva obs. Rhamni, inquit, nigri fructus niger est, verticilli figura, orbiculatus, in medio elatus: Rhamni candidi fructus prædicto similis est figura, sed colore candidus. Hæc Cordus. Ut autem verum fatearur, nondum bene eum percipimus: videtur enim Rhamnum 3. Diosc. non distinguere à primo & secundo eiusdem. Præstus aliqui ab eo descriptis optime quædrat huius nostro. Nam que de folio dicit, parvum momenti sunt, nec quicquam certi inde colligas quod intelligat. Huius nostri sanè folium nec candidum nec nigrum recte dixeris.

Anguilo-  
pino.

Peculiarem opinionem habet Anguil. nimirum fufpicatur, alteram Rhamni fpeciem adiectam Diofcoridis, ut alie multe plantæ fupriz. Occafio fufpicionis eft, quòd fibi contradicat Diofc. in defcriptione huius fructus, cum dicit: fructum edit larum, candidum, tenuem veluti folliculum, haf- tula: regie fimilem. Quippe fructus Rhamni, qui oftenditur, efti larus fit, hoc eft compreffus, non ideo fimilis eft fructui haf- tula: regie, [A- fphodelo] qui rotundus eft vel orbicularis, non compreffus. Præterea fpinz eius non funt debiles, ut vult Diofcora. Deinde Theop. de duobus tantum Rhamnis loquitur folijs non decidis: qualis Palurius non eft. Adde, quas primas Rhamni Diofc. fpecies femper virere: tertiam verd non item, quæ, ut Theoph. verbis colligo, nihil eft aliud quam eiuſdem Palurius, admodum vulgaris Italiz, ſicut & Græciæ: Nacti- etiam hæc planta omnis generis locis, tam ſicis quam aquaticis, frutex valde ſpinofus, cuius folia ſimilia Iuibis noſtris ſylveſtribus, niſi quòd latiora & rotundiora, & circa petiolum colore magis fulco. Plures emitit ramos altitudine quatuor aut quinque cubitorum, in multa brachia diſiſos: funtque cum ipſi rami, tum ſpinæ coloris Caſtaneæ. Spinz ſemper geminz, una recta, altera aduſca, recta ut plurimum ſupra incurvam locatâ, ad figuram harpagonis. Fructus rotundi, compreſſi, in medio nonnihil exuberantes, qui ſpondylø figura ſimiles, conferri ramulis adhærent, colore primò inter viridem & æalbum medio: fuliginòſo verd ſi reſiccati fue- rint: Horum quilibet tria aut quatuor ſemina continet, ſubſtantia pingui ut Lini. Ita ut appareat hunc fruticem nihil aliud eſſe quam Palurum Theop. & Dioſc. Noſtro tempore vocatur ad

huc in multis Græciæ locis nomine aliquantulum  
 corrupto Palurus. Palurus Græcis, inquit, Bo-  
 nius vulgò nunc Apaliura dicitur, quem multi  
 existimant Rhamnum; Jam inaudiendus Matth.

Rhamni genus, quod nigrum est ( ut etiam Dioscorinquit ) quindm fermè cubitorum altitudinem attollitur, infirmioribus aculeis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo non absumili. In epicadit, in eius medio ossiculum concluditur, in quo parvus nucle<sup>us</sup> rut & aculeos aliquos longos & asque, nonnullos verò ut Rabi, incurvos: falli verò eos qui putat Rhamn<sup>um</sup> esse Diosc. Paliur<sup>um</sup>, sed adhuc magis cæcitate, qui ennd<sup>e</sup> esse Diosc. adulterin<sup>um</sup> cõtendunt. Præterea dicitur eidem Rhamnus, Ital. *Martuca vera*. In polstr. com. Flores & tribuit mucosos, subcroceos, fructum candidum, in eius medio nucleum durum ac rotundum, ceteris ferè magnitudine, & in eo semen lentis inlar compressum, rubro cortice, alba intus medulla: asserit præterea legendum esse apud Diosc. iuxta antiquum Codicem & Orisab. *αγορ<sup>α</sup> παλ<sup>υ</sup>ρ<sup>α</sup>*, additque Paliurum Theoph. semen proferre *αλ<sup>α</sup>β<sup>ο</sup>*, id est in siliqua prælonga, fabæ inlar, ut ille reddit. Græcis *αλ<sup>α</sup>β<sup>ο</sup>* longam vel oblongam siliquam in plantis designare Suida & Pavorino testibus: imò ipsum quoque Theoph. manifestum testem esse ait eius significationis, qui l. 3. c. ii. de Acere scribens inter alia dicit: Paliur<sup>um</sup> fructum sive folliculum oblongum esse, &c. Obstat præterea, ne tertium Rhamni genus, Paliur<sup>um</sup> esse possit, ipsum quoque semen, quodd non *αλ<sup>α</sup>β<sup>ο</sup>*, sed in duro ac rotundo concludatur ossiculo, in ipsius verticis centro latefcente, fungula quadam siliqua exterius obducto, triplici intus cavitate diviso, ubi semen ipsum se continere cut latitet, Lentis inlar compressum, rufa, ac levi cuticula contectum, alba dulcique intus medulla, non autem fuliginosum ac pingue, ut de Paliuri semine scribit Diosc.

[illegible]



habere ait Matth. nisi sit ea vox declaratio vocis  
 ut *μαθη*, ut suspicatur Marcellus. Sin verò cum Pe-  
 na Lob. Dod. & Sarac. pro *λογωδὲς* legamus *λο-  
 γωδὲς* aut *λογωδὲς*, Lini facie, non videmus quid  
 amplius impediatur, quin Rhamnus, Diosc. & Pa-  
 liurus eiusdem, sit etiam Palurus Theoph. ait  
 enim: *ἡ δὲ τὴν γλῶσσαν ἔχουσα ὡς λίαν, ὅσπερ τὸ αὐτὸν  
 στίγμα.*

Videtur eundem hunc Rhamnū nigrum vocasse  
 Amatus quem ait in Hispan. & Ital. prosperè cre-  
 scere, fructu simili verticillo, in cuius medio nescio  
 quid nigri conspiciatur, ut à se Pisauri prope mare  
 annotatum scribit. Is verò solus hanc notam habet,  
 quā Rhamnum nigrum ab albo distinguit:  
 egregiam sanè verò Qui, quum Ruellij Rham-  
 num reprobet, cur suum non declarat notis mani-  
 festiorib. quā fecit? Diosc. Rhamnum, faciunt  
 Turner. Dod. [qui & Palurum dicit] Gesn. Pena,  
 Lob. Clus. Celsalp. Camer. qui & Spinam Iudai-  
 cam & ci notat. Dod. vult esse Zura Plinij, quod  
 nondum assecimus, de ea sub Paluro, Rauvolff.  
 Paluro, inquit, nostro, qui existimatur Rhamni 3.  
 genus, ita similis lutea alba, ut primo aspectu  
 existimare eandem cum eo. Et quoniam Diosc.  
 easdem facultates suo Paluro tribuit quās Paluro  
 1. Theoph. non præter rationem Clus. Anguillar.  
 secutus, Rhamni 3. descriptionem, quæ apud Dio-  
 scor. extat, ad Paluri eius historiam revocandam  
 censet. Cuius sententiæ & Celsalp. est.

Porro cum sint tam laxæ descriptiones utriusve,  
 h. e. tam Paluri quā Rhamni 3. & ex facultatibus  
 valde imbecilles coniectura, nullum putant Ad-  
 versos posse statuere, quoznam cui sit præferenda.  
 Quæ [inquit] huic Diosc. descriptioni valde  
 quā accedit, est Rhamnus 3. nam frutex quantus  
 est, prædurus est stipēs, aculeatus, semine pinguis  
 lineoque non fuliginoso, sed satis duro, ut Lini.  
 vires huic congruunt: nam lapillos erexit poten-  
 tissimè: diureticus est, ac proinde, haud abs re  
 doctus Anguil. ambigebat esse Rhamnus Palu-  
 rius alio nomine (ut sæpè fit) nota Africanis  
 transmarinisque regionibus, vel Diosc. fructu vi-  
 tiatus Codex. Quod ad semen attinet huic sunt  
 terna ossicula, ut Theoph. vult, estque Lini æmu-  
 lum, non fuliginosum, ut corruptè legitur, læ-  
 ue, non lentum tangenti: & in siliqua lata folli-  
 culari specie, terna, quaternave: unde meritò  
 hæc ipsissima videtur. De voce, fuliginosa, di-  
 ctum à nobis prius ad colorem posse referri. La-  
 tina proponit solum icōnem Matth. pro Rham-  
 no. Turner. vitiosam figuram habet, cuius titu-  
 lus, Rhus, incutia typographi, pro Rhamnus. E-  
 legantem figuram habet Camer. apud Matth. no-  
 mine Paluri 3. & 3. Stachdōren.

Ex Theoph. colligimus in Græcia nasci, quia  
 nostratē dicit. Gaudet aliqui locis maritimis,  
 campestribus & incultis. Copiosus provenit in  
 Gallia Narbonensi, potissimum quæ Monspellio  
 Iunellam itur, spontè crescit inter sepes & in a-  
 gnis. Item circa Vraniam: in agro Veronensi, in  
 Apennino prope Bononiā in planitie versus Bal-  
 dum. In Belgij hortis colitur, Dod. Norimbergæ,  
 inquit, Camer. hyemem etiam nisi sit admodum  
 acris, ferre potest: alioqui diligenter erit à frigore  
 muniendus. Basileæ in horto D. Platei in iusta ar-  
 borem excrevit, oxali sæpè crevit ex semine, ac et-  
 iam floruit. Floret autem Maio & Iunio: fructus  
 autumnō maturescit, & tota hyeme arbori adha-  
 ret. Lob. annotat ex vetustō admodum semine  
 crescere, quod verisimile, cum semen in valculo  
 egregiè munitum fuerit.

Quomodo vicia sepes paranda sit ex Paluro  
 Tom. I.

& aliis vastissimis spinis, quas vocat, ad versus ho-  
 minum pecudumque incursum, habes apud Co-  
 sum. l. i. c. 3. Adstringat, ventrem fluentem co- Tempera  
 habent digerunt, & Phymata curant Palluri fo-  
 lia & radix. Galen. Fructus verò tantam obti-  
 nent incidendi vim, ut & calculos vesicæ com-  
 minuant, & pectoris pulmonisque excretionibus  
 auxiliantur. Semina contusa ad tussim commen-  
 dariam dictum, is etiam ad arenulas & calculum Arenula  
 uruntur Monspelienses Medici ad quos affectus  
 in frequenti etiam usu habet Cl. D. Platerus.

## PALIVRVS AFRICANA.

## CAP. XV.

ALIVS hic Palurus est ab eo qui hæctenus  
 dictus, seu à Græco, quem Diosc. cum Rham-  
 no suo terdo confudit. Nunc quid & de hoc tra-  
 dant auctores, viderem.

In Libya, seu Africa, auctore Theoph. maxima  
 copia est: Quippe apud Hesperides eo ad uren-  
 dum utuntur, quemadmodum & Loto. Sed fru-  
 ticosior hic est, quā Lotus, folio huic nostrati  
 [tò ἐν τῇ Γραῖο] similis, sed fructu diverso, non  
 chin latum fert sed rotundum & rubrum, magni-  
 tudine qua Cedri, aut paulò maiorem, cuius nu-  
 cleus non simul editur, quemadmodum acini Pu-  
 nici. Fructus verò ipse suavis est, cui si quis  
 vinum affundat, & ipsum suaviorem fieri tra-  
 dunt, & vinum ipsum quoque suavius efficere. Di-  
 xerat autem prius Palurum differentias quasdam  
 habere, omnes autem fructiferas esse. De ea verò  
 quæ semen ἐν λῶβῳ φέρει, quamque hic adducta  
 descriptio nostratē vocat, inter Rhamnos  
 adum, quod eam, uti dictum, Dioscorid. cum  
 Rhamno inconsideratè commiscuerit. Et paulò  
 ante dixit Palurum etiam in Nasamoniaco agro,  
 & apud Ammoniam aliisq. partibus nasci. Quid ē  
 sibi velit idē Theoph. quādo l. i. c. 16. ait: Quædam  
 & mactone & lateribus pungunt, ut sunt Ilicis,  
 Roboris, Smilacis, Rubi & Paluri folia. Verba  
 sunt: τὰ δὲ ἔχοντα καὶ ζῶντα. In eptē Gari, sit uata Gaza vel  
 concidit, ut ante nos notavit Matth. [ἡ δὲ τὴν πλάγιν  
 ἔχει ἐν τῇ πλάγι]. Agit autem hic de foliis. Consi-  
 derandū igitur: quisnam sit ille Palurus, cui talia  
 folia, Eorum verbbum peculiarem interpreta-  
 tionem Casal. invenit, quam cap. de Iuibis refe-  
 remus. Alioqui & hic Roboris seu ἰπὸς loco  
 malum legere Phellodryps. In Roboris enim  
 foliis nulla spina: at sunt in hæc.

Cyrenaica regio [inquit, Plin. l. 13. c. 19. ex hōc  
 Theoph. loco] Loto suæ postponit Paluro. Fru-  
 ticosior hæc, fructūque magis rubens, cuius  
 nucleis non simul manditur, iucundus per  
 se, atque suavis, est vino: quin & vina sicco suo  
 commendans. Interior Africa ad Garaman-  
 tas usque & deserta Palmarum magnitudine &  
 suavitate constat [præstat Dal.] nobilibus maxi-  
 mè circa delubrum Hammonis. Et lib. 16. cap. 24.  
 Verè cæpturo germinant, Aquifolium, Terē-  
 binthus, Palurus, &c. sed per hunc Palurum in-  
 telligimus Græcum. Rursus idē l. 24. c. 13. Pa-  
 liurus quoque spinæ genus. Semen eius Asti-  
 Ziram [Ziiron M.] vocant, contra Scorpiones  
 efficacissimum: Item calculosis & tussi. Folia  
 astrictoriam vim habent. Radix discutit Panos,  
 collectionēs, uoicās: urinas trahit pota. De-  
 coctum eius potum in vino alvum sistit: serpen-  
 tibus adversatur. Radix præcipuè datur in vino.  
 Aliqui folia contusa addito sale, articularum  
 morbis imponunt. Proinde Baccæ purgationi  
 foeminarum, cœliacis, Dysentericis ac cholæ-

*Cholera. Al-*  
*bi fluxus*  
*Infusa cor.*  
*poti*  
*Lukata.*  
*Plin. illust.*  
riens. In vino pota alvum sistant. Radix decocta & scillita, extrahit infusa corpori. Vulsissima est & luxatis, tumoribusque.

Videtur autem Plin. duas plantas confundere. Nam vires quas primo loco ponit pro Paliuro, respondent viribus à Dioscor. etiam Paliuro adscriptis. Verùm si Paliurus Diosc. & Theoph. [quod existimamus,] idem sunt, baccæ non conveniunt Paliuro prius: à Theoph. enim ex attribuuntur Paliuro Libyco, ut ex præcedentibus apparet.

Dod. intelligit per Zuram Plin. Rhamnum vel Paliurum folio Iuubino, de quo ante. De Connaro & Paliuro Athen. vid. lib. 14. c. 10. ubi diversæ autorum de iis sententiæ. De Connaris, inquit, prius apud Alexandrinos vocatis verba faciam, ac de Paluris. Meminit de iis Agathocles Cyzicenus, h. s. verbis libro historiarum patriæ tertio: Cùm in sepulchrum fulmen irruisset, arbuscula

[alii legunt arbor] ex tumulo pullulavit quam illi Connarum nomenant. Est autem planta Vlmii Piceæque magnitudine, nihilque minor (nonnulli leguas, magnitudine quidem parva illa est, pino aut ulmo magnitudine paritunde, nec immerito sic super hunc locum exclamat Dalechamp. Quid hoc est dicere? Pinus sanè & Vlmus proceræ sunt arbores, ita veteres interdum ludunt nostram diligentiam. Et Clusius, se hunc locum non intelligere dixit) Truncos habet frequentes & oblongos, spinasque paulum prominentes: folium est tenerum ac viride Phyeque simillimum. Fructum bis quotannis producit, Vere scilicet & Autumno, qui dulcis est omnino, & olivæ oleastrique fructui similis, carnem, osque illi simile habet, & differt succi voluptate, cuius fructus etiam viridis comeditur. Vbi verò ficans fuerit, farinas conficiunt ex eo, quas calcant, ac non pinguunt: neque aqua irrigant. Paliuri ramum dixit Euripides in Cyclope. Theopompus lib. Philippic. 21. mentionem facit de iis, & Diophilus Siphnius medicus in libro de iis, quæ ab ægrotantibus & sanis sunt comedenda. Considerent igitur petiti an de Iuubis hoc loco scribat Athen.

Lubet & ex eodem propter magnam similitudinem proponere quæ de Loto Polybij tradit: Quæ [inquit] de Loto scripsit Herod. eadem refert Polybius Meg. Iopolytanus, oculatus testis l. 12. hist. his verbis: Est autem Lotus arbor minimè procera, aspera, aculeata, folio Rhamni [ilicis, Theoph.] paulò latiore & crassiore: fructu per initia colore & magnitudine simili perfectis baccis Myrti, dum augebit, coloris phœnicei, Oleæ [Fabæ, Theoph. de Loto à Dioscor. hæc inaudienda sunt. Secundæ Loti Theoph. quæ

*Lotus Liby-*  
*ca Polyb.*  
*Folium,*

καρπὸν ἔχει τὸ ἄγαν ὀξύ, id est, fructum habet insimè & appositissimè tradit esse lentisco similem, Dal.] magnitudine, rotundo, nucleo admodum pusillo. Maturus colligitur, & cum alica contusus ad fervorum famulorumque cibum in vasa conculcatur, ac stipatur: ingenuorum autem edulis, detracto nucleo eodem modo reponitur, ac pro cibo est, gustu caricis & Palmulis non dissimilis odore tamen suaviori. Fit & ex eo vinum, in aqua macerato, & trito, saporis grati, & iucundi, qualis est optimi nullo. Merum id, & sine aqua, bibunt, sed ultra decimum diem non perdurat. Quamobrem paulatim ad usum tam brevis temporis conficiunt. Fit & acetum ex eo. Hactenus Athen.

*Lotum.*  
Ruell. & Matth. volunt Connarum Athen. esse Paliurum: id negat Solerius, & vult apud eundem pro Philycæ legendum Philyx: Paliurum

Libycam Theoph. eandem esse censet cum Loto Libycæ Polybij, Paliuri species incognitas, omnia eiusdem genera semen in siliquis ferre falsò Matth. asserere ex Theoph.

Plutarchus autor est, in Cœcægio monte Paliurum arborem haberi, cui si vel bestia vel avis, aut aliud animal voluere fidat, velut inviscatum cohærebit, præter Cuculum. Huic enim soli parcat: & ne scripto derogetur fides Ctesiphonta citat in testem, libro arboribus dicato.

Ichthyophagi, ut annotat Hermol. piscium carnes semine Paliuri conditas inveterant.

Troglydytæ succo Paliuri pro vino utuntur vulgò. Nam proceres florem quandam expimunt, cuius liquor nostrati multo similis aspicitur.

De Paliuro apud varias nationes, inquit Ruell. discerepant historiæ, quæ facie multum dissimili, ut apud se nascitur, ostendunt. Inter omnes tamen convenit, eam vivis hortorum sepius dicatam, quod suis minacibus aculeis noxium pecus abigat. At nos vix concedendum hoc putamus Ruellio. Præterea, quem putat Paliurum, non est Paliurus, ut dicitur in Spino alba. Sic & Matth. Ad eò inter se, inquit, in quibusdam historiis discerepant scriptores, ut per se eorum mentes maxime perturbent, qui rerum veritatem indagare student. Id autem discriminis nimirum evenit de Paliuro. Nam quæ huiusce stirpis à Diosc. traditur historia, omnino differt ab ea, quam diversis generibus prætulit Theoph. Hæc autem non convenit cum ea, quam memoriam prodidit Agathocles: neque huic illa correspondet, cuius Plutarch. est autor, & hæc à prædictis omnibus dissente videtur. Paucis eius historiam perstrinxit Diosc. Quod nobis est impedimento, quominus verum Paliurum de qua ipse intellexit, cognoscere valeamus. Theoph. quoque plura Paliuri sunt genera. Quare cùm de Paliuro tot ac diversæ ferantur sententiæ & habeantur historiæ, faciliè, inquit, Matth. crediderim, Paliurum esse nomen ad nationum placita variis ac diversis aculeatis stirpibus impostum: est Ios. phus Sallandius medicus apprime doctus, & in stirpium historia non imperitus, dum Veneta classe in Græciam traiecit, Diosc. Paliurum se vidisse pro certo affirmaverit, semine fuliginoso ac pingui: atque inibi proprium adhuc nomen retinere. Hæcille.

Bellonius scribit Paliurum Agathocles descriptum à Theoph. provenire circa Sues in planitie Arabiæ desertæ. Quæ verò sit hæc Paliurus nondum nobis constat: existimasset Nabeam, de qua mox, nisi ipsa Bellon. separasset. Cordus apud Diosc. scribit variam esse apud autores Paliuri historiam, & in tanta varietate quicquam indicare temerarium fore: autores duplicem tradere, alteram arborescentem, alteram humiliorem. Quidam nihilominus temerarius apud Cordum annotat esse Klein Strachel Viocken, foliis Vitæ similibus. Nos intelligimus Tribulum terrestrem, exiguum herbulam, humi repentem. I nunc & Paliurum dicito. Nos verò ex prædictis satis patere arbitramur, plantam quam antea vocavimus Rhamnum sive Paliurum Iuubinum, non malè ad Paliurum veterum reduci posse. Paliurum alios existimare Iuubam sativam & sylvestrem postea demonstrabitur. Putatur etiam alia Nabca dicta folio Rhamni vel Iuubæ, esse Paliurum Athenæi, de qua paulò post. Quidam existimant Paliurum Theoph. fructu Cedri esse Grosulariam spinosam, ut vocant, de qua sub Vva crispa. Lycium Gallicum quidam vocant Paliurum.



liurum peregrinum i. de quo postea. Agrii humi  
malè aliquibus pro Paliuro habitum fuit. Spinus  
albus sive Oxyacantha Matth. non est Paliurus, ut  
quidam volunt. Mespilus Aronia dicitur Ruellio  
Paliurus Africana, de qua egimus, l. i. Paliuri  
etiam nomen videtur attributum Rhamno sive  
Oleastro Germanico, de quo antè. Acaciam putat  
Ruell. Paliuri Theoph. quoddam genus. Io-  
marinus an sit Paliurus dubitat Ruell. de quo in-  
ter Genistellas sub Nepa.

NABCA FOLIO RHAMNI  
vel Iujubæ.

CAP. XVI.



**E** Creta ab insi-  
gni medico &  
Botanico Honor.  
Bello missi rami,  
nomine Oenopliæ,  
quibus Cortex  
albus, folia  
qualia Iuiubis vel  
Rhamno 3. qui a-  
liis Paliurus dicitur,  
trinerviis tantu-  
llis crenatis cum  
brevibus pedicu-  
lis, & iuxta singu-  
los spinæ tenues,  
albæ. Flosculi ra-  
cemosi similes ju-  
binis.

Fructum verò  
Napeæ & Nabce  
nomine ex Italia  
restitut. I. Hent.  
Cherlerus. Is Prun-  
um Cereum au-  
tumnale æquat,  
cortice rufo inte-  
ctus, cui & caro  
subest concolor,  
saporis grati, aci-  
duli: huic verò  
& osculum im-  
mergitur nuclea-  
tum.

Biseram arbo-  
rem esse adnotat  
Alpinus, Loti ma-  
gnitudine, Acaciæ  
instar spinosam,  
foliis Iujubæ pro-  
ximis, latioribus:  
floribus quoque  
qui Iuiubæ flori-

bus planè sunt similes, albis, parvis. Bello ait, Oenopliæ seu Napeæ arbores ad Pyri nostræ magnitudinem exurgere: fructu, Pomo sylvestri adeò consimili, ut pro altero alterum quis sumperit, dulci, cum acore grato & suavi, nucleo intus, qualis est Olivæ.

Lubet & eiusdem Hon. Belli descriptionem ex citatione Clus. adscribere. Arbor est, inquit, Pyri mediocris altitudine, cuius caudicem & ramos tegit cortex exalbidus, ad cineraceum tendens: eius folia Paliuri Theoph. seu Ziziphi rutilæ foliorum sunt æmula, binas uncias longa, unam latæ, tribus nervis à petiolo secundum longitudinem excurrentibus prædita, supernâ parte saturâ viriditate nitentia, inferna ad cineraceum aliquantulum

Tom. I.

tendentia, quæ ramos alternis inordinata ambiunt: ad quorum exortum multi nascuntur flosculi albi, flosculorum Oleæ instar peculiaribus longis petiolis singuli nitentes. Fructus siccæ edit, parvo Malo valdè similis, magnitudine ut plurimum Cerasi, interdum tamen, Nucem Juglandem etiam æquante, suavis gustus, osciculum in se continens Olivæ instar. Bifera autem est: nam & novo Vere & Autumno singulis annis fructum profert. Vernalis tamen plerumque ad fructum non pervenit, ob imbrium copiam, & à vermicibus corrumpitur.

Duo eius genera, eodem teste: Spinosum utrinum, alterum Spinis carens. Spinosum ab Alpino describitur, qui Connarum Athen. (& rectè) esse censet, licet icon ipsius, arborem non rectè exprimat. Spinis carens, in Aegypto, Syriæque provenit: nascitur & in Creta, in urbe Rhetimò, è Syria allatum, quod non noverat Alpinus, quemadmodum neque Hon. Bellus Spinosum.

Quare diu fuit in ea sententia, ut non Connarum Athen. esset hæc arbor, sed potius Polybij Lotus Lybica, ab ipso Athen. eod. lib. paulò potèst descripta, cuius verba antea citavimus, præsertim cum videret arborem Spinis carere, hancque suam sententiam Alpino significavit, à quo Oenopliæ ramum spinosum acceperat, quem, demptis spinis, eundem fuisse cum Napeæ à se descripta idem Bellus testatur. Ramos nos pulchros vidimus apud C. L. D. C. Bauh. & Jac. Zuingerum inter alias plures exoticas. D. Rauvolf quoque al-

quando ad nos misit fructus hoc titulo Iujubæ rum alia species in Palestina frequens: sed hic fructus rotundus est, non longus, ut Iujubæ vulgares. Alpinus quoque testatur bis in anno flores ac fructum ferre, sed Vere non perfectè maturam, at computrescere prius quam mature-  
scat. At Autumno perfectissimum ac optimum evadere. Provenit Oenoplia seu Nabca, inquit, Bellon. frequens in Aegypto, Syria & Armenia, qua Græcia totaque Europa caret. Secundum eundem, omni tempore viret, quod tamen Hon. Bellus tantum in Aegypto & Syria nascente, verum esse ait: in Cretam verò translata, falsum, teste experientia. Porro utriusque prædictæ

arborum, tam spinosæ quàm non spinosæ, historia est apud Serap. sub nomine Sadar, eodem censente, nec repugnante Alpino, sed more suo cum Loto Diosc. (à qua valdè differt) confundit. Is Sadar duas facit species, una est Afri, & alia est Ad hal: sed Afri non habet spinas acutas, utriusque autem speciei folia sunt lata & rotunda: sed Nabach & Ad hal fructus sūt parvi, præferuntur autem huius provincie cæteris, & in regum mensas veniunt, quia dulcedine omnibus aliis præstant, sicut & odore, nam & aromaticam suavitatem in ore relinquunt, eandemque indumentis conciliant iuxta ea positis, sicut alia aromata. Reliqua quæ de Nabach [hoc est Loto] habet ex diversis autoribus, cap. de Loto recitata sunt.

An Lybica Paliurus Theoph. Item an Paliurus & Afforum Zura Plin. Item an Athen. Connarum Agathocli, qui & idem etiam Paliurum appellare videtur? Verba eorum, quòd adhuc dubij sumus, antè adduximus, cum de Paliuro ex Veterum placitis traderemus. Interim certiora perquirent posteri.

Bellon. vult esse Oenopliam Græcorum, à qua Paliurum Agathoclis aperte distinguit, lib. 2. obl. cap. 54. Considerandum an historia Loti Polybij apud Athen. quam antea sub Paliuro Connarò subiecimus huc referri possit.

Differen-  
tia.Spinosa:  
Spinosa: ca-  
rens.Connarum  
Athen.Iuiubarum  
species.Sadar  
rap.  
Serap. re-  
preh.Sadar dua  
species.An Paliu-  
rus veteru  
An Conna-  
rum Aga-  
tho.Oenoplia  
Græcorum,  
An Lotus  
Polybij.

Nabcam, dicit Alpinus, olim Aegyptiis idem fuisse cum Paliuro & Connato Athenarum: tamen Connari fructum non videri omnino similem Nabcae fructui ac offi: sequi etiam nusquam in Aegypto ex ficatis illis fructibus farinam fieri animadvertisse.

*Cedrus Libani.*

*Iuiba alba.*

*Nep Nep Syria. Vires & Tempera.*

*Stomachi & alui relaxatio.*

*Vlcera intestinorum. Febres febrifera.*

*Cardiaci. Purgat bilem. Febres putrida.*

*Cibus.*

*Novi.*

P. Martyr de rebus Oceani & noui orbis: Poma inquit illa, ut Praecocia Pruna, quae olata parua etiam & rubella, arbitror ego eius generis, qualia ipse comedi Aprilis mense in Aegypti Alexandria: quorum arborem Iudaei indigenae periti legis Mosae, Cedrum Libani assueverant, ea sunt esui apta: dulcedinem leni quadam acrimonia mixtam habent, uti in Sorbis videmus. Loco Persicorum & Cerasiorum, aquae huiusmodi aliarum arborum incolae in hortis arborem hanc plantant, & diligenti cura nutriunt, cum peregrina sit. Ea est Ziziphæ arbori & altitudine & trunci etiam similitudine. Et Ruyus. Iuiba albam vocat, Weissenbrustberlinbaum / quam se vidisse ait inter Rama & Ioppe: primumque existimasse, esse Paliurum nostrum, tertium genus Rhumini, ac tandem agnovisse errorem, similem, tamen esse Paliuro 2. cuius Theoph. nomen, l. 4. cap. 4. In Syria teste Bello, Nep seu Nap vocatur: ac in Creta proprio nomine caret.

Horum fructuum temperies, si Serapioni credimus id de Sadar suo ex diversis scribenti, est frigida & sicca in primo gradu: perfecti maturo aliquam habent humiditatem: sunt omnes altringentes, ante maturationem, quorum usus frequens est ad stomachi aluique relaxationem firmandam: ad quae mala succum etiam ex ipsis immaturis expressum familiariter tum per os sumptum tum clysteribus iniectionem usurpant Aegyptij, teste Alpino. Ex iisdem quoque fructibus siccis in aqua maceratis fit infusio utilis ad intestinorum relaxationem & ulcera. Sed maturorum si catarum decoctum aut infusio familiarissima est ad omnes pestiferas febres. Aiant enim hos fructus miram aduersus venenosus qualitates & putredinem, efficaciam habere, corque strenue roborare. Succus item perfecti maturorum optimus est ad purgandam bilem & ventriculo, & primis venarum ductibus. In omnibus etiam putridis febribus, infusione ex ipsi parata, libenter ad sedandum calorem utuntur. Esui summe iucundi existunt hi fructus, praecipueque maturi: tamen parum nutriunt, facileque, ut Cerasa, in stomacho corrumpuntur, si immoderate ipsorum esui indulgeatur, stomachusque offenditur. Apud primates tamen Aegyptios ac Turcas non delicias sunt, & magno in pretio habentur.

## ZIZIPHA SATIVA ET SYLVEST.

### C A P. XVII.

**Descriptio** QVAE in officinis notae Iujubae fert, arbor est domestica, sed in fructum spinosum facile degenerans, teste Celsus. aliqui satis magna, stipite recto, in ramos plures brachiato, quibus in tenuibus furculis quasi pediculis adnascuntur alternatim folia, unciam aut sesquunciam longa, semunciam aut unciam fere lata, in obtusum mucrone definita, splendide virore nitida, tribus secundum longitudinem decurrentibus nervis, per ambitum serrata: ad quorum ortum rami spinis horrent, alii aduncis brevioribus, alii rectis longioribus: (sed cum senescit aculeis caret, inquit, Celsus.) eodemque loci flores, plures fere simul emicant, pediculis brevissimis, ut fere sessiles videantur, Ribes floribus persimiles, colore herbaceo, apiculis concolori-

*Folia.*

*Spina.*

*I res.*



bus. Hoc se ferunt & magnitudine Olivari, Corso, crassiores, per maturationem tamen, velut testatur Celsus, paulo ingratius, quam iunioribus, quibuscula crassiuscula pulpa subalbidam mollem fungosam mellem dulcedinis contingerit, cui immergitur ocellum oblongum, utrinque acutum, rugosum, in quo nucleus compressus, Læus

maioris instar, rufa pellicula tectus,apore amaro.

Cordus quoque singulari diligentia, hos fructus de quibus et loquuntur G. & C. Ziziph. nomen ab Oriente in Europam introducta, arboris Poma seu baccæ sunt: Cuius baccis sanguineis & splendens foris colore, oblonga figura & singulari inus ligneoque semine similes, aliquantulum tamen maiores, & ad mediocritatem Pruni, aut Olivæ magnitudinem, accedentes, levi, molli, glutinosi gustique dulci pulpa seu carne constant: si parva singulare, ut diu non est, semine continentes, utrinque acuminatum, foris duro ligno intus oblongo aliquantulum cōpresso & raso nucleo constants. Afferuntur ex Italia ad nos siccatæ, ideoque rugosæ. Iujubæ minores, Plinio Tuberes appellatæ, colore nitore, carne molli lentore, sapore & quodammodo inusum, si non neque minores, nec oblongæ, sed rotundæ: atque similiter flaccidæ. Eligantur maiores ponderosiores, minus flaccidæ, & pleniores carnem habentes. Afferuntur hæc quæ ex Italia.

Iujuba sylvestris, teste Anguil. similis est Paliuro primo, quem folio Iujubino diximus, non solum foliis, sed ramis & spinis. Frutex est altitudinis quatuor aut quinque cubitorum: cuius rami se terram versus contorquent ad formam semicirculi, spinis abundantes crassioribus, & similiter acutis, binis simul dispositis, modo prædicto.

Folia disposita sunt ut in Sorbo. Fructus similes Iujubis domesticis, nisi quod multo minores, & similiores Cedro ferenti fructus minores, aut Lauri fructibus, qui, ubi maturerint, rubent, & esui apti: non autem nuclei, qui ossi, ideoque reiciuntur. Quibusdam in locis fructus hi in vinum immittuntur ut suavius reddatur. Reperiuntur in agris Veronenensibus.

Columella rutilam & albam Ziziphum inter probatas arbores, & apum pabulationibus commodas refert: postea tamen Ziziphi flores ait mel mediocritatis gustus reddere.

Plin. zizipha & Tuberes retulit ad mala, quorum plura genera dicit. & mox subdit: Aequè peregrina sunt Ziziphum & Tuberes, quæ & ipsa non pridem venere in Italiam, hæc ex Africa, illa ex Syria. Sext. Papinius, quem Consilem vidimus, primus utique attulit, D. Augusti postioribus temporibus, in castrorum aggeribus fata, baccis similiora, [de ziziphis id audiendum, non de Tuberbis Dal.] quam Malis, sed aggeribus præcipue decora, quoniam & in testâ iam sylvarum scandunt. Quibus utique postremis verbis insinuat, ut vult,



re vult, eisdem iam suo tempore in privatorum hominum hortis abunde fatas. Dixit porro Plin. etiam Zizipha alba & Gappadocia, de quibus sub Olea Germanica. Nondum liquidd patet, an de his Græci antiquiores prodiderint: sed mox specialius inquiramus.

Gal. verò Zizipharum meminit, ut dicitur in viribus. An Serica idem? Ambegerunt sanè doctissimi viri. Et videtur eruditissimus Had. Iun. satis confidenter *Σινεϊς* Gal. & *Ζιζυφο* Simeonis Sethi unum & idem pronunciare, quamvis alij plures, ante eum id fecerint, ut mox dicitur. Plin. sinè diversa statuisse videtur. Et quas Gal. Sericis attribuit vires, Ziziphis optimè conveniunt. Apud Avic. legimus: De Iuibis, id est, Sericis. Sed in hanc rem amplius perquirendum. Si verò quis consideret Connari, & Lon Polybij utraque descriptiones, antea à nobis ex Athen. adductas, multa in iis deprehendet, quæ cum Iuibis conveniunt. Ex posterioribus Græcis Actuæ. & Simeon Sethi Ziziphorum meminit: Ille quidem Iulapij ex Ziziphis facti: hic verò vires habet: & ex iis præfert maiora, qualia Edissena dicit. At scriptiores Arabes hæc potissimum in usu medico claros fecisse videntur. Ruell. coniectura se non posse assequi tradit, quemadmodum Græci Tuberes ipsa, appellent, nisi eas quis Serica vocari putet, parvi succi poma, ut tradit Galen. Idem ex Plinij & Colum. Zizipho, & ex Sericis Galeni ynam histor. facit. Eadem quoque dicunt & faciunt Avic. Rhafes & Averrhoes: Plinius item Valer. Paulus, Aetius quos omnes citat Cronemb.

Item Curtius, Gese. Monachi, Lonic. Vesalius, Amatus, Cæsalp. Lob. Costa, & alij. Dubitant verò Matth. Tragus, Camer. Dod. & nos, non tamen ut illud negemus. Melius inquirunt posterii. Matth. Plinij Codicem, l. 17. cap. 10. ubi separat Tuberes à Ziziphis, depravatam putat, quòd ruspam apud Colum. Tuborum mentionem fieri legit. Suspicionem eius auxit, quòd inter Arabes Avic. & inter Græcos recentiores Simeon Sethi, duas Zizipha species scriptis mandaverint, & quòd tamen in Plinio una tantùm legatur Ziziphus. Omnium verò maximum argumentum putat, in Plin. subesse mendum, & illi de Ziziphis id ascibendum esse, quòd de Tuberibus fortasse malè legatur. Verum ex Palladio distinguente Zizipham à Tuberibus, satis apparet argumenta & suspicionem Matthioli contrarium sentientes, parvi ac nullius esse momenti.

Sed Anguill. placita non contemnenda hoc loco nobis perpendenda. Antiqui, inquit ille, epist. 2. varias habuere Paliuri species. Athen. meminit unius, distictæ Connarus, multum differentis ab omnibus reliquis, quam attribuit Agathodoli, cuius descriptio aliter interpretanda quam vulgò fit: Versionem correctiorem ex Græco, & Anguillaræ etiam consentientem supra dedimus. Ait tamen idem, Paliurum nunc sibi incognitum, nisi dicamus esse Iubas, modò vox *σεννιβας* vertatur longus cum rotunditate, id est, ovali figura, quemadmodum ad genuinum sensum est vertendum cæset, Theoph. quoque duorum Paliurorum meminit, quorum unus familiaris erat suæ regionis, alter peregrinus de quibus supra. Vtrumque genus sibi notum dicit Anguill. Ac priorem quidem esse Rhamnum 3. Dioscor. de qua re supra plus satis: Alterum verò sive Africanum esse Iubam sylv. Ex Plin. quidem oriri dubium de hac sententia: sed censendum esse Plinium errasse. Theoph. per vocabulum *σεννιβας* semper intelligere nucleos, qui intra se continent se-

men duos ut ossa, ut sunt nucleis sive ossa Cerasorum, Olivarum, Persicorum, Prunorum. Quam vocem Plinius, qui refert omnia quæ dixerat Theophrast. nucleum interpretatus est, & rectè. Idem Anguill. credit textum Theoph. corruptum esse, cum ait, os Paliuri simile esse Malorum Punicorum ossi, cum Mala Punica nullum os habeant, sed solum grana illa quæ à Theoph. dicuntur *κωνο*: ac sic conveniat cum Plin. dicente: Non comeditur cum nucleo, omittens Malum Punicum, ut verba suo tempore nondum inserta in Theoph. textum. Verum in iis quæ sequuntur apparet eum malè intellexisse Theophrastum, ut videre poterunt legentes. Fortè melius legere-tur, si apud Theoph. pro Malo Punico reponeretur alius fructus nucleum habens. Concludens denique Anguill. Si [inquit] in Italia ostendi potest Paliurus Africanus, nescio quid melius ei conveniat quàm Iuibæ sylvestres. Eiusdem opinionis & Guilandinum ipsum fuisse intelleximus.

Idem Anguill. seq. epist. Existimo, inquit, nullum errorem commissurum eum: quid dicit, Lotum ab Athen. descriptam, esse eam quam dicit Theoph. in Pharide provenire, quandoquidem pauca ex notæ, quas Theoph. suæ tribuit, ascriptæ sunt ab Athen. suæ, quam describit ex sententia Polybij. Verba Athenæi ostendunt, Lotum Pharidis non esse differentem ab hac Loto, quoniam Lotus ossæ Plinij nihil aliud, est, quàm Pireus Pharidis Theophr. Sed Lotus Athen. est Lotus ossæ Plinij. Hoc esse verum ostendit Plin. dicens: Ex Loto ossæ vinum exquiri simile mulso, quod ultra denos dies negat durare, ut etiam ait Athen. Videatur Athen. ipse. Lotum Ossæ esse Pireum Theoph. negari non potest, cum eadem sint verba quæ Plinij, sed advertendum Athenæum sibi contradicere in foliorum descriptione, ut pote qui sic habet, *ἔχει δὲ ὅλην ἡ χλωρὴν ὡς τῆς θύρας τὸ πρῶτον μικρὰς καθύπερθε καὶ παρυπὸς*: quæ verba sic transfert Anguill. Lotus folia habet vitidia similia Rhamno, parva, longiora & latiora. Sed folia parva, & lata, & longiora, videntur res contrariæ. Sic ille, qui nobis quidem nodum in scirpo quætere videtur. Quasi verò non aliquid possit esse parvum simpliciter & in se consideratum, & tamen longius & latius, collatum cum alio minori. Dura tamen, ut ingenuè fateamur locutio Athenæi, [quamvis non aperta contradicção, ut Anguill. censet] eam autem tolli posse existimat, si dicamus: Folia Loti parva, vitidia, similia Rhamno, sed longiora & latiora: quæ versio cum Dalech. ferè incidit. Ac ita fortè intellexit Athenæus. Denique addit Anguill. suo iudicio non erraturum eum, qui hanc plantam dicit esse Iuibas [Giugiole] domesticas. Hæc ille. Quoad nos maiori ex parte Anguillaræ sententiæ subscribimus. Inclinat enim multum animus Theoph. sub Loto, & Plinium sub ossæ Loto, de Loto Athenæi locutus, ac Lotum Athen. esse Iuibas. Verum non videtur nobis eo loco distinguendum, quo distinguit Anguill.

Quæ autem Theophrastus scripsit de Loto arbore, à nobis transcripta sunt lib. 2. sub titulo Loti Pharidis. aiboris fructu Cerasi, quæ si quis consideret, iuxta interpretationem Anguillaræ, tria ibi videntur tradi Loti genera, & præterea Paliuri duo. Primam diximus dicto libro, Lotum fructu Cerasi: Secunda est Lotus Pharidis, quam Anguillara eandem cum Loto Polybij putat sive Iuibis. Tertia erit, quam Theoph. post Paliurum de-

*Th. ophr. correct. Anguill.*

*Lotus Pharidis.*

*Iuibas domestica.*

*Lotus Pharidis.*

*Lotus Pharidis.*

scribit dicere: Reserunt quidam Loti, & Graecia sanè cum Iuibis videtur convenire. Paliurum autem Theoph. secundum fructu Cedri, Anguillara existimat esse Iuibas sylv. Si liceat fateri verum, obscuriora & breviora videntur, quae Theophrast. Plin. & Athenaeus scribere de his plantis. Dalech. Lotum Polybij apud Athenaeum aliter quam Anguillara eadem existimat cum Dioscoride, lectionem tamen non parum mutat, ut suam tueatur sententiam. Ex Anguillara per *Bzdran* intelligit *μακρότερον*, longius. Nos diximus fortè interpretandum esse paulò amplius, aut maius. Quid præterea præcedentibus verbis intelligat Anguil. per Pireum Pharidis Theophrasti, considerandum. Pirei vocabulum non invenimus apud Theophrastum. Voluit fortasse scribere Pyrinus, sed non recordatus se pro *πυρρον*, restituere *πυρρον*, & convertere Ital. Il Primo. Hec & alia faciunt, ut nihil adhuc asserere audeamus, ne quid temerè pronuntiare videamur, iam dictis non bene intellectis. Vocabulum præterea Rhamniquivocum videtur, nescimus an Athenaeus de Rhamno Theoph. & Diosc. nigro & albo intelligat: si intelligit, Iuibas non convenit: Si Paliurum intelligit, quem Theoph. comparat Loto: cur non potius Theophrast. voce usus, quam voce Rhamni, quæ apud Dioscor. supposita existimatur? Pro Rhamno tertio Dalech. censet legendum *πυρρον*, illicis.

Rhamni  
non equi-  
voco.

Lotum Phari-  
dis Theo-  
phrast.

Paliurum  
Africanum.

Ab Anguillara sententia non alienus fuit Gesn. ubi ait: non desunt qui veteribus etià Græcis hæc arborem (nempe Ziziphum) cognita fuisse putent & ad Lotum quam Theoph. in Phatide insula Lotophagorum nasci tradit, referendam. Optime sanè convenire videtur arbori quam Athen. Loti Polybij nomine describit ex eiusdem histor. l. 12. Quin & Guiland. Paliurum, inquit, Africanum Theoph. Iuibam esse non dubito.

Iuibam patris auctorum præconiis inclaruisse mirum, quum Homero antiquissimo Poëtæ ante annos ter mille Loti nomine sit celebrata. Sic & Alpinus mirum non esse ait aliquos etiam viros doctissimos Iuibam Paliurum esse voluisse. Et Dod. in Hist. Gal. Si quis, inquit, expendat quæ Theoph. de Paliuro tradit l. 4. c. 4. competet alteram esse Iuibam sylvestrem.

Cæsalp. quoque non parum negotij nobis accessit in hac historiâ. Is quippe de suo Tubere scribens (quem nos Azadaracheni vocamus) ait habere fructum Sericorum ferè amplitudine, Iuibas intelligens. Postea, inquit: Plinius Tuberes candidos vocat cum Sericis affines & cum Ziziphis: omnia peregrina in Italia, bacis similia quàm Malis. Colum. Zizipha videtur appellasse, quos Plin. Tuberes, cum similiter scribat eorum duo genera, rutilum & album. Nos verò, contra opinionem Cæsalpini, diversos putamus fructus, ut annotatum l. 2. c. de Persicis, ad quorum genus referimus Tuberes. Præterea, non concedimus Cæsalpino, Plinium dicere, Tuberes esse baccas: peregrina quidem dicit Zizipha & Tuberes, verum de Ziziphis tantum dicit, baccas esse. Scribit præterea Cæsalp. Serapionem Iuibas putare esse apud Gal. Serica: Plinium distinguere Zizipha à Sericis, quæ difficile sit nostris Iuibis aptare. Quid si [addit idem] Paliurum apud eundem Plin. & apud Diosc. asseramus esse nostram Iuibam? Quid si & Theoph. eandem intellexisse dicamus cum de Paliuro scribit, & *μακρότερον* *πυρρον* *μακρότερον* *πυρρον* quem locum Gaza convertens, abstulit illam vocem, sicut solum. At verbum

Tuberes.

Cæsalp. o-  
pinio recte  
est.

*μακρότερον* significat etiam extremitates quatuordecim, ut extremas aurículas & pulmonum fibras. Fert igitur Paliurus in extremis ramis tenues quoddam virgulas in quibus fructum & folia: immò unicuique folium videtur communi pediculo tres aut quatuor fructus continens, ut inquit, Theophrast. quibus medici ad tussim contusus utuntur. Quod autem de foliis scribit in extremo & lateribus sinuata considere, ut in Rubo & plerisque aliis, accipiendum est de integris virgulis, tanquam foliorum pediculis, quarum gratia alibi testatur Paliuri folia reddi spinosa ut Rubi. eius fructum oblongum esse idem testatus est in Ace-re.

Alium porò describit Paliurum in Africa nascentem, Loto magis fruticosum, folio similem nostrati (*πυρρον* *πυρρον*) Paliuro: cuius etiam meminit Plin. in Cyrenaica regione Loto antecellere, &c. Ex quibus colligitur Paliurum fructum forte nucleum continentem, nostratam autem ab Africano differre figura & colore: non enim in acutum turbinatur, sed æqualem amplitudinem servat per totam longitudinem fructus. Gaza tamen vocem *πυρρον*, non turbinatum vertit, sed rotundum. Quamvis habeamus Iuibam sylv. fructu non rotundo, sed in latitudine depressa.

Hæcenus Cæsalp. qui per Iuibam sylvestrem intelligit Rhamnum, quem diximus folio Iuibino, qui sanè bene respondere videtur Paliuro primo Theophrasti, non autem Iuibas, quomodo-ocunque Cæsalpinus Theoph. verba interpretetur.

Zizipha, Græcis *ζίζυφος*, *ζίζυφος*, tot & synonim modis scriptum invenimus: & *ζίζυφος* in nostro Simeone Sethi, nisi sit mendum. Iuibas offic. Galeno, ut quidam volunt *ζίζυφος*, Serica. Iuibas rubra Bellon. rutila Colum. *Ziziphus punicea* Hist. Lugd. *Ziziphus rubra* Camer. *Ziziphus rutilus* Clus. Iob. teste *ζίζυφος*, Grecorum: *luzuka* Arabum, *palurus* Africana Theoph. Lotum 2. Polyb. Crategus fortè du Theoph. Arabicè, ut in Serap. Hunen & Zulfazef, quasi Zizipha. Invenimus pro Arabica nomenclatura vanè notari *zulfazef*, *zulfazef* Hamen, Hanab, Hunen. Anep. Germ. *Brustbeeren*. Vocantur & *Note Brustbeeren*. Gai. *Iuibas*. Nard. seu ling. Gortica. *Grandulier*, & *Guindoles*. Belg. *Iuibas*. Ital. *Guggiolo*. Hisp. *azufesca*, *azufesca*, vel ut alij scribunt *azufesca*. Lusit. *Mazacan da Nafega* lidem Arabica lingua *ponium* ab *Alnasegua* vocant, teste Amato.

Camer. pro *saiva* & *zizy*. duas apposuit pulehras figuras. Tantò ineptior Tragi. Nec mirum: quippe qui fateatur se arborem non vidisse, sed LONI. CERI figura penitus inepta & falsa. Pro Iuibis Dorst. quoque malam iconem habet, fructum Rosarum sylvestrium. Nascitur in Lenano insula, in Syrie planitie inter Damalcum & Libani montem. Bellon. Qui alio loco dicit, ad Iordanem fluvium allatas venales Iuibas, tam albas quàm rubras, cum Ficibus, Vitis &c. Gaudet solo & calido alio, aut certe temperato. in Hispania, Italia & Gallia Narbon. hortis colitur. Clus. scribit nunquam spontè nascentem à se viam. Coiant & Lugduni & Geneva, ac Lugduni quoque fructus fert. A multis iam annis ubi crassitudinis arborem & alias parvas colimus in horto E. C. Montbelgardico, ex Gallia Narbonensi & Lugduno allatas: sed hyeme magna cura reponuntur: quotannis ferè florent, sed admodum tardè & vix ante Augustum: unde subsequentes pluvie frigida cum floribus fructuum etiam primordia decidunt. Sylvestres etiam siuequentes Montpelj occurrunt



occurrunt, valde spinosa, & in nonnullis campis Italix. Monspelij florent Maio & Iunio. In illis ramuli quorum folia hyeme sæpe decidunt, in nostris vero, id ferè quotannis: sed subinde nova recrescunt. Ita in eodem ferè statu permanentiam à pluribus annis.

Fructus leguntur autumno, vel post, unà cum fuscis, & in manipulos colligati post aliquot dierum insolationem laquearibus suspenduntur. Postremò decerpi in capsulas reponuntur ad medicos usus. Sunt etiam qui decerpta Zizypha, & cratibus tegetibusque instrata, tam diu insolant, quousque rugosa ibidem fiant. Zizypha, inquit Palladius collecta matura in longo vase fictili servantur oblito, & loco fictiore composito, vel recenter lecta poma, si guttis vini veteris persundas, efficitur, ne ea rugarum deformet attractio. Seruantur etiam decisa cum ramis suis, aut fronde sua involuta, atque suspensa. Diutius conservantur, promittentibus Græcis, si in vinum mulsum coniciantur, interlatis vicissim arundinum folijs.

Loci calidis Aprilis mense, præcipiente eodem Pallad. Zizyphum conferemus: frigidis verò Maio, vel Iunio. Amat loca calida, aprica. Seritur ossibus, & stipite & planta. Crescit tardissimè. Sed si plantam ponis, Martio magis in terra molli: si ossibus feras, in scrobo palmari, ita ut terna grana per scrobem cacumibus ponantur inversis. Quibus in imo & in summo affundatur latamen, & cinis, & herbis adnascentibus manu planta liberetur circumspens. Cum pollicis soliditati similis fuerit, transferatur in locum pastinatum, vel in scrobem. Terram diligit non nimis lætam, sed proximam tenui atque ieiunæ. Per hyemem prædest illi, ut circa codicem lapideum cumulus aggeratur, qui æstate debet auferri.

Si arbor hæc tristis est, ferrea strigili subrasa hilarior fiet, vel, si simum bubulum radicibus modicè & frequenter affundas. Plantatur etiam è ramis è media arbore acceptis, sicut Didymus in Georgicis suis tradit.

Seneca, [quæ plerique, uti dictum, Iuibas putant] non ausim affirmare, inquit Gal. quicquam ad sanitatis tutelam, aut morborum profligationem pertinere. Mulierum enim atque infantum effusporum est edulium, quod exigui est alimentis, ac concoctu difficilis: & præterquam quod stomachum non iuvat, paucum etiam alimentum corpori exhibet. Etsi verò Iuibæ Galeni tempore, in usu medico fortè non fuerint [si modò ex per Serica intelligendæ] à posterioribus tamen Græcis, maxime Aëuario, Actio, Simeone Sethi, & alijs in usum medicum vocatæ sunt, nec erat cur hic Fuchsius inhereret in Arabes, maxime, cum ipsemet Sericum Galeni pro Iuibis habeat, dicens omnia quæ de Zizyphorum viribus literis mandarunt Arabes, falsa esse: nec videns interitum, se non modò Arabes scriptores, sed Græcos recentiores, & posteriores medicos omnes, immò etiam seipsum damnare, ut facili patebit ex ijs quæ mox dicentur. ACTVAR. quippe tradit Oxyfacchar, vel ut alij vertunt Iulepum è Zizyphis conferre ad ardentem febrem, purgare sanguinem, & tussis, ac ex calore destillationis, succurrere. Zizypha, inquit Sim. Sethi, commendam quandam [quæque] quandam] habent humiditatis & caliditatis. Proprietatem verò sedandi sanguinis acredinem. Bonum etenim succum gi-gnunt, & evacuant, quod solum est in sanguine. Facit ad tussis eorum decoctum, & ad spirandi difficultates, pectusque & renes ac vesicam. Me-

liora sunt quidem Zizypha quæ maiora, quales sunt Edissena. Sedant etenim hæc acrium humorum vomitum: verum difficilis sunt concoctionis & Lienii officium. Quamobrem satius est eorum uti decocto. Arabes etiam [annotat Tragus] in Zizyphi facultatibus commemorandis nequaquam consentiunt. Serapio siquidem unà cum Rhase Iuibas calidas & humiditas esse dicit. Contra Averrhoes frigidas & humiditas pronunciat. Cæterum potestis fructus pectoris vitij adhiberi. Ad asperitatem arteriarum & asperam tussim Iuibæ profunt. Ex his officinis potiones, Electuaria & alias confectioes parant. Serapio ex autoritate Aben Mesuæ acuitatem cholerici sanguinis extinguere tradit. Pueris exhibentur in exanthematibus, & alijs ad Erysipelas: in pleuritide, ardore urinx, ulceribus renum & vesicæ usurpantur.

Sed antequam Avicennam, quem Fusch. nominè tenus carpit, audiamus, ipsiusmet Fuchsi verba de viribus recensenda. Iuibæ, inquit, fructus, Myxarijs affinis facultate: nam calidus humidus primo gradu, atque etià pulmonarius. Ad fluxiones calidas, acres, tenues in pectus salubet. Ut alimentum verò à Galeno damnatur. Quem locum Avicenn. & Sauonarola citant in suis Iuibis. Cæterum eandem sententiam ex ipso Galeno sumptam reddidit Avicenn. cui tantum illud addidit, quòd ea ad pectoris & pulmonis vitia conferant, & quòd quidam (ut ferunt) cum maxime renum, tum etiam vesicæ affectibus prodesse consueant. Verum ex ea occasione, quòd Gal. ait nullam se invenisse in Sericis facultatem ad corporum affectus curandos, Fuchsius in Avicennam quiritatur, & ceteros Arabes. Sed an id iuvandi, an contradi-cendi studio, lectorum iudicium esto.

Nicol. sanè Alexandrinus Zizypha passim suis medicamentis pectoralibus admiscet, præsertim ubi ex calidorum humorum influxu morbus emerferit: item inter ea quæ bilem deiciunt. Ideò quæ nihil mirum, ut inquit Matth. si ad hæc omnia præstare Zizypha tradiderit Avicenn. Suo enim lentore, ac sua, quæ ægrè permeant, crassitie, sanguinem condensant, qui flavæ bilis redundantia tenuior, quàm par sit, redditur. Ut non malè tam à citatis Græcis, quàm ab Arabibus in pulmonis affectibus commendatur, & etiamnum hodie magno multorum cum solatio usurpentur Syrupi specie, in quem concinnata, Iuibino nomen & famam dederunt.

Cæterum hallucinavit eos censet Matth. qui Zizyphis sanguinem expurgari ac abstergi contendunt, quique ea ijs commiscunt medicamentis, quæ pectoris affectibus à frigidityte obortis parari solent, ut recentiorum nonnulli, qui Zizyphis, nulla habita eorum ratione, ad quodvis pectoris vitium indifferenter utuntur, & plerumque cum magno ægrotantium discrimine.

Nos verò non possumus Matchiolo assentiri, statuenti ex usu Iuibarum magnum creati ægrotis detrimentum in affectibus pectoris à frigidityte obortis: sunt enim dulces, nec ullam habent manifestam frigiditytem: quinimò tribuitur eis caliditas in primo gradu: quapropter in eiusmodi affectibus à causa frigida Syrupus Iuibinus omninò videtur concedendus: & si fortè denegandus, non propter Iuibas, sed ob alia frigida admixta.

In Syr. Iuibino Mesuæ, pro Iuibarum lib. x. legendum numero 1x. & non mutandum aquæ pondus, ut fecit Manardus, notantibus Monachis. Restat ut de Zizyphorum facultate Pallada-

Nasa.

Asperitatis arteria.

Exanthemata. Pleuritidis.

Matthi ipsa hallucinavit.

Error in Syr. Iuibis.

Experimen-  
tum in  
Quartana

Græci Pōltz iudicium inaudiamus. Fatetur is se vim egregiam in iis invenisse: quippe qui, cum Quartana laboraret, & Zizipha insperisset, subito se convalescere asserat, & Croto factum: cuius rei testimonium perpetuum hoc epigrammate extare voluit:

Ἐκ τῆς Ζιζιφῆς ὁ Πόλτζος ἰσχυρὰν ἀνὰ βίαν  
Ἰσχυρὰν ἔλαβεν ὅτε Ζιζιφῆν ἐκείνην  
ἠπείχετο, καὶ οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὰ πάλιν  
καὶ πάλιν ἐκ τῆς Ζιζιφῆς ἐκείνης ἔλαβεν.

Miram sane verò ac verè Diuinam Ziziphorum vim, si his & hoc modo iis Quartanæ cura adscribenda. Non tacendum tamen, notante Curtio, in quibusdam exempli. legi *διζιφῆς*, cuius vocis explicationem ne ex tripode quidem petas.

### BER INDICA FRUCTV IVIVINO.

C. P. XVIII

Descriptio

Folia.

Flores.

Fructus.

Delectum.

Lacca.

Arbor Ber-  
riferæ.

Nomina.

Cibus.



DER Indis dicta, autore Acoſta magna est arbor, multis foliis & floribus prædita & copioso fructu, foliis rotunda sunt Mali foliis, tamen ea emulcentur, superne saturatè virent, inferne candicant & pubescent uti Salviz. In gustu adstringente, Flores exigui, candidi, quinque foliolis inſtantes, inodori: Fructus Ionubis

sen Ziziphis similes, alij aliis maiores & suaviores, nunquam verò tam probè maturescentes, ut conservari queant, & in alias regiones transferri, uti Zizipha, & perpetuò nonnihil astrictionis retinentes: unde colligitur minimè pectori utiles esse, quemadmodum Zizipha. Præferuntur fructus in Malaca nati Malabaricis: sed iis adhuc præstantiores quos Balaguate profert. Conspicitur hæc arbor ætate alatis formicis perpetuò onusta, quæ in ramis eius Laccam elaborant. Garcias præter ista ait eum fructum, qui in Anafegua provenit, commodè exſiccari posse. Arborem verò nonnihil spinosam esse. Allatumq; sibi ramulum ab arbore Beriferæ revellum, cui multa inhaerent Lacca.

Vocatur hic fructus in Canara *Bor*, in Decan *Ber*, in Malaya *Vidaras*.

Hist. Lugd. *Mala Indica* Acoſte vocat, Lusitani *Mancanas de la India*, id est, *Mala Indica*. Cum aliis eſui aptis Malis careant in prædictis insulis ac provinciis, commendantur hi fructus apud eos.

### LACCA.

C. P. XIX.

Cum Lacca in arbore prædicta, tanquam loco natali gignatur, vel sanè tanquam in horreo



a formicis conge-  
ratur, merito ea  
huc dicenda.

Lacca gummi, ut in officinis habetur, concretione bacillis perennae ter circumvoluta adheret, suspensio inæquali, rugosa & veluti granulata, pellucida, colore rufo, flavo, aut ex rubro nigricante, intus cavernosa, nescio quid nigri, fibrillis subsistit in antus continens, sapore nullo evidente, spiritu colore ru-

bro tingit, qui longè apparet floridior, si cum aqua misceatur. Prunis imposita bullat primum, levem odorem resinofum spirans, tandemque flammescit. Vi detracta bacillis, corticem ferè secum rapit. & canaliculata qua adhæsit, apparet. Bacilli duarum triumve unciarum aut longiores cortice teguntur satis crasso, melino ferè: materies ut coryli, sed medulla copiosiore facta.

Reliqua historia tota incerta quodammodo est, vel ipso Garcii teste, qui de ea in hunc modum scribit. Quidnam sit Lacca, quomodo pararetur, & ubinam gigneretur diu dubitavi. Nam affirmabant nonnulli in Pegu flumina exundare atque alveum suum superare solet: aqua deinde defluente, in lutum quod remaneret baculos ab incolis iniici, in quibus prægrandes formicæ nascerentur alatae, quæ multam Laccam accumularent.

Verùm hi non oculati testes ex fama vulgari narrarunt. Aptimè curiosus diligensque vir, qui istuc fuerat, ubi Lacca colligitur eidem retulit vastam arborem inveniri in Pegu & Martaban, foliis quodammodo Pruni, in cuius furculis & minoribus ramis magnæ formicæ in terra viscibus aliisque locis enatæ, hanc Laccam elaborarent (ut apes mel conficiunt) materiam ex ipsa arbore exsurgentes. Hos deinde ramulos ab arbore revelli atque umbra sicari, donec deciderent ramuli, Lacca autem ipsa velut in tubulos concreta maneret: interdum tamen ligni fragmenta inhaerere: at meliorem censeri, quæ sincera esset, lignique fragmentorum experte: eam verò, cui inhaerent fragmenta, deteriorè. Inveniri etiam fordidam & minimè sinceram, quam postea colliquantur, & in pollinem reducerent, eamque viliorè censeri, quoniam multam terram admixtam haberet. Deinde negotium dedit idem Garcias quibusdam qui in Pegu profecturi erant, ut, an ita se res haberet, diligenter perquirerent: sed ij retulerunt verissimè eum dixisse. Idem postea verum esse didicit in Balagua te profectus. Allatus quoque eidem ramulus ab arbore Beriferæ revellus, cui multa inhaerebat Lacca. Sed quoniam exigua admodum quantitate provenit, ibi negligi ait. Ibi tamen se vidisse in arboribus, affirmasse testatur. Formicæ autem hanc Laccam elaborare inde manifestum putat Garcias, quòd plerumque alæ formicarum Lacce permixtæ conspiciantur. Præmanſum autem

Deſcriptio  
Lacca  
Oſis.

Tinctura.

Bacilli  
quales.

De Lacca  
Lacca  
Lacca  
Lacca

Formica  
alata.

Lacca  
Lacca  
Lacca  
Lacca

Delectum.

Arbor  
Beriferæ.



tem hanc Laccam pulcherrimo rubro colore inficere quæ sit deligendi ratio. Non esse autem eam arborem, in qua Lacca elaboratur, Myrto similem aut facie aut magnitudine, ut aliqui volunt, sed interdum in Nucis Juglandis magnitudinem ex-crescere, interdum minorem esse.

Porrò, quod ex Formicarum alis coniecturam desumit Garcias, eas esse Lacce opifices, id nobis nondum manifestum, nisi diversorum relationi quantum par est tribueremus. Facile enim Lacce primò ex arbore Berifera exudanti adhære-re pollunt formicæ multis arboribus insectæ. Cum succino sanè vana aenigmata repetuntur, ut muscæ, culices, &c. in cuius substantia aliquot eiusmodi bestiolas non semel vidimus, ut miraculo insertas distixisse. Quid si modò exsudantis succi, & fortè aliquid dulcoris habentis (ut ex fructu eius Iujubino coniectamur) amasæ formicæ, eique inhiantes accurrant, & ita adhærent? Nec bacillis aggerere liquorem fluidum & resinosum posse formicas, atque ob id ad hanc rem ineptiores esse, fortè morosior aliquis investigator dixerit, ita ut citius credat, exipiamet arbore, vel eius ramis & furculis statim temporibus exudare illum liquorem, & demum Solis vi in eam formam, quam videmus, concretoscere. Non tamen quicquam de cogitatum volumus, relationi suprascriptorum: consideranda tamen hæc proponere volumus, donec peritus & doctus aliquis testis totam rei historiam declaret.

Sed quid Arabes dicant audiamus. Ita enim Bellunenſis apud Avic. habet. De Lacca, id est, Cancamo, Laccam quidam dixerunt, inter quos est Paulus, esse gummi herbæ, simile Myrrhæ, boni odoris: sed cum cautione administrandum. Alij verò errantes dixerunt esse Karabe, quanquam in plerique proprietatibus cum ea conveniat. Serapio itidem ex sententia Dioſc. & Athabari (quem quidam Paulum putant) scribit esse gummi arboris in Arabia nascentis, Myrrham quadantenus referens. Deinde ex sententia Rhafis, in ramos Sorbi, quam ipse Guberam vocat, è cælo delabi tradit. Postremò, Lacca, inquit Isaac apud eundem, res quadam est rubea quæ tenuib. lignorum furculis inhaeret. Coquitur hæc, & ex ea pannu rubeo colore inficiuntur, quam insecturam Chermes appellant. Cæterum Lacca ex Armenia deferretur. Hæc tamen Serapio. Ita laudat Arabes nostrâ diligentia, & rari doctiores sepius à magis cõfusi ac hesitabundi, ab his redimus. Verùm, quoniâ Dioſc. Cancamum Laccam esse putavit Serapio, ex ipso satis prodit, sibi Laccam incognitam fuisse.

Garcias, cui Lacca à Cancamo diversa est: nec Avicenn. nec Serapioni, imò nec ulli Græcorum cognitam fuisse asserit. Laccam autem in Arabia non nasci palam esse dicit, quoniam in Arabiam ex India deportetur. Similiter nec in Sorbi ramos delabi, neque etiam Mespili, ut nonnulli perperam verterunt, cum nulli sint per universam Indiam Sorbi aut Mespili. Sed nec in Armenia nascitur, nec etiam est Chermes Arabum, cum id nihil aliud sit, quàm Coccum insectorum Græcorum. Sed neque Myrrhæ similis est Lacca, ut volunt Arabes, quoniam hæc in extimis ramis elaborata hæret: Myrrha verò ex ipso arboris truncò exstillat, neque item odorata veluti Myrrha est. Quidam, inquit MATTH. pro Cancamo gummi quoddam rufum ac pellucens ostendunt, quod furculos incognitæ arboris undique circumue-lit, Myrrhæ quidam tamen us simile. Veruntamen quòd nulla (ut Dioſc. inquit) in eo manso saporis virtus deprehendatur, alijs id potius mentiri,

quàm esse legitimum Cancamum volunt. Quantum etiam hallucinantur Monachi, quoniam Moſien scripserunt, sanguinem draconis vulgò vocatum Cancami loco substituunt, suo dicitur loco. AMATVS scribit in errore versatos, qui Cancamum Laccam esse putant: Laccam enim non esse gummi aut plantæ alicuius guttam, ut huc vsque omnes ferè crediderint, sed potius formicarum alatarum stercus, fabagoye, velut cera apum. Quod si ita sit, cur non simile aut aliud quid observatur in nostris? nam multas arbores vastant, etiam glutinosi succi, ex quibus paste tale quiddam ex-cernere possent. Ita in rebus nobis nec cognitis, propè nec visis, velimur potius, quàm veritatis vadam teneamus. Cæterum, quam officinæ Laccam vocant, eam, teste Garcia, Arabes, Persæ & Turcæ Loc Sumatri, quasi dicas Laccam è Samatra, nuncupant: non quòd Samatra sit provinciæ Pegu, vbi plurima Lacca nascitur, finitima: sed quòd Arabes & slijam memorati in Samatra gigni putarent. Idem nomen etiam invaluit apud provinciarum Balaguate, Bengala, & Malanar incolæ, quoniam à Mauritanis siccò cõstit fuerunt. Legitimum tamen earum provinciarum nomen est Lacc: in Pegu verò & Martaban, ubi præstantissima est, Treo, atque istuc è Iamay adferri tradunt. Non vocatur Acc, aut Ancusul, ut Pandectar., corrupto nomine appellavit: neque Sag, ut apud Serap. lib. 5. impl. cõst. corruptè legitur. Cæterum cum ab ipsis incolis, apud quos plurima nascitur, Treo vocetur, mirabitur aliquis, cur nomen Loc, Lac, aut Luc invenere. Sed hæc sunt casum coniecit Garcias, quòd hoc medicamentum in Loc sive Mellis crassitiem dissolveretur, cum ad inficiendum, tùm ut eius usus esset in medicina. Quod autem Bellunenſis Luc verterit, fieri potest cum ita in veteri exemplari invenisse. Attamen nunc omnibus Arabibus Loc-Sumatri dicitur.

Vulgari sermone quidam in Italia appellant Lacca: quidam diminutivè Lachetta. In Germ. non nullis officinis inſitorum Leguſis vocari audivimus. Eius duo genera facit Matth. [quæ tantum bonitate differre opinatur] præstantius, vulgò Lacca Sumatri: deterius eidem Lacca comberri dicti.

Acosta imitatus Garciam sic de ea scribit, Lacca, Arabicè, Persicè, Turcicè, Loc Sumatri, quasi dicerent Lacca ex Sumatra, non quòd in Samatra inveniat. Quidam enim existimant eam fieri in fluvij Pegu: verùm res ita se habet: Quadam formicæ alatæ eam præparant supra magnas arbores. Veniunt in Hispaniam multi rami pleni Lacca, ex qua fit Cera. Adulteratur Lacca cum Resina & Cerâ. Nomina, quæ posuit Pandectarius Acc & Ancusul sunt corrupta. Avicennæ non videtur cognita Lacca, quandoquidem similem facit Myrrhæ, similemque facultate Carabe. Carabe siquidem glutinat & adstringit: Lacca verò aperit. Error eorum, qui vocant Loc Sumatri, provenit à Chinenſibus. Serapio vocat Sac, quod est Lacca: ac Dioſc. allegans, dicit Gummi Arabiæ arboris similis Myrrhæ, citat Rhafim dicentem eadere de cælo supra Guberam: in omnibus errat. Dioſc. non scripsit de Lacca, nec Serapio titè cognovit, putavit esse Cancamum Dioſc. Rami cum Lacca, non sunt arboris, quæ proferat Laccam, uti penè omnes hodie crediderunt. Est secunda Lacca artificialis, quam confundit Serapio cum prima, de qua Amatus. Quum præterea dicit Serapio similem Myrrhæ, clarum fit, non cognitam nec Serapioni, nec Paulo. Falsum est, quod dicit Rhafes cadere supra Guberam, id est, Sorbum. Dicunt Monachi in Mesum neminè vidisse etiam Lac-

Amiri  
Lacca non  
est gummi  
Formicarum  
sui generis

Nomina

Lac Sumatri

Laci

Trac  
acc.  
Sac.

Serap. &  
mend.

Lac

Genera  
duo.

Lac Sumatri

Lacca quæ  
mole fiat.

Cera ex  
Lacca.

Acc. Ancusul  
sal, corruptè  
legitur.  
Avic. repreh.  
Serapionis  
errores.

Non esse  
Cancamum  
Dioſc.  
Serapionis  
confusio.

Rhafis erò  
ter de Sorbo  
Monachi  
rapi error.

cam in Europa, multos credere esse Cancamum, convenire quidem cum descriptione Pauli & Dioscori. Verum cancum incognitum existimari. Erraverunt quandoquidem reperitur, & ea utuntur Arabes, Persae, Turcae. Clarum verum esse Laccam, quatinus officii utimur, & quae adfertur ex India Orientali: talem existimant omnes Asiae, Africaeque regiones, & maior pars Europae, ita etiam nominant ipsi Indiani, quamvis Monachi in Mesum & alij existiment non inveniri. Vocatur Lacca, Lac aut Loc, vel Luc.

Dubitant etiamnum Pena & Lob. Arabum Lacca an sit Diosc. Cancamum, Et in Advers. Nullis, inquit, rationibus severiores veri exactores Laccam Arabum Diosc. Cancamum esse inficiantur. Et, mox, an verò sit Chermes, cuiusvis est sciscitari, at non nisi eruditii statuere. Dixerant autem prius Laccam arborem & nomenclaturam Arabicam esse, quadantenus arbutum & pruno similem à multis referri, cuius sint frustula & fureuli, qui vulgari Lacca obducti in officia habentur. Notandum verò in Plant. iconib. Lobelianis malè positum esse titulum in Laccæ cum bacillis: est enim figura ad Bdellium pertinens.

Anonymos ad Cosmogr. notat, veram Laccam esse Gummi arboris in Arabia fuisse olentis, & Myrrhae non usque adeò absumilis. A Malayvis Lacca dicitur *Casilaca*, testibus Bry fratribus. Cæterum, Scalig. libet de Lacca differentem addere. An est, inquit, Cancamum ea, qua utimur, Lacca? Est. Arabes enim sic sunt Cancamum interpretati. Est enim Lacca nomen Arabicum: nempe Lach ipsi etiamnum vocant. Corruptus enim est Serapionis codex. Quin communis Indiae quoque vox. Nam quæ in Martabane Indiae oritur, cognomen habet à loco appositum nomini, *Laccamartabani*. Ibi enim optima. Eius arbor, simillima est Iuglandi nostræ. Est igitur Cancamum verum Lacca. Nam, qui negant odorem ullum ei inesse ignibus impositæ, videntur suam sententiam aut non ab experimento sumpsisse, aut in adulterinam incidisse quæ sit ex Gummi & Brasilio liquore.

Sed quid hoc est dicere, Cancamum est Lacca quia Arabes ita sunt interpretati? Non alioquin hic, mos est huic viro tam securè credendi. At prius odoratum Cancamum dixerat, atque etiam sufficionibus expetitur, qualis sanè nostra Lacca nequaquam est, nec talem esse ab ullo Indicarum rerum Historiographo, quem quidem legerimus, annotatum: nisi ab Anonymo supradicto, Lob. & Pen. qui ex Scaligero suum illud iudicium ac censuram, quam paulo ante adduximus, desumpsisse videntur. Adhuc itaque stat sententia Cancamum & Laccam differre, donec aliquis prodeat qui vivis rationibus, vel ex re ipsa, nos doceat rem eandem esse.

Nascitur Lacca plurima in Pegu: nonnulla in Balaguate. In Arabia non nasci palam est, inquit Garcias. In regno Pegu dicto, ut refert Amatus apud Indos, quum terra vel pluvia, vel arte plus iusto irrigatur, formicæ ligna quædam subilia ab incolis disposita in altum ascendunt in quib. Laccam generant, quam hodie Lusitani nostri ex India afferunt rubram, translucentem, in odorem & sine sapore. tincturis præcipuè deservientem, ex qua Officina Dialaccam appellatam conficiunt.

Nunc, quod reliquum est de vera Laccæ succedaneis, artificialique Laccæ. Vera Laccæ nomen, de qua iam egimus, Artificiali etiam, ex sacce Brasilijs & Cocci factæ, à nonnullis attribuitur. Inter alios enim Serapio, ineptè hanc cum pri-

ma & genuina confudit Laccæ, unde, autore Amato in Diosc. multi Serapionis errore seducti, eam in compos. Dialaccæ miscunt. Hanc porò Laccam alteram seu falsitiam Venetiis ex granis tinctorum & Brasilijs facere fieri, testatur quoque Fuchs lib. 1. comp. medic. cap. 1. Scaliger ex gummi aliquo & Brasilio liquore.

Resina verò & Cera Laccam veram interdum adulterari annotavit Accetti. Et nos ante in Icon. Plantini pag. 50. pro Laccæ cum suis bacillis B. Jellu nomen suo truncato & fureculo immixto ponimus diximus. Accutunt, inquit, Amatus, Monachi, qui Antidotarium Mesues exposuerunt, quum in comp. Dialaccæ dicunt: Si defuerit Laccæ eius loco iniciatur lachryma Sanguinis Draconis. Eundem in signum sanè errorem ante Monachos commisit Avicenna, non confiderans Laccam sperire & provocare menstrua, Sargum enim verò Draconis constringere. In Dialaccæ dolore Mesuz & aliis compositionibus, si vera Lacca requiratur, inquit Andernac. non habetur, sed minori pondere, ut pro Diac. l. ponantur Scrup. II. Laccæ deficiente ponit Syriacum Colleg. Flor. in Antiball. Nec est quod credimus, ut præcipit Acosta Ital. lib. 1. cap. 16. Laccam esse, quod Chermes, vel Chermes Arabibus dicitur, Chermes enim est Coccus tinctorius.

Lacca, inquit Avic. vehementem vim habet attenuantem: confert tremori cordis, & iecur roborat, & prodest contra icterum & hydroem ac hepatis dolores. Cæterum errat Avicenna, quod similes illi cum Carabe facultates tribuat. Nam glutinatoria non est & attritionis particeps ut Garcias scribit, dum Avic. eiusdè erroris accusat, quamvis idem vim aperiendi obstructions Laccæ tribuat, Carabem verò multas partes calidas ac tenues habere censemus adstringentes nullas.

Cæterum erroris ansam Avicennæ præbuisse putat idem, quod Laccam Cancamum Diosc. esse existimavit, cum tamen planè diversum sit à Laccæ. Præterea ex eo manifestum eius errorem esse, quod duo diversæ capita descripserit, in altero ibidem Cancamum descriptionem enarrans, in altero de Cheichem agens, quasi diversæ essent simplicitas. Serapio ex diversis autoribus Laccæ tribuit vires Cancami, quas duas res eardemque facultates planè inter se confundit. Ad oppilationes tamen tam hepatis quam splenis, ut & in hydrope & ictero, ad quæ vitia inter alia ille commendat, à plerisque medicis unanimi consensu præscribuntur Trochisci Dialaccæ dicti. Pulcherrimo quoque rubore inficit præmansa Laccæ, non tamen ea tinctura karmes est, ut putavit idem Serapio. Ex ea etiam bacilli parantur ad obstringendas epistolas, ut notat Garcias. Ceram Hispanicam vocant. Iisdem & fabros lignarios lineas ducere ait. Laccæ etiam implere cum aurifabros tum argenti fabros vasâ maiora aurea & argentea. Quod an ita se habeat his iudicandum relinquimus qui ea tractant. Nobis enim nihil adhuc de ea re innotuit: miramur tamè, cum Laccæ toto genere differat a metallis, & quod facile uratur. Scimus quidem cum Laccæ in Ceram Hispanicam redacta, & Conchyliorum splendicantium minutissimis fragmentis & aliis ad splendorem & varietatem commendatis in cru stari ligna, tabulas, arculas, sclopeta, cultellorum manubria, & similia elegantissimo aspectu, & lappidis etiam Elegantiam non æmulante modò sed etiam superante. Aliquot eiusmodi tabellas inter rariora nostra adscribamus. Clusius ex quondam

Arbor Ar-  
borea fr-  
uosa.

Plantis  
error.

Arbor sua-  
vis alens.  
Casilacca.

Cancamum  
est Lacca  
Scaligero.  
Lach.

Laccam ar-  
boris.  
Arbor Iu-  
glandi fr-  
uosa.

Scalig. o-  
pinio resp-  
gitur.

Locus.

Amatus in-  
dico ut  
generetur.

Acquisita.  
Lacca &  
Serapio  
natus.  
Lacca ar-  
tificialis.

Adulter.  
Sub. iust.  
Diosc. pte  
comp. 4  
Lacca.  
Averroes  
revelat.  
Sargum  
Draconis  
Avicenna  
ror.

Myrrha  
Syriacum  
Coccus  
Tinctorius

Dialaccæ  
Nives  
ulio  
Tremor  
icteri  
Lacca  
Hydrope  
Avicenna  
Lappa  
Coccus  
ror.

Cheichem  
Non  
merit  
qui Su-  
pio.

Cera  
Hispanica

Incrust-  
io eleg



iundam sententia tradit, Alutas & Coria vervecina Laccā confusa, & urina veteri macerata, rubro colore infici ex altera parte.

Cæterum modus abluendi & præparandi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est, inquit Cordus: & qui eum primus invenit aut tradidit, Laccæ naturam penitus ignoravit. Nam quicquid parum sincerum & efficax est in Laccā, illud aquæ miscetur, quam illi dicunt abiciendam esse, & quod remanet in trochiscos formandum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Ille verò hunc modum tradit. Aristolochiæ longæ, Schœnanthi singul. uncias duas Decoquantur in aquæ lib. 4. aut quantum satis sit, donec remaneant, lib. 3. Colaturæ insperge Laccæ integræ, lib. 1. unc. 4. Decoqu. Laccā deinde lento igne, donec aqua fiat coloris sanguinei & quicquid in Laccā boni fuerit, dissolvatur: tum per filtrum aut laneum pannum cola, & remanentes sordes abice. Excolatam verò & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase ulque admellis spissitudinem coquito, & tepidam massam in Trochiscos fingito.

# VVA CRISPA SIVE GROSSULARIA.

## CAP. XX.



VT spinis armavit rerum parens natura arbores superius exhibitis, Oleam sc. Rhamnum, suibas, sic etiam quæ sequantur, ut sunt Oxyacantha, Bæberis & uva Crispa (quam recentiores ita dixerunt) & de qua iam Frutex est bicubitalis & tricubitalis, ac etiam maior numerosa foliorum segete luxurians, variæque in ramulis subdivisus, cortice purpurante, materiæ fore bu-

xeo colore pallescente. Spinis longiusculis, acutis & rigidis ad foliorum exortum passim armatus, singularibus, binis aut ternis: folia unguem lata, nonnunquam ampliora, nonnihil retunda, modicè divisa, superius sinuato virore splendens, inferius dilutiora, utrinque hirsuta, sapore acido, ex brevibus pediculis: flosculi pulchelli parvi, suavi sed nonnihil gravi odore, simul multi ex eodem tuberculo, quo folia prodeunt, ex pediculo brevissimo punicante hirsuto nutantes, quibus subsunt globuli hirsuti futurarum baccarum rudimenta, ex foliolis quinis utrinque rubentibus, extorsum reflexis, ut radiatam stellam expriment, quæ totidem adnatas quasi lingulas albicantes, intus hirsutas surgentia, florem reliquum concavum efficiunt: inter singulas autem lingulas singula stamina rectè se tollunt à rubris illis florum foliis similiter orta: ex globulo autem stilus virens, alba lanugine circa infimam partem, aspergilli modo obfusus. Baccæ succedunt, rotundæ, hirsutæ, striatæ, ante ma-

turitatem acidæ, maturæ dulces: in quibus grana multa exigua.

Vnum genus sylvestre, alterum cultum in *Sylvestris Hortensis* hortis minus spinosum, baccas multò maiores producens.

Sed iam miram autorum varietatem circa hunc fruticem intelliges.

Ruel. Grossulariam veterib. silentio præteritam ait: alibi tamen ait non deesse qui Paliurum esse arbitrentur, quorum opinio si non ausum accedere, cum et si nonnulla cōsentire delineationi putentur, plurima tamen reclamare etiam constat. *Rhamm. & Hallucinar* verò eos qui Rhamnum i. esse arbitrantur: folia non respondere, quæ circumatæ rotunditatis conspiciantur. Ap. j modo dissecta.

Ryffius eadem profert, Ruellio tamen non citato, gaudens magis alienis ornari plumis, quam creditori suo honorem ferre debiti.

Amatus Rhamni nomine uvam crispam ponit, & more suo in titulo diversarum plantarum nomina confundit. Sic enim habet Rhamnus: *Vva crispa Scambrynos*, Hisp. & Lus. It. *Marucha*: Germ. *Stechdorn*, *Grasfelbeerbaum*: Gallicè, *Burgepine*, aliis *Groislier*. Alibi uvam crispam, aliis uvam marinam, aliis uvam spinam dici, quæ nomina & Matth. habet, ac uterque antiquis præteritam ac incognitam putat.

Cornar. perperam Paliurum i. Theophr. & Plin. censet, nempe eum cuius fructus sit magnitudine baccarum Cedri, *Closterbere* German. qui culinis quàm medicinz notior, ad Rhenum & Menum frequens, non rubicundus, sed rotundus, viridis & striis velut distinctus.

Spinam ferentem Crispinam uvam, inquit Cordus, Rhamnis quidam annuerant, sed cum foliis & fructu plurimum discrepent, sui generis spinum esse credimus. Quidam *Bergesber* esse putant, sed folia dissimilia sunt: nos autem præ eam vocem uvam crispinam intelligimus, alioqui Dei baccas sonat.

Trago Grossularia verè Rhamnus est veterum, videlicet genus 3. Diof. Et addit: aliis dici *Burgam spinam*, aliis *Neprium*, *Persephonium*, *Leucacantham*, *Albam spinam*, *Cervalem spinam*, *Agnon*, *Adaim*, *Philorecin* aut *Socialem*: Serapioni dici *Hausfig*, aliis *Ausci*. Sed pleraque hæc nomina ad Rhamnum Catharticum pertinent. Præterea uva crispā non convenit cum Rhamno Diof.

Fateatur Fuchf. nescire se fueritne cognita uva crispā veteribus tam Græcis quàm Latinis, eamque Latini putat uvam inortam nuncupari posse. Non esse Rhamni speciem primam, ut nonnulli arbitrantur, posse tamen citra aliquod vitæ discrimen Rhamni generibus annumerari, quod scilicet viribus admodum similis sit. At Cornar. Rhamnum i. Diof. facillè se credere ait. Vti iam videas Cornarium duobus locis de uva crispā scribere, quasi diversas traderet plantas: nempe Embl. 98. ubi hæc ait: & Embl. 100. ubi Paliurum Theophr. putat, uti dictum.

Hermol. & Lacuna veteribus præteritam putant. Lonic. & Apollo Rhamni Diof. speciem faciunt. Negat Curtius. Hist. Lugd. Ilos, vel ut alij legunt Oeths Theophr. putat: nulla alia correctura, ut equidem censemus, quàm quod inter alios frutices spinosos numerat. At habet ibi & non spinosos. Certè difficile est iudicare in tanta brevitate & obscuritate.

Gelsnerus Ceanothum vocat. Hæc autem eius sunt verba: Ceanothus spina Theophr. memorata, hoc est, uva crispā vulgò dicta, (ut mihi quidem videtur) passim apud nos obvia est, sepibus hor-

*Grossularia*

*Paliurus*

*Rhamm.*

*Ryffius*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

*Rhamm.*

*Plin.*

*Theoph.*

*Plin.*

48  
*Sepibus  
 commodata.*

*Pracella.  
 Roncella.*

*Vitis Pre-  
 sta Plin.*

*Rescitur  
 ea optimo.*

*Synonyma  
 linguat.*

*Locus.*

*Tempus.*

*Vires et  
 viti tum-  
 entum  
 medic.*

*Febr.*

*Vent.  
 profluviu.*

*Spiri-  
 tuium  
 aug.*

torum in primis commoda. Facillimè enim nasci-  
 tur, dense fruticat & propagat seipsum, & spinis  
 suis transitum prohibet: & acinis iucundi saporis  
 placet. Ceanothum asperum nostrum Cardanus  
 de uarietate rerum l. 6. Rocellam (malum Roncel-  
 lam, seu diminutivum à *Ronce* Gallico nomine  
 Rubum significante) vocat. Rocella, inquit, hu-  
 mile arbutum est, folio angusto (angustum sane  
 non videtur) ac tenui, quasi vitis, spinosum, bac-  
 cam ferens, quæ cum maturefcit, viridis & sub-  
 flava est, rotunda admodum, magnitudine Lupi-  
 ni: gustu ex dulci adstringente. Quidam volunt  
 esse vitem pratiam Plinij, in qua sententia fue-  
 runt Goulandinus, Pena & Lob. sed perperam no-  
 stro & Dalech iudicio: neque enim verisimile est  
 Plinium terrem & fruticem spinosissimum inter  
 mures & cultissimas vites retulisse.

*Dieta uva crispa, Grossula, Grossularis, Grossularia:*  
*uva marina, uva spina, uva crepsina, vel crispina, ab*  
*intortis ferè que in circulum versis foliis & acinis*  
*quos producit. Grossula verò à durailia membra-*  
*na seu cuticula, qua obducuntur acini isti: siqui-*  
*dem man lucu crepat, inquit membrana quæ*  
*disrumpitur. Germ. Krenselbeer, Krausbeer, Gros-*  
*elber, Krensel, Krensel, Krensel, Krensel, Krensel,*  
*Belg. Steekelbesien, Steekelbeer, Steekelbesien,*  
*Krebesien, Krosselen Brabantis, Truysbesien, qui-*  
*budam Knorselen. Gal. Grosfeller, Grosfeller, Gros-*  
*selles, Grosfelles, Grosfelles. Angl. Gooseberry. Italicè*  
*uva spina, uva crepsina. Hispan. uva crepsa uve espina.*  
*Boh. Chlupate rabadi.*

In sylvestribus provenit & sepibus multis Ger-  
 manie locis, nò tamen passim. Vix alibi copiosius  
 luxuriantem videas, quam circa Basileam, ubi cir-  
 ca omnes ferè sepes sese diffundit. In toto Ducatu  
 VVirttembergico ferè obvia, maxime circa Tubin-  
 gam. In Gallia calidiori non adeò frequens, sed  
 minus in Italia ceterisque calidioribus locis. A-  
 rmat enim frigidos tractus, nec ullum frigus refor-  
 midat. Venetiis tamen etiam observavimus in  
 Muran, in Ca. Corneti, Patavij in hortis quibus-  
 dam. In vivarum sepiu in structura venit passim  
 ubi abundat, etiam in Scotia. Illud autem genus  
 quod baccas maiores profert in hortis nonnullis  
 infirmo sarmento radicis sustentato observavit  
 D. Cargillus. Cuius nos pulchras arbuticulas à plu-  
 ribus annis in horto E. C. Montebelg. colimus.

Vires statim initio pubet, ac virefcit Martio,  
 sepè etiam antè. Floret April. Fructum fert Maio.  
 Iunij fine ac Iulio perficit, quo tempore dulcescit  
 in cibum, qui tamen laucioribus mensis repudie-  
 tus maturus: immaturus verò & acidus adhuc co-  
 quitur cum carnibus ac piscibus: nam succo suo  
 subacido cibos commendat. Concinnatur & in  
 placentas Cupediarum & scitamentorum vice.  
 Vulgè *Tartus* vocant. Ipse verò maturus fructus  
 pueris, pauperibus & gravidis mulieribus satis ex-  
 petitus. Immaturæ haud quoque iuiculis incoctæ  
 f. brientibus non sine utilitate exhibentur. Frigide  
 namque sunt & astringentis qualitatibus. Quapro-  
 pter diversimodè administrari possunt choleri-  
 cis, calidis, & bile repletis corporibus tam sanis  
 quam aegris: in salamenta, vel embammata. Po-  
 test & exprimi Omphacium. Valent contra gravi-  
 darum picam: appetentiam cibi excitant. Omne  
 ventris profluvium, potissimum verò Diar-  
 rhoam & Dysenteriam, & Colicam passionem  
 compefcunt immaturæ, ut tradit Matth. nam fri-  
 gidæ sunt & sicæ astringentes, sitim sedant, &  
 cruenta expuentibus profunt. Haud dubiè, in-  
 quit Fuch. idem quod Rhamnus temperamen-  
 tum obtinet. Ut enim hic adstringit & refrigerat,

sic etiam illa. Refrigerat autem in primo comple-  
 to, aut secundo incipiente: deficcet verò secun-  
 do. Ex Diosc. verbis de Rhamno [addit idem]  
 sitis liquet, Vvam intortam non hoc tantum no-  
 mine sepibus apponi, ut eadem muniat, atque  
 adeò alienorum ingressum prohibeat, verum  
 etiam ut veneficia ab hortis propulset, ut hinc  
 quoque colligere liceat eiusdem cum Rhamno  
 esse facultatis. Quæ verba utinam non excidif-  
 sent Fuchio. Miseros verò nos Philosophos Chri-  
 stianos, si à paganis modum discere debeamus ta-  
 lem arandi fascinationem. Doctis & potissimum  
 Theologis iudicandum relinquitur de hac re,  
 & an plantis possint impediri hac ratione vene-  
 ficiolorum maleficia. Omnium optimum modum  
 veneficia, hoc est animalia noxam hortus inferen-  
 tia ab iis arandi, censemus, si Tragi consilio, ordi-  
 ne multos Grossulariz fructus ponas: ita enim  
 sepe efficias perpetuam & præstantissimam,  
 quam nulla poterunt animalia, ac ne mures qui-  
 dem commodè, penetrare, & sic horti ab illis tu-  
 ti reddentur. Melius Dod. de viribus eius, quan-  
 do tradit. Fructus antequam maturefcant, frigidus  
 & siccus est, ad secundum gradum ac astringens:  
 eiusdem ferè naturæ cuius uva immatura. Sistit  
 fluxum ventris, & omnem fluxum sanguinis, &  
 maxime succus expressus & exiccatus. Vtiliter  
 applicatur inflammationibus calidis, Erysipela-  
 tibus & igni sacro. Idem præstant folia, sed imbeci-  
 liores. Eadem novella crudaque comesta, urinam  
 tiant ac profunt laborantibus arenulis & calculo.  
 Fructus etiam saccharo coniunctur contra calores  
 internos, potissimum febriles. Frequens eorum  
 usus prodest Gonorrhæa & fluore albo laboran-  
 tibus, teste Camer. Avicula quoque baccis gau-  
 det. Idè circa ramulos & frondosas arbuticulas,  
 Diap. Galliz civitate, non ignobili, observavit  
 Gesn. circumductum rete, atque ita aviculas in iis  
 pulchro spectaculo nutritas.

## GROSSULARIA SPINOSA, FRV- ctu obscure purpurascente.

CAP. XXF.

**C**ORALLARI loco huc etiam transferemus *Deser-*  
*cea* quæ Clus. in pl. rar. histor. tradit. Certè,  
 inquit ille, anno 1594. Leyda conspiciebam Gros-  
 sulariz genus amphioribus nigrioribusque foliis,  
 spinas ad singulos foliorum exortus binas vel tri-  
 nicam habens (interdum etiam nullas) brevès  
 & vulgari multò infirmiores, præter alias inertes  
 & longè breviores, sparsim ramis cortice ex fusco  
 purpurascente tectis inascentes: fructum, dum  
 immaturus est, vulgaris instar virentem, qui ma-  
 turus purpurascit, plenè autem maturitate ex pur-  
 pura atrum colorem contrahit, peninæ ac non-  
 nulla pruna.

## DE OXYACANTHA, PYXACAN- tha & Pyracantha, tam veterum quam neotericorum placita in genere.

CAP. XXII.

**I**NTRICATA & perplexa harum historia suadet  
 cuique autori de iis placita seorsim relinqui, id-  
 que idè, ne veterum placita, multorum intem-  
 pestiva imitatione, aut dubio conatu, quadrata  
 miscam rotundis: inde eas plantas propo-  
 nituri.



fituri, quā his nōminibus apud posteros Herbarios innotuēre.

Theoph. non uno loco *ὀξυανθήν* ad perpetuū virentes, & sylvestres refert: quamvis rectius fortē, inquit Dalech. quis legerit *πυλαγύδα* vel *πυλαγύδα*. *ὀξυανθήν*, inquit idem, vere germinat, ac post vergiliarum occasum fructum reddit, quo ad coronas usi veteres: illius autem spinis Mali medici spinæ non abfinites. Ex quibus paucis, [vix enim plura reperias apud Theoph.] quid esse possit multis quidem suspicari licuit, uti dicitur in progressu, paucis verò fortē, quid verē sit, asserere.

Nihilō plura, sed clariora tamen, habet Plin. lib. 24. cap. 13. & 14. Spina est, inquit Plin. appendix appellata, quoniam bacca puniceo colore in ea appendices vocantur. Hæ crude per se & ar de in vino decoctæ, alvū citant [citant] ac tormina compescunt. Pyxanthi bacca contra serpentum ictus bibuntur. Lycium præstantius ē spina fieri tradunt, quam & Pyxanthon Chironiam vocant, quales in Indicis arboribus diximus, quoniam longē præstantissima existimatur Indicum, Hæc ille. Cuius sanē verba de spina appendice optimē conveniunt cum Berberi, vulgō dicta, de qua pōst. Per tormina autem apud Plinium non Colicos, sed Dyentericos dolores intelligimus.

His paulō diligentior Diosc. sic habet. *ὀξυανθήν*. Acuta spina, quam Pyrinam aut Pyntanthen aliqui vocant, arbor est pyrastro similis: spinosa valdē & minor: baccas profert myrti, plenas, rubras, fragiles, & intus nucleū: radicem multitudine, altē descendente. Huius bacca potu aut cibo, alvi profluvium & abundantiam feminarum sistunt. Radix illita aculeos & spicula extrahit: abortum fieri tradunt, si ter radice venter, aut sensim feriat, aut perungatur. Idem Diosc. alibi, Mespilum à quibusdam Atoniam dictam, foliis similem tradit *πυλαγύδα*, ut habet Cod. Bas. Lacuna legit *πυλαγύδα*. (Pyxanthæ sive Oxianthæ folio, legunt alij) unde Marantha. Pyxanthæ usquam apud Dioscoridem sermo est, neque quid sit scimus, nisi idem sit quod Oxianthæ, &c. Et alibi, Lycium alius Pyxantham vocari ait. Et Cynosbaton quoque que aliis *ὀξυανθήν* dici. Galeno quoque *ὀξυανθήν*, ut arbor est pyro sylvestris [*αγρὸν*], similis, ita & viribus non dissimilis. Quin & ipse fructus, pyri quidem sylvestris, prorsum & absolute acerbis est [*ἀπὸ τοῦ πυρρῶς*]: alij amarum vertunt, non benē nostro iudicio. Cæterum Oxianthes [*ὀξυανθήν*] & tenuium est partium, & paululum quiddam incisivum obtinet. Porro arboris huius fructus, pyri sylvestris fructui similis non est, verum Myrti, scilicet rubens & rarus [*ἀραιὸν*]. videtur leg. *ἀραιὸν* ex Diosc. Dalech. Habet verò & nucleos.

Porro non elus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum, quos *πυλαγύδα* Græci vocant, cohibet. Ita vidēs apud Gal. aliud esse Oxianthum, aliud Oxycanthum. Serapio, de verbo ad verbum, de Amirberi sive Berberi refert, quæ Diosc. & Gal. de Oxycantho & Oxycantha vel Oxycanthe habent. Fatetur Hermol. quæ sit Oxycanthos in Plinio, sibi non compertum. Medicinas certē quas Diosc. ei tribuit, Paliuro Plin. dicavit. Maximam difficultatem iniicit, quodd Theoph. perpetuū virentem dicit Oxycantham, qualis certē apud nos neutra est earum, quæ ab Herbariis pro ea proponuntur. Variæ autem plantæ proponuntur pro Oxycantha & Pyxa-

antha, de quibus ordine suis locis trademus, ordientes à spino acuta, quæ ad Diosc. descriptionem Oxycanthæ quàm proximē accedere multis videtur.

## OXYACANTHA VULGARIS, SEV SPINVS ALBVS.



**F**IRMA est, si Materie, quæ alia, materies Oxycanthæ vulgaris: caudex Spinæ, mediocriter crassus, & ramis lentis, firmisq; operi topiarum maxime idoneis brachiatus, spinis horret rigidis & acutis, multo etiam ligno durioribus: Cortex rubet. Folia Apij, seu Mespili Atoniæ, gustu viscidol. Flores odoratissimi confertim nascuntur ex sesquivialibus ferè pediculis, albi, quinque foliis constan-

tes, apicibus, ut in pyro rubentibus. Bacca per maturitatem rubræ, velut ex umbella pendens, Myrti baccis maiores, umbilico nigro, pulpa glutinosa, pauca, molli, ac subdulci, singulæ officulum continentes unum vel duo. Vnum si fuerit, rotundum: at si duo, per medium divisa globulum efficiunt, & interna parte qua committuntur, caecolam ostendunt incurvam. Duriissima sunt, & prope modum ossæ. Rarius tria in una bacca inveniantur. Variant & figura, sed communissima orbicularis. Circa huius quoque stirpis investigationem tam variè se torserunt auctores, totque opinionibus discrepant, ut mirum videatur. Colum. & Pallad. spinam albam vocant. Marcelus hanc Oxycantham Theoph. putat, cuius pluribus locis meminere, facilem cognitu & inventu esse ab agresti Pyro diminuta appellatione, atque aded à spinarum acuminatis cuspidibus Oxycantham Græcos dixisse: Plinium verò sub hoc nomine eius non meminisse.

Simili veri coniectura, inquit Ruellius colligi posset, Paliurum Diosc. id esse, quod hortos viva sepe cingit Aubepinum, hoc est, Album spinum: quod vulgus Senellas vocat. At Matthioli. Sunt è recentioribus qui putent Paliurum Dioscoridis eam esse arborem, quam nos Oxycantham: Sed palam fit non esse Paliurum &c. Et Matthioli sanè assentimur, non benè Ruellium Theophrasti nomine dixisse de Rhamnō nigro, quæ Theophrastus dixit de Paliuro: Existimantes etiam Dioscor. & Theophr. Paliurum diversam à nostra Spino alba.

Tragus Hagendorn, & fructū Hagöpfel vocat, rectè quidem: sed falsò putat hunc esse verum canisentum seu Rubum, Germanis Hundsdorn, & Græcis *κυνόσατον* dictum, nempe eum quem Diosc. quoddam Oxycantham appellare scribit, hœcque nomen pertinere putat idem Tragus ad aliam plantam. Cynosbaton, addens, Plinium Cynospalston & Neurospalston appellare. Estque qui eundem hunc fructum Arbutum esse com-

tendant. In margine notatum Theodori Cani rubus. Falsū inquam, & alio errore eiusde. n. fructu nescio quam Imaginem asperam & caniliā affingit, quæ in hac planta nullatenus reperitur: quare ne Cynosb. itos quidem fuerit, si quidem hæc nota non addit.

*Egyia.* Cordus vocem *πύρα* perperam apud Dioscor. inter Oxyacanthæ Synonyma exetatam suspicatur, & Pyracantham, cuius sidem Diosc. meminit in Mespili capite, eam esse censet quam cap. de Oxyacantha corrupto nomine *πυρα* vocat. Idem ait à Diosc. Oxyacanthæ nomine descriptam esse Pyracantham, hoc est. Spinam veteribus Latinis & Plinio simpliciter dictam, quæ Gallis *Aube-épine*. G. m. *Gage-dorn*. *Veig-dorn*. Eamque quosdam falsò putasse Cornum esse: & liberè pronunciat Oxyacantham Dioscor. esse Pyracantham: *Spinum album* Italici: & alibi Sorbum aculeatam & Pyracantham dicit: cuius bacca gustu al quantum glutinosa statim satietatem vescentibus adferant, & omnino succo careant.

*Cornu.* Cornu. Rubum caninum & *κύνοςβ.* Diosc. putat ex eo, quod apertè Diosc. ascripserit Oxyacantham quoque dici, sed fallitur: non enim folia habet Myrti, & nihil lanuginosi in fructu quod fauces lædere possit, quippe quem sæpè comederimus sine ullo nocumeto: eiusmodi autem lanugo est in calycibus Rosæ sylvestris.

*Spina acuta.* Quorundam opinio est, inquit Anguil. Spinam acutā esse illam Spinam, quæ vulgò vocatur *Spin bianco*, quæ opinio in totum mihi non displicet. Verum duæ causæ efficiunt, ut id non liberè dicam. Primum enim Theoph. vult Spinam acutam semper habere frondes: Secundò, dicit Spinam Mali medicæ similes esse Spinæ acutæ, at duæ illæ notæ in Spina alba non reperiuntur. Præterea Spina acuta *δένδρον* est *δένδρον* & *δένδρον* (ut quidam volunt, at fructus Spini alba sunt dulces ventremque lubricant, non adstringunt: minuscule adhuc mulierum fluxus compescunt. Vnde quid sit Oxyacantha pro certo affirmare non possum. *Matthiolum* verò in Diosc. Si dicendum est, inquit, Oxyacantham nasci in Italia, eam equidem aculeatam arborem esse crediderim, stipite, cortice, ramis, floribus, proceritate ac ligni materie planè pyrastrum referentem, quam in Hetruria rura nostra Senensis *Bagaia* vulgò nominant: Ananienfes & ceteri Tridentinarum vallium incolæ, quidam *Amperlo*, quidam verò *Pandroso* vernaculis nominibus vocant, & Gortienfes *Barazzo bianco* vulgari sermone appellant. Quippe quæ omnibus notis ac lineis acutam Spinam referat. Et paulò pòst refutans Anguillatæ argumeta, ita fit, ut concludamus oportet. Si Mespilus Aronia folio Oxyacanthæ provenit, eoque scisso (ut Theoph. prodidit,) Apij instar: hanc spinosam arborem *Bagaia* dictam, esse procul dubio acutam spinam, quandoquidem eius folia in modum Apij dissecta sunt, Mespili Aroniz modo, &c. Quibus etiam accedit quòd secundum eundem Theophr. *δένδρον* *δένδρον* & *δένδρον*: Denique, datur utiliter Celiacis: cibum resistentibus & dysentericis, prohibet mēsum profusum, &c. Hanc controversiam quod atinet, uti nolimus cum Anguil. pronuciare fructus Spini albe provocare menses, ita quoque miramur *Matthiolum* n. scribere eos adstringere.

Loniceri verò ignorantia explodenda, qui duobus locis de hac planta tanquā de diversis scribit.

De Oxyacanthis sic Amatus. Oxyacantha Dioscor. cuius fructus à pueris avidissimè comeditur, & in nonnullis regionibus perpetuus ar-

bori tenaciter hæret, ut in Lusitania plerumque observavi, & H. J. huius rationem reddunt quia hæc ipsa arbor ab illis Rubus creditur esse, quem viderat *Mysès* in itinere non convertam, & sine noxa obumbrantem, ex quo Deus ei locutus, & Galopodia ut exieret, iussit, quia in terra sancta erat. Dicunt igitur illi, ob illam dignitatem perpetuum arbori hunc fructum esse. In universa Hispania sui vocis *Palmierium*, Hetrusci verò *Begaiam* vocant.

Si ex aliis scriptoribus colligere liceret, ait *Matthiolum*, Oxyacantham fruticem potius quàm arborem esse minis propriè eam arborem, appellasse Dioscoridem existimandum esset, ac cum *Matthiolo* sentiendum, ut, qui fruticem pro Oxyacantha, non arborem statuunt: licet & hic frutex loci ratione quandoque in arborem assurgat. Verum si arboris significationem verè acceptam, aliter sentiendum est.

*Gesnerus* Spinam albam, Spinam appendicem, & Oxyacantham unum & idem putat: sed fallitur: nam Plinij spina appendix baccas acidas habet, quales in hac nostra non sunt: idem alibi Appendixis spinæ Græcam vocem se non invenire ait, nisi quis Diospyron conficiat, id est, Iovis flammam, *Malbeer*. At *Palmum* Io. Filisius ait, censeri eum fruticem qui *Netelbeer* dicitur.

*Dod.* in histor. Gal. Oxyacantham Diosc. putat esse *κύνοςβ.* Theoph. quam tamen opinionem rectè & prudenter postea omisit in sua Hist. Latina: ubi quibusdam Spinam vallarem & Spinam *sepical* vitem dicit: *Amyrberin* Serap.

Non placet Pen. & Lob. subausteras dicere baccas: rectius nostro iudicio Cordus aliquantum glutinosas, & *Dod.* & Anguil. dulces dicere: nam uterque sapor non obscurè in iis percipitur, modò sint maturæ.

*Firmiter* *Matthiolum* probasse ait Turnertis hæc nō esse Berberim ut multi opinati sūt, sed Oxyacanthā Diosc. nec se distingere, nisi quòd Theoph. inter eas recenset, quibus folia Hymen non decidunt: ideo sibi videri Spinam albam Colum.

Oxyacantham aliqui, teste *Cæsalp.* Prunum albam vulgò vocant: *Azarolus* sylv. vocari possit. Plin. videtur Mespili: genus appellasse, cum inquit, Tertium d. generat, tametsi Anthedoni similis est, quod *Gallia* vocant. Theoph. Græcè Anthedonoidem vocare, ait idem quasi specie Anthedonis. Hanc eandem & Oxyacanthā Diosc. esse, sed aliā esse Oxyacantham apud Theoph.

*Camer.* quoque apud Math. annotat vocari in Italia à quibusdā Prunum albam & *Azarolū* sylv.

*C. Bauhin.* non Spinum albam censet Oxyacantham Diosc. sed aliā de qua sub Pyracantha.

*Schuenck.* Idus non ex autopsia, aut iussu intus exquis nucleis & ossibus aspera candidaque lanugine involutis refertum esse. Hoc in Rosæ sylv. fructu deprehenditur, sicut dictum, non in baccis Oxyacanthæ multis dictæ. *Clus.* Oxyacantham vulgarem dicit: neque enim legitimi censet. At *Pena* & *Lob.* receptam usu & nō omine veram Oxyacantham dicunt. Ruell. ait *Spinum album* Italici, Gallis *album* Spinum dici. *Spinum acutam* *Lemnius* dicit & Oxyacanthem. *Brassavola* *Leucacantham* fruticem quam benè norunt qui *Leucacanthæ* historiam legerunt. Dicitur & Arab. *Amyrbaris*, *Hisp.* *Espin-maenelas*: *Pylitero*, & *Pyliteros*. Belg. *Hagedren*: It. *Pan-d'orso*, *Amperlo*, *Bagazzo*, & *Bagaia* Hetruscis, uti dictum. Angl. *May*: *Handhornree*: Boh. *Hleb*. Spontè nascitur passim Germaniæ & Galliæ sylvis, agrorum marginibus, hortorum sepiibus, & locis tam montanis

*Rubus*  
*Myrsin.*



montanis, quàm campestribus, fœcis pariter, atque udis. In Burgundia ad Dubium annem magnas & altas arbores vides. Vidimus etiam Monspeli & in pluribus Italæ locis. In Bœnzweiffenberg pulcherimas patulas & expantas vidimus, & aliam perelegantem in Schombach Ducatus Vvitembergi. Mense Maio florum amenitate, odorique fragrantia spectabilis. Fructus maturefcunt Septembri, quo mense, eius semina reperi in ventriculis tam merulæ nigre, quàm montanæ & Octobri, & ad multam hyemem in sepibus à hortis grato spectaculo videtur. Solet enim hæc, ad tonsiles sepes, quæ passim decussatim implexa extimas hororum pomitorumque oras ambit, præ alijs ferè omnibus expeti, etiam in hortis principum.

Dos eius præcipua videtur in odoris suavitate florum, tamen non defuerint, uti testatur Ruel. qui tradiderint hanc stirpem instar Lauri fulmine non ici, nec unquam de cælo tangi. Aiunt quoque pisces matinos: floris odore percussos, confectum corruptionis sentire contagia, quod gravi fragrantia acceptum quasi referat. Huius rei piscatores gnari florem devitant. Mirum est, si fulminis fulgur tuta respuat. Sed relatu se hoc habere ruellait, non certè scriptore: Aditque vulgus deturbandis calculis uti citino, singulari (ut se vidisse testatur) remedio ex vino, quod peculiari vocabulo Senellam nominat. Tragus falsè Cynosbaton existimans, tam fructui quàm folijs & floribus astringentè & conspiciatoti vim tribuit. Scribitque flores vino maceratos per triduum, deinde in vitro destillatos, remedio esse præstantissimo pleuriticis, & iis quos tormina exercent. Aquam etiam ex folijs floribus extractam arte destillatoria alvi fluxus sistere, si aliquoties per diem bibatur. Eandem aquam non tantum refrigerandi vim habere, sed etiam aculeis carni inhaerentibus reficere, si linteo in illa madefacta imponantur, adeo atterahendi facultate pollere: Etsi quæ hoc singulare experimentum. Lignum Cynosbati flagellis idoneum est, quo remedio desidia & insolentia fetulorum, & malè inorigeræ familiaræ, quàm efficacissimè emendari potest. Dòd. ei attribuit vires à veteribus Oxyacanthæ tributas, ac præterea dicit: fructum ex opinione quorundam Neoteri-  
corum conferre ad vesicæ atenuas & calculum. Et Cornar. audivisse quendam ait, qui siccatæ pulverem calculosis commodum afferret cum vino potum, cum suo illustri experimento. Et Camer. Saxonibus notissimum & usitatissimum è baccis Oxyacanthæ destillatum liquorem esse tradit ad calculos renum. Anguillatæ scribit, fructum ventrem lubricare, non astringere, & mulierum fluxus potius provocare quàm compescere. Nos verò non possumus nobis persuadere, fructus dulces Spini albe astringere & consipare ut Tragus & Matt. opinantur, nec etiam aquam ut vult Tragus, Anguillatæ etiam non astringunt fluxus provocare. Si enim astringeret, nihil faceremus ad Nephriticum & calculos. Qui autem credunt esse Oxyacantham genuinum veterum, legant eius vires antea traditas.


Ex posterioribus scriptoribus Schenckfeld. us est, qui alios secutus Oxyacantham veram veterum censet: nec parum miramur, illum, nullo citato auctore, nulloque experimento scripsisse fructum eius astringere, taborare, prohibere alvi, & feminarum profluvia i nucleos calculos comminuire: radicem illam aculeos & spinas extrahere, aquam ex floribus pleuriticis utiliter esse. Imò rationem ipsam respiciat. contraria plane

in his viribus deprehendit: Astringere ac prohibere certè contrariantur extrahenti spinarum, ubi præstaret dilatare quàm astringere & repellere, quod fit astringente & frigida. In pleuritide, ubi expectorandum, si ea aqua frigida sit, ut vult Tragus, & astringitoria, quomodo utilis esse queat periti norunt medici. Ita nobis ipsis interdum somnia fingimus, ut aliquid novi & inauditi dicentes, & nobis placeamus & alijs. Atque utinam materia medica, vel potius eius immensa facultatum varietas, non magnam intrementi sui partem, non in vanis eiusmodi opinionibus nulla interdum ratione, nullo sensu fundatis cœpissent. Sed mundus vult decipi, decipiatur ergo. Hoc tamen de aqua florum & fructuum non ita dictum volumus, ut eam proflus reiiciamus in pleuritide & calculo, quia nobis nondum constat nec existimamus astringentem & refrigerantem esse. Quare amplius indagandum.

Rustici ex hac arbuscula vivas sepes passim faciunt & exstruunt, quod pecus hortis in visum minacibus aculeis valenter arceat. Materie eius nihil magis expetitur ad tornum, propter duram & firmam atque tenacem eius æquabilitatem, quæ ad Buxum quodammodo accedit, ut in dies in torni exercitio experimur. Ad manubria & alia id genus præcipua post Buxum.

## PYRACANTHA QVIBVS DAM.

CAP. XXII.



**PYRACANTHA** frutex  
est spinosus, cortice nigricante vestitus, cuius per arbores aculei, alij uncia longi, alij breviores, sursum ferè spectantes, rigidi: folia iuxta aculeos Arbuti folijs quodammodo similia, alia scilicet longiora, alia unciam longa aut breviora, semunciam aut unciam lata, leviter acuminate, quadam rotunda, pulchre per ambitum serrata, glabra, potissimum inferiora, siquidem superiora interdum nonnihil lanuginosa sunt, nitore illo, quem superna facie ostendant inferiora, destituta ferè. Eandem existimamus Dalech. Vuam urli, cui flores attribuit acervatim congestos, ex luteo rubentes: fructum ex aureo colore ad coccineum vergentem, densius coadervatum, rotundum, acidum gustus. Addit C. Bauh. in iis grana aliquot contineri: & flosculos ex quatuor aut quinque foliolis cœpositos, ex luteo subrubentes, in quorum medio aliquot brevia stamina.

Pyracantha folio Pyrastrii inquit Lobel. & Penain Advers. aspectu squalida, eius bæccæ rubræ existant à pueris: semina oblonga habent, quasi Pyri aut Berberidis, in umbella flores racematim candidi, & fructus Oxyacanthæ pares. Raius valde spinosi. Rhamnus 3; Diosc. Icon. Plant. Rhamnus 3; Diosc.

*Palurus* Ady. Teuton. Item *Palurus* 2. peregrinus iisdem. Sed in dictis Iconibus videtur duplex error Typographicus, quia locis quæ ibi ex Adverbi. citantur, non posita Icon sub his nominibus, sed tantum per se pro *Pyracantha*.

*Pyracantha* Lycium. [ inquit Celsalp. ] in Italia arbutus est, aculeis acutissimis armata, cortice lævi, subfulvo, sed interius pallido: foliis Buxo longioribus, in arbutu sentatis, perpetuis: flores in racemulis roscemat minutis candentes. Baccæ autem fort Myrti minores, in maturitate croceas, saturato colore, gustu insuaves, nucleis intus duobus aut tribus. Perdurant autem hæc in multam hyemem, ut *Oxyacantha*. Oritur locis humidis & incultis. Diosc. quoque *Pyxantham* appellari testatur, apud quem pro *Pyracantha* legitur. Plin. ferè ex Diosc. transcribit. Apud Theoph. *Pyracantha* seu *Lycij* nomen non reperitur: videtur autem hanc intellexisse sub nomine *Oxyacanthi*, id est, seu *Pyracanthæ*. Hæc Celsalp. in quædam descriptione multa nobis videntur cum *Pyracantha*, de qua hic agimus convenire, nisi sit eadem, ut consideranti & examinanti patebit. Hist. Lugd.

*Oxyacantha* Theoph. videtur esse Galeni, id est una urti. Dodo *Oxyacanthæ* sive acutæ *Spinæ* alteram hanc annumerari *Spinam* acutam scribit, cuius flores sint candidi & odorati priori similes. Humiliorem hanc esse. Sibi Diosc. nomen *Pyrenæ* proprium videri.

*Pyrenæ* Non desunt, inquit Clusius qui ruam urti faciant *spinam* illam perpetuam virentem, *Oxyacanthæ* vulgari floribus & fructu persimilem, quæ in Belgicis hortis *Pyracantha* nominari solebat. Eam Anguillara, & rectè quidem, meo iudicio, *Oxyacantham* legitimam esse censet. Nam Theoph. perpetuam comam *Oxyacanthæ* tribuit. Diosc. *Pyrastrum* folio esse ait: cumque insuper baccas habeat Myrti, plenas, rubras, fragiles, &c. aptissimè *Oxyacantham* referre mihi videtur. Sic Clusius. At sit hæc eius opinio qualis qualis velit, illud certum Anguillaram non meminisse huius *Oxyacanthæ*: immò apertè eo loco, ubi conatus est ostendere, nostam *Spinam* albam non esse *Oxyacantham*, fateatur, asserere se non posse quid sit *Oxyacantha*.

*Clus. res* C. Bauh. apud Matth. *Oxyacantham* Diosc. ait esse qui pro *Rhamno*, alios qui pro *Pyracantha* ostendant. Acutæ spinæ nomine à Castore Durante exhiberi se *Oxyacantham* Diosc. censere, & ad differentiam vulgatæ, *Oxyacantham* *Pyrastrum* folio vocat. In Galloprovincia & Italia sepibus visitur, sed non ita frequens, teste Lob. Nascitur &, inquit Dale. in Alpinarum gentium *Bramovicum* & *Ebroduncensium* saxosis convallibus, maxime quæ torrentes præcipiti cursu vicinas terras glareæ & arenis obruunt. Provenit & in agro Senensi *Hetruriz* propè *Alcenum* montem. Spontè etiã in sepibus circa Bononiam provenire C. Bauh. notavit. Dod. raram ait, in paucorum tantummodo hortis apud Belgas repetiri. Florere Maio. Visus hic frutex nobis in instructissimis hortis D. Frid. Meyeri & D. Sprengeri, Argentinz & Heidelbergæ, in cistis cultus magna cura: ille *Pyracantham* vocabat: hic fruticem *Hispanicum* ex Italia missum. Ramus cum baccis missus. C. Bauhino nomine *Oxyacanthæ*. Nos Patavio ramum ex horto D. Cortusi attulimus, qui *Lycium* vocabat. Baccæ ad unum maturescunt. Nostam iconem, quæ satis feliciter picta fuerat ignavus corrupti sculptor, nam nec flores expresit, nec fructuum umbilicos. Hist. Lugd. etiã baccas habet sine umbilicis, nihil melius: nec solumum

feraturas rectè exprimit, ut nec icon Lob. quæ tamen baccarum umbilicos ostendit.

# BERBERIS VULGO, QUÆ ET OXYACANTHA PYTATA.

## CAP. XXIV.



INTER arbores Defertur & frutices ambigit *Berberis* vulgò dicta, modò humilis, et d. n. c. i. au- cans, modò proce- rior, eundem satis crasso donata: tota autem per quam ramacibus spinis armata; una, duabus, tribusve ut plurimum ex eodem puncto emittens: quod loci & folia prodeunt, ad Pruni sylv. quodammodo accedentia, sed ex angusto principio latefcentia, spinulis in toto am-

bitu mollioribus donata, sapore acido, sed quæ prima germinatione sinuosa videas, & pungentibus spinis horrida. Flores in ligularacemosis, lenis foliolis luteis constant, quibus totidem concoloria stamina respondent, pistillo viridanti, odore gravi: quibus baccæ succedunt *Cylindraceæ*, tenues, per maturitatem pulchrè rubentes, sapore acido & astrigente. Extimo cortici rimoso, & subcinereo aut albicanti, subest liber ex viridi flavescens, & huic materies albidæ satis fragilis, cui medulla ampla. Radix multissima non crassa, nec altè descendens, in terræ summo se continet, egregiè flava sub primo cortice. Hæc sanè, si quæ alia, nobis *Spinam* appendicem Plinij egregiè referre videtur: ita quippe baccæ puniceæ in ea pendentes, ut meritis præcis Appendices, & ab his ipse frutex Appendix sit nuncupatus. Sed & crudæ per se, & aridæ in vino decoctæ alvum citam ac tormina, hoc est, dysentericos cruciatus & fluxus indubiè compefcunt. Et *Berberis* Avic. esse volunt, quæ ei *Amiberberis* dicitur, & ut vult Luminare maius, etiã *Oxyacanthæ* Diosc. Ex fructu modernis *Lycium* fieri: & arborem eius vocari *Darlsahan*. ab aliis *Crispinum*, Quosdam negare esse *Darlsahan*, sed errare. *Berberis* vocat Petrus de Crescentiis quam rura modò *Crispinum* vocant, & ea dicitur *Oxyacantha*, inquit Hermol. sed *Oxyacanthos* quæ sit, in Plinio se non comperisse. *Crispinum* verò vocari, quasi *Acem Spinum*, ut multis placet: atque ex acinis oblongis & racematim congestis vinum fieri, eodem ferè usu quo vinum ex *Malo Punico*.

Eiusdem cum *Hermolao* opinionis sunt etiã Ruell. *Tragus*, *Monachi*, *Fuchius*, *Cornar*. *Sylvius* & *Luminare* maius. His verò contrarius est *Cordus*, inquit, *Oxyacantha* quæ Theoph. etiã *Pyracantha* & *Pyrastrum* nominatur, ab omnibus esse creditur *spina* quam Arabes eorūque interpretes & recentiores cum Medici tum Pharmacopolæ omnes uno ore *Amiberberis* & *Berberis* appellant. Cui sententiæ nos minime resag-



fragamur, sed potius conquerimur, confundi apud autores hoc nomine duos frutices natura diversos.

Quæ enim apud Diosc. extat Oxyacanthæ descriptio, nihil minus designat quam Berberim. Alia enim est Oxyacantha, cui Gal. adstringendi & pariter incidendi vires tribuit ab ea Spina, quæ à Dioscor. sub Oxyacanthæ nomine describitur, quod iam ostendimus, ab ipsa fruticis descriptione exorti. Principio Oxyacantham suam Diosc. Achradi, hoc est Sylvestri Pyro, similem dicit, minorem tamen & spinosior. Similitudo autem semper ad formam & figuram rei refertur. At divertissima est Berberi à Pyraastro figura, ut iam declarabimus. Pyraaster enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in divaricatos & intortos ramos diviso. Berberis pluribus virgis fruticis modo se attollit, usque minime intortis, sed rectis. Pyraastro, antequam omnino senescat, cortex est lenis, glaber, in flavo spadiceus, in cæsis candidantibus maculis variegatus. Berberi vero longè diversus colore, & in ipsa adolescentia rimosis & rugis contractus. Quapropter, nemo facile, modò semel tantum utrumque viderit, Berberim Pyraastro similem dixerit. Iam in fructu tanta discrepantia, ut ne similitudini quidem ulle ullus reliquus videatur locus. Berberi quidem rebus est fructus, sed Myrtæ bacce dissimilis. Hæc enim rotunda & globosa existit, illo verò oblongus & utrinque acuminatus. Oxyacanthæ deinde fructus *εὐπυρρῶν*, hoc est, friabilis describitur. Sed Berberis bacca quoniam lenta cute succulentam carnem continet, minime friabilis esse potest. Friabile etiam non de re quapiam lenta, humida & succosa dicitur, sed de fragili, arida, quæ digitis facile veluti in pulverem atteri queat. Talis autem fructus Berberi non est. Quare nemo ipsum friabilem dixerit. Censemus itaque ahàm esse spinam quæ à Diosc. describitur, ab ea quam Gal. & Arabes Oxyacanthæ & Berberis nomine describunt. Itaque pronunciamus Oxyacantham à Diosc. descriptam esse Pyracantham: Veram autem Oxyacantham de qua Gal. scribit, Berberim esse. Nihil enim obstat quoddam ex Dioscor. Galenus in suæ Oxyacanthæ descriptionem transtulerit. Omnino eiusdem quoque sententiæ est Matth. acilidem penè nix rationibus: nempe Crispinum vulgò dictum, qui nihil aliud quam Berberis est, prorsus ab Oxyacantha seu Acuta spina Dioscor. differre. Immo Berberis virgæ pollicarem (addit) crassitudinem rarissimè excedunt, nisi ætate longa incrementum susceperint, quin & rara inveniuntur eius virgula quæ hominis longitudinem æquant.

Ad hæc Pyraaster cortice constat aspero, squamoso, inæquali, crasso, colore in nigro rufescente. Berberis verò cortice vestitur albo, levi & admodum tenui: quo fit ut non adeò leviter ferro vel lapide tangi possit, quin statim cortex frangatur, & crocea ligni materies detegatur. Præterea Pyraaster Prunorum modo aculeata conspicitur, aculeis singulis ex eodem loco erumpentibus, licet rari frequentissimis horreant spinis, usque nigris, validis, candidi Rhami modo mucronatis. At Crispinus [Berberis] ternis perintervallata armatur aculeis, simul ex uno eodémque puncto prodeuntibus, adeò ut trifurcato ordine prodeant, duobus scilicet utrinque se pendentibus: tertio verò medium occupante, albis, planis, non quidem rotundis, fragilibus, & admodum pungentibus. Illud insuper discriminis addit: acu-

Tom. I.

tam Spinam fructum ferre Myrti magnitudine: Crispinum [Berberim] verò racematim in uvæ modum, cuius oblongi acini tritico paulò maiores, vividis ac rubentes elegantèrque racemis annexi, puniceos acinos quadantenus representant: quanquam minores, oblongiores, acidiore, & colore etiam multò vivaciore habeantur.

Crispini [Berberis] deinde folia minime Pyrastrum referunt, sed potius puniceam malum, quamvis latiora, nec adeò in mucronem destinentia, per ambitum spinis tenuissimis frequentissimisque horrida. Radices etiam quæ profectò æquè flavæ sunt, ac si croco essent infectæ, etsi plures sint, atque exiles, nihilominus altè non descendant, veluti acutæ spinæ, sed in latus summo cespitè vagantur. Flos denique Pyraastro admodum refragatur: namque melius ex racemo Vvæ simili erumpit, sui fruticis interno colore à quo dum explicatur atque dehiscit, perquam suavem spirat odorem. Quibus evidentiissimè colligi potest, & Oxyacantham Græcis & Berberim Arabibus, non esse hanc nostram Berberim, seu Crispinum vulgò dictum, cuius communis usus est apud Medicos & Sepiarios.

Sed præter hæc illud etiam certò credendum, quòd si Diosc. per acutam spinam hanc nostram intellexisset, nunquam silentio dissimulasset folia mirabili opere per ambitum aculeata: neque fructum, quem ramis pendulum gerit, acinis inter se racematim coherentibus, Myrti baccis assimilasset, nec scriptum reliquisset, radices in profundum agi: nec denique flavum earum colorem quo insigniter natura infectæ sunt, unquam reticisset. Non prætermisisset etiam spinarum historiam, utpote quæ ternæ suis virgibus innascantur, à pede ad verticem: non corticis candorem, non tenuitatem: non item, quòd sæpius sine caudice variis veluti stolonibus fruticet: non denique ipsam Pyraastro prorsus similem reddidisset, à qua profectò non minus distaret, quam Quercus ab Olea, ut pudeat huic rei vel refutandæ, vel confirmandæ veritati manifestè diutius incumbere.

Non dissimulandum tamen eiusdem huius sententiæ præter Cordum & Matth. esse etiam Amatam, Dod. Dalech. Tabern. Hist. Lugd. Camer. Bacchanel. Turner. & pleròsq; doctiores, qui ipsam rem non diligentius perpenderunt. Quid? Quòd ipse Galenus quoque quamvis hanc spinam *εὐπυρρῶν* vocet, ab *εὐπυρρῶν* tamen distincterit, in lib. de simpl. sed & manifestius in lib. de fac. alim. ut probè annotat Dod. Etenim, inquit, Diosc. huius Spinæ [Berberis] non mentitur: nam quam ipse Oxyacantham sœm. gen. vocat, Galeni est masculini generis Oxyacanthus. Avic. utrumque fruticem sub Amyrberis nomine complexus videtur. Quin & Serapio Berberim describitur, Diosc. nomen verbàque producit, quam tamen nunquam ei innotuisse clarum est. Cum vulgarem Italarum Crispinum, legitimam esse Mauritanorum Berberim totus Oriens clamat, teste P. Hæsto, ubi in præsentem usq; diem Amyrbaris nomen conservat, ut in Arabia: quo nihil est Damasci & Tripoli notius.

Est igitur Berberis Oxyacanthus Galeni. Sicque volunt & statuunt etiam Dod. Gesner. & Camer. ac ita statuent, quicunque rem diligentius examinabunt, quamvis Tabern. inter recentiores etiamnum Oxyacantham Galeni dicat.

Oxyacanthæ tamen vocem cum Oxyacantho plerique Herbarij confudere, inter quos & doct.

E 3

Alia est Oxyacantha Græcorum & Berberis Arabum ab hac.

Differunt Oxyacanthus & Oxyacantha

Amyrberis

Amyrbaris

Etissimus Cordus, vulgi opinionem secutus, & diligentissimus Sylvius, & alij plerique, sed parvi momenti est nominum consilio, si de re ipsa constet.

Dalech. volebat aliquando Berberim esse Viam utsi Galeni l. 7. comp. med. floc. de quare suo loco. Frustra quoque Tragus huic nomina à Diosc. suæ Oxyacanthæ tributa ascribit. Apud Serap. legas Amyrberim etiam Arsam dici, & fructum Zairach. Hispanicum etiam & Italicum nomen quod Berberi tribuit Amatus, neutiquam ei convenit, sed Oxyacanthæ Matth. sive Spinae albi. Falluntur quicunque Oxyacanthæ Dioscor. loco Berberim sumunt. Sic Carolus Stephanus Styrium parum peritus confundit in Horto Spinum album & Berberim. Berberis, Berberus, Crespinus, Oxyacanthæ, Spina acida, & Spina sancta, quorundam, ex qua Bugia officinarum, Germ. Eibschal / Eibschalen / Versing. Sauwerach / Passelsbeer / Saur Jörn. Io. Bokelius in lib. suo de peste fatis barbarè vocat *Barberis*. Belg. *Sauselboom* / *Suerboom* / Gal. *Espine-vinette*, atque inde Latino nomine, *Spinivincta*, quod ex eius acinis vinum exprimitur: ou de Berberis. Ital. *Crespino*, Hisp. *Espino de Maiuelas*. Vngar. *Irom Borbala*, hoc est, Vinum-Barbarum, *Faj-siska*. Boh. *Drac*, sive *Drisal*. Angl. *Berberis tree*, aliàs, *Pirigde tree*, & *Berberis*. Burgundi vocant, *Bois de saint Martin*. Et Montbelgardenses *Baccas Joumarin*.

Sponte nascitur multis in locis incultis, sylvosis, frutetis campestribus, montanis, siccis & aquosis: & riuiolorum ripis ac collibus etiam potissimum gaudet. Amat loca frigida, paulò calidiora tamen non respuit. Nam & circa Bononiam observavimus, & in Italix hortis plurimis, sed cultam. In Delphinatu iuxta Valentiam, spontaneam. In agro Basilienfi, Alsatico & Burgundico passim ferè occurrunt & Montbel, Stuckardiz in horto illo Ducis regio totas sepes ea contextas vidimus. In Brabantia reperitur in marginibus agrotum & sepibus? In uniuersa Hispania fructum non emitte ait Fuchsius: fortè ob regionis eximium calorem: secus verò in Germania, Gallia & uniuersa Italia.

Tempus. Germinat incunte Vere: Floret Aprilis & Maio. Per Septembrem & Octobrem rutilo suo decore sepes exornant Baccæ, quibus mensibus maturæ carpuntur ad usus. Rubent verò etiam Augusto. Monspelij non vidimus.

Vires & us. Folia & fructus temperamenti sunt frigidi & sicci in secundo gradu, partèque etiam quassam nonnihil subtiles habent. Vires Spinæ Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum suum immodicam restinguit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conduuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eosdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum ingrossum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harum acore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum & solutum, contusorij succi cum aceto plurimum profuisse in calidis dolorib. dentium a fluxione biliosa vel terosa obor-

Stit. Menstr. fa. perit.

Febres.

Dolor dentium.

tis: acient enim sua frigidityte & astrictione humorum subtiliū influxum, & gingivas confirmat. In doloribus capitis à causa calida fronti applicita multum possunt. Possunt & maturi acini cum ramis decerpi, & vel per se in umbra siccati, vel in cella vinaria reponi, ut nostri solent, tūm quando opus, aquæ tepide vel gelidæ immergi, (nam quæ reviviscunt,) & ad prescriptos usus accommodari. In omni bus penè calidis morbis in vomitionibus continuis, præsertim biliosis, Berberis Baccæ salutare sunt. Folia tenera Maio mense: acini Autumno intinctibus quàm accommodatissimi sunt. Tradunt nonnulli, acinos maturos tulos, ac cataplasmatibus instari illitos, non solum abiectiones calidos lenire, dolore mitigato: sed & illos rumperre, & ad sanationem promovere. Id annotat Tragus. Verum huic remedio non multum tribuimus, nec eo etiam uti vellemus. Ad maturandum enim astringentibus non opus. Ob sunt repercutientia. Quid igitur prodesse queat Berberis?

Aqua ex foliis & floribus Maio mense destillari potest, & ad prædictos morbos plerisque præscribi.

Sed vino quod ex Berberis acinis exprimitur, nostro & Matth. iudicio, longè maior inest austeritas, aciditasque, quàm mali Punici succo quamvis nonnulli aliter sentire videantur. Illud enim, ut egregiè monet Matth. si in acutis perniciosisque febribus, uti Causus, & quæ pestilens, Iulapio Violaeco ac aqua commistum, ægotantibus exhibeatur, non modò suum restinguit, sed biliosas pestilentisque exhalationes supprimit. Datur utiliter Caliacis, cibum reciditibus & Dysentericis, & ubi bilis à lecinore in Ventriculo regurgitans cholicos excitaverit affectus: Non tam sumptum quàm indicit mensuram profusui inhibet. Tineas ventris enecat, præsertim si bibatur ex aqua Graminis, vel Portulacæ, vel Abrotoni, addito sacchari tantillo. Prodest cruentis excretionibus: firmat commotos dentes si eo sepius foveantur, quietinat gingivas roborat, & gargasatu faucium utæque inflammationes discuit, atque destillationes ed consuentes reprimit. Vulnere recentia in carnis superficie glutinat, & ulcera vetera desiccat. Nocet his, qui ex flatu, ac frigidityte laborant ventriculi doloribus, atque etiam ægrè spirantibus.

Huius verò succum mordacem nolimus oculis instillare, in Ophthalmia, etsi, ut suadet idem Matth. pompholyx addatur cum aqua rosarum. Acra enim non possunt non vellicando exquisitissimi sensus oculis dolorem causare, & ita fluxiones potius concitare quàm prohibere. Quare hoc remedio uti volentibus suademus, ut extrinsecus palpebris circumcirca applicant, adhibita cura, ne intra oculos pertingat. Ex foliis eius vitidibus teste Dod. sunt intinctus, haud secus atque ex oxalide, ad appetentiam excitandam ad refrigerandum, atque etiam utilissimi febricitantibus & temperamento calidis.

Flavus eius cortex, inquit, Camer. pulveratus, auxilio est aphthis, similibusque faucium ulceribus. In lixivio maceratus flavo colore tingit. Hunc corticem quædam Officinæ Bugiam nominant. Assamenta & suppellectilem ligneam observavimus hæc ratione vernice incrustari, illustrarique. Aquæ, quæ macerata collâ mucaginosa sit reddita, illinuntur ligna explendis fibrarum & pectinum interstitiis: siccata insulo, corticum Berberis croceo colore tingunt, tandem nitorem inducta vernice liquida vulgata conciliant.

R H AM.



## RHAMNUS CATHARTICUS.

CAP. XXV.



**C**ELEBRATUM Rhamnum catharticum usum in purgando multus & felix, arbusculam sepibus alicubi familiare, cortice externo nigro vestitam cui duo alij subfunt, alter vitidis, alter luteus, materie pallida dura, ramis satis crebris, iisque fere ex aduerso sitis brachiata, duris, rigidisque & longis spinis foliis ruinaem,

aculeis præterea alius minoribus horrentem. Folia ad Pruni folia accedunt, acuminata, atroviuentia, crenata, nervosa, adstringenti sapore: flores herbacei coloris paruos profert, quatuor apicibus constantes, multos simul iunctos. Succedunt bacca frequentes ad radicem spinarum ex longiusculis pediculis, frangulae pares, per maturitatem nigrae, succo virente plene, in quibus grana terna, vel quaterna Pyrorum granis penè similia, figurâ ferè triangulâ, cortice nigricante, medulla alba non ingrati saporis, quæ facillè ungue prementè franguntur, sapor baccarum amarus & subastungens, & qui facillè gustanti nauseam moveat. Habet & succus earum nescio quem sibi peculiarem odorem.

Rhamnum [ inquit, Hermol. ] Dioscorid. à nostris Spinam cervalem dicit appellari. Quo argumento videri potest haud dissimile huic genus esse quod & hodiè vulgò Spinum cervinum vocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus vitidis, ob id, vel ad colorem pingentibus idoneo. Cortex arbori subniger & nūdus, quasi Ceraso, interior virens, postea luteus, lignum extrâ candidum, interior medulla rubet. Hermolai hanc opinionem fugillans Marcel. Fuerunt, inquit, qui Spinum Cervinum appellatum Rhamnum crediderint, non animadvertentes fruticem à Diosc. non arborem vocari, virgâque non ramos illi tribuere, & Rubis, Hederæ, Palmarumque, ac similibus plerisque aliis coniungere eam Theophrastum, quorum nullum arborefcit. Spinum verò Cervinum arborefcere, & humani seminis crassitudine truncum aliquando habere, & omnem rubrum esse, quum Rhamnum nigram & candidam Theoph. tradiderit. Nec posse Rhamnum arborem intelligi Theophrastus ostendit, Nam si arbor fuisset, pedibus nocere non potuisset. Hermolai opinioni ad stipulantur, Ruell. Gesnerus, & Fuchsius quondam etiam Spinam cervalem cervinamve vocavit. Ac Ruellius quidem & Ryff anbo more suo Hermolai verba ipsa adducunt, eo tamen non citato. Quasi maluerint se falsa inducere opinionem, ut aliquid dixisse videantur, quàm auctori suo citationis honorem referre. Quin & à Trago

hæc planta pingitur & describitur sub hoc nomine: Rhamni 2. species: quo verò apud veteres habitus fuerit, sibi non satis constare fateatur. Et nisi folia eius hyeme decuterentur, facillè se dicturum esse speciem Rhamni alteram apud Theoph. Quamquam id ob stare nequitiam posse censet, quò minus Rhamnis accensetur. Si quidem nec Diosc. nec Plin. perpetuò virentium Rhamni foliorum ullam fecerint mentionem. Quapropter præsentem fruticem Rhamni speciem esse statuit, quoad alij certiorum eius nomenclaturam docuerint. Et in Hist. German. idem tradit, & nec à Nicandro quidem scribi perpetuo esse folio. Ac parvi id momenti esse etsi hyeme excidant folia, quominus Rhamnus 2. Theoph. esse possit, se itaque in ea mansurum opinione, donec alius meliora tradat. Nobis sanè verò maximi momenti esse videtur, plantam esse vel sempervirentem, vel folio deciduo, & hanc notam nuspiam facillè deleri contemni debere aut posse statuimus. Præterea non videmus quid in hac stirpe appareat, cuius merito Rhamnus candidus, qui alter est Theoph. dici possit. Mirum etiam, Tragum, alioqui sedulum herbarum vestigatorem, facultatis purgatricis huius fruticis non meminisse. Cordus quoque Cervi spinam vocat: Et Cæsalp. Spinam cervalem vulgi, quasi & ipse dubitaret esse veram & legitimam Diosc. Dubitasse videtur & Apollo, nequicquam statuens. Sed revera Rhamnus non est, ac tantò minus Spina cervina Dioscor. ut rectè nostro iudicio statuit Marcellus contra Hermol. cuius opinioni etiam refragatur Matthiolum. quavis non nisi ex Marcello id hausisse videatur.

Hallucinantur proculdubio, inquit Amatus, qui Spinam cervalem vulgò dictam, Gallis Burgam vel Neprum, Rhamnum esse putant, quum revera nulli Rhamni generi respondeat. Et Diosc. Rhamnum solutivum vocans, negat tamen esse verum Rhamnum vel Theoph. vel Diosc. Nec placent qui Rhamnum simpliciter & absolute dicunt, ut fecerunt Theoph. Goli in Onom. Euchar. Roslin, & Helfricus, qui & idem, & Spinam albam vocat, nihil rectius & alia quædam nomina tribuit, nequitiam huic arbori competentia. Nihil tamen impedit, quominus cum adiectione Rhamnus Catharticus vel solutivus dici queat, quòd Rhamnis quodammodo, spinis, baccis, & aliis quibusdam accedat, ut à plerisque recentioribus herbariis fuit nuncupatus.

Spina infectoria Matth. Clus. Penz. Lob. & alii. Spina infectoria quorundam. Spina cervalem, inquit Amatus, Hispani Alvarum: Itaque verò Merlam vel Cervinam, Galli Burgam vel Neprum appellant. German. VVegdorn, VVegdornbeer, Creutzbeer, VVeer senbeer, VVahenbeere, Ferbkörner, Ferbbeer Darwin man das Saffignun macht. Belg. Rhijnbesien doren. Besienboom, Baccarum arbor: & fructus Rhijnbesien, id est, Rhenanae baccæ, quòd magna copia iuxta Rhenum reperitur. Italis Spina merlo, Longobardis Venerisque Spin Cervino: Foroiulienibus Spina-querzo, cæteris Spina da tingere. Bacchan. tradit Petrus Maracho dici: num rectè, ipse videtur. Gal. Neprum, Bourg espine. Gallo-belgia Nerprun. Hung. Ervöisk, i.e. canina spina.

Pulchram iconem habet Matth. ut & Camer. quæ melius placent nostrâ. Euchar. duas figuras habet diversis locis, & diversis nominibus, quasi de distinctis plantis tradidisset, cum tamen utrobique posita illa nomina [ nempe primo loco Breutzbeer, ferbkörner: alio Weggdorn/

Weerschenbeer ] omnia uni huic frutici conveniant.

Locus.

Nascitur multis Germaniæ locis senticosis, & sepibus, agrorum limitibus, ac iuxta vias, in dumetis iuxta itinera & vias sitis, ut vix alibi copiosorem observes: unde & Germ. Wegdorn, quasi *Vsarum bacca*, vel *baccifera* dicta. Amat inculta loca, & rivulos ac fœtrobis aquam habentes. Basilæ, Tiguri, inter Montbelgardum & Baffordiam circa Barmont copiosè nascitur. In horto E. C. Montb. copiosè alitur inter sepes. Multis Pannoniæ locis vulgarissima est, ubi interdum arboream amplitudinem adipiscitur, teste Clus. quales & aliquot videas in horto prædicto. Floret Maio. Autumno bacca maturefcunt.

Tempus.

Vires & usus.

Ignis sacer. Serpentina ulcera.

Color lucet.

Viridis color.

Punicæ color.

Temperam.

Purgant.

Hydrops. Dosis.

Vi mitius purgant.

Molestè purgant.

Folia fugidæ & siccæ sunt nature: ided igni sacro & serpentibus ulceribus efficaciter illinuntur. Quædam mulierculæ vel folia vel interiorem corticem cum modico aluminis vino decoquant, adversus oris ulcera & putredines, quibus hoc medicamento gargarisato singulari experientia succurrunt. Bacca huius fruticis melle tempore lecta arefacta & tusa in aqua & alumine macerata, luteum seu croceum potius reddunt colorem, quo librarii olim libros pingere consueverunt. At hodie cum auripigmentum usu recipi cæpit, repudiati sunt acini isti, quanquam locum adhuc habeant apud eos qui chartas depictas & luforias, nec non coria colore flavo inficere solent. Autumno cum bacca ista maturitate suam assuetæ nigra evaserint, leguntur, & tusa in vase æreo asservantur, & pulchrè viridem exhibent colorem. Vnde nonnulli eum viridè colorè ex his parant, quem Ger. Saffrum vocamus. Gal. verò, *verd de l'estie*. Belg. Sappruen: qui pictoribus accommodatissimus est, & in magno usu. Hi acini cum circa festum D. Martini in arboribus adhuc hærent, legi solent, & ad Punicum colorem conficiendum ab iis qui coria inficiunt, & depictas chartas coloribus illustrant. Ex his facillè liquet has baccas utilissimas esse, ut quæ tria colorum genera præbeant, croceum, viridem & punicum, ut in scripta retulit Tragus. Bacca autem, ut gustu amaritudinem cum adstrictione quadam referunt, ita & calidæ siccæque existimantur ordine secundo. Purgatrices verò sunt, atque crassam pituitam & biliosos quoque humores per alvum educunt. Nos peculiarem earum vim in sero & aquosis humoribus efficaciter educendis experti sumus, quapropter non rarè earum syrupus ad uncias tres hydropicis præscriptus notabili cum successu datur: atque etiam exhibetur aridarum pulvis a ʒj: ad ʒiſs. autore Dodon. Nonnulli baccas numerant, qui à XV. ad XX. exhibent, vel etiam plures duris hominibus. Præstat autem ipsas contractas in iusculo pinguis carnis absque sale incoquere, atque iusculum ebibere: sic etenim minori cum molestia, ac paucioribus ventris doloribus ac torsionibus evacuant. Incoquantur autem bacca à XL. ad LX. pro robustissimis, etiam plures. Idem Dod. tradit baccas potenter purgare per inferiora, evacuare pituitam viscidam ac humores biliosos magna vi & excessu, ita ut multum corpus perturbent eorum qui sumunt, & ac sæpè vomitum movere. Itaque non convenire nisi juvenibus robustis & rusticis, qui magis parcant pecuniis, quam vitæ suæ, Sed mollibus & debilibus has baccas valdè nocere, immensâ suâ vi: atque eò magis si non correctæ & castigatæ exhibeantur. Et sanè eam facillè parari possit ex iis syrupis, aut ipsæ quoque prædicto modo administrari, ipsas baccas temerè, nisi robusto devorandas

dare nolumus. In Syropo verò quo quotidie & frequenter utimur, etiam in delicatissimis naturis, nullam molestiam effatu dignam, unquam deprehendimus: & solvendo corpori accenti modicissimum à multis iam annis cognovimus, etiam in nobis ipsas. Paratur Matth. hoc modo. Bacca probe maturata, ut Octobris principio, leguntur ad lib. ij. mundatæ, conquantur parum, & in olam vitreâ in dicitæ per tres quatuorve dies benè testæ, stare sinuntur loco tepido. Postmodum exemptæ in sacculum coniciuntur & prælo subiectæ exprimitur. Succus expressus cum lib. j. d. Sacchari lento igne coquitur ad Syrupi consistentiam. Postea colatur, addunturque Cinnamomi & Zinziberis benè pulverisati ana drach. 4. Garryophil. drach. ij. & in usum reponitur. Huius unctia j. ad drach. x. placidè purgat pituitam omnèque crassos & viscosos humores. Quare podagricis optimum est medicamentum. Nos ita fieri iubemus. Succum baccarum maturarum extracti & ritè depurati lib. V. coquantur cum Mellis opt. & Sacch. ana lib. j. d. ad Syrupi consistentiam. Adde pro unaquaq; libra Syrupi, Cinam. & semin. Anisi conquantur ana ʒij. in petia ligata immergantur. de hoc tutò dabis ab ʒj. ad ʒij: nec prædictas molestias metues, nisi fortè in exquisitissimè delicatis homuncionibus aut impuris planè corporibus in quibus omnes ferè purgationes molestiores fieri scimus, quod plerique tales stomachici sint quorū Camerinam absq; singulari cautione mouere periculòsum, sit & ex laccis his Electuarium, nonnullis in locis usitatum, ut & Syrupus quæ ambo parum amica stomacho Camer. censet, ideòque eò diligentius corrigenda. Medici Lutetiani, inquit, Pen. & Lob. certiores virium, quàm Matth. ut qui nos ad pituitam crassam & viscidam, sed potius tenuem educendam, prudentius utuntur. Sanè & nos præcipuum earum vim in extrahendis aquis deprehendimus: ut dictum.

## RHAMNVS SOLVTIVVS

PVMILVS PANNON.

I. Clus.

EX ea plantæ portione, quam penes nos in sicco nostro herbario habemus, apparet fruticem esse ad Rhamnum Catharticum vulgarem accedentem, cortice testum nigricanti. Folia ex eodem tuberculo plura oriuntur, brevibus pediculis hærentia, acuminata, unciam plus minus longa, semunciam lata, circumcirca crenata, lævia. Bacca siccæ Terebinthi fructum referunt, tum magnitudine, tum forma turbinata, in acumen desinente pediculis semuncialibus appendæ: nec demonstrant commissuras quales Clus. habet in Rhamni sive spinæ insectoriz Pannon. 2. sua figura, cui tamen folia satis respondere videntur.


Considerandum an possit esse prima eiusdem, cuius nullam dat figuram, quamque sic describit: Spina insectoria prior bicubitalibus assurgit ramis, in multas alas divisas, cortice lævi, spinæque insectoriz vulgaris tum colore tum substantia similis, testis, qui membrana superiori dempta: ex viridi pallefcit, & si potest est amarifusculo: ramuli paucis spinis horrent, sed ipsi in spinas plerumque desinere solent. Folia vulgari ferè similia, sed minora & angustiora, ad Pruni sylv. folia plurimum accedentia, gustu lingnam exiccant. Flos congestus, ut in vulgari,



g. i. iisdemque coloris & forma, hoc est, ex palido herbaceo, & quatuor foliis constans, minor tamen. Radix ut in aliis fruticibus lignosa. Hanc si quis Lycij generibus annumerandam censet, non refragabit.

Frequens cum vulgari Rhamno exit in Leytenberg. Floret Maio.

## RHAMNVS SOLVT. PANNON. II.



**S**pinæ infectæ Pannonicæ. Clutis cubitalibus habet ramos minimi interdum digiti crassitudine plerumque minores, nigro rugosos cortice obductos, superiore parte in ramulos divisos, qui tenuiore & laxiori cortice recti plerumque in acutam spinam desinunt. Folia Myrti aut sylv. potius, breviora tamen & minorata, per am-

bitum nonnihil ferrata, gustu, primum adstringente, deinde nonnihil amaricante: Flores inter folia herbacei, quatuor foliis constantes, ut in priore: Fructus deinde spinæ infectæ vulgaris haud absimilis: binis, nonnunquam etiam ternis veluti commissuris distinctis, initio viridis deinde per maturitatem niger. Radix crassa, lignosa, dura, raras fibras in latera spargens. Et hanc quoque Lycij generibus accenseri æquo fert animo. Tabern. Germ. Ungersisch Veegsdornbeer & Creutzbeer vocat. Botanici qui viderunt, considerent quantum differat hic Rhamnus à Lycio Gallico.

Nascitur copiose in monte Bodensi thermis imminente & vicinis iugis, loco petroso & salebroso.

RHAMNVS BAVARICVS  
DALECH.

**P**ro Rhamni periam genere spinosam plantam Germanus quidam rei herbariæ studiosus ex Ingoisadio Dalechampia attulit, quam Rhamnum Bavarium vocabat, quod aliud aptius nomen non inveniret. Hæc planta, ut ille narrabat, hominis altitudinem superat, cortice est purpurascete, spinoso, foliis densis, pallidis, omnibus ferratis, sed

aliis longioribus & angustioribus, prima scilicet ramorum parte, nec illi dissimilibus, aliis brevioribus & rotundioribus, circa ramorum extrema Rhodis folia utrunque emulantibus, spinis multis, tenuibus, sed acutissimis, foliosis, ut in primo Rhamno Matthioli. Hist. Lugd.

## LYCIUM VETERVM.

## CAP. XXVI.

**L**ycium, quod aliqui *πυργόφυτον* vocant, autore Dioscor. arbor est spinosa, virgistrum cubitorum, aut etiam longioribus, circa quas folia sunt Buxi similia [Plin. Radix Buxei coloris] densa. [Savon:] quidam frequentia vertunt. Fructum fere Piperis instar nigrum, [Celsus:] Celsus. non probat, sed melinum substituit, id est, luteum] amarum, densum, [Savon:] sive succi plenum, aliter quam Matth. & Corn. laxem: corticem vero pallidum, Lycio diluto similem, & radices multas, obliquas, [pro *πλάτεις* ut Orbas:] habet à Plin. legi potuit *πλατεις*, Serap. quoque legit *πλατεις* lignosas. Nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, pluribusque aliis locis. Aspera loca amat.

Succus dicitur radicibus cum fuit ipso tussis [Ruell. hic more suo maluit Plinij sensum exprimere, quam auctori fidem præstare, cum ait: Rami cum radiculis tussis, &c.] & per dies multos maceratis, denique coctis: ac tunc ligæa quidem abiciuntur, liquor vero iterum coquitur, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur amura inter coquendum admixta, aut Absynthij succo, aut felle bubulo. Quod vero spumosum innatit inter coquendum, exinito, & ad oculorum medicamenta reponito: reliquo ad alia utitor. Simili modo & è fructu expresso & insolato succus elicitur. Optimum est Lycium, quod igni accenditur, quodque dum restinguitur, rubentem spumam [Orbas. *κατὰ τὴν*, id est, fumum legit] edit,

extrinsecus nigrum, intus vero cum dissecueris fulvum, minimè virosura, cum amaritudine adstringens, colore croceo: quale est Indicum, reliquo præstantius & efficacius. Vim habet astrictoriam, & quæ pupillis caliginem offundunt exterit: palpebrarum scabiem, pruritus veteresque fluxiones sanat. Facit & illitum, ad aures purulentas, tonsillas, gingivas exulceratas, labiorum fissuras, sedis rimas & attritus. Cæliaci & Dysenterici, tum potum, tum etiam infusum convenit. Datur & sanguinem excreantibus atque tussientibus ex aqua: itemque à rabioso cane demorsis, catapotij instar devoratum, aut ex aqua bibitum: Flavos facit capillos: Reduviis, herpetibus, putrescentibusque ulceribus medetur: Fluxum mulierum appositum sistit, & à rabiosis animalibus demorsis, seu in lacte bibitum, seu catapotij vice assumptum, auxiliatur. Fertur & Lycium Indicum [hæc sequentia superflua apud Dioscor. putat Cornar.] fieri ex frutice Lonchitide vocato. Est is è spinarum genere, virgas habens rectas tricubitales aut etiamnum maiores à fundo numerosas & rubo crassiores. Ruptus cortex rufescit: folia vero Oleæ similia videntur. Cuius herba in aceto decocta propinataque prodituri Lienis inflammationibus, Regioque morbo mederi, & scæminarum purgationes cieri. Cruda quoque trita in potu eadem præstare traditur. Seminis mystra

Descriptio  
Diosc. Py-  
xantha.  
Folia Buxi.

Locus:  
Lycij succi  
parat. ra-  
tio.

Adulterat.

Succus à  
fructu.  
Delectui.

In. scem.  
Vires.

Caligo ocu-  
lorum.

Scabiæ  
palpebrarum.

Aurium  
ulcera.

Gingivarum  
ulcera.

Rime la-  
biorum.

Ex. ant.  
Callosa

Dysent.

Long. spu-  
rum.

Gantis ra-  
bide mor-  
bis.

Capillos  
cingit.

Fluxum pu-  
ridum.

Menfes su-  
perfl.

Lycium Indicum.  
Lonchitidis  
descriptio.

Vires.  
Lienis in-  
flammatio.  
Idem.

duo epota aquosa expurgant, suntque aduersus lethalia medicamenta remedio.

Plin. verò spinam eam ex qua Lycium fit in Græcia, Pyxanthum Chironium vocari dicit, quam vocem superfluum putat Dalech. Sed Plin. verba, ut à Diosc. nonnihil variantia lubet adscribere Fert & Spina Piperis similitudinem, præcipua amaritudine, foliis parvis densisque, Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice laia lignosaque, buxi coloris. Hæc in aqua cum semine excepta in æreo vase medicamentum fit, quod vocatur Lycion.

Ea spina & in Peho monte nascitur adulteratque medicamentum. Item Asphodeli radix, aut fel bubulum, aut Absynthium, vel thus [Rhus. Ch.] vel amurca. Lycion aptissimum medicinz, quod est spinosum. Indi in utribus Camelorum aut Rhinocerotum id mittunt. Ita videt Diosc. folia Buxi similia dixisse: Plinium verò radicem buxi coloris, eandemque latam, quum in Dioscor. legatur obliqua, ut non vana suspicio sit Cornari Plinium præstare pro *μαγν* legisse. Sed fallitur Plinius & in eo, quod Indiam eam ferre dicit, ut annotat Dalech. Hæc enim Lycij descriptio in Cappadocia, Lycia, Et ut ait, in Peho nascens. Indica spina Lycij, quam Lonchitum vocat Diosc. aliter ab eo describitur, ut paulo antè citatum. Idem Plinius & alibi tradit ex Rhamni sylvestris radice fieri medicamentum, quod vocetur Lycium: At hoc falsum esse & à nemine proditum, iam suo loco ostensum. Idem mox subdit: Lycium præstantius è spina fieri tradunt, quam & Pyxanthum Chironium vocant, quales in Indicis arboribus diximus, quoniam longè præstantissimum existimatur Indicum. Coquantur in æreo vase ferè per triduum, iterumque exempto ligno, donec mellis crassitudo fiat. Adulteratur amaris succis, etiam amurca & felle bubulo.


Spuma eius ac flos quidam oculorum medicamentis additur. Reliquo succo faciem purgat, & pforas sanat, cerosos angulos oculorum, veteresque fluxiones, aures purulentas, tonsillas, gingivas, tussim, sanguinis excretaiones, tabæ magnitudine devoratum. Aut si ex ulceribus fluat, illucum, rhagadas, genitalium ulcera, attritus, ulcerata recentia ac serpentina ac putrescentia [in naribus Dalecham.] vt & clavos, & suppurationes. Bibitur & à mulieribus in lacte contra præstuvia. Indici optimi [Diosc. non Indici] differentia, glebis extinsecus nigris, intus rufis, cum fregeris, citò nigrescentibus. Astringit vehementer cum amaritudine. Ad eadem omnia utile est, sed præcipuè ad genitalia. Hæc Plin.

Sed & Galenus audiendus: Lycion sive Pyxanthum arbor spinosa, ex qua Lycium, quod vocant conficitur, id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata utuntur, & sedis orique phlegmonas ulcerationesque tum herpetas, putredines, & ulcera contumacia, & aures putrescentes, & intertrigines ac paronychias. Est autem facultatis exicatoria, compositum ex diversigenis substantiis, quas *ερεζιν* Græci vocant: altera quidem tenuium partium digerente atque calida: altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest: digerit verò & desiccatur, non parum, nempe in secundo ordine; in calore autem mediis & symmetricis proximum est. Proinde ad varia hoc utuntur medicamine: ut abstergere

te quidem ad ea quæ pupillas obtenebrant, [ad putredines & Cacoethe ulcera] ut contrahente verò, Cæliacis, Dysentericis ac muliebri profluvio adhibentes. Lycium hoc in Lycia & Cappadocia plurimum provenit: alterum verò Indicum, ad omnia valentius est. Hæc Gal. qui idem l. 4. c. 4. *ερεζιν* de Lycio loquens: Non obsecrum esse puto, inquit, Indicum Lycium à me dici, non hoc quod apud nostros populos provenit.

Cornar. verò ut monebamus, quæ in Diosc. de Indico Lycio habentur, fieri ex frutice Lonchitide, penitus suppositum esse iudicat, & de Lonchitide herba illuc translaturum, de qua idem Diosc. l. 3. agit. Officinæ hodie nonnullæ Lycium habent, sed unde collectum, aut allatum, ignotum est ferè, inquit Cornar. etiam his qui materias medicas important, ut qui vix appellationum aliquam cognitionem habeant. Nasci autem & in Italia in Ligurum montibus Pyxanthum, unde Lycium rectè fiat, quidam tradunt, de quo mox. Quidè aromatis Indicis scripsit, narrat Lycium ab Indis vocari Cate: fieri è tamis arboris Hacchie, minutim concisis, elixis, coctis, cum farina Nachani succo mixto, & in pastillos tabellæque formato. Arborem verò Indici Lycij postea describemus ex Garcia. Lycium Indi vocant Græci quoniam Indicum nomen non satis noverrant, pro Cate principio quidem Acanthon nominarunt: Et quia in Lycia & Cappadocia ea arbuscula Buxi folio est, Pyxanthum appellarunt, teste Dale. arboris Indicæ figuram ignorantes, quæ Tamarisci folia habet, alias spinosissima, ut postea specialius patebit. Nunc Lycij differentias, quæ eo nomine hoc seculo innotuere tradamus, incipientes à Gallico:

## LYCIVM GALLICVM.



LYCIVM Gal. Descriptio. Lycium spinis rigidissimis horret Oxycanthæ Matth. similibus, circa quas flores parvi, multi simul, ex brevibus pediculis, quibus succedunt bacce, quæ maturæ sub pellicula continent semina oblonga, polita, striata, exiccata bicocceæ & trilocceæ apparent: baccis spinæ Burgundicæ sic satis similes, amaræ valde. Lugdunum adferuntur nomine Grani in insulis.

Graine à teindre. Folia ad Prunum sylv. nonnihil accedentia, tenuia, minora, in ambitu aliquantulum serrata, nervosa, decidua. In siccis nullum deprehendimus manifestum saporè. Nascitur in alpeis & saxosis circa Avenionem, & Carpentoracem. Hist. Lugd. Lycium Dalecham. describitur Spina Dalech. tres cubitos alta, cortice in cinereum pallescente, radicibus multis lignosis, aculeis foliosis, fructu Piperis magnitudine, nigro, adnexo brevi pediculo, nunc triangulo, nunc quadrangulo, nunc cordis

Aug. ant  
tenia.

Pyxanthum  
Chironium  
Plin.

Lycion.

Adulterat.

Pimerror.

Pyxanthum  
Chironium.

Vires.

Faciem

purgat.

Pfora.

Tussis.

Rhagades.

Genitalium

ulcera.

Attritus.

Clavos.

Delectum.

Temperat.

Lycium

Galenus.

Sugillata.

Herpetas.

Ulcerata.

Intertrigo.


Paronychia.

Temperat.

Cassia.



cordis figura, pro nucleorum numero : è cuius fastigio pilus duplex subtilissimus eminet, gustu adstringens & valde amaro. Baccis ad tingendum tinctum aureo colore infectores utuntur, easque vocant Tinctorium granum, *Graine à teindre*, aut Flavum granum, *Graine jaune*, aut Avenionense granum, *Graine d'Aignon*. Ex eo quod de Lycio Diof. prodidit nimirum *Exsiccatas reixas*; flavos reddere pilos, movit Dalechampium ut crederet, quod & multi asserunt, verum Lycium, quamvis hæc planta non sit, cuius succo in Offic. utimur, eisdem effectus tamen præstaturam, quos veteres suo Lycio tribuerunt. Eiusdem Dalech. figurâ ad plantam siccam facta, in qua contrahuntur folia. Baccæ etiam proculdubio erant siccæ, quæ ita angulosæ appictæ. Solum fuerat advehi Lycium ex Lycia, verum quid sit hodiè norunt perperci, inquit Adver. Est in Provincia Narbonæ plerisque locis arbuscula [Lycium siue Pyracantham Narbonensem vocant] Oleæ sylv. similis, Arbuti magnitudine, foliis Oleæ, sed brevioribus, rigidioribus, rotundioribus, minoribus, candidis foliorumque viridi, obscuro, saturiore, colore subfulvo, spinis crassissimis, rigidis, præduris. Baccæ sunt ut Phylireæ maioris, sed rotundiores, quam Oleæ, succo subrubro, Oleagineo, uti Phylireæ: qui amarus, ingratus, accensus cum strepitu quodam flagrat, extinetur rubet. Hanc, tametsi præ se undique refert Lycium, tamen non auderemus asserere eandem esse. Id tamen audemus dicere, vix maiori posse vsu parari commodo Lycium, quam istud nostrum: & posse longè propius, aptiusque subditi illi quam Amurcæ: habet namque vires digerendi quadam cum astringitione. Quod si non sit Lycium, fuerit sanè species Oleæ sylvest. cuius Amurcæ omnium præstantissima vice Lycij est. Valde putamus Matthiolum hic iconibus abuti, sed & Anguillare etiam & aliis doctioribus vera momentibus convictari. Considerent itaque periti an hæc conveniat cum Lycio à nobis descripto & depicto: an verò illa quam eisdem Adverf. Paliuri alterius peregrinæ nomine describunt his verbis: Quædam spinis horrida, foliis Oleæ minoribus, baccis nigris, tricoccis, Smilacis, gravidis, succo fulvo, tinctura apto, prægrandibus, Berberidis modo, granis ternis, sed minoribus, oblongis, gustu subacri, cuius hic picturam damus, non procul Montepelio, qua itur ad scaturiginem Lani amnis, secus ripam & propè viam multa. In qua sanè descriptione multa sunt, quæ cum nostra conveniunt, excepta comparatione illa foliorum cum Olea. Figura sanè quam ponunt adv. pro Paliuro 2. peregrino satis quadrat cum nostro Lycio, quamvis foliorum serratura non addit, granaque angulosa non apparent. Vix enim putamus virentia ita angulosa esse, ut sicca, nisi fallat memoria. In icon. Lob. p. 279. errore ut existimamus Typographi pro icone prædicta alba posita, nempe Pyracanthæ, quæ etiam posita p. 182. sub titulo Rhamni 3. Diofcor. Nec scimus cur ibi etiam ita vocetur, quum in Adverf. Pyracantha dicatur, nisi & is sit error Typographicus.



asserunt, sunt enim purpurascetes & ferè nigra: semina in baccis ad Berberi maccedunt, breviora tamen lucida, polita, colore subfulco, aut ex spadiceo in nigrum vergente, penè triangula, inter ea quædam sulcata: saporem amatum non deprehendimus, sed aliis ingratum: Quædam etiam baccæ apparent angulosæ: an verò virentes tales, sint nescimus: Po-

strema Matth. figura id non demonstrat. Fortè succo & carne humidior exsiccata, à granorum intus positorum situ & figura tales apparent, ut hinc dicat Anguil. ad Tithymali fructus accedere. Nihil tamen asserimus. Qui viderint plantam virentem, explicent. C. Bauh. apud Matth. putat esse Lycium 1. Cæsalp. & Brassavolz, cuius icon ex Matthioli. proposita falsa est, nec meretur nomen Lycij primi, tantum abest ut Brassavolz sit dicendum: ac multo etiam minus Cæsalpini, cuius Lycium suspicamur esse Pyracantham Lob. de quo diximus alibi. Idem C. Bauh. & Lycium 2. apponit sub alia figura quod & Italicum vocat.

Cæterum ut Galli suum, sic Itali suum quoque Lycium celebrant, atque adeò melius censent. Sic enim tradit Matth. Lycium medicamentum Officinarum adulteris non vacat: hoc avo ex Lycia ad nos non importatur: veruntamen & in Italia Lycij arbor nascitur: quandoquidem (ut Brassavolus testatur) in Liguria Alpibus frequens illa visitur. Eadem & in Dalmatia provenit, unde nuper eius ramuli baccis onusti mihi allati fuerunt: quippe (ut mihi retulerunt) via, qua ex Zaraitur Nonam, ubique virefcit. In com. cum magnis fig. Lat. & Ital. ait Licij plantam, cuius iconem dat, sibi missam à Baptista Balisto Dalmato Myropola: Sed revera plantam ipsam vivam à se nusquam visam. Cæterum quamvis censet vitiligator quidam, eam fictitiam potius, quam veram esse Licij plantam, se tamen, cum Lycij historiam omnib. ferè notis illam representare videat, eam ex commet. suis eruendam consultum non duxisse, quousque alius compareat, qui ex Lycia, vel Cappadocia veterè Lycij plantâ ad nos afferat. Haberi quoque aliam quandam plantam, quæ non parum Lycium æmuletur. Hanc primum Verona ad se missam à Fran. Calzolari, cuius & imaginem exhibet, ut de ea quoque aliorum sit iudicium. Lycium Atab. Haddadh, Hadad, Kilulem siue Felzakarag vocati. At pace Matthioli dixerimus, icon, quam fictitiam apponit[ ut is non negat, merebatur quæ ex commentariis suis erueretur cum aliis quamplurimis fictis: res docendæ, & vivis imaginibus representandæ, quantum in nobis est, non figmenta, non excogitata larvæ, ut ipse non parum sæpè fictitat. Lycium Italicum verum sit an non, nihil refert, modò talis exhibeatur, qualis est, & pro Italica. Qui Itali-

Securina;

C. Bauh.  
Lycium.

Lycium 2.

Lycij arbor;  
Locus.Alia Lycij  
similis.Arab.  
M. arch. sp.  
qui multas  
icones.

## LYCIUM ITALICUM.

ANNOS plures annos accepimus à D. Cor-  
tuso baccas similes baccis Lycij Gallici, cum  
inscriptione Lycij ex moræ Baldo: colore tamen

# HISTORIAE PLANTARVM

63

cam dicit, non Lycium vel Cappadocicam dicit. Cautius sanè Camer. immò & fidelius in sua epitome Matthioli illam omisit, Lyciumque Italici titulo alteram genuinam apposuit cum hoc lemma: Planta est aculeata, Pruni sylv. faciem referens, minoribus tamen foliis: flores mittit candidos, è quibus baccæ gignuntur, Ligastri ferè similes, sapore asæro atque astringenti, è quibus succus exprimitur.

Flora.

Verum Lycium hodie cognoscitur. Matth. ca. 168.

Sed Anguillaram Matthiolam castigantem audiamus. Verum, inquit, Lycium hodie non cognoscitur: planta quæ pro eo demonstratur non convenit. Effigies quæ missa Matthiolo Lycij provenientis in Nona non est vera: folia ei non sunt Buxi, quamvis parva, sunt enim tenuia, & potius similia Pruno sylv. Fructus non similes Pipert sed potius Tithymalo, non multi simul, sed rari, non amari: cortex non pallidus sed potius niger: spinosus quidem est. Eam plantam non convenire cum figura Matth. clarum erit iis qui iter suscipient versus Zaram & in Italiam per sylvam dictam Legnano propè Marano & Rivoli Veronensium & alia loca. Nullam etiam spinam invenio quæ conveniat cum Lycio secundo eiusdem. Hæc ille. Et sanè dubium non est, ficticiam esse, ut dicebamus. Miramur tamen Matthiolum faceri à se nusquam visam plantam, & missam imaginem à Baptista. Curigitur ei cum honorem denegavit reperta raræ plantæ? cur scripsit sibi alatos ramulos baccis onustos, si verum non erat? Mendacem oportet esse memorem. Aut cur illos non conferebat cū sua icone? Aut cur hic saltem morem sibi consuetum neglexit, accommodandi iconem ad descriptionem Diosc. Denique cur loco citato ex sola icone visa invenitur in sui similes, dicens: maximam tūm seplasiaciorum tūm etiam Medicorum incuriam ac negligentiam esse in iis exquirendis, quæ ad artem medicam spectant? Est sanè. At longè maior ac perniciosior est temeritas eorum, qui, quo dolo, quæve arte id possint, fatagunt fingere nova, applicare veteribus, ut ista soli invenisse, hæc non nescisse videantur, qui mos Matthiolo propemodum solemnis fuit, quod equidem dolemus. Sed veritas non tacenda, ut tandem studiosi, quos stipites ille putavit, & fore fortè prævidit, falli desinant, habeantque eius imitatores quem spectent, ac in hoc etiam si velint, admirentur: maximè quando advertent, eundem suum magistrum, tam vassè scivisse lectoribus suis scum facere in post. Com. Lat. & Ital. cum magnis figur. mutata priore illa sua icone ficticia, cuius folia planè Buxea ad Diosc. verba effinxerat, ut Buxum potius, quàm Lycium dixisset, si absconditæ fuissent spinæ. Et quoniam in Diosc. etiam legitur fructus *oxyris*, is ut egregius plantarum plastes, densè aggestas simul plurimas baccas affinxerat & appinxerat. At nunc aliorum monitu vel proprio pudore cautior, si non melior, factus, aliam excogitandam figuram censuit, non ut antè, ex Diosc. sed ex sui castigatori Anguillaræ verbis & monitu, folia pingi curavit minus *ovata*, rariora, tenuiora, atque uno verbo, minus Buxea: & fructus præterea triquetros: addens insuper ceu opus quoddam supererogationis, ac superpondij loco figuram secundam. Bellam sanè verò Palinodiam. Hic optafemus aliquis eius glossator aut patronus, si potuisset, defendisset, aut quod debuisset, hunc fucum ei exprobrasset, ne studiosi rei herbariæ bis vel toties deciperentur. Nos ex eodem Matth. proponimus iconem secundam, ut satis congruam, & ramulorum primæ falsissimæ. Itémque

Matth. m. 168. v. consuetudo graphicæ depergitur.

addi curavimus baccam Lycij montis Baldi.

Sed nec Dod. absque virgula censoria abeat: Is quippe, ut olim, ita in postremis suis ficticiam Matth. iconem proponit, auctis etiam cruncis & radice sibi nunquam visis. Lycium vocat simpliciter & *oxyris*, dicitque *oxyris* Theophr. id est, Buxum Asiaticum. At quis Oedipus hoc ei arcanum detexerit, ut tam liberè pronuntiaret, equidem nescimus. Possit tamen fortè esse, soli coniectura est, ex nominis afinitate & spinis. Spinofum enim *oxyris* facit Theophr. quantum huius & alio loco meminimus. Idem Dod. in post. sua hist. Lat. ad Anguillaræ aliorumque sententiam accedit, qui volunt Pyxantham: Matth. non esse legitimam.


Tab. modò Buchsodorn simpliciter, sicut & Lycium, ut in iconibus: modò Lycium italicum, Welschen Buchsodorn. Is duas postremas figuras Matth. habet. Lycium Alpinum exprimit prior Matth. icon apud Hist. Lugd. & Lycium italicum posterior eiusdem. Ita habes duas pro una.

Camer. Buchsodorn vocat: is unica figura contentus addit tamen quoddam velle esse Lycium.

Nascitur quoque eodem teste, copiosum in agro Tridentino, circa atem de Gresta saxosis locis. Provenit & in aliis quibusdam Italicis similibus locis. D. Cortusius nobis femina vel baccas misit cum foliis quibusdam, nomine Lycij montis Baldi: quæ satæ Montbelg. non proveniunt.

Vbi legitimum Lycium non sit ad manus, nihil prohibet, inquit Matth. quin hoc eius vice succedere valeat. Astringit, cohibet, roborat, siccit, & reprimat. Et succus è baccis à me extractus hæc omnia bellè præstat.

## LYCIUM CRETENSE, SIVE BERBERIS CRETICA.



Lycium Cretense baccæ differt à Lycio Gallici baccis: non enim sicæ monstrant angulos, nec etiam sunt amaræ. Differunt etiam à baccis quas a Cortusio ex Italia accepimus: sunt enim tales, quæ passuis Corinthiacas distas referant pellicula sua corrugata, argumento recentes succo repletas fuisse. Madefactæ chartam purpureo ac violaceo eleganti tingunt. In iis grana sunt minora, nec ita lucida, ut in Lycio Cortusiano. Folia quoque differunt à Lycio Gallico, sunt enim angustiora, oblonga, & circumscripti ovata, nec in longiusculum pediculum, ut illa, desinentia. De hoc ad nos scribit Cl. & peritiss. Cydoniz Cretæ medicus, Honorius Bellus: Mito femina Lycij *λειτουργία* vocati, cuius descriptionem aliàs Cl. Zuingero & Clus. dedi, sub his verbis: frutex est ad quatuor aut quinque cubitos assurgens, totus spinis horridus, spinæque tres simul (ut in Berberi vulgari cernuntur) referens: folia

habet



habet parva, ad buxi foliorum formam accedentia, leniter ferrata, flores copiosos, lateos, instar Paliuri, sed minores, quibus succedunt fructus aliquantulum longi, ut Berberis fructus: coloris autem nigri, saporis inter acidum & dulcem medij, in quibus vel unum vel duo granula continentur. Cortex ligni non lavis ut Berberis, sed asper & pallidus est: materies ligni lutea, atque radix ipsius elegantissimo luteo inficitur: oritur in altissimorum montium convallibus: defert autem à Berberi, cuius folia maiora sunt, & fructus racematum nascuntur. Legitimum vero Lycium non est, quia fructus neque rotundus ut piper, neque amarus est. Propterea potius vocanda est Berberis alpina aut montana, quam Lycium, quemadmodum Sylvester Thodeschini censet, qui hunc fructum frequentissimum in Libano monte etiam invenit.

Ceterum duo alia Lycij genera hic reperiuntur, quorum unum maxime historiae convenit, id etiam in Libano monte oritur, cuius cum ad maturum neque femina, neque rami sunt: ideo de ipso in praesentia verba non facio. Alterius vero ramus siccos simul cum eius fructu nondum maturo mitto: vocatur Petrea Amygdala, licet cum Amygdalis nihil commune habeat: frutex etiam duorum aut trium cubitorum altitudinem attingens, densus, folia parva firmaque ferens, spinis totus plenus est, & fructum rotundum ferme parvum ut piper habet, cum ad maturitatem pervenit, iugitatem radix lignosa est maxima, & aque simplicissima. Hebraei ex huius fructu elegantem luteum colorem parant.

An Rauvolf. lib. 2. c. 12. itin. de plantis Libani, Lycium incolis Zoroa. Item lib. 22. Lycium peregrinum fructus inter Rauvolfi & Toppe, cuius succus interdum reperitur in nostris Officinis: & cuius meminit Propheta David Psal. 53. sub nomine Hadhadi. Et sub finem lib. 4. figuram proponit sub titulo Lycij Dioscoridi, & Hadhadi Arabum, quam figuram & nos proponimus, non audemus tamen pro certo asserere Rauvolfi. Lycium esse Creticum. Non enim describitur Rauvolfi. nec Cretici partes omnes vidimus: appropinquamus tantum Cretici folium & granum.

## LYCIUM QVORVNDAM, FOLIO Myrti Tarentinae aut Buxi.

**F**rutex est spinosus, multas ab radice virgas proferens, cubitales, saepenumero ampliores, rectas, pulchras, tenues, rubentes, multis ramulis praeditas, qui in acutum spinam plerumque desinunt, tamen alios hinc inde sparsos aculeos habeant, breves interdum & infirmos: nonnumquam verò oblongos, firmos, & multis foliis obfitos, ut in Rhamno primo. Fel a nullo ordine digesta, Spini, sed multò breviora, Myrti Tarentinae aut Buxi quodammodo aemula, gustu lente & cum aliqua aciditate mordicant. Eius nec florem nec fructum videre cōtigit: nam Novemb. & primo duxat Vere, aliqua ex parte foliis viduatum hunc fructum inveni: inquit Clusius qui dubitat quoniam hic frutex referendus sit, atque tradit esse tamen nonnullos qui ad Lycium referri debere putent, Castellani *Tamulus* five *Tamulus* vocant. Hist. Lugd. tradit pinxisse Lob. Lycium Hispanicum quod Clusius descripsit. At nos figuram Lycij Hisp. Lob. non telerimus ad hanc plantam, sed ad Rhamnum, Clusius.

Apud Complutum, aliisque Castellae veteris locis, & Baeticae parte, quae vulgò Extremado-

rum vocantur circa fluentes & declivibus locis, quae hyeme abundante nascentem observavit Clusius. Idem Castellani s. Copium utum praebere: componunt etiam in sacculis pistorum fornacibus. Vitis calfaciendis idoneos.

## LYCIUM GARCIAE, SIVE CATE.

**A**rbore quatuordecim Cate extrahitur, autem Are Garcia, magnitudine est Fraxini, folio minuto Erica vel Tamarici simillimum, perpetuo virente: Florere aiunt, sed fructum ferre negant: multis spinis horret: materies ligni robusta, dura, densa, ponderosa, nec ut aiunt putredini obnoxia, sive solibus exponatur, sive aquis immergatur. Porro succi extrahendi haec est ratio. Ramos huius arboris minutim confectos elixant, deinde contundunt, postmodum cum farina Nactarii (semetis est nigra & minuta sapore, scilicet conficiendis panib. apta) & eiusdem nigri ligni quod istuc nascitur, scobe, interdum etiam sine eo) pastilli & tabellae formantur, quas in umbra siccant, ne Solis ardore earum facultas evaporet.

Cate in omnibus ferè locis Indiae, in Malacca Cate. Quod verò hoc nomen Cate aut paululum immutatum apud Arabes, Persas, reliquosque Asiae nationes obtinuerit: in causa esse puto, quod maxima pars illius in Malacca regno absumitur, ubi idem nomen obtinet. Incolae eius arborē *Hacchu* & *Lignum Sempervivum* nuncupant. Exiliat autem idem Garcias hoc Cate nihil aliud esse quam Gracorum & Latinorum Lycium. Propter vires n. & extrahendi modum, Indicum Lycium praefertur à Dioscorido Plinio & Galieno, ut verba antea protulimus. Vocatum est Lycium à Graecis, ut dicebamus, quoniam in Lycia primum inter Graecos eius usus repperitus sit, optimūque istuc nasci eo tempore centerent. Praefertur etiam Indicū ab Avicenna & Serapione, qui id *Hadhadi* appellant, uti dictum: Sed merito Garciae opinioni se opponit Clusius, quod Dioscorido Lycium flos Buxi habeat, & puilla ut ait. Itaque longè alia censenda est, quam ea quae à Garcia describitur. Tamen si non satis sibi consistere videatur Dioscoridi in Lycij descriptione, si modo postrema capitis de Lycio pars, Dioscoridis sit.

Ceterum de quo his agitur Lycium plurimum nascitur in Cambaya, tunc Gurra, praefertim Bagaim Manora & Daman, urbibus Lusitaniae Regi parentibus. Provenit etiam in continenti Goae, aliisque plurimis locis, sed non tam abundanter ut supra enumeratis, è quibus mercimoniis gratia exportatur magna quantitate in Chinarum regionem. In Arabiam verò, Persiam, & Corasone, medicamenti causa, & pauca quantitate. Magna autem copia in Chinarum regionem & Malacam deportatur, quoniam in masticatorum plurimis eius cum Betre est usus. Indi quippe ad gingivarum molliificationem & relaxationem medicamento ex Betre, Arca & Cate composito plurimum utuntur. Neque tantum optimum est medicamentum ad confirmandas gingivas & dissicandum & condungendum: verum etiam ad alvi praefertim curanda, oculorumque dolores tollendos, in quibus plerumque optimo cum succulsi gummi se esse testatur idem. Ex ligno eius, propter duriem & pondus, pistilla pignatur deglutanda. Oncae idoneae in mortariis ligneis, sex palmos in ambitu continenab.

Recentiores quidam & Periclymeni succo succedant eius parant. Sed si Lusitani pharmaceuti, copolae ac infiores in conquirendis legitimis medicamentis diligenter essent & huius & alia-

Dioscorido

Folium.

Fructus etc.

Vitis

Mastic.

Succus etc.

Vitis

Cate

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

Vitis

Lycium


Vitis

Lycium

Vitis

Lycium

rum desideratum copia classe regia in Lusitania, & inde in alias nationes deferri possit.

LYCIUM INDICVM ALPINO  
PVATVM.

*Lycium Indicum.*  
Locus.  
Descriptio

*Spina.*

*Folia.*

*Flores.*

*Fructus.*  
*Sapor.*

*Lycium Aegyptiacum.*  
*adulterum quale.*

*Non esse Lycium Sativum.*

*Vires & v. us.*

**H**ACTENUS

post tot, na-

tionum, tot auto-

tum, etiamque

nostram satagen-

tiam, nondum

constat, quod-

nam verum & le-

gitimum veterum

sit Lycium, singu-

lis suum, quod ad

illorum Lycij vi-

res quodammo-

do accederet, pro

eo obrudenti-

bus, tandem pro-

diit Alpinus, qui,

ut ille quondam

Philosophus, cum

suo *verum, verum*, a

se legitimum Ly-

cium, nventum ratus, in hac prorumpit verba:

Verum Lycium Indum tibi prodam: quem fruti-

cem longè ab Alexandria civitate supra ripas ra-

mi Nili Calig vocati, decem millia passuum in-

veni: quem incolæ *Vzeg* appellant. Est is frutex

multis ramis rectissimis, ab radicibus multis, du-

ris, lignosis, oblique descendentes, longitudi-

ne trium cubitorum & plùs observatis, sursum as-

urgens ramis: spinæ acutissimæ & longæ multæ-

que insunt, quarum quædam foliis vestitæ spe-

ctantur. Folia verò huiusce fruticis sunt Olivæ si-

milis, iis tamen candidiora & augustiora vel mi-

nus lata. Flores Agithalid planè similes habet,

quippe parvos albos, Hyacinthi orientalis

forma & magnitudine æmulos, à quibus fructus

nigri parvi producantur, Ebuli fructibus prorsus

similes, læves, gustu amari & astringentes.

Quamquam verò in Ægypto multa Lycij copia

circumferatur, tamen nescire se fatetur, an ex hoc

illud frutice conficiant, quando neque hanc plan-

tam copiosè ibi provenire noverit, neque sciat

illam esse notam. Siquidem Lycium ab illis usita-

tum falsum ac adulteratum esse arbitrat. Huc au-

tem succum, qui ex Arabia locis asportatur, du-

rum esse, exterius nigrum, & Acaciz succo valdè

similem. Fractum intus colorem Aloës præ se fer-

re, odore obscuro, non ingrato, sapore subdulci,

astringente, nullius amaritudinis participare: visco-

sum esse, digitisque contrèctatum adherere, un-

de colligit, haud esse verum Lycium, præser-

tim cum neque amaritudinem habeat, neque

igne succentum rubescentem edat spumam, ut

de vero Lycio traditur. Quapropter quod ante

Categoricè affirmarat, nunc dubitat, an sit

Lycium Indicum Dioscoridis, quod tamen &

in titulo fecerat. Sed nec experiri se potuisse

tradit succum, qui pro Lycio circumferatur. Æ-

gyptios inter calidum & frigidum medium con-

stituere, sed supra primum gradum sicum, sti-

pticum: proinde, inquit, in omnibus ulceribus

loto utuntur, præsertimque ad oris, aurium, narium, ani, intestinorumque ulcera. Vitis maximus est in Collyriis ad Ophthalmias accendas: mulieres enim paratum linimentum ex Lycio & antimonio habent, quo quotidie oculos liniunt, ut oculos defendant ab humorum fluxionibus. Eo etiam illi ad ventris fluxum utuntur, non inferturque ad Dysenteriam. Ad spiritum sanguinis eo maxima spe utuntur, & ad uteri profluviu cohibendum, eo pessimo modo intro misso, ad ulcera pudendorum præsertim ad caries, ad gingivas corrolas & ulceratas, nec non ad dentium commotionem. In Liehteris, dysenteris atque fluxu hepatico & Clysteribus iniiciunt & in liquore aliquo convenienti solum hauriunt. Nec dubium illius illitu quamcumque partem ab influxu humorum efficaciter defendi, unde & podagricos dolores retardare compertum est.

AGIAHALID ÆGYPTIVM FOLIO  
BVXI: AN LYCIUM?

**E**T huius *Agithalid* historia Alpino accepta ferenda. Arbor est, quæ in medio cuiusdam Eunuchi Tercæ viridario, quod parum ab æde Veneri Consulis distat ex Æthiopia asportata, magnitudine Pyri sylv. ramis raris non multis, in rectum æqualiter elatis, ordinatim acutissimis multis spinis obsita, folia ferens Buxi proxima, latiora tamen, pauca, rara, ungula, bina æqualibus interstitiis adnata. Flores habet paucos albos, Hyacinthi Orientalis floribus similes, sed minores, à quibus prodeunt fructus nigri Ebuli similes, gustu subamari & astringentes. Folia gustum acido sapore sentiunt, cum aliqua astringente. Huius arboris foliorum usum ad pueros vermibus vexatos, in Æthiopia audit esse familiarissimum. Dubitat verò an hæc possit esse Lycium Diosc. Sed hæc obstare videntur, quod Lycium Diosc. frutex potius sit quam arbor: præterea foliis densis describitur, non raris: nisi *ad unius folij densitatem referre voles*, quod possis. Nihilominus tamen adhuc dubitabitur. Nec intelligat quis facilè illa Alpini verba, quando folia dicit singula, bina æqualibus interstitiis adnata: nisi fortè error sit typographi, & legendum: bina singulis æqualibus interstitiis adnata, ut figura ostendit. Ita dubius abit nobiscum lector, nesciens adhuc, quodnam sit verum & legitimum Lycium veterum. Nos viam patefacimus inquirendi, conferendi, decernendi.

Certiora aliquando docebit posteritas.

HISTOR.





*Elymodry.*  
*Aegilops.*  
*Platyphyl-*  
*los.*  
*Phagus.*  
*Hali-*  
*phloeus.*

tè legendum ètymologice ut infra, Etymodryn.] vocant. Quod idem & in cæteris faciunt. At Idæi id has species dividunt: Hemerida, Aegilopa, Platyphyllon, Phagum, Haliphloeon, quam alij Euthyphloeon vocant. Græcè: *ἡμερίδα, αἰγίλοπα, πλατύφυλλον, φαγόν, ἡλιφλόων, ἡ εὐθύφλοων*. Omnia quidem fructifera sunt: sed dulcissima glans Phagi, uti dictum: proxima Hemeridis: deinde Platyphylli: quartò Haliphloei. Aegilops glans omnium amarissima. Distant etiam magnitudine, figura & colore glandium. Quin & folio, caudice,

*Hemeris.*

*Phagus.*

*Theoph.*  
*emend.*

*Aegilops.*

*Platyphyl-*  
*los.*

*Hali-*  
*phloeus.*

*Theoph.*  
*correct.*

*Callis.*  
*differentie*

*Callam-*  
*pra.*

*Theoph.*  
*emend.*

*Maccedon.*  
*dryo.*

*Elymodry.*  
*Platyphyl-*  
*los.*

*Phagus.*  
*Aspri.*

*Platyphyl-*  
*los.*

materie, totaque aded specie. Hemeris namque non erecta est, nec levis, nec exaltata, quippe quæ corpore in orbem comoso, contorto, ac hodoso, sinuoloque assurgat: cuius materies robusta quidem, sed infirmior quam Phagi. Hæc enim robustissima, & minimè putredini obnoxia. Sed nec ipsa erecta quamquam minis torta Hemeride [ *ἡμερίδα* ] Aldin. & Bas. Cod. Gaza legisse videtur. Quædam autem [ *ἡμερίδα* ] quem & nos secuti sumus. ] Caudice verò crassissimo constat, ut tota quoque ipsa curta maneat. Nam eius etiam planta in orbem comosissima, celsissima & lævissima, materie per longitudinem robustissima, nunquam in cultis, aut certe petarò nascens. Ab hac proxima Platyphylo proceritas, sed materie ad ædificia, dempta Haliphloei. Ad cremandum etiam & carbonem faciendum inutilis sicut & Haliphloei: ap post illam terebinibus carciæque maximè obnoxia. Haliphloeus verò crassissimo est & cortice & caudice, sed fungoso & cavo magna ex parte, ubi magnus evasit. [ *ἡμερίδα* ] Totus hic locus corruptus est in vulg. exemplarib. Sic legimus ex Plinio & reipsa: *ἡμερίδα* [ *ἡμερίδα* ] Quapropter ædificiis hæc minis apta habetur. Brevi quoque putrescit, quæ arboris eius natura est, vel à natura hoc ei accidit. [ *ἡμερίδα* ] Quidam legunt: *ἡμερίδα* [ *ἡμερίδα* ] Echinum arrectis foliis arbor horrida est. ] Ideo cava fit. Dicunt quidam hanc corde solum carere, & solum tangi, quamvis altitudine non excellat. Ideo Aeolum quidam, huius lignis minimè utuntur ad sacrificia. Ergo secundum ligna & totas formas hæ in eis differentie sunt. Gallas verò omnia genera ferunt Sed solius Hemeridis [ *Quercus*, *Gaza* ] utilis ad Coria. Aegilops verò & Platyphylli aspectu quidem similes sunt Hemeridis Gallis, sed læviores, & inutiles. Fert verò & aliam nigram, quæ lanx inficiuntur. Quod autem Sphagnon [ *σφαγνόν* ] legunt doctissimi, pro *σφαγνόν*: Gaza penem reddit. Plin. panos arentes, muscoso villo canos [ *σφαγνόν* ] quidam vocant, branchiis [ *βραγχίαις*, *βραγχίαις* alij], *σφαγνόν* alij ex Plin. id est, musco simile: sola Aegilops profert, canum muscosumque cibitali longitudine pendens ceu longum aliquod linteum. Nascitur id è cortice, non ex furculi capite, unde glans, nec è gemma, sed è latibus superiorum nodorum. At Haliphloeus id nigricans & brevis gignit. Sic itaque Idæi quæ genera distinxere.

At Macedones has differentias faciunt: Etymodryn [ *Veri quercum* *Gaza*, nimis licentiosè ] quæ dulces fert glandes: Platyphyllon, quæ amaras: Phagum quæ rotundas [ *σφαγνόν* ] Alpin [ *Gaza* ] Cerro interpretatur: At Plin. hoc de Haliphloeis [ *quam alij sterilem dicunt, alij verò ferunt* ] ferre aded inluavem, ut eo nullum animal vescatur, exceptis suis: ac ne has quidem, nisi alterius pabuli inopia, ac harum estu pleraque capius dolore vexant. Materia quoque Platyphyl-

li [ hæc enim vox subaudienda videtur ex præcedentibus: nec repugnant Scal. Conf. & Dalech. ] improba, & dolabrata quidem proflus inutilis: rampit enim & labat. Non dolata verò melior, ob id rudi tantum utuntur. Improba etiam ad cremandum & ad carbonem faciendum: quippe cuius carbo omnino inutilis, exillit enim & scintillat: arariorum tantum officinis compendios. Nam cum cessante flatu protinus extinguitur, parum absumitur. Has igitur species differentias constituunt cum Idæi, tum Macedones apud Theoph.

Plinius etiam speciatius differentias ex hoc loco declarat, & explicatius etiam tem absoluit. Genera inquit, Glandium multa. Distant fructu, situ, sexu, sapore. Namque alia Fagæ glandis figura, alia Quernæ, & alia Illigæ: atque inter se quoque generum singulorum differentie. Præterea sunt aliquæ sylvestres, alia placidiores, quæ culta obtinent. Iam etiam in montosis planisque distant: sicut & sexu mares & feminae. Item sapore. Dulcissima omnium Fagi. Genera distinguere non datur nominibus, quæ sunt alia alibi. Quippe cum Robur Quercumque vulgò nasci videamus, Esculum non ubique. Quartam verò generis eisdem, quæ Cerrus vocatur, ne Italæ quidem maiore ex parte notam esse. Distinguemus ergo proprietate naturæque, & ubi res coget, etiam Græcis nominibus.

Glandem quæ propriè intelligitur, ferunt Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Illex, Suber. [ *omittit hic Haliphloeon, quam postea memorat.* ] Continentur hispido Calyce, per genera plus minus eutem completente. Folia præter illicem gerunt, carnosa, procerà, sinuosa lateribus, nec dum cadunt flavescencia, ut Fagi, pro differentia generum breviora vel longiora. Glans optima in Quercu atque grandissima, mox Esculo: nam Roboris parva: Cerro tristis, horrida, echinata calice, ceu castanæ. [ *Theoph.* dulcissimam in Phago atque grandissimam, mox Hemeridi: Platyphylo parvam, Cerro amarissimam dixerat. ] Sed in Querna alia dulcior molliorque semina: matris spissior. Maximè autem probantur Latifolia [ *Phagi Theoph.* ] ex argumento dictarum. Distant autem inter se magnitudine, & cutis tenuitate. Item quod aliis subest tunica rubigine scabra, aliis protinus candidum corpus. Probatum & ea, cuius in balano utrinque ex longitudine extrema [ *longitudinis extremo.* Th. ] lapidescit duritia. [ *Id accedere glandi maris Phagi & Haliphloei, tradit Theoph.* nunc in cute, nunc in carne: sed glandem non commendare. ] Melior, cui in cortice, quam cui in corpore, utrumque non nisi mariti. Præterea aliis ovata, aliis rotunda, aliis acutiore figura. Sicut & color nigrior, candidiorque, qui præfertur. Amaritudo in extremitatibus, media dulces. Quin & pediculi brevitates proceritatesque differentiam habet. In ipsis verò arboribus, quæ maximam fert, Hemeris vocatur, brevior, & in orbem comosa, & aliquæ ramorum crebris cavata. Fortius lignum Quercus habet & incorruptius: ramosa & ipsa, procerior tamen & crassior caudice. Excelissima autem Aegilops, incultis amica. Ab hac proxima Latifolia proceritas, sed minis utilis ædificiis: atque carbone dotata [ *ædificiis atque carboni: dolata &c.* ex Theoph. quamvis hic de Cerro & Alpi Macedonum id tradat. ] vitis obnoxia est. Quamobrem solida utuntur carboni, arariorum tantum officinis compendios: quoniam desinente flatu, protinus emoriens, fapit recoquitur: ceterò plurimis scintillis. Idem è novellis



novellis melior. Acervi confertis taleis recentibus luto caminatur, accensaque stirpe contis punctis durescens Calyx. [Corium seu tegumentum luto sa crusta, Dalec. Hoc fieri Theoph. vult, ut excitata flamma omnia corripiat.] atque ita sudorem emittit. Pessima & Carboni & materiaz Haliphleos dicta, cui crassissimus cortex atque caudex, & plerumque cavus fungosusque. Nec alia putrefcit ex hoc genere, etiam cum vivit. Quin & quamvis altitudine non excellat: fulmine lapissimè igitur, hinc Virgil. Eclog. i. cecinit:

De caelo tactas memini prædicere Quercus.

Ideòq; ligno eius nec ad sacrificia uti fas Eidè raro glans, & cum tulit, aptata, quam præter fues [de Cerri glande hoc Theoph.] nullum attingat animal, ac ne ex quidem, si aliud pabulum habeant. Hoc quoque inter reliqua neglectæ religionis est, quod emortuo carbone sacrificatur. Glans Fagea sive hilarem facit, carnem coctibilem ac levem & utilem stomacho. Ligna suam angustiam, compacta & immixta laxa, ut in nudam, fungosam, ponderosam: Quercus l. flum. & p. v. l. nam. & ipsa glandum aquè dulcissima [ & ipsarum glandum quæ est dulcissima Dale. nempe Fagi Græcorum. ] Proximam huic Ceream tradit Nigidius, [contra iudicium hoc Theophrasti.] nec ex alia fordidiorem carnem, sed duram. Ligna tentari fues, non p. u. u. m. detur. Hæc non h. m. a. m. e. de. Fungosam carnem fieri E. Culo. Robore, Subere. Quæ glandem ferunt, omnes & Gallam, alternèque annis glandem. Hæc Plinius ferè de Quercum vel potius Glandiferarum arborum differentiis, qui d. l. p. q. u. o. r. Suber dixisse videtur, ubi Suber glandem ferre dixit.

Idem quoque & antè eum M. Varro, in Thuri agro, ubi Sybaris fuit, Quercum memorat, quæ ex ipsa urbe perspiciebatur, nunquam folia dimittens, nec ante mediam ætatem perminans.

Idque mirum esse, addit Plin. Gæ. i. s. autoribus prodictum, apud nos postea silèti. Nos id apud nullum Græcum autorem præterquam apud Theoph. hæc tenemus legimus. Sed & hodie observata sunt quas postea dicemus. Meretur & illud relationem, quod de Quercibus miræ magnitudinis idem refert Plin. his verbis. Aliud è sylvis miraculum: totam reliquam præter eam quæ proximè Oceano adiacet, Germaniam replent, adduntq; frigori umbras altissimæ tamen haud procul Cauchis, circa duos præcipuè lacus. Littora ipsa obtinent Quercus, maxime aviditate nascendi: suffosæque fluctibus, aut propulsæ flatibus, vastas complexu radicum insulas secum auferunt: atque ita librata stantes navigant ingentium ramorum armamentis, sæpe territis clausibus nostros, cum velut in disticta fluctibus agerentur in prorsus stantium noctu, inopèsq; remedijs illæ præliū navale adversus arbores iniierit.

Quædam etiam Quercuum genera negavit Theophr. fructum ferre: nos sanè, addit Scal. aliquot pumila Roborilla sterilia novimus, si glans exigatur. At Gallam ex iis legimus grandem oppidò.

Sed iam reliqua quæ naturam d. p. u. e. in genere declarant ex citatis arboribus colligamus. Theophrasti, ergo, quæ folio constant deciduo, communium nomine d. p. u. e. [quod sive Quercum sive Robur veras, per nos hæc] vocat, cuius modò genera diximus. Reliquarum autem glandiferarum, quæ perpetuò virent, numerantur ab eodem Theoph. species quinque: scilicet Ilex, Smilax, Phellodrys apud Arcades vocata: Suber,

Aquifolia, de quibus infra, suis locis tradetur.

Porro d. p. u. e. robustissima est, ac difficulter moritur: materies quoque eius spissa, dura, ideòque flexum nullum recipit, tam navibus quam domibus commoda, nec non & in terra obruta durat, Cortex d. p. u. e. Crassus, Scaber & rimosus, ex humore carne & nervis constans in senecta quoque rugosior: Medulla quoque eius [quæ] spissa, quam Melandrium vocant [atrum reddit Gaza] Quidam d. p. u. e. florere existimant: alij minime, sed d. p. u. e. d. p. u. e. Iulium Quercinum. [muscum Roboris. Gaza. Melius fortè dixeris Bryon Fier.

Quercinum reservato nomine Græco, cum id genus floris proprium sit t. i. s. d. p. u. e. autore ipso Theophrasti. l. i. histor. cap. 3.] Proprium d. p. u. e. Galla: ac omnium copiosissimè præter fructum, & alia gignit: ut gallam parvulam, & aliam resinosam, & nigram: ferunt & quid Moris specie simile [sive] d. p. u. e. sed durum & fractu contumax. Hoc verò rarum est. Quidam etiam initio colis aut pudendi virilis effigie, cum perficitur durum parte protuberante & perforatum. Fert & aliquid Tauri caput imitans, quod effratum, nucleum intus ostendit Olivari similem.

Nascitur in iis & quod p. u. o. r. vocat, hoc est, pillulas lanatas, vel coactos lanæ flocculos, molles, sed nucleo duriore, quibus in lucernarum luminibus utuntur. Etenim probè flagrant, sicut galla nigra. Item & aliz quædam pilulæ cum capillo, sed inutiles, verno tamen tempore melleo succo insipientes tam tactum quam gustum. Aliæ præterea interiùs ad alarum pronos recessus enascuntur Pilulæ sine pediculo, intus cavæ, versicolores, eminentibus umbilicis candicantibus, aliquando maculosis, interdum nigris, quibus media cocci colore splendant: quibusque appetis nigra & putris inanitas conspicitur. Gignunt & Quercus, quanquam rarè, lapidosum quid, sed magna ex parte pumicem referens. Et his adhuc rariùs è foliis convolutas compactasq; Pilulas oblongas.

Præterea in foliorum tergo Pilulas albicantes, pellucidas, aquosas dum molles sunt, in quibus pilula s. f. & m. u. l. e. [p. u. o. r.] nascitur: quæ adultioris factæ in parvam ac lævem veluti gallam indureunt. Sed & fungi è radicibus & iuxta radices erumpunt, quos tamen communes habent cum cæteris arboribus quemadmodum & viscum.

Viscum, quod in aliis quoque provenit. Ita d. p. u. e. vides multiferam esse hanc arborem. Quod si etiam, ut prodidit Hesiodus, mella apesque ferat, etiam magis illud confirmabitur. Nascitur verò hic melleus liquor ex aëre descendens, [sive] d. p. u. e. p. o. l. l. i. s. & dicere de caelo cum Plinio & Gaza.] & huic maxime incumbit. Quin & ex cremata Quercu nitrum fieri aiunt: Hæc igitur t. i. s. d. p. u. e. propria sunt: Dixerat autem iam paulò ante d. p. u. e. quoque in quercu nasci, sicut & in aliis arboribus.

Cæterum eadem ferè & Plin. sed paulò aliter addens quoque alia: Robur præter fructum, plurima & alia gignit. Namque fert & gallæ utrumque genus [album & nigrum Theophr.] & quædam veluti Mora, ni distarent arida duritie, plerumque tauri caput imitantia, quibus fructus inest nucleis Olivæ similis. Nascuntur in eo & cæci habent: Pilulæ, Nucibus non absimiles, intus habentes floccos molles, lucernarum luminibus aptos. Nam & sine Oleo flagrant, [Nam sanè in Oleo, & d. Dal.] sicuti galla nigra. Fert & aliam inutilem pilulam cum capillo, verno tamen tempore melligeni succi. Gignunt & alæ ramorum e.

Materiei

Cortex

Melandrii

Fier.

Quanam

ferat

d. p. u. e. seu

Quercus

in genere.

Mora sive

quid.

Causa.

Nucleus

Tauri ca.

p. u. o. r. i. s.

Pilula la.

nata.

Pilula Pi.

loja.

Pilula ca.

ca.

pumicosum

quid.

Pilula s. f.

& m. u. l. e.

Pilula ca.

d. i. d. a.

Culicis.

Fungi.

viscum.

Med. & p.

fer.

Nitrum.

Cathrys

Plinio Ro.

bur.

Mora.

Pilula s. f.

& cæci habent.

ca.

F 3

ius pilulas, corpore, non pediculo adherentes, candicantes umbilicis. Cætera nigra varietate dispersa. Media cocci colorem habent. Apertis amara inasit est. Aliquando & pumices gignit: nec non è foliis convolutas pilulas: & in folio rubente aquosos nucleos candicantes & translucentes, quandiu molles sint in quibus & eulices nascuntur: maturescunt in modum gallæ. Ferunt Robora & Cachryn: ita vocatur pilula in medicina urendi vim habens. Gignitur & in Abiete, Larice, Picca, Tilia, Nuce, Platano, postquam folia cecidere, hyeme durans [Cachrys foliorum conceptu, è medio germinis globo prominens, tanquam parturiente folium natura, qui in folia post explicatur: Convoluta è foliis pilula lules, in Iuglande & in Avellana racematim compactus callus, floris vicarius: Cyttarus in Coniferis gradatim, (quamofumq; nucamentum, rudimentu fructus, Bryō in quercu, racemosi villi quilofo floris sunt. Hæc diligenter distinguenda. *Kachrys* pro Libanotis semine quidam scribunt. Roboris verò & arborum citataru Cachryn ineptè confundit Plin. cum Rosmarini pilula acri & arente, quæ etiam Cachrys dicitur, ut & medulla seminis Crethmi. Hæc Dalech. ] Continet nucleum Pineis similem. Is crescit hyeme, aperitur vere pilula tota. Cadit, cum folia cæperint crescere. [Hic rursus dormitasse videtur Plin. Nam de Iulis Avellanarum hoc Theoph. esse auci Pineæ similes, crescere hyeme, aperiri verè totos, &c.] Tam multifera sunt, & tot res præter glandem pariunt Robora. Sed & Boletos Suiolique, gulæ novissima irritamenta, quæ circa radices gignantur: Quercus probatissimos: Robur autem & Capressus & Pinus noxios. Robora ferunt & Viscum, & mella, ut autor est Hesiodus. Constâtque rotes melleos è cælo cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Cremati quoque Roboris cinerem nitrosum esse certum est. Omnes tamen has eius dotes, illex, solo provocat Cocco. Galliarum glandifera maxime arbores Agaricum ferunt. [Immo potius in Laricibus nascitur, sub quibus de eo trademus in libro Resiniferarum & Coniferarum.] E glandiferis sola quæ vocatur *Yani Aegylops*, fert Panos arentes, muscoso villo canos, non in cortice modo, verum & è ramis dependentes, [è cortice nascentes, non è furculorum cacumine, unde glans: nec è gemma, sed è latere superiorum nodorum. Theoph. ] cubitali magnitudine, odoratos, ut diximus inter unguenta. Suberi minipa arbor [non minima Dal.] glans pessima, rara, cortex tantum in fructu præcrassus ac renascens, atque etiam in denos pedes undique explanatus est.

Haecenus Plin. de iis quæ Quercui seu Robori innascuntur. Addamus & reliqua quæ ad eorum doctrinam generalem pertinere videbuntur. Omnes arbores, ut creditur, inquit Theoph. cortice detracto intereunt, sed aliquæ plus temporis perdurant, ut *Spis*. Idæi *Spis* radices non tam profundè descendere volunt, ac Abietis, sed multo plures habere, & latius diffundi. Quercus, autore Plin. & Olea tam pertinaci odio disident, ut altera in alterius scrobe depaſſæ moriantur. Quercus verò & iuxta nucem Iuglandem. Robori radices copiosæ, carnosæ, quas in profundum agit. Sî Virgilio credimus, Esculus, quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Maxima spatio atque plenitudine & Citri [Cedri vet.] est. Ab ea Platani, Roboris & Glandiferarum. Falsum arbitror quod aliqui prodidère, radices arborum vetustate minui, vila etenim est annola

Quercus eversa vi tempestatis; & ingertum soli amplexa. Robori materies ossæ, cariem vetustatemque tardissimè sentit. Diuturnior materies Roboris defossi, & in aquis Quercus obruta. Eadem supra terram nimosa facit opera, torquendo sese. Robur marina aqua corrumpitur. Fagus & Cerrus defossæ celeriter marcescunt. Esculus quoque humoris impatiens. Incurvatur & Robur, ceditque ponderi. Idem infociabile glutinò & secum & cum aliis. Securibus pertinaciùs resistit tam aridum quam viride, ferrarumque dentes replet, sicut & Buxus, æqualitate inertis: qua de causa alterna inclinatione egerunt scobem. Ex reliquis sicissîma Lotos, quæ Romæ ita appellatur, deinde Robur exalburnatū & huic nigricans color, [Roboris exalburnati nigram medullam antea diximus ex Theoph. *μυλὰ δ' ὄνει* vocat.] magis etiam Cytisò. De cætero plerisque eorum, sed utique Robori tanta duritia est, ut terebrari nisi madefactum non queat, & ne sic quidem adactus avelli clavus. Suberis materies mollis, in aqua non fluitat si dematur cortex.

Sed, quod maxime honorificum sit Quercui, Plinius ipsam etiam Italiam, Provinciarum totius Mundi sine æmula nobilissimam & pulcherrimam, & ut ille ait, omnium terrarum alumnam, eandem & parentem, numine Dedm electam, quæ cælum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia, titulusque molliret, & tot populorum discordes feræque linguas, sermonis commercio contraheret ad colloquia, & humanitatem homini daret; breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret &c. hanc inquam folio maxime Querno assimilare voluit, multo proceritate ampliorè, quam laticudine. Sed idè & stillicidia Quercus ponderosissima dicit. An quia pondus ab ipsa Quercu acquirunt? & an à foliis, vel à ligno? Ab hoc possint aliquid: ab istis, vix putamus. Sed ita putamus: cum Quercus folia sint sinuosa, & interdum veluti carinata, idè plus aque sustinere: inde guttas, maiores, idèoque graviores. Quod si cui subeat aliam excogitare rationem, possit.

Sed nunc paucis quid & Diosc. de Quercu, *μει* *Ἀπὸ*, in genere habeat, videamus. Is unica *Spis* voce Diosc. (ne quis fortè eum existimet prædictas species non novisse, ad vires potius quam historias respiciens.) & nostro & aliorum doctissimorum iudicio, comprehendisse in universum omnes glandiferas arbores, non solum quod sciret, una voce omnia illa genera contineri posse, sed etiam, ut brevitati consuleret. Idè dixit: *Ἀπὸ* *μὲν* *στρωτὶνὸν* *ἔχει* *δ' ὄνει*, &c. Similitèrque tunica quæ circum glandem est calyci subiecta. Sed Iligneas glandes, Quernis. [ *Spis* *Spis* dicit, non *Spis* *Spis*: diversarum specierum intelligens. ] At tamen gallam idem non *Spis* *Spis*, sed *Spis* *Spis* fructum dicit, nihilominus sub hac voce diversas species comprehendens. Mirum verò ab eo potius fructum dici Quercus, quod tamen de glandibus adèdè expresse non dixerat. Nempe si non verè fructus est Galla, habet tamen fructus speciem, quamvis revera excrementum sit, ut & reliqua suprascripta, quæ nullus flos præcedit, sicut fructum præcedere solet, in iis quæ florent. Sed notandum quod idem Dioscorides ait Chamædæyn folia habere parva forma & divisa similia Dryi: quod & Plin. dixit: Item Betonicam inquit Diosc. folia ferre longa, similia Dryi, in circuitu dissecta: denique Syderitidis primæ folia esse longiuscula ad formam *Spis*. Sed longè diligentiori observatione dignum, quando idem cap. de Cocco



ait, *ἐν τῷ δρυϊ*, in quercubus provenire Coccum, quamvis ibi An. qu. *ἐν τῷ πεύκῳ* legi velit ex Theoph. hoc est, in Illice. De qua re plura in Illice, ubi de Cocco tradetur. Illud obiter notabis, & veluti superpondij loco: etiam veterem Dioscor. lectionem ferri posse, sed ea lege ac omine, ut, sicut dicebamus, *δρυς* nomine glandiferæ arbores omnes comprehendantur, inter quas & Illicem referri nemo negaverit. Interpretes tamen quercus nomen retinuerunt.

Hip. in lib. de affect. *βαλάνη* voce, *ἀντὶ δρυός* usus est, ubi ad inflammata *βαλάνη φύλλα* id est, quercus folia imponere iubet. Quercum Plutarchus inter arbores sylvestres fructu bellissimam & fertilissimam ait. Eo enim & feræ & alices pascuntur. Nempe etiam M. Cato inter ea, quæ ad bonum opumumque agrum spectant, sylvam glandariam annumeravit. Inter mitigatas validissima. Omnium verò prima nata dicitur. Vnde Arcadium cum hac, cognitio quædam, quod omnium primi ex terra homines fuisse perhibeantur. Socrates autem in Deorum contumeliam, qui sua tempestate colerentur, per quercum, ut ait Tertulianus, deiebat, hac ratione, ut ipse arbitrat, quod Deum unum, qui Mundum cælumque regeret, esse existimaret, qui antè foret, quàm quercus crearetur & nasceretur. At qui Athenis & in Græcia colerentur, longè post quercum, & ferè à sua memoria natos, nec dignos ut pro Deo colerentur, quare ob violatas illorum ceremonias ultimo supplicio à suis condemnantur.

Hesiodus autem Deos dicebat, iussit hoc concedere, ut in illorum quercuum ramis altioribus glandes nascerentur, in medio verò apes habitarent. Idem Plutarchus in vita Martij Coriolani ait coronam quernam servati civis esse præmium, quod Iovi, in cuius tutela sunt civitates, sacra sit quercus. Quamvis alij, ut Plin. Esculum Iovi sacrum dixerint. Iovis autem signum altissima quercus erat. Hinc quercum sacram ferunt, quod vitæ causa, in hac primum arbore, mortalibus fuerit, qui primum glandibus vescerentur. Ovidius.

*Et quæ deciderant parula Iovis arbore glandes.* Huius enim fructu suos populos primum aluisse dicitur. quare Iovis arbor dicta. Vnde adagium: *πολλὴν πατηνύρεον Διὸς βάλανος ἔφαγεν*. Id est, multorum festorum Iovis glandes comedit. quamvis per *Διὸς βάλανον* & Castaneam intelligant. Dicitur autem de sene multarum rerum usu docto & experto.

Civica autem dicitur quercus, quoniam antiquitus querna corona donabatur ei, qui civem servasset, de qua nominem melius differentem audias quàm ipsum Plinium: Glandiferi maximè gentis honos apud Romanos perpetuus. Hinc civica coronæ, militum virtutis insigne clarissimum iam pridem verò & clementia Imperatorum, postquàm civilium bellorum profano [prophanatio M. profanatione. Vet.] meritum cœpit videri civem non occidere. Cedunt his Murales Vallaræque aures, [ita enim legimus ex Gellio.] quanquam pretio antecedentes. Cedunt & Roftræ, quamvis in duobus maximè ad hoc ævi celebres: M. Varone è piraticis bellis, dante Magno Pompeio: itémque M. Agrippa, tribuente Cæsare è Siculis, quæ & ipsa piratica fuere. Civica ligna primò fuit, postea magis placuit ex Esculo, Iovi sacra. Variatūque & cum quercu est, ac data ubique, quæ fuerat, custodito tantum honore glandis. Additæ leges arctæ, & idèd [coronæ] imperibz, quâque conferre libeat cum illa Græco-

rum summa [ex Oleastro in Olympicis, ut suo dictum loco.] quæ sub ipso Iove datur, cuique muros patria gaudens rumpit: Civem servare, hostem occidere: Vtque eum locum, in quo sit actum, hostis obtineat eo die: utque servatus fateatur: aliàs testes nil profunt: ut civis fuerit. Auxilia, quamvis rege servato, decus id non dant: Nec crescit honos idem Imperatore servato, quoniam conditores in quocunque cive [civem M. & CH] summum esse voluere. Accepta licet uti perpetuò. Ludos ineunti semper assurgi etiam ab Senatu, in more est. Sedendi ius in proximo Senatui. Vacatio munerum omnium ipsi patrique & avo paterno. quatuordecim eas accepit Sicinius Dentatus: [qui propter fortitudinem Achilles Romanus dictus.] Iex Capitolinus. Is quidem & de duce Servilio. Africanus de patre accipere voluit apud Trebiam. O mores æternos qui tanta opera honore solo donaverint, & cum reliquas coronas commendarent, saltem civis in pretio esse noluerint: [clare professi, ne servari quidem hominem fas esse lucris causa] servari quidem hominem, nefas esse lucris causa. Hæc Plin.

At Plutarchus ex quercu dari solitam Civicam narrat, quod in expeditionibus glandiferi generis hancadinvenire facile sit, vel, quod Iovi & Iunoni sacra, qui urbibus præsidere dicuntur. Corona querna, & draconum voluminibus olim Triviz Dianæ *τῆς εἰσόδου*, sive *πρυτανίδος*, quam eandem esse cum Hecate putabant imaginem, coronare mos fuit. Sophocles in Rhizotomis apud interpretem Apollonij.

*ἵππε δ' ἀποπνέχ' ὑπὲρ ἱερῶν  
τῆς εἰσόδου ἡδ' ἑστῆς πύργου  
τὸ δ' ἐλπίδα πολλὴν περὶ πόρε  
ἔχ' ἵππε νῆες ἱερὰς περὶ πόρε  
σερῶσιν ἰδὲ δρυὶν ἑστῆς  
διῶν σπινθὴς δ' ἀποπνέχ'.*

Hanc Coronam ut inferis diis, sic etiam Parcis imponabant. Catullus,

*Hu corpus tremulum complexens undique Quercus  
Candida purpureis ramis induxerat ora.*

Purpureis, *τοῖς ἐρυθροῖς*. Scalig. P. Decius Mus, tribunus militum in bello Samnitico ea donatus, testibus Corn. Nepote & Plin. secundo de vitis illustrib. M. Antonino Philosopho, & L. Aurelio Vero quoque fratribus oblata. Aurelianus Princeps bis ea donatus. Probus in bello Sarmatico semel, & Valerianus. Cæsar autore Suetonio, à T. Thermo in expugnatione Mitylenarum illa donatus. Coriolanus, ut narrat Plutarch. à Dictatore Civica donatus, propter civem in prælio, quod Latini post exactum Tarquinium cum Romanis fecere, servatum. Scipio Africanus, consulem patrem apud Ticinum amnem, adversis auspiciis cum Hannibale præliantem faucium, intercessu suo, servavit. Quamobrem duabus coronis donatus, scilicet ut duplici corona conspicuus foret, quod & patrem & consulem servasset. Lege Val. Max. Rufus Helvius, miles gregarius, ob servatum civem in bello, quod Tacfarina in Africa, contra Romanos gessit, à Cæsare Civica donatus. Cicero, propter servatam contra L. Catilinæ, & ceterorum coniurationem urbem, L. Gellius, vir præclarissimus à Repub. dandam Civicam coronam arbitrat, ut ille de seipso testatur. Habes exempla eorum: qui Querna, hoc est Civica corona redimiti fuere, ob servatum civem. Sed quid vetustis exemplis inhaeremus? Hoc nostro seculo cum dirus ille Mars, & fatalis Orci filia feritas, in totam Galliam ac civem Genevensem grassata, Ios-

*Ist Quercus Medici sum. cui corona donatur.*

Quercetani Medici excellētis & Regij, ac optimē de patria & concivibus suis meriti, ob editum & se Sclopetarium, hoc est, librum de curandis vulneribus, quæ Sclopetorum & similium tormentorum ictibus acciderunt. Fr. Hotomani, eternæ famæ Iurif. Gallicus ille Cato, & Acad. Basil. lumen præclarum, eidem Quercetano nomine, felici omine, Coronam Quercnam, *ON CIVIS SERVATOS*, publico illo opere extare dicarēque voluit, hoc adiuncto argumento:

*Ob conservatos insigni hoc munere civis*

*Conferuntur doctus Atheniensium.*

*Quercetane tibi Querna corona datur.*  
Fuit & consuetudo vetus situ dignissima. Mos erat Atheniensibus, ut puer quispiam in nuptiis induceretur undique spicis frondibus, & quercus glandibus opertus coronatūque Cunas panibus impletas gestaret.

*Quercus civilis.*

Virg. quoque Quercum civilem dixit: Aeneid. 7.

*At qui umbrata gerunt civilis tempora Quercu.*

Lælius Querna corona redimitum celebrat

Lucanus.

*Lælius emeriti gerens insignia doni,*

*Servati civis referentem præmia Quercum.*

*Obsidionalis dicitur à civica.*

Audi Valerium Max. Cæterum ad Quercum pronæ manus porrigantur, tibi ob cives servatos corona danda est. Argumenti sanè proportio hinc eximio Medico indices suos cives arte sua servanti, & ab orco revocanti competere, atque ad id verè tali conferri debere, iubet. Nec absolum fuerit dixisse, inter civicam & obsidionalē coronas hoc interesse, quod hæc singularis salutis sit, illa diversorum civium servatorum publicam quoddam præmium. Sed de hac re satis.

*Prienensis Quercus.*

Iuxta Priensem Ionæ urbem Quercus fuit, apud quam Samij & Prienses bellum gerentes, mutuis se damnis afflixere, magnæque prælio inter eos commisso, Samios mille Prienses occiderunt. At septimo post anno ibi cum Milesiis congressi, optimos quoque urbis cives ac primos uno prælio amiserunt, ut post eam calamitatem mos Priensibus mulieribus fuerit, ut cum de maximis rebus ageretur, cum miserabili precatione iureiurando testarentur: Apud Quercum funebrem: quod eo in loco & patres & viros ac filios, amississent. Hæc Plutarch. in Probl. Abfalon Davidi patri rebellis & insidians (ut sacra nos docent pagina, cum mulo insidens aufugeret, & sub Quercu densa petransiret, obvolutis ramis illius crinibus, pendit, & à Ioabo tribus lanceis transfixus. Extat & Adagiū, *τὸ ἐπὶ δέντρῳ αὐτῆς*, id est, per tenebras quæ apud Quercum: De ingenti & fatali calamitate dicitur. Sed satis digressum.

*Quercus funebris.*

*Abfalon in Quercu pendens transfixus, adag.*

Restaret ut ipsas Quercum differentias proponeremus, ni diversorum autorum recentiorum diversæ sententiæ nos remorarentur, in assignandis suis, & reducendis explicandisque præcorum *τῆς* *speciei* differentis, quos consuluisse & audivisse intere rei herbariz studiosis antiquam singulas nobis observatas promamus. In ea verò re multum se torserunt.

*Recentiorum sententia de Quercus differentiis. Roboris genera Hermol.*

Hermol. Roboris genera quaterna tantum fecit, Quercum, Robur, Esculum, Cerrum, quæ eundem iudicio Græcis illis respondent, Hemeridi, Aegilopi, Haliphloe, Platyphyllo. Ut sit quercus, Hemeris: Platyphyllos, Esculus: Aegilops, Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos Robur significet, sibi incomptum ait Theophrast. certè [addit idem] Agnam *δένδρον* appellat, quam nostri Robur interpretantur. quidam ut Diosc. quatuor prædictis duas addidit spe-

cies, Fagum & Illicem. Sed toto genere distant, ut cognate potius quam congeneres: habende sint. Verùm non ideò malè locutus Diosc. ad vires, potius respiciens, quas eandem cum cæteris habent. Hemeris sanè Homero non quercum sed vitem significat, ut Photion testatur esse voluit.

Sunt, inquit Ruell. qui Hemerin esse Quercum existiment, quam Mylion interpretantur: quibus facilè accedo fretus Theoph. testimonio, qui scriptum reliquit, eam quæ glandem ferat dulcissimam, quibusdam Quercum, aliis Hemerida, id est, placidam vocari. Cæterum utrique eadem ascribitur natura, præterquam à Plinio, qui parum diligenter glandiferam arborum diffinitionem observasse à nonnullis accusat. Hanc inter Quercum & Hemeridam invenit differentiam, ut in his arboribus, quæ maximam ferat glandem Hemeris vocetur brevior & in orbem comola, aliisque ramorum crebrè cavata: fortius lignum Quercus habeat & incorruptius, ramosa & ipsa: procerior tamen & crassior caudice. Theophrastè *ἀγρία δένδρον* appellat, quam nostri Robur interpretantur. Robur tamen, quæ Theophr. *ἀγρία δένδρον* dicitur, licet pro communi glandiferarum genere usurpent, ea tamen Plin. esse videtur quercus, quæ Gallicum nunc vulgus *Chesnam* vocat, eam passim in sylvis spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuosissimo & glande exigua, materie durissima. Nam & hæc sola præter fructum Gallum utiunque generis & fungos, & plurima alia pignit. [Gallas singula ferre genera dixit Theoph.] Cæterum sunt qui Haliphloeici nomine Robur putent comprehendere, quod comptum non habeo, nec parva fuit difficultas prodere, quibus Græcis latina congruerent. Hæc Ruell.

Drys, iudicio Amati, Quercus est, suaves & dulces glandes ferens, quam nonnulli Etymodrym appellant. Nam communis Quercus infusilla & subius grates glandes producit, cæius Diosc. tanquam species, Fagum & Illicem numerat, quod intelligendum de viribus: secus autem figura, quum multum inter se differant. Nam Fagus arbor est, quæ licet fructum glandi figura & forma similem non habeat, glandiferis tamen arboribus annumeratur.

In Italia, si Anguilcredimus, omnes species arborum glandiferarum, quas recenset Theoph. sunt bene notæ. Nam, ut ille tradit, Prima species, quæ montanis dicitur Hemeris, Macedonibus. Etymodrys, quam Gazanunc Placidam nunc Veriquercum vocat: Itali vocant *Querciam*: In Abruzzo *Ghianda Castagnola*. Profert hæc glandem magnam, crassam & longam, ac hæc glandes in quibusdam locis Hispaniæ comeduntur coctæ in igne in star castanearum. Secunda à Montanis dicitur *Aegilops*: Macedones vocant *Asprin*, Gaza vertit *Cerrum*, Itali adhuc vocant *Cero*, cupula autem in qua continetur glans vocatur *Vallania*. Tertia species quæ vocatur à Montanis *πλανόφυλλον*, eodem nomine à Macedonibus vocatur. Gaza vertit, nunc Esculum, nunc Latifolium. Itali vocant *Fargno*, *Fargni* & *Isibio*. Quarta eodem nomine à Montanis & Macedonibus dicitur *φνός*. Gaza vocat Fagum. Itali, Faggi. Quinta species incognita erat Macedonibus: non autem Montanis, qui Haliphloeon vocant: Gaza vertit Salsicortem nec non Recticortem. Itali *Rovere*. Aliæ sunt quoque species figura inter se similes, sola magnitudine differentes. Prima quæ Græcis dicitur *αἰνός*. Gaza Illex: Italici *Locini* & *Elci*. Secunda *αἰνός*. Gaza Suber. Tertia *αἰνός*. Gaza



**Quercus Aquifolium.** Hæc sunt species arborum glandes ferentes, in Italia cognitæ. Hæc Anguil. Qui cum Matth. & Amato existimat quædam Theoph. & Diosc. eandem esse cum Fago Plin. quod sanè consideratione dignum. Fagus enim Theoph. Diosc. & Galien. eandem videtur, & diversâ Plinij Fago, quæ Oxya Theoph. Quæ verò Diosc. tradidit *ἀειφυῖς*, infusâ referemus, cap. de liliæ, inter vires, sicut & quædam Plinij, de Fago habes cap. de Oxya sive Fago vulgari & Latinorum.

Cæsalp. aliter tradit Glandiferarum differentias, quàm Anguilla, dum scribit Species quas novimus, folio sinuato, & deciduo tres notæ sunt, quæ una Quercus vocatur, frequens in collibus, caudis intorto, ramis in multam latitudinem sparsis, folio non valdè sinuato, glande mediocri, licet quædam maiorem, quædam minorem ferat glandem, optimam ad saginandos fies, folium similiter hæc latum: illa angustum fert. Altera erecta caudice in ingetum altitudinem folio maximè sinuato, glande in Echinato calyce infusavi, quæ Cerrus appellatur. Tertia erecto similiter caudice non adè exaltata: folio latiore, modicè sinuato, glande maximâ rotundiori: appellant in Etruria Farniam, triremibus fabricandis expetitam, materia enim flexilis & enodis: eadem in maritimis reperitur, sed operibus inutilis. Quæ autem folio constant non sinuato, dissimilia secundum ætatem folia ferunt, nam initio obrotunda sunt, modicè sinuata in angulos acutos, adultæ autem arbore, oblonga redduntur & angustiora, quasi Oleæ similitudine, sed ampliora infernè denscantia, glandem ferunt tenuè, in acutum desinentem, inutilem, perpetuèq; virent: Huius generis quinque novimus species, scilicet Suberem, Suberellam, llicem duplicem & Granum tinctorum.

At Theophrastus, quæ folio constat deciduo, communi nomine *ἀειφυῖς*: id est, Robur, sive Quercus vocat, cuius modò quatuor, modò quinque facit species, quarum prima Hemeris, sive Placida vocatur, quæ nostra Quercus, tenuior glande & folio. Secunda Cerrus. Tertia Latifolia, cuius notæ in nostra Quercu latifolia reperiuntur. Quarto loco Fagum ponit, non quam nos ex Plinio Fagum vocamus: cuius verba conveniunt Farniæ in montibus altissimis ad naves quarita. Quinto loco Haliphilios, seu Saleicortex addit, quæ etiam Redicortex cognominata est: hanc putaverim apud nos illud genus Farniæ esse, quod in maritimis provenit. Theophrastus teste, Macedones Roboris quaterna genera faciunt, aliis nominibus, scilicet Etymodrym, seu Veriquercum, quæ glandem dulcem producit, hæc cum Placida eadem videtur esse. Secundo loco Esculm quæ glandem amarum fert, Latifolia videntur intelligere. Tertio Fagum, quæ rotundam fert glandem, quæ Farnia est. Quarto Cerrum.

Apud Plinium Robur, Quercus, Hemeris, aut eandem arborem significant, aut parum differentes: Agilops & Cerrus similiter conveniunt, sic Latifolia, & Esculus, Haliphilos autem apud eundem cum Cerro Arcadum eadem putatur.

Lugdunenses Coloni, hoc pacto inter se contendunt, ut du Choul narrat. Quæ plano in loco aut convallibus Quercus creverit, illis rusticis Chesna vocatur. Si verò in altis montibus radices egit, qui iuga habitant agricolæ, *Roule* aut *Rouvre*, quasi Robur nominant. *Roule* folio Quercus est minore, & duriore materia. In Gallia Quercus, quam plebs *Charme* vocat, sine glande arbor vivit, lignumq; maximè expetit, propterea quòd

cæteris præferatur.

Fallitur nostro iudicio du Choul reponens arborem, *Charme* Gallis dictam, in numero quercus, omninò enim ab ea differt: de ea autem trademus sub Fago sepium dicta. Ait præterea, Ornum & Roboris speciem, quæ sterilis sit, aliqui crediderunt: Et postea: Glandiferarum arborum penè incertus numerus, efficit ut omnes enumerari non possint. Huius arbor est glandifera. Babalaustum quercum, Babalaustum quercem glandem Avicenna dixit.

Paulanias in Arcadum sylvis diversas esse quercus tradidit, quarum alias *μαυροβλαύς* vel Latifolia: alias *χίχρη*, Fagos appellat. Terciam autem genus earum esse, & usq; ad levem corticem præbere ait, ut in mari anchoris signa ex eo faciant. Huius quercus corticem Hermesianax Poëta, *κόρτις* hominavit, & Suberem.

Vitruvius l. 7. de Færno nœminat, quòd inter quercus genera ponitur, & nunc quoque Itali Færnum quercus genus vocant, teste Curius. Est præterea Eumna quercus in Hispania, genus minus, & non adè rectum, cuius glandes ob suavitatem eduntur. Hodie vulgus *Vellera* appellat. Repertæ in Olympo hæc nostra ætate, admodum humiles quercus, folio tesui, glande exigua: quæ veteribus fuisse incognitas ferunt.

Nos ad Rhodani ripas [inquit du Choul] faxis hærentes quercus offendimus, contorto caudice, fructus magnitudine, & natura steriles. Non desunt qui penitus contendunt in quercubus marem & fœminam esse: discrimen sic faciunt, ut mas ad ultimam usque senectutem opacis locis folio non spoliatur, fœminæ hyemis initio decidat. Galli Andegaveses quercus inferunt perpetua coma virentes, quod equidem sibi persuadere priusquam viderent potuissent negatidem.

In Apeanino & Andium agro [vulgò *Angiers*] Quercus perpetuè virens ex genere Latifolia notante Rob. Constantino. Antea diximus ex Theoph. Varrone & Plinio Sybaticam agri Thaurini itidem semper virentem.

In Græcia hodiè hæc Quercuum genera faciunt, autore du Choul. Melanos Ymeri, Thellalia Drys Lesquymeri. Reperta hæc ætate, inquit idem, in nemore Trôfac propè Bituriges tanta proceritate atq; crassitudine quercus, ut referre quâta sit nemo in animum inducat. Iussu enim mandatorè Francisci Regis invictissimi ac doctissimi, aggere veluti factò, pedamentis quibuldam circummunita est, ut cum venaretur tantus Gallorum princeps propter admirationem & inauditam pulchritudinem sæpè sub hac posset oblectari.

Hac fortè non minor, sed ob naturam in ea obsequentem arti mirabilior, quæ etiamnum hodiè, in spectatissimo illo Basilienensi viridario ac sylva à D. Petro cognominata visitur, à Cardano & aliis celebrata. Vulgatæ Quercus, quam paulò pòst describemus species est, crassitudine, quantum vix tres homines comprehendant, truncò homine brevior, sed vaitissimis ramis, senis aut septenis, quorum quilibet Quercus quales vulgò videntur facit crassitudine æquet, ita in orbem repandis brachiata, & triplici pedamentorum ordine in immensum propemodum ambitum fissula, ut iam ante multos annos centum passus circumcuncti non sufficerent. Sed crebrioribus ramis divaricata prædicta brachia, & sensim elata patula opacitate sua, & conniventibus circa media brachiis pateram pereleganter referat, quæ de causa, ob rami & insolentem huius pulchritudinem, & quòd præterea fons perennis

Ornum

Hullos.

Babalaustum

Paulanias

differentia;

1

2

3

Latifolia:

Tauri

Corticis lb.

vi.

Theophrastus

Ber.

Færnum.

Eumna;

Vellera;

Quercus

humiles

Olympi.

Quercus

steriles

Fructuosa.

Mas.

Fœminæ.

Quercus

perpetua

folia.

Græcia hæc

sunt Quercus

genera

nem.

1

2

Melanos

Ymeri.

Drys Lesq.

quymeri.

Quercus

crassitudine

Gallia.

Quercus

Basilienensis

amplissima.

# HISTORIAE PLANTARVM.

ad ipsum ferè truncum perennes per tubos ex-  
cavens Lymphas, D. Maximil. Caesari sub ea cum  
Caesarea sua aula discumbere ac coenitare libuerit.  
Floret eadem & fructus fert, cæterarum more,  
quotannis ferè. Diceret in unica illa quercu, om-  
nes propemodum pulcherrimæ arboris dotes  
Faunos atque Sylvanos certatim contulisse. Ut  
iam nihil sit quod de Lycio Platano gloriatur Li-  
cinius Mutianus, eius provincie legatus, cõnasse  
sæpius sub ea cum octo lectum locus, cum hæc  
quercus Basil. multò plures supra trunci ambi-  
tum brachiorumque, divisarum capiat, quàm Pla-  
tanus ista adumbravit. Sed, ut hæc altitudine præ-  
cellebat, erat enim 77. pedes alta, ita illa nostra  
amplitudine expansa.

Plin. sanè multa Robori tribuit, quæ quercui  
adscribenda videntur, etiam iudicio du Choul.  
Calyci Cerri tribuit idem, quæ calyci Haliphloei  
competunt, ut vult Confil.

Hæc in genere de differentiis quercuum nunc  
enim reliqua generalia de Tempore, Loco, Satu  
& cultu dicenda, pleraque ex Theoph. Plin. Var-  
ronæ, & Trago.

In genere verò & omnibus Roboris speciebus  
competunt hæc nomina *Sageichy* vel *Strancichy*  
vel *Eysichy* & *Eyscholz*: Belg. *Sageeste*: Gall.  
*Robre* ou *Rhure*: Ital. *Rovere*, Dunslinæ quercus  
genus, *Agriadyris* Theoph. putata: *Sais d'Agla*: *Adi-*  
*cras* eiudem, ut Had. Iun. & alij quidam pu-  
tant, *Robur* dicitur & *Robor*. Marurè & verè cæptu-  
ro germinat *Sais* & glandes, fructu ferit reddunt,

ut circa Vergiliatum occasum: Et reliquæ quidem  
arbores, ut primùm cæpere, continuant germi-  
nationem. *Robur* & *Abies* & *Larix* intermittunt  
tripartito, ac terna germina edant: idè & inter  
cortices squamas spargunt. Folia quercus cuius-  
cunque in principio tenerissima sunt, idè facili-  
mè superveniente pruina marcescunt, & ipsam  
fructuum spem amittunt, quod aliquando in istis  
regionibus evenire solet: Eadem folia mox co-  
muntur oblonge & luteæ *Cachryes*. Hæc verò  
circa diem D. Georgii sacrum, quercus ostendit,  
Porro folia Quercina quæ primùm lutei sunt co-  
loris [licet nonnulla etiam rubicunda appareant,  
maximè ea quæ è novellis Quercubus erumpunt]  
subinde viridiora ac solidiora evadunt. Post *Ca-*  
*chryas*, quas diximus, perexigui prorumpunt &  
rubri flosculi, qui in glandes tandem abeunt,  
quarum non raro tres aut quatuor unico cõque  
tenuissimo insident pediculo. An verò glandes

ex aliâ fugem sint perventura, c. c. d. f. m. D. Iaco-  
bo sacrum, observari solet, cum enim è calycibus  
prorepere consueverunt.

Montes & valles diligit Robur: quercus &  
in plana descendunt. Omnibus superscriptis  
differentiis veterum, si Matth. credimus, u-  
niversa abundat Hetruria: quippe in mariti-  
mis Senensibus & Faliscorum agro, ac etiam  
Romano tractu, omnia illa glandiferarum  
genera adeo numerosa in vallibus suis pro-  
venire tradit, ut glandibus innumerales por-  
corum greges incolæ ibi quotannis agerent.  
Frugorum & calorum iniuriæ passæ quercus  
veluti Robora, tardius moriuntur. Quercus  
cæsa anno tertio relurgit: & in aquis obruta  
durat, Fitque Ebeni similis, & detorticatione  
nem facile tolerat.

Circa Oleum & Inglandem feri vetant Geo-  
ponici quoddam naturæ quidam *arboribus* ab  
eis diffideat, & fundi oram sterilem faciat. De  
satu controvertitur. Quidam enim ex  
semine ac glande tantum eam progigni statuunt:  
alij ex radice quoque sed lentè. Nonnulli e-  
tiam ipso caudice detruncato: avulsione aut  
radice, nullam earum quæ ab imis toboleis  
non mittat [ *truncus* & *truncus* ] exortiri pos-  
se arbitrantur. Iuxta urbem Ilienum quercus  
in Ili tumulo tunc sata dicuntur, cum cæpit  
Ilium vocari. In Ponto circa Heracleam ara  
sunt Iovis Stratij cognomine, ibique quercus  
duæ ab Hercule satæ. De insitione nihil effa-  
tu dignum traditum: hosce tamen etiam fructus  
quercus protulerunt, si verum dicant  
Poëtæ: Virgil. Eclog. 8.

----- Aurea dura

Mala ferant Quercus: Narcissi floreat Alnus: Amy-  
Pinguia corticibus sudent Eleætra myrica: La-  
Certent & cygnus ulula:  
Horat. Epist. 1.

----- Quid sit rubicunda benignè

Cornæ vepres & Pruna ferant: & Quercus & Corni-  
Illex  
Multa fruge pecus, multa Domum invet um-  
bra:

Sed hæc vota poetica nobis potius esse viden-  
tur, quàm veræ narrationes. Ruellius tamen  
memorat, per insitionem quercum bona Py-  
ra ferre visam esse: Fides sit penes autorei.  
Nunc specialem historiam aggrediamur, in-  
cipientes à vulgatissima quercu nostratè.

## QUERCUS VULGARIS BREVIBUS AC LONGIS pediculis.

Vix ulli genti Europeæ inco-  
gnitam putamus Quercum Defen-  
vulgarem recto, crassissimo, va-  
sto & valde caudice, nec minùs Cortice  
firma materie, crasso, rufo, timo-  
fo, scabroq; cortice: brachiis lon-  
gè latèq; luxuriantibus, foliis lon-  
gis sinuosis. In hac nucamenta  
aut fusi observantur, in quadra-  
talibus tenuibus pediculis ex cer-  
tis intervallis, muscoli, ex apiculis  
testibus heretibi eodem puncto  
pluribus exortis, compositi, sic,  
ut interdum verticillatim ligulam  
cui adherent coronent, quos in-  
fra pedes dan us cum pilis: que-



Glandes  
Fugient.

Cachryes.

Hali-  
nuculi.  
Robor.  
compus in  
genere.

Agriadyris.

Nomina  
Roboris in  
genere.

Plin. nota-  
ent.



cus: observantur quoque & glandium rudimenta, tanquam globulimmini purpurantes & hirsuti (qui mihi flosculi) privatis pediculis insidentia. Glandes in Calycibus suis seu cupulis sessiles, vel furculis proximè adherent: & longis tenuibusque pediculis appenduntur. Atque etsi magnitudine variant, unciam tamen communiter longæ sunt, corticosa membrana tectæ puniceas nucleos callosos, acerbos & austeros, quemadmodum & cupula exterius asperiuscula, interius lævis predicto cortice multo densior, vix tertiam glandis partem capiens.

Quercus vulgaris tres varietates à fructu potissimum postea trademus: hic id notandum nobis videtur, sæpius visas Quercus maximas totas cavas corrupto ligno ac etiam interdum adusto penè toto ab opilionibus, ut homines in eis occultari poterint, & nihilominus pluribus annis virentes & fructiferas durare. Vox *apud* inquit Lob. & Pena, à *sub*, erumpo, pullulo, qua designantur potiss. glandiferum genus & præsertim Quercum, cuius frequentiss. occurfus, ipsaque celsior & ramesior arboris species frondis grandioribus anfractibus sinuata quavis notat nec notiore faciunt, tum frigidis, tum calidis plagis. Non mentio quæ putet apud Theophrastum. Item Silvestre tamen *apud* quæ hodie *Robur* vel *Roure* vulgus nostras vocat, ut quæ sit perquam solido truncato, multum cineris urendo relinqueret. Qualem etiam è vulgari truncato nos parandum curavimus, aiunt Lob. & Pena, qui addunt: Quæ glans dat Quercus, duplex videtur. Earum vulgarissima nemorum & saltuum Pedemontium, Delphinatius, aliarumque regionum temperatorum est alumna, minore fipite, brachiis & fronde. Huius quædam varietas aut differentia videtur Fagus, Theophrasto dicta, vocis argumento Latinis Esculus, cuius esculenta glans, & post quænam dulcissima celebrabatur, famemque explebat primis mortalibus: hodie *Fargni* & *Fargno* Italicè. *Hargni* Gallicè: Lignum istius firmius prodit, quam urbana Quercus. Item in obs. Quercus perpetua fronde virens, Gallis *Chestes verda*. Huius Quercetas in Gallofrancia oriri audio. Glandes nostratibus similes sunt, quales ferendas misit eruditiss. D. N. Rache apud Lutetianis Medicus. Nos verò quiddam concernit, cur totam Quercus Lob. historiam hic proponamus, factum id à nobis, quod non in omnibus æquè perspecta sit. Quercus etiam à nobis descripta, *Quercus Virgilij* est. Et fortè reliquorum quoque Poëtarum, *Iovis sacra*, *Chama*, *Fariatica*, *Dionisia*, *Dodonæa*, *Citrica*, *Masbonia*, *Atricomæ*, *Patula*, *Rigida*, *Dura*, *Grandifera*, *Grata* suisbus, &c.

Quercus Manre est apud Hebræos: nos in vulgata interpretatione Vallem Manre habemus: & Genes. c. 12. ubi Græca vulgata editio *Apud* habet, Latinus interpres Vallem vertit. D. Hieronymus inter Quercum & Terebinthum nullum discrimen agnovisse videtur, lib. Gen. 1. cap. 17. Latinus habet Terebinthum Græcus *Squor*. Item L. 3. & Gen. 35. Est Serap. Codex emendandus ubi Cullor Latinis litteris scribitur: eum errorem in sua commentaria transtulit. Elon citra controversiam Quercus fuerit, Et Quercus Ofes cap. 4. Quercus etiam à Iosue filio Nun, Ela dicta. Sunt tamen qui hæc vocabula generales arborum omnium apud Hebræos appellationes esse contendunt, quæ sanè rerum magna esset confusio in unica vo-

ce. Extrat & Ciceronis posima de Arpinatum quercu. quercus de qua Pompeius.

Hæc eadem à nobis descripta putatur, esse Platiphyllos Idæorum & Macedonum, & Latifolia Plin. Periti quidam Herbartij hanc marem esse aiunt, fœminam verò genus alterum in saxosis, glande pusilla. Robur quoque quæ Theophrast. Agria, Drys dicitur, ea Plinio esse videtur quam Gallicum vulgus, *Chestes*, vocat, inquit Ruell. non sine errore, si hæc *Chestes* Quercus sit.

Dalechampion, Quercus genus 2. est Hemeris Idæorum, Macedonum *Erymodrys*, Latino *Robur*: Itolorum *Rovere*. Placidam interpretatur Gaza, audacis more suo. Plin. Græco nomine utitur. Idem Dalech. multa habet curiosius observata in sua Quercus historia, quam Hist. Lugd. retulit his verbis: Quercus in specie arbor est omnium maximè procera, si Aegilopem excipias, recto caudice, cortice inferna parte rimoso scabroque, superiore lævi, cui subest Alburnum, quod cum animalis pingui comparari potest, plurimis in orbem brachiata ramis, magnam innoxiamque umbram loco inducentibus: folio grandi, Cerri & Halphitæ folio latiore, carnoso, laterum anfractibus sinuosissimo in arbore vetusta, minus in ea quæ cæsa novam frondem mittit, sed tunc maximè lato & spisso, summa parte obtuso, cum cadit nigrescente potius quam flavescente: glande mediocri, subius grata, od eamque causam iis saginandis apta, cum à Phagi & Hemeridis glande discelleris, dulci, non omnino quidem, sed si cum Halphitæ & Aegilopis glande conferas. Minus enim acerbæ & amara gustui est, Calyce nullis aculeis horrido, sed pustulata tantum scabritia asperato. In summo ramorum cacumine ferè Glans nascitur, brevior, extrema parte veluti depressa ac retusa, aculeo, qui in summo fastigio glandis eminet, brevior & minus pungente: sæpè ternæ glandes simul coherent, aut binæ, raro unica prodit: pediculus eas sustinens crassus & brevis, inde nascitur ubi ramo folium adheret. In unius furculi capite plerumque videas hinc tres coniunctas glandes, illinc duas, ac in proximo unam solam, prout succus, earum alimentum, huc illuc sese magis spargit: radice longè latèque evngante. Hanc uti dictum, Platiphylon quidam marem esse aiunt: fœminam verò genus alterum, in saxosis & asperis locis ferè nascens: mare humiliore, cortice in tenellis furculis rubescens, te, non ut in illo albescente: folio minore: brevior, angustiore, antroforum magis acuminato, tam densis laciniis singulis lateribus, ut minus crispum videatur, latius & nitidius virente, glande pusilla & strigosa. Talem profectò gignunt aprici lapidique colles Allobrogum, aspectu nonnihil variam, ob loci squallidi ariditatem.

Cæterum & in aliis Quercetis fœmina quoque provenit, folio quam maris brevior, antroforum latiore, & magis obruto, infernè pallido, cortice ramorum nigriore: glandibus minimis, in ramorum & furculorum vertice prodeuntibus, interdum senis aut quinis, sæpè ternis aut quaternis, raro binis, rarissimè singularibus, quasi digito retusis, aculeo minimo, parum è calyce prodeuntibus, sed ei firmiter adnexis. Platiphylorum quoque generi adscribenda, quam supra memoravimus in Thuino agro, in Apennino &

Platiphyllos  
Idæorum  
& Macedonum  
Latifolia Plin.  
Periti quidam  
Herbartij hanc  
marem esse aiunt  
fœminam verò  
genus alterum  
in saxosis  
glande pusilla  
Robur quoque  
quæ Theophrast.  
Agria, Drys  
dicitur, ea Plinio  
esse videtur  
quam Gallicum  
vulgus, Chestes,  
vocat, inquit  
Ruell. non sine  
errore, si hæc  
Chestes Quercus  
sit.

Hemeris  
Idæorum  
& Macedonum  
Erymodrys  
Latino Robur  
Itolorum  
Rovere  
Placidam  
interpretatur  
Gaza  
audacis  
more suo  
Plin. Græco  
nomine  
utitur  
Idem Dalech.  
multa habet  
curiosius  
observata  
in sua  
Quercus  
historia  
quam  
Hist. Lugd.  
retulit  
his verbis  
Quercus  
in specie  
arbor  
est  
omnium  
maximè  
procera  
si  
Aegilopem  
excipias  
recto  
caudice  
cortice  
inferna  
parte  
rimoso  
scabroque  
superiore  
lævi  
cui  
subest  
Alburnum  
quod  
cum  
animalis  
pingui  
comparari  
potest  
plurimis  
in orbem  
brachiata  
ramis  
magnam  
innoxiamque  
umbram  
loco  
inducuntibus  
folio  
grandi  
Cerri  
& Halphitæ  
folio  
latiore  
carnoso  
laterum  
anfractibus  
sinuosissimo  
in arbore  
vetusta  
minus  
in ea  
quæ  
cæsa  
novam  
frondem  
mittit  
sed  
tunc  
maximè  
lato  
& spisso  
summa  
parte  
obtuso  
cum  
cadit  
nigrescente  
potius  
quam  
flavescente  
glande  
mediocri  
subius  
grata  
od  
eamque  
causam  
iis  
saginandis  
apta  
cum  
à Phagi  
& Hemeridis  
glande  
discelleris  
dulci  
non  
omnino  
quidem  
sed  
si  
cum  
Halphitæ  
& Aegilopis  
glande  
conferas  
Minus  
enim  
acerbæ  
& amara  
gustui  
est  
Calyce  
nullis  
aculeis  
horrido  
sed  
pustulata  
tantum  
scabritia  
asperato  
In  
summo  
ramorum  
cacumine  
ferè  
Glans  
nascitur  
brevior  
extrema  
parte  
veluti  
depressa  
ac  
retusa  
aculeo  
qui  
in  
summo  
fastigio  
glandis  
eminet  
brevior  
& minus  
pungente  
sæpè  
ternæ  
glandes  
simul  
coherent  
aut  
binæ  
raro  
unica  
prodit  
pediculus  
eas  
sustinens  
crassus  
& brevis  
inde  
nascitur  
ubi  
ramo  
folium  
adheret  
In  
unius  
furculi  
capite  
plerumque  
videas  
hinc  
tres  
coniunctas  
glandes  
illinc  
duas  
ac  
in  
proximo  
unam  
solam  
prout  
succus  
earum  
alimentum  
huc  
illuc  
sese  
magis  
spargit  
radice  
longè  
latèque  
evngante  
Hanc  
uti  
dictum  
Platiphylon  
quidam  
marem  
esse  
aiunt  
fœminam  
verò  
genus  
alterum  
in  
saxosis  
& asperis  
locis  
ferè  
nascens  
mare  
humiliore  
cortice  
in  
tenellis  
furculis  
rubescens  
te  
non  
ut  
in  
illo  
albescente  
folio  
minore  
brevior  
angustiore  
antroforum  
magis  
acuminato  
tam  
densis  
laciniis  
singulis  
lateribus  
ut  
minus  
crispum  
videatur  
latius  
& nitidius  
virente  
glande  
pusilla  
& strigosa  
Talem  
profectò  
gignunt  
aprici  
lapidique  
colles  
Allobrogum  
aspectu  
nonnihil  
variā  
ob  
loci  
squallidi  
ariditatem

Glans  
varietas  
aculeo  
pediculus

Glans  
varietas  
aculeo  
pediculus

Glans  
varietas  
aculeo  
pediculus

Glans  
varietas  
aculeo  
pediculus

Andium Gallie pennis agro nascentes, ut, quod Plinio mirum fuit, tam rari missi definamus.

Id verò admiratione longè dignius, quod scribit Plin. lib. xvi. cap. vi. probari Latifolte glandem, cuius in balano utrinque ex longitudine extrema lapide sit duritia: meliorem cui in cortice quam cui in corpore, utrumque non nisi mari. Nam cum locum Theophrasti exprimere voluisse videatur, eius sensu alienissimus est. Neque enim id melioris glandis signum esse vult Theoph. neque id de Platyphyllo scribit, sed de Phago & Haliphloe. Hemeris arbor est non levis, sed aspero rimosoque cortice: humilis, non exaltata: non recta, sed contorta: aliisque ramorum crebè cavata: materia summa duraque, sed minus quam Phagi, glande post Phagum dulcissima, sed longiore maioreque, imò omnium maxima, è suo calyce breviori ac depressiore facile decidua, repui longoque pediculo affixa, modò unica, modò gemina dependente, quod illi ex omnibus Quercus generibus peculiare est.

Hæ sunt igitur huius Quercus, quam hic proponimus differentie vel varietates, quas ceteri Herbarii patet: Dolech non dubitare.

Cæsalpinus quoque, qui tamen multum circa Quercum fassus videtur, non mirum itam discrimen posuit harum Quercuum. Periti viderint an Theoph. Hemeris sive Placida, (ut ille cum Gaza vult) & Macedonum Etymodrys seu Veriquercus, ipsi cum Gaza dicta, Plinij item Robur, Quercus, Hemeris eidem dicta, sit nostra Quercus pediculo brevi. Idem viderint an eadem Cæsalp. Drys, Robur vel Quercus, Theoph. latifolia Plinij & Italice, Macedonum Esculus, possit esse nostra Quercus cum longis pediculis.

Alias & Cordus Quercus facit differentias: est enim hæc illi vulgaris illa ramosa in latitudinem diffusâ glandifera arbor, caudice neque adeò procerò, neque recto, crasso tamen, quam Latini propriè Quercum vocant, Germani Eysche, Theodoros nunc Placidam nunc Quercum vertit. Δρύς speciatim vocata Robur est, siquidem Theodoro credendum, nisi enim ita Robur Græci appellaret, non temerè aliud nomen esset reperire, quo ea gens eam arborem indicaret. Caudice asurgit Robur recto, prò cetero, paucisque ramis brachiato. Italis adhuc Rouer vocatur, Germanis Streiche, à soliditate quasi lapideam Quercum dicasi. Frequentissima est hæc in Helsia arbor.

Agilops Cerus est, Roboris figuram referens, sed hæc etiam eò tum rectior, tum procerior existit, ramisque non nisi in summitate habens, Germanis Tanetche vocatur, quoniam Abietis modo recto proceroque constat caudice. Platyphyllos, est quam Esculum Latini & Hasleiche German. appellant, Saxonie sylvis in plano familiaris, hæc latissima folia, unde & apud Græcos nomen. Hæ sunt Glandiferae arbores quæ hoc capite Δρύς nomen à Diofco. nominantur, & propriè vocatas glandes ferunt. A Fago Latinorum dissimilima sylvis [Phegus Græcorum] qui ei tribuunt glandem non aliarum modo oblongam, sed rotundam. Fagus verò Latinis dicta, glandem propriè non fert, sed in echinatis pericarpis castanearum more pingues & oleosas nuces, casque triquetras & acuminatas: quæ figura è diametro cum rotunda pugnat. Qui verò Phegum novisse voluerit, montanas lustrat sylvas, in quibus provenit hæc arbor. Figura illi non dissimilis Quercui, sed itrigonior & tiliior. Glandes fert omnibus agrestibus notas, figurâ rotan-

dis: quæ nota tanquam præcipua ab aliis plantis feris distinguitur. Porò non sicut hæcenus rescribere quo nomine nostri agrestes hæc Phegum appellant, glandes verò, adiecto rotundum cognomento, à reliquis distinguunt. Hæc Cordus Miramini dixerunt. Botanici non observant differentias, quæ à pediculis sunt, & fructibus, licet abundent in Germania: atq; ut verè fateamur, eius differentia nobis nihil perspicua sunt: Hemeridem Gordi existimamus nostram Quercum cum longis pediculis. Robur etiam eius fortè est Quercus, cui glandes parvæ cum breviss. pediculis. Agilops eius, quæ sit hactenus, quid si ea, quam altissimam observavimus, de qua paulò post, quam non separamus, ab ea, quæ pediculis longis caret: nolumus tamen veram & genuinam antiquorum Agilopem dicere: nec scimus an vera Agilops in Germania proveniat. Platyphyllos Cordi, quæ sit ignoramus, vellent eius glandes descripias. Quercus sanè vulgaris mirè ludic foliis. Phegon, Cordus cur dicat, figurâ rotundâ, notâ tanquam præcipuâ, ab aliis distinguens, nos latet: quandoquidem Theophr. Phego tribuit fructum dulcissimum, inter alias, glandem, qualem vix puto reperi in Germania. Considerandum igitur an intelligat Cordus, nostram Quercum longos non habentem pediculos, glande maiori.

Angul. II. menda Theoph. & Etymodryn Macedonum apud eundem veram Quercum dicit, quam Querciam in Abruzzo vocant: Chianica Cagli. flagula in quibusdam Hisp. locis, ubi eius glandes coctas comedunt castanearum instar. Videntur etiam eam intelligat quæ est cum longis pediculis: Item an Fargna & Fargni & Ischio eiusdem, quam Platyphylon Theoph. dicit, & à Gaza nunc Esculum, nunc Latifoliam verti, sit nostra cum brevibus pediculis: an verò hæc intelligat Lob. cum scribit uti dictum: Quercus quæ Gallas dat, differentia quæ iam videtur, Fagus Theoph. Latine Esculus, Fargni & Fargna Italicè. Fargni Gallicè.

Tragus genus durum Quercus Latine Robur, germ. Hagenchen & Eysholz dici ait, ubi Quercum cum longo pediculo pingit, etsi nihil distinguat.

Ad eundem modum Lonicerus distinguere conatur Quercum Eichenbaum ab eius specie Hagen-Eichen / Robore, haliphleos Græcis dicta. Qui tamen, quamvis ponat duas icones, non demonstrat differentiam inter Quercum & Robur: utraq; enim icones representant Quercum, cui glandes cum longis pediculis.

Rythio quoque in Diofco. Quercus, Δρύς appellatur & Hemeris, id est, Placida nostra vulgaris quercus cum longis pediculis, quantum demonstrat eius icon.

Dodon. in hist. oall. propriam habet iconem quæ eandem videtur demonstrare, quam simpliciter Δρύς & quercum vocat: in hist. autem Latina fortè vocat quercum sylvestrem & Robur. Non observavit discrimen in nostratibus quercibus à glandibus & pediculis petiit, pro eo exhibet iconem sine glandibus à Lob. & nobis positam, pro quercus excremento fungoso: tradit nemerim, quercum, Robore, sive Agresti quercu sæpè humiliorem, glande maxima & dulci: quercum palsim per Europæ provinciam obviam esse, præsertim Robur: nemerim non ita vulgarem. An verò ipse novisset discrimen, dubitamus.

At Clusius hisp. quod peculiari nomine Robur appel-

Quercus  
cordi.

Plin. vedat  
quint.  
Theoph.  
explorat.  
Hemeridis  
descriptio.

Matricaria.  
Gland.

Cæsalp. it.  
cat.

Robur  
brevis pedi-  
culo.  
Quercus  
longis pedi-  
culis.

Hemeris  
Quercus  
Gargensis  
est.

Drys.

Robur.

Cerus  
Agilops.

Platyphyl-  
los.

Phegon.

Fagus Lat.



appellari debeat, difficile inquit est iudicare, cum nonnullæ notæ Robori, nonnullæ *quercubus* attributæ; Quercui, per vniuersam Europam notissimæ, conueniant. Roble in Aquitania dicunt etiam de nostre Quercu, in cuius foliis Pilulæ nascuntur. Idem præterea dicit in postrema hystor. Hispanos nomen Roble vulgari Quercui etiam tribuere, quæ in Hispaniis frequens est, & montibus Calpi, fretoque Herculeo vicinis semper viret. Quercum etiam propriè Quexigo Hispaniis dici & Enzina de Bellotas græcissas à quibusdam vocari, si-bi relatum esse. Clusium diligentissimum Botanicum non tradere in vulgari Quercu differentiam à pediculis miramur, ita ut nesciamus, quam intelligat vulgatem; meminit tantum latifolia exticæ, de qua paulò post.

Du Choul Quercum in montibus agricolis *Roule* & *Rouure* dici ait, quasi Robur: alibi simpliciter Quercum dixit, & à rusticis Lugdun. Chæna dicit. Et rursus Hemerida & Placidum dicit Quercum putari, quæ Mydion interpretantur. Videtur autem Quercum cum longis pediculis intelligere, cuius glandis iconem simpliciter glandis Quercus & alia Hemeridis glandis nomine expressit.

Sunt, inquit Turn. qui duas Quercus statuunt species, vnam quæ glandes ut Poma Querna ferat; alteram longè minorem vulgari, quæ ad adificia vulgò vtuntur. Nullas sibi in foliis Quercus obseruatas in Anglia Gallas, quas tamen in Italia non tantum, sed & in Frisia Orientali in syl-  
uola non procul Auriaco viderit. De quâ verò Quercu intelligat, non addit. Pingit eam quæ breui pediculo:

In Silesia, inquit Schv. Quercus vulgaris, lativa, vrbana, Δ. Dioscor. in syluis, collibus, & montibus gignitur. Est etiam Quercus petraea, Δ. *quercus*, Quercus sylu. Robur. Lat. *Steineyche* in collibus & petris frequens, fortius lignum habet & incorruptis cæteris: folia quamuis arcescat, per hyemem non cadunt. Et has differentias assignat Schv. An verò in Silesia nulla alia Quercum differentia offeratur, considerent istius loci Botanici. Casp. Bauhinus apud Matthioli. ponit iconem nostre Quercus, cum breuib. aut nullis pediculis pro Theophrasti Quercu latifolia, seu Platyphyllo, quam ait distingui in marem & fœminâ. Quercus autem longissimo pediculo ei est Hemeris Idæorum, Etymodrys Macedonum, Placida Gazæ. Huius florem ait in suo Phytopinace à nemine propositum: Camerarius tamen eleganter pinxerat in Hist. Matthioli. Germ. atque Epitome. Vel certè iconem habuerat à Gesnero: iam flores an sint, vel potius Bryon representans iulos, qui in Corylo & Nuce iuglandis proueniunt, considerent alii. Nos eius iconem ponemus paulò inferius, titulo Pilulæ foliorum Quercus.

Ex suprà dictis igitur patet paucos distinxisse Quercum cum longis pediculis, ab ea, quæ glandem cum breuib. fert pediculis, atque aded nullis, ipsi calycibus earum ramis immediatè adherentibus, quæ in quibusdam syluis Comitatus Montbelg. prouenit, ut non longè à pago Charmont, & in monte iuxta Blamontium & S. Hippolitum, & inter Blamontium & Montbelgardum, ubi & alia cum longis pediculis, quæ ab incolis vocantur *Glands flans*, quæ passim ferè obuiæ sunt, atque aded vulgatissimæ videntur, longiores, singulares, binæ, ternæ, ac etiam quinæ. Earum verò, quarum glandes proximè adherent ramis, gemina conspicitur varietas: vna eum ma-

Tom. I.

iorib. glandibus binis aut ternis: altera maioribus ternis vel quaternis, quæ & pluribus, fortè fœmina, & minores glandes fert: Incolæ vocant *Grus Gringeur*, & *Petit Gringeur*. Istarum Quercum differentiam vix ponere possumus, nisi quis earum quæ breui aut nullo pediculo sunt folia inspicere velit splendidiore, & paulò firmiora.

Differentia in foliis.

Cæterum passim in syluis aliisque locis, prædictæ nascuntur Quercus, locis præsertim & prouinciis Septentrionalibus, sed in Germania & Burgundia, quæ longo est pediculo, reliquis multò frequentior, & fortè etiam melior ac vilior, ob glandis magnitudinem, quæ cæteris præstat. Nullibi locorum quercus pulchiores, altiores, rechores ac sine ramis vidimus, quàm in monte Cherimont ditionis Montbelg. altitudine æquant Abietes: dixerit quis ramos industriè ablatis vt-  
que ad cacumina.

Cherimontane speciosa, & altissima.

In syluis Germ. teste Gesn. duo tantum genera crescunt: *Eich*, Quercus: & *Bageidy* vel *Steineyche* Robur. Basilensem parulam, antiquitate & amplitudine celebrem, antea descripsimus. Est ex eo genere, quæ longos fert pediculos. Vtræque alioqui Quercus ibi vulgaris in syluis, sed eam quæ longis pediculis quidam *Vereiden* vocant, fortè quòd subius sit aptior & gravior. Verlin enim iis suis minores dicuntur. Quercus quoque obseruamus Lugduni, Montpelii, & multis Italiae & Gallia locis.

Quercus locis arenosis, macilentis ac fœcis consita dilatatur.

Pelagos olim locus fuit Quercubus confitus post Pelagii. Neptuni templum quod ad Aliæsum est montem.

Mirum, si non est fabula, quod proditum inuenimus Nucem iuglandem senio in Quercum mutari.

Nux Juglandis in Quercum mutata.

Circa Thebas quoque est Quercus, teste Plinio. Diuotissimè viuit, ut mirum sit ab Aristotele (aut quisquis eius libri sit autor) de plantis dictum esse proceras rectasque arbores minùs diu viuere. Quercus rectissimas, grandissimas, vetustissimas, quarum fætionem ne aduortum quidem aut ac prouari norint.

Aristot. notatur deced.

Quercus vere quidem germinat, sed tardiùs multus alius arboribus. Noua folia producit Maio: Glandes maturæ sunt Augusto. Iulos cum flosculis ac glandium rudimentis alàs Aprilis fine, aliàs Maio obseruauimus. Gallæ proueniunt ætate: mense Septeb. decidere incipiunt, sicut & glandes.

Tempus.

Robur verno tempore cæsum teredinem sentit, brumâ autem non pandatur, aliàs obnoxium fit vt torqueat se findatque: infinitum refert & Lunarem rationem obseruari. Videtur autem de Quercu vulgata id intelligendû, quæ ad adificia potissimum ac præ aliis omnibus cedi solet. Luna deficiente tutissimum Quercum cadere omnes existimant. Quercus quæ Solis beneficio in vniuersum prinata fuerit, quod ad lignum ipsum & fructum attinet, durior est, deterior, & minùs tractabilis: ita quidem vt lignum Quercus à Sole auersa difficile sit findere, quod Germ. rustici *Winterschleg holz*, quasi dicas lignum rigidum, hiemisque vitio induratum ac intractabile, instrumentisque renitens, interpretantur. Reliqua habes in superioribus. *Δρῦς* nomine tradunt multi Græcos omne arboris & ligni genus complexos esse, vnde & Vitem *ἑρῖται* *εινὸν* quidam Synonymia poetâ appellauit. *Δρῦς* autem in specie *Σαπῶν* Hippocrati, *ἡνίκας* verò Theophrasto, vt plerique volunt. Latinis Quercus, Iouis

Cadendū tempus.

Lingua.

arbor quibusdam Robur. Quercus, inquit Gorop. Latinorum nomen est, sed non minus quam Robur à Cimmericis siue Ianigeris Romanorum antiquissimis maioribus relictum: à Weer, id est, defendo: Mercou, id est defendo à frigore. Dicta itaque Quercus à Mercou, vel Wer-hout. Ger. n. Eichenbaum: Gall. Chesne: Ital. Quercia: Hisp. Robre. Bohem. Dub. Belg. Eikenboom/Eeste. Angl. Oaktree: vel ut Boreales Eitree / Allobroges Rhodano vicini Chermilloe appellant: Sabaudi, Drylie.

Glandis no-  
mina  
Dryobala-  
n  
Aylor A-  
rist.  
Fruges Ro-  
burnea.

Glans, *Edax* & *Spobedax* Straboni, *Edax* Arist. [tamen si lignam propriè glandem notare velint] vnde manasse videtur origo Germ. vocis Eichel: fruges Roburnea Colum. Hebraeis vt Elias Leuita in nomenclatura sua testatur, Allonim: Cul-lur Serap. vt in vulgatis legitur. Belg. Eechel: Holl. Aectre/Gil. Glans, Agl. ind. Ital. Chiande. Hesp. Na-l. ta. Hung. Maf. Thebaidis fructus, inquit Plin. populati etiam nomine à nobis appellantur Bala-m. Pilulas illas inuiles, quas folus & ramis Quercus adhaesi diximus. Germ. Eischöpfel vocant. Ger. *Edax* id est, pilulas atininas. German. Eischöpfel. Quercus quoque *Edax* dicitur Festo, tum quod ge- us arboris grane ac durum sit, tum etiam quod in ing-ntem euadat altitudinem. Et Quercetam febrem quidam grauem & magnam putant dici, ac cum tremore frigidam. Lucilius: *Iacta me ut febris Quercera,*

Virale as-  
mina  
Quercera  
febris.

Et alibi:

*Querquera consequitur febris, capitisque dolores.*  
Et Plinius:

*Is mihi erat bilis Querqueratus.*

A. Gellius: An tu fortè morbum appellari hic putas, agrotationem grauem, cum febris rapida & quercera.

Quercum Poëta duram decantant, rigidam, vmbrosam, aëriam, sublimem, glandiferam, frugi feram, patulam sacram Ioui, annosam cuiam, Dodonida, amicam Ioui, faticam, frondosum, arduam, alticomam, validam, altam, Dodon. ram, ramofam, nodosam, frondentem, cariosam, gratam subus. Vires autem & vsus Quercus vulgaris postea tradentur.

Vires.

#### QUERCUS LATIFOLIA EXOTICA CLVS. VEL RARA.

Descriptio  
Quercus.

IN V'ennenfi saltu, inquit Clus. Latifoliae amplissimas arbores inueni anno 1578. cuius omnes glandes è longis pediculis dependentes maxima ex parte non modò obsitæ, sed quasi inclusæ erant viridi quadam excrefcentia, multis inæqualibus angulis prædita & scabra, quæ rescicata, gallarum modo dura & firma erat, quarum etiam vicem explere potuisset. An id vitium illi peculiare sit, & singulis annis recurrat, me latet, vt qui semel duntaxat per eam saltus partem iter fecerim. Qui illas partes inhabitant de hac re erudire possunt.

#### PHEGVS VEL ESCVLVS.

Descriptio

DE Phego & Esculo in superioribus multa diximus ex Veterum placitis. Nunc eam prout hodie observatur Dalechamp. descripsit. Phagus siue Esculus brevis est arbor, in orbem comosi, Hemeridis modo, non erecta, minus tamen quam Hemeridis contorta, caudice crassissimo: folio quam Hemeridis angustiore & breuiore,

Folium.

obscurius virente, infernè candicante; glande dulcissimâ, terete, longâ, quam Etymodyos breuiore, è breui crassoque pediculo subreftâ, calyci multâ necius completenti tenacius herente, Glans in ramorum furculis, ad exortum singulorum



propemodum foliorum vnica, rarè gemina, graciliore quam in latifolia & magis acuminata, aculeo suo magis pungente. Reperitur & in hoc genere arbor, fert gladem fert superiorem omnino figurâ similem, sed crassior, altior, plenior, ob molli sua pondus, è calyce facile deciduum. Lignatores huius speciei marem esse volunt, alterum feminam. Esculus si Virgilio credimus, quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Georg. 2.

Pars autem posita surgunt de semine, vt alta Castanea, nem. vniueque Ioui qua maxima frondet Aesculus [Esculus] atque habita Graia oracula Quer-

cus  
Altiùs ac penitus terra defigitur arbor:  
Aesculus [Esculus] in primis: qua quantum verrice ad auris

Aetereas, cuium radice ad tartara tendit:  
Ergo non hyemes illam, non flabra, neque imbres  
Conuellunt, immota manet, multisque per annos  
Multa virum volens durando secula vincit.  
Tum forte latè rames, & brachia tendens  
Huc illuc, in media ipsa ingentem sustinet umbram.

Cæterum, quod Dalech. interpretatur Quercus; quoniam glans velut.

Multi verò Esculum, Græcorum esse Platyphyl- lon existimant, cuius opinionis sunt Bellon. Curtius & alii. In Traconitide, inquit Bellon. prouenit Esculus, qui à Græcis antiquis vocabatur Platyphyllos, nunc Vela-guida. Fert glandem magnitudine oui Columbini, quâ possent victitare homines tempore famis: ad gustum enim Castanea accedit. Tertium Quercus genus quod Theoph. vt docti sentiunt. Longè alia à nostrate Fago & Plinii quoque quamquam plerique cum ipso Plinio, nominum affinitate decepti Phagum cum Fago confuderint. Plinius quoque Esculi & Platyphylly tanquam diuersarum arborum eodem loco meminit. Præterea Esculus, vt inquitiple quoque Plin. rigida nec excelsa est arbor. Platyphyllos, dempta Egilope, rectissima est, & excelsissima, atque adificiis minus utilis. His accedit Bellon. glandis discrimen, quam in Esculo dulcissimam esse etymologia indicat, cum ab escu nominetur: Platyphylly glandem non nisi tertium bonitatis gradum obtinere liquet ex Theoph. Non est igitur Esculus Platyphyllos, vt putarunt Bellon. & Curtius. Arrisit Plinio quod Fagus, aut te phagum: Cur non & Esculus ab esca dicatur, & ab escu, vt voluit Seruius?

Ad hanc ipsam Dalech. iudicio posset referri Quercus peregrina seu Maugitanica Scalig. grandem ferens



fereus glandem, oblongam, sapore longè dulciore atque delicatiorē, quā Castanea: Nam & Hispani, qui arborem *Enzinam* vocant, glandes verò *Velutias*, has ob suauitatem sub cineribus tostas secundis mensis apponunt. Curtius putat à Plinio Latifoliam dictam. Horatius *rigidam Esculum* dixit. Gallis *Escuil*: It. *Ischio*: Romanis rusticis *Esculo*. Germanis & Septentrionalibus, ut putamus, incognita. Scribitur à nonnullis *Aesculus*. An de hac Cardan. Brasili arbor non magna *Enzinæ* similis, folium *Quercinum*: est autem *Enzina*, *Quercus* in Hispania genus minus, & non adeò rectum, cuius glandes ob suauitatem eduntur.

Hist. Lugd. duas figuras habet, nos marem tantum assumpsimus: feminam omisimus, quia nulla notabilis differentia quæ figura exprimi possit. Dalechampius sanè suam Phagum huc *Esculum*, ut ex iam dictis ex Hist. Lugd. apparet, eandem existimat, cum *Esculo Bellonii*: verum nondum id asserere possumus, cum nobis non constet, quæ sit Phagus Dalechampio, & *Esculus Bellonio*, qui præter iam citata, scribit *Esculum* & *Cerrum* dictam Volagnidam, semper virere. Alibi autem in Insula Lemno circa pagum Rapanidi est sylua *Esculi*, quæ non excinditur ad ignem, quia in ea colligitur *Velonia* Græcis, & Italis dicta: *Calycibus* & *Glandè* *Esculi* videntur pro adornandis corbis: *Velonia* non transportantur ex insula, reseruant pro suo usu. Item in Græcia & Anatolia præparant coria cum glandibus *Esculi* in Gallia autem cum corticibus *Quercus*: inter Hierosolimam & Damascum abundant montes virentibus *Esculis*. Et, in regione Trachonide provenit arbor Cocci & *Esculus*, atque dicta *Platyphyllos*, nunc *Velagnida*, ibi perit ea glans quia non alunt sues. Tandem, in monte inter Antiochiam, & Amanum montem provenit *Esculus* & *Ilex*.

Botanicis diligentibus committimus investigationem *Volagnidæ*, *Esculi Bellonii*, Phagi Dalechampii: nec non opinionis Casp. Bauh. apud Matthiolum scribentis, Phagum seu *Esculum* esse *Roboris* primum genus *Clusii*, de quo mox. Hist. Lugd. annotat præterea, Phagum Dalechampii non ubique in Italia provenire, sic nec in Gallia. Frequentem tamen in Apulia esse declarare Horatium. In eo Allobrogum tractu quem Rhodanus alluit, ad pagum Ambleneu nominatum, & lapidicinarum arena, gignitur, parva ab incolis appellata.

Observatione quoque digna sunt, quæ Coropius de Phago scripsit: Miror, inquit, in Galeno quòd Phagi glandem acerbam etiam faciat: cum & ea olim homines vixisse narretur, & hac etiam nunc tempestate à plurimis comedatur. Mirabilis etiam est tum eazæ, tum aliorum in hac arbore error, qui credunt Fagum Latinorum, eandem esse cum Phago Græcorum. Verum Plinius eos monere debebat, qui demonstravit, quàm distet Latinorum Fagus à Græcorum Phago. Deinde mirum eazam non animaduertisse, Plinium in Roborum generibus enumerandis Fagi nomen nusquam posuisse, cum tamen in iis Phagus Græcorum esset. Quòd autem pro Phago Græcorum nomen Latinorum posuerit, hoc vno solum indicio constare potest, quòd Fagi glandem omnium dulcissimam fecerit, quam laudem Phago Theophrast. ascripserat.

Fabule, inquit Theophrast. celebrant *enys* in lilio, supra tumulum lili. *enys* in aqua permanere potest incorrupta, madefactaque melior reddi videtur. Fructum reddit Autumno. *Esculus* similiter provenit, (inquit Plin. quod de Tom. I.

*Quercu Colum.*) sicuti *Nux*, cætera triennio ferior (Ceditur autem *nux* eodem autore, intra septimum annum) nimis (minis M.) morosa nascitur In quacunque terra seritur, nascitur è balano, sed non nisi *Esculi*, serobe dodrantali, interualis duorum pedum, sarritur leuiter, quater anno. Hoc pedamentum minime putrescit, cæsumque maxime fruticat, vel ut m. f. habet, fructificat: hoc est, ut Dal. explicat, quantò sepius cæditur, tantò fruticosior planta in Querceto resurgit. De hac sanè potissimum intelligendus Plinius videtur, cum ait: Glandes opes esse nunc quoque multarum gentium, etiam pace gaudentium, con-  
Panis.  
Cibus.  
Vfus.  
Inebriant.  
Materiei  
id est quæ peculiariter scripsit Theophrastus.

## ROBUR. I. CLVS.

Nunc Roboris differentias, ut à Clus. observata: & in historias relata, dicemus. Roborum prius Quercui nostrati admodum simile est, & robusta materie, sed humilior, & caudice magis contorto, frequentibusque ramorum alis ca-  
Descripti.  
Folia.  
Robosorum  
Melan-  
dryon.

## ROBUR II.

*Clus.* in Pannon. Robur primum siue latifolium, & in hist. post. secundum, Quercus ferè magnitudine in Austria, Styria & Pannonia crescens, strigosus est Quercu ligno duriore, folio minis amplo, altera parte nonnihil incano, exiguum glandem fert: incolæ à duritie *Steineidel* appellant, hung. *Kemenischer fa* nonnulli *Musfal*. Considerandum verò relinquimus, quantum hoc robur differat à nostra Quercu vulgari cum glandibus sine longis pediculis minoribus.

## ROBUR III. CLVS.

Descriptio.



Galla rosae.

Pillula.

Superantem nouem aut p'utibus Galls onustum collegerit Clus. inharebant ex gallae ipsi ramo-contiguae ferè, sed sine villo ordine, rotunda quidem & veluti Sphaerica figura conspicuae, sed aliquot tuberculis respersae rubent ex cum sunt recentes, praesertim ea parte quae Solem spectant. Inueniuntur & in huius folijs interdum pillulae iis similes, quae in nostratum Quercuum folijs nascuntur. Eius Gallam, maiorem vocant Lob. & Dodon.

De praecedentis Roboris fortè Galla annotat Clus. apud Garciam frequentia. Garcias scribit: lam-bos fructum Indicum similem esse magnis gallis recentibus, quae Lusitanis *Poma de Cnquo* nuncupantur, cum in odore, tum in colore. Nisi nos-ter Garcias gallas illas maiores, quae in Robore passim per Hispaniam & Lusitaniam nascuntur, intelligat per *Bugalhas grandes*, quid sibi velit, ignoret me fateor. Ceterum eas exiguae pillulae palmaria maiores nunquam vidi, colore pulcherrimo rubicantes dum recentes sunt, & odoratas. Vel fortè praegrandes illas iuglandes vult, quae vulgaribus duplo maiores sunt: quandoquidem vulgares suo operimento nudatas, *Bugallia* appellare videatur, cap. 20. de Macilib.

Locus.

T'ra ad  
Castell.

Multis Castellae veteris montibus frequens est, & plerumque numerosis ab eadem radice stolonibus fruticat. Harum ramis contortis, deinde filis & exsiccatas tadarum loco rustici vtuntur nonnullis veteris Castellae locis, praesertim circa S. Martinum del Castanhal.

## ROBUR IIII. CLVS.

Descriptio.

Folia.  
Galla.

In arborem excrescit pusillam Robur quartum Clusii, eius item folia minora sunt, duriora, angustioraque, nec adeò profundè incisa & sinuata, sed veluti aculeatis denticulis tantum terrata, infernè quidem candicantia, sed nulla mollanugine respersa. Frequentem etiam ista alit Gallam superiori similem, & tuberculis acutis



ornatam, pallidiorè tamen colore. Galla maior altera Lob. Tabern. Sagaciden tertiam vocat.

## ROBUR V. CLVS.



Priori ferè simile est, sed stolonibus brevioribus, & magis contortis, rugosiorèque cortice: gal-  
la item extremis ramulis nascuntur, aliis minoribus, laues & sine tuberculis, colore ex rufo nigricante, iis quae in Offic. venales reperiuntur perquam similes.

Nascitur vtrumque hoc genus in Lusitaniae solitudinibus itinere Vlyssiponen-  
Locu

ensi, non procul Eborae, & ab incolis *Carualla* nuncupatur.

## ROBUR VI. CLVS.

Sextum humile genus est, nec humanam altitudinem excedit, fruticis potius, quam arboris nomine donandum: tenuibus & lentis ramis, folijs secundo ferè similibus, sed minoribus, nec adeò sinuosis, minorum gallarum quae plerumque binæ, ternæ, aut plures simul nascuntur, admodum ferax.

Nascitur in Austria & Pannonia: nullum tamen eius nomen vulgare intellexi: sed rustici cum secundo confundunt.

## ROBUR VII. CLVS.

Inuenitur & septimum quoddam Roboris genus (nisi quis ad Quercum referre malit) inter Rio frio & Aldea Galega solo arenoso non procul Vlyssipone frequentissimum, adeò humile vt raro pedem magnitudine superet: ramuli tenues & flexi,






milis nomine ponit iconem Clusii, quercus humilis fructus specie, fionde Ilicis molliore Lob. *Baheiden*, Tabern. His omnibus Roboris differentiis Clus. vires eas quas Dioscor. ad *spv* in genere, refert, quas postea dicemus.

### CERRI GLANS, AEGILOPS ASPRIS

THEOPHR. PVTATA.



**A**D manum nobis cum sint illi ipsi Cerrici rami ex quibus Dalech. iconem suam [quam minus artificiosè pictor expressit] curauit delineandam, nouam damus figuram & descriptionem, quam possumus ex ipsius ramis maxime fidelem. Folia habet vulgaris quercus, sed ut longiora, ita in tenuiores altioresque lacinias diuisa, licet sit, ubi & foliis

ludat, si rectè iudicamus ex ramis, quos munere Dalech. habemus, quibus subinde folia propius ad quercus vulgaris accedunt, superius lucida, subius autem cineracea. Ceterum proximè ligno adherent, calycibus hispidis & fenticosis infidentibus, vnciam latis, glande tamen nondum matura, similibus planè calycibus quercus Burgundicæ echynato Calyce. An verò sit eadem cum Cero magno Calyce à Lobelio picta, ambigimus.

Equidem à Valerando Dourez Calycem glandis maximæ habemus, cuius magnitudinem non capiebat tabella nostra, quem maximam glandem è sinu suo protulisse ipsa cautitas indicat, ut quæ fescunciam in diametro habeat, paulò minus altum, quem vndique crassa, rigidaque creberrima

Tom. I.

spicula obuallât, præruptæ rupis fragmenti æmulum, non minùs cernis vncius in diametro habentem, internè hirsutum: habemus & minorem oculatam eo modo quo pingitur à du Choul & Lob. eiusdem magnitudinis quæ eorum figura. Sunt nobis etiam glandes nostris vulgaribus duplo aut triplo maiores. Cerrus, Galis ignota arbor, cui Cerrus eam ob causam nullum ab eis nomen positum est ac ne Italicæ quidem magna ex parte nota, ut ait Plin. In summam altitudinem crescit in Græciæ & Hetruræ syluis, incultis amica, rectissima, leuissima, & materiâ per longitudinem robustissima, ad sustinenda suspēdendaque edificia firmissima. folio est crasso, amplis incisuris laciniato. Sterilis non est, ut quidam putauerunt, sed est glande tristi, horrida, rotunda, ac velut obtusa, amarissima adeoque insuauis, ut eam præter sues, nullum animal attingat, ac ne ea quidem, si aliud pabulum habeant, ut & Theophrastus prodidit, qui addit caput mandentium dolore afficere, quod tamen de Haliphilæi glande perperam scripsit Plin. Calyx glandis eam ferè totam complexus, rigidus, latus, in cinereo candicantibus aculeis echinatus vallatusque est, non, ut Pin. ait, eeu Castaneæ, sunt enim hi crassiores & rigidiores multò. Glandes cerreas Calycibus suis contextas ex Cypro, Chio, aliisque Cerrorum fertilibus locis negociatores interdum conuehant, Gallones alii vocant, alii *Gallones*, *Valonia*. rotæa fissa supra corticem super est, toto.

Quercus *Aspræ* inquit Lob. in Aduers. sue præcellæ, dictæ Cerris Plinii, tristi prægrandi echinata glande: quæ itur Pefaro Romani publica via videntur cellissimæ, alibi minus peruiæ, nec valè nota hoc sic: cuius glans les prægrandes capulum habent echinatum, ambitu squamis præduris sibi mutuo incumbentibus, horridum, magnitudine ferè Echini marini, valde crassum: Folia maiora multò, eadem alioquin Quercus. Et in obseru. Valerandus Dourez, Inslunopoli Venetias rediens ramulos quercus duorum generum asportauit, quibus me donauit. Vterque inquit, quercui nostrati admodum assimilatur, folio & ligno, sed glandes ipsi ramo inharcent: Vni qui minor Calyx hispidus & molliter echinatus, illic subpar, alteri verò glandes prægrandes calycem habent echinatum, ambitu squamis præduris sibi mutuo incumbentibus horridum, valde crassum est. Folia maiora, eadem alioquin quercus. huius speciei obseruasse memini publica via qua itur Pefaro Romam &c: alibi minus obuias nec valde notas: è cuius tamen prægrandi & duro Calyce glandes non exerebat, sed claudebat, fortè quia immaturæ erant. huiusmodi folia & glandes liberalissimè communicauit Dalech. qui Cerrim Plinii me docuit.

Hæc Lob. quem non satis intelligimus. In Aduers. posuerat descriptionem Cerris vix in itinere Pefaro Romani: postea in Obs. repetit, eandem nomine Valerandi, apud quem viderit, ac eius quam vidit Romano itinere speciem facit: figuram apponit in Observ. sub hoc titulo, Cerris Plin. maiore glande Adu. 431. Hæc figura quæ diuersa à Dalech. Cerris figura: vix videtur differre ab altera, cui Lobel. titulum fecit Cerris Plin. minore glande, & Calyce molliùs echinato, nisi sit lusus naturæ, de quo nostra suspicio in descriptione: Cerris glans immatura, quam & Hist. Lugd. & ante hanc Lobel. etiam proposuit. Theophrast. montanis *Aspræ*: Macedonibus *domæ*: Gazæ Cerrus & nobis adhuc Cero & Calix Vallania, inquit Anguil. Hist. Lugd. *Aspræ*.

*Aegilops T-*  
*daorum.*

Dalechamp. Quercus 4. genus facit, item Aegilopa Idæorum, Asprin Macedonum, Cernum Latinorum. Cernus Plin. maiore glande Lob. qui & aliam immaturam habet, vti dñum. Cernis Plin. 1. frembd Eychbaum, Taber.


Vfus &  
Vices.

Collectio-  
nes ex ab-  
fessum.  
Partium  
debilitas.  
Contra  
scorpionem.

Vfus Calycum ad inficiendos atro colore pan-  
nos, Gallarum vice. Sed ex illis tinctura dilutior,  
fugacior, viliorque est. Cerni folia & cortex, &  
glans, authore Plin. siccant collectiones, supputa-  
tionēque fluxiones sistunt. Torpentes mem-  
brorum partes corroborat [ post vsum calefacien-  
tium & siccantium ] decoctum, eius fotu: cui &  
insidere expedit, siccandis adstringendisque par-  
tibus. Radix Cerni aduersatur scorpionibus.

### GLANDIS MAGNVS CALYX.

Descript.



Inter fructus  
missos à Iaco-  
bo Gareto, [ in-  
quit Clus. Exot.  
lib. 2. cap. 16. ] ma-  
gnus erat glan-  
dis ille calyx, qui  
ab Anglis ex  
Windecaorn re-  
latus, Londino  
ad me mitteba-  
tur, etenim ses-  
cuncie latitudi-  
nem, & vncie  
profunditatem  
habebat, durus  
admodum, &  
multis squamis  
hispidis hisq;  
obtusis, ex cine-  
raceo fuscis, in-  
ternā parte ad

glandis vsque sedem breui, mollique & veluti  
sericea lanugine cineracci coloris fultus, cuius  
glans [ quæ mihi non conspecta ] ingens fuisse  
debut. Schedæ quæ hic calyx muolutus, adscri-  
ptum erat, Hic calyx glandis ex Wingandecaorn  
allatus fuit: propterea eum esse suspicabar, quem  
Virginensis Historiæ scriptor Ntanguimnenauf  
appellari tradit, cuiusque glandes ab incolis de-  
siccari, vt facilius conseruari possint, deinde a-  
quā macerari & decoqui, vt in cibum cedant cum  
piscebus vel carnibus, tam ministris quàm ipsis  
patribus familiās, vel variandi cibi gratiā, vel ob  
panis penuriam. Hæc Clusius: Nos nescimus in  
quibus hic calyx differat à nostro Valerandi,  
quem Icone expressum exhibemus, vel etiam ab  
eo, quem Lobelius exhibuit Obs. & Icon. Plant.  
cum inscriptione: Cernis glans immatura. Illius  
etiam glandis & calycis iconem, proposuerat Io-  
du Choulin suo libello de Quercu: Lectores his-  
toriam Cernis diligentius perpendant, quum ar-  
bores videbunt.

### QUERCUS BURGUNDICA, CA- LYCE HISPIDO.

An Haliphlaeos putata, & Cernus semina  
Dalechamp.

Descriptio  
glandis.

EX Burgundia glandes accepimus, non multo,  
vulgaribus maiores, aut certè pares, quamuis  
Calyx paulò maior, interius, echinatis spiculis



non rigidis ta-  
men, satique  
longis horret, eo  
modo, quo Cerni  
nobis descri-  
ptæ, atque ter-  
nas & quater-  
nas proximè  
iunctas, non  
tantum singula-  
res, extremitati  
ramulorum ad-  
hærentes: folia  
verò parum no-  
bis à vulgaribus  
differre apparet,  
nisi quòd acce-  
dere videantur  
ad colorem fo-  
liorum Quercus  
pediculo breui  
vel sine pedicu-

lis: nec malè hæc nobis conuenire videntur cum  
Haliphlaeos Cerro semina Dalech. & Clusii Cer-  
ro. Ne tamen fortè Lectores fallantur, addimus &  
Dalech. descriptionem.

Cernus semina, inquit, caudice assurgit proce-  
ro & recto, cortice subcæruleo, ramosa quidem,  
sed ramis latius non porrectis, nec extensis, vt  
Quercus, imò breuibus, nec ita in multos furcu-  
los diuisis, vt tota arbor aspectu tonse & putatæ  
similis sit. Folia habet Cerro similia, longiora,  
angustiora, & multò nigriora, per latera incisuris  
minutis latis sinuosa, interuallo quod iacet inter  
margines laciniarum minutis patente, infernè su-  
perneque subaspera, tactu duriora, hyeme deci-  
dua. Glandes profert alius glandiferis minores,  
excepta illice, non longas ac teretes, sed orbicu-  
latis, & aliquantum compressas, Cerni maris mo-  
do, ex Calycibus suis parum exertas, qui spinis  
longis, flauis, gracilibus, densis, hispidi sunt, Ca-  
lancarum instar, nec tamen ita rigidis, erectis-  
que, sed nec crassioribus spinarum mucronibus  
armati, vt in Cerro. Calyculi hi quibus continen-  
tur glandes bini plerumque ad singulos exortus,  
breuissimo pediculo ramis & stiraculis adhærent.  
Radicibus nititur validis, non recta deorsum a-  
ctis, sed vndique per transversum terram in ob-  
liquum comprehendentibus. Cortex ligno prop-  
rior cum in ramis, tum in caudice & radice vehe-  
menter adstringit: folia remissius: Glandium ca-  
lyces facultate cortici respondent. Glandes ve-  
hementius adstringunt & amaræ sunt: quare et-  
iam à porcis negliguntur, nisi aliud desit pabu-  
lum. Materia arbori robusta & dura.

Considerandum nunc An non eadem Clusii Aegilops  
Cerrusve sit: quæ occasio vt hic iungamus  
historiam integram ex Clusio: quercus, inquit,  
genus, non modò in Viennensi saltu, sed etiam in  
plurisque Pannoniæ syluis frequens est, eadem  
altitudine quæ vulgaris quercus, atque etiam cel-  
siore assurgens, caudice erectiore, corticēque  
crassiore, & magis scabro: folia frequentioribus  
incisuris, sed minutis altis diuisa habet quàm quercus,  
longioribus tenuioribusque pediculis in-  
herentia, ramulos breuiore, frequentibusque no-  
dis obritos, gemmas minores, & aliquot  
gracilibus foliolis ceu staminibus aut villis  
septas: Calyces breui, crassoque pediculo  
annotinis ramulis adnatos, non in foliorum  
alis, omnino hispidos, & molliter echinatos, in  
quibus glans est Querna, paulò breuiori & ob-  
tusiori



tusiori mictione prädita, quæ autumnio maturitatem consequitur. Adhærent interdum inter folia, multis veluti squamis constantia capita. Rustici & materiarum cæsores optimè eam à Quercu vulgaris distinguere norunt : illius materiem candidiorem laxioremque & ad opera minus aptam censentes. Huius Cerri crassiorum atque etiam tenuiorum ramorum, ac libralia interdum fragmenta in lapides commutata, atque adeo matrice in nigrum silicem conuersa [superficie tamen candida & friabili remanente] atque naturales ipsius ligni venas, oïbes reliquasque formas etiamnum retinentia, non modò eruta conspexit Clus. & Ill. Herois Dom. Balth. de Bathyan munere habuit, sed seipsum etiam legisse meminit in motis Eysenberg vulgò nùcupati & Pinkæ fluuio Pannoniæ imminenti acclui, quæ ad vallem Pinckathal ab eiusdem fluuii eam perluentis nomine nuncupatam, descensus est atque ad Austrum spectat. Obsitus olim is mons fuit [quemadmodum adhuc vicini] Quercus & Cerri arborum syluis, nunc verò vineis generosissimè vini feracibus.

Ceris Plin. minore glande & Calyce molliùs echinato Lob. & Quercus Iustinopoli allata à Valer. Doutes, calyce minore hispido eidem Clus. iudicio *αἰγὴν* Theophr. est. Cerrus Plin. Quercus genus cum calyce hispido. Quercus Pannonica latifolia & rectius Cerrus. Camér. Quercus 5. genus Dalech. apud Hist. Lugd. Haliphleæ Idæorum & Macedonum, Cerrus fœm. quorundam Italorum *Farnia*, Gallis *inçigita*, Latino nomine caret : quare Plin. Græcum semper usurpauit : Gaza ineptè *Salscorris* nomen finxit. An Cæsalp. Quercus ; in Hetruria *Farnia* : Dryos 4. genus Theophr. *Fagus*, *Farnia* in montibus, *Maced.* *Fagus* ; Cerris Plin. altera Taber. Dod. iconem habet Lobelii, nomine *Aegilopis*, minore glande, verum nihil vitrà. Cæsar Bauh. præter Cerrum magno calyce echinato, duas alias tradit his verbis : Quercus calyce echinato altera, Haliphleæ Idæorum & Macedonum, Cerris Plinii minore glande Lobelii, cuius lignum sæpè lapidescit : Huius etiam species in Burgundia reperitur minor, calyce valde hispido, quam apud fratrem Io. Bauhinum vidimus. Copiosè nascitur in Apennino, & in Burgundia quæ itur Vesuntio Dolam, vnde nobis Nobiliss. D. Frid. Cappler gubernator Insulæ oppidi, dicti *L'isle* attulit glandes & ramos, quos tamen iam priùs in pileo cuiusdam videramus. Glandes in hortum E. C. V. Virt. Montb. feri curauimus, spe bona nascituras. Proderunt quidem aliquot, aut vna solummodò remansit quæ pluribus annis à nobis culta tandem glandes protulit : sed non quales sperabamus. Fugerunt enim cum longo pediculo, & calyce non echinato. Nec propterea imaginamur nobis metamorphosim aliquam veteribus & recentioribus consuetam, sed suspicamur cum illis glandibus alias fuisse admixtas.

Sed nunc vires Quercu in genere recitemus. Quercus omnis (possis & dicere, omnis suis partibus) autore Dioscor. astringentior vim habet : *ἀπὸς τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς διανοίας* maximè verò astringit membranacea tunica, quæ corticem & caudicem ipsum interiacet : similiter & ea quæ circum glandem est sub putamine. Harum autem decoctum datur Celiacis, dysentericis & sanguinem excreantibus. Eadem trix fluxione laborantibus fœminis in *menstruis* subduntur. Sed & glandes eosdem effectus habent : vinam quæque cient, & si comedantur, capitis dolorem inducunt & status efficiunt : estate verò virus eiaculantium ictibus resistunt. Earum quoque & corticis decoctum contra toxica prodest, ex lacte vaccino potum. Cruda autem ac intrita inflammationes illa leniunt : cum auxungia verò suilla salsa, ad malignas duritias & malefica vlcera conueniunt. Hipp. ad suffocationem matricis in suffitu vitur foliis Quercus.

Eadem penè & Gal. confirmat, qui sic habet : paucis immutatis & additis aliis nouis. Quercus ( *δρυὸς* ) partes omnes, astringentis qualitatibus participes sunt. Sed plus tamen habet quæ in truncis cortice membrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calyculo, ea videlicet quæ fructus carnem conuulsit. Quamobrem ad profluuium muliebrem, & sanguinis exuptiones tum Dysenterias & diuturnos ventris fluxus commodè esse credūt. Maximè verò vtuntur eâ decoctâ. Valentius tamen astringunt Phagus & Illex ( *φύδος καὶ πελὶος* ) seu quis eas species *δρυὸς* velit, seu toto genere diuersas. Quin & folia harum plantarum tenella illa strenuè desiccare valent, minus autem quæ sunt alterius *δρυὸς*, nimirum quantò minus sortita sunt astringentis. Siquidem ego quandoque glutinasse me vulnus memini, securi infictum, cum nullum adesset ad manum medicamen præter ipsius Quercus folia : Terebam ea in læui petra, & vulnus omnemque vicium locum contexi. Eandem cum foliis vim habet & fructus *δρυὸς*, eoque medici nonnulli ad incipientes & ceteros vtuntur phlegmonas. Nam quæ iam vehementes sunt, astringentia respuunt. Desiccatur & astringit Quercus : exsiccandi autem paulò infra media, in genere scilicet eorum, quæ [ vt sic dicam ] tepida sunt. Medius cortex quercus inquit Matthiol. & tunica interior glandis, in aceto & aqua decoctus, & suprà ignem sacrum impositus, calorem tollit. Mulieres quæ vrinam difficulter reddunt, carbones Quercinos candentes aspergunt vino, & per infundibulum vapore in vterum recipiunt. Ad ardorem ventriculi fume folium quercinum, supra linguam ponas, humiditatem quæ exprimitur ex eo, deglutias, iuuabit.

Folia Quercus imposita feruidis pustulis, calorem compescunt & sanant. Mulieres quibus menstrua redundant, folia Querna decoquant in aqua, ac inferiores partes fomentant. Eodem modo & glandes administratæ iuant.

Folia & cortex ac calyces glandium sicci, sunt ad tertium vsque gradum adstringentes, vt vult Dod. eiusdem etiam temperamenti sunt glandes, nisi quod calidiores & minus astringentes. Cortex quercus in puluerem tritus, vtilis est puerulis aduersus vermes. Valet etiam ad gonorrhæam. Io. de Monte experimento glandes contulæ & potæ vrinam promouent : mirum quæ id vi, quæuis idem & Dioscor. dicat. Aqua è tenera ac recēs prorumpente Quercus fronde, aut immaturis glandibus destillata, iisdem donata facultatibus, quibus decoctum, pueris maximè in commemoratis affectibus exhibenda. Iocinoris defluxiones sistit, renem calculos comminuit si Matthiol. credimus & mulierum alba profluua cohibet.

Decoctum ligni Quercus inquit Lonici. mixtum cum vino & potum, vtile est sanguinem spuentibus : Aqua medio Maio ex iuuenis Quercus foliis destillata, & singulis vicibus ad drach. iij. pota medetur profluuii albo laborantibus, pulque excreantibus &c. Non probamus quod scribit propellere sanguinem concretum, nec etiam in punctiōibus lateralibus, nec in calculosis.

Toxica.  
Inflammationes.

Effusio  
matricis.  
lib. 6. simpl.  
med.

Vulnus.

Exsiccandi  
vulnus.

Phlegmonis  
cura.

Temperat.

Ignis facit.  
Vrina difficilis.

Ardor Ventriculi.

Feruida  
pustula.  
Menstrua  
superflua.

Vermes.

Vrinam et  
Aqua stil-  
lar. viii.

Hepatis  
defluxio.  
Menstrua  
alba.

*Dysenteria  
pestilens.  
Hautus  
Cyrena  
Vetien.*

Horstius ad Dysenteriam pestilentem præscribit aquam foliorum Quercus & decoctionem cupularum glandium cum Amygdalis. His qui à venenatis animantibus aut serpentibus morsu, vel ictu fuerint, quive venenum hauerunt, vel cantharidas biberunt, ita ut sanguinem mingant, glandes in puluerem redactas bibant, ac sentient opem, Tragi experimento.

*Sanguis  
Calculus.*

Quidam glandes aridas aduersus calculum exhibent, quo successu, nescimus. Quidam & ceruicisiam ex foliis Quercus parant, eaque vtuntur in Dysenteria pro singulari experimento, vt scriptum reliquit Placotomus de natura Cereuisiarum. Neque id ratione caret. Adstringendi enim facultate cum polleat, & aluum sistere, & omnis generis fluxiones suppressere potest, & prædictis plerisque affectionibus accommodari. Eodem teste, corroborat ventriculum, iuuat retentionem, prouocat vrinam, & quibusdam Dysuria laborantibus præsentem fert opem.

*Dysuria.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Sputum  
Sanguinis.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Dentium  
dolor.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

*Experi-  
mentum.*

Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisatu, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido os colluendum, quo experimento nos sæpè felicissimè vfos fuisse, etiam in inueteratis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

Scandula, tradente Plinio, è Robore aptissi-  
ma, mox è glandiferis aliis, Fagisque.

Goropius vir multæ lectionis, & admirabilis antiquitatum vestigator tradit Crucem Christi fuisse ex Quercu, non ex variis lignis, vt quidam prodidit. Ideo & alibi, Quercus lignum, vitæ appellat. Xerandiaz, eodem teste, in pede montis Vaccæ faces parant ex bacculis Quercinis excorticatis & contusis.

Nec prætereundum Alexand. Macedonis inuentum seruandæ niuis in scrobes, vbi ea sit, coniectus è Quercu ramis. Roboris cunei vsum ad emendandam Amygdalæ arborem vitiosam vide cap. de Amygdalo.

Sanè Quercini ligni vsum nemo facilè declararit. Vix enim aliud habeas in hoc nostro orbe perennius, quodque ad plures vsus necessarios accommodari possit ac soleat, vt ad ædificia, naues, & instrumenta tam ea quæ in terra quàm aquis vsui esse possunt. Fiunt & ex ea dolia vinaria cæteris omnibus præstantiora, immò vel sola ferè bona. Vetustate nigrescit. Si Quercu cinere murium aditus obtineantur, eos scabie confici ac deinde perire prodicunt.

Sed glandium vsus quoque præcipuus, quarum appellatione Vlpianus & Caius LC. ti censent omnes fructus contineri, vt Inglandes, Diinglandes, & Iugli, quoniam iis homines quondam vivebant. Qui frugibus repertis velcuntur, glande obtutuisse, prouerbio antiquo iactatur. Primum tamen homini cibum inde fuisse, inter omnes penè conuenit: Virgilian Culcæ.

Quercus ante data Cereis quàm semina visa  
Illi Vripleni mutauit sulcus aristas.

Et alibi:  
Heu magnum alterius frustra spectabis aceruum  
Cum siquæ famem siluis solabere Quercu.

Lucretius:  
Glandi ferat inter curabant corpora Quercus  
Et fedare sitim, fluuij fontesque ducunt.

Boetius:  
Nam qui longa negantibus  
Sulis semina credidit  
Eliis Cereis fide  
Quernas pergit ad arbores.

Theocrit. Schol.  
Et terram calcans propriam ne desero Quercus;  
Glandium cibus tam frequens olim Arcadibus  
fuit, referente Pausania, vt quo tempore monuit  
Apollo Lacedæmonios, ne Arcades bello lacerassent, hunc cillis victum è glandibus attribuerit.

Glande satur multà obfister tibi plurimum Arcas,  
Nostra tuu n. n. sunt contraria numina capiti.

Pelasgus cum regnare cœpisset, primum quidem rudes homines docuit tuguria facere, ad frigoris imbrumque & æstus incommoda arcenda. Ille idem tunicas conficere è pullis cois instituit. Ad hæc cum vulgò virente adhuc fronde herbisque ac radicibus, non modò non cibariis sed plerumque perniciosius vescerentur, salubriores multò glandes esse, neque omnes, sed quæ sola Phago legerentur persuasit. Hac ciues in oppido Chio oblesos vixisse tradit Cornelius Alexander, inquit Plinius. Quoniam verò glandium cibus tam vulgatus fuit Arcadibus, eos Plutarchus non ineptè Glandiphagos, *βανδαφάγος*, vocauit: apud eos voracitas in summa gloria fuit. Alii verò glandium collectores mercede conductos balanistas appellabant.

Legimus apud Strabonem, in Lusitania montanæ gentes glandibus victitasse. Quin & apud Plin. vt dicebamus, quosdam inopia frugum arefactis

*Scandula  
Coropius  
Cruis Christi  
si ex Quercu  
Lignum  
Facies  
Alexandra  
inuentum  
seruandæ  
niuis  
Emendandæ  
Amygd.  
Contra  
mures  
Glandium  
Silus.  
Diinglan-  
des.  
Ingli.  
Adag.  
Arcad.  
glandi-  
gi.  
Balanis*





quemadmodum & Cornario fuisse videtur, ei certe opus non fuisset descriptione illud explicare. Quod præterea Paulus pro Omphacitide Galla, glandium calycem non acceperit, hinc intelligere licet, quod alio in loco de gallis, non de glandibus differens, duo Gallarum genera constituit, alteram omphacitidem, alteram flauam, magnam, viribus inferiorem, Diosc. & Gal. auctores secutus, qui non aliter diuisere, nec vquam omphacitidem Gallam pro glandis calyce vsurpare, vtpote qui glandes & earum calyces à gallis planè diuersas esse scirent. Præterea Diosc. Gal. Paul. nusquam nomine *omphacitis* pro Galla vsi sunt, nisi vt adiectiuo iuncto cum substantiuo suo *omphacitis*. Quare in Paulo legendum *omphacitis* non *omphacitis*, vt contendit Corn. glandiumque calicem *omphacitis* à Græcis appellari, etsi Cornar. atque Andernacus, qui *omphacitis* vnam acerbam interpretatur, Græcæ linguæ peritissimi, non ita senserint. Verum, inquit Corn. Omphacitis immatura intelligi non potest, quum vtraque suo tempore immatura sit. At cum Diosc. & Gal. Omphacitidem Gallam dicunt, hac voce immaturam non intelligunt: etsi multi apud eosdem ita sint interpretati, sed quod *omphacitis* *omphacitis* *omphacitis*, inquit Gal. id est, quod admodum acerbum sit medicamentum, cum altera Galla minùs acerbæ qualitatis sit particeps, quam *omphacitis* à rusticis suis appellari scriptis: Qui verò *omphacitis* legendum censent vinogallam, & vinosam dicunt, quoniam minùs adstringens ad austeri vini lenitatem potius accedat.

Cornar. & Andernacus.

Vinogalla.

Nigra.

Tempus.

Galla Hemeris.

Delictus.

Galla, auctore Theophr. lib. 3. Hist. plant. tam nigra quam candida nascitur magna ex parte noctu confertim, & subito, [addegitur,] vnaque die aucta, excepta resinacea, si ab æstu occupetur marcescit, augerique amplius nequit: aliàs enim amplitudine maiore grandesceret: qua de causa earum aliquæ non maiores fabis euadunt. Nigra verò pluribus diebus viret, & quædam etiam magnitudinem Mali assequuntur. Nos æstate media gallas sæpè obseruauimus: Autumno. v. magna ex parte cadere. Quæ glandem ferunt, inquit Plinius omnes & gallam: alternisque annis glandem. Sed gallam Hemeris optimam, & coriis perficiendis aptissimam. Similem huic læfolia, sed leuiorem, multoque minùs probatam. Fert & nigram. Duo enim genera sunt. Hæc tingendis vtilior. Nascitur autem galla Sole de Geminis ex-eunte, erumpens noctu semper vniuersa. Crescit vno die candidior: & si æstu excepta est arescit protinus, neque ad iustum incrementum peruenit: hoc est, vt nucleum fabæ magnitudine habeat.

Comagena.

Prognostica ga gallis.

Nigra diutius viret, crescitque vt interdum mali compleat magnitudinem. Optima Comagena: deterrima ex Robore. Signum eius quod cauerna translucent.

Illud obseruatione dignum, quod de gallis multi produnt, & in hanc vsque diem à vulgo inter præfagia non spernenda habetur, quod quidam de maioribus tantum gallis perhibent. Nempe aiunt, quotannis aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram præfagire, si ex fracta, quæ prius integra fuerit non perforata euolet mulca, futuri belli: si prorepat vermiculus, annonæ penuriz: si currat araneus, pestilentium morborum præfagium esse. Neque cuiquam mirum videatur, in omnibus gallis ista nasci animalcula. Etenim, inquit Marth. huius rei sæpè periculum feci, nullamque vnquam sum consecutus, pule non perforatam, quæ ex tribus dictis ani-

malculis vnum intra se non contineret: nam foramine aperto, facili iudicari potest, iam animal exiisse. Et paucas inuenias Gallas absque foramine, nisi in ipsa arbore adhuc recentes. Dicamus igitur licet, Quercum & fructum & animal gignere. Cuius rei hand ignari Veteres illi patres, non sine causa quercum dixerunt Ioui summo esse dicatam. Quercus gallam, si per tempus in arbore permanferit, putrescere Albertus Magnus ait, atque in ea vermem procreari: qui, si in gallæ medio situs sit, futuram hyemem asperiores pronuntiat: leuem verò si circa margines. Eiusdem rei in eadem arbore aliud præfagium desumunt, vt si in altioribus ramis Erucæ telas contexerint, leuiorem: si in inferioribus, tigidiorem.

Appositè autem carpitur à Matthiolo Cornarius, quod suis in Galenorum Commentariis, tam primo, quam sexto libro de compositione medicamentorum secundum locos, acriter contendat nihil aliud Omphacitidem Gallam esse Dioscoridi & Galeno quam Calycem illum quo glandes in arboribus continentur, quem Recentiores Cupulam vocant. Statuaturque nunquam à sua opinione recedere nisi quis Pauli locum cap. de dysenteria, vbi Omphacidem dicit esse cauum illud ex quo glans quercina enascitur, planè corruptum esse docuerit: aut *omphacitis* ab eo substantivè pro eo quod Calycem Plinius dixit, & vulgo Cupula glandis vocatur, dictum ostendat.

Galla, *omphacitis* Græcis: Arab. *Hajj*, & *Hafus*: Germ. Synony Gallöpfel / Eychöpfel: Belg. Galnote / Eychens apfel / Gal. Noix de galle: Ital. Galla. Hesp. Galha, Agalla, ab. galla. Hung. Bugha.

Tabern. vndecim gallarum genera & variatæ figura expressit, ac nobis fortè non pauciora obseruata, vt regione, duritie, colore, ita figura quam maximè differentia. Gallæ officinarum Gallæ C. vulgarissimæ, rotundæ, leues, foraminulis perforatæ, læues, paucis interdum tuberculis asperatæ, interdum multis & angulosæ, magnitudine variæ, vnciam ample, quamuis magna ex parte infra subsistant, sunt etiam maiores, rotundæ, interdum turbinate ac pyriformes, colore ruffo, leui mallei ictu fragiles, intus vngue friabiles, cauernosæ, fungosæ, gustu adstringenti & acerbato. Hæ nulla icone indigere videbantur, quod passim essent obuiz, & Robori Clusi appictæ.

## 2. GALLÆ MAXIMÆ EXOTICÆ.

Vbi vbi tandem hæc, aut ex qua Glandifera enatæ, in littore maris mediterranei, etiamque Tyrreni & Adriatici nobis obseruatæ & reperiuntur, amplitudine sunt oui Gallinacæ, colore fulcæ, & fortè ascititio tali, leues ac læues secundum longitudinem, aliquot sulcis donatæ à Corona ad pediculum vsque seu crassum & amplū vestigium quo adhæsit, superna parte veluti corona redimitæ notabili à cæteris atque vulgaris differentia, eaque tamen non integrum circulum efficiente, nullis tuberculis asperatæ, nullis foraminulis peruiæ, substantia alioqui & sapore iam dictis similes, intus nigre.

## 3. GALLÆ PROVINCIALES ET ILLYRICÆ.

Quercus ramum [cuius nescimus:] habemus à Valer. Dourea cum gallis magnis amplitudine.





gofe: videntur quiddam medium habere inter gal-  
las & pillulas Quercus quodam fubftantiam: aut  
certè ramus decerpitur: cui nòdum effent ma-  
ture. Ramus videtur effe Roboris 3. Cluf. quod  
fuprà d. fcriptum. Galla maior 2. Lob. Gallie  
provinciales Dalech. Quæ hic adpictæ funt ab Hift.  
Lugd. proponunt Gallarum provincialium no-  
mine. Nò fimiles planè habemus, geminas, no-  
mine Gallarum ex Illyria: ponderofiores funt æ-  
cteris omnibus, vt oleas dicas: funt folide & du-  
riffimæ, tuberculatæ, pediculo craffo, colore fulcæ  
ac fubnigræ. Habemus & fingulares. Carent om-  
nes foraminibus An Omphacitis Diofc.


ta in præcedenti tabella pingitur ab Hift. Lugd.  
nomine Gallæ ex oriente. Camer. Gallam pingit a-  
pertam in qua veluti nucleum ostendit. Plerasque  
suprapositæ tabellæ & Tabern. pictas dedit.

**B**laſa illa punctata, oblonga & vtrinq; Deſcriptio  
leſſiles figura, quas in prædictæ tabellæ medio  
inter reliquis vides, **Lapides** Quercuum expri-  
munt, pumicosos planè, cruſtulos, intus canos,  
ſapore auſtero, & os contrahente, non ſine ama-  
ritudine: colore aliàs pullo: ſaltem vt in ſiccis no-  
ſtris iam dudum repositus apparet. His videtur  
ſimile, ſi non idem **Λάδευον** **καυοί** **θεοφραſτ.** **Thoepraſt.**  
hoc eſt, pumicci lapilli quos raro inueniunt: Sanè  
nihil impedit, quominus eoſdem dicamus. No-  
ſtris reperitur in Gallis.

*Pumicosi  
lapides  
Thoepraſt.*


*Pumiceæ*  
*lapides*  
*Theophr.*

GALLÆ ORIENTALES, ET ALIÆ DIVERSÆ.




**C**allarū hīc  
varias figu-  
ras vides: un-  
das, tubercula-  
tas multangulas,  
angulosas,  
scissiles, echina-  
tas, radiatas cor-  
nutas, vt octo  
vel nouem differe-  
ntias in hac vi-  
nica tabella ob-  
seruare liceat.  
Que echinatae  
sunt & radiatae,  
sicut & cornuta  
& angulose, vul-  
gus onupuntum  
sunt duriores:  
sed inferiores (ta-  
men) candidio-  
res, & ad ligni-  
alicius fungosi  
naturam acce-

dent. Vnicuilla quæ in imatellæ parte media  
confpicitur, tam pulchre æt caput Tauri à Theoph.  
memorata exprimit, vt nihil fuprà, durior quo-  
que eft cæteris: fed an nucleus Oliuari fimilis fit  
in hac, vt de fuis ait Theoph. afferre non aufimus.  
Nam quia vnicum & perelegans, integrum adhuc  
afferamus. In cæteris tamen quæ ei adiungitæ &  
cornua repræfentant cuiusdem nature videntur,  
nullus intus nucleus. Hiftor. Lugd. verò fequen-  
tes ptingit, titulo excrementi caput Tauri fimilis,  
quas & nos habemus, & interdum inter cæteras



Gallæ vulgaratæ apud infitiores reperiantur, quinque inferioribus proposita tabellâ substantiâ & naturâ similes, nisi quod minûs candidâ conspiciantur, & ad vitiditatem inclinent: Figuram tabellâ fatis benè exprimit: sed nostrâ prædictâ melius ad caput Tauri accedit. Gallis multò duriora sunt. Suprema quæ à dextris posita



**P**ediculo has  
vel extremi-  
tati ramusculi  
adhæsisse appa-  
ret, eoque satis  
crasso, & aliqua  
ex parte gallam  
complectente,

quasi & ipsa fluctuum in morem nascitur. Hist. Lugd. Gallæ ex Istria nomine pingit. Data nobis quoque pro gillis Istriacis Lugduni, ranulorum extremitatibus harentes, eo modo quo Clus. gallas quidam appuget & Rob. r. Rugose fecant, ac ex notis obis factis, quæ in Hist. Lugd. extant, quæ denud præter hic exhibemus. An Galla Roboris s. Clus. Gallæ minor Lob.

**E**thas interdum Descriptio  
inuenias inter 15.  
ceteras Gallas, qui-  
bus vt substantia &  
natura, conſimiles,  
ita figura pluri-  
mum differentes.

Fungi speciem quamdam representant: huius generis plures habemus diuersarum figurarum: aliquas supernè vmbilicatas, circa media lacinatas, vt hic appittæ: alias vtrinque ventricosas: alias semiglobulû eximentes: alias ambipû pentagono, alias radiatû ac stellato, atque ad eò tot varietates, quas omnes describere curiositatis potius esset quàm vtilitatis. Carent plerique foraminibus, argumento soliditatis maioris, quàm gallæ vulgares: suntque duriores & quodammodo ad ligneam naturam accedentes. Pingit Hist. Lugd. supra scripto nomine. Pingit & Cæmer. vt videntur, sub ramo florente quercus. Tabern. earundem diuersas formas pingit sub n<sup>o</sup> 12. 13. 14. fortè & primus sub n<sup>o</sup> 9. & 10.

Habemus & minimas, piffo vix maiores plures, *Galla nana*, *semina*, *semina*, *semina*, duriusculas non forminatas, laeves, nullis tuberculis inaequales Videntur ad illiricas accedere naturâ, si pondus responderet. Fortè naturâ est <sup>16</sup>. lufus, aut ob alimenti penuriam remanferunt nana.

## GALLÆ INDICÆ.

Descript.  
17

18

rat, sacerdotalem aliquomodo pileum exprimens, in qua quatuor veluti cornua sursum tendentia, vt in Tubulo marino, internâ parte ferè cinerea, in medio eminet pars quatuor eam angulis donata, aliter sitis quam cornua: ea pars superat etiam quatuor angulos, ei in medio veluti umbilicus. Tota ex luteo lucet, ab inferiore etiam parte tota lucent cornua, inter quæ apparet pars ligni, cui adhaerit, intus cana. Tertia ex albo fluens, magnitudine, qua pingitur, inæqualibus lateribus, tuberculis quamplurimis, Fragorum seminibus ferè similibus, multò crebrioribus, quam icon exprinat. Vltima etiam fluens, dura, lignosa, tota foraminulenta. Has quatuor illi. Pinc. pilla res. tuant.

GALLA UMBILICATA: ITEM  
QUERCUS EXCREMENTVM VIL-  
losum, vel potius Muscosum.

Descript.



mine: nostrem enim corruptit oscitantia vel malitia sculptoris, vt & plures alias; tam veteratiorè hodie res aguntur. Colore sunt pullo ac nigro, carent foraminulis. Umbilici corona vel crista rigi-

Inter Exotica Ill. C. V. Viri. reperi anno 1608. Stutgardie, ramulum hunc ligneum eâ magnitudine, qua in hac tabella sub numero 1. pingitur, in ali. quot partes diuisum, in quorû extremitatibus globuli ex cinereo nigricantes, inæquales, sub- stantiâ gallarum, sicuti & formâ, sapor nullus. Illa verò quæ numero 2. exprimitur, pulchra sanè e-

diffima. Pinxit & Camer. & fortè etiam Tabern. numero 10. Excrementum muscosum, quia eadem hac tabella parte supernâ continebatur, hic describi par est. Bedeguar, quale in Rosis conspicitur, sed facie quodammodo refert, sed villis paulò rigidioribus, fuscis ac subnigris in siccis, furculum immediatè complectens, circa media durum: habitu hispidio ac muscoso: musci fibris multifidis. Folia Quercus cuius ramo adhæret, similia sunt Quercui vulgari, infernè ad basin glandis rudimentum & copula, cum breuissimo & crasso- pediculo ramo adhæreat, quod malè expressit sculptor, & penitissimi pictoris diligentiam corrupit. Lob. vocat Bedeguaris effigie excrementum spongiosum & muscosum, siue Bedeguar è Quercu: quod pictum exhibet à se in Romano agro collectum. Nostrum est ex plantis Valer. Dourez, Pillulæ capillatæ nomine pictum ab Hist. Lugd. quamuis à Lob. icone nonnihil differat: idem tamen putamus. An hæc sint etiam *les nodules* ex Theophrast. Rotundum quiddam cum villis inutile: verno tamen tempore mellei succi? Audiamus Gallarum vires.

Dioscorides. Vtraque Galla, [nempe Omphacitis, quæ melior & efficacior: & leuis ac perforata,] vehementer adtingit. Tertia ex crescentia in carne, gingiuarum & Columellæ fluxiones, insuperque oris vlcuscula cohibent. Quod verò in earum medio est, dentium cauernis inditum, dolores sedat. Cremata carbonibus, donec igne candeat, & vino, aceto, aut etiam aceto sallo extincta, sanguinis sistendi vim asciunt. Decoctum earum ad infellus efficax est, contra vulvarum prolapsus & fluxiones. Capillos denigrant aceto aut aqua macerata. Colicis & Dysentericis in aqua aut vino trite seu illata, seu bibite conueniunt: nec non & oblongis addita, aut tota in aqua prius cocta, in qua nonnihil excoquendum sit eorum, quæ his affectibus conferant. In lumina, vbi quid adstringere, sistere, aut siccare opus est, vlturparæ sunt.

Ruellia verba Diosc. *de vltura* vltur, vertit nucleum. Sanè nimis licentiosè. Intelligit autem Diosc. internam partem, vel potius centrum & corculum seu medullatum, quod reliqua galla adtingentius est: idèque reprimendis fluxionibus à cuius dentium aptius & efficacius. Nec fuit cur hic Dalech. vel Hist. Lugd. Ruellio patrocinetur dicens, eum in Plin. auctorem habuisse, qui nucleum ferri pro Chalybe dixit. Egregiam sanè verò collationem. Quis vel semestris Grammaticus nescit illud à Plinio *ut mæcedonibus* dictum? In Galla propriè nucleus non est: Idem tamen Plinius, vt dicebamus ait, in iis quæ caput Tauri imitantur, inesse nucleum Olui similem: quod dixerat etiam Theophr. & in vitibus, Gallarum nucleum dicit: Idem impropiè videtur dicere Robur gignere nucleos quos.

Sic autem ille ait de gallarum viribus: Vis omni n. similis. Optima Comagena. Ex crescentia in corpore tollit. Profunt gingiuis, Vix, oris exulcerationi. Cremata & in vino extincta, colicis, Dysentericis illuntur. Paronychiis ex mulle, & vnguib. scabris, pterygiis, vlcibus manantibus, condylomatibus, vlcibus quæ Phagedænica vocantur. In vino autem decocta auribus instillantur, oculis illuntur: a lueris eruptiones & panos cum aceto. Nucleus comman- ducatus dentium dolorem sedat: item intertrigines & ambusta. Immatura ex his ex aceto pota, Lienem consumunt. Eadem cremata, & aceto sallo extincta, menses sistunt, vuluæque proci- dentes



dentes foti. Omnes Capillos denigrant.

Gallarum vires memoria prodidit Galenus l. 7. simpl. med. faciaquens. Gallæ omphacitis admodum acerbum est medicamen, pleraque sui parte essentia terrena & frigida: perquam delicata, & fluxiones repellit: ad hæc constringit, contrahitque partes laxas, & languidas, omniumque fluxionum affectibus strenue resistit. Esto igitur tertii in deliccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flauilla, & magna laxaque, & ipsa desiccata quidem, sed tantò minus, quantò minus acerba qualitas est particeps. Coctatque per se ac deinde trita, cataplasma est non intrenuum sedis phlegmonarum ac procidentiarum. Porro coquenda est, si modica opus sit astrictione, in aqua: si vehementiore in vino. Ac si augere insuper adstrictionem sit opus, vino vtare austeriori. Denique Gallæ combustæ sanguinem repimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vitione allumunt, suntque iis quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate.

Galla Auicennæ est frigida in primo gradu, sicca in secundo: Dodonæo frigida & sicca ad tertium vique gradum.

Lucius vt Fest. Pompeius attestatur, cum gallam fore bibendam pronuntiabat, parsimonia vtendum esse, ventremque coarctandum, nec gulæ indulgendum esse inuenerat.

Ex omphacitide galla, calcantho, gummi & vino Matthiolus atramentum scriptorium parare docet hoc modo. Sumito gallarum crassissimulè contritarum vnc. v. calcanthi Romani vnc. iij. Gummi Arab. vnc. ij. Salis drach. j. coniiciantur hæc omnia in fictili vitreo circulo: superfundito vini albi potentis feruentisq. lib. v. & vnc. iij. ocluso valis ore, quindecim dies insolato, vel post vaporarii fornacem hieme reposito, miscetorque quotidie rudicula.

Restat tandem vt ea, quæ de viribus & vsu gallarum Lonicus annotauit, subiungamus: Gallæ ait, adstringunt, glutinant, tingunt. Vis & facultas eis qualis quercui. Flos gallarum, aquæ sanguinaræ immixtus, & naribus instillatus, sistit hæmorrhagiam. Medium in gallis contentum excavato denti applicatum, dolorem eius lenit. Gallæ in puluerem redactæ, sordidique vicribus insperstæ, putredinem arcet, vulneraque mundificant. Gallas si cum ouorum albuminibus commisceas ac emplastrum conficias, inferiorique ventri superponas, aluum sistit. Vehementer etiam pulvis cum aqua pluuiali bibitus fluxilem constipat ventem. Cui vomitus frequentem molestiam parit. is in aceto & pluuiali aqua gallas coquet, eoque decocto linteum aut pannum imbibere permittet, vtiliter autem imbibitum ventriculo linteum admouebit. quæ mulier nimios menses patitur, in aqua pluuiali gallas coquat, cui succi plantaginis addat, & cum bombacæ suppositorium formet, vuluæque indat, sistit enim hæc menses, & mirè prodest. Hæmorrhagiæ laboranti gallæ miscetur cum succo plantaginis aut Buræ Pastoris, imbununt in hisce succis pileporini, supra interdum, linteolum, naribusque imponuntur. Emplastrum etiam ex gallis cum albumine oui temporibus applicatum, inhibet fluxum narium. Pulvis gallarum vulneribus inditus, manentem adhuc sanguinem ita comprimit, vt non sit opus illa fuere. Tu qui nigros effices capillos, gallas recipito crassas, nigras,

Tom. I.

non oculatas, quas in oleo coquito: facta coctione oleum cocturæ separo, gallasque soli exponito, donec siccatæ sint, quo facto hunc puluerem cum aqua pluuiæ iterum coquito, crinesque decoctione lauito.

### GALLÆ SIMILE EXCREMENTVM QUINQVANGVLVM BRASILIANYM.

Mittebant (inquit Clus. Exor. lib. 2. cap. 25.) pro fructu decimo, qui delatus è Brasilia Descrip: dicebatur: sed arboris excrementum aliquid instar gallæ veriùs nuncupandum censebam, quàm fructum: simili enim materia constare videbatur: & gallas similis penè formæ vidisse memini. Vn-  
ciâ autem minor erat, quinque angulis velut al-  
lis constans, supernâ parte aliquantulum protu-  
berans, & à centro ductas habebat quinque li-  
neas ad externos vsque angulos: infernâ longior  
erat, sensim gracilescens usque ad sedem, quâ-  
ramo inhesisse videbatur.

### PILVLÆ FOLIORVM QVERCVS.



Quercus hic Descripti-  
pilulas da-  
mus, parte ta-  
bellæ inferiori:  
superior enim  
Quercus ulos  
ostendit, ad ca-  
pus huius inin-  
referendus. Hæ  
autem pilulæ ma-  
gnæ ex parte a-  
ueris tohis, hoc  
est, parti terram  
spectanti adra-  
cuntur, plures  
interdum vnico  
hærentes folio  
proximè & im-  
mediatè, læues,  
fungosæ, pallidæ,  
sapore subacido  
& astringente.

Gallæ non duri-  
tiam acquirunt sed molles & fungosæ manent:  
exquisitè rotundæ sunt magna ex parte, & exigua  
gallam rarè æquantes, vetustatèque corrugantur.  
Et in his, si autumnus calidior fuerit, vermiculi  
nascuntur qui postmodum in culicellos transi-  
gurantur. Nascuntur autem & ipsæ pilulæ magna  
ex parte autumno aduentante, ac post primos au-  
tumni imbres. Arida & inueteratæ digitis faci-  
lè in puluerem atteruntur, quibus notis facilè à  
gallis distinguuntur, ne quis eadem cum iis putet.  
Videntur autem ex ipse esse, quas Theophrast. An pilula  
in foliorum tergo candicantes, translucidas [sic] aquosa  
[sic] aquosas, [quales & hæc nostræ in principio  
sunt] quæ indium molles sunt, in quibus & calices  
nascuntur. Sed, quod ait, maturescentes in modum  
parvæ & lævis gallæ, indurari, id in nostris non  
obseruauimus, fortè quia in his regionibus, vt  
alibi, non perfectè maturantur. An pilulæ Ono-  
cicidæ Galeni? Ita sanè Tragus iudicat. Gallis si-  
miles Pilulæ Cordo & Hist. Lugd. Gallæ in folio  
quercus nascens. quidam & Gallöpfel vt Mat-  
Theophr.

Pilula Or-  
nocicida  
Gali.

H

thiol. & Taber. & Gallas vocant: differunt tamen  
multum à propriè dictis gallis: neque hæc vitillæ  
in mediis foliis nascuntur.

Ryffius non sine notâ ignorantiz pro gillis  
pingit pilulas in foliis Quercûs, cui glandes sine  
pediculis. Dodon. ait in Belgio satis frequentes.  
Lonicerus pingit & vocat gallas affinas.

Tempus &  
Locus .

Menſe October corrugant incipiunt : Septem-  
bris integræ adhuc ſunt, quales ſæpè & prope  
Monteb. Auguſt. in Ducatu Virtembergico  
& in Burgundia obſeruamus, Turnerus vidit  
non tantum in Italia, ſed & copioſè in Friſia O-  
rientali in ſyluola non procul Auriao. Is ſub vi-  
ro perdocto relatum teſtatur. Anno 1557. magnam  
eiſmodi pilularum copiam ſuper ſolis Querquis  
inuenit in boreali Anglia plaga, præſertim ve-  
ro circa Hallfaxiam. Idem expertum eſt atrite in-  
ſeruit atramento faciendo. Eæ adſcriptionis ar-  
gumento quoque, iſſdem viribus quibus Gallæ  
prædita ſunt eſſe, non malè quæ dixerit: quan-  
quam eæ nullius momenti eſſe dicat Trauus.

Plinius sanè scribit Roboris pilulas ex adipè  
nifino Alopecias capillo replere. Dodon. ait, ad fac-  
cultatem gallarum accedere, sed ipsis multò infir-  
miores ac minùs efficaces. Schwyenckfeldio ad  
tinctoria sum à tinctoribus colliguntur.

COC CVS QVERCVVM.

### Description

**N**ascitur quoque in Cilicia Quercubus Coc-  
culus Cochlearum exitum similitudine, quod  
illius regionis mulieres ore legunt, inquit Diosco-  
lib. 4. Quem tamen locum Marcellus corruptum  
esse putat, & pro *in tunc* legendum *in ore* *in ore*,  
quod illius regionis mulieres distortum Cuch, di-  
stortum esse legunt. Nos aliam coniecturam in  
eum locum proposuimus in præcedentibus. Sunt  
qui volunt apud Diosco. pro *in tunc* legendum *in ore*.  
Matthiolus tamen assensu se vidisse vt postea dixi-  
mus, qui intelligant excrementa rubella à Lobel.  
obseruata.

EXCREMENTVM QVERCVVM  
FVNGOSVM.

**Q**uercum vulgariū frondibus Vernō tempore etiam flos pediculo adnascuntur excrementis fungosa, rara, laxa, fricueta, acida, insigniter adstringentia. Magnitudo nucis Iuglandis aut citreæ, superficiei æquali, tuberosa, pulcherrimo rubore plurimum ornata, lappete parte albida, aut pomorum instar luteola. In quibus temporis progressu vermuculi gignuntur, qui in suis multas cellulās callofas sibi pro domiciulis effingunt. Iuueniuntur Maio in Quercubus glandes cum longis pediculis ferentibus. Easdem & Tragus notauit his verbis : *Quædam Quercus verò rotundas & fungosæ boletisque similes ferunt pilulas, acerbâ humiditate plenas, in quibus vermes creantur, quæ in culices tandem abeunt.* Lobel. depingit hoc titulo : *Quercus vulgaris cum suis excrementis fungosis.* Dodon. ponit nomine Quercus. An forte hæc sint Onocideæ Gal. An *quercus* iuxta Theophrastum, y. 6. vultus Theophrasti de quibus supra. An verdè hæc Galla Theoph. quæ malè compleat magnitudinem, cui & colore similis? An Plin. Pilule natæ in alis tamorum, corpore non pediculo adherentes, candantes ymbilicis, &c. vide supra.

Onocicida.  
An psylla  
versicolore.  
Theoph.

NVCVLÆ FACIÆ ALBVM QVER-  
CVS EXCREMENTVM.

**N**on patum venustum Quercus excrementum  
nucis faciem ostentans offendens (locus  
non succurrit) summitati fereuli foliis caren-  
tibus infidentem, figura ex rotundo compressum, sed  
inferne sessilem, superne umbilicatum, cuticula  
albida, ac lississima, etiamque splendente ob-  
duntia, sub qua spadicem visitur, reliqua sub-  
stantia ad nucis myrticæ callum accedit, nisi  
quod albicet magis: extrema superficies multis fero-  
briulis & tuberculis inæqualis est. Sapor adstringens.

EXCREMENTVM LANATVM  
QVERCVVM.

[illegible]

QVERCVVM CAPITVLA  
SQVAMMATA.

Scabiosa aut. lxx capitulo maiusculis similia  
Sed nascitur tunc Quercuum ramis tam extremis  
quam ad latera, denso squamularum membra-  
nearum & sub riturum aggestu compactis, co-  
lore alius fusciniereo, alius fuluo aut rufo, brevis-  
simo pediculo adhaerentia, amplitudine vicia-  
li. Præter squamularum hunc glomerem nihil  
in se aliud continet. Nec quicquam aliud ex his  
ortur, sed ita in arbore conceptum est. Petrar-  
da inueniuntur. Bis tantum inuenimus & obfer-  
uamus, in vno ramo singulare, in altero gemina.  
Omnia est foliorum alia enascuntur. Talia describit  
& depingit Clus. in suo Certe: Nos paulo post I-  
conem proponemus, cum gemmis foraminulatis.  
An-  
Tha-  
alis arboribus & in Quercu [exemplis de his] nasci  
ait. Id inquit dicitur aut germinationem Verni  
temporis initio gignitur: Est globosus foliorum  
conceptus, inter præcedentem exortum siue ar-  
ticulum, & nouellam germinationem mediū.  
Gaza Amertum vertit, nouē & improprie: re-  
ctius Plin. Cachryū feruato Græco. Significat &  
Cachrys Libanotis frugifer semen ære, quod  
in mandando linguam exurit, de quo Dioscorid.  
Qua homonymia deceptus Plin. Cachryū Quer-  
cum & Cachryū Libanotis, res valde diuersas  
pro vna eademque re usurpat lib. 16. cap. 8. Nihil  
enim acris, nihil tunc vniuersis de uerbis in hac nostra  
Cachry.

QVERCVVM SQVAMÆ CANDI-  
DÆ CADYCAE

**P**raeterea non raro contingit, ut testis est Tra-  
gus, ut Querna folia Autumno appropin-  
quante



quante sinistro in latere rotundas & candidas ostendant squamulas easque caducas. Cumque hi sterculi (sic enim à rusticis ex squamula nominantur) apparent spem omnes concipiunt, copiosi sequenti anno glandium proueniunt.

### EXCREMENTVM QVERCVS TYBEROSVM.

**L**igna penè duritie & veluti ex plurimis baculis & vuarum specie aggestum excrementum bis tantum in quercu offendimus, vtrumque cauum & cauernosum, sed minus: maius minutissimis & rigidis spinulis hispidum, colore ex rubro in pullum ac fuscum tendente, plusculis foraminibus à vermiculis vtrumque pertusum. Sapor astringens. Nonnulli ad Theophrasti *συγγρηγμένους*, hoc est quiddam Mori seu Sycamini speciem gerens referunt.

### GEMMÆ FORAMINVLATÆ FOLII QVERCVS.



**N**on curiositas est has à nobis describi. Nihil aspectu pulchrius: minutissimæ ac innumera propemodum foliorum dorso adherent [studio agglutinatæ dicas,] veluti minutissime sphaerulae corollares compressæ, in medio pertusæ sed non ex toto, colore ex Byssino in fuluum nitente, eleganter splendicantes, ac si holoserico subtilissimo ob-

ductæ essent. Supra centum triginta in vno folio numeramus. Autumno obseuata in vulgari bus Quercubus prope Bessfordiam & alibi, ac etià in eodem ramo capitula squammata antè dicta.

### NODI SEV VERRUCÆ QVERCVVM.

**I**ntra quercuum corticem interdum inuenias, velut glandularum in homine *αἰδολογας*, lignosos nodos atque verrucas materie prorsus querna, crispa & eleganti, proprio cortice, præter quercinum, eoque rubro atque fungoso obductas, magnitudine & figura varias. Vidimus pugni magnitudine, item avellanae, ac inter has medias. Aliquando etiam foras prominent, haud secus ac verrucæ in manibus, alimenti argumento luxuriantis.


### QVERCVS ALBVMEN.

**S**caliger in lib. de plant. falsò Aristoteli attribuit, (vbi autem ille variè differit de analogia plantarum cum animalibus, illarumque partes cum Tom. I.

horum comparat) ait: omisit albumen in quercu quod cum animalis pingui potuit comparare. Quale autem illud sit, fatemur nondum nobis innotuisse.

### VVA QVERCINÆ.

**R**adicum Quercus fibris sub terra adnascitur & circumnascitur Iuglandis magnitudi-



ne, ex pluribus veluti acinis racematim coherentibus [vnde ei vva nomen] compacta, substantià durâ, intus rubentis seu ferruginei coloris, medullis nonnihil albo, sapore insigniter acerbis & astringentibus. Meminit Encelius per Ver, quo tempore vegeta est, colore foris esse purpureo, intus candido & quasi lactifero: Locus & Scribitque tem-

pore veris colligi debere, & sicari in vmbra, & deinde puluerisari: in æstate petire, & fieri quasi ligneam: ita à se obseruatum testatur. Cl. D. Schenckius Medicus apud Friburgenses celebr. ad nos misit his verbis: Vva Quercinæ vobis mitto radículas: amanuensius meus ante triennium casu, dum aliis herbis eruendis intentus esset, sub Quercu ex eiusdem radicibus in monte proximo, Orientem spectante, & vrbis vicino, nobis vulgo Burhalden dicto, effossas. Vva Quercinæ puluere nihil expertus loquor, inquit Encelius, præsentius in Dysenteria: & in omni fluxu sanguinis. Desperatos Dysentericos aliquot curavi illa vva quercina: meritò ergo digna est omni laude. Habet & alias virtutes, de quibus Medicis est cogitandum. Solenander testatur, succum vva quercinæ magno solatio illiniri Podagricis.

### FVNGVS VEL AGARICVS QVERCVS.

**N**ascitur etiam in Quercuum caudicibus Agaricus, quem aliquando vidisse meminimus colore in fusco subcinereo, [si probè meminimus] annoso Quercui adhatum. Hunc inquit Camer. recentem sale condiunt nonnulli indeq; loco calido reponunt: succum emanantem Podagricis illinunt. Sed ad id efficacior putatur Vva quercina, ut testatur Solenander. De Agarico quercuum copiosius agemus lib. 9. capit. de Larice.

Tradit du Choul quercus fungos producere, sed esse, qui parum præbent.

De Polypodio in quercu proueniente, quod aliis præfertur, alio in loco agemus, vbi eorum sententiam reprobabimus, qui plures faciunt.

quàm murale. Ibidem scribemus de Dryopteride à Quercu dicta.

### EXCREMENTVM QVERCVS PVRGANS.

Antiqui, inquit Lobel. cuiusdam è Quercu, instar Ledi pullulantis, meminertint excrementi, quod purgat & adstringit summopere.

### MVSCVS QVERCVVM, ET ALIA- RYM ARBORVM.

Descript.



Fert & Muscū Quercus, ne vel in minimo suo officio defuisse videatur. Hoc nomine significantur caniculus, ceterarumque arborum villi, exterius arboribus adherentes, aut ex iis pendentes, ex iis tamen enati, aut adnati sine radice, sine flore, sine semine. Nos exhibemus iconem, qualem Lobel. exhibuit hoc mūdo:

Quercus vulgaris cum glande & musco suo. Differunt capilli densitate, exilitate, figura & diuisura: Item odore. Graeci σφαγγιον σφαγγιον, σπλάγχνον, βύον, σάκον vocant. Soranus βύον ἀνομαστικόν, Sphagnos, siue Spacos, siue Bryon & in Gallia nascitur, inquit Plin. Sunt qui Splachnon & Hypon appellunt: Arabes l'fucam, quamquam Phauorinus φάουρον τὸ ἐστὶν τῆς δρυὸς γένος exponit. Diosc. βύον à quibusdam σάκον vocari tradit. Idem & Gal. & Paulus. Sed Plin. alibi, Sphagnon aliis Bryon dici ait: elsq̃ hoc nomine Canos arborum villos, quales in Quercu maximè videmus. Muscum aliqui Officinæ, Arabes secutæ, Vinea vocant. Aenech etiam Arab. Bohemicè Wedy: teste Matth. Germ. Baumtuff. De reliquis Musci differentiis, vt de terrestri diuersarum specierum, & de Marino tradetur in fine operis.

Locus. Muscus inuenitur in arboribus Cedro, Populo alba, aut Quercu.

Præstat verd Cedrinus: proximus huic populneus: quo in genere probatur, qui odoratiore est & candidus: nigricans autem deterior censetur: Diosc. Sphagnos in Cyrenaica prouincia teste Plin. maximè probatur: secundum locum obtinet Cyprus, tertium Phœnicus. Fertur & in Agypto nasci, quin & in Gallia, nec dubitauerim. In Quercu maximè videmus odore præstantes. Hæc Plin. Alii tamen Cedrinum, Lariceum & Piccum primæ nobilitatis dicunt, quod odoratissimi sint, Quernum omnium vilissimum pronunciant, præter eam qui faxis & vdis terræ glebis adnascitur, quam à natali atque parente suo muscus naturam mutuetur. Du Choul in lib. de Quercu scribit: In Quercu maximè annofa muscum gigni, in Gallia pullo suauis odore esse.

Diosc. Muscus adstringendi vim habet in caliditate ac frigiditate mediis, facitque decoctus infellu ad vulnæ affectus. Miscetur & vnguentis balaninis, oleis seu illitibus, propter eam, quæ prædictus est, spissandi vim. Est & ad fustum & acoporum medicamentorum præparationes vile & accommodatum. Serapio epotum vinum retulit, in quo diebus aliquot Vinea maduerit, alium somnum inducere, ventriculum roborare vomitiones compescere, & alium sistere. Ad hæc Muscus, vt inquit Auic. vtiliter inter cordis medicamenta inseritur, quodd odoris fragrantia animi defectus iuuat. Ad Dysenteriam, inquit Matth. & profusum ventris coquatur muscus arboreus in aqua aut vino rubro & detur in potu. Pulsus musci Querni exsiccatu assumptis cum ouo impedit ab abortu. In vino acerbo coctus, gargarisatus facit ad dolorem dentium, & relaxatam vaulam. Muscum cohibere sanguinem obseruatum est in vris, qui campitum vulnerati fuerint, sanguinem reprimunt musco. Quidam muscum Quercinum eligunt, macerant in vino per noctem, & bibunt contra lictum: alii & in calculo probant.

Montepelienses ex Musco Quercino aut Ilicis alteriusve arboris resinam non ferentis, parant cantatissimum & præstantissimum illum puluerem Cyprium appellatum: quem etsi pro magno secreto merito habeant, à Clariss. tamen Illustriss. istius Acad. Professore & Medico quodam nobis communicatum, perlubenter ita communicabimus, vt faciliè à quouis industrio Pharmacopœo ad illorum imitationem parari possit. Ergo Muscum ætatis initio lectum & probè mundatum sacculo linteo tenuique inditum limpidio riualo vel torrenti immergunt per triduum, sepe pedibus conterunt, vt albescat: tum aqua fontana elotum & in vmbra exsiccatum aqua ros. & florum Citranguli per sex continnos dies irrorant, vel alternis vicibus, vel de singula triduo, incipientes ab aqua ros. his singulis diebus mouendo, ac rursum, vt prius siccat permitunt: Sed arcam habent seu capsam studio ad id factam, cratibus vel asienibus pertusis interstinctam: his muscum imponunt, & in imo supposito styrae & Benioino perfumant ter in die probè clausa arca ne quid euaporet: sed singulis vicibus mouent & mutant, donec fiat siccissimus, quod biduo aut triduo fieri aiunt. Tum in amplo mortario tundunt & setaceo cribrant, addendo ad quatuor huius pulueris libras, libram semis pollinis Santali muscatellini: quidam & albiissimi sacchari vncii. addiunt, vt albidior euadat. Hæc massa & veluti prima materia est pulueris Cyprii, odorata quidem sed longè præstantior futura si singulis libris addatur Cibeti & Moschi ana. drach. i. sem. ambræ griseæ scrup. i. ac probè in mortario agitentur & misceantur. Alii aliter parant, & præstantiorem additis ad singulas vncias. prioris materiz. Cibeti drach. i. Ambræ & Moschi ana. drach. f. Hunc magnatibus vendunt magno pretio. Prioris, aureo nummo singulas vncias. Nos adhuc optimum habemus à pluribus annis. Scimus & alios parandi modos Italorum & Hispanorum. Sed quilibet sua industria faciliè addere ac minuire potest. Res esse experimenti vt ceterarum terz omnium mixtionum. Ad hæmorrhagiam narium Muscum, qui crans hominum aëri expositis adnascitur, in subtilissimum pollinem redactum multo præstantiorem esse non raro expertum se scribit Hildanus. Ast ego non video cur præferat querno, cum verisimile sit quernum magis adstringere.



stringere, consideratâ præsertim naturâ Quercus & potissimum corticis.

### MELLEVS LIQVOR QVERCVS.

**C**elebratur Quercus ob melleum rorem [apud Theophrast. & Plinium ex autoritate Hermolai, ut ante indicatum] qui in eam cadit: verum pluris faciendâ Quercus ob prodeuntem & erumpentem liquorem, de quo Cordus c. de Oleomelle in Dioscor. lib. 1. cap. 37. dum inquit: Apud nos veris tempore è Betula & quercuum caudicibus sponte sua distillare humorem liquido melle crassiores, ad quem apes & id genus insecta conuolent, est enim gustu dulcis: sed nauseam gustantibus affert. Alliciuntur etus dulcedine agrestes pueri nonnunquam, sed postquam tanullum degustauerint, nausea & capitis dolore corripuntur. Qui superueniente vomitu paulo post soluitur. Porro hunc liquorem Oleomel esse nequam affirmamus, sed similem aliquem in nostro orbe genitum. De hoc liquore fortè poterit non male dici ex Virg. Eclog. 4.

Et dura Quercus sudabit roscida mella.

### DE VISCO QVERCVS ET CÆTERA- RVM ARBORVM.

**C**atillonem dicas Viscum, nutrimenti alieni præceptorem, ut quod non nisi arboribus innascitur, neque is omnibus promiscue: quoniam verò optimum in Quercubus, omnium Medicorum testimonio prouenit, libuit post quercum eius historiam proponere. Multis autem Stolonibus fruticat, cortice tectis coloris herbacei ac interdum flauescens, minimi digiti ferè crassitudine, nonnunquam crassior, quos intercipiunt geniculi, è quibus rami frequentes propagantur nodosi & ipsi, similemque sibi lobulem procreantes ramulorum bina opposita, Portulacæ foliorum forma, oblonga, per extremum rotunda ferè, coloris herbidi, crassa, nervis rectis, Plantaginis pentaneuræ modo secundum longitudinem donata, saporis subdulcis & subacris. Flores, tum ad genicula, tum extremis ramis hærent, parui, lutei, quadripartiti, qui in baccas abeunt conferim coaceruatas, vix crispæ supparæ, eodémque modo striatas, albicantes, pellucido lento ac tenaci liquore plenas, odore quodam grato, vinoso, sapore iucundo: quibus immersa sunt grana nigra, singulis singula, lata, compressa, cordis effigie. *hæc* Viscum dicitur Aristoteli, unde Latinis Viscum manasse putant. *hæc* Theophrast. quod nomen ait esse commune, *hæc* verò Arcadibus, *seris* Euboicis dici. *seris* uelutych. Aliud est *o* *hæc* siue *hæc* venenum: quod si Matthiol. considerasset non in eundem cum Plinio errorem impegisset, *hæc* venenum, viscum Chamæleonis albi exponens, quando ait in com. in Dioscor. ixia ut superius l. 3. retulimus, lenta & visci modo tenax est lachryma, quæ in chamæleonis albi radicibus agglutinata reperitur. Sed de hac re fusius suo loco. Arab. Debach. & Daba. h. & Hele, Lat. Viscus & Viscum: Viscum Quercinum Offic. Germ. Mistel / Eidenmistel, Affelber. Belg. Marentaden: Gal. Guy: It. Viscio, Pania: Hisp. Liga mordago: Mordago de robil: Boh. Melj. Vng. Fay gyongy. Dicitur & omnia sanans: & Germ. Weil alien schaden teste Trago: Angl. Mistel-tree. à Chaldeis, ut legitur Tom. I.

tur apud Alb. Magnum, dicitur Luperax, à Græcis Ephisena. Bind lyme quod ex acinis eius fit. Hoc est Viscum ut ait Plin. pennis alium tactu ligandis, iuglandis oleo [Glandis oleo. C.H.] subactum, cum libeat insidias moliti: de quo postea. Inde Adagialiter Plautus in Bacchidibus: Viscus merus vestra est blanditia: nempe ad me capendum illecebrâ, & tendicula. Idem eadem comedia: Tactus sum vehementer visco: cor stimulo foditur. Sunt qui aureum illum ramum, quem Aneas apud Virg. ex Sybilla præcepto ex ilice decerpit Viscum fuisse existimant: coniectura hercle non mala: nam & auri colore flauescit viscum, & ilici non raro innasci solet. Audiamus ipsa Virgil. verba: Aen. 6.

Acupe qua peragenda prius: Latet arbore opaca

Aureus & filius, & lento vimine ramus,  
Lunoni inferna dictus sacer: hunc tegit omnis  
Lucus, & obscurâ claudunt conualibus um-  
bra.

Sed non ante datur telluris operita subire,  
Auricomos quam quis decerpserit arbore sacro.

Et mox.

Discolor unde auri per ramos auri refulsit,  
Quale solet syluis brumali frigore Viscum  
Fronde vivere noua, quod non sua seminat  
arbus

Et croceâ factu reteres circumdare truncos

Talis erat species auri frondentis opaca

— Illice.

Non est omittenda in hoc frutice & Galliarum veteris illius auri admiratio, tradente Plinio lib. 16. capit. 44. Nihil, inquit, habent Druidæ (ita *viscum o.* *sim Gallia* *sacrisis-* *sum. N. l.* *Robur* *Druidarum* *magis* *Quercus à* *Deo electa* *putata.* *Omnia sa-* *nans.* *Viscum ma-* *gna Gene-* *ratione le-* *gebant* *Druides.* *Fecunda-* *tatis medi-* *cina.* *Contra ve-* *nerena.* *Duo con-* *trouersa.* *Viscum.* *Hyphear.* *Theophr.* *illustr.*) suos appellabant Magos) Viscum, & arbore in qua pignatur [si modò sit Robur] sacratius. Iam per se Roborum eligunt lucos: nec vlla sacra sine ea fronde faciunt, ut inde appellati quoque interpretatione Græcapossint Druidæ videri. Enimvero quicquid adnascatur illis, è cælo missum putant: signum esse electæ ab ipso Deo arboris. Est autem id rarum admodum inuentu, & repetitum magna religione petitur: & ante omnia sexta Luna, quæ principia mensium annorumque his facit, & sæculi post tricesimum annum, quia iam virum abundè habeat, nec sit sui dimidia: (etiam si non sit dimidia Dal.) Omnia sanantem appellantes suo vocabulo, sacrificiis epuli que ritè sub arbore præparatis, duos admovent candidi coloris Tauros, quorum cornua tunc primum vinciant. Sacerdos candida veste cultus arborem scandit. Falce aurea demittit. Candido id excipitur sago. Tu m. deinde victimas immolant, precantes ut suum donum Deus prosperum faciat his quibus dederit. Fecunditatem eo potò dari cuiusque animalis sterili arbitrantur, contraque venena omnia esse remediâ. Tanta Gentium in rebus frutulis pletunque religio est. Hæc Plin.

Theophrast. verò in Visci natura indaganda non parum se torfit. Duæ potissimæ circa id occurrunt difficultates: de differentiis, & de cœcè di modo. Fatetur Theophrast. Viscum non solum in Quercu prouenire, sed in aliis quoque arboribus: quin & alibi ait: Illex præter glandem fert & puniceum quoddam granum & Viscum atque Hyphear. Itaque contingit ipsam quatuor simul fructus ferre, duos proprios, totidemque alienos, Visci nimirum & Hyphearis. Ac Viscum quidem fert à Septentrione: à meridie Hyphear.

Hic vides eam Viscum & Hyphear apertis verbis inter se distinguere. At lib. 2. Caus. cap. 23. Longè aliter cantat: Viscum siue *hæc* nomen est.

se commune: Hyphear ab Arcadibus: Stelidem ab Euboicis appellari. Vnam esse naturam: diuersas habitudines, quatenus oritur in diuersis. Sed hoc ex aliorum sententia narrat: & addit *doctus*, videri, non esse. Subdit tamen, quasi suo nomine, Hyphear & Stelidem, in Abiete ac Pinu: Ixiam etiam in Quercu, Terebintho aliisque plurimis. Alii tamen [inquit] differre ista inter se volunt, non leui ratione: siquidem [si vera dicunt] non solum in congeneribus vnumquodque prædictorum nascitur, exempli gratia, in Abiete ac Pino: verum etiam in eadem arbore plura diuersis partibus innasci, hinc Stelidem vel Viscum, inde Hyphear. Præterea non solum formâ differre, sed & fructus dissimiles proferre. Atque id quidem passim obseruari posse, etiam in agris ac regionibus, quæ plurimum inter se distant. Item aliud Viscum folio esse perpetuo, aliud nequam, haud esse absurdum aut insolens: siquidem aliud semperiuuentibus, aliud frondem amittentibus innascitur. Ita euenire, vt in his careat alimentum, in illis habeat, quantum sit satis. Hanc enim causam esse perpetuæ aut deciduæ frondis. Sed hæc vtro se modo habeant, nihil facere ad eam questionem, quâ queritur, Cur Viscum ex semine in terram confito nasci nequeat?

Plinius omiſſa hac veltatione securè tradit, Visci tria esse genera: Namque [inquit] in Abiete ac Larice [Pinu Theophr.] Stelin dicit Eubœa nasci, Hyphear Arcadia: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno Ilyu, Terebintho, nec aliis arboribus adnasci, plerique. Copiosissimum in Quercu, quod Dryos Hyphear vocant. In omni arbore excepta Illice & Quercu, differtentiam facit odor vtriusque, & folium non iucundi odoris in vtroque Visco amarum & lentum. Hyphear ad saginanda pecora [scilicet *ovibus*] vtilius. Adiciunt discrimen, Viscum in his quæ folia amittant, & ipsi decidere: contra in hætere nato in æterna fronde. Altitudo eius non excedit cubitalem, semper fruticosi ac viridis. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. [Dalech. leg. taliquando verò fert.]

Quod si igitur ita est, vt Plin. tradit, & sentire videtur Theophrastus. Iam non etia tantum erant Visci genera, sed tot, in quot arborum generibus illud innascitur. At mulus, immò longè pluribus arborum speciebus innasci quàm vel à Theophr. vel Plinio proditum sit, infra patebit. Neque enim idem Viscum specie, quod è Quercu, & Illice, & Pyro, & Malo, & aliis prodit: sed tamen vt omnes Visci differentis ad duo summa genera reuocari possint, arborum suarum, quibus innascuntur naturam imitantia: dicemus aliud esse perpetui folium, aliud folio deciduo. Atque id, cui ab arboribus alimentum suppeditetur, perpetuam frondem agere: Adnatum verò arboribus quæ amittant folia: in iis quoque sentire dispendium. Quanquam hoc posterius non sit perpetuæ veritatis. Nam in nostris Malis & Pyris (id quod & Scal. notauit) hyemis sæuitia spoliatis, videmus ne vnum quidem amittere folium. Ratio est tenacitas ipsius succi, quæ suo lentore sibi ipsa sufficit. Vt fortasse illa distinctio contingens tantum sit, non perpetua. Quam verò Plin. adfert Maris & scemina distinctionem, idque à fructu ferendi aut non ferendi argumento, de eo non tam planè constat, nec quicquam de hac Theophr. Ipsa quoque Plin. verba dubia sunt, quando habet. Mas fertilis, femina sterilis. Aliquando non fert. Quid enim hoc est dicere: Sterilis est, & aliquando non fert? quod a-

liquando non fert, de eo præsupponitur & aliquando ferre: contingencia enim hic intelligitur. Quare non sterilis. Ergo nec illa quidem differentia pro vera ac perpetua stabit. Ac ne quidem si cum Dalecham. legamus: aliquando verò fert. Nam quod aliquando fert, is nemo facile sterile diceret. Nisi quis fortè imaginari velit sterilem nasci in sterilibus arboribus (si modo exstet vlla in rerum natura) fructiferam verò in fructiferis. At quid arboris fructus, toto genere diffidens, ad fructum Visci? Contrarium potius rationabilius videtur, vt sterilis Viscus in fructifera arbore: & fructifer in sterili nascatur, ex ratione alimentum huc aut illuc abrepti. Sed horum neutrum apparet.

Quapropter restat eam tantum solam veram distinctionem Visci esse, quæ desumitur ab arboribus specie differentibus, quibus innascitur. Nam & differentes fructus ferre proditum est.

Scaliger sanè in Vascossa baccas eius aut virides, aut pallidas obseruatas sibi tradit. In Syria rubræ esse perhibentur, vbi etiam Oleas, in quibus nascitur, interficere creditur, vt dictum in Oleæ historia. Et fortè ad hoc respexere, qui apud Theophr. Viscum non solum formâ sed & fructu differre tradunt.

Sed quid Hyphear, quid Stelis? nunquid res distinctæ à Visco, an huius species & differentia, vt Plin. voluisse videtur, ac ipse etiam Theophrastus, Nam quod de eorum differentia affert, ex aliorum potius sententia narrat, quàm ex sua. Aut si res distinctæ sint, cur à tot seculis, à tot post Theophr. Authoribus non ab aliquo declaratur? Neotericorum sanè herbariorum, immò ne Grammaticorum vllus hæcenus nobis visus, qui non Hyphear & Stelidem sub Visco tanquam genere complexi sint. Quin & Theophr. in tota illa sua disputatione de generatione Visci, hunc saltem nominat, huic suas aptas rationes, non frivolas conieciurâ ipsum hunc pro genere ceterarum intellexisse. Imò apertè eandem omnibus naturam tribuisse videtur: quando de omnibus tribus dicitur: validum & nutrimento aptum, seu, vt ille ait, *ισχυρόν & τροφικόν*, & *ἰσχυρὸν ὡς τὸ τροφικόν*. Nam his & boues, & iumenta hoc pabulo post messem alit atque pinguescere. Aut si diuersa sunt, cur non de aliorum semine forma ac statu egit, sicut de Visci? Cur non aliis aliquis post tot secula prodit, qui illud ostenderit? Quare tantisper credamus, genere continere Viscum, Hyphear & Stelidem, aut specie, aut suæ arboris ratione differre, donec doctus & expertus aliquis doceat, vel nos vel posteritatem, quid sit Hyphear, quid item Stelis, & in qua re differant à Visco: maxime cum sciamus doctissimos etiam viros ad hanc nostram sententiam accessisse.

Plinius, nescimus an oliscitania memorie lapsus, an ignorantis, lib. 16. cap. 30. Buxo adscribit, quæ de Illice scripserat Theophr. quando ait Buxum à Septentrione Viscum, à Meridie Hyphear ferre.

Dioc. de Visco tradens, neque Hyphearis meminuit, neque Stelidis: sed simpliciter fruticem ait in Quercu [scilicet *ἐν δρυϊ*] nascentem, folia habentem Buxo similia: Additque gigni etiam in Malo, Pyro & plerisque aliis arboribus: atque etiam apud fruticum quorundam radices inueniri, & se vidisse testatur Brasiauolus frequenter, sed detestatus esse, & vice trunci furgi.

Scribit Bell. in. in ter montem Athos & urbem Ceres & Tricala nullam esse Quercum, in qua non proveniat Viscum, omnino diuersum ab eo, quod

Perpetui  
lium.  
Folio deci-  
duo.

Alia Fe-  
mina.

Plin. 20.

Pa-  
cal  
differe

Viscum

Plin.

Viscum  
radice

Viscum  
cur di-

a case



quod nascitur in Pomis, Pyris & aliis arboribus, nec vllum esse rusticum, qui non norit nominare Oxos: ex semine enim eos tenacissimum parare gluten. Optassemus sanè, Bellonius indicasset tantum differentiam Visci quercini illius à Viscò Pomorum nostratum. Qui n. in nostris regionibus nascitur, facie non videtur differre à Pomorum aut Piorum Viscò. Præcipua differentia virgum esse putatur, quæ præstantissimæ creduntur in Quercino.

Matthioli. id quod in Pinu & Abiete nascitur, quodque ut Plin. ait, Stelidem [Stelin] Euboea dicit, hyphear Arcadia, frequentissimum in Tridentino agro nasci testatur: sed hoc ad aucupia prorsus esse inutile. Quæ sanè notabilis est differentia ratio. Idem tradit id quod in Pinu, Abiete, Amygdalo, Malo, Piroque provenit, perpetua fronde viret. Id verò contra, quod Quercus, Robori & Castanæ innascitur, ut pote cui apperente hyeme omnia folia decidant. Huius rei causam addere conatur Theophrastus, tamen sententia non omni ex parte probanda videatur. Nam & Amygdali, & Pomi, & Pyri, quæ arbores frondem hyeme amittunt, in Italia perpetua frō de viet. testatur.

Apud Serap. legimus in monte Nafca ex arborē magna ibidem nascente, & ab eis Tarabella dicta, fieri Viscum. Eius ramos decorticatos macerant in aqua per duos menses, deinde ex fortiter confusis elici Viscum bonum. Hanc verò præparationē magis sibi placere ait Tragus quàm eam, quæ à Plinio traditur. Sed miramur quomodo probare & conferre poterit rem sibi incognitam: nec Serapionis verba nobis conveniunt videntur cum nostro Viscò. Cur non docet Tragus quæ sit ea arbor, quæ à Serap. vocatur Tarabella? Viscum quoque non dicitur Orcus, ut existimat Tragus inale Ruellium intelligens. Præterea lectores considerent, an Viscum fiat ex ligno, & non potius ac melius ex bacis: quamquam non prorsus negaverimus ex Viscifurculis quoque ea ratione, quæ ab Serap. præscribitur, Viscū confici posse, sed minus acivilius.

Posteris, ut Camer. Casp. Bauh. & nobis quoque Visci differentia observata: simplex, hoc est singularibus aut binis vel paucis bacis, & Viscum Polycoccò. Vtrūque pingit Camer. Nos unica nostra Fuchiani cōtēti cōsem, rati baccarū multitudinem, quam potius varietatem censemus, non novam mereri figuram. Equidem in eadem arborē, aliquando binis vel ternis, aliquando plurimis bacis racematim coagellatis Viscum observavimus.

Sed nova, nec sanè vulgaris velitatio ineunda de Visci crescendi modo. Theophrast. enim eumque secutus Plin. ac omnis aded antiquitas sine controuersia putavit Viscum nasci ex ipsius baccarum semine, per alios turdorum, palumbarum, cæterarumque id genus avium, postquam acinorum pulpa intra suos ventriculos concoxere: In qua sententia & Plautum fuisse certum est, quando ait:

*Ipsa sibi avium mortem creat:*

*Turdus exitium sibi cecat.*

Et

Nempe propter glutinum, quod ex eo fit: quo aues postea capiuntur. Inde etiam veteri proverbio in eos dictum, qui sibi ipsi extremi exitii sui causam præbent, & perditæ suæ fortunæ infœlices sūt fabri. Hos omnis ferè posteritas secuta, ut sit, secutè crediderunt rem ita se habere. Ast huic opinioni vir summus & acutissimus Scaliger se opposuit, multis nixus rationibus.

Sed lubet prius Theophrasti rationes audire, ne indicta causâ condemnatus videatur: idque summam tantum.

Mirandum, inquit, & absurdum atque impossibile videtur, quoddam plantas in aliis ontri plantis, in terra non posse, ut Viscum, Stelis atque Hyphear. Namque arbor ex qua Viscum oritur terræ vicem gerit. Tandem igitur magis ferè debuit, vera mater, ipsa scilicet terra, præsertim cum tam multum ac validum fructum pariat. At omne Viscum in arbore nascitur: nullum in terra. Admirationis etiam causam auget Quercus dutities: nempe rigiditas ligni, & succi vel copia vellentitudo & fecunditas insignis sūt Roboris dat significationē, non etiā in terra prodire posse: supponit autem Viscum ex semine velle prodire: non, si cut animalcula quæ ex putredine gignuntur in aliis arboribus, sed sibi propriam habere materiam, & quidem propriam actu secum afferente formam: tale namque semen est, ut ipsemet Scal. explicat. Multa præterea adducit exempla eorum quæ in aliis nascuntur quæ tamen & ipsa in terra apta sūt nasci, si semen ferant. Secus in his si non ferant, ut Cornua & similia. Voracem & validam esse plantam Visci, idcirco multum sibi deposcere cibi. Quapropter si qua in arbore oriatur, quæ minus comæctus habeat suppeditare: debile esse. Cur ergo, inquit, non oritur è terra? Valida enim queunt cogere terram in suas leges, vi sua eam disrumpere. Cogere igitur debuit Viscum terram, ut pareret sibi. Ideoque & in ea nasci, sicut Lupini semē: Quod si quis ligi dum dicit semen, id non tollit generationem sed differret: idēq; fieri ut quadam anno sequenti demū enascantur, sicut Beta. Nec metu esse à putrefactione, à quo periculo æquè longè absit ac ipsa Beta.

Sic itaque vltro citroque multis iactatus argumentis, quæ quilibet videre & legere potest lib. 2. cap. 23. tandem ostendit is non esse acquiescendum. Tantum enim abesse ut saluant quæstionem, ut etiam nun magis implicent. Sequi igitur capite vbi quæstionem solvere conatur, inde initium capiendum esse nos monet, unde nos ducit natura; id est, ex rei ipsius conditione. Has verò plantas esse eiusmodi, ut in aliis tantum sint, è quibus & solis & solæ enascuntur, sicut & animalia quædam non nisi in animalibus possint creari: quorum tamen origo lateat: harum verò plantarum generatio pateat. Cuius initium fiat à pastu avium, velut accidente ad generationem. Id etiam in aliis evanire. Picam nempe & alias aues quasdam, glandes reponere, obruere terra. Ita hic quoque, visci grano detracto confectoque in aluis, quod frigidissimum sit, casu quodam excerni ac deponi ab avibus supra arborem, in qua parum immutata stercoris vi & naturâ, illud pullulet & emergat. Mox pauli copia & naturæ fortè vi propria vires capere & incrementa. In Abiete autem & Pinu validissimum nasci. Naturam conclusita comparasse multarum rerum societatem & mutua beneficia, tum generationis, tum conservacionis. Non tamen dicendum esse, hanc generationem non nisi avium opere confici potuisse.

Hæc ferè Theophrasti. de generatione Visci. quod postremum tamen hic obiter resutandum. Nam cur aues non sint concausæ necessariæ semen vorantes, coquentes succum, emittentes semen cum stercore? Aut quis illuc stercus illud transferat calidum nisi auis? Aut quomodo semen ab arbore suscipiatur, quod non suscipiebat, nisi vi stercoris alterata? Illud enim frigidiss.

firmum dixit: quasi sua natura ineptum ad hanc generationem, nisi preparatio & alteratio ventriculi auis tanquam Coquus & porcor interueniat.

Sed Plinium audiamus, qui paucissimis rem expedit. Quædam, inquit, in terra gigni non possunt, & in arboribus nascuntur. Namque cum suam sedem non habeant, in aliena viuunt, sicut Viscum. Omnino autem satum villo [nullo] & ch. ] modo nascitur, nec nisi per alium auium redditum, maximè palumbis ac turdi. Hæc est natura, vt nisi maturatum in ventre auium non proueniat. Hæc Plin.

Nunc Scalig. audiendus, qui ex professo hanc Theophr. & Plin. opinionem magna subtilitate conuellit, in hunc modum. Veteres omnes sine controuersia sunt arbitrati, Visci acinis à Turdo comestis, quod ad pulpam pertinet, concoqui: quod feminis est, incoctum ab aluo deiici, exire, sistique in arboribus iis, in quibus isti quiescere consueverunt. Pro nobis facit, quod ait Theophr. semen esse propter generationem. Mihi tamen aliter videtur. Neque vlla in terra satum prouenit: neque in quavis arbore. Dices, arbores certas pro solo ei. à Natura destinatas. Sic sanè sugies. Sed tum contrà, mirabor: quomodo in durissimaligna subeat ita, vt sibi findat corticem, ac sine radice vnum cum illis fiat. Nam quamobrem non super Iuglande, Olea, Lauro, Cupresslo, Larice? quando super horum congeneribus, iisque æquè duris, atque etiam durioribus nascitur: Py-

*Quibus arboribus non nascatur Viscum.*

ro, Malo, Sorbo, Puno, Cerro, Quercu, Terebintho, Abiete, Pino, Ilice. Etiam super Castaneam vidimus. At in illis nihilofecius auicula stabulantur. At in Turdorum ventriculis, atque intestinis, quos Visci bacis hac de causa nutritos secumimus, nullum vnquam granum inuentum est. Similis est hæc fabula, Qui à me rogati: quo semine in parietibus herbe nascerentur: vento aiebant, in parietes seminibus delatis. At non ita est. Sed quasi cortua ex ossibus animalium: sic ex arboribus educi Viscum.

Quamobrem Ion poeta Chius in fabula Ceneo, Viscum dixit esse sudorem Quercus.

Quam ob causam vnicum est lignum vtriusque, non autem insectum, tanquam in terram. Quia ratione etiam è Thymo prodit Epithymum, non è semine: haud sine Recentiorum nugis. Nullo modo fieri potuit, vt in Terebinthi corticem latissimum, durissimumque, vitam membræque sua ingere atque insinuare queat Viscum. Sed à calore potius interno informata Visci principia in succo sibi connaturali: ab externo adiuta, atque euocata concreuisse, atque in plantam hanc adoleuisse, quasi cornua quædam, sicuti dicebamus. Vbi & illud tibi à Theophr. animaduertendum fuit, qui lib. 2. de causis scribit: perpetuati frondes Visci generibus iis, quæ in arboribus æternifoliis oriuntur. In perdisfoliis quod proueniat, ipsum quoque amittere folia. Non enim verum est. In Malis nostrorum prædiorum, non solum vt serò dicam *durici*, sed etiam, vt iocemur, *terrestris*. Quibus foliis ipsæ virent, suis spoliata. Non tamen illorum insectamur opinionem, tanquam vulgi vel sobolem, vel alumnâ. Subest etiam ratio non inepta, neque imbecilla, quæ id illis potuit persuaderi. Quando in diuersis arboribus eandem videntur plantam: vnum, idemque principium, è diuersis originibus promanare posse minimè videbatur. Sed quemadmodum Quercus & Pini folia diuersa, sic diuersa esse quoque decuit vtriusque Visci folia: si ab illorum natura

profecta essent. Pulchram sanè pro illis excogitauimus defensionem. Quam tamen diluere licet hac inscita obiectione. Non enim necesse est, diuersorum excrementa diuersa esse facie: sed ratione sola differre satis est, vt lachrymas. Itaque pro nobis faciet potius. Quia longè aliis viribus Quercinum est Viscum, quam Ilignum & alia. *Visca sunt diuersa* Exempla quoque valida sunt. Alia Fagus à Quercu: ab vtriusque flex: Galla tamen omnibus. An suo peculiari satum, semine, quæ Galla orta est? Sic Ceruorum & Damarum cornua sunt vtriusque, non ab externo compluta, aut inserta semine, sed ab internis primordiis excitata. Maximum verò ad sententia nostra confirmationem argumentum, quod è ramis quibuscum exit Viscum, quo in loco nullis modis vel stercus consistere, vel semen vnquam potuerit hæere. Nam quod ait Cardanus: semen ex auicularum aluo deiectum, quominus ab imbricibus deuolutum pereat, foliorum operimento inramis custodiri, id in perpetua frondis arboribus fortasse verum fuerit: at in Sorbo qui potest? Visci namque fructus neque maturus neque edendo est, nisi arbore exfoliata. Quare intempestiuas hybernæ leuitiæ intus ipsum perpeti ac perferre posse, non fit verisimile. Nihil enim commodius consistere, quam in re proclui globum. Quippe in summis furculis etiam hodie ipsum conspicati sumus. Qua in sede & ancipitis firmamenti, & quietis, ne tranquillo quidem celo stare quicquam valeat.

Ad Theophr. argumentum, quod aiebat: Omne semen esse propter generationem, neque respondere scio, neque animus suadet vt ei assentiar. Denique omnino si responderem neciam, magis neciam, quo modo semen, vt dicebamus, valeat durissimos cortices ita penetrare, vt coalescat. Nostrum sanè commentum parabolice videtur firmum ratione. Theophr. accipit pro probatione, quod ipsum eget probatione. Ait enim è semine nasci. At negamus nos. Si enim è semine nasci posset, è terra quoque de semine nasceretur. Plin. *Plin. semine* ait, non nisi auium ventriculis domitum semen, *ita reit* esse genitale. Atqui ex earum aluo plus in terram deiicitur, quam in ramos: neque tamen proficit. Quasi verò in palumbis & turdi ventriculo nequeat granum concoqui: cum tamen Labruscarum gigarta longè duriora & grandiora conficiantur. Hoc experti sumus nos. Primum Labruscæ vnam dedimus Turdo: in deiectionibus nihil præter ipsa excrementa. Deinde etiam Visci baccas dedimus: idem. Nec faciat Æolus edictis suis, vt hyemales tempestates abstineant à iure suo deiiciendi ex ramis, complutis, agitat, semen illud quod necesse habet seruari sub ipsum vsque Ver vt conformetur. Nam per hyemem qui possit Interea sedet in ramo summo, læui, tereti, securus de dilapsione deque gelu: tum sibi findat corticem valentissimum, quod vix acutissima subula facere queat. Arguatur & aliquis licet: si Viscum oritur tantum ex stercore auis comedentis Viscum, quomodo igitur primum ortum Viscum, ex quo aues nondum comederant?

Hic & multis aliis similibus rationibus, quas hic breuitatis causa omittimus, confutatur opinio Veterum de generatione Visci. Plures rationes habet Scalig. ex ipso etiam Aristotele accersitas, quas inde petet, qui vult. Huius etiam sententia inter Veteres sine dubio fuit Virgil. cum ait:

*Quod non sua seminat arbor.*

Ridicula est sententia Monachorum existimantium Viscum nasci ex stercore auium, non quatenus sit Viscum, sed quatenus sit auium stercus.

Potest



Porro Brassauolus vult in omni arbore posse nasci Viscum, ac etiam in Vite se vidisse testatur. Cui sententia se opponunt Monachi, id negantes, quod a se non in omnibus conspectum sit. Quorum sanè negatio non minùs reiicienda videtur, quàm affirmatio Brassauoli, qui eam intèpestiuo fundamento firmavit: nempe quod super omnem arborem sterco emittere queat Turdus aut alia aliqua avis; Sed hæc quæstio ex eorum numero est, quæ ab homine definiri nequeunt: adde quod de potentia agat, non de actu. Temerario iudicio incedunt, quicumque negant possibilitatem cum aliqua ratione coniunctam.

Nimium sibi tribuunt qui omnibus arboribus Viscum innasci asserunt, quia non omnes viderunt. Sed hoc parum refert. Dicamus potius quibus arboribus innascitur, hoc est quibus arboribus innatum vidimus vel nos, vel alii. Vidimus in quercu & habemus magnum & integrum fruticem Quercus ligno adhaerentem. Habemus & frusta pollicaris ferè crassitudinis, cortice nigro recta, vetusta, pro Quercinis data. Lausolia Quercus per multas Pannoniæ sylvas visci feracissima est, teste Clus. Nec alibi sibi veri Visci querni conspectam copiam scribit Turner. quàm apud Hugonem Morganum Londini: acceperat autem ex Angliæ Essexia, quæ huius præ reliqua Anglia feracissima. Apud nos rariùs inuenitur in Quercu. At in Pomis & Pyris tam domesticis quàm sylvestribus suis frequenter, & multis locis in Spino alba seu Oxycantha Matthiol. Vidimus etiam natum in Corylo, sed rarò. Semel tantum in Sorbo terminali. In Tilia aliquoties, & quilibet videre potest, satis frequens Basileæ in viridario D. Petri supra Tiliis nasci. In Pruno sylv. non rarò: in Salice altissima bis. In Mespilo semel. In Sorbo alpina semel. In Abiete ter. In Amygdalo & Acere semel. Obseruamus etiam aliquando Monpeli in Illice. In Populo Lybica semel. Cordus scribit reperiri, sed rarò in Vite: in qua & Brassauolus vidit. Quod Abiete innascitur, Hyphear est secundum quosdam. Hoc antea disputatum. Nascitur & in Betula, Populo nigra, Terebintho, Robore, Tilia sylvestri, Cerro, Castanea, Cotonea, Olea. Thalius vidit in Iuglande. Autumni initio cum suis acinis decerpitur, tota hyeme restant baccæ.

In quacunque verò nascatur arbore, noxam ei asfert, vt etiam interire possit, teste Theophrast. Hederà inquit Plin. necari arbores certum est. Simile quiddam & in Visco, tamen si tardiozem eius noxam arbitrantur. Suprà verò dictum Oleas Palestina ob Viscum cum illis innascens sterilefcere. Nos à nostrati Olea scimus, etiam vitem exhauriri, inquit Scal. Alex. Cornelius, tradente Plin. arborem Aeoniam, [id est, æternam: vulgæ. Eonem habent] appellauit, ex qua facta esset Argo, similem Robori Viscum ferenti, quæ nec aqua nec igni posset corrupti, sicut nec Viscum, [ferentem: quæ nec aqua posset corrupti, sicut nec Viscum, nec igni Dal.] nulli alii cognitam, quod equidem sciam.

Porro glutinis, quod Viscum nuncupatur parandi ratio multiplex. Dioscor. ex bacis Visci quercini confusis ac lotis, tandemque in aqua decoctis fieri tradit. Eisque qui acinos commandantes ipsum conficiant. Optimum dicit recens, colore intus porraceo, extrà verò subflauo, quodque nihil habeat asperi aut fursuraceti. Optimum etiam traditur quercinum: inualidum verò quod ex Mali & Pyri Visco paratur. In Hetru-

ria, teste Matthiol. non modò in Quercu laudatissimum prouenit, sed etiam in Cerro, Illice, & Castanea, præsertim in maritimis Senensibus, vbi vastissima assurgunt syluæ, quæ non paruo prætius locantur, qui Viscum efficiunt. Scandunt autem illi arbores inmensas, non sine magno vitæ suæ periculo, sæpiùsque funibus adalligati, id muneris in aërè pèndentes obeunt. Grana quæ legerunt, in aqua decoquunt, donec disrumpantur, postea còtundunt, & tam diu lauât in aqua quousque fursuracea extrêmèta eximât. Paratur optimù ex Castaneæ visco. Nam quod ex Pyri, ac Pomi Visco paratur, inutile est. Quod in Pinu & Abiete nascitur, ad aucupia prorsus inutile est: decoctum enim, & deinde elotum omnem amittit lentorem. Non dubitauerimus ex Tiliæ Visco optimum parari posse, cum arboris eius succus sua naturalentus & glutinosus videatur. Viscum autem Plinio, consistit ex acinis qui colliguntur quando leues amplitudine quidem augentur, Viscum verò marcescunt. Siccantur deinde, & ariditunduntur, ac conditi in aqua putrescunt duodenis ferè diebus. Vnumque hoc rerum putrescendo grauius inuenit. Inde in profluente tursus maleo tusi, amissis corticibus interiore carne lenteferunt. Hæc est illa Viscum pennæ animum tactu ligandis, luglandis oleo subactum, tiliæ libeatis fidias moliri. Fit etiam à nonnullis artificio Viscum, ex variis rebus, vt ex Sebesten in Damasco, & ex radicibus Maluauisci, & ex fructu Aquifolii, & similibus ad capiendos aues, etiamque aquaticas: quod tamen medicinarum est idoneum, testibus Monachis. Viscum enim Damascenum, [vt Herm. Aoisius] ad nos adferri solitum, non fit ex acinis Visci dicti, sed ex Myxis potius vel aliis rebus. Quod autem hoc verum sit, apparet ex eo, quoniam vulgare hoc Viscum non acrimoniam, nec amaritudinem villam habere videtur, quas Gal. & Dioscor. suo inesse Visco scribunt, sed dulcedinem potius: ideòq; humores ex intus corporis partibus attrahendi & digerendi vires non habebit. Apud recentiores hæc nomina leguntur: Viscum Quercinum, Viscum aquæ aptum, Viscum Romanum, & Viscum absolutè. Viscum Romanum non est Mastiche, vt quidam putant, nec in vilo probato autore legitur, tantò peius faciunt, qui ita legunt apud Mel. in compositione Catapotiorum de Colocynthide: nam in alio & antiquissimo cod. legitur Absinthium Romanum, sicque legendum esse & Monachi & Brassauolus merito censent. Viscum aquæ aptum, arte paratum est: aucupes eo vtuntur. Melle aliqui parant: alii oleo nucum, alii oliuarum: ita nuncupatur, quoniam etsi pluetit, nihilominus aues eo irretiuntur, & quod eius vsus etiam sub aqua esse possit ad capiendos pisces. Fit hoc Viscum ex Sebesten in Syria, deinde Alexandriam, inde Venetias transfuehitur, sed rarò bonum inuenitur. De quo suo loco. Fit tamen & Viscum commune pro aqua & aquatilibus auib. Viscum verò soli aptum, quod & alii Damascenum dicunt, fit ex Visco, de quo hoc loco tradimus, quod & simpliciter Viscum dicitur. Veteres autè Querno & Colurno.

Visco eximias vires, maioremque quàm reliquis efficaciam ascribere, inquit Turner. Nos non videmus quas vires veteres Colurno tribuerint, quamuis eum non repudiemus, sed laudemus. Dioscor. vim habet discutiendi, molliendi, attrahendi, concoquendi, panos seu tubercula (pusculas) parotidas & abscessus, resina, parique ceræ admi-

id 3: hodie fiat.

quando leues genia baccæ.

Artificiale Viscum. Viscum Sebesten. Viscum Maluauisci. Viscum Aquifolii. Viscum Myxarum.

Viscum Romanum.

Viscum aquæ aptum.

Viscum Soli aptum. Viscum simpliciter.

Vicia: & Viscus. Tumores & abscessus.

*Epinyctidas*  
*det.*  
*Vlcera.*  
*Ligna tu-*  
*mor.*  
*Vngues.*

xtum: epinyctidas quoque in splenio sanat. Vt-  
tera autem vlcera, malignosq; abscessus cum the-  
re mollior: lienemque absunt cum calce aut Ga-  
gate. Alio die lapide coctum & impositum. Vngues  
quoque extrahit cum Arsenico aut Sandaracha  
illitum. Ceterum cum calce viniq; saxe mixtum,  
suam vim ostendit. Viscum inquit Plin. è Robo-  
re præcipuum diximus haberi, & quo conficere-  
tur modo. Quidam contusum in aqua, deco-  
quunt, donec innaret. Quidam commanducantes  
adnos, expuunt cortices. Optimum est, quod  
sine cortice est, quodque leuissimum (leuissimū)  
extrà fuluum, intus porraceum, quo nihil est glu-  
tinosius. Emollit, discuit tumores, siccatur strumas.  
Cum resina & cera panos mitigat omnis generis.  
Quidam & Galbanum adiciunt, pari pondere  
singulorum: eoque modo & ad vulnera vtuntur.  
Vnguium scabritas expolit, si septenis diebus  
soluantur, nitroque colluantur. Quidam id reli-  
gione efficacius heri putant, prima Luna colle-  
ctum è Robore sine ferro. Si terram non attingit  
Comitialibus mederi. Conceptum feminarum  
adiuuare, si omnino secum habeant. Vlcera com-  
manducato impositoque efficacissime sanari. Hy-  
phear adlaginanda pecora vituli centes Plin. At  
Theophrasti & Viscum, & Hyphear, & Stelidem  
multum nutrire tradit. Nam & boues & iumenta  
hoc pabulo post messem ali, atque pinguesce-  
re. Vita modo purgat primò, addit Plin. de in pin-  
guetate, quæ sufficere [superfuere Dal.] purga-  
tiohi. Quibus sit aliqua tabes intus, negant du-  
rare. Ea medendi ratio ætatis quadragenis die-  
bus. Galen. Viscum ex plurima aërea & aquea  
calida, paucissima terrena substantia constat: nam  
acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque et-  
iam effectus substantiæ respondent. Siquidem va-  
lenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum  
tenues, sed & crassiores, eoque diffundit adige-  
rit. Est autem ex eorum genere, quæ non protin-  
us post primam appositionem excaecant, sed  
quæ tempus requirunt, velut Thapsia. Apud Plin.  
quoque legitur florem Visci ad Lichenas cum  
calce subactum conferre.

*Delectus.*

*Vulnera.*  
*Vnguium*  
*scabritas.*

*Epilepsia.*

*Ad conce-*  
*pium.*

*Vlcera.*

*Tumorum*  
*cibus.*

*Tempera-*  
*mentum.*

*Lichenas.*

*Supersti-*  
*tiones eor-*  
*um vsum.*

*Orbiculi ad*  
*Epileps.*

*Turdorum*  
*auripium.*  
*Contra Vlc-*  
*nerum E-*  
*picus.*

Porro non apud Priscos tantum, sed etiam nunc  
hodie apud Christianos superstitiones locum ha-  
bent circa Viscum. Inuenias enim qui credant,  
Viscum Quercinum amuletum aduersus venefi-  
cia & ludibria Satanae efficax esse, ideoque è collo  
puerorum & infantium suspendunt, quo à vene-  
ficiis tuti esse queant. Quidam Empirici existi-  
mant Viscum quod Quercui, Corylo aut Pyro ad-  
nascitur, si terram non tetigerit, in puluerem re-  
ductum ac è vino potum comitialibus mederi. It-  
aque ex eo orbiculos conficiunt, quos ad eun-  
dem morbum facere credunt. Alii argento inclu-  
dunt, & inter alia è collo puerorum & infantium  
suspendunt. Omnia Visci genera dum viridia ad-  
huc & recentia sunt, rufa, succo extracto auri-  
busque indito, discutiunt collectiones earum, &  
emolliunt eas intra paucos dies, dolorumque fi-  
niunt: ex Trago.

Visci, tradente Matth. Hetruscis maxima uti-  
litas est: nam præter eius vsum in aucupis, qui-  
bus mirum in modum delectantur, ob ingentem  
turdorum copiam, qui autumnii tempore in syluis  
quibuldam ex Iuniperis arte constructis, eo ca-  
piuntur: id etiam in primis utile est Vitibus mu-  
niendis, ne prima germinatione ab Erucis, qui-  
bus omnia scatent, gemmae deuorentur. Siqui-  
dem agricolæ Viscos vites omnes circumdant, quo  
postea erodentes vermiculi, qui tam præstantissi-  
mo laici insidiantur, è terra sursum petentes me-

ritò implicantur. Quod cum perpexisset, natura  
omnium rerum parens, Visci multum Hetruriam  
largita est, ne hanc ob pestem vino destitueretur.  
Sunt qui Quercui Visci lignum in tenuissimum  
puluerem redigant, & comitialibus hauriendum  
præbeant, quo tantum medicamento multos  
fuisse sanatos pro certo affirmant. Sed noui ego,  
inquit Matth. complures, morbi & medicamenti  
prorsus signaros, qui ligni loco Viscum ipsum in  
catapotis deuorandum dederunt.

Adnotandum tamen, Ligni Visci vsum in me-  
dendo præclarum à doctissimis quibusque haberi,  
& à plenisque Medicis prescribi contra Epilep-  
siam & Apoplexiam, & Paralyfim, multumque in  
his casibus præstare tum intus epotum, tum verò  
in collo appensum. Viscum Pyri sylu. contra-  
ctione morborum laborantibus maximo auxilio  
esse sibi compertum ait Matth. Contunditur id  
vna cum foliis & ramis, & cum pinguedine capi  
recenti. Rami, nouitii præsertim, commendantur  
in fluxu muliebri, & Nephritide. Quidam Vi-  
scum Quercinum, quod terram non tetigerit [hoc  
nobis superstitiosum videtur] in aqua Ruta deco-  
quant, & 40. dierum spatio potandam præ-  
bent, prorsusque eo modo, quo vulgò Dixta dicta  
instituitur, sudare iubent, efficaci & probato, vt  
aiunt, remedio aduersus Epilepsiam, cui experi-  
mento etiam non parum tribuere videtur Camer-  
argumento, quod in magna estimatione fuerit apud  
Vetæres, vt etiam omnia sanantem vocitarent.  
Gentilis & Iac. de partibus lignum S. Crucis vo-  
cant: de quo & supra quedam dicta. Scimus quod-  
dam non inutiliter eo in vino macerato vlos con-  
tra vertiginem. Quidam nostro iussu contusum  
in aquis conuenientibus macerant, vt de eo po-  
tallent pueri contra vermes egregio effectu. Cen-  
to Medicus V. Virtemb. ad Epilepsiam commen-  
dat.

Viscus Querci, inquit Alb. Magn. cum qua-  
dam alia herba, quæ dicitur Marlegon, id est, Syl-  
uum, vtscribitur lingua Theuthonica, omnes se-  
ras aperit: & si prædictum compositum in ore a-  
licuius ponatur, & cogitetur de aliquo, si debet  
accidere, corde ingigitur, si autem non, corde re-  
sistit. Sed si prædictum ad arborem suspendatur  
cum ala hirundinis, ibi congregantur aues be-  
ne per quinque milliaria, & hoc vltimum tem-  
pore meo est expertum. Hæc ille, quæ homini  
Christiano tanquam superstitiosa, aut saltem fa-  
bulosa non tentanda.

Viscum Coryli mense Iunio collectum ante  
exortum Solis: concisum minutum exsiccata, quod  
in puluerem redigi possit. Cuius pulueris accipe  
quanta est auellanae magnitudo, superfunde a-  
quæ florum aut herbae Verbasci, cochleare v-  
num aut alterum, tertiumve, vel q. suff. pulueri  
humectando, vt eo vti possis. Hoc omni septi-  
mana ter repetes: noctu horæ quadrantem an-  
tequam cubitum eas. Nihil autem superbiben-  
dum aut comedendum. Quod si zegeriam paro-  
xismo correptus sit, prodesset puluerem cum a-  
qua exhibere, aut cum paroxysmum imminere  
præsentire.

Nicol. Metri in lib. Medico. ab Hen. Martio edi-  
to, mirabiliter commendat Viscum Auellanarum  
sive Coryli. Platear. in Conuulsione Visci Quer-  
ni penuria Viscum Coryli sumi suadet. Eo Visci  
ligno quod in Atronia nascitur, argutos prospe-  
ritus curatos sibi compertum tradit Curtius. Pa-  
ratur & emplastrum efficax ad suppurationes, &  
extrahendum pus, quod Scribonius Largus de-  
scribit, Emplastrum de Viscis vocant. Equo pe-  
tet,

*Quercus*  
*fuldens.*

*Epilepsia*  
*Apoplexia*  
*Paralyfis.*

*Fluxus*  
*mulieb.*  
*Nephritis.*

*Experimentum*  
*ad Epilepsiam.*

*Lignum*  
*Crucis.*

*Vertigo*  
*Lumbago.*

*Seras*  
*aperiend.*

*Aues quin-*  
*que milia-*  
*ria.*

*Viscum*  
*Coryli ad*  
*epilepsiam.*

*Viscum*  
*Coryli ad*  
*epilepsiam.*



ter, qui volet. Ceterum baccae cuiuscunque sint generis Visci non intra corpus sumendas putat Camer. esse enim nocuas: quod facile concesserimus ob insignem suum lentorem. Item tradit Visci Quercini usum esse in quibusdam locis ad pleuritidem, epota drach. j. puluerisati ex aqua hordei vel alia conuenienti, non sine solatio acri.

## VISCVM INDICVM.

## CAP. II.



**E**x Indicis plagis, accepinus hanc, nupiam nisi in ramis & truncis arborum enasci solitam, ita Visci, quod quia multum adumbrat, Indicum Viscum vocauimus. Sessili, sed transuersum excurrente est radice cespitem, gramineis geniculis & Polypodii quadantenus, sed albicantibus: Collum item ex pallido virentibus

à medio summotenus effloribus, fungosis, striatis, sesquipedem longis: in quibus folia semper virentia Visci effigie, sed duplo maiora, fungosiora, & secundum neruum, medium folium intercurrentem, circulari vtrinque sensu, non parum admirationis mouentibus, veluti scalpito impressa. Lob. & Pena Adu.

## VISCVM INDICVM ALIVD.

**E**idem coelo & natalibus ramorum arborum Indicarum debemus hanc, vnde auulerunt, qui Morgano miserunt, cespitem latiore, sessilibus candidibus incumbit, fibrillis cespiceis radicata, vnde proximè surgunt folia inuicem conuoluta, tunicea, inferius ferme palmum lata, numerosa, quadantenus Aloes aut Scyllæ & superne in ligulas prætenues, mucronatas desinentia: putpureum, striatum, concayum alis donatum, Scapum, Hastulæ Regiæ aut Aloes, duorum & trium cubitorum, ambientia, quæ multis glutinosis siliquis picantur, Auenæ sita: magnitudine vero & sericeo tomento candido, Apocinum & Alepiadem representant, & semine, sed Conisæ exili, gustu falso, ingrato, nitroso forte quia in aura maritima adoleuit, vt Aloës illic in sabuleis. Adu.

Penæ & Lob.

## ILEX ARBOREA.

## CAP. III.



**N**ihil vulgatius, nihil notius oris nostris Quercu ex cuius familia cū & Ilex sit, calidis regionibus, ceu Hispaniæ & Gallie Narbonensis frequens, ad eam ex instituto accedimus. Arboret igitur Ilici brachia ramulique incana lanugine obducti sunt, licuti & prona parte folia, nam supina virent, nisi admodum, tenella fuerint. Sunt ea vero quam Coc-

cifera Ilici maioriam muricata, idque rariius aut crebrius, iam leuiter signata, aliàs ne crenæ quidem ulla marginum æqualitatem interumpunt: tam variè ludit foliis. Longa fert & racemosa amenta, ceu nucamenta lutea. Glandem autem longam, læuem, turbinatam, mediocri magnitudinis, è calyce incano, & veluti imbricato emicantem. In huius & foliis & ramis excrementum obseruatur per uernum tempus, nigrum, totundum, quale circa Monspelium obseruamus.

Quandoquidem Clus Ilicem se in Hispania obseruatam describit, eius historiam subiiciemus. Quæ mihi cognita, inquit, arbor est Mali aut Pyri magnitudine, multo frequentioribus brevioribusque ramis prædita quam Suber, quos latè spargit: folia perpetua, supernè viridia, infernè candicantia, gustu adstringente, foliis Suberis minora: & magis orbiculata, in adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter nouella, & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa, aculeata sunt: certè in tenellis arboribus antè quam glandem ferre incipiant, omnia folia aculeata obseruabam. Multos in extremis ramulis fert oblongos, qui in flauos & mucosos flosculos poline & tenui puluere perfusos explicantur. Glandes è floribus non oriuntur, (nam sunt inutiles) verum in aliis quibusdam separatis pediculis: ex autem quernis glandibus sunt similes, nunc maiores longioresque, modò minores & breuiiores, quæ nonnunquam antè maturitatem nigrescunt, & gummi quoddam reddunt gustu calidum, saporis tamen non ingrati. Maturarum cortex siue p-

tamen nigricat, nucleus candidus, firmus & dulcis est, præferum maiorum: vtræque tamen à nonnullis maxime expetuntur, illisque non minus auidè velcuntur ac nos castaneis ac auellanis. Hanc ob causam in foro Salmaticensi, abisque Hispaniæ locis, venales mensibus Octob. & Nouemb. proponuntur: vt non immeritò dixerit Plin. per Hispanias glandem secundis mensis infert.

Hac vidim in ore Londini anno M. D. LXXXI. in suburbano quodam horto, ad dextram Tame-

Descriptio

Folia.

Nucamenta.  
Gland.

Excrementum.

Foliorum  
Garterat.

Flosculi  
Iulorum.

Flores  
Inutiles.

Glandes.

Gummi.

Nucleus.

Plinio glan-  
des aculeis.  
in Hisp.  
Ilex Londi-  
nensis prius





afferere non audemus. Sanè icon quam pro Pilatina Illice proponit, accedit ad Phellodryn 2. latifoliam Dalech. Caum dixit Virgilius:

*Sape sinistra caua prae dicit ab Illice cornix.*

Dicta & fradens, pacia, Littorea, tremens, viridis, curuata, umbr. sabirfusa, plena fauis, alba, pasula &c. Nec malè quoque quis spinosam dicat, à foliorum aculeis. Apud Suidam in prouerbio, quod ἀνδρὶ παρὰ χεῖρῃ, ὃ δὲ σπῆρ βῆσιν iubet, non legendum ἀνδρὶ sed ἀνδρὶ. Acylo, ubi intelligendus δὲ σπῆρ τῶν ἀνδρῶν. Galeno dictus Illicis fructus, quem Acylon eidem & Hip. & Homero dici paulò antè monnimus. Nempe ipsamet Suidas, salubrem & fortem rerum vsum, quem ibi insinuat, id admodum nos dicit vt optimè annotauit doctissimus Cornar.

Hermol. Illicem arborem de amplissimis dicit, vt Robur, materie spissa & robusta, sed quæ frangatur ac diffiliat sponte sua. Ob id Peticles Bosotios Illicibus dixit esse similes, vt est apud Aristotelem, quum ipsi se conficerent intestinis discordiis. At fallitur vtiq; Hermolaus si Illicem Aquifoliam putat à Gaza dictam, quamque Theophrast. Ariam siue Agriam siue Naticam lyluestrem, vti ille ait, dicit, cui folia nunquam decidunt. Longè enim diuersa est Aquifolia seu Agriifolia. Illex Matthioli arbor est in Italia nouissima, speciatque proceritatis, cortice in rufum nigricante. Materies densa admodum ac robusta, in atrum rubescens. Folia laucina, perpetuò virentia, sed externè candicantia & icabra: internè virefcentia, laucique: toto ambitu serrata, ita vt spinarum speciem præ se ferant. Glandes quernis minoris, quæ & in reliquis minis præstant. Præter glandes pilulas quidam rubentes gignit. Idè in Com. Cum magnis fig. Lat. & Ital. notat, non rectè sentire eos qui Plinii tantum & Theophrast. testimonio freti Illicem haud spinosam legitimam esse negant. Sed de differentiis mox. Amatus Illicem dicit arborem similem arbori Grana, id est, Coccum, ferenti, quæ procerè crescat: nonnullos tamen Illicem maius Suber esse credidisse, sed falso. Hanc verò admodum gl'ndiferam esse.

Lob. & Pena proceram arborem & querna elegantia scribunt, oblongo Arbuti folio, tantillum denticulis per ambitum asperato, perpetuo, atro-virente, oblongiore, graciliore superne: quæ rana gl'nde propendente, nucamento muscoso, luteolo, non diuerso. Clusius Illicem legitimam & maiorem dicit: itemque florem ferre. Maio racemolum, tametsi Plin. florere negat: & hæc in Hist. Hisp. Sed hanc censuram omisit in postremis comment. ad id fortè respiciens, quòd Iuli, vt postremò vocat, diuersi sint à floribus, vt in Quercu & Corylo. Nam certè Theophrast. ambas florescere dicit, tam fructiferam quam sterilem.

Plin. Græcis, quia serra propter duritiem fuit secanda, vt volunt Aduers. ἀλφειον & corticis sanguine, Curtio: quàm rectè, ipse viderit. Barbes Serap. & Arabum Carmas iisdem. Ital. Lecino, Leccio: Elice: & Elce Petrarche. Hisp. Aezina & Amcinheira & Coscix: Gall. Ieuse & Boufe Beillon. Chesus verò. Germani quidam, quamvis apud eos non nascatur, Storcheyden vocant. Fructum ἀβύλον vocat Theophrast. Hispani Bellora aut Abilora.

Circa Illicis differentias etiàm peritiores quidam hallucinati sunt, vel eas non agnoscetes, vel sanè inter se confundentes. Theophr. tamen aperte aliam ἀβύλον, aliam ἀλφειον dixit ambas tamen florescere: Et alibi: Phellodryn Illicem feminam quibusdam dictam. Illicis, insit Plin. duo genera.

Tom. I.

Ex iis in Italia folio non multum ab Oleis (rectius fortassis Suberis aut p'laris erit reponendum. Dod.) distant, Smilaces à quibusdam Græcis dictæ, Masculas Illices negant ferre. Ad quem Plinii locum annotat Dalech. Theophrast. lib. 3. cap. 16. hist. quo loco tractat de Illice, Smilace, Phellodry, nusquam id scribere, vt suspicatur videatur nullam Illicem infructiferam esse. Atqui æquè sterilem ac fecundam modò diximus ex Theophrast. lib. 3. cap. 5. suspicamur tamen Theophrastum non cognouisse discrimen inter Illicem arborem magnam, & eam quæ coccifera est: aut certè aliam cocciferam à nostra intellexisse. De Illice femina Plinii vide postea in Phellodry.

Columella spinosam & non spinosam agnouit, vt clarè ex his eius verbis colligi potest: Autumno boues lauentur fronde: vltima sunt Iligneæ & Querneæ, Iligneæ tamen vel melior est Querneæ, sed eius generis, quod spinas non habet: nam id quoque vti Iuniperus respuitur à pecore propter aculeos. Idem & inter minorem & maiorem differentiam videtur fecisse, quando ait: minor Illex apibus quæ sita: nam prolixior ab omnibus improbat: nisi fortè per minorem quod fortè alicui verisimile videbitur, iuniorum intelligat. Tamen obseruatum, vt paulò inferius dicitur, humiles & tenellas per margines spinis horere, adultas aculeis carere. Quapropter studio sis indagandum relinquimus, quid Colum. per minorem Illicem, quid item per prolixiorum intelligat.

Curtius minis rectè videtur Theophrast. intellexisse quando Illicis duo genera facit: alterum Arcadibus, Theophrast. autore, Milacem vocari tradit. Duum est generum Illex, inquit Matthiol. alterum folio spinoso: sine aculeis alterum: hoc vbique ferè scater Hetruria tillo verò Hispania. Meminit vtriusque Colum. Non rectè sentiunt, qui Plinii tantum & Theophrast. testimonio freti, Illicem haud spinosam, legitimam esse negant. Et paulò post: Sunt qui censent Illicem non spinosam Smilacem esse: sed cum Smilacis materies sit soluta mollique in opere (vt Theophrast. scribit) eorum sententiam comprobem, non habeo. Interim & nos haud videmus cur Matth. spinosam Illicem in post. suis Com. relegat in Hispaniam, cum in prioribus scripserit Italia notissimam. Nec mutat tamen suam iconem foliis longiusculis & ordine serratis, cui sanè non respondent folia Illicis ex Clus. exhibitæ pro Illice folio maiore Hispanica. Ita hæremus dubii, an duæ species sint, vel fortè lusus foliorum, & icon Matthiol. vitiosa. Sunt enim nobis à Lobelio (si bene recordamur) dati rami Illicis nomine, cui multum Ilignis nostris Montpellierensibus affinia sunt folia: siquidem vt superius virent, inferius canescent, ac per ambitum muricata sunt: hoc tamè nobis differre videntur, quòd tantillo longiora, magis etià sint serrata. Ad Quercus propius, quàm Illicis superius descriptæ folia, accedunt: videntur sanè Castaneæ folijs sua serratura quodammodo comparari posse.

Sed hæc diligentius Lectoribus peritis examinanda relinquimus: & an apud Theophrast. lib. 4. cap. 4. mutanda sit lectio, vt volunt Cornar. & Rob. Const. Profectò si icon Illicis Matthioli vera, potest lectio antiqua & Plinii relinqui. Sed ita vt Theophr. lasciuientem in figurarum fabrica & variatione passim deprehendimus, vt malimus fidem penes autorem, & varietatem posteris examinandam relinquere, quàm rem nondum planè apertam pro certo asserere. Certè Camer. in hist. Germ. Matthiol. & in icon. particularem habet figuram.

Matth.  
Femina.

Illex arbor.

Spinosa.  
Non spinosa.

Minor.  
Major.

Matth.

Quercus  
et c.

Matth.  
natur.

vt Theophr.  
lectio aut.  
qua barè  
posuit.

omissa Matthioli, sub hoc titulo Steineyden i. Ilex, quæ figura melius conuenit nostræ Ilicis modò descriptæ, quam Matthioli, quanquam nomen Germanicum, quod Quercum laxatilem seu petram sonat, licentiosius ab eo effectum videatur. Idem Camer. in epit. scribit: Ilicem differre non solum folio spinoso & non spinoso, sed etiam latitudine & angustia foliorum. Habet enim primo loco Ilicem simpliciter dictam: secundo Ilicem latifoliam, quæ, ut ille ait, Græcis *πλειόφυλλον* dicta: conuenit cum priore magnitudine, altitudine, materia ligni firma ac solida. Folio differt latiore, ambitu sinuato & aculeato. Glans interdum maior, interdum minor quam sit Quercus, locorum ratione varians, spinoso innititur calyculo, per maturitatem alicubi nigricans, nucleum habens intus album, grati saporis. Flocculi pusilli, flauescetes, racemulum efficiunt oblongum, qui Maio mense inuenitur. Obseruantur nonnunquam in eadem Ilice diuersa folia, ut humilis ac tenellæ per margines spinosa horreant, adultæ verò aculeis careant. Illud verò notandum, in iconè Camerarii non obseruari, quod ait, calyculum spinosum. Hæc autem nobis eadem cum Smilace Dalech. de qua post.

Ilex angustifolia.

Ilex latifolia Camerarii.

Ilex latifolia spinosa.

Diuersarum arborum Synonyma.

C. Bauh. in suo tractato Matthioli duas ponit icones ex Tabern. Prior est ad Matth. imitationem facta: secunda ad Clusianam, quam idem C. Bauh. Ilicem latifoliam spinosam vocat: nam & ille spinosam & non spinosam agnoscit, Synonyma hæc annotans: Ilex Italica folio Oleæ C. Bauh. Ilex i. folio Oleæ Plin. Ilex Lac. Cas. Lugd. cui & Phellodrys folio ferrato angustifolia. Ilex angustifolia Tabern. Ilex i. Matth. & Smilax Arcadum Theophr. Clus. Hist. Suberi ramulum huius adpinxit Lobelius. Item Ilex Hispanica spinosa folio. Ilex maior Clus. Hist. & Pan. Ilex maior glandifera. Dod. Ilex arbor Lob. Ilex latifolia Camer. in Matth. Ilex Tabern. Lugd. cui & Phellodrys nigra. Ilicis 2. genus Casalp. Hæc altitudine & ligni materia cum præcedenti conuenit, & foliis differt, quæ in hac latiora sunt, ambitu sinuato & aculeato: licet in eadem diuersa etiam obseruentur, ut paulò antè dictum.

Sic & Hist. Lugd. Duum, inquit Ilex est generum: alterum folio spinoso: sine aculeis alterum. Ilicis à Matthioli. pictæ folium oblongius & angustius, ad id fortasse genus referendum, quod Plin. in Italia nasci tradit, folio non multum ab Olea distante. Quæ in Gallia Narbonensi & Prouincia notissima est, etiam mulierculis & pueris, folia habet Suberis primi foliis minora & magis orbiculata, in adultis arboribus plerumque sine aculeis, præter nouella & nunc primum enata, quæ aliquantulum incisa & aculeata sunt, teste etiam Clusio.

Smilacis glandifera 2. generum.

Nobis videtur ad Ilicem Monspelicam referendum, quod Hist. Lugd. c. 6. l. i. vocat, alterum Smilacis glandifera: genus humile: cuius verba paulò post sub Smilace ponemus. Eadem Hist. Lugd. cap. 7. Iconem habet, cui titulus, Phellodrys alba folio ferrato: ea icon accedit ad Ilicis Matth. iconem. Icon verò Smilacis humilis angustifolia, folio non ferrato respondet Monspelicæ. Nondum videmus quantum Phellodrys alba latifolia differat ab Ilice Monsp. Verum de his paulò post. Considerandum interim studiosis relinquimus, an in Hist. Lugd. vnus plantæ rami non pingantur pro diuersis plantis. Mirè, ut iam dictum, ludit Ilex Monspelica. Perpendendum præterea quantum ab hac à nobis proposita Ilice differat Suber angustifolium à Camer. exhibitum tabulæ parte superiori in Histor. German. Mat-

thiol. & epitom. pag. centesima decima sexta.

Lacuna annotat, reperiri Ilicis speciem valde humilem in Castilia Carcasco dictam. Plinii Cusculum esse quoque Ilicis speciem, ex qua Coccus colligatur. Et Anguil. scribit Ilicem in Prouincia & Sclauonia coccum ferre. At nos suspicamur huic non benè perspectum discrimen inter Ilicem hanc, de qua hoc capite agitur, & cocciferam, de qua postea: sicut etiam de Anguillaræ Agria siue Aquifolia glandifera post Phellodryn agemus.

Carcasce

Anguil. not.

Smilax Theophr.

Plin. lat. corrig.

Glans oleæ. Smilax.

Agria Theophr.

Ilex Monsp.

Phellodrys

Suber quercus.

Smilax cadum.

Locus

Dod. Ilicem maiorem vocans, iconem Clus. habet. Eam putat non esse *epirot* Theophr. sed *epirotia*, ac etiam Plinii Ilicem & Smilacem lib. 16. cap. 6. ubi, ut dicebamus, pro Oleis, rectius putat legi posse, Suberis aut *oleis*. Nam Oleæ folio neque esse, neque à quoquam Veterum hanc Ilicis speciem siue Smilacis esse traditam. Suber autem folio referre, quod Græcis *επιρὸς* quæ si vera, ut probabilia sunt, valeat iam Matth. cum sua Ilice, Oleæ folio.

Casalpino Ilex minor est Subere, cortice nigro, asperò: folia eadem: nascitur in asperis collibus. Facit & alterum genus fruticosum, rotundiori folio, modicè sinuato. In Hispania quoddam genus oriri tradit, cuius glans dulcis comeditur, ut apud nos Castaneæ. Enzinas vocari patrio nomine. Smilax Theophr. eidem qui apud se in Italia Ilicem vocari ait. Per Aquifoliam quam Agrian vocat, eundem Theophr. Ilicem fruticosam intelligere suspicatur.

Penæ & Lobelio quoque Ilex variat à superiùs descripta, stipite humiliore, albidiorè foris, & Oleæ similiore, itemque glande altera tantò minore. Lob. speciatim in diuersis suis operibus pro Ilice aubore proponit iconem Clusii, ex qua etiam nostra desumpta. Verum hoc notandum, Lobelium cum Pena in Aduers. pag. 432. ramulum pingere planè similem Ilici Matth. cui hunc titulum fecit: Phellodrys Arcadum: Ilex fœm. Theophr. Quasi de consulis inquit Ilicis & Quercus in hanc principis, nomenclaturam Theophr. *επιρὸς* ouis, siue Suberiquem confirmat. Etenim de facie & foliis Ilicem quampiam dicas: ipsum autem lignum mollius & laxius Ilicis, sed foliis incisa serrata Castaneæ, non Quercus: reliqua effigies Ilicis, minor tamen Quercus: maior Ilicis, non glandes, sed *αυλα* exiliora & oblongiora. Miramur verò cur locum ubi viderint hanc Phellodryn non declarant: gratum fecissent & nobis, & aliis diligentioribus Botanicis. Nos, ut iam monuimus, nullum genus Ilicis, foliis, adèd ferratis, villorum & Matth. pictura demonstrant, vidimus, Botanici curiosi hæc diligentius perpendant.

Clus. vult aut siletem putat Ilicem Plinii non multum folio ab Oleis distante, esse Smilacem Arcadum Theophr. l. i. c. 16. Hist. descriptam, quam Ilici similem facit, folio non aculeato, sed molliore, profundiorèque. De quo amplius cogitandum.

Theophr. Ilicem inter eas recenset, quæ montibus propriæ sunt, quæque in planis non nascuntur. Nostra sanè in campestribus maritimis ac syluosis Narbonensibus ac Prouincialibus abundè prouenit, ut dicitur. Quæ in re cautiùs Plinius: Subeunt & in montosa Vlmus, Ilex &c. Item montes amat Ilex: & mox: montes & valles diligit Ilex: quæ omnia vno eodèque cap. 18. lib. 16. Quin & Colum. in agris nasci Ilicem abundè declarasse videtur his verbis: Olea potest in agro frumentario feri, vel ubi Arbutus aut Ilex steterant,



rant. Quicquid sit in re manifesta, non opus testi-  
monis.

Plin. vetustissimam quandam Ilicem vrbe in  
vaticano celebrat, in qua titulus areis literis He-  
truscis, religione arborum iam tum dignam fuisse  
significat. Tiburtes quoque originem multo an-  
te vrbeni Romam habent. Apud eos extant, eo-  
dem teste, lices tres, etiam Tiburto conditore  
eorum vetustiores, apud quas inauguratus tradi-  
tur. Non nascitur circa Elim & Lacedæmonem  
propterea incolæ in carpentariis fabricis eius loco  
vtuntur Subere. In monte Cretæ olim dicto Ida.  
nunc Pyloriti copiosè proueniunt lices: sed al-  
tissime in monte Athos. Item in montibus circa  
Hierosolymam, & circa Amanum montem, teste  
Bellonio, Copiosè quoque nascitur per vniuer-  
sam Hispaniam locis præsertim campestribus &  
collibus, rariò in montibus: Lusitaniz non admo-  
dum familiaris, vbi Suber frequentissimum, au-  
tore Clus. Est & in Italia nota, vt annotat An-  
guil. Nos sanè in montibus Euganeis, propè Pa-  
tauium inter balneum Aponense & Arqua obser-  
uauimus. Non tamen recordamur an ab hac dif-  
ferant. Patavi etiam vidimus in horto Treui-  
ano. Romæ in aliquot magnatum hortis. Sed om-  
nium copiosissimè & spontaneum circa Monspe-  
lium, tum alibi, tum in sylua Aigremont vulgò  
dicta, vbi nullæ ferè arbores sunt præter lices. In  
Galloprouincia quoque haud infrequens. Vt mi-  
rum sit, Ruell. Gallum natione, Glandiferam Ili-  
cem Galliis rariorem quàm vt sæpè conspiciat-  
ur, tradere: nam, vt ostensum, in mo-  
dò dictis Galliz prouinciis frequens est Ilex glân-  
diferâ, nisi ille vel aliam intelligat quàm nos, vel  
istas prouincias sub Galliz voce non sit comple-  
xus, quod non putamus.

Ait tamen apud se satam in hortis glande cre-  
uisse, cingente robustam frondem spinarum valo-  
Cam. spinosam in Hispania frequen-  
tissimam dicit: quæ verò spinis caret in quàm plurimis  
Hetruriz syluis haberi, Latifoliam verò in qui-  
busdam nemoribus, collibus, campestribus aut  
conuallibus, nec infrequentem in Hispania, Nar-  
bonensi Gallia, ac Prouincia quoque reperiri, nec  
non in Italia. Ilicem Monspeliensem Dalech. Smilacem folio non feruto angustifolium vocabat.

Eorum arborum, inquit Theophrast. quæ feritè  
fructificant, quas nonnulli annuo spacio fructum  
perficere volunt, (ἐναυτοφρούς) vt Iuniperi, Ilicis,  
germinationes in Vere proueniunt. Omnium  
autem tardissimè (ἐσθιότατα) legit Gaza: quamuis  
vulg. exempli. Basil. & Aldin. πλεονάζον habent, id  
est, plurimum vel copiosissimè. Nobis prior le-  
ctio magis aridet. Iuniperus, Celsus & Ilex  
fructus suos perficiunt Ilicem namque fructum  
suum anno perficere (ἐναυτὸν χρόνον) Arcades a-  
iunt. Simul enim fructum antecedentem matu-  
rat, & nouum ostendit. Quapropter in his eue-  
nit, ut assidue fructum habeant. Post occasum  
Vergiliarum fructum maturum reddit.

#### DE PHELLODRY SIVE ARIA ET ILICE FOEMINA.

A Ntequam Ilicis vires tradamus, libet eius cō-  
Ageneres aut certè affines arbores Phello-  
dry seu Ariam & Smilacem, ex veterum & neo-  
tecicorum placitis in historiis referre. Subinde  
hodie eo nomine designatas arbores subiicere.  
Postquam igitur Theophrast. Smilacis historiam  
proposuisse, subdit: Quod verò Phellodryn

Tom. I.

Arcades nuncupant, natura est inter Ilicem &  
Quercum media, atque aded Ilicem feminam *ἡ δὲ σπέρμα*  
quidam esse putauerunt. Ideoque vbi Ilex non  
prouenit, hac ad plaustra, similiaque vtuntur  
opera, vt Lacedæmonii & Elii. Diores arborem  
Ariam (*ἡ δὲ ἄρῃα* habet Ald. & Basil. *ἡ δὲ ἄρῃα*, ex quo *ἡ δὲ ἄρῃα*  
Gaza agrestem vertit, non benè) vocant quæ  
mollior laxiorque Ilice, durior ac spissior quær-  
cu, colore ligni decoricati, candidior Ilice, fuluio-  
re *ἐν ποσειδωνί* quercu, folio ambabus similis. ve-  
tùm maiori quàm Ilex, minori quàm Quercus, &  
fructum pro magnitudine minorem quàm Ilex  
habet, maiorem quàm Quercus: quem vt & Ili-  
cis quidam *ἡ δὲ ἄρῃα* vocant: quercus autem, *ἡ δὲ ἄρῃα*, *ἡ δὲ ἄρῃα*,  
Medullam quoque manifestiorem habet quàm  
Ilex. Mox ait: Suber (*ὁ περὶ δὲ* fructum semper  
fert glandosum (*ἡ δὲ ἄρῃα*) similem Ariæ (*ἡ δὲ ἄρῃα*:  
sic vulg. Cod. habent: nos potius legen-  
dum censemus *ἡ δὲ ἄρῃα*, quæ lecto & Doctiss. ob.  
Const. placuit: quamuis Gaza Aquifoliam verterit,  
qui alibi Agrestem reddiderat.) Porro Phello-  
dry idem Theophrast. inter syluestres numerat,  
quæ folio perpetuo sunt. Et Ariam post autūnum  
& Arcturum cædi tradit, hancque cum quercu om-  
nium difficillimam in opere. Ariam Macedoniz  
incolas non florere, existimare: (nam *ἡ δὲ ἄρῃα* & hic  
legimus, *ἡ δὲ ἄρῃα*) Tardissimè germinare: fru-  
ctum reddere hiemis initio: Carbones optimos  
reddere ob materiæ spissitudinem & solidi-  
tatem: idè & diuturniores efficaciores-  
que ex ea confici carbonēs ob eiusdem mate-  
riæ duritiem: hanc etiam antequàm terebrent,  
prius madefacere arifices, quò scilicet mol-  
liorem reddant. Eiusdem Carbones potis-  
simū requirit ad decoctionem veterulorum argē-  
teorum. Hæc itaque citatis Theophrast. locis si-  
ue legatur *ἡ δὲ ἄρῃα* siue *ἡ δὲ ἄρῃα*, censemus intelligen-  
dam Phellodryn. De Agria autem seu Aquifo-  
lia Plinii postea sub Agrifol. De Ilice verò dicta A-  
gria Anguillaræ, quæ Glandifera, paulò post Plin-  
ius contrā quàm Theophrast. Phellodryn viden-  
tur eandem existimasse cum Subere, quod &  
Phellos dicitur: vt & doctiss. Hermol. annotauit.  
Cui subscribit & Curtius. Et sanè Plin. omnia  
tribuere videtur Suberi, quæ Theophrast. Phello-  
dry. *ἡ δὲ ἄρῃα* enim Suberem denotat, & fructus  
*ἡ δὲ ἄρῃα* dicitur. Quæ si etymī significatione in-  
terpretari velimus, Phellodryn arborem, vt  
dicebamus, inter Suberem & Quercum veluti  
mediam agnoscemus. Magna quippe harum ar-  
borum affinitas, maximè Ilicis foliorum cum Su-  
bere, & harum fructus cum quercu aut Robo-  
re.

#### ARIA SIVE ACILACA BELLONII.

DE Aria à se in diuersis locis obseruata sic  
prodidit Bellonius sparsum. Aria in monte  
Athos retinet suum nomen: incolæ tamen Mon-  
tis Idæ in Creta nominant Acilaca. In eodem mō-  
te semper virent Aria, Phyllica & Ilices (*ἡ δὲ ἄρῃα* Loc. *ἡ δὲ ἄρῃα*  
verdis) altissimæ. Itinere Siderocapla Bucephalam  
in rupibus inter ceteras arbores maximæ erant  
Aria & Phyllica, quibus cū destituantur Galli,  
ne nomen quidem habent Gallicum. Circa Hiero-  
solytam quoque obseruantur Ariæ & Ilices:  
quemadmodum inter Hierosolytam & Damascum &  
modò dictæ, & paræ arbores Coccum ferentes.  
Acilaca & Phyllica in Creta Arbores sunt insigni-  
magnitudinis glandes ferentes. In monte Cretæ  
Pyloriti abundant Ilices & aliæ arbores Acilacæ.

I 2

Inter Halepū & Antiochiam & Ariā & Esculū & Elapponi. Hæc Bellon.

Cæterum quod dicit Ariam vocari in Creta Acilacam, confirmat nostram opinionem in locis antea ex Theophrast. citatis legendum esse, Aria, non Agria: & Ariam esse Phellodryn. Theophr. enim, ut dicebamus, ait Phellodrys fructum vocati *Αχιλας*, quæ vox sanè quamproximè ad Acilacam Bellonii accedit. Posterorum est Ariam Theoph. cum Acilaca Bellonii diligenter conferre, & ista omnia diligentius explicare. Sufficiat nos tot rebus implicitos ansum cogitandi vltiorem, & fortè etiam cognoscendi præbuisse. Non enim omnia possumus omnes, ut ait ille.

#### AGRIA SIVE AQUIFOLIA GLANDIFERA ANGVILARÆ.

Descriptio

Opportunè hîc de Anguillaræ Agria glandifera dicemus: quam Ilicis aliquod genus putamus, nec idem esse cum Aria Bellonii. Sic. a. suam Agriam describit Anguill. Agria, quam Plinius Aquifolium vocat, folia fert similia Ilicis, nonnihil spinosa: glandem minimam. Lignum eius durum est. Prouenit in montibus saxosis Sclauonia & Patavinis. Hæc ille.

Folia, vltius.

Anguill. citat.

Quale autem sit hoc eius Aquifolium ingenue fateamur nos ignorare. Interim is quoque ut alibi monuimus, non benè Sorbum Alpinam vocauit *Αχιλας*, plantam, hercle, admodum diuersam ab Aria Theoph. & ab Agria sua modò descripta.

#### PHELLODRYS MATTHIOLI.

Descriptio

Phellodrys Matthioli arbor est glandifera, quam quod folia ferat Suberis, corticem vero & ligni materiem. Cerro non ab similem ] Herbaria vulgè app. *Il. ac. cer. figura*, quasi *Il. ac. cer. berem* dicas: id quod etiam fecisse videtur Antiquitas. Quandoquidem Theoph. lib. 3. c. 16. ea Phellodrys dicitur.

Locus.

Copiosa hæc in agro Senensi, in omnibus, Archidossi, & Comitatus S. Floræ. Sed illuc usque non peruenit Anguill. cum de hac arbore nihil tradiderit inter glandiferas, quæ in Italia proueniunt. Hæc ille in post. com. Lat. & Ital. cum magnis figuris. Idem in Icon. scribit Phellodryn Hetruscis Cerro fugaro dictam, caudicem habere Suberi non ab similem, & folia & glandes Quercui siue Cerro similia. Nasci in agro Senensi in montanis syluis. *Il. ac. cer. figura* Theophr. ut notat Camer. in Epit. Matth. vbi huius iconem retinet, sicut & Tabern. qui Phellodryn & *Βορφρυς* vocat.

Illex fam. Arcadum.

Matth. tab. nativ.

Illex Smilac. Dalech.

C. Bauh.

Verum tamen quæ sit hæc Phellodrys Matth. qualisve planta, asserere non audemus. Hetrurix Herbarii aut Medici diligenter aliquando id docebunt. Interim obseruandum non sibi constare Matth. dum modò scribit folia esse Suberis, modò Quercus siue Cerri similia, quæ sanè à se inuicem insigniter differunt. Quod si nesciuit ille, saltem in eo peccauit, quod imaginariam collationem instituerit, in planta rara, & ut ille carpit, Anguillaræ non cognita. Quod si licet aut suspicari ex icon. ea accedit ad Smilacem Dalech. paulò ante dictam, quam & du Choul videtur Phellodryn nuncupare. Int. Lugd. Phellodryn Matthioli pictam sed non descriptam dicit. Vide plura infra de Phellodry nigra. Paulò securius C. Bauh. in Hist. Lugd. an aduertit videtur, cum scribit: Phel-

lodyrs alba angustifolia, & Phellodrys Matth. Cum vtraque figura vnam plantam exprimat, alterutra omitti poterat. Modestè in hist. Lugd. scriptum, Phellodryn albam angustifoliam, videri esse Phellodryn Matth. Idem C. Bauh. apud Matth. Phellodryn hanc Ilicem fœminam Arcadum Theoph. putat, & Phellodryn Cast. Lugd. & Tabern.

Clus. solertissimus, si quis alius, huius æui Botanici, Matthioli Cerro fugaro sibi nunquam conspectam fatetur. Certè nec nobis, etli Italix diuitias Botanicas lustraerimus. Sit fides penes authorem, donec aliquis certiora doceat. Dod. quidem fide implicità, ut videtur, meminit Phellodrys Theoph. & Cerro fugaro Matthioli, verùm nihil definit aut docet.

#### PHELLODRYS NIGRA ET ALIÆ DALECHAMP.



Phellodrys nigra vocata, id nominis à ramis nigricante cortice vestitis & glabris adepta est. Folia ab Ilicis differunt, quod rotundiora multò & latiora: Smilacis folus, quod longè breuiora pro latitudine, minisque candida inferius: à Suberis nobis traditi, quod duriora, spinis mordacioribus, magis horrida. Ita describimus

Descriptio Erym. Folia.

ex ramis generis Ilicis, quos habemus, quosque Dalech. Phellodryn nigram latissimis foliis & valde spinosis, calyce glandis lruui vocitabat.

Dedit nobis diligentissimus stirpium vestigator D. Agerius folia duo Ilicis frutescentis ex monte Euganeo, vncias duas lata, tres longa, prædictorum ramorum foliis admodum similia.

Hist. Lugd. quæ Phellodryn hanc Dalech. proponit, ad eam sic annotat. Quum de Ilice & Smilace dixisset Theoph. subiungit. Quod verò Phellodryn Arcades nuncupant, natura est inter Ilicem & Quernam media. Hæc ille. Si tamen nomen ex Subere & Quercu factum spectes Phellodryn, id est, Suberiquercum, naturæ Suberis & Quercus participem potius dixeris. Sed Suber Ilicis admodum simile est, ut nihil interfit, an ex Ilicis, an ex Suberis & Quercus confusus principii hanc dicas fuisse à Theophrast. nominatam. Quinque Phellodrys genera obseruauimus: duo candidantibus foliis, tria obscure virentibus. Vna igitur [describente Dalech.] est foliis altera parte albicantibus, angustis, longiusculis, crebris admodum & non profundis incisuris crenatis, leuiter asperis potius, quam spinosis: cortice cinereo: Glæ, cum matura est, ex fusco flauescente. Hæc videtur esse Matth. Phellodrys picta, sed non descripta. Alteri, folia altera parte candicante, latiora sunt, raris laciniis, sinuosa, molliter culeata: cortice, maturaque Glæ, ex atro rufo-

Nomin. rati.

Theoph. luff.

Quinq. Phello.

genera Phello.

2.

phello.

2.



edry

75073

112

## it.

it.

73.

Coronar rē-  
preh.

*Æquiuoca*

### Description

*Nucamenta*  
*ta.*  
*Glandes.*

*Ilex latifolia.*

*Dalecham-*  
*pii Smila-*  
*ces dua.*  
*Smilax*  
*Arcadum.*  
*Cortex.*  
*Folia.*  
  
*Flor.*

Milace. A.  
rilace.  
Materia.





sed reliquarum Quercuum folia minis, quanto minis etiam adstringunt. Egineta quoque similem quidem Ilci cum Quercu vim tribuit, sed multo fortorem quam ipsam dicit. Gal. sanè in 2. de alim. *A. xlvij* Quernà glande ad omnia deteriore esse ait, sicut hanc Castaneis, quæ omnium glandium optima sunt.

Rubentes pilulæ, quas præter glandes fert Ilex, tritæ cum aceto vulneribus recentibus & cruciatis oculis vultus imponuntur inquit Matthiol.

Folia eius refrigerant & reprimunt, vt reliquarum glandiferarum: quapropter & oedematosis tumonibus, & imbecillis partibus roborandis vultus adhibentur. Radix Ilcis tusa, & ichui Dryini imposita, plurimum prodest. Leo calcatis Ilcis foliis obfufecit, notante Curtio.

Ilcis honos ad axes & currus vnica tantum rotæ simplicis iugo tractiles *quædam dicitur* & iuga lytarum pfalteriorumque autore Theophrast.

Secatur & Ilex tradente Plinio, in laminas prætenues, colore quoque non ingrata: sed maxime fida iis, quæ tærantur, vt rotarum axibus, ad quos duritia sua vtilis. Proditum terebris vaginas ex Ilce vtilissimas fieri: ex eadem malleos maiores quoque. Hyginus manubria rusticis Iligna commendat.

Liber qui dicitur Oribasii ex Heliodoro de Machinamentis, organa ex Iligneæ materia tantum robustiori consicienda docet.

In carpentariis pro Ilce vtuntur Subere, vt videre est apud Plin. cap. de Subere. Theophrast. & Terebrum: ad igniaria ex Ilce facere iubet. Quibusdam in Castelle veteris locis Ilcis rami eduntur cubitali longitudine, in strus & aceruos congeruntur, & luto operiuntur, deinde subiecto igne in carbonibus vsilantur, qui Salmanticam & alia loca deportantur. Arborum trunci, ad molarum fibricas & alia opera seruantur, ob materiæ firmitudinem atque durabilitatem, teste Clusio. quantum videri præstet Carbo Iligneus ad metalla & alios vsus, vbi densa & frangi carbone opus, in superioribus declararum. Matth. sanè Iligneum Carbonei Hetruscis in pretio esse tradit, non modò, quòd ignem diu foueat, sed etiam, quòd [ vt aiunt ] vapore caput minimè tentet. Iligneæ glandis vsus in cibis antea diximus. Attamen ea suem angustam, nitidam, strigotam & ponderosam facit, si credendum Plinio. Horat.

*Vmber & Iligna nutritis glande rotundas*

*Currus aper lances carnes vitantis inertem.*

Colum. bobus exhibet Iligneas frondes in pabulum, quas & Querneis præfert, modò non sit spinosa: hanc enim propter aculeos respuunt, vt dicebamus. Virg. Georg. 2.

*Nec n. m. apes examina condunt*

*Cortibusque cauis: vitiosaque Ilcis aluo.*



Verùm præstat hic historiam Clusii subiungere, cuius iconem etiam proponimus, ab inepto sculptore unius felicitè paratam.

Suberus duo genera Matthiol. obseruauit: ego, inquit Clus. vnicum tantum, nisi fortè quod in extremi Aquitania Pyrenæis proxima nascitur, ab eo quod per Hispanias frequens est, diuersum sit. Nam Aquitanicum (quo I. quidem contemni) alia non retinet, sed Lyoniæ adest vt meri. Aprilis obseruauit, quo foliis prorsus viduæ erant quatuor Suberis arbores circa Bayonam. Quare Theophrast. non immodè tribuit Suberi deciduum folium, cum dicat arborem esse Pyrenæ familiarè. Quod verò in Hispaniis nascitur, perpetuò viret vt Ilex, cui aded simile est, vt prius a Clusio plerumque falsas, nisi vix cecidisset, & ditumpi solitus, errorem detegeret. Maius est Ilce plerumque, & caudice, vbi adoleuit, longè crassiore, cortice item denso, carnosò, scabro, & immixto, qui nisi subito tempore detrahatur, defiscit, aliisque subnascente expellitur: detrahitur, qui subest nouellus ita rubet, vt procul aspicientibus arbores, rubrica aut minio pictæ videantur. Suberis rami Ilignis firmiores sunt, folia maiora, longiora, molliora, & superne magis virentia, interdum non nihil dentata, aliquando minimè, vt in Ilce. Glans magna, vbi maturuit nigricans, & ligna longior, & obtusiore cuspidè, calyce etiam maiore, magis hispido, & per oras molliter echinato. Glans admodum adstringentis & exsiccantis gustus, Iligna multò ingratiior. Magna ex parte coniunctim nascitur, vt Pontica nux, sed crasso breuique petiolo, & firmiore quàm Iligna. Ramulis nonnunquam adnascuntur dura & lignosa quædam cinerei coloris tubercula, aded firmiter inharrentia, vt nisi fracto ramo eximi non possint. Matthioli Suber alteri oblongis angustisque foliis, quod Pisano agro nasci tradit sibi nunquam vsilum fatetur idem Clusius.

Quinqueranus libello quem de laudibus Provinciae inscripsit, triplicem Suberi corticem tribuit. Sed præstat ipsam audire: nam quædam in eius historia tradit ab aliis minimè obseruata. Suberis, inquit, arbor vberimè in Olbiensis ora provenit, Ilcis specie, glande maiore & deteriore, trunco ingenti. Hunc vestiunt cortices terni: primus præcrassus, qui in cadorum & omnium penè valorum obturamenta adiscitur, piscatorumque retia, contrà premente plumbo cleuat: ex

ribus. Glandes *Glandes.*

breui sed crasso pediculo appenduntur, simul plures, Calyce hispidiore. Pharmacopœus Pataunus ad Aquilam / dedit nobis Cerri nomine, Ilcis speciem, prædictis ramis valdè similem ni folia essent maiora multò, quatuor ferè vncis longa, & duabus lata, calyces eadem hispidi. Fortè varietas est à loco aut ætate.

*Suber A. quiritanicum folio densius.*

*Theophrast. illustr. Suber II. panta. per. fol.*

*Cortex.*

*Glans ex altior de scriptio.*

*Sapor.*

*Lignosa tubercula.*

*Descriptio Quinqueranus. Cortices terni, eorumque sapor.*

## SVBER LATIFOLIUM.

Suberis latifolii ramos, quos habemus ad Matthioli. Suber proximè accedentes, ab Ilce Monspessulana distinguunt folia rotundiora, minisque polita, adhæc ramis nullis aut minoribus spinis muricata, quæ tamen tomentum prona parte obtegunt, vnciam aut fescunciam plus minis longa, vnciam lata: Oriuntur hæc à ramis Ilce tenuio-





nem habet Suberiferæ latifoliæ, quam & Ilicem glande echinata vocat, & ad alterum latus ramulum angustifoliæ Suberiferæ, quæ omnino similis Matthioli Suberi angustifolio sine vllis tamen crenis & denticulis, quas tamen habere ait in descriptione: nec cupulo aculei pungentes appicti, licet in eadem id dicat. Sic enim designat viramque: Suberiferam latifoliam, seu Suberiferam Ilicem, si corticem eximeris, omnino eandem cum arborea Ilice dixeris: ei tamen folia & glandes rotundiora, breuiora, item dentata: cortex geminus stipitem amittit: alter interior, qui perpetuò hæret: alter crassior duos pollices, rugulosus, perquam levis, qui deglubitur, & quolibet gentium defertur. Multa Galloprovinciæ maritimus Tholonæ, Olbiæ & aliis adiectis, & in Tuscaniæ Lucæ prætura. Sed ad Apennini radices, & Anconensis agri collibus multò frequentiùsna quæ angustiore, longiore, minutiusque crenato folio est, ad arboream Ilicem accedente: glandoso semine, cupulo foris pungenti, aspredine scabro.

Mirum verò quod Bellon. scribit, Adrachnes fructum pulchri esse coloris, vt ad vescendum incitet. Pendere ex pediculis incuruis, crassitudine & coloris esse fructui Rubi idæi, & molles vt fructus Arbuti & Suberis, (Liege) saporisque fructus nascentis in Suberis arbore. Sanè hanc Bellonii comparationem non intelligimus. Quid enim molli & veluti minutis granulis compacto ac vtnoso Rubi idæi fructui, aut etiam Adrachnes, cuius fructum Arbuti simile faciunt, commune cum glande Suberis? Vt merito Clus. quoque eam comparationem, quæ Bellon. dicit Suber fructum ferre edulem, Arbuti seu Memecylo similem minimè digerere potuerit: Certè nec Clusio, nec nobis, nec fortè vlli Herbariorum alium fructum in Subere videre contigit, præter glandem: nisi fortè Bellonius Liege vocabulo duseram à Subere arborem intelligat, præter omnium Gallo- rum receptam opinio nem.

Dod. pro Phello seu Subere ponit iconem ex Aduers. paulò priùs dictam.

Camer. in hist. Germ. & epit. Matthioli. posuit portionem figuræ quam habet Matth. additque ramum alium Ilicis foliis angustis, non asperatis: quem à Gesnero ex nostris Monspelienibus fictis desumptum putamus, vt qui fortassis existimaret Suber Illud Matthioli. non differre ab Ilicè, quodque fortè minùs benè pictum putaret apud Matthioli. Titulus tabellæ est: Suber angustifolium: *quædam similitudo*. Iconem alteram Matthioli omisit, ac pro ea supposuit iconem Lacunè nihil mutatam. In hist. Germ. Matthioli. dicitur Suber i. latifolium. Hist. Lugd. Suberis viramque iconem Matthioli proponit.

Tabern. quoque geminas icones habet. Sic & Casp. Bauh. Suber duplex alterum rotundo folio: Suber Lac. Lonic. Cord. & Casp. & Suberella. Suber latifol. Clus. Cast. Tab. Lob. Suber folio breuiore & latiori Lugd. Phellos siue Suber Dod. Alterum Suber oblongo folio: Suber angustif. Cast. Tab. Suber Aquitanicum & Suber decido folio Theophrast. Clus. cuius ramum Suberi Latifoliæ suæ adpinxit Lob. vti dictum.

*quædam* Græcis plerisque, non *quædam* vt Had. Jun. in suo nomenclatore scribit: *quædam* etiam Theophrast. à nomine, quia semper altipetus & im- merabilis vndis manet, vt notant Adu. *quædam* Theocr. Schol. vt vult Jun. Suber Lat. & Herbariis. Poetæ *canum*, *multiformum* & *multica- num* dicunt, ob corticem: Item *siluestre* & *agreste*, quia spontaneum. Germ. *Pantostenholz* & *Sor-*

lenholz quasi *crepidarum lignum* dicas: arbor *Brachbaum* & *Borgbaum* iisdem, teste Cordo, à crepitu quem cortex eius sub pedibus edit, cal- ceis insitus. Gal. arbor & cortex *Liege*: seu vt Ruell. *Liegium*, à leuitate, vt putat, quod extet aquis, nec obruat. It. *Subro*, *Souero*, *Sugaro*, *Sug- hiero*. Hisp. arbor *Alcoro*que: cortex verò *corchia de Alcoro*que: Glans, Bellot a. Belg. *Corckboom*, *Blot- hout*. Fructum Curtius *quædam* dici notat, sed non alia quàm sua autoritate. Nam nec ita est, & vis vocis repugnat.

A Suberis corticis leuitate tractum Adagium: *Adag.* Subere leuio: de homine inconstante. Sed contra- rio sensu: Tanquam Suber: & apud Pindarum, *ad quædam* de his qui dissimulare aut mergi aduersis fortunæ procellis nesciunt. Nam, vt dicebamus, Su- beris cortex non solàm ipse non mergitur, sed & aliis alligatus, ea fidere non sinit. Subercum dixit Colum. & Serenus.

Theophrast. Suberem peculiariter *quædam* nar- Locu: sci scribit, in qua voce d. vñ. Victorius alique quidam docti mendum subesse suspicantur, legi- *Theophr.* que debere *quædam*, Copiosa namque hæc arbor est in maritima regione Hetruriæ, quam olim in- coluere Tyrreni, vt syluæ etiam ingentes Suberis sint prope Populoniæ, & oppidum quoque inde appellatum Sughereto. Corrupta enim Latina voce Suber; patria sermone Sughierio vocatur. Quod folio est rotundiore, in Romano. quod pro- lixiore in Pisano agro provenit, teste Dal. Specta- tur & Suberes in ora maritima Liguriæ, vt Plinio fides non sit adhibenda, qui nec in Italia tota na- sci, nec in Gallia omnino tradit. Nam hodiè satis abundè in vtraqueprovincia nascitur: et iam Plin. seculo ext. hille dubium non est. Immo Hetruriæ tractui Thyreno hodie penè propriam non malè quis dixerit, ad Theophrast. imitationem, si Ita- liam quis vtrumque respiciat. Nuppiam enim quàm illic copiosus, licet & alibi nascatur. Quid si Plin- num candidè interpretati dixerimus, Nec in Ita- lia tota nasci, hoc est, non in omni, non vbique. Sed obest nostro candori posterior clausula. Na- scuntur, inquit Clus. plerisque Castella nouæ, Bati- cæq; locis, præsertim circa el Puerto de Mirabel, vbi ingentes eius sunt syluæ, & totà adèd Lusita- niâ. Pyrenæis montibus admodum familiaris. Cortex non modò per vniuersam Germaniam sed totam adèd Europam uetus, vbique ferè ge- tium venalis profat.

Suberis cortex tritus, ex aqua calida potus san- *Vises &* guinem fluentem ex vtralibet parte sistit. Eius- *Vius.* dem cinis ex vino calido, sanguinem excreanti- *Sangu.* bus magnoperè laudatur, autore Plin. quod & *flu-* Serenus testatur hoc carmine.

*Sed quancunque fuit, vis immoderata cruoris,*  
*Subereus cortex, calidis potatur in vndis,*

*Antè minutatim studio vincente terendus.*

Phellos seu Suber, & maxime id quod est è vinariis valis, vltum, siccantissimum cinerem efficit, qui in Dysenteriacas maxime compositiones miscetur. In nimis purgationibus vteri, sanguine erum- pente, præbatur Suberis ex Italico vase vsti ci- nis. Mirificè etiam auxiliatur pudendis appositus. Ex Paulo. Estque hæc arbor cortice quàm reliquo habitu nobilior, quem geminum obtinuisse dixi- mus: quandoquidem prouida natura haud igna- ra sepissimè cortice spoliatauri hanc arborem, ad vltus humanos, caudicem gemino cor- tice muniuit. Vltus externi & crassioris, anchora- libus maxime nauium, piscantiumque tragulis, & cadorum obturamentis: præterea in hyberno sœminarum calceatu, inquit Plin. atque vltima

*Vises &*  
*Vius.*  
*Sangu.*  
*flu-*  
*xus*  
*Sangu.*  
*spu-*  
*um.*

*Dysenteria*  
*Menses su-*  
*perflu.*

verè, nec in luxuriam magis & fastum, proceritate eminentia, vt in Venetis mulierculis, [ & vbi non? ] alibique locorum tam in iis quàm in viris videtur esse. Non enim valetudinis tantum gratia, aut aduersus hyemis frigiditatem, calceis interluitur, sed aliis vnciali aut sextantali, [ quæ frigoris munimento sufficere posset ] alias trientali, immò & dodrantali aut altiori elevatione multis geminatis corticibus, vt grandiores videantur, & cæteris cuiusmodi quæ in supereminant, id quod in principum maximè aulis nupiam non cernitur. Quem abusum vel apud Priscos innuuisse, Clemens Alexandrinus; Pædagogi ex Alexi Comico testatur & ridet: *πρὸς τὸν μακρὸν τὸν ἀνδρῶνα τὸν αὐτὸν ἐν τῇ γυναικὶ*. Ex Xenoph. lib. de tuenda re famil. de re Homachi: *ποσὸν αὐτὸν δ' ἔργου ἔλκετο*. *ἔργον δὲ τὸν δὲν ἵππον*. Tam libenter sumus grandes. Sed abundè dicta èstratio, quæ se viorum iuxta formatumque forma ac statuta credit proceram fieri. Atque hoc norunt futores ac veterinarii, qui subeream corticem in promissos vtus appositè crepidis innectere norunt. Sed nec piscatoribus ignotus hic cortex, qui verticillorum alis, ne fiant, aut in profundum trahantur, appendere solent. Cæteras utilitates ad alucaria, ad tegendas domos & similes suprà diximus. Amatus medium illum corticem, quæm videntem vocat, colore tamen rubrum [ de quo suprà ] à Coriariis Hispaniæ pro præparandis bubulis coriis vsurpari solent.

vsus ad  
piscatorum  
vorticula.  
Interioris  
corticis &  
fusi ad de-  
panda co-  
rit.

## ILEX COCCIGERA.

Descript.

Folia.

In i.

Alia.

In cemen-

tatione.

Ornata.

Super.

Vermiculi.

2

In cemen-

tatione.

Ornata.

Super.

Vermiculi.

2

In cemen-

tatione.

Ornata.

Super.

Vermiculi.

2

In cemen-

tatione.

Ornata.

Super.

Vermiculi.

2

In cemen-

tatione.

Coccigera Ilex à nobis obseruata, multum magnitudine cedit aliis Ilicibus, vt quæ non temerè stolones duobus cubitis altiores proferat, eoque non admodum crassos: folia, Aquifolia proxima, minora, muricata, vtrinque glabra, verum non ita hilari virore nitida. Flores vel potius iulos copiosè fert, muscosos: glandem verò maximam, quod in pumila arbuscula mireris, etiam ligna altera maiorem, calyce asperiore. At præter hæc omnia triplicia excrementa in ea obseruantur. Vnum Maio & Aprili apparet, quod nihil est aliud quàm grana in foliis rubra, partim rotunda, partim oblonga, ex ipsa foliorum substantia nata, Pisis parvis æqualia, substantia intus alba, non ita ablimilis substantiæ fructuum Oxycanthæ Matth. gustu non nihil acido, grato, in quibus tandem vermiculus nascitur. Alterum excrementi genus, huic cum Ilce maiore commune, Maio mense apparet, ramis adhærescit, sed satis leuiter, copiosum, rotundum, nigrum, laui nitidæque superficie, satis durum, intus liquore albedo plenum, cui vermiculi innant, tandemque inarescit: circa quod feruent sæpè formicarum operæ. Tertium denique, eodem cum iam dicto tempore conspicitur in foliis, reliquis notius & celebratius, Coccum puta insectorum: grana sunt rubra, saltem puluisculo albo, quo resperguntur, absterfo, liquore sanguineo plena, cum concoloribus vermiculis huic solæ pumilæ Ilici propria, quatenus nobis obseruare licuit in Galia Narbonensi, nec ita vberit.

Quoniam verò non omnia nobis in miranda hac arbuscula obseruare licuit, habet hic Lobeli historiam quoque inferere, quod in ea multa ob-

seruentur notati digna. Coccus, inquit, insectoria, seu Ilex coccifera, an Aquifolia Plin. Insectorium granum cruore miniato & muricato pannos imbuens, nomen Arbusculæ fuit. Si, quam sæpè meritò & profusè laudat suam Italiam Senensis Commentator tam diligenter iustrasset, neutiquam dubitasset, an huius arbusculæ, vt vocat, reperiri in Italia, aut multò minùs Bizantiò Cocciferam Ilicem hanc acceperisset. Siquidem frequentissima hæc humillima Ilex, cum plerisque Italiæ locis, tum præsertim in Hetrusco Romano & Senensi finitimo agro, locis montosis, glareosis, sterilibus, inter varias Ilices, Smilaces asperas, Terebinthos, Lentiscos, vbi etiam, tamen paucæ & parum, nec quotannis, tamen nonnulla Coccum ferunt. Sed quia minus Coccinum, & paucum, citòque euanescent, partim ignoratur, partim negligitur. At in Gillo-provincia Arelatenfi plantæ patentissima, folibus æstiuis retortida, squalida, glareosa, lapillis, siccilibusque constricta, & Frontignanæ, Narbonæque maritimis, hanc legunt mense Maio, annis admodum æstiuosis, vt totum semestris nihil penitus pluat. Hæc Ilex tunc turmatim & vicatim confluit illuc Coccum lectum, quem Vermilionem voce vernacula vocat, atque venundatin mercatu singulam libram 12. & interdum vicenis affibus Gallicis.

Perelegans naturæ opus & visendum, non tamen fructus aut semen, sed excrementum nobile tantillæ Ilicis, quæ à cæteris Ilicibus exilitate tantum differt, horridiore aspectu, & rigidis spinulis densis, crispisque foliis ac sinuosis, minoribus, semper virentibus, sed Agrifolium præ se fert. Coccum autem ferunt copiosum, & amplexantur foliis introflexæ spinæ, atque furculi præditi copiosiores, nitidum, Agrifolii aut Asparagi hortensis plantæ similem, concolorem. Fusciore tamen & oblectiore foris, intus verò sanguineo cruore lucido gliscit, quem pressu excipiunt recentem ad medicatas cordique amicas, Alkemes præsertim, confectioes, Pharmacopœi Monspelienses, Aquilextenses, Massilienses, & Arelatenles, crudo, candido vel iuluo ferico, illic etiam Serificis vermicibus neto & glomerato. Verum Insectores, qui magnam vim Cocci emunt, non premunt, sed aceto aut albo vino irrorant, ne in vermiculos, aut vinifugas exiles muscas abeat auior, penè vacuis reliquis tunicis. Sicque in puluerem rubellum miniatum redactum feruant, unde Scoletium antiquis dictum, seu vermiculolum istud esse, satis liquet: & compertissimum non esse siuctum, sed excrementum Ilicis: cui in furculis sunt glandes longiores, nitidiores, nigriores, Quernis, sed echinato acetabulo, non bullato ima parte, inclusæ. Flores verò Martio illic promittunt muscosos, subluteos aut herbaceos Oleæ Ilicis aut Quercus. Cuius etiam mediis foliis & truncis non raro animaduertimus excrementa rotunda, rubella, & interdum fluita, maioraque Ilicis, in variis locis Heluetia plurima. Quæ non alia videtur ab ea, quam mulierculæ, Dioscor. dicente, legebat ore, & vocabant Coccum, fortassis quadam, vt verisimilis sit, similitudine. Sed cum nostrati Narbonensi & Hispano nullus hodie notior aut potior habeatur, viris que eadem omnes congruant, quas meminerint Scriptores, frustra itum improbat, & altum expetit, qui neutrum probè nouit Senensis Commentator. Hæc Lob. in Aduerf. qui in suis Oblitum pluit iconem Clusii, qui Hispanicam descripsit, cuius descriptio nonnihil variat à nostra.

An Aquifolia Plin.

Marth. carpin.

Locus: Italiæ nigrissimus.

In Italia minus Coccinum.

Legend. tempus.

Vermilion. Pretium.

De diff. Ilicibus.

Cocci descriptio.

Duplex descriptio.

De generis.

Scoletium.

Glandes.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.

Excrementum.



Ilex Coccigera, inquit, nunquam altè affurgit, sed multis ab eadem radice prodeuntibus ramis fruticat, duorum aut trium [quando plurimum] digitorum crassitudine, sepe numero vnus tantum, aut etiam virgulis tenuioribus, ramosis: folia illi superiore llicè minora, aliquantulum sinuosa, magis virentia, nec acria parte adè incana, rigentibus aculeis armata, quæ vultate interdum rubescunt. Pusillam & valdè amaram fert glandem, calyce spinoso & echinato. Obseruabunt studiosi Clusium tribuere suæ Hispanicæ llic pusillam glandem: at nos in Gallia Narbon. maiorem quàm llicis obseruauimus. Item quod ait, nec acria parte adè incana: quibus verbis satis clarè insinuare videtur esse leuiter incana, quod tamen in Narbonensi non obseruamus.

Coccum quomodo gignatur, & eius colligationem. Quæcunus libello suo de laudibus Prouinciæ sic declarat, llicis duo genera: alterum arboreum: alterum frutex exiguis sesquipedali proceritate latissimè viret, foliis læuore præfulgidis, spinarum vallo ambitis numerofo, colore affurgit in modum Rosarum: à nostris Fagi appellationem sortitur, quia nullam Fagi imaginem repræsentet. Prouenit locis planis quidem, sed in altitudinem euectis, exhibet & llicentibus collibus, sed infæcundis. Vere medio rotati umbribus Coccum hoc modo ordiuntur. Vltimus scirpus se in duo brachia partitur, in horum medio primum omnium increfcit rotundum quiddam, magnitudine & colore Pisi, hoc Maxem vocat, quod ex eo cætera grana producantur. Matres porò habet vt plurimum quinque quælibet capsum familia, quæ in eunte astate, æstûque maturissimorum vermiculorum cæteram profundunt, sat scûntque in summitate. In animalia prorept neua soboles, colore candida, pro se quisque in sublime. At vbicunque vermiculi vel geminantis furculi axellis occurrerint, desident, & incrementis ucti, multi magnitudine fiunt. Inde llicentis adolefcenibus, albus color in cinericium transiit, ianque non animal, sed Pusum rursus apparent. Tuncque ea grana maturitatem adepta colliguntur, iam coloratis vermiculis facta: dùmque asportantur mercatoribus, ambiens pellicula præ teneritate rumpitur. Vermiculorum quidem, qui citra vaginulam habent pretium in libram quamlibet, aureus solatus, in granorum verò, quæ adhuc eorum partem retinent, huius quadrans. Torpent interim vermiculi, ac immobiles iacent: ceterum cum primum tempestiuitas adest, in linteæ præcipitati, soli exponuntur. Tumbato calore statim prorepunt, atque effugere nituntur: sed à custode, qui continuus affidet, concussu linteæ in medium ed vique reiciuntur, donec emoriantur. Tanta quidem dum hæc fiunt, totòque mox triduo, odoris suauitate atque gratia, vt non Cibetæ, non Molcho, non Ambra, sed ne Citriorum quidem floribus facile concesserit. Si quæ verò grana legentis effugerint sedulitatem, ea mox alatorum animalium numerosum exercitum in auras effundunt. Obseruatum est vno anno ex campo lapideo, Arelatenfî agro, prouentum vndecim aureorum milibus æstimatum. Hæcenus Quicquid.

Similem Cocci parandirationem, inquit Clus. in Gallia Narbon. atque in Hispania obseruasse memini. Areas enim sub dio habebant ad eam rem destinatas, eminentè aliquantulum margine, quibus linteo panno instratis Coccum effunde-

bant, custodibus summo seruore Solis perpetuò assidentibus, & extrema linteæ bacillo concutientibus, vt vermiculos effugere properantes, iq̃ interiorē linteæ partem repellerent: istam tamen summam odoris suauitatem non sensî, licet satis acres & sagaces habeam nares. Verum Bellon. Cocci Cretici historiam tradens, aliam præparandirationem tradit: cuius quoque verba referre lubet. Cocci baphici census ingens est in Creta: sed eius collectioni cum potentiores operam impendere nolint, pastoribus & pueris istam prouinciam relinquunt. Inuenitur mensè Iunio in exiguo quodam frutice, ex llicis genere glandem ferentis, sine pediculo inhærens istius fruticis stipiti, colore ex cinereo albicante. Sed quia istius fruticis folia spinis horrent, vt Aquifoliæ, pastores furculam sinistra gestant, qua ramulos depri-munt & inclinant, dextra autem putatoriam falcem qua illos demetunt, & rotundas vesículas exigui Pisi magnitudine auferunt, qua parte ligno ad hærescunt apertas & hiantes, pusillis rubris animalculis lende minoribus plenas, quæ per hiatum illum effugiunt, & inanem vesiculam relinquunt. Pueriam collectum Coccum ad Quæstorē deferunt, qui ex dimenso ab illis redimit. Is animalcula à vesiculis cribro segregat, deinde sumis digitis leniter eaprehendēdo, in pilas efformat gallinacæ cui magnitudine: nam si nimium comprimeret, tota in succum resoluenterent, & color periret. Itaque duo infectionis genera: vnum pulpæ, alterum vesicularum. Quoniam autem pulpa ad inficiendum commodior est, eius pretium quadruplo maius, quàm vesicularum.

Inuenitur etiam aliud genus Cocci Baphici supra Myrtos, quod indictum veteribus & recentioribus.

Ceterum Theophrast. videtur nobis obscurus in tradenda Pisi siue llicis historia: cui tribuit granum quoddam puniceum: & paulò pòst describens Phelodryn siue Aiam, ostendit llicis glandem maiorem glande Quercus: quæ duo, vt alia multa, quadrare llic Coccifera possunt. Verum quædam alia, vt arboris magnitudo, & glans pusilla non conueniunt cum nostra llic Coccifera: quæ occasio, vt hæreamus dubii an discrimen Theophrasto fuerit notū inter llicem arboream & Coccifera: vel an quædam Ilex arborea etiam Coccum ferat, quæ diuersa sit à nostra llic Coccifera. Theophrast. verba antea recensimus sub llic arborea: vbi ait: ἡ ἰπὶ τοῦ τὸν φρυγικῶν κόκκου &c: Diofcor. κόκκος βαφικῆς frutex est paruus, furculosus, [φρυγανὴς Dalech. putat legendum φρυγανὴς, llicis similis. Non malè. Non enim est è Cremiorum genere, vt Sarac. conuertit.] cui grana seu lentes adhærent, quæ exempta decerp-tare reponuntur.

Herimol. Barbarus, inquit Marcellus, Græcos codices secutus, quos nos etiam vidimus, in quibus non leguntur ἡ ἰπὶ τοῦ τὸν φρυγικῶν κόκκου Nos ex aliis Græcis & Plinii historia admoniti eā seruauimus vocem. Quod verò Diofcor. ait hæ-rerē Coccum ἀφ' αὐτοῦ, idem Marcell. non ad formam grani, sed hærendi modum referendum esse censet. Nos, hercle, ad neutrum ritè referri posse putamus. Lentes enim siliquis immixtæ hærent. Ita solet Diofcor. vt interdum minus exquisitas ac proprias comparationes adferat.

Idem Diofcor. mox subdit Cilicium Coccum etiam in quercubus innasci, ἢ τὰς δρυὶν, quo in loco sanè nobis placeret doctiss. Anguil. suspicio, legendum esse ἢ τὰς πηγύας, nisi aliud obesset, quod pluribus dicitur in loco. Sed quid Plinius

De odore dubitatur

Cocci legi di & parandis alia ratio.

Vermiculi

Duo infectio-nis genera

Aliud genus Cocci Baphici. Ancygnus Theophr.

Diofcor. illustr.

Cilicium Coccum.

Omnes, inquit, Quercus dotes Ilex solo prouocat Cocco. Granum hoc, primòque ceu scapus fruticis [ceui scapo fruticis Dal. qui ait malè emendare Turn. ceu scabies. At sanè hæc correctio vt ingeniosa & rei accommodata nobis placet: est enim excrementum veluti scabies.] paruz Aquifolia Illeis: Cutilium vocant: pensionem alteram tributi pauperibus Hispaniæ donat. Et alibi: Coccum Illeis &c. Est autem genus ex eo in Attica ferè & Asia nascens, celerrime in vermiculu. n. se mutans, quod idè Scolecion [σκολήκτιον] vocant, improbanteque. Principalia eius genera diximus. Vide p. 84 de loco. Dilech. pro Cutilium quisquiliam legendum putat: nam quidquid Festo quicquid fureulorum foliorum uve cadit ex minutis arboribus.

Cocci etiam meminit Pausanias in Phocæis. Perpetui inter vites eius fruticis ordines, quem Iones & reliqui Græci Coccum: Galatæ qui super Phrygiam sunt, patria voce Hys nominant. Crete eadem magnitudine qua Rhamnus, folio nigriore & molliore quàm Lentiscus, in reliquis Lentisco simili: eius fructus Solani fructui similis, Eui magnitudine. Gignitur in Cocci fructu pusillo in animal: id si maturo fructu in aërem exiliat, statim volucre fit, culici simillimum. Verum priusquàm concepiatur animalculum, Cocci fructura legunt. Est etiam animalculi sanguis tingendis lanis utilis. Hæc ille. Veteres autem codices, inquit Clus. vt à nobiliss. Iac. Sufio Græcè & Latin. peritissimè admonitus sum, non habent *σκολήκτιον* nec *σκολήκτιον*, sed *σκολήκτιον* & *σκολήκτιον*, hoc est, Ilex, seu Ilex, pro Lentiscus & Lentisco: quæ sanè lectio legitima est: nam quæ similitudo Cocci infestum cum Lentisco: facilis autem est lapsus à *σκολήκτιον* in *σκολήκτιον*. Hæc not. tamen dubius hæret de quarum planta hoc loco loquatur Pausanias. Sic enim scribit: Coccus Baphicæ: Pausanias qui fruticem hunc in Locale copiosam ad Amyclion Rhamni amplius hinc, præterea Lentisco similem &c. describit, fructu Solaniq. i. iem. specie, sed Eui magnitudine. Sit autem Granum tinctorium, aut Phœnicobalanos atque Palmula, quod Hip. Phœnition Coccon quasi Granum puniceum vocauit, æstimatis relinquo. Sed huic dubio iam citata emendatione satisfactum. Idem refert, Coccina quædam legi apud Græcos texta, quæ nostri ceu Coccina legentes in Strabone rubra conuertunt. Ceterum Coccina dicitur, Coice frutice.

Tam Coccus quàm vermiculus Sanguisorbæ Panicalingua *Chermes* appellatur. Hieronymus in sacris literis vermiculum & vermiculatas vestes nominat, Granum [vt idem Hermol. opinatur] Aquifolia significans, quod auctore Plin. quibusdam locis vermiculi similitudine conspicitur. Hinc denuatum putat, vt Coccinea vestis Scolecidata, hoc est, vermiculata vulgò diceretur, siue quasi Quisquilata, [Etenim granum Cocci etiam Quisquilum vocatur Plinio, vt paulò antè dictum] à quisquilis. Nec dubium Hieronymum ad Coccum Scolecium respexisse. cum *χρυσόκτιον* reddidit vermiculum. Rob. Const. Scolecium Plinii est Coccum Illeis. De Vermiculo purpureo Democritus quoque meminit tinctoris utili, sed è purpureis ac murice, vt idem Herm. coniecit, Nam & de Vermiculo Galatiæ, hoc est, Iligno, idem Democ. meminit.

An hanc Illicem intellexit Colum. pro minore? Is enim geminam dixit: minorem apibus quæstam, & prolixiorẽ omnibus improbatam maleficio.

Illeis, inquit Ruell. in Gallia duo genera inue-

niantur: Cocciferum, in duplici discrimine, minus quod nunc Gallia vocat Scarlatum, in Narbonensi prouincia frequens, vbi rusticis *vermiculum* dicitur, frutice paruo, exilibus ramis, & aculeato folio: grano quo duities lanæ pretiosio illuminentur succo, aspectu coloris gratissimo, in rosis micante. Colosiam Barbaro notior, quàm Latino aut Græco nomine, quum Mauritanis *Quermes* nominetur: inde Quermesinus, nobis Carmesinus, qui quisquillo tutelet Colos, vocetur. Sed Scarian nomen à Latino immutatis literis videtur oriundum. Quod verò secundum & maius Illeis genus vocat Ruell. de eo agemus postea sub Aquifolio.

Subtilitatem nobis nouam important Monachi. Fatentur quædam Chermes idem esse, vt & ab omnibus exponitur, cum Grano tinctorio, cuius duo principalia genera faciunt: vnum Coccum, seu Coccum Baphicum, quod Serap. Chermes dicitur: Alterum granum Chermes, vel simpliciter Chermes, &c. Iam, inquit, in Elect. de Gemmis, apud Mes. nonnulli ignoranter Chermes alterum, Coccum intelligunt, ob id, quia in exordio descriptionis eius Elect. legitur esse Granum tinctorum. Sed hi decipiuntur, quoniam Chermes est aliud à Cocco &c. His sese opponens Mathiol. Patres [Monachos intelligens] inquit, hallucinari ex eo equidem euidentissimum fieri arbitror, quod hæcenus neminem Arabicæ sectæ inuenierim, qui eorum ad tripuletur sententia. Si quidem Serapie per Chermes nil aliud intelligit, quàm Coccum tinctorium à Græcis appellatum: cum de Chermes agens ea sanè omnia in eius historia referat, quæ Diosc. suo Cocco tribuit. Scire libentissimè ne quæ autoritate in hanc vanam deuenierint opinionem. Non negarim ob id, nostram Chermesinam à Cocco minime differre, sed negarim Mauritanorum Chermes nostri vsus Chermesinam esse, quod nil aliud Chermes esse putem, quàm Coccum Diosc.

Matchiolo subscribunt Lacina, Amatus, Arguil. Lonic. Clus. Dod. Apollo. Hist. Lugd. & alii plerique. Ac peritissimi quique Coccum & Chermes pro rebus diuersis agnoscunt quidem, id tamen non concludere censent, Chermes non esse Coccum tinctorium Serapionis & Arabum ceutorum. Brasauolus quoque in exam. Syrup. diuersa quidem esse fatetur, at Chermes ait sub Cocco comprehendere.

Interim Marth. haud exiguum suæ existimationi inusset notam cum tantus Herbarius, vt vulgò iactatur, nescire se ait, an Cocci arbuscula in Italia proueniat. Fortè Plinius ipsum absteruit, vt ne vel suspicari quidem sit ausus. At si diligenter Italici diuitias Botanicas lustrasset, non Bizantia accessitam suam picturam, vt ipsemet fatetur exprefisset. Sed maiori etiam oscitantia de ipso grano seu Cocco iudicat. Labet eius verba referre. Coccum, inquit, tinctorium communis vsus constat rotunda inaniquæ bacca, quæ nullam profectò Lentis faciem refert, vt Diosc. asserit. Vt hinc planè coniecere liceat, Coccum hoc diuersum esse generum, nostrumque facillè illud esse, quod Plin. in Attica & Africa prouenire tradit, Scolecium idè vocatum, quoniam ex eius medulla tenues exoriuntur vermiculi: argumento quod hoc inane intus deprehendatur. Ita ille ad pauca respexit ita retanti momenti & tam multiplicis vsus.

At Marcellus qui ante eum scripsit, & ipse Hertricus, eum docuissent quomodo Diosc. intelligendus sit: saltem aniam suppeditalet meliora, certio.

Plin. emend.  
Dal. not.

Aquifolia  
Illeis.  
Cujuslibet.

Scolecium.

Plin. lectio  
not.  
Coccus  
Pausanias.  
Hys.

Pausanias  
emend.

Granum  
tinctorium.  
Pausanias.  
Istius  
prouenit  
coccu Hipp.  
Coccina  
texta.

Chermes.  
Vermiculus  
lacinarum  
de.

Scolecidata  
vestis.

Quisquilum.

Coccum  
Scolecium.

Vermiculus  
Illeis.

Illeis  
plex.  
An Illeis  
minor Co-  
llectio.

Scarlatum  
Vermiculus.

Quermes.

Scarlatum  
Vnde.

Chermes.

Chermes.

Monachos  
resistent.

Marth.  
Hys.



certioraque perquirendi: nec tam planè, ut is ait, coniciendi, Cocci diuersa esse genera: in qua quidem re Aduersarius, quorum censuram & verba antea produximus, haud immerito titubantem hunc commentatorem ridet.

Camer. in epit. Matthioli nouam iconem proponit, nomine Cocci infectorii: & tamen aliam alio titulo, nèpe Cocciferæ Illicis appictis glandibus, excrementis atque Iulis, addita adscriptio- ne & obseruationibus iisdem planè, quas (ego Bauh. Jam olim iuuenis cum plantis meis & obseruationibus D. G. Inero tanquam fido Preceptoris candidus discipulus transiferam, quem ut industrium & diligentem philosophum scio multum adiuuasse, magnam lucem inde studio Botanico attulisse, & attulisse maiorem, si vir ille, communi bono natus, diutius vixisset. Epistolæ eius ante paucos annos à Cl. D. Casp. Bauh. editæ, fidem abundè faciunt eorum quæ hic testamur. Interim thesauro eius naturali aliò distracto, minùs candidè nobiscum actum fitemur, quando nostris labores & conceptus supposititio partu parentem mutasse, nullo honoris vel nostri, vel Gesneri, nulla gratitudinis compensatione, non sine cachinnis contemplamur. Non ita fecisset Gesnerus, vir modestia, gratitudine, & æquanimi- tate, præter singularem eruditionem, toti Mundo nouissimus. Sic vos non nobis &: Fruatur iis tantisper bonum publicum, dum interim maturiora meditamur.

Extant & herbarum imagines, nullo autore nominatæ, vbi Cocci baphice nomine fictitia icon habetur. Non enim ex pediculis pendet Coccum, vt ibi pingitur. Nec putamus Gesne- rum in Catal. cum ait. Aquifolia vel Aquifolium, *ή άγία* aut *άγια*, Coccum fert, istud Coccum de quo hic agimus, & quod tam à Grecis quam Latinis, præcis ac neotericis Herberis *άγιος* & Coc- cum *ή άγία* dicitur, intellexisse. Monendi ta- men incauti, ne fortè decipiantur. Quia mul- tum differt bacca Aquifolii, à Cocco baphica nostra.

Tabern. geminas quoque icones huius vnius plantæ habet: vnam titulo Illicis cocciferæ: aliam vitiosam, & ut videtur, ad libitum factam, nomi- ne Cocci tinctoriæ seu infectoriæ: quam sanè noli- mus in renouato Matthiolo adiectam.

Hist. Lugd. quoque frustra duas posuit icones. Scire debuit aut monere eius confarcinator, cum calyx complectitur glandem, immaturam esse, & principium eius. Priorem traditis Synonymis: *Ilex aquifolia* Plin. siue *Ilex parua aquifolia*: *Phel- lodrys Coccifera* quibusdam Theophrasti lib. 3. hist. cap. 16. communi nomine *άγιος*: *άγιος* Dioscor. *Chermes* Serap. Huic, inquit, Glans, ro- tunda, Calyce aculeis rigente, totamque ferè, vt Cerro, complectente. Nimirum immaturam glandem & imperfectam ac inchoatam tantum, ne- sciuit à completa distinguere. Posteriozem sim- pliciter cocci infectorii arbutulam nominat. Vt sub quo cælo versatus fuerit, ipsemet nescisse vi- deatur.

Nec placet Amati iudicium iniquitatis. Grani tinctorii Plinio duas esse partes: exteriorem corticofam, quam *Cascolban* Lusitanos & Plinium *Quisquilium* vocare. Non enim Plinium intellexisse videtur, qui non grani exteriorem partem corticofam Quisquilium dicit ac intelligit, sed to- tum granum ipsum indifferenter, quod etiam coc- cum Illicis alibi vocat idem Plinius.

Ilex Aquifolia coccifera da Choul in hist. Quer- cus.

Cornar. post tot Authores qui ante eum scri- pserunt, incertum se fatetur de cocci tinctorii ortu: & qui integrum eius Emblema ad Diosc. le- gerit, comperiet eum non nouisse discrimen in- ter coccum Illicis, & coccum radicum, quem ait vocari *Zichirbitz* in Podolia.

Lacuna scribit Diosc. confundere coccum [ *la grana* ] cum planta quæ eam profert, nempe Illicis specie parua. [ *Enzinella* ] Quasi verò hoc nouum sit, frustus nomen pro planta sumi, & vice versa. Maioris momenti, quod ait, corticem tantum plantæ adhærere: nos etiam in foliis obseruauimus. Notatu dignum, si verum quod idem ait, vermiculos cocci ipsissimi puri sanguinis colore esse & in extremo gradu aromaticos: qui ali- quantum aucti prodeant ex semine in terram de- ciduo, & innumera multitudine vicinis atrepere parietes. Idem & odoratos dicit: quod incolis examinandum relinquimus, potissimum an adeò sint aromatici hi vermiculi, vt hic ait, quod à ne- mine alio hæcenus proditum nouimus. Idem vult, coccum si simpliciter ponatur aut legatur apud authores, intelligendum esse istud, quod & nos statumus.

Singularis & planè *άγιος* nobis videtur Anguill. quando de cocco & plantis cocciferis scribens ait: *Italis la Grana* dicta, vel coceos baphica nascitur in duabus plantis distinctis: Illice, & in planta propria. Coccus Illicis adhuc hodie repe- ritur in Prouincia & Salautonia, vbi *Cernach* voca- tur, quod tincturam significet. Prouenit etiam in Macedonia, vbi similiter *Chernach* vocatur, sed cum aspiratione in primi syllaba. Hæc ipsa plan- ta profert eum liquorem, quem Theophr. *ύγας* vocat, colore rubrum, substantia mellis: quo mul- lierculæ illius loci fuci vice vtuntur, nam rubello decore cutim commendat. Prouinciales *Chermes* nuncupant. Ast planta propria quæ coccum fert, prouenit in agro Valentino Hispaniæ: vbi radicè propagatur, stolones emittens lignosos cubita- les, foliis vestitos Agrifolii, sed parua & modum, in ambitu spinosis: & intra foliorum pediculis grana progignit multò pulchriora maioriæque I- gnis. Hæc eadem nascitur in Creta, vbi *άγιος* vocatur: ibique grana colliguntur circa Fe- stum S. Crucis, quod aliis temporibus colligi ne- queant, sicuti grana Pimpinelle. Chermes & coc- cus Arabum & Græcorum eadem res est, vt pate- bit conferenti vtrorūque scripta. Hæc Anguill. Quem vt sagacissimum aliqui Botanici mira- mur non aduertisse coccum in Prouincia in pro- pria arbore Illicis specie, vt à nobis descripta est, & ab Illice, tamen diuersa, nasci, non minùs quam in Hispania: quam & eodem modo propagant. Mirari item subit, eundem inter glandiferas ar- bores non reposuisse. Sanè videtur ei Ilex cocci- fera non benè cognita fuisse, quicquid tandem de ea tradat. Clusius profectò, qui diligenter Hispa- nicas plantas perquisiuit, vnicam tantum obser- uauit cocciferam Illicem. In Illice maiore seu ar- borea, de qua antea egimus, in Hispania nullos coccos obseruauit, sed tantum granum nigricans *Ilex coccifera* & nos in Gallia Narbonensi. Planta igitur quam Anguill. propriè cocciferam appellat ac describit eadem nobis est cum Illice coccifera Prouinciæ & Hispaniæ.

Nec minor admiratio nos habet, vbi Anguill. apud Theophr. *ύγας* scripserit succum esse. Nec nos, nec vllus alius, quicquam tale apud Theophr. legimus, aut ab aliis proditum legimus. Aut si ma- ximè etiam succum talem obseruauit, qualem de-

Corna not

Vermiculi  
aromatici.

Cernach.

Chernach.

Hyphear  
Theophr.  
quid an-  
guill.Gazopri-  
nos Creta.Anguill op-  
rio refut.Ilex coccifera  
serapropriè  
Anguill.Anguill ef-  
ficium Hy-  
phear ex-  
plosum.

scribit, nihilominus reprehensione non carebit, quod ei nomen *vgi* ap. rem longè diuersam, vt sub Vilco ostendimus, ausus sit assignere.

Dodon iudicio vnus tantummodò *vgi* meminit Theoph. Duo tamen genera posteritati obseruata, nempe glandiferum tantum, quod vocat, [ nobis Ilex arborea ] & alterum Coccum ferens, à Diofc. sententia aliena esse. Illicem siquidem lib. i. inter *Δρύες* refert: alterum verò lib. 4. sub titulo *κόκκος βαρβικός* describit. Sed hoc peculiare idem Dod. annotat: Coccum ferentem Illicem quandoque vnico caudice arborentem attollit: sæpè tamen fruticantem esse: Glandem [ si quando proferat ] pusillam gignere [ nos magnam satis obseruauimus, vt dictum. ] Hallucinari eos, qui Chermes ab insectorio Cocco differens esse opinantur, & circa radices alicuius herbe veluti Pimpinellæ reperiri ac colligi. Hæc Dodon. qui suam iconem ex Clus. habet, suamque descriptionem, partim ex eo, partim ex Theoph. eudisse videtur. Nondum etiam ei concedimus simpliciter. Theoph. vtramque Illicem non agnouisse: rationes suprà diximus. Rarum etiam esse videtur id, quod Coccum baphicæ, vnico tantum caudice arborentem vidisse tradit. Nic. Reusnerus, vir Cl. nec ignobilis Poëta Germanus, vtramque Illicem ex Theoph. eandem putasse videtur, etiam in suis Emblem. eleganti Tetrasticho sic celebrans:

*Fortius umbrosa nihil, aut secundus vsquam  
Illice, quæ Viscum nobile fronde parit.  
Et præter glandem ferit Coccum lararubentem  
Et foliis semper frondet amana suis.*

Synonyma Ilex coccifera *κόκκος* Coccum Græcis: *ύζο* Pausania: Lat. *Coccus baphicæ*, sed *Grani tintorii* aut *infest. rj* vel *Kermes* nomine potissimum Sepalsius cognita. *κρίν* Theoph. vt vult Rob. Const. Hip.

Præst. *κόκκος*: Plin. Coccum vocat. Arab. *Chermes* vel *Kermes*, vel *Chermes* vel *Chermes*, *Quermes*, & *Alkermes*: Tot enim modis scriptum inuenimus. Nec dubium, esse Chermes Serap. quoniam vniuersum caput Diofc. exscripsit. Myreplus sericum ex Grano Illicis dixit. Grana Theoph. *κόκκος βαρβικός* videtur nuncupasse. Cætera prius dicta. German.

*Phagnolium*. Scharlachbeere, & Scharlachgrün. Gal. *Graine d'Esclaire*, Vermillon: Item simpliciter, *Graine*. Ital. *Grana de tintori*. Hip. *Grana para tennir*: & *Grana en Grano*. Castel. *Casoi*, arbor & grana: quæ vox à Culculio Plinii detorta videtur. *Grana de tintore*. Catal. *Coscol* & *Quasque*. Portug. *Gran de Casco*. Tinctura scarlatum dicitur: quibusdam

Scarlatum Carmesinum. Carmesinum. Non tamen est genuinum illud de quo mox trademus sub Pimpinella. Coccum verò hoc Græcorum, vel Chermes Arabum à Chermestino vulgò dicto diuersum est, vel tinctorum iudicio, qui Granam vocant, *Graine*: Chermesinum verò quod ex herbe radicibus colligitur, *Carmesini*.

Locus & del. Aus. Optimum Coccum Diofc. gigni tradit in Galatia, & Armenia, deinde in Asia & Cilicia: locum postremum obtinere quod in Hispania prouenit. Sed ea vox Asia [ *asia* ] mendi suspicione maxime vacare, visa est doctis: quoniam & Galatiam & Armeniam Asiæ regiones esse constat. Idèd quidam eam vocem planè expungendam censent. Alii Asiam pro Lydiæ ciuitate, Asiæ, vnus ex mundi quatuor partibus accipiendam censent. Sed interim sciendum, an ibi etiam Coccum proueniat. Nos nihil decernimus de regionibus nobis incognitis, hoc est, non lustratis. Probabilior tamen nobis videtur doctiss. Sarraceni coniectura, qui *Asiæ* vel *Turciæ* reponendum censet: quam

Plinius de casco. *sanè* ex Plin. haust: qui ait: Gigni & in Galatia,

Africa, Prædia, Cilicia. Pessimum in Sardinia. Et alibi etiam Lusitanæ grana celebrat. Dixerat autem prius: Coccum Galatiæ rubens granum, aut circa Emeritam Lusitanæ, vt dicemus in terrestribus in maxima laude est. Verum vt simul peragantur nobilia pigmenta, aniculo grano languidus succus: idem à quadrimo euanius. Ita nec recenti vites nec senescenti. Item alibi: Est genus Coccilicis, in Attica ferè & Asia nascens, celerimè in vermiculum se mutans, quod idèd Scolicion vocant, improbantque. Principalia eius genera diximus. Cæteram quod Diofc. vilissimum omnium Hispanæ Coccum dicit, neutiquam ei subscibit Lacuna hispanus, qui longè excellentissimum in multis hispanæ partibus colligi testatur, ac tale quidem, quod facile cum Galatiæ & Armeniæ possit comparari. Magni etiam fieri quod in Sezinbra, parte Lusitanæ crescat: immò illud reliquis omnibus præferri. Quod verò ex Africæ Barbaria aduehitur multò minoris esse virtutis ac valoris. Cui sanè fidem neutiquam derogamus, maxime cum ipsemet etiam Plinius Lusitanicum ( quæ Prouincia hispanæ contra-mina est ) in maxima laude posuerit, quippe imperatoris dicatum paludamentis. Crescit, inquit Clus. multis hispanæ locis, in Narbonensi etiam Galia & Prouincia. ( vbi & ipsi multoties vidimus & legimus ) Nec dubium quin & plurimis aliis, sed non vbiq; Coccum gerit. Nam iis solum regionibus, quæ Mediterraneæ mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur, nasci animaduertebam. Sed neque istic perpetuò fert. Cum enim frutex adèd adoleuit, vt glandem alere incipiat, Coccum non gignit: idèdque solent incolæ quadriennes aut aduoliones fructes vrere, vt proximo anno nouelli resurgant, qui deinde singulis annis aliquot subsequenteribus Coccum ramulis inhaerentem, instar exiguum Pisorum coloris cinereti gignunt. hunc pueri & mulierculæ colligere solent, & mercatoribus vendunt, qui magna eius copia coacta, deinde preparata, in Emporia mittunt. Nascuntur etiam inter Hierosolymam & Damascus Illices cociferæ, ex quibus incolæ, teste Bellon. colligunt Coccum [ *Graines d'Esclaire* ] & mercatoribus Venetis vendunt, qui emunt in omnibus Mundi partibus. Arbustulæ Illicis cociferæ circa Monspelium euulsæ & in hortos Stuckardianum & Montbelgardentem E. Celi. transplantatæ, hyemèque repositæ plures annos durarunt. Sed nec flores, nec Glandes, nec Cocco protulerunt.

Colligendi modos suprà ex diuersorum obseruationibus ostendimus. Illud addendum in Gallia Narbon. ac fortè etiam alibi, non legi Coccum annuatim, sed cum anni temperies tulerit. Nam si Ver pluuium fuerit, omninò deperit. Ad hanc verò messiem, ingens hominum turba vndique tam ex locis vicinis quàm remotioribus concurrat. Ordinatum omnes procedunt, vt nemini ordinem aut præuertentem, aut anteuertentem liceat, magistratibus etiam prohibentibus, ad quam item leguli, si Bened. Curtio credendum, in campo decubant, à quibus tunc mercatores Coccum ipsum emunt.

Alit vnus aut alter scriptulus restat eximendus in Diofc. Is tradit nasci Cilicum Coccum in Quercubus, exilis cochleæ similitudine, quod illius regionis mulieres ore legant & coccum vocitent. Vt de posteriori prius dicamus, fatemur cum Marcello, non intelligere nos in quem vsu ab incolis mulieribus ore aueli aut excipi opus fuerit, & pro, *ut* *sciam* aliter quodam legi potuisse.

Anno.



Annotat Sarac. in Vet. legi, *in secunda m. i. sed* Scholion esse, al. *sp. i. u. m.* Sed neutra lectio placet. Nam ad quid ferro opus ad tantulas bacculas legendas? Et *sp. i. u. m.* seu luxatio, quid hic doceat? Marcellus putat aliquid substituendum quod tempus designet, quo legendus sit Coccus. Idem Cornar. pro *sp. i. u. m.*, substituit *in t. p. d. p. e. t. a. t. e.* Quæ lectio fieri quidem potest, si cum Diosc. mente consentiat. Sed quis id nouit? Plin. de hac re nihil: nihil Theophr. Aut quid si relicta vulgata lectio- ne dicamus mulieres ex ramis auulis ore decerp- tum dentibus continuisse, & in Pilulas redege- se, ne inde nascerentur vermiculi? Aut quid si cocci genus aliquod magnum illud fuerit, quod & ore & manibus decerpi mereretur? Sed inæ- hæ sunt coniecturæ. Redineamus tanquam Cornarii lectionem, donec certiora aliquando inue- stiget posteritas.

Sed quid in Quercubus [*in t. p. d. p. e. t. a. t. e.*] etiam nasci Coccum? Infelicem verò Germaniam aliâ- que nobilissimas Provincias, quæ tot alant Quer- cus quas nec vnica vnico, quod quidem obser- uatum sit, beatis Cocco. Quapropter merito dili- gentissimus Anquill. hanc lectionem Diosc. dige- rere nequirit, sed *in t. p. d. p. e. t. a. t. e.* seu *in t. p. d. p. e. t. a. t. e.* re- pone voluit. Hæc suspicio nobis oritur, ne fortè Dioscor. licem genericâ voce *sp. i. u. m.*, qua omnes glandiferas arbores intelligi in principio huius l. diximus, complexus sit, aut fortè licem arboreâ. (si modò ea sit alicubi Coccifera, quod ex Theo- phrast. aliquis suspicari posset, hæc tamen verò ne- scitur) sed prior opinio magis arderet, nisi prius *in t. p. d. p. e. t. a. t. e.* dixisset. Et quid opus fuit de- nud obtrudere *sp. i. u. m.* vocem? Et si *in t. p. d. p. e. t. a. t. e.* legendum sit, Cur de Cilicio potius id dicat Diosc. quam de Galatiatico & Armeniaco? Quæ ratio- nes nos mouent, vt nonnum certam & indu- bitatam Angullaræ lectionem agnoscamus. At- que ex hac quidem velitatione nos retraheret in assensionis portum Matthiolus, si ei viro, finge- re consueo, fidem auderemus adhibere. Ait enim: Coccum inuenisse se in quibusdam Quercubus Boh. Et rursum in post. com. quod in Quercubus inquit, nascitur Coccum (vt Dioscor. in Cilicia nasci scribit) copiosum quoque in Bohemia proue- nit. Primum quod à me visum est, truncum fe- rè totum occupabat non infimæ Quercus, non longè Poggibroi in Leporario, quod Parcum fera- rum vocat Cæsar Ferdinand. deinde aliis etiam in locis: sed cū ab incolis non cognoscatur, quotân- sit perditur. At qui in polonia vbi etiam copiosè proue- nit, nō desunt, qui illud diligenter legunt. Hæc ille.

Infelices verò nos denud & omnes cate- ros Medicos aut Herbarios, qui tot Querceta per tot nobilissimas provincias minis sanè septen- trionales quàm Bohemia ac Polonia, tanquam tamen harum diuitiarum participes nunquam fa- cti, in hanc usque diem, pace sanè Matthioli, du- bii hæreamus, an vspiam locorum vnquam in Quercu natum sit Coccum tinctorium: de hoc enim agitur, & intelligit Matthiol. Optassemus sanè sciam naturæ scrutatorem graphicè docu- se formam, magnitudinem, cohesionis modum, colorem, saporem, tempus, ceteraque quæ ad il- lorum naturam intelligendam facerent. Item an planè conueniant, atque adeo nihil aliud sint, quàm veluti Cocci Ilcis. Quod quia non fecit, nec testem, vel vnum, vel plures produxit, qui cum ipso Coccum in Quercu viderint: quia item Medici & Herbarii illorum locorum nihil hæte- nus, quod equidem nobis confiter, istarum rarita- tum [fortè sibi solis seruantes] communicarunt,

Tom. I.

aut aperuerunt, tanquam bona Matth. venia du- bitabimus, num verum Coccum tinctorium vi- derit in Quercu, donec Medici aut Sepiasarii istorum Regnorum nos doceant certiora. Interim, tam is, quàm ceteris rei herbariæ studiosis con- siderandum relinquimus, an non fortè viderit Matth. illud excrementum rubellum quod Lob. & nos quoque non semel obseruauimus tam ex- trunco quàm è mediis foliis enatum, sed Cocco tinctorio maius: similia ferè & passim videas in foliis Fagi. Si sic? Cum Cocco Cilicio Dioscori- dis conferre non debuit, minis verò idem dicere. Mirum etiam nobis videtur, ad quid Poloni istud tam diligenter legant:

Cæterum Coccus Baphica, teste Dioscor. vim habet adstringentem: cuius ratione vulneribus Vires & nervisque sauciatis trita ex aceto conuenienter Vires. imponitur. Et Plin. Coccum Ulicis, inquit, Vul- Nervul. neribus ex aceto recentibus imponitur: Epipho- ris ex aqua & oculis suffusus sanguine instillatur. Galeno Granum tinctorium adstringentem si- Epiphora. mulque amarum qualitatem possidet. Oculi suffu- Vires. Vtraque si- ne morfu desiccatur. Proinde ad ingentia vulnera congruit, & ad neruorum vulnerationes. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt: alii cum oxy- melite. Eximie conferre hoc granum mulieribus Abortu. abortientibus cum pari thuris pondere in poti- sumptum: id quod & Fuch. & Matthiol. testan- tur, qui ait, mulieres Italicas puluerem Cocci ina- sectorii non infelicitè sumere ex ovo foetili pau- co addito thure vel mastiche ad prohibendum abortum. Idem affirmant mulieres Lugdunenses & Gallæ pleræque: atque adeo Amatus se cum mulieribus ab abortum prorsus magno iuamen- to exhibere solitum testatur. Nostro tempore mulierculas Monspelienfes & Nemaufenses in Difficili difficili partu & collapsis viribus eius pulueris partu. scobem ex vino, aut ipsam etiam Confectionem Alkermes non sine fructu hausisse scimus, quod & Clus. obseruauit. quadam etiam eâ vel ante partum, tanquam sacra anchorase muniant, ad quam necessitas tempore confugiant. Roborat enim partes, siue prædictis qualitibus manife- stis, siue etiam [vt quibusdam placet] totius sub- stantiæ familiaritate, quam dicunt habere cum corde præcipuam. Medicis certè Monspelien- sibus nihil præstantius in quouis casu præcipiti, & morbis acutissimis, Apoplexia, Paralyti, & simi- libus esse scimus. Mesues eam ad cordis palpi- tationem, syncopem, mentis alienationem seu de- sipientiam, & mæorem sine causa manifesta ce- lebrat: facultates enim nostrum corpus dispen- santes mirificè roborare testatur. Efficacissima, in- quit Sylius, multorum etiam Regum in Gallia testimonio est probata, maximè in quibus vel longo morbo fessis, vel iam moribundis, vel ab eo reualescentibus, natura languet: etiam si qui- busdam maximè improbari audiam, dicentibus Coccum baphicam solùm astringere, & suo colo- re rubro sanguinem & spiritum similitudinis ra- tione magis ad se distrahere & dissipare, quàm cogendo firmare. Præterea lapidem Cyaneum [qui eam quoque ingreditur] vomitu & deie- ctione purgatorium, naturam turbare tantum, & humores melancholicos exagitare, ob quantita- tem tam exiguam non vacuare. Ac prior obie- ctio non maioris momenti nobis videtur, quàm si quis de vino rubro & astringente idem diceret, quod tamen vel magis illud præstare posset. De lapide Cyaneo: etsi Sylius illam probabili satis ratione diluere conatus sit, aliis considerandum putamus. Nam ad quid vomitoria atque purgan-

miscbimus cardiatis & ad robur viscerum destinatis, ut in eadem compositione, quod ille pretendit, denuo ea castigemus? Omittit, & recte castigaueris. Non ideo minaris momenti, nostro sane iudicio, fuerit confectio Alkermes: immo vel multo nobilior, quippe quae pacatis generosius, & nullo impedimento turbata, munere suo cardiaco strenue sit functura. Et nouimus viros praclarissimos; etiamque Medicos quosdam apud Montepelenses cereberimus, aliquando eiusdem fuisse sententiae.

Quaestio de  
tempo con-  
fecti Alker-  
mes.

Iouberis  
sententia.

In eius vero compositionis fabrica potissimum dubitatur, utrum sit melius, Granum tinctorij succum, qui sericum nondum infectum usurpare: an ex serico eo tincto resumere ac mutuari. Sagacissimus Medicus Iouberus sententiam à Mesueo non frustra requiri existimat, cui succi copia esse potuit: sed utriusque copiam & qualitatem expecti, quem etiam crudum sericum & in substantia [ut vocant] ipse Mesues permixtus aliis immisceat cardiatis. Eiusmodi autem serico, ut verum fateamur, paulo magis quam nihil vitium. Illique sane vires cardiacas tribuere videtur tota fore Medicorum schola, fide potius implicita, quam ratione bona & aperta. Malimus igitur ipsum et succum accipi, si haberi possit: [potest autem ab his qui incolunt eas regiones ubi nascitur,] aut ex succo granorum recenti & saccharo Syrupus parari potest, ut & cum aliis succis sit, cui succus pomorum & aqua rosarum addi potest [absque serico crudo] ex quo deinde & ceteris addi solitis confectio praestantissima, quando lubet concinnati queat. Aurum quid in ea possit aut praestet, non iunt Sapientes. Haec res non est huius instituti.

Manardus  
reprobat.

Apollon ex-  
pugnat.

Non tamen probatur nobis Manardus in consuetudine Mesuei scribens ad eam confectio nem se nunquam prostituturum suas pecunias, quod neque in serico vocato, neque in cocco, vel Baphica vel chermes, agnoscat vim nisi constringentem: ledere cor potius, quam iuuare, &c. ei dubio, inquit Apollon, mentem adhibuit Syllius, at difficultate porterritus, insolutum reliquit, nos soluere tentabimus. Sed Deus bone, quam elumbi conatu: ad adstrictionem recurrit, ad rosarum succum aut liquorem stillaticium [de quo non queritur,] ad colorem succi, qui sanguineam dirigat massam atque defecet coloris familiaritate. Miserabilis erratio, ac Medico Philosopho indigna, quaecumque a colore sumitur ratio. Sufficiat scisse adstrictionem quam Dioscor. & Gal. nos docuerunt, & sensus ipse, ut de substantiae familiaritate nihil tradamus. Sufficiat item scisse, Ambram, Lignum Aloës, Cinnamomum optimum, Moschum & cetera, quae hanc confectio nem ingrediuntur, partim & ipsa cardiaca atque adeo etiam cephalica esse, partim succo Cocci baphica, quae basis est eius compositionis, pro vehiculo esse ad partes principes, quas roborat, muniat, atque sua adstrictione a vaporum & humorum ingluvie tuncatur, aut ipsos etiam spiritus dissolutos cohibeat, & retineat in officio. Tota autem confectio odoris iucunditate non modò oblectat, sed & corroborat, & corporis spiritus vehementer reficit, animumque exhilarat. Sed de his disputent otiosè alii, dum nos hic dissertationes fugientes, recensendis & enarrandis vinibus immoramur.

Vulnere  
cap.

Linamentum  
ex Cocco.

Fallop. Expof. in lib. Hipp. de Vuln. e. Solemus inquit, in vulneribus capitis linamentis uti ex serico grano infecto, ne sit autem chermesinum, quod tingitur vermiculis illis: at si è cocco aut Grano fiat, praestantissimum est, non ex Vermiculo nato in cocco, sed ex cocco ipso, quoniam

linamentum illud vim habet adstringendi. At quia ex nauigationibus Indici adueniunt vermes, quibus purpuram illam merentur, ideo semper obseruauit fugere, cum non possim scire, an ex vero cocco, vel ex vermiculis sit tinctura illa.

Iam verò nihil pretiosius, & in maiore fortuna honestius hodie habetur quam coccum, & coinctus pannus Scarlatinus dictus, quo Reges quondam à priuatis, nunc nobilitas à plebe vix discernitur. In pretio & honore merito habetur, nisi corrupta morum disciplina, caleatque sumptuariis legibus, ceu araneorum telis, promiscuum plebi eum colorem nostra tempora fecissent. Vestes scimus eo infici admirabili furo. Atque ut fiteamur, Galatiae, Africa, Lusitaniae granum cocci imperatoris, ut Plin. ait, dictum paludamentis. Coccina autem, ut habet Martialis, aut ut Lampridius, indumenta coccea, quae scilicet cocci colorem imbibebant, olim plurimi fecit Antiquitas, vel hoc vincto argumento, quod coccum Imperatoris paludamentis dictum prodiderit Plin. Huius puluisculo & hodie lanas inficiunt vivido illo colore, qui in rosis micat, quo aspectu nihil gratius, & in purpuras Tyrias, Diaphanæ aut Laconicas. Etenim Tyrio primum tinctas, mox ex cocco tingere mos erat, aut contra, notante Dalecham. Nam & tertio, quarto & quinto saturabantur, vnde nomina illa vestium, Monocoros, Tricoros, Tetracoros, Pentacoros in vitis Principum.

Nunc etiam, ut tradit Const. ex cocci & Bersillii facie pigmentariorum Lacha paratur ad rubrum saturum. Non autem illam Lacham intelligimus Arabum, quod cancamum est Graecorum, hodie ignoratum, ut putatur: sed illam pictorum. De qua etiam doctiss. Fuch. lib. de comp. med. qui a Lacham tradit ex Arabum secta, gummi scilicet Kermes, siue Alkermes, ex quo carmesinus color paratur.

## COCCVS RADICVM.

Idem vulgò CHERMESINVM, quod ex herbarum radicibus colligitur, Oramoisique dicitur, iamiam tractandum venit. Ex sanguisorbæ igitur [attestante Hermol. in Diosc.] radice, quibusdam locis, ut ferunt, vermiculus eruitur, qui curatus, sericis præcipue tingendis purpuram facit incomparabilem. Inuentus casu, excrementis gallinaceorum ita coloratis, nam & visus purpureæ, ut est apud Iulium Pollucem ab Hercule videtur institutus, confectio canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igitur Purpurissimum hoc vermiculo Carbasinum ad praestanti amphitheatrium velorum [ut abiturat idem] colore dicitur. Quidam carbasinum appellant colorem: quoniam vermiculus hic Punica lingua carmes appellatur, quemadmodum & coccus. Potest & ab vrbe charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanas inficere Sardibus ceptum sit, ut inquit Plinius. De hoc vermiculo nihil apud Veteres inuenias. Hermolao subscribunt cardanus, Amat. Corn. Lacun. Monach. Matth. & Apollon, quamvis & ex alia quoque nasci credant. Sericum [inquit Card.] tingebatur apophyte quadam Bibinellæ, sed nunc maior copia grani, quod è Fica Indica prodit. Karbasinum porro, quo floribus ille ruber color efficitur, à Kermes Arabum longè aliare est. Hoc siquidem ex Illice colligitur, illud autem [ut Amatus quoque testatur]



reatur] ad radices Saxifragiæ nascitur, Pimpinella similis, non solum in Italia, sed Polonia, & alius variis regionibus: nec tantum ad radices prædictæ, sed etiam ad Farraginis, Parietariæ, & aliarum herbarum, Lentis magnitudine, vt Coccum Illicis, quod occysimè quoque in vermiculum vertitur, ni vt decet tractetur, vnde quidam Coccum Scolection dici apud Plinium arbitrati sunt. Sed hic scire licet, quod ab hinc sex tantum annis, ex insulis nouiter repertis in Hispaniam aduectum fuit & inde in Italiam, tanti magisterii & coloris supremi, vt illius vicia vna superauerit opus confectum libræ vnius vulgari Carbisini: quâ de causâ, Venetiis sericum carbisino infectum, vilissimè pretio habetur: imò nigrum carbisino carius venditur. Ait autem hoc in loco Constantinus eos verba Plinii negligenter legere, qui credant, rubes granum illud, cuius infectu vsus est parando carmesino coloris, Scolection esse Plinium: cum hoc coccum sit Illicis, illud verò tuberculum quoddam rubrum & excrementum, nõ fructus, in quibusdam plantis concretum.

Meminit Cornarius coci ad radicem herbæ similis Plantagini, Arnoglossum appellatæ, in Samaria ad Rusiam impetante Podoba nascentis, vulgò 3f. hrbis dicti, voce ex Kermes, vt putat, corruptâ, ex quo panni inficiantur, qui color Scharlach & Chermesin in Germanis vocetur. Quodque vbi colligatur hoc granum, quinta parte tantum, quod centenario dicitur, vel quinque, aut sex aureis Rhenanis veneat. Verum inter excicandum ac præparandum, dum in puluillum redigitur, tantum ipsi decedere, vt ad nos allatum libræ vnius pondus triginta, aut quadraginta plus minus aureis valeat. Et addit, grana singula singulis radicibus adnascencia. Lentis magnitudinem non excedere. Et hæc vera esse, ac ideo Veteres longè suâ opinione falsos esse. Verum fallitur ipse Cornarius, qui inter Carmesinum adhuc radix Plantagini, Arnoglossi dictæ, & Chermes sine coccum Illicis nullum dici non nouit ac id nõ dicitur. Quare etiam quædam præparata nunciatam ad radices herbæ cuiusdam inueniantur, non propterea Veterum Coccum solum natâles, & originem, nascendique modum, vt falsò Cornarius putat, nescierint. Ad tincturam vniuersalem panis, grana, quæ in aliquibus locis ad radicem vulgari Pimpinellæ colliguntur, inferunt, testatur Lacuna, qui ex Peru quendam granorum speciem adferri scribit, quæ in illis partibus Cochinella vocatur.

Monachi in M. f. dist. 4. c. 4. supra confectio nem Alkermes, duo principaliora granorum tinctiorum constituunt genera. Vnum, quod simpliciter, absolute, & quasi autonomastice, granum tinctorum & Coccus arabica, dicitur: & Alterum, quod non absolute granum, sed granum Chermes, vel simpliciter Chermes (vt proprie vulgus vocat, nuncupatur. Et hoc granum est, de quo Mesues intelligit in præsent, & aliis pluribus locis. quò videlicet grano vrantur tinctores solummodo ad tingendum setam, quæ postea à Chermes, vel Karmes, vel Chermes, vel Chermes, Chermesina, aut Chermesina cognominatur. Et reperitur hoc granum ad radices quarundam herbarum, sed abundantius ad Pimpinellæ, & proprie ad illas, quæ sunt annosæ & crassæ: quasi in superficie terræ. Rustici quidem in pluribus Italiæ locis colligunt, & præcipue montanis & asperis. Vtrumque enim tam coccum, quam Chermes apud tinctores notissimum est. Nonnulli tam-

Fom. I.

men ignorantes Chermes, coccum intelligunt, ob id, quia in exordio, præsentis descriptionis legitur declaratum, quòd sint grana tinctorum. Sed hi decipiuntur quoniam Chermes est aliud à Cocco: & hoc multis est clarum. Vnde aliqua res tincta in Cocco, coccinea dicitur: quæ autem in Chermes, Chermesina vocatur. Quando autem Aromatarii volunt huiusmodi confectioes parare, in quibus ingreditur ipsa seta tincta, ab ipsis tinctoribus possunt eam emere. Et aduertendum quòd ipsa seta debet esse recentè tincta, quòd author notauit, cum dixit: Et proprie: super cuius tinctura non præterit spatium extensum. Hoc autem diximus quia scimus quòd plurimi, cum inueniunt in receptis setam tinctam in Chermes: accipiunt scissuras, seu quicquibus pannorum sericorum charmesinorum, quas proiciunt factores, tanquam non amplius aptas ad vestimentorum vsus, super quarum tinctura transierunt plures anni, non aduertentes quòd dicit author: Fac modicum bullire, donec aqua rubeat. Ex præfatis autem scissuris, seu frustulis, siue per modicam, siue per multam decoctionem, nunquam aqua redibit: & per consequens, nullam possunt tribuere Medicinæ virtutem. Igitur necesse est, vt sit recentè tincta. Non tamen recentissimè, sicut extrahitur ab infectionis vase, vt adhuc permadescat: sed post primam, vel secundam suæ exsiccationis diem: & inde interspiciam octo vel decem dierum fiat operatio submersionis eius in succo pomorum dulcium & aqua rosata. Præterea non ignorandum, quòd hoc nomine Chermes, vocatur etiam tinctura rubri coloris, cuiusdam generis Laccæ, siue [vt mauis] Lacchæ, vt legitur apud Serapionem. Item animaduertendum, quòd in pluribus locis per mendosas impressiones pro Chermes est positum Chermes: vnde inibilegitur mendosè: Seta tincta in Chermes. Et quodamque per contrarium in aliquibus locis, in quibus legendum est Chermes, legitur Chermes.

Hæc Monachi, qui alio loco reprehendunt Brassiaulorum, quòd confuderit Chermes, cum Chermes, qui volent plura, eos consulant.

Contendunt ergo Monachi, aliud esse Coccum, aliud verò Chermesinum. Etenim asserunt si legitimum Chermesinum è quibusdam fieri granulis, quæ vt plurimum vulgari Pimpinellæ radicibus adnascencia reperiuntur, vocarique hæc proprie Mauritanis Chermes: & hinc isti deinde colligunt, ait Matthiolus, minimè credendum esse, quòd Græcorum Coccum, vulgò grana tinctorum nuncupatum, sit Mauritanorum Chermes: quandoquidem magna omnino inter colorem coccineum, & chermesinum intercedat differentia. Sed hos hallucinari ex eo equidem euidentissimum fieri arbitrat, quòd hæcenus neminem Arabicæ sectæ inuenerit, qui eorum ad stipuletur sententia. Siquidem Serapio per Chermes nil aliud intelligit, quàm Coccum tinctorum appellatū à Græcis, cum de chermes agens ea sanè omnia in eius historia referat, quæ Dioscorides sub Cocco tribuit. Quapropter scire quilibet meritò desiderat, quæ ratione, quæue autoritate nixi Monachi in hanc vanam & erroneam deuenierint opinionem. Verum non ob id quicumque negauerit, Chermesinum nostrum à Cocco minimè differre, quòd certò sit, aliud esse Coccum, aliud Chermesinum, vnde & infectores, differentia causâ, Granam nuncupant: Chermesinum verò, quòd è Pimpinellæ radicibus decerpitur. Sed negauerit Mauritanorum Chermes nostri vsus

K 3

Chermes à  
cocco diff-  
fert.

Pro seta  
tincta in  
Chermes  
quia acci-  
piendum

Chermes  
ex Laccâ

Chermes  
pro Chermes,  
falsè  
legitur

Brassiaulo-  
rum error.

Aliud Coccum,  
aliud  
Chermesinum

Monachi,  
notantur.

Chermesinum esse, quod nil aliud chermes sit, quam coccus, cuius hic meminit Dioscorides. Chermesinum nouum iam pridem conuehitur in Italiam.

*Apollo ob-  
secras  
Bipinnella.  
Strella.*

Diligentem porro considerationem ea requirunt, quæ Apollo tradit. Nascentur in Hetruria, Umbria etiam super herba ex Bipinnella genere, vulgò Stella, quod vel semen sit, vel subterranei vermiculi ouum quibusdam dubio fuit, quod citissimè in vermiculum, cimicis æmulum, atque in papilionem alatum permuteetur. Nos dubitamus an perspectum fuerit discrimen Apollini cocci Ilicis & cocci radicem.

*Coccus ra-  
dicum  
C. Bauh.*

C. Bauh. apud Matth. & in Phyt. Ad Pimpinellæ Saxifragæ maioris radices in quibusdam locis grana notantur, quorum medulla in colorem rubrum mutatur, cuius vsus ad tincturam carmesini Lacuna monente, in quibus & vermiculi, Costæo auctore, nascuntur, quare coccus radicem dici poterit.

Animaduertes hoc in loco Lacunam non scripsisse grana hæc provenire ad radices Pimpinellæ Saxifragiæ.

Ego quoque coccum radicem primus nominavi, licet frater id subiceat.

*Polygonis.*

Camer. ad Matth. Germ. coccoferum Polonicum, Polygonum, cui adnascuntur bæcæ, ex quibus pulcher color ruber chermesinus, quæ etiam Iunio mense repemuntur in Herniana.

*In Hernia-  
na.*

## AQUIFOLIUM SIVE AGRIFO- LIVM VVLGO.

### C A P. III.

*Institutum.*

PRæter institutum nostrum glandiferis hic iungimus bacciferam: verum à bacciferis incæteris dissimillimam, & Ilicibus magis accedentem, atque aded à multis cum illis confusam.

*Descriptio.*

Agrifolium igitur vulgò dictum, al: cubi in iustam arboris magnitudinem excrevit: sapiens pumilum vt ad frutices referri possit, perpetua fronde viret: caudex & rami lentis, flexiles, læues cortice duplici muniti, exteriore viridi, [in trunco vtpurimum cinereo] interiore pallido, odore cum auelluntur, tum etiam sapore ingrato, faciente: materie chlora, albæ, dura ac solida ac circa interna nigricante, quæ in aqua præponderat, Buxi aut Guaiaci instar. Folia satis magna, densa, sinuata, longis & rigidis in ambitu spinis horrentia: [interdum, licet rariùs, superiora folia Laurinis sunt similia, sine aculeis, quod in vetulis arboribus copiosius obseruatur] colore ex viridi splendente, vt in Malis aureis ac Medicis, ex pediculo breui, sapore non ita ingrato vt cortex, flores pulchri, parui, chlori si rectè recordamur, quaternis foliolis, totidemque apicibus constantes, [in quorum medio bæcæ rudimentum] conferti vt in Lauro, breuibz pediculis appensi, quibus succedunt bæcæ parvæ, rotundæ, rubræ, vmbilicatæ, gustu subdulces: cum tetro quodam sapore: intus continentur semina quaterna, oblonga, triquetra, striata. Velut in aula amplissimi & verè Regii illius Palatii, à Granuella S. Imp. & Caf. Carol. V. quondam Cancell. exstructi, vidimus magnam fati arboris fronde magna ex parte non spinosa, ob id, obiter aspicienti, Lauro repræsentantem.

*Cortex.*

*Materies.*

*Folia.*

*Varietas  
foliorum.*

*Sapor.*

*Flores.*

*Bacca.*

*Sapor.*

*Agrifol. fo-  
lio non spinoso.*

Dod. ait: senescente arbore, pauciores vel nullos aculeos habere. Idem & Caspalius obseruauit.

Theophr. Aquifolium [ἀγρία] inter sylvestres perpetuò virentes recenset, idque non vno loco vel lib. 1. c. 15. ponit inter vrbanas perpetuò virentes Laurum, & inter sylvestres Ἀγρία, vbi Gaza verit Aquifolium, imitatus Plinium, & rectè, postea subiungit, & ex iis crescere circa Olympum Τερεbinθον, Ἀγρία, Ἀδελφον, Gaza conuertit, Laurum sylvestrem: Clus. Laurum Tinum putat: nos Agrifolium intelligimus. Item lib. 3. c. 4. Montibus propria, quæ nasci in planis nequeunt. Macedoniz Abies, [Ἐλάνη] Pinastrum, [πύκνη] Picea, [πίττα] Aquifolia, [ἀγρία], nec vertendum Picea sylvestris, vt fecit Matth. Item postea sub finem cap. Inter sylvestria perpetuò virent, quæ primo volumine retulimus, Abies, Pinastrum, Picea, Aquifolia [πίττα, ἀγρία]. Sic enim in nostro Aldino legitur, interposita distinctione: Gaza Piceam agrestem, & Matth. sylvestrem vertit: neuter bene. Terebinthus, Philyca, [τερεβινθός] malè Gaza Aquifolium reponit: nam Philyca materies est alba, & in alendo pecore honor: Agriz seu Aquifolii materies non est albida, neque frondes pecori viles fert. Apharca, Laurus, Suber, Quercus, [φελύδρις] Apud Theophr. lib. 3. c. 16. vbi agit de Subere, Ἀγρία Gaza vertit Aquifolium: nos, vt antea monuimus, censemus legendum Ἀσία, id est, Phellodryn & non vertendum Aquifolium.

Apud Plinium bæcæ sunt Aquifolio, & spinæ sine lucco: folia aculeata pungentia: cui è genere sylvestrium ea non decidunt: germinat Vere cæpturo, Notandum Plinium vocare coccum baphicam Ilicem Aquifoliam paruam, fortè quia Aquifolio proprè dicto similis.

Theoph. arboris genus intelligi voluit crategonon siue Cratægonam, quam Itali Aquifolium vocant.

Qui leget quæ scripsit Theophrast. lib. 3. c. 15. de cratægo, faciliè insignem Plin. lapsum animadvertere verba posuerunt lib. 3. sub Sorbo torminali.

In Macrobi commentariis scriptum est, Agrifolii arboris nomen. Qua voce Ilicis genus etiam nunc Valcones vocant, inquit Scal. licet corrupta, Agreol.

Ruell. scribit: Est Aria siue Agria, quam pro Ilicem Aquifolia Dores vltorant. Quibus verbis licquid patet ipsum nullum discrimen facere inter Ariam & Agnam, quod tamen nostro iudicio non est paruum, vt suo ostensum loco. Idem ait: Aquifolium sibi videri, Veteribus nihil aliud fuisse, quam Ilicem. Ilicis verò duo esse genera, minus & proluxius. Plinium tamen negare succi quicquam habere Aquifoliæ bæcæ: sed de ea forsitan intellexisse, quam Græci Smilacem appellant. Et alibi: alterius Ilicis genus [Aquifolium intelligens] maius perpetua fronde virens iniustam arborem proflire, cum sibi commodam natum sit humum, caudice læui, folio pungente aculeo perambitum armato, bacca punicea. Hac ple-rasque Galliarum sylvas scaterere: sed in multis locis tam pumilem arborem, tamque crescenti piteram, vt ad frutices potius sit referenda. Vulgus Gallicum Hous aut Housson vocare, rusticis non ignotum, qui sæpè spinarum iniuriam experiantur. Quod si non sit generis Aquifoliæ Ilicis, paruam tamen aut nihil differre videri. Subscribere iudicio suo permultos studio & doctrina insignes. Glandiferam Ilicem Gallis esse rariorem, quam vt sæpè conspicitur. Satam tamen apud se in hortis creuisse, cingente robustam frondem spinarum vallo. Nec se clam esse, cratægum vel crategonam Aquifolium in Italia, auctore Plinio voca-

*Agria  
Theophr.*

*Theophr.  
vbi cor-  
rupta  
ilustr.*

*Matth.  
Picea.*

*Gaza  
Matth.*

*Gaza  
matth.*

*Aquifolia  
Plin.*

*Cratægum  
Theophr.  
Aquifolia  
Itali.  
Pliny  
lib. 3.*

*Agrifolia  
arbor  
crab.  
Ilicis ge-  
nus.  
Agreol.*

*Ruell.  
preb.*

*Ilex  
Quercus  
Ruell.*

*Smilacem  
den.  
Ilicis  
folia  
Ruell.*

*Glandi-  
fex.*

*Cratægum  
voca-*



*veani.* Non tamen simile veri, esse licem Aquifoliam cum à nullo ei reddatur folium aculeatum. Theophrasto neque esse arborem magnam &c. Mox subdit: Theod. Gaza Aquifoliam intellexit, quam Theophrast. Agriam huc Ariam appellat, sempiterna frondis arborem, inter Robur & Ilicem mediam. Sunt qui Smilacem Aquifoliam interpretentur, haud ferendo errore. Nam Arcades arborem faciunt Ilici similem, folio tamen non aculeato, molli, profundo, materie soluta & in opere tenera.

Iouis Barbam nonnulli contendunt esse quam Theophrast. Diosporon, id est. Iouis sementem: [Sic enim apud Athen. legimus] alii Diospyron, id est, ut nonnulli vertunt, Iouis flammam: alii Iouis triticum malunt interpretari. Arbor extat Parisius in peristylis sacrarum ædium D. Genouæ: An Diospyron fuit, inquit Ruell. asserere non ausim. Nimirum ad pauca respexit coniectatione sua. Nobis relatum Parisiensem illam esse Agrioli arborem folio non spinoso, qualem supra diximus esse & fieri anofam. Sicut est, non placeat pro Diospyro, nec etiam separanda à Gallorū *Rosæ* seu Aquifolio, quod Ruell. & cum sequenti aliquifacere velle videntur. Falluntur & ii, qui Pyxanthum esse putant Germ. *Rosæ*, Gall. *Hu.*, Lat. *Aquifolium*, & meritis à Cordo reprehenduntur. Tragus fatetur se latere quo in loco hæc arbor (frutex) apud Veteres descripta sit, ac videri sibi ne doctos quidem quicquam de illa cognouisset, nisi quoddam Ruell. Aquifolium appelleret. Neque tamen Aquifoliam hic intelligi velle de qua Theophrast. lib. 3. cap. 15. scribit, sylvestri Mespilo accensæ: (Crategus sibi nominatur, non Aquifolia) neque etiam ad Ilicem Theophrast. hanc arborem referri posse. Se existimare sylvestrem Lauri speciem esse, Latine Laurum spinosum, seu aculeigeram appellandam. Quod nomen ex Germanico mutatas videtur, Germani enim *Stechpalmen*, quasi Palmam pungentem vocant, quamvis Lauro longè similior sit, quam Palmæ, quod facili animaduertere potuit Tragus. Nec tamen stirpi planè imperitus Lonicerus fidè hac in parte tribuit insigni & modesto Herbario Trago: sed ineptè non glandiferam arborem vult Ilicis Aquifolia Plinii genus, quod ex Ruellio, sed intempestivè hausisse videtur. Ryfius quoque in Dioscor. com. Ilicem Aquifoliam magnam vocat, fructu inutili: & figuram falsam apponit. Non enim fert bacca ex longis pediculis, ut pingit: sed & Monachi Ilicis genus putant de quo Theophrast. l. 1. hist. c. 15.

Hallucinantur ferè omnes Iuniores asserentes Loton esse Agrifolium, ut iidem notant, rectè statuantes non esse Loton. Id autem putabat Ruell. ob id à Matthiol. reprehensus. Aliquando inquit Matthiol. mihi persuasi, eum haud longè aberrare, qui dixerit Paliurum Africanum esse Agrifolium, quòd foliis sit vndique aculeatis, Loton maioribus, fructu Cedri, rotundo, rubro, nucleum intus habente, iucundo & gustui non ingrato: non tamen quòd pro certo hoc asserere velim, quòd hæc propria sit Africæ planta: Sed quòd aliquando his notis persuasus, putarim Paliurum hanc aut Agrifolium esse, aut omnino arborem ei similem. Plin. ex Theophrast. hanc ipsam literis mandauit. l. 13. cap. 27. Sed cum de viribus eius disceret lib. 24. eam recensuit, quam & Dioscor. Nullam ego arborem hætenus reperi, quæ Paliuro Africanæ similitudine respondeat, præter Agrifolium, ut dixi: Non dico Agrifolium: ea est in Italia arbor, quam Theophrast. Crateo-

gonæ vocat, omnibus ferè notis Mespilo similis.

illa verò quam Agrifolium appellamus, fructu est rotundo, lucido, rubro, Ruscum & Cedrum bacca æmulante. (in post. Com. addit: nucleo etiam Rusco simili, albo crassoque: [quod falsum]) Huius radicem cortice incolæ Viscum parant, quo etiam modo ex Viburno conficiunt. Hanc non desunt, qui velint eam esse stirpem, quam Theophrast. Agriam huc Ariam appellat, sempiternæ frondis arborem, inter Robur & Ilicem mediam. At in post. scribit eundem Matthiol. Hallucinantur, qui Theophrast. Agriam huc Ariam faciunt: atque in eodem errore versantur, qui eandem existimant eundem esse Crateogonon.

Ita solet Matthiol. Palinodias suas canere, ut in alios fabam cudit videatur. Sed falsum quod de fructu ait, iucundum esse & gustui non ingratum: & quæ de nucleo tradit, committitur. Quid vocat Agrifolium in Italia? Erronea sanè opinio est existimare Agrifolium esse Paliurum Africanam. Plausibilior erat opinio Guiland. de zizipho, licet scribat impudentissimum Guilandinum somniasse, si somnauit, is utique impudentissimè delirauit. Oppidè festinum se putabat. Verùm distinctione illa Aquifolia & Agriolia, quæ nullius est momenti, quæ nulla innitur ratione, nullo sensu nullaque autoritate. Ita seu Dauus quidam Botanicus, per turbans omnia, raro impune istud nobis ferat. Quidni de veritate agitur, de hominum salute, ac Studioforum vtilitate.

Nectendus crassus ille error Amati, quando putat esse Agrifolium Hulp. *Azob.*, Lufit. *Aziunho*, Germ. *Nelbeer*: sed nomen Germ. neutri conuenit. Verùm præstat eius verba audire, ne ind. cta causa damnatus videatur. Diosc. (infit ille) ut de re passim obuia, Paliuri exactâ prætermisit historiam: ut tamen coniecturis assequi possimus, hic idem Paliurus Dioscor. cum eo à Plinio descriptus est, quem Theophrast. lib. 4. hist. cap. 4. prius descripsit, & eum Afrum Paliurum vocant. Trabant autem, inquit, in hanc me sententiam Plin. verba lib. 24. cap. 13. vbi Paliuri vires prosequitur: quæ ferè cum Diosc. ita habent: Paliurus quoque spinæ genus est, semen eius Afrum vocant &c: quæ omnia cum iis, quæ Dioscor. suo tribuit Paliuro conueniunt. Vocant hodiè fruticem istum rei rusticæ Scriptores Agrifolium, non verò Agriolium &c: Hæc A. *Agriolium* matus. Quem reprehendens Matthiol. non minus crasso se implicat errore. Audiamus eum. In Paliuro, [inquit] Amatus confundens historiam, pede prolabitur. Siquidem putat Dioscor. Paliurum, & eam de qua Theophrast. lib. 3. c. 17. hist. tradidit, & Gal. lib. 8. simpl. illam esse arborem, quam Agriolium vulgò vocamus. At tam Diosc. quàm Theophrast. Paliurus frutex est non arbor, & semen in siliquis profert, fuliginosum, mansu- *Aliud Paliuri genus* lentorem relinquens, seminis lini modo. Id quod in Agriolio nusquam spectari potest, cum Baccifera sit arbor. Nec propterea negauerim Agriolium aliud esse Paliuri genus, quod [ut ipse quoque Theophrast. inquit lib. & cap. 4.] in Africa nascitur, quum notis omnibus illam referat. Verùm non ob id affirmauerim, Agriolium alterum illud esse genus, quod siliquas profert. Sed cum Amatus fortasse audierit Agriolium inter Paliuri genera haberi, nec vnquam legerit Paliuri differentias apud Theophr. nulla adhibita distinctione pro omni Paliuro Agriolium adducit. Quia & in hoc decipitur, quod certò crediderit Paliurum à Plin. descriptam lib. 13. cap. 19. & à Theophrast. lib. & cap. 4. esse Dioscor. Paliurum. Erro-

sanè per se patet, quòd Diof. Paliurus semen in  
siliquis ferat: Theophrast. verò & Plin. citatis locis  
fructum ferat rubrum siliquis nullis infestum.  
Nam tamen siliquarum non meminerit Diof.  
sed tantum seminis, quum tamen rara in arbori-  
bus sint semina, quæ siliquis vel vasculis quibus-  
libet non asseruentur, non temerè censeri potest  
Diof. siliquis prætermisisse. Nam si de Africana  
Paliuro scripsisset is, fructus meminisset, non se-  
minis. Adhuc, quum Theophr. Paliuro siliquis  
ferenti easdem tribuerit tum vires, tum qualita-  
tes, quas suæ reddidit Diof. ambigendum sanè  
non est, quin Diof. Paliurus semen in siliquis fe-  
rat. Hæc Matth. Quisfructu luctitans, & ipse in  
media lucta pede prolabitur. Nam nec Amati,  
nec Matthioli Paliurus est Agrifolium, ac vtræque  
opinio erronea. Quid autem Paliurum Theoph.  
& Diof. existimemus, superioribus libris osten-  
sum, & speciatim in historia Rhamni, nec opus  
hic repetere: ad eum locum lectorem relega-  
mus.

Sic & doctiss. Guilandinus. Matth. inquit, Paliu-  
rum Africanam falsò Agrifolium vulgò dici sta-  
tuunt, quòd & Agrifolium à Theoph. crategus ap-  
pellatur, quod non affinit. Tanta fuit eru-  
diti illius in his modestia, ut quid asseren-  
dum sit de Veterum placitis. Sanè Paliurus Afri-  
canus esse nequit, neque crategon, cum sit eius  
baccæ iucundæ siliquis: Aquifolii verò neuti-  
quam.

Verùm & Lacuna nobis suas obtrudit ineptias,  
Agrifolium non solum legitimam Paliurum sta-  
tuere ausus, sed & fructum ipsum per se iucun-  
dum, atque si quis vinum infundat, tum ipsum  
suauior, tum vinum suauius reddi. Qui si vel  
baccas has degustasset [si modò vnquam vidit]  
vel merum iis imbutum hausisset, hanc vti-  
que cantilenam non cecinisset.

Paliurus, inquit Gesn. nobis incognitus est: nec  
senserim cum Amato, qui illicem Aquifolium no-  
stram [ipse Agrifolium nominat, & ab Aquifolio  
non rectè distinguit] Paliurum facit. Idem Gesn.  
Diospyron arborem, à Gaza Iouis flammam con-  
uerfam putat, cui hac in parte assentiri haud pos-  
sumus.

Fuchs. quoque Aquifolium illicem aliquando  
vocitabat. Ita & Goropius vocat, in Vertumno.  
Sed cur illicem vocent, non videmus, cum ne spe-  
cies quidem eius sit. Non enim est glandifera, &  
natales illicum feraces, adeoque æstuosos odit, ut  
benè obferunt Lob. Quind. à Dioscoridi indi-  
cetur putat, nec fortè valdè nota Græcis. Idem &  
Rufcum sylu. vocat. crategon etiam esse negat  
Dod. qui nec Paliurum esse rectè scribit.

Solerius quoque apertè scribit nullam esse Pa-  
liuri speciem, vt Matthiol. opinatur, nisi quis ad  
coccygiam Plutar. Paliurum ablegare velit. Esse  
Aquifolium Plinij, Ariam sue Agriam Theophr.  
diuersam à Lauri & Paliuri generibus, quicquid  
dicant Tragus, Lonici, & Amatus. Ipse verò et-  
iam Solerius non bene, nostro iudicio, confundit  
Arian & Agrian Theoph. distinctas plantas, vti  
dicebamus, quod & Curtius facit.

Harchius in Ench. Aquifolium Rusco non ab-  
similem scribit. Sed parua similitudine. Reuera e-  
nim Bosimilior est Alino.

Had. Iun. Agrifolium Italis Oxymyrsinen,  
hoc est, Ruscum syluest. dicit tradit. Quod an ve-  
rum, & quàm rectè supra videtur. Idem ait,  
Oxyphyllos Theoph. vocem non malè dici, aut à fe-  
ritate aculeatae horti. & de qua dicitur d. 17. p. 1.  
Sed non placet studio aliarum plantarum nomi-

na huic affingi, quæ studiosis & incantis confusio-  
nem parere queant.

Rob. Steph. crategum putat. Verùm prius di-  
ctum non esse. Et esse negant nobiscum Dodon.  
Pena & Lob. Herbatii non ignobiles.

Matthiolas [inquit Apollo] in Ruellium in-  
uehitur, quòd Lotum eam plantam existimaue-  
rit, quæ Ital. Agrifolio dicitur. Ruell. autem alio-  
rum sententiam refert, Matth. cauillatur.

An Agrotolum Anguillaræ? An hoc intelligit  
Varignan in secretis, vbi ait: Nabach est Agri-  
folium. Et alibi: Agrifolium & Gummi eius. Suspi-  
camur tamen Varignanam diuersas plantas con-  
fundere. De Nabach alibi dictum.

Agrifolium Barbara vox est, vt notat Had. Iun.  
Acrifolium, Monachi habent. At Aquifolium & A-  
quifolium legimus apud Plin. pro eodem. Aquile-  
ntiam vocat Varto, à lentore insigni. Ita & Toxires  
vocat in suo Onomastico & Had. Iun. Agriolium  
Allobroges. Fortè Aquifolium dictum, quod Acuti-  
folium. Nam quid ipsi cum aqua: Græcis ἀγρία: non  
item dicitur. vt quidam putarunt. Germ. Stedypal-  
men / Stedbaum / Strachender Palmenbaum /  
Stedappfel / Waldstiel. Belg. Bult / Sted-  
palm. Gall. Hous, Huis. n. Allobroges speciatim  
Argile vocant: Prouinciales, Aubreyin, vti nobis  
relatum. Solerius tamen notat iidem Græci dici:  
Delphinatibus Grenon & Egrenon: Montbelgar-  
densibus atque Burgundis, du Pin, fol. Vasconi-  
bus, Agrotol, Hous, Lest, Azimbo, vti dictum  
antè. Angl. Goly.

Sed sunt qui geminas species facere voluerunt:  
vt Gesnerus: qui in lib. de hortis, postquam eam,  
quæ folio est spinoso dixit, addit: Est & alia spe-  
cies: Iuxta folia. Bult. in folio D. Iohannis. Et  
Solerius apertè dicit: Agrifolii duo genera: vnum  
folia habet aculeis armata: aliud non aculeata.

Uti sequitur C. Bauh. in cap. suo Matth. etiam  
nouam adiecit iconem, cui titulum fecit: Aquifo-  
lii varietas, cui ait, folium non fimbriatum, extre-  
mitatem leuem. Sed reuera neque distincta spe-  
cies esse videntur, neque propriè dicta varietas.

Non distincta species, quia vti dicebamus, vetula  
arbori accedit tantum, vt talis fiat. Non varietas  
speciei: quia hanc varietatem obseruauimus, non  
in tota arbore, sed in ramis quibusdam. Sæpè oc-  
current eiusmodi folia non spinosa, etiam in spi-  
nosissima Aquifolia, qui obseruare volet. Audiamus  
quid Cæsalpinus dixerit. Agrifolium, inquit,

frutex est, folio aculeato, per ætatem arborefcens  
Hederæ similis redditur, folio nequaquam fim-  
briato, nec pungente: foliocolas candicantes gi-  
gnit: baccas carne modica, sub flaua & subdulci:

ossicula intus tria aut quatuor, oblonga, striata &  
depressa. Hæc fortè Rigens erit Hederæ apud  
Plin. Quæ descriptio Cæsalpini & nostram supra-  
positam confirmat, & demonstrat, quantum fi-  
dendum Matth. descriptionibus, ostenditque fal-  
sitatem eius & Lacunæ in describendo Agrifolio,  
vt antea monuimus.

Viderit Plin. quidem lib. 17. c. 8. & aliam arbo-  
rem pro Aquifolia accepisse, nempe cratego-  
non. Sed hic error iam supra plus satis explo-  
sus. Caterum Aquifolii & Agrifolii nomine do-  
nuntur diuersæ plantæ: in primis verò & commu-  
ni omnium consensu ea, de qua hic agimus.

Alex. Ilex dicitur de cocifera, vt dictum cap.  
præced. Aquifolii nomen tribuit etiam Ilici  
arbori & Phellodry, vt cap. de Illice ostensum. Pro  
Aquifolio Plin. & Agria, Anguillaræ Ilicis genus  
tradit, de quo nos cap. de Phellodry & Aria.

Agrifolium & Crategonem Theoph. quidem idem  
putant.

Amat. &  
Matth. opi-  
niones fal-  
sa.

Crategus  
Varroni.  
Guiland.  
not.

Lacuna i.  
supra ex-  
posita.

Gesn. error.

Non bene  
dicitur I-  
lex.

Coccygia.  
Tragus.  
Lob.  
Solerius er-  
ror.  
Curtius  
tauat.

Harchius  
not.  
Oxymyr-  
sine.  
Ruscum  
syluest.  
p. 1. Oxy-  
phyllos.

Had. Iun.  
repreh.

Matth. au-  
tillatur.  
Lob.

Nabach.

Synonyma  
linguarum.  
Acrifolium.

Aquile-  
ntiam.  
Varroni.  
Erymon.

An ei-  
us.  
rentia.  
Spinosa.

Non spi-  
nosa.

Non esse  
distinctam  
speciem.

Descrip-  
tio.  
Cæsalpini.

Phellod-  
ry.  
dic. ant.

Ossicula.

Matth.  
guilt.

Aequi-  
folium.

Alex.  
Ilex.  
sera.  
Ilex.  
rea.  
Phellod-  
ry.

Agrifolium.  
Agrifolium.



putant, de quo sub Sorbo torminali. Phyllicum Theophr. ut ante dictum, malè Gaza interpretatus est Aquifolium. Syhuestrem Laurum Tragus Ruell. teste, Tinum dici notat, & nonnullis Aquifoliam. Ex historia Lotiorboris latis apparet Aquifolii nomen et attribui. Harchius in suo Enchiridio scripsit, Bruscum siue ruscum quibusdam dici Aquifolium. Apuleius in epître Bryonia tribuit nomen Aquifolii. Agriofilon siue Pustina ca erraticæ Toxici dicitur de Pustina ca sylu. Græcorum siue Staphylino sylu.

Gaudet hæc arbor locis incultis, vmbrosis, ac syluosis, desertis: quapropter eâ plateæque syluæ tam Gallia quam Germania, scæcent. Hercynia. Saltus prope Saltzburgum: montes Burgundici, vbi sæpe obseruamus pulcherrimas, quarum folia suprema erant Laurinis simillima, sine spinis. Iuxta fontes acidos: in montibus Sabaudici in montibus agri Basiliensis & totius Helueticis. Sed vix vltimam abundantiam, quam in fructu cæssa sylua prope thermas plumarias, vulgò Plumbares dictas, Lotharingæ, quâ ab us Vrsuliu tenditur & vicinis locis: vbi plurimæ arboreæ scæntes conspicuntur, & foliorum varietate prædicta. Montipetu: Patavii: Bononiæ: Tubingæ. In Anglia frequētissima. In calidioribus regionibus mundis aliè fructuat, nisi colatur: sic etiam ægrè. Schvvenck. notat Aquifolium Plinii in Silesia, sed tantum in vindatio. D. Scholtzii M.d. Vratil. se vidisse. Antuerprensē monachi ordinis Franciscani, hortum suum, quem habent exultissimum sciunt, teste Amato. Et nos quoque passim cultum topiarie in horto E.C. Month. aptari curauimus, quam non inuenisse subit, hortumque perenni virore suo ornat. Sed non feliciter adolescit, & virore magis placet, quam multiplicat ramorum fronde. Eadem, vti refert Tragus in quibusdam syluis, nimirum, eâ, quam Sen ydar vocant, prope arcem Veldentiam, è regione Mosellæ fluit, iâ arborefcit, vt reliquis arboribus magnitudine & proceritate æquet. Vbi & in hoc genere videas, quæ humili statu contentæ: frutices potius, quam arbores apparent. Hoc genus Aquifolia in saltu. Haganouensi inter cæteras sentes & frutices luxuriat. Habentur & pulchræ arbores in horto Stuckardiano, & topiarie. Vere cepturo germinat: flores iunio, fructum maturat autumnio, & subinde per hyemem arbori adhæret. Nam & Februario onustam baccis vidimus. Euenit huic arbori quod Ilici: nam mirè ludit in foliis natura. Videas, quæ nullas omnino spinas, alia quæ vix vnam aut alteram, alia quæ plures: magna tamen ex parte quæ tota in ambitu rigidissimis spinis obuallata, à quibus & auiculas atceri credimus, vt bæcæ diutius arbori adhæreant. Ita Curtius ait: in senectute folia eius vno tantum vel duobus tribusve aculeis per ambitum armari. Carol. Stephanus Arantiorum furculos Agriofolio commodè inferi monet. Si in teneras arbutulas inlerantur Rosæ, producant subitides flores, vt peritissimos hortulanos expertos ait Camer.

Aquifolii bæcæ, si Dod. creditur, temperamento Calidæ sunt ac siccæ: tenuiorum item partium: & flatus discutiunt. Ad colicos dolores viles sunt, etiam si quidè pituitosos humores per aluū educunt. x. aut xii. numero assuptæ, vt ab his accepisse se ait, qui eatum experimentū quandoq. fecerunt. De vsu huius arboris, inquit Tragus, nihil compertum habeo. Aniculæ eius folia vino aut potui iniecta, aduersus laterum dolorem morbum.

que pleuriticum pollere tradunt. Experiatur qui *Pleuritis* volet.

Sagminibus etiam frondes Aquifolia adiciuntur. Vulgus diuturna superstitione seductum ac fascinatim, consecratas eius frondes supra fores, tam ædiū quam stabulorum suspensas à fulminibus ea loca tuta seruare credit. Sata etiam in domo, villæve, veneficia arcere creditur. Item baculum ex ea factum, in quoduis animal emissum, etiam si citrà, defectu emittentis, crediderit ipsum per sese recubitu propius adlabi, tam præcipuam inesse aibori, vt Plin. ait, naturam. Flore eius aquam glaciari Pythagoras tradit. At nos præcipuam us inesse superstitionem censemus qui istas nugas credunt.

Radicum decocto, teste Marthiol. fouentur vituliculi, qui prius luxati duritiem contraxerunt, nam emollit & resouit, tumores discutit, & ossa fracta ferruminat. Id quod valentius præstat radicem ipsarum cortex excoctus & illitus. Sunt qui folia valdè laudent contra pleuritidem tussim, in puluerem redacta & pota, nobis tamen non placent. Folia suspenduntur circa funes, è quibus falsæ carnes sub testeo pendunt: prohibent enim suis aculeis ne mures accedant. Sunt, qui etiam scopas ad terrendas domos è foliosis virgis parant. Bæcæ auiculis in alimentum cedunt. Ramis, quod perpetuò vireat hæc arbor, hyeme ornatur templorum fores & aræ, quos deinde in suas edes deportant rustici. putantes hisceramis fulgura inhibere, & fascino aduersari, gentilitates superstitionem sectantes, à Plinio edoctæ. Radicis decocti fotu emolliuntur & relaxantur egregiè dura vniuersi corporis tubercula. Lignum ex Aquifolia confectum ac distillum, Telex modo vritur, autore Hermol. & à Græcis in hoc vsu Garbion vocari solet. Hoc & è Quercu Lophia, sit, & alio nomine Panos & Phanos appellatur vulgo quoque, quemad. è Virgineo libro factæ lampades, Lophiæ dicuntur, & ex Arundinibus, Elanæ.

Fit & Viscum ex Aquifolia, potissimum apud Gallos notante Ruell. hoc modo. Cortices detrahunt, & facta humi scrobe viginosis maxime obruunt, frondibus arborum inuoluentes, & ibi putrescere patiuntur, quod ferè duodenis diebus fieri solet. Tum maridos eruant, & tantisper pilatundunt, dum in Viscum lentescant. Demum in profuente, vt obhærentes corticum reliquiæ sordelæque fluant, proluunt, & adiecto olei nucum momèto fistilibus recondunt ad aucupia. Nam ligadis auium pennis præstat. Matth. ex radicis cortice fieri ait. Amatus ex radice simpliciter. Sed hoc viscum, inquit Dod. non minùs nocium est, quam ex arboreo Viscò præparatum: tenacissimum siquidem est: interanea omnia conglutinat: excrementum exitus contrahit ac claudit, atque hoc modo perniciem homini adfert, non qualitate aliqua, sed glutinosa sua substantia.

FAGVS LATINORVM: OXYA  
GRÆCORYM.

## CAP. IV.

Fagus Latinorum arbor magna est, patula, Descriptio  
mis diffusa, caudice crasso & procerò: matre *matre*





nè eum discrimen non statuisse inter Fagum Latinorum & Phagum Græcorum, nec demonstrasse Fagum eandem esse cum Oxya Theophr. præsertim cum ex eius descriptione quædam excerptisse videatur. Nec scimus quo nomine donet *φάγον* Theophrasti, nisi sit Esculus.

Fagus olim Troiæ magno in honore habita fuit. Et Latini Fagum suam perinde acque Græci suam Ioui consecrarunt, auctore Gorgopio. Vnde Iupiter Fagutalis à luco Fageo dictus. Virgil. eam passim celebrat: Eclog. 2.

---Duo tibi pocula ponam

Fagina, cælarum divini opus Alcimedonitæ.

Eidem patula dicitur, alta, frondosa, ardua, rotans, rudis, teres, &c. Per tegmen autem patulæ Fagi nihil aliud intelligit, quam Augusti patrocinium. Lufit idem Virgil. Grammaticos, dum Fagineus axis dicitur: quod illud Homeri *φάγον* interpretari voluisse videretur, eo quod sciret ex Oxya etiam axes fieri. Celebratæ & olim hactæ egregiæ ex ea fieri solitæ. Ideo fortè Theophrast. dixit a qualem semè Abieti & ad similem quoque vsum comparari. *ἔχρη δὲ βύρρα* dicit ab Homero prodit Porphyrius. Locum querant otiosi.

Xanthus Lydus & Menecrates Elaita auctores sunt Fagum arborem apud Lydos Mylon dici, & Olympum montem Fagorum sylvis abundare: Vnde Myli populi, vt Strabo inquit & Eustachius.

Hallucinantur qui Oxyam Græcorum, ornum existant, vt Pandectarius. Vetus interpres, vt notat Gorgopius, ipso Oxya reddidit Fagosissimam: nescimus vnde mutuatus sit scissimæ adiectionem, nec ille se scire fateatur. Tantò magis miramur Hermolaum, Ruellum & alios, alioquodissimos viros, etiamque bonos Latinos tam implicita fide falsos, nostris, [id est, Latinis] scissimam appellari: Immo & Scalicorum emanatissimæ naris Philologum, ea voce vsum, quæ nullus vnum probatus autor, quod quidem sciamus, vsum sit. Non consuetam suam diligentiam adhibuit Tragus in Fago, cum ait: Latine Fagus, Græcè Phegos: aliud genus vocatur Scissima, Oxya, quod non provenit apud nos: id est, vocant etiam Mylon. Hic triplex error. Fagus Latinorum non est Phegos Græcorum vt ille putat, sed Oxya: quod non aliud distinctum genus à Phago. Et nascitur apud nos Oxya.

Nec placet à Const. in suo Lexico *φάγον* Theophrast. misceri cum Fago Plinii, quam tamen ipsemet alibi distinctam agnoscit. Fallitur igitur cum ait: *ῥάγον φάγον*, Fagea glans Plinio, & *φάγον* Theophrast. lib. 4. cap. 9. Haud enim Fagea Glans est *φάγον* Theophr. vt ille citat. Immo ne *φάγον* quidem simpliciter. Quem eundem errorem committunt Ruell. Castor. Dur. Lacun. Curtius. Cornar. Ruff. Dod. Matchiol. Anguil. du Choul. Had. Iua. & postremus ille historix Germanicæ, Tabernamontani titulo editæ. Compilator. Adde his omnibus Lonicerum, qui nec ipse Phagum Græcorum & Latinorum distinguere novit, ita namque scribit: Theophrasti duo genera, marem & fœminam, alii diuidunt in albam & nigram. Fagus nigra provenit in agris, nec ita frequens: cortex eius crassus & hirsutus (*Βαρυχ*) In medio folii solet provenire bacca viridis acuta: fructus dulcis est, & triangularis: Oblectantur agrorum planicie. Fagum nigram, vocant aliqui scissimam, quia lignum eius facile in assulas finditur, Græci vocant Oxyam. Hæc Lonici, qui

non animaduertit Phegon Græcorum diuersam à Latinorum Fago, in qua nobis nondum cognita differentia à nigredine & albedine, ignota etiā nobis corticis hirsuties: nec nota Fagus, quæ oblectetur planitie agrorum. Ita vides paucos in re herbaria, quid scriberent, aut posteritatem docerent, securos suæ famæ, animaduertisse. Mirandum, hercle, in re tam clara, tam manifesta, addamus etiam tam facili, quam vel sola collatio descriptionum Theophrast. & Plinii adductarum luce meridiana clariorem faciat: quam etiam claram fecerunt, Cordus, Pena, Lob. (qui tamen alibi eundem errorem committit, vt dicetur postea) Gorgopius, Girardus Anglus, Cæsalp. & Dalechamps.

Videtur tamen doctissimus Hermolaus aliquid subolsescisse, cum ita scribit: Fagus ea, vt quidam scripserunt, quæ ingenuissimas secatur laminas, glandifera non est: Ideoque duo genera siue nomina Fagi sunt: glandem ferentis, materie scabra, quam Græci *φάγον* appellant, vt fructum quoque Hippocrates: & alterius, quam Græci Oxyam. Sed fallitur in eo quod Fagum, vt dictum, ab hac Oxya distinguit. *φάγον* verò, vt dicebamus nobis videtur Esculus. Et Ruell. ait: Fagus Græcis Phegos, glandiferis arboribus annumeratur: tamen fructus nihil simile glandi habet. Cætera transcribit ex Hermol. eo non citato, & satis indistinctè. At Phegi fructus similis est glandi: immò ipsemet glans est: quanquam interim etiam nolimus dicere, Fagi fructum planè nihil simile habere cum Glande: nec glandiferis arboribus simpliciter annumerari: nam à Plinio veluti excludi iam antè dictum. Ne quisquam igitur post hæc arbitretur *φάγον* Græcorum & Fagum Latinorum eandem esse arborem.

Dod. quoque in post. suis scriptis aliquid subolsescit, quando inquit: Ad Fagi genus à nonnullis refertur quæ *φάγον* Theophrast. dicitur. Sed fallitur tamen idem Dod. quando addit: Plinium & huius arboris meminisse, sed sub *οστρά* nomine: si modo non per *οστρά* legendum sit Oxya. 1. cap. 11. Nec sub Ostryæ, sed Fagi nomine aperitissimè descripsit Plin. Et si Dod. scidit caput Theophrast. vbi Oxyam describit: perlegisset adè considerasset, deprehendisset, hanc & Ostryam siue Ostryam etiam Plinio dictam, ab eodem, ipsomet capite, satis clarè describi: interposita tantum historia Taxi. ] nec suspicio eum incescisset, Plinii Ostryam mutandam in Oxyam, quum arbores reuera sint distinctæ. Tantò magis hallucinatur Girardus Anglus, qui Oxyam Theophrast. putauit esse Ostryam Plinii, quem suam opinionem forpisse ex Dodon. suspicamus. Itaque nullius momenti illa correctio Dodonæi apud Plinium, qua in Ostryæ descriptione, pro semine hordeo simili, putat legendum, semine Castaneæ simili. Nos Ostryam Plin. eandem cum Ostry Theophrast. censemus, de qua lib. seq. sub Fago sepium, diuersa ab Oxya Theophrast.

Nescit quid velit Io. Ferus, dum in Genesin cap. 1. Fagum nullum fructum ferre ait, sed semen. Quæ hæc subtilitas: Siue Fagum hanc nostram intelligat, siue Fagum sepium, siue etiam multorum imitatione *φάγον* Græcorum, & fructum ferre & semen, si rectè nouerit, intelliget. Quid discriminis facit inter fructum & semen nescimus: nisi fortè maiores fructus, fructus: minores, semina cum vulgo dicere velit. At ne nesciat ille, & semè fructus est, quamuis non totus vel totum fructus, semen sit. Hæc ad Phycam pertinent, cuius nos non partem tantum, sed totam profitemur. Su-

Glandifera non est.

Phegi.

Ruell. præst.

Dod. lapsus.

Girardus error.

Dod. temeritas. Ostry. Plin. & Theophrast. ead. dem.

Io. Ferus. castus.





bus, ac etiam turdis, merulis, aliisque compluribus volatilibus. Glans Fagea suam hilarem facit, carnem coquibilem, ac leuem & vtilem stomacho. Et sanè in Germania multis locis, praesertim in Saxonia fues iis saginari nobis relatum. Fagi folia esitata, laborum gingivarumque vitis mirificè opitulari: tusa item torpentia membra corroborare Matth. asserit. Dod. eadem folia refrigerant, vitiliterq; applicantur pustulis & ulceribus. Nucleus non nihil humidus & calidus, cuius licet non multus usus sit in hominibus, dulcis tamen est & esui gratus, vilis ferè ad omnia, ad quæ Pinei nuclei: vt idem vult. At nobis sanè obseruatum, Fagineam glandem, potissimum virentem & nondum exiccata, si paulò copiosius comedatur, Loliis instar, caput turbare, ac ipsos etiam suos afferunt: eius esu turbulentos reddi, & tandem obdormiscere: id quod etiam Schvvenckf. testatur: qui ait, caput tentare, & inebriare eos, qui nimium comederint. Fertur pinguedo suam eiusmodi Fagineis glandibus saginatorum mollior, quæque dum coquitur, magis liquecat. Nolumus itaque has nobilissimas ac innocuas Pineis nucleis ferè pares d. cere cum Dod. qui & ipse in post. suis scriptis merito omisit illa verba: sed addit: Feruntur renum ex calculo dolores, si edantur, mitigare, & ad Calculorum ac arenularum faciliorem exitum prodesse. Delectantur iidem Columbae. Est & esca vrsis quaesita, inquit Lob. & pauperculæ plebi, regionibus calidis & frigidis: sed quas Calidas intelligat, notare debuit. Oleo ex ea expresso paupercula plebs tempore quadragesimali loco butyri vititur, teste Schvvenck. Sed præcipua nobilitas, vilitasque merito quoque habetur illa quæ Poetarum maximus Virgil. celebrat: Eclog. c.

--- In vridi nuper qua Cortice Fagi

Carmina descripti: & modulans alternat aui.

Et Plinius lib. 16 cap. 9. Scribit in recenti cortice ad duces explorator, incidens literas à succo. [incisus literas tegere succo Dal.] [Literis ob succi madorem non conspicuis, & cum siccatu fuerit cortex apparentibus.] Nec non in quodam vsu sacrorum religiosus est Fagi cortex. Sed non durat arbor ipsa. [subaudi, cortice spoliata.] P. Crecensius scribit Cinerem Fagi posse assumi ad conficienda vitra.

Theophrast. humidissimam oxyam dicit: lectulosque ex ea cedentes & obsequiosos conficere: eadem minoribus nauibus commodam: atque in totum ex hac testudinem (*Xelusia*: lignum carinis affigi solitum, ne dum subducuntur, lacerentur vel offendantur) condi solitam. Praestare item ad plaustrorum vehiculorumque vilem fabricam. Denique hanc in aqua permanere incorruptam posse, madefactamque reddi meliorem. Cortex Fagi, inquit Plin. Tilix, Abieti, piceæ, in magno vsu agrestium. Vasa corbæque ac patentiora quædam messibus conuehendis vindemiisque faciunt, atque pretexta tuguriorum.

Facilis & in opere Fagus, quantum fragilis & tenera. Eadem & scetilibus laminis in tenuia flexilis, capsisque ac scriniis sola utilis. Fagis pectines transuerfi in pulpa. Apud antiquos & inde vasis honos. Pocula Fagina Alcimedontis, ælato opere facta supra dicta ex Virg. Miramur sanè oxyan Theophrast. & Fagum Plin. olim in tam nobiles vsus vocatam, maxime eius materiem, quam scimus facile putrescere, nisi sit perpetuè tecta aut in aqua sepe merfa, quod sæpè nobis obseruatum in lignis ad vrendum scetis. Si enim sub dio mancant non tecta & ma-

descant, facile corrumpuntur, & ad ignem inutilia redduntur: alioqui inter nobis nota ligna ad focum & carbones vtilissima & præ aliis expetita. Tam si ad formam spectemus, quæ quas in hoc ligno elegantia, inter tot alia, & tam nobilissima ligna, vt ad calata opera sit adhibita? Non facile dixerimus aliam oxyam Theophrastum, aliam Fagum Plinium à nostra Fago intellexisse: hoc enim verat vtriusque descriptio tam eximie & aperte huic nostræ quadrans. Sed multum potuit Veterum superstitio in rem aliquam, alioqui per se nec valde pulchram.

Scandulis Fagineis quas Plin. post Roboreas aptissimas dicit, hodiè longè preferuntur Quercinæ. Immo inutiles habentur Fagineæ, ob modò dictam causam. Nos concedimus Plinio capsis ac scriniis solam Fagum vtilem. Multa alia hodiè præferuntur. Et ipse met Plin. fragilem & teneram fatetur. Quanquam ad crassiora firmioraque opera nobis satis firma videatur, vt ad plaustra, & similia. Multa quoque vtenilia ex ligno Fagi confici solent, & pleraque instrumenta agriculturæ. Annotat Tragus, Fagum in aquis ~~duræ~~ incorruptam, madefactamque firmiorem reddi, adificiis aquaticis accommodatissimam. Theophrast. idem dixerat prius.

Sed non potestremus usus eius, quòd in tenuissimas laminas flexiles dissecta, ensium vaginis firmis. *Ad G. ginas.* mandis interseritur, ad id cultratis hodiè sola vtitata.

Iucundum saltem auditu est, quòd Io. Coleurus tradit, quomodo scilicet in Festo omnium Sanctorum experiri liceat qualis hyems ventura sit: Illo ipso die, inquit, in syluam abito } vt resci- *prognosis tempesta-*  
cas num hyems calida aut frigida futura sit } rum.  
ad Fagum, ex ipsa assulam recidito, & si quidem fuerit licca: hyemem expectabis calidam affuturam. sin verò fuerit humida, hyemem sperabis frigidam aduenturam.

## CASTANEA.

## CAP. V.



Dictum de Descriptio  
Quercu, Ilicis, Agrifolia, Fago Latinorum. Venit nunc recensenda Castanea inter glandiferas, licet ipsa glandem non ferat, sed Castaneam. Verum vt Glans includitur cupula seu calyce, sic & Castanea si addas echinatum. Primum omnium exerit virgas Phœniceas Castanea, quæ temporis progressu in magnam altam & crassam arborem excrescunt, Quercuumque annosarum crassitudinem adipiscitur. Cortice vestitur leui, maculoso, subnigro. Est vbi & in cinereum vergat, sed potissimum in ramorum extremis & iunioribus arbusculis. Materies robusta, non sentiens putre-

Cortex.

Materies.

L.







Balani.  
Sardiana.  
Euboica.

apud Græcos appellantur Balani Sardiæ, Euboicas quoque Græcis dici lego. Sed & castaneas primò dictas, scribit Photion, quod ab oppido Magnesiæ, quòd Castanon dicitur, aduectæ sint, ut fortè Diodorus Nucis, castanicas inde nominàrit. Quid si à castitate, cùm Plinius ieiunius dicat eas innuat. Ex iis Græci Pogonias appellant, nisi quis Lanatas earum intelligat, sunt enim aliquæ pilis hirsutæ. Stephanus docet Castanon oppidum esse in Apulia, non procul à Taranto.

Castanea  
Sinde  
Nucis Castanica.  
Pogonia, lanata.

Euboica  
Sinde  
Lopima  
Sindel

Castaneam Iouis glandem dixerunt Prisci, etsi Posteriorcs, ut notat Marcell. Regiis Nucibus eum honorem tribuerunt. Eandem legimus in Veterum Græcorum Lexicis Lopimam & Euboicam dictam fuisse: hæc à regione, illam à cortice: quem λέπθ Græci dicunt: & λωπά decorticare.

Laudauit contra venena quædam præcipuè Nicander castaneam: Nucemque, ut postea Maro fecit, appellauit: vericulus eius est:

Εὐβοικὴν καὶ καπνὸν τὸ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν αἶμα.  
Quod non parum miretur aliquis, cùm manifestè inter Glandes potius [ teste etiam Marcello ] quàm inter Nucis castanea numeranda sit. Magnis authoribus vtrumque defendi potest, ut supra ostensum: nec nos aliud in huiusmodi re mouemus, quàm fuisse quondam in ea Glandis & Nucis nomen, laudis Glandis quàm Nucis clariuisse. Quod Iuris consulti etiam decreuerunt, titulo de Glande legenda, omnes arborum fructus ea voce complexi. At ut Iouis glandes appellerentur, Plin. non castaneis, sed Nucibus Regiis adscribit: quum, ut inquit, sint qui honoris nomen interpretentur. Vnde sanè & Iuglandium appellatio contracta est.

Glandis  
Iuris  
consulti,  
omnis  
fructus.

Cordus consentit nobis esse Cestianam Glandem Aëtio: sed sibi compertum ait, in aliquibus codicibus apertè τὸ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν haberi, & non κατὰ τὴν, velut Bohemum Hassenstenium exemplar, vnde se primùm Aëtii editionem transulisse scribit. Habuisse nimirum βαλάνην φλοιὸν ἢ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν: hoc est, cortex glandis, maximè castaneæ.

Nux etiam Heracleotica dicitur, ut ex Oppio viro doctissimo, in lib. quem fecit de syluest. arboribus docuit Macrobius, his verbis: Heracleotica hæc nux, quam quidam castaneam vocant. Euboica etiam à regione. Nonnulli insuper ex Philostrato in iconibus, Iouis Glandem dici arbitrantur: quod etiam aliquos facere ait Diof. At nobis ἡ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν rectius videtur competere Auellanis siue Corylo arbori, quàm castaneæ, iuxta sententiam Theophr. apud quem & Gaza vertit Nucem auellanam.

Rob. Const. in Lex. vult κατὰ τὴν ἰσχυρίαν esse nucis castaneas. Theoph. lib. i. c. 13. τὸ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν. [leg. κατὰ τὴν ἰσχυρίαν] ὡς καὶ ἡ ἐλάνθη καὶ τὴν ἐλάνθη [scribendum ὡς κατὰ τὴν ἰσχυρίαν]. Plin. crusta teguntur Glandes, corio castaneæ. Hesych. etiam ὡς κατὰ τὴν ἰσχυρίαν, sed scrib. ὡς κατὰ τὴν ἰσχυρίαν, supple κατὰ τὴν ἰσχυρίαν. Nicander quidem κατὰ τὴν ἰσχυρίαν ἐλάνθη: ἐλάνθη ὡς κατὰ τὴν ἰσχυρίαν, cecinit. Deprehenditur, inquit idem Const. nondum rectus error Plinii, quem sequitur Gaza. Siquidem Theoph. lib. 5. c. 5. quia κατὰ τὴν ἰσχυρίαν cecinit inter αὐτὰς: Plin. lib. 6. c. 40. Iuglandem: Et lib. 5. c. 7. τὸ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν. Plin. lib. 16. c. 42. Iuglans. At nos Plinio potius assentiri quàm Athenæo & Constantino, nempe per Nucem Euboicam intelligendam Iuglandem, docuimus supra lib. 3. cap. de Iuglande sub titulo Cariz seu Nucis Euboicæ: ybi Lector compertus quæ

Theoph. e.  
munda.  
  
Plin. ex  
Gaza  
crust.  
si  
Constantino  
credendum.

Theoph. partim de ea scripsit. Licet ipse quonque Cæsius. tradat διὰ τὴν ἰσχυρίαν alibi à Theophr. Castanea. Nucem Euboicam dici. Apud Xenoph. κατὰ τὴν ἰσχυρίαν, de castaneis intelligendum. In collect. ad agriculationem spectantium. l. 2. adnotatum, Castaneas dici διὰ τὴν ἰσχυρίαν: quod & lib. 10. repetitum aduertat. Galeno etiam κατὰ τὴν ἰσχυρίαν dicuntur castaneæ nucis, sig. dictæ à loco Idæ montis, quem κατὰ τὴν ἰσχυρίαν plurali numero appellat idem Gal. lib. de Euchimia.

Apud Serap. castanea dicitur Castal: & sardia. Castal. dicitur ait quibuldam castaneam dici, & esse scabulor.

Armon Hebræis, Trago, qui vult Iacobum Patriarcham Genesio. vsum virgultis è castaneis: ita & Latina pleraque habent & Gallica & Germanica, quanquam vetus & ex eo Tubingenium impressio habeat Platanum loco castaneæ. Nimirum virgis castaneæ Iacob fecerit sui spæ, quam de multiplici ac copioso sætu conceperat, ingenioso dolo elusit. Sic autem verba sonant, vertente Castalione: Iacobus ex Populeis & Colurnis, & Castanis virgis virentibus partem corticis detrahebat, & earum album nudabat, deinde eas ponebat in canalibus aquariorum è regione pecorum, ut cùm ed potum venissent, in aspectu virgarum inirentur, quod cùm fiebat, varios & maculosos, & verficulores sætus edebant. In Græco exemplari nulla prædictarum arborum exprimitur, sed simpliciter legitur: ἡ δὲ κατὰ τὴν ἰσχυρίαν κατὰ τὴν ἰσχυρίαν κατὰ τὴν ἰσχυρίαν. &c. fortè quòd interpretibus non probè cognita fuissent hæc arbores.

Gal. & Castaneas, & Castaneas neutro genere dici ait fructus. Dodon. Græcè etiam κατὰ τὴν ἰσχυρίαν κατὰ τὴν ἰσχυρίαν κατὰ τὴν ἰσχυρίαν & κατὰ τὴν ἰσχυρίαν vocat: sed quo auctore? Germ. Kastanien / Kastanbaum: fructus festen. Belg. Bastanienboom / Castanie. Gal. Chastaigner, Chastagne. Ital. Castagno, Castagna; magne, Maroni. Hisp. Castanhu, Castal. & Cast. Castanias: Portug. Castanhas, Marones. Angl. Chesnut tree: Fr. Chesnut. Vngar. Görtynye.

Antea dictum ex Theophr. Thmolium Olym. pumque Mysum Castaneas ferre plurimas. In Macedonia montibus obseruauit Bellon. Lætanatur opaco & Septentrionali cluio, regionum tamen non frigidiorum, nam cælum Aquilonium non ferunt. Quapropter rarior in ple. isque Germaniæ locis, immò in quibusdam vix nisi culta. Luxuriat tamen, inquit, Tragus circa VVeisenburgum Imperiale oppidum non procul à pago Sörrenbach vulgò vocato, nec non in Allatia superior, vbi magna memoria scateret, vnde & in Thuringiam & inferiorem Germaniam conuehi solent. In tota Italia vulgò notissima: vbi tamen montibus & opacis gaudent magis, quàm campetribus & apicis: sunt etiam in Palatinatu, in Heluetia. Plenæ sunt præterea Allobrogum, Delphinatus & Aluernorum syluæ, quæ in totam regionem, ob præstantiam disperguntur. Apud Petragoras tamen maior proeunt: ut ingentes ibi eius arboris, si alterius cuiusque cernantur apud quos quadrupedum omnis generis & auium pabulum, teste Curtio. Delphinatus tamen minimè sua frustrantur laude, quæ à negotiatoribus magna copia Lugdunum deuehuntur, & deinde in alios tractus comportantur: quamquam & ager Lugdunensis montanus, qui Chauflanius dicitur, aliique contemini ferant, magnitudine gustatque minimè inferiores, sed non tanta copia. Sed Petragoritis & Cenomanorum potissimum montium populis instar mestium sunt, vbi pauca familiaria [ nobilitate excepta ] quæ paucis vellecun-

Armon.  
Hebr.

Castanea  
Bibliorum.

Iacobus  
fiscus.

Nomina  
lingar.

Locus.

Petrag.  
Cen.  
manus  
quælibet  
nuc.



veantur, nisi septimo quoque die aut solenni festo, tradente Bruyerino, qui se illac transeuntem ita ab incolis accepisse testatur.

Italicis laudatissimis patria Tarentum, ut dicebamus, & in Campania Neapolis, de quibus Martial. Epigr. l. 3. ad Toranium.

*Et quas dūta Neapolis creavit*

*Lento Castaneæ vapore tuffa.*

Vidimus in montibus Euganeis, Rheticis, ad lacum Verbanum Italiae, & Lemnum Sabaudiae. Integrarum probatio est, ut in frigidam mittantur: siquidem bonæ & incorruptæ merguntur, vitiosæ supernant. In genere recentes & bonæ à putredinis labe infectis, vel non decorticatæ feceruntur duritie ac pondere.

Ineunte Vere germinant nec multò post florent, feritque Vergiliarum occasu fruticant, nepe circa finem S. prembris, ac per totam ferè hyemem durant. maturo fructu echinati calyces rumpuntur ac hiant. Tum maturæ decidunt Castaneæ. Quidam more impatientes prælongis virgibus sicut nuces Inglandes arboribus decutiant. Alternis ferè annis agricolam vberi nescire exilant. Gaudet in Genere montibus & acclivibus: Campestribus interdum degenerant, aquas oderunt.

Castanea, inquit. Colum. roboribus proxima est, & ideo stabilendis vineis habilis: Nux eius in repassinato posita celeriter emicat, & post quinque nimum caesa, more salicti recreatur, atque in palum formata ferè vique in al. vram cessionem perennat. Puta n [Basil. Cod. Pullan] terram & resoluta n desiderat. Sabulone humidum vel refectum totum non respuit, opaco & Septentrionali diu latatur: spissum solum & rubricolum reformidat.

Sentur à Nouembri mense per totam hyemem siccata terræ, & repassinata in altitudinem dupondii & semissis, nuxes in ordinem semipedalibus, ordines autem quinti pedum spatii dirimuntur, in altitudinem dodrantis Castaneæ depressi: sulcis committitur, qui vbi nucibus confiti, priusquam complantentur, breues arundines ab later. Castaneæ rumpuntur, ut per hos fationis indices cattulis fodi & tuncari possint. B. maiam semina transferunt: sed vacuitas binum pedum relinquatur, ne densas plantulas emaciet. Spissius autem semen propter varios casus deponitur: nam interdum prius quàm enascitur, aut ficitatibus nux inarescit, aut aquarum abundantia putrescit: interdum subterraneis animalibus, sicuti muribus & talpis infestatur, propter quæ nouella Castaneæ ciliurescunt. Atque vbi frequentanda sunt, melius ex vicino, si competit (mergi more) pertica declinata propagatur, quàm exempta referuntur. Hæc enim velut in nota sua & de vehementer germinat. Atque radicibus exempta & deposita est, biennio reformidat: propter quod cōperu n est. commodi N. tibus, quàm viuatradicibus eiusmodi sylvas institui. Culus eiusdem est fossilis positionisque, qui vineæ. Supputari debet bima, quinetiam trima nam bis ferro repetenda est veris principio, ut incitetur eius proceritas. Idem Colum. alibi ante Calendas Martias vel etiam inter Non. & Idus Martii Castaneas ferere præcipit.

Digna obseruatu quæ Palladius in hanc rem prodidit. Castanea feritur & plantis quæ spontè nascuntur & semine. Sed quæ plantis feritur, ita zgra est, ut biennio de eius vita sæpè dubitetur. Serenda ergo iosis Castaneis, hoc est, seminibus suis, mense Nouembri & Decembri: itque Fe-

Tom. I.

bruario. Eligendæ sunt Castaneæ ad pondendum recentes, grandes, maturæ: quas si Nouembri mense seramus, faciem se præsentia fructus ipsius præstat, si verò Febr. ponamus, ut ad id tempus durent, ita faciendum. In vmbra Castaneæ siccentur expansæ, tunc in argillum & siccum locum translatæ Cumulum faciant, & eas omnes fluuiialis arena diligenter operiat. Post dies 30. eas remotâ arenâ in aquam frigidam mittis. Quæ sane sunt, merguntur, supernatæ quæcunque vexatæ est. Itaque quis probat, similiter obrues, & post 30. dies æquè probas. Hoc cum tertio feceris vique ad Veris initium, ferere debebis, quæ maseint illibate. At qui in vasculis seruant, arenâ pariter missa. An ut solum molle & solutum, non tamen arenosum. In fabulone proferunt, sed humecto. Nigra tertia illis apta est, & Carbunculus, & tofus diligenter infractus. In pillo agro & rubrica vix prouenit. In argilla & glarea non potest nasci. Dilige cœli statum frigidum sed & tepidum non recusat, si humor assenserit. Pelestat cluius & opacis regionibus, ac maxime in Septentrionem versis, ut dictum. Pastinari ergo locus debet, qui huic destinatur arbutio, aliuudine pedis vnus & semis, vel duorum: vel totus aut sulcis in ordinem declinat, aut centè araris resolu hinc inde findentibus. Qui si mo satius ac redacti in puluerem, Castanearum semen accipiat, non amplius pedis dodrante demersum. Vri- cuique semini propter notam, surculus debet assignari. Ipsa semina singulis locis simul terna vel quina ponantur, inter se quatuor pedum spatio separantur. Quibus transire placuerit, bimas Plantas transire debent. Locustamen deducoria liquoris accipiat, ne humor insidens limo, germen extinguat. Cui placet, potest Castaneæ in propaginem ducere ima virgula, quæ in radice nascuntur. Nouum Castaneum circumfodi debet assidue. Mense Martio & Septembri incrementum maius acquirit si purationibus adiuvetur.

Breuius paulò aliter Plinius: Castanea pedamentis omnibus præfertur facilitate tractatus, pedurandi peruicacia, regerminatione cædua vel salice letior. Querit solum facile, nec non arenosum, maximeque sabulum humidum aut carbunculum, vel topi etiam farinam, quamlibet opaco Septentrionali quæ & præfido situ vel etiam declui. Recusat eadem Gallicam [glaream D. Calcem, Vet.] iuricam, cretam, omnemque ceteræ fecunditatem. Seri nuce diximus, sed nisi ex maximis non prouenit, nec nisi quinis acervatim satis. Perfungi solum debet supra (Impremū Vet.) ex Nouembri mense in Februarium: quo soluta, spontè cadunt ex arbore, atque subnascuntur. Interualla sunt pedalia (semipedalia, Collesquipedalia Dal.) vndique sulco dodrantali. Ex hoc seminario transferuntur in aliud, bipedali interuallo, plus biennio. Sunt & propagines, nulli quidem faciliores. Nudata enim radice, totam sulco prosternitur. Tunc ex cacumine super terram relicto renascitur, & alia ab radice. Sed translata nescit hospitari, pauetque nouitatem. Biennio ferè postea ptohit. Ideò nucibus potius, quàm viradicibus plantaria cædua implentur.

Cultura non alia quàm supra dictis fodiendis supputandisque biennium sequens: de cætero ipsa se colit, vmbra stolones superuacuos enecante. Cæditur intra septimum annum. Sufficiunt pedamenta iugerū vnius vicenis vinearum iugeribus, quando etiam ea bifida stirpe fiunt, durantque ultra alteram sylvarum cæsuram. Damege-

L. 3

ronti Castanea plantatur & ex viuiradicibus, & ex semine. Securius est, eodem tradente, modus ex plantis: post duos enim annos fructum producit. Plantatur ab æquinoctio non solum à seytalis & ramis, sed etiam auulsiõibus ac viuiradicibus, quemadmodum Olea. Seminantur porro Castaneæ non similiter vt Amygdalæ & Nuces, sed acuminata parte sursum spectante. Mense Martio vel Aprili castanea inseritur sub cortice, teste Palladio, qui vtroque genere sibi probatum ait. Potest etiam inoculari. Inseritur in se & in salice, sed ex salice tardius maturat, & sit asperior in sapore.

*Serr. di. raro Insetis.* Fulmineam Salicem secudant ardua membra Castanea, & multo pasta liquore vigent.

*Salici.* Idem inquit Vug 2. Georg.

*Fago.* Et steriles Platanos malos gessere valentes, Castanea Fagos &c.

*Virgil. expositur.* Dicit quid in quam arborem debeamus inferere, Fago castaneam, non enim in castanea fertili longè ignobiliore fructu Fagum faciliè inseruerit, Vnde aut Hypallage est, vt castaneæ Fagos sit, pro Fagi castaneas gessere, aut mutanda distinctio, vt sit:

*Platan.* Et steriles Platanos malos gessere valentes Castanea, Fagos.

*Ingland. Robor.* Hoc est: Infundendæ arbores Platanos fortes ramos castaneæ portauerunt. Seruius. Castanea, teste Ruellio, Inglandi, Fago, & Robori infixa comprehendit.

Annotat Bruyerius: Inseti quidem castaneas: verum non ita feliciter: nam longè plures deperire, quàm quæ incolumes euadant: operosissimamque esse in suonem.

*Repositio.* Castaneæ feruantur vel in cratibus dispositæ, vel intra sabulonem, ne inuicem tangantur, vel in vasculis fictilibus nouis conditæ, & loco siccior defusa, vel inclusa virgise ex Fago receptaculis, & lutatæ, vt spiracula non relinquas, vel hordei paleis minutissimis obrutæ, vel palustri vlu densioribus sportis reclusæ. Pallad.

*Vires. & vus.* Castaneæ glandes, quum & ipsæ adstringant, similes etiam præbent effectus cum cæteris glandibus: maxime verò membranæ quæ sunt inter carnem atque putamen. At caro iis qui Ephemerum biberint conueniens est. Diof. Castaneæ vehementer sistunt stomachi & ventris fluxiones, sanguinem excreantibus profunt, carnes alunt. Torrerè has in cibis gratius. Moluntur etiam & præstant ieiunio fœminarum quandam imaginem panis. Simcon Sethi & Fuch. calidas & siccas dicunt, ordine primo. De calore adhuc dubitamus, Coddæ in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquantur, cœliacis, dysentericis, sanguinemque excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior membrana, quæ corticem fructumque discernit, ad tertiam partem decocta in aqua, & potui oblata, mirè aluum fluentem refrenat, & dedò vt Dioscor. putet, etiam cathartico dato per hanc potionem iri obuiam posse, si plius, quàm necesse sit, purget. Plin. Valer. Ex farina castanearum cum melle fit Eleuatium vile aduersus tussim & sanguinis sputum. Dod. Monet tamen Lacuna virides damnosas esse pulmonibus, ac ob hanc causam putat præter tunicam propriam etiam echinato illo cortice armatas esse, ne ab villo animalium attingantur, antequam sint maturæ, in quam rem amplius inquirendum. Castaneæ tritæ cum sale mellèque subactæ rabidorum ca-

num moribus viliter imponuntur, eodem & Matth. teq. & cum hordeacea polenta, & aceto illitæ mammarum durities discutere hic ait cum Fuchio: nos sentiem impedire potius, quàm fædam discutere censemus, ob adstringentem illarum vim & aceti repercutientem. Idem ventrem excitare, eò quodd statum gignant, vult. Nos, quia stomacho graues, per se ad eam rem inutiles putamus. Interior membrana rubens, qua albicans pulpa circumuestitur, sistsit valenter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones: quinetiam cum pari pondere tamentorum Eboris, alba fœminarum profluvia cohibet ex aqua albæ Nymphæe hausta, inquit idem. Possunt & cum farina subactæ pessi forma subdi, ad suppressendos menses, monente Fuchio: sed prius in aceto macerare suadet. Emulso castanearum cum decocto Glycyrrhizæ extracta, addito pauxillo leminum Papaueris, confert iis qui ardore vrinæ laborant, quod remedium sibi communicasse Cratonem Med. Cæs. testatur Camer. Castanini olei meminit Sipontinus. Indi quoque, vt Plinius ait, è castaneis vinum conficiunt. Porro de castaneis, quantum ad cibum & nutrimentum, variant inter se auctores. Galienus crassi succi cibos castaneas cibo suaues recenset, atque adeò inter reliquas glandes, quanquam has suisbus magis quàm hominibus accommodatas dicat. Et alibi castaneas, siue elixentur, siue assentur, siue denique frigrantur, semper prauas dicit, & multò magis, si crudæ mandantur.

At Aëtius ex omni glandium genere optimas dicit castaneas, & solas ex sylu. fructuum genere memorabile alimentum sufficere. Esse tamen etiam ipsas capiti graues, vt pote dolorem eius inducentes: sed multò magis his Quercinas. Philotimus in lib. de nutriment. vbi citat Athen. tradit difficillimè omnes crudas digerere, atque peragrè solui, cum à Phlegmate in ventre retentæ fuerint, propter substantiæ firmitudinem. At Diphilus a propud eundem castaneas bonum dicit habere succum, & multum nutrire: at duræ esse digestionis, multumque in stomacho commorari: tostas minus quidem nutrire, sed faciliè digerere: elixatas minus his esse ventosas, & magis nutrire. Sic & Simeon Sethi copiosum corpori alimentum præbere affirmat, sed difficulter concoqui, tardè transire, crassum humorem & capitis dolorem facere, flatuolas esse & ventrem sistere: sed si torrefiant: vel deficcantur, multum nocumtum deponere.

## Cœna Bapt. Fierz.

Qua tibi gratia licet postea mollescat echino,  
Sicca est, & nimio Castanea igne calet.  
In caput & ventres inflata a asperissima sauit,  
Nis spolia apportet mellis arundinei.

Nimium ad noxas eius vitandas cum Sacchato comedendas suadet. Non infestiuè tamen easdem ab hac iniuria vnicò hoc disticho vindicauit Antonius Campanus quondam Episcopus Iteraniensis perdoctus. Castanea loquitur.

Ventosam qui me censens, ventrique rimendam,  
Falluntur: ventos pello ego, non facio.

Lob. Helius:

Si quem sacra tui victus Dodona inuabunt  
Serigeri, Stomachum veller habere suu.  
Castaneas molles patula sub regimine Fagi  
Ipse ego pro duris Glandibus esse velim.

Sunt & ad panificium aptissimæ castaneæ, quæ, si sanè sit ab incolis illorum tractu, vbi abundant, præsertim in montibus, vbi quotannis aliam

Mammari  
duretia.  
At arth. not.  
et Fuch.  
An Senerò  
excutit.

Alui flores.  
Sanguis.  
flu.

Menstrua  
alba.  
Menses sa-  
perit.

Ad ardo-  
rem vrinæ  
emulso.

Oleum ca-  
staninum.  
Vinum è  
castaneis.  
Dissentium  
auctores  
castan. nu-  
trimentu.

Præda

Bene nut-  
re.  
Noxa.

Nutrimen-  
ti Sarcitis  
Snde.

Non al-  
ventis

Prepar-  
ad pan-  
em, se-  
durem-  
rum



rum siugum annona deficit. Primum vt ætatem longissimè prorogent [alternant enim Castaneæ, vt dictum.] castrantur lento illo suo cortice, qui sub echinato calyce primò subest: deinde proxima corpori tunica, quæ infestat saporem, detrahitur: mox ut siccantur exactè, curant sedulo. Nam cratibus sic delibratas imponunt, quas postea in caminis suspending: siccatas in vltus seruât: moluntque in farinam, ac tandem cogunt in panem, quo per hyemem victitant. Integras etiam pierunque cum suilla coquunt in capaci cacabo: vicèque pulmentarii ac panis iucundissimè vescuntur. Suprà dictum ex Plinio, molituram præstare ieiunio fœminarum quandam imaginem panis. Coquunt & solas ex aqua, atque ita bellaniorum ceterorumque fructuum loco comedunt.

Fructu sanè refugium non semel Castaneæ miseræ plebeculæ in maxima annonæ caritate, vt Romæ compertum anno M.D.L. teste Lacuna.

Nostri homines torteri eas non modò gratiis, sed & in deliciis habent, præsertim amplissimas illas Marrones dictas, quas cum cæteris promiscuè diurnis ac nocturnis commensationibus apponunt: Galli & Itali etiam ex liquore rosaceo saccharato. Alii cum pipere & sale comestas, innocentiores putant, suntque reuera sic paratæ, illicia Bacchi ac Veneris: & de noxa sua plurimum remittunt.

Torrentur duobus modis, vel in perforata patella ad ignis flammam, vel sub prunis & cineribus candentibus. Prius tamen quàm igni aut cineribus credantur, cultello obiter vulnerari debent, vt plagæ hiatu, flatus igne citatus euadat: alioqui vbi flagrantem incaluerint conceptio intus spiritus, magno cum crepitu profiliunt, non sine adstantium periculo. Consumitur etiam melius fœtore sua humiditas, quæ iis inesse putatur, & æqualiter torrentur. Præsertur posterior torrendi modus: nam in sartagine tostæ vel patella ferrea, vt in cauponis fieri consuevit, parum comburuntur, aut certè aliquid fuliginosi Empyreumatis contrahunt.

Diuitum culinæ porcellos, anserculos, gallinas & artocreatas iis infarciunt, sicque assant. Et quid non ingenioso excogitatum ventri. Portentosa gula hyeme ad focum luculentum tostas castaneas ex vino dulci, hoc est, musteo & nouissimè expresso mandi suavit. Ita vides qua ratione à summa necessitate, in qua iis victitabant homines, ad extremam voluptatem sit deuentum. Sed sibi solis ista habeant ventres. Nam in totum quomodocunque paratæ, operosæ sunt in cibo, & paulò tantum Glandibus præstant.

Viscerum infarctibus oportunè: Colico dolori obnoxii inimicæ, & iis qui ad Calculum procliuues noxiæ, si modus abstinendo. Citra igitur satietatem edendas suademus.

Materies arboris ædificiis atque aliis domesticis vtensilibus admodum apta est: siquidem non modò ex ea fiunt trabes, tigna, asseres & pedamentæ, sed & cadorum costæ, & eorum cinctus, verum ignatis in septa, testibus Matthioli & Lacuna. Fabris tamen sartaginis carbonem expetitos, quod citò extinguantur, vt antè dictum, supple-

## CASTANEA HYMILIS RACEMOSA.

CAP. VI.



**H**ymilem Castaneam Io. & Locus du Choul nemini adhuc notam arbitrat, non longè à Pilatino monte contemplatam, depinxit. Matura nucus Auellanæ est magnitudine, echinato calyculo, corio, membranaq, tegitur. Sola nunquam suo calyculo includitur. Multæ simul racematim coherent. Gustu est insuauis. Sequentes ad hanc non referenda.

nechuius sunt fructus: ob mox dicendam rationem quamuis fortè aliquam similitudinem habeant.

## CASTANELLA PEREGRINA: AN.

GOR ARBOR, CASTANEA FRIGIDA AMARA.

CAP. VII.



**A**pud Cl. C. Descriptio Bauh. hunc fructum primò vidimus & deinde à D. Robino Botanico Regio dono missum accepimus. Figura & facie Castaneam non malè representat, nisi quæ ea parte quæ sessilis est Castanea, hæc in gibbum elata sit & concolor, consimili corio vniuersam contegente. Magnitudinem ostendit icon: cortice integitur spadiceo, quali Castanea,

nisi quòd paulò saturatiore, & plusculis striis inæquali. A cuius summo ad imum mucronem hyli facie linea latiuscula, cinerea, striarum itidem eminentiis asperata protenditur, vt in altera iconum videre est. Superna partè, (siue infernam dicere lubeat) linea coronali cingitur, intra quam pars clausa nigrior, nullisque striis donata. Impressio arguit alteri cuidam adhæsisse. Sapor pulchre ex albo in fulcum inclinantis (fortè ob vetustatem) ac firmæ, amaricans ac ingratus: Cæterum oleaginosa, vt impressa aciculæ acies

prodidit: iuxta enim oleaginosum quid exfudat, haud secus ac Nuci muscatæ, adacta punctura. Icon gemina utramque faciem ostendit. An *Gor arbor.* Scalig. de hac scribit ex. 181. parte 20. cum ait: Ad fluium Nigrit arbor, cuius fructus Castaneæ similis, sed amarus: Gor vocant incolæ. Hi sunt *Ethiopes* sub Libyæ solitudinibus. Io. Leo lib. 1. descript. Africa tradit has arbores mirandæ esse proceritatis, satis procul a mari in continente. Cæterum si nostra Cistifolia sit Gor, non potest esse fructus Castaneæ humilis. Repugnat enim immensa illa proceritas, & locus ubi prouenit.

# CASTANEA EQVINA FOLIO MULTIFIDO.

## CAP. VIII.

Descriptio



Folia.

Fructus.

Echinus.

Amentum.

Culices.

Cortex.

**C**astanea equina, quæ Florentiæ vidimus in horto Magni Ducis Hetruriæ, & ex qua fructu euechyno deceptum habemus, magna satis est arbor, quanta Morus, & valde patula: folia palmata sunt, ex segmentis plurimum septem composita, quorum singula pinnae marinae quodammodo emula, ex angusto admodum prin-

cipio sensim dilatantur, tandem in obtusum mucronem desinentia, per ambitum serrata, quamuis serraturas plerasque veteratiori sculptor omiserit, longitudine dodrantali: qua parte latissima sunt, palmum circiter lata, à costa media obliquis ordine nervis in ambitum directis, coloris supernè atroviuentis, infernè hilarioris, sapore amaricante. Porro coeunt hæc omnia in vnum longum pediculum, estque pediculorum situs oppositus. Fructus ipse non ita in conum desinit, vt vulgaræ nostræ castaneæ, globosior, altera parte spadiceus: quæ verò echino adhæret, impressionem cineraceam ostendit, cui cortici, nulla intercedente lanugine pulpa nostratibus castaneis similis subiacet. Echinus ipse multo crassior ac firmior, quàm dictæ, exterius rufus, prout siccus ostendit, internè albus, durus, sed rarioribus, breuioribusque spinis oblitus, firmis tamen & infestis, colorèq; flauicantibus, qui per maturitatem in tres partes dehiscens, Nucem ostendit, ipsius lateri infima parte inhaerentem, non à pediculo, vt rel. quæ. Hanc scribit Clus. Autumno cum folia amisit, protinus amentum quiddam extremis ramulis gignere, & turgidum, quasi parturiret, pingui ac lento humore conspersum, in quo culices & huiusmodi insecta hæreant, totaque hyeme ita perdurare, donec ineunte Vere, & præmaturè admodum gemmae in folia sese explicant. Corticem ramis tribuit, nouellis quidem virentem, adultis autem

cinereum, sub quo lateat alius succulentus, viridis, lignum ambiens, vt in Sambuco, vel Acere latifolia.

Matth. Castanearum aliud genus, in Orientalibus regionibus, de quo tam apud Antiquos, quàm Recetiores neminem meminisse putat. Arbor est, inquit, spectata proceritatis, folio Pentaphylli: Echinos fert in cacumine, magnitudine nostratibus æquales, subrufo colore, verum durior & crassior putamine, aculeis raris, sed robustis ac firmis, & colore flauescens. Singuli singulam continent castaneam, nostratibus ferè similem, crassior tamen, cortice subnigricante, præterquam anteriori parte: ea enim albicat, maculâ corolis effigiem præferente. Totus idem robustus est, simplex tamen, nullam intra se aliam tuniculam habens, quæ carnem ambiat, illi similem, qua nostrates castaneæ conteguntur. Sapor paulò, nec adeò mandentibus gratus, si tamen ex sicco fructu id quidem rectè percipi potest. Clusius quoque Veteribus ignotam censet. Lob. mixta quasi naturæ ex Fago & Castanea dicit, frondibus digitalis Eliehoti, Castaneæ alioquin similibus donatam, in qua Echinus octennium aut decennium, eiusque nucleum claudit & tueretur saporis perboni, seque nonnullas incorruptas prædulces gustasse in Museo Rondeletii.

Cæsalpinus nouam opinionem habet: putat Castaneam equinam esse, quam Plinius Myrobalanum appellat folio Heliotropii herbæ simili: fructu Nucis Auellanae, quæ Glans appellatur, &c. At quæ obsecro folii Heliotropii similitudo cum foliis castaneæ equinae? Nos Myrobalanum illud Plinii relinquimus sub Nuce Myrepica.

Equinam castaneam appellant Constantino politani, testibus Matth. Cæsalp. & Clus. qui ait Turcis patrio nomine *At cee stanefi*, vel *ad castanefti*, eadem significatione ob mox dicendam causam. German. Rosfe fescen: Gal. *Chastaigne de cheual*: It. *Castagna di cavallo*, o *Castagne cavalline*: Hispan. *Castana de cavallo*. Anglic. *Horse Chestnut tree*.

Concedimus quidem Penæ & Lob. Matthiolum affabre expressisse in sua figura, ad quam & nostra facta [excepto fructu] si modò florem, quem prius pingit, descripsisset. Vt dubii sumus an verus sit flos, vel fictus. Clusius sanè etiam in sua iconè, quam habet in post. hist. omisit florem.

Nascitur Constantinopoli, & in Creta, vnde Locutus de folia accepimus à Cl. Medico Hon. Bello. Ramus etiam cum fructibus incipientibus à Clariss. Zuingerio communicatus, qui ait sibi obseruatam inter Patavium & Veronam. Nobis arbor visa Florentiæ in horto Ducis. Tam Matth. quàm Clus. scribit sibi ramum missum Constantinopoli per Qualebenum medicum. Hic speciatim sibi etiam egregiè adoleuisse testatur, Viennæ, & intra duodecimum annum, in humana coxæ crassitudinem, duarumque Orgyiarum aut amplius altitudinem adoleuisse, latamque comam sparsisse. Fugoris patientissimam esse, vmbriaque & aqua, vt Platanum, delectari.

Addunt fructus, & status deuorati patiunt, si Matthiolo credendum: qui tamen paulò ante saporem tantum dulcem dixerat, nullius adstrictiōis mentionem faciens. Idem & culicibus & anhelosis equis plurimum auxilii affert. Deuoratas affirmat: darique etiam sanguinem reiciuntibus. Id de equis & Clus. affirmat, indeque nomen apud Turcas traxisse.

CASTA-



## CASTANEA PERUVIANA.

CAP. IX.

**S**cribit Clusius in Hist. post. Castaneæ hoc genus sibi ab Abrahamo Ortelio Cosmographo Cl. donatum, quod is ex Peruana provincia delatum à Celeb. viro D. Aria Montano acceperat. Sphærica inquit, penè est figuræ hæc Castanea, nisi latera haberet paullo depressiora: præsertim ubi



pediculo inhæsit, cortice satis crasso, fragili tamen, & veluti fungoso obducta, coloris ex fusco aliquantulum flavescentis. Huic subsunt innumere, tenues quidem sed firmæ spinæ, putamini, quod nucleum includit, tenaciter inhærentes: ipsum putamen fulcum est, non densum, sed lentum & fractu contumax, interiore parte læue & splendidum, quo

continetur nucleus Amygdalæ [putamine suo liberæ] magnitudine & colore, forma autem leporino reni similis, intus albus, sapore dulcis ferè ut Amygdala aut Castanea vulgaris.

## CASTANÆ PURGATRICES.

CAP. X.


**F**ructus est arboris eiusdem vassæ, Castaneis similis, sed calyce læui, non, ut illarum, echinato: eo calyce si fructus continetur, Castaneis non admodum ab similibus, sed sine cortice, & ferè quadratus, in duas partes diuisus, med. um intercurrente, & totum deinde ambiente pellicula. Ex maritimis Nicaragua & Nata (quæ sunt in noui Orbis Cōtinenti) invehitur in hispaniam. Editur hic fructus viridis, aut contusus vino exceptus: si siccus, eius puluis ex vino aut Gallinæ uisculo sumitur: datur etiam tostus, ut minùs purget. quocunque tandem modo sumptus, sine molestia purgat, obseruatis iis quæ à purgatione obseruari solent, & preparatis prius, ut decet, humoribus. Illud verò minime silentio prætereundum, pelliculam illam exteriorē & internam abiciendam esse, alioqui grauius Symptomata excitaturam veluti ingentes vomitus, animi deliquia, & periculosa alui profluvia. Calidus est in primo gradu. Ex Costa: qui fructum Cholagogum vocat: It. Castagne purgative. Castaneæ purgantes Castor. Dur. Possis Germ. Purgierende Castanien. Gal. Chastaignes qui purgent, appellare.

## CASTANÆ SPECIE FRUCTVS

PEREGRINVS.

CAP. XI.

**M**ediocrem Castaneam non tantum magnitudine, sed & tota forma refert, ut pro ea primo obtutu possit fallere: Color tamen paulo



Descripti

dilutior ad flauum inclinat: nitor & læuitas eximia, excepta basis porruuncula oblonga, quæ videtur aut arbori aut echino adhæsisse. Cortex extimus admodum tenuis fragilisque, cui fungosa substantia adnata subest. ipsa verò cavitatis vacua est: quo fit ut insignis totius fructus læuitas. Hunc ill. nostro Purcapi nūst D. Paludanus nomine Fructus peregrini Indici.

Cortex:

## LEUCOMA FRUCTV CASTANÆ.

CAP. XII.

**F**ructus quem ex India accepi, inquit Monar. Leucoma eis dictum, similis est nostrati Castaneæ, cum colore, tum magnitudine, tum etiam sessili illa & albicante parte, quam Castanea obtinet, quæ prægnans videtur. Arboris est vassæ magnitudinis, maternæque firmæ & robustæ, cui folia Arbuti. Fructum edulem gratique saporis esse aiunt, & alui profluvia sistere, quoniam adstringit. Temperatum asserunt.

Descripti fructus.

Arbor. Folia Vires &amp; Alui fl.

## GLANS INDIAE DV CHOVL.

CAP. XIII.

**D**V Choul in fine libelli sui de Quercu scribit: Superesse Indiæ Glandes, Latinis suo iudicio & Græcis incognitas, de quibus se non posse aliquid viris optimis tradere, neque describere, quoniam arborem non viderit. Egregiam sanè verò excusationem: quasi verò interim non ipsam Glandem sine arbore describere potuisset. Exicone [si quando viderint] occasionem sument studiosi, inquirendi, an non aliquid commune habeat cum Castaneis purgantibus antea descriptis. Nobis sanè videtur, quoad figuram accedere ad Ahouai, de quo inter Nuces exoticas lib.

## GLANS INDICA.

## CAP. XIV.

Descriptio



Capula.

dura ac lignosa ferè, exterius plurimorum denticulorum mutuo incubitu imbricatòque asperata, colore cinereo, pediculo semunciam ferè longo crasso atque lignoso. Glandem à capula separatam accepimus, licèt pictor coniunxerit. Data verò pro eiusdem cupula glande, ac tam aptè respondet immersa, ut vix dubitari queat. Monere tamen volumus. Nostrum quippe non est quicquam in hoc opere, quantum in nobis quidem fuerit mentiri.

Vilendæ raritatis ac pulchritudinis hic fructus datus nobis ab Illustr. Ducissa VVirttemberg. Cuius Glans Quercing figura & magnitudine similis, intus candida, substantia dura, ac propemodum ossca, nullius saporis manifesti: exterius nigra, lineis ac venulis squamatis, corticatissimæ, rufis, reticulatim per superficiem sparsis.

Capula crassa

tamen à fortiori digitorum compressione facile frangatur ac diffiliat. Per longitudinem arca insignis, inæqualis & scabra tuberculea excurrit, hylæ imaginem præ se ferens, quaque parte cortex reliqua



firmiter est, crassior, duriorque eam adhæsisse vel alteri cortici externo, vel arbori, suspicio est. Interna facies cortice connecta est rufa, tenui atque fungoso, intercurrentibus veluti venulis, ut in interiore cortice castaneæ, im-

mediatè callum complectente. In quo ceu pulvino immersus iacet, omnem ferè cavitatem adimplens, nucleus figura rotundus, facie glandis aut castaneæ nucleo per similibus, geminus ut in glandibus, extima facie scaber, rufa cuticula intectus, quæ verò committitur lævis, substantia dura & colore Glandis nuclei, sapore dulci, grato. Non putamus hunc fructum quicquam pertinere ad Balsami genera.

Sapor.

## ARBOR FINIVM REGVNDORVM

FRUCTV CASTANÆ ECHINATO.

## CAP. XVI.

GLANS INDICA MAGNA  
SVBROTVNDÆ.

## CAP. XV.

Descriptio

Balsami  
fructus.

Thomas Platerus, elegans Medicus, & rerum naturalium industrius vestigator, inter alia rara, quæ amicè nobiscum communicavit, perelegantem etiam hunc fructum dono dedit, à Domino Robino, Regio Botanico acceptum nomine Fructus Balsami, ut aiebat. In glandem magnitudine æquat, cortice constans flavescente, ut Glandis Quercus exiccata, lævi, crassiusculo, qui

Nominis oblitus Io. Balada [inquit Scal.] familiaris meus, qui multos annos Indias peragravit, faciem modò narrabat arboris. Parvam esse frequentibus virgulis, veluti Punicam. Folium Pruni. Fructus qualis castaneæ cum Erinaceo. Intus Coccus ruber: quo utuntur ad tincturas & picturas. Non enim literas habent Mexicii, apud quos nascitur: sicuti neque olim Aegyptii, ante Theuth. Sed in tabellis pictis servant agrorum facies, finisque prædiorum. Quæ fuit causa, ut ego eam appellarem, finium regundorum Arborem, donec alius me felicior nomen ipsum apponat verum.

Descriptio

Folium

Fructus

Coccus

tinctura

Locus

Raritas

minis

FINIS LIBRI SEPTIMI.

HISTO-













# HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER OCTAVVS.




DE ARBORIBVS SYLVESTRIBVS.

TAM Sylvani Faunisque litandum, sed cum ratione & Genio bono. Sylvas intelligimus nunc celebrandas, quas Lemuria, frustra neque infelices dixere prisca, speciatim rigidus ille Cato, damnataeque religione, quippe neque feri neque fructum ferre solitas. At nos contra, istud non modò aequo animo non feremus, sed eo ipso feliciores iudicabimus, quod earum peculiaria parens videri possit natura, quippe quae magna ex parte sponte sua nascentes, nulla arte, nullo ingenio humano egere videantur, quanquam & in recta iam sylva scandant, patula ramorum opacitate lasciva pleraque, ut non improbe etiam earum quasdam urbanas dixeris. Nec ipsae tamen fructu suo carere docebimus: & si non fructu, at alia aliqua dote non spernenda, umbrarumque officio homines invare, ut nullum prorsus sterile ac inutile huius naturae opus extare constet.

TILIA VULGARIS PLATYPHYLLOS.

CAPVT I.



GRATA latè  
Gpatentium,  
inque attegias for-  
nicatorum brachiorum umbrā  
placet Tilia, caudice mirè in mo-  
dum grandescen-  
te, cuius corti-  
ci nigricanti ac  
in vetulis crasso  
& rimoso, in iu-  
niorib. nec cras-  
so multum nec  
scabro, sed læ-  
vi ac subcinereo,  
subest tenuis len-  
tus ac dulcis li-  
ber, totius ar-  
boris nomen in-  
deptus, si non  
pouis illa ab hoc: Philyram dicunt. Materies  
alba, mollis, facillè cælo cedit. Extremi ramu-  
li fragiles sunt. Folia lata, ex rotundo in acu-  
men definitentia, in ambitu serrata, inferna par-  
te magis hirsuta quàm suprema, quae ferè gla-  
bra. Ex horum alis oriuntur ligulae longæ, al-  
bicantes, foliaceæ, ex quarum costa media pediculus emicat, qui in tres, quatuor, quinque-  
ve petiolas abit, quorum singuli florem susti-  
nent suavolentem, quinque foliis ex luteo-  
lo albicantibus constantem; apicibus complu-  
ribus luteis, stylo albicante: totum florem ob-

vallant calycis dehiscents quinque segmenta al-  
bida pinguis. Fructus Piso maiori æqualis, ro-  
tundus, aliquantum in oblongum vergens, an-  
gulosus, hirsutus, non durus, intus claudens  
semen [vel nucleum] subfuscum, dulce. Fert &  
Viscum copiosè & abundè, & quotannis Ba-  
sileæ.

Huius arboris exortus mirabilis, & præ cæ-  
teris observatu dignus, qui ex semine deciduo  
spontaneus, primis statim diebus colicolum ex-  
xerit unciam unam aut alteram altum, bina fo-  
lia ostentantem quorum unumquodq; in quin-  
que communiter divisuras, veluti, digitos dis-  
sectum, extremis & media cæteras longitudi-  
ne superantibus, iucunda, hercle, dispositione:  
ut Basilæ in celeberrimo illo Tiliceto prope  
D. Petrum, quotannis videre est Maio & Iu-  
nio mensibus. Horum foliorum iconem exhi-  
bemus in sequenti tabella iuxta Tiliam minore  
folio.

Thalium excrementum seu vitium Vvis querci-  
nis simile observavit in Tiliarum antiquarum  
radicibus.

Apud Diosc. Tilia φιλύρα est, in Proeth ubi per  
duplex a scribitur. Eius verba citabimus in vi-  
ribus. Apud Theoph. verò φιλύρα, cui alia mas,  
alia femina. Differunt inter se tota figura [mas  
et femina] etiamque ipsius ligni: & quod altera fru-  
ctifera est, altera sterilis. Nam lignum mari-  
dum, flavum, nodosius ac spissius, πυκνότε-  
ρον, [Gaza non benè spinosius convertit.] Fe-  
minæ verò candidius, flexibiliusque. Cortex ma-  
ris crassior, & detractus propter duriciam flecti

Fractur.

Viscum.

Præter.

Tilia exor-

tus.

Prima fo-

lia.

Præter Tilia.

Philyra

Diosc.

Philyra

Theoph.

Mas &

femina.

et inter

differant.

Tom. I.

M

Gaza a-  
lium error.

Medulla.

Tilia histo-  
ria ex Pl.

Vincula  
Tilia.

Philyra.

Plin. sibi  
contradice-  
re vide-  
tur

Tilia mol-  
les.

Ephora.

Hermol.  
lapsus.

Ruell. 1a.  
2a. Phily-  
ra.

nequit. *Fœminæ* candidior & flexibilis, ex quo-  
cistis [*zetas*: gaze, cunas, alij, Canistros.] fa-  
ciunt. Item odorator. [Plin. mari tribuit odo-  
rem.] Præterea mas sterilis est, & sine flore: *fœ-  
mina* & florem & fructum gignit. Flos calyci si-  
milis [*φύλλαδες*: gaze Calyculo intectus: nec ad  
verbum, nec ad rem.] iuxta folij pediculum, &  
anri sequentis Cachryn, suo petiolo innixus e-  
mergit, viridis, dum in calyculo est: detectus ve-  
ro subflavus. Floret cum domesticis arboribus.  
Fructus rotundus, oblongus, Fabæ magnitudi-  
ne, Hederæ acino similis, masculus quidem  
quinis constans angulis, veluti fibris emhenti-  
bus, & in acutum se contrahentibus: Minor verò  
minis divisus. grandior excelsus, minuta quæ-  
dam tenuiæque emittit femina, quanta Atriplicis.  
Folium & cortex suavia, dulciæque. Folium figu-  
ra Hederæ simile, verum in ambitu sensim ma-  
gis rotundatur, & iuxta pediculum id, quod velut  
in gibbum prominet, a folij medio, longiore tra-  
ctu in acutum magis cogitur: suntque folia per  
ambitum crispa atque serrata. Lignum paucam  
medullam habet, ac eam quidem haud multò mol-  
liorem materie, quæ & ipsa mollis est.

Hæc Theoph. ex quo Plin. pleraque sua de ea-  
dem transcripsit in hunc modum. In Tilia mas &  
fœmina differunt omni modo. Namque & mate-  
ries maris dura, rufiorque ac nodosa, & odora-  
tor. [de fœmina id Theoph.] Cortex quoque  
erassior, ac detractus inflexibilis. Nec semen  
fert aut florem, ut fœmina, quæ crassior arbore,  
materie candida, præcellensque est. Mirum in  
hac arbore fructum à nullo animalium attingi:  
foliorum corticisque succum esse dulcem.  
Inter corticem & lignum tenues tunice mul-  
tiplici membrana, & quibus vincula Tiliæ vo-  
cantur: tenuissima earum [tenuissimum corium.  
Vet.] Philyræ, coronarum lemniscis celebres, an-  
tiquorumque honore. Materies teredinem non  
sentit, proceritate perquam modica [hoc ad Phil-  
lyream pertinet] verum utilis. Mollissima Tilia,  
eadem videtur & calidissima: argumentum affe-  
runt, quòd citissime scias retundat. Et mox: Fri-  
gidissima quæcunque aquatica: lentissima autem  
& idèd scutis faciendis aptissima, quorum plaga  
contrahit se protinus, cluditque suum vulnus,  
& ob id contumaciùs transmittit ferrum: in quo  
sunt genere Fici, Salix, Tilia Betula &c. [Hic Plin.  
sibi contradicere videtur, magna oblivione, qui  
paulò ante Tiliam calidissimam ex Theoph. dixe-  
rat, nunc frigidissimam dicit. Nec verum, frigidis-  
sima quæcunque aquatica: Salix amara neuti-  
quam talis nobis videtur.] Sol ad Aquilonem  
scandens, vertit Tiliæ folia ad mille usque peten-  
da. Quod postremum ante ipsam dixerat  
Theoph. cap. 26. l. 2. caus. ubi, postquam de folio-  
rum circumactu à Sole locus fuisse, addit: hoc  
latius in Tilia [*φύλλαδες*] patere, quòd hæc amplio-  
ra candidioræque folia gerat. Tiliæ milles dixit O-  
vid. Dicitur & apud Poetas sequax, lavia, pinguis,  
elumbis.

Mirum Hermol. in re tam manifesta hallucina-  
rum, ut Tiliam Græcis Phelyream [sic enim ille  
habet.] nostris quoque Phelyram & Philyram di-  
ci tradiderit. Certè tantum differt Philyræ à Phil-  
lyræ seu Tiliæ, quantum Myrtus à Quercu. Non  
igitur rectè *φύλλαδες* Tiliam vertit, eandemque  
cum *φύλλαδες* Diosc. confundit, & præterea cum  
Philyræ. Sic enim quoque à Theoph. vocari ait.  
Eundem censuram meretur Ruell. dum Tiliam  
Græcis Philuram dici scribit: & Diosc. esse arbo-  
rem magnitudine quæ Cyprus.

Marcellus more suo Hermolaum carpens in  
versione Theophrast. quod *λαφύ* tincturam ferri  
convertat, quam, quid sit, scire Græcarum litera-  
rum impedit non sit. Ipse tamen & geminum in-  
currit error: Primum quòd Philyream Diosc. con-  
vertat Tiliam: Deinde quòd demonstret aleam  
plantam esse Philyram sive Phylliram eiusdem  
Dioscor. quam nos Tiliam diximus. Sed quod pu-  
tat *λαφύ* melius in temperaturam converti, per  
nos licet: Optassemus tamen declarasset, quam  
vim aut qualitatem agentem per illam tempera-  
turam intellexerit. Vult autem Tiliam matrem  
esse futuriæ Tiliæ, in omni opere tractabilem,  
quæ pedinum suorum sequaci facilitate nomen  
aliis omnibus arborum pectinibus dederit.  
Passim enim Tiliam nunc in arboribus Italos di-  
cere lineas, ductus, interfectionisque & circun-  
ductiones illas, quibus confecta omnis earum  
materia & in seipsam stipata convolutæ vide-  
tur: quod natura tam diversum opus oraci *κν-  
δύρας*. Plin. eos imitatus *pectines* dixit: & in quibus  
variarent pectinum illorum lineæ & intervalla,  
semper adiecit aliquid, quod varietas illa indicaretur,  
obliquos, crispas, nodososeve dicens. Et  
verò idem Marcellus sibi ab Hermol. ostendi op-  
tet, sitne nostrati Tiliæ antiqua illa eadem: (di-  
cit autem nostratem, quæ in Hetruria nunc ab o-  
mnibus Tilia nominatur, ex qua secandis coriis  
futores paratam ubique tabulam habent, in nul-  
lam partem rectis pectinibus, sed quacunque  
ferramentum agatur sequacem & cedentem,) i-  
pse tamen quoque nihil certi aditavit, neque sa-  
nè adstruere potuit, quippe qui apud Diosc. Phil-  
lyream, Tiliam converterat, & Ligustro magni-  
tudine æqualem hanc arborem secerat: atq; qui  
ligni pectinibus adhærens, (quos Græcis *κνδύρας*  
vocari diximus) seu per longitudinem rectis pe-  
ctinum modo lineis, nullam earum esse in ea fu-  
torum tabula & arbore causatur, sed in omnes  
partes sequacem pariter & facilem sectionem: an-  
tiquiores tradit Græcos ex agrestis pro futoria illa  
tabula usos: expertos namque in duriore materia  
acui ferrum, in molli verò in secando ductum re-  
tundi, atque aciem amittere. At si Marcellus  
Theoph. *φύλλαδες*, ex quo eius marem & fœminam  
agnoscit, cum Philyræ Diosc. consulisset, & rur-  
sus hanc cum Tiliæ sua Italica, facile agnovisset,  
hanc ad Philyram tam propè accedere, quàm à  
Phillyræ, & arboris magnitudine, & tota adèd  
forma distat, nec ex nudæ tabulæ futorie (quam  
tamen Tiliacem fuisse agnoscimus) pectinum  
carentia, & accessita illa etym ratione, dubita-  
set, an Tilia nostras sit Philyra Theoph. & Phil-  
lyra Dioscorid. diversissima à Phillyræ eiusdem.

Nihil doctorem se Botanicum præbet Cordas,  
quando ad caput Diosc. de Phillyræ scribit,  
ab eo describi Tiliam omnino eandem cum Li-  
gustro, si invicem utriusque descriptionem con-  
ferat. Galeni & Aeginetæ ætate talem Tiliæ histo-  
riam in Diosc. lectam. Atque sive Tilia à Diosc.  
ita descripta sit, sive ab alio hæc descriptio adie-  
cta, falsam esse pronunciat, ob id quòd nullus,  
neque ex piscis neque ex recentioribus hisce  
notis eam depinxerit. Omnes [addit ille] mani-  
feste describunt Tiliæ appellatione eam arborem  
quæ German. ob ligni lenitatem & molliem eam  
Lindæ vocatur. Ac miratur hoc nullum ante se a-  
nimadvertisse: quòd omnes qui post Dioscor. de  
rebus scripserunt, aut alios interpretati sunt, ul-  
que ad nostram ætatem, eam controversiam de  
Tilia inter Diosc. & Theoph. silentio præterive-  
riat. Et tandem supervacuum concludit esse hi-  
storiam



quæ apud Diosc. de Philyrea habetur, seu ut ipse vertit, de Tilia, quamvis idem agnoscat Philyram Græcorum potius esse Tiliam. Sed frustra quitur ubi non opus. Nec opus fuerat ea fatagencia, quam sola Philyrea æ se in Tiliam perperam conversa inexit. Non enim eo capite apud Diosc. quaestio est de Tilia, quare nec de ea disputandi locus. Siquæ is etiam Tiliam rectè cum Ligustro contulisset, & utramque probè agnovisset, non dixisset illam omnino cum hac eandem esse.

Sed nec Tragus videtur discrimen animadvertisse inter Philyram, quæ Tilia, & Phyllyream, quando ita scribit: Quæ Germani Lindenbaui vocant, eam cum Gaza & Virgilio Tiliā nuncupare placet. Sive ergo *φιλύρα*, sive *φιλύρα* Theophrasto dicatur, nihil nos offendet, cum & ipse Aegineta Philyrada non Philyram vocare voluerit, quæ Diosc. Philyrea dicitur. Nam quas Phyllyreæ suæ vires Diosc. eas Philyradi Aegyneta quoque assignat.

Castor Durantes quoque Tiliam pingit pro Philyrea, licet eius descriptio non conveniat.

Hi itaque Phyllyream cum Philyra seu Tilia confundere, ad nominum potius vicinitatem, quam ad rem ipsam respicientes. At Fuchs. primus inter eos fuisse videtur, qui observavit aliam à Tilia seu Philyra esse Phyllyream Dioscor. redarguens simul etiam viros nonnullos doctissimos, qui utraque confundere. Hanc Fuchsij sententiam merito secuti sunt. Cornar. Muth. Dod. Monachi, Curtius, Lonic. Lacun. Ryhius, Fr. Massarius, Dalec. Hist. Lugd. & alij. Nec tamen ferendi qui sibi persuadent, Dioscoridi Tiliam incognitam fuisse, vel eidem à vulgari Tilia, aliam esse longè diversam, utpote quæ omnibus notis Tiliæ refragetur. Nam & ipsum quoque Tiliam seorsum à Philyrea cognovisse, ut benè monet Matth. vel saltem in iis plantis discrimen posuisse, satis perspicuum ex eius præfationis fine, ubi sic habet: Flores & omnia quæ incundum spirant odorem, & virtutes *φιλύρεως* recondenda. Quæ voces non modò rectè ab interpretibus conversæ, in articulis Tiliaceis: sed & posterior non à *φιλύρεα*, sed à *φιλύρα*, quæ Lat. Tilia est, deducta, satis declarat ab ipso Diosc. Phyllyream & Philyram pro diversis plantis agnitas.

Nec audiendus Plinius, cum ait: Tiliam arborem esse proceritatem perquam modicam, nam cum contrarium in re ipsa appareat, certum est, ipsum quoque Plin. vocum propinquitate deceptum, eas inter se confudisse. Id quod vel clariùs patet ex eo, quòd idem nostræ Tiliæ eas tribuit vires, quas Diosc. suæ Phyllyreæ, ut suo quoque dictum loco.

Nihilò tolerabilius lapsus Cornarij, quando inquit: Non putandum esse Philyram Theoph. esse Tiliam, seu *Linde* Neoteri corum, sed esse Platanum. Tiliam verò & Philyram, nisi penitus fallatur, [ut certè fallitur] esse eam arborem, quæ nostris Germanis *Ahorn* appellatur, sed lubet in totum eius verba recitare. Quidam, inquit, asserunt Tiliam esse quam nostri *Ein Lind* dicunt: nimirum quòd futuros tabulis ad secanda coria ex ipsa factis utuntur: hoc tunc demum admittemus, ubi ostenderint de Philyra ac Tilia hunc usum à veteribus tradi, & non Platanum esse & appellari, ex quæ eiusmodi tabulæ parantur. Nam quod Plin. ex Theoph. dixit, mollissima Tilia, eadem videtur & calidissima: argumentum afferunt, quòd citissimè ascias retundat: hoc omnino reprobari illius eius usum, quum *fermentum* re-

tundatur magis, quàm acuat in ipsius usu, id quod non contingit in tabulis ex Platano hodiernis, quæ & molles sunt, & ferro cedunt, & ferum nulla iniuria offendunt. Quanquam ego Tiliam non dum coria in ipsa secantur, sed dum eius materia caditur, & in usum efformatur, ferrum lacerare, & tincturam eius relaxare, tum apud Theoph. tum apud Plin. intelligendum esse putem. Iuxta eandem rationem etiam dum Galz. *Comales* *αὐτὸν ἀγυρῆς*, & *αὐτὸν ἐστὶν ἰσχυρὸν*, canales validos, eosdèque albos & molles fieri posse docet ex Philyra, quæ Tilia est: cuius dogma hodie Chirurgi sequentes, ex Platano canales tales parant: tamen de huius arboris ligno Gal. non sensit ex eo apparet, quòd validi, id est, ut ipse dixit, *ἰσχυροί*, canales ex hoc ligno fieri non possint, sed ex eo quod *Ahorn* nostris vocatur, & à nobis Philyra esse creditur, & validi & molles, simulque albi, ex femineo præsertim eius genere, optimè fieri possunt, velut ex Theoph. ac Plin. locis supra adductis evidentissimè patet. Cæterum quum Plin. alicubi de Philyra dicat, eius materiem teredinem non sentire, proceritate perquam modica, verum utilem: etiam his verbis declarat, [inquit Corn.] Tiliam non esse, quam nos *Linde* dicimus: quum hæc & teredinem non sentiat, [contrarium asserunt fabri periti: Sed ita sibi persuadet Corn. quia Platanum existimat] & ingenti tum proceritate tum amplitudine se expandat, ut Platanum esse adhuc non dubitemus, quam citò putrescere ex Theoph. liquet. Tiliam verò *Ahorn* nostris dictam esse, etiam ex his notis coniectamus. Neque enim opinionem hanc nostram aliter approbatam esse volumus. Hactenus ille. Nec certè aliter ut meliùs potuit, ac ne sic quidem benè. Nam erronea admodum uttaque Cornarij opinio, volentis *Linden*, Philyram, seu Tiliam esse Platanum: sicut & illa, quæ vult, Tiliam esse *Ahorn*, de quo fusiùs cap. de Accere. Interim advertat lector quàm ieiunè Cornar. ad ligni tantum examen respiciens, suas fundarit opiniones, cum, uti dicebamus, nihil sit clariùs Philyræ Theoph. descriptione collata cum Tilia Plin. atque ad eòd nostræ.

Rectè Turnerus negat Tiliam non esse Platanum, ut multos velle ait.

Nescimus ubi Pena & lob. Phyllyreæ illam suam descriptionem apud Theoph. legerint, quando tradunt: Frondosam illam ramis patulam Theoph. *φυλλοειδὴν* [ita enim scribunt] ex qua Phyluræ, sive assulæ finduntur, Tiliam esse certum est. Nam ut à nobis quidem observatum, *φύλλα* legitur apud Theoph. in diversis exempl. pro Tilia. Nostro iudicio Abies finditur in tenues assulas: non item Tilia. Falluntur iidem, nec uno errore, cum de Tilia sic scribunt: alia est hæc à Diosc. Phyllyrea, & per y scribenda, quod in tenues assulas & Phyllyras discernatur: pulcherrima Basilæ Helvetiorum in D. Petri area, patulis ramis, sparsis, in quæ vasta magnitudinis ambitum fornicatum propagata, folio latiore Populneo aut Betula, serrato ambitu Loti ramis: item frondosis & Amentis per initia Coryli aut Iuglandis. Verum quidem in D. Petri area dicta pulchras & magnas admodum esse Tilias, etiam cum visco: sed nulla quæ in fornicatum ambitum sit extensa. Est quidem ibi patula eiusdem Quercus celebratissima, & à nobis suo loco descripta. Nullibi etiam in Tilia observavimus Amentia Coryli aut Iuglandis. Quercus cum longis pediculis, qualis modò dicta, solet ferre aliquid respondens Coryli

Cornarij  
prob.

Cornarij  
opinio retri-  
citur.

ps. & Lob.  
multiplex  
error.

Tilia cum  
visco.

aut Juglandis nucamentis. Ve suspicio sit, eos Quercum, quæ nondum protrulerat omnino sua folia, & iam ista nucamenta ostentabat, sumptisse oscitanter latis pro Tilia.

Cordus quidem in sua obs. sylva scribit sibi visam Tiliam grandem Veris medio aut paulò antè lulos ferentem longos, colore flavos, propè Nuringam oppidum in pago. Sed quævis Tiliam intelligat, dolemus nos non recordatos sciscitari, quando ipsi adsumus apud Illust. Palatinam viduam Illustr. Ducis Lud. VVirtenbergici. Nemo præter ipsum, quod equidem sciamus, Iulorum istorum in Tilia meminit, nec facile fortè animadvertentur in vulgatis Tiliis, quas sanè plus satis diversis anni temporibus contemplati sumus. Theoph. tamen, vti dictum etiam Cachryn Tiliæ tribuit.

Consideratione digna descriptio Casalp. Tilia [inquit] arbor in Alpibus tantum provenit, Alno similis, fructus minor quam Alni, striatus, semina inter squamas continens depressa, materia alba aut flavescens. Esti autem hic videatur Casalp. hanc nostram Tiliam intelligere: tamen nec in Alpibus tantum provenire, dicimus, nec Alno valdè similem, quamcunque tandem intelligat. In materie quoque nullam flavedinem hactenus observavimus.

Cæterum Tiliam hanc, de qua hic agimus plerique feminam statuunt, ut Fuchl. Dod. Pen. Lob. Casalp. Hist. Lugd. & Schuvenckf. quibus non gravatè subscribimus. Non placet verò eam à Schuvenckfeldio Tiliam sativam sive fecundam dici, cum incerta sint ea epitheta: quia altera folio minore, de qua postea, multis in locis est sativa, & passim fecunda quoque. Præterea femina hæc nostra, etiam spontè in montibus provenit, & viscum fert. Proinde nec à Trago quidem rectè simpliciter sativa dicta. Quid nobis videatur de Tilia mare Dod. Penz & Lob. dicetur postea cap. de Fago sepium sive Ostrea. Quamquam Casalpini difficultè putet coniectari posse, quænam sit Mas, cum folia non describantur: suspiceturque intelligi posse Lignum putidum vulgò dictum, de quo nos l. 5. de Spina Burgi.

ubi hanc Casalp. opinionem reiecit. Idem paulò ante scripserat, suspensionem esse, ne Plin. cum Vlmi genere comprehendat carpinum utramque, aut Alnum, Tiliamque quasi præterea dictam.

Apud Amatam Lugduni excusum, icon Tiliæ incuria typographica malè posita pro Cisto maris.

Fallitur Car. Stephan. dicendo Phyliræ interdum Philycam appellari. Differt enim Phyliræ à Phylira quicquid dicat Stephanus.

Nomina Linguar. Tilia, *שיל*: Hebr. ut placet Elia in nomencl. Alcherach: Germ. *Linde* / *Lindenbaum*: à ligni mollitie, uti volunt. At Gorop. in Indoscyth. Tiliam gemina ratione *Linde* dici scribit: & quia pulchra sit, & quia fascis & funiculi ex ea fiant. Belg. *Linde* / *Lindenboom*. Gall. *Tillet*, *Teil*, *Tillen*, *Tilher*: It. *Tiglia*, *Tilia*: Hisp. *Teia*. Angl. *Lind tree*. Boh. *Lipa*. Hung. *hacsa*.

Cortex eius quoque Phylira dicitur & Tilia. Sed & aliarum arborum cortices interiores eo nomine donantur. Sic Plin. l. 24. de Vlmo: Corticis utique inquit, interior Tilia lepras sedat. Et paulò post: Idem præstant & Tiliæ corticis &c: Et hoc ipsum etiam lib. 16. his verbis idem Plin. declarat: inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, è quibus vincula Tiliæ vocantur, tenuissimæ earum Phyliræ Coronarum lemniscis celebres, antiquiorumque honore.

Phylira cortex. Phylira homonymia.

Phyliram Theoph. ibidem nesci scribit, ubi C. Locustasus. In locis fervidis difficillimè prodit. Plinio autore, montes & vales diligit Tilia: nem aquosis gaudet montibus. Pungue istumque solum desiderat, in stercoreto optime procreat in arido ac saxoso agrè adolebit. Tiliæ Afæ inquit Theoph. difficulter recipit: & in hac alenda cultores hortorum vehementer laborant. In toto Germania tractu, in urbium & ædificiorum areis in delitiis habent, ob opacitatem quam vel per se, in vel atregias disposita, deambulantibus recubantibusque tempore æstivo præbet. Et finè vix videas aliam arborem in Germania, aut fortè in tota etiam Europa, quæ cum Tilia opere topiatio, & ampla ac patula illa valitate certet.

In primis nobilis Basilica inter alia nobilissima naturæ dona, quæ habet, & huius stipatu ac ornatu triumphat, ubi plures areas ac sylvas hac unica arbore confitas videas, præcipuum illius amoenissimæ urbis decus, quod totus serè Iunius cum Maij parte media ingeminat sævissimum florum per totam urbem afflatu, non sine incolarum ac transeuntium salubritatis iuvamento. Sed præ cæteris rara & topiaria amoenitate conspicua, quæ iuxta summum templum in regio illo viridiario ad Rheni alluentis ripam, vasto illo propugnaculo cæu humetis Colossis elato, ex quo Rheni tractus utramque urbem alluentis & circumiacentis provincie præclarus & cuius promiscuus patet prospectus: vulgò die Phalz vocant, quasi Palatinam dicas. Item extra urbem passim præcipue etiam in amoenissimo illo sclopetariorum campo.

Tiguri quoque Helvetiorum, ut ipsi vidimus, Tiguri & in scripta retulit Gesnerus, magnæ proceræque collem Palatinum, quem vulgò Aulam (den Hof) nominant, quam plurima decerant, pulcherimo Tiliceto: & extra urbem passim in fossis circa mœnia, egregie spectantur, ut passim sub eis sediam in umbra non desint senibus & aliis animi gratia obambulantibus. Harum maxima truncum habet inferius ea crassitie, ut si viri duo mediocres amplexarentur, dodrantes quinque adhuc superfluit. Sed præterea specabiles sunt duæ illæ huius arboris domus, quæ infra urbem statim ad Liguriam visuntur, media inter eas domo, cui placæ utrinque iunguntur, in qua conveniunt, qui sclopetis exercentur, ita digestæ, ut mensis aliquot in utraque collocatis, maxime convivarii numerus, tanquam in cœnaculis & tricliniis capiat, infra, supra & circumquaque brachiis, & frondibus Tiliarum ambientibus, &c. Similes aut etiam elegantiores Scaphusæ Helvet. ad Rhenum visuntur. Insignis quoque visitur Moguntij in S. Albani cenobio 20. crassis columnis lapideis suffulta, quæ nihilominus quotannis excinditur, teste Lonicerus. Est & in Silesiæ cœmeteriis, artis hortis & sylvis notissima, ut notat Schuvenckf. quamquam Dod. scribat rarè in sylvis nasci. Cæli-colarius annotat Tiliam provenire in Baldo. Considerandum an sit ea amplissimo folio, quam postea describemus. Copiosè etiam provenit in Essexia Angliæ, in nemore, duobus milibus Cloestriæ, teste Turnero. In Italia provenit asperis tantum montibus, inquit Matth. quibus maximè gaudet.

Omnes quidem sic formandæ arbores, ne trunco cubitos quatuor excedant, ut quicquid ab ea altitudine superest, totum in tabulata si-

Culta

ve her.



ve brachia & ramos effundatur, sicut & de quercu Basiliensi supra dictum est, impietatis illo genere, à quo & Inpam herbam denominavit antiquitas, quoddam filij incendunt patrem, minores ramuli brachij, è quibus oriuntur, supereminant. Tilia utraque, quod in hortis Lutetia nunc spectatur, industria Bellonij fecit.

Paulò antè æquinoctium germinat Tilia: floret Maio & Iunio: fructum maturat Augusto, qui mox septembri adaperitus satiscit ac sua sponte decidit. Aestivis solstitiis folia sua vertit, ut prodidit Theoph. In multam ætatem vivit hæc arbor crediturque supra centesimum vivere, quales multæ videntur Basileæ, quarum fatum ne avi quidem nostri viderunt.

Theophr. Tiliam post vindemiam & Arcturum cædendam suadet.

## TILIA FOLIO MINORE.



**T**ILIA folio minore nobis dicta, non minus patula est arbor quam prædicta. Folia tamen multò sunt minora, ad Beculæ accedentia, colore ferè Populi Libycæ non hirsuta ut Tiliæ præcedentis, folio maiore dictæ, sed firmiora rigidioraque. Flores tamen similes, nisi minores essent, coloris eiusdem, pallidi odorati, formâ accedentes ad Berberim, umbellam ferè efficientes, sex septem, octo, novem, aut etiam undecim, ex luteo foliolo seu amanto prodeuntes, ut in alia Tilia, sapore acido cum lentore: quibus succedunt fructus parvi, hirsuti, angulosi, ut in alia. Materies similiter alba, lenis, sed cortice magis scabro obducta. Hanc facillè crediderimus prædictâ firmiorem & duriorẽ: tota enim arbor toxofior, Fert & hæc visum.

De hac sic Tragus: Tilia sylvestris sativæ per omnia respondet, nisi quoddam folia & flores gerit magis exigulos: præterea & frondem nigriorem. Florem edit tardius sativa Tilia, qui nullo post se relicto fructu aut semine decedit.

Theoph. in hunc ferè modum suam quoque Tiliam del neavit.

Visa nobis in VVirtenbergico montè, ubi nobilis & antiqua illa arx Teckiana Ill. Ducum VVirtemb. Tilia (de qua & in Bollenfium fonte Admirabili, fontiumque historia salubrium Universitatis) quæ fulmine tacta fuit noctu, mense Septembri, & sub ea novem vaccæ exanimatæ expeculio E.C. sub ea stabulant. Ista Tilia non erat eius speciei quam antea descripsimus folio maiore, sed ad hanc accedebat, quam vocamus folio minore: nihilominus tamen ei folia erant maiora, quamvis glabra, nec hirsuta: ipsa quoque arbor maxima, neque in hac specie glabra ista maiorem ob-

Tom. I.

servavimus. Dubij hæremus, an sit species quædam particularis, vel varietas tantum foliorum: quæ tamen si constans & perpetua, & ipsa speciem efficiet, quod nobis facillè persuaserimus.

Esti verò, ut dicebamus, Tragus hic prædictam atque descriptam, sylvestrem vocitet, & fructum non ferre dicat, quemadmodum & Gesn. qui & Tiliam sylvestrem & sterilem dicit, nobis tamen & Basileæ & Montbelgardi & alibi locorum fructifera observata.

Cur Schuvenckf. dicatur *quidam* *épyxne*, nescimus, id est Tilia montana minore folio: *Steins* *Tilia montana*, *Waldlinde* Tilia mas & saxatilis Matth. At nobis Tilia mas sive saxatilis Matth. videtur Vlmus, nobisque consentit C.Bauh. ut dicitur sub Vlmo. Marem Theoph. dicere vix quisquam rectè auserit, cùm eius folia non speciatim describat. In tabella ad latus prima exortus folia picta habes.

Gaudet hæc iidem cum præcedenti locis: Speciatim Basileæ inter cæteras visitur, sed rarius, quia ob foliorum parvitatem paulò minus patula. Exiit & pulchra Montbelgardi in fori angulo, supra quam quondam tugurium pulchrum & amplum, cum mensis erat exadificatum, comestantium refugium haud insolens. Nascitur & in tenebrosis ac latissimis VValgovia sylvis: Item Silesiæ tam sylvis quam montibus: atque in pluribus Ducatus VVirtemb. pagis.

Florentem observavimus in fine Iunij, quum aliud genus iam deflorasset. Tardius etiam fructum perficit.

## TILIA MAXIMO FOLIO.



**V**ix horæ spatium distat ab urbe Basileæ mons à pago vicino Mutetis vocitatus: proli Apollinæ quotannis aliquoties à Celebraustino Medico ac Botanico D. D. Calp. frequentè Bauhino, fratre & ad nostro ed stirpium varietatis causa, tanquam ab altero quodam Apolline, produci solitæ, novissimus. In eo, inter cætera haud passim obvia, provenit arbor quadam ad

Tiliam folio maiore accedens, cui folium speciosum, amplissimum, dodrante interdum latius, hirsutum, in appendicem angustum fastigiatum: quoddam hirsutum etiam apparet in dorso quod nervorum eminentia decorat. Sed præstat ipsius descriptionem adicere.

Tilia mas nova arbor, crasso caudice, ramosa, materia uti Tiliarum robusta, [cæterarum alioque materies mollis, etiam pncis & neotericis Herbariis testibus] cortice lanuginoso, subrufo: foliis magnis, quæ vix rotundantur, ut in femina fit, monente Theoph. l. 3. hist. c. 10. sed in acutum angulum desinunt, Mori sativæ foliis quoad formam simillima, eo excepto, quoddam profundè sunt serrata, ex virore nigricantia, prona verò parte

M 3

splendētia, Tiliæ fœminæ vulgaris, foliis triplo & quadruplo maiora: in qua hæcenus nec florem nec fructum videre licuit. Quam tamen ab annis septendecim nunc observavi, cum in monte nostro Muteto (quo studiosos singulis annis deducere solemus) ob plantarum copiam, verè Apollineo, plures sint arbores. Tiliæ fœmina non est, nec etiā Tilia sylv. Tragi, cui folia multò minora. Fortè Tilia mas Theoph. 3. hist. cap. 11. quam sterilem & nullo flore esse scribit.

*Thilia  
mas Theoph.  
Equivoca  
Tiliæ.*

*Barbus  
vulgaris.*

*Fagus  
sepium.*

*Vlmus.*

*Acer maior.*

*Phillyrea.*

*Eignum  
putidum.*

*Spina Bur-  
gi.*

*Ligustrum.*

*Philyrea.*

*Salix.*

*Valla er-  
ror.*

*Tiliæ vires  
& ulus.*

*Epilepsia.*

*Macula  
faciei.*

*Comitialis  
morbus.*

*Virus.*

*Calculus.*

*Tumores.*

*Vulnera.*

*Fuch.  
Matth.  
Dodon.  
Curij  
er-  
ror.*

*Lonicera  
latifolia.*

Cætèrūm Tiliæ æquivocationes non pauca. Dicitur sunt species tres, & fortè etiā adiungenda quarta illa Techsiana. Est & Tilia hulsifera Cordi itidem dicta. Da Choul autor, Sorbum torminalem dici à nonnullis Tiliam fœminam, de qua suo loco. Dicitur & Tilia de Fago sepium. Quidam & Vlmum pro Tilia exhibent, cuius & interiores tunicæ dicuntur Tiliæ. Item Aceris genus maius (de quo postea) à Corn. Tilia putatur, minus benè. Phillyrea Diosc. à multis confunditur cum Philyra Theoph. De illa lib. 5. Cæsalp. Lignum putidum existimat esse Philyram marem, quam opinionem refutavimus l. 5. c. de Spina Burgi. Quidam sibi persuadent Ligustrum esse Tiliam & Phillyream Diosc. non distinguentes Philyram à Phillyrea: de quæ supra plus satis. De Ligustro actum lib. 5. Quidam Phileam Theoph. confundunt cum Tilia, Philyra & Phillyrea. Et Hermol. redarguit meritò Vallam, quod Itcam, quæ salix est, interpretatus sit Tiliam.

Tiliam calidissimam esse supra ex Theoph. dictum: addita ratione cur ita sentiat, nempe quod tincturam ferri secantis emolliat. Ast nobis sanè atque expertis aliter videtur. Nam & Cerdones qui tabulas ex ea expetunt oppositum experientur, in coriis incidendis: nam ob molliem suam cedit ferro, idè non retundit, quia non secatur. Nec ea qualitas cultri aciem corrumpens hæcenus à nostris observata. Sed apertioribus rationibus, nescimus an item experimentis, ripatus incedit Fuchf. Cùm sic inest: Calidam esse Tiliam, vel ex eo liquet, quod frigidis cerebri malis, Epilepsiz, & id genus aliis misce conferat. Amaritudo etiā cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus prævalere videtur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatem, cum modica adstrictoria, peninde atque Vlmus (cuius facultates illi Plin. tribuit) habere evidentissimum est. Si quispiam vires quæ à recentioribus Tiliæ tribuuntur, probè expendat, nihil ab illis quæ ex Plin. & Gal. sententia de Vlmo dicuntur differre compertiet. Nam maculas faciei abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lavetur. Mederi etiā morbo Comitiali bibitum eius liquorem stillaticium, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere. Quid multa? omnes facultates Vlmi obtinet Tilia, idè quæ vulneribus etiā recentibus succurrit, & alia quæ à Diosc. & Galeno in Vlmi historia commemorantur, potest. Hæc Fuchf. Nobis consideratione & inquisitione dignum videtur, annon scribat Tiliam amaram ex imaginatione. Is alioqui, eumque sequuti Matth. Dod. & Curtius Vlmi vires tribuunt Tiliæ, decepti verbis Plin. qui, uti dicebamus, interiorē corticem Tiliæ vocat. Fuchf. præterea & Dod. non observant Plinium tribuere Tiliæ, quod attribuit Phillyræ, longè diversæ plantæ, ut rectè etiā monuere Cornar. & Matth. Lonicerus verò, licet agnovit Phillyream diversam à Philyra: nihilominus tamen vires Phillyræ obliuiose tribuit Tiliæ. Quas vires Plin. Tiliæ

tribuit, omittimus, ob dictam inodo causam. Plin. 27. Comperunt enim Phillyræ, non Tiliæ, quæ Phillyræ.

Cortex & folia Tiliæ, inquit Dod. calore temperata sunt, nonnihil astringentia & adstringentia, temperamento penè similia Vlmo. Tiliæ cortex commansus, ac inde illitus, vulneribus recentibus agglutinandis efficax est. Folia verò trita & aqua conspersa, pedum tumores discutunt. Humor è medulla castratæ arboris defluens, capiti illitus, capillos reddit, defluens quæ continet, teste Matth.

Baccæ seu fructus Tiliæ tempore oportuno collectæ, & in pulverem redactæ, in Dysenteria, aliisq. alvi profluvii summopere laudantur, nam & ea ratione in expeditione quadam multos milites conservatos Camer. prodidit. Eadem cum aceto trita, in nares datæ potèster Hæmorrhagiam sistunt. Baccæ aliquot (imparem numerum superstitionis præcipiunt, quod nec Camer. magni facit, nec ab ullo docto & sapienter probatur) deglutitæ, validè sanguinis è naribus profluvium compefcunt, ut in primaria quadam persona experientia comprobatur. Ex recentibus Tiliæ foliis expressus succus, cum vino mistus & calidus artubus infusus, spasmo statulento benè facit. Quidam eadem trita & aqua conspersa, atque emplastri modo imposita, singulare contra eundem spasum in gravidis remedium iactant.

Tiliarum è floribus (quorum perquam suavis odor, & cum vitium floris odore similis suavitas) aqua destillatur in frequenti usu tam apud Germanas quàm Gallas mulierculas. Existimatur autem à doctis modicè calida, sicca & emplastica. Potè utilis ad Epilepsiam, cordis tremorem, uteri dolores, calculum renum & sanguinem in corpore, ob casum aut ictum aliquid, concretum, ad quod remedium aliqui etiam tritos Tiliæ carbonēs admiscunt. Dosis est unica uncia aut sesqui. Oculorum dolores mitigat, & locos igne aut quavis materia ferente adustos sanat, idque efficacius, si interior cortex albus Tiliæ in hac aqua maceratur, aut eius loco Cydonij grana, aut Phyllium, & nata inde mucilage loci illinantur. Aliqui liquore vi ignis extracto ex sanguine Melis seu Taxi adversus pestem utuntur, tradente Evonymo. Quidam inquit Tragus, aquam Tiliæ florum destillatam, adversus ventris tormina exhibent, & non sine ratione: nam intestinis à Dysenteria erosio illa convenit. Alij adversus morbum Comitalem usurpant. Tilia usta, aceto carbonibus restinctis, cum oculis cancerorum tritis sumpta, concretos sanguinis grauios exigit, his qui ex alto delapsi fuere, ita ut sanguinem excreent. Tunicæ seu libri medij, qui costici & ligno intercedit, aqua macerati, lentus viscosusque humor ambutis singulari remedio prodest, quod experientia multos docuit. Scimus etiā aqua florum Tiliarum plerasque mulierculas uti ad faciei fucum. Ex carbonibus Tiliæ, qui pulverem bombardarum parando abhibentur, prælentissima mors multis creatur, ita ut Tilia & salubria præbere & necom afferre possit. Sûntque qui existimant Tiliæ carbonēs pulverem pyrium veneni suspicione liberare, argumento, quod in dem lapsis ex alto, ex liquore aliquo utiliter propinari soleant. Cætèrūm mirari subit, cur Theophrast. Tiliæ seu Phillyræ fructum à nullo, mandi posse scribat, [i. e. quæ quædam] (17)



*Dei Sparros*, inquit: Jædum alibi tradat folia Tiliæ dulcia esse, & à multis animalibus comedi: Vltimum enim hoc verum. Nam & Basilæ pauperculam plebem folia pro vaccis & capris adventante hyeme recondere solere scimus. Fructum quidem negligit, & ipsa quoque respuunt animalia: & eundem Tragus ab omnibus animalibus tutum esse scribit. Gustavimus tamen non semel, & dulcem competeris, atque innoxium. Quare illud, *Dei Sparros*, non ita intelligimus, ac si omnimodi mandi nequeat, sed quòd nulli animalium cibo ac nutrimento idoneus sit. Folia etiam non solum sua natura dulcia, (qui tamen dulcor exiguis & viscidis) ac propemodum insipida nobis visa sed & per accidens, ex roris cœlestis incubitu, à quo multa ita oblinuntur, & glutinosa evadunt ac si melle madefacta fuissent: ut iam olim pueri didicimus.

Porro num Tilix flores apibus competant, nondum apertum videtur. Columella sanè Tilix & Taxi, ex omnibus, flores apibus nocere dicit, repudiandosque esse. Ego, quod ad me attingit, inhiit etiam Tragus, crediderim flores Tilix apibus, licet maximè ab illis expectatùr, minime conducere. Sed quare non conducant, aut conducere possint, nullam adfert rationem : & horum neuter offendit, in qua re nocent. Virgilius sanè commendate videtur pro apibus. Cato.

*Ergo apibus satis idem: atque examine multo  
Primus abundare, & spumantia cogere pressis*

Mella favis: illi Tilia, arque uberrima Pinus: &c.

Pinus sanè apud autores pro apibus commenda-  
tissima. De Tilia diligentius inquirendum.

ictis sa-  
 cripta-  
 bis ex  
 ce 11.
 

 Nobilissimus & corticis usus, in quo olim scrip-  
 titatum, sed recenti opus, in quo ad duces scri-  
 batur explorator, monente Plinio. Modus exposi-  
 tus in Vlmō. Et Gal. 6. Epid. scribit, quosdam  
 valde antiqua Hippocratis exemplaria, ante tre-  
 centos annos exarata, habuisse, *alia ex quo ipsae, alia,*  
*quaha apud se [sua etate] in Pergamo.* Languius  
 quoque in epist. librorum meminit in dedicationi-  
 bus ex Tilia corticibus conscriptorum. Sed hic  
 usus iam dudum inolevit, suppetente pergamen-  
 to & charta facitior ad eam rem longe aptissima.  
 Crassiores Tiliz cortices vidimus Nurtungæ pedali  
 latitudine, longitudine competente in circulo  
 plexos, quos tinis imponebant in circulo  
 lineæ lixivio perfundebantur, ut eo corticoflo  
 supereminente cineres cum lixivio superemi-  
 nentes continerentur Plin. lib. 16. c. 9. ex Tiliz  
 cortice vasa, corbæque, ac patentiora quædam,  
 messibus, vindemiisque convehendis, atque  
 pretexta tuguriorum fieri scribit.

Sed materiei utilitas non postrema. Theoph. in opere facillimam dicit, [Τὸ αὐτὸ θεωρεῖν] ob suam molliem. Foris navium longum & arcum. menfurarumque fabricæ expetendum. Habere & corticem ad cistas (seu cunas ut Gaza vertit) faciendas idoneum. Exiis namque fabricari solere. Verba sunt: ἔχει δὲ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἀποκομιδῆς, καὶ οὗτοι καὶ κίνας. ποῖον γὰρ αὐτῆς. ἔχοντες αὐτὴν ut exemplaria habent. Nam antea, ἔξ ἐκ τῶν κίνας ποῖον dicebat. Sed hic etiam alterum membrum deesse, non male suspicatur Corn. ante πρότερον τὰ κίνας. Gaza vertit: Habet etiam corticem funibus cunisque percommo'dum: ubi, funibus de suo addit, quod in eius sit ficut fide, nisi ita in quodam exemplari versto legitur. Materiei Tiliæ usum non satis laudare hodie possunt sculptores simulachrorum, ex ea quippe omnia pene simulachra parantur. Levis est, ac levis sit magis æte, tenax, facillè se-gatur. Diu durat. Ab his aliquando scificantiibus

nobis, dum ex Tiliæ ligno imaginem Christi sal-  
vatoris exfulperent, cur non uterentur Acere, re-  
sponderunt, cariei obnoxium esse, Tiliæ nequa-  
quam. Atque in primis etiam ex Tiliâ Lapidarij  
sculptores suas Ideas ( *Differenz*. vocant ) pa-  
rant. Ex eodem ligno optimi sunt carbonēs pro  
delineationibus pictoribus expetiti.

Et ut nihili, quantum in nobis erit, utilitatis Tiliæ omittatur, & illud memoratu dignum : Cinesiam Poëtam Græcum flagitiosissimum, tam gracilem fuisse, ut perhibetur, ut Tiliacis asseribis corpori circumdatis imbecillitatem sibi fulciret, ut Phileas alter poëta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne vento subverti posset. Cinesiam vero Anstoph. ob illam causam Philyreum vocabat. Vñs etiam his Antoninus pius, ut testatur Capitulinus. Quum ( inquit ) & longum esset, incurvareturque, tiliacis tabulis in pectore fasciabat.

Solent & Germani, ramos Tilia ordine quodam in amplitudinem distribuere, ac palis suffulcire, ut sub umbra eius, quæ omnium arborum maxime innoxia putatur, ætatis tempore, patulaque ramorum opacitate recubantes, sese recreare commellationisque instituere queant. Hinc fortè tritus ille versus.

*Filia sub Tiliâ ducit subtilia fila.*

Viscum Tiliaceum quidam caduco morbo obnoxiiis salutarem prædicant.

Carbonis  
pictorum.

Cinesia  
Poeta ful-  
crum Tiliæ.  
554.

Cinesia  
Philyreus.

Attestation  
p. 146.

*Recubantibus patula  
turgescit.*

*Pisces usque  
Morbus  
Caducos.*

V L M V S.

## CAP. II.



PLURIMIS  
ramis brachi-  
ata Vlmus arbor  
procera, inter-  
dum infra iu-  
stam altitudinem  
subsistens, cortice  
cinereo, nunc la-  
vi, nunc profun-  
dissimis sulcis, emi-  
nentissimisque por-  
cis secundum rami  
longitudinem  
exarato, interio-  
ri albo flexibili:  
materie item al-  
ba, firma. Ante  
omnia flores pro-  
mit, ex ramulo-  
rum extremo-  
rum tuberculis, in  
nucarium con-

Description:

Correspondence:

*Materiae*  
*Floris*

Triculi fo  
lucer

## Summary

Folia





illis tradentem audire. Sic autem ait.

Inter has atque frugiferas, materie Vitiumq; amicitia, accipitur Vlmus. Græci duo eius genera novere: Montosam, quæ sit amplior: Campestem, quæ fruticosa, [ramis plurimis opaca, sed exiguis & brevibus.] Italia Atinias vocat excellissimas, & in iis Siccanas præfert, quæ non sint riguz. Alterum genus Gallicas. Tertium noltrates, densiore folio, & ab eodem pediculo [susculo Vet.] numerosiore. Quartum silvestre. Atiniaz non ferunt Samaram: [Colum. ferunt quidem, sed rariorem.] ita vocatur Vlmi semen: omnisque radicum plantis [radicibus plantarum. D.] proveniunt, reliquæ femine. Idem & alibi Maritz Vlmi meminit: & Vlmo in genere ramulosa folia tribuit. Marita autem Vlmus est, cum qua Vitis maritatur, ut specialius dicitur in satù & cultu.

Cæsalp. prædictas differentias ex Plinio citans, quatuor in Italia ab eo numerari scribit: sed pro Atinias, legit Albineas. Et ut ne quis putet esse typographicum errorem, sciat, eius vocis nullam extare correctionem inter errata in fine posita, cum tamen minoris momenti eiusdem paginae exaggeret, unius tantum literæ mutata, Samoræ, pro Samaræ. Quæ autem Amentum ferat, & Vvas, nondum vidimus, [addit Cæsalp.] ut suspicari liceat, ne Plin. cum Vlmi genere genere comprehendat Carpinum Vtramque, aut Alnum, Tiliamque appellatam, quasi pteleam. Plin. tamen etiam alibi Atiniaz meminit, eamque propter nimiam frondem, Vitibus ineptam dicit.

Plinium taxat Solerius, quod Vlmum malè dividat in quatuor species, aliter atque Theoph. atq; Colum. Gallicam Vlmum & Atiniam esse Montanam Theoph. Vernaculam, Italicam, Nostratam, & Campestem, & Theoph. Pteleam seu Vlmum simpliciter esse unum & idem. Cui sanè non gravatè suscribimus, præsertim Columellæ, diligentissimi Geoponici verba considerantes, qui ita habet. Vlmi duo genera, Gallicum & Vernaculum. Illud Atiniaz, hæc nostras dicitur. Atiniam Vlmum Tremellius Scrofe non ferre fametam [quod est semen eius arboris] falsò est opinatus: nam rariorem sine dubio creat, & iccirco plerisque & sterilis videtur, seminibus inter frondem, quam prima germinatione edit, latentibus. Itaque nemo iam ferit ex famera, sed ex sobolibus. Est autem Vlmus longè lætior & procerior, quam nostras, frondemque incundiorẽ babus præbet. Virgil.

Præterea genus haud unum, nec fortibus Vlmi. Cordus scribit: quid discriminis sit inter Vlmum montanam, & Pteleam seu Vlmum simpliciter, fabris lignariis notum esse, & à se quoque ex historia arborum differentias indicatas. Sed memorià lapsus hoc dicit. Nam l. 3. c. 1. suarum hist. describit Vlmum unicam, nullam differentiam demonstrans. In Corn. in Diosc. Vlmum folia Tiliæ & Corylo non dissimilia habere scribit: quod de maxima & latifolia superius descripta intelligendum putamus: Nam vulgata parum similitudinis cum iis habere videtur.

Tragus Vlmum proceram nullo fractu præstantem dicit: Campestem fructum ferre, quod in eius fide situm sit. Plin. Atiniam, semen nullum proferre prodidit: attamen Columellam contrarium scribentem produximus.

Matthioli falsò ait Theophrastum dicere, Vlmum sterilem esse, quamvis multa in eam rem ex Plin. quiritetur. Idem in Comm. cum magnis fig. Lat. & Ital. proponit Vlmi iconem, sine ulla descriptione, titulo Tiliæ maris: Et in Hist. Germ. Steinlinden / Tiliæ saxatilis: ait ferre folia Vlmi [sanè verò: nam ipsamet Vlmus est.] aut Carpin: quosdam vocare nigram Carpinum. Profectò quivis vel vulgariter in stirpibus versatus agnoscat ibi pictam Vlmum, quod nescivit tantus commentator, ut aperte constet ex eius descriptione, quam in sua Epitome dat, his verbis: Tilia mas: Græcis οὐδὲν ἄλλο: ἔστι. Tilia maschio & Carpinio: Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaque, ac etiam sterilis: folia fert lata, oblonga tamen, in quibus ferè omnibus numerosè extuberant bullæ, in quibus mæscæ gignuntur, quæ tamen arescentibus receptaculis, inde gregatim evolvant. Quis hic non videat Vlmum à Matth. descriptum? Rectè igitur à C. Bauh. nobiscum sentiente annotatum. Tilia mas quæ proponitur à Matth. Lob. Lugd. & Tab. Carpinus nigra dicitur Castori, & nobis Vlmus, aut certè eius aliqua species esse videtur.

Lepidè Pena & Lob. Vlmum pro Tiliæ mare proponentes, à femina non perinde totam atque folio differre scribunt, tamen exiguum sit discrimen: folia tamen Vlmi scabra rugosaque esse: hosculos, [suam Tiliam marem] notè baceas uti femina, proferre, sed semen & flores in folliculis Carpinii modo. Mox subiungunt: Vlmus multò vulgarissima, notatque facilissima est: folio non adè illi dissimili, [certè non, quia idem] aut Alni. Folliculis vernitè volucellorum & fuliginis repletis, Habent & Vlmò alteram latifoliam. Sed mirum industrios alioqui Verbarios in Tilia sua mare non eosdem folliculos observasse, in Vlmo, quæ eadem cum illa observasse: inter se non distinxisse, ex una planta duas fecisse, denique neque Tiliam suam marem neque Vlmum rectè inexistisse probè. Tio Tiliæ maris: partium delineatio ac designatio quomodo quadrat? Neque nobis exiguum, ut illi putant, discrimen esse videtur, inter folia Tiliæ & Vlmi. Figura à Lob. posita pro Tilia mare in obs. Teut. & icon. satis demonstrat, eam ex Vlmo facere Tiliam: id satis indicant etiam cortex sulcatus & rugosus, ac folliculi in foliis: similitudo item non parva cum Vlmi icone Dodonæi. Camer. ad hist. Matth. præter Vlmi iconem, quam cap. 38. habet, posuit & aliam cap. 46. nempe Matthioli, sub titulo Tiliæ saxatilis, annotans, Matthiolum in Lat. exemplari facere Tiliam marem, quamvis Dod. Vlmò similiorem dicat. Ipse verò in re tam aperta, quod sentiat, non docet: fortè nec scivit.

Matth. in prioribus Com. iconem Vlmi satis bonam habebat, nisi quod folliculis nimium artificium ad rotunditatem affictum videbatur, quos in post. edit. Ital. mutavit. Pro Tilia mare, uti dictum, figuram Vlmi proposuit, iudem cum folliculis. Hist. Lugd. secuta Matth. more suo easdem duas icones proponit.

Dod. præter Vlmum, quam Theoph. simpliciter vocat, & aliam tradit, de qua agemus postea sub titulo Fagi sepium sive Ostyæ.

Esti verò Rhythus in Corn. in Diosc. scribat, Rhythus 160

Matth. rati  
proh.

Tilia mas  
Tilia saxat.  
Carpinus nigra.

Matth. non  
agnoscat Vlmum.

Error. Lob.  
Lugd. &  
Tab.

Pena. &  
Lob. multa.  
Pena lapsus.

Camer. sic.

Dod. not.

Rhythus 160  
Krit.

Vlmum esse folio individuo, nihilominus tamen iconem habet arboris cum folio in partes & lacinias diviso, quæ fortè ad Aceris aliquod genus facta.

Lonic. pr.

Lonic. duas tradit Vlmus, totidemque figuras: prior ei dicitur *Küßholz*: posterior *Vlmensbaum*, cuius icon eadem cum modo dicta *Ryffij*: quam ait in magna altitudinem excrecere instar *Küßbaum*: ei autem esse folia fissa siye angulosa. Non dubitamus bonum hunc Herbarium, si Diis placet, suam descriptionem ad iconem, non ad ipsam plantam, effinxisse.

Tabern. negrit.

Tabernamontani farrago, tres, immò quatuor habet Vlni figuras. Prima quæ folliculos habet, titulo *Küßbaum* / Vlmus 1. Altera, *Essenbaum* / Vlmus 2. Tertia *Yffenbaum* / Vlmus 3. Et alio loco Vlmum pingit cum folliculo pro *Tilia* mare & *Steinlinden*, id est, *Tilia* saxatili: Sed nulla istarum figurarum exprimit semina: neque docet in quo differant tres eius Vlni, quasi cum pueris ipsi res fuisset, qui picturis & figmentis delectantur. Icon Tragi & flores & Samaram ostendit, sed in una arbore iuncta. Nostra melius & flores & foliaceos utriculos cum semine: & folliculos in foliis, sed ramis distinctis. Palmam dactylifera pro Vlmo nobis ostentat Petr. Crescentius.

Synonyma longuar.

Porro & apud Diosc. Vlmus *πτελιά* est, qui & folliculorum, & humoris in iis exiccatione in *πτελιά xavotvov*, hoc est, animalcula culicibus similia, abeuntis meminit, & corticem fluxilem dicit internum, externum crassum.

Thidehar. Hebr.

*πτελιά* & ceteri Græci meminere, pro eadem arbore. Hebræis *Thidehar*, Esaiæ 41. Sed apud Arabes variis nominibus insignitur, secundum

Arbor C. micum. Didar.

Arbor C. micum. Apud Serap. dicitur *Arbor Cimicum*, sicut & apud Avic. Can. 2. l. 2. c. 73. Vbi interpret Vlmum exponit. Item c. 216. *Didar*, id est, *Arbor Cimicum*, ex qua egrediuntur capita inflata, in quibus humiditas, ex qua fiunt *Cimices*. [Culices alij.] Vt mirum nobis videatur cur Avic. duobus distinctis locis scribat de eadem arbore. Sed hoc ei non insolens. Apud Bellon. legimus, *Albadid* est *Aldidar*, quæ

Aldar. Dardar seu Luzach.

*Arbor Cimicum*. Item: *Duaden Alderdar*, id est fructus seu flos: *Alderar*, quod est *Arbor Cimicum* ut patet 2. Can. Sed Scal. apud Serap. *Arborem Culicum* legi vult, non *Cimicum*, sic itaque & apud ceteros Arabes legendum fuerit. Matth. notat Arab. *Didar*, *Dardar* seu *Luzach* dici. Germ. *Vlm* / *Küßbaum* / *Küßholz* / *Lindbass* / *Yffenholz* / *Vlmerbaum* / *Rößtern* / *Rußtern* / *Essenbaum* / pro diversis provinciis. Sed speciatim Montanam *Wildrußbaum* / & *Bergrußtern* / hoc est, *Syvestrem* & montanam Vlmum vocitant. Belg. *Vlm* / *Vlmensboom* / *Peperboom*. Gal. Orme. It. *Olmo*. Hisp. *Castil. Olmo*. Catal. *Olma*. Portug. *Vlmo*. Angl. *Elmtree*. Boh. *Gilim*. Hung. *Zilfa*. Theoph. Vlni folliculos *xavotvov* vocat, & alibi *πτελιά* [noctua]. Gal. *δυνδαν* Lat. verd folliculum, utriculum, capsulam, Vlni nuncupant.

Follicul. Cypariss. Tylactum

Semen Vlni Samara, quibusdam Samera, ac etiam Amara, vt ex suo Columel. habet Hermol. vocatur.

Epheta.

Cæterum tam Virgil. quam reliqui poetæ Vlmum variis epithetis celebrarunt: *Aerea frondosa*, *alta*, *proceraspectiosa*, *ferris*, *opaca*, *densa*, *patula*, *ramulosa*, *umbrosa*, *virens*, *molli*, *dura*, *frondans*, *miniosa*, *exesa*, *amita* vitibus, *hospita* vitibus, *pampinosa*, *villicoma*, *textilis* *salerna*. Cur au-

tem à vitibus tantopere commendata, diceret in cultura.

Nec potuit quin & Vlmo suam superstitionem proderet antiquitas. Sic enim legitur apud Plin. Est in exemplis, & sine tempestate, ullæ causa alia, quàm pîodigij, cecidisse multas, ac sua sponte surrexisse. Factum hoc populi Rom. Quiritibus ostentum Cimbricis bellis Nuceræ in lûco Iunonis, Vlmo postquam etiam cacumen amputatum [amputamentatum en.] erat, quoniam in ipsam aram procumbebat, restituta spontè ita, ut protinus floret: a quo deinde tempore maiestas populi Rom. surrexit, quæ ante vastata cladiibus fuerat. Sed hoc parum, nisi & Vlmum aliquando loquutam atque apud Gymnosophistas cum hominibus fabulari credidisset eadem.

Prodigiosa Vlmus. Causa sponte restituta.

Vlmus loquens.

In Cherroneſo atque in loco editissimo Proteſilai tumulus fuit: [Græcorum sunt hæc figmenta] in cuius gratiam Nymphæ Vlmos plantarunt, ea quidem lege, ut si aliqui tumulum spectarent & contemplerentur, illarum unius partis rami protinus florent, & statim foliorum profluvium paterentur, altera parte vireſcente, ut Proteſilai immaturum casum indicarent. Cùm enim Græcorum primus in Troianum litus deſiliſſet, à viro Dardanio interfectus eſt, ut in 2. liad. deſcribit Homerus. Habes Vlmæas virgas apud Plaut. in Afin. & Epid. 13. Quem Apelles Zeuxiſque duo pingent pigmentis Vlmæis: virga utique nemini ingrauior, quàm Vlmæitibz, hoc est, ei, qui virgæ Vlmæis cæditur.

De summo Proteſilai Vlmis. Causa sponte restituta.

Theoph. autor, Vlmum lucos, aquasque desiderare. In sylvis Germaniæ haud infrequens, etiam inter Quercetâ, aut ad marginem: Vnde Loc. fortè illud Virgilij,

Vlmæa 80.

— Glândemque ſues frigere ſub Vlmis.

Tam montanam quàm campestrem Anguil. in Italia notam dicit. Provenit, inquit Matth. in sylvis & montibus, saxosis locis. Nascitur & pinguibus lutosisque campis. Ptelion vrbs Theſſaliæ nomen habuit ab Vlmorum frequentia. Plana, Campeſtris: montosa, Montana dicta amat: Facilis apud aquas incrementi. Circa Baſileam, non paucis locis obvia, præſertim in ſylvis, earumque marginibus. Colimus & in horto E.C. Vbi quottannus floret Martio & ſamaram fert. Obſervare licet & aliis multis Burgundiæ & Galliæ locis. Genevæ propè aream *la Treille* dictam etiam Maio florentem conſpeximus, Germinat inter primas: mox Sole in Arietem tranſeunte florere conſuevit: ſemen Maio matureſcit: Quo menſe & folliculi erumpunt. Auctu facilis eſt. Folioa mox poſt ſolſtitiũ æſtium convertit: quo argumento ruſtici ſolſtitiũ tranſactum ſciunt.

Temp. Foliorum confectio. Vt Vlmus. Causa sponte restituta.

Docet Columella quomodo Vlmariæ ſint faciendæ. Nam & ad vites ſuſtinendas deſiderantur Vlni, & ad pecudum cibaria: nam capræ & oves libentiſſimè hanc frondem appetunt: itémque boves: ſed magis Attinæ. Itaque agrum genere uno Attinæ Vlni conferendum probat: ſi minus fieri poterit, dabitur opera, ut in ordinibus diſponendis pari numero vernaculæ & Attinæ alterentur. Ita ſemper miſtis frondibus erit utendum, ut quaſi hoc condimento illece præcudes fortiùs iuſta cibatorum conſciant. Vlmus quidem longè lætior eſt & procerior, quàm noſtras, frondemque iucundiorẽ bubus præbet, qua tamen cùm aſſiduè pecus alueris, & poſtea generis alterius frondem dare inſtueris, ſatidum



studium bobus afferet. Sic itaque seminarium Vlni facies. Sameram, quæ iam rubicundi coloris sit, & compluribus in solata diebus iacuerit, ut aliquem tamen succum & lentorem habeat, iniicies arcis pinguibus, & modicè humido bipalio paltinatis, occatis, ac resolutis veris initio, & eas totas seminibus spissè conteges: mox cribro putrem terram duos altè digitos incernes, & modicè rigabis, stramentisque areas cooperies, ne prodeuntia cacumina seminum ab avibus prærodantur. Vbi deinde præceperint plantæ, stramenta colliges, & manibus herbas carpes: idque leniter & curiosè faciendum, ne adhuc teneræ brevèsque radiculæ Vlnorum convellantur, atque ipsas quidem areas ita angustè compositas habebis, ut qui runcantur sunt, medias partes earum faciliè manu contingant: nam si lætiores fuerint ipsis seminibus, quæ proculcata erunt, noxam capient. Astate deinde prius quàm sol oriatur, aut ad vespæram, seminaria conspergi potius, quàm rigari debent, & cum ternum pedum plantæ fuerint, in aliud seminarium transferri.

Ac ne radices altius agant, (quæ res postmodum in eximendo magnum laborem affert, cum plantas in aliud seminarium transferre volumus) oportebit non maximos scrobiculos selsquipedè inter se distantes fodere. Deinde radices, in nodum, si breves: vel in orbem coronæ similem, si longiores erunt, inflecti, & oblitæ simo bubulo scrobiculis deponi, ac diligenter circunculcati. Possunt etiam collectæ cum stirpibus plantæ eadem ratione disponi: Quod in Attinia Vlmò fieri necesse est, quæ non fertur è samera. Sed hæc Vlmus autumnii tempore meliùs, quàm vere disponitur, paulatimque ramuli eius manu detorquentur, quoniam primo biennio, ferri reformidat ictum. Tertio demùm anno acuta falce abraditur. Atque ubi translationi iam idonea est, ex eo tempore autumnii, quo terra imbrisus petmaduerit, usque in verum tempus, antè, quàm radix Vlni in eximendo delibretur, rectè feritur. Igitur in resoluta terra ternum pedum quoquo-versus faciendi scrobes: at in densa, sulci eiusdem altitudinis, qui arbores recipiant, præparandi.

Sed deinde in solo rosèdo & nebuloso conferendæ sunt Vlni, ut earum rami ad Orientem, & in Occidentem dirigantur, quò plüs solis mediæ arbores, quibus vitis applicata & reliquata innitur, accipiant. Quod si etiam frumentis consulimus, ubi solo intra quadraginta pedes, exili ubi nihil, feritur intra viginu, arbores disponantur.

Cum deinde adolefcere incipient, falce formandæ, & tabulata instituenda sunt: Hoc enim nom ine usurpant agricolæ ramos truncosque prominentes, eosque vel propius ferro compescunt, vel longius promittunt, ut vitæ laxius diffundantur. Hoc in solo pingui, meliùs illud in gacili. Tabulata inter se ne minüs tenuis pedibus absint, atque ita formentur, ne superior ramus in eadem linea sit, quæ inferior: nam demissum ex eo palmitem germinantem inferior atteret, & fructum decutiet. Sed quancunque arborem fueris, eam biennio proximo putare non oportet.

Post deinde si Vlmus exiguum incrementum recipit, verno tempore antè quàm librum demittat, decacuminanda est iuxta ramulum, qui videbitur esse niidissimus, ita tamen uti supra eum trunco stirpem dodrantalem relinquant, ad quam ductus & applicatus ramus alligetur, & correptus cacumen arbori præbeat. Deinde

stirpem post annum præcidi, & allevari oportet. Quod si nullum ramulum arbor idoneum habuerit, sat erit novem pedes à terra relinqui, & superiorem partem detruncari, ut novæ vigæ, quas emisit, ab iniuna pecoris tutæ sint. Sed si fieri poterit, uno ictu arborem præcidi, sin minis, terra desecari, & plagam falce allevari oportebit, eamque plagam luto paleato contegi, ne sole, aut pluvius infestetur. Post annum, aut biennium, cum enati ramuli rectè convolverint, supervacuus deputari, & idoneos in ordinem submitti conveniet. Quæ Vlmus à positione benè proveniet, eius summæ vigæ falce debent enodari. At si robusti ramuli erunt, ita ferro amputentur, ut exiguum stirpem prominentem trunco relinquant. Cum deinde arbor convolverit, quicquid falce contingi poterit, exputandum est, illevandumque eatenus, ne plaga corpori matris applicetur. Vlmum autem novellam sic formare conveniet: loco pingui octo pedes à terra sine ramo relinquendi, vel in arvo gracili septem pedes: supra quod spatium deinde per circuitum in tres partes arbor dividenda est, ac tribus lateribus singuli ramuli submittendi, primo tabulato assignetur. Mox de tenuis pedibus superpositis, alij rami submittendi sunt, ita ne iisdem lineis, quibus in superiore positio sint, in eademque ratione usque in cacumen ordinanda erit arbor: atque in fiondatione cavendum, ne aut prolixiores pollices fiant, qui ex amputatis vitigis relinquuntur, aut rursus ita alleventur, ne ipse truncus lædatur, aut delibretur. Nam parum gaudet Vlmus, quæ in corpus nudatur, vitandumque ne de duabus plagis una fiat, cum talem cicatricem non facile cortex comprehendat.

Arboris autem perpetua cultura est, non solum antè diligenter eam disponere, sed etiam truncum circumfodere, & quicquid frondis enatum fuerit, alternis annis aut ferro amputare, aut adstringere, ne æmula umbra Viti noceat. Cum deinde arbor vetustatem fuerit adepta, propter tantum vulnerabitur ita, ut excavetur usque in medullam, quæ sit exitus humori, quem ex superiore parte conceperit. Vitem quoque antequam ex toto arbor prævaleat, conferere convenit. At si teneram Vlmum maritaveris, novam sufferet: si vetustam vitem applicueris, coniugem necabit. Ita sibi pares esse ætate, & vitibus arbores vitæque conveniet.

Sed arboris maritandæ causâ scrobs vivitadici fieri debet, latus pedum duorum, altus levi terra totidem pedum, gravi, dupondio & dodrante longus pedum sex, aut minimu quinque. Absit autem hic ab arbore ne minüs selsquipedali spatio. Nam si radicibus Vlni iunxeris, malè vitis comprehendet, & cum tenuerit, incremento arboris opprimetur. Hunc scrobem, si res permittit, autumnio facito, ut pluvius & gelicidiis maceretur. Circa vernum deinde æquinoctium binæ Vites, quò celerius Vlmum vestiant, pedem inter se distantes deponendæ, cavendumque ne aut Septentrionalibus ventis, aut rorulentæ, sed sicce serantur. Hanc observationem non solum in Vitium positione, sed & in Vlmorum, cæterarumque arborum præcipit Columella. Et uti cum de seminario eximuntur, rubrica notetur una pars, quæ admo-neat, ne aliter arbores constituamus, quàm quemad. in seminario steterint. Plurimum enim refert, ut eam partem celi spectent, cui ab te-

Ve ad T. &  
sustentari  
nem aptan  
da Vlmum

Quando Via  
ru adferen-  
da.

Quomodo  
adferenda.

nero conſueverunt. Melius autem locis apri-  
cis, ubi cœli ſtatu neque prægelidus, neque  
nimium pluvius eſt. Autumni tempore arbores:  
At Vites poſt æquinoctium deponuntur: ſed  
ea ita conſervanda ſunt, ut ſummam terram, quæ  
aratro ſubacta ſit, ſemper pedem altè ſubternamus,  
radicèſque omnes explicemus, & depositas ſter-  
coremus: ut exſitum Colum: qui Vlmariæ  
faciendæ rationem hanc ſatis curioſè conſcripſit.  
Neque tamen omnia hæſtenus ex eo prolata:  
nam reliqua ad Vitium cultum reſervanda. Ut  
videas Vlmī operoſam hanc agriculturam non  
propter ſe, ſed propter Vites, quas ſuſtineant  
& hoſpitentur, inſtitutam. Nam ad pecudum  
pabulum non opus iſta Geoponica ſatagentia.  
Sat fuerit, ſi ſat ramoſa atque frondofa naſca-  
tur, uberi frondis meſſe magis profutura. Po-  
teſt etiam Vlmus ſic diſponi, ut adhuc tenera  
decacuminetur, ſic altitudinem quindecim pe-  
dum excedat: ſic Vitium hoſpitiū aptiſſima futura.

Ex ſemine ſata germinat quidem facilè, ut  
Theophr. monet, & nos experientia ſciamus.  
Nam, vel à ventis in hortum traiecta ſemina  
oculis emerſiſſe ſciamus ingenti ſtipitu. Aſt ce-  
leſtina pulcherrimèque in arborem adoleſcit, ſi  
avulſione plantetur ipſo etiam Theophr. autore.  
Eadem etiam ſam grandis tranſlata perdurare op-  
timè poteſt. Solet & è radicibus procul à trun-  
co interdum ſtolones exerere.

Plin. rem p̄cipuiſſimis expiſit in hunc modum.  
Vlmorum priuſquam foliis veſtiantur, Samara  
colligenda eſt circa Martias Calend. cum flave-  
ſcere incipit. Deinde biduo in umbra ſiccata  
ſerenda, denſa in reſtracto [in areis ſactis Co-  
lum.] tetra ſuper minutatim cribrata, craſſitu-  
dine, quæ in Cupreſſis. Pluvix ſi non adiu-  
vent, rigandum. Differendæ ex arcarum ve-  
nis [ita vocat excavatas foſſas] poſt annum in  
Vlmariæ, intervallo pedali in unamquamque  
partem. Maritas Vlmos autumnio ſerere utiliſſi-  
ma, quia carent ſemine. [Atinias ſi intelligit, eas ſe-  
men ſerre ſuper ex Colum. dictum.] Nam ex è  
plantis ſeruntur. In arbutum quinquennes ſub  
urbe tranſferunt, aut (ut quibuſdam placet)  
quæ vicenſium pedum eſſe cœperunt. Sulco qui  
noventarius [id eſt, pedes novem a vicino di-  
ſtans: aut in quo pedes novem à ſe invicem  
diſſite arbores ponuntur] dicitur, altitudine pe-  
dum trium, pari latitudine, & eò ampliùs cir-  
ca poſitas pedes terni undique è ſolido adag-  
gerantur. Atulas id vocant in Campania. In-  
tervalla ex loci natura ſumuntur. Aridiores [Ra-  
tiores c. n.] ſerendas in campeſtribus convenit.

Vlmis detrahatur ſuccus inutilis, ſupra terram  
foratis vſque ad medullam in ſeneſcã, aut cum  
alimento nimio abundare ſentiuntur.

Porrò Vlmī folia, rami, & cortex adſtringendi  
vim habent, inquit Dioſc. Folia tria ex aceto ad  
lepram efficaciter illinuntur, & vulnera glutin-  
ant: multò verò magis cortex, ſi ſaſciæ loco  
circumvolvatur: eſt enim lori in modum ſte-  
xilis. Craſſior autem cortex in vino aut aqua  
frigida viciæ pondere potus, pituitam educit.  
Quin & decoctum foliorum aut corticis radi-  
cūve oſſibus fractis, ſi ſorus gratia perfunda-  
tur, ea celeritè obducto callo ſolidat. Humor  
autem qui in folliculis prima germinis eruptio-  
ne reperitur, faciei illitus, cuti nitorem indu-  
cit. Recentia folia ad obſonia olerum more u-  
ſantur.

Avic. arborem Cimicum frigidam & ſiccā ſa-  
cit primo gradu. At Theophr. Vlmum humide

naturæ dicit, argumento, quòd poſt cæſuram ea  
recta materies multum humoris emittit.

Quod verò Dioſc. de radicū corticis decocto  
ait, id ſimpliciter de radicū decocto Gal. Paul. Dioſc. c. 14  
Act. & Onbaſius videntur intellexiſſe: ut non  
deſint, qui pro *h. t. è καὶ τῶν ῥιζῶν*, legendum  
ſuſpiciunt, *h. τῶν ῥιζῶν*. Nam & Gal. & ex eo  
Paul. & Act. eadem penè, de Vlmī cuiusque par-  
tium vitibus prodidere, omnes autem aſtrin-  
gendi ac extergendi vim illi tribuunt, per quas  
illa efficit. In vetuſto etiam Dioſc. codice Bi-  
bliothece Palatinæ ſic legitur: *τῶν ῥιζῶν καὶ τῶν  
καρπῶν τῶν ῥιζῶν ὅτι τῶν καρπῶν*, ubi legendum, *τῶν  
καρπῶν*, notante Sarrac.

Sic autem de Vlmī vitibus tradit Galenus. *Experiri  
in vulneribus*  
Vlmī foliis quandoque recens vulnus glutinavi-  
mus, confidentes adſtringentem & abſtergen-  
tem illis ineſſe facultatē. Cortex ampliùs etiam  
ſubamarus eſt & adſtriCTORIUS. Itaq; cum aceto &  
lepram ſanat. Radices eandē cum corticibus viti-  
dibus vim habent vulnera glutinandi: nam & de-  
cocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ  
callo inducitur opus habent. Humor autem follicu-  
lorum in Emplaſtrum quoddam melinum, quod  
adſcribitur, recipitur apud eundem Gal.

Vlmī, inquit Plin. & folia, cortex, & rami,  
vim habent ſpiliandi, & vulnera contrahendi.  
Corticis utique interior tilia lepras ſedat, & folia  
ex aceto illita. Corticis denarij pondus potum  
in hemina aquæ frigidæ alvum purgat, pituitaſ-  
que & aquas privatim trahit. Imponitur & colle-  
ctionibus lachryma [quæ præciſis ramis fluit è  
medulla, dum ardor caſtratur. D.] & vulneri-  
bus, & ambuſtis, quæ decocto fovete prodeſt.  
Humor in folliculis arboris huius naſcens, cu-  
ti nitorem inducit, faciēque gratiorem præ-  
ſtat. Cauliculi foliorum primi vino decocti, tu-  
mores ſanant, extrahuntque per ſiſtulas. Idem  
præſtant & Tilix cortices. Multi corticem com-  
manducatum vulneribus utiliſſimū putant: folia  
verò tria ad aſperſa pedum tumori. Humor quo-  
que è medulla, uti diximus, caſtrate arboris  
effluens, capillos reddit capiti illitus, deſtuen-  
tèſque continet. Caterùm, quoniam turpiter  
Plinij verbis falſi ſunt Fuchſi Matth. Dodon. ac  
Curtius, de Vlmō dicentes: Corticis utique in-  
terior tilia lepras ſedat, &c. placuit paucis te-  
petere, eorūque errorem detegere. Hi ita-  
que non animadverterunt, quod Cornario o-  
ptimè conſtitit, tenuem tunicam inter corticem  
& lignum tileam vocari, ac idè pro tilea [te-  
nui illa tunica] Tilix legerunt, ac per conſe-  
quens Tilix falſò tribuerunt, quæ Vlmō Plin-  
ius aſſignavit, cōfundentes utriūque facultates.

Folia Vlmī, quæ ad Orientem ſpectant, im-  
pari numero decerpta, & cum pipetis granis  
contrita, & ex vino Cretico pota à ieiuniis, pu-  
rulentas tuſſes mirificè juvant, ſi Marcello Em-  
pīrico credimus. Sed imparitas illa numeri ſu-  
perſtitio non caret.

Matth. experimentum eſt, humorem folli-  
culorum mederi puerorum Enterocelis, ſi ſple-  
nia in eo madefacta inguini ſuperponantur, at-  
que ſubſemorali ſubſiguntur.

Cæſalp. tam veſicas quàm humorem contem-  
tum utilem ſcribit in eodem affectu: glutinandi  
enim & adſtringendi vim habere.

Corticis radicis decoctum articularum duri-  
tias remollit, & nervorum convulſiones reſo-  
luit, ſi in ſorus modum adhibeatur. Item tu-  
mores diſſequit, quos iugi auritus in collo bonum  
excitavit. Vlmī radices, ſi diu coquantur, &  
decocto

Quæ loca  
deliguntur,  
quæ rem-  
pus: quæ  
tenen-  
dus modus.

Vlmus pro-  
pter ſinem  
colitur.

Serendi duo  
modi.

Satio &  
cultus ex  
Plin.  
Plin. cor-  
rect. & il-  
luſtr.

Atulas.

Vires &  
uſus.

Lepra.

Periculis

Oſſa fra-  
ctura.

Tum.

Deſi cor-  
ti ad pu-  
garionem

Vuln. d.  
Ambuſta

Tumor

Ad deſi-

gum co-  
pili.

Ignorant

gravat

tuſſis.

Matth.

Dodon.

Curtius

Tuſſis

pulenti

Enph.

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-

in ſple-



*Pilorum*  
*fluumum.*  
*Podagra.* decocto supernatans pinguedo colligatur, eaque illinatur sæpè locus, à quo pili defluerint, ij brevi renascuntur. Eiusdem cortex confusus & muria usq; ad eò subactus, ut malagmati similis

*Podagra.* sit, illitus podagricos dolores mulcet, inquit Mart. Fallopius scribit se liquore folliculorum Vlmi, (quem & colore & substantia melleum videt) nihil reperisse opportunis in agglutinatione, & vidisse mirabilia in villicis de hoc liquore. Sed vidisse etiam maiora. Quendam ex

*perim.*  
*slap ob.*  
*salum.* erronibus perforasse mammillam, femora, brachia &c: pugione, & solum huiusmodi liquore mixto melle spatio 24. hor. sanasse. Possè servari. Et à se quoque colligi solere, ut eo utatur in podagricis affectibus cum fluxiones fiunt. Mense Maio colligebat, quoniam tardius nascantur vermiculi coherentes: explebat phialam vitream, & cera & linteis obturabat: postea faciebat foveam in terra pedis altitudine, & in fundo foveæ ponebat salem communem, supra quem ampullam collocabat: deinde foveam explebat terra, ita ut ampulla operata esset terra, & relinquebat per 20. vel 25. dies, tandem dividebat fæces à substantia clara.

*Alia.* Hæc ex eius placitis transcrip. 2. Eiusdem liquoris colligendi præparandique rationem aliam tradit Camer. nempe hanc. Vesiculæ collectæ, antequam generent vermiculos, impantunt vitro al cui angustioris oris, quod inversum aptatur alteri vitro paulò minori, & si liquor ille commodè exsillat. Ex hoc, quoniam non diu durat, Oleum paratur, teste Sylvio præstantissimum in vulneribus. Nobis verò hæc nus observatum olea quibuscunque invulnere simplici minùs profuisse: nam & eis ferè sordescit vulnus, & glutinatio, quæ inprimis desideratur, impeditur.

*pericatio*  
*um.* Nec omittendum illud Timot. Rosi. sciretum: qui liquorem folliculorum Vlmi duobus phialis sibi mutuo impositis, ad solis radios destillatum optimum & mirabilem prædicat ad curandos affectus tibiæ & vulnera.

*pericatio*  
*um.* Cæterum apes, ubi se post luberniam satiem Samera impleverint, profluvio alvi, nisi succurratur, intereunt. Nam propriè hoc Vlmius habet, ut apum ventrem solvat: Eaque causa est, cur in regionibus Italiæ, quæ sunt eius generis arboribus consista, rari frequentes ducent apes, uti Colum prodidit.

*usur.* Vlmi materiem, reliquis post Cornum, firmitate facillè vincere, Theoph. autor: qua de causa cardines ulmeos foribus addi, quòd rigorem fervet. Nam si ipsi firmi permanent, valvæ quoque stare rigide atque intortè possunt. Utilis Vlmius quoque ad fores, præla & torcularia. [apud yavazoyas, fideiculas, quibus torqueri solent nocentes] Quin & ad carpentorum opus, sed ad id mediocriter bona. Plin. quoque Vlmius, quòd rigorem forissimè servet, cardinibus assamentisque portarum utilissimam prædicat, quoniam minimè torqueatur: permutandà tantum esse, ut cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Observavimus etiam excindi arbores ex horto E.C. VVitteimb. ad rhedas magnarum bombardarum, idque ob ligni firmitatem, uti narrabant artifices.

## LIGNORVM CARIES.

Quandoquidem caries lignorum, maximè eorum, quæ adstringendi, & extergendi vim

habent, qualis est & Vlmius; humentia vlcere purgat & replet, idèd mox post Vlmi tractationem, de arborum carie, quæ ex veteribus lignis & caudicibus colligitur, hæc ex Diosc. subiungimus. Caries lignorum, quæ est velut fatina, imposita repurgat & ad cicatricem perducit ulcera. Quæ verò serpunt, cohibet, cum pari Aniso & vino subacta, linteolis inducta & imposita. Germani hanc Worminell / Vermium farinam vocant.

## VLMI EXCREMENTO AC-

CEDENS FRUCTVS

Peregrinus

## CAP. III.



A NONYMON Descriptio

quemdam fructum in naturalium nostro thesauro adferimus, Castaneæ magnitudine, vel ferè duplo maiorem, qui utriculos seu excrementa Vlmi refert quodammodo, modòque compressus, modò inqualiter tuberosus iugescit rugosus, striatus, coloris fulvi, basi scissili latiori, cui pediculus annexus fuisse videtur.

Inter huius geminos cortices concreta melligo, quemad. in Anacardio & Caious, splen. Mell. g. dens, nigricans coëscit, cuius in effectis nostris fructibus odor & sapor omnis exolevit. Cavitas totius fructus inanis est. Datus tam olim dono anno 1563, à Clariss. & celeberr. naturalium vestigatore D. Gesnero, qui inter, Nuces moschatas repererat. Idem postea & nobis repertus Lugdani cum Pipere.

Clus. de peregr. stirp. huic pingit in quadam tabella sub No 7. de quo ait: Forma plana est, rugosa, & nonnullis Caious fructibus: per medium sectus, nulla grana, sed splendenter quemdam nigrumque succum iam concretum & induratum duntaxat continere, deprehenditur. Itaque inter fructus potius vitia, quàm inter fructus numerandum censet. Repertum sibi ait inter Acaciæ veræ siliquis & semina.

Clus. in Exot. ipse non amplius inter vitia fructus numerat, omisit enim ea verba: verum addit: interdum nucleum observasse rugosum, quem ambebat inter binos cortices succus concretus, splendens, ut nux Caious immatura censi indubiè possit. Nos propter similitudinem aliquam cum Vlmi excremento hunc fructum hic post alium reposuimus, posset tamen transferri in lib. sextum hist. nostræ & Caiou subiungi.

Hist. Lugd. & Tab. proponunt homine fructus peregrini 7. Clusii Vlmi arboris similem Indicam, cuius cortex ad rheumata commendatur, ut ex Monarde tradidimus l. 4. post Seiteragi.

FAGVS SEPIVM VVLGO  
OSTRYVS THEOPH.

## CAP. IV.

Descriptio.



Fructus.

Carpinus.

Lupulus  
arborescens.Carpinus  
gemina.  
Cæsalp.Carpinus  
Pliny alia  
ab hac.

Vlmus.

PROCEHIOR magna ex parte, quā ut ad vulgatum sepium humilitatem cogi possit, atque adeo in insignem altitudinem sæpe excrescit, caudice crasso, cortice subalbido, materie durissima & solidissima, albicante. Folia per ramos vimeas, serrata, sed longiora, minus crispula. Ex ramis primo Vere nucamēta quædam ac Iuli dependent foliati,

oblongi, foliorum agminibus densè stipati auctorum, membraceorum, ruforum, aut ex viridi fuscorum. Fructus uerò in longo pediculo spicæ instar, foliorum angustorum ligulis alatis obvallatus, pyramidalis corculi effigie, striatus, compressus, lignosus. Qui proveniens duo foliola Pomorum foliolis ferè similia producit. Collectus nobis Maio mense in horto Patavino ramus, (Carpinum vocitabat Cortusius) cui similem alium dedit D. Agerius ibidem decerptum nomine Lupuli arborescentis: cuius sanè Iuli ampli ex foliolis compacti, Lupuli illis foliaceis ac squammatis nucamentis non ita multum dispares, sed membranacea foliola articulū postremum pollicis faciliè æquant: eiusmodi in nostra Fago sepium nondum observavimus. Simile nucamentum ac veluti Iulum, si ita liceat appellare, in sua icōne exhibuit Camer. quale & à nobis in adiecta tabella exhibetur ad latus.

Tam hanc quàm præcedentem tradidisse videtur Cæsalp. his ferè verbis: Sunt in montibus Hetruræ duæ arbores Fago similes, sed materie candida, folio rugoso, & circum minutissimè serrato, longiore quàm in Fago, & frequentioribus nervis, quæ uterque medio, costarum modo, rectè producuntur: fructus utrique valde exiguus. Nam altera in cacuminibus racemulū densum fert flavescens, ex folliculis quibusdam membranaceis oblongis constantem: in singulis autem folliculis, tanquam, utriculis singula semina parva, cartilagineo & candido cortice obducta continentur. Altera autem non in folliculis, sed in umbilicis foliaceis, singula, aut bina semina fert maiuscula, & striata: ut à nque vulgò Carpinum vocant. Videtur Theoph. Ostryon seu Ostryam appellasse mitem, & for minam similem Fraxino fecisse. Plin. etiam similem Fraxino facit, cortice & ramis: Cætera autem Theoph. Sed Carpinus apud Plin. alia ab his est. Dicit autem paulò post idem Cæsalp. Quæ autem Amentum ferat Vlmus & Vvas, nondum vidimus, ut suspicari liceat ne Plin. cum Vlmigenere comprehendat Carpinum utranque. Sanè ingeniosè, ut rem propius inspicienti non

temerè ita esse videatur. Rectè & in eo sentit, quòd Ostryon Theophr. statuit, de qua hic sic tradit; Ostryon, quam quidam Ostryam vocant, unica est species, Oxyæ cum sat, cum cortice similis, foliis Pyri similibus, nec multò longioribus, in acutum contractis & maioribus fibris multis & crassis à medio dorsi, tenui per ambitum scissurà, reliquis fibris à media, costarum in modum, iuxta magnam porredis: materie dura, decolori, exalbida: fructu parvo, oblongo Hordeo [κεράτ] simili, flavo. Radices sublimes habet.

Hunc Theoph. locum angustius contractum & nonnihil mutatum sic habet Plin. In Syria & in Aegypto copiosa hæc Tamarix est, cuius infelicia ligna appellamus, quæ tamen infelicia sunt Græciz. Gignit enim arborem Ostryon, quam & Ostryam vocant, solitariam circa saxa aquosa, similem Fraxino cortice, & ramis: folio Pyri, paulò tamen longioribus, crassioribusque ac rugosis incisuris, quæ per totum discurrent: semine hordeo simili. Materies est dura atque firma: quæ in domum illata, difficiles partus fieri produunt, mortisque miserat. Hæc ille. Quod verò de arborum infelicitate ait, id ex Catone & Tarkinio aliisve similibus hausisse potuit: Illi quippe felix arbor, quæ fructum fert: infelix, quæ nullum: huic apud Macrobiū infelices, quæ fructum nigrum ferunt: quanquam & alias rationes eiusdem rei dixerimus alibi, & ne hic quidem citatas sufficere ad constituendas infelices dixerimus in prologo huius libri.

Dictum quoque lib. præced. cap. de Fago five Oxyæ, non probari nobis Dodonzi sententiam, quæ Ostryam Plinij eandem facit cum Oxyæ Theophr. nec, quod ille putat, pro Ostrya, legendum esse Oxyæ, denique, nec pro Hordeo, ut idem autumat, Castaneam substituendum.

Tanta est potè tamque confusi auctorum, & modernorum possimum Herbariorum in huius arboris designatione confusio errabunda, ut ex eorum historiis studiosi involvantur potius, quàm definitam & certam cognitionem adfiscant. Quorum opiniones serie quadam proponemus, & unicuique more nostro sententiam & censuram nostram adicemus.

Ac primum quidem Ruellius insigniter fallitur, dum arborem hanc Orneoglossura dicit, & Vlmi speciem, Linguam avis Offic. dictam. Hæc enim Fraxinus est. Considerandum, tamen an nostram hanc Fagum sepiam intellexerit, cum ait: Gallis extrita priorelitera, aut in aspirationem conversa Hætrum & Hedrum pro Cerro appellitari. Nam Hætrum, vel Hedrus glandifera cornitur. Abdicatur quæ apud nos ædificiorum fabricis, ut quæ flexa & fructu infelix habeatur, infernis tamen & levioribus non improbat. Si præterea Gallis quibusdam credimus, Fagus nostra sepium Hæstre dicitur. Verum si Ruellius & Car. Steph. eam intelligunt, maxime errant, non glandifera est. Vnde liquidò constat ambos ignorasse quid scriberent: Hæstre enim describunt cum verbis antiquis attributis Cerro: quæ fortè in Gallia non provenit, aut si proveniat locus fuit ignotus illis ac ipsamet planta. De Fago quoque sepiam, videntur & sequentia dici à Car. Stephano: Tercium Aceris genus Græci Zygiam vocant, quam nonnulli Carpinum esse autumat. Et post: Carpinus, vulgò Charme, inter Aceris genera numeratur, atque id est genus, quod Græci ζυγίαν, quasi jugalem vocant, runt,



runt, quòd' ex eius materie *ῥα ῥα* herent. Perpendant ergo lectores an Car. Steph. per *Charme* eandem, quam nos, intelligat arborum; ut suspicamur, ei tamen ignotam, ea enim non est ex genere Aceris.

Du Choul in opusculo suo de Quercu nihil rectius. In Gallia inquit, Quercus, quam *Charme* vocitat plebs, sine glande arbor vivit: Lignum maximè expeditur, quòd ceteris praeferatur. Malè autem Quercum hanc nostram Fagi, de qua eum loqui censemus vocat, à qua plurimum differt.

Tragus Ornum Latinis dictam putat, quamvis id oppugnent aliqui, inquit, qui Fraxini speciem sylvestrem volunt: In his (addit idem) arboribus provenit Lingua avis, *Vogels Zungen* offic. dicta; *Ornglossum*: in Serap. *Lise Hassaphir*: Hebraeos efferrè, *Lischen Hassaphir*, hoc est, *Lingua avis*. Sed Ornus non est: nec Lingua avis offic. hulus est arboris, sed Fraxini: nec etiam Serapionis est *Lischen Hassaphir*. Lonicerus *Banbuden* aut *Büchsfarn* vocans, sic dici ait, quia forma aliquatenus similis sit Fago, & media inter Fraxinum & Fagum. Lat. dici Ornum, & non immeritò genus sylv. Fraxini. Folia similia esse Fraxino nisi essent profundius serrata: eius fructum solum esse in usu medico: Arab. dici *Lisenhazafir*: Lat. *Linguam avis*. Ruellio tamen *Linguam avis* esse fructum particularis arboris, quam vocet *Ornglossum*. Certè vix induci possumus, ut credamus Lonic. intellexisse quæ scriberet. Nam quæ quæso similitudo Fagi sepium, quam ille pingit, cum Fraxino? Aut quis huius, de qua hic agitur, fructu utitur pro Lingua avis? Nec Ornus est, nec Lingua avis Arabum. Ineptè igitur huius arboris fructui tribuit vires, quæ Linguae avis solent tribui. Fidant plebei eiusmodi ignaris rei herbariæ scriptoribus.

Turner. *Fraxinum montanum* vocat, quamvis nulla ei similitudo cum Fraxino. Hanc opinionem Dodon. ingeminat, & novis erroribus stipat. Nam in Hist. sua Gallica Vlmo tertiam speciem scit, *καλάραν* Theoph. scribitque Colyteam videri Vlmo sylv. Plin. Gallicè posse dici *Orme sauvage*: Germ. vocari *Banbuden* & *Buchsfarn*: Belg. *Bersleer* & quibuldam locis *Berenner*: & seq. cap. *Tili. in marem, Tili. lieu masle*, Gallis quibusd. in *Hestre*, Belg. *Ypeleyne* dici. At in Historia latina Vlmo, inquit, non multum dissimilis alia quædam præalta arbor nascitur, cuius materies lignosa multò durior est, & ad opéra idcirco usurpatur, quæ pondus & vim sustinent, ut sunt Cochleæ & molendinorum rotæ: folia huius rugosa similiter & ambitu serrata existunt, velut priores, sed longiora & averfa parte læviora; diluvis videntia: quæ ubi ressecata fuerint; gratum olent. Ab his verò nulli exeunt folliculi, & bubus eadem minus grata sunt. Semen priori satis simile. In diversis sylvis, locis montosis ac arvis hoc genus provenit, velut in Arduenna sylva ac Sonia in Brabantia dicta, olim Ardenne parte, in quibus hæc arbor frequens reperitur. Altera hæc Vlmo *officinalis* Theoph. est, quam Gaza *Mamiulmum* interpretatur. Colum. verò *Vernacula* & nostras dicitur, id est, Italica: Belgis *Bersleer*: & quibuldam locis *Berenner*. Plin. Vlmo 3. nostras sibi ac Colum. dicta. Item cap. seq. inquit Dod. Tilia mas non minor, aut minùs in am-

plitudine diffusa est, quàm femina: cortices lentu & obsequiosi similiter [femina] sunt: & ad funes conficiendos idonei, sed tamen paulò duriores ac fragiliores: lignum durius, nodosius, & ex luteo coloratius, Vlmi satis simile: folia lata, haud quaquam lævia, sed asperiora, propemodum veluti Vlmi, in quibus tamen folliculi nulli gignuntur. Fructum adedò rard profert, ut sterilis, nec ullum facere existimatur. Est autem hic planus, rotundus, & vi maioris Thlaspios infarctus, coherentque plures è longiusculis pediculis racematim. Marem hanc Belgarum nonnulli patria voce *Ypeline* appellant. Falluntur non parum [videlicet Matt. & Lob. in obs.] qui Vlmo, aut huic cum folliculis in foliis similem pro Tilia mare iconè expriment ac exhibent. Item cap. 19 scribit idem Dod. Carpinus Caudice assurgit procero, cortice inalbescente, nonnihil aspero ac tenaci. Rami in latitudinem effunduntur, circumvestiti, lati, foliis haud angulosis sed ad Vlmi folia accedentibus, nisi teneriora essent. Inter hæc triangularia quædam racematim dependent, iuxta quæ Capitula Cicerum magnitudinem, in quibus fructus sive semen. Radix firma, crassaque, sylvis & montibus gaudet, Aceris hæc 3. species Carpinus est. Nomen Itali & Allobroges retinent. Zygian hanc Græcis vocant, testis est Plin. quasi coniugalem, quòd ad *ζυγία*, id est, iuga quibus boves iugantur, conveniat, quæ & nunc ex hac confici testatur Curtius.

Ceterum in his quæ ex Dod. proposuimus; quàm plurima consideranda veniunt. Inprimis verò non constat nobis, quo in loco Fagi nostræ sepium meminerit in sua hist. Gallica, nisi id fecerit Vlmi 3. nomine. Nomina enim Germanica conveniunt, & similitudo cum Vlmo; usque quales sive Orno tribuit Tragus. Nec repugnare videntur quæ scribit in hist. Lat. nisi quòd omittit descriptionem Vlmi 2. quam habebat in hist. Gallica: & quam ponebat pro tertia, ponit nunc pro secundâ. Præterea nomina quæ assignabat secundæ, nunc huic tribuit: nomina autem Germanica, quæ tertiæ dicaverat, omittit, & jungit Belgica. In hist. Gallica Tiliæ maris descriptio cum nostrâ Fago sepium convenit, sicut & nomen Gallicum, & comparatio cum Vlmo, & quædam alia. Sed in hist. Lat. reiecit nomen Gallicum. Rursus in hist. Gallica Carpinus ei erat Aceris species maior: nunc autem relicta illa opinione in hist. Lat. posuit pro Carpino iconem nostræ Fagi sepium, quam in descriptione Vlmi folio dicit: Cætera non in omnibus satisfaciunt. Nec scimus cur nomina Germanica & Gallica omiserit. Igitur vident studiosi ab eo tres tradi plantas Vlmi folio, quarum lemmata ex libris suo nomine confarcinasse videtur, non ad ipsas plantas sibi ob oculos positas. Si tamen quis tres eas plantas diversas noverit ac nobis ostenderit, herbam porrigemus, suspicionemque hanc abiciemus. Illa verò eiusdem Dod. de Colytea opinio, sua sponte cadit, cum ille met eam in hist. Lat. omiserit. Tiliam marem quoque non censemus, si, uti videtur, Fagum nostram sepium intellexit. Ea etiam nihil commune habet cum Aceris specie sive Carpino. Etiamdudum ea opinio doctis displicuit Botanicis, sicut & nobis qui Ostryn Theoph. uti dictum, censemus.

In monte Athos, inquit Bellon. frequens est arbor, quàm antiqui vocarunt Ostryam: nomen ibi hæc retinet: Ea est, quàm vocamus *Haisfre*.







adoleverit, subinde candidior apparet, in tenuis philyras ductilis, satis crassus: in adulta arbore candidus, rimosus: qui huic subest interior, tenuis admodum, laevis, ac instar membranae pellucidus. Crassiorum ramulorum cortices etiam in albicant, sed minorum puniceus aut spadiceus est, qui à laticatis & aridis tenuis pellicula specie avelli &

ungue separari potest, quemadmodum & incanus ille in ramis maioribus, laevore inoffenso. Folia quae primo exortu plicata ac crispata prorumpunt, vitridi pulchrèque herbaceo tinguntur colore, singula singulis, iisque tenuibus dependentia pediculis, ubi excreverunt, Populi nigrae ferè, sed minora, minus laevia, per ambitum serrata, saturatis virentia, paulò angustiora, subpinguia, odorata, sapore amaro.

Ruell. foliis Faginis dicit, paulò angustiora: quae collatio minus placet.

Cæsalp. infernè subhirsuta ait, punctis albis distincta, quod postea diligentius observandum. Goropius verò scubit, quaedam Betulas crispari.

Fert sulcos seu nucamenta longa, Piperi longiora vel Alni lulis similia, quae si credendum Tragop. Betulae sunt loco feminis, ex quibus novae progignantur Betulae. Sanè si siccati, in seminum quoddam parvum, compressum ac leve fauiscunt.

Matth. negat ferre ullum fructum: at nobis constat, semen ferre, & ex eo satis prognasci arbores, quod utique fructus eius fuerit, nisi ille aliter fructum acceperit.

Locus quibuldam ad septentrionem, ubi haec arbor copiosa crescit, vulnerato cortice succus effluit, qui à rusticis appensis vasculis exceptus cum ipso multo dulcore cernit.

Maioribus radicibus minora quadam fila crassitudinis culmi triticeae adnascuntur, quae sub arenis ad quadraginta & amplius pedes prorumpunt, ut notavit Goropius in suo, Nilokopio: in quibus laus vimineae textilisque materia.

Apud Theoph. *Σπυδα* [sic enim vocat] id est, Betula, folium fert Caryae simile, sed paulò angustius. Cortice vestitur versicolore, sub quo materia laevis, nec nisi ad baculos utilis. Curtius Graecis Semyd dici ait: Sed ubi Matth. faceret se non compertum habere quid hic Theoph. per Caryan intelligat. Miramur etiam acutissimum Scaligerum non exposuisse quid hic sit *αγρία*, nec insignem Botanicum Cæsalpinum. Nos Nucis Avellanae folium intelligimus; quamvis fortè minus propria videatur similitudo. Rober. Constant. negat Betulam folium Nucis Avellanae habere, ut Iuglandis [alterutrum enim per *αγρία* intelligendum esse & ipse subolscit] sed accedere ad folium Tiliae. Observant studiosi, utri similis sit, Avellanae

seu Coryli, an Tiliae folio. Apud Diosc. nihil invenimus haecenus de Betula.

Plinius etsi paucis, satis tamen aperte nostram Betulam expressit, quando inquit: Betulla *Betulla* Gallica arbor, mirabili candore atque tenuitate, terribilis magistratum virgis. Eadem circulis flexilis: item Corbium sportis. Materies eius contumaciùs transmittit ferrum.

Tragus fatetur multos quidem doctorum existimare Betulam Graecè Semyda Theoph. esse: sed verò nihil istorum sententiae detrahens, quod ad se attinet, Papyri illam speciem mavult dicere. Ut verò sic sentiat, & formam arboris universam & facultates id admonere ait.

Neque tamen intelligere Papyrum illam, cuius Theoph. meminit l. 3. hist. c. 9. quae longitudine super dena cubita non venit. Apud Germanos aliis quoque arboribus, ut Quercubus &c. non unam esse faciem: hanc enim proceram & in magnam simul amplitudinem diffusam, illam breviusculam, ac in fruticem potius, quam arborem evadere, etiam centum annos natam. Quod in Quercu fieri videmus, quid obstat, inquit, quo minus idem in reliquis contingat? Sed ut haec ita sint, quod non inficiamur, neutiquam tamen Trago alienari possumus Betulam esse Papyrum, ut facile apparebit legentibus historiam de Papyro.

Nolimus equidem à Svenoekf. tam securè pronunciari; *Σπυδα*, *πιδάου*, Theoph. de Betula. Nam *Σπυδα* (sic enim legitur apud Theoph. in casu recto non *Σπυδα*) & *πιδάου* distinctae sunt plantae apud ipsum etiam Theoph. & cur ille Betulam Papyrum pronuntiaret, rationem non habuit meliorem, quam auctoritatem Tragi & Euch. Rösslin. At ipse etiam vidisset, si rectè inspexisset, etiam à Trago negari esse Papyrum illam Theoph. de qua modò diximus; quamvis Papyrum idem Tragus nihilominus putarit. Nec ideo dicere potuit esse Papyrum Theoph. quòd apud quosdam fortè legerit, olimin huius cortice scriptitatum, & in hanc usque diem quosdam eius extare libros. Nam & aliis corticibus ac Philyris olim inscriptum fuit, quos tamen nemo prudens ideo Papyrum simpliciter aut Papyrum Theoph. dixerit.

Decussit etiam Euch. Rösslinum docere, *Euch. Rösslin. cur Betulam vocaret Vibicem. Sed in promptu suspicio: effectus Virgarum Betulae id eum docuit, quòd iis caesa tergora saepiculè vibicibus picturata vidisset.*

Betulam plerisque Herbariis dictam legas à nonnullis, inquit Dod. & ex eo Taber. *σπυδα* [Synon. ab aliis *σπυδα*. Sed à quibus? Doctissimi quique pro Semyda Theoph. agnoscunt. Germ. *Birken* / *Eichenbaum*: Cimbr. *Bernd*: Slavon. *Bresina*: Belg. *Berschenboom*: Gal. *Bouleau Boule*, & *Bes*. Galli, inquit Ruell. *Betula* extrita & litera nominant: tura *Bouletum*. It. *Riela*, *Betula*, *Bedula*: *Bedulla* Tridentinis. Angl. *Birch tree*. Bohem. *Briža*. Vagur. *Vitr fa*.

Betulam à batuendo dictam vult Const. n. *Erymon*, quòd eius viminibus cadantur pueri: non à Bitumine, (licet Plin. autore ex ea bitumen excoquatur,) quasi Batulam; Nomine Betulae venit & Pyrola de qua suo loco, ut videre est in indice; Invenimus etiam Fagum sepium sive Ostryam à quibusdam dici Betulam, de qua antè.

Gaudet frigidis maxime Betula & aquosis, te-

# HISTORIAE PLANTARVM.

te Plia. Eiusmodi & arenosis maximè hodie Germaniz non infrequens. Tragus ait in umbrosis & altis montibus reperiri, & felicius adlescere. In Germaniz ac Bohemiz montibus ac sylvis, teste Dod. gignitur, tum & alibi: & quandoque in arenosis & aridissimis, veluti in Brabantiz Campania quibusdam locis aded sterilibus, vt ne herbam quidem producant, in quibus tamen viget ac crescit. Calceol. notat in monte Baldo provenire. Observavimus etiam in multis Galliz sylvis, potissimum in agro Aureliaco non longè à Gergeot oppido, si benè recordamur: ut & Helvetie & circa Basileâ potissimè in Sundcovi a arbores magnas vidimus, non fructus quales suas tradit Tragus. Thalius tamen in Hercynia, Saxothuringia, atq; in Brocenburgo, Betula pumilè nasci scribit: aliâ. v. in Hercynia passim.

Satio.

Montbelgardi in horto E. C. à me [Bauh.] Ioh. plantata, in maximam tam excrevit altitudinem. Optimè crevit in illo vivario circa Montbelgardum, ubi densum Betuletum videas Ill. nostri principis manu ex seminio constitum. Sonij saltus accolæ Fago casa subnasci ex eodem trunco Betulam constanter affirmant. Quid verò de hac re nobis videatur, in Fago dictum. Goropius scribit visas sibi duas aut tres Fagos ita connexas cum Betula, ut ex eodem trunco viderentur pullulasse. Meminimus & alias diversas arbores eadem ratione coalitas, non uno loco observatas.

Tempus.

Iuli ineunte verè prodeunt: Folia deinde Aprilis aut paulò tardius, pro natura loci. Tragus Iulos non decidere ait ante autumnum. Notat tamen Schuvenckfeldius semen paleaceum in Iulis Iulio à vento dispergi.

Vites & usus.

Plumis frigidissima dicit, quæcunque aquatica: lentissimè ut autem, & ideo scitis faciendis aptissima; quorum plaga contrahit se protinus, cluditque suum vulnus, & ob id contumacius transmittunt ferrum: in quo genere & Betulam collocat. Idem & Galliam ex ea Bitumen excoquere tradit. Qui mès hodiè, uti putamus inolevit. Cortex quidem ignem facillimè concipit: idèò rura lucernarum vice succendunt: reddit flagrans pingue quiddam & oleosum, ut & Ruell. observavit.

Bitumen. Lucerna.

Fasces

Columel. ad vinculorum usum eam quoque inter cæteras commendat. Fasces, quorum inventio Vetuloniz Silius adscribit, capiebantur ex Betula; teste Goropio.

Papyri:

Betula, inquit Tragus, priscis temporibus magno in honore habita fuit propterea quòd veteres, antequàm Papyri usus esset inventus, libro Betulæ, hoc est, cortici candido opera sua inscribere soliti fuerint: is testatur se vidisse Curiz, oppido Rhætiæ superioris nonnulla carmina in cortice Betulæ exarata. Lonic. quoque albis corticibus usos antiquos loco chartæ testatur, & ex ijs adhuc nostro seculo reperiri libros scriptos. C. Bauh. in interiori candido veteres ante repetitam chartam, scribere solitos annotat, eumque tenuem dicit, & chartæ instar candidum: conferrant qui libros inscriptos viderunt, & considerent an talis interior cortex reperitur.

C. Bauh.

Sur ut dicitur.

Inter omnes verò arbores vix aliam quamcunque reperias, quæ Vere tam citò, tantæque copia humorem & succum è terra hauriat atq; Betula. Nam in initijs Veris, anteq; folia prodire, iam dulcem suum succum cumquædè largum recipit, ut si arbor vulneretur, limpidissimus liquor copiosus effluat, quem sui pressi pastores, in sylvis & penumero potare solent: quemad. & nos (in-

quit Tragus) non semel eo liquore recreati fuimus, cum herbarum gratia vastas peragremus Calceol. sylvas. Vidimus & terebello perforato inferius illarum. caudice velut per tubulum profluisse. Hic succus, autore Trago, in Vere collectus, adersus calculum & morbum regium potu auxiliari dicitur. Succus hic dulcis, præsertim si destillatus (ut vulgò dicunt) fuerit, exulcerationes oris papulæque sanat, & maculas extertit, collutæ. Eadem efficit & aqua, è viridibus folijs destillata.

Oris exulceratio.

Maculae.

Ex eodem illo succo è caudicis vulnere exstillate, Ioh. Simlerus refert in sua Valsie descriptione, solere ibi plerumque Matzam confici.

Matza dicitur.

Quin & Camer. Succus Betulæ, ait, colligitur principio Maij, soli exponitur, effervescit pariter. Instat multi: atque ita repositus per totum serè annum bonus conservatur.

Succus præparatur.

Hydrops.

Quidam destillant. Creber eius potus cum aqua sambuci & similibus laudatur, in hydrope: Aqua præcipuè commendatur ad absterisionem & curationem vulnerum. Quidam plebei ex folijs eius corticis in aqua parant sibi balnea ad scabiem.

Vulnera scabies.

Aqua foliorum.

Cortex Betulæ in dneres redactus, si ex ijs lixivium paretur, ad oris ulcera & maculas abstergens efficacius facere perhibet Tragus. Hic quia bituminosus est, inquit Matth. excafcit & emollit, humectat & resolvit. Folia excafciant & siccant, resolvunt, attenuant, abstergunt, amara sunt. Hæc eadem habent vires, quas Populi nigri. Idem cum alumine ex aqua decoctis quidam luteum colorem parari tradunt pro pitectoribus. Succo pingui, quem virentes Betulæ ramuli, vel etiam è scopis betulaceis aridi super pelvim accensi remittunt, in stillato cathis, oculorum rubores discutiant. Eodem linteolum imbutum, umbilico impostum, ad lumbricos facit enecandos. Schuvenckfeldius quoque cremati ligni emanantè liquorem oculorum albugines & cicatrices delere scribit, vel potius ex Lobelio, eo non citato, transcribit. At nos ijs, qui hoc remedio uti volent, suaves sumus, utem liquorem degustent prius, & caveant ne eius usu ex parvo morbo magni faciant. Curtius ex corticis cinere factum lixivium, Caseos à vermibus innoxios magis lervare scribit, q; aquam stillatitiam recentium foliorum. Idem, qui Gallus erat, Bitumen ex Betula Galliam excoquere tradit, cuius in medicina nullus, quod legerit, apud antiquos sit usus, nisi quòd recentiores quidam, eo pastores aridas fauces inungere dicant. Quæ valdè veremur à Curtio aut efficta, aut certè ab alijs, malè intellecta prodidisse. Quis enim bituminoso liquore & utique humectante redolente ac sapiente, idèòque calidissimo, aridas inungat fauces? aut quis inde resultare queat fructus? quod solatium: quæ humectatio, remollitio aut quod refrigerium, quod in eo casu vel maxime desiderari solet, & ex artis præcepto, debet? Suspiciamur itaque Curtium id de liquore, qui è caudice vulnerato exstillat intellexisse, oscitanter & obliuiose, aut verius imaginariè, quippe præter rationem, ad bituminosum ultione paratum liquamen transfluxisse.

Lumbrici.

Albugo.

Cicatrix.

Cicatrix.

Caseum.

Conferat.

Arida fauces.

Curtius.

Conferat.

Ventriculi pecorum, quibus coagulum lactis nostri parant succo Betulæ conditi, seu macerati, cum præcaseos omnes, inquit Tragus, qui eo coagulo coeunt, à vermibus asserunt, certò id attestante experimento.

Experientia.

Conferat.

Miramur verò Dodonæum in sua histor. Lat. Dod. Anno 1582. conscripta, de medico usu Betulæ partiumque eius nihil vel apud veteres vel recentiores





gno molli, ruf-  
fescence. Rami  
valdè fragiles  
sunt, ut vel digi-  
tales levi inflexu  
frangas, ob id  
Frangula hæc ar-  
bor dici posset, unde.

Frangula  
unde.

cortice ex fusco  
subcinereo, ma-  
culato, internè  
luteolo, amaro  
cum adstrictione  
& ingrato: ligno  
rubro albo & me-  
duloso: foliis  
vestitiuntur latis  
Avellanæ vulga-  
ris, rotundiori-  
bus, nervosis, cre-  
natis, vindibus,  
splendentibus, leri-

Oculi.

to & viscido humore obfistis. Oculi triangulares,  
ex cinereo rubi interdum & virides, aut in pur-  
puram quodammodo vergentes. In ramulo-  
rum fastigiis nucamenta seu luli dependent,  
simul multi, virentes vel rubentes, unciam cir-  
citer longi & fragiles, antequam commissuræ  
conferruminatarum particularum dehiscant: quæ  
ubi se explicuerint, duas etiam uncias longi-  
tudine superant, sapore adstringente, cum ali-  
qua amaritudine. Cæterum porriusculas dictas ad  
mediam tanquam costam alligatas ambiunt sta-  
minula multa, ut in Corylis. Mense Septem-  
bri apparent etiam minimorum rudimenta. Eo-  
dem mense veteres conos videas privatis ramu-  
lis pendentes, binos ternos, quaternos, plus  
minus, pulchre hiantes & apertos. Item paulo an-  
tè, aut eodem tempore novos, magnitudine  
parvæ avellanæ, primò virentes, ubi mature-  
scent rubentes, & mox hiantes, ex imbricata  
squamarum compage coaggestos: è quibus  
& ante seminis maturitatem itamina purpurea  
prominula quædam observata, quæ fortasse flo-  
rum loco haberi possunt. Horum Conorum gi-  
stus valdè astringentes cum aliqua amaritudine.  
In quibus semina, ubi matura fuerint (quod  
prædicto item mense observari solet) parva ad-  
modum, compressa, inæqualia, rubentia: atq; in  
iis medulla alba paucæ, sapore manifesto de-  
stinata. Observatur & in Conis, ubi mature-  
scent pulvis arenosus. Nic. Perot. in cornucopia  
notat in Alno, arbore nota, reperiri Tuberos.  
Theoph. l. 3. hist. cap. 14. κληδον [sic enim  
vocat Alnum] ἀκαρπον, id est sterilem dicit: ita  
enim habet Cod. Bal. sic & Plin. legit, & Dal.  
& Gaza more suo Plinium secutus. At Aldin.  
noster codex ὑκαρπον habet: Rob. Constant. legi  
vult ὑκαρπον δὲ καὶ μορον, pro eo, quod in utriq; in-  
dictis codd. habetur post ὑκαρπον & ἀκαρπον, δὲ μο-  
ρον. Nec displicet ea lectio. Immo & ipse quo-  
que Theoph. eiusdem lib. c. 6. κληδον mani-  
festè circa autumnum fructum ferre dixit.

Juli.

Sapori.

Com. Senti.

Com. novet.

Semen.

Tuber.

Clethra

Theoph.

Throph. cor-

rad. et ut-

Descriptio

Theoph.

Radia.

centiores extare; tam securè scribere ausum:  
quandoquidem Tragus & Matt. quos citavimus,  
& qui multò ante dictum tempus scripserant,  
plures tradidit eius vires medicas. Fortè id fecit,  
quia more suo scopas facturus, apud Ruell.  
legerat, Betulæ in medicinâ nullum usum esse,  
quod ipse quidem legerit, sed baculis tantum  
& scopis nasci. Cæterum quidem, nihil ea fre-  
quentius esse apud nos ad usum scoparum. Ab  
equitibus etiam expetuntur eius virgæ pro do-  
mandis equis. Eadem ut olim magistralium  
virgis terribilis fuit, ita & hodie, & à longo  
iam tempore ad scholas triviales relegata pæ-  
dagogis virgæ præbet ad coercendos & casti-  
gandos pueros: ut qui amore virtutis sapere  
ac discere nolunt, sapere discant formidine pæ-  
næ: iuxta illud, *maiora minora*.

Ipsa porò materies tam obsequiosa est; ut  
ob id in quibusdam locis ad quas illos pleben-  
dos expetatur, maxime in Anglia, teste Tur-  
nero. Laniones ex Betula & verucula confi-  
ciunt; gravior quippe est, quàm Populus. Au-  
cupes visco illius Betulæ virgis ad aucupia ut-  
untur: idem usus ad muscas. Piscatores Nor-  
tumbri corticem delibatum fuso bacillo inter-  
positum accensumque usurpant ad piscationes  
nocturnas, tridentemque adnatantes pisces confo-  
dunt: qui piscandi modus & Burgundis & Mont-  
belgardensibus haud insolens. Ex Betula in  
Alsatia, & Basilicæ ad maxima illa dolia con-  
stringenda circuli probatissimi habentur. Item  
in Avernia, Allobrogibus, Sebustianis, agro  
Tridentino alibi que locorum. Rustici etiam  
tempore messis virgis teneris Betulæ segetes  
colligare consueverunt, sicut & alia quoque,  
ad quem usum hæ virgæ maximè adhiben-  
tur. Cortices Betulæ Balistariis, duri verò  
& crassiores caudices Carpentariis (ex his enim  
illi axes & abides conficiunt) relinquunt, teste  
Trago. Parantur & ephippia, equis im-  
ponenda ex Betula. Ananij teste Match. è suis  
Betulis non modò optimos conficiunt carbon-  
es ad coquenda liquandaque metalla: (diu en-  
im vivacem ignem retinent, caputq; non ten-  
tant: quo nomine & à Metallicis expetuntur  
cum fundunt metalla) sed è delibrato contor-  
dæque cortice faces ad nocturna lumina parant,  
quibus in tedæ vicem utuntur, quod bitumi-  
nosa & oleosa pinguitudine, ut dictum, re-  
dunt. Schvenckfeld. semen siccatissimum natu-  
ræ esse scribit. Idem observavit, ex trunci  
medij substantia aliquando nasci Fungos fla-  
vos, Rhubarbaro similes: eosq; astrictoria vipolle-  
re, & ad sanguinis fluxum cōpescendos utiles esse.  
Ioan. Coler. verb hæc refert. Mense Martio ex  
Betula multa fluit aqua si truncus vulneretur:  
crescente luna coaservanda est, pellit calcul-  
um ex vesica & renibus: si quid depravati est  
in visceribus, pulmone, hepate, aut splene  
tollit: si albiatur facies, admittit omnes matu-  
ras, & faciem pulchram & gratiosam reddit.  
Fertur Tartaros circiter mensem Martium, hanc  
tantum aquam potare, nec eo potu unquæ agro-  
rare. Per totum annum potest ad multa usurpari.

## ALNUS VULGARIS.

## CAP. VI.

ALNUS vulgaris arbor iuxta magnitudi-  
nis, ramosa, cortice scabro, fusco: li-

Ergo Theophrasto Alnus fecunda est & u-  
nius generis. Arbor natura recta, ligno molli,  
medulla tenera, ita ut virgæ graciliores to-  
tæ excaventur: folio Pyri [ἀπρι] at paulò  
post Coryli folio melius simile dicit. sed am-  
phiorè nervosiorèque: coruce scabro, intus  
rubente, quo coria tinguntur: Radice per sum-  
ma cæpitum sparsa, nec maiore quàm Laurus,  
sed tenui.





# LIBER VIII

135

Item Ra. Ariseram vocitat: quem errorem & Raui. Textor commisit. Id enim Epitheton ad Populum pertinet, quod vel ex Aristotele didicissent: de qua postea.

Sed nec Hort. Tusculano credendum, dum in suo dictionario Latino-Greco-Gallico Alnum *alysen* Græcorum pronunciant.

Dictam Alnum putat Curtius, quod ab anne alatur. Quid si dicamus, quod ipsa potius alatur. Pascit sata, inquit Plin. Et sub Alni tegmine herbas succulentiores nasci observatum.

Clethram quidam & Latine scribunt & vocant.

Alnus Cardane, inquit Scil. si nescis, Onicium est vestrum. Germ. Elen / Erlenbaum / Erlenbaum / Ellerbaum / Orlinbaum / In Austria Schwarz erlin / hoc est Alnus nigra. Belg. Elst / Elsenboom: Gall. Aulne. It. Alno, Alano, Amia, Onici, Onam, Onio, & Onato Hetruscis. In Taurinis Verna: Vacones, haud multo longius, Ber, autore Scal. Angl. Alder tree: Vngar. Egör fa. Bohem. Wolfe. Polon. Olśa. Sclavon. Wolschowe. Folia eius castissima dicit Raviss. Textor. Poetæ multa de Alno fabulantur, fingentes tres sorores Phaëtonis, Phaëtolam scilicet, Phoebea & Lampetiam, cum per quatuor menses fratrem in Eridanum præcipitatum, quod currum Solis male duxisset, defluisent, in Alnos tandem conversas. Vid. Ovid. Metam. 2. Fab. 2. Eiusdem fabulæ Virgil. quoque meminit Eclog. 6.

Tum Phaëtonidas musco circumdatus amare Corticis, atque sfo præcora erigit Alnos.

Sic variis Epithetis à poetis ornata Procræ, opaca, frondens, alta, acrea, viridens, longa, potura, procellosa, viridens, virens, viridis, ceres, fragilis, phætonides, fluvialis &c.

Gaudet enim plurimum aquis, ut haud ferè alibi quam humectis & uliginosis nascatur locis, potissimum verò frigidis & opacis vallibus, ad fluminum ripas, unde fluminea, fluctibus apta, & amica fretis, ab iisdem dicta. Theoph. sanè in aquosis tantum suam Clethram, alibi verò nusquam nasci dicere ausus est, eumque secutus Plin. ut Virg. Georg. 1.

Tunc Alnos primum fluvij sensere cavatas. Et Georg. 2.

Fluminibus Salices trassique paludibus Alni nascuntur.

Passim occurrit in Germania & circumiacentibus provinciis: Item Gallia; sed rarior: adhuc rarior in Italia, ubi tamen reperitur, autore Matth. In Helvetia, Burgundiaque nihil frequentius. Basilæ extra Portam lapideam ad Briscum annum abundè crescit: ubi cum fructu virente Maio vidimus:

Augusto & cum fructu, seu conis, & cum nucamentis. Ac de tempore vix certi quippiam statuas. In Suintovia observavimus mense Martio cum conis veteribus, novorum rudimentis, & Iulis, iisque omnibus simul. In Ducatu quoque VViremb. Augusti sine itidens cum conis tam veteribus quam novis & Iulis simul vidimus: ut parum absit quin credamus omni penè tempore ætatis aliquid patere. Communiter tamen fructus maturascit Septembri. Gemmas protrudere incipit ac novella folia mense Aprili. Theoph. Alnum post Favonium demum germinare scribit. Virgil. Ecl. 10.

Quantum vere novo viridis se subicit Alnus. Legendum, surgit, pro subicit.

Non itaque audiendus Tragus, quamvis secura credulitate eum plurimi sequuti sint, eum ita scribit: Alnus præsertim adulescens fusco vere emicat flore, Betulæ consimili. Quanquam Alno Iuli seu flores non decidunt, sed durantur, cogunturque, ita quidem ut forma Olivas imitentur. Atque hic est Alni fructus, qui Autumno appetente maturatur. Hæc ille: qui Iulos accipit pro flore, eosque imaginariè nulla observatione putat è longo corpore in glomerem cogi, quod falsum & contra expectationem, utin superioribus abundè refutatam: Sed in florem, quem apiculis quibusdam è fluctu emicare putant, uti dicebamus, diligentiùs inquirendum. Vidimus sepius in Iulos, conos novos & veteres simul, ut dictum.

Seritur ex semine Alnus: atque ipsa aded se satiat, hiantes sub autumnum cono, exidentè que sua sponte seminio. Serenda in sepius pratorum, quia gramen melius provenit sub eius umbra, & folia decidua impingunt folium. Accenda verò ab arvis & frumentorum agris propter frigidam & nocivam umbram, sub qua nec frumentacea, nec legumina, nec linum, aut Milium, aliave similia rectè & feliciter proveniunt, ut observavit Aug. Gallus diligentissimus apud Italos Geoponicus. Tonsa densior fit & ramosior, & rura ab invasione torrentis irumpentis quodammodo munit.

Folia Alni viridia imposita, ut scribit Tragus, tumores discutiunt, & inflammationes resingunt. Hæc tabellarii alique si quando in astu defatigati fuerint, ut commodè pedibus incedere non queant, calceis imponant: hæc enim ratione dolor mitigabitur, & calor & lassitudo extrahetur. Folia Alni viridia, rorè que manè madentia, conclavibus inspersa, ac post horæ spatium rursus amota, purgato condavi, pulices fugant: nam hisce foliis hærentes exigi possunt. E cortice Alni color ater conficitur. Insectores namque & pilearii Cortices Alni & ferrum vetus aqua per aliquot dies macerant. Hinc color efficitur niger, atramenti similis. Theoph. sanè Alni corticem & coria tingere scribit. Prædicta ratione cum ferro maceratum huic usui applicant futores. Alnus inquit Matth. efficit manifestè, sed in frigiditate & caliditate parum à mediis abest. Præstat cortex, quod magis adstringat, Gallæ vice, tingendis atro colore. Sunt etiam qui cortice & Alni fructu viridi utantur, gallarum vice, ad scriptorium atramentum conficiendum, addito gummi & calcantho. Alni cortex, autore Dod. refrigerantem & adstringentem cum siccitate facultatem obtinuit. Incipientibus inflammationibus utiliter imponi potest. Conducit quoque ad oris & tonsillarum inflammationes, ac tumores veluti Nucum Juglandium cortices. Alberto autore, Alni folia ex ferventi aqua tumori sunt remedio, suppurationesque discutiunt. Ea quoque super inventum esse scribit Curtius, siue viridia, siue arida sint, vetustis vulneribus sepius imposita, hæc ad sanitatem perit cere. Fertur & corticis succus ad ambula facere. Interior Alni cortex, rubeus nonnihil, inquit Cam. cum momento aluminis in vino coctus gingivas corroborat, detinuitque dolores arceat. Idem calidis oris & gutturis tumoribus prodest. In obs. Lobelii errore typographico Alno tribuuntur vires ad Betulam pertinentes. Materies eius difficulter ardet. Commendatur à multis ad navalia. Inservit & lin.

Tragiopino reser.

Corticis

Cultus.

Vires & ulsus. Tumores inflammatio.

Andynamia plantarum pedum rai bellariorum.

Contra phlegmas.

Tinctura.

Téperaphi.

Atramentum.

Corticis temperam.

Inflammatio.

ma. incipiente.

Oris & tonsillarum.

Tumor.

Phlegma.

Pulveris.

Setera.

Ambrasia.

Dentes molibiles.

Dentium dolor.

Tumor gutturis.

Ad navalia.

lin.

*Vasa Culi.* vasis vulinatis, sutorumque formis, nec non corum, quibus messoris utuntur, receptaculis consociendus utile est.

Falluntur igitur ii, qui, uti Ruell. scribit, Alnum duntaxat scopis nascentem, nullum ferre fructum prodiderunt. Nam & hoc falsum esse supra docuimus. Et ad scopas inutiles esse ipsi docet fragilitas: nam ne minimum quidem flecti potest. Hinc illud solemne apud Germanos de Alno proverbium.

Rot haer / Vndt Erlen bogen:

*Proverb. de Alno.*

Hoc est rufi, & qui capillitio sunt rufi, & arcus ex Alnoligno confectus si probe se gesserint, laudem sanè meritos: quod experientia doceat contrarium. Alni quoque apud Plin. sepes muniunt, contraque erumpentium amnium impetus, riparum muro, in tutela ruris excubant in aqua fixæ, cæseque densius innumero hærede profunt.

*Ad adifici-  
c. tum  
dament.* Sed non postrema Alni utilitas ac dignitas est ad adificiorum fundamenta: Nam ut scribit Vitruvius, Alnus, quia non nimis habet in corpore humoris, in palustribus locis infra fundamenta adificiorum palationibus crebrè fixa, recipiens in se quod mens habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immensa pondera structura: sic enim in vulgaris Vitruvii codicibus mendosa legi debere non malè doctus, censuit Budæus. Vitruvium secutus Ruell. eadem utit, additque, & sine vitis conservari, quod aëre sit & igni plurimo temperat, non multum terreno, humore paucio. Itaque non posse extra terram paulum tempus durare, sed in humore obrutam, permanere ad diuturnitatem. Multaque adificia sub fundamentis eius generis habere palos. Sed cur Alnus sub aquis duret nec putrescat, aliam à Vitruvii & à Ruellii profert rationem acutissimus Scal. nempe quod humidum habeat communis naturæ, cum humore advertito: non enim aquam sub aqua putrescere, quod nihil invehatur peregrini: quæ subtilitas planè contraria est rationi Vitruvii, qui ad humoris inopiam, uti dictum, causam retulit: Ruell. verò & ad hanc, & ad aëris & ignis plurimi, terrenæque substantiæ paucæ temperationem.

*Cur Alnus sub aquis non putrescat.*

Sed enimvero magis arridet Scaligeri ratio: quem optassemus eandem eodem tenore lapidescentis Alni causam exaggerasse. Sed circa hos scopulos nobis alio loco, alioque tempore velandum. Illud tantum dicamus si non multum terreni habet Alnus, cur tam facile lapidescit. Lapide sanè verò, nihil ferè magis terrenum. Aut si ignis cum aëre temperatus in causa sit, citius hercle patietur ab aqua, ob qualitates contrarias: A contrariis quippe omnis passio & alteratio. Sed nec Vitruvius temerè concesserimus humoris in Alno inopiam, quam non frustra poturam & fluviale dixerunt poëtæ, & quam non nisi aquarum alumnæ scimus. Immo in humidi exuperantiam & siccæ seu terrestris substantiæ defectum eius fragilitatem referimus. Sed de his aliàs. Hic enim potissimum nostri spectandum: alibi non. Illud certum & indubitatum, palos eiusmodi sub aquis infixos, temporis progressu lapidescere, ut multi nobiscum testantur, vidit Tragus, & nos Alni frusta lapidea plurimis locis: apud incomparabilem illum naturæ sententiarum Vlysses Aldroandum Bonon. & magna vidimus frusta: apud Calceolarium Veronæ, & Venetis multis in locis, in

*Cur fragili-  
lit.*

qua nobilissima & verè regia civitate nobis pto certo à fide dignis relatum magnis etiam sumptibus accersiti soltam Alnum ad facienda palationum & adificiorum sub aquis fundamenta, non modò quod crebrè fixa ad æternitatem maneat immortalis, uti Vitruvius dixit, sed quod ingentes admodum ferat etiam moles, ut annotavit Matth. Et ut ille ait, in Mulao Calceolari:

... Videas lapidescere Sarni

*Ceruleo sub fonte Alnum, Filicisque maniplos,  
Et palea intortos leno cum vimine culmos.*

Nec contenta ingens hominum solertia istud scisse, nisi & ipsa ad imitationem naturæ, artificio quodam, sed & naturæ oblectantis beneficio, ex Alno lapidem generare, vel illam in hunc transmutare possit.

Imponitur lignum, quantæ velis magnitudinis, in labra illa ampla aenea, in quibus Lupulus coquitur ad faciendam Cerevisiam: cumque percussus abundè Lupulus est, eximitur idem lignum, & arena vel glareæ in ipsis cellularis obruitur per triennium: inde cum exemptum fuerit, duratum in lapidem apparet, è quo potissimum Cortes fiunt, quibus ad ferramenta acuenda mensuræ utuntur. Recitat Gesnerus ex D. Kentmanno.

*Alnus quæ  
arte mutatur  
in lapidem.*

## ALNUS INCANA ET HIRSYTA.



**A**LNUS incana Descriptio  
Alnus & hirsuta nobis dictæ filia vulgari similia, miris tamen rotunda: desinunt enim in acumen, magis serrata & penè laciniata, subtus hirsuta & incana, non virentia, nec etià vilcosa. Color quoque ramulorum diversus, non ita virens, sed candidior. Iulos & Nuculas, ut vulgari, fert.

*Iuli.  
Nucul.*

Cæterum neque hic assentimur C. Bauhino, dicenti. Iulos hanc obtinere, quàm vulgaris. Alni breviores, qui conglobati fructum non ita rotundum, sed oblongum constituent. Nam & in hac dicimus Iulos à fructu distinctos, ut antea traditum.

*C. Bauh.*

Alnus 2. in Austria & Styria weissen, id est, alba Alnus, Clus. Alnus hirsuta, C. Bauh. Iam olim hæc nobis observata Genevæ & circa Montbelgardum variis in locis, sed humidis potissimum, uti præcedens, ut ad Dubis ripas in pago Adincurio propè Iemum D. Docurtii Consil. Ill. E. C. V. Virent. ubi licet utramque Alnum videre & pulchrè à se invicem discernere. Item in Burgundia ultra pontem rigidum, vulgò dictum, Pont de roide, versus Villars, cum Iulis & Nuculis mense Septembri. Inter Graudivillam oppidum, & pagum Fesche ad Comitatum Montbelg. pertineant. Observavimus etiam

*Locus*

*Tempus*

*trans*



trans Rhenum inter Brisacum & Burckenheim. Inter Montbel. & Porentruum itidem Septembri cum Iulis & nuculis distinctis. Nascentur & locis aquis circa Basileam inter Mutetum & Munchensteinium, & infra pagum Hünningen ad Rhenum. Alunt & Austria & Styria montana circa flumina & udis locis: etiam in Danubij insulis circa Viennam frequens est, priori commixta, teste Clusio: cui huius Alni cortex magis refrigerantem cum siccitate facilitatem obtinere videtur, quam vulgaris.

# ALNO SIMILIS ARBOR.

## CAP. VII.

**A** Nnotant Pena & Lob. in Adversariis suis, post historiam Visci Indici, coniecisse Naucleros in eadem spontulas, surculos effractos arboris. Alno quidem similis, fronde & ligno: sed tamen diversos, ratemose & muscoso flore, glomerulos conflante. Fortè [addunt iidem] duntaxat celo & agro variat. At nobis floris hanc diversitatem vix celum aut agrum variare in eadem specie videtur. Posterius indagabunt.

# DE POPVLIS IN GENERE, ET IN SPECIE.

## CAP. VIII.

# POPVLVS NIGRA SIVE ΑΙΓΕΙΡΟΣ.



**P**OPVLVS nigra in altum se attollens, cortice levi exalbedo ac incano obducta: sed ramuli potissimum albicant: materiam dura, pallescente, ac minus alta minusque scissili, quam Populi alba: quidam volunt aridam & levissimam. Radices profundiores quam in alba. Antequam folia erumpant, oculos protrudit mucronatos, odorato, luteo & pingui atque tenaci succo praequantos. Hinc folia Hederaceis similia, ex rotundo mucronata, serrata, Hederaceis minus crassa, atrovire splendens, longis pediculis appenda. Producit & quasi Iulos in longo racemo coarctatos, lanugine, tibi dehiscunt, alba plenos.

Quaedam, notante C. Bauh. ante exortum foliorum floret: at fructum non fert. Flos instar amentis colore rubente aut candicante. Quaedam fructum fert, seu Iulos, racematim com-

ptos, multis rotundis & viridibus granis conflantes: (uva Populi aliquibus) in quibus lanugo candida in pappos avolans, cui pauca semina vix minuta adpensa sunt.

Hæc αἰγείρα est apud Diosc. cuius nihil aliud quam vires tradit, & quod ex ea δάκρυον seu lachryma exsillans concresecat in Electrum seu succinum: de qua re postea. Idem & Populum albam agnoscit, quæ ei λεύκη dicta.

Apud Theoph. verò satis ampla Populi utriusque, hoc est, tam nigra, quam & ipse αἰγείρα vocat: quam alba, quæ & ἡ λεύκη dicitur: itemque Libyæ descriptio: Aegiron autem in Creta nuncupari dicitur, de nigra intelligens. Populus alba nigraque, inquit [λευκή καὶ ἡ αἰγείρα] unius sunt formæ: ambæ rectæ: sed excellior læviorque nigra: figura foliorum similis, & lignum cum caditur albedine simile est: utranque ne florem quidem habere putant. λεύκη [hæc Populus est Libyca, de qua postea.] Populo alba similis est. Quidam Populum nigram solum sterilem esse putant, ut Arcades: cæteras autem omnes, quæ in montibus proveniunt, fructum parere. At verò in Creta Populi nigra multa sunt fructuosa. Ac paulò antè dixit: Fructum reliqua quidem omnia ferunt: de Salice vero, & Populo nigra [αἰγείρα] & Vimo, uti dictum, varia sententia est. De Populo, annotat Scaliger, non est dubitandum: in Aquitania enim fert fructum. Sanè circa Basileam alibique locorum sæpissimè fructus prædictos ferentem vidimus, ut de hac re hodiè amplius non sit dubium.

Sed & alia difficultas oritur in foliis diversarum Populi specierum, quas nos dissimiles describimus, uti reuera sunt: cum tamen Theoph. ut ex modò citato loco patet, utriusque Populi foliorum similem figuram dixerit. Respondendum in ex ipsomet Theoph. l. i. hist. c. 16. Aliarum quidem arborum folia ipsa sibiipsis similia esse: Populi verò alba [τῆς λεύκης] & Hædæ, & Ricini dissimilia. Recentia enim seu novella, & rotunda esse: [τῆς ἰσὺς γὰρ νέα, ἀσπέρη]. Hist. L. vertit: Recentia enim Populi utriusque & Ricini folia rotunda esse: de quibus intelligere ait, cum dicit Theoph. utraque foliorum figuram similem habere. Vetustiora verò angulosa fieri. τῆς δὲ παλαιότερα γωνιεῖς: quæ non bene expressit Gaza, cum ait in angulum exire, sed nimirum Plin. potius quam solum autorem sequi voluit: qui tamen melius, quam Gaza dixit, Nigra Populo: ut Crotoni, folia in iuventa circinata rotunditatis esse: vetustiora in angulos, exire. In angulos, inquit, non in angulum. Sed fallitur uterque, & neuter vocis vim apud Theoph. exprimit. Fallitur & Plin. in eo quòd quæ Theophr. de alba dixit [τῆς λεύκης], ille ad nigram transfert: cum tamen hunc locum ex Theoph. transcripsisse videatur.

Sed Gaza etiam fallit, dum ex eo Plinii loco, nè non Pliniamus videatur, ad versionem Theophrasti, de Populo alba accommodat, verba quæ Plinius dixerat de Nigra. Ut, vel hinc pateat, quam fidus Theophr. interceptus fuerit Gaza, qui multos in erotis Barathrum cum sua versione præcipitavit. Hist. Ludg. uti dictum, ad utramque, retulit. Vox est γωνιεῖς. Sive igitur in angulos exire dicas, siue angulosa, utrumque rectè Populo alba conveniet: non item Nigra, quæ folia non habet angulosa. Errantque qui Populi alba folia in suis Herbariis non angulosa pingunt. Res eò redit, ut Theophrasto suamens, sua sententia relinquatur. Alio-

Populi  
Semina.

αἰγείρα.

Nigra &  
alba Theo-  
phrast.

Item Liby-  
ca.

Cercis.

Theob. in  
lustr.

Dubium  
de foliis.

Solutio.

Gaza rei  
prob.

Plin. c. 16  
Gaza eam  
non videt.

Gaza non  
fidus Theo-  
phrast. in-  
terpretat.

qui haud vanè quis dicat, curiosam & haud magni momenti esse hancce fatigentiam.

Idem serè repetit Theoph. l. 2. Caus. c. 22. nisi quòd Crotonis tantùm ibi mentionem faciat: non item Populi.

Potèrò quod idem Theoph. tradit, & pluribus in locis inculcat, spontanea Metamorphosi Populum albam mutari in Nigram: id nemo mortalium nobis persuaserit. Quis enim credat arbores specie & forma diuersas, distinctas foliis, fuctu, odore &c: in se invicem transmutari: si modò eandem Theoph. per albam & Nigram intelligat, quas & nos intelligimus, uti sanè non dubitamus. Nam etsi in 5. de caus. idem scribat eiusmodi mutationes ideo evenire intelligendum esse, ut quæ transmutantur aliquid similitudinis habeant. Fatetur tamen idem, *αὐτὸν τὸν αὐτὸν ἔχοντα τὴν αὐτὴν, καὶ ἀποκαταστῆναι εἰς τὴν αὐτὴν ἀποκαταστῆναι δὲ αὐτὸν εἰς τὴν αὐτὴν*: hoc est, foliis esse latioribus albam Populum, quàm Nigram, cortice leviori, & in totum succo latiore. Sed eandem in senecta ob alimentum inopiam, frondem angustiorum corticemque scabriorem acquirere, haud præter rationem putat. Sanè & nos idem putamus.

Alb Albam in Nigram transfigurari, sua sponte, sine arte, hoc est insitune, aut alia cura, id verò nobis non modò præter rationem, sed & præter naturam esse videtur, quippe qui longè maiores plurisque differentias inter eas agnoscimus, quàm à Theoph. posita sunt, atque adeò tot & tales, ut pro distinctis speciebus agnoscamus, & nobiscum agnoscat Scaliger: quem proinde ut acutissimum, & subtilissimum atque adeò etiam interdum regidum ac severum Theoph. interpretem atque censorem miramur miratius inde ferret, sed secuta credulitate præternavigasse: & nihilominus hanc mutationem passim in suis commentariis inculcasse. Consideret bene utramque qui novit arborem, & à nobis utriusque politas descriptiones, & nostræ sententia facile plausum dabit. Theoph. verò eo loco, ubi de plantarum transmutatione tradit, more suo (Aristot. præceptorem imitatus, & ut securitati suæ consulere, neque obnoxius fieret reprehensioni) non ex sua sententia eam metamorphosin tradit, sed aliorum: Quædam, inquit, totius arboris plantæve mutationes sua sponte [*αὐτομάτως*] fieri videntur: quemadmodum Populum albam in Nigram quondammodo facessere aiunt, tum foliis, tum tota facie. *Ἐξαρπύριδος γὰρ, καὶ οὐκιάτος, καὶ τῆς ἰνῆς, περὶ τὴν ἰνῆν*. Nota: *Ἐξαρπύριδος*, mirabile vocem, & de qua nihil Grammatici nostri. Nota & τὸ γένος αὐτῆς. Non feliciter itaque Gaza τὴν οὐκιάτος in totam speciem convertit. Putamus autem eiusmodi popularem persuasionem Theoph. fuisse relata, quæ viro Philosopho, & in universum generi humano nihil est pestilentius: quippe quæ & constantes animos interdum labefaceret, & curiosos ac discendi cupidos inhiberet, simplicesque v. d. irretitos occupet secuta & vana spe credulitatis, qua nunquam ad genuinam & solidam rerum cognitionem pertingere queant. Eiusmodi multa sunt etiamnum hodiè in nobilissima nostra arte Medica, licet una, falsa & præter rationem etiam à doctis nihilominus pro veris agnita ac etiam usurpata: quorum tamen non minimam partem explosit Doctissimus Loubertus in erro-

ribus popularibus, & nos non minorem sortè in hoc nostro opere.

Sed ad institutum revertamur: nimis enim digressum.

Plin. cum Theoph. tria agnoscit Populi genera: albam, nigram, & quam peculiari nomine Libycam vocat, quæ *λίβυς* est Theoph. ut dictum. Nigræ Populo materiam tribuit cuspiam, quod notandum. Idem Plin. Populis in genere tremula tribuit folia, & ipsæ foliis inter se crepitantia dicit esse, quod de Libyca potissimum intelligendum. Item Populo nullam esse umbram, ludentibus foliis, quod itidem de Libyca inaudimus. Quando verò Populum Herculi dicatam scribit, id de alba intelligendum esse, postea docebitur. Nec audiendus Plinius, quando & Populum inter eas arbores recenset, quas solas nullos fructus parere sibi credidit.

Diosc. sanè aperte Populo nigræ tribuit, cum ait: *ἡ δὲ γὰρ &c.*

Quin ipse quoque Plin. l. 24. c. 8. De Nigræ Populi viribus tradens, eius semen ex aceto comitialibus utile prædicat. Falsum autem est quod idem lib. 16. c. 23. Plin. ait: Populorum foliis grandissimam esse lanuginem. Nam nec Nigræ nec Libyæ ulla est. Et populo albæ non grandissima, sed candidissima, (uti forte legendum) superficie tenuis averfa partæ asperæ quasi farina quadam essent obducta folia. Et tamen non benè Plinium reprehendit Matth. quasi, ut ille ait, Candidam efflorescentem lanuginem in nigra Populo videri scripsisset l. 16. c. 23. Nam & hoc expressè non dicit, eo saltem loco, sed Albæ, folium bicolor, tribuit peculiariter, Nigræ nequaquam, cuius tamen folia mox subdit ex Theoph. ut Crotoni, in inventa circumatæ rotunditatis esse: vetustiora in angulos exire, quod de alba diceret Theoph. supra monuimus.

In factis literis quoque Populi sit mentio ut Genes. 30. Sed quia ibi Populum albam intelligendam putamus, id postea sub eius historia dicemus. Hermol. annotat Populum nigram Aristoteli vocari Acheroïn. Est & Populus nigra memorabilis Homeri celebratione, & loco, quod inter arbores hortorum Alcinoi commemoratur.

Avicenna Populum Nigram vocat Haurum Romanum cap. 344. Et 510. Nucem Romanam: Et cap. 311. sub nomine Hauri, confundit ea quæ de alba & nigra Populo à Diosc. & Gal. diversis capitibus scribuntur.

Ruell. de Populo nigra scribens nugatur: nam quæ dicit de ea, nec albæ nec nigræ Populo competunt, quomvis ea ex historia aliqua albæ malè intellecta, ignoranter transmississe videatur. Sic enim habet: Populus nigra, *αὐτὴ* Græcis, fronde angustiore: folia vetustiora in angulos exeunt, infernè herbacea, superiørè caridant. [quæ contrario modo apparent in alba] Et mox: Nigra, folio bicolor. Fallitur: nam talis alba, non nigra. Idem ad capit. Populi nigræ refert quæ de Electro ex Hermolao transcripsit. Planè a nobis persuademus, Populi genus neutrum Ruellio cognitum fuisse. Rectius Curtius ex hac Populo Populneum unguentum fieri scribit, quàm Ruell. ex alba, de qua re postea.

Falsò legitur apud Plin. l. 14. c. 1. Rumbotium vocari & alio nomine Populum arborem Italici Padum transfretis. Nam eò loco, non Populus

An alba  
mutetur  
in nigram.

Theoph. re-  
preh.

Scal. not.

Popularis  
persuasio  
vitiata.

popularis  
Loubertus

Matth.  
cripsit.

Popul.  
Herculis  
dicatam,  
Plin. ubi  
quæ cry-  
ret.

Plin.  
contradict.

Matth.  
prebende-  
reprehendi-  
tur.

Acheroïn  
vocat.

Auc. cry-  
Hauri.  
Romanum

Nu-  
mand.

Ruell.  
Gatur.

Eiusque  
erroris.

Plin.  
recl.



Populus, sed Opulus legendum. Falliturque Thef. ling. Lat. quando ad eam scribit, *Opulus*. Vitiola Plin. lectio cum decept.

Veteres Latini, uti notat Cordus, utramque Populum, Fasfarum appellaverunt. Est etiam herba Farfarus & Farfarella dicta, à similitudine, quam cum Populi foliis habet.

Cur verò Tragus nobis & aliis nigram Populum, dixerit albam, nescimus: Nam ea quam proponit, nigra est. Eius opinionem imitatus est Solerius.

Lonic. quoque posuit iconem Populi nigræ, pro alba, confundens cum alba & Libyca ut posita dicitur. Sed & Harchius inkite Nigram, *αυρήν* dicit.

Petro de Crescentiis, Populus nigra simpliciter dicitur Populus: Similiter & Gesnerus Populum nigram vocat. Angul. Populi secundam speciem facit. Schvuenckfeldius & Camerarius annotant Populum nigram Albarum dici P. de crescentiis: sive verò hoc ita sit, sive nō sit, (Nam Crescentii codex nobis nūc non est ad manū) nō rectè ita dicitur id nomen de nigra. Nam *αυρήν* seu albam à colore in Italia Albarum vocari Scal. testis est, cui hac in parte plus tribuimus, maxime cum & vocis vis id præclare insinuet. Populum verò simpliciter *αἰς* vocat hanc nostram. Tragus & nigram Albarum Ital. dici ait.

Hebræis *Lishach*, Gen. 30. si modò hæc Populus intelligenda, ut idem putat Tragus. Germ. *Pappelbaum* / *Sarbaum* / *Bollen* / *poppeln* / *poppelweiden* / *schwarze poppeln* / *Aspen* / *Altenbaum* / *schwarze poppelweiden* / *Sarbauchbaum*: idque, ut sit, pro diversitate Provinciae in Belg. *Populier* / *Popelaer* / *Populane* Angl. *Poplar* / *Asp* or *Esp* tree. Non tamen qualibet hoc nomine Anglis appellata est Populus nigra. Montana enim & Libyca eodem illis appellatur nomine, teste Turnero. Quapropter distinctiō d. eatur, *Black Poplar tree* / vel *Black aspe* / vel *Watte aspe*. Gall. *Peuplier*, & *Tremble*, uti notant Had. Ian. & Matth. At nobis posterior appellatio melius competere videtur Libyæ. Soler. annotat Delphinatibus dici *Pinon*, & Provincialibus *Pibulo*. Valconibus *Pibul*, teste Scal. Ital. *Propa*, eidem: aliis *Pop. li negro*. Hisp. *Alamo negro*. Bohem. *Copel*. Slavon. *Lopel* / *Copel*. Mauit. *Haur rany*. Vngar. *széte igonie* / *hibol lérónar*. Primum illud erumpens germen, cuius in medicina usus, Officinæ *Oculus Populi* vocant: alii *Gemman*. *Populi*: Græcorum quidam *σπίρνα* vocant: unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa germina resinosa, sed racematim coherentia granula, in compositione unguenti ex Populo assumenda temerè existimant, in quibus nihil resinosum. Græci certè non aliud quàm quod resinosum est, accipi volunt, licet fortassis hoc ipsum hand proprio nomine expriment. uti Dod. putat. *σπίρνα* vel *σπίρνα* *πύρνα*: id est, multa circa semen resina existit, inquit Paul. Agin. l. 7. Sed de hac te plura in viribus. Schvuenckf. famen eadem gemma *μαδάλη* Græcè dicitur: ubi hanc vocem subleget, nescimus. Germ. *Sarbollen* vocant: & *Pappel*. *fnosper*. Quæ de Populo simpliciter Epitheta habent Poetæ, potiss. ad albam pertinent.

Quid verò sit Populi nigræ succinum diligentiùs inquiremus lib. seq. inter Resiniferas, post Vernicem sive Sandaracani Arabum, Michridatis ducti autem, qui Succinum ex Cedri genere defluere dixit.

Populum nigram in variis lotis observavimus, *Locus*.

sed potissimum aquaticis: circa Basileam extra Portam lapideam & alibi passim ad elices aquarum, quibus prata & pomaria irrigantur, ordine plantatæ copiose videntur. Nullibi tamen observavimus cum suis Vvis seu racematis feminibus, quàm circa Basileam, potiss. propè Binningam pagum. Montbelgardi, quod in eod. tractu rara sit, in hortum plantandam cultivimus. Observavimus etiam Mospelji. Patavii, Genevæ, Lugduni, in Alsatia, potiss. ad tractum Rheni & propè Lauterburg, in ducatu VVitemb. Angul. in Italia vulgarem dicit. Provenit etiam in monte Baldo, teste Calceolario. Turner. in Anglia minus frequentem scribit, quàm vel in Italia vel Germania superiore. Ad Padi seu Eridani Ferratiam perlabentis ripas Populos nigras nasci Lacunæ testimonio diximus. Annotat & Ravil. Textor frequentem esse hanc arborem iuxta Spermium & Padum fluvios, qui propterea vocentur Populiferi à Poëtis. Matth. quoque ut antiqui Populum inibi nata testatur.

Theoph. auctu facilem dixit, quod ad aquas nascatur: quod verum esse cum Trago observavimus: nam brevi in altum se attollit, maxime si secundum amnes in pratis & uliginosis campis consita fuerit.

Aprili mense, aut etiam priùs, odorata gemmæ prorumpunt: Maio racemuli seu Vvæ quæ Iunio decidunt, aut certè paulò post, ut circa Basileam observatum.

Si propagare velis, ex præscripto Theoph. & Satio.

Tragi, rami deputandi sunt, ac Verno tempore uliginosæ ac humidæ terræ mandandi. Avulsione, scilicet modo, facile provenire observavimus. An bene ex semine proveniat, nondum compertum nobis. Quomodo verò Fungi nascantur è Populo nigra docet Tarentinus in Geoponicis: ut si caudici Populi nigræ confiso, & per terram strato, fortimentum aqua resolutum infundatur, fore ut illico proficiant *Agonice* fungi, quod Diosc. etiam de alba tradit. Theoph. scribit *Egerion* seu Populum nigram ex Creta translatam sterilem, quod vix credimus: ut tamen hoc verum sit, non tamen verum, extra Cretam esse sterilem. Fertur quoque Populum nigram efficacissimam in eadem insula nasci.

Scribit Diosc. Populi nigræ folia ex aceto imposita, podagricis doloribus auxiliari. [ quod de suis incipientibus potissimum intelligimus ] Resinam verò quæ ex ea profluit, malagmatis admisceri. Semen seu fructum ex aceto potum, comitialibus utile esse. Quæ verò de Populorum lachrymæ viribus tradit, & paulò ante dicta sunt, & ad succinum propriè pertinent.

De Populi nigræ temperie variè varia sentiunt.

Alis calida est in tertio: aliis in primo tantum gradu. Galeno Agiri flores calidi facultate quidem sunt, in primo recessu à temperatis: at in differentia quæ habetur in sicando & humectando, paulum quiddam ad siccius deflexerunt, sed & subtiliorum potius, quàm crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora, minusque efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, aquæ etiam calidiorum. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exicantius, non tamen admodum calfacit. Solerius apud Gal. pro *σπίρνα*, vult legi *σπίρνα*, existimans

Temper. populi nigræ diss. p. 110.

in-  
constans.

Populum albam quàm perperam nigram vocat, uti dictum, calidam esse in tertio gradu: sicque lectum fuisse aliquando ait. Manardus quoque, Oribasius atque Avic. variis in locis calefacere etiam scribunt in tertio ordine: Sed hic nulla in re tam varius tamq[ue] parum sibi constans fuisse videtur.

Serap. multos Arabes citat, quorum unus temperatæ caliditatis cum pauca frigiditate dicit: alii frigidam, sicut & Haliabas. Verùm cum de succino loqui videantur, quod ipsi Crabe vel Carabe vocant, & quod falsò Gummi Populi rentur, fabuloso errore parum dignos se monstrant, quibus credatur.

In Populo  
temperam  
exacite in-  
quiritur.

Consulendus itaque naturæ Codex, hoc est, Populus ipsa, qui ostendit ad tantum caliditatis gradum hanc arborem non extolli, ut inter medicinas tertii ordinis debeat collocari. Nam quis quæso sapor, quis odor, quæ demum qualitas tam præcellentes monstrat calores? Neq[ue] n. multum odorata, neque eximio aliquo sapore prædita: sed dum gustatur, primò quidem modicè adstringit: postea amaritudinem quandam subobscuram invehit: Olfactanti non insuave quid, sed exiguum id omnino præsentat. Si quis verò via regia, quam Gal. monstravit, incedens, experiri eam in corporibus temperatis agrisque voluerit, calefacientem non valdè inveniet. [Non tamen frigidam idèò dicimus cum Amato, quem mox refutabimus.] Paulus præterea calefacere eam scribit in primo ordine: cui Constant. quoque Monachus consentit.

Actius, interprete Cornar. taxat ad tertium caloris gradum, sicut & Gal. in quibusdam exemplaribus. Optimi tamen Codices tam Græci quàm Latini, calidam faciunt duhtaxat in primo. Oculos tamen ut odoratos, cum resina reliquis Populi partibus calidiores statulimus, uti plenius mox declarabitur.

Cùm igitur omnes calidam faciant, alii in hoc, alii in illo gradu, si quid valet veterum auctoritas, satis confutabitur Amatus, qui Populum nigram frigidam statuit. Verba eius sunt: Tenellos cauliculos, pro conficiendo Myracopo, id est, Vnguento Populeo colligunt: quo medici pro extinguendo capitis & renum ardore frequenter utuntur, illius fronte & temporibus, renibusque ipsis, ardentissimis in febribus utuntur: An verò benè, in dubium vocamus, quum vetus Galeni translatio, ἀρρηκτὴν calidam in 3<sup>o</sup> gradu esse constituat: Cui opinioni Serap. & Avic. favent, eam in 3. caloris gradu collocantes, à quibus nec Oribas. dissentit. Quæ si vera sunt, procul dubio unguetum Populeum potius calidum quàm frigidum censendum est. At revera res ipsa, inquit, non ita se habet, quum unguentum Populeum prope 3. gradum frigiditatis à doctissimis iudicetur, & quotidiana experientia ita esse attestetur. Proinde Populum frigidam esse, vel saltem non calidam necessarium est.

An ung. Po-  
puleum cal.  
Gel frig.  
sit.

At mehercle bonus Dialecticus, si Diis placet, Amatus, ab unguenti Populnei temperamento, de ipsius Populi qualitate concludit, præter omnem rationem, non considerans, illud unguentum & Mandragoram, & Hyosciamum, & Lactucam, &c: res frigidissimas ingredi. Nec ullius ponderis est argumentum ab autoritate sine ratione. Siquidem exigua rei calidæ portio in frigidam compositionem potest recipi, ad frigida medicamenta ad locos affectos deducenda, aut vehementiam insalubrium frigidorum simplicium

Amati ar-  
gumenta  
explodunt-  
ur.  
ad 1.

infringendam: utin dicto Vnguento sit: non tamen necesse est, ut ob id calidum medicamentum propter eius commissionem existat. Quod si ita fuisset ratio cinarus: Doctissimi Populū propter tantum frigiditatis gradum esse iudicant. Errant itaque qui calidam censent, rectè fuisset argumentatus. At sic antecedens negatur, productis Galeno, Actio, Paulo, Orib. Serap. & Avic. Fallit enim à parte ad totum argumentatio. Non enim si Vnguenti pars aliqua calida est, totum Vnguentum idèò calidum esse necesse est. Alioquin & sic concludere liceret: si calida esset Populus, esset quoque Populeum unguentum calidum: atqui frigidum est: ergo Populus frigida est, sed hæc ad Scholas. Cùm in unguentum Populeum ingrediuntur duntaxat uncia xviii. oculorum Populi frigidissimorum recipiuntur uncia xx xxi. debilem oculorum Populi vim superant: atqui si frigidum semper remanet, præsertim cùm Populus in primo tantum gradu sit calida, frigiditas verò reliquorum ferè omnium 2. aut 3. gradum attingat, nonnulla etiam ad quartum ferè sint frigida. Erroris autem cardo in eo versatur, quòd non animadverteret auctores in acopa indere nonnulla calida, non ad totam compositionem calidam reddendam, sed frigidorum vim deducendam, aut certè tandem retundendam. Id quod Gal. l. 9. ὑπερθερμὸς docet, his verbis: Ex Opil & Hyosciam &c:

Alterum Amati argumentum ita procedit: Gal. Paul & Constant. scribunt Populum calidam esse tantum in primo: Ergo frigida est, aut saltem non calida. Inductum sanè argumentum, & quod confutatione parum egeat. Debebat ergo concludere. Ergo Populus calida est, nullo modo frigida. Calidam namque esse in primo, est unum gradu à temperatis aut frigidis recessisse. Tertiò argumentatur: Nullum habet Populus insignem odorem saporève, quo calida posset iudicari. Ergo nullo modo est calida. Negatur antecedens, & ad eos omnes qui teneros oculos Populi nigræ degustarunt, olfeceruntve provocamus. Esti verò tantæ vehementiæ non sit vel sapor vel odor, ut in tertio ordine constituere velimus, talis tamen est, qui ius suum ordinis primè facit tueatur, ut fortè etiam accedat ad secundum, in quo sanè ordine doctissimus Turnerus, qui ingeniosissimè eadem Amati argumenta in Herbario suo Anglico refutat, collocare non dubitavit cum resina sua. Cornar. cùm videret Populum nigram adèò esse calidam, inquit idem Turn. consultissimum putavit accipere Populi albæ oculos. Vtrum autem rectè, an secus consulat, iudicabunt qui Nic. Alexandrinum consulunt, moxque speciatim dicetur.

Nobis sanè hac in parte neutiquam reiciendum videtur iudicium Tragi, qui utramque Populum albam [nam sic & nigram nostram vocat, uti dictum] medium putat obtinere temperatè humida & terreæ substantiæ, ad refrigerandi potius, quàm exalfaciendi accedens: nisi quòd oculi odoratissimo illo gummi prægnantes, aliquantum calfactoriæ facultatis habent. Ergo dicendum distinctius, oculos Populi in prædicto ordine calidos, ipsamque etiam resinam. Reliquas verò partes inclinare ad frigiditatem.

Schuvencckfeldii edicto, folia & flores digerunt, resolvunt, attenuant: Oculi calfaciunt, humedant, siccant cum partium tenuitate: molliunt, digerunt, resolvunt. Oppidò hercle festinus qualitatum dispensator. Quo experimento, quæ ratione, quo sensu foliis resolvendi attenuandique

Cur calid  
frigidus a  
mijceant

Refutatio  
2. rationi  
Amati.

Calidum  
ord.

Invariatio  
Tragi  
Populi  
per.

Schubert  
feldii  
resol.



vim tribuit? Et quis ipsi credat oculos simul humedare & exicare.

Sed & illud addendum, falli etiam in eo Amatum, dum ait, tenellos cauliculos pro unguento Populeo sumi, quod non verum: aut si alicubi fit: non bene fit: sed oculi accipiendi.

Plin. quidem dum Populum & uvas & semen ferre facitur, illas unguentis, hoc verò comitibus præsert: sed optimè monet Matth. ne ob id Myropolæ communis usus unguentum Populeum vocatum, ex Populi uvis conficiant, ut Ruell. credit à Plin. deceptus. Quandoquidem Nic. Myreps. qui illud unguentum describit, non Vvas, sed germina seu gemmas admiscet. Odorata enim sunt & ceraginosæ: Cùm tamen nullus profusus sit uvis odor, nulla insignis qualitas. Anigitur antiquitas Populi Vvas inodoras admiscuerit dubitandum sanè est.

Sed Plin. & in eo hallucinatus est, dum Muscum in Populo nascentem, nihil ab eiusdem uvis differre existimavit. Eius verba sunt. Eodem & Bryon pertinet, Vva Populi alba: Optima circa Gnidium aut Cariam, in siccibus aut siccis asperisque: secunda in Lycæ Cedro. Hæc Plin. At Cedrus nullas fert Vvas, sed Muscum odoratum. Apud Diosc. legimus, post Cedrinum, optimum esse Muscum Populeum: sed hæc ad Populum albam pertinent.

Plin. quoque secuti sunt Hermol. & Ruell. qui aiunt Vnguentum ex uva Populi fieri, quæ Bryon fit. Verùm falluntur, nec hodiè ex Vva fit: neque sanè ea etiam oculis præsertenda.

Lacuna scribit flores Populi alba vulgè assumi in unguentum Populeum, quum videantur accipiendi flores nigra Populi secundum sententiam Gal. & Pauli. Verùm considerandum esse auctores per flores intelligere gemmas quas oculos vocant, quandoquidem neutra florem ferat, ut bene ab Hermol. annotatum ait. Ast nescimus ubi Lacuna observavit Vnguentum fieri de floribus Populi, id nec in Italia, nec in Gallia, nec in Germania vidimus. Oculos pro floribus accipi non displicet, quanquam non desistantur suis floribus vel Iulis, ab uvis distinctis ambæ Populi, ut is cum suo Hermol. autumat.

Neque ijs accedendum, qui Nigra Populi oculos neutiquam assumendos putant, sed alba, quæd huius oculos frigidiores putent ijs, quostamen nos cum Manardo calidos potius, quàm frigidos censemus. Legimus etiam apud Gal. Aet. & Paulum, acopon *στανδρον*, hoc est, de Populo nigra: nullibi *στανδρον*, hoc est, ex alba, legisse meminimus.

Cordus in suo Dispensario oculos Populi simpliciter sumendos tradit, non addens, cuius. At Matth. nigra accipere iubet. Et Cronemburgius eorum improbat opinionem, qui volunt parari hoc unguentum ex oculis Populi alba. Vallet istud unguentum in omnibus calidis affectibus illitum: nariibus inditum, & temporibus ac pulsantibus arteriis illitum somnum conciliat. Eius quoque usus ad calidos dolentesque tumores. Quidam & felicitur podagris calidis illinunt. Sed ne invetere scat cautio est: aliqui vires eas perdit.

Actius & Paulus Aegineta ex oculis populi nigra Oleum Aegirinum dictum conficiunt. Verò tempore id confici debet, cùm plurimum graviss est, pragnanque resina, potissimum in gemmis. Falsò legitur in Histo. Lugd. cùm nulla est nigra illam Resina, Nam & Paulus Vere fieri

præcipit, licet Actius æstate parari iubeat, at uterque, quum multa circa sperma [sic bacca vocat] est Resina. Sumunt eius grana modicè que confringunt, & ad pondere expensum inde trientem, Olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies 40. insolant, atque ita excolatum reponunt. Est hoc Oleum calfactorium, tenuium partium, attenuat, remollit, & est odoris iucundi. Cutis densitatem sanat autore Paulo. Ad cap. dolorem valet, & illitum membris dolentibus, podagris, arthriticis & nephriticis. Alii Olei uncias 76. recipiunt: vini verò lib. 4. oculorum Populi nigra resinosorum Vere lib. 3. quos diutissime terunt: post in oleo ac vino infundunt. Septem verò sequentibus diebus quotidie eos agitare oportet. Octavo levibus prunis subiciunt, incoquantque ad vini consumptionem. Post fortiter exprimunt & in vase ad usum reponunt. Sic Curtius describit. Atque hoc propter coctionem admixtionemque vini calidius existimaverimus, & frigidioribus affectibus quoque adhiberi posse. Mirum verò hoc Oleum hodiè in Officinis nec parari ne haberi, quum tamen commodissime parari posset, & in multos usus aptari.

Oculis Populi nigra odoratis & viscosis feminæ pulchros capillos hoc modo comparant tradente Matth. Oculos cum butyro confusos olea indunt, quàm probè operculatam postquam per septem dies stare permiserint, igni tantisper admovent, quoad butyrum liqueat: butyrum hoc per linteum excolatum mundo vase reponunt, eoque capillos lotos & exiccatos illinunt: unde non tantum pulchriores sed & prolixiores redduntur.

Humor qui de Populi nigrae cavis effluit, verrucas & papulas corporisque attrita tollit, teste Plin.

Nigra sunt quod scribit Curtius ex quorundam relatione vermes hominis animalisve vulnere decidere, si horum vel pili, vel lana in apertum corticem Populi nigrae ante Solis ortum recondantur. Hoc autem Betulae quidam ascribunt.

Simile illud Plinii: virgam Populi in manu tenentibus intertrigo non metuatur.

Populi ferunt in foliis guttam, ex qua apes propolin faciant. Rami ab agricolis Octobri decerpti exiccantur cum foliis, ad pabulum hyemalis capris & ovibus.

Theophr. & Populum nigram deligit ad sustentandas vites nobilium vinorum, quod minus densa patulaque sit folia.

Populi vitibus placent, inquit Plin. nulla illarum umbra, ludentibus foliis.

Huic materia lenta, ideoque scutis faciendis apta eodem autore.

Est sanè annoque Populi lignum pulchrè crispante undarum discursu peramenum: idèoque artifices Germani ex eo varia utensilia, menas, abacos, lectorum spondas, capsellas, ostia, etiamque cohlearia & alia plurima parant. Attetiores ad rem eam in tenues alseres secant, & alia ligna ijs investunt. Alba est, sed vernice croceato undulata crispitudinem longè elegantius ostendit. Stupidos verò esse eos oportet, qui incoctas atramento Populneas assulas ad speculorum capulas ab impostoribus emunt, quale ab ijs divendi scribit Scaliger. Nam Ebeni lignum nec undatim crispum est sicut hoc: aut si Populeum adolectum, natus fortè tale non sit, at reliqua facie, & pondere præsertim, & lavore etiam politum, Ebene longè cedit.

Eius Gires.

Capillis suavis.

Ad Scrocas.

Superficia sunt contra vermes vulnere.

Intertrigo.

Apes.

Pecundum, abus, vitibus de pin.

Ligni usus, varia consilia.

Impositura.

## POPVLVS ALBA: AETKH.

Differt

Folia.

Tomen  
tum.POPVLVS ALBA FO-  
LIO MINORE.

Catuli.

Lignum.

Correx.  
Gemmae  
Populi folio  
minore.Lance Se-  
terum.

PLVRIMVM differunt Populi albæ folia à Nigræ foliis, totòque vultu aliam arborem docent. Sunt ea enim omnium maxima, Aceris maioris potius, in acuminatas circumfrolas lacinas diuisa, superne cumatro vitore fortuita lanugine donata: at inferiore parte denso tomento incano ceu Tusilaginis folia, sed magis niveo pubescunt, quo etiam oblitum sunt cum pediculis longistami. Folia observavimus manus expansæ amplitudinem facile æquantia. Quales ferat flores vel fructus nondum observavimus. Icon nostra est Gesnerina vel Cameriana: posterior lobeliana. Hic scribit Catulos ferre ante foliorum exortum, & latifolia filicis modo edere. Taber. scribit, villosos esse, & ex purpureo fuscis. Ligno est albo, quod facile finditur, cortice albo lævi. Et hæc

ut prior, gemmas in primo foliorum germinatu fert. Illa verò quæ minore est folio, non aliter ferè à prædicta differt. Hæc albæ est Diosc. & Theoph. ἡ λευκή [inquit hic] καὶ ἡ κίρκη. ἡ δὲ γρημνία καὶ ἡ ὀκρά. ἡ δὲ ὀκρά, καὶ ἡ ὀκρά. ἡ δὲ ὀκρά, καὶ ἡ ὀκρά. Variare ait folia, ut ex rotundis adolescentioribus, si veterascent, fiant angulosa: id quod Plin. nigræ quoque accidere vult, quod in nostris non reperiri ait Cæsalpinus. Eandem idem Theoph. fronde latiore, cortice læviori, atque omniaro succulentiore [ἡ περὶ αὐτὴν] dicit, quàm nigram: [ἡ αἰγίρα] sed eandem in senectâ obalimenti defecum, in fronde angustiore corticemque scabriorem abire, haud absolum putat, id quod ei facile concesserimus, quod idem fieri videamus in cæteris quoque arboribus, ut vetula strigosiores evadant. At si eam in nigram hac ratione transformari putet, ut ex aliorum relatione citat, & aliquas rationes, quare id

fiat, producere conetur, ei sanè neutiquam assentimur, ut clariùs exposuimus in historia Nigræ.

Ceterùm videtur Theoph. sibi ipsi contrarius. Theoph. sibi contrarius. Nam modò citato loco, qui est l. 5. caus. c. 8. hoc est, Populum albam cortice læviori, & in totum læviorem dicit quàm Nigram; qui tamen l. 3. c. 14. hist. πάλιν αἰγίρα, seu nigram αἰγίρα, καὶ λευκὴν dicit: foliorum verò figuram similem, simile & lignum candore esse cum caditur. Videri autem utramque florere carere. Hic Populum nigram λευκὴν dicit: ibi albam: quod miramur nativissimum non observasse Scaligerum. Nec est, quod nobis quis obtrudat, in causis eum de cortice loqui [ut sanè facit] in historiis verò folia conferre. Nam simpliciter læviorem dicit, nullam foliorum faciendi mentionem. Imò hæc non intellexisse aperte patet ex statim sequentibus: τὸ δὲ σκεῦος ἡ φύλλα, &c: priùs ipsas arbores contulerat: nunc demum de foliis transigit. Et videtur nobis τὸ ἀγροκόρεον non longè aliud esse, quàm ἡ αἰγίρα, scilicet, saltem in harum arborum collatione. At illud epitheton in causis albæ, hoc in historiis, nigræ tribuit. Utrobique verò ambas inter se confert: ut quæ ratione excusamus Theophrastum, nunc non habeamus. Cogitabimus autem in posterum.

Gaza λευκή non rectè vertit simpliciter Populum, apud Theop. l. 1. Hist. cap. 16. Magna sanè differentia in foliis est, non tantùm, quod folium albæ subtus candidum sit, sed etiam quod laciniatum. Si quis autem obiciat, Theoph. l. 3. hist. cap. 14. dicere, τὸ δὲ σκεῦος ἡ φύλλα, &c. Resp. similitudinem esse foliorum primum erumpentium, non autem adultorum: alioqui & hic sibi ipsi contrarius foret Theoph. Sed hanc obiectionem & ipse Theoph. sustulit, pauld post descriptionem ex eo à nobis adductis verbis. Nugantur qui in suis Herbariis Populum albam folio non anguloso pingunt, vel potius pro alba, nigram ostendunt, quæ folia non habet laciniata.

Plin. non benè inspexit Populum albam, quam rectè quidem folio bicolorem dicit, sed supernè candicante, infernè parte viridi. Nam contrarium apparet: supernè vires, infernè albet. Minus excusandus Lonic. qui eundem errorem commisit: qui quàm ignarus fuerit stupium, ex eo patet, quòd in hac tam vulgari planta tam turpiter cæspitat. Pro eadem exhibet Populi nigræ: cui in descriptione, quam ponit, nihil respondet: confunditque inter se utramque Populum, ac etiam Libycam. Nam folia albæ tremere dicit: ideoque Gallis Tremulam, quasi Tremulam vocari: quod veritatis Libycæ competit: folia primò rotunda, postremò angulosa dicit, cum tamen nigram pingat, atque id tantùm albæ competat: addens eius folia esse supernè alba, subtus viridia, cum contrario modo se res habeat: ut tandem nesciamus, an credendum ei sit, & de qua intelligat, cum ait: ferre fulos cinereos, qui sine fructu decidant.

De hac intelligendum quod Plinius simpliciter de Populo tradit, cum ait: Populorum foliis grandissima lanugo. Evolat candida (tradita folio numerosiore candida) ut Iulus. Quam equidem quæ sit illa grandissima lanugo, nondum videamus. Nam foliis parte inferna quod aspersum est incanum tomentum, tam grande



grande non est, ut grandissimum dici mereatur. Vnde suspicio nobis non vana, forte legendum esse, candidissimum. Cætera quoque non satis clara videntur, & parum abest, quin totum illum locum corruptum dicamus. Quid enim sibi vis vult verbis: Evolat candida ut Iulus. Si Iulum intelligit: sitita. At & relique Populi Iulos habent. Non ergo de candida sola id dicendum. In M.S. ita legitur: grandissima lanugo euolat. Candida &c: est ut Iulus. Alii sic legunt. Euolat &c: candida, & ut villi. Da-lech. sic. Evolant candida & ut villi. Idem & alibi huic folia circummagi post solstitium ait: eoque argumento certius intelligi fidus confectum.

Cæterum quicquid antiquitas de Populo prodidit, ad hanc potissimum pertinere videtur. Genes. 30. Populi sit mentio: ubi scribitur Iacobum virgas eius cum aliis ineuntibus proposuisse pecudibus, ut ostendimus in historia Cæsaræ. Nec tamen pro certo asserimus hanc intelligi oportere, vel aliam. Vetus interpres & postiores, ut Castalio, ita verterunt. In Græcis scriptum *αἰχμήν* dicitur. &c: Quid si legas *αἰχμήν*, & intelligas Populum albam. Lonicærus annotat Populum dici Hebr. eo loco Libæne: Tigurini interpretantur Weyden / id est Salicem: an bene iudicent alii.

Hermol. uvæ tribuit Populo albæ, Plinium secutus: an bene nescimus. Inquiratur. Eadem Populus & Herculi dicata consecratæque fuit, teste Plinio: Vnde Virgil.

*Populus Alcide gratissima:*

de qua etiam intelligit, dum dicit:

*-----Herculeæque arbor umbrosa Corona.*

Idem in ludis iuventutem fronde Populea velatum fingit: quod *ἥβη*, id est, Hebe, sive iuventus, Herculis uxor sit, cui Populus dicata est. Hoc autem Phisici, ut Probus ait, ad naturalem causam *αἰχμήν* referentes, Herculeum tempus significare volunt, ac ei Populum deovent: propter colorem album, quo dies accipitur, & nigrum, quo nox. Vnde Sali Herculi ad aram maximam in foro Boario sacra facientes, Populi fronde coronabantur: Vnde etiam Virgil. *Æneid.* 8.

*Dixerat Hercules bicolor cum Populus umbra Velasque comas, solisque innexa pendit.*

Et non longè post:

*Tum Sali ad cantus, incensa altaria circum Populeæ adsunt, evincti tempora ramis.*

Docent autem alii, Coronam Lauream his præfici. Cæteri verò ad fabulas referunt, & ad albam tantum Populum. Vnde Pausanias, albam Populum Acheroidem vocat: contra Aristoteles nigram. Quod primus, iuxta Acherontem Theoprotidos amnem genitam ad Græcos transtulerit. *Αἰχμήν* Homero quoque dicta, quod redux ab inferis Hercules, Populi in Acherontis ripa nascentis ramo coronatus, emergerit, Harpocratio teste, Lepida est fabula. Nam quam ad inferos Hercules descenderet, & labore defatigaretur, corona ex hac arbore complexa, caput, propter sudorem velasse dicitur: Vnde foliorum partem alteram, quæ temporibus adhererat, exaluisse aiunt: partem verò exteriorem, propter inferiorum calorem nigram permansisse: eosque colores sic in ea permansisse, ut bicolor postea fuerit. Alii autem eum ab inferis redeuntem, primum arborem istam contemplatum se inde coronasse, conveniente plantæ colore albo huic eventui, quum è tenebris

in lucem commearat. Eandem causam & Pausanias refert: proindeque [addit] non aliudigno cremari victimas in Elide Iovi Olympio. Alii denique dictam ita tradunt, quod Hercules devicto Cerbero, Populum arborem ex Acheronte detulit frondibus eiusdem coronatus.

Aristoteles omne solū sylvosum arborosumque, Acherusia dici prodidit: ad quod fortè alludens Poëta festivissimus, Vlmorum Acherontem dixerit in Amphitruone. Horat.

*Tempora Populeæ fertur vinxisse Coronæ.*

Theocr. *ἰδ.* & *λαβὼν ἡρακλῆος ἱερὸν ἔργον*: quo loco interpres scribit Populum sacrum esse Herculi.

Pausanias in Eliacis scribit Populum etiam *αἰχμήν* ab Homero appellatum.

Lambinus suspicatur bicolorem dictam Populum, quod & alba & nigra in hoc genere sit, quæ Populus dicitur. Sed potior est illa ratio; de quod frons Populi etiam albæ rævera bicolor est. Apud Horat. *Carm.* 1.2. *od.* 3. legimus:

*Quæ Pinus ingens, albæque Populus*

*Umbra hospitalem consociare amaris*

*Ramis, quæ obliquo laborat*

*Lympha fugax trepidare rivis:*

Item *Epod.* lib. *od.* 3.

*Ergo aut adulta vitium propagine*

*Altas maritat Populos.*

Contra *Od.* 5. l. 4. Populum, Vlmum & similes arbores viduas appellat; quæ vitibus carent. Quid si legendum cum Lambino dicamus, albas maritatas, nisi & superius quoque legendum sit: altaque Populus. Viraque lectio ferti potest.

Texebant (ait Parnthasius in Claud.) sibi Bacchæ coronas ex alba Populo, & ut ait Harpocratio, iuxta ripas Acherontis enata.

Populum albam Plautus Farfaram appellat: à foliorum multitudine, ut quidam volunt. Quid si dicamus à foliorum similitudine cum herba Farfara, cuius folia iidem inferna parte albicant? Prosternebam eos [inquit in Pæn.] ut folia Farfari; quæ levi impulsu venti alicuius Autumno universa aliquando cadunt.

Porrò ut ad historiam redeamus, pleraque quæ Ruell. *id.* de Populo alba tradit, Libyæ potius competunt, quam nos Cæcilia Theoph. censemus, multum ab hac diversam, atque adeo tota specie. Huic illæ voces, Tremula, Trambula, non albæ competunt, & etiam à vulgo tribuuntur. Idem cum Hermolao Plinium tribuantem potius, quam naturæ codicem inspicit, ut diceret, Populum albam foliis esse infernè herbaceis: nec ex nostra alba hodie paratur unguentum ut ille ait, nec ex sua Tremula: nec scopis tantum natæ Populi: nec infelices damnatæque religione; quod neque semen ullum, neque fructum ferant, ut oscitanter cum Plinio assentit. Denique nec Bryon est uva Populi: ut quid veri in ea historia, habeat præ erroribus vix appareat.

Eisdem plerisque errores & Curtius habet, Curtius suis gillat. Alciatus, Alciatus, pingit, & albam vocat.

Tragus Populi albæ alteram speciem hanc facit: nam priorem albam dicit, quæ nobis nigra est.

Ryffius iconem proponit Populi nigra: nec tamen declarat aut scribit, quam intelligat. Albarus, Pet. de Crescentiis.

Asiæ, speciem Populi inquit Scal. à colore quoque in Italia Albata. Nihil igitur fuerit

Gaza scilicet  
alios fallit.

Theoph. &  
Plin. miror.

Epitheta.

Pop. Hera-  
clea.  
Pop nigra  
Soleris  
mali.  
Cass. Dur.  
repreh.

Larfolia.  
Arbor ad-  
mirans.  
Schueneck-  
feldius.

Locus.

Nomina  
linguar.

Locus.

Lucianus  
vult.

impedimento quominus apud Theoph. Albaram  
Latine vocaret Gaza, qui & alibi alia fingit, &  
multis locis, ubi est utrumque *albarum* & *albarum* al-  
terum omittit, ut h. c. s. ubi *albarum* simpliciter  
populum vertit, & *albarum* omittit, pro ea repo-  
nens Albarum, cum tamen paulo ante *albarum* Al-  
barum reddidisset. Tanta est huius interpretis fides  
se & alios fallentis. Nec tamen verum quod  
Theoph. *albarum* seu sterilem dicit *albarum*, & *albarum*,  
hoc est, tam albam quam nigram Populum. Ex  
quo loco Plinius eandem infelices damnataque  
religione dicere ausus fuit, eandemque arbores  
ciat, quas hic *albarum* Theoph. dicit. Sed de hac  
re iam prius dictum.

Dicitur & Virgilio Candida Populus: Populus Al-  
cida gratissima: Populus in fluvio pulcherrima, & a-  
licubi, Populus solida. Huic & aliis Poëtis, bi-  
color, nigris, alba, alba, alba, phaeobuntis, glau-  
ca, frondens, ardua, &c. Populus Heraclea, cana, um-  
brata, frondosa, Guidoni de Fontenaya. Mirum quo  
consilio Soleris hanc Populum nigram dicere au-  
sus sit. Minus placet eandem Castori Dur. & Po-  
pulum nigram, Germ. *Aspen* & Gall. *Tremble* di-  
ci: nam nec nigra est: & uox *Aspen* sicuti *Trem-  
ble*, Libyca competit. Lob. priorem, Populum  
albam latifoliam: posteriorem minoribus foliis, pin-  
gens utramque dicit. Arbor admirans vulgo, in-  
quit Schueneckfeldius, ob folium bicolor, super-  
nè candidans, inferiore parte viride. Hæc ille.

Eo quæres nunc rediit, ut & arbores iudicio  
prædixit mirari audeant, quid miremur in illis.  
Miretur tanè Populus, cur se non propius inspe-  
xerit bonus ille vir, sed ex aliorum ore suæ fron-  
dis colores invertere sit ausus. Contrarium si di-  
xisset, non Arbor admirans, sed Admiranda nobis:  
seu Admirabilis, ut ille dicere voluit aut debuit,  
restitisset. Sed hæc ad scholas. Leuce etiam Lat.  
dicitur. Arab. *Haur*. Hebr. *Libas* teste Lonicero,  
*Lishach*, Trago. Germani autem luxuriant in huius  
arboris nomenclatura idque pro regionum varietate.

Is enim dicitur, *weiß Alherbaum* / *weiß Pop-  
pel* / *weiß Pappelbaum* / *weiß Pappelweiden*: *Pa-  
pelbaum* & *Pappelweiden*, etiam simpliciter,  
*Sarbaum* / *Abelen* / *Bollen* / *Poppelbaum* / *Ab-  
bichbaum* / *Papierbaum*: quæ duo postrema no-  
mina Schueneckfeldius adiecit, quorum alter-  
um Papyri arborem denotat: alterum admira-  
tionis arborem. Belg. *Abelboom* / *Popelen-  
boom*. Angl. *Whit aspe* ou *Pophier tree*. Gall.  
*oheau*, *Aubel*, vel *Obel*: Provincialibus *Aulbero*:  
Vascon. *Viole*. Ital. *Popolobianco*, *la pioba*, *Albare*.  
Hisp. Castil. *Alamo blanco*. Catal. *Alber*. Portug.  
*Amievro* & *Alamo branco*. Bohem. *Topol*. Slavon.  
*Topel*. *Topel*, teste Hort. Lusit. *Vngar*. *Zeg-  
nycfa*.

Plinio autore, Populus montes amat: at con-  
siderandum an hanc intelligat, an potius Liby-  
cam! Nam paulo post ait: Populos in aquis  
provenire: quod & Theoph. dixerat. Nam in  
partibus ad Rhenum sitis, locis humilibus, & uligi-  
notis tractibus pratique nasci gaudet. Frequen-  
tissima nascitur utraque Populus in agro Man-  
tuano ac Ferratiensi, non modò in Padilitori-  
bus, sed & per agros & prata in fossarum aggeri-  
bus, ut testatur Marth. Provenit & in monte  
Baldo teste Calceol. Scribit Turner. non me-  
minisse se in Anglia vidisse, sed in Italia iuxta  
Padum frequentem observasse: ut Lucianus con-  
spicilio eguisse videatur, quando ad Padum nul-  
los Populos se vidisse scribit. Neque verisimile  
est post eius ætatem deum ibi consitas, etiam

longè ante eius tempora ibi natæ Populi celebra-  
te fuerint à scriptoribus, adeo ut & Populifer, Padus rivi  
pulifer.  
uti dicebamus, à Poëtis nuncupatus fuerit Pul-  
chra atque procerâ videatur propè Basilicam ver-  
sus arcem Binnigen. Nostra cura Argentuariis,  
vulgò Horburg, in arce E. C. V. Vitemb. è vicinis  
locis accersita & in orto Montb. plantata. In  
Lotharingæ sylvis etiam observavimus. Illa ve-  
rò quæ minore est folio, frequentissima est in  
Brabantia, teste Lob. Nascitur etiam circa Basi-  
leam, quæ tunc ad novam domum.

Leuce aquarum prævida, non modò avul-  
sione, sed & summis ramulis facile pullulat, au-  
tore Theophr. Aucta facilis est. Sed celerrimè  
pulcherrimè quæ germinat ex avulsione, uti fili-  
ces. Eam etiam si quis prægrandem, & cum ar-  
bore se exaquantem transfulerit, optimè perdu-  
rare posse idem tradit. Desixam feri nunquam re-  
culturæ: Proinde non solum semine, radicæque  
germinationem, sed & hanc assignari posse. In  
agrorum circuitu potius plantanda, quia umbra  
eius nocua, & radices magnas & copiosas fundit.  
Quamquam & hoc commodi habeat Populus,  
quod loco vitioso & sterili benè proveniat, ut  
observavit Aug. Gallus. Superstitiosum utique  
quod Theoph. inter alia arborum quarundam o-  
stenta prodidit, Populum albam Stagyris in  
Musco prociuum sua sponte resurrexisse. Credat  
qui volet. Vitium cautè hoc est, pericarum vites  
sustinendum. Populus alba scribitur bipedaneo pa-  
stinatu, taleæ sesquipedali, biduo siccata, palmeo-  
dali intervallo, terra superiniecta, duorum cubito-  
rum crassitudine, ut docet Plin. Sed qua ratione  
Vlmæ instituas, & ad eius imitationem & Po-  
puleta [nam & hanc desiderat Vitis] ad vitium  
sustentationem, seu, ut prisci loquuntur, ad ma-  
ritantias vites, ampliter traditum in Vlmi histo-  
ria.

Populus vitibus placet, inquit Plin. Idem Po-  
pulus inter frigidissimas recenset, quod sit aqua-  
tica: lentissimè quæ dicit & scutis faciendis aptis-  
simas, quarum plaga contrahit se protinus, clau-  
ditque suum vulnus, & ob id contumaciùs trans-  
mittit ferrum. Sed eum ad materiem potissimum  
respexisse certum est, quæ ad eisdem usum cum  
nigra accommodari potest & solet. Ignibus di-  
catum Populi lignum multum eractat fumum in-  
quit Ruell. Diosc. Populo alba vites has tri-  
but: eius cortex uncia unius [alij, denarij, & re-  
ctius inquit Dod. in Græco habetur *ἑκατόντα* *ἰσχυρὰ*  
*ἰσχυρὰ* nec prior dosis superflua nobis videtur  
corticis nulla vehementi qualitate præditi. ] pon-  
dere potus Ischiadicis & Stranguriæ seu urina  
stillsicidii prodest. Traditur & conceptum pro-  
hibere seu admere [ *ἀντι-ῥοι* ] si cum mulino  
renebibatur. Sed & folia post purgationes cum  
vino pota idem præstare dicuntur. Tepidus quo-  
que soliorum succus aurium doloribus utiliter  
instillatur. Piliulæ verò quæ primo soliorum ger-  
minatu erumpunt, [ *ῥοι* vocat: intelligere vi-  
detur gemmas ] trita & cum melle illita oculo-  
rum hebetudini [ *ἀντι-ῥοι* Al. *ἀντι-ῥοι* ] meden-  
tur. Ne defuncti qui memoria prædidierint, tum  
alba tum etiam nigra Populi corticem in tenuia  
frusta concisum, ac Rerocatis areolis sparsum &  
quasi satum, quavis anni tempestate fungos edu-  
les proferre. Plin. Populi alba foliorum succum  
calidum aurium dolori conferre ait: & simpliciter  
prodest. Hoc & Serenus testatur.

Sæpius oculis visâ coxendice morbus  
Perfurit, & gressus diro languore moratur,  
Populus



*Populus alba dabit medicos de cortice porus.*

*Gabasterforis facultatis Populum albam dicit, et  
temperatura efficit, ex aqua tepida et terrenis  
extenuata efficit. Hinc fortè Schuencfclius  
dicit occasionem fumpfit Populum albam habere  
re vim humedantem & ficcandi. At aliud efficit  
contrariis qualitatibus mistum effe: aliud con-  
traria præferre, hoc effe, simul humectare & ficca-  
re posse. Eadem ratione quis dicat vinum calefa-  
ciendi & refrigerandi vi pollere. Sed hic non dis-  
putandi locus. Ipse videtur, quo experimento hoc  
dixerit.*

Cautius Dod. in hift Gal. Folia, inquit, & cortex Populi temperata funt in calore & frigidityte nonnihil tamen fice & abftergentia. Porta albam quam nigram humidiorẽm dicit: Lacuna tam albam quam nigram calidas dicit in primo gradu, & paulo ficiores, quam temperatas : & habere partes tenues. Præterea efficacioreẽ effe flores ramis. Refinam eodem temperamento effe, niſi quod nonnihil calidior fit quam flores. Folia decocta potu tomiumbus mederi Schuuenchfeld, tradit: & ambuſta fanare impoſita.

Nic. Goddinus in Chirurgia militari Populi lanuginem commendat ad fluxum sanguinis, quod & Holler. facit in instit. Chirurgicis : sed molliter evelenda vel abradenda.

Nolimus hic cum Alberto impiè docere modum cauſandæ fertilitatis aut abortum cum Populo. Fortè & nimis id dictum ex Dioſc. Taliſuis autoribus relinquenda, nec in vulgus ſpecialiſpergenda & explicanda, ut quidam ueteriorum, ſpecialiſque eques quidam, cui tamen votum erat caſtitatis. Sæc peritoſiſſa fuiſſe, ut obuiam ent. Sanè aranei ex herbis uenena; ſole apes mella colligunt. Lacuna, ut antè monuimus, ex huius oculis fieri unguentum Populeum ſcribitur ubi, non doctè dicto non credimus.

pufilli, albidī. Oculi acuti, nitidī, ſpadiceī. E  
ſemine ſuo, inquit Tragus, quod Salicis quatuor  
generis ſimile cernitur, revivifcit. Contrā Mat-  
th. fruſtu nullum, nec flores ferre ſolere au-  
ſus eſt, cum tamen ipſemet paulō poſt ſibi mani-  
feſtē contradicendiſcribat: Semen legi antequam  
rumpatur, & ſiccari in umbra, Mendacem oportet  
eſſe innotem.

*Kegris* hæc apud Theophr. cuius nominis ratio- *Cercis*  
*Theophr.*  
nem nullam adhuc videmus. Fieri potest, ut  
*κέρκισ* irreperisset, pro *κέρκισ* aut *κέρκισ*, vel *κέρκισ*, à  
*κέρκιν*, crepitu & tremulo concussu foliorum  
motu, id quod Plin. læpenumero Populo inge-  
nere tribuit, & nos potissimum in hac observa-  
mus. Theophr. *κέρκισ* Gazæ Populum Alpinaum *Populus*  
*alpina.*  
verit. Est quidem hæc magis alpina quàm ca-  
teræ Populi species : at non ided decuit Gazam  
interpretis fidem excedere, & novum Theophr.  
affingere nomen, præsertim tale, quod nihil rei-  
nûs quàm *κέρκισ* exprimat. Si fingere voluit, cur  
non Tremulam dixit. *Gazæ n*  
  
*Reall*

Ruell. Græcum nomen, quasi Græcè nescisset, omisit. Alpinum ex versione Gaza, Libyam ex Plinio appellavit. Hermol. Alpina homen non posuit: non posuit Cercidos, & dixit: Nostros facere tria genera: quasi verò non & Theoph. totidem faciat. Nemo enim est, inquit Scal. qui Cercida Populi speciebns non annumeret, si earum communes differentias contempletur. Ruell. hoc amplius eravit addidit, qui Alpinam cum Libyca coniunxit: utranque confundens. Quippe si Alpina est, Libyca non erit. Nam & cæli segmenta alta, & natura loci longè diversissima. Scaliger putat non convenire Plinianam Libyam cum Cercide Theoph. quòd Plinius folio miniam ac nigerrimam dicit. At Theophr. *φύλλον χροῖον σκεδὺν ὕδρον, τὸ ὅσον, ἔχον τὸ πᾶν*. Hic nihil nigrioris intelligas, tantò minus illius maxime nigri. Sic Scal.

At nobis Libyca Plinii & Cercis Theophr. eadem videtur. Nam quod Plin. Libycam fiam folio minimam dixit, & nigerrimam, sine dubio, id cum respectu ad albam dixit: quamquam & sic nigerrimam licentiosius dixit. Nigrior est, quam alba. Illud verum huic folia esse minima inter ceteras Populos. Quod verò eandemidem, fungis enascentibus laudatissimam dixit, id de alba Diosc. Profecto non displicet lectio codicis m. l. quæ, ut annotat Dalechamp. ita habet: Quæ Libyca appellatur, minima folio, & nigerrima evanescentibus fungis. Laudatissima alba, & c. Quæ lectio si bona & genuina, iam nihil amplius habet scil. quod quintetur. Est enim vera. Nam autumnii sine cessantibus fungis, hoc est, non amplius erumpentibus, arbores totas penè nigra fronde vestitas vides, antequam folia decidant.

Sed & Theophr. descriptionem producamus. *Descriptio Theophr.*  
Cercis, inquit, Populo alba similis est, cum ma-  
gnitudine, tūm quod ramos albicantes quoque  
habeat: [ *Ἰν Ἰνδῶν*: & verum hoc, ut diximus  
in descriptione: præsertim in inferioribus. ] folia  
fert Hedera, sed partim angulosa, partim oblon-  
ga & in acutum fastigiata: colore parte supina  
pronaque ferè simili, pediculo longo & gracili  
pendentia, ideoque non recto sed reflexo & nu-  
tante. Cortice vestitus aspersiore, quam Populus  
alba, scabrioreque, Pryn hylæstris in modum.  
Hæc Theophræde Cercide sua, quam utriusque Po-  
pulo subicit. *Quæ* sanè appositè in Libycam  
nostram quadrant: nec alia hæcenus inventa,  
quæ Cercidi melius respondeat. Nobiscum quoque  
sentiant Anguil. Solerius, Matth. Hist. L. 6.

POPVLVS LIBYCA. ΚΕΡΚΙΣ  
THEOPH.



POPYLVS Li-  
bycafacile &  
breui tempore in  
magnam excreuit  
altitudinem, rad-  
icibusq; reptan-  
tibus latè se pro-  
pagat : Cortex  
partim nigricat,  
partim albicat.  
Folio est conti-  
nuidè tremente,  
breuiore, rotun-  
diorè quàm ni-  
græ, per ambitum  
crenato, fuperna  
parte virescente,  
inferna ex cinereo  
candicante, ac  
propemodum  
glauco, [ Matth.  
folium esse notat ]  
Erius in extremo  
& subtus incana,  
cedentia; qualia  
necias quinque cir-  
cei & filici coloris,  
similia : quibus  
medio apices per-

& alii. Vitrarius qui reliquarum meminit, huius oblitus est.

*Tragi opino-  
risus.*

Non assentimur Trago, hanc inodoram facienti. Eiusdem albam odoratam, nigram esse, antea demonstratum.

*Non est à Germ.  
Pop. alba.*

Falluntur quoque, ut bene notat Cordus, qui Populum albam esse existimant arborem, quæ non est à Germ. Ein aspen nominatur. Hæc est; Populi species à Plin. Libycæ sive Alpina dicta. Sed longè turpius fillitur Lonic. qui hanc non modo Aspen vocat, sed Aeginum seu Populum nigram quoque dicit, quando ait folia ei perpetuò tremere. Is etiam lib. 4. cap. 28. huius nomina confundit cum Populo alba & veriore nigra: nunc [ci. 29.] pro nigra exhibet: licet non habeat oculos odoratos, qui simile quid cum succino seu Electro fundant, quod ille ineptè vocat das Gummi deo Aspenbaums.

*Theoph. il-  
lustr.*

Pena & Lob in Advers. suspecti sunt *Aspenbaums* Theoph. esse arborem ludæ: sed Lob. in suis Obs. eam sententiam mutavit, & Populum Libycum dixit. Est quidem *Aspenbaums* quædam siliquata apud Theoph. lib. 1. hist. cap. 19. sic enim ait: Quædam arbores semen in siliquis inclusum habent, ut Ceraunia, quam Ægyptiam Ficum vocant, Cercis, & Colutea Liparæ. At in nostro Aldino Codice non *Aspenbaums*, sed *Aspenbaums* legitur: sicque legendum vult Solerius. At quid Galla seu *Aspenbaums* ad siliquas? Scaliger vult legendum *Aspenbaums* sic: Ita & Dal. & Hist. Lugd. Ergo dux fuerunt Cercides apud Theoph. siliquata, & non siliquata de qua hic agitur: Nam in huius descriptione quæ satis ampla, & paulò ante à nobis adducta, siliquarum non meminit.

*Non est  
Ceraunia.  
Tremula  
Sind. Trā-  
bula.*

Non placet eorum opinio, qui Cæterum Theoph. eandem cum Populo Libycæ faciunt. Huic propriè competunt illa nomina *Tremula*: *Trambula*, quoniam longis & gracilibus petiolis pendencia folia levissimo autæ afflatu tremunt, tremulæque excitant murmurillum. Ob eandem causam Gallis *Tremble* & à Belgis *Vlateker* dicitur. Delphinæbus *Tremm*, & *Tremblen* Germ.

*Nomina  
Linguar.*

*Libyscher Pappelbaum Zitterpappel*. Sed plerisque *Aspen*. dicitur nonnullis *Zeilgen* oder *Görzenholz*: id est, idolorum lignum: fortè quoddam Idola ex eo sculptantur. Dicitur & Flandris *Niespenboom*: quibuldam Gallo-belgis *Niespe*. Ital. *Popolo montana*. Angl. *Asp* / vel *popler of the montains* & *Asp* simpliciter. Scotis vulgò *Quacking asp* / id est, tremula *Populus*. Vng. *Uyar* fa.

*Locus.*

Esti verò Plin. *Populum* simpliciter dicat amare montes, tamen id de hac potiss. intelligendum, quanquam & in uliginosis sylvis nasci gaudeat, inter Betulas. Toti Germaniæ & Bohemiæ familiarissima. In Suncovia propè Basileam, ubi plurima crescit, passim ferè cum plurimo visco observavimus, & lulos antè folia proferentes, Martii fine. Abundat etiam circa Montbelg.

*Tempus.*

Libycæ *Populo* easdem facultates cum cæteris tribuit Matth. sed imbecilliores. Tragus suam *Populum* nigram [ita vocat Libycam] tradit ex quorundam sententia calidæ ac nonnihil siccæ qualitatis esse. Hodiè magni in medicina est usus. Scribit tamen Schvvenckf. Nucamenta Appli collecta aceto macerata, contra Hemorrhagiam convenienti medicamento imbuta natibus indi.

*Ligni usus.*

Ligni materies quæ candidiss. ac leviss. à tortionibus (inquit Schvvenckf. expetitur. Ex eadem, propter levitatem *Calopodia* parantur,

& in imagines exculpitur. Passavantii, Abbat. Murbacensis oppido; Burgundiæ conterminuo, vidimus detrahi corticem iuniorum arborum ad altitudinem hominis, pro facibus, *Brandins* vocant: quem aiunt ardere faciliè, nec minùs lucere quàm faces quæ ex Abietino ligno, aut etiam quæ ex cera & resina, quales cum Ellychnio parati solent. Dal. manu annotatum invenimus, Nortmannis *du Syle blanc*, dici & nasci in fluentium aquarum ripis, cuius lignum carbonem præbeat ad conficiendum bellicorum tormentorum sulfuratum pulviculum optimum. Putamus eum hanc arborem intelligere, aut certè unam ex prædictis *Populi* speciebus: Fortè albam.

*Facies.*

*Carbonem  
ad tormen-  
torum fa-  
ciem.*

## POPVLVS NOVI ORBIS.

## CAP. IX.



Novo orbe, non ita dudum, nec minùs elegantes, nec parum similis arboris ramos prægrandes Angli mercatores, uti referunt Pcn. & Lob. in Adv. illic reversi attulerunt, quorum Morgani dono iconem exhibemus. Virgulta sunt aliquantùm flexuosa, & per semipalmum palminque crebra, geniculata, veluti insertione commistura; partium nodosa, unde ex-

*Folia.*

cunt è singulo pediculo singula folia, ora exquisitè rotunda, nec uspiam, nisi quæ pediculus hæret, intercisæ, crassæ, rigida, laciore. Arbor Indæ: cui *Populi* alternatim exeunt prælongi loruli, stipati acinulis multis exiguis, planè *Populiciti*. Quare & hanc *Populum* Peruvianam vocare visum fuit.

*Acini.*

Gustu est perquam astringente, aliquantùm calfaciente, subfalso. Eandem Hist. Lugd. exhibet *Populi* Americæ nomen.

*Sapor.*

Est & *Populo* similis *Tacet*—*quebit*, ligno summi candoris, resinæ *Thuri* similis: de qua lib. seq. inter resiniferas.

*Tacet.*

*quebit.*

In *Populi* autem genere videntur esse arbores, quæ *Camphoram* ferunt, Cæsalpini iudicio. Sed de ea lib. seq. In eoque *Populi* modo magna arbor *Tacamahaca* Monardis, etiam tradetur. Item *Succini* seu *Electri* historis, quam multi *Populi* lachrymam existimant.

*Populi*

*Campho-*

*ram sum-*

*ter.*

*Tacamahaca.*

*Succini*

## DE ACERE EX VETERIBVS, ET IN GENERE.

## CAP. X.

Disputatur inter Grammaticos cuius generis sit Acer, quidam enim doceri volunt, Eodemini



minini generis iuxta regulam grammaticalem. Hinc scriptum invenimus in Lexicis : Acer neutri generis contra Priscianum, qui feminini esse putavit : contra verò Prisciani opinionem testimonia hæc citantur: Ovid. lib. i. Amor. Eleg. ii.

*Subscribam. Veneri fidas tibi Naso i abellus*  
*Dedicat: ut nuper viles fuisset Acer.*

Idem

*Acerque coloribus impar.*

Acer autem vel Aceris, ut Solinus in suis memorabilibus dicit, sic quibusdam dicta, (nominis ratione longè satis petita, quòd artificum acia ingenia, propter eius materiei præstantiam ac elegantiam exerceat : Vnde Plin. eam ab operum quoque subtilitate commendavit.

*σφένδαμνος* Theoph. Cuius, inquit, alij duo, alij tria faciunt genera. Primum quod communi nomine *σφένδαμνος* [Scal. *σφένδαμνος* scribit : forte error typogr. Gaza Acerem vertit] vocant id est Acer alterum, quod *ζυρίαν*, id est Carpinum : [Gaza utrobique Caprinum vertit, ut aliquid peculiare haberet.] Tertium quod *καρπίνεον*, id est, lectirotam, ut Stagirita vocant. Differunt autem inter se Acer & Carpinus, quòd illi materia sit alba & nervola: huic flava crispæque. Arbor utraque notabili magnitudine, [το δὲ ζύλον ἀμύχανον: ampla ambabus materia] Platano utriusque materies in findendo similis, [ἀμύχανον ἢ ἁπλὴν ὁμοίαν τῷ τῆς πλατάνου] rigida, [πεταύη : postis & lavem & lentam dicere.] sed gracilior, macrior, mollior & longior. Tamen tàm Aceris quàm Platani partes omnes dum finduntur, semper desinunt in mucronem: non ita mediotenus filia, [μετοχιδί] nec ita multum in summo [ἀλλ' ἀκεροχιδίον ἢ πᾶν]. Fortè & dici possit, in ambitu filia haud ita multum in mucrone abire.] sed provt eius fuerit magnitudo. [ἢ ἡ δὲ ὅς κατὰ μέγεθος]. Aliter Gaza legit: ait enim, Multinervia sunt minùs, quàm pro sua magnitudine.]

Corticem habet paulò scabriorem, quàm Tilia, livescentem, crassum, habentem naturam fervidiorem quàm Picæ, [πυρόπτερον ἢ ἡ τῆς πίθου]. Gaza legit *πυρόπτερον*, ipsiori: forte rectius.] & quifacillimè flectatur. [ἀμύχανον] Gaza legit *δυσκέρων*, inflecti contumaci: & sanè non est flexilis, inquit Scal.] Radices paucas, sublimes, crispasque magna ex parte tàm flava quàm candida habet.

Nascitur potissimum in aquosis, ut Idæi perhibent, inventique rara est.

De flore nihil sciunt. [Gaza aliter legit: De flore nasci aiunt fructum.]

Fructum fert, non valdè oblongum, Paliuro tamen similem, sed oblongiorem. At verò Olympi incolæ Carpinum [*ζυρίαν*] montanum magis esse volunt. Acerem verò [*σφένδαμνον*] etiam in campis nasci. Esse verò nascitum in montibus flavam, & bellè coloratam, crispam ac solidam, quâ ad opera lautiora utuntur. Campestem verò albam, minùs solidam, minùsque crispam: quam quidam Gleion, [*γλεῖον*, Bas. Aldin. noster Cod. γλίον] habet. Gaza Gallicam vertit, quasi γαλλίανος legisset] non Acerem [*σφένδαμνον*] vocant. Marisquæ materiem crispiorè esse atque contortam, & in planis maxime nasci, citiusque germinare

Vides quantâ satagentiâ in gratiam studioforum ex corruptissimo & desolatissimo hoc Theophrasti codicis loco spicilegium istud instituerimus. Cæteri Herbarij, qui ad pompam interdum potius, quàm legentis utilitatem Theoph. Græca verba citare consueverunt, has spicas inter tot spinas sublegere non sunt ausi. Et ipsi sa-

nè etiamnum suspensâ hæremus, an veras, & ad autoris mentem genuinas tulerimus. Certè ad rem ipsam quàm fieri potuit commodissimè, observatis autoris verbis accommodare studuimus. Attamen vnicus restat scrupulus, qui nos malè habet. Nam illa verba, το δὲ ζύλον ἀμύχανον aliter Scaliger, aliter Gaza, sed longè aliter Constantinus accipit. Scalig. ad arbotis magnitudinem : Gaza ad materiei amplitudinem retulit, sensu quidem seu ratione diversâ, reipsâ tamen in idem recidente. Et utramque versionem ferri posse putamus. Nam quibus arbores sunt amplissimæ, iidem & materies ampla. Gaza magis ad rem, (atque utinam sic semper) Scaliger magis ad puritatem respexit. Vterque igitur sequentia, ad materiei naturam, conditionem, ac diuersitatem, ex vulgata lectione, satis quidem depravata, aptavit, sed dispari hercle felicitate. Nam minùs ex Gazæ versione intelligas, quid velit, aut doceat, quàm ex ipso adèd corruptissimo Theophr. textu. Nam quid illud est: venis in longum fluctuas? insolens profectò verbum, atque extra materiam. Græcum est, πεταύη. Sed quis Oedipus illa intelligat? Omnia eius filia in acutum compressa abscinduntur. Nec ita semisfilia, sed summum potius præfissa multinervia minùs sunt, quàm pro sua magnitudine esse debeant. Quæ verborum hîc monstra tàm ineptò coheru, dubio ac difficili sensu nobis obtrudit. Hoc non est convertere, sed pervertere, Verba ita habent: τὰ δὲ σφένδαμνα ἵνα αἱ ἐξ ἀκεροχιδίου καὶ ζυρίαν μετοχιδί. ἀλλ' ἀκεροχιδίον ἢ πᾶν ἢ ἡ δὲ κατὰ μέγεθος, &c. Felicitus Scaliger, & ad rem explicatius, quāvis verborum tenorem non profusus ad amissum sequutus videatur. Comparat, inquit, Acerem Platano secundum materiam & filionem. Et cùm dixit, Acerem findi productione tractu: tamen inquit, tàm Platani, quàm Aceris partes omnes dum finduntur, semper desinunt in mucronem. Postea addit: καὶ ζυρίαν μετοχιδί. ἀλλ' ἀκεροχιδίον ἢ πᾶν. Gaza: Nec ita semisfilia, sed summum potius præfissa. At semisfilia neque in ea arbore, neque in aliis angulum efflicere queunt. Omnia tamen ἐκ τοῦ συνίκεν. Et præfissum est, antefissum. Igitur quid est? non enim dicas, ut præfixum culpe robur. Itaque sic interpretare. Nunc arboris partes partibus comparari: imam, summam, mediam. Imam in mucronem abire: ubi finditur. Mediam partem non ita. Summum autem esse *μετοχιδίον*. Tamen haud ita multum: neque id evenire merito nervorum. Ibi quoque obinere nervos pro ratione crassitudinis. At in longè alium sensum ista omnia trahit Constant. nempe ad folium refert. & αἴτι τῷ ζύλον. periculosa, ut ille ait, verbi depravatione, necessariò reponendum esse ζύλον. Sic verò & infra Theophr. τῶν φύλλων dixit de Mespilo: ist est, folium non laciniosum, non rugosum, sed tentum sive explicatum & expansum, vel extensum & exporrectum. Ei *σφίμαθ*, ut infra, corruptè pro *σφίμαθ μετοχιδίον*. Intelligere in foliis Aceris filia non ita profunda esse, atque sunt in foliis Platani. Pro *ἀκεροχιδίον ἢ πᾶν ἢ ἡ δὲ* &c. sic emendat: *ἀκεροχιδίον ἢ πᾶν ἢ ἡ δὲ*. Intelligere eum, nervorum numerum folij non respondere magnitudini. Oppidò sanè ingeniosa ac docta correctio & explicatio, quāque Scalig. ne subellect quidem. Et res sanè ipsa non repugnat. Quāvis autem tolerabilis utraque nobis videatur, ac nihil præter rationem trahere: Posteriores tamen faciliore planiorèque censemus.

Gaza ob:  
 scurum  
 Theophr.  
 st locum  
 obsecro  
 rem reddat.

Theoph. Gazæ  
 ric correct.

Sed iam nobis observatas Aceris differentias specialiter adamas.

ACER VULGARE MINORI FOLIO.

Descriptio.

Materiales.

Cortex.

Folia.

Flores.

Semen cum fructu seu conceptaculo.

Sapor.

Rumpotinus.

Opulus.

Colum illud fr.

Plin. loci emend.

Theophr.



ACER minus sylvis & tepibus nota arbor, caudice ramisq; est plurimum sulcatis rugosisque, matente alba, satis fragili, & fissili medulla in medio facta: ramuli minores adverso plerumque situ, coniugati oriuntur. Ramorum tenuiorum cortex tenuis, fuscus, qui unguibus facile abraditur, subest alter etiam te-

nuis, flavescens. Folia Hederae foliis quodammodo similia, quintuplici divisura primaria incisa, in principio tenera molliaque, quo tempore lactei quiddam fundunt: temporis progressu rigidiuscula, pediculis longis virentibus aut rubescentibus haerentia. Flosculi simul multi ex pediculis laevigatis interdum ramosis, mucosi, in novem, decem aut undecim segmenta hirsuta coloris herbacei divisi, stamina virentia aut rubentia apicibus luteis una cum stylo bicorni obvallantia. Semen conceptaculo gemino alis papilionum aquaticorum expansis figurâ simili hirsuto recluditur, in extremis membraneo, quâ coitus est alarum, turgidulo & nonnihil elevato, intus duro ac penè osseo, cavo, in qua cavitate semina medullosa & vires vel pallens latet; saporis subastringentis, non ingrati tamen. Astringentior est sapor corticis & foliorum, nec sine amarore.

Sic habet Varro l. 1. c. 8. ubi docet, qualis arbor cuique Vitium generi sit maritanda: Quartum [vitium genus] arbuta, ubi traduces possint fieri vitium, ut Mediolanenses faciunt in arboribus, quas Opulos vocant.

Columella verò: Est & alterum genus arbuti Gallici, quod vocatur Rumpotinum. Id considerat arborem humilem nec frondosam, cui rei maximè videtur idonea Opulus. Ea est arbor Corno similis. Pleniorum Opuli descriptionem non invenimus. Sed cur Corno comparat, arbori fronde dissimiliam? Turner. autem dicit eum non solidum similitudinem, sed arboris magnitudinem & materiem respexisse.

Vitiose apud Plin. ut dicebamus, legitur Populus, pro Opulus, lib. 14. capit. 1. dum ita scribit: Rumbotinus vocatur & alio nomine Populus [lege Opulus] arbor Italiae Padum transgressus, cuius tabulata in orbem patula replent, puriorque producto dracone in palmam eius, inde in subrectos ramorum digitos flagella dispergunt.

Theophr. ling. Lat. Rumpotinus legit: sed fallitur, dum dicitur, hoc est Populus nigra,

putat, mendoso Plin. codice deceptus.

Ex hoc Plin. loco Cordus Opulum Rumbotinum dixisse videtur, si modò & is Opulum legit. Idem tamen Plin. l. 24. cap. 19. ait: Rumbotinum arborem demonstravimus inter arbuta. Iuxta hanc viduam vite nascitur herba &c: Est autem Rumpotinum arbutum Gallicum arboribus humilibus & minimè frondosis constitum, eaque re ab arbutto Italico differens, ut annotat Dal. qui addit l. 14. cap. 1. Rumpotinum in arbutto Opulum dici. Vulgò Gallis des Hautins.

Sed mirari subit cur Colum. Opulum arborem humilem nec frondosam dicat, cum ex prioribus Plinii loco, quem Opulum intelligere non dubitamus, patulam esse non obscurè constet. Respondendum, arborem, si excreverit, patulam non malè dici. At si Rumpotinum cultu fiat, ad maritandas vites, humilem esse nec frondosam. Talem Colum. divit.

Quod verò Aceris genus intelligat Turner. nescimus, dum sic annotat: Quæ mihi à viris doctis in Italia ostendebatur pro Opulo, folium habet Aceris laciniatum, sed obscuriore mucrone quam Aceris. Referebat mihi Contr. Gesneras Gallis un Opier nominari. At nos scimus Gesnerum pro Opulo demonstrasse Acerem minorem passim obvian, de qua hic agimus. An aliam intelligat Turn. inquirendum.

Ruell. suo more, veterum historias cum suis miscet, ac pro suis obtrudit toto suo capite de Acere, ut difficile sit intelligere quam plantam tradat: nomen tamen Gallicum Erable, quod apponit, convenit nostro Aceri, an item descriptione, lectoribus iudicandum relinquimus. Nullum nobis Aceris genus forma & magnitudine Tiliæ notum, corne paulò scabriori quam illa, sublividoque, crasso & flecti contumaci, quale ille describit, aut potius fingens malè transcribit.

Ruellium imitatur Carol. Steph. qui parum in cognitione Aceris se versatum demonstrat, nesciens Platanum Gallicum esse ex genere Aceris, ac præterea Charmæ Gallorum Zygiæ dicentis Aceris genus.

Curtius. Est inquit, apud nos nos, [Gallos] siquidem hæc sit, quam nos Arabum vocamus, folio Platani, verum longè minori, quæ & in amplitudinem minimè nascitur, ex cuius tantum materie arcus fabricantur.

Adhuc exactius Tragus: Acer folia habet elegantissima, saturatæ viriditatis, dissecta, Saniculae similia: cortice vestitur duro & incano, modò humilis, modò magnitudine insigni: Lignum annosum crispatur: fructum fert Orneoglossum similem. [id est, Fago sepium.]

Quidam inter doctiores Acerem Germ. Ahorn interpretantur, propterea quòd Acer non in omnibus locis Massholder, sed Ahorn vocatur: cum tamen Ahorn alia sit arbor [videl. Acer maior] Alii vocem Massholder, quam Tragus Aceri adiungit ad Sambucum aquaticum referunt. Idemque Tragus huic nostro Aceri in hist. Germ. hæc nomina tribuit: Schreiberholz & Schreiberlaub.

Lonicero 3000. Acer, Ahorn, prima species campestris, Acer Gallicum, alterum alpinum, Carpinus 2. & Zygia. Et Ahornbaum non multum dissimile dicit à Linden seu Tilia. Quoddam tamen, addit, velle Ahorn esse Platanum & Massholder esse Acer. Pro Ahorn & Acere ponit figuram Sambuci racemosa, quam & alio loco ha-



co habet: deinde aceri maiorem minoremque confundit, ac seq. cap. etiam Platanum: ubi figura, quam ponit, potius competere videtur Aceri minori, quam vocat *Nassholder*: rursumque Platanum & Chamæplatanum variè miscet.

Gesl. scribit Aceris species tres apud se [Tiguri in Helvet.] inveniri in sylvis ac montibus: inter eas etiam Zygiam à Theoph. nominatam; ne scire se quàm rectè Gaza Carpinum vertat. Aceris speciem minorem Opulum & Rumpotinum appellat. Et alibi: Opulum Aceris speciem minimam, alio nomine Rumpotinum dici ait.

Hic tamen notandum Colum. distinguere Carpinum ab Opulo, licet Rob. Conf. ut antè dictum pro iisdem ponat.

An Anguil. Aceris 2. species *Lygia*, quam in Lombardia *Oppio* dici scribit, addens lignum eius luteum, folia minora esse [quàm in dicta Alsati] sive Acere maiore nobis] fructum etiam minorem. Ambas tamen figura similes: Acer tenuifolia Thelio. Acer communis, Theophr. Sphendamos Pen. & Lobel. *Sphendamos* id est, Acer Campestris Dod. Aceris 2. genus minore folio, humiliore materia, crassiore cortice Clus. quod ab imperitis in Gallia *Sycamorum* nuncupari tradit.

Hist. Lugd. tria Aceris genera Gallis nota proponit: Acerem montanum: cuius duo genera facit, unum Candidum, quod Alpini, Avernique *Plane* appellant: alterum flavum seu crispum, quod Opulum montanum dicit. *Erable madré* & *Erable inuline*. Traditque hodiè quoque lignatores Sequanos Acerem montanum mare feminâque distinguere, colore magis, flavo in mare, pallidioris in femina, &c. Verùm non placet ab eadem H. Lugd. Acer seu *Erable* Gallorum Italicè *Pied'occa* & *Platan aquarico* dici: immò hæc nomina Italica nulli Aceri nec maiori neque minori convenire putamus. Figura etiam in eadem transposita. Supra eam quæ habet titulum Acer Campestre ponendus titulus Aceris montani, & vice versa.

De hoc nostro intelligenda eadem cum inquit: secundum Aceris genus est Acer campestre, sive in planis nascens: veteribus Opulus campestris: hodiè Infusibus *Opulo* vocant, & ea ad maritandas vites utuntur, quas cohiugatas *Hautains* vocant: nos *Erable mil* & *Erable madré*. Sed figura quæ pro Acere montano apud eandem posita est, uti dictum, ad hæc nomina pertinet.

Taber. Acerem minorem non distinguit à maiori, & miscet nomina cum Platano. Germ. *Teusch* *Ahorn* vocat: Schwenckf. *Leinbaum*: *Milchbaum* & *κλινότερον* antiquorum. Vulgo *maßholter baum* / & *Ahorn*, uti dictum: Belg. *maesshouwenboom* / *maesshout*: Gal. *Erable*, *Opier* Ital. *Apero*, *Arefe*. Hisp. *El-Acre*, *Elafe*. Angl. *Ople tree* vocari possent: Turn. licet in Anglia non viderit, Vngar. *Iharfa* teste Clus.

Cordus notat, nasci iisdem locis, quibus Vlmus. Et sanè apud nos passim sepes tam hæc quàm Vlmus stipatas videas: gaudet præruptis & sylvosis. Humili statu contenta, vix supra hominis altitudinem attollitur caudex: reliquum non nisi virgæ & exigui rami, aut certè brachia haud magna, nec alta, nec multum sparsa: nõ tam frutet potius, quàm arbor, ut Tragus putat, fruticis nomine abutens. Aliquibus tamen locis etiam in proceram arborem grandescit, ut in quibusdam tenebrosis VVaalgois sylvis ac in comitatu Bidiscensi tantæ magnitudinis reperitur, ut ædi-  
ficiis vel maxime inservire queat, teste Trago. In

Helvetiæ & Silesiæ etiâq; Lotharingiæ ac Burgundiæ editis collibus ac montosis locis passim occurrit: in planis verò ut plurimum inter sepes & fruteta. Circa Verbanum lacum & aliis Lombardiæ quibusdam locis, ut & in Sabaudia, potius. circa Genevam maritatur vitibus, in locis campestribus, arvis, pratis: Eiusmodi vites vocant

Vitis.

*Vrin* Vnde *Vina-d'Vrin*, quæ ibi celebrantur.

Tempus.

Floret Aprili & Maio: fructum fert messis tempore: at maturum Septemb.

Viscum.

In Burgundia & circa Montbelgardum Viscum ferens non semel vidimus.

Satio.

Oculi melius cacuminibus, in arbuſto protinus deponuntur. Colum. Nam ferè [inquit idem] ita constitutum Rumpotinetum animadverti, ut ad octo pedes locis ficcis & clivosis, ad duodecim, locis planis & uliginosis, tabulata disponantur. Plerumque autem ea arbor in tres ramos dividitur, quibus singulis ab utraque parte complura brachia submittuntur: tum omnes penè virgæ, ne umbrent eo tempore, quo vitis putatur, abraduntur. Arboribus rumpotinis si frumentum non inseritur, in utramque partem viginti pedum spacia interveniunt. Cui rei maxime videtur idonea Opulus. Verùm quia raram, neque idoneam frondem pecori præbet, à plerisque repudiata est. Quod mirum. Nam ut idem Colum. scribit, ad arbuſtum Gallicum, quod vocatur Rumpotinum, desideratur humilis, nec frondosa, qualem Opulum esse idem testatur. Ceterum qua ratione arbuſta ad sustentationem Vitium feri ac coli debeant, ad longum descriptum habes in Vlmo.

Rumpotinetum.

Culcus ad Vitis substantivum.

Aceris radix. Plinio prodente contusa [è vino c. n.] locinotis doloribus utilissimè imponitur. Serenus idem testatur hoc carmine, nisi quod hic in potu det:

Vires &amp; uſus. Secoris doli.

*Si latus immeritum morbo tentatur acuto*

*Accensum ringes lapidem stridentibus undis.*

*Hinc bibis: aut Aceris rapas cum raris & undis*

*Cum vino capis: hoc præsens medicamen habetur.*

Tragus, Dod. Curtius huic Aceri eandem habes vires ascribunt quos & nos secuti sumus. Habent semina & Cortex Vlmo similes qualitates, si Cordo credimus.

Lignis usui.

Gesl. lignum perennis durationis dicit: quod cum maxime annosum fuerit, undat in crispatur. Plerumque apud nos lantioribus dicatur supellectilibus, utpote orbibus, mensisq; ut annotat Tragus, qui præterea addit. Qui venationi student, ij accipitres, quos ad prædam instituerunt, ad baculum seu vectem ex Acere affluere solent, ut illi insideant. Quæ verò hoc faciant ratione, ipsi norunt proculdubio.

Prensiuſia. Ad Venationem accipitrum.

## ACER MONSPESSVLANVM.

**A**CER Monspelienſe, arbor est mediocriter procera, ramis latis explicatis, cortice quodammodo purpurascēte, folio Aceri vulgari simili, in tres tantum cuspidēs sive angulos diviso, crasso, venoso, ex longo pediculo pendente; paribus intervallis utrinque sito: fructu gemino, membranulis duabus coherentibus, alius muscarum similibus. Aceris 3. genus, inquit Hist. Lugd. nominavimus, quod in sylva Monspelienti, urbi vicina, Valena nuncupata provenit, Aceris vulgaris penè figura. Hoc Aceris genus quidam esse aiunt, quod Plin. in Istia, Rhætiæque præcipuum esse tradidit, crispo macu-

Descriptio Corticis.

Folia.

Fructus.

Aceris 3. genus.

Locus.

Istia &amp; Rhætia.

Peſons.  
ceum.



nioſo minore: ſay nte intus ligno.

ACER MAIVS: MVLTIS  
FAVSO PLATANVS: ID-  
que duplex.

Deſcrip.

Cortex.  
Materies.

Folia.

Sapor.



Flores.

Fermitus.

Nutris.

Alia Variet.

ſoles præcipuam inſit gratiam: Flores muſcoſi, ex herbido albidis, caliculo continentur lanuginoſo. At alati fructus ex vulgari cognitu ſunt faciles, per omnia maiores, ex longo pediculo pendentes plures, ſed ſinguli bini foliacei, bipennem expenſam & inverſam, ut pulchrè Adv. comparant, aut papilionis aquatici alas imitati, nucleos in medio quâ alæ cocunt iudem gemino utriculo duro ſatis continent, magnitudinis ſeminum Atantiorum albicantes, guſtui non gratos.

Eſt & alia varietas, prædicto foliorum amplitudine minimè cedens, nec tam altis ſinum diviſuris, nullis item ferraturis, ſed extremorum acutis exquiſitiſſima, ut cum quavis etiam acicula certet, pari nervorum diviſura, ſed minis frequenti interna parte: non incana ſunt, ut prædicti, folia, ſed dilutè viridia, ſplendcantia: ſuperna, ſaturatiùs viridia, non tamen adeò, ut pectora. Tota exterum folii facies mollior, delicatiorque, longioribus etiam hæ-

larum diſcutu, quod à ſimilitudine caudæ pavonum nomen accepit, de quo antè horum opinionem, nec aſſentimur, nec repugnamus, addit Hiſt. Lugd.

De hac eadem fortè Pen. & Lobel. Aceriſ videl. maiori congener, inſequentior Septentrioni: quæ fortè apud Theoph. zygia ſit, tamenſi & frigidis proficiat: folio & fructu minis laci-

rent pediculis: quale Baſileæ circa Dornachum, & in Ducat. VVirtemb. circa fontem admirabilem propè Boll obſervatur. An in flore & fructu quoque ſit aliqua diverſitas, nondum obſervavimus. Eius folium in medio tabellæ ſeorſim piſtum. Eleganter eius ramum cum fructu quoque pingit Camer. in epit. Matth.

Falluntur, quicunque Aſhorn diſtam Germ. arborem Platanum eſſe contendunt: ea enim Acer eſt, ut & nobiſſam teſtantur Cordus, Turner. Geſn. & doctiſſimi quique. Eo tamen errore decepti fuerunt plures, ut Cardan: dum in lib. de var. rer. ita ſcribit: Id magis mirum, ſolâ curâ Platanum, quæ vix in Italia ob negligentiam videatur, in Angliæ & Scotiæ eſſe frequentiffimam. Numeravimus in vitidario Monachorum D. Auguſtini, quod in ſuburbis Edimburgi eſt, ſuprà viginti Platanos, quarum quædam 30. pedes ſuperabant, & tamen ea regio eſt frigidiffima. Id ergo contingit partim diligentia, partim (ut ille putat) maris propinquitate, adeo ut hyemes ea regio mitiores habeat. Delectari, autumat eos hac arbore, quod folia Vitib. tam ſimilia habeat, ut cum vidiffet furculos plantatos, exiſtimavit Scotos vites colere: itaque veluti amatores, quod verè poſſidere nequeunt, imaginibus imitantur. Habet autem cum Vite aſſinitatem non ſolum in foliis, ſed etiam in pediculis ſarmentisque, quod cum vitibus adoleſcant, iſſque gaudeant: vel potiùs hæ illis. Rectè igitur Scoti feciſſe videntur, ut cum paucas arbores iſtud ſolum ſecar, eam delegerint colendam, quæ omnium ſit pulcherrima. Eodem ſtudio ſemè Angli, ſuis ſylvis eas inſerunt, ut cum fructiferis ſemè carendum ſit, non ſuſciferarum formoſiſſimam delegerint. Hæc omnia inquam de Acere noſtro maiore intelligenda ſunt, ne utiquam de Platano, quàm eam non noviffet Cardanus, Acer putavit & aſſerere auſus eſt: partum profeſſo in eò ſubtilitatem ſuam demonſtrans.

Aſt & Tragum, induſtrium alioqui Herbarium, hunc eundem errorem ſibi imponere paſſum valdè miramur. Ita enim cap. ult. quod eſt de Platano, ſux hiſt. inſit. Platanus inter Fraxinos humectis & altiſſimis montibus provenit, idè ſit ut à ruſticis incolis VValgoiæ & Mediomatrici Fraxinis accenſeatur, ſed perperam. Siquidem folia gerit Vitis Viniferæ aut Ricini ſimilia, pediculis ſuſſulta rotundis, longis, tenuibus & rubentibus. Quædam in hoc genere arbores 1. Maio menſe florent: aliæ non florent, nullamque ſerunt ſuam: German. dicitur Aſhorn & 2. Waldeſcheren & Bucheſcheren. ſylveſtre eius genus nonnullis Leinbaum. Hæc ille. Quæ omnia ad Acer noſtrum pertinent, atque fortè etiam ad geminum, à nobis deſcriptum: ut etiam Tragum Platanum cum Acere confuſiſſe certum ſit.

Immo ipſi adeò incolæ quidam Penz & Lobelio prope Oxoniam aſſerverunt etiamque oſtenderunt hanc, rati eſſe Platanum, ut ipſimet in ſcripta retulerunt. Vt iam nemini mirum eſſe debeat, & à Cruſio & à Friſchlinio in ſtudio herbario non verſatis in ſuo nomenclatore Platanum Aſhorn eodem errore converti. Sanè & Du Choul in deſcript. montis Pilati, cum folia eius Du Choul ſimilitudinem quandam habere videret, cum ſolis Platanis, huius ſpeciem dicere auſus eſt. Sed perperam.

Sic & nomen vulgare Gallicum, *Plaſne*, multos in eam opinionem duxit, eſſe Platanum, cum ſit ſpecies Aceris, inquit Beſſon. Hoc nomine ceſtimunt, *Plaſne*, (addens) totam Galliam deceptam fuiſſe.



fulfæ, & doctos viros. Idem paulo post: Speciem Aceris [d'Erable] plurimi communi consensu dixerunt Sycomoron, quum tamen Sycomorus sit admodum rara.

Ostenditur apud nos, inquit Ruellius arbor Sycomori (ut aiunt) nomine, frondosa, Moro non dissimilis, conspectu, folio, magnitudine: sed neque germinibus, neque ramis quicquam provenireprehendimus: nisi quippiam ineunte vere, cum paritur, veluti nucamentum prælongum. Fructum foliacea siliqua, inflexu ferè falcato, gerit. Sed scalptu vulnerata, nihil remittit lactis, cum vera Sycomorus ætate multa lactea fœteat saliva.

Car. Steph. verò in suo seminario sic ait: Vifa est nobis Sycomorus Parisiis in horto Gotofredi cuiusdam Pharmacopolæ diligentissimi herbarum & arborum, quæ apud nos rariores sunt, indagatoris & cultoris. Item in arbut. Platanus apud Græcos & Latinos nomen retinet à foliorum & umbræ latitudine: propria appellatione apud nos caret, quamquam etiam in Gallia conspiciatur, omnibus incisam arboris speciem demittantibus, & nomen eius ac naturam ignorantibus.

Vidimus & ipsi Lutetiæ, quæ non alia est, quam Aceris genus maius. Hæc est fortè apud Gesn. Zygia montana, quæ Bellonio Lutetiæ crevit, & Acer maius. Gesner. quoque tradit Ruellium Acer montanum pro Sycomoro descripsisse: illudq; Allobrogibus in montibus Helvetijs vulgò Lynbatum: cuius truncum femoris ferè crassitudine, quatuor pedes & amplius lègù, superna parte abscissum, proximo vere plantavit prato medio: ceteri humido, quem mox æstate pulchrè geminasse scribit: ita ut persicillè eam crescere & durare appareat. In epist. ad Io. Caium Britannum notat, solum quod hic ei misit pro Platano, omnino Aceris esse, vulgò Gallis Plaine dicti, nomine ad Platanum alludente, eaque voce quosdam deceptos Platanum credidisse. Olim Gesn. etiam vocabat, Theoph.

Tertius error est Cornarij, qui dum sibi persuadet Tiliam esse Platanum, vult Acer maius esse Tiliam, quam sibi persuadet citò putrescere: sed præstat eius proferre verba, ne indicata causa, condemnatus videatur. Tilia & Philyra inquit, nisi penitus fallor, est ea arbor, quæ nostris Åhorn appellatur, permutatis omnino nominibus, contra quàm hodiè fieri solet. Theoph. ad fabricandas naves determinam esse dicit Platanum, eò quod citò putrescit. Quibus verbis confirmatur id, quod dixi, Platanum esse quam Germani Lunde vocant. Nam lib. 5. Philyram ad tabulata longarum navium probat Platanum autem alibi ad eadem improbat. In summa itaque, quicquid Theophr. de Philyra, quicquid Plin. de Tilia dixit, id omne ad arborem Åhorn nostris dictam, pertinere mihi videtur. Quicquid verò de Platano uterque dixit, id ad eam, quæ nostris Lunde vocatur. Plin. tamen non satis sibi constat, sed Philyram Theophr. cum Phillyrea Diosc. confundit. Hæc Cornar. Qui ut non male in principio ominatur, penitus fallitur, estque penitus erronea hæc eius opinio. Sciscitanti sumus à peritis sculptoribus, quo ligno uterentur ad simulachra: responderunt, Tilia, & non Acer teredini obnoxio. Sanè Meloeoni Alatiæ in splendido & claro seminarum cœnobio Anno 1604. quo hæc commentamur, totam passionem Salvatoris nostri industrè sculperunt ex Tiliæ ligno, non ex Acere, quod tamen ibi abundat.

Tom. I

Reliqua quæ Corn. adducit, verba sunt, non actiones.

An Anguil. *aspindum* propriè, id est, Acer, *sphendai* vulgò *Asari*, ex quo parantur orbes & vasa & similia ob lignicandorem. Rob. Const. ab hac *Asari* separat *Plane* Gallicè dictum & suam *Plane* mor. idem facit cum *Pied'oca* Anguil. uti iam diximus, quæ nobis videtur *Sambucus aquatica*.

Pena & Lob. hanc Aceris speciem illam dicunt, quam *κινύτερον* antiqui vocarunt. At Lob. in Obl. *κινύτερον* Anguil. dici ait, quasi penituerit cum in Adv. *κινύτερον* cum Pena fecisse. Addit Ital. *Pied'oca*, & *Platano aquatico* dici: duasq; habet figuras unius huius plantæ. Non. a. putamus Anguil. hanc intellexisse arborem, sed *Sambucum aquaticam*.

Lonicerus Åhorn & Acer hoc maius cum minore confundit.

Dodo. in hist. Gal. putat esse *ζυγία* & Lat. *Carpinum*. Aceris i. speciem, & maiorem vocat. Et in Lat. propriè *aspindum* dictam censet: ita & Celsus. & Camer. qui hanc vulgarissimam dicit.

Acer latifolium ab imperiis Platani nomine donatum Clusio. An Acer maius Camer. in hort. cuius turiones etiam lacte scateret ait. Is in epit. Marth. de secundo à nobis tradito, quod non distinguit à priore, scribit: Acer maius, nonnullis Platanus Germanica, aliis Carpinus Plinij, Græcis, *αζιδιον*, Gallis, *Plaine*, Teutsch *Åhorn* & Waldeßchern Germanis: Alijs verò Åhorn simpliciter.

Tabern. manifestè Acer hoc cum Platano confundit: præterea non distinguit Acer maius à minori: nec ponit descriptionem nec figuram maioris. Bohem. Brev. Vngar. Janorsa. Slavon. Åieb. Reliqua linguar. nomina & huic convenire videntur. Ad differentiam addas, maius.

Tres Aceris species nobiscum agnoscunt Gesn. Hist. Lugd. & Camer. qui in maiorem, medium & minimam distinguit: ac maiorem hanc vulgarissimam dicit. Sed quæ eius media?

Schuenckf. ita distinguit: Acer maius *Σφαιρόν* Theoph. Dod. Acer montanum, Åhorn, *Ein Url* / *Urlenbaum* Sil. Arbor alta montibus propria, Opulus Gesnero. 2. Acer crispum, Acer Bruscum, intortius crispum: *σπινδαίου* Theoph. Bellonio: *Urlener Flader* syl. in montibus celsis nascitur: non adeò frequens. 3. Acer simpliciter: Acer molliuscum simplicius *spartum* Plin. *Schlechter Flader*. At non docet Schuenckf. an tres distinctæ species & in quo differant, vel an tantum varietas in ligno. Tragus sanè Acer crispum facit varietatem tantum ligni Aceris vulgaris: nos verò vidimus Aceris maioris lignum valdè crispum & fissum crispitudine asperum.

Humectis & altissimis montibus gaudet, interque Fraxinos provenit, solo pingui & spisso, in Burgundia, & iuxta Blamontium Ill. Ducis VVirtemb. arcem, ubi abundat & aliis montibus vicinis. Basileæ propè Campum Scopetariorum: sed in monte prope *Leurach* & in *Wasserfall* Aquacida monte copiosè: prope *Biehen* pagum ditionis Basil. Geneva in monte *Salève*: in ditionis VVirtemburgicæ multis montibus: in saltu Viennensi & aliis vicinis sylvis: Lutetiæ & in Anglia atque Scotia alibi que locorum, umbræ causa, quam facit magnam, ad æstivos Soles excludendos, in hortis & viridariis colitur. In horto Montb. etiam nostra cura plantata. Dodon. in alpibus & Brabantia quibusdam locis nasci scribit.

Locus.

*Tempus.* Floret mense Maio: fructum maturat Septembri.

*Vires & usus.* Camer. hanc faciens vulgarem, tribuit ei vires à nobis Aceri minori tributas. Materies ligni candidior ab arculariis & menariis ad varia utensilia expetitur. Cùmque ipsa arbor magna & procera sit, ut Plin. etiam Tiliæ ferè amplitudinis dixerit, non dubium hanc Virgil. de equi ilius Troiani structura loquentem intellexisse Aeneid. 2.

*Fructus & varia.* Præcipuè cùm iam hic trahibus contextus Acernis Staret equus. Acernam mensam commemorat Martialis. 14.

## PLATANVS.

## CAP. XI.

*Descriptio.**Folia.**Pilula.**Flosculi.**Sphæria Trachea. Sphæria.**Descriptio Cordis.**Cortex.**Cortices singulis arboribus exiit.*

bus per superficiem seminibus conicis, medium pilulæ faciente exptæ lanuginis tomento. Gorporis testatur Platanum nostris Tiliis longè esse inferiorem. Curtius flosculum eius pallidum dicit. Lacuna parvum, ex luteo albescentem. Fructus seu Echini penduli harent pediculis singulis, longioribus & brevioribus non æqualibus, aut uno exortu iunctis (ut pingunt, qui non viderunt) paritate Vnedonis ferè, Bardanæ concolores, apiculis acerofis asperati. Semina Scabiosæ montanæ non dissimilia, tomento leni subrufo intexta, ut describunt Pen. & Lob. Cæsalp. scribit Platanum ingentem arborem specie Quercus: folia etiam sinuata diutius servari in arbore, ut in genere Roboris: semina pusilla esse effigie glandis. Nicandri interpretes Platanum fructum esse sphæria quædam Trachea scribit, id est, orbiculos asperos: proptereaque à Nicandro dici Sphæram.

Sed plenius, & ut pleraque sua, singulari diligentia scribit Cordus, in hunc modum: Platanus, quæ in tantis olim regibus & divitibus delictis fuit, arbor est magnæ, amplæ, & in latitudinem explicitæ Nuci similis & æqualis. Caudice assurgit robusto, non ita procero, sed statim in ramos diviso. Cortice tegitur lævi, corio similis: subinde singulis mensibus exteriores & scabriores tunicas exiente, unde semper sub arbore hac adulta strati conspiciuntur cortices. Rami eius nullo ordine in alios crebrò dividuntur ramos: furculi Nucis similes: virgæ & furculi ex

intervallo nodis & geniculis præcinguntur: ex quibus singulorum annorum germinationes & accessus furculorum numerantur. Folia habet magna, lata, dura & robusta, dodrantali plerumque quoquo versùs amplitudine, sesquialiali pediculo aut longiore furculis adnata, in quinas aut septas partes, instar palmæ humanæ divisa, hyeme decidua, Aceri similia, nisi singulæ eorum fibræ in plures partes utrinque diffusæ essent. Venæ à pediculo ad omnes foliorum partes & eminentes angulos evidentes derivantur. Vere cùm germinaverit, secus folia etiam globulos quosdam producit, longis & gracilibus dependentes pediculis, undique asperos, & veluti lanugineis flosculis plenos, paulatim in maiusculas pilulas excrecentes, parvo castaneæ echinæ æquales. Sunt autem hirsutæ hæ pilulæ & lanuginosæ, atque totæ ceu aculeis constantes, sed mollibus, similes iis, quæ in certo quodam Vlvæ genere [Sparganio] nascuntur locis lacustribus & palustribus. Cùm autem ad maturitatem perveniunt pilulæ, totæ fassunt, & dissolvuntur in totidem semina, quot aculeis exasperatæ fuerant. Singula enim semina in superficie pilulæ in acumen desinunt. Porro ea semina parva sunt & oblonga, undiquaque flava, aspera & papposa lanugine involuta: quo fit, ut contractæ pilulæ nihil quam papposa lanugo esse appareant, amianto contrito similes: ea si casu in asperam arteriam recepta fuerit, strangulat: id eoque inter venena à quibusdam veterum recensetur. Materia arbori satis robusta, mixtæ cum Fago & Quercu similitudinis. Auctu facilis est arbor si aptum nacta fuerit solum, quale est pingue, rarum, rigrum: nam in asperis, & saxosis contumaciter adolefcit, & tortuosa nodolæque evadit.

Eti autem Diosc. eo loco, ubi Platani facultates proponit, & Pilularum meminit, & tunc harum tum foliorum lanuginis, eam non describat. Ex aliis tamen eius operum locis nostram descriptionem eliciamus. Primum enim, Ricino folia tribuit Platani, maiora, læviora, nigrioraque: Item Glycyrrhizæ fructum ait magnitudine Pilularum Platani, asperiores. Denique ex Xanthio scribit esse fructum Platani Pilularum modo spinosum [ἀκνέος φρούτον]: Al. ἀκνέος: malimus ἰσχυρόν, Echinatatum.]

Theoph. multa quidem de Platano habet, sed pauca quæ ad arboris formam intelligendam faciant. Non dubium tamen eum per πλάτανον hanc ipsam intellexisse, quam & arborem dicit, & in Creta in agro Cortynensi ad fontem quandam perpetuifoliam: Iovem sub ea cum Europa concubuisse fabulari: Talem & in Creta esse: a quo gaudere ac rigris: in Italia esse raram: auctu esse facilem: radices in summa terra dispersas habere, [ἀκνέος φρούτον] quæ tamen, si locum commodum nactæ fuerint, facili & altiora subeant: Materiem ad opificia esse ineptam, quippe quæ celeriter putrescat. At Platani folia tremula ubi dicat Theoph. ut annotat Cæsalp. nondum observavimus. Ita quidem Poëtis dici legimus.

Notabile est, quod notavit Varro lib. 1. cap. 37. Alias radices angustius diffundere, ut Cupressi, alias latius, ut Platani: usque eo, ut (quemadmodum Theoph. scribit) Athenis in Lycro, cùm etiamnum, Platanus novella esset, radices triam & triginta cubitorum egerit.

Eodem teste non procul à Cretæ urbe Cortina Platanus est, quæ folia hyeme non amittit: In Cypro, ut Theoph. ait, etiam una. Non enim



nim eadem omnia in eodem agro rectè possunt. Ast Bellon. postquam de Cortina Cretæ locutus fuisse, addit: in Valle ad fontem nascentes Platanos omnes esse deciduis foliis. Sententiam ferent, qui ista loca inhabitant.

Neque sterilis est Platanus, ut Virgilius ait Georg. 2.

Et steriles Platani Malos gessere valentes.

Putamus autem sterilem dici à Virg. quia fructum non ferat, qui homini sit edendo. Nam (ne quis fortè putet, antiquos aliam intellexisse Platanum) Theoph. Platanum manifestum semen habere scribit, & ex eo nasci. Hæc ob solam umbram, potatoribus præsertim, olim erat in deliciis, unde Virg.

Iamque ministrantem Platanum potantibus umbram.

Et Horat. Od. II. l. 2.

Cur non sub alta vel platano, vel hac

Pinu incantes, &c.

Potamus iuncti?

Tantum autem huic arbori olim habebatur honos, ut mero infuso enutritur.

Considet sub Platano disputaturus Socrates cum Phædro apud Platonem, & apud Cic. 1. de orat. Crassus cum Scævola, Antonio, Cotta, Sulpitio. Vmbriferam dixit idem ex Homero. Et Genialem, quodd sub ea convivari veteribus mos esset. Vnde Genium Deum eius foliis coronatum tradunt.

In Lydia Xerxem Herodotus scribit Platanum compemisse, quam ob pulchritudinem monili aureo donaverit, & custodiendam mandaverit uni ex immortalibus. Idem & Aelianus. Diè integram sub ea consumpsisse tradunt nulla postulante necessitate, caltrique sua circa Platanum in solitudine posuisse: tuendamque vico delegasse immortalis. Immortalis autem, uti notat Cal. Rhodig. non hic intelligitur, quia platanum nunquam moreretur, sed unus ex iis, decem millibus ex Persis in militia delectis. Hi dicebantur immortales: quoniam si quis eorum aut necesse aut morbo numerum minvisset, confestim substituebatur alius, nec unquam plures erant paucioresve decem millibus. Erant item præcipuo inter omnes cultu decori, & eodem omnium præstantissimi.

Sed & proditum invenimus eundem Xerxem auream sibi Platanum fundi iussisse, quæ antiminos foret, id est, amatam effingeret, leniretque æstivationem mentis exillius absentia.

Memorabilis etiam fuit aurea illa Platanus. Dario donata: ut scribit Herodotus, quam Cyrus devicta Asia, ut refert Plin. invenit. Hæc præcipuo.

Θερεινὴ καὶ πλατάνη Nicander vocat, quodd æstate, πῆς οὐρανοῦ ὑψὸς lectum ac cubile umbra frondis suæ præbeat. Verba in Theriacis hæc sunt. Σφαίρη τῆς θέρης καὶ πλατάνη: id est, Sphaera quoque thorum præbentis æstate Platani. Interpretes locum eum enarrans, illud θέρης ὅπου pro umbrosa posse accipi, tradit: quoniam latissima sint eius arboris folia, ut opacissime contegant æstivo tempore: vel (inquit) quia thorus ex numerosis foliis confici abundè possit eodem tempore.

Sed quis [inquit Plin.] non iure miretur, arborem umbræ gratia tantum ex alieno petitam Orbe? Platanus hæc est, per Mare Ionium in Diomedis insulam eiusdem tumuli gratia primum invecata: inde in Siciliam transgressa, atque inter primas donata Italiæ: & iam ad Morino's

Tom. I.

usque pervecata, ad tribunalium etiam pertinens solum, ut gentes vectigal & pro umbra pendant. Dionysius prior, Siciliæ tyrannus, Rhegium in urbem transtulit eas, domus suæ miraculum, ubi postea factum Gymnasium: [idem & Theoph.] nec potuisse in amplitudinem adulescere, & alias fuisse in Italia, ac nominatim Hispania, apud autores invenitur. Hoc actum circa captæ (Caput M.) urbis ætatem: tantumque postea honoris increvit, ut mero infuso nutrantur: Comptum id maxime prodesse radicibus: docuimusque etiam arbores vina potare. Celebrata sunt primum in ambulatione Academiæ Athenis cubitorum xxxvi. unius radice ramos antecedente. Nunc esclara in Lycia gelidi fontis loca amœnitatē, itineri appositā, domicilii modo cava lxxx atque unius pedum specu, nemoroso vertice, & se valis protegens ramis, arborum instar, agros longis obtinens umbris. Ac ne quid delit speluncæ imago, Saxæ intus crepidinis corona muscosos complexa pumices: tam digna miraculo, ut Lucinius Mutianus ter Cos. & nuper provinciæ eius legatus, prodendum etiam posteris putavit, epulatum intra eam se cum duodecesimo comites, largè ipsa toros præbente fronde, ab omni afflatu securum, optantem imbrium per folia crepitus, lætorem, quàm marmorum nitore, picturæ varietate, laquearium auro, subuilem eadem. Aliud exemplum Cui principis, in Veltino rure mirati unius tabulæ laxi (que ramorum trabibus scambæ patula, & in ea epulati, cum ipse pars esset umbræ, (circumspulsa ipsius umbra) xv convivarum ac ministerii capace tridinio, quam cœnam appellavit ille nidum.

Est Cortina [addit idem Plin.] in insula Cretæ iuxta fontem Platanus una, insignis utriusque linguae monumentis, nunquam folia dimittens: statimque ei Græcæ fabulositas superfuisset, Iovem sub ea cum Europa concubuisse: Ceu verò non alia eius generis esset in Cypro: sed ex ea primum in ipsa Creta (ut est natura hominum novitatis avida) Platani satæ regenerare vitium: quandoquidem commendatio arboris eius non alia maior est, quàm Solem æstate arce-re, hyeme admittere. Inde in Italiam quoque ac suburbana sua, Claudio Principe Marcelli Eterni libertus, sed qui se potentis causa Cæsaris libertis adoptasset, spado Thessalicus, prædixit, & meritò dici possetis quoque Dionysius, [fortassis ob vineta multa & ampla, quæ possidebat. D.] transtulit id genus. Nanque & Chamæ-platani vocantur coactæ brevitatis: quo arborum etiam abortus invenimus. Hoc quoque ergo in genere pumilionum infelicitas dicta erit. Fit autem & ferendi genere & recidendi. Hætenus Plin. de Platano, qui ei latissima folia cum Fico & Vite tribuit, & Platani quoque spectatim angulosa dicit: cuiusque umbram iucundam, quanquam crassam & Paulinus: Nam Platanus ramos expandit in umbras. Est & illud Elogium eius apud Ovid. Metam. 13.

Nobilior pomis, Platano conspectior alta:

Horat. in Odys:

Cur non sub altâ, vel Platano?

Iuxta Amymonæ fontem, & propè Lernam paludem, Platanus enata, Græcorum fabulis etiam memorabilis, qui sub ea Hydram serpentem educatum ferunt, autore Pausania. Quo etiam scribente apud Messenios, à fluvio Biantæ longius stadiis viginti Platanistoni fons, sic dictus, Platanistone quodd ex patula Platano intrinsecus cava, aqua nix fons.

fluat quæ potui sit.

Idem de Platanorum vastitate lib. 7. histor. vetens Græcia scribit his verbis. Præcessit Phærensium agrum fluvius Pierus, in cuius ripis Platanorum lucus est, tanta arborum magnitudine, ex ipsa vetustate, ut intra cæternas [multæ enim concavæ sunt] qui velint, & epulari, & recumbere possint. Fori area magna, & latè patenti ambitu est, quo scilicet spatio esse consueverunt præca fora.

Præcorum  
fora sub  
Platano.

At quæ in Italiam invecæ fuerunt, climatis inclementia, inquit Marth. in magnam proceritatem non adolefcunt.

Platanus  
nomen.

Meminit & Homér. Iliad. 2. Platani his verbis: καλὴν αὖτ' ἀπ' ἀνθρώπων. Intelligit autem Platanum, uti annotant Cæl. Rhod. & Curtius. Aliàs Platanistos loca spaciola amplaque denotat, à foliorum Platanii similitudine. Et Aristoph. ἡ δὲ πλάτανος τῆς γῆς ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου. Apoll. 2. ἡ δὲ πλάτανος τῆς γῆς ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου. Arist. de Mundo: πλάτανος ἡ γῆς.

Themisto-  
cles de Pla-  
tano.

Themistoclem Athenarum principem, cuius operam ingeniumque ac prudentiam summam non parvis in rebus, nec rarè, experta Græcia est, produnt auctores gravissimi, ut citat Cæl. Rhod. posteaquam amplissimè de patria esset promeritus, solum tamen sapientis convivio à civibus inaccessi. Vnde illius præclara circumferitur sententia: ἡ κατὰ τὴν φύσιν οὐκ ἔστιν ἀνθρώπου.

Eius præ-  
clara sen-  
tentia.

Quid eis negotium facessitis, qui vobis fuerit beneficii? Se quoque subinde Platano consimilem prædicabat, ad quam decurrerent, quos infestaret imber: mox verò serenitate reddita velleretur ab eisdem, interimque convitiis proscinderetur. Hinc tractum adagium: Platano adsimilis: in eos, qui cum alicuius necessaria opera usi fuerint, cum postea derisui & vilipendio habent.

Socrates  
per Platanum  
iuravit.

Socrates autem non ob aliam causam à Mileto reprehensus, auctore Maximo Tyrio, quàm quòd per Platanum iuraret, quali nefas sit per tam nobilem arborem iurare.

Plato à  
Platano co-  
gnomina-  
tus.

Volunt & Platonem divinum Philosophum, à Platano ita cognominatum, quòd is prælati humerus præditus esset. Platanistos enim Græcis, ut dicebamus, amplius & spatiofius locus est.

Mulvarum  
error.

Sed ut ad Platani historiam naturalem redeamus, errant tam in Germania quàm Anglia multi, ut in præcedentibus fusiùs ostensum, qui Aceris speciem maiorem Platanum putant, quam Germ. Åhorn vocant: fatentur in summis montibus, nonnihil humidis, inter Fraxinos nasci. At Theophrasto Platanus in palustribus inter Salices, & ad fontes rivulosque provenit, idemque non uno loco de eius natalibus scribit. Adde quòd tùm Theoph. tùm Plin. scribunt, Platanum spontè in Italia non provenire, Plin. etiam ex peregrino Orbe umbræ duntaxat causâ translata. Sanè, si Acer ille maior fuisset Platanus, ac Itali tam vicina regione, qualis est Germania, nasci cognovissent, (ut certè nosse potuissent verisimile est) nunquam ex peregrino Orbe accersivissent. Denique qui Acerem Åhorn describunt, non tam umbrosos ei ramos tribuunt, ac Plin. & Theoph. Platanus: ut de reliquis notis valde patentibus, nihil dicamus.

Alius error.

Sed minùs adhuc ferendus eorum error qui Tiliam seu Linden Platanum esse putant: nam, vel ex Diof. didicissent Platani folia esse Ricini similia, nisi quòd huius sint maiora, leviora, nigriora: quam similitudinem nunquam susti-

nebant folia Tiliz. Plin. quoque ait, Ficuum, Platanum & Vitem omnium amplissima habere folia. Tilia autem harum aliarumque multarum respectu parva habet. Ergo Tilia non est Platanus: ut & hic cæteras notas longè discrepantes, ex descriptionibus petendas omittamus.

Tabern.  
nos.

Tabern. quoque confundit Acerem cum Platano, dicens: Åhorn / Græcis σελίνδαμ, Lat. Platanus &c. Scilicet qui postremus de Plantis scribens, quod alios docere debuit, nondum didicit ipse.

Icon verò Platani, quam Camer. exhibet, iam olim ex nostra planta depicta fuit.

Synon.  
Lingua

Platanus Arab. Dulb. Germ. incognita, ali- quibus tamen Frömbd Åhorn / id est, Acer exoticum dicta: It. Platan: Hsp. Itidem. Gal. Plane Angl. Playnæce.

Etymol.

Dicta Platanos, à πλάτος, à latitudine foliorum: vel à πλάτος, quoniam est patulus diffusula ramis. Vnde ἀμφιπλάτος à Græcis. Dicitur & Platanistos, quòd sit πλεονάζων. Platani stem tamen sunt qui à Platano per diminutionem proferri putent: quum paronymon sive denominativum sit verius, nihil primitivo amplius, minùsve significans. Si enim diminutivum foret, exire debuerat in -ων, ut annotat Cæl. Rhod.

Platanus

Est & Platanon, locus Platanis confitus. Vnde Plin. junior epist. 3. l. 1. Quid agit Comituum mea delicia: Quid πλεονάζων opacissimus?

Aequi-  
acer

Aequivoca circa Platanum hæc invenimus. Cardanus & alii malè putarunt Acerem maioribus foliis esse Platanum, uti dictum. Lonicerus, ut priùs monitum, confundit Acerem minorem cum Platano. Cornar. Tiliam ineptè censuit Platanum, quem & in Tilia & paulò antè explosimus. Sambucus aquatica quibusdam dicitur Platanus aquatica, de quo suo loco. Platani nomen quoque in hist. Indicis obtinuit Mufa. Sparganion quoque dicitur Platanaria à fructus similitudine: de quo inter Gramina palustria. Platanus ab Horatio celebs dicitur, quòd non quemad. Vlmus ad sustentandas Vites adhiberetur.

Tilia,  
Sambucus,  
aquatica

Platanus  
calidus

De natalibus multa scribunt, cum præci, tùm neoterici. Conveniunt in eo, quòd gaudeat riguis & palustribus, aquarumque ripis. Platanum, inquit Theophr. in Adria esse negant, præterquam circa Diomedis delubrum: inque Univerfa Italiarum esse affirmant, quanquam multi magnique fluvii utrobique eam perfluant. [Vides eum distinguere Adriam ab Italia, id quod tunc, inquit Scal. fieri deuit, ut intelligat Adriam, Galliam cis Alpes.] Dionysius Tyrannus maior ambitiosius contendens in Rhegio in hortis consecit eas, quæ nunc in Gymnasio stant, nec ullam insignem magnitudinem capere possunt. At in alijs locis plurima nascitur. In Nilo Platanus provenit, non tamen multa. Hæc Theoph. Hodie Platanum multam in in Hetruria sponte nasci Victorius scribit. Videntur annon & is Acerem maiorem pro Platano accepit. Nam istud à nullo alio proditum invenimus. Videtur quidem speciosa & anosa Florentiæ propè pomæria, & in suburbio quodam non procul mœnibus urbis, ut observarunt Pen. & Lob. qui ex iis ramos & fructus defraçtos Augusto cum penè eebant maturvissent depingi curarunt. Coluntur & Romæ in viridarijs quibusdam, sed minùs proceræ sunt, nec folijs ita crebris, ut radios Solis impediunt, videnturque perire, inquit Lacuna, non irrigantur.

Locus

Theoph.



gantur vino, ut olim Romæ fiebat. Alioqui si commodum natura fuerit cœlum & solum ad 80 pedes excrevit. Anguillæ testatur Platanum non nasci sponte in Italia: sed in Creta locis vicinis fluviis abundare. At in Italia in agro Veronenſi, in *S. Maria in Stella*, in domo Dominorum *Giusti* conspici pulcherrimas in agro Bononiensi *alla Cronara* vulgo dicta in prædio Faenæ maximam, sicut & Patavij in horto *Torquati Bembi*. Vitis & in agro Veneto *Bassiana* dicta, in viculo cui *Fogia* nomen. Neapoli viti *Matthiolo*. In Creta ad montem *Ida* iuxta torrentis fontem in valle abundant Platanus, foliis omnibus deciduis, teste *Bellon*. Provenit etiam in Lemno insula. Item in monte *Athos*, ubi altitudine comparari possunt Cedris montis *Libani*. In monte *Castagna* in Macedonia. Antiochiæ habentur altissimæ. Sed altiores in monte *Tauro*, cuiusque nature sunt, ut cortices exuant hyeme, hac in re *Andrachnis* contrariæ, quæ id æstate agunt. In Sicilia frequentissima, etiamque sponte nascitur ad *Ætnæ* montis radices. Apud Hispanos, Siculos & Constantinopolitanos, inquit *Cordus*, in divitum hortis excolisimus. *Clus.* scribit Constantinopoli allata, ad aliquot *Orgyas* sibi *Viennæ* Austriæ crevisse. *Turner* duas etiam plantas teneras in Anglia vidit, sed aliunde advectas. Foliatum ramum cum *Pilulis* nobis dono dedit *Patavinus Pharmacopœus* ad *Aquilam*.

*Theophr.* tradit ex femine nasci. Argumento, quod aliquando in Tripode *Aeneo* nata. At [ad- dit *Scal.*] multa *avertuntur*. Verum non probatur nobis eius opinio, qui vix ullam plantam *avertuntur* nasci censimus. Parva femina [qualia & Platanus] leviâque facili de loco in locum transferuntur, à ventis, avibus &c. ex quibus nascantur. Quanquam ex femine quod ex Italia accepimus, à nobis fato, nihil unquam prodierit. *Celerimè*, inquit *Theophr.* pulcherrimæque germinat ex avulsione. Quæ etiam si quis iam proceram & arbori æqualem transtulerit, perdurare optimè potest. Idem prodidit & *Delphicam* Platanum *Agamemnonis* manu fatam, & alteram in *Caphys* *Arcadiæ* luto. In regione *Aulocrene*, per quam ab *Aparia* in *Phrygiam* itur, Platanus offenditur, ex qua pependit *Marsyas* victus ab *Apolline*, quæ iam tum magnitudine electa est, autore *Plin.*

Sed maxime mirum, quod *Theophr.* refert, & miratur etiam *Plin.* *Antandri* Platanum etiam circundolatis lateribus restibilem sponte factam, vitæque redditam longitudine decem (quindecim *Plin.*) cubitorum, crassitudine, ut quatuor viri non facile amplecterentur. *Plin.* ait, crassitudine quatuor vlnarum. Immo & secutum tam stantes quam prociduas ita ferre tradit *Theophr.* ut & refulgant, vivant, germinetque. Nam cum *Antandri* Platanus procidisset, ramis amputatis, truncoque securi luxato, surrexit noctu levata onere, atque reuixit, & cortex rursus circumcrevit. Quæ incredibilia non temere quis iudicabit, nisi idem *Theophr.* & alio loco idem traderet, & modum, quo id factum, adderet. Nempe causam hanc esse putat, quod arbor prostrata parte altera plurimum terre evulserit: mox flatus noctu ingens adversusque secutus eam propulerit, ramisque occurrentes, ac impressionem faciens, erexit. Fides sit penes autorem.

Inter primæ germinat Platanus, teste *Plin.* *Echini* autumno matureſcunt.

De insitione nihil specialius proditum. Apud *Plutarch.* *Symph.* quælibet. 6. legimus: fuisse *Pla-*

tanos Malorum furculos ferentes. Et *Palladius* libello de insitione, ubi de *Pomi* insitione tradit, inter alia sic canit:

*Robora rhyssigera Platanus concordia Baccho.*

*Fatibus insititur plena rubore novia.*

Platanus autore *Theophr.* lentore non caret, Viris & x4  
estque natura humida sicut & *Vlmus*: indicium, sus.  
quod post cæsuram erecta materies multum humo-  
ris emittit. Tenerrima Platanifolia, ut scribit *Diosc.* in vino decocta, mox illita, oculorum  
fluxiones sistunt, ac tum ædemata tum phlegmo-  
nas levant. Cortex in aceto coctus ad dentium  
dolores colluitur. *Pilulæ* verò virides, in vino  
potæ serpentum moribus auxiliantur: exceptæ  
autem adipe, igni ambusta sanant. Foliorum pi-  
lularumque lanugo (in aures & oculos) illapla,  
auditum visumque labefactat. Addit *Galen.* lib. 3.  
Simpleiusmodi Platanus lanugine, spiritu attrita,  
inspiratæ, arteriam quoque offendi, quippe  
cum ea vehementius excitet & exasperet: quo  
fit ut nox non obscure vicietur. Ideoque vitan-  
dam suadet.

Platanus eodem tradente, humidioris frigidi-  
orisque essentia est, non tamen multo plus  
quàm *Symmetra*. Proinde folia vicia trita &  
illita, non obscure *Phlegmonas* nascentes adiu-  
vant. Cortex autem & *Pilulæ* magis desiccantem  
vinum obtinent, ut ille quidem in aceto decoctus ad  
dentium adhibeatur dolores: *Pilulæ* verò cum a-  
dipe ad ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice  
combusto medicamen desiccantium & abster-  
sonum efficiunt, ut cum aqua lepras sanet: per  
se autem illitum ob humorem nimium ulcera  
vetera & fordida. Platanus, inquit *Plin.* adversantur  
vespertilionibus. *Pilulæ* earum in vino potæ  
x. quatuor pondere omnibus serpentum & scor-  
pionum venenis medentur. Tusa autem cum aceto  
acri, magisque scyllite, sanguinem omnem  
sistunt. Et lentiginem & Carcinomata, melanias  
quoque [melandriæque] veteres, addito melle  
emendant. Folia & cortex illinuntur collectioni-  
bus & suppurationibus, & decoctum eorum.  
Corticis autem in aceto dentium remedium est.  
Folia eorum tenerrima in vino albo decocta, o-  
culorum. Lanugo foliorum & auribus & oculis  
mutilis. Cinis pilularum sanat ambusta igni vel  
frigore. Cortex è vino scorpionum ictus restin-  
guat. Inopia cogit aliquando luminum causa è  
Platanis baccis [miramur Platanus baccas *Plin.* dice-  
re] fieri oleum, aqua & sale maceratis. Folia man-  
sa ieiunis impetigini auxilio esse & *Curtius* testa-  
tur, illudque *Serenus* expressisse hoc carmi-  
ne

*Seu folia Platanus, quod mansi, in mane vorabis.*

Vespertilio, scribente *Aliano*, Ciconiarum o-  
vis ingenita natura adeo infestæ sunt, ut ea solo  
tactu sterilia reddant. Verum ad illarum malefi-  
cium, naturalis etiam ingenita scientia remedium  
edocuit. Platanus enim folia suis nidis ingerunt,  
ut advolantes vespertilioes, perniciem adferre  
nequeant. Quæ de nocturnis autem tradit *Cæsar. Rhod.*  
fabulosa putat. Scribunt & alij hoc genus ani-  
malis à stabulis abigi, si in eis folia appendantur.  
Videtur autem *Avic.* foliis Platanus venenatis re-  
sistendi aliquam qualitatem tribuisse: Nam *Can.*  
4. fen. 6. tract. 3. legitur, *Fumus Adulb.* id est, Platanus  
& propriè foliorum eius, [ut vertit quod  
cum *Bellunenſi* *Santes Ardois* in suo opere de  
Venenis] serpentibus resistit.

In monte *Athos*, ut observavit *Bellon.* Cymbas  
parant ex magnis truncis Platanus, & sine magno  
labore & sumptu: unamquamque Cymbam ex

Oculorum

fluxiones.

Oedema.

Phlegmon.

Dentium

dolor.

Serpentum

morbus.

Ambusta.

Noxæ.

Temperâ

Lepra

Contra Ge-

peritiliones

serpentes

Scorp.

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

Contra Ge-

peritiliones

solo truncato parant. Deiciunt arborem iuxta radicem, deinde truncum cavant, & formant instar Cymbarum, quibus tranatur Sequana.

Nota ex  
pilula.

Considerandum autem an tunc dari possint Pilulae Platani in Potu, ut praescribit Plin. & Dioscor. Quandoquidem lanugo arteriam offendit, autore Galeno, qui vitandam suadet: ex Cordo etiam periculum [suffocationis] ex Pilularum posita lanugine annotavimus.

## FRAXINVS VVLGIOR.

### C A P. XII.

Descriptio


Folia.

Sapor.

Fructus.

Musci  
globosus.

Theoph. Il-  
lustr.  
Icon Dalech.



**S**PECTIOSA  
Sproceritatis ar-  
bor, crasso, sim-  
plici, erecto, cel-  
sique caudice a-  
dolescit, cortice  
ex cinereo viri-  
dante, materie al-  
ba, crispo pecti-  
num discursu un-  
dulata, validis ra-  
mis brachiata: fo-  
lia Sorbi modo  
pinnata, quadri-  
plici quintuplici-  
ve coniugatione  
ad costam anne-  
xa, atrovirentia,  
laxa, crenata:  
siccio sapore sub-  
amato, acriq[ue]  
mordaci praedita:

quem etiam saporem linguae imprimunt quoque fructus, qui peculiari furculo numerosi pendunt, quod inversam avis linguam referat, inde in seplasis nomen indepti. Ex his singulis scundam circiter longi, parum culmo latiores, infima parte membranae, à medio ad pediculum medulla facti sunt alba, gustu acri & amara.

Scribit Dalechampi. in Hist. Lugd. se globotos muscos, quales tradit Theophr. in Fraxino observasse & collegisse hyeme iam desinente: esse tuberosos, velut ex reliccato impensius glutinoso musco concretos, gustu nonnihil adstringentes, lignoso intus nodo muscosum corpus sustinente. An verò in Lauro tale quippiam gignatur nondum observasse.

Scimus quidem Theophr. lib. 3. cap. 8. Cum recenseret arbores quae praeter fructum peculiarem alia nonnulla ferunt, tradere, in Vlmogigni Vvam & folliculos: in Pico Grossos & Ficis: in Avellana Nucem & Iulium: In Illice, Glandem & Coccum: in Lauro fructifera, non omni quidem, sed aliqua eius specie, Baccam, & Vvam, *τὸ βόρπον*, nisi legendum sit *τὸ βόρον* quae tamen uva, inquit Dalech, in Lauro non fructifera, quam marem vocant, magis gignitur. In Lauro, addit idem Muscum aut Vvam me vidisse, equidem non memini. Hæc ille.

At nec nos quicquam tale hæcenus in Fraxino observavimus. In icone nostra, quæ ex Camer. ep. tome Matth. mutuata *βουρβουδης* quiddam seu racemosum appositum, uti etiam in descriptione non Matthioli, sed Theophr. quam priore loco ponit Camer. addens: praeter fructum alia quædam ferre, ut muscos in globum coactos, specie Pilularum. An verò idem intellexerit cum

Dalech. ignoramus. Sanè Dalech. icon nobis *τροπ. Dalech.* suspensa est, nec respondere videtur suæ descriptioni.

Scribit Camer. in horto, Fraxinum marem florere, sed non ferre fructum. Eius corticem interioriorem (ut Cæsalp. refert) aquam in qua maderit coruleam reddere. Idem ad Hist. Matth. gir. Germ. Ramis Fraxini curavimus appingendum rugosum tuber seu excrementum, in quod degenerat nonnunquam fructus, ex multis quasi pilulis constans, cuius meminit Theophrastus, ut mox tradetur. Idem Cam. & apud Thaliun annotat Fraxinum sterilem solam Rosculorum racemos nigros ferre, qui abique fructu, ut Luglandium Iuli decidunt.

Scribit & Pierius in Hieroglyph. l. 7. summis ramis Fraxini adnasci ceu cornu cervinum, amputato ramo, statimque corticem lachrymam plorare, quæ Visci instar crescat, varièque se contorqueat & crispet in larum: atque illud quicquid sit, penitus lignosum esse. Nascitur & Manna in Fraxino, ut dicitur in progressu. Fraxinus in [uxia] Dioscoridi arbor ignota est: idem non describit, sed tantum vires eius quasdam recenset.

At Theophr. l. 3. c. 11. Fraxini [uxia] duo facit genera: unum excelsum ac procerum, ligno candido, benè fibrato seu nervoso, [tumor: Gaza incipit & novè crassivenium convertit] molliore, crispiore, & magis enodi. Alterum humilius, minusque augescens, cabrius, durius, & flavius. Folia sicuti suntque Dalech. Laurinis, nempe Lauri latifolia similia: sed in acutius coacta, & in ambitu nonnihil serrata, nec tamen margine pungentia. [legimus enim, *ἐν τῇ πλάτῃ τῆς δάλεχ*, pro *ἐν τῇ πλάτῃ τῆς δάλεχ*, ut in vulgatis habetur: quam tamen vocem Gaza omisit [inquit Scaliger] & pro ea reposuit, ac subsidientia. Nec sanè dum mihi compertum est, an usquam extet Fraxinus aculeata: quapropter merito Scaliger mendum esse iudicavit. Totum ramum solum unicum [quodam rectius cum Gaza & Scalig. quam ut in vulgatis *ἐκκινω*] putaveris, quoniam ab vno pediculo folia simul iuncta exoriuntur, quæ coniugata velut pergenicula in singulis ordine dependent, frequentibus ac crebris coniugationibus, perinde atque in Sorbo. At humilis Fraxini internodia breviora sunt [Gaza *τὸ βόρον* non *τὸ βόρον*: quoniam *τὸ βόρον*, *μυρτιά*, *μυρτιά*] foliorumque coniugationes minus crebrae. Alba autem sive montana longæ, plurisque, quia latius distinet, latiora quoque habent intervallo, coloris porracei. [Gaza *τὸ βόρον*, Ita & Colum. At Hermol. legit *μυρτιά*, herbacei.] cortice integitur spisso, tenui, subrubro. Radicibus crebris, crassis ac profundis nititur. Idem hanc nullum fructum ferre putant: sed & flore catere. Fert tamen in siliqua [Gaza *ἐν τῇ πλάτῃ*] fructum parvum, nucis modo, Amygdalæ similem, gustu subamarum. Fert & alia quædam, veluti Muscos; [Gaza] sicut Picea [in Ald. legitur *τὸ βόρον* *τὸ βόρον*, sicut Laurus] verum magis compactos; [Gaza *τὸ βόρον* non *τὸ βόρον*] singulosque per se globosos, ut sunt Platani Pilulae. Ac eos quidem parvim fructui propinquos, partim à fructu multum distitos, hæcque ratione plures. [Gaza *τὸ βόρον*, ut & Dalech. vult. Alioqui legitur *τὸ βόρον* *τὸ βόρον*: quasi diceret: eodem modo & implicamina quædam nasci, sicut & Gaza vertit.] Lævis Fraxinus locis gaudet umbrosis valde: [Gaza *τὸ βόρον*: Gaza legit *τὸ βόρον*, nam concavus reddit, & de suo addit, maderis.] at quæ alpera [Gaza *τὸ βόρον*], siccis atque laxosis. Quidam alteram Fraxinum [uxia] alte-



*Bumelia*, ratin *Ευκάλυπτος*, id est, maiorem Fraxinum [Bubulam Fraxinum Gaza: latinus Væfraxinum dixisset, Scalig.] vocant, uti Macedones. Bumelia maior est & excellior (*μακροτέρα*: Gaza & Dalech. habent, rarior corpore) ob id minus crispa. Hæc .n. Fraxini natura, ut Bumelia campestris sit levis: montana verò scabra, quæ in genere campestrium & montanarum natura est. Quæ in montibus nascitur, benè colorata est, lævis, spissalentaque: at quæ in planis, malè colorata, rara & scabra. (*ῥαχέια*). Hic sibi contradicit Theophrastus. nam prius contrarium dixit. Sic itaque utramque Fraxinum describit Theophrastus: qui & alibi tradit, Fraxinæ radicem esse numerosam, densam, altamque.

Plinius, more suo, pleraque ex Theoph. transcribens, ita habet brevissimè. Materie causa reliquis arbores natura genuit, copiosissimamque Fraxinum. Proceræ hæc ac teres, pennata & ipsa folio: multumque Homeri præconio & Achilles hasta nobilitata. Materies est ad plurima utilis. Ea quidem, quæ fit in Ida Troadis, intantum Citro similis, ut ementes fallat cortice ablatò. [De Taxo hoc Theoph. l. 3. hist. c. 10. Erroris causa, quod Plin. Fraxinum, Milum esse putavit, ideoque etiam pinnatum dixit. Nimirum apud Theoph. *ἡντι τῆς ἰδίας*, legit *τῆς μαλίας*. Illius non huius folia, inquit Theoph. Abietis in morem *ἡντι τῆς ἰδίας*.] Pergit Plin. Græci duo genera eius fecere: longam, enodem: alteram brevem, duriorem fuscioremque [flavioeremque, Theophr.]. Laureis foliis. Bumelian vocant in Macedonia, amplissimam, lentissimamque [latissimamque Dalecham.]. Alij situ divisere. Campestem enim esse crispam: montanam, spissam. Hæc Plinius qui dum folia, Theophraster lectionis imitatione, Laurinus comparat, de particulari id intelligendum, non de tota & alata illa foliorum congerie, quam totam folium dicunt Herbarij.

Colum. Fraxini non semel meminit, ubi de Vlmariis faciendis tradit. Speciatim post Opulum atque Vlmum, Vitem maximè alere Fraxinum scabit: sed neque Opulum neque Vlmum tam idoneas esse, quàm Ornos. Eas sylvestres Fraxinos esse, paulò latioribus tamen foliis, quàm cæteras Fraxinos, nec deterioerem frondem, quàm Vlmæ præstare. Tam Ornus quàm Fraxinus Virgilio quoque catuine celebrata Ecl. 6.

Cantando rigidas deducere montibus Ornos. & Ecl. 7. Fraxinus in sylvis pulcherrima Pinus in hortis. Populus in fluviis: abies in montibus altis. Sapienter si fime Lycida formose reutis. Fraxinus in sylvis cedat ribi. &c. Et alijs multis locis. Et Iuven. Satyr. 1. Quantes iaculetur Monychus Ornos.

Cum itaque dicat Colum. Ornum esse Fraxinum sylvaticam seu montanæ, ac Theoph. referat rupium Fraxinum colore esse luteo, & Germanorum Wald escher montana sit colore luteo, ut experientia sibi compertum esse scribit Turnerus, rectè nobis videntur statueri, quæ Fraxinum montanæ & sylv. Germanorum, esse Ornum Latinorum, & Fraxinum sylvest. Theophr. statuant. Nam Sorbus aucuparia in præcelis montibus non oritur, sed in depressis & agnoscis. Quod sit ut Ornus esse non possit, aut Fraxini 2. genus apud Theophr. In Plinio verò miramur, quod Ornum post prædictos scriptores non Fraxini speciem faciat. Imò eius non tantum in loco, quod quidem legerimus, mentionem faciens, interponat inter Ornum & Fraxinum Acerem valde dissimilem arborem idque L. 16. c. 18.

Hermol. in Diosc. Fraxinum *Mileam* & *Meliam* *Mileam* quoque Græci vocant, *Trinodemque* cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habet prægrandes, ordinatos, parèque numero: quod genus arborum Græci *Ἀγλαυόφυτον*, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant. Duo genera. Excelsum & alterum humilius. Sed folio Lauri latifolia acutiore, lævitèrque per ambitum nem ferrato: & ut Theodor. inquit, subsident, quia legisset, *δυνατίζον*. Nos *ἡντι τῆς ἰδίας*, hoc est, non sine quodam marginis, vel cacuminis aculeo. Fructum fert minutum in siliquis, qualem Amygdalæ, gustu subsalsum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscum: & alia quædam adstrictiora gustu, circinatæque ut Pilulæ Platani: Hæc partim cum fructu emergunt: parum multò post nascuntur ei & quæ plecta, hoc est, plicamenta sive involucria dicuntur, &c. Id & Cæsalp. observavit: dicens, Plinium non subiungere loco citato Ornum Fraxino: quasi multum differant & non sint eiusdem generis. Eius opinionis videntur fuisse, qui diversam multum à Fraxino plantam, Ornum putarunt eam quæ sorbus aucuparia dicitur, contra mentem Columellæ. Quæ autem ex Fraxini genere certò sit Ornus, nondum asserere ausimus. Scribit quidem Anguil. Inveniri Fraxini duas species, unam altissimam, ex quibus hastæ: alteram Latinis dictam Ornum, cuius semen dicatur Orneoglossum & Offic. Lingua avis, ac utramque speciem notam esse in Italia: At alij, linguam avis Fraxini dicant: alij utriusque, diligentius autem hæc perpendant Itali.

Cordus utramque sic describit. Fraxinus simpliciter ita dicta, & *ἡντι* Græcis, minoribus est & angustioribus folijs, & semine seu fructu graciliore. Altera verò latioribus maioribusque tum folijs tum fructibus conspicitur. Eius frondes ad Boum pabula quidam adhuc non minis quàm olim reponunt. Vnde Bubulæ cognomen apud Græcos invenit, quamvis à magnitudine ita nominari poterit. Eiusdem iudicio Fraxinus sylv. seu Ornus nihil aliud est, quàm magna illa *ἡντι* latifolia Fraxinus montibus familiaris. Idem Fraxini aliam speciem eandem censet, quæ Orni nomen circa Romam servat adhuc hodiè, in Germania non proveniens. Fructum vulgò Linguam avis vocant. At Tragus Linguam avis ad Fagum sepium manifesto errore refert, cum huc potius sit reducenda.

Avic. Linguam avis reponit inter medullas: *Lingua a.* & alio loco plantam censet. Nam foliotum eius *ἡντι* & corticis medicinas scribit.

Serapio arborem esse dicit similem arbori Didar, id est, Vlmò. Verum in Fraxino, non in Vlmò invenitur res quæ Lingua avis nunc dicitur, de qua & mentio non semel apud antiquos, cum & ad Venerem facere proditum sit.

Gal. in confect. Hepaticis ab Asclepiade conscriptis cuiusdam meminit, quæ semen Fraxini recipit. Aetius verò l. 10. idem medicamentum ex Philagrio citat, & Oribasium Fraxini semen non admittere scribit: additque, Fraxini semen, seu fructum esse arboris, ex qua Fraxinea ligna quocunque in opere apta ac obedientia, caduntur, hoc est, *ἔξ τῆς ἡντι τῆς ἰδίας*, *ἡντι τῆς ἰδίας* Gal. alioquin lib. simplicium Fraxini nō meminit, ut neque Aetius. Paulus Diosc. verba transcripsit, nihil amplius addens. Patet itaque Manar. dum perperam dixisse de semine Fraxini ab antiquis nullam fieri mentionem Fraxini, inquit Matth. species sunt, Ornus, itemq; Orneoglossum dictum, quod ferat semen illud, quod Linguam





Theoph. vocat] ad quaternos pedes, monente Plinio: qui ante tricesimum sextum mensem attingi falce vetat: & alterna servari brachia, alternis putari annis, suadet. Sexto anno matantur cum vitibus, quas maxime alere Colum. prodidit: ac in eum finem locis asperis vel montosis rectè feri monet, quod iis minus letantur. Nimirum ne plus iusto excrescant. Quomodo autem disponenda Fraxinus habes apud Colum. lib. de Arboribus, cap. 16. Sed hanc rem abundè docuimus in historia Ulmi.

*Infusio.* De infusione Fraxini nihil adhuc legimus: nisi quis fortè suspicari volet Pyrum inferendum Orno ex illo Virgiliano Carmine Georg. 2.

*Ornusque incanuit albo*  
*Flore Pyri.*

### FRAXINVS TENVIORI ET MINORI FOLIO.



**E**ST & Fraxini varietas alia: cuius folia pinnata segmentis dividuntur tenuioribus, striatioribus, acutioribus, serratis tamen perinde ut Fraxini vulgaris. Rami, pluribus & crebrioribus tuberculis foliorum pediculis sedem dantibus, navales. Iconem nostram bene pictam, minus affabre expressit sculpsit, ex ea quæ expressa in hist. Lugd. quam ex

nostro ramo iam olim pingi curavimus. Ramum ex Lugduno vicinis montibus collectum adhuc hoc anno 1695 quo hæc commentatur, adferimus.

An hæc sit Ornus Columellæ? Cuius folia singula dicit oblongiora, angustiora, obscurius virentia &c: Vix videtur. Non enim sunt oblongiora.

An hanc intelligit Turner. cum in Herbario suo Anglico ita scribit. Theophrasti Fraxinus altera, seu Petrea, montes amat: eadem cum Fraxino sylvatica seu Petrea Germanorum, hoc est, Waldefcher: & Orno Latinorum, de cuius natalibus Virg. 2. Georg.

*Nascuntur steriles sanosis montibus Orni.*  
*& Aeneid. 6.*

*Ingentes advolvunt montibus Ornos.*  
Non ausimus tamen hac de re quid certi asserere.

### FRAXINVS ROTVNDIORE FOLIO.

**S**ED & tertia Fraxini à nobis observata varietas, cui coniugatum quoque disposita folia, sed quæ Pistaciorum folia referunt, lubrotunda, minora quam Fraxini vulgaris, in ambitu serrata, in quibus medietas interior ad nervi immum, brevior quam exterior sæpè conspicitur, id quod



in Terebintho & Pistacis usui venire subinde observamus. Hoc Fraxini genus attulit nobis D. Caspar. Bauhinus ex Italia cum hac inscriptione: Ornus 3. Galli Braxiani de re rustica.

Præter Fraxini Equivocorum genera à nobis enumerata aliarum plantarum quoque id nomen aut simile acquisivere, quæ vitanda equivocationis ergo hic consignanda. Inprimis

Sorbus aucuparia, quæ ab aliquibus dicitur Fraxinea arbor: aliis Fraxini sylvestris species, & Fraxinus bubula, & Ornus, de quibus paulò ante. Cæsalp. scribit: Ex Fraxini genere fortè fuerit lignum in nova Hispania repertum, cuius ramenta cæruleum elegantissimum reddunt. De hoc ligno in superioribus libris egimus. Oxyan Plinius Fraxinum interpretatur, ut Scal. quoque annotavit. De Oxya seu Fago vide lib. præcedentem ubi apparet, quibuldam etiam Ornum dici. Considerandum an Thallio & Horto Lusitane Fraxinus, Fago similis, Buchesche sit nostra Fagus sepium, quam malè Tragus quoque Orneoglossum putavit. Non placet Lobelium in Obs. scribere de Lantana; & Bæiner Mälbaum Tragi i. Fraxini minor. Distamnum album quorundam, nonnullis dicitur Fraxinus pumila & Fraxinella. Polygonatum quoque dicitur Fraxinella sive Fraxinella. Apud Gesnerum videre est Lilium Convallium dici Fraxinellam, ut alibi ostenditur. Tractatus Quid pro quo, deficiente Fraxino substituit Sabinam, quod non probamus.

Fraxini femina, autore Hippoc. numero decem trita, & cum vino pota, urinam ducunt, & vulvarum doloribus auxiliunt. Foliorum succus, teste Diosc. & ea ipsa quoque, cum in vino pota, tum etiam imposita, viperarum moribus opitulatur: [Quidam addunt, ad mordicis: sicut & cortex Spleneticiis.] Cortex usque & cum aqua illitus, lepras remouet. Ligni ramenta [porreclata] pota lethalia perhibentur. Hæc ille. Nos suspicamur Dioscoridem apud veterem quendam malè legisse, usque pro melle, ut fecit Plin. qui eius coævus putatur. Nam apud Gal. de med. facillè parab. cap. 40. legimus, Fraxinei ligni ramentorum Cyathus triduum potui datus, sanitatem restituit: quod utique non scripsisset, si lethalia agnovisset. Er in lib. de Dynamid: eidem Galeno adscripto: Ad Splenem: Cortices Fraxini excoque in Vino, & bibat quotidie donec sanetur. Si vis probare da porcello per triduum ut bibat, & in quarto occide ipsum, & non inuenies splenem. Nos vix verisimile putamus. Res est experimenti. Idem lib. ad Hamorrhoidas: Oleum Fraxini injectum ad melle prodest.

Columella Fraxinum & capris & ovibus gratissimam dicit, nec inutilem bubus. Et alibi: Orni frondes, inquit, Capra & oves libentius appetunt.

Folia alie-  
bi mortife-  
ra.  
Contra ser-  
pente.  
Vlcera.

Fraxini  
cui serpē-  
tibz anti-  
pachia.

Plin. cor-  
rect.

Hepaticū  
laxer dor-  
lor.

Hydro-  
pneum.

Experi-  
menta com-  
parata.

Itus ser-  
pentium.

Hepaticum  
med.

Noxa.

Hydro-  
pneum.  
dolor.

Aqua cor-  
eum.

Calculus.

Idem.

Oleum li-  
gni.

Pocula ad  
venem.

Cautio au-  
torum de  
oleo.

Ex re si-  
canti.

petit, quam Fraxini aut Vlmi. At longē secus Plinius: Folia Fraxinorum, inſit, iumentis mortifera; ceteris ruminantium innocua, Græci prodidēte. In Italia nec iumentis nocent. Contra serpentes verō ſucco expreſſo ad potum, & im- polita ulceribus, opifera, ac nihil æquē, repe- riuntur. Tantāque eſt vis, ut ne matutinas qui- dam occidentēſve umbras, quā ſunt longiſſi- mæ, ſerpens arboris eius attingat, adeh iplām gyro claudatur ignis & ſerpens, in ignem potiūs, quā in Fraxinum fugere ſerpentem. Mira na- turæ benignitas, priūs quā hæ prodeant, flo- rere Fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. Idem alior: Fraxinus quā vim ad verſus ſerpen- tes haberet, indicavimus. Semen foliis eius inest [reſtūs legis ſiliquis aut folliculis: non enim in foliis ſemen, ſed ex alijs ut Theoph. ait, & docet experientia] quo medentur iocinoris & lateris doloribus in vino. Aquam quæ ſubit cutem, extrahunt. Corpus obefum levant onere, ſenſim ad maciem reducentes, iisdem foliis cum vino tritis ad virium proportionem, ita ut puero quinque folia tribus Cyathis dilvantur, robu- ſtiſſimis, ſeptem folia quinque Cyathis vini. Non omittendum, ramenta eius & ſcobem quibuſ- dam cavendi prædici. Hæc Plin.

Camer. quoque ſcribit, ſe expertum ſerpentes Germanicos non fugere Fraxinum. At longē aliter Ambr. Paræus in ſua Chirurgia: Expertus inquit reſero. ſi fronde Fraxinea gyro claudatur ignis & ſerpens, in ignem potiūs, quā in fra- xini: um fugere ſerpentem. Vtri nunc creden- dum? Experiendum. Scribit tamen Colum. lib. 6. cap. 16. Vbi bos à viperaiſtus fuerit, præſens remedium eſſe, ſi conteras fraxini teneri cacu- mina quinque librarum, & eo idem vini, & duo- bus ſextatis Olei, expreſſiſque ſuccum ſucci- bus inſundas. Itēque cacu mina eiſdem arbo- ris cum ſale trita læſæ parti ſuperponas.

Gal. l. 8. vbi dicitur, ex Aſclepiade ſub ſinem libri, hepaticum medicamentum deſcribit hoc titulo. *ἀλλὰς ἀντιρεπνίου. μίλιον αὐτὸς τὸς ἀλλὰς ἢ τὸς ἀντιρεπνίου. μίλιον αὐτὸς τὸς ἀλλὰς ἢ τὸς ἀντιρεπνίου.* In cuius compoſi- tionem quoque ingreditur fraxini ſemen.

Idem ſemen & tuſſum inferre, & fauces exa- ſperare, Curtius prodidit, integrum devoratum prodeſſe, & dentibus commiſſum, ut ait Serenus: quo etiam auctore, hydropticis potum conſert. Aurium etiam doloribus inſuſus ſuccus, cum torretur, prodeſt, ut idem teſtatur hoc carmi- ne:

*Quinti ſecus teneras dolor alit ſauciat aures,  
Fraxinea in ſtammis fundit quem talea ſuccum  
Inſilles.*

Aqua è corticibus Fraxini deſtillata, unicè & ſingulari remedio ad calculum & morbum re- gium facit, inquit Tragus: Folia vino decocta & pota hepaticis & ſpleneticis conducunt. Ea- dem præſtat oleum è ligno Fraxini conſectum, ac potum, tradente Manardo ſuper Meſuem. Succus hydropticis, meo iudicio: non inutile fue- rit remedium. Pocula quidam ex ligno Fraxi- ni parant, pollicentes, ſi quis ex eiſmodi poti- lis aſſiduè bibat, eum lienem extenuare hæc pa- cto poſſe. Idem & Hollerius commendat, & alii quidam.

Si oleum Fraxini fuerit paratum per deſcen- ſum, ut loquuntur: nullo modo ſuademus per os exhibendum: ſin alia ratione, magna cum prudentia exhibendum. Duobus namque mo- di oleum è Fraxino paratur. 1. E viridi Fraxini

ligno teſſellatim conſiſo per deſcenſum, uti lo- ſci. elici-  
quuntur Chymici, tant aqua quā oleum elici-  
potest, ſicut ex ligno Juniperi vulgus elicit. 2. Iſ-  
dem teſſellis, ſed minutius conſiſis, in aqua pro-  
pria, addito altero tanto ſpiritus vini, aut media  
parte, maceratis, & poſtmodum deſtillatis: exi-  
bit aqua cum oleo, quod ab ea poſtea ſeparatur.  
Theophr. Fraxinum humidiffimam dicit, ex eo  
quod lecti cedentes & obſequioſi ex ea ſiant.

Folia, cortēque Fraxini moderatè calida ſunt, Tempora.  
auctore Dod. & tenuium partium. Semen cale-  
facit & exiccat tertio exceſſu. Foliorum & cor-  
ticis decoctum ex vino potum hepar ſplenē-  
que ab obſtructionibus expedit, roboratque, &  
lateris doloribus medetur. Idem folia præſtant  
in oleo ſerveſacta, & lateri impoſita. Folia, cor-  
tex, turionēſque eodem modo ſumpti valent ad  
hydropem, quia vacuant aquas. Ad idem facit ſe-  
men in vino decoctum, Sereno teſte:

*Fraxineum ſemen cum Bacchi rore bibendum eſt.*

Lingua avis, tradente Matth. in recentiorum  
Medicorum uſu eſt ad ſtimulandam Venerem, Ad Vene-  
rem.  
qua in re primū celebrata ab Arabibus. Clara  
experientia, in Italia, inſit idem folia non lethali-  
iumentis, ut voluit Plinius [imponit Plinio  
Matth. nam contrarium dicit Plin. nempe in Ita-  
lia non lethalia eſſe] & malè cum tuerur Rob.  
Conſt. quin inſi ſi ea exhibentur, ubi aſſum-  
plerent Taxum, liberantur à morte.

Videamus autem quid Rob. Conſt. quem Mat-  
th. notat, de eare ſcribat. Carpiunt, inquit, Pli-  
nius, à Matthiolo (cuius etiam aſſecta in hac par-  
te Amatus Luſit. & in multis imitator atque re-  
prehendor) quod lib. 13. c. 16. dixerit Fraxinea fo-  
lia iumentis mortifera, ceteris ruminantibus in-  
nocua, ex Græcorum autoritate: quum hoc i-  
plum Theophr. Taxo aſſeſſerit. Sed proſectò  
ab hac calumnia exonerandus eſt Plinius noſter:  
Primum quidd hoc pro vero non aſſuat: imo li-  
quidò teſtetur, id non verum in Italia deſchen-  
di. Secundo loco, quod abſurdum non ſit, ean-  
dem facultatem differentibus plantis genere, à  
diverſis autoribus attributam, & tantum à Plinio  
recitatam. Neutèrque mihi probat, Plinium, qui  
omnium optimè luculenter Græcè ſciet, tam ſi-  
cile vicinitate nominum abſtraſſe, ut ipſi cau-  
ſantur, aut potiūs criminantur. Ad hæc, quæ  
nominum aſſinitas in his vocibus Græcis *quidæ*  
& *μύλα*, id eſt, Taxus & Fraxinus: de quibus, vi-  
cinis capitibus egit ipſe Plin. nominatimque per-  
ſcripſit lib. 16. c. 10. Taxum ipſam à Seſtio Smyla-  
cem appellatam eſſe. Sed ambo dum ambitioſè  
Græcan ſtudent, & videri volunt in his doctri-  
næ literis tantum proſeciſſe, ut utriuſque linguæ pe-  
ritiſſimum Plinium, inſcitæ coarguant, proſectò  
vel in Grammaticis, ſuam produunt imperitiā,  
quod utriuſque cauſa doleo. Siquidem *μύλα* per  
iota, & *quidæ* Græcè dicitur. Sed pro Hederæ  
ſpecie & frutice, quem deſcribit Dioſc. l. 2. *quidæ*  
verò per ypsilon eſt Taxus, da qua Dioſc. l. 4. &  
l. 6. & Plin. l. 16. c. 10. non antea *μύλα*, ut legit  
Amatus Luſit. apud Theoph. *μύλα* enim ea ſcri-  
ptura idem eſt quod *μύλα*, ſive *μύλας* *μύλας*, Lepi-  
molaris. Atque ita ſemper diſtinctum invenies  
in emendatis codicibus. Verūm iſti ſcripturæ  
confuſione ſeſe implicanc & alios credulos per-  
trahunt in errorem.

Sic itaque Rob. Conſt. quiritur contra Mat-  
thiolum & Amatum pro Plinio. Cui Matth. re-  
ſponder in poſt. com. in Dioſc. Ac utique hal-  
lucinari ſcribit Conſtantinum dum contra ſuam  
ſententiā Plinium defendere nititur. Rei ſi-  
dem

Obſtruc-  
tio-  
neſcerā.  
Plemis.

Amatus  
Matthioli  
imitator  
ex repræ-  
henſor.

Matth. re-  
preh. ex  
Pli. deſend.

Matth.  
ſponſum  
Conſtan.



dem esse Plinium lapsum fuisse, claram in Italia experientiam: siquidem Taxi foliis, non Fraxini, iumenta non ruminantia necentur. Quinimò hanc salutare præstare remedium lethali bus serpentium venenis: quibus adde inimica sit Fraxinus, ut ne maritimas quidem occidentesve umbras, quamlibet spatiosas, serpentes arboris huius attingant. Miraque naturæ benignitate, priusquam illa prodeant, florere Fraxinum. Quo argumento fretus, errorem Constantini facile à quovis materiam medicæ studio, detectum iri concludit. Aut si (inquit) suam ipsius ignorantiam & Plinij errorem cognoscere cupit, alat suum equum aut asinum Fraxineis frondibus: id si fecerit, sui erroris atque Plinij palinodiam recantabit. Quod si plura à nobis doceri non dedignabitur, sciat devoratis à quadrupedibus Fraxini foliis ea ceterò sanari, quæ Taxum fuerint depasta. Hæc Matth. ad Rob. Constantinum. Et sanè qui diligenter Plinij verba perpenderit, & cum Theoph. verbis, quæ de Taxo edidit, contulerit, facile indicabit Plinium, quod ei non ut quæ adde est insolens, vocum *usuius*, & *usuius* seu *quidam* similitudine deceptum, ut de Matth. experimentis aliorumque nihil amplius dicamus. Probandum fuit Constantino, *usuius* non esse Fraxinum. Et si non agnoscat affinitatem inter has voces *quidam* & *usuius*: at agnoscat, inter *usuius*, & *usuius*, cuius vocis nomen meminit quidem. Accedat quoddam Hermol. Ruell. alique doctissimi viri, Plinij lapsum agnoverint. Parum itaque attendit Plinium de Fraxino scribentem perpendisse videtur Rob. Const. dum eius errorem non agnoscens, novo errore pro defensione cumulat. Sed de his plura facis.

Pergit Matth. in vitibus. Humor qui refuscat urendo Fraxini lignum, mixtus cum pari pondere succi Cyclamidis Scyllæ & Rutæ, ac non nihil simul decoctus, valet ad surditatem, si eundo cubitum ponatur in aurem sanam, ita ut æger dormiat supra sanam. Si aut in utraque aure surditas, ponatur in aure minus affecta. Aqua extracta ex lignis per descensum, ablato oleo, mixta cum aqua Violarum, tollit ruborem & pustulas faciei. Decoctio corticis ramorum sumpta per aliquot dies imminuit humidum splenem. Lingua avis vilis est in potu pleuritidis & ad provocandum urinam. Etsi cum Pistaciis, nucleis Pineis & saccharo iuvat coitum. Si colligatur principio Novembris, exsiccecur in furno, & eius pulvis detur cum vino, plurimum confert adversus renum calculos. Singulare experimentum contra calculum. In minutis talcoas concisæ Fraxini sumuntur M. ij. quibus affunduntur vini albi lib. iij. ad tertias coquantur: per linteum colati iuris Cyathus in quo tenuissimæ serraturæ Fraxini drachma insula fuerit, bibitur manè calidus octo diebus continuis: Præservat à calculo diu: quod in multis experientia verum comprobavit. Cinis Fraxini cum aqua mistus, scabiem illius profligat. Recens cortex vulneri recenti superligatus, ita constringit, ut futura non sit opus. Coquitur eius cortex in aceto, quod ex spongia calidum ventriculo adhibuit, vomitus compescit. Idem in vino rubro coquitur, quo utiliter fovetur dysentericorum ventres.

Quamvis autem Diosc. ligni scobem potu lathalem credi tradat, esse tamen scribit Cæsalp. quæ eius decocto utantur vice ligni Guaiaci, foelici successu. Eius cortex internus aquam, in qua macuerit, cornileam reddit, quam apponunt Gallinis, cum morbis vexantur, eodem teste.

Loquelâ deficiente corticem Fraxini linguæ *Loguale deficiens.* supponi iubet medicamentarius lber VVirttembergicus, & restitutum in promittit. Magnum sanè remedium, si verum & probatum. Fraxino Spleneticos, Nephriticos, & Lue Venerea affectos scio curatos, inquit Lob. Qui igitur sunt ramenta venenum? siquidem ipsa adversatur venenis. An quia corpori non venenato imprimit illam qualitatem, quam in venenum exerta fuit. Siquidem Cantharidibus hæc perquam grata est: ut pote in quâ nascuntur, victitant & moriuntur. Id verò, ut de Iunipero dicitur, ramorum alperitate posse interimere quosdam, qui noxam non sentiunt ex decocto. Corticis radicis cinis nodulo exceptus cauterij potentialis supplet vicem madefactus & impositus: indeque foraminulum contractum referatum, immisso Hederæ folio, fovetur. Corticis, seminis & foliorum decoctum surditati fassitu medetur, occulta proprietate. Sal Fraxini sudores movere urticis mixtus: medicamentis autem purgantibus, ferrosi evacuat, stimulosque agit. In immensi illa peste Lugdunensi, ubi ego Bauh. medicus ordinarius urbis stipendio detinebar, observavi quosdam usos Fraxini cortice ad potiones sudorificas pro peste correptis. Ad reddendos capillos pulchros Cento medicamentorum VVirttembergicus iubet accipere mense Aprilis Fraxini gemmas & folia, eademque siccata & pulverisata, quantitate medij ovi, linteo involuta macerare in lixivio, quo pili abluantur. Vlum Fraxini ad stipandas vites diximus in cultu ex Colum. Virgil. & fudes commendavit:

*Fraxinea: aprare fudes furcæque bieornes:*

Nempe Vitibus. Nec minus hodiè in usus venit serenda inter vites, quamvis facile à gelu laudatur, & minus daret Acere. Verum quia facilius provenit Acere, & quia serpentes eius umbram refugiant, ut etiam Aug. Gallus non ignobilis Geoponicus Italus testatur, & in Italia locis quibusdam Vitibus adferitur, vel potius Vites adferuntur huic, ut ea sustineantur, quod & Cæsalp. testatur.

Sed & folia ac frondes hodiè in quibusdam locis in usu sunt ad sustentandas oves & capras: speciatim prope Acidulas Vlmensium, Fraxini passim coluntur in eundem usum. Priusquam decidant folia, frondem decerpunt & præleant, fasciculosque conficientes in hyemem siccatos reponunt. Quo tempore iis rodendos & devorandos suspendunt, id potissimum tertio quoque anno facientes, sicut & de Coryli ramis, uti nos observavimus.

Porro tantus est materiei usus, ut Fraxinum præ aliis copiosissimæ materię causa naturam generasse, scribere non dubitarit Plinius: quippe quæ obedientissima sit in quocunque opere, tandemque pro hastis Corylo melior, Corno levior, Sorbo lentior. Est sanè Fraxini lignum tenacissimum ac durissimum, ob quas doctes & ad hastas expetitur, huicque longitudine, rectitudine non aliud lignum præferri, nedum confecti potest. Ad ephippia & farissas conficiendas passim expetitur, maxime in Anglia, Hibernia & Scotia. Abacis, mensis, cochlearibus, poculis conficiendis commodissimum. Denique quicquid ex ligno fieri debet, ita ut subtile, fabrilè factum etiamque forte esse debeat, ut magnam vim sustinere queat, non melius ex alio, quam existo parabitur. Vtuntur & ad Rhedas & similia instrumenta. Ex radice pugionum manubria fiunt, præsertim sylvestris, quæ materię

*Spleneticos, Nephriticos, Lue Venerea.*

*Cantharides*

*Cantherin.*

*Surditas.*

*Sal Fraxini ad sudores, Purgans.*

*Pessis, Capillorum ornatus.*

*Sudes pro vitibus.*

*Vfus ligni.*

elegantia prædicta longè præfertur, atque ad eundem striarum varietate, nec Aceri quidem cedit: qualem in Poloniæ sylvis crescere audimus: immò vix pulchrius lignum in tota ad eundem Europa crescere tradunt. Nobile vocant: Germ. *Edeleschern*: quale apud nos non crescere artifices testantur.

Quæcumque vires primæ seu vulgari Fraxino tribuuntur, isdem prædita est & alia, sed efficacioribus, vel Turnepi iudicio, nisi ubi maior humiditas requiritur. Tum verò accommodatior est vulgari.

Sed nec illud prætereundum quod Oribas. ex Heliodoro monet: Bases, crura, latera, transversaria, Cubitos, testudines, adiunctaque crura, cæteraque quæ in organis Chirurgicis ampliora expetuntur ex ligna vel fraxinea materie, quæ secundas obtineat, conficienda.

Organæ  
Chirurgi-  
cæ.

### DE MELLE AEREO, MANNA, TERENIABIN ET SACCHARO Alhuzar in genere.

#### CAP. XL

Infusum  
rati.

**D**Iu multumque cogitavimus, quonam loco esset collocanda Manna: quam nostram dubitationem iniecerunt potissimum ii, qui Mel æreum existimant. Sed Experientia tandem Clarissimorum Medicorum cedentes, atque potissimum insignis illius Altomari, statuentis ac docentis Mannam esse liquorem seu Lachrymam Fraxini & Orni, libuit hoc loco de ea in genere & specie tradere.

Arist. de  
melle æ-  
reo.

Incipiemus à verbis summi Philosophi Aristotelis sic scribentis de apibus: Construunt favos de floribus, ceram ex lachryma arborum fingunt: Mella ex rore æris, syderum ortu potissimum, & arcus cælestis incubitu contrahunt. Omnino ante Vergiliarum exortum mel non fit. Favos itaque, ut dictum est, ex floribus faciunt. Mel ipsas non facere apes, sed rorem candentem deferre, argumento est, quod uno aut altero die cellas cera repletas inveniunt Apiani.

Theophr.

Adhuc clariùs Theoph. lib. 3. hist. cap. 9. de melle æreo scribit, his verbis. Quercus ferax arbor est plurimarum rerum. Sin autem, autore Hesiodo, Mella quoque apesque ferat, magis illud quoque confirmatur. Ergo nascitur & melleus hic liquor ex aere, nec aliis magis insidet frondibus.

Plin.

Ex quibus & Plin. sua mutatis, tamen fusiùs eadem declarat. lib. 16. cap. 8. Robora ferunt & Viscum & mella, ut autor est Hesiodus: constatque rores melleos de cælo cadentes non aliis magis insidere frondibus. Et lib. 11. cap. 11. & 12. Nihil horum [apes] statò tempore, sed rapiunt diebus serenis mania: & melle uno, alteròve ad summam, die cellas replent.

Ex aere ve-  
nit.

Venit hoc ex aere, & maximè siderum exortu, præcipueque ipso Sirio exsplendescente fit: nec omnino prius Vergiliarum exortu sublucanis temporibus. Itaque tum prima aurora folia arborum melle rosida inveniuntur: ac, si matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt: si veille est Cæli sudor, si siderum salvia.

Cæli sudor.  
Siderum  
salvia.  
Aurum  
suc-  
cu.

ut si aëris succus: utinamque esset & purus ac liquidus, & suæ naturæ, qualis defluit primò. Nunc verò è tanta cadens altitudine, multumque

Tom. I

dum venit, sordescens, & obvio terræ hiliti infectus: præterea è fronde & pabulis potus, & in utriculos congestus apum (ore enim vomunt) ad hæc succo florum corruptus, & alveis maceratus, totiesque mutatus, magnam tamen celestis naturæ voluptatem affert.

Altomarus iungit ex Plinio, ea, quæ scripsit cap. 14. eiusdem libri, de altero genere mellis, quod vocatur *Hortæum*: Verum quum ea, quæ ibi dicuntur, nobis videantur intelligenda de Melle propriè & simpliciter dicto, hic omittimus. Videtur & Virgil. de Melle propriè dicto scribere: Georg. 4.

Protinus ærei Mellis calestia dona  
Exequar.

An verò Ecl. 4. intellexerit Mellei rorem de cælo cadentem ut quidam existimant, aliis considerandum relinquimus. Eius hæc sunt verba:

Et dura Quercus sudabit rosida Mella.

In Quercu sanè foliis non semel observavimus Rorem melleum, quemadmod. & in foliis Tiliæ, quem nostro iudicio, nec Quercus neque Tilia sudabat: censemus Virgilium potius Poëncè loqui, quàm verè. Curtius tanquam miraculum extollit, quod ex Quercubus mel destillet, & de hoc Hesiodum ac Virgilium loco posterius citato loqui censet. Cordus præter iam dictum Melleum liquorem rosicidum vel æreum, etiam alium agnovit humorem melleum, dulcem spontè destillantem ex truncis Quercuum, quem Oleo-melitis ipse comparat, de quo nos lib. 6. & lib. 7.

Galenus lib. 3. alim. cap. 39. sic ditinguit: Mel à plantis & ab animalibus est secretum. Oritur enim in plantarum foliis. Est autem heque succus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem est cum rore, generis: non tamen assidue, nec copiosè, ut ille provenit. Memini, aliquando, cum æstate super arborum ac fructuum herbarumque folia mel quàm plurimum fuisse repletum, agricolas velut ludentes cecinisse, Jupiter melle pluit. Præcesserat autem nox, ut per æstatem, benè frigida (nam tum tempus anni æstivum erat) pridieque calida & sicca fuerat æris temperies. Perius quidem naturæ interpretibus videbatur hilitus è terra & aquis à folis calore sublatos, ac deinde exactè tenuatos accoctos, à frigore secutz noctis concretos coaluisse. Apud nos verò rarè id accidit. In monte autem Libano quotannis persæpe. Itaque coria super terram extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis defluit, excipiunt, & ollas ac fictilia melle implent: vocantque id mel rosicidum & æreum. Proinde constat materiam, ex qua mel generatur, rori esse congenetam. Videtur autem & ex plantis, in quarum foliis colligitur, boni malive quid ipsi accedere. Hæcenus Galenus.

Quæ verò nostra sit opinio de Melle æreo Galeni, postea apparebit sub titulo Mellis Cedrini.

Amynthas lib. 1. de Asiæ mansionibus, cum tractat de Aëreo melle, referente Athenæo, ita scribit: Simul cum foliis id decerpentes componunt & fingunt ad instar Syriacæ massæ. [Cassarum pinguium, quæ à Syria convehuntur] Quidam glebas ex eo faciunt: & ubi fumere collibitum est, diffractas ex eis micæ in ligneis poculis, quæ Tabætas nominant, dilutas antè & collatas bibunt, gustu simili, ac si quis mel dilutum bibat, sed multò iucundiore. Hæc Athenæi verba optime respondent nostræ Mannæ Brianfonæ, siue Laricæ, de qua postea. Quid si Cedrinam intelligat?

Arabes sub rore aëreo comprehendunt Terenianum

Acerum  
mel cele-  
stia dona  
Mellis  
ros.

Quercus  
mel.

Melitis  
Quercus  
lens.

Mel plu-

Manna  
concretus

Mel Eli-

ni.

Manna  
lectio.

Mel in  
dam  
rem

Mel  
reum  
Athenæ

Ter-  
nabin



niabin, Mannam & Saccharum Alhuzar: quorum varias species tradunt, tanta obscuritate, ut nihil supra. Quum tamen differant à nostris Europæis Mannis, nec inter ipsos bene constet, libet omnia huc referre, quæ de ipsis scripserunt incipientes à Serapione.

Tereniabin, inquit, est Mel roris. Itaque Tereniabin est ros cadens de cælo, similis mellis granuloso concreto. Vocatur Mel roris. Plurimum cadit super arbores in Orientis regione, Coraseni dicta, quibus folia similia spinis viridibus, & flores rubri: & quæ fructum non ferunt. In Castellâ cadit supra summities Palmarum. Vis ei emolliendi alvum & humectandi pectus. Confert natura calidis, potissimum si dissolvatur in aqua Iuubarum & Prunorum. Aben Mesuaj: Emolliet ventrem & pectus. Præstat quæ alba & recens. Dosis à 10 ad 20 aureos. Ita tradunt Mesua, Albusari, Aben Guefid, Attabari & Rhafis. Verum Abix scribit: Tereniabin præstat Zuccharo, sedare inflammationes febrium calidarum, auferre sitim, & ventrem mediocriter emolliet. Esse Mannam quæ cadat ex aëre, sicut Manna, lenire pectus: plerumque cadere supra spinas prædictas. Hæc Serapio cap. 11.

At cap. 45. Men inquit, est Manna. Mescha scribit, Mannam esse calidam, abstergere & emundare: virtutem ejus intentionem aut remissionem esse pro diversitate arborum supra quas cadat. Mesarigie tradit Calidum primo gradu, temperatum in humiditate & siccitate, conferre pectori & pulmone: Eam quæ cadit supra Tamasicum bonam esse tussi & asperitati pectoris.

In Collectâ Rhafis Manna traditur, cadere supra arborem Malvaviscum, veluti Mel: moram trahentem in ea albescere: at citò collectam viridem esse.

Habere autem, calida est in fine secundi gradus, sicca ferè eodem gradu. Melior cui color clarus, accedens ad albedinem, & non nihil rufescens, & de ligno purè collecta. Roborat ventriculum, adstringit ventrem, confert aquæ citrinæ pota ventriculo imposita. Venit & in medicinis apostematum. Exiccatur catharum usus drachm. in caput-purgio: mundat cerebrum, crassos vapores dissipat & corroboret. Mixta in potionibus & caput-purgiis, tollit tumores pituitosos. Miscetur & confectionibus magnis, quod maxime sit salutaris.

Rhaze auctore l. 3. ca. 20. Tereniabin calidum est, ventremque solvit, atque guttur lenit. Et l. 9. ca. 14. Mannam, quam antiquis Mel aëreum dici ait, ad raucedinem commendat. Et c. 15. & 54. In evacuantibus medicamentis addit.

Avic. iudicio, Manna est omnis ros cadens super lapidem aut arborem, dulcis: coagulatus sicut mel: exiccatur sicut gemmi, quemadmodum Tereniabin & Siracost. [Est Manna, quæ apud Italos in usu: Bellun.] & mel quod adfertur ex Cafferam, in Reb: [Altom. Antiquus codex habet hæc Eracost, & Mel asportatum de terra Cusaræ sylvestri.] de singulis suo quoque capite diximus. Assumit præter suam levitatem & dulcedinem aliquid de natura & virtute ejus rei, supra quam cadit. Hæc Avic. l. 2. tract. 2. c. 489. In margine annotatum Men esse commune nomen ad omnes species Mannæ. Idem cap. 496. Mel [Hafel] est liquor cadens super flores & reliqua, quod apes colligunt: èstque vapor qui elevatur & maturatur in aëre, convertitur & in crassatur potum: & mel factus decedit. Et quandoque

Tom. I.

cadit mel sicut est in monte Chasferam. Variat secundum ea, super quæ cadit. Quod manifestum est, colligunt homines: quod verò occultum, apes. Et cap. 704. Tereniabin [Bellu. Trugibin, Terenia. species Mannæ, quæ in Oriente valde in usu] est ros plurimum cadens in Coraseni [idem Serap.] in locis, quæ sunt ultra fluvium: & in nostra regione [Bochara, in Persia: Bellun.] ut plurimum cadit super Ahaagi. [Spinas, Serap.] Melus est recens, album. Est in caliditate temperatum, leniens, abstergens, confert tussi, & lenit pectus: sedat sitim & Choleram. Facile evacuat particulari proprietate. Dosis à 10 aureis ad 20. Et c. 758. Zuccarum Alhufar [Sachar Alhaffer.] est Manna cadens super Alhufar veluti frusta salis. Habet cum absterfione paucam acerbicatem & amaritudinem. Vnum est iamentum album: aliud est Alhagiezi ad nigredinem declinans. Est absterfivum cum acerbicatem. Zuccarum Alhazar acuit visum: confert pulmone & hydropis cum lacte Camelæ noviter factæ: [Rhaf. cum lacte Camelino & Serap. cum lacte Mandragoræ] non facit sitim sicut reliquæ species Zuccari: quoniam ejus dulcedo est parva: bonum est ventriculo & Hepati confert, renibus & vesicæ.

Serap. de dicto Zucharo: Abufar hæc scribit c. 30. Et Zucharam Haosceri Andacani confert stomacho propter suam stipticitatem & acerbicatem: confert in doloribus renum & Vesicæ, abstergit visum Collyrio: exiccatur & resolutum pannum oculi [infusionem forte.] Haustum non sitim creat, quia pauca absterfione præditum, propter quam & hydropicis confert, potum cum lacte Mandragoræ, id est, Lafaha. [Camelæ. Avic.] Recens calidum est & humidum: Vetus calidum & siccum: Confert ventositatibus ventris, eumque lenit. Haustum cum Oleo Amygd. dulcium confert Colicæ: Vetus ex eodem phlegma stomachi abstergit, sed sitim inducit, & sanguinem crassum generat. At quod affertur ab Aliemen, quod Mastici simile est vocaturque Zucharam haoscer, prodest stomacho & hepati propter paucam amaritudinem, quæ præditum est: & à proprietate quadam confert in doloribus vesicæ ac renum, hæque partes mundificat.

Isaac Bensulaimen. Zucharam ex regionibus Heigen, quod est nominatum Zucharam haoscer minus dulce est quam reliquæ species, sed magis exiccatur. Quare non auferit sitim sicut aliæ species Zuchari: sed laudatas operationes præstat in doloribus renum: & quando bibitur cum lacte Mandragoræ idem præstat, sed effluviis & manifestis operatur, & suspectum, atque periculosum in naturis calidis.

Aabrianisa: Hahoscer habet lata folia, & nascitur toto tempore anni: & habet Zucharam quid, quod egreditur ex oculis ramorum ejus, & exortu foliorum ejus, & homines colligunt de eorum convenientem, in cuius Zuccharo est amaritudo: & egrediuntur ab eo Mala [intelligimus nasci in ea arbore Mala] similia testiculis Camellorum: & egreditur ab istis pomis res quedam adurens, quæ non est aliud præstantius, cauterium. Eadem & culcitæ & pulvinaria implentur. Arbore ejus vocatur Chercha: cuius folia incisa emittunt lac, quod Maio collectum coria depilata in eo macerata. Lignum ejus leve est, grossum, rectum, pulchrum; ita ut etiam Musici illud in ludicris suis cantilenis brachiis & cruribus seminarum comparant. Aliud Hahoscer est species Tithymalli.

Avic. de  
stipitate.

Terenia-  
bin. Teren-  
ia. Teren-  
ia.

Delectus.  
Vires.

Sacharum  
Alhufar.

Iamentum  
album.

Vires.

Zucharam  
Haoscer.

Zucharam  
haoscer.  
Mastici si-  
mile.

Lac haoscer.

Hahoscer  
quid.

Mala simi-  
lia testicu-  
lis camelo-  
rum.

Causiticum  
Arbor Cher-  
cha.

Lignum  
quale.

Hahoscer  
Tithymalli  
species.

# HISTORIAE PLANTARVM.

*Autorum  
inducimus  
de supra  
scriptis A-  
rabum pla-  
ntis.*

Hactenus Serapio & ceteri Arabes de Melle  
aëreo sive roris, & de Manna, satis quidem bar-  
bare: quorum obiter, atque absque sensus im-  
mutatione [vri speramus] placita propofimus  
à nobis dedolata: quæ tamen ita obscura nobis  
videntur, vt pauca certa ex iis colligi & concludi  
in hac rerum obscuritate possint. Qui certa er-  
vet, erit nobis magnus Apollo.

*Manna  
Aëreum.  
Terregebum*

Nec prætermittendus Averroes qui lib. 5. col-  
lect. de Manna scribēs granulosam intelligere vi-  
detur, aut certē liquidam. Ait enim: Terrege-  
bin, id est, Manna, est ex speciebus antiquæ  
Mannæ, quæ provenit à partibus superioribus  
Syngæ vel Indiz: estque similis Saccharo, in suis  
virtutibus, calida & humida in primo gradu: &  
eius proprietas est purgare suaviter choleram,  
quamvis debilius sit aliis purgantibus: idē dā-  
tur in passionibus calidis, etiam antequam ap-  
pareant signa digestionis.

*Neoterico-  
rum placita.*

Audiamus quid Neoterici de iis tradant.  
Hermolai quidem & Marcelli opiniones de  
Melle aëreo, Manna & Elæomelire postea tra-  
demus sub titulo Man siue Manna sacrarum lite-  
rarum. Nam Hermelaus propemodum in ea est  
opinio, vt credat idem esse Elæomeli & Aëro-  
meli, quod tanquam à veritate alienum impro-  
bat Cordus. Matth. autem scribit Hermolaum  
vicinitate Elæomelitis & Aeromelitis decep-  
tum, dubitasse utrum Elæomeli sit Manna.

*Manna  
mel aë-  
reum.*

Mannam Elæomeli esse negant Lacuna, Ruell.  
Ryffius, Brassavolus, rationes autem cur non  
sit, infra dicentur.

*Veteribus  
non inco-  
gnitum;  
Error.*

Ruellius Mannam roridum vel aëreum mel esse  
ex eius dulcedine sufficienter vult constare:  
mellisiliumque hunc sudorem veteribus, præfer-  
tim verò Galeno, Plinio & Dioscoridi, non in-  
cognitum fuisse scribit: eosque magno implicari  
errore qui Mannam putant Elæomeli veteribus  
fuisse.

*Ros Syria-  
cus.  
Manna ly-  
bani.  
Crinitus  
not.  
à Manardo  
Ros Syria-  
cus.*

Crinitus lib. de honesta voluptate improbos  
& ignaros vocat, qui Mannam, cuius nunc com-  
munis usus, ante Galeni tempora ignotam Italiæ  
affirmant, addens, Tiberio imperante, Mannæ  
usum à Medicis probatum, licet alio nomine ap-  
pellant: Celsum suæ sententiæ ad stipulati &  
Rorem Syriacum apud eum oportere intelligi,  
quem Hebræorum monumenta & recentiores  
Medici Mannam vocant. Dioscoridem nominare  
Mannam *λυβανου*: & Orpheum inter thymiamata  
referre. Ba autem ipsa verba Manardus citans,  
in Epistolis. Criniti sententiæ ad stipulati non pos-  
se ait. Ac Ros Syriacum Celsi esse vulgi Sumach:  
scribendum fuisse, Rhos, voce Græca. Dios-  
coridi Mannam *λεβανου*, eiusdem Manardi iudi-  
cio, esse *επιρροια λεβανου* Galeno apud Or-  
pheum: atque excribationem & pulvisculum  
quendam Thuris ad suffimenta idonei. Neque  
igitur Celsum, neque Diosc. neque Orpheum,  
quorum testimonio nititur Crinitus, id probare,  
quod contendit: Tiberio scilicet Cæsare impe-  
rante, Mannam hanc, quam nunc passim ad  
alvum nobilium (pretiosa enim res est) lenien-  
dam exhibemus, in agnitione & usu fuisse Medi-  
corum. Nisi tandem fortiores rationes produ-  
cat, non se ab Averroë recessurum, (ait Manar-  
dus) sed Mannam hanc inter ea repositurum,  
quæ post Galenum in usum venerunt Medicor-  
um. Nisi fortē quispiam antiquitati favens, Mel  
sylvestre, ut Svidas, vel Mel roris aut acris, ut  
Galenus, vocatum ab antiquis contendat: cui  
nec nos magnopere repugnabimus.

*Mel sylve-  
stre.*

*Zuccharum*

Idem Manardus scribit: Zuccharum Alhusar

est Manna cadens supra plantam Alhusar, cui  
eandem vires Avic. tribuit, quas Græci suo sac-  
charo. Ergo idem est cum Zuccharo Alhusar  
Græcorum saccharum. Ex quibus adhuc colligit  
Saccharum melleum esse rorem. Quem sic ratio-  
cinantem reprehendens Cordus, vehementer se  
mirari ait, ipsum suffragia ab Avic. petere, quem  
utque adeo detestatur, & cuius nullam facit  
autoritatem, vt pote qui se non admittiturum pro-  
testetur, nisi id in gratiam amici faciat. Nos verò,  
inquit Cordus, haud temerè Avicennam hoc di-  
centem reicimus, etiam si contra nostram senten-  
tiam scribere videri possit. Ideo autem hoc Ma-  
nardi argumentum reicimus, quoniam per Ha-  
hofer, quod idem est cum Alhusar Avic. non  
eandem omnes plantam intelligunt, aliis rectam  
& proceram quandam plantam, aliis certam Ti-  
thymali speciem sic vocantibus. Præterea non  
conveniunt inter se in definiendo zuccharo Al-  
husar autores. Avic. enim dicit id Mannam esse,  
quæ cadat supra plantam Alhusar. Serapio con-  
tra autoritatem Abionisæ, scribit zuccharum sentiu-  
Habosfer egredi ex oculis ramorum suæ plan-  
tæ, & à locis foliorum eius, hoc est, quæ folia à  
planta sua & oculis nascuntur. Quare cum il-  
le Mannam esse dicat, hic verò lachrymam ex  
Habosfer emanantem, nondum composita con-  
troversia nullum suggerit Manardo argumentum.  
Nos tamen credimus Habosfer plantam esse,  
Cannæ Sacchari non dissimilem: quæ perinde ut  
Sacchari canna Saccharum ab oculis emittat: sed  
sui generis & minus dulce, quam verum Saccha-  
rum, atque adstrictione & amaritudine etiam  
ab eo differens. Si autem contingit etiam Man-  
nam supra Habosfer cadere, poterit hæc Manna  
Alhusar vocari, ut etiam Avicennæ salva maneat  
fides & autoritas. Quod verò eadem sit materia  
Mellis apum, Mannæ & Sacchari antiquorum,  
haudquaquam concedendum putamus. Diversa  
enim à Manna esse Saccharum antiquorum mate-  
riæ, suo loco ostendetur. Neque verò Mellis ac  
Sacchari materiam rorem veteres esse credide-  
runt, alioquin nequaquam *Αγοριαν*, id est, Mel  
rosicidum vocassent. Nam dum Mannam vocant  
rosicidum Mel, ad differētiā Mellis apum, præsu-  
munt apum Mel rore non constare ut Mannam.  
Quod autem diversa sit Mellis apum materia à  
rore, multa mellis & apum proprietates palam  
ostendunt. Mel enim semper quoqueque veris  
& æstatis tempore in floribus reperitur: Mellei  
autē rores non semper, sed rarissime apud nos de-  
cidunt. Mel tam noctu, quam interdum in flori-  
bus reperitur: Melleus ros tempore tantum ma-  
tutino. Mellis circa Meridie plurimum in flori-  
bus deprehenditur: Melleus ros incalescente  
Sole statim perit. Mel dum in floribus continetur,  
semper est liquidum: Ros Melleus concre-  
tus est. Mel apum in floribus continetur: Ros  
melleus supra folia plantarum decidit. Mel ve-  
tustatem non tantum per se ferre longam potest,  
verum etiam omnia alia, quæ hoc excipiuntur in  
multos annos conservare, quod Theriaca, Mi-  
thridatium & alia huiusmodi confectiones clare  
ostendunt: Ros verò Melleus, hoc est Manna,  
non solus quidem incorruptus unum atque alte-  
rum annum durare potest, nedum alias res à cor-  
ruptione tueri. Itaque in favis etiam, aut favis ex-  
pressum mel, brevi corrumperetur, si melleus  
ros apum mellis materiam præberet. Præterea in  
Septentrionalibus regionibus maxima mellis est  
copia, ut in Lithuania, Livonia & vicinis regioni-  
bus, in quibus tamen rarissimi mellei rores con-  
spiciuntur.



spiciuntur. Porro si ros est mellis materia, quæ-  
rimus, qui fiat quod hic in flores tantum deci-  
dat. Cælo enim delatus in ea potius se demit-  
tet, quæ lata & expansa sunt, veluti folia plan-  
tarum, & minime in tantillos flores? Quoniam  
verò mel non in foliis plantarum, sed floribus  
reperitur, atque is non totis, sed absconditis eo-  
rum anfractibus, & posteriori tantum parte at-  
que recessu, haud verisimile est, mellis materiam  
rore constare. Quomodo enim his præteritis  
latissimis etiam foliis, in florum ultima penetra-  
lia tanquam furtim intrepens atque ex industria  
in latebris se abscondit recipere potest? Pos-  
tremo constat omnibus, qui usque ad extremam  
senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis,  
apibus ipsas mellificaturas, tantum è floribus col-  
lectum liquorem in favis reponere. Rores verò  
melleos cum decidit, haudquaquam ad favos  
convehunt: quod ipsi quoque verum esse depre-  
hendimus. Præterea melitro rore delapso ad  
hunc frequentes quidem convolant apes, mini-  
me ut cum in alvearia reveant, sed tanquam  
ad cibum & pastum: quo adeo se replent, ut pro-  
fus inertes & ignava reddantur, multaque emo-  
rriantur. Itaque rustici dicere solent, mellitos  
rores bonum quidem pastum apibus præbere, sed  
ad mellificationem minime conducere. Interim  
enim dum rois suavitate allecta cibi avida de-  
tinentur, nihil ad alvearia convehunt. Quapropter,  
nemo nobis persuadebit rorem mellis apum ma-  
teriam esse. Hactenus Cordus: cuius quidem  
rationes non minus manifestas quam veras cui-  
quam videri facile censemus, ut plura super his  
addere haud videatur necesse.

Non dubium est, inquit Monachi, quod  
quantò recentior est Manna, tantò melior. Ob  
id Manna Orientalis parvi fit in Italia, quia non  
potest haberi ita recens ut Calabrica. Ea autem  
duplex est, scilicet ærea, quæ cadit velutiros su-  
per universas arbores & plantas & lapides, quam  
quidem vocamus Mannam cælestem sive æ-  
ream, & propne est Melitoris. Alia Manna est,  
quæ peculiariter ex Fraxino & Orno colligitur.  
Colligunt etiam Calabri quandoque Mel æ-  
reum, id est, Mannam cælestem super varias  
plantas & super lapides, sicut & alia gentes: sed  
hoc fit raro, nec ita densatur. Manna autem æ-  
rea secundum Arabes habet plures differentias,  
teste etiam Mesue. Consent communiter Docto-  
res, apud Arabes Tereniabin & Siracost esse spe-  
cies Mannæ. Siracost autem sive Xiracost, sive  
Alsiracost, ut iidem Monachi tradunt, idem est:  
verum de his copiose scribemus capite proprio  
de Siracost.

Brassavolus in suo examine scribit. Mannam  
rorem condensatum nemo dubitare audeat. Su-  
perioribus annis Ferrariæ in horto Excel. medici  
Sigisf. Nigrifoli cecidit: is copiam collegit, at-  
que probavit. Est statutus locus in Oenotria, in  
quem singulis æstibus descendit, & ab omni-  
bus passim colligitur. Neapolitani reges occlu-  
dere locum, ne quis sine vespicali colligeret. Dum  
locus occlusus fuit, non descendit, eo recluso &  
vespicali remoto, iterum descendere cepit. Sed  
& iterum clauso loco & tertio recluso & clauso  
cessavit: ut necessarium fuerit, reges quibuscum-  
que permittere, ut colligere possint. Hoc mihi retulit  
Illustriss. Federici regis Neapol. dignissima uxor.  
Sunt autem tria Mannæ genera in Calabro so-  
lo collecta. [ & dictum ante quomodo Hebræorum  
Manna vera sit de generibus Calabrinæ, de qui-  
bus mox.

Tom. I;

Hermol. Mannam sub Elæomeli comprehen-  
dit, cui consentire non possumus. Manna è cælo  
descendit: Elæomeli ex arboribus sponte manat,  
&c.

Belloh. libello de arbor. conf. Mellis Cedri-  
ni duas præcipuas differentias facit: liquidum scilicet  
& durum. Frequentissimam Gallis aridam  
Mannam dicit quæ ex vicinis & variis montibus  
petitur, adeo ut huius discrimen publicè à nego-  
tioribus sit cognitum. Siquidem Mannam istam  
seu Rorem Cedrinum, quem in officinis asser-  
vant, suis nominibus distinguunt: & alia Calabri-  
nam, aliam Granatam, aliam Brianzonam, aliam  
Ambrunensem dicunt: quæ inter se dissimiles  
sunt. Dicit præterea variè esse durationis tempus:  
aliam enim statim post annum exolescere, ali-  
amque redolere: aliam tardius corrumpi, ut ad  
quinquennium adservari possit. Omnes tamen  
sicciore loco gaudere. Sed liquidam Mannam, no-  
bis alioqui infrequentem, temperato loco non  
humido nimis, nec adeo calente reponi debere.  
Omnium ortum in media æris constitutione ex  
rore in Vere circa principium æstatis esse consti-  
tuisse. Mannam in Libani Cedris potius quam a-  
liis arboribus adhærere: sic etiam in Europa  
Laricibus ralle copulari. Indigenas ad Larices  
summo mane festinare. Nam quum sol illuxerit  
liquidam evadere. Hinc duas eius species  
constituit: Liquidam, quam proprio nomine A-  
rabico Tereniabin dicit: hancque esse de qua  
Hip. & Gal. meminerint: quàmque diversis capi-  
tibus Serap. & Avic. à Manna siccæ distinxerint.  
Mannam itaque liquidam sive Mel Cedrinum,  
cum nobis nunc nullo in pretio habeatur, am-  
plius servari desuisse. Mannam etiam, quia mox  
fiatur, magno vè nire solere.

Mannam, eodem tradente, Veneti aliter  
quàm Galli negotiatores distinguunt, & variis  
nominibus appellunt. Siquidem quum merces  
undecunque ad nos deferantur, varia Mannarum  
genera agnoscunt: præcipuam tamen granulatam,  
quam vulgò Mastichinam nominant. Alteram  
Bombycinam,

Fuchsi iudicio, Mel æreum & Ros Libani  
Gal. appellatum non est nisi Manna Arabibus, no-  
mine ab Hebræis mutato: quibusdam Ros Sy-  
riacus dicitur. Dudum est generum: alterum liqui-  
dum, quod Arabibus Tereniabin, & Hipp. Mel ce-  
drinum dicitur: atque servari desit. Alterum ari-  
dum, quod hodie asservatur in arculis ligneis aut  
vitreis, & superscriptis distinguitur nomi-  
nibus.

Matth. Mannam quandam liquorem sive ro-  
rem suavem vocat ex aère venientem, sub lucanis  
temporibus, arborum ramis & frondibus, her-  
bis, lapidibus & solo interdum hærentem, qui  
brevis temporis curriculo coalescens, grumofus in  
Gummi morem efficitur. Huius duo tantum  
genera se in Italia vidisse fatetur: quorum alterum  
ab orientali plaga, alterum à Calabris deferatur.  
Orientalis duplicem esse speciem: præstantissi-  
mam Mastichinam: vilem & adulteratam, Bom-  
bycinam.

Duo quidem genera à Mauritani diversis ca-  
pitibus prodita agnoscit: Mannam nempe, & Te-  
reniabin: sed non aliam inter ea speciem differe-  
ntiam facit, quàm quod alia liquefcens, melli si-  
milis, alia in grumos concreta videatur, quam as-  
serit esse illam quæ ad nos advehitur. Quam ante a  
ex Brassavolæ testimonio à quodam coemptam  
Melli similem diximus, Matth. censet ex eo gene-  
re fuisse, quod Mauritanii Tereniabin nominant:

Q 2

Hermol.  
nor.

Manna im-  
quæda ex  
dura Bal-  
lonio.

Manna  
varie.

Ambru-  
nensis.

Durationis  
varie-  
tati.

Manna li-  
quida.

Ortm.

Manna Li-  
bani.

Manna  
Laricis  
duplex.

Mel cedri-  
num.

Manna di-  
stinctio ve-  
netorum.

Mel æreum  
& Ros Lib-  
bani.

Ros Syria-  
cus.

Tereniabin

Manna  
descriptio  
Matth.

Orientalis.  
Calabrica.  
Mastich-  
ina.  
Bombyci-  
na.

ethi contrarium ipse Brassavolus senserit, qui vult Mauritanorum Tereniabin esse eam Mannam, qua communiter utimur.

credidi Aver. & post eum alii plures, Man-  
nam veteribus, praeferunt Galeno i. cognita  
fuisse. Quibus illud reclamatur quod ipse Gal. l. 3.  
de Alim. fac. script. Huius etiam meminere  
Arist. Theophr. Plin. & alii, ut in praecedentibus  
libris liquet. Consequitur Mart. & alii multi,  
illam hanc ipsam intellexisse, qua hodie uti-  
mur, sed loco differentem. Item testatur de Man-  
na utriusque consistentem & eodem demum vi-  
tibus esse generatam.

*Manna*  
*Lacina.*

*Delectum.*  
*cineribus.*

*Manna. x*  
*Mafichina.*  
*na.*

*Manna fo-*  
*lorum.*

*Manavot-*  
*potum.*

*Manis*  
*fachum.*  
*Locus.*

Lacina in com. in Diofcor. Manna est vapor valde craffus & fuavis, qui interdum elevatur vi Solis, & noctu concrefcens, condenfatus defcendit fupra herbas, fupra folia & ramos multarum arborum, & tandē fupra petas: Congelaturq; inftar gummi. Prefertur quæ alba, dulcis, guftui grata, quæ tota eft granulofa, & alba, dulcis, guftui grata, fimilis minimis granis Matichæ: hinc dicta Manna Matichina, licet dicatur etiam Manna foliorum. Secunda eft, quæ defluet in ramis. Deterior quæ cadit fupra petas: grana funt valde craffa, coloris obfcuri, nec faporis ita grati.

Optima Manna defertur communiter Vene-

*Optima*-Manna defertur communiter Venetias ex Oriente. Advehitur etiam ex Calabria Romanæ, tanta bonitatis, ut possit conferri cum Orientali. Terebinthi Arabum etiamdem Lacuæ iudicio est species Manna liquidæ, qualis in monte Libano. Melior in foliis Fraxini & Populi, quam in aliis arboribus. In Persicis & Amygdalis non cogitur in grana.

*Sive liquida sit sive arida, eligendam fuerit  
Fuchf. albam, recentem, dulcem, puram & ex  
crementorum expertem, exstirpibus odoratis &  
salubribus collectam. Est que statim post annum  
exolefcit & situm redoleat. Alia tardius corrumpi-  
tur, ut ad quinquennium adseruari possit. Om-  
nes fictiori loco gaudent. Mala cineritis: pes-  
sima fusca, comosa, antiqua. Hæc tempore mole-  
lescit, dolisque prodit. Amato quoque Manna  
est ros: meliens condensatus: qui tria genera fa-*

Suidas sylvestre Mel de celo cadens appellat. de quo & Pomponius videtur scripsisse in sua Cosmog. præcipuè in India descriptione, quum ait: India tam pinguis alibi, & tam feraci soli, ut in ea Mella frondibus desunt.

*Ma* Manuel Ciriacus nobilis Belgæ & Lusit. Regi à  
negotiiis, eodem referente narravit, Portugal-  
*Manna* lenicis iusticijs invenire solitos super arborum fo-  
*Potingia* liis forem melleum, qui mox in speciem sacchari  
condensaretur: qui quidem eos, quoties [non  
*Prasaga* enim quotannis defluebat] è coelo descendere  
soluit per nullius anni ignem prasagebat.

Manna, inquit Acosta, de qua tot docti viri scripsere, inuenitur in Vzbeche maiore trium generum: vnde ferunt Ormuz & in totam Indiam. Sunt & alia duae species praeter Calabrinam. Manna autem non est medicamentum novum aut incognitum antiquis, quam is minoris in usu, quam apud Arabes. Serapio eam confundit cum Manna Graecorum. Fuchsius vero eius vsum tollere vult, sed pauca cum ratione: cum sane in usu medico multum sit facienda.

Medi placet & Altissimi diligentis scriptoris placita de Manna notabiliora producere. Nam peculiatum opinione habet de eius generatione. Rationi consentaneum, inficille, ut quibundam etiam particularibus aëris constitutionibus, ferenis tamen semper, & ac tranquillis existentibus, liquor quidam suavis, melleæ consistentiæ, rorique similis, nec non res quedam sacchari, seu gummi similitudinem præ se ferens, pruinæ instar generetur, crassiusculis quibuscumque interitum etiam & lentis è terra vaporibus, & aque aqua diurno tempore à solis calore sublati, exacteque tenuatis ac coctis: Et deinde superuenientis notæ frigore concretis seu congelatis, ac deorsum decidentibus. Qua ratione liquidam interim Manna generari rori similem, quam rosicidum seu roridum mel, aut saltem eidem simile, appellare licebit: interdum concretam atque congelatam, sacchari, seu gummi similem, pruinæ instar, quam rosicidum saccharum iure appellare poterimus: seu maius puinosum, cum pruinæ magis quam rori similis sit, eidemque in eius generatione respondeat.

Hanc suam opinionem non modò ponit ita Alcornarus, sed insuper quæstiones quasdam, eam illustantes proponit ac soluit. Cùm ros, inquit, in temperie, ac temperatis locis magis generetur, pruina uero in frigidioribus: & liquida manna seu mel rosicidum, rori: concreta vero, & quæ coagulata est, pruina correspondet, haud temerè quis queret, num eodem anni tempore, eodemque loco ambo generati valeant? Respondet, Ita: quòd, quamvis uterque halitus seu vapor, ex quo tam liquida, quam concreta manna generetur, à Solis & diurno calore, uero dictum, subleuetur, atque à superuenientis noctis frigore prope terram infrigidatus ac concretus tandem descendat, quemadmodum de rore: & pruina dictum est: Dissident tamen inter se maiori innotiue ratione. Nam, sicut, cùm exiguum fuerit noctis superuenientis frigus, quemad. ros magis generatur, perinde etiam & liquidum, rosicidum, æreumque mel, potius simili gignitur.



gignitur: si verò maius fuerit superuenientis noctis frigus, congelatus idem vapor à maiori frigore, priusquam in liquidam & melleam substantiam convertatur, concreta Manna, pruina seu etiam nivi similis procreatur. Etenim maioris frigiditatis est congelascere, teste Aristotele. Quapropter in temperatis etiam naturalis locis, ac etiam calidis & æstate nihil impedit, quominus quandoque pruina generari possit, particulari cœli statu (superueniente nocte) frigidiori existente, &

congelata  
conglu-  
e Man-

obscitio.

solutio.

reatio  
qua co-  
lione.

adu  
re su-  
pro-  
pro-

re a-  
mā-  
ab co-  
m car-

prædicta manna generetur, quæ fieri possit ut dala-  
cis sit, temperatæque calida, ac alvum solvat, ut  
omnes Medici uno ore fatentur? Respond. quod,  
quamvis à frigore concrecant sublatis halitus seu  
vapores, ex quibus utraque Manna generatur: à  
Solis tamen calore prius fuere attenuati & con-  
cocti, aliàs elevari haudquaquam potuissent:  
ideò et si concreto à frigore eis accideret, earum  
tamen materia calida est & humida, cuius etiam  
temperaturæ manet utraque Manna ex eis geni-  
ta. Similem etenim habet generationem ac pin-  
guedo, quæ & ipsa dulcis ac moderatè calida  
est, quamvis à frigore concrecat, uti Gal. voluit.

Solutio.

Quod verò in calidis regionibus, temporèque  
anni calidiore aer frigidior esse possit in nocte,  
quam terra in sua superficie, & tertena omnia cor-  
pora, particulari potissimum constitutione frigi-  
da existente, hac ratione confirmat. Quemadmo-  
dum ex præcedentis diei calore impenitus ob  
eius tenuitatem ac citius fuit calefactus aer, pari  
ratione à sequentis noctis frigore impenitus ac  
citius refrigerabitur, quod tamen terræ ac ter-  
renis corporibus non contingit. Sed & radiorum  
Solis reflexio die facta efficacius imprimitur terre,  
tanquam corpori solido, quam aeri: ita ut diutius  
illi quam huic inhæreat, adeo etiam ut vix tota  
etiam nocte evanescat. Ad quod respexisse vi-  
detur Plin. quando ait Mannam liquidam ac ro-  
scidam sublucanis maximè temporibus primæque  
aurora decidere, quo tempore præcipue frigus  
intenditur: quod nos etiam de concreto & rori-  
do intelligimus. Est enim eo tempore aer frigi-  
dior, cum ob Solis diuturniorem absentiam, tura  
quod eodem iterum appropinquante è terra sub-  
lati frigidi vapores uniantur ac defertur magis.  
Quamobrem Mannam, quam vocant acream  
concretam & coagulata è cœlo delapsam pro-  
culdubio in aere, & non in locis in quibus repe-  
ritur, concrecere ac coagulari concludit. Confer-  
re tamen locos in quibus colligitur aliquid sal-  
tem ad eius conservationem, ita ut in quibusdam  
plantis, terris, seu lapidibus melius quam in aliis  
quibusdam conservetur, licet, uti dictum, & ex  
Melse ostensum, indifferenter in universis tum  
arboribus, tum lapidibus in ea regione decedat,  
in qua generatur, & non in quibusdam speciebus  
duntaxat, aut certis eiusdem speciei arboribus, ut  
quidam falsò imaginantur.

Mannam  
in aere con-  
crecere.

Quorun-  
dam error.

Cæterum eiusdem Altomari iudicio de coagu-  
lata Manna inter Græcos, quos ille legerit, nemo  
est qui meminerit, quicquid alij sentiant: nisi  
quispiam velit Actuarium de hac Manna intelli-  
gere voluisse, cum ait: perquam moderatè pur-  
gant Calsia nigra & Manna: Calsia quidem tri-  
bus aut quatuor drachmis sumpta, vix moueret  
alvum: Manna verò etiam maiore modo quam  
Cassia fumenda est, & flavam bilem simplici ra-  
tione pellit.

Manna  
congelata  
Altomari  
censet Gete-  
res non in-  
venisse.

Videntur autem Arist. Theoph. & eum sequen-  
tibus Plin. in suprà citatis verbis liquidam Mannam  
seu roscidam mel intellexisse, vel eiusdem Altomari  
sententia. De coagulato verò solos Arabes  
scripsisse censet. Ex Galeni verò verbis ex 3.  
de alim. citatis, quilibet, ut idem annotat, vel pa-  
rum in eius doctina exercitatus percipere pote-  
rit, de liquido ac aëreo melle, rori simili eundem  
verba facere, & non de ea liquida Manna quam  
Terentiabini Serapio & Avic. appellant: neque de  
coagulato melle, quod Manna appellatur, & sac-  
charo seu granulis simile est.

Theophr. &  
Plin. Man-  
na.  
Arabes  
Mannam

Terentiabini.

In regno Neapolitano, inquit Altomarus, plu-  
ribus in locis sæpe liquidam & melleæ consisten-

# HISTORIAE PLANTARVM.

66

*Manna  
liquida  
plantis no-  
xia.*

*Tereni-  
abin  
quorundam  
nos non  
habere.*

*Manna  
granulosa.  
Manna  
Masticina,  
g.*

*Cedrinum  
Mel Hip-  
poc.*

*Orientalis*

*Calabrica.  
Briganti-  
na.*

*Orientalis  
duplex.  
Calabrica  
triplex.*

*Quinque  
genera.*

*Manna ge-  
nera apud  
Indos. 1.*

*Siracost. 2.  
Cardui  
feu Ter-  
reniabin.*

*Folii ad-  
mixta.  
stellis fa-  
cie.*

*Manna A-  
pennini du-  
plex.*

tie Mannam instat rois decidere supra folia ac ramos nonnullarum arborum: nec non super herbas & lapides, à quamplurimis rusticis nec paucis nobilibus intelleximus: verum adeo noxiam esse retulerunt plantis super quas decidit, ut protinus earum folia marcescant. Hanc vno ore fatentur oēs super universas indifferenter arbores, plantas seu herbas ac lapides cadere, iis in regionibus, in quibus decidit: quam tanquam nullius usus, parvis facientes, minimè colligunt.

Tereniabin antiquorum quod de cælo cadat minimè habere videmur. Altomarus sanè neutrum Tereniabin, hoc est, nec coagulatam nec liquidum in Regno Neapol. cadere putat, aut valde exiguum, idque rarissimè, & non quotannis, potissimum concretum & coagulatam. Liquidum verò aut non omnino reperiri, ut dictum, id non esse eiusdem speciei ac facultatis, cuius Arabes Tereniabin esse fatentur, neque eiusdem notas habere. Traditurque præterea, eos qui coagulatam Mannam colligunt, tanquam inutilem eam derelinquere, eamque segetes, in quotquot incidit, protinus tæbe quadam, veluti rubigine perimere, quod sanè nequaquam de Tereniabin Arabes scripserunt.

Rob. Conf. in Lexico duo Mannæ genera agnoscit: *Granulosam*, ut vocant, vel potius granosam cum Plinio, cui purgatrix vis inest, ut Celsus: quamque quod Masticinæ similis, in offic. Mannam Masticinam dixere. Alteram *Liquidam*, nunc etiam voce tamen prisca Tereniabin in Arabia nuncupatam. Vtramque ex arboribus legi ait, sed concretam tantum afferri: Et liquidam præcipue illud esse *ut dicitur in Hædo*. Hippoc. quod Quercubus insidete ex antoutate Hædodi Theophrastus dixit, & quod *de quercubus & de quercubus & de quercubus* vocatur. Apoll. rad. i. supra triphoram Persicam: Ad nos, inquit, tria Mannæ genera asportantur. Vna ex Orientalibus locis: altera ex Calabro solo: tertia ex Brigantio. Orientalis duplex videtur: altera Masticina: altera Bambacina. Calabrica triplex: de quibus postea. Eiusdem iudicio absolute nullo pacto dici potest, aut Manna, aut Tereniabin, hoc liquidum ut mel concretum, illud granulosum, aut è contra, ut Brasavolus fusch. & Matth. diversimodè sentiunt.

Garcias quinque videtur statuere Mannæ genere. 1. ex Vshæque provincia. 2. Quæ in Carduis. 3. Calabrica similem. 4. Calabrinam. 5. Melli similem. Ex quibus colligitur, eum Mannam Calabrinam à Calabrinæ simili diversam agnoscere: Simile namque non est idem, & in omni similitudine aliqua diversitas.

Cæsalpinus apud Indos plura Mannæ genera esse tradit, quæ nequaquam ferantur ad nos. Quandam tradunt ex arboribus destillantem rois modo, vtriusque collectam, sapore faui Mellis, quam *Siracost* vocant. Alteram granulosis Coriandri similibus addensatam, colore rufio, quam ex capitibus Cardui cuiusdam decutiunt: & *Tereniabin* vocant. Tertiam grandioribus glebis, ut plurimum foliis admixtam, similem Calabriensi, quam *magni faciunt*. Quartam Mellis albi purgati similitudine, quæ citò corrumpitur, nisi vasis vitreis condatur, quibus ea gens caret.

Colligitur, eodem notante, & apud Italos in Appennino diebus canicularibus & serenis promiscue in pluribus arboribus, sed præcipue in Quercu, & Salice: nunc concreta, similis Cal-

briensi: nunc liquidior melli similis, quod Græcis *Aeromeli* vocatur, Mel aerum, Mel toscidum: de quo Gal. Theophr. Plin. Verum, ut Gal. Elæmelitis non meminit, sic Diosc. Elæmelitis, quamvis vtrique tribuatur vis purgandi bilem & cruditates. Sed de Elæmelite alio loco à nobis traditum. Idem Cæsalp. statuit Mesuem & Avic. nomine Mannæ quodcumque genus intelligere, quod Mannæ eadem tribuant, quæ Serapio Tereniabin: apud quem hæ voces differre videntur, cum diversis locis agat de Manna & Tereniabin: Mannamque eam dicat, quæ in grumos concreta: Tereniabin verò illam, quæ similis Melli: Sed hæc parvi sunt momenti. Illud potius disquirendum, an Manna quæ vimur sit inter genera Mellis ærei, an proprius fucus fraxini & Orni? Id contendere nituntur quidam ex recentioribus. 1. Quoniam Ros promiscue super omnes plantas, lapides & terram decidit. At Manna Calabriensis solum in Orni & Fraxinis reperitur, idque non in omnibus, sed in quibusdam. Præterea, quia Manna ea ex vulnere arboris emanat: Ros autem exterius ex Aëre adhæret: Sicut & experimento liquet: linteo enim arbori superextenso, quod rorem cadentem excipiat, reperitur nihilominus Manna ex arbore emanans, nulla autem in linteo. Tandem quoniam multum differt à Manna prædicta, rois concretio in mellis substantiam: ros enim frigore noctis concrevit: ac Sole aut alia caliditate aduente, soluitur, ut putant: Manna autem nostra, ut succus, concrevit à calido & sicco: meridie enim colligitur magis densatam.

Hæc & alia huiusmodi sunt, quibus Manna nostra à genere Mellis ærei, & Manna Arabum explodunt, ac Fraxini & Orni propriam quandam lachrymam censent. Sed de Manna nostra & aliis differentis postea specialius. Nunc enim generalia tantum persequimur. Pamphilus Herilacus de aquarum natura. l. i. c. 7. Ros inquit, in aliqua regione condensatur in Mannam, vel in mel rois. Item cap. 15. Circa procreationem Mannæ & Mellis rois diuersæ sunt opinioniones Philosophorum: Hanc veritatem futo opiniones vaporibus commiseri terrestre siccam, pro materiali eorum causa, non vno modo: unde diuersa composita producuntur: in melle verò crassioris, commistio hæc, non est congelatio, sed coagulatio. Non ignorare autem decet Mannam, quæ talis in usu est, ut plurimum non esse rore de cælo cadentem: sed facitiam, vel gummi quod colligitur in Orno & Fraxino circa Romam & in Calabua.

Cæterum Adversaria de Mannæ origine sic statuunt. Exinim sanè naturæ opus, ac mirabilitatis plenum: nec valde videri tradunt, antiquis notum. Indicæ est quod paucis & vasilantibus verbis illius meminerint, nec quantum esset ad purgandam salubritas monuerint. Theophrast. siquidem ex Hædo & Aristotele succum mellitum ex æthere Quercubus sive Robori illapsum putat: qualem Galenus proventu portentoso è Libani arboribus excussis memorat, & Celsus Syriacum Mel vocat: qui omnes (præterquam experientissimus senex Hippoc. qui non æreum sed Cedrinum mel vocat) persuasi fuisse videntur aliud esse Manna istud, quam roridum ex humo in æthera subvectum interdum, vi & calore siderum, vaporem spiritum, qui reduce nocte occurrentis frigori liquor refluus & quasi stillatitius factus, arbores, telluremque rursum, horis antelucanis præsertim irroret. Quam

*Aeromeli.*

*An Manna  
qua Strabo  
sit inter ge-  
nera Mellis  
ærei.*

*Experimentum.*

*Generatio  
Manna ex  
Mellis ro-  
ris.*

*Manna I-  
talica fa-  
ctitia.  
Gummi  
Fraxinis.*

*Manna  
minis pro-  
be cognita  
fuisse pri-  
us.  
Succus  
Mellis.  
Hædo. A-  
rist. & The-  
ophr.*

*Syriacum  
mel Celsi.*

*Cedrinum  
Mel Hippoc.*

*Manna  
generatio  
generata  
quædam.*



Quam opinionem, ut improbare nolumus: ita etiam sequi, nescio quo modo, reuult animus. Quinam enim tenuitatis tantæ, partim æreæ, (cuiusmodi ros esse videtur) destillatius liquor illic vel imbecillis Auroræ radis dissilari in auras solitus, possit in grumos masticheos, gummosos, farinaceos, emplasticos, solidos & densos abire? Quin Manna etiam calidiuscula est, gravis ac pinguis, & soluta non adeo facilis. Imò soluta, liquori calido, non uti mel, aut saccharum, mixta, perstat, sed plurima, quasi aqueum respuens liquorem, resina gummi & Caphura factiæ modo rursus coit, & collecta vasistatibus adhæret. At imbrum cælestium proles nix, grando, pruina, gelu, ros, omnia frigida, neuiquam pinguis, sed facillimè vel calore, vel humore solvuntur, nec quicquam pinguis vestigij relinquunt. Quare suspicio magna est, Manna non æreum esse rorem, quem refrigerando temperandoque diurnum æstus natura comparat: sed succum, vaporèmq; vivificum cuiuslibet tum arbori tum herbæ insitum iam per soles tempestivos & genitiles maturitatem assequutum: qui exullans, expiransque interdum trans latentes corticis superficieque meatus, in auras à sole seruido dissipatur, noctu vero cum rore consueto illabente permiscetur, qui partim obstat ne dissipetur, partim seipsum unà fermentat, ita, vt in amicam naturam unà coeant, ac demùm quippiam consentientie inter mel & Saccharum nature: quod quispiam MELISACCHARUM vocare possit. Istud paradoxum confirmat eorum diligentia Pharmacopœorum, qui in ramis magnis præcis Laricis & Fraxini, inque vinariam cellam, quo æstatis tempore Manna colligi solitum est, aportatis, Manna postero die, tamen non perinde nitidum, conspectum sibi affirmant. Quod etiam minus mirum videatur illis, qui sciunt Rosi communi deciduo purgatoriam vim inesse, non à se, sed à foliis herbarum, quæ abluuntur & absterguntur ab illo. Sicut Brassicæ foliis & Rosarum rorem exceptum, detergente, nitroso & laxante succo, magis labricare certum. Eapropterque consulto huic infundunt Rosas nonnulli ad Syrupum Rosarum ex infusionibus. Quare cum quilibet observare possit post ramos & truncos avulsosve furculos, vel etiam radices Laricis, Pinæ, Iuniperi, & aliarum gummosarum aut tederarum arborum, gummi, lacrymas & micæ etiamnum in superficie congeri atque concrecere, quas idè propter similitudinem Manna Thuri Græci: Rustici autem Narbonenses Metaphoricè in Iunipero & Teda glaciem, Galli Vernicem vocant, poterit secum perpendere idem Larici, Ornoglossi, Amygladæ, Prunæ ac aliarum plurimis, usu venire posse. Ab eo etiam habent præterea Adversus quod de cleomele Narbonensi dictum in Olea Æthiopica magis fuit hæc persvasio: alioqui & rara observatio est, neque à quoquam recentiorum literis prodita: quin potius à nonnullis quasi fabula foret excepta, nec ipsimet assentiri recensionibus ausi essemus, nisi oculis manibusque id comperissemus in Provincia Narbonensi maritima, non procul Monspelio, urbe tam lauta quàm nobili. Et paulò post subdunt. Istud nostrate porrò nos quasi utriusque nature Cinnam & particeps plurimarum arborum genitabili salvia syvari, atque ex madore qui cuiuslibet inest pro sua natura plantæ varius, constat putamus. Cui dum occurrit noctis periodus antelucana frigidiuscula, quemadmo-

dum tunc coacto in Æthere, vel aere; vapore, aqueum facit Rorem vocatum: sicut arboris succus perficere cogendo & addensando expirantem per latentes poros mellitam exhalationem, sistit inibi Manna. Quæ eadem causa efficit, ut Ficus suos fructus noctu maturare verè dicatur, non autem luna calor æstivus, vt quosdam statuisse scribit Plutarchus, siquidem illi noctu silente æquè benè maturitatem assequuntur fructus, ut in Ficus historia abundè declaratum. Ac hanc quidem sententiã, insunt eadem Adversus de generatione Mannæ, cæteris probabiliorum ob rationes adductas putabimus, dum prodeat aliquis qui his certiora vel manifestiora declarare possit.

Nunc reliquas Mannæ & aerei Mellis vires ex veteribus persequamur. Ac ex cæteris quidem Arabibus pleraque tradita supra, ob naturæ & historia diversitatem ad differentias & descriptiones facientes: nunc verò & Melsenti audiamus: & post Actuarium, & Neotericos quosdam.

Mel [inquit, cap de Manna] est Ros frigore noctis æstivæ concretus, ex halitibus à terra & aquis Solis calore sublatis æstivæ, id est, die calido sicco, ac deinde exactè tenuatis & coctis. Manna eidem est ros ex vapore elato, & cocto in aere temperato, fecundo, lætis aspectibus cadens super quasdam plantas & lapides, à quibus dux ipsius differentie statuuntur. Quæ enim lapidibus incidit, guttarum aut seminis modo coagulatur: quæ si recens, dulcis, alba aut saltem subcitrina, est melior. Mala verò antiqua, fusca, cænoza. Quæ plantis, harum tum facultatem aliquam assumit, tum foliis & floribus est permixta, neque id nimis: quæ si præterea recens est, & subalbida, est melior. Temperata est, aut paulò calidior: calida humida primo gradu Averrois guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget: bilem clementer purgat, sitim sedat. Adulteratur saccharo, & folliculis sennæ: sed hæc tempore maturari eget: dumque mollescit & liquefit, dolum prodit. Quoniam verò imbecilliter vacuat, præsertim cruda (cocta enim citius agit) thymo & hyssopo, vel alio, vis eius, ut Cassius, intenditur. Valentibus autem medicamentis mixta, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa naturæ magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus Scammonio miscuit, [Mel, rem Mannæ congenerem miscuit Gal. Vbi autem manna, non legimus, nisi in libris falsò illi adscriptis: Sylv. quod à posterioribus est laudatum: alii Turbith, alii alii. Datur à drach. sex ad drach. quindécim. Annum servatur.

Perquam moderatè purgant Cassia nigra & Manna, prodente Actuario, præbimus utramque quibus potentiùs medicamen aliud dari non potest: nimirum pueris & fœminis utero gerentibus commoditate quadam & necessitate urgente representamus, & iis: in quibus exuperans febris reliquorum medicaminum usus respuit. Datur, monente Fuchio, iisdem quibus Cassia nigra, sed maiori pondere quàm Cassia. Datur enim ab uncia una ad uncias tres, quamvis Melsue infra fescunciam consistat. Idem porrò Fuchius levem aut ferè nullam solvendi aliumque subducendi vim tribuit: quod iis compertum esse ait, qui iuxta Libanum fuerunt. Referte namque indigenas eius montis, quum abundè ea timent, nihil tamen lædi, aut alvum sibi quoquo pacto subduci sentire, sed ea tantum obsonio nutiri. Quapropter cum melli

Ros.

Manna quomodo fiat.

Melsue de Manna.

Differentia duc.

Delectui.

Temperam.

Vires. Adulterium.

Costa efficitur.

Dosis. Duratio.

Quibus datur.

Cibus.

Fuch. re-  
preh.

quodammodo similem facultatem habere con-  
fiteri faciliè ea nos carituros censeat, modò peregrinorum  
admitatione non ita duceremur, neque stulti contemptis  
nostratibus è longinquis allatis uti potius, quàm iis quæ  
nostri in hortis proveniunt, malleimus. Atque stultitiæ nostræ,  
temerè sumptus immodicos facientes, condignas nos dare  
pœnas concludit. Pater itaque Fuchsius Mannæ vsum  
prorsus è medio tollere. Sed rationes quas affert, non sunt  
eius momenti, quibus persuaderi debeamus: quapropter cum  
Matth. cogimur in hoc eius sententiæ refragari. Nam quòd  
Manna alvum subducit, & eam quidem innocuè, non solum  
conuenit inter autores, qui hæcenus de ea scripserunt, sed  
ita etiam quotidiana experientia docet. Siquidem durum &  
semis vnciarum pondere data alvum perbellè deiecit, &  
privatim blem educit. Quod verò de indigenis Libani  
montis scribit, quis tam faciliè illi credet, cum nos  
quodidè contrarium experiamur? Aut, si maxime etiam  
verum sit, quòd narrat, (nolumus enim cuiusquam fidei  
temerè derogare) illud consuetudini tribuendum  
censemus. Ab assuetis enim non fit passio, ut tradunt  
philosophi. Et Medicis haud insolens est, medicamenta  
benigniora longa consuetudine alimentorum vices  
subire. Deinde non est de medicamenti benigni natura,  
ledere, sed juvare: quòd Manna utique præstat  
blandè alvum subducendo. Quid si suspicemur Mannam  
Libani esse peculiarem quandam speciem: quæ si non  
purget, non idèò sequitur, alia Mannæ genera (quæ  
diversa esse ex superioribus liquet) non purgare.  
Quapropter securis & generalis, quàm par erat, de omni  
Manna id pronunciauit Fuchsius: quòd Arabum odio,  
more suo, cum fecisse, non temerè fortè quis suspicetur.

Sylvius putat nos idèò transcendere Mannæ  
dolum à Mese præscriptam, quòd nostra Manna  
fortè imbecillior sit, aut etiam adulterata. Quòd  
quamvis de imbecillitate concedi possit: de adulterio  
tamen non debet. Nam qua tandem re adulterari  
queat ut minor evadat, & faciem non mutet? Adulterium  
vinum acendarum potius causa accedit, ut de Calabrica  
tradit, eam scammonii diluto commisceri. Putamus tamen  
Sylvium intelligere Mannam Larignam, in Gallia  
vulgarem, quæ proculdubio diversa à Meseui  
Manna.

Cnatio.

Lad. Duretus in notis ad Holler. de morb. inter  
ubi Holerius Mannam in Colica biliosa præscribit,  
annotat: Mannam tunc exhiberi non posse, quòd  
eiusmodi Colici ferè sint *melancholici*. Ac sanè idem  
sentire videtur Altomarus. At nobis: aliud videtur  
exhibere medicamentum purgans dulce, aliud  
cibos dulces. Si Manna educit bilem Colicam  
exatantem, non generabit. Ergo etiam non nocebit  
etiã si sint *melancholici* qui assumunt. Verùm hic  
opus est diligentiori consideratione.

Duretus &  
Altomar.  
taxis.

#### MAN SIVE MANNA SACRARVM LITERARVM, SIVE ISRAELITARVM.

Manna hi-  
storica ju-  
cta.

HÆTENVS de Manna, Melle aëreo & Teren-  
tiani in genere: nunc de differentiis specialius  
tradamus, exortis à Manna sacris literis cele-  
brata. Exodi 16. legimus, Ab Elimo profectam  
omnem Israëlitarum multitudinem in Sinem so-  
litudinem, positam inter Elunum & Sinam, per-

venisse quintodecimo die secundi mensis, à  
quo Ægypto excefferant. Ibi vulgò Israëlitas  
in Mosem & Aharonem fremuisse: optare sese, si  
fieri posset, ut in Ægypto à Iehova essent oculi,  
cum ollis carnium affiderent, cum panem ad fa-  
tuetatem comessent: nunc in eam esse solitudi-  
nem ab illis adductos, ubi tota illa multitudo  
fame conficeretur. At Iehovam Moysi denunciat-  
se, sese illis panem pluturum esse de cælo, cuius  
singulis diebus certum modum egressi collige-  
rent, ut eorum periculum faceret, utrum ex sua  
lege victuri essent, nec ne. Sexto autem die  
curarent, ut quod ad se importarent, id duplo am-  
plius esset, quàm quantum reliquis diebus con-  
sumerent. Et Mosem atque Aharonem ad omnes  
Israelitas verba fecisse, eos & vespere se à Iehova  
ex Ægypto eductos esse cognituros, & manè  
etiam eius claritatem spectaturos, postquam illo-  
rum in se fremitus audivisset. Nam se quidem ta-  
lem non esse, ut de se expostulare debeant. Ad  
Iehovam hanc querimoniam, non ad se spectare.  
Tum verò Mosem mandasse Aharoni, ut univer-  
sam Israelitarum multitudinem iuberet in Ie-  
hovæ conspectum accedere, qui eorum queri-  
monias audiret. Atque Aharonem ad univer-  
sam multitudinem verba faciente, eam ipsam,  
Iehovæ splendorem in nube conspexisse, cum  
Mose colloquente in hunc modum. Audi vi  
fremitus Israëlitarum: renunciatote eis, sub  
vesperam comedite carnem, & manè saturos  
esse pane, cogniturosque quantum eorum Deus  
Iehova sit. Igitur vespere exortas cothurnices,  
ut castra obtegerent. Mandè autem circum  
castra, solum contritum fuisse rore: qui ubi  
ros evanuit, conspectum fuisse quiddam in  
superficie ipsius deserti minutum, rotundum,  
tenue, perinde ac si pruinâ esset conspersa  
humus. Eo viso, Israëlitas hic inter sese  
dixisse. Manhu? quid hoc? neque enim  
scivisse quid esset. His Mosem respondisse: Hic  
panis est, quem vobis Iehova dat ad victum,  
de quo ita præcepit, ut colligatis ex eo, quantum  
cuique opus erit ad victum, videlicet gomeres  
in singula capita, inita ratione numeri eorum,  
qui sunt in cuiusque contubernio. Id quòd illi  
fecerunt, collegeruntque partim largius, partim  
parcius. Sed cum gomere metirentur, neque ei,  
qui plus collegerat, supererat, neque ei qui minus,  
deerat: tantumque quisque collegerat, quantum  
ei ad victum opus erat. Interdixit autem Mo-  
ses, ne quis ex eo reliquum faceret in crastinum.  
Cuius præcepto neglecto, nonnulli reservaverunt.  
Sed id enatis vermibus forebat. His cum Mo-  
ses successisset, colligebant deinceps singulis  
matutinis, quòd cuiusque victui satis esset:  
postea calefcente sole liquebat. At sexto die  
duplicem victum collegerunt, videlicet duos  
gomeres in singulos. Id cum omnes civitatis  
magistratus ad Mosem retulissent: respondit  
illud ipsum denunciatum esse à Iehova. Post-  
tridie enim Sabbati ferias Iehovæ facras fore:  
coquerent & elixarent quòd opus esset, reliquum  
omne sibi in posterum diem reponerent, ac  
reservarent. Idque cum ab illis esset administratum  
ad præscriptum Moysi, posttridie quòd repositum  
fuerat, id neque forebat, neque in eo vermes erant.  
Eo Moyses iussit ut illo die vescerentur,  
quòd Sabbatum Iehovæ esset, ruri non inven-  
turi. Sex diebus enim colligi debere: septimo  
autem die, quòd Sabbatum esset, non fore.  
Quidam tamen de populo etiam septimo die  
exierunt ad colligendum, sed nihil inven-

Iehova Ma-  
nam pro-  
misit.  
Panis de  
Cælo.Cothurni-  
ces.Descriptio  
Mannæ  
ex S. Scri-  
ptura.Manhu  
Panis  
Israelitarum



invenirent. Hicque à Moſe juſſu Iehovæ caſtiga-  
ti ſunt, quòd tam diu illius præcepta & leges ſer-  
vare nollent: perſpicuum eſſe, Iehovam, quia  
iſtis Sabbathum tradiſſet, propterea ſexto die  
victum præbere bidui: inanerent in ſuis ſedi-  
bus, nec quis ſeloco moveret die ſeptimo. Ita-  
que eo die feriati ſunt. Nominarunt autem il-  
lud Iſraelitæ *Manna*, quod ſimilitudinem habe-  
bat ſemina *Coriandri*, album, guſtu placentarum  
ex Melle. Idque ſibi Moſes dixit à Iehova in  
mandatis datum, vt ex eo, quantum gomer ca-  
peret, ſeponeret & conſervandum ad poſteros, vt  
viderent quo eos victu ille toleraſſet in deſer-  
tis, eductos ex *Agypto*. Mandavitque Aharoni,  
vt gomeris menſuram Mannæ in phialam immit-  
teret, idque apud Iehovam ad poſteros cuſtodi-  
endum reponeret. Quod ille fecit, quemad. Ie-  
hova Moſi præceperat, idque apud Oraculum af-  
ſervandum repoſuit. Hac Manna Iſraelitæ per  
40. annos vti ſunt, quibus ad extremam Chan-  
anæam, quæ terra habitabatur, pervenerant. Eſt  
autem gomer, decima pars ephæ. Hactenus  
Moſes. Ex quibus patet, Iſraelitæ Mannam per  
40. annos pro cibo uſos. Ad quod ſortè reſpici-  
ens *Fuchſius*, Manna noſtrum & Libani non di-  
ſtinguens à Manna Iſraelitarum, cibum potiùs,  
quàm medicinam credidit, & quæ re paulò an-  
te. Patet item Mannæ nominis originem apertè  
derivatam ab Hebraica illa Quæſtione *Manhu*:  
quod & ſupra monitum.

Num. 11. eadem plebs carnes petens contra  
Iehovam murmurat, ac ſe animis contabefcere  
clamat, quòd nihil aliud oculis illius obver-  
ſaretur quàm Manna iſta: vbi *Coriandri* grano  
ſimilem fuiſſe denud traditur, & ſpecte *Bdellij*:  
hancque gentem illam paſſim collegiſſe, mola  
que conſuturam aut in mortario diſtribit coxiſſe  
in ollis, & hinc panes deſtitutiſſe feciſſe, ſapor-  
libi oleo torrefecti, hancq; Mannam cum roſe in  
Caſtra noctu delatam, vt clariùs legere pote-  
cum reliquis circumſtantis loco citato.

Deuter. 8. Exprobratur Iſraelitis, quâ ratione  
Iehova Deus illorum, quadraginta annis per ſo-  
litudinem ductarum, vt eos affligeret, vt tentaret  
vt adverteret quid in animo haberent, an eius  
præcepta ſervari eſſent, nec ne. Igitur eos affli-  
xiſſe, & fame affectos Mannam paſſiſſe, tum iſtis  
tam maioribus ſuis ignotam, vt eis oſtenderet  
non ſolidum pane vivere hominem, ſed etiam  
eo omni, quod ex ore Iehovæ proficiſcitur.  
Hinc diſcant noſtri Medici, ſi velint, Mannam  
Iſraelitarum rem diuino miraculo productam fui-  
ſſe in illorum neceſſarium victum. Obus fuit,  
non medicamentum ante illorum tempora i-  
gnotum.

Iſoſ. 5. proditur quo tempore ceſſavit Man-  
na, nempe poſttridie paſchæ: neque eam deinceps  
habuiſſe Iſraelitas, ſed comediſſe ſine fermento  
panes, & toſtas fruges.

Pſalm. 78. Diuinus rex Iehovam celebrat, quòd  
patribus ſuis Mannam ad veſcendum depluerit,  
& celeſte dederit frumentum. Ita enim vocat:  
quod Deus magna copiæ de celo depluerit, in  
illorum victum neceſſarium, ita paſſim legas in  
S. Scriptura, aliàs verè Manna, quæ de celo de-  
ſcendit, tradi, aliàs myſticè. Verè dedit tibi ci-  
bum Manna: cibavit te Manna: & Manna tuum  
non prohibui: dedi vobis Mannam in eſcam: pluit  
illis Manna ad manducandum: manducauerunt  
Manna in deſerto. Myſticè: facite, Manna &  
oſſerte: vincenti dabo Mannam abſconditum, &c.

Sed quod ſalutis noſtræ dator ille Iſoſus Chri-

ſtus, ſermonem faciens de pane vivifico, (vt le-  
gimus. Ioan. 6.) ſeipſum cum Manna comparat,  
id verò præcipua obſervatione dignum. Nam  
petente turbæ ab eo ſignum in ſpecimen, quo vi-  
ſo in eam credant: Maiores noſtri, inquit,  
Mannam ſolitudine comederunt, quemad. ſcri-  
ptum eſt: Panem de celo dedit eis comeden-  
dum. Quibus Ieſus: Hoc vobis, inquit, etiam at-  
que etiam confirmo, non Moſem vobis panem  
dediſſe de celo: ſed meus pater verum vobis de  
celo panem dat. Nam diuinus panis eſt, qui de  
celo deſcendit, vitamque dat mundo. Tum illi:  
Domine da nobis perpetuò panem iſtum. Et  
Ieſus: Ego ſum panis vitalis. Qui ad me venit,  
nunquam eſuriat: & qui mihi fidem habet, nun-  
quam ſitiet, &c. At Iudei de eo ſtemuere, quòd  
ſe dixerat eſſe panem, qui de celo deſcendiſſet,  
quirerantes, qui, cum Iſoſepi filius ſit, cuius illi  
patrem & matrem noverint, ſe de celo de-  
ſcendiſſe dicat? At Ieſus ſic eis contra respon-  
dit: Ne muſtate inter vos. Nemo poteſt ad me  
venire, niſi pater, qui me miſit, eum trahat, à  
me vltimo die ſuſcitandum, &c. Et mox: Ego  
ſum panis vitalis. Maiores veſtri, qui Mannam vi-  
xerunt in deſertis, tamen mortui ſunt ſequitur  
enim ad captum auditorum, qui non vltius reſ-  
piciant, quàm ad nutritionem corporis. Hic  
eſt panis, qui de celo deſcendit, quo qui veſce-  
tur, non ſit moriturus. Ego ſum panis vivus, qui  
de celo deſcendit, quo panis qui veſcetur, vivet  
in perpetuum. Panis autem quem ego dabo,  
Caro mea eſt, quanti ego pro Mundi vita da-  
bo, &c. Et mox: Hic eſt panis qui de celo de-  
ſcendit, non quale Manna, quo cum vixerint ma-  
iores veſtri, tamen mortui ſunt. Hoc panis qui  
veſcetur, vivet in ſempiternum, &c.

Cæterum verba illa quæ c. 16. Sapientia Salo-  
monis leguntur: Nix quoque & glacies ignem  
ſuſtinent, non tamen liqueſcebat, vt illi agno-  
ſcerent ignem ardentem in nive, & in pluvis co-  
ruſcantem, fructus hoſtium conſumpſiſſe: eun-  
dem ruſum, ut alerentur juſti, etiam propria fa-  
cultatis oblitum eſſe: Hæc, inquam, verba docti  
quidam haud inſubidè (ſi de rebus ſummis ac  
Myſticis tenue noſtrum quoque iudicium inter-  
ponere ſas ſit) ad Mannam referunt, quòd ea nix  
quædam & glacies fuerit, quæ tamen igne coque-  
batur: neque liqueſcebat, cum eadem ſole ſolve-  
retur. Nam (ut mox additur) quod igne non  
corrumpebatur, idem planè exiguo Solis radio  
calefactum liqueſcebat, ut notum eſſet, Solem  
agendis Deo gratiùs præveniendum, & eundem  
ſub ortum lucis interpellandum eſſe. Et illud,  
inquam, quod igne non corruptum fuerat vel  
non conſumebatur &c: de Manna intelligunt, de  
quare Theologi decernere malumus, quàm ali-  
quid temerè pronunciare.

Sed quid autores ſentiant de Manna hac Bibli-  
ca paucis videamus.

Elxomeli, inquit Hermol. ſi hoc idem quod  
& Aeromeli dicitur, quafi Mel æthereum ac cele-  
ſte, quod ſacra litera Manna vocent, ut non pla-  
nè contendo, ita certè promptiſſimus ſum ut  
credam: ſed ita tamen ut intelligatur aliquid di-  
ſcrimen inter id quod manduci potuerit, & id quod  
Medicinæ tantum naſcitur. Eum verò tacitè  
reprehendens Marcellus: Non probamus inſiſ-  
tere, quod aliqui ſuſpicari ſe dixerunt eſſe. Oleomeli  
Dioſc. quod antiquiores Græci æthereum, id eſt, æ-  
thereum Mel vocaverunt: id ſcilicet quod ab He-  
breorum ſacris literis acceptum veteres Man-  
nunc verò paſſim Manna medici & oſſicina ap-

*Manna  
anſerit.*

*Diuinus  
panis.*

*Panis vi-  
talis.*

*Panis vi-  
talis.*

*Autorem  
variorum  
indicia Ge-  
ria de Ma-  
na Iſraeli-  
tarum  
Elxomeli  
Manna.*

*Manna ali-  
mentum  
non eſt  
Medicina  
Non eſſe  
Elxomeli  
Manna.*

pellant. Acreum enim mel non ex trunco manat, ut Oleum, sed in arborum foliis invenitur.

Lonic. non solum stultum, sed impium quod dicit, miraculum celeste, quo Deus Manna pluebat Israelitis in deserto, in naturæ operationem vertere.

Manisterus in Exod. habet quædam notatu digna, sic scribens: Habuit autem Manna illud rorem supra & infra, ut Hebræi dicunt &c. Onkelos sic vertit hunc locum: Et cum auferretur descensus roris, ecce super faciem deserti tenuitas quædam denudata in modum Calcis, quæ quasi gelu iacebat in superficie terræ. Id cum vidissent

MA. lib.

Israelitæ, dicebant: Man-hu, id est, hoc Man.

Interpretantur autem Hebræi Man, ut scilicet quod donum seu pars. Aben Ezra de Manna loquens, dicit Man esse nomen Arabicum, asseritque se vidisse speciem rei conformem Mannæ, sed quæ solum in mensibus Nilum & Itar descendat, & expositam soli non defluere, nec per noctem referatam putrefecere, nec esse tam duram ut conteratur in mortario, sed super linguam positam liquefcere, ut usus eius magis sit pro medicina, quam pro cibo. Assimilatur Man Coriandro, Gar. non colore sed figura. Videtur autem

Gar.

his verbis planè Manna nostrum Gallicum insinuare voluisse, cui sanè ex notæ haud malè competunt, de quo particulariùs postea. Sunt etiam, addit idem, qui Gar exponunt Sinapi. Aben Ezra verò fatetur se ignorare quid sit, aut quid significet.

Fosteri error.

Forster summè hallucinatur in Diction. suo Hebraico confundens semen herbæ graminæ, Germanis dictæ Schwaden cum Man Hebraeorum, Arabum & officinarum, cum quibus nihil commune habet, præter solum nomen. De ea Manna herbacea agemus inter fumentacea & graminea. Idem Man designatum vertit: siccum (ait) rorem illum celestem, tanquam singulare donum à Deo ipsis destinatum Israelitis vocasse. Chaldaus vertit Mana: quem Hieronymus sequutus Manna transfudit Exod. 16. Ios. 5. Psalm. 78. Nehem. 9.

Manna herbacea. Man designatum.

Manna.

Rob. Const. in Lex. *מאנה* Chaldaus, vel *מאנה* Hebræis, *מאנה* dicitur. Nonno poëtæ, id est, Manna, cibus ille quo Deus XL. annis Israelitas pavit in deserto, qui; nocte roris instar celo demittebatur, & post solis exortu liquefcbat.

Brassavolz iudicio Hebræorum vera Manna in granula concreta ut Calabra videtur, sed miraculum in quantitate fuit, & in eo quodd singulis diebus pluebat, & ob mandatum pluebat, & ob mandatum putrefcebat. Mannæ nomine vulgò, ut vult Cordus, quod nunc acreum seu rosicidum Mel, Manhu ab Israelitis olim appellatum, ostendunt: Idem lib. 2. cap. 104. apud Diosc. apertis verbis scribit, Mannam sacrum literarum, idem esse cum melleo rose: an rectè iple viderit & docti.

Melleus ros.

Sanè & Monachis apud Mesven Manna sive Manhu est mel roris, sive pinguedo aeris, sive Mel acreum.

Pinguedo aeris.

Claudamus sacram Mannæ historiam pulchra Adversariorum obseruatione. Hebræorum Germanicorum notum, inquit, & Rabinum admodum callentem Philosophiæ habuimus, qui Manna istud purum & Masticinum vocatum, affirmabat esse idem cum suo Israelitico, Bdellii specie, Coriandri granis simile, melleo sapore, quale etiam nunc est in Palestina, Syria & Arabia. Porro, nobis obiectantibus illius supercoelestes vires, potentia, & putredinem: Respondebat

Manna masticinum.

Iehovam cunctipotentem, pro eo ac ferebat sua voluntas: usum & fructuonem Mannæ illis largitum fuisse, qualem, quantum & quamdiu sibi visum fuit: reque ab se contra uti solum ad suam ostendendam sive gloriam sive munificentiam, præter, & super naturæ leges ratas. Sic quoque Marach perquam amarum & salum edulcuit iniecto ligno: & Arabicus sinus quasi medius factus, vadum fecit proli Iehovæ, hostes verò obruit: Solis orbita cursum inhibuit, & æquor montibus supernavit.

## MEL CEDRINVM.

Hippoc. lib. de Vlcibus ait: Medicamentum aliud ad ulcera vinum accipit, Mellis Cedrinum paululum: ex aridis, florem artis.

Ad ulcera.

Mel illud scquit Galenus mercatores sui temporis è Montè Libano petiit venale portexisse: idque roris modo destillare: atque in eo copiosissime ex foliis arborum colligi: propterea quod Cedrus inibi frequentissima sit, ex hac potissimum accipi verisimile esse scripsit, lib. 3. de alim: Rorem montis Libani nominans quod Hippocrates Mel Cedrinum appellavit.

Locus.

Ros Libani.

Gal.

Manna.

Gal.

Itaque cum mel istud vulgò Mannæ nomine cognoscatur, & durior sit compaginis, quam ab autoribus descriptum sit, merito dubitabit quispiam an eadem res sit ac ea, quæ ab antiquis sub eo nomine intellecta est. Siquidem neque Hippoc. etiam Gal. unquam durum intellexerunt, sed liquidum, adeo ut Gal. scripserit suæ regionis indigenas referre solitos, Iovem aliquando melle plere.

Ego verò, inquit Bellon. de arb. confis. aliquando dubitavi an olim Cedrinum mellis genus hoc edi ab hominibus loco medicamenti soleret, quo alvus solveretur. Sed ex antiquissimis Hebræorum monumentis habeo Cedrinum hoc mellis genus edule fuisse, neque ita tamen liquidum, ut manibus facile teneri posset: duasque eius præcipuas differentias fuisse, liquidam scilicet & duri, mihi ex negotiatoribus apud Mem-

An Cedrinum mel purget.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Gal.

Manna.

Monachi



Monachi sive Caloieres montis Sinai (ut idem Bellon. annotat in suis Obs.) habebant Mannam liquidam collectam in suis montibus, quam vocant *Tereniabin*, ad differentiam duræ Mannæ. Quod enim Arabes vocant Tereniabin conservatur in ollis terreis mellis modo: venaleque ferunt Cairum. Hoc Hip. vocavit Mel Cedrinum: alij Græci Rorem Libani. Differt à Manna alba sicca. Gallica quæ ex Brianfon defertur, sicca est. Cairi venalis in Officinis promitur Manna duplex. Una quæ dura vocatur Manna: altera quæ liquida Tereniabin. Hæc Bellon. Ceterum, considerandum an Manna Cedri non sit potius liquor exudans ex Cedris, & concretescens, quam Ros. Nam si Ros esset, cur potius Cedris Libani, quam aliis arboribus adherescit, cum eis sint tenuia admodum folia, cæteris plerisque lata, & expiando rori commodiora: ut videmus apud nos Europæos Rotem foliis Quercus potissimum adherere.

Scribit Bellon. Mannam Lariceam, si Sol illuxerit, liquidam evadere, & esse Tereniabin. Inquirendum autem annon idem eveniat Cedri næ Mannæ. Sicca sit, censemus liquidam Cedrinam Mannam diversam à Rore aëreo. Fortè Galenus Manneum liquorem in Libano proprium Cedris non distinguit à Rore aëreo in diversas arbores cadente. De Melle Cedrino Hippoc. pauca quædam antè quoque dicta sunt. De viribus etiam Mannæ Libani considerentur quæ antè tradita sunt ex Bellonij, Fuchij, ac Matth. opinionibus diversis. Et Lectores considerent, quæ postea traduntur de manna Orientali mastichina: multa enim ad hoc caput referri possunt.

# MANNA LARICEA SIVE BRIANSONA.

MANNÆ quæ passim in Officinis lautioribus habentur suis distinguuntur nominibus à loco petitis. Aliæ enim Briansonæ, aliam Ambrunensem, aliam Calabrinam, aliam Granatam vocat. Quæ cum inter se sint dissimiles non tantum facie, sed & efficaciâ, aliam aliis præponunt. Nam [ut pulchrè etiam annotavit Bellon.] alia compadiligano pingui, dulci, flavoque, aut albicante prædita est, ut Briansona. Aliâ grano constat grandiori, floccosiorque referens, intus concavo, candidiori, cuiusmodi est Calabrina. Alia pellucida est exiguo grano, cuiusmodi mastichina. Nunc de Briansona speciatim dicemus. Grumitataque mannæ Briansonæ seu Laricæ, alij Coriandro pares, rotundi, alij oblongi maioresque, colore albicante, & cum inveterascit, flavescente, consistentia cerea, sed in ore liquefcente, dulcedine saccharina, valdè grata. Admissa multa foliola Larigna sunt. Carbonibus imposita, tota ferè consumitur bulliundo.

Scribit Bellon. se aliquando certum montis latus Laricibus confutum eo modo albere compersisse, quo cum pruinæ in hyeme arbores convesterint. Nam, ut paulò antè dictum, hæc in Libano monte Cedris, in Europa verò Laricibus mavult copulari, ac eius tantum extremis ramis. Cuius rei causam subtilitatum professoribus indagandam relinquimus. Vide quæ paulò antè etiam dicta de liquefactione mannæ Laricæ ex Bellonio, nempe quomodo à Sole liquefaciat.

Est autem legenda, eodem autore, antequam

Sol arboribus suis igniculis vim intulerit: nam roris illius materia noctu supersidet, non autem interdiu. Quocirca indigenæ ad Larices summo manè festinant, ut mannâ legant, priusquam Sol illuxerit: nam, ut dictum, quum Sol ei illuxit, deterior esse solet, & liquida evadit. Hinc duæ species. Sicca Sorap. & Avic. manna, quæ in mediterraneis magni venire solet. Inurbibus autem quæ ad radices montium sitæ sunt, adè vilis est pretij, ut non pluri in vere libra, quam quatuor assibus divendatur. Ros enim, qui arboribus infidet, tantus est, ut operarij quantum volunt reperiant: sed in legendo operariis tanto tædio esse solet, ut ab uno viro vix tres libræ uno die colligantur.

*A sole liquefit, & deterior fit. Dna spec.*

*Legendi modus.*

Rustici porrò ad Larices manè appulsi, brevi Solis radios imminere sentientes, falces arborum securibus in terram decutunt, multos ramorum acervos sub arboribus in umbra asservantes, ut quicquid roris illius celestis cacuminibus adhererat, per otium in umbra sub arbore legant. Illi verò quum multam exceperint, & ad vicinas urbes detulerint, hanc negotiatores quidem emunt, sed quoddam intra annum unum aut alterum deterior evadat & corrumpatur, necesse habent, ut ex multis libris paucas divendant, illas quidem carius distrahere, quibus reliquarum iacturam, si quam adesse contingat, refarciantur. Hinc fit, quoddam magno valeat. Hæc est illa Manna per totam Galliam celebris, quæ Briansona: testaturque Bellon. non aliunde, quam ex Laricibus in summis altissimorum montium colligi: duram esse: atque differre à Manna montis Sinai quæ liquida sit.

*Manna annis deterior evadit. Cur magno valeat.*

Fuchius Mannam Briansonam flavam dicit, utique vetustiore inspiciens: Nam vetustate flavescit. Quapropter etiam Bellon. flavam dixit. Designanda tamen res unaquæque ut est in prima propriæque sua natura.

Cecidit è cælo Manna, tradente Math. admodum copiosa, maltichæque granis similis, agro Tridentino, in Ananienfibus montibus, & præsertim supra Larices arbores, testibus Cl. med. Iulio Alexandrino, & Petro Spezzilencio pharmacopoeo Ananienfi: quippe qui huius mannæ, quam ipsemet legerat, scribam ferè ipsi miserit. Nunquam autem se concessurum ait Matth. mannâ, quam è Lariceis foliis legerunt Ananienfes, è Larice ipsa exsudasse, cum nihil prorsus resinosi resipuerit. Quinetiam quod non solum in arborum foliis spectetur, sed etiam in pratis, adè ut fenissecæ præ mannâ à Sole dissoluta, falces ab herbis nequiverint explicare. Asseritque hanc cælestem fuisse mannâ, perinde ac illa, quam se propriis manibus in agro Goriensis legisse testatur. Sed par fuisset Matth. rationes quoque reddere, cur supra Larices potius concreverat, quam supra alias plantas. Quid si non lecta supra folia, sed supra ramulos? Matth. non erat præsens cum colligeretur. Lariceam mannâ non respere resinâ, non sufficit ad ostendendum non exsudare, ut videre est de eo Elzomelite Lobelij. Fieri potest, ut præter exsudantem mannâ in Larice, ros mellis interdum cadat aut coadervetur supra omnes plantas eius loci, ubi Larices manniferæ copiosæ sunt, qui nihilominus diversus sit à mannâ Laricea. Sed de hac re postea specialius sub mannâ Calabrina.

*Math. opinio non è Larice exsudare Mannam.*

*Math. opinio improbat.*

*Aliorum conjectura.*

An Apollini manna Brigantina: à Brigantio Cœnomanorum oppido, nundinis illustri, vel candida, quæ quidem selecta nec vitata, dulcis &

*Manna Brigantina candida.*

*Leuca.* gustu iucundissima, minuta, mellem dulcedinem representans: vel livefcens, tenuior, Pinis festucis: furculis herbulisque & foliis etiam adoluta, subductioe alius ignavior: ad alios usus, ut etiam ad lenitionis opera, vix subduplo efficacissima: quum præsertim Orientalis Calabrensisque interdum munda amarescant, & imposturis inabuta minis valeant. Si autem Apollo eandem intelligit mannam, quam nos, miramur non observasse foliola Laricis esse admixta.

*Observatio.* Lob. & Pena tradunt, ut antè monitum, Laricis ramos in vinariam cellam asportatos, mannam postera die demonstrare. Idem etiam conantur demonstrare, mannam potius succum plantæ quàm aëreum rorem esse. Adduntque non spernendam Brianzonensem ad Galloprovinciæ & Allobrogum Alpes provenire solitam, qua universa ferè utatur Gallia, modò delectus purioris, candidioris & recentioris grani habeatur, qualem illic effractus è Larice furculis copiosam se habuisse scribunt: quæ nec dosi, nec gustu, nec purgandi effectu quicquam cedere illi videretur exoticæ. Eamque multò minoris emi, minorique [quàm maltichina, vel Granata] mangopij suspicione. Blandè autem educit biliosa è primis venis & cicore, & quæ pulmonibus pituitosa veluti Lariceus liquor, Terebinthina Veneta vocata.

*Delectus.* Hæc si Syriacæ puræ copia desit, aut Calabrensis, utendum ab uncia semis ad uncias tres. Sylvius vetò, ut antè monuimus, huius dosin tradere videtur ab uncia, ad unciam.

*Dosis.* Cæterum miramur Altomarum, qui tam curiosè de manna scripsit, nihil tradere de manna Laricea, quæ tamen, ut dictum, in multis Gallie & Germaniæ partibus utuntur, cui semper admixta folia Laricis.

*Manna Trunchibul.* Rauvolf. manna nostræ Lariceæ forma & sapore similem dicit mannam Trunchibul.

#### MANNA CALABRINA FRAXINI ET ORNI.

*Descriptio.* Pro Calabrina nobis demonstrata manna purior est, quàm Brianzona. Grani multò maiores, figura varij, colore flavescences, sapore dulci, sed minis grato, quàm prædictæ, cum quadam acrimonia. Nec ita facile liquefcit. Vita etiam minis consumitur. Loco humido posita, minis videtur liquefcere quàm Brianzona. Conservanda, ut illa, loco sicco. Hæc hodiernis temporibus notissima est, ut in Italia, autem Brianzonis, pluribus colligitur locis: sed copiosior in Calabria, quæ & Calabrensis ubique vocatur: & particulariter in Fraxino & Orno colligitur, quam certè specialiter ipsæ arbores ex se producant, sicut Gummi cæteræ arbores: achuiusmodi est Calabrensis. Ratio est, quia in caudicibus & truncis sive ramis arborum copiosior, quàm in foliis reperitur. Nam quæ de aëre, sicut ros, descendit, abundantius recipitur in foliis, quàm in truncis. Hoc ratio, hoc experientia docuit plurimos. Nam quis audeat dicere pluviam aut rorem, dum cadit, prius insidere truncis, quàm maderesciat folia? Et quemadmodum aqua æqualiter pluit super arbores & plantas, ita & manna descendit rorando universaliter & arbores & plantas, & petras, & ipsum adeò purum putum solum.

Iam quare in una potius arbore, quàm in alia

non multum distante reperitur? Nonne quia illa arbor ex se producit, & illa non? Item si sicut ros, descendit semper, quare in extremitatibus & foliis superioribus, quæ cælum spectant, ipsarum arborum non invenitur, sed in ramis & foliis inferioribus? Sed revera, nos (inquunt idem Monachi) curiosè ac studiosè hoc observare iussimus: & ita invenerunt, nempe ex se illas arbores producere illam rem, quam mannam vocamus: quæ liquida fluit ex trunco, & ramis superioribus in folia inferiora, postea congelatur. Et ad maiorem certitudinem plures observatores propriis oculis pluries viderunt fluentem mannam scaturire ex quibusdam tuberculis ipsius arboris: quia non undiq; per totam arborem fluit, sed in quibusdam specialibus locis generatur: ex quibus cum profuit est dulcissima. Si autem quis locum illum (unde videt exire mannam, incidit, exit abundantius, sed fit amara propter percussionem & corticis incisionem, ut ipsi observatores experti sunt. Etiam præcisus ramus, & domum virens portatus, produxit mannam.

Quare concludendum est, arbores, ut Fraxinus & Ornus, hisque similes, ex se generare mannam, sive maus, Gummi dulcissimum, quod manna dicitur. Nam & Gal. etiam quapdoque utitur succo Fraxini: pro quo forsitan intelligenda ista manna, quæ scaturit è Fraxino & similibus arboribus. Eadem arbores & mannam cælestem suscipiunt (cum cadit) sicut & aliæ plantæ. Et quid mirum arbores gummi illud dulcissimum producere, quod mannam arboream vocamus? Nonne & arbores & plantæ generant, stacten, myrrham, storacem, Balsamum, mastichen, Picem, Resinam, & similia plura? Nonne & apes similiter ex floribus quarundam arborum & herbarum mel & ceram colligunt. Ergo &c. Colligunt etiam & ipsi Calabri quandoque mel aëreum, id est, mannam cælestem super varias plantas & super lapides, sicut & aliæ gentes. Sed hoc fit rarò, & non ita densatur.

Arboream mannam autem singulis annis, circa caniculares dies ante textiles pluvias colligunt. Cum autem pluit, cessat fluere. Sed & genus hoc manna: arbores dupliciter colligitur: scilicet una in caudicibus & ramis, quam vocant mannam grossam, & mannam de corpore: alia verò super folia, quam mannam finam, seu mannam subtilem, & mannam foliorum nominant. Medici autem nostri temporis, laudant potius eam, quæ colligitur super folia. Sed revera viribus non differunt, & unum eundemque ortum habent. Nam quæ colligitur in foliis, non ibi generatur, sed è truncis & ramis fluens, cadit super folia illa, quæ ex directò habentur subter. Non enim in cunctis (ut diximus) foliis ipsius arboribus reperitur, sed in illis duntaxat, quæ ex trunco vel ramis susceperunt. Hæcenus Monachi.

Eiusdem sententiæ est & Altomarum, qui concretam & granulofam Mannam, semini aut Gummi similem, (ut ille inquit) cuius frequens est usus, quotannis colligi solitam scribit tam à Calabris quàm à Samnitibus & Vestinis, qui Garganium incolunt montem, & pleræque Apuliz partes, ut Castellanetam: aliisque etiam in locis ipsam colligi solere. Eam tamen non nisi ex Fraxino & Orno colligi, uno ore fateri omnes. Hæcque eam ipsam esse Mannam, qua communiter ad molliendam alvum Medici omnes utantur, ac usi sint quotquot per Centum annos & ultrà, medici antè se fuerint.

Inqui-



Inquisiturus autem an sit velut eos quidam è cælo cadens, sicut ea, de qua Arabes meminerunt, vel dictarum arborum succus humor seu lachryma, sic ratio cinatur. Quæcunque ex aëre decidunt, in quacunque regione ac quovis loco, non speciatim supra unam rem determinatam illius regionis seu loci, sed indifferenter supra omnes ibi existentes rationabiliter cadere debet. Sed Manna hæc non nisi in Fraxino & Orno reperitur, in cæteris vero arboribus, herbis & lapidibus eiusdem loci nequaquam, ut collectores testantur. Igitur non generatur in aëre, neque è cælo cadit. Et per consequens non est eiusdem speciei cum ea, quæ è cælo decedit. Deinde: Eadem Manna, quotannis ex iisdem colligitur particularibus arboribus iam supra 40 annos, ut colligentes eam fatentur, ita ut non desint, qui eandem arbores emant, tanquam singulis annis hoc producentes vestigal. Süntque eodem in loco & eiusdem etiam speciei arbores nonnullæ, super quas Manna hæc non reperitur. Igitur è cælo non cadit, nam, quæ maior ratio reddi posset de una quam de altera, præsertim eiusdem speciei arbore, eodem in loco existente, ac per plures continuos annos eam producente, si è cælo caderet, nulla sanè: quamvis in uno plantarum genere magis quam reliquo quædam afferri possit apparatus ratio. Præterea si Manna cælestis seu aërea pro sua generatione, peculiariter quandam, ut dictum, cæli constitutionem requirit: ita ut calida & sicca præcedat diurna aëris temperies, nox verò sequatur per æstatem bene frigida, (etenim æstivo tempore potissimum generatur) rationi consonum est, non qualibet die, singulisve noctibus etiam æstivo tempore generati posse, sed raro admodum, quemadmodum & liquida, præsertim in Calabria. Ad hæc, Manna quæ utimur, quæ quidem in Fraxino & Orno colligitur singulis diebus, Canis præsertim tempore, aut paulò antè, in iisdem reperitur, modò pluvie, præsertim magnæ, aut ventorū vehementia non adsit. Igitur aërea non est. Amplius, si aërea Manna de genere est mellis rosæ seu aërei, ut dictum, concreti, cū mel solvatur à calore, ac coaguletur à frigore: sequitur quòd eadem Manna à frigido, tanquam contrario causis liquefactionis coagulari debeat, solvi verò à calido. Cū verò in ea, quæ in Orno & Fraxino reperitur, contrarium eveniat, nam à calido durius fit atque coagulatur, ab aqua verò solvitur: necessarii sequitur eandem de natura aëreæ & mellis rosæ non esse.

Quod si quis dicat: non modò à Solis calore Mannam in his arboribus repertam concrecere & duriorem reddi, verum etiam à frigore, ut eam colligentes diu observaverunt: aiunt etenim non solum à Sole, verum etiam à frigore, Aquilone videlicet modicè flante in nocte, eam condensari siccioremque reddi: Dicimus nos, & hac etiam ratione probari, eam non esse rorem è cælo cadentem. Nam hic cū sit aquæ naturæ, à frigido duntaxat coagulatur. Quæcunque enim sunt aquæ (inquit Arist. lib. 4. Meteor.) non coagulantur ab igne: solvantur enim ab igne: Quæ verò communia sunt terræ & aquæ, & ab igne coagulantur, & à frigido, ut ipse ait: quoniam ab utroque incrassantur, recedente videlicet & evaporante humido, diversa tamen ratione. Cū itaque coaguletur, & à Solis calore, & ab aquilonis frigore, hæc quæ in Fraxino & Orno reperitur Manna, necessariè sequitur, eam nec vapore nec rorem esse, aut ex eisdem ge-

nitam: proinde neque etiam aquæ solis, sed aquæ & terræ esse. Item si à Solis calore, & 7. ab Aquilonis frigore hæc, quæ in Fraxino & Orno reperitur Manna non solvitur, nec liquefit, sed potius concrefcit, duriorque efficitur: sicut eam colligentes asserunt, meridie Soléque magis ardente, aridiorem, candidiorem, magisque concretam & coagulata esse: & collectam iam, ubi humidior fuerit, ac liquefieri cœperit, Soli expositam, albidiorē durioremque reddi: quis vnquam asserere audeat eam à cælo fuisse delapsam, atque ex concreto rore genitam? Cū præsertim quæcunque à frigore concrefcunt seu coagulantur, à frigore liquefcant, ut idem tradit Arist. Quinimò Manna hæc ab aqua solvitur atque liquefcit, ut in dies observamus, & eam colligentes testantur: pluvia enim superveniente, confestim solvitur & evanescit, ut primis Augusti imbribus ingruentibus observatum est: sequitur itaque à calido & sicco, hoc est, ab igne aut igni similis fuisse coagulata. Ergo non erit aërea. Nam quæcunque sunt aquæ, inquit Arist. non coagulantur ab igne: solvantur enim ab igne. At vapor aquæ signum est, eodem teste: eo enim consistente, est aqua, ut in ollarū operculis videmus. Cū itaque non ab igne, neque à Sole, sed ab aqua solvatur atque liquefcit Manna hæc in Fraxino & Orno duntaxat reperta, coaguleturque ac durius reddatur à calido, demonstrativè concluditur, eam non esse de genere rois, nec ex concretis à frigore vaporibus genitam, neque è cælo cadivam si saltem prædictis Arist. rationibus ad fundamentis fides adhibenda. Adde quòd, ut huius Mannæ copia maior generetur, contraria requiratur particularis aëris constitutio ab aërea: nam si eo tempore, quo emanare consuevit, dies pluviosus præcellerit, & frigida quodammodo, sequaturque admodum calida & sicca altera aut tertia, maior, ut aiunt, iisdem arboribus quantitas colligitur. Quàntidem ratione aërea seu rosæda esse non poterit.

Quod si quis rationibus destitutus, ad cæcas obiectis delectetur, & occultas causas confugerit, inquiring, causam ob quam Manna hæc in Fraxinis & Ornis duntaxat reperitur, esse earundem arborum proprietatem quandam, ob quam ad seipsas magis alliciant, trahantque hunc suavem liquorem è cælo cadentem, quàm cætera arbores, quemadmodum magnes ferrum, & succinum paleam: Dicemus: cur hæc proprietas non cuilibet particulari eiusdem speciei arbori conveniat? Nam ut cuilibet magneti ac succino datum est, ferrum & paleam trahere, ita sanè & cuius Fraxino & Orno hæc facultas tribui debet. Atqui per multos annos, eosque continuos observatum est, in una regione eodémque loco quotannis determinatas quasdam Fraxinos & Ornos talem in se continuisse dulcem liquorem: quasdam verò alias eodem in loco existentes, eiusdem magnitudinis, eiusdemque ætatis nequaquam. Observatū præterea diversæ magnitudinis ac ætatis quasdam particulares arbores iam dictarum, eodémque in loco consistentes, non tantum quotannis eiusmodi dulcem in se continere liquorem, sed etiam certis temporibus: ut puta sub cane, vel paulò antè: quasdam verò nunquam. Quibus de causis nequaquam concedere aut fateri possumus, peculiariter quoddam illud fieri Fraxini & Orni proprietate: quoniam singulis hæc inesset proprietas, etiam si non æqualiter in omnibus. Non itaque à tota substantia seu specifica forma Fraxini & Orni talem sibi liquorem alliciant à cælo vel aëre

cadentem nam omnibus talis esset trahēdi facultas, quia omnibus una eademque forma & species. Nunc vērō in paucis id observatur.

*Vera Man-  
na genera-  
tio in Fra-  
xino.*

Sandē iam Maio & Iunio mensibus Canicula ante gressu liquorille dulcis intra cortices earum continetur, quo paulatim cocto, adventante ar- dentis Sitis calore, cortex arefcit, eoque scisso aut fisso, liquor foras trahitur, atque ab eodem calo- re iterum contrefcit & condensatur in grumos, aut gummi specie granula. Imō etiam non incisis corticibus, ante caniculā hanc Manna sepe ema- nare visa est, praesertim in Ornis: siue iam dicas tanquam superficium quiddam nec alimento commodum à natura arboris foras protrudi, siue à Solis vi & calore foras elici, siue utraque causā concurrente, quod nobis verisimilius videtur. Neque tamen sufficiebat expulsio illa arboris & attractio Solis, ni huius quoque calor cōcoctōt & cōdensator accederet. Ex quib. perspicue intelligi potest Manna generatio in Fraxino & Orno, vel à mediocriter in natura contemplatione versatis.

*Obiecto de-  
iur.*

At si dixerit forte aliquis, roridam hanc Man- nam non esse velut superficium quiddam arboris, aut alienum, sed simile & familiare, ac velut a- limentum quoddam, & propterea ab eis attrahi- tum quatenus ex eo, quae causa sit, quod tam continuē & diuturne copiose ab eisdem exter- nantur & non potius destineatur? Item quae possit esse eius diversitatis causa, Solem optulari, ut eadem Manna imbibatur prius, arefcatur & are- fiat cortex, rarefiat & scindatur idem: deinde Ca- nis fervidus calor eundem humorem rursus eyo- tet, condenset ac coagulet, quo tempore corti- cem multo etiam magis exsiccare deberet, quam praeterea mensibus, Maio & Iunio, potissimum cum ab ipse incisione aliqua apud spontē ex iis- dem arboribus prodeat Canis tempore, & ante, ut de Ornis dictum. Aut quid impedivit, quomi- nus eadem Manna praedictis mensibus non fuerit à Solis calore concreta & coagulata instar gummi circa cortices dictarum arborum, potius quam in iisdem imblita & intra attracta? praesertim cum ab eodem calore Canis tempore iterum condensa- ta, & gummi instar granulosa reddatur.

*Quidam  
decepti.*

*Circa Me-  
ridiem non  
tempore  
austilicano  
colligi.*

*Quando  
ante Solis  
ortum col-  
ligatur.*

*Manna  
arborum no-  
calefit.*

Hoc loco notandum doctissimos quosdam vi- tos à villicis & pastoribus Calabris deceptos, fal- sò allerentibus, Mannam hanc, quae in Fraxinis & Ornis reperitur, manē antequam Solis calor invalcat, colligi, cum communiter contrarium & hodiè observetur, semperque observatum sit. Non enim manē, priusquam Sol valde peroratur, ipsi falsò retulerunt, sed meridie, Solēque servi- dissimo eam colligunt: neque tamen à Solis calore rarefcit, solvitur aut evanescit, sed potius con- crescit, & durior ac candidior redditur. Qua- propter eam, quae Ornis inhascit, tertia vel quarta à Solis ortu hora colligunt, quod vel à re- missiore calore condensetur, cum terrestrioris naturae sit, eius succus, quam Fraxini. Immo ean- dem quandòque, ut aiunt, etiam ante Solis or- tum colligunt, sed non nisi ubi prae diē inclinante iam Sole profluxerit, & ab eodem concreta fue- rit, aut certe noctu flante Aquilone fuerit coa- gulata. Idque ob eandē causam, ne Sole superve- niente sicior aridiorque reddatur, praesertim ubi non spontē, sed vi, adhibitis cistis, proficiat.

Ex dictis liquet, Mannam hanc arboream, non aëream aut coelestem dicendam, quod iisdem semper colligatur arboribus, atque adeo earum sit propria. Recensendaeque hae arbores inter eas quae copiosum succum & humorem habent, quod, & spontē, & incisurā, ut dictum, non

tantum à caudice & brachiis, sed surculis etiam, & quibus iuxtaque foliorum pediculis, immò ex ipsis etiam foliis, eum liquorem exspunt. Id tamen non quolibet tempore, sed sub cane & ante et- iam: quo tempore hae arbores à germinatione & fructificatione cessant. Quare cum eo tem- pore succus earum validissimus sit, ob dictam causam, maxime etiam suam ostendit naturam.

Sed alia non levis dubitatio discutienda. Di- ctum enim non omnibus eiusdem generis Fraxi- nis & Ornis talem produci liquorem, ex quo fiat Manna: hinc quis inferat, non esse earum pro- prium humorem seu succum proprium. Huic ita responsum volumus. Proprium utique earum suc- cum esse hinc certò cognosci, quod ex quibus- dam earum etiam spontē profluat (nam celsuris illatis modo & tempore convenienti, plures e- mittunt, uti dictum.) Quod vērō non omnes, sed aliquae tantum hanc Mannam procreant, cen- sendum id fieri ob aliquod impedimentum, ut puta ob defectum aut vitium aliquod, vel ob soli aut regionis diversitatem: quemadmodum & Amygda- larum, Prunorum, Cerasorum, Iuniperorum, & reliquarum quarundam arborum generi contin- git, haec eandem habeant naturam.

Est igitur proprius dictarum arborum succus seu humor Manna, quae quotannis, sub Cane pos- tissimum, in Fraxinis & Ornis duntaxat, pluribus continuis diebus colligitur, (qua & se longo tem- pore Neapoli usum testatur: Altomarus, & quo- quot ante se per plures annos medici fuerint, ad alvum solvendam usos esse) non ros, Mel aëreum, aut Manna, quod sequentibus etiam observatio- nibus confirmatur ab eodem. Nam, inquit, su- per inciso lintheo, per plures noctes ac dies, supra eandem arbores, ita ut ros iis incubere non po- tuerit, inventa nihilominus in eis, iisdemque die- bus, ac collecta manna fuit, arboribus etiam non incisis: id quod fieri haudquaquam potuisset, si spontē ex iisdem arboribus non emanasset, maxi- me cum supra idem lintheum & ne vestigium quid- dem eiusdem generis rosis, vel liquidae vel coa- gulatae mannae fuerit perceptum.

Sed quid opus diu hac in re sermonem prote- lare, cum plures hae digni, quibus hanc rem pe- nitus investigare decreveram, uno ore confessi sint, mihi quae retulerint, se propriis cōspexisse o- culis, post collectam in dictis arboribus Mannā, ex eisdem locis reliquam resudasse, emanasse, ac sensim effluxisse, & deinde Solis calore super- veniente coagulatam fuisse: idque non semel duntaxat, sed saepius ac saepius vidisse testati sint.

Atque insuper in Fraxini Ornique caudicibus, iuxta corticem saepius adnatas veluti vesiculas quasdam se invenisse seu tubercula, quas disrum- pentes, primum liquorem quendam album, dul- cem, concretionem & crassum in optimam Mannam convertere: deinde minus album, tenuiorem, li- quidioremque, sed dulcem quoque manifestissi- me emanantem saepius conspexisse: qui etiam à superveniente Solis calore coagulatus, conco- ctus, albidiorque redditus, effectus est Mannae primae assimilis: & ubi diu permansisset superflue à Solis calore exsiccat, inutis redditus est. Ergo si incisis arboribus, in eisdem incisuris talem re- periant concretum & coagulatam succum, eius- dem ferè coloris, saporis & consistentiae, cum ea, quam ex non incisis colligunt, Mannā, quis un- quam haesitare audeat eam esse earundem arborum succi propriam, spontē ad eosdē ramos, caudicē ac surculos detrusū, potius quam rorē quendam & celo aut aëre delapsū? Nemo sanè nisi pertinax valde.



Addeunt & illud: nempe cicadas & alia quædam animalcula se in spexisse, quæ ex dictis arboribus, Orni præsertim, cortice perforato, hanc lachrymam exugebant; quibus deinde fugatis, ex eisdem foraminibus seu fissuris, liquorem hunc dulcem profluxisse, hancque se postmodum à Solis calore coactum legisse, tanquam in optimâ Mannâ coactum.

Observatum præterea relatumque à fide dignis, se plures tecuisse Ornos, ut ex eis pro vini dolis circulos pararent; quos cum fidsent, foliis exposuissent, non parvâ in eis huius Mannæ copiam invenirent: eamque non in cortice, sed ex lignosa ac veluti eiusdem Orni medullosa substantia interiori emanantem.

Testatus item quidam Faber ferrarius, vir probus, cuius nomen Cæsar de Riodi, se, cum in quadam sylva structo igne carbonem pararet, vidisse ex orno vicina Mannam resudasse, & ab eodem igne paullo post coagulatum fuisse.

Cæterum & difficultas hic excutienda. Nam cum dictarum arborum cortex & folia amaro sint sapore, non abs re quæret quispiam, quæ fieri possit ut tam dulcis liquor ex eisdem arboribus, si earum succus sit proprius, exsudare possit? Dicendum, hunc humorem non ex cortice, sed ipsa ligni interioris substantia, quæ sapore dulcis ferè est, aut saltem non amara, oriri, & per corticis fissuras promanare.

Sed, cur corticis amaror contactu continuo eandem non inficit suo amarore? a mirum eiusdem corticis humor, exiguus cum sit, à Solis calore coactus, tandem & ipse dulcis redditur. Et quia maior succi ligni quam succi corticis, copia, illius sapor, non huius prævaleat. Adde quod cum per tenues ac angustos corticis meatus idem excernatur ac transiit humor, quod eius crassum est, in substantiam corticis impingitur, ita ut per eos expelli nequeat, nisi quod dulce & tenue existit. Id quod contingit etiam in separatione aquæ dulcis à salis & amara per vas cereum ac tenue, per quod tenues dulcesque aquæ partes resudant, reliquæ, transiunt inæptæ, obærent.

Certum autem eiusmodi Mannam quam in Fraxini admodum copiosam provenire diximus, in Orni foliis nunquam vel colligi vel reperiri: imò nec in ramis aut surculis, nisi perquam rarissimè: & fortè quæ neutiquam in iis sit genita: Sed quæ ex caudice aut ramis ipsi proximis defluerit. Eam verò in caudicibus seu truncis, aut crassioribus ramis duntaxat colligunt. Causa autem esse potest, quod cum in faxis magis montosisque ac siccis locis proveniat Ornus, siccioris etiam naturæ, h. e. minus humidæ sit quam Fraxinus, quæ, ut dictum, locis humidioribus, concavisque, magis gaudet, vel Theoph. & Plin. auctoribus. Quapropter Ornus tantam in se non continet humiditatem superfluum, nec adeo dilutam ac tenuem ut ad folia usque exiguosque ramulos perveniat. Est item scabrosa arbor, ita ut faciliè priusquam ad folia usque aut surculos promaneat, in caudicis crassioribusque ramorum corticem absumatur. Quod vel ex eo probatur: quod qui eam colligunt, aiunt huius arboris Mannam perfectiorem esse, si manè & vespere legatur, quam meridie sub ardente Sole. Quia ex immodico Solis calore aridior sicciorque redditur, & propterea imperfectior. Contrà quam in Fraxini foliis fiat: in quibus non manè nec vespere, sed meridie, ac calidissimis diei horis, ut dictum, colligitur Manna. Manè enim humidior cum sit, colligi nequit.

Satis autem exigua est ea, quam in foliis reperiant, & veluti milium parva eius grana: ita ut faciliè conici possit ex eiusdem arboris ramis super

folia decidisse potius, quam in eisdem genitam esse: aut saltem propterea, quod magna ex parte ut collectores referunt, in Fraxinis Manna emanat ex ramis, & a postissimâ parte, quæ foliorum pediculi eisdem aune sunt, atque in eisdemmet pediculis & ramis coalescentem inveniunt. Poterit ob id, quæ in foliis reperitur per eandem pediculos ad folia effluxisse, cum tam minuta sit, ut vix semunciam vna alterave die ex foliis colligat.

Nec alienum à ratione cupiam videri debet, quod in Fraxini foliis & iuxta pediculos eorum reperitur, cum id eveniat propter Fraxini humiditatem superfluat, quæ non tantum per caudicem & ramos diffundi, spargi atque transmitti queat, sed & ad foliorum exortum atque ipsa adeo folia, per quorum poros transiit, & à Solis calore concretat. Aiunt etiâ minuta illa grana, quæ manè supra folia reperiant, eodè etiam die Sole superveniente, aucti maiorisque reddi, quæ postea vespere colligunt. Quod fieri haudquaquam posset, si ex aëre fuisset delapsa: nâ à Solis calore potius liquescentia ac ablumpta fuisset quam concreta & adhaerentia.

Quapropter valcant, qui Mannâ in Fraxinis & Orni solis repetitâ, aëream seu rodam, ac à celo delapsam esse contendunt. Dictum autem non abs re, foliis: Nam contingere potest, ut eadè arbores in quibusdam locis, in quibus aërea Manna decidit, reperiantur: & ita supra eandem etiam decidere poterit. At nō supra eas solas, & quotidie per multos dies, sed supra ceteras quoque oēs, ut & herbas, & frutices, & lapides eiusdè loci. At quæ in Fraxinis & Orni solum generatur & reperitur, non tantum spontè certis temporibus ex iis profluit, sed & incisione facta copiosius.

Verum non vnus est duntaxat eadè incisionis modus: nâ quidam factis nonnullis incisuris in toto caudice, sequenti demum die eâ colligunt. Quidam verò aliquot diebus ante eadè arbores incidunt, inferioribus tantum partibus, & deinde eadem collecta, quæ primò effluit, demum & aliam effluere sinunt, ac denuò colligunt. Alij verò, prætermissa omnino ea, quæ per primas effluit incisuras, post paucos dies aliis in locis superioribus, easdem arbores incidentes colligunt: quæ quidè præ cæteris dulcior, ac non parum suavior existit, purgata, ut aiunt, per primas incisiones arbore, h. e. excreto eo humore, qui impurius, & propterea amarior & crudior erat. Id verò in Orni potius quam Fraxinis nō abs re

machinati sunt: nâ Fraxini humidiores cum sint, ut dictum, spontè magis, nō tantum è caudicibus & ramis, verum etiâ è foliis eorūque pediculis, & qui iuxta eos sunt oculis, talem emittunt lachrymam. At Orni, ut quæ sicciores naturæ sint, h. e. minus quam Fraxini humidæ, corticisque duriores & scabriores, locisque saxosis, montosis ac siccis degant, tantam in se humiditatis copiam non continet: nec adeo dilutus & tenuis est eorū humor, ut ad ramos & folia eū spontè emittere valeant: sed in caudicem solum, & rarissimè in ramos. Quapropter ut copiosius effluat ex eis humor, eisdè vulnera iniiciunt: ita. n. & promptius effluit, & à Solis etiâ calore, nō parum arbores incisæ ad expulsiōem iuvantur, eundem scilicet humorem ad corticem trahente.

Validissimis itaque rationibus atque experientia probatū est, eā Mannâ quæ hoc tempore in Italia videtur, quæque etiâ prædecessores eorū videri fuisse per plures annos, ad alvū molliendā, nō esse eam, quæ eiusdè generis cætere existit, & de qua Arabes scripserunt, sed Fraxini ac Orni succū propriū atque coactum, quæ ex eisdè duntaxat in tegno Neapol. plerisque in locis, præsertim Calabriæ colligit, & per plures annos se collegisse fatentur, hunc colligendi modum à maioribus habentes.

Cur in Fraxini foliis potius quam Orni concreseat.

Incisionis modi.  
1.  
2.  
3.

Fraxini plus emittunt Mannam quam Orni: Cur?

Hæc de Mannæ arboreæ generatione, generationisque modo, quantâ potuimus diligentia ex Altomari doctissimis scriptis collecta approbat etiam doctrina insignis Medicus & Philosophus Goropius: qui in suo Niloscopio ita scribit: In regno Neapolitano, in collibus plurimis & clivis multum Ornus multa luxuriat, quæ vulnerata, Mannam nostram, quam Calabram vocamus, exsudat, quâ Mellis ærei & Mannæ verè loco, vti ferè solemus, eo quoddam huius incerta, illius certa copia, & arbores quotannis, ær non quotannis idem redat. Hinc tamen Altomari Goropii & nostro sanè iudicio probabili ac verisimili sese obiciunt Matth. Cæsalp. & alij quidam.

Contra-  
ria opinio  
Matth. &  
Cæsalp.

Foliorum  
Manna:

Sic enim Matth. insit. Mannæ alterum genus à Calabris desertur, plurimi penditur quæ stirpium frondibus incidens colligitur: proinde foliorum Marina cognominata, minutis granulis constans, translucida, gravis, Mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis atque suavis. Secundas partes sibi addiscit, quæ ramis insidet. Tercias vera, quæ lapidibus in solo inhaeret. Hæc granulis constat crassioribus, & calore longè minus sincero. Ex ea, quæ nocte peracta è cælo deciderat Consuetudine, quæ est Calabriæ civitas, mihi facta fuit copia super Fraxineis frondibus, quæ vulpiti perfectè cocti guttas prorsus referebat. Accepi ibi ab incolis, quoddam hæc manè legitur, priusquam Sol exortus admodum excalescat. Namque postea Sole liquefacta absorbtæque facillè evanescit. [Hoc planè negat Altomarus & ait, Fraxineam & Orneam Mannam solum à calore crescere & indurari.] Quapropter plerique (ut à nonnullis audiui) ubi in magna deciderit copia, summo mane arborum ramos præscindunt, & in opacis collocant, ubi concretam maiori commodo legunt. Non parum aberrat Altomarus, cum contendit Mannam quæ in Apulia & Calabria è Fraxineis legitur folijs, è cælo haudquaquam decidere sed ex ipsa planta exsulare. Explodenda autem omnino videtur sententia Monachorum, cum pro certo asserant, Sinito ardente Mannam non solum roris modo super arborum & herbarum folia repenni æræ & cæli clementia, sed etiam arboribus, Fraxino scilicet & Orno absque aliquo cæli rore, gummi modo, inciso earum cortice, in lachrymas concretæ. Siquidem ea Manna, quæ inciso harum arborum cortice collachrymare cœpit, nullus quidem plantæ liquor est, sed ipsa eadem Manna, quæ diebus superioribus easdem in arbores ab ære deciderat. Nam cum illis regionibus usu veniat, quæ præ cæteris prædictæ arbores eo mellifluo flore affatim abundeque madescant, sitq; cortex Solis ardore nimio sitiens ac rimosus, magnam liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo fit, ut postmodum exurent canicula, inciso eodem cortice idem liquor exiliat, & in grumos concrecat: qui tamen cum leves fungosque sunt ob arboris succi missionem, infeliciter operantur, nec alterius Mannæ viribus correspondent. Quoddam autem tantum Fraxino Orneoglossumque eveniat, cum melleus ille ros in universam omnes occupet plantas, in causa est harum arborum nobis occulta potestas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas. Quippe omnibus clarum est, apud Calabros & Apulos solum Fraxinum & congenerem Orneoglossum Mannam in se contrahere, retinere, densare ac cohibere: ex alijs verò arboribus eandem statim desfluere, & in subiectas herbas, petras, solumque diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso cortice, non sanè pri-

Altomarus  
not.

Monachi  
repreh.

Fraxinum  
& Ornum  
nullam  
Mannam  
exsulare.

mò, secundum naturam, sed ex accidenti desunt Manna. Verum optimi illi patres [Monachi] contenti (ni fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare neglexerunt. At incolæ qui ex maiore huius liquoris provenit plus anni referunt, rei naturam diligentius investigarunt. Monachorum sententia ad stipulam Altomari, cum ipse sibi persuadeat, communis usus Mannam, nihil solidi cælestisve liquoris continere, sed tantum [ex arbore esse:] quod etiam multis conatur ipse comprobare, cum tamen plura sint quæ non consentiunt, id ego examinandum sapientioribus relinquo. Hæc Matth. contra Monachos & Altomarus.

Ex arbore.

Cui ad stipulam videtur Cæsalp. sic scribens: Disquirendum utrum Manna, quantum sit inter genera mellis ærei, an prorsus succus Fraxini & Orni, ut contendere nuncur quidam ex recentioribus, & Mannam Arabum explodunt. At eo modo [quo illi de Fraxino & Orno] cavillari etiam de Quercu licebit, cuius folijs maximè insidet mel acreum. Si enim ros non magis super unam plantam quam aliam decidit, cur maxime hoc genus reperitur in Quercu? Quod si id tribuatur naturæ Quercus, ut liquorem illum cælestem conferret, alia autem plantæ magis & minus absument, cur eadem non liceat & Fraxinis & Orni assignare? Quam enim intus hauriant hunc rorem, totum autem non absument in nutrimentum, aut ob multitudinem, aut ob aliam causam, necesse est, ut reliquum tanquam excrementum expuant, alteratum tamen & magis addensatum, quam in Quercu, ob aliquam eius concoctionem, ob id non in folijs solum reperitur, ut in multis alijs arboribus, sed undique ex intimis corporis exit. In folijs autem Quercus maxime reperiti mellum liquorem dicemus, quia ea arbor minimè omnium bibat eius homorem: idcirco desunt mellea substantia ex iis, non multum addensata, & Sole adventante facillè evanescit, ut contingit substantiæ æræ: facillè in spiritum resolubili. In quibus autem paucissima, aut nulla reperitur huiusmodi concretio, cum tamen locus eo humore scateat, ut quibusdam Fraxinis & Orni contingere aint, absumentur avidius eiusmodi humor in earum nutrimentum, ideo nec ros liquidus permanet in folijs, nec expuitur addensatus. Neque illud omnino verum à frigore noctis addensari rorem in melleam substantiam, ut modò concrecat ad similitudinem pruinæ ob vehementiorem frigiditatem, modò in liquidiorem substantiam ad roris similitudinem à minori frigiditate. Non enim hæc corpora aquea tantum sunt, ut ros & pruina, sed terram habent æri mixtam, ut tradit Arist. 4. Meteor. c. 7. de melle. Nam & mel quod apes cōdunt in suis alveolis, ex huiusmodi rore cōstat: quodque super diversas plantas colligitur, non succus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem est cum rore generis, ut testatur Gal. 3. de Alim. fac. c. 39. non tamen omnino ros, simplex sicut aqua, sed ob æstivam caliditatem tertæ in halitum digestæ commixta, & incrassata magis & minus in melleam substantiam. Eger tamen halitus aqueus frigiditate noctis, ut conset, simplex quidem in rorem & pruina, commixtus autem in melleam substantiam, quæ non amplius à solo calido liquatur, sed ab humido, ut sales. Aliqua tamen ex parte à calido sicco liquari huiusmodi corpora, quatenus à frigore condensata sunt, non est absurdum, ut contingit Nitro, Alumini, Calcantho, Saccharo: In igne enim prius lique-



liquefcunt, deinde ficcantur: humido autem frigidio id eft, aqueo, omnia hæc corpora folvuntur, non calido, quale eft Oleum. Hæcenus Cæfalp.

Sed quæcum ipfe, tum Matth. protulit adverfus fententiam Monachorum & Altomari, minime nobis videntur avertere eius rationes, & experientia quamquam iisdem etiam Amatus fcribat.

Hæc, inquit Apollo [de faccharo fcribens adverfus Matth.] natura funt arcana, Philofophis ipsis incomperita: nec verifimile eft tantam meli rotis copiam intrudi poffe, quanta per tot dies exhaufitur, &c. Sed ipfe etiam Apollo, in re fibi incognita, uti patet, fluctuans, Monachos temetè carpit: mox ad naturæ arcana, ignorantium afylum confugit; Philofophis dicens incomperita, cuius tamen poftca causam & modum hariolari verius quàm ftudiofa inquisitione veftigare videtur.

Pena & Lob. tradunt, ramos magnos Laricis & Fraxini præcisos, atque in vinariam cellam quo æftatis tempore Manna colligi folitum eft afportatos, Mannam poftero die, quamquam non perinde nitidam olètare: quæ omnia, ut ipforum reliqua: nec non etiam ea quæ Pamphilus Herilacus de Manna ex Ornifraxino tradit, cum Altomari fententia optimè confentiunt. Conſiderentur etiam alia quæ antea ex iisdem tradita de generatione Mannæ, & de Elæomelite: quæ itidem omnia facere videntur pro Altomari.

Mirum autem Galeni temporibus neminem iftud, ac ne ipsum quidem Galenum tale quiddam obſervaffe, vitam quoque Romæ agentem. Nemo enim aſſerre audebit Mannam hæc id eſſe, quod à Gal. 7. ſimpl. facchar nominatur. Nam id quoque ut de Melle faccharo dicebat Dioſc. ex India & felici Arabia convehitur, ut Gal. inquit, & in calamis, ut aient, concreſcit, non in Fraxinis & Ornīs, ut à prædictis autoribus conſtante aſſeritur. Ideoque idem eſſe cum Altomari putamus Mel faccharum Dioſc. & facchar Gal. de quo plenius ſuo loco.

Nec quicquam etiam referre ait idem Altomarus, ſi Theopha. cæterique veteres autores, qui de plantis ſcripſerunt, inter æas arbores, è quibus humor emanat, coagulatur atque conſiſtit, non connumerarint: nam neque Oleam tàm domeſticam quàm ſilveſtrem, inquit, quæ ſpontè, & v. etiam ſimilem procreat lachrymam, ut diu à quibſdam obſervatum eſt meminertunt.

Cæterum ex his, qui Thuri Mannam cæleſtem hanc [ſic vocat Matth. hanc Fraxini & Ornī Mannam, cuius hæc ſunt verba] eſſe crederunt, Crinitus Florentinus quoque fuit in cuius cenſuram Manardus Ferrarienfis lib. 1. ſuarum epiſt. peculiarem epiſtolam conſcripſit. Veruntamen venia illi danda eſt, cum & Serapio, qui Mauritanis omnibus in ſimpl. medic. hiftoria præſtitit, Thuri Mannam cum cæleſti ineptè confundat.

Bræſſavolus, Apollo & alii quidem prædictorū autorum Mannam Calabriæſem triplex faciunt: primam & præſtantiffimam, vulgò Mannam de folio dictam. Quippe ruſſici folia aptant, & velti tegete extendunt: plantis quæliorum foliorum arbores, ut apicū colligatur, & parum ſupra aliam rem cadat. Eadem & frondea dicitur, quod ſtipitum frondibus infidens colligatur: atque oblongis conſtat granulis. tranſlucens, gravis, maſtiches in morem lenta primum, mox facile liqueſcens, alba & ſuavis. Secundas ſibi vendicat, quæ trunco, ligno & arborum ramis effluit ac in hæret. Ideo & ligni vel trunci Mannam, alii Man-

nam è corpore vocāt. Tertia cæteris deterior, in terram defluens aut petras, arenulis permixta, colore livente, minis ſincera. Hæc Manna terra dicitur. Eadem igitur res ſupra diverſa cadens, aut è diverſis promanans, varia nomina, diverſaque ſpecies (ſi modò verè differentia ſpecierum dici poſſit) vel varietates ſortitur.

Verū aliter Amatus de Calabriæ differentijs ſtatuit, dum putat eam ex ære defluam eſſe. Sic enim ait: Manna eſt ros qui præcipue cadit in Calabria, unum ſupra folia, quod perfectiſſimum eſt, vulgò dictum Manna de folio. Aliud ſupra ramos & caudices arborum, primò deterius, ſed craſſius & corpulentius. Tertium verò ſupra terram, cæteris deterius. Quæ verò ſuper lapides cadit, mea ſententia, inquit, cæteris generibus nobilior cenſenda eſt: dicitur verò Calabrenſis Manna hæc Maſtichina, quæ tanquam præcipua celebratur & in pretio hodiè habetur.

Altomarus amariorem dicit eam quæ incifis arboribus proſpiciet, Calabris Ideo Mannæ forſan dictam. Hæc ex Orno eſt.

Ita vides quanta ſit autorum varietas in Mannæ hiftoria & generatione. Nunc Calabrenſem Amatus Maſtichinam vocat, qualem plerique alii Orientalem dicunt: & nobiliorem æſtimat quæ ſupra petras cadit, quàm alii deterriam putant.

Pamph. Henl. Mannam ex frondibus facillimè liquari ait à Sole, idq; Manna ex corpore non cōgigere.

Adhuc aliter diſtinguit Cæſalp. ſic tradens Fraxinum & Ornā ſolas Mannam ferre teſtatur [Synvaticus] in Calabria, circa canis ortum, cuius eſt vſus in tota Italia ad alvum leniendam diſſolute iuſe, aut ſero, ponere duarum vnciarum aut trium: mitiſſimum, n. eſt medicamentum, ſolū tenues humores educens. Sant aut mica quædā candida, aut flaveſcentes, pingues, ſapore mellis. Eius differentia ſunt: Nam quædam minutionibus micis conſtat, quā Mannam foliorum vocat, quia ex folijs colligatur, quæ magis probatur: altera craſſioribus, quàm Mannam corporis appellant, quia ex ramis, tanquā ex corpore arboris habeant: & hæc aut ſpontè, aut vulnerato cortice: [hæc ſanè contrariantur opinioni Cæſalpini, qui negat Mannam ex arbore promanare, de qua re antè] Nā ex vulnere primò exit liquor turbidus, & naſeoſus cum quadam amaritudine: poſtea emanat purior, quamvis glebis grandioribus.

Probatur pinguis, & quadantenus tranſlucida, Maſtiches quàm ſimillima. Improbatur arida, & cinerei coloris. Item ſapor optimæ ſuavis cum dulcedine modicè linguam mordens, quæ n. morſu caret, euanida eſt, & quæ naſeoſa, eſt impura, aut adulterata, aut ſenæ infuſione, aut addito Scammonio.

Si deſit Syriaca Manna aut Calabrienfis, vtrèdum monet Lob. Brianſonenſi ab vnc. j. & ſad vnc. iij. Et aſſerit quofdā inſtitores, qui illinc veniebant, hodiè illic per paucam aut nullam inveniſſi, planè que conqueſtos deſiſſe: quod an verum de Calabria, viderint incolæ.

Matth. ait Mannā Italicam, præſertim Calabriæ pluribus annis incorruptam perdurare. Id negat Altomarus: & bonitatem eius perfectā non ſupra annum extendit. Henlacus cavet ne in compoſitionibus Arabum utamur Manna dicta ex corpore: & addit eiufmodi gūmis. nos falſò vti pro Manna. Lacuna Mannam ex Calabria tantæ bonitatis dicit, ut conſerti poſſit cum Orientali.

Garcias Mannam Calabrinam conſert cum ea quæ ex Perſiæ Becora vñbe aduehitur, magnis glebis, admixtis plerumque folijs.

trunci  
Manna, i  
3.  
Manna ter-  
ra.

Amati opi-  
nio de diffe-  
rentijs Ca-  
labricæ.

Maſtichina  
na.

Amarior  
Orni.

Cæſalp.  
opinio de  
iſdem.

Dofis mo-  
dosque ex-  
hibendo.

Cæſalp?  
me-  
turbidū:  
purior.

Deleſſim.

Adulter-  
rium.

Duratis.

Similis  
Perſicæ.

Et Acosta ei similem dicit adulterinam quandam in Ormuz, & tertiam Indicam, de qua & aliis Indicis mox. Idem etiam testatur vulgatiorem Mannam in Hispania esse Calabrinam, verum meliorem quam ex Oriente Venetias adfertur.

*Manna Halepi.*

Rauvolfi quoque Mannam quandam Halepi haberi scribit, similem Calabrinæ. De Manna tradentes consule etiam Costeum & quinquetanum, quorum neuter nunc nobis hæc commentantibus est ad manus.

*An omnis Manna Medicis liceat viti?*

Tandem ut ad vires transeamus, placet iucunda & vtilem Medicis hoc loco quaestione præmittere. Nam cum confitet, saltem ex probatissimorum autorum placitis duplicem esse Mannæ originem: alteram ex aëre seu rore: alteram ex Fraxino & Orno: harumque varias esse differentias: quæntur an Medicis indifferenter atque innoxie eisdem in vna speciebus, alteraque pro altera uti liceat: & num vna eiusdem speciei sit altera perfectior: & quæ imperfectior quodammodo earum est, nunquid omnino vitanda & exploranda?

Altomari diligentissimi de Manna scriptoris iudicio, *Aërea Manna*, ex rore genita, ab Arabibusque descripta, potissimum concreta, & quam Mesues commendat, ad eos usus quos ipse ac Serap. & Avic. probant, est vtilissima. Eius vires ante posuimus post generalem Mannæ historiam. At eius defectu, num *arbores* seu *Fraxinea* & *Calabrina* dicta liceat uti? Cùm, ut ostensum, ex Fraxino, & Orno quæ Fraxinus sylve lris est, profluat, utique earum vires quodammodo imitabitur. Nā mel roscidū aëreæ Mannæ cadens supra quas cadit, ut Gal. & Mes. volunt, quantum magis proprius earundem plantarum succus, easdem continet facultates, quæ ipsis arboribus propriæ sunt?

*Vires & temperam. Mannæ Calabræ.*

Cùm itaque *Manna Calabrica* Fraxinea, seu lachryma Fraxini, quam Mannā vocant, dulcis sit cū obsecuto quodam amaro: nec multo crasso lētoque humore plena, consequens est moderatè calidam esse, gratam & naturæ nostræ amicam. Et ob dictas facultates, ut discimus ex 4. simpl. vim habere concoquendi, laxandi & rarefaciendi, quemadmodum reliqua dulcia: nec non fundendi, laxigandi ac molliendi, ex 4. & 5. de simpl. Gal. Et ut summatim dicamus, cunctas etiam præstabit utilitates, quas Arabes *aërea Manna* tribuerunt, quatenus dulcis est, quævis non tantæ humiditatis sit particeps, neque adeo temperatè calida existat. Amaritudo .n. vix sensu perceptibilis, talis non est, quæ dulcedinis vim obfiscare aut impedire possit. Eius tamen ratione etiam magis abstergendi vim habebit, extenuabit, humores crassos incidet, ac infarctus liberabit. Quapropter & menses movebit, pituitam & pus ex pectore exterminabit, tantò efficacius quantum magis à dulcedine ad amarorem inclinabit. Quapropter non solum probandus fraxineæ, & Orni Mannæ usus, sed propter hunc vel maximè præ aliis deligenda. Sed quid opus multis rationibus, ubi sensus & experientia in aperto sunt? Nam rationes quarere earum rerum, quæ patent sensus, infirmitas quædam intellectus est, ut merito Arist. dixit in 8. phys. contra Zenonem omnia quiescere dicentem.

*Arist. dictum contra Zenonem.*

*Eandem purgat.*

Neque nā ipse solus, inquit idem Altomarus, sed oēs ante me & iuxta me in hac regione medici hac Mannā bono ac felici successu, citra ullam noxam eorum, qui sumserunt, vti sunt, præsertim ad alvum molliendam. Nam nec inquietudines & fastidia, neque tormina, colliquationem, superpurgationem aut eiusmodi malum

symptoma assumpta excitat, aut excitavit vlla, siue ex foliis, ramis aut caudice fuerit collecta. Omnino enim se prædictos usus omnes felicissimè expertum esse Deum immortalem testem advocat idem Altomarus, omnesque medicos posteror ad eius usum imitatur & hortatur. Ad ea verò quæ incisione prohietur, cauet abstinendum in ardentibus febribus, alvi fluoribus, dysenteris, aliisque calidioribus morbis, similisque naturæ corporibus: ac etiam ætate, regionibus, annique constitutionibus valde calidis: non tamen adeo, ut cætera pharmaca alvum solventia, quæ calidiora sunt, dictis temporibus, locis atque personis prohibendam censet. Eius tamen usum, quæ ex foliis & ramisque pediculis ac oculis profluit, quolibet anni tempore, quavis corporis constitutione ac morbo exhiberi tutius posse. Denique ubi *Arabum Manna* haberi nequeat, eā utendum suadet, quæ spontè ex dictis arboribus emanat: nam eisdem ferè præstare usus, quos Arabes suæ Mannæ tribuerunt, & longè plures, præsertim eam, quæ ex foliis & pediculis eorum colligitur: quod sincerior, dilutior ac tenuior sit cæteris, quippe magis concocta, idèoque dulcior: ac de foliorum viribus non nihil participet, quorum succus, uti suo loco dictum, serpentum ictibus valde opitulatur, Diof. & Plin. autoribus. Hancque non solum serpentum ictibus, sed & eadem ratione malignis pestilentibusque febribus auxiliari. Huic proximam esse, quæ ex ramis & caudice spontè profluit. Tertiam in bonitate esse eam, quæ non ex primis illatis cæsuris colligitur, videlicet quæ ex eisdem primò profluit, sed ex aliis vulneribus post aliquot dies factis. Nam quod primò effluit, impurum, inconfectum, ac excrementosum valde esse: & proinde puriorem, perfectiorem dulcioremque ex secundis cæsuris. Neque tamen penitus & illam respiciendum scribit quæ primò primis illis incisuris profluit. Nam & hanc quoque, licet amaritudinis cuiusdam sit particeps, dulcedinem tamen magis præ se ferre, quæ perpetuè in ea prævaleat: nec aliter differre à prioribus, nisi quod calidior sit, quapropter etiam valentius operetur, sibi que ita longa experientia confirmatum esse. Ac si noxa quedam ex eius usu, ut tormina, calores, &c. supervenerint, id medici culpa, minus rectè ac intempestivè ea ventis, aut morbis vel corporibus, quibus non competebat, exhibentis, factum esse: aut quod plus æquo deditur, vel Mannam aëream putant: aut certe quod pro hac ipsa aliam vitiosam aut adulteratam præbuerit, constanter asseverat.

Suadet tamen semper recentissimam, quantum fieri possit, deligendam, humidiorémque: vetustam & aridam omnino vitandam.

Quæ si ita se habeant, quis Mannæ Calabrinæ, quæ ex Fraxino & Orno est, usum deinceps ausit repudiare. Sed iam & cæteras Mannæ differentias pericquamur.

## MANNA ORIENTALIS MANNÆ

STICHINÆ.

**M**ANNÆ etiam ex partibus Orientalibus ad Græcos deferretur, & præsertim ex monte Libano. Venetis magna copia habetur. Brassavolus scribit ex Orientalibus & Meridionalibus



bus partibus & alterum genus Mannæ importari, sicut mel liquidum, præter illud albicans granulofum, hoc est, ut ille ait, Manna Arabum. Et addit: Nicol. Nicolucium à Mauro quodam huius liquidæ Mannæ pyxidem emisit, & ea mirros effectus fecisse.

Amatus quoque tradit Mannam Orientalem ex monte Libano & aliis locis Venetias illatam aliquando granulofam, aliquando liquidam, mel referentem. Primamque Arabes Mannam absolutè, secundam Tereniabin vocare.

Belion. priorem Mastichinam vocat, pellucidam, quæ esse ait, exiguo grano: atque hanc præcipuam agnoscere Venetos, granulatam dictam: Gallis Granatam: vulgò Mastichinam dici, quod Mastiche sit ad similes.

Orientali Mannam parvi fieri in Italia Monachi tradunt, quod non possit haberi ita recens, ut Calabriensis.

Matth. sanè scribit, eam quæ ex Alexandria Ægypti adfertur, Mastichinam dictam, uno duntaxat anno in suis viribus persistere. Alioqui eam præstantissimam dicit: alteram verò infirmam ac vilem, Bombycinam nuncupatam. Lacuna quoque Orientalem perfectissimam dicitur. Hanc eandem Lob. Mastichinam, Granatam & Syriacā vocat, pro qua substituit, ut ante dictum, Brianfonsensem.

Apollo quoque Orientalem primam & præstantissimam facit eam quæ Mastichina dicta, in quosdam quasi grandinis callos niveosque globulos densatam.

Fertur (inquit Cæsalp.) aliquando & ex Syria longè candidior Italica, Mastichina vocatur, quæ translucida: Mastiche similis, parvis granulis, efficiatior Italia. Bombycina autem minime translucida, crassioribus micis Gossippi. Putant hanc Saccharo adulteratam esse. Sed dentibus prehenderetur: Saccharum enim sub dentibus crepitat. Manna autem mollis est.

Venetis, notante Bellonio, aliter quàm Galli negotiatores distinguunt, in Mastichinam seu granulatam, & Bombycinam. Hæc ideo sic vocat, quod floccorum bombycis referat effigiem, quæ quidem vilioris est pretii quam illa, neque tantæ dulcedinis particeps: cuius etiam libram edas, alium tamen nunquam subducat, ideoque Mannam istam ex rore æthere venire, mellis modo, nemo dubitet.

Altomarus Bombycinam adulteratam putat. Sed hanc rem Venetorum doctissimos Medicos posteritatem docere par est.

#### SIRACOST ET MANNA XIRQUEST INDICA EX ARBORE QVEST.

Pro interpretatione vocabuli Siracost hæc referemus & contrahemus quæ Monachi copiose scribere in mss. supra compos. Diasiracost.

Siracost sive Xiracost sive Asiracost &c: idem est: secundum Simonem lanueslem, & nonnullos aliquos ex iunioribus, est quædam species Mannæ. Et in testimonium citant Avic. cap. de de manna: Bellun. in interpret. ait Siracost esse Mannam, quæ apud Italos in usu est. Pandectario Alsiracost, & Xiracost Arabicè, est Manna. At Siracost eidem est Manna vel succus fructuum. Avic. autem licet caput de Manna dicat, Mannam coagulari & exicari sicut gummi & sicut Tereniabin & Alsiracost, & mel de terra Cusuram &c: non tamen per hoc declarat nobis Siracost esse speciem Mannæ. Nam ad instituentem aliquam similitudinem [quod ille facit inter Mannam, gummi, Tereniabin, Alsiracost

& mel &c:] non semper est necesse adducere species eiusdem generis illius rei, de qua queritur similitudo ipsa. Non omnia verò illic posita, esse species Mannæ probatur: quia sicut gummi & mel non sunt species Mannæ, ita fieri potest, ut nec Siracost sit eiusdem species. Sira enim sive Xira Arabicè succum significat. Quoniam igitur, ut dicebamus, Pandectarius ait Siracost non tantum significare Mannam sed etiam succum fructuum, ideo fieri potest, ut sit succus alicuius fructus coagulatus ad Mannæ similitudinem, & non species Mannæ. Et quamvis Avic. de unoquoque prætorum loquutus sit in proprio cap. tamen proprium cap. de Siracost, neque sub hoc, neque sub alio quovis vocabulo reperitur in eius 2. can. qui est de simplicibus. At est apud eundem Caput de Tereniabin. Potest tamen esse, ut communis opinio est, Syriacost esse verè speciem Mannæ: quia in sequentem Tripheram Persicam, quæ in multis cum ista confusione concordat, ingrediuntur Manna, & Tamarindi & Cassiæ pulpa, & saccharum Violatum, & alia multa sicut & in istam. Christoph. de Honestis autem in suis notatis, post Hieræ infusiones ponit absolutè Siracost esse Mannæ speciem: additque eiusmodi Mannam non amplius in nostras partes importari. Igitur si Siracost est species Mannæ, potest hæc compositio vocari

Confectio Mannæ. Sed quia infra alia descriptio, cui titulus, Confectio de Manna: ad differentiā illius fortè vocant præsentem

Diasiracost, quasi declarantes particularem ipsius Mannæ speciem: ut est etiam alio loco Syrupus Altereniabin, quod idem significat quandam

Mannæ speciem. Igitur quando de Siracost non potest haberi melior certitudo, loco eius si ponitur Manna æthere sive arbores, nostro iudicio rectè fiet. Idque eò maxime, quia in exordio eius certi cognoscere descriptionis ait Mes. esse medicinam benedictam in febribus acutis &c: Et Manna similiter ab ipso autore inter medicinas benedictas connumeratur. Ergo si (ut diximus) ponitur Manna in ipsa compositione, non agitur contra auctoris intentionem. Ipsa autem Manna debet esse recens & perfecta: quia legitur ibi: Alsiracost boni & recentis &c.

Scribit Garcias: In India Manna primum generis conservatum, sapore savi mellis, Xirquest aut Xiracost vocari, id est, Lac ex arbore. Xirquest nuncupata: nam Xir lingua Persica lac sonare: inde nobis corrupto nomine Siracost Arbor nuncupari. Esse autem rorem quandam in eas arbores delabentem, aut gummi ex eis destillans.

Idem etiam confirmat Acoſta, nisi quod pro Xiracost, Xiracost habeat: & gummi eiusdem arboris dicit, Lectoremque ad Avic. relegat.

#### MANNA INDICA TIRIAMIA-BIN AUT TRYNGIBIM.

Manna in India alterum genus dictum Tiriamia bin aut Tryngibim, ut vertit Bellunenſis, in Carduis nasci ferunt, granis quàm Coriandrum maioribus: colore inter rufum & rubentem medio, quæ ex tribulis decutuntur. Vulgus plantæ fructum esse putavit, sed gummi aut resinam esse rescitum est.

Huius usus præfertur à Persis ei quæ utitur: quoniam quæ in usu est, pueris exhibere non audent, nisi 14. annum exceſſerint. Ego tamen ab eo tempore quo in India sum, illa uti non ſiti, & sine molestia purgare semper depre-

hendi. Hæc Garcias. Eademq; ferè & Acoſta habet.

Halepum, tradente Rauvolffo, copioſè adferunt Perſæ in utribus mannam ſub nomine *Trunſchibil* quæ colligitur ſupra fruticem ſpinolum *Agul* & *Alhagi*. Hæc Manna conſtat granis paullo maioribus Coriandri ſeminibus, formâ & ſapore admodum ſimilis noſtræ Mannæ Laricæ. Poſſet exiſtimari Iſraëliitarum manna, de qua Moſes ſcribit fuiſſe ſimilem ſemini Coriandri & colore Bdellii. Eam Mannam cadere in frutices ſpinofos teſtatur Setap. & Avic. cùm de Manna ſcribunt, quam vocant *Tereniabin* & *Trunſgibin*, & Cluſius in epit. Indicarum plantarum.

Ait autem Avic. eam mannam cadere in regione Coraſceni. At Rauvolff. potiſſ. in Perſia ſupra *Agul*. Nos *Agul* ſive *Alhagi* plantæ hiftoriam & iconem poſuimus lib. 10. cap. poſt Geriſtam ſpinolaſam, & alias ei ſimiles.

#### MANNA INDICA CALABRINA PERSIMILIS.

*Deſcriptio.* Manna in India; genus, inquit Garcias, magnis glebis advehitur, admixtis plerumque foliis. Calabrinæ perſimilis eſt, pluſiſque æſtimatur. Deſertur ex Bacora urbe Perſica admodum celebri. Eadem & Acoſta. Et Rauvolff. Halepi præter mannam *Trunſchibil* & aliam Calabrinæ ſimilem haberi notat.

#### MANNA INDICA MELLI CANDIDO SIMILIS.

Advehitur interdum Goam in utribus aliud genus Mannæ ex Ormuz emporio melli candido depurato perſimile. Sed facile corrumpitur in ea regione: propterea quod vitreis lagenis non aſſervatur. Garcias. Idem Acoſta, qui liquidam eſſe ait.

#### MANNÆ ADULTERINÆ.

*Deſcriptio.* Manna ex Oriente altera ſpecies inferna & vilis, quæ *Bombycina* nuncupatur quippe quæ nil aliud eſt, quàm aut evanida & ſenio exhausta *Maffichina*, aut ſaccharo aliſque impoſturi adulterata, notante Marth. Hanc ſolam ex Orientalibus vidiffe ſe ingenuè fateatur Altomarus, Venetiis tranſmiſſam, licet in cæteris inveſtigandis maximam adhibuerit diligentiam. Hanc verò ferro ac lateri ignito unâ cum Calabrinæ granis quibuſdam inieciſſe, tam eius quæ ex foliis, quàm quæ ex ramis & caudice colligitur: illam autem protinus ſolutam & liquefactam: hanc verò ariorem duriorẽque redditam. Soli quoque expoſitam *Bombycinam* non quidem ita repente ſed ſenſim liquefactam. Calabrinam verò duriorẽ redditam & albidiorẽ. Neque ſecus cenſendum putat de *Maffichina*, & de qualibet alia Manna è cælo cadente, quocunque in loco, ac quovis tempore, modò adulterata non ſit. Nam cùm humidior & recentior ſit quàm *bombacina*, conſentaneum eſſe ut citius ad Solem & ad ignem liqueſcat.

*Cæſalp.* hanc inter utràmque differentiam notat, quod *Maffichina* ſit tranſlucida ſimilis *Maffiches* parvis granulis: *Bombycina* verò minime, ſed ſimilis craſſioribus micis Goſſipij. Quod ſi ita eſt, *Bombycina* ſanè non erit vetus *Maffichina*. Vetuſtas enima quantitatem non auget. Illius parva granula: huius micæ craſſiores. De qua re certiora docebunt Veneti ac Neapolitani medici ac inſtitores.

Ait tamen Apollo mannam alteram Orientalem *Bombacinam* vocatam aut *Maffichinam* evanidam & ſenio exhaustam, multo ſaccharo, farina miliacea aut hordeacea, aliſque miſcellis vitiatam, vilem, deſteſtabilem, nulliusque momenti, floccorum lanæ & Goſſipij effigiem candore præ ſe ferentem. Quod ſi ſaccharo adulterata ſit, dentibus eniſm ſub dentibus crepitat. Manna autem mollis eſt.

Teſtatur Altomarus iure ac prudenter à iuſtiſſimo ſuo præſide Neapolitano atque conſulibus de quadam manna ſancitum eſſe, ut igæ creparet. Neque in eo ſuam ſententiam ſequuntur, ſed pharmacopolarum & quorundam medicorum teſtificationem id decreviſſe, qui eam mannam aiebant eſſe rem peſſimam, & humano generi omnino adverſiſſimam: quæ tamen verè an falſa ſint eorum conſcientiis ſe relinquere ſcribit: in eo ipſo ſuam prodens oſcitantiam, cùm prius dixerit iure ac prudenter crematam. Mannæ genus valenter purgans & magis ſolutivum reliquis Mannæ generibus medicus quidam Brachmanes in civitate Cochinchinæ in pretio & familiari uſu habuit, ut reſert a Coſta, ex doctiſſ. ab Orta: Factitium tamen erat & ſic parabatur. Amylum candidum & puriſſimum, Mannam cuiuſcunque generis, ſed præſertim quæ Calabrinam æmulatur, Scamoneam & ſeminiſ genus Viſa dictum, quod ex Bengala advehitur, quodque Lathyridis grano ſimile eſt (inieto interdum polline radices cuiuſdam candidæ lacticinæ, cui nomen Dante cum ſaccharo, pauxillaque aliqua odorata aqua permixcebat, ſolique exponebat.

Mannam autem adulterari nihil mirum, quandoquidem & lapides Bezahares tanto artificio in Ormuz & in urbe Cochinchinæ provincie malabar, ubi rex degit, adulterantur: ut legitimi appareant, falſantque etiam maxime expertoſ in iis dignoſcendis prima ſuperficie, qui niſi fragantur, vix à legitimis diſcerni queant.

Ita non inutiliter monet Cordus adulteratam & minime probam eſſe mannam, quæ grumis ſuis foliorum ſenæ partes aliquas complectitur, cùm nulla ad nos ex Arabia & Egypto Manna adferatur, quemadmodum Sena.

Et Pamphilus Herilacus tradit Mannam noſtram Italiam conſuetam, ut plurimum non eſſe rorem de cælo cadentem, ſed vel concretam ex ſenæ infuſione vel aliis, & ſaccharo, vel gummi hinc inde collecto.

#### MANNARVM AQUIVOCA.

Manna graminæ longe diverſa eſt à Manna roſis, arboræa, acetiam *Thuris*, ut ſpecialius traditur inter frumenta. Eſt & Manna *Thuris* vocata extra harum Mannarum genus: de qua alibi. Manardo ſaccharum antiquorum ſub roſcodo, ſeu (quod idem eſt) ætheo melle, tanquam genere continetur. In hoc tamen diſſert Manna à ſaccharo: quod Manna ſuper alias plantas & petras: ſaccharum verò ſuper humidines in India & felici Arabia proveniat. Sed Manardus Alexandri Aphrodiſei opinione deceptus eſt, confundentis ſaccharum cum Manna, ut notat Cordus. Nos autem Manardi opinionem particulatim reſutabimus in hiftoria ſacchari.

Nunc reliquas arborum ſylveſtres perſequamur.



## DE EVONYMO VETERVM.

## CAP. XIV.

**E**VONYMVS dicta arbor, autore Theoph. nascitur cum alibi, tum in Lesbo insula, in Ordymno monte. [ἐν τῷ ὄρει τῷ Ὀρδύμνῳ: non ut vulg. habent: ἐν τῷ ὄρει τῷ Ὀρδύμνῳ γὰρ ὄρεος. Nam & Dal. ita legit, & Confl. vocem ὄρεος ē margine irreplisse suspicatur.] Est autem magnitudine Punice, & folio eiusdem sed maiore quā Chamaedaphnes. Circa Septembrem germinare incipit. Floret verē: floris color, qualis in Leucoio, odore gravi, odorem cruciatu ahmanti, ac in tābum putrescentis [ἀσπρῶν, ἀσπρῶν] referente. Fructum cum suo putamine aut conceputulo Sefami siliquis non abimili, intus foliolo, sed in quatuor versus distincto. Esi lethalis est arbor, tā fructu quā foliis pedori & ovium gregibus, sed maxime capris, nisi forte purgentur. Purgantur autem alvi profluviu. [ἀνοχῶ: Dal. legit ἀνοχῶ, inedia ubique abstinentia. Quid sit ἀνοχῶ, haud facile invenias, quāquam aūqui vomitionem] & per supernam purgationem vertant, ἀπὸ τοῦ ἁέρος. Hæc Plin. bona ex parte ita transcripsit. Nec aspiciat in Lesbo insula arbor, quæ vocatur Evonymus, non abimilis Punice arbori, inter eam & Laurum folij magnitudinē, figura verō & molliora Punice, flore candidiore, itaq; pestem denuntians [sic ineptē ὄρεος transfert.] Fert siliquas Sefami similes, intus granum quadrangula figura, lethale animalibus, nec non & in folio eadem vis. Succurrit aliquando præceptis alvi exinanitio.

Dod. de nostra Evonymo dicit, eius foliorum esse capras interire, nisi superhæ & infernè purgentur. An hoc observatione habeat: an ex voce ἀνοχῶ, & Plinij lectione extorsit, ipse videt.

## EVONYMVS MULTIS: ALIIS

## TETRAGONIA:

**R**AMOSA est arbutula, Evonymus multis putata, aut certe frutex arboreus, altitudinis quatuor aut quinque cubitorum, cuius stolonē lato virore perfusi, & nuper nati ramuli, propter corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares apparent, non secus ac si dolabrā ars perpolvisset, ipso alioqui ligno interno tereti, albo aut flavescente. Cortex viret

Rami crebro intervallo, in oppositos ramulos dividuntur. Folia oblonga acuta, crenata, ē Periclymeni generis Chamæcerasi dicta foliis similia & equalia, paulo post veris initium flores profert pallidos aut herbaceo quodammodo colore cōstantes, ex quatuor foliolis congestos, quibus totidem alternatim posita calyculi foliola subii-

ciuntur, pari numero apicibus luteis umbilicū curvofum viridatē cum filo concolore occupantibus. Singulis stoculis singuli succedūt fructus, seu singula siliquæ quadrangulæ rubentes, aut puniceæ, [aliquando albæ, notante C. Bauh.] totidem distinctis loculis semina parva solida continent, cuticula crocea intacta, medulla alba, figura femini cannabino similia, hoc est, ex rotundo oblonga, sed maiora, sapore amaro, cum obscura quadam dulcedine nauseabundo. Ipsa etiam arbutula tota gravem & incundum habet odorem Materies eius sic satis solida, fissilis tamen & æqualis est: ea, cum adhuc succo turget, cæla, diluto croceo pallore etiam Buxum provocat.

Hanc expressē δαρυίαν Theophr. faciunt Dod. Rob. Confl. Pena, Lob. Matth. Anguil. Thalius. Cæsalp. nihil certi statuit: suspicatur tamen hanc ipsam esse Evonymum Theophrast. Ruell. dubitat. Curtius Evonymum Plinij vocat: At Evonymus Plin. & Theophr. eadem est planta.

Evonymos, i. boni nominis, per ἀνίστημι: unde quædam exemplaria Plin. habent Anonymos, uti notat C. Bauh. At Cæsalp. suspicatur Plinium ex Theophr. depravatē Anonymon legere. Evonymo & Anonymon vocat Cordus. Evonymum sanē Theophr. esse idēd voluit plerique: quod multat notæ eius historiæ respondent.

Hist. verō Lugd. quam Dalech. primò incepisse constat, Evonymum falsè creditam aī ab omnib. ferē Herbariis. Idem alibi: Herbarij, inquit, quam Matth. Evonymum esse putat; Evonymum esse negant, sed Tetragoniam Theophr. esse volunt. Gaza Quadratoriam interpretatur. Sic dictam hæcenset Dal. quod rami ob linearum quatuor rufarum setarum, docti modo exantium, recta per viridē corticem porrectarum, discursum, quadranguli appareant, quod huic arbori peculiare est: & quod in fructu quadrangula siliqua sit.

Evonymus Græcorum inquit Clus. Evonymus Latinorum cepletur potiori doctorum virorum parti, tamen quidam aliter lentiant, & tetragoniam, cuius solum nomen apud Theophr. inter serò germinantes reperitur, esse velint.


Nos sanē hanc Evonymum pro certo non dūm asserere audemus: tantisper tamē ita appellare lubet, dum apud nomen reperitur.

Quod si verò vulgaris hæc nostrā Evonymus est Tetragonia Theophr. ut volebat Dalech. (quod ut non negamus, ita non temerē in tanta eius brevitate asserere ausimus) & Evonymus etiam eiusdē sit eadem, ut ex diversorum Herbariorum sententia colligi potest, inconsideratē sanē Theophrastus eandem plantam diversis nominibus tradidisset.

Tragus ζορία & Carpinum, alii lugalem dicunt. Sed fallitur Tragus, quod facile animadvertet, qui descriptionem diligenter perpenderit: quam eundem eius errorem, more suo Lonic. & Frischlinus in suo nomencl. sequantur. Eiusdem etiam Tragi opinionem meritò reiciunt Dodon. Matth. Hist. Lugd. & doctiores plerique.

Petro Crescentio, Fusarius nostro & aliorum iudicio dicitur. Fusaria vel Fusarium ramus, teste Ruel. Fusaria & Fusago Herbar. Curtius quibusdā regionibus Fusariam dici notat. Si quis cum Silio Italico conferat, facile coniciat esse, inquit Match. At in post. com. Categoricè asserit Hetruscis Silio dici, aliis Fusario.

Germ. Spindelbaum, id est, Fusaria: & Fanz södlin, id est, Galli testiculū: Spilbaum Cordo: lingua Silensis Tzwerckholz, & Psaffenröglin: In Thian Alsatiæ nobis Wefschelholz appellatam inter



notata invenimus. Apud Lonie. per Leadegrits-  
zianum annotatum Helvetice dici *Schumpffen-  
schlegelin* & ex ea fieri *Regerwadel* & *Wiemä-  
del*, id est, *Flahella*. Aliis *Eyerbüschelen*. *Schim-  
pfenschlegelin* pols etiam *Gelsa* vocat. Gallic. *Du  
Fusaire*, *Fusin*, *Bonner de prestre*, *Bou à sainte des Lor-  
doires*. Montbelg. *Eufilan* & *du Fusin*. Belg. *Papen-  
hout*. Ital. *Fusano*, *Fusaro*, *Silio*. Angl. *Spindelstree*  
Yngar. *Rekeragosa*, id est, à capitis rosa arbor di-  
citur. Quæ verò *Lonicerus* nomina gallica, græ-  
ca, & latina, Evonymo adscribit tam conveniunt,  
quàm gnarus harum linguarum ille fuit. Ea au-  
tem *Junis*, *Carpier*, *Carmes*, *Sylvia*, *Inghin*, *Carpinus*, te-  
tia species *Aceris*. Siliquæ vulgò *Scrota sacerdo-  
tum*. Ruell. *Malimus* *Pileos sacerdotum* vocare.

Scrota sa-  
cerdotum.

Species  
quatuor.

(Forrè leg.  
Theoph.)

Locus.

Tempus.

Vires & u-  
sus.

Contra  
Matth.

Purgans  
& Vomito-  
rium.

Furfur.  
Pediculi.

Capillorum  
fucus.  
Ensi.

Gefnerus duas eius species notat: 1. Evony-  
mum quæ passim in sepibus circa Tigurum. Et  
aliam propè Genevam nasci, ad Dioscorid.  
descriptionem accedentem, *Bellonium* sibi re-  
tulisse ait. An fortè ea sit varietas, quæ fructum  
exalbidum fert? Sed & latifolia observata, & alia  
flore phœniceo, de quibus mox.

Porro hæc, si Lob. credimus, nulli regioni ca-  
lidæ aut frigidiæ iuxta sepes & margines deest. In  
Galliæ montibus & vivis interdum sepibus na-  
scitur, Ruell. Inter spinosas stirpes iuxta vias ple-  
runq; reperitur, Trag. In Italiæ sepibus, dumetis  
& sylvis, Matth. In sylvis tam planis quàm editis,  
Cord. Nascitur & in Angliæ, maxime inter  
*Evare* & *Parthenaye*. In Altiæ, Helvetiæ,  
Ducatus V. Virtemb. & Burgundiæ sepibus, etiàm  
que in Allobrogibus, & in Italia Longobardica  
passim observavimus. Colitur etiam in horto  
Montb. transplata nostra cura.

Montspelij Aprili ut & Patavij florentem vidi-  
mus. In frigidioribus locis ut Germania, Maio flo-  
ret. Autumno appetente, siliquæ quadrangulæ  
purpureo tinguntur colore, donec penitus rube-  
scent: postea sua sponte decussatim quadriparti-  
te rumpuntur, ac hiantes ita pendent, in hyemem  
usque croceas bacculas vel semina ostentantes  
non iniucundo aspectu.

Cæterum inter recentiores non convenit, an  
hæc nostra Evonymus, quod de sua Theophrast.  
prædicat, pecori sit noxia. Id asserit Matth. & se  
hoc scire ait. Et Ruell. Hanc, inquit, neque pecus  
neque capra novellorum etiam germinum avida  
proflus attingit. At Clus. Vulgarem hanc Evony-  
mum scribit à capris maxime appeti, easque eius  
foliis avidè sine noxa vesci, quod se in Pannonia  
observasse testatur: ac ob id Vngaris *Recherah-  
sa*, id est, à capris rosam dici, licet id Theoph. opi-  
nioni repugnet.

Et sane nos Clusio potius credimus, quamvis  
Schuvenckf. audacter pronuntiet, fructus oves  
enecare. Veritatem prima quaque occasione di-  
scemus. Fertur fructus homini exhibitos per in-  
ferna ac per superna purgationem moliri, si terni  
aut quaterni dentur vorandi. Emollunt etiam &  
resolvunt exterius apposti. Idem fructus in lixi-  
vio cocti capillos flavo colore tingere, furfures  
abstergere, lendes & pediculos necare tradun-  
tur. Italiæ mulieres ex eodem unguentum pa-  
rant, quo ad pulchros & flavos reddendos capil-  
los utuntur.

Tornarij ex ligno varia vasa & instrumenta de-  
tornant. Ex eadem & fusos muliebri netu cele-  
bres apud Germanos conficiuntur, æquè ac apud  
Gallos. In Helvetia pulchra ex bacculis minutim  
ac tenuitatem concisis parantur muscaria vel lar-  
daria [ sic vocat Had. Iunius. ] quibus culinæ  
transgendi lardo caribus præ acubus com-

modè ac frequenter utuntur.

Triplicem proditum est parati ex huius fructu  
colorem. Flavum, viridem, & fulvum. Flavum  
conficiunt ita. Fructum legunt post festum D.  
Io. Baptistæ cum adhuc viridis est, eumque cum  
tantillo Aluminis parum bullire sinunt.

# EVONYMVS LATIFOLIA.



EVONYMVS Descrip

Latifolia vir-  
gas habet cæbi-  
les, virides, fractu  
contumaces, quas ma-  
gna ambiunt fo-  
lia, bina semper  
ex adverso na-  
scentia, leviter  
per oras serrata,  
Evonymi vulga-  
ris foliis formâ  
haud abfimilia,  
sed longè an-  
tiora, Citriæ Ma-  
li foliis magnitu-  
dine non cedentia,  
minùs tamen  
longa, viridia,  
gustu ingrato &  
amaro. Radix

digitalis crassitudinis summa tellure in bicubita-  
leg longitudinem excutrit, multisque flavescenti-  
bus fibris donata est, summo capite, interdum  
etiàm è media sui parte virgas singulis annis pro-  
ferens, quas hyeme corrumpi & interire existi-  
mabamus, cum non nisi novellas virgas Maio  
mense deprehendissemus: postea tamen compe-  
ri eas virgas hyeme non interire, sed exiguum  
admodum incrementum capessere, folia sub fi-  
nem autumnii cum reliquis eius generis abiicien-  
tes, & oblongam gemmam extrema cuspidè  
(spem proximæ novo Vere germinationis) pro-  
ferentes. Inter infima folia oblongos tenues  
que pediculos profert, è quibus aliquot depen-  
dent flosculi, quatuor albicantibus & ad carnem  
quodammodo colorem tendentibus foliolis præ-  
diti, forma vulgaris Evonymi floribus perlimi-  
les. Clus.

Idem in post. hist. addit: Floribus successit  
fructus, ut in vulgari quadrangulus, interdum  
etiàm quinque angulis constans, maior tamen  
& quasi alatus, maturitate dehiscens, & alba gra-  
na aurea pulpa inclusa nonnunquam Augusto,  
sed potissimum Septembri mense continens.  
Evonymus Pannonicus prior seu latifolius etiam E-  
vonymus latifolius, Breis Spindelbaum.

Maio mense 1579. novellas virgas deprehen-  
dimus in sylva illa, quæ ex Greben III. D. Baltha-  
sæ de Bathyan arce, descensus est versus V. V. V. ar-  
dinum in ea Pannoniæ parte, quæ olim Interam-  
nis appellabatur, nunc autem Slavoniæ nomen  
obtinuit, Germani Windischland vocant, ultra  
Dravum flumen, quo solum loco observavimus.  
Dnas postea indidem mecum attuli, quas adhuc  
alut in cultissimo suo horto C. V. D. Ioh. Aichol-  
zius Vienneſis Medicus, notante eodem Clusio.  
Camer. in suo horto Norinbergæ coluit. Item  
Hortus Lusaticus. Chariff. frater C. Bauh: ramum  
attulit nobis collectum in horto D. Trevisani  
cum floribus viridibus, Evonymi latifolii corrupti  
nominis



nomine. Genes etiam Cherleus collegit in  
horto Patavino, nobisque communicavit.

## EVONYMUS FLORE PHOE-

NICEO.

Scriptio



**A**RBUSCV-  
LA est aut  
frutex homine  
altior, cuius cau-  
dex & rami tu-  
berculis asperi, ac  
veluti punctis  
notati: rami  
sunt pulverulen-  
ti. Folia ferrat-  
a, Pruno sylv. simi-  
lia: folioli ali-  
quot simul ex  
longis petiolis,  
quadrifolij, simi-  
les Evonymo  
vulgari vel Epi-  
medio: quorum  
dum, phoeniceo  
coloris. Clus-  
sulis sic describit:  
Alurgit bicubi-

telibus aut maioribus ramis, digitati vel etiam  
pollicari crassitie, lentis & obsequiosis, denso  
corticis obductis, vixit primum, deinde multis  
nigricantibus tuberculis aspero, qui in summo di-  
viduntur in plures ramulos ordine & serie qua-  
dam inter se oppositis, Myrti latifolia paribus,  
sed tenerioribus, leviterque in ambitu crenati:  
gustu primum exsiccat, deinde amarissimo &  
calido: ex quorum sumis in oblongis gracilibus  
que pedunculis folioli unus, bini, aut ad sum-  
mum terni dependent splendentes, & purpura-  
scentes, quatuor foliolis constantes, umbilico  
quadrato, & staminibus luteis quatuor angulos  
occupantibus: Cotini vulgo crediti flori haud  
multum forma abhinciles, licet maiores. Fructus  
succedit in siliquis quadrangulis, alterius Evony-  
mi similibus, spongiosis, aurei coloris, sed debi-  
lescentibus tenui filo propendens, in quo grana  
non crebra, uti in alio, sed nigra, Fraxinella gta-  
norum amula & splendentia, bina interdum &  
terna, eodem loculo & pulpa comprehensa.

Evonymus alter eiusdem Clus. Evonymus Pannoni-  
cus, Vngerisch Spindelbaum Taber.

Hanc nobis insignis vir D.D. Schvartzius Me-  
dicus Illustr. C. VV. Vitemb. & praefectus horti Me-  
dici Illustriss. Celsi Sturgardiani nobis ostendit  
Anno 1595. Maij 25. prius non visam, quae in pul-  
chellam arbutulam excreverat: ex iconis imagi-  
natione, quam apud Clus. videramus, statim de-  
prehendimus esse Evonymi hanc speciem raram.  
Copiose nascitur, teste Clus. in sylvis utriusque  
Pannoniae montibus: sed qui Alpes attingunt,  
eandem alere desinunt. Invenitur & in Moravia:  
nusquam vero abundantius, quam in sylva arcis  
Greitzenstein, Illustriss. Comitibus Nicolai de Sal-  
mis vicina, secundo a Vienna milliari, ad levam  
Danubij ripam. Floret Maio: Fructus Augus-  
to plerumque maturescit, maturius quam vul-  
garis & latifolia. Camer. se etiam in suo hor-  
to Norinberga coluisse scribit. Porro Dalech.  
suam particularem Evonymum exhibuit, de qua  
nos sub Nerio Alpino sive Chamaezorio: Tra-

duat Advers. Quosdam apprimè doctos Cha-  
maezepilum sibi persuasisse, alios Evonymum  
Alpinum fecisse arbutulam alpinam; folio Mali, Cotiniae.  
Sec. Nos existimamus eos intelligere Cotiniae-  
strum, de quo alibi.

## SYRINGA FLORE ALBO.

CAP. XV.



**Q**VVM Sy. Descrip-  
tione alba  
vulgò dicta sit  
fructu inaequali,  
visum est eam  
hoc loco pone-  
re. Ea infirmis  
ramis adolescit  
fruticosa admo-  
dum, fungosa  
medulla inter-  
tis. Folia per  
coniugia exe-  
unt tanquam è  
geniculis, Sta-  
phylo dendri, le-  
vius in ambitu  
crenata, hirsutae  
modica praedita,  
sapore subdulci  
& acris. Flores in  
extremis furcu-  
lorum multi simul iuncti, odorati, candidi, dul-  
ces, Arantiorum, quaternis foliis constantes, api-  
cibus in medio luteis.

Hanc Guilandinus Philadelphum florem A-  
pollodori apud Athenarum dipnosoph. lib. 4. cap. 12.  
dicebat, uti nobis retulit D. Casp. Bauh. Quae sa-  
na opinio nobis non displicet.

Verba Athenarum haec sunt: Apoll. 4. Rerum Par-  
thicarum scribit florem Philadelphum vocatum  
nasci in Parthia regione de quo haec tradit. Myrti  
varia genera, Milax, [Smilax] vocatusque Phi-  
ladelphus, qui flos naturae aptum nomen acce-  
pit, quia ramos illi per intervalla esse accidit sua  
sponte, complexionem ubi nascuntur animato-  
rum, veluti ex una eademque radice operantur:  
reliquum verò discurrunt, ac vivas plantas gi-  
gnunt, [cum ex intercapedine sponte rami col-  
verint, animato complexu cohaerescunt] & in  
unitatem iunguntur, deinde procurentes vivos  
furculos pariunt] Hinc effectum ut domesticos  
Philadelphos in custodiam converterint: nam te-  
neriores subtilioresque ramos adimentes, ac in  
retis more componentes in circulum plantae so-  
lent circa hortos: qui ita coniuncti securitatem  
parant, difficilemque aditum operantur ubi fue-  
rint positi.

At Rob. Const. iudicio Ostrya, Hetrucorum  
est Syringa arbor appellata, quam ait videri in  
horto Ducis Florentiae cum iis notis, quas assi-  
gnat Theophrast. nec deesse illam fructus insi-  
gnem potam, quae Hordei grano similis. Florem  
(quod ipse tacuit) candidum & suaviter olen-  
tem. De eadem & Plin. lib. 13. cap. 21. Inter infelices  
arbores, quam & Ostryam vocari tradit. Hinc  
Hist. Lugd. Quae vulgò Syringa, multi, inquit, est.  
Ostrya Theophr. esse volunt. At hac opinio  
Camerario non placet: certè neque nobis. Ne-  
scimus verò quo errore in eadem Hist. Lugd. post  
Syringae rubrae descriptionem indistincte iterum  
errore.

Synonyma

Locus.

Tempus.  
Satio.  
Pisus.

albæ descriptio posita sit nulla eius nominis sâda mentione.

*Syringa vulgaris, Syringa flore albo Clus. Syringa Italica Lob. Syringa alba Siringbaum, Tab. Syringa vulg.* Cefalp. & Hist. Lug. Burgundi ut aiunt, *Ispe* vocant, præsertim Vesuntij, ubi aliquot in hortis egregie cultam vidimus, undèque accersitam in hortum Montheig. transplantavimus. Habetur etiam in horto Sutzgardiano. Et in Italiae hortis multis Patavij, Bononiæ, Ferraræ, aliisque observavimus. Floret Aprili & Maio.

Facile furculus propagatur. Hactenus nihil nobis de eius usu innotuit. Possêt tamen ex floribus aqua odorata destillari. Folia quia subdulcia & acria sunt, eas habebunt vires, quas Galen, istis qualitatibus assignat, quem consulas licet.

### SYRINGA, ALBÆ SIMILIS CAPITULO, OCTO STRIIS NOTATA.

#### CAP. XVI.

Descriptio

**A**RBORIS-NE, an fruticis (inquit Clus. Exot. l. 2. c. 25.) ramulus, quemve florem tulisset, ex sicco difficile erat iudicare: aliquam tamen affinitatem habere videbatur cum illis ramulis, qui in coronario frutice, sive Syringa à vulgo Herbatiortum appellata, odoratos albos flores, racemi instar compositos, quinos aut septenos ferente, nam eiusmodi ferè capitula habebat, octo exilibus striis notata, quæ in binas partes restelli avicula in modum dividebantur, contra quàm in coronario frutice, cuius capitula in plures partes divisa: nullum autem semen continebant, sed inania erant.

### SYRINGA FLORE COERVLEO SIVE LILAC.

#### CAP. XVII.

Descriptio

Radix.

Cortex duplex.

Lignum.

Gemma.



**C**OMMUNE nomen & fructus inutilis faciunt ut Syringam coeruleam hic collocemus. Arboris magnitudinem acquirit, plerumque tamen & fruticosa: radice multum reptante & pululante, seque plurimum multiplicante, stolonibus robustis: cortice exteriori in cinereo virescente detracto liberum ostentans viridem, sub quo lignum solidum,

firmum. In extremitate ramulorum sunt crassæ & turgentes gemmæ. Folia bina ad versa, contrariòq; ortu serie quadà cruciformi disposita, Asclepiadis foliis quodammodo similia, sed latiora, vel Apocyni rotundioris aut Populi nigre, subrotunda in acumen tamen desinentia, mollia primum cum floret, postea duriora & firmiora, utraque parte

glabra, pediculis uncialibus aut amplioribus apertis, subamara & nonnihil acra. Flores ex privato furculo imbricato foliorum stipatu obvallato suaveolentes oriuntur in lubs formam dispositi, numerosi, sine foliis: quorum singuli ad flores Laureolæ folio deciduo accidere videntur, oblongi, rubentes, aut ex rubore cœrulei, quinque partiti, quatuor apicibus croceis altè reconditis fasci. Subsequuntur veluti siliquæ rubentes compressæ, vix unguem longæ, ex brevibus pediculis, quæ mature in duas partes separantur & pulchrè hiant, in quarum interstitiis secundum longitudinem porrectis latent semina longa, angusta, foliacea, compressa, tenuia.

Hanc plantam, inquit Matth. Constanti inopoli secum attulit Clvir Augerius de Busbecke, qui continuis septem annis Cæsaris Ferdinandi primi apud Solimanum Turcarum Imperatorem Orationem egit, sub hoc nomine *Lilac*. Eam quàm inspersissimè, & fructus eius agnoscerem Pistaciorum faciem perquam bellè referre, illic in suspitionem veni, an hæc fortasse *Glans unguentaria* dici posset. Quapropter, ut aliorum quoque sit iudicium, eam hic excudi volumus. Vivam plantam videre non licuit, sed affabrè & diligentissimè piceam. Hæc Matthiol. qui nimis audacter ex pictura suæ plantæ pronuntiavit. Necessè est sanè fructus non benè fuisse pictos, quippe qui nulla ratione Pistacia referant: quod si ille observasset, nullam profe&to occasionem reliquam habuisset suspicandi esse Glandem unguentariam. Melius depinxere Lob. & Dod.

Glandem unguentariam esse non posse statuunt & Clus. & Pena & Lob. & Hist. Lugd. & ob id Matthiolum taxarunt: Et Tab. monet, ne utique *Ben* esse existimandam.

Idem Matth. scribit Patavio huius plantæ recentissimum ramusculum, floribus copiosissimis referum, & alterum deinde cum fructibus ad se misisse Cortusium, literisque sibi significasse, hanc se credere esse plantam, quæ Theophr. l. 4. c. 10. hist. *Ostryx* appellatur. Hanc ex Aphrica, ubi frequentissima proveniat, sibi missam fuisse, ubi vernaculo idiomate *Sringa* nuncupetur. Quinetiam se plures in suo horto huiusce arboris alere plantas, ob floram suaveolentiam. Hæc ex scripto Cortusii.

Addit idem Matth. Vnguentarij ac Sepalsarij Mauritanorum nomina secuti eam *Ben* appellant. Forma hæc Pistacia maximè refert, albo cortice triquetro, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui, &c. Sed nescit quid misset Matth. Nam si huius tamum cum fructibus à Cortusio accepit, mirum quâ fiducia etiamnum Glandem Vnguentariam credere sit ausus, nisi fortè ipsam Glandem unguentariam cognitam non habuerit. Apud Theophr. *Ostryx* nulla: sed *Ostryx* sive *Ostrya*, quam ne utique esse censemus. Consule caput præcedens. Sed cum *Ostryx* dicat Theophr. habere fructum pusillum, oblongum, Hordeo similem, colore flavum, &c. mirum rursus, qua osecitantia Matth. præterierit hanc Cortusii ineptam suspicionem, & diversitatem non ostenderit. Tanta nimirum eius naturæ herbariæ vestigatoris fuit diligentia. Ac hos quidem errores in ultima Matth. editione ostendi parvifuit. Falsum ubique detegi, veritas nupiam celari, aut neglecta præteriri debet, etiam in rebus naturalibus.

Cæsalp. *Ligustrum Orientale*: fortè *Iseminum coeruleum* Arabum eadem, l. 3. c. 43. Idem l. 4. c. 10. Arabes inquit, *Sambach* vocant, eorum interpretes

Sapor. Flores.

Fructus.

Ex Constanti inopoli.

Lilac.

Glans unguentaria.

Matthiol. reprobat.

Glans unguentaria non est.

Non est Ben.

Ostryx Theophr. Locus. Syringa.

Matthiol. ter error.

Cortusii Plus Tertius. Matthiol. error.

Ligustrum orientale Iseminum coeruleum Sambach.



res *Ieseminum*. Flores tradunt esse in Aphrica trum generum, candidos & cæruleos. Et mox cæruleum in hoc genere nondum vidimus, sed inter frutices ostendimus, vulgò Ligustrum Orientale vocant.

*Syringa* flore cæruleo Clus. An Arbor quæ suo idiote *Cauda vulpina*, *Queüe de Renard* Gall. & Germ. *fuchs schwanz* sonat? Nam postquam dixit Turcas nullis parere sumptibus, & summam adhibere diligentiam, in conquirendis exoticis arboribus, quæ elegantibus floribus sint prædita, addit: Aliunt fruticem *Hederæ* foliis, perpetuò virentem, violaceis floribus, oblongum pediculus ambientibus, & vulpinæ caudæ crassitudinem æquantibus: quæ de causa ipsi sua lingua *Vulpinam* caudam appellant. Verum nostra *Syringa cærulea* perpetuam non habet comam, sed decidua est folio, ut superior, ut bene monet Clus. Nisi fortè apud illos folia perennet: apud nos nequaquam. Quidam malè *Portulacam* arborescens *Theoph.* putarunt.

*Syringa cærulea* *Lestranica* Pen. & Lob. *Syringa* *Li. fir.* Tab. *Spanischer Siringebaum.* *Syringa cærulea* eidem: & *Syringa* *Belgis cærulea* flore *Hist. Lugd. & Camer.* Bononiæ nobis *Syringa* *Azura* vocata fuit.

Hunc fruticem, teste Clus. alunt horti Belgici atque plerique Germaniæ, & aliarum Provinciarum. Floret cum superiore, interdum maturius.

Locus & Tempus.

Nostrâ curâ in hortum Montb. Dolâ translata fuit, & furculis seu stolonibus ab radice, atque absque radice ferè depacta feliciter germinavit. In Italiæ, Galliæ & Burgundiæ hortis curiosè cultam vidimus. Gemmas prædictas Decembri & Ianuario ostentat. Pulchras etiam videas arbores huius in horto E. C. Sturgardiano, & Argentinenfi *Frid. Meieri* instructissimò.

Saris.


Instructio ratio.

## AGNUS SIVE VITEX.

## CAP. XVIII.

*Agnus foli. n. n. serrat.*

*Agnus folio serrato.*



saporis acris.

Huius varietatem folio breviori & molliore, sed & latiore ac serrato Lob. observavit, quam & nos non semel vidimus. Verùm expendant herbarum diligentes cultores, an non sic fortè naturæ lusus, temporis, ætatis, loco aut culturæ adscribendus. Gesner. Viticem alium arborecentem dicit, alium minorem.

Plantæ huius si *Theoph.* meminit, sub *ῥον* vel *ῥον* titulo tradidisse videri potest, cuius sanè opinionis fuit Gesnerus stirpem ex veteribus sagacissimus vestigator. Sic enim in sua appendice scribit, *ῥον* vel *ῥον*, *ῥον* vel *ῥον*, postterius tantum probo, ab *ῥον* nihil differt, ut *Plinij* & *Eustathij* autoritate confirmari potest. Nam quæ de *ῥον* *Theoph.* eadem *Plin.* de *Vitice*, id est *ῥον*. Et *Eustathius* *Homeri* interpretatur *ῥον*, *ῥον* Latini quoque *Salicem* Amerinam nominant *Gaza* interprete ex *Theoph.* Qui etiam *ῥον* *ῥον* & alibi *ῥον*, *ῥον* interpretatur.

Sic autem *Theoph.* de *ῥον*, seu ut alij malunt, *ῥον*. *ῥον* aliud candidum, aliud nigrum: & flos frutisque utriusque pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: quibuldam verò inter hos prædix quodammodo in purpuram inclinans.

Tom. I.

ANTEQUAM ad *Salicem* generum transeamus, placeat *Agnus* sive *Viticem*, non tam ob faciem quandam, quàm quorundam nominum affinitatem præmittere. *Arbustula* est frequentibus ramis brachiata, quos cortex cinerei coloris tegit. Folia adverso ortu uncialibus & sextantalibus pediculis hærent, digitata, Lupini modo, in quinque ferè lacinias seu folia particularia subdivisa, cæcis subtruncatis, superiùs fusci propemodum, per margines undique sibi similia. Spicas ferè *Lavendulæ*, non singulares quidem ut illa, sed ex singulis nodis coniugatis, florum purpurascens, quibus grana succedunt numerosa, *Coriandrinis* & rotunditate & magnitudine ferè paria, nec crispata tamen nec striata: ac neque talis [ *ῥον* ] neque candidans est, uti quorundam. Folia quoque tenuiora levioraque, sicut & virgas, habet id quod album est. Videtur itaque pro coloris varietate, quadruplex discrimen agnoscere: nam præter album & nigrum & subpurpureum, etiam fulvum dicit, sic enim *ῥον* vertit *Gaza*: nisi malis albi vini modo nigrescens dicere, ut sub nigro comprehendatur.

Sed mirum si hæc nostra *Oecon Theophr.* sit; cur huius historiam spinosis interposuerit. Inter *Rhamni* namque atque *Paliuri* historias collocavit intermedium. An quia ita solet *Theophr.* consulas suas narrationes dare, & alienis ple-rasque locis collocatas? Sed eiusmodi quærelæ nihil certi docent. Difficiliores hisce opuli, quàm ut de iis vel verbum in suis annotat. *Scalig.* & *Rob. Const.* Hic tamen in suo Lexico ait *ῥον* à *Theophr.* in loco adducto poni inter aculeatas: quod ita intelligendum, non ut aculeatam hæc faciat *Theoph.* Sed, ut dicebamus, quia aculeata, nempe *Rhamni*, historiam immediate præmisit, & alterius aculeata immediate subiecit: Quæ fortè coniectura aliquos movit esse eam crispam & Gallorum *Groefelii*, ut idem *Const.* suspicatur cum multis.

Descriptio

Folia.

Spica floris.

Grana

V. n. crispata

*Iſon Aetij* Est & *Iſon* planta cuius meminit Actius. Est  
*alia plantæ* & *Iſum* Plinio.  
*Et Iſum* Idem ſanè Theoph. l. 6. hiſt. cap. 2. τὸ ἐν οἷο Cneo-  
*Plin.* τὸ ἐν οἷο τὴν πλάτανον. Sed ſi iſon

ron comparat, vtilem plantam. Sed nō  
vel <sup>10</sup> apud Theoph. sit Agnus, cui eadem l.  
hist. cap. 5. <sup>2</sup> potius dicitur, non ibi: aut hic  
<sup>10</sup> vel <sup>10</sup> potius, non illic. Nam <sup>10</sup> apud  
Theoph. l. cit. hanc ipsam esse de qua hic agimus,

non obscure quis colligat ex eo quod & Diocle  
& cæteris Græcis ita dicatur, & quod eam dicat ar-  
borem interdum effici, ſicut & Palurum, & He-  
deram, etiamſi fruticolæ ſint. Quod ſane de A-  
gno rectè dicitur, non minùs quàm de aliis. Ga-  
za ibi Amerinam convertit, partim memor à ſe

*Amerina.* Za *Artif.* lib. 9. de natur. An. Viticem con-  
 versam: ubi eadem & *rub.* dicitur. Rucfus Con-  
*Artif.*  
*rub.*  
*Artif.*  
*Oculus* spe-  
*cies* est *sa-*  
*licis.*

*d. 2. un-* Ceterum, sunt qui censent: *ad hoc* apud Theo-  
*de.* phrast. esse Agnum seu Viticem: cuius sententię  
*Agne Hip-* sunt Marcel. Pena, & Lob:  
*roc.* Vbi perperam in Cod. Bas. nostro iudicio di-

flūm dñi, *ελας* dñi legitur pro *ελας* θεο, ut in  
 Aldino habetur, & a doctis ita legitur, ut a Scal.  
 Dalech. & aliis. Gaza Oleagnum vertit: de qua  
 Theophr. scribit lib. 4. cap. 6. In Lacu Oritho-  
 menio arbores, matricque humiles ilice proveni-  
 unt, Salix, Elagynos. (hic Gaza de fūto cerebro  
 interponit: quia Olez Ametinaeque speciem pre-

fert: quæ sanè verba nec in Aldino, nec Bas. nostro Codice leguntur, quamvis eadem Rob. Conf. in suo Lexico ex Gaza potius versione, quam ex ipso textu Græco fide implicita citet. Et mox: de Eleagno quæ fortè & alibi locorum nascitur aliisque appellata nominibus, nunc dicamus. Est Eleagnos: & *Gaza* Oleagnos? fiatocamula planta, Agno similis, *maçquon* *nois* *ayras*: Sic Gaza & Cod. Bas. quos & plerique sequuntur: At in Cod. Aldino habetur *nois* *ayras*: si prior lectio vera, ut veram suspicamur, *inayras*? non erit noster Agnus? folio figura eadem simili, molli in Mali Codicibus *nois* *ayras*? Ruellius non meminit poni & lanuginoso, flore Populi albæ, minore. Fructum vero nullum profert. Nascitur potissimum in insulis fluitantibus, quales sunt in lacu Orthomenio: & in Ægypto circa paludes, in Theprotide, & in aliis stagnis. Hæcille.

Non esse  
Elæagnum.

Noster Agnus non omnino fructus expers est, sed grana fert, uti dictum. Adde quod si Agnus sit similis Elæagnos, Agnus esse non possit.

Rauvolff. pro Elragno proponit Salsaf Syro-  
rum, de quo postea.

Agnus in Apud Diosc. Agnus five Lygos [ $\Lambda\gamma\gamma\acute{o}\varsigma$  &  $\eta$   $\lambda\upsilon\gamma\acute{o}\varsigma$ ]  
 Lygos Diosc. Inter est in arbore asurgens, qui in li-  
 minum epìs campi que palustribus nascitur, nec  
 non & in locis asperis & salebrosis. Virgulta ge-  
 nit longa, fractique contumacia: folia verò O-  
 livæ, sed teneriora atque maiora. Florem al-  
 tæm eius genus fert album cum purpura quadam  
 tinctum: alterum purpureum solum. Semen au-  
 tem, quale Piper.

Dictus est hic fructus *Δρύς*, Græcis, quasi Castus, quod in Theophrasti matronæ castitatem custodientes eo ad strata uterentur. Lygos verò, quasi vimen, propter virgarum eius firmitatem. Hæc omnia Agno teui Vitici nostro egregie conveniunt, quemadmodum & vires ab eodem traditæ: quanquam feminis collatio etiam Pipere

paulò crassior videri possit.

Arbuseulam hanc ut tradit idem Dioscor. inter  
reiectanea, alij Agomon, alij Amicomian, alij  
Tridactylon: Magi semmon, alij Hamaideos: Aegy-  
ptij sum, Romani Salicem marinam, alij Piper  
grefse, alij Lecrificum nominant.

Plinius postquam de Salice tradidisset, ita subdit: non multum à Salice vitilium iuxta distat Grætex; foliorum quoque aspectu, nisi odore gravior esset; Græci Lygon vocant: alij Agonon, quoniam matronæ Thesmophoriis Athenien-  
Hæmida  
 Sam.  
 Salix  
 rina,  
 Piper d.  
 resfe.  
 Læscifia  
 Vitex Th.  
 Agnoni,  
 Genera d.  
 Candida  
 sium castitatem custodientes; his foliis cubitus sibi sternunt. Duo eius genera. Maior in arbo-  
Genera d.  
 Candida  
 rem Salicis modò affurgit: minor ramosa, foliis candidioribus, lanuginosis. Prima album florem mittit cum purpureo [purpurascens Diosc.] quæ & candida vocatur: Nigra quæ tantum purpureum. Nascuntur in palustribus campis. Hæc Plin.  
Nigra  
 quem plerique ex Theophr. loco adducto transcripsisse patet.

Apud Serap. *F. manchet*, est *Agnus Castus* : ubi  
& arbor *Abrahe* dicitur & *Piperella*, & *Piper Eunu-*  
*chorum*. Alij & *F. manchet*, *Samacher* & *Bongiechis*  
Arab. dicunt tradunt. Idem ex *Dioscor.* citat dici &  
*Kiston* & quoddam religiosi sternant hanc plantam  
sub lectis, ad refrendandam libidinem. Et nomi-  
nari etiam *Logiz*, propter duritiem virgarum  
eius. Esse plantam arboris altitudine : nasci  
propaeas, & locis agrestibus, maximè aq̃uosis :  
virgas habere duras ad frangendum, folia *Olivæ*  
similia, nisi quia sint maiora, longiora & mol-  
liora, ( intelligit autem partes foliorum, quas  
suora folia particularia diximus ) &c.

Porrò dubitat Flernol. an Salix Amerina idem sit quod Agnus Rea Vitex, etiamſi Dioſc. hoc affirmet. Ipſe tamen ita cenſet: Viticem non multum à ſalice vulgari diſtare, uſu vineo-  
lorum, foliorum quoque aſpectu, niſi odore gratior [ legimus, gravior ex Plin. & reipſa ] eſſet. Quan verum autem ſit, Viticem & Salicem Amerinam, eandem eſſe plantam in Plinii & Columellæ lectione diligentiores facili cognoscunt. Ille namque poſteaquam Amerinæ vires tradidiſſet, demum ad Viticis hiſtoriam ac vires tranſiit, hunc utique ab illa diverſum fa-  
ciens, cum ait non multum à Salice viticium uſi diſtare &c: Hic verò manifeſtè Amerinam Salicem dicit, & Salicis ſpeciem facit, quod de vitice nemo tam commodè ac proprie dixerit. Vt non immeritè Marcellus negat, Grecorum Agnon, Salicem Amerinam eſſe. Suſpicatū-  
que, adiectam ab imperitiſ latinorum rerum Grecorum medicis eam Diſcordi appellationem accreviſſe. Tām enim Viticis quàm Amerinæ Salicis vocem novſſe quondam Dioſc. verſimile eſt. Neque credendum, in ea appellatione deceptum diligentiffimum aliquem, & ex profeſſo hæc agentem. His ita ritè conſideratis, mirum Gêſnerum non uno loco alioſque Salice Amerinam dicere auſos. Gaza quidem apud Theoph. uti dictum, Amerinam interpretatus eſt, ſed quā fide? Nam Amerina Salicis epitheton eſſe videtur, quamvis ſatis obſcura origine, ut fuerint etiam, qui non Amerinam, ſed maximam Salicem dictam putent, notante Cornaro. Linacæ quoque Grammaticus Anglus, Gazam ſecutus, [ aut hic fortè illum ] Agnon & Lygon Amerinam nulla auctoritate nulloque fundamento convertit. Falluntur igitur matth. & Had. Iun. & omnes alii qui Viticem Salicem Amerinam credunt & dicunt.

Lygon Lygeânque Græcis dici, monet idem  
Hermol



Hermol. & carbotem, & quoddam herbæ genus: quod, ut inquit Athen. in nidos suos parituri Cygni ferant. Nec tamen satis se habere comperit, hanc quam Cygni petant herbam, aliud genus oportere intelligi, quam Viticem. Invenire se & scopas Amerinas Sparti similes describi, folio tamen minore, sed lenticia virgularum maiore, quas Genistellam Amerinam vocitent hodie.

Corollæ à Lygo usos esse veteres Anacreonti Poëtæ credimus: cuius originem Samii Caræsq; dederint, diversis causis. Nam & Lacedæmones arundine certis sacris, ut autor est Sôsius, coronabantur. Idem Hermol. monet Lygon & Aegylin quandoque dici ac legi. Item Moslyn, & Oesyan, & Qeson, & Oelocarpôn, ut Polluci & Phorioni videtur. Vnde Gerra Oesyma, hoc est, quadrata quadam turgioria ex huius Salicis viminibus, quæ Ligella quoque nominatur à Plauto in *Lulularia*: fortè à Lygo, id est, Vitice, aut à ligando.

Adicendum & illud, quod à Diosc. scriptum est à quibudam Lectistichum vocari, putare Hermolam in eo verbo mendum esse: nec Lectistichum, sed à similitudine saporis & acrimonie Ligusticum legendum. Nam & Piper agreste dici Viticem, idem autor affirmat. Et in eadem, quæ apud eundem legitur voce, *Amictômizum*, si non sunt integræ omnia, antiquæ tamen integritatis, ut annotat Marcel. & significationis aliqua adhuc supersunt vestigia. Ex quibus facili cõiectura est fuisse eius vocis compositionem, quæ ad Venerem misceri marem cum femina perhiberet.

Habet & *lygos* à viminum & vincendi usu manifestam rationem. Id enim Græcè *λύγος* est: idque omnes aperte testantur: præsertimque Homerus nono *Odyssæ*: *Λυγέας ὕμης* dicens: flexiles scilicet & sequaci lentitia ad vincendum aptos Vitices. Et *Arrianus* in hist. sua exercitum describens per nivem ingredientem: & ne in nive hæreret, pro calcæis circulis ex Lygis factis utentem: ut eo auxilio maius nivis spatium premens, firmiore vestigio iter faceret. Estque Lygos Græcis communis vox omnibus quibus in rustico opere ad vincula utimur, quales Salices omnes sunt, ut & multa plantæ aliz, in quarum genere Vitex quoque numeratur: idèoque communi illa appellatione etiam indicatur.

A rubore virgarum Sanguis manifestè Vitex dictus est. Avis verò Ibis adiectio ad superstitionem & Magicas vanitates, nostra ætate penitus incognitas, pertinet.

Magi eundem Semnon, id est, Venerandum (ea enim est vocis illius significatio) ob eandem illam castitatis causam dixerunt.

Quod verò & Agonos inter Diosc. Syhonyma dicitur, non aliunde est, quàm quod ipsemet cum plurisque aliis auctoribus & ante eum Hippoc. non uno loco humanum semen *γόνος* & *γόνος* vocat: à cuius privatione *ἀγόνος* vitex dictus.

Statio Papinio arbor casta quoque dicitur. Sicenim apud eundem lib. 2. Thebaidos, Tydeus templum Palladi vocens ait.

*Censum ibi virginis vota Calidonides aris:  
Aitæ tibi ritè faciet. — Et post: Et arbore  
casta*

*Nescit purpureas niveo discrimine vitæ.*

Vel hinc pateat cur & *λύγος* dictus sit, nempe propter flexilitatem, quam habent in vinciendo eius rami. Vnde *Diana λυγδæσquez* dicta, quod inter hæc virgulta invanta fuerit, uti Poëtæ nugantur.

Tom. I.

Herbarium antiquum Io. Cubæ Agni casti nomine, vel arboris Abrahæ, Arab. Amarikest, monitrosam figuram exhibet, nullam plantam demonstrantem. Sic & Petr. Cresc. ingens arboris monstrum pro Agno proponit.

Mirum verò rudes etiamnum non modò Pharmacopoeos, sed & Medicos hunc fruticem passim in suis practicis libris, atque receptis, quas vocant, Agnum castum vocitare: ignorantes Castum expositionem esse, Agni. Agnos enim castus est apud Latinos: & Castus *ἀγνός* apud Græcos. Et Agnus quoque, ut Festus ait, animal dicitur quod ad hostiam purum sit, & immolationi aptum. Siciple salvator noster, ipsamet castitas & puritas, & pro nobis hostia, Agnus Dei à præcurfore eius Io. Baptista dictus & indice ostensus.

Averthoes *Pentastiles* & *Granum sterilitatis* vocavit. Alii *Castam arborem*. Germ. *Schaffmüle*: *Abrahams Baum*, *Reuschbaum* / non *Bunsch* basi ut Had. Iun. habet in suo nomencl. *Reuschbaum* / *Genschlamp*. Itali. *Vitice*, *Agno Casto*. Hisp. *Gartiglio Casto*, *Gartillo Casto*, *Pimendo*, *Sauzgartillo*. Angl. dici posset *Chastree*, ex Græco, vel *Saupree*, à cannabinis foliis & seminibus. Bohem. *Quincef*.

Semen eius in offic. Agni Casti semen ineptè vocant.

Passim in Italiæ & Galliæ hortis celebrioribus colitur. Imò & in Germaniæ hortis. An verò copiosè ad Oenum fluvium, non longè ab Oniponte oppido, *Issbrud* Germ. dicto, aliusque vicinis locis proveniat, ut *Cordus* tradit, accollæ viderint. Considerent etiam Herbarii, an is qui ibi nascitur, sit idem cum eo qui Italiæ satis familiaris.

Montspeli arborès satis magnas vidimus florescentes Iunio, semine maturo Septembri: Item Lugduni, Bernæ Helvetiorum in horto Doctiss. viri Bened. Artui. Palustribus gaudere supra dictum. Colitur & in horto Montb. egregia arbutula una aut altera, nostra cura, à multis iam annis, Stutgardia importata ex horto Ducis. Hyeme reposita conservatur, ac floret Augusto & Septembri. Fructum orditur quidem, sed non perficit.

Vitici genus folio serrato coluit Cl. Platerus Basileæ, qui assererat, ramos depauctos facile radicare. Fert & hyemem non reposita, in eius horto, sed à ventorum iniuria satis munio. Semen aliquoties levimus diversis locis; ex Italia acceptum, sed frustra.

Viticem quondam Athenæ, trio servandæ castitatis nomine, celebrarunt, cuiusque gloriam non parum auxerunt. Multum illi etiam ex Academia & à Platone, ob eandem causam, laudis accrevit: gravi civitatis & hominis testimonio, non esse ab impuris tractanda, quæ puramente concipienda, & religionis egregia sanctitate exercenda ab homine sunt. Cui consulens natura, quemadmodum generatōnis, & Veneris multos animantium generi stimulos dederat, ut quotidianam vitæ iacturam nova continuè sobole instauraret: sic [ut eleganter tradit Marcel.] pro castitate aliqua etiam hominibus ostendit, quibus vtentes, à Veneris & Cupidinis insultibus tuti essent atque immunes. Ex quorum numero sanè & Vitex est, satis hac in parte cum ab aliis, tum à Diosc. celebrata: cum testatus est, Agnon vocari, quoniam in Theophrasti Cereis sacro, quod Athenis à mulieribus fiebat, castitatem custodientes mulieres, foliis eius cubitus sibi sternerent: expertæ aut à peritioribus

*Pigmentum.*  
*Arbor*  
*Abrahæ.*  
*Amarikest.*

*Medicorum*  
*Pharmacopœorum*  
*Castum*

*Agnum*  
*Christum*

*Pentastiles.*  
*Granum*  
*Sterilitatis.*  
*Synon. Lit.*  
*guar.*

*Locus:*

*Tempus:*

*Vires:*

*Viriditas*

*Castitas*

*Castitas*

doctæ, calore suo inflationes solvere Viticem: (nisi quis antipathia quadam aut proprietate naturali id præstare sentiret malit) idcirco Venetis impetus omnes faciliè retundere ac inhibere. Qua potestate in abundantia feminis & contra nocturnas Veneris per somnum imaginationes, & feminis incontinentiam, finitati hominis non parum contulit.

Contra se-  
minis in-  
continen-  
tiam.

Temper.

Morsus  
serpentis.  
Hydrops.  
Lac. auget.

Vuln. in-  
flam.  
Alteses.

Dolor capi-  
tis.

Lethargus.  
Phrenitis.  
Contra Ve-  
nerem.

Testium  
duritia.

Luxatio.

Vulnera,  
intertrigo.

Tempera.

Sapor.

Nona.

Cur caput  
tentat.

Cur cum  
calidus sit,  
non Vene-  
rem stimu-  
let.

Conferunt  
enim Ruta  
Viticem.

Huius porro excafactoriam adstringentemque vim Dioscor. tribuit: quo autore fructus eius epotatus demorsus à serpente, sed & lienosis ac hydro-picis opitulatur. Lactis abundantiam facit, men-lesque ciet drachmæ pondere in vino potus: ge-nituram quoque exsolvit. Caput verò tentat, soporemque infert. Herbe ac feminis decoctum ad insectus, vulvæ affectibus & inflammationi-bus opitulatur. Semen cum Palegio potum, suffitu etiam & appositu, purgatione movet: dolorem quoque capitis dissolvit illitum. Cum aceto & oleo Lethargicorum Phreneticorumque capitibus instillatur. Quin & folia tùm suffitu, tùm etiâ substratu venenata fugant: ac contra ve-nenatorum morsus adhibita auxiliantur. Te-nitium duritias cum butyro vitiumque foliis emol-liunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum mi-tigat: cum foliis verò, luxatis vulneribusque me-detur. Creditur & viticis virga intertrigines ar-cere, si eam viator dum iter facit, manu teneat. Hac Diosc.

Gal. Vitis naturam atque temperamentum paulò diligentius inquiri, his verbis: Agnos aut Lygos, hoc est Vitex, planta illa fruticosa, cali-dus quidem est & siccus tertio ordine, verùm multum tenuis substantiæ, tùm gustu acris simul & adstringens. Ipsas tamen virgas [λύγες] ad medicinam habet inutiles. Cæterum folia se-menque calida sicque facultate sunt, substan-tia verò tenui. Nam & utentibus ita apparet, & gustantibus acris simul & subadstringens perci-pitur, tùm folium, tùm flos, tùm semen. Edendo tamen etiam semen [ἀγνός] est: verùm tam perspicuè calfacit, ut capiti hoc nomine dolo-rem pariat. At si frigitur, (nam & sic editur cum tagematis) minùs caput tentat. Porro flatus ventris ducitur, & cum non fructus, & multò ma-gis cum fructus fuerit. Cohibet etiam impetus in Venerem, tum frictionis expertus, tum etiam i-plam expertus (fructus.) Folia item florésque ipsius fructus id ipsum præstare possunt. Itaque non tantum est potaque ad castitatem conferre creduntur, verùm etiam substrata. Hinc est quòd Athenis in Thesmophoriis, hoc est, Sacris Cereris, mulieres totum sibi fructum subternunt. Hinc illi quoque nomen inditum Ἀγνός, id est, casti, uti dictum. Ex quibus omnibus manifestum est, A-gnón calfacere, simulque exicare, tùm omnium maximè flatus discutere. Porro quod exactè te-nitium sit partium, facultas eius τρυφερόν est at-que indicio. Nam, quod caput tentat, non magis à multitudine vaporum ab eo prognatorum, quàm à caliditate eius ac subtilitate partium fieri rationi consonum est. Si enim flatus uolum spiritum procreare posset, sanè & ventrem inflaret, & Ve-nerem stimuleret, perinde ut Eruca. Verùm, cum non tantum non excitare, imò etiam reprimere queat, fuerit sanè secundum Rutæ maximè facultatem, tùm in excafaciendo, (Quod L. 1. alim. item 2. comp. med. part. refrigerare dicitur, id errore factum hinc discies) tum in reficcando, non tamen illi par est. Nam utròque paulò est inferior: siquidem Ruta tùm magis est excafa-ctoria, tùm magis deficcatoria. Differt etiam

qualitatis simul ac facultatis missione. Nam A-gni semen ac germina modicam ferunt adstric-tionem: At Ruta ubi aruerit, exactè amara est & ac-ris: ubi verò humida, subamara. Non tamen auferitas aut acerbitas illi inest: aut si cui videat-ur inesse, ea utique omnino obscura videbitur, nec par ei quæ est in Agno. Quocirca & ad ieu-cur & lienem indurata & obstructa Agni semen potius quàm Ruta competit. Sed hæc ad curan-di iam Methodum pertinent. In præfens id so-lum novisse sufficit, quòd Agnus calidus est & siccus facultate, idque non mediocriter, sed ter-tio excessu, tùm admodum tenuium partium. Hæc qui norit, ac postea methodum curandi di-dicerit, ipsemet inveniet, quo pacto menses hic cieat, partes induratas digerat, lassitudines sol-vat, & ex eo acopum excafactoriumque un-guentum præparetur.

Idem Gal. l. 1. alim. fac. Cannabim cum Vitice comparat, cuiusque semen huius feminis viribus quodammodo simile dicit, sed multum ab ipso distare, ut, quòd egrè concoquatur, stomacho incommodum sit, capitis dolorem inducat, & prævum succum habeat. Ede tamen fruxum cum alis bellariis, quæ post cœnam voluptatis ad bi-bendum gratia comeduntur. Sed & Vitis se-men fruxum edi, & impetus venereos cohibere, modicum verò dare alimentum, & hoc ficcans ac refrigerans. Ex quo loco apertè liquet vel Galen. sibi p. contrarium esse, vel hoc loco contrarium irrepisse, legendumque calfaciens; ut paulò antè monitum: quanquam idem simili errore repetatur l. 2. alim. c. 35. ubi etiam refrigerare scribit, & fruxum manum huius accommodum esse qui à Venere puros se servare volunt: necita caput ferire, ut Cannabis. At ibid. c. 39. Vitis tu-riones sicut & Terebinthi in auriam acetumve iniectos per totum annum asservati tradit, ut vim quandam provocandæ appetentiæ acqui-rant, si quis ipsis moderatè utatur.

Porrò eandem modò dictam in Galen. contra-rietatem Aëtius l. 1. Tetrab. ser. 1. velut emendans, legit pro ὑποψυχῆς voce, ὑποψυχῆς, ut alimentum ficcans ac calfaciens corpori dari accipiamus. Ni-si quis fortè cum Saraceno Vitis semen eatenus refrigerare dicere velit, quatenus Veneris impe-tus, qui à calore sunt, inhibere potest.

At quod l. 2. ὑποψυχῆς, c. 1. Vitis moderatè, refri-gerare, atque adeò, ex Archigene, nonnullis aliis per-missum dolori capitis à causa calida oborto cõve-nire innuit: idem rectius de vitentibus Viti-cis foliis accipi censet: quippe cum prædomi-nantis humiditatis ratione non usq; adeò calefa-ciant: maximè verò si cum Lauri foliis, natura calidissimis conferantur. Adde quòd, quoniam longè tenuissimarum sunt partium, æquè ac alia, quotquot sunt ὑποψυχῆς, faciliè eorum, quibul-cum permiscuntur, si ve calfaciant, si ve refrigerent, vim exacuunt & adaugent.

Notabis & aliam contrarietatem in citatis Gal. locis. Nam in 6. simpl. ὁ γὰρ καπνὸς καὶ ἀνὰ λυγὴν ἡνδρα γένεσθαι αἰσθεῖται. Ad quod respicit & illud Dioscoridis, ὁ καπνὸς ὅς ἐστιν ἀνὰ λυγὴν ἡνδρα γένεσθαι. At contra idem Gal. alim. 2. καὶ ἀνὰ λυγὴν ὁ γὰρ ἀνδρα γένεσθαι. (inquit) καὶ ἀνὰ λυγὴν ἡνδρα γένεσθαι. Sed pugnantia hæc loca faciliè fuerit conciliare, si fateamur tentare quidam caput Vi-ticis semen, uti re ipsa facit, testante eodem quo-que Sarac. non tamen quantum Cannabis: Illic enim simpliciter agitur de Vitis semine: hic vo-rò cum Cannabis semine comparatione facta.

Cæterum quòd Vitex contra Venerem insiste-re iam aliquoties dicta sit, & mulieribus in Thel-

teoria  
nisi que  
vires  
obstru-

Menses  
duritiam  
Lassitudi-  
pugnantia  
acopon.

Conferunt  
enim semen  
Cannabis

Cibus:

Gal. sibi p.

contrarium

Vitis  
tiones co-  
dici.

Gal. l. 1. c.

quomodo

Gal. c. 35.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.

quomodo

Gal. c. 39.



mophotis subterni solita: in maribus id Paulus Aegin. l. i. decrevit, quo capite de nimia feminis abundantia agit. Præcipit enim unâ cum refrigerantibus herbis Viticis ramulos subternendos his, qui vel in somno vel in vigilia copiosiore seminis fluxu abundant. Plin. hunc veluti scopulum fugiens, impetus Veneris inhibere Viticem dixit communiore illa voce incertum legentibus iudicium suum relinquens. Siquidem utrique sexui commune generationis studium & ad Venerem impetus est: nisi Athenienses matronas primùm, mox Dioscoridem de his sic cogitasse aliquis credat cum Marcello, in communione coniugalis thori iacentibus simul viro & uxore, satis ad castitatem fore stimulos Veneris hoc remedio in viris extinxisse: exenctisque his castitatem ea ratione feminis acquirere: quam (ut sunt in coniugalis thori officio viris suis faciles & morigeræ omnes) servaturæ aliter non erant.

Sed placet & Plinium de Viticis viribus dissentientem producere, maximè cum peculiaribus quædam præter prædicta habeat. Semen, inquit, potum vini quendam saporem habet, & dicitur febres solvere: & cum unguntur oleo admixto sudorem facere: sic & lassitudines dissolvere. Vriam (Vitices) cient & mentes. Caput tentant vini modo: nam & odor similis est. Inflationes pellunt in inferiora. Alvum sistunt, hydropicis & lienibus perquam utiles. Lactis ubertatem faciunt. Adversantur venenis serpentum, maximè quæ frigus inferunt. Minor efficacior ad serpentes, bibitur seminis drachma in vino vel posca, aut duæ foliorum tenerimorum. Et illinuntur utraque adversus araneorum morsus: vel perurdis tantum, suffitu quoque aut substratu fugant venenata. Ad Venerem impetus inhibent: eoque maximè phalangiis adversantur, quorum morsus genitale excitat. Capitis dolorem ex ebrietate sedant cum rosaceo flos tenerique cauleculi. Seminibus decoctum vehementiorem capitis dolorem dissolvit: & vulgum etiam suffitu vel appositu purgat: alvum cum pulegio & melle potum. Vomica, panosque difficilè concoquens, [facilè concoquit cum cum M.] cum farina hordacea mollit. Lichenis & Lentiginis cum aphrenigro & aceto semen sedat, & oris hinc & eruptiones cum melle. Testium [duritias] cum butyro & foliis vitium: Rhagadas sedis cum aqua illitum: luxata cum sale & nitro & cera. Et semen & folium additur in malagmata nervorum & ad podagras. Semen instillatur in oleo [ & aceto Diosc. ] decoctum capiti in Lethargia & phrenesi. Virgam qui in manu habeant aut cinctu, negantur intertiginem sentire. Hæc Plin.

Quæ Serapio habet, ex Diosc. & Gal. transcripserunt.

Viticis semen, ut Nicandri Schol. Græcus tradit, haustum liberat à febribus, & sudores movet. Hydropicis & splenicis auxilio est, in vericam expurgatis humoribus. Veluti Polium confert lictericis. Inimicum mulieribus prægnantibus: pellit embrya. Comestum & haustum steriles servat: aiunt enim extinguere flammam libidinum:

Matth. Viticis semen ad Gonorrhæam cum aqua florum Nymphaeæ aut Portulacæ commendat. Et addit, scribere doctum quendam (cuius nomini parit) in Herbario suo tum Latino tum Germanico, cap. de Vitice, Dioscoridem testari, quoddam si quis Viticis ramulum iter faciens manu teneat, securas sit futurus à Lupis. Sed bonus ille doctus, qui quis tandem fuit, fallitur: aut

Tom. I.

spiam enim Diosc. in cap. de Vitice saltem, Lupi cuiusdam meminit, sed intertriginis, quæ Germanis à Lupo & ano deducto nomine *Arßwolffen* nominatur, quoddam vehemèti equitatione potissimum in ano & natibus acquiri solet. Ad fugandos serpentes iubet Nicander in Theriac. Viticem multarum subternere.

Gorrh.

*Aur tibi casta Salix, pulchro qua flore renidet:  
Præbeat instratâ securum fronde grabatum.*

## SILER VETERIBVS.

## CAP. XIX.

Sileris cuiusdam meminit Plinius, sed omisâ eius descriptione: eius natale solum & vires, paucis tradidit. Non nisi in aquosis, inquit lib. 16. cap. 18. provenit.

Sileris folia illita fronti: capitis dolores sedant.

Eiusdem semen tritum, in oleo phitirias coërcet.

Serpentes & hunc fruticem refugiant, baculumque rustici: autore nostro lib. 24. cap. 10. teste, ob id ex eo gerunt.

Siler Plinio, anthore Casalpino, est *Evony. Aquilegia* *Econymus* *Theophr.* *Plinium Dalech.* Aloisius esse putat *Salicem la-* *foliam*, candido folio, è cuius cinere, sulphure & Aphronitro fiat pulvis excutiendis machinis bellicis utilis.

## SALICES.

## CAP. XX.

SI superius explicata titulum sylvestrium arborum merentur, potiori ratione aut saltem eadem & Salices quæ sequuntur, sylvestres vocandæ. Veterum autem de Salicibus placita cum nostrarum Salicum historiis in differenter confundere, non statuiamus. Quare eorum generalia de his placita nostratium historis præmittimus.

Salix notantibus Theophr. & Plinio, ocyf. *Salices* *Fruticum.* similè amittit semen, antequam omnino maturitatem sentiat: ob id Homero *Odyssæ* K. vel 10. dicta *ἀκρογάρῃ*, id est, *frugiperda*. Eam autem dictionem scelere suo interpretatam esse secutam ætatem tradit Plinius: cum sc. Salicis semen mulieri sterilitatis medicamentum esse animadvertit: Sed in hoc quoque, addit idem, providens natura, facilè nascenti & depacto furculo, incuriosus semen dedit. Vna tamen prodit ad maturitatem pèrfere solita, in Creta insula, ipso descensu Iovis speluncæ, toruum ligneumque magnitudine Ciceris. Fiunt verò quædam & loci vitio instructuosæ, sicut in Pæro sylvæ Cædua, quæ nihil fert.

Theophr. porro omnino Salices inter præmadas atque palustres arbores referens varia generâ agnoscit: *Nigræ*, quæ cortice nigro aut puniceo: *Candidæ*, quæ candido tegitur: *Quarum illa virgæ pulchriores & ad texendum commodiores proferunt: hæc spissiores.* [ *monotrichæ* lege pro *monotrichæ*. ] Tribuit autem in genere Salici folia longa, qualia & nostris sunt.

Plinius aliter distinguit in hunc modum. Salicis plura genera. Namque *Alia* in proceritatem magnam emittunt iugis Vinearum perti-

*Differetia* *Theophr.* *Nigra.* *Candida.*

*Fruticum* *serens* *Cretica.*

*Differetia* *Plin.*

cas, *Alis* virgas sequacis ad vincituras lentitiz. *Alis* pretenues viminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus *alis* firmiores corbibus, ac plurimæ agricolarum supellectili: candidiores ablato cortice, leves tractatu, vilioribus [ melioribus, aut mollioribus Ruel. & Ch. ] vasisque etiam supinis in deliciis cathedris [ in quibus ignibus sedent totos dies mulierculæ, & cum iis molles & effeminati viri: vnde Cathedralitij Martiali ] aptissimæ. Cædunt Salici fertilitas densior tonsura: nullius quippe tutior est reditus, minorisve impendij, aut tempestatum securior. Tertium locum ei in æstimatione ruris Cato attribuit priorémque quàm Olivetis, quàmque frumento aut pratis.

*Salicium* a-  
firmisio  
apud Vete-  
res.  
*Planta* ad  
vincula.

*Græca* ru-  
bens.  
*Amerina*.

*Nigra*.  
*Candida*.

*Viminalis*.  
*Vitellina*.  
*Gallica*.  
*Differentia*  
*Colum*.  
*Græca*.  
*Gallica*.  
*Sabina*.  
*Accommo-*  
*dantur*  
*inter se &*  
*ad nostras*.

*Plin. Variè*  
*alij*.

Nec tamen quia desint alia vincula: siquidem & Genistæ, & Populi, & Ulmi, & Sanguinei frutices, & Betulæ, & arundo filia, & arundinum folia, ut in Liguria, & Vitis ipsa, recisisque aculeis Rubi alligant, & intorta Corylus. Mirumque contuso ligno alicui maiores ad vincula esse vires. Salici tamen præcipua dos. Finditur Græca rubens, candidiorque Amerina, sed paulò fragilior: idè solidò ligat nexu. In Asia tria genera observant. Nigram utiliore viminibus: *Candidam* agricolarum usibus: *tertiam*, quæ brevissima est, quæque *Helicem* vocant. (Hanc distinctionem ex Theoph. transcripsit Plin.) Apud nos quoque multi totidem generibus nomina imponunt: *Viminalis* vocant, eandemque purpuream. Alteram *Nitelinam* (Vitellinam Ruel.) a calore, quæ sit tenuior. Tertiam *Gallicam*, quæ tenuissima. Columellæ *Viminalis* Salicis tria genera: *Græca*, flavi coloris: *Gallica*, obsoleti, purpurei & tenuissimi viminis: *Sabina*, quam plurimi *Amerinam* vocant, gracili & rutila virga.

Quæ sanè singula pulchrè cum iis, quæ Theophrast. tradit, convenire videntur. Nam primam Salicis speciem, quam Theoph. *nigram* aut *punitam* vocat, Plin. *viminalis*, Colum. verò *Sabinam* & *Amerinam*: Germani *Rott Weiden*, tubros: *Salices*, Lugdunenses etiamnum hodiè *Amerinas* & *Ambres*, Parisienses *Osier* vocant, teste Dalech. Quod verò Plinius ait: Finditur Græca rubens, de Amerina quoque intelligendum, eiusdem Dalech. iudicio, quòd ea sola findatur. Nam Amerinarum Quædam rubet, quam Græcam vocant, Plin. etiam *nigram*, l. 24. c. 9. Quædam candida est: idè ait Plin. Finditur Græca rubens, candidiorque Amerina, ita ut vox, Amerina, æquè ad rubentem & candidiorem referenda sit. Secundam speciem, quam Theoph. *Candidam*, Plin. *Vitellinam*, Colum. autem *Græcam* vocant: Germani *Geel Weiden*, *Salices flavas* nuncupare videntur. Tertiam quæ Theoph. *Helix* dicitur, Plin. & Colum. *Gallicam* appellant: Germani verò à tenuitate & exiguitate *Klein Weiden*, *Salices parvos* seu *humiles* nuncupant.

Dalech. illa Plin. verba: *alis virgas sequacis ad vincituras lentitiz*: de Amerina, ruffa, & vitellina intelligit. Et illa. *Alis pretenues viminibus texendis spectabili subtilitate*, de nigris & purpureis. Forè rebus de Gallica cæa Helice, quam & tenuissimam idem Plin. dixit.

*Helix* unde

Videtur autem *Helix* dicta à similitudine Hederæ sic vocatæ, quæ ad iustum Hederæ modum non excrevit: vel *in pila*, ut apud Theophr. legitur, dictam putat Dalech. quòd maximè flexilis sit ac plicatilis: nimirum propter tenuitatem.

*Dub. ex*  
*Plin.*

Illud considerandum an non subsit aliquis in Plinio error, dum Amerinam l. 16. cap. 37. rubentem ( ut exposuimus ) & expressè candidam facit: eandemque lib. 24. cap. 8. nigram. Nisi lega-

tur, uti corrigi Curtius: Columella autem rutilam. Quæ si quis non admittat, videat an non Plin. & Columell. in divisione Salicum discordent.

Diosc. de Salice tradit ac si una tantum species esset. Nam arborem dicit vulgò notam. Fructum tamen ferre non ignoravit.

Cordus Salices sic distinguit: *Salix Viminalis* in Francia nostra copiosè propter Vites feritur *Perticulis* in Saxonia, ad Lupuli pedamenta. *Perticulis* est, quæ longiori talea sive pertica pangitur, ea non singulis annis putatur, ut Viminalis, sed quarto demùm anno. Longiore enim ætatem Perticæ quàm Vimina requirunt. Atque hæc generum sunt nomina. Specierum verò quæ cordò demonstrari vetulstis nominibus possunt, *Vitellina* & *Gallica*. *Vitellina* est, quæ Germani *Gele Weiden*, flava, & *Totte Weiden* vocatur. Frequens in Francia nostra, cùm Perticulis tum viminea. *Gallica* verò est, quæ in obsoleto purpurea profert, & omnium tenuissima vimina: Germ. *Harweyde*, hoc est, *capillares Salices* à gracilitate vocant. Porro (addit idem Cordus) qui Salicum figuras ignoraverint, consulant Herbarium Fuchsj., qui plurium specierum imagines delineari curavit. Pingit autem Fuchsj. duas Salices hirsutas, & unam line pilis, sed absque descriptionibus additis, quod non placet. Ipse quoque Cordus minis diligenter Salices investigasse videtur, qui tam paucas differentias agnovit.

Gesnerus quoque postquam dixisset in Helvetia multa Salicum genera nasci, sativa & sylvestria, addit sylvestrium miniam Siler appellari: & aliam quæ læto est folio *Salweiden*.

Marth. *Salicis quatuor sunt genera*. Nam quædam Differentia in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis in Liguria fiant perticæ & pali maximi usus ad vitium pedamenta: *Alis* non tam proceræ, colore rufescentes, sequacis lentitiz, quæ ligandis cadorum vinatiorum circulis commodè finduntur: Has Salices Græcas vocat Cato. *Alis* firmiores, corbibus, & rusticæ supellectili admodum expetitæ. *Alis* minores ac mira tenuitate texendis canistris, citellis, & calathis aptissimæ. Ut videas Matthiolum veterum differentis contentum, differentis nostratum inquirendis parum insudasse, ac usum tantum nostratum illis accommodasse.

Tragus quatuor quoque *Salicis genera* constituit Fuchsius tria. Dodon. *duo tantum*. Vnam quæ cæterarum arborum modo in proceritatem magnam assurgit: alteram quæ semper humilis est, & vimina profert, cuiusque cortex interdum rubescit, aliquando candicat, nonnunquam verò flavescit. Turnerus Anglus tres tantum agnovit species: *Græcam*, colore flavo, plurimam in Frisia Orientali circa Anricum: *Gallicam*, vimine rubro, in multis locis Angliæ & Germaniæ: *Sabinam*, quæ & Amerina, quàmque in Italia tantum & Frisia Orientali inveniri scribit. Totidem habet figuras.

Angul. in Epist. scribit: Salicis species [ veterum ] intelligit omnes notas. *Helicem*, de qua scribit Theophrast. Bononiensibus nunc *Viticem* vocari, ex cuius virgis fiant pulcherrimæ citellæ.

Scimus (inquit Aloisius in exam. Musæ Bras. favolæ) Hermolaum dicere se non planè compertum habere, an Salix Amerina idem quod Agnos five Vite sit: Verum, quia nullis quod suspicatur, coniecturis aut rationibus probat, propterea cum Diosc. eandemque sentimus.

Sic Ruell. cū aliis multis bonis ac doctis viris

*Salix Viminalis*.

*Salix Perticulis*.

*Vitellina*.

*Gallica*.

*Græca*.

*Sativa*.

*Sylvestria*.

*Græca*.

*Gallica*.

*Sabina*.

*Amerina*.

*Helica*.

*Vite*.

*far*.



farragine nomēclaturarum, quæ spuria in Diosc. irreperunt, deceptus, tradit Viticem autore Diosc. Salicem Amerinam à Latinis appellari, cum inter has duas stirpes multum interit, doctissimorum Herbariorum quoque calculo, ut in historia Viucis ostensum. Enimvero sanè si Salix sit frugiperda, uti Hom. cecinit: Amerina, si Vitex sit, non omnis Salix erit frugiperda.

Scaliger sanè ad lib. Arist. de plantis annotavit, eum [si modò is liber est], quod Scal. negat, plausibilibus sanè argumentis,] contradicere sibi de sterilitate Salicis. Suprà namque [inquit] Salicis brevioribus ramis flores attribuebat: nunc amovet à toto genere fructum. At Amerina, si ex multorum sententia sit in Salicum censu: suis bacis five granis infusmet hanc sententiam. Quibus Scal. verbis facile intelligi potest, eum per Amerinam, Viticem, quæ granifera, intelligere.

Nos & alios Salices fructiferos, mox dicendas, observavimus ita ut saltem in iis edictum Homeri corrui: nec omnes sint frugiperdæ.

Eodem errore & Arist. quoque lapsus est, qui lib. 1. cap. 18. de gen. animal. scribit nec Salicem, nec Populum semen aut fructum proficere. Verum in utroque femina observavimus, quamquam non in omnibus Salicis speciebus. Et ex femine Salices natas infra dicetur.

Remittit Tragus lectorem ad Arist. lib. de inventura & senectute c. 3. de Salice tradentem, quo tamen loco ne verbum eius meminit. Alio quidē loco monet florem Salicis apibus gratum esse.

Scalig. annotat, se Salicem sine ullo medullæ momento vidisse.

Cronenburg. lib. 3. de comp. med. scribit Plinium lib. 16. cap. 38. octo Salicis genera proponere: Quæ tamen omnia ex Plin. verbis, nostra diligentia extorquere nondum potuit. Herbam porrigemus ei, qui id præstiterit.

Ceterum in constituendis Salicum differentiis, respicias licet, vel ad locum, in quo nascuntur: vel ad usum: vel ad corticis colorem, ex quibus fontibus suas potissimum defumpit differentias Dalech. in Hist. Lugd. Nam, inquit, Salices alie sunt aquatice, id est, aquaticæ: alie sicca loca non dedignantur, ut Amerina, quæ in vinetis, quantumvis aridis & siccaneis passum profilit. Aquaticarum alie pigris & stagnantibus aquis gaudent, & ad rivorum fluviorumque margines, leni lapsu fluentium, vel pingue crassumque solum rigantium proveniunt. Alie glareosis, lapidosis, arenosisque torrentium & rapidorum annuum ripis.

Ex corticis colore, candido, nigro, phœniceo, luteo, differentia alie sumuntur. Quæ ut ingeniosè quidem à perdocto viro tradita sint, tamen non omnes Salicum differentias exactè designare possunt. Sunt enim & alie à magnitudine seu proceritate, à panniculi seu floris specie, à figura foliorum, à fragilitate & lentitia virgarum &c: Immo & ab ipso quoque fructu: Vt nihil dicamus de exoticis Salicum speciebus infra tradendis.

Quas C. Bauh. diligentia consignavit, ita habent. Salix alia pericallis, alia Viminalis. Pericallis, quæ vulgaris & prima, vel est sterilis, flores ferè amentaceos ante folia, vel est fructifica, ferè racemulos, Populi instar oblongis granulis. Viminalis variat colore, cortice magnitudine & fructu. Colore est cortex albo seu pallido, Gallica dicta: nigro, Phœnicea Theoph. Purpurea Plin. Luteo, Græca dicta, Vitellina Plinio: Cinereo quæ larsolia seu aquatica Magnitu-

dine alia viminalis magna, alia parva. Magna, Latifolia. quæ secunda est Salix, purpurea nigra Viminalis, Magna. cui peculiare, quod ad cuiusque folii petiolum gemina semper sint foliola, variorum. Theoph. phlois Theoph. Tertia: Salix, phœnicophlois, five phœnicea. Phœnicea. Quarta: Salix lutea. Quinta Salix Latifolia, quam aliqui Elæagnon Theoph. censent, quæ duplex, Lutea. alia folio oblongo, quæ Salix Caprea latifolia Theoph. Tab. alia folio rotundo, Salix 4. Trago. 6. Salix Caprea angustifolia. 7. Salix longissimis foliis, Elæagnon. Hist. Lugd. Parva variat foliis latis & angustis: Latis, Salix humilis repens, quæ duplex apud Clus. in Hist. Pan. hæc octava est & Humilis repens. 10. Rotundifolia infra describenda. Angustifolia duplex Clus. undecima & duodecima. 12. Salix Helice Hist. Lugd. quæ baccas fert rubentes & caput squammis compactum. 14. Salix maritima, quæ testis ostrearum & saxi in mari adnascitur. Fructu variat quod alia sterilis, alia fructifera, ut supra dictum. Quas omnes differentias mox ita proponemus, ut vel ex titulis quovis obiter indutrio Herbaria studiose dignoscant se invicem queant, ubi prius nomenclaturas generales dixerimus, & alia quedam generalia.

Græci itas vocant. Lat. Salicem, quod ea celebritate crescat, ut Salix videatur, uti Festus & Synonyma linguar. Maurus Servius volunt. Arab. Bulef, Bhulles, Saffas, aut Chalis dicitur, & ut alii volunt, Saffis quoque apud Avic: Iudaicè Araf. Germ. Weiden: Weidenbaum, Sellinger, Selber. Belg. Wilghe: Willighenboom. Gal. Saulx. & Sault & Saule. It. Salice, Saliceo. Hisp. Sauro, Salgueiro. Angl. Willow-tree aut Salow-tree: Bore. Irbus, Sanghe-tree. Bohem. Durba Lugduni Salices viminalis dicuntur Ambres, quam Burgundis & Mont belgardensis fructus Rubi Idæi, ita dicantur. Ramus Salignus Græcis ῥαῖς, aut vimen flexile à ῥαῖς, quod ob lentitudinem flectatur. Trunci summum rusticis Caput vocant.

Salicem Poëtæ, variis epithetis ornarunt: un- Epithetæ de Virgil Ecl.

— Salices carpetis armatas

Animalibus tamen, maxime Capris dulcis est: Valde enim appetunt eas. Lenta Salix eidem. Vnde etiam Ovid. Metam 4.

Lentior & Salicis virgine

Et Idem Vng Georg. 2.

Et glauca canentia fronde Salicæ.

Item eodem lib.

Inculque exercet cura Salicem.

Amnicola & curva Ovid. Secunda viminalis Virg. Tenera Lucret. Dicta & cana, viminalis, pericallis, sylvatica, fluminea, amnicola, umbrosa, erratica, resiliens, opaca &c: Malè verò frugiperdam dictam Homero dicas, si omnem intelligat: bene, si aliquas tantum. Nam aliquas semen ferre mox patebit, & ex semine quoque nasci à Trago & nobis observatum.

Salix munda apud Iuriconsultos, ea dicitur quæ omni spurcicia & frondibus liberata & purgata est, aptaque & ad viendum & alligandum: ut quæ ex arundine iuga fiunt, aut pedamenta adminiculaque vitium. Verba Iuris Consulti sunt: Et Salicis munda annua libram viginti millia. Turneb.

Qui Salicis pumam albicantem adnotatam reliquit, inquit Marth. inveni neminem: quæ delapsis statim floribus, è ramulculis uvæ modo dependet, donec ventis arrepta buc & illuc, plumæ modo, impellitur. Sed parum attentè Marth. legisse videtur Plinium de Salicibus tradentem, qui apertis verbis scribit. Salicis Fructum ante

maturitatem in araneam abire: quā aranea nihil aliud, quā id, quod Matth. spumam vocat, intellexisse videtur.

Diosc. succi Salicis vnus tantū meminit: At Plin. Salicis succum trium generum esse prodidit. *Vnum*, quem arbor ipsa exudit gummi modo. *Alterum*, qui manat ē plaga cūm floret, ē ciso cortice trium digitorum magnitudine. *Tertium*, qui detractione ramorum à salce [Salice Dal.] destillat, quorum vires infra dicentur. Nunc nobis observatas differentias proponamus.

### SALIX MAXIMA, FRAGILIS, ALBA, HIRSVTA.

Descriptio

Folia.



Florum spica.  
Cortex.

Salix alba  
Theophr.

Americana  
Plin.

Fuchsi cor.  
sor.

pilis propemodum destituitur. Sed & in eo variant, quā d interdum serrata sunt, interdum cretinae, vixdum apparent. Virgis, ut post describenda, adnascuntur multae florum spicae, molles & incantae, quae maturitate in pappum abeunt. Cortex cineraceus aut rubescens, vimem saepe.

Hae Theophr. nostro iudicio *italicae*, Salix alba est, cui album tribuit corticem, ad differentiam nigrae, & virgas spissiores [ *πυκνότερας* : quoniam alij *κατακτερας*, id est, fragiliores legere malint. ] Eadem Salix Americana & Candida Plin. Perticalis Colum. quae ad vinea um perticas etiamnum hodie locis quibusdam utitur. Scimus Fuchsum aliam pro alba Theophrast. intelligere, nempe flavam: verum ea non habet spissiores virgas nigrae, sed graciliores. Præterea omnia melius quadrat cum ea quam exhibemus.

An de hac Virgil?

*Glauca canentia fronde salicæ.*

Glauco sanè optimè quadrat. Fortè Perticalis Cordo, quāvis ad luteam referat. Salix candido vestita cortice, fragilis: Sic Andere Weyden, *weisse müde/Bruchweiden* Trago. An eadem Salicis, genus: *Bruchweiden*? V. *crispweiden*, sicut & Taber. vocat? An hanc Clus. intelligit in Pan. cūm ait: In Insula Danubij, quæ ē regione Pannonij est, altissimas & crassissimas Salices vidisse meminit: Maxima prægrandium Visci fruticum copia onusta. Et nos quoque iuxta Fontem frigidum, *Freidefontaine* Burgundis dictum oppidum, hanc ipsam Salicem, de qua hic agimus, nimulū fallimur, Visco resertant vidimus: ut hanc Clusium intelligere vix dubium sit. An Salix alba perticalis Hist. Lugd. cui potissimum conuenit quod tribuit Plin. lib. cap. 37. Cædura Salicis

denfioresse tonsura fertilitatem, & brevi ligno [ non pugno, ut mendosi Cod. ] verius quā ramo, &c. Primum genus Dalec. sententia, inquit Hist. Lugd. dicimus esse vulgarem Salicem, in magnam arborem clescentem, cortice candido, quæ Theophrast. & Plin. est Salix alba, prior, arborecens, & perticalis. Nec Fuchsi placet opinio, qui Salicem Theophr. albam Plinij Vitellinam, id est, flavam, esse putat: quoniam in flava Salice virgas *πυκνότερας*, spissiores, quā in nigra non videmus, vel ut quosdam legere diximus, *κατακτερας*, fragiliores: quas tamen habet alba Theophr. autore: sed tenuiores Plin. sententia, vel ut legendum censemus, firmiores.

Cæterū folia habet Salix hæc arborecens oblonga, angusta, Oleæ similia, supernè virentia, infernè candicantia.

Non displicet in H. Lugd. poni pro Salice hæc nostra figuram ex Matth. sub hoc titulo Salix alba Perticalis vulgaris.

Crescit in locis madidis, circum prata rigua maxime. Ex hac Lugdunum perticas longas advehunt pro hortis, *Maier* vocant. Observantur etiam circa Genevam, Basileam, Montbelgardum, & aliis multis locis.

### SALIX PYMILA ANGVSTIFOLIA, INFERNÆ LANVGINOSA: cuiusque varietas.

INVENTUR porro auctore Clusio in Pannonia & Austriæ quibusdam depectis cædiis sylvis & viginosis pratis, Salicis genus quoddam gracilibus & cubitibus interdum virgis assurgens, lentis, quæ à medio ad summum ramulorum, multas ferunt exiguas florum spicas, molles & incanas, maturitate in pappum & lanuginem abeunt: folia quā pumila angustifolia prona parte cinerea & postea describenda breviora, angustiora super è viridia, infernè canalanugine pubescent & splendent. Radix digitum crassa est, & tenuibus fibris prædita. Sed & virgula secundum summum radicis caput, quæ telluri coheret, subinde tenues & capillatas fibras agunt. Nec huic dissimilis, paulò tamen lauioribus folijs prædita, quæ passim in sabulosis Hollandiæ aggeribus Oceano adiectis inter gramina & spartum, *Salin* illis nuncupatum nascitur.

### SALIX ANGVSTIS ET LONGIS- SIMIS FOLIIS CRISPIS, tubus albicantibus.



VIRGAS cortex virecens obvehit, aut cineraceus, suntque ex longissima & simplicibus, nullis adnatis virgulis donatae, obsequioz admodum: Folia quæ longa admodum, angusta, & crebro agmine ramos stipantia, superius vireseunt, inferius cum nitore ad obiectum luminis vario canescunt, a nervo medio



medio obliquis in margines nervulis exporrectis, in ambitu crispata magna ex parte, quod pictor noster exprimeret neglectis.

In hoc genere excrementum Gallæ simile foliis adnatum observavimus. An Hist. Lugd. Salicis 6. genus: quod Dalech. Elæagnum arbitrat, in sabulosis nascentis propè rapidos amnes duntaxat, ut ad Rhodani ripas? An Clus. Pan. Vulgaris Salix, quæ foliis atque angustis, prona parte incanis? An verò Amerina ex qua corbes huius. Et hæc riguis gaudet locis & pratis, cuiusmodi in locis circa Montbelg. & in Ducatu VVirtemb. inter Bod. ubi admirabile balneum, & Wyssfleig observavimus, aliisque non paucis. Ex hac potissimum, quod vimina proferat longissima, sine adnatis, & lenta, plectantur quatili, sportula, vanni, cathedræ & anacinteria.

**SALIX TENVIOR, FOLIO MINORE.**  
VIRINQUE GLVERO,  
fragilis.



**SALICIS RACEMI SEV MI-**  
CAMENTA; ROSÆ ET CA-  
pitula squammata.



pes, nullamque progrediendi vim in se habens.

Ceteroqui notandum, quod in exteriori parte excrementi huius flosculorum lutei apices toto se proferant ambitu, exertique suis finibus conspiciantur, suis tamen longioribus petiolis excrementitiæ substantiæ toti involvantur, obteganturque. Observavimus quoque excrementum producere in ramulorum fastigio, Rosæ æmulum, foliis confertim stipatis compacte, partim hirsutis, partim glabris. Icon prior quam iam sculptam emimus minus placet. De hac sic Hist. Lugd. Dalech. Salicis quintum genus omnium brevissima, Helice fructifera, à nigra certè & alba diversa, quamvis pumilam in eo utroque genere, ut diximus, Theoph. esse tradat: virgas tenuissimas, maximèque exiles proferit, cortice subluteo vestitas. Huic folia paribus semper intervallis gemina, cum in aliis generibus temerè, nulloque ordine disposita sunt, candicantia sed non lanuginosa, brevissima, conferta, in ambitu minimè crenata, protuberante semper ad foliorum radicem velut novo aliorum conceptu, quod huic proprium est.

Porro sæpè foliis insident Vesicæ, quales in Vlmii foliis reperiuntur, subrubentes. Ramorum autem vertici foliosa capitula, delapsis iam foliis in arbore manentia. Quare hanc Salicem, ut autor est Theoph. fecundam esse Arcades existimarunt. Est enim hæc Salix Helice Theoph. eiusdem Dal. iudicio.

An Fuchsi. Salicis genus. Klein Weiden: Helix Theoph. Gallica Plin. & Colum. Gethero Salix minima Siler dicta. Haarweiden, in margine ad Cordum, dubitamus tamen an Cordus hanc nostram intellexerit.

An Anguil. Salix Helica Theoph. Virice Bondenium, ex qua sunt pulcherrimæ sportulae.

An Matth. Salices minuscule ac spectabili tenuitate, texendis canistris, cistellis ac calathis aptissimæ. An Clus. Pan. Salix angustifolia Pannoniæ genus peculiare, iuxta torrentes & udis locis nascentis, crasso caudice, & ramis in multos tenuiores frequenterque ramulos divisis præditum, quam vulgaris ea Salix, quæ foliis aliis angustis, prona parte incanis est. Eius, inquit ille, præterea folia, licet subtus canentia, supernè cum vitore alba quadam lanugine pubescent, angustiora sunt, in longiorem mucronem desinunt, frequentioraque in ramulis nascuntur. Flores item aliis generibus hmiiles, pallidi, semènque minutissimum, nigrum, candida, molli- que languine exceptum, levis auræ arbitrio huc illuc fertur. Solet etiam hæc Salix alià quadam notà à cæteris distingui, quod plerumque tuberculis quibusdam subrubentibus baphico cocco ferè similibus folia onerata habere conspiciatur. Viennatorrens, qui sub Viennæ urbe in Danubium influit ea maximè abundat.

An Gerardo in hist. Angl. Salix s; Rosæ Anglica: The English Rose Willow.

Passim in pratis & riguis fossis circa Basileam, in Ducatu VVirtemb. Alsatia, Brisacia ad Rhenum, Genevæ ad Rhodanum, Montbelgardi, ubi & in orto Principis tum hæc tum aliæ plures Salicis species Labyrinthum hortum efficiunt fossa aqua plena undique cinctum.

**SALIX PUMILA ANGUSTIFOLIA;**  
PRONA PARTE CINEREA.

Huic generi, notante Clus. graciliores sunt virgæ, ut plurimum pedales, nonnunquam

Excrementum rosæ æmulum.

Vesicæ.

Rosæ Salicæ.

Salix Helice Theoph.

Virice.

Salix Angustifolia. Plin. non, Clus.

Folia.

Flores. Semènque.

Tubercula.

Salix rosæ.

Locus.

Descriptio.

Folia.

Flor.

Radix.

Locus.



Radix digitalis, crassa, humidius, obliqua, nigra, & tenuis, fibris donata est.

Crescit in iudis castris sylvis infra Francofurtum ad Mœnum.

**SALIX HUMILIS REPENS**  
ANGUSTI FOLIA LOB.

Descriptio  
& locus.

Folia.  
Flores.

Icon.



herbaria studiosos hortamus, ut exactius describant & moneant, an alicui à nobis descriptis conveniat.

**SALIX LUTEA, TENUIOR, SALTIVA, VIMINEA.**

Descriptio

Cortex.  
Folia.

Sapor.

Varietas.

IN pulchras arbores adolescit hoc Salicis genus, quorum vimine, nullum nobis notum ligandis vitibus similibusque aptius, tanta est tamque lenta rupturæ secuta flexilitas, ut merito viminea *est* dici mereatur. Cortice integitur vitellini coloris, amaro. Folia rara, acuta, palmum circiter longa, semuncialia lata, supernè cum virore splendentia, glabra, incana, infernè nonnihil pilosa, potissimum superiora, exiguis per ambitum denticulis crenata, nullo manifesto amarore prædita, adstrictionem quandam præ se ferentia. Ab hac differre volunt Sa-

lierales duntaxat, recta, lentæ, subflavo cortice tecta. Vinctalia folia, sativi Lini foliorum modo angusta, supina parte viridia, prona verò cinerea, & cum novella adhuc sùs, omnino cana. Flos ut in vulgari flavescens, exigua, brevi, mollique spica ante folia nascitur, at in candidam deinde lanuginem resolvitur. Ra-



licem illi per omnia similem, cuius tantum cortex pallidior, & quæ non minoris usus, est minoris commendationis. Ex Fuchio figura nostra crenas parum feliciter exprimit, quæ obscuriores paulò, solè esse quam in Salice rubra. At in hac icone pinguntur veluti pili rigidi.

An Matthiol. Salices non tam proceræ, colore

rufescentes, sequacis lentitæ, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè finduntur. Talis sanè nostra hæc est. Salicis 2. genus, Berleiden & Bachweiden hoc est, Lutea & aquatica, eidem. Clusius Pan. scribit: Salicem vulgarem luteam sive pallidam Vngaris Saar sive vocari. Salix 4. Vitellina. Salix Græca Taber. qui & aquaticam cum Matth. vocat, cum tamen minus quam alta sit aquatica, etiamque nonnihil sicis locis proveniat. Hanc Fuch. Salicis 2. genus, Candidam Theophr. & Plinij Vitellinam, Columel. Græcam facit. At nos Candidam Theophr. non eandem censemus cum Plinij Vitellina, ut iam dictum sub Salice alba, foliis utrinque hirsutis. Stauimus tamen & nos Salicem hanc Vitellinam Plinij. Cordus etiam Totterweiden vocat, & eundem generum facere videtur, quando frequentem in Francia dicit, cum Perticalem, tum Viminalem. Tertij generis Salices luteæ Trago.

Hæc si quæ alia passim colitur ad vites & hortorum septa nec tendenda. Ex hac potissimum Labrynthus in horto E.C. Montbelgardeni nostra cura factus. In Alsatia potissimum circa Russicum etiamque circa Basileam proceras arbores quales alibi non vidimus, observavimus. Ramos crassiores præfectos contorquent & connectunt, ut deinceps veluti scalas ostendent, pluresque eiusmodi, annuatim sibi invicem incumbenibus, mirabili figura.

**SALIX SPONTANEA FRAGILIS**  
AMYGDALINO FOLIO, AVRICULATA & non anniculata.

SPONTANEA hæc Salix cortice obtegitur satiorubente raris albo, vehementi adstrictione cum levi amarore prædita. Folia longa, mediocriter lata, mucronata, lenticulata, tam supra quam infra, virentia & glabra, quorum pediculo brevi auriculæ binæ ctenatæ appositæ; sapor his potenter adstringens minus amarus quam luteæ. Virgule tenuiores flexum vix ferunt nisi torqueantur, maiores rumpuntur. Mirè ludit: folia modò auriculata, modò auriculis carent: cortice vestitur modò albo, modò purpurascente. Pictor vel potius sculptor paucorum foliorum crenas ritè expressit, reliquis ignoranter pilos affixit.

Descriptio  
Cortex  
Sapor.  
Folia.

Auricula

Sapor.

An





An Anguil. e-  
pist. 4. Siler arbor  
speciosus, hinc, fo-  
lius latioribus re-  
liquis Salicibus:  
Paravinis Salice  
aquatilis, ramis  
valde levis. Quod  
postremum sane  
huic nostræ non  
convenit.

Salicis 3. gen-  
us Dalech. pur-  
purea cortice ob-  
scure purpura-  
scente, quam es-  
santoloni, id est,  
cortice nigro  
amictam Theo-  
pl. rith. & Afiani  
vocant, Pl. Pur-  
puream: foliis ve-

nos. obscure virentibus, in ambitu serratis,  
ad folii cuiusque petiolum geminis semper fo-  
liolis subrotundis, quod peculiare nacta est.

In Hist. Lugd. supra figuram, Salix purpurea  
nigra viminalis. Quanquam minus viminea sit  
et vis plerisque, ut dictum.

Taber. duas proponit icones sine descriptione:  
Vtramque serrato folio: hoc titulo: Salix syl-  
vanfolia, Breit seilweiden: & Salix syl. angustifolia  
Schmal seilweiden. Prior huic nostræ re-  
spondet: posterior cui respondeat nescimus.

Sic & Gerardus utramque Tab. iconem, his no-  
minibus: 1. Salix, The common Willow. 2. Salix  
aquatica, The Cyar or Water Willow. Nec  
bene destituit eas.

Provenit hæc in fluminum labulis ripis, quæ  
præcipiti cursu vorticosa ruunt, ut Rhodani teste  
Dal. Observavimus etiam in valle fontium aci-  
dorum Gricebach cortice albo. Balfæ in dume-  
tis non uno loco. Montb. passim acervat in horto.

Hæc si Plinii purpurea sit, ut vult Dal. nec re-  
fragatur, viminibus texendis iam olim virgas tenues  
præbuit, quibus corbes, sportas, qualos, canistra,  
fiscinas & id genus alia utensilia vasæque consi-  
ciebant spectabili subtilitate.

### SALIX RUBRA MINIME FRAGILIS, FOLIO LONGO. ANGUSTO.



MAENIUS  
est hæc Sa-  
lix apud hortu-  
lanos, si quid li-  
gandum: cuius  
cortex intense  
rubet: folia ob-  
longa, acuta  
utrinque; glabra,  
sed subtus non-  
nihil candican-  
tia, argutis den-  
ticulis undique  
crenata. Vimen  
lentum, & ut li-  
ber, obsequio-  
sum. Huc perti-  
net Scilla varie-  
tas, quæ vulga-  
ter, cortice mi-  
nus rubente,

forte & foliis latioribus.

Nostra figura, quæ Fuchiana, minus bene cre-  
nas exprimit, cum pilos potius ostendat. Hæc  
Theoph. Salix nigra: & Salix Græca rubens, & ni-  
gra Ashe, eademque viminea purpurea Plin.

An Cordo Salix Gallica, Bar Weiden Sci-  
mus tamen Gesnerum hanc ad aliam speciem re-  
ferre.

Salix rubra Viminalis, Rote Bandweiden/  
Trago.

Salicis 1. genus, Rotweiden / Sabina & Ameri-  
na Colum. & Fuchio. Quanquam difficile sit  
iudicare an sit Sabina & Amerina, quum Colum.  
dicat rutilam esse: Plin. autem unum loco candi-  
dam faciat, altero nigram. Fortè ut nos, ita &  
Plinius varietates observavit.

Salices rubra Matthiol. Salicis 4. genus:  
Salix Phœnicophlebos sive phœnicea Hist. Lugd.  
quoddam eius cortex palmularum colorem refert:  
unde & nomen: folio purpureæ similis, minus  
serrato, ad cuius exortum nullæ foliorum appen-  
dices emergunt, quæ nota ab illa faciliè distingui-  
tur, viminum & virgarum parigracilitate.

Salix punicea Sabina, & Salix Viminalis, Ro-  
te Baumweiden Tabern.

An Clus. in Pan. Salix rubra, Vngaris dicta  
Siz-fa.

Et hæc passim in pratorum & hortorum mar-  
ginibus colitur. Est & spontanea, infrequens:  
Montbelgardi & Balfæ abundat.

### SALIX LATIFOLIA INFERNE HIRSUTA.



LATIFOLIA Descriptio.  
Salix ex fo-  
liorum argumē-  
to nobis dicta, cuius folia inter-  
dum palmum aut  
sesquipalmum lon-  
ga, latitudine  
quadrantali aut  
etiam palmari;  
nervosa, sunt &  
minora, pronā  
parte incana &  
hirsuta, supinā  
verò viridantia,  
sapore adstringē. Sapor.  
te line mortu aut  
amarote, pedi-  
culo semenciali  
cui sæpe auricu-  
la caule ample-  
ctentes adnata.

Catulos profert staminulis crocantibus plenos,  
quos leorsim fabre appinximus: quibus succe-  
dit in receptaculis racematim coherentibus la-  
nitium quoddam candidum. Vimina crassius-  
cula, incano hirsuto cortice amariante testæ,  
tuberculis aliquando ex dulcedine leviter adstrin-  
gentibus nodosa, fragilia. Interdum cortex veluti  
fuligine obductus videtur.

Hanc ex pictura potius quam descriptione a-  
pud Tragum agnoscas, quam postremum seu 4.  
Salicum genus facit, & Seilweiden vocat, quasi  
verò & ipsa viminis officium tam egregie præsteret,  
ut vox illa Seil, quæ funem denotat, insi-  
nuat. Rectius Gesnero Salix sylv. latifolia &  
Seilweiden dicta. Salix aquatica, Læb. Salix eu-  
porea.

Salix nigra  
Theoph.  
Græca Plin.  
viminea Plin.

Sabina,  
Amerina  
Calart.

Phœnicē  
phlœo.

Lœtus.

Descriptio.

Folia.

Sapor.

Auricula.

Catali.

Racemuli.

Lanatum.

Cortex.

Sapor.

Tragum

not.

Salix eu-

porea.

*prearorundifera*, Rind Schmelzen: & *Salix caprea latifolia* Breit groß Schmelzen Tabern. nam duas icones habet sine ulla descriptione, nec docet quā in re differant, nisi titulo tenuis & iconis. *Salix* sanē sita multū variat: nolumus tamen idē species temerē mulicicare, quod Arist. edicto cautum. Eundem sequitur Gerardus Anglus, & priorem *The Goate round Leafed Willow*: Posteriorē *The Goate broad Leafed Willow* vocat. An Angli. epist. p. 64. de hac: *Elæagnus* Theophr. apud quem pro *masia*, id est, Fraxino, legitur *masia*, id est, Pomus. Manifestē apparet similiorem Fraxino quā Pomus: verū non nihil pilosā. Flos similis Populo albā, sed minor. Fructum non fert. Invenitur in Vmbria in insulis, & in Abruzzo ad fluvium *Sanguine*. Patavinis *Zenigle* dicitur.

An de hac Clusius Hist. *Elæagnus* Theoph. nihil aliud videtur, quā *Salicis* genus, quod *Atrebates* *Salengre* nominant. An eidem in Pan. l. i. c. 27. *Salix latifolia* aquatica *Bečōrye* sa Vngaris dicta. An eidem ibid. c. 28. *Salicis* genus quod *Elæagnus* Theophr. censent. Item: An idem de hac in Hist. in fol. l. i. c. 21. *Elæagnus* Theoph. videtur *Salicis* genus esse: & aliquando illud esse existimavi, quod secundum aquas nascens, ampliora, candidioraque habet folia quā cætera *Salices*, ad Mali folium non nihil accedentia, sed longiora: florem seu iulum mollem, villosū, candidantem antē quā sese expandat, Populi albā iulo similem: Liguam reliquis *Salicibus* lentius, & ad multos usus utile. Omnia sanē pulcherrē huic nostræ *Salici* competere, nisi diceret liguam lentius: quod facit ut dubitemus, quā intelligat, nisi ipse fortē in ligni iudicio deceptus sit. Nec ausimus asserere de qua *Salice* scribat *Goropius* in *Adiaticis* l. i. p. 29. *Salix riparia* genus illud, quod folijs est, quā cætera alioribus *Wermenhent* nominatur &c. Hunc fruticem Theophr. *Elæagni* nomine descripsit, & flos ei Populi sed minor. Florem hoc loco Theophr. pro nucamento posuit &c. Nostri dubii occasio quod in præsentia, *Goropij* codex nobis non sit ad manus. quodque hæc nostra *Salix* cæteris non albidior videatur.

An Matth. hist. German. *Schilweiden* aut *Seizen*.

*Salix Platyphyllos*, sive *Leucophloeos*, id est *latifolia* & candido cortice, quā quidam pro *Elæagno* depinxere. In convallibus altissimorum montium & frigidissimorum Segusiani tractus, ad fontium scaturigines, & stagnantes in pratis rivulorum aquas huius generis arbuscula nascitur, velut abortiva, folijs tam exiguis, ut teruncio ampliora non sint, rotundis: conferum stipatis, superne ac inferne candicantibus & lanuginosis, toto frutice non altiore palmo, quem ob brevitatem, & ita compressam ramulculorum ac frondis congruem pro *Salice* vix agnoscas.

Porro in Hist. Lugd. duæ ponuntur figuræ eiusdem arboris: uni titulus: *Salix Platyphyllos* *Leucophloeos*: alteri *platyphyllos* *Leucophloeos* Dalech. quæ melius placet, quanquam neutra valdē bona sit.

Gignitur in solo macro arenoso, lapidoso quoque, eodem teste, sed udo, ad torrentium margines, & in sylvis umbrosis: præsertim quā collectis in lacunas aquis terra humescit, aut quā fontium scaturigines profiliunt. *Basilæ* propē *Leuzach*, etiamque in montibus vicinis: *Genevæ* in colle *Abbaux*: in valle *Griesbachiana* propē fontem

tes acidus: *Montbelgardi* passim & in horto *Labyrintheo* Principis. In *Alfatia* multis locis, aliisque Iuli Iulio conspiciuntur.

*Salix Platyphyllos*, notante Dalech. interiore Tempus. Vilius. cortice est rubro, quod huic generi proprium est, exteriore ad ligandum apto, ut ex ligno contulo, ac intorto. Quamobrem eo rusticis *Allobroges* lignorum fasciculos, quos venales in oppida comportant, vinciunt, ligno fragiliore quā *Salicis* primo loco à nobis descriptæ. Huius carbonis ad pulserum. citissimè ignem concipit. Quapropter ad pulverem excutiendis bellicis tormentis necessarium uritur. Præstat etiam delineandis iis, quæ pictores ante accuratam operam imitanda sibi proponunt. Carbo p. thorum.

### SALIX LATIFOLIA NON HIRSV. TA, CVM GALLIS.



Est & aliud Descriptio. *Salicis latifolia* genus, cuius folia non ad maximam prioris *Folia*, latitudinem accedunt, mediocribus tamen eius generis paria & serrata, verū nec supra nec subtus hirsuta, neque etiam candicantia, sed laevi glabritie viridantia, cortice Cortice vimen obtegente nigro: quæ ob id, nisi folia essent lata, ad nigram Theophr. Locum, referri posset. *Pilulis*.

Lugduni collegimus cum *Pilulis* in folijs.

### SALIX PYMILA LATIFOLIA PRIOR ET SECUNDA CLVS.



*Montium* Descriptio. *Merhola* & Locum. aperta iuga *pumilas* *Salices* alunt. Prior vultus habet minimi digiti crassitudine, humifusis, pedales, interdum etiam maiores, frequentibus præditas ramulis, qui sursum attolluntur, & inter graminia emergunt: uncialibus ferè folijs obfiti, superne viridibus & splendens, inferne subcinereis, & quodammodo Flores. canescentibus, non multum ab *similibus* *Vitis* Idææ. folijs. Fertea in tenellis ramulis flosculum.



*capitula.* rum molles spicas : quibus succedunt capitula ut in maiore & latifolia Salice, quæ maturæ aperiantur Augusto, mollemque lanuginem fundunt, in qua pusilla nigra grana latent. Radix admodum crassa est, pro plantæ tenuitate, crassique & oblique sparsis fibris firmata.

*Tempus fructuum.* Posterior similes fundit virgæ, humi etiam iacentes, nonnunquam paulo longiores, magis scabro cortice testas, & in frequentiores ramulos divisas, quas similia cum superiore folia ambiunt, magis mucronata, superne viridia, inferne splendentia, licet tenui lanugine pubescant. Huius florum spica sive iulus crassiusculus est, illi penè similis, qui in latifolia Salice nascitur. Radix cum superiore convenit, imò crassior quodammodo videtur, non minus quam illa dispersa, virgis etiam secundum radices caput interdum fibras agentibus. Describit Clus. sub Salicis pumilæ latifolæ prioris, & alterius pumilæ latifolæ titulis. *Salix pumila*, Klein Weiden Tab. *Salix*

*Latifolia.* 6. *humilis*, Theophr. Wido Gerardo. An Camer. apud Matth. hist. Germ. Erdweiden: *Salix latrepens*, quæ copiose reperitur in Sabaudia & Lugduni Gallorum.



ta, crassiuscula, rigidula, rugosa, venis sinuatis crebris à nervo medio exsertentibus, glabra utrinque, sed inferiore parte canescentia; superiore atroviorentia, pediculis satis longis: ad quorum imi animadvertere est fortuita capitula lanugine saligna plena. Subinde verò & privato indudentem furculo brevem similis iulus. Locus: Hæc aliquan-

do à nobis in Rhatius montibus collecta.

### SALIX PVMILA, FOLIO VTRINQUE GLABRO.

### DE SALICIBVS IN GENERE.

*criptio.*



*Folia.*

*capitula.*

*angulo.*

*ymna.*

*Locus.*

rentia, in duas retortas veluti corniculatas carinas dehiscentia, lanuginem candidam exhibent. Advers.

*Salix humilis repens* Pen. & Lob. Adv. & obs. Chameirea, Grundweiden Taber. ut videtur: ponit enim tantum icoriem, non describit, quemadmodum & eius simia Gerardus Anglus.

Crescit in monte Pilati Helvetiorum: montibus Sabaudia, Lhdunensibus & Vegeniis haud infrequens.

### SALIX PVMILA FOLIO ROTUNDO.

*criptio.*

*Folia.*

*V*ix humo se attollit palmatis ista Salix, ramulis prædita rubentibus, illisq; magnam partem nudis, quorum tamen fastigia plusecula coronant folia, valde concinna, ad cotoneæstri folia quodammodo accedentia, circinataz ferè undique rotunditatis, nonnihil tamen in oblongum por-

Tora. I.

*I*n genere autem quancumque Salix lutos, aquas, que desideret, ut scribit Theoph. idem tamen fitetur alibi in terra & aqua provenire Salicem. At Plin. non nisi aquosis provenire scribit, vimineas atque tantum intelligens & maiores illas species. Nam pumilas in montibus potissimum nasci diximus. Reliquas ferè in pratis & aquis.

Inter primas arbores germinat Salix. Iulos & Salicinis, flores æstatis initio aut etiam antè ostentat. Sæmina paulò pòst. Capitula & excrementa adventante autumno.

Citò nascuntur citòque occidunt Salices, minusque durant. Causam reddit Theoph. quòd ad aquas proveniant, quales arbores minus durare tradit, quam quæ in liciis. Eas tamen scribit dolationem ita tolerare, tam stantes quam à flatu prostratas, ut resurgant, vivant, regenerantur. At illam quam Philippis surrexisse superstitionis prodiit, ramis quidem detuncatam fuisse ait, sed non circudolatam, Aruspiceq; tunc persuasisse, ut sacrificarent, custodirentque arborem, ut quæ ostentum faustum portenderet. Quasi verò causa non fuerit aut esse potuerit, quòd arbor prostrata partè altèrâ plurimum terre evulserit: mox venticingentes vel ramis occurrentes eam erexerint, ut ipse Theophrast. coniectatur, vel sanè opposita parte terram radici accumulando restibilem ita fecerint. Quancumque si unica tantum radix eiusmodi arborem promptè germinantium ac nascentium in terra restet, sufficere queat quæ totam arborem conservet & in integrum restituat. Sic habes superstitionis illius causam physicam, nupspiam in talibus prætereundam; ubi eam consequi licet.

Est sanè Salix ex eorum genere quæ commo-Satio dissimè omni facionis modo seruntur. Nam & semine nasci à Trago observatum & proditum. Quod non penitus ignorasse videtur Theophr. qui scribit: Eas quas steriles quidam putant, generare quosdam dicere, ut Salicem &c.

Idem optimè notavit, Salicem avulsione satam celeritè ac pulcherrimè germinare: aut etiam si quis pergrandem & iam arborem tran-

*Salix frum.*  
*visera.*

T

*Tr. inflatio.* stulerit; optimè perdurare posse. Habétque Salix hanc naturæ prerogativam, præter illam quam à semine, surculo, talea & radice habet.

*Serendi modus.* Est verò Salix eiusmodi, ut non propter se feratur, sed propter alia sit, ac vineas maximè. Earum satio sit loco madido: tamen præcipiente Plinio, duos pedes & semipedem, talea sesquipedali, vel pertica, [Talea in viminâli: pertica in arborecente] qua utilior, quò plenior. Intervallo esse debent pedes sem. Trimæ pedibus binis à terra putatione coëscantur, ut sic se in latitudinem fundant, ac sine scalis tondeantur.

*Salix enim secundum est, quò terra propior.*

Has quoque omnibus annis confodi [circumfodi Dal. sed quid iuvat circumfodi apud nos sua sponte vberè nascentes? Vide quæ mox dicentur, configi habet M.S.] Hæc est viminabum cultura [quibus verbis cognoscis priorem lectionem veriorem.] Perticalis & virgæ & talea feritur fossura eadem. Perticas ex ea cædi iustum est, quarto ferè anno.

*Plin. emend.* Et ex [Viminales potius quàm Perticales] fenescientium propagine refarciantur locum, pertica immerfa, ac post annum recisa [à parente ubi radicem egerit.] Salicis viminalis iugera singula sufficiunt XXV Vineæ iugerbis. Hæc Plin. qui & alibi, Salicem circa Martias Calendas in humidis virga feri iubet.

*Serendi tempus.* Colum. eodem tempore circa vineam feri suadet, quòd palmitibus idonea præbeat vincula. Eandem, eodem autore, rignus ager, vel uliginosus optimè, nec incommodè tamen alit planus & pinguis: atque is debet converti bipalio. Omnes vel acuminibus vel taleis deponuntur, perticæ cæcuminum modicæ plenitudinis, quæ tamen dipondiarj orbiculi crassitudinem non excedant. Optimè panguntur eò usque dum ad solidum demittantur. Taleæ sesquipedales terreo immergæ paululum obruntur. Rignus locus spatia laxiora desiderat eaque senum pedum per quinque rectè faciunt: siccanæ spissiora, sic, ut sit facilis accessus colentibus eos. Quinque pedum interordinia esse abundè est, ut tamen in ipsa linea conficionis alterna vacuis intermissis bipedaneis spatiis consistant semina. Satio earum est prius quàm germinant, dum silent virgæ, quàs arboribus detrahi siccas conveniet. Nam rosidas si recideris, parùm prosperè proveniunt. Ideò pluvij dies in exputanda Salice vitantur. Fodienda sunt primo tritæno salicæ crebrius, ut novella vineta: cum deinde coaluerint, tribus fossuris contenta sunt: aliter cultura celerriter deficiunt. Hæc Colum. Sed nostri nec hanc quidem curam adhibent, tùm quòd Germaniæ loca feracissima sunt, tùm verò quòd depactæ virgæ perbellè germinant loco commodo, etiam nulla adhibita cultura. Nam quamvis adhibeatur cura, testante eodem Columel. plurimæ Salices intereunt, quarum in loco ex propinquo mergis propagari debent, curvatis & defossis cæcuminibus, quibus restituantur, quicquid intercidit. Anniculus deinde mergus decidatur à stirpe, ut suis radicibus, tanquam vitis, ali possit. Constant. etiam Februario plantat, clava & taleis loco cænofo & aquoso. Accedamus ad Salicum vires.

*Sationis intervalla.*

*Quales virgæ esse conveniant.*

*Qua dies eligenda sit satio.*

*Salix culturarum curam exspectant.*

*Propagatio.*

*Salicis vires & usus.*

*Vires.*

*Sangu. spum.*

to subactus, callos clavosque illi tollit. Ex fo- *Calci. clavi.*  
lus & cortice succus cum rosaceo in Calyce Pa- *Aurum dalar.*  
nici calefactus, aurium doloribus auxiliatur. Sed *Puls. g.*  
& eorum decocto foveri podagras utilissimum. *Puls. g.*  
Id furfures quoque detergit. Excipitur & ex ipsa *Succus Sa-*  
succus, inciso durg florè cortice: intus enim *lich.*  
concretus continetur: qui ad purganda ea quæ *Caligo o-*  
obstant oculis suam vim præfert. *cul.*

Eiusmodi succi Salicis, è plaga manantis exci- *Succus vi-*  
so cortice, mentionem quoque, ut dicebamus, fa- *plex.*  
cit Plin. sed duorum aliorum succi generum præ-  
terea meminit, nempe eius quem arbor ipsa exu-  
dat gummi modo, & eius qui detractione ramo-  
rum à Salice destillat. De quorum viribus  
& Salicis ipsius sic tradit. Corticis è ramis pri-  
mis cinis, clavum & callum aqua [aceto Diolc.]  
mista sanat. Vitiæ cutis in facie emendat, mag-  
is admisso succo suo: qui trium generum &c.  
ut supra. Qui è plaga manat cùm florèt, ad ex-  
purganda valet quæ obstant oculis: item ad spif-  
landa, quæ opus sunt, ciendàmque urinam, &  
ad omnes collectiones intus extrahendas. Om-  
nes verò vel unus prædictorum liquorum in caly-  
ce Punici calefactus, auribus infunditur, vel foli-  
a cocta, vel cum cera trita imponuntur: item  
podagris. Cortice & folijs in vino decoctis  
foveri nervos utilissimum. Flos tritus cum foli-  
is furfures purgat in facie. Folia contrita & po-  
ta intemperantiam libidinis coërcent, atque in  
totum auferunt usum sapijis sumpta. Amerinæ  
nigræ semen cum spuma argenti pari pondere, &  
balneo illitum, psilothrum est.

Salicis folijs, autore Galeno, ad cruentorum  
vulnorum glutinationem usq. possit: Verùm flori-  
bus eius maximè propè omnes utuntur medici  
ad exiccantis emplastri præparationem. Est enim  
vis eorum ita delicatiora, ut morsu abstineat.  
Habet verò etiam quandam adstringentem. Sunt  
etiam qui succum ex ea expressum, medicamen-  
tervent, mordacitatis expert, & exicatorium,  
ad multas res utile. Haud enim invenias quid, ad  
plures res utilius, medicamento citra mordacita-  
tem exiccante, quòd paulùm etiam adstringat.  
Porro arboris cortex similem facultatem obtinet,  
tùm floribus, tùm folijs, nisi quòd temperaturæ  
sit siccioris, sicut omnes profectò cortices. Sed  
hunc quidam comburunt, eisque cinere utuntur,  
ad ea omnia quæ valenter desiccare oportet:  
quo clavos, callos, Gæcis πῆλοι, myrmecias  
tollunt aceto ipsum macerantes. Nonnulli autem  
dum florèt Salix corticem eius incidunt, &  
succum quandam colligunt, utunturque ad ea  
quæ pupillas offuscant, extergente videlicet si-  
mulque tenuium partium medicamine. Vti ue-  
rò ad alia multa quis possit, siquidem talis fue-  
rit.

Salicis Amerinæ folia, ut scribit Hip. cum ni-  
gro vino pota, ad vulvæ purgamenta faciunt.  
Eadem, tradente Ægineta, probè trita, & in a-  
ceto cocta, non solum incipientes agylopos, sed  
etiam in vomica mutatas persanant: rumpuntq;  
& usque ad os penetrant. Quo usu non solum Æ-  
gylopos, sed etiam Anchilopos curabis. Folia ex  
aqua decocta, donec colorem immutaverint,  
Trallianus in anginis ad gargariandum dabit:  
Nam crassa avellunt, iuvantque.

Serapio ex diversorum autoritate atque placi-  
tis tradit: Salicem à proprietate quadam extra-  
here sanguifugas adherentes gutturi: glutinare  
vulnera recentia: conferre fluxui sanguinis, fru-  
ctum & folia esse stiptica sine vellicatione, vique  
quadam occultâ siccare: decoctum ex aqua cly-  
stere

*Succus vi-*

*Vitiæ cu-*

*Vitiæ cu-*

*Podagris.*

*Contra-*

*psilothrum*

*Emplastr.*

*Succum.*

*Myrmecias*

*Vulvæ pur-*

*Agrylopos*

*Anchilopos*

*Angina.*

*Sanguifuga.*

*Vulnera.*

*Stiptica.*

*Clystere.*



stere iniectum, sanguinis excretionem cohibere: auribus infitum, tergere saniem: glutinare ulcera magna, atque potentius si bibatur cum vino styptico nigro: & quando ex folio eius recentit fit emplastrum, conferre fluxui sanguinis undecunque exeat.

Cinis Salicis, eradicat verrucas illitus cum aceto, autore Avic. Eiusdem, summitates cum aqua propria sedant dolorem capitis: [Sodam] eiusque succo nihil præstantius in sanie aurium. Percussis oculis luli ex aqua decocti benè faciunt. Eiusdem aqua confert obstructioni hepatis atque ictero.

Serenus Salicis usum non reticuit, præsertim ad furfures faciei hoc carmine.

*Frans Salicis cum flore suo contrita medetur.*

Eiusdem folia cum ramis in cubiculis strata, aërem infrigidant, & infirmantium ardores mitigant. In quem usum hinc infelicitate etiamnum in Italia & Gallia quibusdam locis adhberi observavimus. Cortex radice Salicis barbam conservat, & nigram facit cum oleo dissolutus. Scillorum capillorum curantur cum mucilagine Pyllyi, Altheæ, & foliorum Salicis, tradente Bayro. Salicis folia cum alius refrigerantibus aqua incocta ad lationes pedum febricitantibus conducunt. Ex eiusdem ligno & bacillis rasori parantur ad abradendam & emundandam linguam Caulo & febribus ardentibus laborantium, notante Camer. Vulgus B. abriteriorum indifferendum Breune vocat, & in ea lingua abrasione præcipuum curam inceptè collocat, magno profectò agrotantium periculo, si interioribus non prospiciant. Breur e namque Germ. dicta seu nigredo & scabrities linguæ, Symptoma tantum est febrim ardentium, maxime Causi & febris Hungarica.

Salicis luli ac fructus, pabulo pecudum admixti, ipsa pinguefaciunt, autore Democrito.

Porro tam Theoph. quam Plin. frigidissima dicunt quæcunque aquatica, tenuissimæque [potissimum Salicem, & idem sentis faciendis aptissimam] quorum plaga contrahit se protinus, cluditque suum vulnus, & ob id contumaciis transmittit ferrum: & quod levissimum sit Sal. lignum, utilitatem eandem ingeminat. Habet etiam candorem rigoremque, & in sculpturis facilitatem. Nihilominus tamen lentissima comodissime inservit ad cistas, corbes, cunas & eiusmodi reliqua, quæ flexili crate constant: hæcque nullam aquaticam utiliore dicit Plin. Caterùm usus tùm quotidianus, tùm villicos nihil attinet hic recensere, cum multi sint qui texendis è cortice etiamque virgis corbis & piscatorum natis victum suum quaerunt: quæ omnia abundè cantilena illa Germanica de concertatione Buxi & Salicis confirmata, uti notat Tragus, docere potest.


Caster animal amphibion, dum in aquis degit, Salicibus gaudet: in his enim, vel potius sub harum radicibus habitationem sibi ædificat in fluminum ripis.

Theoph. Paracels. notat nonnullos foliorum Salicum succum cum Mercurio in cineribus tenuisse, [ad exoptatam illam metamorphosin metallorum in aurum] sed nullo fructu.

Restat & id explicandum, cur *Salix* & *Arabo* & *Aginetæ* & *Arabo* dicatur Salix: An quia fructum proprium, perdit ante maturitatem, ut Theoph. Plin. Democritus, Porphyrius, referente Scobæo, & Conf. statuunt: An verò quia Veneri resistit, ac sterilitatem inferunt folia, conceptumque impediunt, ut Diosc. tradit. Quod & Plin. ait, his verbis: Folia contrita & pota intempe-

rantiam libidinis coercent: atque in totum auferunt ipsam sapientis sumpta. At alio loco idipsum semini tribuit, cum ait: Salicis semen mulieri sterilitatis medicamentum esse. Quare, fieri potest ut *Arabo* & *Aginetæ* dicta sit Homero, non tantum quod ocysimè semen amittat, antequam omnino maturitatem sentiat, uti voluit Theophrast. (quod tamen non in omnibus verum, uti dictum) sed & quod viri semen ita infecundum reddat, ut à femina non concipiatur. Nam & *Arabo* semen humanum *Aginetæ* dici potest, haud secus ac mulierem gravidam *Aginetæ*, & Venerem fecundam *Aginetæ* dixere, notante Saraceno. Gal. sanè quoque eumque sequenti Paul. & Aëtius hoc Salicis semen *Aginetæ* Theophrast. & Diosc. dictum, florem solum appellare videntur, quasi feminis nomen minime mereatur, quancquam revera pleræque semina quoque ferant, quod boni illi viri cum plerique præcis ignorasse videntur.

SALSIF SYRORVM, SALICIS SPECIES, ET ELAAGNUS.



sicut Cypriota: Et quibus primo vere Hosculi mollicelli ac lanuginosi pendent, pallidi, Populæorum æmuli, naturæ sicciore iucundi odoris. Hos legunt incolæ, eò quod nullum ferant fructum, & ex iis aquam Cardiacam pretiosissimam eliciunt.

Rauvolff. Elaagnon Theoph. non modò Salsif Syrorum similem dicit, sed eam etiam censeri posse. At lib. 4. apertè Elaagnon Theophrast. facit. Et Clus. *Elaagnon* Theophrast. inquit, aliquando existimavi Salicem latifoliam: sed Rauvolff. Salsif ad Elaagni historiam magis accedere videtur. Elaagni autem descriptionem ex Theophrasto posuimus cap. de Agno sive Vitice.

Idem Rauvolff. ait esse *Arabo* & *Aginetæ*. Eiusdem iudicio Salsif est *Zarnab* & *Zarnabum* Arabum, ut Rhafi cap. 353. & Avic. cap. 749. Scrapion verò cap. 26. communì nomine *Zurumbeth*: cui & nos subscribimus. In nostro Cod. Scrap. de simpl. cap. 261. sic legitur: *Zurumbeth*: Galenus in translatione Arabica, *Zarich* adhibet est *Zurumbeth*, è numero specierum odoratarum: ideòque admiscetur confectionibus aromaticis: estque calidum & siccum propè tertium

Plinius dicit. Aut orum indicium.

Descriptio Salicis fœci.

Scularis quædam species Halapi proveniens, Salsif incolis dicta autore Rauvolffio, magnitudine variat, Betulæ similis trunco, ramis, frondibusque. Virgæ longæ, graciles, molles & ex pallido flavescentes. Surculis mollicellis folia harent viticis. E ramis gemma spithamea hinc inde prodeunt, haud secus ferè, ac in

Flores. Folia.

Aqua Cardiac. Elaagnus Theoph.

Arabi. Zarnab. Zurumbeth. Scrap.

*Substitutū* gradum, virtute sua similis Cassia lignea & Cu-  
*Cinam.* bebis. Cassidonium pro Cinnamomo substituit  
Zurumbeth. Isaaco tradente, arbor est magna,  
nascens in montibus Lubnae, id est, in Oriente,  
nullum ferens fructum: foliis longis, colore in-  
*Descriptio* ter viridem & citrinum, Salicis similibus, eius-  
*apud Se-* demque coloris sunt sami: odore Citri: estque  
*rap.* calida & sicca, styptica, resolvit & stringit ven-  
*Temper.* trem [quid hoc est dicere? nisi fortè ut Rhabar-  
barum, diversarum sit partium: solvat, hoc est, ab-  
stergat: & adstringat: nam ut mox sequitur] Me-  
seah ei stypticatatem tribuit & simul cum ea e-  
tiam subtilitatem & caliditatem, & vim adstring-  
endi ventrem. Mesarugea eius virtutem similem  
dicit Nucis moschatae, sed esse subtiliorem eā.  
*Virid.* Sternutatorium ex ea & oleo violaceo, conferre  
*Dolor cap.* dolori capitis frigido & humido. Prodesse ean-  
*Stomachus.* dem stomacho & hepati propter vim suam aro-  
*hepar.* maticam.

At apud Avic. Zurumbet est lignum simile Cy-  
pero, sed maius, & minus odoratum: calidum &  
accum orisve terreo: resolvit flatum, impin-  
guat, auferit odorem vini, alliorum & ceparum:  
Cor exiliat & confortat: compescit vomitum:  
adstringit muliebris, & matricis ventositates car-  
minat: resistit moribus vermium venenatorum,  
qua vi accedit ad Zedoariam.

In Rhafi nostro, non praedicto loco, sed ea de  
re Medica, Zarnab calidum esse & siccum legi-  
mus, stomacho & hepati frigidis conferre, ven-  
treque adtingere.

Quae Serapio primo loco dicit ex Galieno cove-  
niri, cum Arnabone Pauli Aeg. l. 7. c. 3. ubi ait: Arnab-  
o ex aromaticis est, unde maxime in unguenta  
miscetur, ut qui calida ac sicca sit facultatis in-  
tertio ordine, Cassiae ac Carpesii similis. Vnde  
etiam Posidonius Cinnamomo non praesente, hoc  
usum se esse dicit.

*Elaeagni equiva.*

**P**ATER Salsif & alia plantae putantur esse  
Elaeagnos: ut *Salix latifolia*, de qua ante cap.  
de Salice. Marcellus scribit: Viticem notam om-  
*Salix latifolia.* nibus & ubique plantam esse Elaeagnon Theoph.  
Verum qui verba Theophr. diligenter conside-  
raverit, compertiet multa non convenire cum A-  
gno seu Vitice. Lob. & Penz. vitex est Elaeagnus  
Theoph. Quidam Gale fruticem Septentriona-  
lium Elaeagnon faciunt, de quo pōst. Nos verò  
capite de Zizipha alba docuimus eam non esse  
Elaeagnon, ut quidam putant.

Ceterum notent incauti, *Salsifras* non eandem  
esse arborem cum *Salsif*.

#### DE ZARNABO SPECIALIV'S. ET ARNABO.

**Q**UANDO QUIDEM variae plantae exhibentur  
pro Zarnabo, lubet earum hoc loco mentio-  
nem facere.

Gesl. in Epist. ad Gm. Matthiolus, inquit, in  
Serapione duo capita de diversis Zurumbet con-  
fundit: posterius sanè videtur Carpesium & Zar-  
nabo ab Avic. dicitur. Ac sic è contrā.

Matth. in epist. ad Fallop. Si Pauli Arnabonem  
& Avic. Zarnabum rectè expendamus, nil aliud  
verius representabunt quàm postremum Sera-  
pionis Zurumbetum. Quamobrem manifestè  
hallucinatur Gesnerus, dum falsò in Zurumbeto  
me accusat: quippe qui existimat posterius Se-  
rapionis Zurumbetum esse Carpesium, &c.

Idem etiam Matthiodus comm. in Diosc. de Ar-  
nabone sic tradit. Non desunt, inquit, qui credi-  
derunt, inter alios Cordus, quoddam Arnabo, de quo  
scribit Paulus, & Mauritanorum Zedoaria, vñ &  
idem referant medicamentum: Verum Sera-  
pionis testimonio cap. 271. Arnabo apud Graecos  
nihil aliud designat quàm Zurumbet apud A-  
rabes: quippe quoddam hoc loco de zurumbet eadem  
scribat Serapio, quae de Arnabone ante ipsi adno-  
tavit Paulus. Hallucinatur autem Brunfelsius in  
suo Onomastico scribens Arnabonem esse unguen-  
tum odoratum: verum eius lapsus causam fuisse  
arbitror, quod oscitanter Paulum legerit: nam  
Paulus apertissimè asserit, Arnabonem vngu-  
entis expeti: quoddam suaviter oleat, non autem un-  
guentum esse, ut Brunfelsius somniasse videtur.

Guilandin Theone: Zurumbet & Gesnerus  
Corpesium malè. Avicennae Zarnabum dicitur. A-  
ctuario Carnabum seu Carnabadium, vel Zarnabum,  
& Zarnabadium: ut obiter Rhizomastiges istos ri-  
deam, Carnabadium apud Galianum Basilum, &  
Myrsinum. Cuminum Aethiopicum esse nescien-  
tes. Rhafi Zarnab.

Gronem. l. 1. comp. med. super El. de Gem. V-  
nus, inquit, Aduarius, [ex Cræcis] quod equi-  
dem memini, Doronicum, id est, Carnabadium  
& Zarnabi habet. Gesl. in catal. plant. Zarna-  
bum, sive Parnabadium: vide Doronicum, *Capit.*  
*sed dicit.* Quidam existimant Doronicum Roma-  
num apothecariorum: mihi non placet. De Doroni-  
co vero suo proprio loco, & capite. Rauvolff.  
parte 4. Itiner. ad figuram N. 112. Peregrina Salicis  
species, incolis Salsaf. Arab. Zarnab, Zarna-  
bum, Zurumbeth. Theoph. Oleagnus: Aeginetæ  
Arnabo. Ceteriora inquirant posterii. Nunc ad-  
tum patefecisse satis esto: Pauli verba de Arnabo-  
ne ante posita sunt. Scribit Iul. Scalig. in Exerc.  
Arnabonem Pauli, Zedoariam nonnullos, alios  
Zurumbet Arabum esse arbitrari, parvi verò utrū  
si referre. Neutrum tamen esse patere ex Avic.  
qui tria facit capita separata. De Zedoaria pluri-  
bus Arnabo putata egimus lib. 19. Pandectario  
Arnabum est arbor magna fruticans, quae est Vl-  
mus, ut Hortus facis testatur, ubi pro icone  
figmentum nullo modo referens Vlinum, ha-  
bet.

#### CALAF, SEV BAN ALPINI. CAP. XXI.



**A**RBYSCV-  
LA fruti-  
cosa est Alpino  
Calaf seu Ban,  
quae quidem, in-  
quit, mea sen-  
tentia Salicis ge-  
nus existit, foliis  
aliquatenus Sa-  
lici similis, sed  
multò maiori-  
bus, quippe lon-  
gioribus ac la-  
tioribus. Flores  
eius sunt qui-  
dam globuli ob-  
longi, albi, lan-  
uginosi, caudici  
penès fo-  
liorum radi-  
ces adnascētes: quor-

Descriptio

Salicis  
nus.  
Folia.

Flora.



quotque in arbore folia existunt, tot flores emit-  
tit. Crescit ad Vitis magnitudinem ramis mul-  
tis, sive stolonibus, rectis. In Ægypto reperit-  
tur locisque humidis nascitur. Hæcille.

Scribit Bellun. in interpret. Arabiorum no-  
minum. *Chalef* esse speciem Salicis in humidis na-  
scentem: folia ei esse Cerasi similia, sed fructus  
non ferre. Flores ineunte vere valde esse odo-  
riferos, ante folia prodire, ex quibus eliciatur  
aqua suaviter olens, cuius frequens sit usus in  
affectibus cardiacis calidis. Atque ex iisdem in-  
fusis, admixtis amygdalis, fieri Oleum *Chalef*, si-  
cut Violaceum.


Alpinus quoque tradit ex floribus destilla-  
ri aquam *Masahalef* vocatam, cuius insignes vi-  
res deperdicat ad accendendam putredinem & ad  
siccandum, ad Venena, & ad cor rececandum.  
Eumque in febrib. pestilentibus secreti loco haberi  
ad capitis dolores, ac ad virium recreationem,  
quin & ipsam putredini ac venenis obistere:  
Esseque eorum florum decoctum, ac ex aqua  
dilutum in quibusvis febribus maximo apud ip-  
sos in usu.

### GARB MAVRORVM, SALI- CIS GENVS.

Crupio.

Cortex.

Folia.



Tempera.

Garb.

Fer.

Arabico.

Garab.

Arabic.

Aphroni-

um ad

marium

ulcerem.

**A**rbor Garb  
Mauris di-  
cta, autore Rau-  
volffio, patula  
est, haud tamen  
multum allur-  
gens: Cuius fur-  
culi extremi te-  
neriores fragi-  
lioresque quam  
ut Salicum no-  
stratum instat  
Vimineo operi  
intervit queat.  
Cortex ex palli-  
do flavescit, si-  
cut & folia, quæ  
oblonga Palmi  
circiter, duos  
digitos lata, per  
ambitum velut  
Atriplicis folia

sinuata, modicè siccant & adstringente faculta-  
te. Fructum & florem se vidisse negat. Sali-  
cis genus idem facti, & incolis iuxta antiquum  
nomen Garb dici tradit: Persanis Fer. Aethiopi-  
bus verò quoque hiberno seculo sub antiquo  
Arabico vocabulo Garb dici de quo Psal. 137.  
Ein frömbd Weiden geschlecht Germ. eadem.

Interpretes verò convertunt *Salicem*.

Apud Avic. scribitur *Garab*, id est, *Salix*. An-  
notat autem in marg. Bellū. Garab esse arborem ma-  
gnam nascentem iuxta Euphratem fluvium. In  
explicatione tamen vocum Arabicarum nihil ha-  
bet de ea voce.

At Rauvolff. scribit, ex ea Aphronitrum, Salem  
Petra vocant, opimum fieri ignario pulveri pa-  
rando quo in bellicis tormentis, pilis excutendis  
utuntur. Surculos scilicet extremos cum foliis  
in cinerem comburi, affusaque aqua macerari,  
separari & multa ebullitione coagulati. Sed pul-  
verem illum nostrati haud æquivalere. Simi-  
le quiddam Plin. l. 21. cap. 10. de Quercubus [has  
fortè arbores intelligens, quippe Quercubus

Tom. I.

quodammodo similes, eodem coniectante] tra-  
dit, ex quibus nitrum parari solitum: cum tem-  
pore autem exolevisse scribit. Cæterum Avic.  
suo *Garab* easdem penè vires tribuit quas *Salici*.  
Corticem eius quoque in usum venire scribit &  
gumi quod incisione effluit. Florem & folia, ac  
utriusque succum exicare sine mordicatione,  
habere tamen adstrictionem quandam. Eiusdem,  
que naturæ esse corticem, sed siccioris. Cine-  
rem ligni cum aceto verrucas & clavos omnis ge-  
neris tollere. Cortice radices tingi capillos. Eun-  
dem cum foliis contulsum commodè imponi  
vulneribus recentibus, ac ulceribus, totumque  
podagram. Succum foliorum cum oleo ros. in  
cortice Granati ebullitum & auri instillatum con-  
ferre dolori eius: corticis decocto abstergi furfu-  
res. Gummi & florem obscuritatem visus tollere.  
Aque etiam succum eiusdem extrahere sangui-  
gas: Quæ omnia & Salici competere ex ante di-  
ctis patet.

Vires Vitis.

Gummi.

Tempera.

Verruca.

Capit. tim-

tura.

Vulnera.

Vicera.

Podagra.

### SPODIUM ARABVM, ET TABAXIR.

#### CAP. XXII.

**T**Abaxir videtur aliquid commune habere  
cum Salicibus: unde sit ut hoc loco collo-  
candum censuimus; prius tamen dictum de Spo-  
dio Arabum.

Rhazis lib. 3. cap. 36. Spodium [Tabaxir Garc.]  
frigidum est & siccum. Febribus acutis, siti, ac  
humio ventris fluxui & vomitui confert: pustulis  
quoque quæ in ore & lingua nascuntur, atque  
in mori cordis auxiliatur.

Avic. lib. 2. tr. c. 617. Spodium [Tabaxir Bel-  
lun.] Radices Alcanthæ [vide paulò post] adu-  
str. Dicuntur aduri frictione extremitatum, cum  
eis perflatur ventus. Frigidum est in 2 & siccum in  
3 gradu. Adstringit, parum resolvit, sed pluri-  
mum refrigerat. Resolvit autem ob amarorem  
exiguum, quem habet. Quæ resolutio cum astri-  
ctione efficiunt, ut valde siccet: estque mixta vir-  
tutis, sicut Rosa. Confert Alcola & Melancholia  
provenient ex sollicitudine: Item apostematibus  
oculorum calidis: roborat cor, & benè facit ei in  
tremore à causa calida, & syncopi factæ ab effu-  
sione bilis in stomachum, tam haustum quam il-  
litum: timori præteritorum & timori futurorum  
obviat: compescit sitim & inflammationem  
stomachi, debilemque erigit: prohibet effusionem  
bilis in eum, turbatum sedat. Effusiones chole-  
ricas refrænat, febresque acutas. Est autem Al-  
canna, [ut explicat Bellū. interp. Arab. nomi-  
num apud Avic.] seu Alcona arbor gracilis, lon-  
ga, habens internodia sicut Canna: sed differt ab  
ea, quod Alcanna non sit cava: eaque utuntur  
Arabes loco lancearum. Reperiuntur & arbores  
crassæ, ex quibus conficiuntur vasa magna utilia.  
Fitigitur Spodium maxime ex radicibus arborum  
prædictarum gracilium combustis.

Serap. c. 332. Sataiscir [Tabaxir Garc. leg. putat,  
vel Rescius, id est, Spodium, Confert caliditati  
cholerae. In Spodio est resolutio & prohibitio,  
& repercussio, & infusio: sed infusio  
eius præstat: estque in sapore eius amaritu-  
do & stypticitas, ideoque desiccant. Non  
tamen tantum adstringit sicut Rosa. Diosc. Spo-  
dium confert apostematibus calidis oculorum.  
Secundum Meschah, frigidum est in 3, & siccum  
in 2 gradu &c. Vbi autem Gal. de Spodio

Infusurum.

Spodium.

Vires.

Febres.

Alcola.

Melancholia.

Alcanna.

Alcona.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

Alcanna.

F 3

*Serap. et  
per.*

scripserit ea quæ citantur à Serap. nos latet. Præterea Spodium Dioscor. confundit cum Spodio Arabum: nec facile ex Arabum scriptis affirmari potest videtur quid sit *Tabaxir*: nam ex prædictis patet, quàm variè de eo scribant.

*Spodium  
Græcorum  
non est s.  
dem cum  
Spodio Ara-  
bum.*

Notandum verò Spodium Græcorum non esse idem cum Spodio Arabum. Græcorum enim utraque Monachi, per os non sumitur. Solus Aethiops & quidam Græcorum ferè novissimus in medicinis ex Arabum scriptis desumptis Spodium præferunt. At Spodium Arabum ut plurimum exhibetur per os in Confect. & Elect. coratibus.

*Spodium  
Aethiops.*

Averr. tradit Spodium esse carbonem nodorum arundinum Indiæ advilatum, &c. Atq; et-

iam hodie multi *Spodium de Canna* vocant.

*Alcanna* seu *Alcanna* Bellunenſis est arbor ex qua Spodium, diversa ab Avic. & Serap. *Alcanna* quæ Cyprus, autoribus iisdem Monachis, qui coniectantur Avic. sumpsisse ex Serap. quæ de Spodio scriptis. In compositionibus autem Arabum, & præcipue in iis, quæ per os sumuntur, per Spodium non est intelligendum Spodium Græcorum, ut nonnulli ex iunioribus declarant.

*Cyprii  
Iuniorum  
error.*

Manardus existimat Spodium factum ex radicibus Cannarum adustis esse unum ex Antispodis Dioscor. Unde nec manent inferunt prædicti Monachi. Ergo est Antispodium, quare præcipit, ut non admittatur in compositionibus.

*Spodium  
Cannarum.  
Manard.  
not.*

# TABAXIR SIVE MAMBU ARBOR. TABAXIR FOLIO OLEÆ.



*nerem.*

cans & cinereus invenitur, sed non idè improbatur, quoniam aut ob nimiam humiditatem, aut quoddam diutius ligno inclusus permanſerit, hunc sibi colorem conciliat: non autem ob arborum incendium hanc nigredinem acquirit, veluti nonnulli putarunt. Nam etiam in multis ramis, quos non contigit ignis, niger invenitur. Gerardus Cremonensis in Rhafin ad Alm. lib. 3. cap. 36. Tabaxir Arabum omnes Arabum interpretes Latini sequuntur, Tabaxir Spodium vertentes, ut idem notat Garcias.

*Unde eni-  
gredo.  
Quorundam  
error.*

*Tabaxir  
non esse  
Spodium.*

*Tabaxir  
quid.*

*Sacar  
Mambu.*

*Pretium.*

*Serap.*

Ceterum eodem teste *Tabaxir* vocabulum est Persicum, ab Aviclib. 2. c. 617. & aliis Arabibus è lingua Persica desumptum, nihilque aliud sonat, quàm lacteus humor, aut succus liquorque alicubi concretus: quo nomine etiam Arabibus & Turcis hoc medicamentum cognitum est. Vocatur ab indigenis *Sacar Mambu*, quasi dicas *Saccharum de Mambu*, quoniam Indi arundines sive ramos arboris illud proferentes *Mambu* vocant. Attamen nunc etiam *Tabaxir* vocare cœperunt, quoniam eo nomine petitur ab Arabibus, Persis & Turcis, qui id mercimonij causa ex India in suas regiones exportant.

Magnè emittit hoc medicamentum pro pretio eius ratione. Eius tamen commune pretium in Arabia est, ut pari argenti pondere ematur. Meminit eius Rhafes: sed omiſſa generatione, solas vires recenset. Serapionis exemplatemporis vitio corruptum esse verisimile est,

**A**RBOR in qua gignitur Tabaxir, autore Garcias, interdum magna est & instar Populi procera interdum minor, ramos ut plurimum erectos (nisi quod pulcherrimos quosque interdum incurvant ad pergulas & deambulacra, apud Indos frequentia, conficienda) frequentibus nodis distinctos, palmi tamen longitudine ab invicem distitos habens. Folium Oleæ longius. Inter singula internodia liquor quidam dulcis generatur, crassus, veluti Amylum congestum & simili candore, interdum multus, nonnunquam verò perpaucus. Sed non omnes arundines sive rami cum humorem continent: atj duntaxat quos *Bisnager, Batecala*, & pars provincie *Malavar* proferat. Hic autem liquor concretus interdum nigrescit.

*Descriptio*

*Folia.*

*Liquor  
candidus.*

*Liquor  
niger & c.*

cum *Serapir* pro *Tabaxir* legat.

Ex diebus patet Avicennam opinionem falsam esse existimantem ex arundinum radicibus crematis fieri. Acosta verò Avicennam excusat, culpâque interpretibus imputat. Incognitum est Græcis Tabaxir, quibus aliud est *σποδία*, nempe Tutia Arabum. Rectè autem contigit Garcias Gerardum Cremonensem, siquidem Clusitæ audiendus, qui Tabaxir putavit esse *σποδία* Græcorum. Sed tamen in eodem errore versabatur doctiss. Bellunenſis, qui ad Tabaxir notam apposuit Spodium. Itaque videndum num ille sit Bellunenſis error, non Gerardus. Nam Gerardus reliquit nomen Persicum. Sed sive Bellunenſis culpa illa est, sive Gerardus, quid alteruter, aut ambo peccarent, si Spodium esse putarunt, quum Avicenna ipse dicat esse cinerem cannarum, vi venti inter se conficatarum, & ignem ex eo concipientium, & proinde ex illo igne exustarum? Nam Thucydides & Lucretius scribunt, ventis flantibus ramos arborum ex collisū mutuo ignem concipere, & ex eo sanè magnas sylvas confligare. Certè quod Avicenna habebat in animo & scripto expressit, id nihil aliud est quàm *σποδία* aut *σποδία*. Idè iniquè Garcias Davum Comicum vocavit Gerardum, quem ait omnia turbare, quum potius in autorem erroris culpa Avicennam derivanda esset, quàm in Gerardum. Gerardus interpretem. Arborea sive Arundines Mambu, in qua huius arboris figura apud Bay Satce Iconi-

*Avic. la-  
pse.*

*Tabaxir  
non est  
Spodium  
Græcorum.*

*Spodium  
Avicenna.*

*Gerard.  
excusatur.  
Avicenn.  
not.*



part. 4. Indię Orient. sub his nominibus. *Bambus arundinis* species. Item *Bambus cum pipere circumvolvente*. Prior icon ex figuris æneis desumpta est, ad quam Bapt. à Doert hæc annotat. Arundo Indica, *Indisæns Rier*. Arundines fert regio Chandel fœmoris crassitudine, quas Lusitani *Bambu* vocant. Est interior Arundinum materia alba: *Tabaxir* vocant. Formantur autem Arundines & incurvantur ad usum Pallanquinorum, nam ex iis conficiuntur veluti stipites. Naves quoque Indi conficiunt, quibus in flumine Cranganor utuntur. Posterior figura est *Acoftæ*, non parum à priore differens, qui & *Iulos* oblongos adpingit. Cùm nesciamus utra sit melior, utramque proponimus.

Ex Medicorum tùm Indorum, tùm Arabum, Persarum & Turcorum testimonio, referente Garcia, *Tabaxir* internis & externis convenit ardoribus, eoque etiam in biliosis febribus & dysenteris, præsertim autem in biliosis fluxionibus utuntur. Nostri verò trochiscos ex eo conficiunt addito femine oxalidis. E trunci Cymbas faciunt Indi, quæ binos viros capere possint: non quidem illos excavantes, sed relictis solum duobus utrinque internodiis per medium secantes. Conscendere verò solent sumiles Cymbas bini Indi, iij. nudi (nam nudos incedere illis in regionibus moris est) sederetque singuli in eius extremitatibus, iunctis cruribus, tenentesque singulis manibus remos trium aut quatuor palmorum longitudinis, quibus eas Cymbas impellunt tanta dexteritate, ut etiam adverso rapidoque flumine summâ celeritate navigare possint, quemadmodum suis oculis conspexisse testatur *Acofta* in flumine Cranganor, in quo plurimus est usus Cymbarum ex hac arundine confectarum: quoniam qui eis vehuntur, securiores sese existimant à Crocodilis, quos illi *Caymanes* vocant, magno numero in hoc flumine versari solitis. Nam cùm ferocissimi sint, sæpenumero in naves maiusculas & minusculas impetum facere solent, ut eos, qui illis vehuntur, apprehendant: & homines & quavis animalia quæ comprehendere possunt, illic devorant. Indigenæ autem affirmant, nunquam compertum esse, ut eos qui Cymbis ex *Mambu* confectis vehuntur, appetant, sed sæpenumero conspectos esse natantes propè illas, & tamen præterire sine noxa.

*Tabaxir* materia alba teste Bapt. à Doert, ad usum medicinæ aptissima ab Arabibus & Persis summo studio quæstita, auro & argento ponderatur. Indi ad vulnera testiculorum & virgæ utuntur. Valet etiam contra cholicas passionēs & Dysenteriam.

## DE ANTISPODIIS.

DE Goan arbore Persiæ ex qua Tutiam parari scribit Garcias, quamque pro antispodio tradit, egimus lib. 3. inter nucleatos fructus.

Si autem eam arborem Avic. intelligit lib. 2 Tr. 2. cap. 705. per Tuciam: & Serap. cap. 412. per Tutiam: turpiter ambo eam confundunt cùm Pompholige & Spodio Græcorum, ut Diosc. quæ mineralia sunt. Scribit autem Avic. Originem Tuciz esse fumum qui elevatur, ubi purificatur æs & c: Inda quidem est, quod abluendo Tuciam remanet in fundo, & illud est Delchudion. Differentia autem inter Succudum & Tuciam est quòd Tucia sublimatur, illud verò minime, sed remanet inferius in canalibus, per quos currit æs. Serap. dicit Tutiam quandam inveniri in mineris,

aliam fieri in fornacibus & c: Et mineras Tutia Indica esse in litonibus maris, propè regionem Indicæ, & meliorem omnium esse albam, quæ suprà veluti falem habeat: secundum locum obtinere citrinam: viridem esse asperam & perforatam, hancque ex maritimis Syriæ differri. Apud Diosc. duæ sunt species & c: inquit Serapio. At Garzias conceptis verbis testatur, nullam per Universam Indiam, sibi saltem cognitam; Tutiam inveniri præter eam quæ confatur è cineribus modò dictæ arboris.

Gulielm. Qualecbonus Curtacen. Physicus Hæc Constantinopoli scribit Matthiolo: Bellonium in suis Com. Cassaboussier vulgò illic Pharmacopolarum Calamum aromaticum esse opinari sed suo quidem iudicio absurdissimè. Magisq; placere Avic. potius Spodium esse, quòd arundines vi ventorum & partium ad se invicem confricatione adustas esse, videatur indicare: ac tale quidpiam huic arundini accidisse, quemvis non ineptè dicere posse.

Qualecbono verò sic respondet Matth. Errare toto cæso Bellonium nunc procul dubio animadverto, quòd tam facile crediderit lapideos calamos illos Aromaticum esse calamum. Nec ob id tecum sentire possum, ut ii Spodium sint Avicæ quia novæ lectio Bellunenensis, quæ hæctenus probatur ab omnibus, loco Cannarum habet Alcanna, quæ nobis Ligustrum designat. Præterea si diligentius hos cannarum trunculos expendamus, quis non potius illos lapideos effectos indicabit, quàm fricatione vel igne aliquo combustos: Mihi facile persuadeo hoc calami genus in littore alicuius lacus scatentis petrifico succo provenire, atque subinde vel ventorum impulsu, vel alio quovis casu in lacum demersum, in lapidem verti. Hæc Matth.

Nos sanè Bellonii sententiæ adherentes existimemus Cassaboussier Bellon. esse Calamum Arom. verum, si Matth. non diceret esse lapideos Calamos. Qui viderunt Constantinopoli Cassaboussier, deceant nos & posteros, quis melius de eo scripserit. Non possumus nobis persuadere Bellonium sagacissimum & doctissimum naturæ scrutatorem existimasse lapideos calamos esse calamum aromaticum.

Ex radicibus Hennæ, inquit Rauvolff. quæ Cyprus sit. Cyprus, Arabes urunt suum Spodium, ut me. Sc Henna.

minit Avic. At hic & radicem Cannarum cinerem Spodium esse dicit. Salvo verò meliori iudicio, quia Spodium Cannarum Indicæ non habetur, minus malum Monachi putant, si pro eo utamur radicibus Cannarum nostratium artificiosè adustis. Id autem improbat Acofta. At Fusch. Spodium Arabum quod Cannarum seu Arundinum radicem exultarum cinerem, & Spodium de cæna vocatum, eo quod Græci *αἰνήμεδος* nuncupant, nonnihil convenire tradit. Idem etiam neque Spodium neq; Antispodium Græcorum intra corpus assumendum suadet. Sed neque Arabum Spodium Cannæ per os ingerendum putat, utcumque Avic. & alii Arabes eius usum commendunt. Nam & Galenum testari radicem arundinis per se non levem abstergendi facultatem obtinere: Vltam verò & calidiorem & magis tenuium partium adeoque acrem effici. Hinc fieri ut lib. 1. de com. loc. c. 1. inter medicamenta quæ Alopecias sanare possunt, recenteat. Ob acrem igitur qualitatem suam radicem arundinis usam. intra corpus tutò exhiberi non posse putat Fusch. Qui tamen sui oblitus in troch. de Eupatorio scribit pro Spodio, Arabum Spodium accipiendum. Idem etiam in Mielea Nicolai ait, Spodium Ara-

Differentia  
ex delectat.

Nulla Tutiam in India esse quæ è cineribus dictæ arboris.

Cassaboussier Calamus, Spodium.

Bellon. reprehendit Calami lapidei.

Alcanna est Ligustrum Matth.

Bellon ex casatur.

Spodii Cannarum succedat. Fusch. rejicit in interius Spodium Cannarum.

Fusch. sibi ipsi contra-ponit.

bum Cannarum, in iis quæ per os ingeruntur, non usurpandum, atque in vnguento Santalino Melux dicit accipiendum Spodium Arabum, siquidem Græcorum calidum admodum sit: cum tamen ipsemet damnavit Spodium Arabum ob acrimoniam.

Apollo non probat Brassavoli opinionem sibi persuadentis Antispodium parandum ex nostris arundinibus. Luminare maius Spodij loco sumit os Elephantis combustum, quod adulteratur radice Canine, ossibus canis, Marmore combusto. Placotobus pro Spodio sumit eburustum. Collegium Colon. officinarum Spodium reicit, ut ex bovum similibusque ossibus factum. Apollo reicit prædicta ossa, & Ebur assu nendū suadet, si habeatur. Sylvius scribit se nescire cur Barbari Spodium vocent. Cornarij opinio est, quod hodie Spodium Offic. vocant, & in usu habent, etiam Antispodium esse, vulgòque credi, Eburustum esse. Nescimus, inquit Monachi, quâ autoritate Platearius dixerit Spodium optimum fieri ex ossibus Elephantis combustis, addens eius ossa solida, qualia dentium: quod falsum cum dentes careant medulla. Hodie Aromatariorum sequuntur, ubique utentes pro Spodio, tam Græcorum quam Arabum, ossibus combustis. Deus fert, an sint Elephantis: & si sint Elephantis quæ pro Spodio venduntur, an possint vel debeant admitti in cordialibus: non approbamus nec reprobamus. Id tamen aliquo modo ferendum censet Fuchs, quum Eburustum adstringendi polleat facultate, si non ex bovibus & canum maximè ossibus suum conficerent Spodium. Idem in Mieleta Nic. Myrepsi scribit id non esse intelligendum de Spodio Græcorum veterum neque Arabum, quod illi Spodium Cannarum vocant, locutum: sed accipiendum per Spodium in ea composita, quod Offic. hodie ita de sententia Platearij appellant, quod non aliud sit nisi Eburustum, & adstringendi facultate pollere. Non solum verò Nicolaum, sed & Actuarius aliosque recentiores Græcos per Spodium intelligere id quod hodie usitatum est. Hæc illi.

Officinæ abusus.

Spodium Offic.

Spodium recentiorum Græcorum.

Fuchs jugill.

Eburustum reprobatur.

Antispodium.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

Græcorum Spodium non esse Officinæ.

uens Spodium recentiorum Græcorum esse Eburustum, nihil certi demonstrat: non improbamus tamen in Mieleta Eburustum ac lotum poni: præferimus tamen Cornu Cerviustum & rosacea lotum, vel etiam nonustum. Quapropter & Apollo nobis probatur, qui Spodio substituit Cornu Cervinum. Diosc. Spodio suo Metallico substituit folia Myrti, ut quæ æqualem vim habeant, cum floribus & baccis immaturis. Eiusdem etiam succedanea Spodij sunt, Oleæ sylv. virgultu, modo iam dicto præparata. Item sativæ cum floribus: Mala Cydonia [ *cydonia* ] hic autem miramur tribui ossa coroneis [ *cydonia* ] Gallæ: Panniculi linei: Mora immatura alba in Sole prius siccata: Lentiscus: Terebinthus: Oenanthe: Rubi: folia tenera: Pseudocyperus cum flore. Quidam etiam, eodem auctore, Fici frondes in Sole prius siccatas similiter [ ut Myrti folia ] præparant pro succedaneo. Alij Glutinum taurinum: Alii lanas succidas asperas, pice aut melle imbutas similiter præparant loco Spodij. Nuclei Palmarum usiti Spodij vice in medicamenta palpebris ornandis parata commodi sunt. Acofta Spodium ex Corallo factum reicit. Pompholix, auctore Diosc. specie differt à Spodio, genere non evanet, Spodos enim subnigra est, Pompholix autem alba. Fiunt ex ætis coctura, ac etiam ex Cadmia, testibus Cornario & passim doctis viris. Vera Pompholix est Nil album: sicut griseum aut nigrum dictum, verum Spodium metallicum à Diosc. Plin. & Gal. descriptum: & ab Arabibus ut Serap. & Avicenn. sub Tutia aut Tutia tradita, nullo modo confundenda aut substituenda pro Tabaxir Arabum, quod malè interpretes converterunt Spodium.

Pænominati auctores non præscribunt Spodium in internis affectibus, sed tantum in externis. Nectemerè mirantur Monachi, Manardum, Brassavolum & alios præcipere indifferenter sumendam Pompholigem vel Antispodia Græcorum, ubicunque Spodium desideratur, non excipientes compositiones Arabum quæ ore sumuntur. Vnde rectè etiâ Garcias ait, Spodium Græcorum sive Pompholigem esse Tutiam Arabum, interne nequaquam sumendam.

Acofta in compositionibus Græcorum pro Spodio metallicum sumendum iubet. Sylvius verò pro Spodio Græcorum cinerem, qui super fornacem aurariam invenitur. Item pro Spodio Pompholigem, Olaus Sudeus in versione pharmacopœæ Br. Bauderon. in Conf. & Triasanti pessime & periculoso sanitatis errore pro Spodio ponit.

GALE FRVTEX ODORATVS SEPTENTRIONALIVM, ELEAGNVS COR-  
do: Chamæleagnus Dod.

CAP. XXIII.

LEGNVS est frutex, samentosus, Dod. cubiti altitudinem raro attingens, in ramos multiplices devaticatus, cortice rufo ad spadiceum vergente, levique: folia quodammodo accedunt ad Vivum Idæam fruticosam, vel ad parvam Salicem, glabra, sed quodammodo incana: atque in quibusdam illorum feraturæ apparent. Ramorum extremis insident capitula veluti Iuli, multo minores quàm in Betula squammati perelegantes, quippe qui diluto spadicco

Folia Myrti

Succedanea

Spodij sunt

Oleæ sylv.

Mala Cydonia

Gallæ

Panniculi linei

Mora immatura

Alba in Sole

præparant

Glutinum taurinum

Lana succida

Nuclei Palmarum

Corallo factum

Pompholix

Diosc. specie differt

Spodos enim subnigra est

Pompholix autem alba

Fiunt ex ætis coctura

ac etiam ex Cadmia

testibus Cornario

& passim doctis viris

Vera Pompholix est Nil album

sicut griseum aut nigrum

dictum, verum Spodium metallicum

à Diosc. Plin. & Gal. descriptum

& ab Arabibus ut Serap. & Avicenn.

sub Tutia aut Tutia tradita

nullo modo confundenda aut substituenda

pro Tabaxir Arabum

quod malè interpretes converterunt

Spodium

Pænominati auctores non præscribunt

Spodium in internis affectibus

sed tantum in externis

Nectemerè mirantur Monachi

Manardum, Brassavolum

& alios præcipere indifferenter

sumendam Pompholigem

vel Antispodia Græcorum

ubicunque Spodium desideratur

non excipientes compositiones

Arabum quæ ore sumuntur

Vnde rectè etiâ Garcias ait

Spodium Græcorum sive

Pompholigem esse Tutiam Arabum

interne nequaquam sumendam

Acofta in compositionibus Græcorum

pro Spodio metallicum sumendum iubet

Sylvius verò pro Spodio Græcorum

cinerem, qui super fornacem aurariam

invenitur. Item pro Spodio Pompholigem

Olaus Sudeus in versione pharmacopœæ

Br. Bauderon. in Conf. & Triasanti

pessime & periculoso sanitatis errore

pro Spodio ponit

Defect


Corre

Folia

Capit



# LIBER VIII.



dices splendent, ad octavam figuram aliquatenus accedentes, Cortex amaricat, non sine adstrictione. Materies candida. Lob. Flosculi sunt ex luteo pallidi, quibus succedunt seminum crebri racemuli, conferti & conferti quasi spicis, in quibus semen pingue, odore scæchridis citinae, sed vehemensiore, & Trifolii quodammodo. Radix teste Dod. subest lenta & dura: folia latiuscula oblonga, Myrti foliis haud multum dissimilia, sed duriora, & subinde longiora: de quorum sinu prodeunt flores spicati exiguuli latcoli: quib. semina succedunt aspera cacumine pungentia, in racemum exigui & oblongi formâ coarctata, oleoso succo per maturitatem redudantia. Totumq. fruticem cum gravitate quadam odoratum esse, eiusque pinguedinem ac oleosam substantiam. Ramulos, quales describit Lob. accepit gener Cherlerus anno 1605. à Machliniâ Pharmacopæo, quos nos anno 1606 degustavimus & comperimus amaro acres & ingratos quasi Oleam aut unguentum aliquid respicientes, odorem tamen non ita ingratus.

Gale autem fruticem tradere videtur Ruell. dum dicit: Botriys Parisiensibus matronis, melius quam officinis aut Herbariis noscitur. Hanc odoris gratia vestimentis, pannis, & linteis curiosè nititum interponunt ut odoris suavitatem contrahant. Describit Augusto & Septembri mense venalis per urbem: Pimen magno clamore denuntiant portentantes coribus rusticis, unde nomen hoc Pimen manavit in vulgus: nam hac facie conspicitur, fruticosa herba, luteis ramulis, ex intervallo brachiatas, foliis cichorii, odoratis, erumpente passim semine in racemulos collecto, quod per maturitatem gummoso lentore pellucet, coeuntibus fulgore auri simul annulis, unde nomen Græcis dictum. Pimen vel potius Pimen vulgò putaverim nominari, quòd ex se Pigmentarii infistoris vice faceret unguentum: nam si prægnans suo lignore premeretur, in gummi lentesceret, hoc cappadoces Ambrosiam vocant. In vino medetur Orthopnoicis. Hac ille. Sed indecent Ledores an Belgarum Gagel, quod Ruell. tradit pro Botryde sit foliis Cichorii, utat: eam plantam oportebat describere & demonstrare diffrimen inter hunc fruticem & herbam vulgò Botrym dictam, de qua nos lib. 28.

Histor. Lugd. Rhus sylv. Dod. & Plin. Rhus altera: Rhotomagensibus Piment Royal, quasi Melissophyllum regium.

Huius fruticis icon exhibita fuit per Gesnerum in fin. hist. Cordi, titulo Eleagni Cordi, sine descriptione, nos in nostra tabella portionem posuimus. Dodon. hist. gall. iconem nostre ferè similem habet, ei tribuens folia magni Buxi, longiora tamen, ait Brabantis dici Gagel & quibusdam Pharmacopæis Myrtum, & semina Myr-

tillos, quamvis non sit Myrtus, hinc a Neotericeis dici Pseudomyrtum, Myrtum Brabantiam: videri Rhus Plinii. Iconi titulus est: Rhus sylv. Plinii, Sumac Sauvage, de Plin. Icon apud Dod. hist. lat. diversa admodum est, quæ non placet, ceterum enim foliis: ea est sub titulo Chamæleagni, ait autem, Cordus Eleagnum appellat: nobis Chamæleagni, vox placuit. Eleagnus siquidem Theophrast. describitur folio molli, ac lanuginoso flore Populi: qualis haud est à nobis descripta: Nomen apud veteres, quod sciamus, non convenit, nisi sit Rhus sylv. Plinii, de quo lib. 24. cap. 11.

Nos Theophrast. descriptionem antè cap. de Agno, sive Vitice tradidimus. De Eleagni autem æquivocationibus & diversis opinionibus nos egimus paulò antè. Rhos verò Plinii descriptio reperitur cap. de Rhoe ubi etiam sunt æquivocationes.

Lob. & Pen. Advers. propriâ habent iconem cum hac inscriptione Gagel Germanorum: vel Gold Anglorum, Myrtus Brabantia quibusdam. Sub eodem nomine in Obs. & Icon. Plant. Eleagni Cordi proponitur etiam ea, quam habet Dodon. de qua antè.

Poriò iam ante sex annos insignis medicus Pet. Turnerus nos donavit Herbario sicco plantarum Anglicanarum, & inter alias & hæc appicta erat, adscripto nomine Gale. Folium hoc ipso anno 1605. quo hæc commentaber, degustatum adhuc & aromaticum. Eandem Plantam quoque haud ita pridem dono accepimus à fratre Casp. Bauhino. Ceterum, fruticis huius ramulos Amomi nomine Constantinopoli missos Clavius in Exot. apud Garc. lib. 1. cap. 31. Viennæ Austria accipiebat, quum Amomum, quo isthic utuntur, inde expetisset, licet nullam similitudinem haberet cum Dioscoridis, vel Plinii Amomo, quemadmodum nec ea planta quam R. P. Quatuor-  
Amomum  
Quatram.  
Piment.  
pro Amomo in pratis uliginosis agro Parisiensis eruat, quam Galli Piment appellant, & inter vestes recondant ad eas à tincis præservandum, Brabantis verò & Flandris Gagel dicitur, & in coquenda Cervisia utuntur ad robur & acrimoniam conciliandam.

In eticetis umbrosis, teste Lob. nemorosissq. saltibus fruticat. Iunio & Anglæ mulierculæ venum adferunt ramos florentes. Dod. autore, gaudet locis incultis & Ericastris, aliquantulum aquosis & palustribus. In Britannia plerisque locis & apud Brabantos ac Flandros non rarè occurrat. Maio ac Iunio flores apparent: Iulio & Augusto semen perficitur. Tunc collectus fruticulus ad forum vnâ cum fructu inferitur. In Rhotomagensium agro quoque plurimum hic fructus nascitur per saltus herbidos & uligine madentes. Est & in Scotia vdis locis frequens nomine Gale: vbi conglavia per æstatem ornât, teste Iac. Cargillo medico Scoto perdocto.

Lob. quoque scribit: Anglas mulierculas venum adferre ramos florentes ad concinnandam ædium conclavia, & trichinia suavi odore, quem halant flores, imbuenda. Ad di etiam flores potionibus consuetis Septentionalium penuriam Lupulorum interdum relaxaturos. Interdum ad hilaritatem bene potis, conciliandam. Fesire namque caput latiore temulentia. Ad everrucanda animalcula, quæ eius odore fugantur, suffiuntur quadam loca, & suffulciuntur summitibus vestes. Sapor egregie amarus insignem habere vinum secandi & diluendi monstrat: sed

Rhus Plin.

Chamæleagni.

Authorum indication.

Gold.

Pervinæ fruticis odor & sapor.

Amomum.

Amomum Quatram. Piment.

Gagel.

Lochs & Tempus.

Vires & usus.

Odor. Inebriat.

Côtra animalcula, & suffulciuntur summitibus vestes. Sapor egregie amarus insignem habere vinum secandi & diluendi monstrat: sed

*Lumbric.* præfectum valere tam sumpum quam admodum  
*Temper.* ad lumbricos necandos & pellendos Dal. prodi-  
 dit. Dodon. semina impensè calida ac sicca  
 sunt, ac ad tertium utriusque gradum accedunt. Fo-  
 lia quoque calida & facultate sicca sunt, sed mul-  
 to minus. Fructus cerebro molestus, Cerevisiæ  
*Nexa.* inter coquendum additus (quod à plerisque fit)  
 admodum caput tentantem & citò ebrietatem  
*Contra* adferentem eam reddit. Totus frutex cum fru-  
*neis.* ctu aridus, vestimentis interpositus, à tinea &  
 vermibus ea tuetur.

## HALIMON SEV HALIMOS.

CAP. XXIV.

*Halimus*  
*Theoph.*

**H**IVVS Theoph. non aliter meminit, quam  
 sicut Lupi & Esopus in Fabulis, ut pro verbio  
 dicitur. Nimirum ut nocentem aliis herbam ci-  
 tat potius quam describit. Ait enim ἄλμον [Gaza  
 Auro vertit] vicinas plantas encare, valentius  
 quam Hedera aut Cytisus: nam & Cytisum i-  
 psum interimere, eoque perniciosius, quò plūs  
 habeat saluginis. Nam in s. Cauligenita salu-  
 gine, nimioque pabuli desiderio id facere tradit.  
 Quo loco ἄλμον Auriopem vertit. Hic autem duo  
 notanda. Si Halimus ut salus, id facit cum non &  
 alia plantæ idem faciunt? Deinde, si plus habet  
 saluginis: ergo & Hedera substatam intelligit. Sed  
 quia πολυτερες est præ aliis, præ iis etiam hoc  
 magis præstat. Diosc. clarior de eo tradit: de-  
 scribit enim sic: Halimus frutex est, circa spi-  
 menta nascens, scilicet papyrus [ῥαβδόν] similis  
 Rhamno, subalbidus [ὑπολευκός]: vulg. exempl.  
 non habent] spinas non habens, sed folia Oleæ  
 similia, latiora tamen [Plin. molliora, ut fortasse  
 ἀπὸ ὕδατος vel ὑπερβολῆς legerit, non πλεονεξία].  
 Cornillam lect. meliorem putat: utramque ser-  
 vat Sarac. uti priorem vulg. exemplaria non ha-  
 beant.] Nascitur in maritimis locis præruptis  
 ac sepibus. Eius folia eborum gratia olerum  
 modo decoquuntur. Radix verò drachmæ por-  
 tione in aqua mulla pota, convulsa, rupta, tormi-  
 nâque mitigat, & lætis ubertatem præstat [ἡ γὰρ  
 χαλκωτάτη: quæ verba quædam exempl. non ha-  
 bent.]

*Nomina*  
*supposititia*

Idem inter supposititia habet: ἄλμος, Alimos,  
 aliis Damallionum, aliis Erymos, aliis Rabdon,  
 quasi virgula dicitur. Sunt qui Basilion, qua-  
 si Regium vocent: alij, Mercurij basin, similiter  
 Sapsin: alij Ostridis diadema: alij Heliostepha-  
 non, quasi Solis coronam: alij Sacrum caulem:  
 Pythagoras Anthenoron, Ægyptij Mōniri: alij  
 Asphe, alij Asealuri: alij Alariphen: Latini Albu-  
 cum aut Ampeluciam.

*Ex amen*  
*prædictorū.*  
*Aliud Ha-*  
*limus, aliud*  
*Alimos.*

Quisquis autem ille fuit, qui Diosc. magna di-  
 ligentia varias illas appellationes adiecit, dece-  
 ptus est Halimi & Alimi similitudine. Halimus. n.  
 simplex, est ab Hale derivatus, fruticem signifi-  
 cans, sapore subasalo, quem se in Hetruria plu-  
 rimum vidisse notat Goriopius. Non igitur tan-  
 tum quia in maritimis nascitur hic frutex, ut vo-  
 luere quidam, nempe ἀπὸ τῆς ἀλῆς, ἄλμος, seu ἄλ-  
 μος aspiratè dicitur, sed etiam quia testibus Gal.  
 & Paulo gustu sit ἀλῆς, hoc est, sapore asalo, unde  
 & ab ἄλμω vocatur. Plin. utrumque ety-  
 mon eleganter complexus est, cum ait: Halimon  
 alij olus maritimum esse dixerè salsum, & inde  
 nomen, &c. Ipse tamen Plin. non distinxit inter  
 Halimum & Alimum. Non benè factum est, in-  
 quit Goriop. lib. 8. Amazonum, ut apud Diosc. è

*Halimos*  
*unde.*

*Halmyris.*

*Plin. lapsus*

Spartanica fieret Halimus cum Alimus præca in  
 interpretatione diceretur: quod igitur adiecitum est  
 in nominum apud Dioscor. diversitate, Halimum  
 à quibusdam Britannicam dici, id prorsus corru-  
 ptum est. Bis itaque impingunt Diosc. exempla-  
 ria: semel Halimum cum Alimo confundendo:  
 atque iterum pro Spartanica Britannicam suppo-  
 nendo. Quare manifestè falluntur, qui Alimon  
 citra aspirationem scribendum putant, atque  
 hunc fruticem dictum credunt, quòd famem de-  
 pellat, aut gustantis esurire non patiat. Cuius  
 tamen sententiæ fuit Selinus, qui cap. 16. in Poly-  
 histore herba in Cr. esse commemorat, & in  
 di. tam, quæ ad morsu diurnam famem prohibeat.  
 Diceret nomen tractum à Latinorum alimonia.  
 Suspicatur tamen Sarac. num Solini ἄλμος à Dio-  
 sc. Halimo diversâ fuerit planta. Non tamen vi-  
 detur. Nam & Gal. Alimon dixit: & Coro. Hali-  
 mon Diosc. Solinum intellexisse putat. Immo do-  
 disti. Hermol. illum Solini locum citans, non Ali-  
 mon dicit: sed sic. Solinus Alimon in Creta na-  
 sci tradit mirabili si credamus effectu, quòd ad-  
 morsu eo fames diu nulla sentiat: ut nomen ei  
 inde impositum sit, quod s. quem arceat: propterea  
 que neque aspirationem prima litera recipiat. Ni-  
 si dicere velis & ipsum Alimon cum Halimo con-  
 fundisse. Dixerat tamen paulò antè Herm. sibi pla-  
 cere aspirationem, quoniam maritimum olus  
 credatur, ideòque & ἄλμω dictum ab ἄλμω.  
 Alioqui Almus est Asphodelus: Halimus verò  
 hic frutex maritimus, ut annotatur apud Cor-  
 dum in Com. ad Diosc. At cum idem Hermol.  
 ait: Halimon nostrum, ut Plin. ait, Aureonem vo-  
 cant: Convolvulicæ ut Hedera: locis salis nasci-  
 tur, saluginemque præstat: bis peccat. Nam u-  
 binam Plin. scripsit de Aureone? Quis dixit Ha-  
 limum convolvulicæ? Fortè hic error ei natus ex ma-  
 lè considerato, aut intellecto Theoph. l. 5. causi  
 supra citato. Ait quidem Plin. lib. 7. cap. 24. Nec  
 Vilcum prodest, nec Cytisus, nec Auro, quod A-  
 limon vocant Græci. Ut videas etiam Plin. A-  
 limon cum Halimo confundere. Aureonem legit  
 Hermol. apud Gazam, qui tamen ut monuimus,  
 priore Theoph. loco Aurum ex Plin. posteriore  
 Aurionem ex suo capite vertit, ut mirum sit cur  
 & Marcellus Aureonem à Plinio dici asserere au-  
 deat. Quam vocem Dalech. diligentissimus va-  
 riarum Plin. lectionum perquisitor ne subolsceit  
 quidem.

Cratæus tertium quoque genus tradidit lon-  
 gioribus foliis & hirsutioribus, odore Cupressi.  
 Nasci sub Hedera maxime. Prolesse Opisthotoni-  
 cis, contractionibus nervorum, tubis obolis in  
 sextario aquæ. Annotat Dalad. Plin. Sativam Ha-  
 limi. Tho. olera quibusdam hortis haberi, eamque  
 vocati, l'herbe du Machoul, id est Herbam Colicam,  
 quòd doloribus Colicis valdè prodest. Sylvestris  
 haud procul Tholosa in quibusdam sepibus na-  
 scitur.

Ceterum quod inter Dioscor. supposititia di-  
 ctum Halimon quibusdam Alibucum dici: inde  
 fortè natus ille error, ut Alphodelon (qui Latinis  
 Albucum seu Albucum dicitur) ab Hesiodo qui-  
 dam Alimon dici putant, quod non temerè fal-  
 sum dicit Plin. Eius verò erroris aliam causam  
 suspicatur Marcellus. Quod deinde inter suppo-  
 sitia Diosc. legitur, Ampeluciam etiam dictam  
 Halimon: ab alba Vite, quam Græci in sepibus  
 nascentem ita vocant, factum fuisse, ingeniosè fa-  
 nè suspicatur Marcellus. Sed hæc coniecturæ sunt,  
 non decreta.

Alimum apud Galen. [nam & ille ἄλμον habet]  
 frutex

*Spartanica*

*Britannica*

*Alimon unde?*

*Alimon Solini.*

*Almad Alimos, aliud Halimus.*

*Hermol. geminus est ror.*

*Aureo.]*

*Auro Plin.*

*Genus*

*Cratæus.*

*Opisthotonici.*

*Contra.*

*Plin. illas.*

*Herba Colica.*

*Alibucum.*

*Diosc.*

*Cur Al-*

*ibucum?*

*Ampeluciam.*

*unde.*



frutex est, plurimo in Sicilia præcipue proventus, ubi & germina eius recentia cillant, & reponunt quoque in posterum futura usui.

Semen pariter & lae planta ipsa generat, estque gustus sal- si & subdistingentis. Ex quibus omnibus palam est, ipsam esse dissimilem. Maior autem pars substantiæ eius calida est temperatæ, cum humi- ditate inconfecta, & leviter flatuosa.

Nascitur in scopulis, maritimis & petrosis locis.

An verò hæc sit Molochia Arabum, quam in- terpres apud Serap. Atriplex marinum vocat, dubitari potest. De qua hic ait: Olitores in Ba- bylonia in manuales fasciculos congestam vici- tim circumferre, clamando: Vendo Molochia, Mo- lo- lia.

Bellun. in interpret. nominum Arab. Mo- lo- chia & Malochia est species Malvæ. Apud etiam

Avic. Muluchia est Malva.


Frustra verò Cordus Diosc. & Serap. concilia- re laborat, quòd ille Rhamno simile Halimum di- cat, sed spinas non habere: hic autem ut Cordus ait, plures illi quàm Rhamno tribuat spinas. Nam Serapio videtur tantum dicere velle, Aufe- gi (cui suam Molochiam confert) multas habe- re spinas.

Tradit quidem Cornar. Halimum veterem hodiè nobis penitus ignotum, sed eam sententiam mitigat Cordus, qui rectè dixit Halimū non quidē temere in littore Germanico, hoc est Septen- trional, inveniendum, ut pote qui calidioribus & Soli adversis littoribus nascatur. Nam repertus esse videtur hodiè, ut & cognitus Halimus, si se- quentibus autoribus sit credendum.

HALIMVS CLVS.

HALIMVS DAL.

HALIMVS VALERANDI D.



NOBIS quidem Halimi Lusitanici latifolii no- mine semen terræ commissum, celeri au- ctu, æstate etiam siccissima in cistula ad cubita- lem magnitudinem adolevit, maiora facturum incrementa, si uberiore humidi soli alimento fo- tum fuisset.

Folia similia Atriplicis marinæ foliis, magnitu- dine varia, non tamen, ut illa, serrata sinuatæ, li- cet quædam tantillum sinuata sint, ordine nullo per ramos disposita, pediculis satis longis hæren- tia, etiam hyeme virentia, crassa, succulenta, can- dicantia & spissitudine ad Portulacæ marinæ fo- lia accedentia, sapore subacido prædita. Caulis adolescenti albus, & ut Atriplicibus fungosus: qui ex foliorum alis ramos profert foliis vestitos, qualia exhibet Halimi Clusii figura. Radix lignosa longa. Adultior in arbusculam excrevit aliquot cubitorum, flores tulit parvos musculos, subpur- pureos, racemosos. Semen tamen ex quo pro- diit parvum erat, compressum, fuscum, in lappu- lis, non absimilibus nostræ Atriplicis lappacæ Monspeliulanæ, minoribus tamen & candidis.

At verò inter plantas quas à Valerando Don- rez habemus, Halimi quorundam nomine, in- venimus ramum lignosum, quem faciliè quis cõi- ciat esse magni fruticis, cortice obductum tenui, modicè subinde cinereo, foliis vestitū ex ad- verso sitis, ad Zizyphi albæ folia accedentibus, brevioribus, nec ita splendentibus, Ramuli unius

fastigio rudimenta quædam apparent, parva; conformia.

Clas. tria Halimi genera proponit: Primum sub nomine Halimi Diosc. quem & maiorem & Clus seu latifolium appellat. Frutex est, inquit, omni- no candidus, Rhamno similis, ipso etiam candi- dior, eadèmq; altitudine assurgens, multis rami- bus ex una radice prodeuntibus, crassis, ligno- sis, & fragilibus nullis rigens spinis: folia Oleæ, seu potiùs Rhamni, breviora tamen & latiora, interdum rhomboide figurâ, alba, carnosâ, quo- dammodo splendentia, saporis acidi: circa ramos, nullo servato ordine temerè nascuntur. Flos Oleæ penè, musculosus, purpurascens, racematim in summis ramis coheret: deinde semen latum Atriplicis, aut portulacæ, quam marinam vulgò appellant, copiosum: Radix dura est, lignosa, & in multos ramos sparsa. Floret æstate, semen Au- tumno maturescit. Invenio etiam Decembri flo- rentem, & maturo semine onustum. Sic igitur hunc legitimum Dioscoridis & quos esse cen- set Clus. & mitius genus Plin. Lusitani Sal- guedinas à salagine: Hispalenses Marisma, quod maritimis crescat appellant.

Penæ & Lob. in Advers. descriptio convenit cum planta quam à Valerando habemus, & ter- tio loco depictam damus. Figura autem quam Lob. postea posuit in suis Obs. Halimi titulo, eadè est cum Clusii figura.

*Dod. Portulaca marina Ramulus.* Habet quidem Dodon. Iconem cum hoc titulo *Portulaca Marina Ramulus.* Sed nec titulum probamus: nec etiam illius Iconis Ramulum Portulacae marinae (de qua sequenti capite agemus) ramulum censuimus.

*Halimium* Halimium verum Dalec. Tholosatis *l'herbe du Masclou*, id est, Herba Colicis doloribus utilis, in Hist. Lugd. sic describitur. Halimus frutex parvus, radicem habet altam, inflexam, longius evagantem, crassam, duram: caules multos, laevissimos in orbem terram opacantes, cubito altiores, angulosos, ramosos: folia multa in furculis, per caules, cauliumque ramulos, imparibus intervallis dispositis, acervatim cumolata, crassa, candida, Oleae similia, breviora, quamvis Rhamno longitudine paria interdum sint, qualia in secundo genere Halimi sui describit Clusius: latiora Dioscoridi Plinio, utrumque enim verum est, et etiam hyeme virentia, saporis primum quidem salis ac subadstringentis, qualis in permixtis maritimis plantis percipitur, deinde subdulcis. Semen producit latum; candicans in summis ramis copiosum. Hanc eandem Aureonem Plinio dici ante &

*Sapor.* Tholosae in hortis coli, & sponte nasci. Bellonius multis in locis Halimi meminit, sed ita, ut ex eius verbis, quoniam planta sit Halimus intelligere non liceat. Amatus Lusitanus etiam de Halimo facit multas, sed ita, ut ex iis Halimum vix internoscas. Nec magis in hac historia sibi constare videtur Anguill.

*Ruell. & Rob. Conf.* Ruell. & Rob. Const. inter nomina ponunt *Blanche purain*, quod nomen Halimo non convenit.

*C. Bauh.* Halimon primo loco à nobis propositum C. Bauh. Halimon Diosc. & Plinius facit & Theophrastus quoque. Vtrumque genus Plinij, sylvestre & mitius seu sativum Tholosae nasci ait: hoc quidem in hortis haberi, & ab iis Herbam Colicam vocari: illam quoque non longe Tholosae nasci. Ac priorem, quem lausolium erectum, sed & Diosc. & mitiorem Plin. Clus. & Lob. dicit, à nobis se accepisse fatetur in suo Phytopinace. De secundo, quem Halimum angustifolium procumbentem vocat, Clus. dubitat an sit halimus verus Dalechampij.

*Herba colica.* Nos autem quidem asserere nolumus Herbam Colicam vel Colicis utilem, Halimum esse, nisi prius nobis sit visa & probe cognita: nec etiam revocare in dubium, quod referendus Halimus Dalech. qui in Hist. Lugd. dicitur vocari Tholosatis *l'herbe du Masclou* vel *Maclou*, ut & Dal. notat apud Plin. In Hist. Lugd. Halimus Dalech. diversus traditur à Clus. 2. Clusij verò Halimus eadem videtur cum Portulaca marina mox describenda: ut iam non amplius ambigendum videatur an sit Halimus verus Dal. cum quo nulla ratione convenit.

Ceterum nomina ex veteribus hic non ponimus, quia nondum certi quae nostrarum plantarum descriptorum illorum descriptionibus verè conveniat. Praemisimus tamen quaecunque veteres de Halimo prodidit. Posterius certiora inquirant.

*Pen. & Lob. contra nomen de Halimo Diosc.* Quod si negationem eximas apud Diosc. & dicas eum dixisse Halimum spinas habere, ut Pena & Lob. coniungunt in Adu. frustra iam sint, quicunque unum praedictorum, Halimum verum veterum & Diosc. statuere audent. Nam, ut quid, inquit illi, inter spinosas & vallatorias & finitimas, maritima cum sit, recenseret. Nam quae vesca sunt & holeracea, secundo libro differuntur. Credant igitur qui volunt, usam ex nobis propositam esse Halimum Diosc. & veterum, ut certè

eis videtur, do nec aliter erudiantur.

Porò Halimi Lusit. latifol. Clusio nomine semen locus accepimus Stutgardia à Cl. D. D. Schuyartz Medico, quod in horto E. C. Montbelgardienis satum pulchrè in fruticem adolevit, & aliquot annis duravit hyeme repositus. Tandem verò hyeme asperiore, negligentius custoditus, perit. Rufus idem semen à D. Robino Hortulano Regio Lutetiae acceptum, & in eundem hortum translatum primo anno in ramosam fruticem ad cubitos altum exiit: Alias etiamnum ab aliquot annis durat aliquot arbutu hyeme reposita, & flores ferunt, in quibus etiam nismus Stutgardiam in hortum illum Regium E. C. & Basilicam Cl. D. D. Platero splendendum & instructissimum hortum colenti. Halimus primus Clusio plurimus sponte provenit Vlyssipone vicinisque locis ad Tagum, aut eius ostia & situata mai proxima, in sepibus mixtum cum Rhamno aut solus: Hespali item in sepibus. Natus etiam eadem semine, quod Vlyssipone attulerat, quem etiamnum apud quosdam rei herbariae studiosos ali existimat. Verum minus album fuisse ait, quam natali loco, & ampliora nactum folia, Atriplicis fere magnitudine & forma, canosa tamen, & faldedimis nonnihil habentia.

halimus verus Dalech. sive herba du Masclou, teste nist. Lugd. Tholosae in hortis colitur: sponte verò nascitur in sepibus, praesertim ad vicum tribus millianibus ab urbe distantem, quem *Saint Housens* vocant, loco macro, squalido, alto.

Dicitur Dalech. in annot. ad Plinium Tholosae sativum & sylvestrem halimum dici *l'herbe du Masclou* Suspicamur verò nos halimum Dioscoridis verum & sativum Dalechampio idem esse cum halimo 1. Clusij, quamvis icon Dalechampio displiceat, potissimum quod flores & semina attinet: nec etiam folia in iconem videntur respondere descriptioni. Tholosates Medici & Pharmacopoei poterant nos ac posteros decere, an ea icon sit vera. Dubia etiam est Dalechampij fides Clusio, quod fructum Ribes vulgari similem verò Dioscoridis halimo, quem Tholosae in hortis coli ait, appingat.

Dioscoridis, Galeni; & Plinij vires halimo tribuuntur antè dictae sunt. Lusitani tenellas prioribus halimi cimas in cibos recipiunt, sicut & Rhamni. Cl. Eques Damianus de Goës, halimi maioris folia cum surfuribus decocta, & podagris, quae à causa calida proveniunt, malagmatis modo calida imposita, dolores lenire affirmabat, teste Clusio. Halimi Dal. foliorum manipulum terunt Tholosates, & ex vino albo propinant, maximo doloris colici, torminumque levamenta. Quamobrem *l'herbe du Masclou* vulgò vocant. Quod hac attrahat, ipsi quoque ac semen augeat, rationi valde consentaneum est. Salsa etenim, nitrosaque substantia, crassiorem sanguinem extenuat, ut in manus fluat, & penetret facilius, subadstringente, partes glandulosas roborat, ad lactis materiam melius concoquendam, dulci, sanguinem copiosorem gignit: quoniam dulcia in sanguinem facile mutantur. Rustici verò pabulo sale condito, in pedibus etiam lac magis affluere credunt.

PORTULACA MARINA FRUTICOSA: QUAE HALIMVS 2. CLVS

PORTULACA marinae flagella ex radice producantur multa, pedalia plurimum (quantam & seliquipedalia observaverimus) ramosa, rarius



Folia.

apor.

adix.

rarius erecta, albicantia, tenuia, lenta: in quibus folia quodammodo ad Olea aut Rhaatni 2. Matth. folia accedunt, nisi breviora essent, pingua ferè & Portulacæ Sativæ, exalbida five cinerea, levia, interdum ferè quadrangularia, saporis salii, quem cultura in hortis translati frutice exuunt. In ramulorum extremis sentien copiosum racematim congestum fert, minutum, præcedentibus floribus, qui ex viandante in purpurissimum quoddam vergunt, Bliti aut Atriplicis ferè similes. Illi radix lignosa, vivax, velut & ipsa stirps, quæ decidentibus paucis foliis hyemem sustinet.

Putat Adamus Lonicerus, Halimū eam esse plantam vvas ferentem quam vulgò Ribem vocant: Sed eam huius folia non correfpondeant oleagineis, sed potius vitigineis, eum planè hallucinatū esse constat. Halimi meminit etiam Galenus lib. 6. simpl. med. vbi dicit: Illius plurimum in Cilicia præcipue esse proventū, ibique recentia eius germina elitari, ac in posterum futura vsui etiam reponi, &c.

Halimus, quæ à Diosc. describitur, etsi alicubi fortassis proveniat in Italia: tamen qui illam Matthiolo ostenderet, adhuc reperit neminem. Halimus Mauritanus *Molochia* & Atriplex marinus appellatur. Cuius historiam referens Serapio narrat, quod eam venale circulerentes in manuales fasciculos cōponunt, & per Babiloniā clamitant *Molochia*, *Molochia*: quod manifestè indicat Halimū apud Mauritanos herbā potius esse, quam fructū vel arborem, eamque fortasse, quam Plinius maritumam ac sal-



sam prodidit. quo hæret salinam quandam herbam (incolæ Bidoie vulgò appellant) quæ frequentissima in littoribus Venetis provenit, hanc esse putaverit: quippe quod ea instar oleis in ciborum usum recipiatur. Folia fert Olivæ similia, crassiora tamen, ac perinde ferè pingua ut Portulacæ, subalbida, lavia, sapore

salso. Caules emittit albicantes, tenues & lentos, in quorum summitate profert semen minutum, racematim coherens. Nasctur frequens prope Tergesti mœnia circa salinas, ubi etiam separatim, nec minus copiosa visitur Atriplex marina, quæ sylvestrem maximè æmulatur. Quanquam apud Mauritanos Atriplex marina idem esse videtur cum Halimo. Sed inter se differunt: *ἡλίμιος* Græc. Lat. halimus, Arab. *Molochia*. Hæc Matth. cuius icon benè repræsentat hanc nostram Portulacam marinam. Halimi alia species conspicitur, diversâ præcedenti Halimo latifolio Clusii locis maritimis proveniens, planta valdè similis ei, quam Diosc. tradit pro halimo, quâ comedunt in Creta, & vocant *Sandalida*, ex qua, provt intellexit Anguillara, in Sicilia fiunt peses. Portulacæ marina videtur. Dodon. Gallico Græcorum *ἡλίμιος*, & nominatim Halimi secundi species de-

Tom. I.

scripta à Plinio. Hanc vocat Gallicè *Pourpier marin*, *Pourpier sauvage*, & *Pourcelaine de mer*. Eam porrò describit Latin. in folio. Portulacæ marina dicta exiguus est frutex, cuius ramuli duri ac lignosi: folia pingua, carnosâ, formâ Portulacæ æmula, sed albiora & duriora: flosculi cauliculis parte superiore ambiunt, quales Bliti aut Atriplici, nec dissimile semen, latum ac planum, radix lignosa, veluti ipsa stirps, quæ defluentibus paucis foliis hyemem sustinet. Huius verò & aliæ reperiuntur species foliis candidioribus longioribus & Olivæ ferè similibus. Non raro quoque altiores, aut ramulis teneriores, quales in Lusitania & Valentino Hispaniæ regno se vidisse Clus. scribit. *ἡλίμιος* autem cum aspiratione, differt ab *ἡλίμῳ* sine aspiratione. Dodonæus in fol. eandem proponit iconem, quam olim habebat, ac præterea aliâ addit, cui titulus Portulacæ marinæ ramulus: quæ icon est in Ic. Plant. pag. 393.

Clusius sic describit. Halimi genus aliud supra cubitalè aut sesquicubitalè non assurgit altitudine, flagellis potius quàm ramis, aded infirmis, ut plerumque procumbat & humi fundantur, candidis quidem illis, sed minus superioris ramis: huius folia oblonga, angusta, pingua & carnosâ, cinerei & albicantis coloris: flos summus flagellis racematim coherens innascitur herbæ ferè purpurascens coloris: deinde semen superiori penè simile, paulò tamen minus. Floret quoque superior [Halimus latifolius] tempore. In maritimis regni Valentini nascitur: vidisse & legisse etiam memini, ait Clusius, in aggeribus illius insulæ, quam duo Rhodani cornua faciunt inter fanum D. Agidii & Arelatum, cum Monspelio Arelatum, & inde Massiliam proficeret. Alitur etiam à nostratibus in hortis. Alebat etiam Vienne Io. Aicholtzius insignis Medicus, aded prolifico semine, ut plurimū illi plantulæ singulis annis spontè nascerentur. Ad halimi etiam genera referri potest alia planta, non modò in maritimis

edite rancimatis, sed etiam ad Oceanum sitis, ut in aggeribus Flandriæ, Zelandiæ, & Hollandiæ nascens. Flos etiam extremos ramulos ambit racematim, ex herbaceo purpurascens: deinde semen secundo simile. Cuius turiones & folia Flandros, Oceani accolæ, sale condire solent, & in usum servare, non secus ac Tytheni maris maritimus vicinos, fœniculum marinum. Alter halimus, sylvestre genus Plinii videtur, cui tenuiora folia tribuit: illius vulgare nomen mihi ignotum, tertius vulgò Portulacæ marina dicitur. Omnes autem perpetuæ sunt fronde, & aliquid affine cum Atriplice sylvestri habere videntur, & fortè etiam facultates non dissimiles.

Matthiolum sequitur Lacuna, & Alimum Solini putat, quasi hæc tantopere famem arceat: & tamen ipse halimum scribit, cum Solinus Alimum scripserit. Sed profectò non tam in hoc, Lacuna est, quam in eo decipitur Lacuna, quòd utique intelligentes Portulacam hanc marinam, is interim suâ iconè nobis obtudat Ligustrum, errore nimis crasso. Hist. Lugd. tradit tertium halimi genus Clus. Crithmum esse Diosc. Ital. *Bidone*.

De ea Pena & Lob. in Advers. hæc inter alia habent. Marina plantæ Portulacæ foliis & facie, quam Crithmum Diosc. putarunt: nam nihil videtur obesse aut deesse, quò minus Portulacæ sit.

C. Bauh. in Phyt. halimum, seu Portulacam marinam, halimum vulg. Matth. halimum sylvest. Plin. unam eandemque hanc censet, licet aliqui halimum esse negent.

V.

Locus. Nascitur Portulaca nostra marina copiosè in agro Narbonensi inter Lacum salsum & mare. In maritimis Zelandiæ, Flandriæ, Hollandiæ aggeribus & tumulis arenosis Portulacam marinam etiam gigni scribit Dodonæus, & alibi similibus locis, ac Iulio mense cum flore potissimum vigere.

Vires & temper. Cæterum, cum Dodonæus ita validam dicat: non temerè dixerim, sapor id non demonstrat, cum is sit tantum salus, & cultus saluginem deponat. Ipsemet præterea Dodon. quasi sententiam mutans, post. hist. in folio ex Galeno dicit tantum maiorem eius partem calidam esse temperatè, cum humiditate non concocta, & flatuosa. Enascuntur apud nos [Zelandos] inquit Lemnius, passim aliquot herbæ saluginoso succo imbutæ, ex quibus sal, si aliàs denegatum sit, faciliè elici potest, atque in domesti-

cum usum deprimi: qualis est Portulaca marina halimo affinis, ut etiam adnotavit Matthioli in cruendis herbis acer & industrius. Hanc nostrates æstate desinente condiunt, ac muria asservatam, aut rudi sale obrutam in hibernos usus reponunt, ut Hispani Olivas, Cappares, Crithmon, Empetron. Excitat enim appetentiam ac fastidia nausæamque discutit, si quando ventriculus pituitosis humoribus oppressus, vel etiam biliosis, cibum respuit. Tota autem herba, usque ad seminis quod minutum est ac racematim dependet, maturitatem, portulacam prægrandem hortensem ac sativam refert: quam Patricii etiam sale rudi ac scabroso obruunt ad excitandam cibi aviditatem: An autem hæc Portulaca marina Halimi nomine sit designanda nondum statui; quum illa famem excitet, iste verò arceat.

FINIS LIBRI VIII.

HISTORIÆ







# HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM. LIBER NONVS.

## DE ARBORIBVS CONIFERIS ET RESINIFERIS.

**N**ATURA sylvestrium arborum, magna ex parte sponte sua procreantur, dicta est. Nihilominus sylvarum & ipsa restant incolae Conifera & Resinifera, nullibi latius nascentes, ut & sola per se, vix caterarum admittentes consortium, ingentes occupent sylvas, nec latiores ex alia sola arbore inventa sint: quippe quia raro cum aliis, sive domesticis, sive sylvestribus cunctant, societatemve incant. Aded etiam in his suis generis consortium indissolubili natura vinculo diligitur. Nec inter illarum genera quae fat multa, maior refertur affinitas. Nam usque aded arcta, ut aliud genus ab altero vix facie dissimile cernatur: tam similitudo caudice, fronde, flore ac fructu: nec nisi ab his, qui eas magno studio & frequenti conversatione coluerint.

He sunt illae arbores, odorato succo praeter alios ita manantes, ut igitur & per excellentiam, Resinifera dicta. Alias tamen Oriens habet, alias Europa. Quae interest Asia, utrinque quasdam habet. Ita & in odoribus sua praetia habent sylvas: erantque per se mira singula: invicem tamen prodigam & perulantem luxuriam ea omnia miscere, & eundem unum odorem facere. Ita reperta sunt Unguenta. Atque haec est luxus & cunctis supervacua materia: quam sane natura salutis tantum ac utilitati hominum pepererat. Nunc ista patrocinia quaesita luxui, ut per hoc ius sematur ad vitia. Margarita gemmaque ad heredem quidem transeunt: ocellis prorogant tempus: aurca & ex argento fabricata pocula scyphique famuliam quomodocumque ornant, nec perent: Attingunt illud expirant, ac suis moriuntur hortis: Unde rem mortuum dixere Iuriconsulti. Sed nihil leges, nihil edicta illorum hic potuerunt. Summa commendatio eorum, ut transseunt semina (atque utinam non & viro, quanquam solo femineo) odor iavet etiam aliud agentes, ut qualiter sentiat, tanquam ab aliqua sui parte corporis, canum more, non lateat etiam mares. Ista sunt: nec absque inmani sumptu. Tanti emittit voluptas aliena. Etenim odorem qui gerit, ipse non sentit. Hi vestes, chirothecas, velamina, crines, ipsaque etiam tergora inficiunt. Ac, mehercule iam quidam etiam in poris addunt, tantique amaritudo est, ut odore prodigo fruatur ex utraque parte corporis.


Nos saluti potius consulentes hominum ac utilitati, salutares has Pronora opes tanquam in officina Aesculapij exponemus, arboribus suas & cognatas resinas inferentes.

## ABIES FOEMINA SIVE BAATH CHAETIA:

### CAPVT I.



Tom. I.



**ABIES** ACCELSA est arbor, & piceae speciosa plurimum, & ramis decussatis in alios minores divisus, in orbem brachiatam, ita, ut velut alae expansae videantur. Sursum versus magis magisque gracilescunt frondes, donec pyramidis ferè formam attingat. Ligno est albo, resinoso, odorato, fibris testisita intertexto, ut assulatim facile per longitudinem scindi possit, cortice obtecto, exteriori levi, & candidiore quam Picea. Inter utrumque tumores ceu folliculi oriuntur parvi, qui, ut resina exstillet, aperiendi: quia clara est & alba. Ramis porro utrinque pectinatim disposita, numeroso agmine folia haerent rigidula, superne viridia, glabra: inferne candicantia, aut

Descriptio

Rami.

Frondes.

Lignum.

Cortex.

Resina.

Folia.

cluterea, lineâ vitti distincta: Sed quàm Picea latiores, molliora, leviora, minusque acuta: quædam etiam bifido mucrone donata: Quas differentias non agnoscentes plerique cum Picea confundunt. Omnis eius frons tali foliorum positu stipatur, ut compressam dicas. Adultiores vero factæ arbores, inquit Clus. talem foliorum ordinem non servant, folia quoque rigidiora, obtusioraque reddantur, è quorum alis nucamenta quædam prodeunt parva, atque ex illis luli singulares breves, qui non multo post in folculos expanduntur. Iterum aliquando, ut in annu sequentem ista nucamenta perdurent. Conos fert oblongos, ovatos ferè, sursum vergentes, Picea vulgaris conis breviores & crassiores: Squamæ verò latiores multò brevioresque & veluti hirsutæ, vel levi exsiccatione caducæ, ut in Pino Cembro. Neque enim hærent, ut in Picea, Pino, atque Pinaistro. Inter squamas singulas veluti lingua quadam eminet, à squammæ radice exorta: ad cuius latera semina hærent alata, maiora quàm in Picea, odorata, mollia, oleosa. Ex conis resina quoque liquida exsultat.

Ex coniferis & resiniferis ergo perpetuâ fronde virens Abies est [Exdræ] cui autore Theophrasti sunt ordinati, utrinque micro ordine respondentes. Sed priusquam ulterius pergamus in contextu Theophrasti, nota Gazam & exdræ legere Roboris, non Abietis. Malè sanè, cum & Philopophus Abietis ramos ordinatè dispositos scribat: & Plin. Abieti ordinatos, Robori inconditos attribuat. Sic igitur legit Scalig. & emendatus, τὸ πρὸ ἀβιέως, & δευτέρῃ τὸ ἐκ δρυὸς οὐκ ἀβιέως. Namque si sunt κατὰ δρυὸς, non sunt ἀβιέως. Notandum etiam ἔξω & à Plinio & Theod. nonnunquam tamum, interdum quoque nodum interpretari: ut & Theophrast. variè utitur. Quod porro Theophrast. alia cultum nullum pati tradit, ut Abietem, & ad summam, quæ loca frigida, nivosaque adamantia adhuc hodie experiri licet.

Sed redeamus unde digressi sumus. Abies procera est, & longo caudice, sicca & fissilis. Nec huiusmodi differentia naturæ deneganda sunt, nam fissilis Abies recta meatuum magnitudine, quamvis nodosa ut Pinus [exdræ]. Sed nodosiores seminis mares, ubi sexus uterque haberi potest, ut Cupressus, quarum nonnullæ binis, quædam ternis, alia quinis & pluribus nodis, rectis, quemadmodum infixis, cæteris autem minimè: quam ob rem Abies validissima est. Lignosa porro huic medulla præcipue quod plurimum tedæ ingerat. Radix ei una tantum data est, prægrandis, ut in ima descenderet, parvæ autem complures ab illa exirent & nervosæ, quæ nullam penitus proferre sobolem possant. Ad longitudinem apta potissimum augeri. Locis denique suis melius augetur, & enodior, amplior, pulchriorque extat. Sic Macedonica præstantior, quàm Parnasia cæteræque, præstat. In totum omnis sylvestris materies pulchrior & commodior & copiosior parte montis Aquilonia, quàm Meridiana, enascatur. Folia habet multifida & quasi serrata, in extremis spinosa [In extremitate pungentia] alarum modò, semper in minores pennas delinquentia, ut tota species sit fœmina, aded densa, ut neque nivem, neque imbrem transmittant. Quod enim spinas omnino pro foliis habeat, nullum inter arbores est. Succum fert pinguem, oleosum, & resinolum: Amantissimum sive florem Croci colore, paulò ante solsti-

tium: Prædictum post Vergiliarum Occalum de. Præfuit. mittit. De flore Abietis, quod Ald. cod. & Scaliger tradit, hunc esse, sibi minus constat. Ald. cod. Sc. Sc. ger notatur. Scribit enim alibi eundem ὑπόκωπον, atque ita res est, quæ in Abiete diligenter consideretur. Semine Provenit tantum semine: radix enim nullam penitus proferre sobolem potest. Deciso cacumine inarescit radicibus eodem anno.

Evenit peculiare quiddam Abieti, cum enim præcisa, vel aliquo pacto diminuta afflatu fuerit, circum lævem partem sui caudicis habet eam quæ dantentis lævem, enodem, similem ac etiam æquipatandam naviculæ: quod quidam circumnavigationem, alii circummagnationem appellant, colore nigrum, duritiâ ultra modum, ex quo crateres Arcades conficiunt.

Illud quoque peculiare hæc eadem in re Abieti accidit: cum enim ramis omnibus ablatis, cacumen decidit, mox moritur: cum vero inferiores, proxima lævi illi parti præcedit, quod restat vivit, & agnatio, quam modò dixi circum fieri assolet: scilicet quia vegetus ac viridius est.

Crescit primùm in excelsum quoad liberè Solem accipiat. Neque ramus ullus, neque geminatio lateris, neque crassitudo interim faciliatur: post in profundum, latumque incrementa capessit, atque ita ramorum exortus, & laterales geminationes sequuntur.

Geminatio nem intermittit, tæque turget, tæque germina edit. Ideò & ter squammosa dicitur: omnis enim arbor cum germinat, squammas corticem spargit.

Ab ulcere ampliori altiorique nihil offenditur, nec ulla ex quibus resina colligi potest, cum tæda discinditur.

Arcades autem eam medullâ totâ exemptâ interire dicunt.

Materies eius primo turgore coloratior redditur.

Verè cum germinat, caditur.

Montibus propria, quæ nasci in planis nequit, sed in umbrosis pulcherrima, & apertis haud similis sibi affurgit. Itaque in Arcadiâ circa Cranam vocatam loco quodam concavo & silente à ventis, quem nunquam Solem attingere aiunt, plurimum tum longitudine, tum crassitudine cæteris præstat, non tamen pariter frequens, neque pulchra cernitur. Nascitur quidem in montium cacuminibus, locisque argentibus, sed non in excelsum, sicut etiam circa Cyllenum promontorium evenit. In Asia Abietem parte superiore Syria, itinere à mari quinque dierum, enasci negant: sed in India visum in monte, cui Mero nomen, affirmant, quo Liberum patrem ortum fabulæ aiunt. Harpalus verò in Media tantum eam locare contendit. In Ponto verò deest, & omnino quæ tedam in se gerunt.

Cæterum, Abietis [Exdræ] quædam macula [ἐλάτη ἀβιέω seu Picea Latinorum] & quædam semina [ἐλάτη ἀβιέω], est. Distant inter se foliis. Mari enim acutiora, magisque pungentia, flexaque magis: Quamobrem aspectu cili-prior tota arbor videtur. Quin & materiâ different: Nam fœmina candidior, mollior, operibâque facilior, atque totus caudex procerior: mari autem variatior, latior, durior, medullâ refertior, atque in totum aspectu deterior. Nuci maris pauci nuclei parte priore insunt: Fœminæ nullæ omnino, ut Macedones referunt. Fœmina pinnatæ atque in angustius tendens, ut tota species concameratum sanè imitetur: simileque pondissimum

Abies à Picea differt.  
Adultiores arbores,  
Folia,

Nucamenta luli,  
Folculi,

Coni.

Squamæ.

Semina.

Abies Theophrasti.  
Rami.

Gaza exdræ.

Theophrasti reser-vatur.

O'xi.

Cultum non patitur.

Caudice longo.  
Fissilis.

Nodosa.  
Abietis fœmina.

Cur Gæli.  
Artem.  
Medulla lignosa.  
Radix.

Locus.

Macedonica.  
Parnasia.

Folia.

Spinosa fœmina.

Succum.  
Fœmina.

Præfuit.  
cum in re regerminat.

Circumnavigationem.

Circummagnationem.

Geminatio.

Ter squammosa.

Vltur.

Caditur.  
tempore.  
Locus.

Abietis.  
xus, & ferens.



potissimum cyathis Bætorum appareat : densum aded est, ut nec nivem, nec imbrem transmittat.

Distant verd inter se multifariam Pinus & Abies. Hæc enim magnitudine excelsa, longæque Pino procerior. Differunt etiam ligno non paulim. Nam Abieti nervosum, molle, levèque. Pino autem tedaceum, ponderosum, atque carnosius. Nodi [idem alibi dicitur de ramis] plures Pino, sed dures Abieti. Quin & reliquis ferè omnibus dures, quamquam mollius lignum est. Habet, ut Pinus *Aegidem*, ita Abies *Album*, dictum Lullon, velut argidi respondens, nisi quoddid album. *Aegis* vero gratus colorata est, quoniam tedam gerit. Spissum hoc & candidum, pulchrumque ex arboribus iam vetustioribus gignitur. Arcades ambo *agidem* vocitant, tam Abietis quam Pini, & copiosiorum esse Abietis volunt, sed meliorem Pinus Abietis enim totam commodam [candidam] levem, spissamque: Pini vero exiguum, & crispiorum & leviorum, in totumque meliorem. Abies verd etiam *circumantione*, sive *agnatione*, quam superius diximus, à Pino distinguitur. Præterea tunica nulli pluri Abies constat, modo Cæpæ: assidue namque tunica conspecta lubidam aliam gerit, atque ex his tota constat. Pinus adhuc plures quam Abies corroditur à teredine: hæc enim antiara est, Pinus verd dulcedinis nonnulli habet, eoque magis quò fuerit tedà refertior. Omnes enim [arbores] teredinem sentire affirmant, præterquam Oleastrum & Olein, quæ amaritudinis causa, neque teredo, neque tinea rodit. Quod autem hic in Theophrast. Gaza *ἔρπον* non legit, sed *ερπον* dubitat Scaliger, an veram lectionem retinuerit, cum Abies amara non sit, sed sicior, quam Pinus. Is autem *ἔρπον* legit. Tradunt etiam Abietis, cum germinat, decorticatam materiam aquis inoffensam, durare posse. Patuitque id apud Phenicum Arcadiæ, cum obrusis faucibus campus in lacum redundavit: tum enim ductis pontibus ex Abiete, cum amplius exumesceret aqua, aliis superalibus fabricatis, postea extrusis obturamentis, unda erupit, discessitque, ac universa materies, in corrupta comperta fuit. Rapissima est medulla, pergit Theophrastus, Abietis, quæ pondus substat valde, ut Pinus, quamvis utramque reniti affirmant. Medullam [in fabrica] omnis habet materies, sed conspecta potissimum in Abiete. Nunc humor ipse quibudam in lachrymæ modum gignitur, ut Abieti, in quâ, ut & Picea, cum lignis degustatis pluvius intulerint, fit Resina, de quâ postea sub Peuce. Sed hæc fortè prolixius ex Theophr. dicta sufficiat.

Audiamus Plinium. Peregrina, inquit, videbatur, quoniam non erat suburbana, Abies. Abieti expetite navigis rami, ut Piceæ, penè statim ab radice modici, velut brachia, lateribus inhererent. Situs in excello montium, ceu maria fugerit: nec foima alia [quam Piceæ.] Materies vero præcipua trabibus, & plurimis vitæ operibus. Abies, ut omnia alia genera, quæ resinam ferunt, accensa, fuligine immodicâ, carbonem repente expuit, cum eruptionis crepitu, eiacularique longè. Abies perpetuò viret, nec facili disceritur in fronde, etiam à peritis: tanta quippe natalum mistura est. Abies è cunctis amplissima est, & femina etiâ prolixior, materie mollior, uti hórquæ, arbor rotundior, folio pinnato densa, utimbres non transmittit, atque hilarior [intuitu] in totum. E ramis generum horum panicularum modo nucamenta squammatum compacta dependent [saltilit] Pinus: Sui enim sunt & La-

Tom. I.

rici coni, veluti Pino, sed minores, & Cupressinis similes] Laricis. Hæc Abietis mascula, priori parte nucleos habent, non item femine. Gignitur & in Abiete Cachrys, postquâ folia ceciderit, hieme durans. Montes & valles diliget Abies, cui folia non decidunt: sunt hæc infecta pectum modo & Piceæ & Abieti. Abies tripartitò intermittit ad terna germina edit: idè & inter squamas corticem spargit: quod omnibus arboribus in germinatione evenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex. Est autem primum eorum [germinum] incipiente Vere, circæ quindecim diebus. Iterum geminat transeunte Geminis Sole. Sic fit, ut [prima M. summa CH.] quina cacumina impelli seentis appareat, geniculato incremento. Tertium est eisdem ad solstitium brevissimum, nec diutius septenis diebus. Clarèque & tunc cernitur excrecentium cacuminum articulatio. Abies floret cocco [croco] colore [Floz, circa solstitium, semen verd reddit post Vergiliarum occasum [alius legit circa diem nonum Decembris.] Est ordo ramorum Abieti, Piceæ: Et Abieti quidem subrecta divisa, rami in cælum tendentes, non in latera proni. Mirum, cacuminibus eorum decisis moritur: totis verd detruncatis, durat. Et si infra [intra M. & CH.] quam rami fuerit, præcidatur, quod superest, vivit: si verd cacumen tantum auferatur tota moritur: Abieti succus humor diu effluit. Hæc inter arbores albanas, rectissima. Navium materiam, præter levitatem, refertur Abies. Abies admirationis præcipua vis est in navi, quæ ex *Ἀγίο* Capricornis insulâ, Ochienna in Vaticano circò statuta, quatuorque truncos lapidis eisdem ad sustinendum cum adduxit: quâ nave nihil admirabilius visum in mari certum est. cxx. velut alus, cxxx. modum Lentis pro saburrâ ei fuisse. Longitudo spatium obtinuit magna ex parte Ostiensis portus latere lato. Ibi namque demersa est à Claudio principe, cum tribus milibus, turrium altitudine in ea exadificatis obiter Puteolan pulvere, advectisque. Arboris eius crassitudo, quatuor hominum ulnas complectentium implebat. Vulgòque auditur octoginta nummorum & plures malos vendunt ad eos usus, rates verd connecti quadraginta sestertiiis pleraque. Pondus sustinet valde Abies, eam in transversum posita. Firmissimum ad testum Abies. Eadem valvarum repagulis, & ad quæcunque libeat intestina opera aptissima, sive Græco, sive campano, sive Siculo fabricæ artis genere spectabilis, ramentorum crinibus, pampinato semper orbè sese volvens ad incitatos functionum raptus. Eadem & curribus maximè sociabilis glutino, in tantum, ut findatur antè, quâ solida est. Non fastidenda hæc quoque scientia, atque non in ultimis ponendâ, quando quibusque satis umbra, aut nutriti, aut non verca est. Abietis quidem quemcunque attigerit, non dubie venenum est. Et hæc sunt, quæ passim Plinius in suis libris memoriæ mandavit.

Discorides arboris huius expressè non meminit, licet nihilominus eius resinæ vocem annotarit, de quâ infra agemus.

Meminit Homerus malum in navi ex Abiete fuisse, quâ Telemachus Pylum navigavit.

*Ἰὼν δ' ἑλάντης κελύξιν ἔντρον ἐκ πετρῶν*  
*Στήθον δὲ κελύξιν.*

Apollon. Rhod. ἀργοναυτικῶν. celebrat Filium Iovis [Herculem] in silva oberrantem.

Ut remum sibi ipsi, araret ad manum aprium. Invenit dein abietem hinc inde digressus, neque

Abies mascula.

Cachrys.

Folia.

Germinum triplex.

1.

2.

3.

Floz.

Semen.

Ramorum.

dispositio.

Abietis.

lib. 16. c. 30.

Arbor alba.

flos.

dispositio.

Abietis pro-

digula ma-

gentudinis.

sive per-

dara.

sistendo.

idonea.

Ad opera.

intestina.

Abietum.

bra.

Genes.

nata.

plurimis gravatam ramis, neque multum virentem.

Ennius eam navei quam Iason cum Graecia Heroibus in Colchidem vectus est, ex Abiete structam fuisse memorat.

*Abiegnatrabis.*

*Vtinam ne in nemore Pelio senioribus  
Cesa cecidisset abiegnat ad terram trabs:  
Nève inde navis inchoanda exordium  
Cepisset, qua nunc nominatur nomine  
Argo.*

Virg. Georg. 2.

—Et casus Abies visura marinos.

Claud.

*Apra fretis Abies, bellis accommoda Cornus.  
Sed & hastas ad præliandum ex Abiete fabricatas esse, notat Virg.*

—cuius apertum

*Adversus longa transverberat Abiete pectus.*

*Elate.* Abietem materiam vulgo notam dicit Hermol. ac ideo eius historiam omisit.

*Sapinum.* Quæ Graecis *ἐλάτη* arbor est, ait Ruell. Gallis & Sapius & Avetum dicitur, Latinis Abies. Hæc Pino non dissimilis. Eius alia mas est, alia scemina. Procreat & alit termitem, ab eoque vivitur. Ignem facile concipit, vehementemque flammam ejaculatur, quod raritatis aëris, qui ei insidet, refertur acceptum. Pars arboris interior enodis, cincto torulo ad intestina opera comparatur: & Sapinea, si Vitruvio credimus, vocatur.

*Avetum.* Superior nodosa duriorque fusterna dicitur. Plinius videtur Abietem cum Palma confudisse, quæ Medicinæ confert germina, folia & corticem. Nec Diosc. nec Galen. usquam in arborum censu Abietis meminerunt. Quam Græci vocant Elaten, non est quam Plinius asserit Abietem. Sed idem potius est Elate, quod Spathe. Abies resinam fundit celebratam, quam Gallicum vulgus

*Plin. natus.* Avetam vocat. Et hæc de Ruellii opinione, qui nec Abietem Latinorum [*ἐλάτη* *ἁβύνη* Theophrasti.] nec eorumdem Piceam [*ἐλάτη* *ἁβύνη* *ἁβύνη*] nō describit. Præterea non distinguit nisi quatenus in genere quædam ex veteribus, & potissimum ex Plinio (quem tamen non nominat) recenset: cur ad hoc caput non refert Piceam Latinorum, quæ Elate mas Theophrasti. Cum Pino etiam non video tantam similitudinem, ut Pino non dissimilis sit: unde si Piceæ Latinorum non dissimilem dixisset, melius authoritati suæ consulisset: nulla enim arbor ei similior, habet tamen manifesta discrimina. Præterea nimis generaliter scribit, quam Græci Elaten vocant, non est quam Plinius asserit Abietem: hoc enim falsum, quia quamvis aliis quidem quibusdam Graecis Elate non sit Abies, sed Palmæ pars, ut Diosc. Galeno, Paulo & Helyschio, quos citat Ruellius: Attamen Elate Theophrasti est Abies & Picea Plinio: Et Dioscorides ipse *ἁβύνη* resinam, *ἐλάτη* Abietinam nuncupavit.

*Plin. natus.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Picea Latinorum.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Ruell. taxatur.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Plin. Sindacum.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Sapinum.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Agaricus.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Fungus.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Car. Steph.* Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Fungus.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Car. Steph.* Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

*Fungus.* Car. Steph. Graecis Elate dicta, Gall. *Sapinus* & *Avetum*, ea est arbor, quæ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utitur. Abietis truncus ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carne tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Id autem in Delphinatu frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversæ arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porta in vill. capite

de Abiete, Piceâ, & Sapino, satis demonstrat, se non nosse discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum. Tradit autem inibi *ἐλάτη* dictam ab *ἐλάτῳ*, e. impello & prolongo: quod in præcellam proceritatem assurgat: atque etiam hac ratione Abietem dictam esse quod in cælum abeat. Quod autem idem ait Macrobius Abietem inter felices arbores annumerare, nondum in eo invenimus.

Petr. Berch. quoque non videtur distinguere Abietem, (cui folia tribuit acuta, parva sicut Plani) à Picea, cui folia acuta.

Nec etiam quæ & qualis sit Abies satis declarat Cord. in Diosc. Abies, inquit, quæ Graecis *ἐλάτη*, ea est sine dubio, quæ à Germ. *Ein Tanne*, appellatur, similes Piceæ silvestri conos ferens, sed torosiores. Weis Thannen, ut tradit Io. Stumpf. lignum asperius, durius & durabilius est, minisque resinæ fert, quam Rott Thanne, sed pulchriorem & ad usum medicum meliorem, quibusdam dicitur: Traubsch, ab aliis Bülbsch. Ego autem tale lignum non Abietis esse dixerim, sed potius Piceæ tribuerim: Considerent diligentiores.

Duo Abietis genera, nigrum seu rubrum, & candidum Tragus agnoscit, ac utriusque folia latiora, sed breviora, piceis foliis esse dicit, Rosmarini penè similia: atque ramulis crucis formam obtinere: Vtrumque, etiam Resinam puram ac odoratissimam, Thuris ferè instar, quod ad odorem & formam attinet, sudare: Candidam insuper Abietem, rubræ per omnia similem existere, nisi quod folia habeat ex una parte cineracei profus coloris, & corticem candidiorem & teneriorem: Hoc Abietis genus in Valesia Helvetiorum montibus gigni: Hancque Abietem simpliciter nuncupari, & Germ. Weis Thannen dici. Sed Tragus resinam abiegnam & piceam non distinguit, quod minus convenit. Quod autem ad me attinet, resinam Abietis observavi liquidam. Eius verò icon non in omnibus placet.

Placet Bellonio, Abietem Gallorum *Sapinum*, *Sapinum* Græcorum *ἐλάτη*, Marem vocare. Ac demiratur ille Plinium decorticatam Abietem *Sapinum* vocare: Nec non duriusculum ipsi videtur, quod Plinius Abiet folia pungentia esse dicit: ut potest, quod in Abiete nunquam deprehenderit: Ac etiam quod Theophrastus multis in locis croceum ei colorem tribuit: tradens se in Abieti nullum unquam florem vidisse: Ego autem Bellonium non demiror solum, sed turpis ignorantia eum arguo, utique qui non observavit, Plinium ex Theophrasto. Abieti mari tribuere folia pungentia, et ipsæmet verba Theophrasti recitant. Si quis etiam ingeniosè consideret, quæ Theophrastus scribit, nostram vulgarem Abietem potius formam dicet, quam marem, quam vis aliter censet Bellonius, cuius figura, uti & Marthioli parum commendanda videtur.

Rectè Solerius affirmat *Sapinum* partem Abietis, ab Abiete non distinctam arborem.

Rectè etiam Du Choul. in descr. montis Pilati, Abietum, quas Sapinos vocant, folia pungentia dici non posse, sed apice modicè incisa, dicit. Rob. Constant. in Lex. *Abies*, abietem aut Piceam reddit. Idem & *Abies*, ut apud Latinos inveniri auctor est. Quà verò autoritate, nobis nondum constat. Et licet abietem Theophrastus cultu detenerem reddi scribat, sicut & Pinastrum, attamen plantatas crescere Gesn. obicit. Quæ obiectione sententiam Theophrasti evincere velle nobis

*Elate*

*Abies*

*Felix*

*Petr. Berch.*

*notatur.*

*Cord.*

*Conus*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*

*Abies*



nobis videtur. Sed velle videtur. Aliud siquidem est crescere & aliud à naturali statu deflere, ut in deterius vergi. Cultu enim nunquam deterius redderetur, si plantata non cresceret.

Inter se similes arbores esse, placet Matthiolo, Picea & abietem, ita ut sæpè etiam lignarios fabros fallant: Piceæ folia esse coloris abiegnis longè nigriore, quin & paululum latiora, molliora, laeviora, minùsque pungentia: In Tridentinis montibus Abietem omnem infructiferam esse, et si Plinius Abietem fructiferam fecerit: Sapinum, teste Plinio, sicut etiam Vitruvio, partem tantum esse in Abiete. Annotatque idem Abietem in centro faxi montis in lapidem esse conversam. Sed quis non miretur Matthiolum, tribuere Piceæ foliis, quæ Abietis sunt, quasi neutram norit. Immerito etiam videtur Plinium notare. Fructifera enim sanè Abies est, uti sæpius observavimus.

Lacuna Abietis picturam ex Bellonio habet, dicens: tantam similitudinem esse cum Picea, ut quidam decipiantur, unam pro altera assumentes. At Lacuna ipsemet deceptus est, qui non novit plantas dictas Piceas: siquidem has non distinguit, vulgari Abieti tribuens, quæ sunt Piceæ. Mihi etiam apud illum contrarietas videtur, cum uno loco dicit: *como en tiemp. de Galeno se usurpava la Resina del Abeto*: & altero loco, cum de resina Piceæ locutus est, ait: *El abeto, produce a quel excellen- te liquor incognito a los antiguos*.

Bened. Curt. de hort. ait Plinium cuiusdam arboris meminisse, quæ Elate, aliis Palma dicatur, ubi Abietem, vel Marantam teste, cum Palma confusile videtur. Plures unam & eandem arborem Sapinum & Abietem existimaverunt. Plinius verò alter, qui Sapinum nihil aliud esse, quàm Piceam, feritate paulum mitigatam, cuius imas partes tedas vocat. Servius autem Honoratus Sapinum Abietis speciem dicit. Vitruvius Sapinum ab Abiete seivante. Alii inferiorem Abietis enodem partem Sapineam vocavere.

Abies & Picea arbor, multum inter se similes, adeo ut nisi quis multum in eis exercitus fuerit, Amato subscribente, discrimen ponere nequeat. Vtraque enim longitudine, crassitie, figura & fœtibus idem habent, nam rami tanquàm brachia à duobus lateribus in trunco oriuntur, ut in crucem nasci merito quis dixerit: ita quoque & folia in ramisculis ad illum modum enascuntur oblonga & dura. Sed in hoc inter se differunt, quòd folia Piceæ obscuriora multo sunt, quàm Abietis: item cortex Piceæ ad nigredinem quoque vergit, qui tanquam corrigia facillè complicatur, ac illico disrumpitur: itis addamus, quòd rami Piceæ terram versus curvantur, id quòd Abietis ramis non accidit, imò & quòd lignum Piceæ pulchrius est, & utilius, venas directiores habens, & nodos pauciores. Sola præterea fœmina Picea fructum parit: verum utriusque sexus Abietem fructum producere tradit Plinius. Et è contrà, in multis regionibus sterilem utramque Amatus conspexit.

Castor Durant. figuram habet, quæ non placet. Apollo verò ex duabus plantis tres facit, nec novit discrimen inter Piceam, quæ Elate mas: & Abietem, quæ Elate fœmina: Matthiolumque imitatus tribuit Piceæ, quæ sunt Abietis. Picea, inquit, frondibus est abiegnis multò acrioribus, ut quæ laeviuscula, molliores, & latiores, atque minùs pungunt.

Cedrum pro Abiete pingit Petr. Cress. aut

certè Cedrum meliùs exprimentem.

Frustra Dodonæus Abietem distinguit à Sapino, cum una & eadem sit arbor, quam meliùs meo iudicio describit in Hist. gall. quàm latina, non tamen probanda figura, quam posuit Hist. gallic. ex Bellonio, nomine Abietis & in lat. Abietis alterius. Cæsalp. Abietem nostram hanc tradit, cuius descriptio aridet, quamvis nec ipse, nec authores Hist. Lugdunensis demonstrent, Abietem fœminam esse, multoque minùs doceant marem esse Piceam, de quâ paulò pòst, & quam nullo modo æstimarim à Theoph. dictam *mirum*, aut *mirus*, qualem facit eam Cæsalpinus.

Lussi nominis vestigia etiam hodie supersunt. Nam Iuræ montis lignatores Abietum, Picearumque candidissimos truncos, non nodis interceptos, sed recto venarum proculu fluvios, & ad opera intestina faciles, nunc *Ouchun* ut in hist. Lugd. perhibetur, nunc *Louchon* vocant. Quid autem Lussum sit, constat antè ex Theophrasto.

Taberna. non ritè læcernit Abietem fœminam à mare, Picea Latini nomen: præterea figura eius falsa.

Clus. Abies Plinii, *Ελάνη ἄλεια*, Abies fœmina Theophrasti. Lob. & Penz Adv. Abies Sapin Gallorum, Phthoropias Theophrasti, mulum tedas dans.

Abies, quam plerique vocant, arbor Propheetis sæpius in concionibus ad populum eundem, dū adhibebatur. Ezech. 27. Abiegnæ Senie adificabatur omnia tabulata, Cedrù accipiebant ad parandù malù navis in te. Osee 14. Dirigam eum ut Abietis virent. in Zach. 11. Euila Abies. quia cecidit Cedrus. Samuel 1. 2. c. 6. David. a. & omnis Israël, Iudebant coram DOMINO in omnibus lignis fabrefactis. Abiegnis & Citharis, & Liris, & tympanis, & sistris, & cymbalis.

Nunc nomina prosequamur. Abies, græcè *Ελάνη*, Hebraicè ut apud Trag. in margine scriptum legitur *Berosch* dicitur, secundum alios *Aenes*. Germ. Thannen / Thannenbaum. Belg. Dennenboom. Gall. Auer. Ital. Abier, Abette & Abeto, *Ανεξος*, *Ανεδία*, *Κροναρ* Hisp. *Abeto*. Scorsim autem hæc nostra Abies, *Abies fœmina*, *Ελάνη ἄλεια*, Germ. Weisse Thannen, quati candidam diceret, Belg. Witte Dennen, Gall. Sapin, Sap. Ital. *Abete*. Hisp. *Abeto*, Angl. Mastro & Scotch. Hung. *Luchseny* fa / *Uelynef* a levely egy felöl a. Boh. *Gedle*.

Epitheta hæc Abieti conveniunt. *Longa, recta, enodus, audax, apra fœtus, redolens, umbrosi, crispæ, proceræ, crinitæ, excelsæ*: electa ut in sacris habetur. Ad hæc perpetuò vivens, resinosa, cum sa. Considerandum autem an mucilaginosæ sit dicenda, ut vult Querc. def. herm. dicens. Abietes resinose, sunt & mucilaginosæ, ac idcirco fixiores & constantioris vitæ arbores, adversus temporum iniuriam munitæ.

Abietis, nomine aliæ etiam denominantur plantæ, ut potissimum arbor vulgò dicta Picea, quæ Elate sive Abies mas Theophrasti, de quâ mox. Suspicamur Petrum de Cresc. Abietis & Piceæ nomine intelligere Pinum sylvestrem. Tragus quoque quandam *Tallau*, sive *tedam* Abietis vestri, quartum genus facit, de quo paulò pòst. Abietem dici de Cedro videre est ex D. Hieron. cap. de Cedro. Trago Larix est Abies tertia. Abietem usurpari pro Junipero, & vice versâ, licebit ex D. Hier. cap. de Junipero videre. Guilandinus scribit Abietes in Arabia thure manare, & Cardanus *thu-*

Lussum

Taber. v. preh.

Abies fœmina.

Philosor.

pro.

Abies in sacra.

Synonyma linguarum.

Epitheta:

Querc. notatur.

Æquivoca;

Picea.

Pinus syl.

vestri.

*Thou. jern. arbor.* *regerant arborem*, Abietem pusillam vocat: ut dicitur cap. de Thure, quæ opinio non placet Scaligeri. Non placeat etiam Abietem *nam inuen-* *tariam* dici Hermolao. Im-merito quoque scripsit Ruellius, Plinium videri Abietem cum *Palma* confundisse, ut demonstratum. Inter maxime plantarum tunc etiam *Abietes* dicitur *marinæ*, de quibus agitur lib. 12. Libro tandem dicitur cap. de *Populo*, alba demonstratum est, eam à quibusdam ignavis dici Abietem. Non omittendum hic velle quosdam *Sapinum* nihil aliud esse, quam caudicis Abiegni partem inferiorem ac enodem, & non ut aliqui falsò opinantur, arborem peculiarem, & ab aliis specie divisam. Non igitur est, ut Porta in villa docet, *Picea* species, aut *Ricea* domestica. Quid enim est quasi *Picea* domestica? *Piceam* Lati-  
*Ticendo-* *majus* *enorum* siue Abietem marem esse credimus.  
*Locus.* In Valesia frequentes Abietes esse perhibet Simleus, Sabaudia fert proceras Abietes & *Piceas*, navali materię aptas: In nostris Alpi-  
*Trag. nota-* *bus* Abietes nonnunquam inveniuntur 130. pe-  
*tim* *dem* longitudine. Firmitate materię præstant Abietibus *Hircinæ* sylvæ, nec alioqui proceræ. *Rheticas* & *Helveticas* in mare Adriaticum de-  
*Benchillan.* *portare* curant. Miror *Tragum* Abietem non observasse in Germania, ut in *Lucania* sylva, & passim provenientem. Scitent passim plerique omnes *Helvetorum* montes & sylvæ Abiete. Abundat in insula *Fermentaria*. In monte *Ma* provenit. *Anglia*, autore *Iulio Cesare*, præter *Sagum* & *Abietem* præfert curicunque generis materiam. Altissimas, ait *Thom.* Har-  
*Fungi Ma-* *ventes.* *not insula* *Virginea* alit. In *Viennensi* saltu, ut & in vicinis aliis aliquot montibus, Abietis esse maximam copiam testatur *Clusius*. In montibus *Burgundiæ* prope *Meche* antiquum castrum dirutum luxuriant Abietes ubi colligunt eius resinam, quam vocant *du Benchillan*. Inibi etiam mense Junio sub Abiete fungi proveniunt, pineis nucibus, vel favis similes, nigri, quos *Marones* vocant. *Genevæ* *Allobrogum* habent Abietem in proximis montibus: ut & *Basilæ*, similiter circa *Masminster*, inter *Ridgenwir* in *Alsacia*, Ill. Ducis *V. Viri.* urbem & *S. Mariam*, ubi fodinæ. Inter *Montbelgardum* & *Porentrutina* non rarè apparent Abietes, unde transtuli in hortum Ill. E. C. quæ minuscè licet proveniunt, nisi sint admodum tenellæ. Curavit Ill. E. C. seminâs in suo ferarum horto, quarum quædam cœverunt. Nec destituntur Abiete montes *Reverend. Episcopi* *Basilensis*, circa *S. Ursinum*, circa fontem novum. Apud *Zoringam*, [legitur annotatum per *Leodeg.* apud *Lonicium*,] *Helvetiæ* oppidum, in diuione *Bernensi*, sylva est *Thannwald* dicta, ubi arbores, potissimum Abietes, tam elegantes & proceræ evadunt, ut vix similes in tota Europa reperire liceat. Nam quædam assequuntur longitudinem 130. pedum, ita ut usui adaptentur longitudine 110. pedum. Hinc à *Genensibus* emptæ adminiculo *Arolæ* deducuntur in *Rhenum*, & inde in mare *Anglicum* ac *Hispanum*, tandemque in mare *Mediterraneum* *Genuum* usque, ex quibus malos navium facere consueverunt. Inveniuntur quidem tam proceræ Abietes & in nigra sylva, sed pinguiores, atque ob id non tam durabiles. Dictæ longitudinis Abietem *Kilchburgi* ante hospitium (interiacet autem *Bernam* & *Basilicam*) Solo implantatam offendes, quo peregrinus è lóginquo diversorū discernere valeas. Comi, teste *Clusio*, virent Autumni initio, & postea resinam fundunt: sub Autumni vero fi-

nem, & Hyemis initium maturitatem consequi ferunt. In hac arbore viscum, quod *Stelin* Pl. ex *Theophr.* appellat, observavi anno Redem-  
pitionis humanæ 1533. sed longè maiore deinde copia 1585. in vivario *Illustr. D. Hyneck à V. Val-*  
*stein* *Promarchionis* *Moraviæ*, non procul à *Pier-*  
*niz* ipsius urbe (cum arcem incolebat *Albis*)  
periinde atque vulgare viscum bacis præditum.

Viscum Abietis anno 1587. cum essem in *Ruchen* vivier allatus mihi ex proximo monte *Val-*  
*lon*: repertum etiam anno 1591. ipsemet ibidem in-  
tu natus tametsi de recte arbitris.

In desperata fame posse & solère homines ex integris conis seu fucibus Abietis famam suam adaugere, quò largius cibentur, autor est *Strep-*  
*pitus*. Cortex & resina Abietis arida, qualitati-  
bus ac viribus cortici, & aridæ *Pini* resinæ valde  
sunt similes, nisi quòd paulò aciores magis de-  
tergent. Vini Abiegni vires, eiusque præparandi  
modum, vide cap. de *Cedro*. Abies, ut ex ha-  
ctenus dictis constat, navibus aptissima est: tri-  
remes enim & longa navigia ex eâ levitatis gratiâ  
sunt. *Ædificiis* optima quæ vetustissima, modò  
cariosa non sit. Quin & ad tabulas pictorias, au-  
thore *Theophr.* & ad quamplurima alia utilis est.

Pondus sustinent validè Abies & *Pinus*: renitun-  
tur enim nec temerè rumpuntur, ac prout carne,  
quàm viribus deficient. Antiquis *Hedera* vini  
venalis indicium erat, ast nunc quibusdam in lo-  
cis Abies. *Viennenses* *Austriaci* dum venale vi-  
num habent, Abietis ramos ante ædes suspensos  
proponunt, quibus si ex stramine citrus unus ap-  
ponitur vinum præcedentis anni denotant. Si  
duo citri vinum trium annorum indicant. Si nul-  
lus, eiusdem anni vinum esse significant. Vine-  
torum pedamenta & pali *Viennensi* agro ex *A-*  
*biete* sunt. Fertur vulgus *Tigunnum* offendi,  
si quis gesserit in pileo ramum Abietis transiens  
per urbem. Similæ novæ & tubuli fontium novi  
ex Abiete & similibus lignis dum sunt recentes,  
odiosum saporem aquæ imprimunt: ideâ faciunt  
pyxides abiegnæ, cum condita, tabella, trochisci  
& similia imponuntur, præsertim si calor accedat,  
ita fastidiosum, & ingratum odorem, non tamen  
ullius pernecabilis malignitatis participem, con-  
trahunt, ut ab eo contenta vindicari non pos-  
sint, ut aliquando monuit egregius Medicus &  
Botanicus *Iac. Gargillus* *Scotus* in thesibus, quòd  
equidem observandum *Pharmacopœis*. Digitis  
vulneratis totum mixturæ facti ex cineribus Abie-  
tis, additâ radicis *Althææ* parva quantitate, *Felix*  
*V. Virz.* conferre scribit. Ait *Columella*, quòd  
quidam abiegnæ scoe mala custodiunt. Semini-  
bus Abietis valde oblectati ait *Gesh.* aves mon-  
tanas, quæ Latine *Loxus*, Germ. *Kreuz* *Vog-*  
*gel* ob totum longum decursum vocari tra-  
dit.

ABIETINA RESINA LIQUIDA  
ET ARIDA.

NOX solùm ex caudice, ut vult *Amatus*, sed  
ramis etiam & veticis affectis, intra quas re-  
sinam ipsam sive oleum abiegnum contentum  
esse dicit, extrahitur. Est autem ut eam describit  
*Apollo*, liquor ille limpidus, clarus, transparentis,  
validè fragrans, atque amarus, globulis quibus-  
dam inter corticem & corticem prætumidis, hu-  
morem eò loci subesse indicantibus, rarus sanè,  
videlicet impermixtus. Ex Abiete tam mare,  
quàm *Jarmina*, eximius hic liquor perfluit, vulgo  
noluo

Tempus

Viscum  
Stelin Pl.  
nio.

Trag. nota-  
tim.

Benchillan.  
Fungi Ma-  
ventes.

Vinum  
bregnum.

Viscum  
Pinus.

Viscum  
Pinus.

Viscum  
Pinus.

Pali Sine-  
rum.

Abies ob-  
la Tigun-  
nus.

Sinula. To-  
buli.  
D. G. G. G.  
nera.

Malorum  
Asser.

Cortex  
seminis  
testis.



nostro Abietis, alii *Lagrime*, sive *Olio d'Avezar*, Augustensis Pedemontio confinisbus, unde legitur ad nos transit, *Bigion* dictus. *Lagrime* quidem appellant, quasi Abietis lachrymam, de quo veteres nihil (quod equidem Math. sciat) posteritatis memorie prodiderunt. Nisi quispiam dixerit Galenum de comp. med. per genera, intellexisse Picem illam resinam, quam pro terebinthina vendebant. Cuius rei illud indicium esse videtur, quod scribat ipse, hanc & gustu & odore terebinthine esse persimilem, quod in abiegna lachryma maxime notatur: & quod insuper sit quadantenus terebinthina acrior: namque huiusmodi qualitates in liquida Picæ resina minime reperiuntur. Suspiciendum putaverit Matthiol. in Galeni verbis, Libratorum forte culpa fuisse mendum. Auxique illi suspicionem hanc ipse Galenus: quippe qui scripserit in Euphorbii medicamento inter resinas ceteris odoratos haberi terebinthinam & abiegnam, hancque illa calidiorem esse. Fallunt autem, qui putant abiegnam lachrymam clarissimam esse larignam: quandoquidem illa inter Abietis cortices vomice modo coascatur, & seceto corio elicitur: hæc verò manat de Laricis caudice ad medullam usque perforato, ut is experientiâ doctus facile attestari potest.

Abies, inquit Ruellius resinam fundit compressis quoque celebratam, quoniam odorata sit, quam gallicum vulgus *Avetam* vocat. Lachrymam ex Abiete Liguriæ & Taurinis dici *Bigion*, quasi abiegneum, auctor est Seahger. Vocatur à Casti Dur. *Oleum Abietis*. Calceol. *Abiegna resina*. Avizo de cur. vuln. Terebinthina abietina. Toxie in Onom. *Resina Abietis*, & *Gummi Abietis*, quod posterius non placet, cum gummi consistentiam non habeat. Catal. Francosurt. *Abietis lachryma*. *Oleum abiegnum*, Germ. *Flussendharz*. *Ölin Thannenharz*.

Nec omittendum, quod Abietinæ resinæ vel terebinthinæ nomen obanuit resina quædam Indica, cuius arbores fere, nec sunt Pini secundum Marard, nec Cupressi, de qua postea. Obtinuit & altera, Resina Americana, seu Resina Carthaginis novi Orbis, de qua infra.

Maximo usui generi humano hanc Abietis lachrymam esse testatur Matthiolus. Hæc, inquit, vulneribus recentibus maximum adfert praedictum, quod non solum conglutinet, sed & mundet, & sarcotica habeatur. Pota renem calculos eicit, arthricos dolores mulcet, coxendicumque eructus lenit: capitis vulnera misicè sanat, adeo ut hac solâ nonnulli utantur. Additur in antidotis balsami vice. Huius autem facultates ita prosequitur Hist. Lugdunensis. Abietis liquida resina, calida siccaque ordine tertio, acrimonia quadam suâ tergendî vim obtinet, & ad veræ

Terebinthinæ qualitates proximè accedit: sumpta semuncia pondere, per alium biliosos humores vacuat, renes abstergit, ulceratos sanat, urinam cit. Nucis magnitudine devorata cum Nuce moschata & saccharo, stranguriam sanat, pudendumque ulcerationi maxime succurrit. Hæc paulo aliter ita refert Dodonæus. Huius resinæ facultas est quasi Pitynæ, minor nempe, quam Strobilina, acrior autem & calidior quam Terebinthina ac Laricea. Lachryma verò Abietis, uti Terebinthina ac Laricea acrior est, ita quoque his calidior ac siccior: abstergit, aperit, vulnera recentia conglutinat, fordiora emundat, capitis vulneribus præcipue conducit. Dimidia unc. pondere assumpta, alvum elementer movet, &

in intestinis contenta expurgat: tum & calculos & arenulas in viis urinariis hærentes expellit: mediocriter verò & urinam cit. Adversus autem fordidorum ex pene humorum profluvium [Gonorrhæam veterem] confert, si aliquot diebus continuis matutino tempore sumatur: præstat verò elotam esse cum stillatio liquore Plantaginis, Lactucæ aut alio consimili refrigerante, qui acrimoniam & calorem eius remittat. Non desunt, ut Apollo ex Matthiolo innominato refert, qui larignam resinam abietinæ malitiosè admisceant, ut hac imposturâ magis lucrentur, cò quod omnes abiegnam pluris faciunt, quam larignam. Sunt etiam qui percolatam larignam & ad ultimam claritatem redactam pro abiegna vendunt. Sed fraus cognosci potest, quod Abietis lachryma substantiâ minis consistat, odore præstantissimo fragret, & gustus larigna sit amarior, ad annumque asservata quadantenus flavescat, cogaturque. Hanc nos Dioscoridi & Plinio ignotam facile comitemus (quod liquidæ abiegna non recordentur), licet Bellonius contrarium asserat, cuius integram historiam hæc usque asservatam, huc referimus. Resinarum appellatio multò latius patet, quam à vulgo facile intelligatur. Quæ cum ex multis & variis arboribus, ut Abiete, Picea, Pino, Larice, & id genus aliis, defluant, de his scorsim iure tractatur merito. Resinarum autem duo summa fastigia tantum ab authoribus traduntur, liquidarum scilicet, & aridarum. Magnam hodiè imposturam à multis in resinis liquidis committi video, inquit Bellonius, siquidem eam, quam Dioscorides, Oleosam vocat (quæ Abietis resina est) ab omnibus nostris temporis Medicis & Iatrapiis pro Terebinthina usurpari palam est: cum tamen vera Terebinthina non sit liquida, nec adeo retortida, sed mediam quandam habeat inter utramque consistentiam. Hæc, ut & resinæ omnes aliæ vetustate siccassit, quemadmodum & Thus, Mastiche & alia. Dioscorides Oleosam liquidam resinam, & aridam vocatam, quid sit, non exprimit. Illa nisi manu premeretur nunquam spontè ab Abiete profluere. Italicum vulgus suam retinet appellationem ad græcæ dictionis nomenclaturam, quam *Olio d'Avezar* vocat, quasi abiegni oleum diceret. Galia falsò Terebinthinam Venetianam vocat, ad alterius Laricæ resinæ differentiam, quam suo cognomento Terebinthinam communem vocat. Oleosaitaque resina, sive abiagna revera ab Abiete exprimitur, hac ratione. Qui pecora pascunt, interdiu ne desidia torpescent vaccinum cornu vacuum dextra manu tenentes ad Abietis sylvas accedunt. Illi autem cum in novellas adhuc Abietes inciderint, siquidem in earum cortice nullam rimam apparere viderint, oleum subesse statim cōficiunt: nam glabro cortice vestitam Abietem tuberculis scatentem comperiunt, quum tamen annosorum cortex in rugas contractus nullo tuberculo ostendat. Idè novellarum arborum prædicta tubercula, sic labio cornu premunt, ut liquorem inde oleolum intro detrudant. Neque tamen hoc modo quam diffusissimâ etiam adhibita opèrâ, ultra uncias quatuor in dies legere possunt. Siquidem singulare quodcunque tuberculum non ultra quam guttam unam aut alteram continet. Illi verò cum per totum diem multa tubercula suppuraverint, tamen secum perbellè actum putant, si cornu unum quod quatuor unciarum capax, oleo plenè abstulerint. Ex quo quidem fit, ut resina hæc ceteris rarior sit, maioriisque vendatur. Hæc

Gonorrhæa.  
Lora præstat.

adulterio.

Fraus de-  
regitur.

Diosc. &  
Plin. ignota

Resina ap-  
pellatio la-  
te patet.

Resinifera  
arbores.  
Resinarum  
duo summa  
fastigia.

Oleosæ resi-  
na  
Terebinthi-  
na substanti-  
atur.

Diosc. nota-  
tur.

Olio d'A-  
vezar.  
Error quo-  
rundam.

Resina abie-  
gna oleosa.  
Colligendus  
modus.

Ex Abieti-  
bus novelli-  
ssimis.

Picia qua-  
tuor indices  
leguntur.  
Quodlibet  
tuberculum  
unam aut  
alteram  
tortu gut-  
tas sondu.  
Bellonii la-  
pis.

ille, quem vox italica *Olio d' Avoeto* movit, ut crediderit resinam oleosam [id est] Dioscoridis, esse Oleum abiegnum: Cum tamen Diosc. cap. de resinis, eo loco non amplius resinarum genera, id quod prius fecit, sed resinarum coloris differentias explicet. Ipsa quoque (Resina) inter se colore differunt, ait Dioscorides: siquidem candida quaedam est, alia Oleosa (*ἰδαυδὴς*) alia denique mellis similitudinem habet, uti Larigna. Saepe ergo Dioscoridi liquidam Abietis resinam, quam officinae Terebinthinam Venetam vocant, Galli

Terebinth.

Veneta.

Resina ab-

regna ar-

da.

Thuris odor.

Locus.

Substituta.

Tempera-

mentum.

Thurs Gar-

put.

Terebinthine de Venise, non fuisse cognitam. De sicca autem hac tradit. Ex ficcis resinis alia est strobiliana, alia abiegnata, alia quam fundit Picea, alia denique Pineae. Eligito omnium maxime odoratam, perlucidam non valde aridam neque humentem, sed cetera similem, atque friabilem. In eo genere praestant pinea & Abiegnata (*ἰδαυδὴς*) odorata enim sunt, atque thus odore imitantur. Praestantiores ex Picyula insula, quae secundum Hispaniam sita est, deferuntur. Quae vero ex Picea, strobilo & Cupresso manant, inferiores sunt, neque tantis atque illa viribus pollent. Veruntamen eorundem gratia, quorum & illa, usurpari solent. Caterum, resinam Abietis aridam qualitatibus ac viribus aridae Pini resinae valde similem esse, sed paulo acriorem, magisque detergentem, iam ante diximus. Hanc praeterea in offic. vendere pro Thure, & Garipor, uti etiam resinam siccam Pini, quandoque solent.

## PICEA LATINORVM SIVE

ἰδαυδὴς, Abies mas Theoph.

## CAP. II.

Descriptio

Rami.

Folia.



foliis reservare ramos, quorum extrema ineunte Inti. Aestate iuvos protendunt singulares, pallefcente quadam farina refertos: quibus etiam postea adnascuntur coni, cylindracei ferè, squamis imbutum compacti, levibus, tenuibus, in principio purpurascens, quae etsi dehiscant, non tamen excidunt, sed ramis etiamnum adherescunt: quorumque unicuique duo sunt adiuncta semina, parva, alta, rufa, adstringentia, medulla intus alba, maxime tamen dura, ut an dicendi sint nuclei, cum Cordo aliorum relinquantur iudicio: Horum longitudo interdum ad septem aut octo vacias extenditur: materies ligno quidem facilis fa-

bris, sed de opere deterior, ut quae pro aëris cōstitutione intumesceat, detumescitve, subinde in edificis crepitans, oneribusque cedens. Hinc excoquitur pix. Resinam fundit, tum è conis, tum è trunco, gummi concretionem.

Pix Resina. Gummi.

Theophrasti historia de Picea Latinorum, si ve eius Abiete mare [*ἰδαυδὴς*] cum iam partim cap. praecedente de Abiete foemina [*ἰδαυδὴς*] per scripta sit, partim etiam ab aliis hoc praesenti cap. recitetur, nos de ea pluribus agere superfluum ducimus. Quare hac neglecta directè ad Plinium festinamus.

Picea Theophrasti. Plinius. Picea.

Picea, ait is, montes amat atque frigora: aëralis arbor, & fune buindicio ad fores posita, ac rogis virrens: iam tamen Scin domos recepta, consili facilitate. Hac plurimam resinam fundit, interveniente intermicante Dalech. candida gemma, tum simili Thuri, ut mista visu discerni non queat: unde fraus seplasia. Omnibus his generibus [omniò huic generi Dalech.] folia brevifera & crassiora, duraque, ceu Capressis. Picea rami penè statim ab radice modici, velut brachia, lateribus inhaerent. Fructus Piceae unus: materies ad fissiles scandolas, cupasque, & pauca alia secamenta. Vitis radicibus Picea repullulat, ut in Lesbo accedit, incendio nemore Pyrrho. Nucamenta Picea totis paniculis, minoribus, gravioribusque, minimos ac nigros nucleos habent. Propter quod Graeci Phitrophoron eam appellat. In eadem nucamenta compressiora maribus sunt, ac minùs resina roseida. Nec ullo flore Picea exhilaratur. Provenit germinatione 15. ferè diebus. Semen verò (Vere C.H.) post Vergilias & ipsa reddit: folia ei sunt insecta pectus modo, pungentia. Non fastidienda hac quoque scientia, atque non in ultimis ponenda, quando quibusque satis umbra aut nutritrix aut noverca est. Picearum quidem non dubiè venenum est. Et hac de Picea, prater vires quae suo loco traduntur, Plinius ipse annotat, de quibus, quod nostrum sit iudicium, infra dicemus. Notandum tamen hic obiter venit, 1. Plinium *arbor* ex Theoph. Piceam verisus, quod non placet: melius verò Theoph. *arbor* tedam & Pinastrum reddi. Sed nec Clus. corrigit, quod mirum. Deinde Piceam nullo flore exhilarascere dixit idem Plinius, cuius contrarium Matth. asserit: ibidem Ruellium & alios erroris accusans, quod Piceae tribuant quae sunt Laricis, ac propterea Plinii lectionem corrigit. Ac tertio, quod Plinius scribit ramos à radice fundi, id, si Scaligero credèdum, aliorum errorem secutum fecisse: quandoquidem coniferas, suam naturam ab initio puras post radicem scribit: atque ubi creverint, inde fundi.

Thuris gemma.

Rami.

Fructus.

Materies.

Nucamenta.

Phitrophoron.

Vos.

Non sunt.

Temper.

Semen.

Folia.

Ymbra.

Vitis.

Picea.

Ruell.

Tax.

Hermol.

Picea.

Cordi.

Cera.

Cembra.

Abies.

Fraga.

Picea.

Larix.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.

Picea.



dum factum sit.

Si Gallico nomine, inquit Bellon. de arb. conf. *Sapinum* appellare volueris, non dices *du Sapin*: cum id nomen Abieti (fœmina) debeat. Gallicè autem dicendum *Suisse* Ne autem eandem arborem si Abietem lectâ, (fœminam) & Sapinum [Piceam Latinorum, sive Abietem mârem] esse credamus, facit, quod utramque dictionem à Latinis usurpatam fuisse videmus. Sic enim Plinius lib. 16. cap. 39. scribit. Cato, ait, hominum summus in omni usu de materiis hæc adiicit, Prelum è Sapino, altâ potissimum, facito. Quia autem, rectè ut plurimum assurgit caudice ut Abies, atq; eadem ferè altitudine, parùm refert, si Sapinum, fœminam Abietem esse pronunciauerimus, ut legitur in lib. Obl. 1. cap. 44. Hæc ille, cuius figuram, quam Sapini nomine exhibet & describit, tanquam malum non recipimus, quamvis interim descriptio Piceæ sit & placeat, non tamen cum Bellonio, fœminam facimus, sed matrem Abietem, de quâ Theoph. lib. 3. cap. 10. Plinio fortè etiam Abies mascula hæc si fuerit, ut existimamus, non erit durissimum, quod Plinius dixit de Abiete, pungentia ei esse folia. Piceam quoque Plinii esse, ut vult Matthiolum, & alii, negare non audeamus: suspicamur enim Plinium sub nomine Piceæ multa dixisse, quæ de hac arbore dici possent, ac de ea, quam *Pinus* Theoph. vocat. Nec putamus hæc *Pinus* Theophrasto & Dioscorid. dici. Sed Plinio evenit fortè in hac voce Piceæ, quod in Larice, ut modò ei sit ea arbor, quæ *Pinus*, modò propriè Picea, sive Abies mas. Quam porro Piceæ arboris titulo proponit figuram, Pini silvestris est.

Bellonius à Matth. quoque reprehenditur qui cum continet Græcorum sententiam sequutum esse dicat, ac id totum Piceæ arbori reddidisse contra Theodori sententiam, quod Theophrast. *Abies* Græcè scripsum reliquit: Non dubium etiam esse, quin veteres Græci *Pinus* pro Picea usurparint: Illudque Bellonii falsum esse, quod ex tæda Piceæ fiat pice, utis asserat, perperam Theophrastum interpretatus: siquidem rara admodum sit Picea, quæ tædam habeat: Præterea Piceam, cuius folia abiegnis paululum latiora, molliora, laviora, & minus pungentia, magno errore Bellonium *Sapinum* appellare: At arborem, quæ Græcè *Pinus* dicitur, Latine Piceam nominari, call. *un arbre du genre du Pin*.

Idemque Matthiolum in post. comm. eadem tradit, omittens reprehensionem Bellonii de tæda Piceæ, & de pice, ac fatetur ex Pino silvestri, fieri piceam nigram. Immeritò verò accusat falsitatis Bellonium, cui Pinus silvestris erat Picea. Mirumque eum tribuere folia latiora & molliora Piceæ, cum contrarium atoposia doceat: ac præterea inter nomenclaturas cur Piceam vocet *Pinus*, cum nomen Gallicum non conveniat. In historia autem eius Germanica tribuuntur Piceæ, quæ sunt Abieti adscribenda: Camer. verò aliam apposuit figuram.

Anguill. Pezzo (Picea) vulgaris de quâ Plinius scripserit, dicitur: cui verè contra Matth. folia tenuiora tribuit, quam Abieti.

Diximus antè *Pinus* non esse Piceam, licet Dod. Gall. id affirmet, Pitynque & Piceam eandem esse arborem Scribonium Largum satis declarare putet sic scribentem: Resinæ pituinæ, id est, ex Picea arbore. Dodonæi etiam figura non benè Piceam arborem exprimit, nec quadrant, quæ de foliis dicit, non circumdare ramos, sed sibi opposita esse instar parvarum annarum: qui

ordo potius in Abiete: mecum autem sentit Bellon. ac alii non pauci, qui dicunt ramusculum nullo ordine circumdari. Is porro in Hist. lat. in fol. non amplius *Pinus*, aut Piceam inscribit sed abietem, *Abies*, Germ. *Weiß Thannen*. Malè autem Dodon. *Weiß Thannen* [Abietem fœminam] diversam tradit à Sapino, quam. n. describit & depingit pro Abiete non est *Weiß Thannen* Germanorum: sed potius ea, quam Germ. vocat *Schwarz Thannenbaum* & *Rohr Thannenbaum*/Lat. Piceam, Græcè verò *Pinus*, sed malè, cuius etiam pessimam exhibet figuram: ea enim quam posuit pro Abiete melior est. Is igitur duas ponit figuras, & duas descriptiones vnius arboris, & præterea cum Picea Plinii, sive *Rohr Thannen* confundere videtur Belloni Piceam arborem longè diversam, atque id etiam in Hist. gall. fecisse, ni fallimur: Vnde nobis planè perquam odiosum Abietem & Piceam non benè notas fuisse arbores Dodonæo.

Qui considerabit descriptionem Tabern. etiam apud VVirfung. vocantis Abietem nigram, *Rohr Thannen*, Penceam & Piceam, compertiet mixtam & confusam esse cum Picea Abietem.

Turneri iudicio Theophr. appellat *Pinus*, quæ Latinis est Picea: nec *Pinus* Theophrasti, est Pinus Plinii: Pence Theophr. in multis convenit, cum Picea Latinorum, quam Germ. superiores vocant *Rohr Thannenbaum* [Abietem rubram.] Hæc non provenit in Anglia, nec Anglicum habet nomen, quod sciat, possit tamen appellari *Piche* tre, quia pice ex eius resina fit, vel ex germanico interpretandum *Rond feur tre*. Et Gazar. malè vertit Pinastrum, alibi etiam Pinum, quasi nihil interesset inter Pinum & Pinastrum. Existimat igitur Turn. *Pinus* esse Piceam apud Galenum, Diosc. Alium, & alios, qui post Galenum scripserunt: Germ. *Rohr Thannenbaum*, sed fallitur ut in pluribus aliis.

Lacuna in Diosc. turpem habet figuram, vocant Sapinum, ac ut videtur, etiam Piceam, cum comparat Piceam Abieti Matthiolum imitatus, antè tamen exhibuerat pro Picea arborem Bellonii, ita ut has duas plantas confundere videatur.

A Gesner. quoque, Ryffio, Amato, Apolline, Helfrico, aliisque in hac planta dissentimus, quod reliquum est ut declaremus.

Variæ in primis est Gesn. sententiâ. Is enim de hort. ait. Picea si est, est quam Tigureses Abietem rubram appellant, à corticis colore. Piceam in altis montium sylvis nascentem pro Piceastro accipiunt. Idem olim in cat. pl. Picea arbor, *Pinus* ut Gaza è Theoph. reddidit, *Rohr Thannen*, ut quibuldam videtur, *un arbre du genre du Pin*. Et, eodem libro. Piceaster arbor *Pinus* dicitur, sylvestris species, *Rohr Thannen*, *une sorte de Pin* sauuage. Item, Pitys, Picea arbor, *Rohr Thannen* putatur aliquibus. Hæc ille, qui nihil determinat, & lectorem maximè dubium relinquit, nec è bivio educit, sed in devium abducit. Nos igitur aberranti succurrentes, hæsitanti verum indicantes, dicimus *Rohr Thannen* non esse, neque *Pinus*, neque Piceam, ut vertit Gaza, nec etiam de genete Pini, nec agnoscimus Piceam aliquam sylvestrem, quæ sit *Rohr Thannen*.

Ryff. in Diosc. videtur ex Gesn. eo non citato tradere, Piceam vocari Græcè *Pinus*, Germ. *Rohr Thannen*, ut quibuldam videtur, aliis ein *feuchd Thannen*, Gall. *un arbre du genre du Pin*. Indagandum verò an Hub. Berland. in Diosc. Piceam eam intelligat, de quâ hic scribimus.

Dodon. alii errorci.

Tabern. confusum.

Turn. lacuna.

Lacuna. rei darguuntur. Sapinum.

Gesn. nota tur. Abies rubra unde dicta.

Abies rubra nec. Pinus est, nec Picea. etc.

Ryff nota tur.

An Picea Berland.

Amat. re-  
pro.

Tivon græcè, non est *Picea*. latinè, ut vult A-  
matus in Diof. qui alibi malam Bellonij figuram  
Sapini, quam Abietem feminam existimant, re-  
cepit.

Apollo sa-  
xat.

Apollo non distinguit *Piceam* descriptam à  
Matthiolo, à *Picea* Bellonii, licet magnum sit dif-  
crimen: quomobrem non existimo eum scitè sen-  
tire *pinus* simpliciter idem esse cum *Pino*: Quæ  
etiam scribit de *Picea* non conveniunt, ut nec  
*Piceæ* Matthioli, nec *Piceæ* Bellonii. Perperam  
etiam putat Sapinum Bellonii, non alludere ad  
*Piceam* Matthioli: Perpendant doctiores, quam  
plantam intelligat nomine *Piceæ* urbanæ Allo-  
brogum, quam Matthiolus ignorasse scribit. Pli-  
nio ex Metrod. Scepti sententiâ placuit ab arbore  
*Piceæ*, quæ *Pades* Gallis diceretur, Patavii nomen  
derivare: eò quod circa fontem eius plurima na-  
scereretur.

Padus.

De quo sic Gærop. Venet. & Hyperb. libro.  
Quid sit *Padus* apud Theoph. nec ego scio, nec ab  
alio me rectè doctum iri spero, propterea quod  
unâ solâ, umbrosoforum locorum quibus nasci  
gaudeat, notâ, describatur, nisi hoc aliquid iu-  
vet, ut è genere *Picearum* credatur, quod *Taxo*  
foliis *Piceæ* imitanti annumeretur. Quando verò  
*Pades* Gallis olim *Piceam* significavit, æque atque  
prius ignoro. Verùm, quod *Methrodorum* iu-  
vem, confiteor *Padum* à *Picea* dici, sed nego *Pa-  
des* *Piceam* Gallis notare.

Alciatus  
notat.  
Hæstic, sa-  
xat.

Alciati figura in emblematis nil commen-  
danda. Diverfarum plantarum nomina nostro  
iudicio confundit *Hæsticus*, qui *Piceam* Latino-  
rum magno errore, græcè dicit *Pinus*.  
Soyffæ delphinatam non esse veterum *Piceam*,  
contra *Math.* assent *Solerus*.

Picea Pli-  
ni Clusio.

Quæ *Plinio* *Picea* dicitur, quæque etiam id no-  
men apud huius ætatis rei herbariæ scriptores re-  
tinet, *Clusii* opinione nihil aliud est quam *Theo-  
phrast. in d. d. p. p.* [ *Abies* mascula ] arbor procera,  
& in metæ modum crescens, foliis brevibus &  
pungentibus, undique ramos singulatim cin-  
gentibus, qui cruciformiter & decussatim in arbo-  
re nascuntur, quam ob causam Hungari *Žerž-  
tós senyó* [ cruciatam *Abietem* ] nuncupant. *Se-  
nyó* autem vocabulum, quod proprie *Iuniperi* li-  
gnum significat, adaptant Hungari omnibus ferè  
arboribus perpetuâ fronde vitentibus, quæ fo-  
lia spinæ æmula habent. Quæ verò *Theophr.*

Folia.  
Pinus Gra-  
corum.

*Pinus* sit ex *Gazæ* versione & vulgatis græcis co-  
dicibus, difficulter admodum iudicari posse idem  
existimat, quandoquidem eius materiam operi-  
bus ineptam esse, & magnitudine *Pino* mino-  
rem, minùsque erectam surgere, scribit. At ut ex  
melioris notæ codice colligere licet, omnium  
doctorum iudicio, ea est arbor, quam *Plinius* *Pi-  
ceam* appellat, & apud recentiores rei herbariæ  
scriptores eodem nomine donatur. Fert verò ea  
Maio mense in extremis ramis singulares iulos  
palescentes farinâ plenos, deinde strobilos sive  
conos mollibus squamis imbricatis compositis  
constantes, purpurascentes dum novelli sunt &  
primum nati, deinde paulatim in longitudinem  
excrecentes, quæ in maturis septem aut octo  
interdum unciarum est, sub quibus exiguum a-  
latum semen, *Pinastrum* simile fovetur. Sed &  
multas habet notas ex quibus conicere liceat,  
*Theophrasti* loco iam memorato *ἐλάττω ἀββίον* esse,  
hoc est *Abietem* marem. Ac meminit etiam  
*Plinius* lib. 15. cap. 10. *Piceæ* sativæ, quæ *Sapi-  
neam* nucem ferat.

Golius no-  
tat.

Minds convenienter *Theophilus* *Golius*  
in *Onomastico* *Piceam* Latinorum, sive *Pi-*

ceam vulgò dictam Germ. *Bech* *Thannen* vo-  
cat.

*Cæsalpini* porro perplexam, intricatam & ob-  
scuram de *Picea* doctrinam consultò negligimus.  
Non tamè illi penitus cœcedimus *Pinus*, *Theophras-  
ti* esse eam, quam pro *Picea* descripsit: nec ei  
conveniunt, quæ ex *Theophrasto* huic attribuit,  
atque is etiam non animadvertit, *Piceam* ut vo-  
cat, à *Theoph.* traditam pro *Elate* mare.

Convenit *Piceam* Latinorum Græcè appellare  
*ἐλάττω ἀββίον*, *Abietem* marem, Germ. *Kohr* oder  
*Schwarz Thannenbaum* & *Fiedren*. Belg. *Deck-  
boom*, Gall. *Pesse*, *Garipole*, *Pin sauvage*, Burg. *Fève*,  
Ital. *Pezzo*, Hisp. *Pin negro*, Anglic. *Pidee tree*.  
Bohem. *Sinif* / Hungar. *Žeržtós senyó* / Arab.  
*Arz*.

*Piceam* pinguem cognominat *Mantuanus*, *Epithetum*  
*Virg.* *Idæam*, & nigrantem: Non quidem ob co-  
lorem, sed ob fumum, ut mihi videtur, quem ac-  
centia emittit, sic enim canit alibi.

Nam sæpe incautus pastoribus exciatis ignis,  
Qui furtim pinguis primum sub cortice reclusus  
Robora comprehendit, frondisque elapsus in altas  
Ingenrem caelo sonitum dedit: inde securus  
Per ramos visitor, perque alta cacumina regnat  
Et totum involvit flammis nemus, & rursus atram  
Ad caelum *Piceâ* crassius caligine nubem.

Picea sui-  
mus.  
Piceum la-  
men.

Idem  
Diripere fucos *Piceum* fert fumida lumen  
Teda, & commisit *Vulcanus* ad æstra favillam.

*Piceæ* sanè nomen multis plantis attribuitur: *Æquivo-*  
sed potissimum à nobis arbori iam descriptæ, *E-*  
late scilicet *Theophrasti* mari, sive *Piceæ* Latino-  
rum, seu *Abietis* rubræ Germanorum. *Clusii* etiam  
pumilam descripsit, de qua mox. *Pinus* *Theophras-  
ti* *Cæsalp.* non bene interpretatur *Piceam*. *Pinus*  
sylv. à pluribus dicitur *Picea*, ut videre est in se-  
quentibus, & *Piceaster*. *Pinus* sylvestris tedâ va-  
rians parum à præcedenti, *Picea* etiam dici vide-  
tur. *Pinus* sylv. *Mugo* dicitur etiam à quibusdam  
*Piceæ*, & fortè *Picea* *Corcyrensis* nigra. *Pinus* sylv.  
sive *Pinastrum* tertius *Clusii*, fortè *Piceæ* genus  
alterum *Bellonio*, *Pinus* sylv. *Olympi*. *Pinus*  
sylv. *Idæ Troadis*, sive *Picea* *Bellonio*. *Mariti-  
mam* *Pinum* sylv. primam *Matthioli* suspicamus.  
*Piceam* in planis *Bellonii*, *Pinum* maritimam co-  
nis firmiter ramis adhaerentibus. *Cembro* existi-  
matur *Picea* *Diof.* per *Cordum*. *Cæsalp.* vocat ur-  
banam *Pinum*, & fructum *apineum* *Plinij*. *Pinus*  
à quibusdam malè dicitur *Picea*. *Taxus* verò voca-  
tur *Picea* funesta.

*Piceas* cultum respuere conicio, quod sæpius  
in horto E.C. frustra curavi plantandas. Attuli  
autem ex montibus *Franchi montagne* in Burgun-  
dia, ubi abundant. Maxima copia Crescere, cum  
in *Viennensi* saltu, tum aliis montibus, *Alpibus*  
que vicinis, testatur *Clusius*.

*Piceâ* scætère sylvas *Tigurinas* & montes, au-  
tor est *Gesn.* qui translatis arbusculas brevi ado-  
lescere prodidit. Qualitatem verò terræ con-  
gruam nobis innuit *Pœtæ* princeps secundo  
*Georgicorum* suorum.

— at sceleratum exquirere frigus.

Difficile est, *Picea* tantum, *Taxi* non centes

Interdum, aut *Hedera* pandunt vestigia nigra.

Inter resiniferas *Pinus* & *Picea* (mirum dictum)

*Erucis* venenatissimis sunt obnoxie, magis quam  
quævis aliæ sui generis. Nam et si sæpius contin-  
gat, ut *Abietes*, *Larices*, *Pinastrum*, in eodem quo  
*Piceæ* sunt, tractu nascantur: illa tamen ab *Eru-*  
*cis* immunes esse solent. *Picea* verò tam multis  
erucis obnoxia est, tam in montibus, quam in pla-  
no, ut

Picea n-  
bui.



no ; ut magna arboris pars albedine ceu telis araneorum obtegatur : Erucæ siquidem telas pratenuces texunt araneorum telis similes, in quibus noctu quidem delitescunt. Interdum autem cum à frigore, imbre, vel Boreâ vento lacescantur intrò sese recipiunt. Vbi verò dies elucescit, ita per ramos sparsæ vagantur, ut tanquam apum examen, altera alteram insequens appareat. Interdum quoque accidit, ut Piceas suis foliis denudent, easque ita erodant, ut totius arboris folia absument, nihilque nisi ramum relinquant. Perniciosissimum veneni genus Erucam esse comperimus habet Bellonius, quod neque veteres latuit, qui eas quæ in Pinu & Picea nascuntur *erucædum* vocarunt, nostri Pinorum Erucas. Dioscoridi id abundè decantatum est, ceteris quæ qui eum sunt secuti, qui tamen exitiolem veneni vim eas habere scripserunt, ut his qui illas hausissent alvum ac stomachum inflammatione torqueri, pruriginem concitari, atque corpus totum exsternuere faceret, multaque alia symptomata excitaret. Quarum rerum dum rationem aliquam investigare studeat Bellonius, comperit eandem suo maximo malo, multa ab his hominibus incommoda provenire siquidem, cum per Piceas istis insectis onustas transiret, aliquotq; ramos fortè fortuna ipsis Erucarum examinibus referret avulsisset, secumque linteis involutos detulisset, tandemque Erucas, quæ multum firmiter linteo pedibus inhærebant, & telis, quas continuò vident, sese firmabant, fortiori digitorum compressione prehensens, villosque sive lanuginem earum atterens, villi in cute atque etiam in carne digitos eius subingressi effecerunt, ut tres integros dies tantam pruritum, caloris & doloris acerbiteretum feriret, ut ne manu quidem interim tangere, neque in lecto noctu se continere, nec propter cruciatum dormire potuerit: brachium verò collo appensum esse per totum id tempus oportuerit.


Piceæ, si eandem nobiscum intelligit Plinius, ut Laricis folia trita & in aceto decocta, dendum dolori profunt. Cinis corticum intertrigini & ambustis. Potus alvum sistit, urinam movet. Suffitu volvas corrigit. Piceæ folia privatim locinoti nullafunt, drachmæ pondere in aqua multa pota. Sylvas, eas duntaxat, quæ picis, resinæque gratia raduntur, utilissimas esse phlegmatis, aut qui longè agitur tunc non recolligunt vires, satis constat: & illum cœli aëra plus ita, quam navigationem Egyptiam, proficere, ac pluviam lactis herbidos ex herbis virentibus & vegetis geniti, Palech, per montium aëra potus. Sapius Bellonio ad irabes & asseres faciendos idonea censetur. Tubis ad aquarum ductus conficiendis non æquè ac Larix, aut Abies idonea est. Arqui quoniam eius materies rara & laxa est, ob omnimodum operi abdicatur: quocirca eam ei rusticis omnib. aliis lignis propter suam molliem postponunt. Sed cum caudex est integer, satis firmus quidem est, ut ex eo asseres fiant, ac valvarum repagula: alioquin accedendo igni tantum est aptus.

*Piceæ Resina.*

Gignit Picea plerumque Resinam suam obduram. densam inter corticem & truncum concretam, at testante Amato, quanquam aliquando, sed rarè liquidam quoque emittit, & illam quidem Larici similem. Piceæ, inquit Bellon. Resinam exudant odoratâ, subalbâ, amaram, & *asformi* Græcè dictam.

#### PICEA PVMILA.

**N**ON VAM valdè assurgit, sed pumilam manet, vulgaris Piceæ genus hoc Clusii, Tom. I.



lib. foliis obfisti: sed tota arbut. ula brevioribus & pallidioribus foliis quàm superior prædita est. In hac neque floram, neque fructum abieci. Cæsius, & haud scit an ferat. Videtur verò hanc Delecti non ignorasse, sed Pinum Tubalim, sive Tibulim vocare. Plinio tamen Tibulis Pinaster est, gracilis succinctor, et nodis, hibernica, um ad usus, penè sine Resina.

*Nucam...*

*Folia.*

*Pinus Tubalim.*

#### T A X V S.

C A P V I

III.

#### T A X V S Descriptio

perpetua frondis arbor, procerior stipite, Abietis & Piceæ similis, quam cæcis notis ab utraque distinctam illustramus, itaque in foliis primis occurrentibus: eâ siquidem Abietis foliis, ortu & humero similia, dimidium sulmum lata non terentur ut Piceæ: ab Abietis, in hoc dispenditur, quod infirmiora mentis que rigida, nequaquam explicata foliorum, servant agmina.

*Folia.*



*Folia.* quin eodem vergentia ferè coincidunt : iam verò si singularia spectes Taxi folia, sunt ea abiegnis acutiore mucrone donata, superne atro virore splendentia, inferne nitore destituta, unicoloria tamen & viridantia, nervo secundum longitudinem decurrente, cum abiegni elatiorem aversà parte habeant costam, coloreque glauco sint prædita, gustu amaricante : porro autem in extremis ramulis circumquaque inter folia oriuntur, perpusilla sed copiosa capitella, sublonga squammata ex quibus veluti flosculi emicant Luniperinis ferè similes, & virore pallescentes, qui deinde in meros & musculos apices fatiscunt : circa mensem Augustum, uti observavimus, fert baccas ex calyce ita emergentes, ut simile quid habere videantur cum glande : postquam verò maturare, quod fit mense Novembri, nihil planè simile habent cum glande, sed figurà quodammodo referunt florem Vitis Idææ, quippe parvo, virente, atque squammato calyculo, brevi pediculo adnato fructus inheret, grano Luniperino maior, superne apertus atque hians, velut ex carnosâ cute conflans, colore pulcherrimo & splendente coccineo conspicuus, intus cavus, succo præditus viscido, ac dulci, in quo granum latitat, pipere minus, nec exactè rotundum, sed leviter compressum, colore inter pullum & spadiceum medio, cortice duriusculo, medullam continens saporis non ingrati. Hoc granum fructus capacitatem non adimplet, sed vndique ferè intactum à fructus pellicula in medio situm est, baccæ imò adhærrens, haud secus ac ipsa ex pediculo enatum. Suspicior. a. baccas tum cum longiusculæ sunt, & glandis formam, aliquo modo demonstrant, nondum maturas esse. Iam verò maturiores aperiri, & propter hiatum figuram acquirere rotundiores. Materies bicolor partim rubet, partim ex albo flavescit.

*Milos.* Theophrastus Taxum Græcè *υλκον* [quidam *υλκων* apud eundem corruptè legunt] vocat, montibus propriam quæ in planis nasci nequeat, vehementerque umbrosis gaudeat. Hanc porro genere simplicem esse scribit, proceram, ætate insignem, similemque Abieti, non pariter excelsam, magisque aliis sinuatam : folio quoque Abieti similem, sed pinguiorem, mollioremque ligno : eam quidem quam in Arcadia nasci tradit, nigro aut puniceo, quam autem in Ida, flavo & Cedro simili, ut pro ea vendant, nam totum cor esse videtur detractò cortice, quem scabritiâ, & colore Cedro similem habet : fructum fert Fabâ paulò minorem, rufum & mollem, qui ab aliquibus hominibus innoxie manditur, suavisque : folia aiunt iumentis lethalia, ruminantibus nequaquam : perpetuò viret, germinat tardissimè : floret, & fructum reddit cum Abiete.

*Abieti simile.* Plinius Taxum facit Abieti similem, minus violentem, gracilem & tristem, ac diram [an duram] nullo succo, ex omnibus solam bacciferam. Mas inquit, noxio fructu. Lethale quippe baccis, in Hispania præcipuè, venenû inest : vasa etiam viatoria vinis lacta in Gallia mortifera fuisse compertum est. Hanc Sæthus Smilacem à Græcis vocari dixit, & in Arcadia tam pestilentis veneni esse, ut qui obdormiât sub ea, cibumve assumant, moriantur.

*Toxicæ.* Sunt qui toxica venena, quondam taxica ab hac arbore appellata scribant, quibus sagittæ tingantur. Repertum verò innoxiam fieri si in ipsam arborem clavus æreus adigatur. Fumus mures necat.

Dioscorides Smilacem vocat. Abieti similem in

Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina : baccis noxiis, in Italia, umbra in Narbonensi. Hanc aliqui *ἡ δὲ ὑλκων*, Romani verò Naxion aut Taxon vocant.

Nicand. in Alexipharm. Taxum inter venenatas stirpes quoque retulit, adscripto simul remedio : & quidem his verbis. Non quidem Taxum [quidam] tu malam Abietinam [*ἡ δὲ ὑλκων*] decerpas Océam : Mortis multum lachrymabilis datricem. Quia hominis Isthmia, & laryngis angustam obstruit viam, quam implens meracissima potio vini curat, &c. Quæ Nicandri verba Gorgeusita refert.

Parce venenata Taxo, quæ surgit in  
Océâ  
Abietibus similis, lethâque absunxit  
acerbo,  
Nè præter morem plenus crateris meraca  
Fundere vina pares, cum primum sentiet  
eger  
Arctari obstruunt sauces, animæque  
crantem.

Virgilius quoque inter alia hoc versu Taxi meminit.

Sic tua Cyrneas fugiant examina Taxos.  
Dicitur autem Cyrneæ Taxus, quod in Insula Cyrne Græcis dicta abundet.

Iam excutiamus Neotericorum opiniones de Taxo, & imprimis Hermolai, qui miset Smilacem arborem glandiferam è genere Quercus cum Taxo non animadvertens aliud esse Smilacem apud Theophrastum, & aliud apud Dioscoridem, unde non sine magno errore dixit : Smilax sive Taxus est, ubi à Theoph. & Diosc. *μίλας* appellata sit folio æterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus, & Paluri, & omnino Ilicis, molliore tantum profundiorque. Folium quoque ut scribit Plin. Abietis : Nec Taxus vulgo, sed litera prætoris immutatione Naxus & Naxium, quoque dicitur : quod nomen & Dioscoridi fuisse cognitum video, qui ubi venena lib. 6. numerat, eodem loco non Taxum, sed Toxum à Romanis dici credit.

In eodem errore versatur Cornarius, & ipse non cognoscens Smilacem Theophrasto differre ab arbore Milos, quæ Smilax Dioscoridis est, sive Taxus. Dicit enim is, eum citante Matth. cap. de Smilace. Habet Gal. lib. 6. cap. 3. secundum loc. Virgultorum Ilicis, Arbuti, Smilacis ac Phagi decoctum. Quo loco ego non de alia Smilace in Com. med. accipiendum censui, & adhuc sentio, quàm de ea, quæ Taxus appellatur. Apud Plinium pro Arcadia legendum puto Narbonia : Galeni exemplaria *ἡ δὲ ὑλκων* habent falsò pro *ἡ δὲ ὑλκων* : corruptè legitur *quidam* in *ἡ δὲ ὑλκων*, *ἡ δὲ ὑλκων* *ἡ δὲ ὑλκων*. Non enim Smilax vocatur Thymalus : nec Romani Naxium vocant. Rectè itaque lecto est, *ἡ δὲ ὑλκων*, *ἡ δὲ ὑλκων*, *ἡ δὲ ὑλκων*. Vocari autem Smilacem etiam Thymalon, Diosc. de mat. med. habet, & Thymion quoque dici inter supposititia legitur : quanquam Paulus non *ὑλκων*, ut Diosc. sed *ὑλκων* habeat. Sed perversè Corn. Smilacem apud Galenum de comp. med. Taxum interpretatur, nec absque periculo valetudinis humanæ venenatam Taxum pro non venenata arbore Smilace glandifera è genere Quercus accipiendum censet. Quid enim obsecro commune habet Taxus cum Ilice ? Vbi deinde Plinius Taxum dixerit Ilicis, Arbuti ac Phagi similem non occurrat : Abieti verò quidem & Piceæ similem facit : Ac cur in Plinio legendum sit Narbonia non vide-



videmus, quandoquidem Theoph. scribit in Arcadia provenire.

Ruellius sequens errorem Hermolai, inquit, Taxus folio aeterno extremitatibus & lateribus sinuato, à Gallia nostra Ifum, vel If nominatur.

Nominum autem vicinitas Plinium videtur fefellit, ut Fraxinum redderet, ubi Taxum interpretari debebat. Fraxini siquidem folia iumentis mortifera, cæteris ruminantibus innocua esse tradit, quod de Taxo [Mia] non de Fraxino (Mia) Theoph. prodidit.

Nunc quid Curtius sibi velit verbis sequentibus, acutionib. discutiendum proponimus, Taxus, ait, arbor Abietis perfoliata. Quare Nicander *ἐλατίνης* vocat. Eam etiam Galen. approbare videtur, quæ sit ex Abietis genere, aut Illicis, deinde quæ in Oetâ Ethiopie monte nascitur. Lachrymosa motus datricem (*δακρυόφυτος δάττειν*) dicunt, unde Latini Taxica, quasi toxica, dicunt. Statius in Theb.

*Meruendæque succo Taxus.*

Et Virg.

*Taxique nocentes.*

Quare Poëtæ eam apud inferorum opaca nasci finxerunt. Seneca in Hercule furente.

*Horrent opaca fronde nigrantis coma  
Taxo imminente.*

Fingunt etiam infernales Furias, ex hoc ligno facies gerere, ut auctor Placidus, unde Statius

*Nec dum ibum, aut trunca lustraverat  
obvia Taxo*

*Eumenis.*

In Cortica plurima nascitur, Diodoro auctore ut ex hac mel collectum amarum sit, Virg. etiam prodente unde

*Sic tua Cyreneas fugiant examina Taxos.*

Quis autem quæso non videt Curtium dicendo Galenum approbare, quæ sit ex Abietis genere, aut Illicis, ostendere se non agnovisse æquivocationem in no mine Smilacis.

Merito eos notat Cordus, qui Ebenum putant eam esse arborem, quæ Germanis *Ein Ephen* (Taxus) vocatur.

Iustus etiam à Matthiolo [qui Taxo baccas attribuit rubentes, Agrifolii modo, dulces, vinosasque] reprehenditur Cornarius, quod apud Galenum iam supra citatum, Smilacem Taxum reddat.

Is tamen etiam ipsemet errat, cum appingit suæ figuræ baccam circinatæ rotunditatis, malè enim, quia non exactè rotundam, sed leviter compressam diligentiores observarunt. Eamque figuram imitatus. Lobelius in eundem errore incidit. Sed cum animadvertens Camer. figuram baccarum mutavit in Hist. Matth. Germ. & Epitome.

Apud Euch. R. ôsslin. icon apposita non convenit, accedit enim ad Betulam in eo præterea peccat ipse sicuti & Trag. Cord. Matth. Dodon. Lacun. Anguill. Gesn. & plerique, quod non ostendant Smilacem Dioscoridis differre à Theophr. Smilace. Taxum Cæsalp. vulgò *Nassum* vocari tradit, Rosculosque ferre amentaceos inter folia sine fructu: quæ autem fructum ferat, eum rotundum gerere & rubentem Agrifolii baccis similem.

Lubuit C. Bathino apud Matth. alteram figuram Taxi addere, cuius Nobiliss. Iac. Ant. Cortus ramum glandibus, ut vocat, onustum transmisit, qui scribit se Octobri & Novembri mensibus in montibus circa Vicenniam, qui Tridentinum spectant, legisse: quod sanè dignum observatu, cum nec ab antiquis, nec à recentioribus, quod

quidem frater legerit, quidquam de Taxo glandifera memoræ sit proditum. Ego sanè anno

1586. Lutetia Augustò observavi, baccas Taxi aliquid simile cum glandibus habuisse, non tamen velim propterea glandiferam vocare, & speciem multiplicare. Alia potè à me in Ducatu V. Vir.

vifa in Novembri, nihil habuit, quod glandem exprimeret, licet non differre videbatur à prædictâ, nec etiam ab eâ, quæ à fratre picturâ exhibitur, causam diversitatis in descriptione dixi.

In ea etiam capitula multum foliosa, monstruosa, quæ iconè nostra proponuntur, sicuti & flores ac bac-

cæ priori loco dicta: verum cum bonam iconem corrupit sculptor, novâ proponimus in qua per

numerum 1. demonstratur ramulus, cum baccis cavis, ac semine sine nucleo, quales postremò

observavimus & monstruosis foliis, 2. loco subnectimus glandes & flores à fratre propósitos, 3.

baccas rotundas ex Matthiolo. 4. baccas ex Camerario, quæ aliquid glandiferi demonstrant. 5.

ramulum cum florib. ex Lobelio qui non placet, & quorum iconem ex Lobelio proposui frater

apud Matthiolum.

Taxus, Græcis etiam *τάξις*, quæ lectionem malim apud Gal. pro *τάξις* retinere, M. Theophrast. *τάξις* Dioscoridi & *βόμυλος*, *βόμυς* Aetio, Germ. *Eiben* / *Eibenbaum* / Belg. *Ibenboom* / *Pennenhout*, Gall. *If*, It. *Tasso* seu *Nasso*, Hisp. *Texo*, Angl. *Yghe* etc. Boh. *Tis* / *Hüg*, *Tiza* fa.

Neque hanc quondam tacebant Poëtæ, sed suo

Taxum penicillo dederunt; *lachrymosa mortis,*

*medrùm lachrymabilis datricem, insanos belli*

*poturam cruores, vultificam, toxicam, venenatam,*

*succo meruendam, nocentem, Piceam funestam: nec*

*quicquam alieni coloris, ut mox patebit.*

In præcedentibus iam dictum plures Smilacem æquivoca. Theophrast. glandiferam arborem confundere cum Smilace Dioscoridis, quæ est Taxus. Valde

quàm laxus Smilacis significatus, ait Lobelius, ut glandifera qui qualdam cognatas, vel similes alias, tamen

admodum discrepantes, & vix penè contrariis pollentes designat, ut *Taxum virosam*, *Smilacem asperam venenisugam* & *Fraxinum ambiguum*.

Sed Smilacis æquivoca posita sunt lib. 7. verum non absque gravi errore huius corticem pro Tamaricis cortice officinæ indoctæ medicamentis quondam admiscuerunt. Et est quoque *Lauri*

species, quæ *Taxa* dicitur, de qua loco. Atque *Verbascum herbam*, sunt qui vocant, *Taxum Verbascum*

*barbatum*, ut dicitur lib. 30.

Nascitur Taxus in saxosis & præruptis locis in Italia, in Ananæ vallis montibus, in Arduenna

Belgii silva, in Burgundia in monte prope Clareval Oppidum E.C. item prope arcem Meche in montibus dictis *Franche montagne*, & in montibus circa Porentrium præterea in Suintgovia. In pago

Grün prope Mörweiller est arbor magna in Cæmeterio, Augusto rudimenta florum protrudens, florens autem Aprilis. Ad Rhenum supra lacum

Constantiensem [Acronium] est pagus dictus *Zu Baur* ubi columna Taxi, ut aiunt sub dio, ad quam malefici alligantur. Audio abundare in Comitatu *hohen Emba*, in campo D. Petri prope Veldsird civitatem Rhetorum in rupibus. In Gallia satis frequens ut vult Ruellius. Vidi Patavii ut & Geneva in monte *Salève*. Germaniam hac destitui scribit Tragus, cõtrarium asserente Dodonzo.

In montibus Helveticis, Tragus laus. Taxum crescere testatur Gesnerus, eamque facile provenire si arbutula parva transplantetur: Durareq; ultra seculum: Arbores duas Figuri eadem proceritate vigere, quæ se præro erant, iam

ferè per quadraginta annos : fructificare raro. Ego verò contrà Taxum aliquoties plantavi Montbelg. in horto Ill. C. VV. sed frustra. Thalius Hirciniæ incolam facit. Olim ego & primò observavi circa Tigurum in sylvis. Reperitur ut semel dicam, in Italia, Gallia, Hispania, & Germania. Umbrosus gaudet. Tardissimè germinat, fructum verò maturat Septembri.

Quæ Theophr. & Plin. de Taxi natura & viribus memorie prodiderunt, iam suprà à nobis tradita sunt. Taxi, inquit Diosc. quæ in Italia nascitur, fructum edentes aviculæ nigrescunt, [ *ut ab vet. codex, Lacun. legit nigrum* ] Homines autem, qui ederunt baccas, in alvi profluvium incidunt. Quæ verò in Norbonia nascitur, tantam vim habet, ut etiam ex umbra eius, hi qui sub eâ sederunt, aut dormierunt, lædantur, sæpèq; etiam moriantur. Hæc de ipsa referuntur ea gratiâ, ut periculum evitemus. Idem de lethali. Potâ frigiditatem totius corporis inducit, suffocationemque ac celerem mortem. Auxiliantur his omnia, in Cicuta relata. Plutarchus eo tantum tempore Taxum noxiam esse tradit, quo florere incipit, quòd cum succo sit maximè prægnans. Virgilius Taxum, ut apibus noxiam, ab apiario semovet.

Ne propius rectus Taxum fere.

Galenus hæc pauca de Taxo. Smilax sive Taxus arbor est, venenosa facultatis, ubi exemplaria falsò habent *in nigrum pro nigrum*. Cat. Ebur-norum Rex Taxo [ Taxi succo epoto & fortè per nates fumo attracto ] cuius magna in Gallia Germaniâque copia est, se exanimavit. Cornarius arbitrat Galenum in columellæ remedii Taxi arboris ramulos probare, ut quorum decoctum vehementi adstrictoriâ vi præditum evadat: Non esse verò eam ubique lethalem & venenosam ex eo patère, quod Diosc. præcipuè de Italica & in Norbonia Hispaniæ tradat nascente. Nos verò nullum fide dignum autorem legimus, qui scripserit Taxum vim adstrictoriam vehementem habere. Cavebimus etiam à venenata Taxo, & per Smilacem apud Galenum, ut antè dictum, inter-pretabimur arborem glandiferam. Esse Ruellius perhibet, qui tradit Taxi baccis alvum res-olveri, & altites, & cohortales gallinas saginari. Marcellus credit Maronem monuisse fugiendâ esse Taxum apibus, ne citâ alvo, cui malo obnoxie sunt, perirent. Curtius dicit Claudium Cæsa-rem, Tranquillo scribente, edicto proposuisse, nihil æquè ad viperæ mortum facere, quàm Taxi succum. Testatur Matthiolus in Tridentinis montibus, non veterina solum, sed ruminantia etiam animalia devorata Taxo interire, ipsiusque baccas iisdem in locis perniciosas esse, sequè curasse affirmat, pastores ac signatores, qui saporis dulcedine allecti, cum has edissent, in febres ar- dentes inciderunt, & alvi profluvia, non sine magno viâ diseminante. Contra Pena, eius bac- cas innoxie puerulos citare in Anglia affirmat, sequè gustasse sub Hyemem non ingrato sapore, sed satuo, vel subamaro, ibique porcos passim eas tanquam glandes comesse. Nulli sanè Angliæ angulo desit hanc, ubi semper virente, umbrosâ, densâque ramorum fronde & lussimâ, similiter Abieti, pènatâ & longis quasi pectinum radiis, ex atro-virentibus comosa, ac in sepulcretis & areis pro templorum sonbus pangi, ad accendos Solis æstus à concione, plebe sub tegmine Ta- xi conventus agere solitâ, nullo percepto inde vel tantillo incommodo.

Sed hic existit questio, inquit Matthiolus, an

frigidi, an verò calidi sit Taxus tēperamēti. Dio- scorides eūsq; sectatores frigidi esse tēperamēti, existimarunt, quòd iisdem remediis Taxi veneno quibus & Cicuta occurrendum esse ille scripse- rit. At his opponit Matth. amorem, qui corti- ci ac frondibus inest, comam perpetuò virentem, Pinorum, Abietum, Picearūque modo, quibus stonde similis est, baccarum tum dulcedinem, tum acrimoniam quandam, & quòd aviculæ eas depastæ nigrescant: quæ omnia insignem tempe- menti caliditatem arguunt. Quare & febribus, & alvi profluvio tentantur, qui eas baccas ede- rint, inflammatis scilicet spiritibus, & sanguine. Quod si quis dixerit accendi febres, fierique alvi fluxiones ex humorum putredine, quemadmodum ætate ex frigidorum fructuum esu, nigrum verò colorem in aviculis contrahi posse tam à fri- gido, quàm à calido, quid tandem ad frondium corticisque amarorem, baccarum dulcedinem & acrimoniam, perpetuòque virentem comam re- spondebit? Nam hæc à calore fieri nemo negave- rit. Febres verò & alvi profluvia ex calore im- modico potius, ut devoratis anardiis accidit, quàm ex humorum putredine oriuntur, & nigre- do illa pennarum à calido potius, quàm à frigido avicularum pabulo. Frigus enim nigredinem non inducit, nisi sit immodicum, & tantum ut interimat. Quare nigredo exultis humoribus gignitur, ut in Æthiopiis. Matthiolo de tem- peramento Taxi ad stipulat Lacuna, dicens eius folia muribus esse valdè lethalia: temperamen- tumque potius calidum, quàm frigidum. Sed & Camer. Taxum innoxiam esse tradit: acinos eius rubros avidè expeti ab avibus, sed inde attonitas reddi, quæ facillè postea capiuntur: scobem autem, ut quidam affirmant, illius esse venenatam. Ego verò testari possum à fide dignis hominibus mihi affirmatum in montibus Burgundiz, folio- rum ut etiam corticum esu mortuos boves & uac- cas: cum enim persuasum fuisset, cuidam rus- tico cortices Taxi valere ad excitandas vaccas ad vcherem & quærendum taurum, eo dato cortice, una mortua, altera gravissimè agrotavit. Io. Lutzius insignis pharmacopœus, in suis adibus Kirchenheimæ ducatus VVirt. asseruit mihi tur- turem album cum torque nigra baccarum esu pe- riisse, & in pago Oberengingen Alsium degus- tata Taxo subitò mortuum.

Hæc paulò copiosius prosequi par erat pro- pter eos, qui tradunt in Europa Taxum inno- cuam, quique eam per os exhibent, aut eius li- gno utuntur, inter quos annumerantur Pena & Lob. Camer. ac VVierus.

Qui morbos simulant pulvere Taxi adeò cu- tim ulcerant, ut miserabiles ac ferè deplorati ho- mines appareant.

Ligni materies quòd rufescat quamplurimis intercurrentibus venis, incorruptaque sit, li- gnariis fabris maximè expetiitur, & plurimi fit, præsertim coënnandis mensis & hastis, telis- que conficiendis. Quamobrem Germani huius arboris asseres ad sua construenda hypocausta non exiguâ sibi comparant pecuniâ. In Episcopa- tus Saltzburgeris urbe quadam torno parare solent pulchros scyphos, cucurbitulas, episto- mia, aliâque subtilia, elegantia & egregia uten- silia, quæ per totam Germaniam distribuuntur, & Viennam usque deferuntur, ac etiam Montbel- gardi perveniunt. Scyphorum autem, cucurbitu- larum & epistomiorum tutum usum dicere nò ve- lim, tutiorè tamen existimari præmissâ macera- tione, in vino vel aceto calido aliquoties repetita.

PEVCE

Obiectio.

Responsio.

Frigus quando nigredinem inducit. Tempera.

Acina.

Scobis. Aurum indicium.

Boves mor- tui.

Turturæ mortuæ. Alinus.

Impositum.

Ligni m- teries. Incorrupta. Mensa. Hæst. Tels. Asseres.

Scyphi. Cucurbitula. Epistoma. Viennam. Montbelgard.



## PEUCE VETERVM.

## CAP. IV.

*Pinus*, *Pinus* veterum Græcos pro Pinu usurpasse nobis dubium non est. Quæ autem Theophrastus *Pinus* & *Pinus* prolixius tradidit in summam contrahentes, ex iis colligimus. Arborem esse proceram, longo caudice, podoſum, non nisi in apricis provenientem atque unam tantum, pragrandem, & in ima descendentem radicem agentem, à quâ quidem parvæ complures aliz exeunt, sed quæ nullam penitus sobolem ferre possint: Præterea vetustate Tedam ingerere, [in se gerere Scaliger] per morbum autem totam effici Tedam: Ramos ex æquo conditos geniculis in versus rectos porrectis habere: Germinationem terram ac per intervalla intermissam paucis diebus edere: deciso exacumine radiculis eodem anno inatescere: Semine tantum provenire: Folia capillata *σπινιφύλλα*, pinguia, multa, excavata, profunda, inclinata, & extremitate pūgentia habere: ac præter fructum, amentum quoddam quod aliqui florem putent ferre. Aliam vero esse *τρίπλητον*, cuius quædam species perpetuo vireat, quædam vero foliis sit deciduis: Aliam *συνεστρεμνὴν*, & hanc rursus vel *φασινάμ*, quæ rectior, procerior, materie crassior, ramis ditior, foliis pinguior, mollior, proclivior, nucæ oblongiori, viridi & dehiscente prædita, picem dans copiosior, atque, propterea quod in monte Idæ plurima proveniat, Idæa vocatur: Vel *Μαρινάμ*, [Maritimam dictam] quæ brevior, folio durior, & ligno circumiecto: Vel tandem *στερεννὴν*. Atq; in his *συνεστρεμνὴν* Sylvestris speciebus observari etiam omnium ferè, Marium atque femininarum, publicam differentiam, quâ omnem Marinem secui brevior, cor tortiosorem, operi diffusiliorem & colore nigriorem esse alleverant. Præterea, id quod pinis subnalcitur colore Tedæ rubidius, odoris gravissimum, nec Tedam redolens, nec flagrans, sed ab igne diffiliens, maribus potius inesse: feminam vero id quod Aegidem & cor eius appellat *γίγνην*, eò, quod minus resinosa (non Pinosa ut male vertit Gaza) [minuſque tedam ingerens & lævior, curſuque venarum prolior est. Tandem vero Arcadiæ incolæ nec Sterilem nec Vibanam Pinum appellare: Sed Pinum cum Picea confundere, constareque eos 1. perperam id facere. 2. Quia Pino materies crassior lævior & excellior est. 3. Quoniam eadem folia pauciora, squalidiora, horrentiora & canifera. 4. Quia hæc picem [sic enim legendum, non autem Piceam, ut vult Gaza] paucior, atque amarior reddit. 5. Quia Pinus pinguior, folio tenuior, magnitudine minor, erectaque minus assurgit. 6. Quia cornu minorem hostiudior, ac nucleum resinæ roscidiorem fert. 7. Quod Pinus adultis radicibus non regerminat, quod tamen in Picea observatur, ut in Lesbo, accenso monte Pythæo qui Pinis scabebat accidisse affirmatur. Sepimò tandem, quod Pinos morbus ipsis peculiaris infestare solet: cum non solum cor sed etiam pars extrema Caudicis in Tedam transiens, quodammodo strangulatur, quod spontè & ubertate arboris accidit.

Notandus autem ad iam citatum Theophrasti locum præter prædictos: adhuc triplex Gæzzæ error. Primum enim ad literalem tantum significationem.

Tom. I.

nem habito respectu *σπινιφύλλα* hic vertit Folia rara cum tamen neque Pino, neque eiusmodi generibus rara sint folia: quinimò nullis frequentiora. Deinde lignum quod Plinius circumtortum bene reddit, ille perperam everſale vertit. Tertiò denique perperam etiam Piceam *σπινιφύλλα* perperam dicit. Nos autè Pini & Abietis [σπινιφύλλα & ελάτης] discrimen cap. 1. de Abiete posuimus.

Pinum, autem [*σπινιφύλλα*] quidam florere existimant, alii non: paulò germinatione prævenit diebus scilicet circiter quindecim, post Vergiliæ intermittere, tæque turget, ternæque germina edit. Ideò & ter squammosa dicitur: omnis enim arbor cum germinat, corticem squamas spargit. Fit germinatio prima statim mens. F. bruario ineunte, quamquam in Idæ monte, die maxime decimo-quinto mensis eiusdem. Tum circiter triginta intermissis diebus, aut paulò pluribus, iterum germinare incipit, ab extremo furculi, usque proximum germinis antecedentis. Et quædam fursum, quædam in latera, curcumquaque emittit, veluti geniculo facto, furculo primi germinis: quomodo scilicet & prima germinatio fieri solet idque igitur circa Martium desinentem. Huius germinationis tempore galla quoque omnis gignitur, tam nigra, quam candida: nascitur magna ex parte noctu universa, inque diem acta, excepta resinacea, si ab æstu occupetur, inarescit, augeri que amplius nequit: alias enim magnitudine ampliore grandesceret, quâ de causa, earum aliquæ non maiores fabis evadunt: nigra vero pluribus diebus viret, & magnitudinem mali nonnullæ capessunt. Postea diebus circiter quindecim intermissis, rursus germinatio mittit mensè Aprili, diebus longè paucioribus, quam prius, fortèque id sex, aut septem diebus summum absolvitur. Quò cum ventum sit, non amplius in longitudinem, sed in crassitudinem incrementa vertuntur.

Omnium itaque arborum germinationes conspicuæ, sed Abietis, Pinique maxime, quoniam genicula in versus rectos possunt, tamque conditi ex æquo spectantur.

Ad materiam quoque cedendam tempus nunc potissimum intellegitur, propter amplitudinem corticis. Cæteris enim temporibus, cortex facile detrahi nequit, deindeque nigrescit materies, aspectuque deformior redditur: nam ad usum quidem non refert, quinimò robustior est, si post fructuum maturitatem cedatur.

Ab ulcere ampliori altiori que cum tæda discinditur, nihil offenditur, sed detracta comâ, decisoque cacumine, ac quod Arcades dicunt, nulla totâ ex universa arbore excerptâ, tota intacta, nec quicquam germinat, sicut nec si adusta, aut tota, aut parte aliqua fuerit. Naturâ perpetua Pinus, plusquam Abies, uti cap. de Abiete dictum, à terredine corroditur.

Pini vero, seu Abietis nodus difficillimus, unde fieri potest, quod eandem reniti affirmant. Repletur autem cava plagarum in tantum, ut pix extrahi possit. Frogalis Pini [*σπινιφύλλα*] anno proximo, mediocri: secundo, vitiosa: tertio, repletio non coitu ligni, sed incremento picis conficitur: lignum enim in hac arbore coire, iterumque unum refici nequit, sed confectio quidem picis reddi post tantum temporis solet: necesse autem ligni quoque agnationem fieri quandam. Siquidem detractâ, deustaque tæda effluviū evenire picis solitum est.

Non simul & fructificat & tedificat Pinus, sed

X 3

*Quando fructificet & redificet. Autu diffilis.*  
protinus novella fructificat, multò autem post, facta vetustior tedificat.

*Pinus picosula.*  
Pinus autem difficilis: quanquam meatuum rectitudinem habeat, verum aut densitas, aut utrumque impedimento est: facit enim & siccitas, ne satis auferere possit. Adhuc imbecillitas in causa est: nam quæ debilia sunt, difficile augentur, nutricanturque. Prosilunt Pini picosa semina, & ad summam omnium coniferarum. Conis enim adhuc pendentibus hæc exiliunt, vasque ipsa inania relinquunt. Quod idem cupressis evenire nullum dubium est: sed illis semen nuceum, his membraceum & exile. Pinus benigna omnibus propterea putatur, quòd radice simplici, altaque sit: feritur enim sub eam & Myrtus, & Laurus, & alia pleraque: nec quicquam prohibet radix, quò minus hæc liberè auferere valeant.

*Corruptio naturalis.*  
Arborem genus forsitan est, cui corruptio secundum naturam spontè, necullo pacto afflictata, sed benè vigenti eveniat, ut Pino [*pinus*] cum radices mutata in tedam fuerint. Ex nimietate enim nutritionis, cumque per tedam transmittere pabulum arbores nequeunt, fit ut moriantur. Quod proximum illi videtur, quod animalibus evenit, quæ extra modum crassantur, atque pinguescunt. Cum enim auram attrahere nequeant, nec ullo pacto spiciti uti possint, propter obesitatem, condensationemque, & illa strangulantur, & Pinus. Quamobrem non ineptè rustici vocabulum istud de Pino usurpant: dicentes Pinum strangulati obesitate atque pinguedine.

*Strangulatur.*  
Pinus [*pinus*] tedà detracta servari potest: Eam verò non semper tedificare constat, sed cum viget, atateque maior est. caret enim tedà novella [*Pinus*], quia humorem non excoquit, neque aggregat, sed totum ad germina, incrementaque altitudinis absumit. Statim autem ac dilatari inceperit, vis illa & habitudo tedæ videtur consequi.

*Tedà detracta servatur. Novella Pinus caret tedà.*  
Medulla tota detracta si sit, moriendum omnino est, ut Arcades aiunt. Nec Pinus & Abies servari amplius potest. Causamque haud temerè illam putaveris, quòd medulla pars humidissima & vitalis præcipuè abest: cuius rei etiam argumentum, quòd materies, quæ medullâ viduata est, pervertitur, recurvatque, usque dum penitus reficetur.

*Cur medulla detracta Pinus moriatur.*  
Decacuminatione Abies [*abies*] Pinus [*pinus*] & Larix [*larix*] pereunt, huius verò causæ scribuntur cap. de Abiete.

*Pin. notatur. Larix. Error multorum.*  
Scire nunc etiam oportet, Hermol. monente, Plinium Larici tribuere, quod Theophr. de Pino [*pinus*] prodidit. Eiusdem autem generis cum Larice [*larix*] Dioscor. quam multi Pinum interpretantur malè] est quæ Pinus [*pinus*] Diosc. quam malè Picam reddunt] dicitur, sed specie differunt, autore Dioscoride. Ruellius apud Cordum *pinus* interdum Pinum, *pinus* verò Picam transfert: Gaza etiam præterquam quòd *pinus* Pinum rectè, sicut etiam *pinus* Laricem vertit: ipsam quoque *pinus* cum Picam interpretatus est, malè. Nec melius *pinus* [*pinus*] Tedam interpretatur Marcellus, Absurdusque ipse Cordus *pinus* Pinum, *pinus* verò Picam interpretandam censet. Olim verò in ipsa Græcia & Macedonia sua nomina permutabant *pinus* & *larix*, Larix & pinus.

*Gaza error Marcelli error. Cordi lapsus.*  
Non benè autem Marcellum Diosc. interpretem, *pinus* tedam interpretari vel inde constat, quòd tedà [*teda*] vinum est, ut testatur Rob.

Const. in Lexico, resiniferarum arborum, Pini præcipuè & piceæ. H. *pinus*, ait Arist. animal. *Pinus* autem, *pinus* tedà detracta servari potest. Et Hermol. *pinus* pineum legit, & hunc *pinus* *pinus*, pineam resinam vertit. Valeat ergo Ruell. qui *pinus* *pinus* resinam ex picea explicat: abeat Marcell. qui resinam ex Tedà legit: exuleatque Eurip. qui *pinus* *pinus* abiegnâ ligna vocat.

Sed & iudicandi sunt, eorundem hæresis penitus extirpanda, qui falsò putant *pinus* pinum esse, *pinus* autem piceam, vel solum ob nominis vicinitatem, quam pinum & *pinus*, piceam & *pinus* magis habere sibi imaginantur. Cyperum enim hac ratione Cyprum, & Cyslon Cistum, rapam napum, rubum rubiam, adde si vis annum, anum, & coccum coquum, sed non sine maximâ tui confusione dixeris.

Ceterum in locis admodum depressis, autore Theophr. atque opacis nullo quidem pacto Pinus [*pinus*] exire potest: Mòtu o. a. pinu ferit. Frigus potius adamathiancæ, locis fervidis provenire non posse, nullum dubium est. Pinum etiam nequaquam Syria fert. Ac quamvis in Latino agro, Pini & Abietes tum magnitudine, tum pulchritudine, inter omnes Italicas præstant, tamen ad ærum rationem, quas Corsica gignit, pro nullo certè habentur. Romanos enim aliquando condendi causa oppidi in eam insulam navibus quinque & viginti præfectos, tam vastis arboribus dicitur locus excepsisse, ut omnino insula tota confertissima, & quasi efferata immensi arborum turba spectaretur. Quamobrem Romanos à condendo oppido destituisse aiunt. Sed nonnullos ingressos, brevi ex loco tam largam cæcidisse materiam, ut ratam perconderent quinquaginta velis duccendam, quam in pelago petiisse addunt. Corsica igitur seu ratione laxationis, seu etiam telluris, cælique virtute, locis plurimum cæteris antecellit. Latinus autem ager aquis totus abundat.

### PINI ÆQUIVOCA.

PINI nomen pluribus competit plantis, & pino aliquo modo similibus. pinus quidem vel est urbana, vel montana, vel maritima. Vrbana voco live, *pinus*, pinum officulo duro, folio longo, & alteram officulo fragili putamine, live *pinus*, quæ tamen & ipsa cum spontè proveniunt, sylvestres dicuntur. Ex *pinus* sylvestri, live *pinus*, qui cultum quasi respicit, est vulgaris Genevensis, Teda cognominata. pinus sylv. Maritima conis firmiter ramis hærentibus. pinus maritima Theophrasti Lobelio. pinus maritima altera Matthioli. pinus India ex qua Bre. pino aliquo modo similis Larix, quam Pini, aut pinastri nomine comprehendi asserit Apollo. pro pinea verò nuce quidam malè pingunt conum Cedri. Atque ubi cæteri in palmo 104. habent Abietem, Beza in suis carminibus interpretatur Pinum. Dicitur & pinus tavia Romanis de Astragalo interdescripta Dioscoridis. Habeturque pini conis facie fructus exoticus, ut pinea nuci similis laccæ, lib. 1. Habenturque præterea pini nuclei Molucani purgantes lib. 3. pini conis facie Nana lib. 16. pino cono similis Hoyca lib. 1. iam citato. pini nuclei similis fructus. pini nuci nucleo similis Ricinus minimus & fructus, lib. 34.



## PITYS VETERIBVS.

Nunc quoque quid *pitys* veteribus sit, quantum quidem, tum propter eorumdem, tum etiam iuniorum diversas opiniones fieri licebit investigare conemur. Antequam autem ad eius historiam tradendam nos accingamus, scite, proficuum erit, Gazam *πίτυς* nomen apud Theophrastum, modò secundum Plinium, modò ab eo diversum, nunc Laricem interpretatum esse, nunc Pinum, nunc Piccam, arque etiam aliquando Abietem. Hinc illa auctorum confusio, hinc de Pity grave chaos: quod præsertim in ipsa Theophrasti historia ex Gaze quidem versione, habetur.

Græci autem non illepidè de Pity ita fabulantur. Pityn puellam fuisse olim perquam illustre, vnicè à Panè adamatam, quam Boreas quoque rivalis deperibat, utrique addictâ. Pani potius puellâ adhæsit, propterea zeloty piâ stimulat Boreas Pityn in saxa propulsans neci dedit. Dolens vicem puellæ Tellus eam in arborem sibi cognominem mutavit, quæ immortalis perpetuòque virore frondesceret. Pani re cognita Pity, virenti eius ramò coronari se sèper voluit. Ac luger adhuc arbor collachrimans, quòd Boreas immeritam spiritui protervo depulerit.

Ceterum, quæ *pitys* (quam Gaza Piccam vertit) apud Theophrastum, sit, difficultè iudicari posse exultat Cluſius, quandoquidem eius materiam operibus ineptam esse, & magnitudine Pino minorem, minùque erectam allurgere, scribat. Nos autem *πίτυς* Gazæ, Piccam dictam, aliam ex Belloni Piccis [Pinaltris] exitumamus, de quibus suo loco.

*Πίτυς* Ruellium Piccam vertere scribit Cordus in Dioscoridem: ac præterea Gazan & Laricem interpretari: hocque ipsi maximè videtur absurdum, eò quòd multum inter se differant *πίτυς* & laux: Additque se Ruellium sequi & *πίτυς* Pinum interpretandum censere. At Cordus sanè sibi non consistit, cum hæc scripsit: si enim Ruellium sequitur, cur non *πίτυς* Piccam vertendum censet?

Pinum [*πίτυς*] notam arbore esse scribit Dioscorides. Eiusdem verò generis esse, quæ Picca [*πίτυς*] dicitur, specie autem differre. Pityides hinc appellat, Pinorum [*πίτυς*] & Piccarum [*πίτυς*] fructus, qui in conis reperiuntur.

Credit Hemol. Piccam veterum esse, quam Græci *πίτυς* vocant. Huusque speciem Theophrastus & Plinium *φειβέριον* pediferam, tinoosamque appellare, quia non prima tantum in parte, ut Abietes, totis paniculis nucleos & minores, & minores, & nigros habeat: sed ipsas quoque paniculas minores, graciliorisque. Sunt autem panicule nucamenta quædam, quæ è ramis arborum, resinam fundentium, callo squammatum compacti dependent, præterquam Larici.

De diversis igitur, quod ex hactenus dictis factis constare arbitramur, Pitys & Pityides dicuntur plantis. Piccam quidem vulgarem, sive Abietem marem [*πίτυς* *ἐλάτης* *ἀβιετα* Theophrastus.] quidam vocant *πίτυς* malè, ut Casalpini. *πίτυς* de Pinalstro, sive Pino silvestri, quod verisimiliter videtur, à nonnullis quoque dicitur. Nec desunt qui *πίτυς* Laricem dicant, licet hæc, ut illa, folia pungentia non habeat, nec in pluribus conveniat. Absque consideratione Gaza *πίτυς* Abietem quoque reddit. Sunt tandem qui *πίτυς*

Theophrasti [*Agriſolium*] cum *πίτυς* turpiter *Agriſolium* confundant.

Ambarum cortex [*πίτυς* Pini, *χρὸς πύκνης*, Piceæ, teste Dioscorides.] adstringendi vim habet, conueniens ad intercipiendos tritus inspersus (*ἐγὼ πύκνης* & non *καταπαύων* aut *ἐγὼ πύκνης* Dioscorides, Corn.) & ad ulcera in summa cute, & amibusta, cum spumâ argenti & mannâ. Idem cerato myrteo exceptus, ulcera in teneris corporibus ad cicatricem perducit: & proſperpentia cohibet cum atramento sutorio tritus. Foetus item & secundas [*πίτυς*, lege *ὀστρεῖα*, vel *ὀστρεῖα* Dal.] cit sufficit. Et potus sufficit alvum & urinas movet.

Sed & folia ipsarum trita imposita, inflammationes mitigant, & vulnera ab inflammatione conservant. Trita verò & in aceto cocta, dentium dolores leniunt, si calida colluantur. Has omnes facultates & Vires Fuchus de Larice refert. Sed pergit Dioscorides. Commodat etiam hepaticis foliorum drach. una cum aqua, aut mulsapota. Eadem faciunt etiam Strobili cortex & folia pota [de Strobilo arbore hæc accipit Corn.] quam eandem cum Pinalstro esse dicit. Modus faciendi vinum pineum [*πίτυς*] cuiusque vires traditur cap. de Cedro. Sed & tegra ex ipsis, in mibustas partes concisa, & cum aceto cocta dentium dolores mitigat, si decoctum ad affectum dentem continetur. Ex ipsis etiam Spatha fit, ad accoporum & pectorum præparationes idonea. Quin ex iis, dum cremantur, fuligo excipitur, ad scipriori atramenti confectiorem: itemque ad medicamenta honestandis palpebris dicata: Erosi quoque oculorum angulis, glabris callosisque genis & lachrymantibus oculis opitulatur. Pityides autem vim habent adstrictoriam, & aliter quatenus calefacientem: subveniunt tussi, & affectionibus circa thoracem, si tum per se, tum cum melle fumantur. Strobili porro si puri [re-purgati] edantur, aut cum passo & Cucumeris semine bibantur, urinas cient, & humorum acrimoniam hebetant, qui vesicam & renes infestant: sedant & rosiones stomachi sumptæ cum Porculæ succo: nec non corporis infirmitatem roborant, corruptorumque humorum labem obviunt.

Toti autem Strobili ab arboribus decerpti, & recentes, confusi & in passo decocti, ad vetustam tussim & tabitudinem conducunt, si ex eo liquore terni quotidie cyathi assumantur. Fit & vinum strobilites [*στροβιλιτὴς*] maceratis in musto Strobilibus recentibus & confusis, præbetque resinati effectus. Quod si quis Strobilos multo præmaceros decocerit, abundè potum iis conducet, qui tabitudine conficiuntur. Vfus plurimos, ut Theophrastus literis consignavit, maximisque Pinus & Abies præstant, harumque materies aptissima, atque pulcherrima constat. Pinus autem omnium ferè maximè viribus valet, & ad usum ædificatorium spectabilis eadem potissimum est laxitatis, rectitudinisque meatuum causâ. Hanc enim ne findi quidem nullo pacto posse affirmant, si glutine muniatur. Navigia rotunda faciunt ex Pino, quoniam non putrescunt. Nonnulli etiam trices, quòd Abiete carcant. Nec Pino atque Abieti Quercus conglutinari valet: altera enim spissa, altera minùs. Affectis autem similis ea esse oportet, quæ foetari, constariq; debeant, non contrari. Carbores quidam ex cufiores pineos potius querunt, quàm quernos, quanquam inferiores sunt: ad statum enim respondent commodius, quoniâ minùs marcescunt, extingunturque. Est autem flamma eorum ce-

lectior & acutior tam lignorum, quam carbonum.

PINVS OSSICVLIS DVRI, FO-  
LIIS LONGIS.

Descriptio

Folia

Coni.

Squamæ.

Resina.

Pityides.

Os.

Nucleus.

Deser. Ca-

salp.

Cortex.

Materia.

Rami.

Telia.

Amentum.

Nuces.

Squamæ.

Nuclei.

Semini.

medulla

Radix.

Max. & se-

mina

Barth. An-

glici erro-

res duo.

Picea.

Electrum.

Tinum pro

Pinu turpi-

pe.

Pity.

Peuce.

Differentia

duplex

Cordo.



**P**ino caudice recto surgenti, ex tuberculis passim in rugoso cortice ramorum extantibus, folia ensaeuntur, bina ferè circa imum connata, mox ab invicem abscedentia, quæ se mutuo spectant caniculata. Iunci marini amula & æqualia, duorum triumve palmorum altitudine, mucrone acuto & rigido: Coni magni, crassi, turbinati, acutis-

De pinu nobilissima illa arbore hæc scribit Tragus. Piceas nuce toto orbe in medicina decantatissimas, in nucamentis turbinatæ effigie compa-

tilibus profert, in altissimis superioris Germaniæ Alpibus prope Valesiam, iis maximè quæ Italianam spectant, gignitur, caudice assurgens procero, recto, tanus folio capillamenti modo prætenui, longoque, copioso, cernitæ obque vestitis. Quam Germ. Diechthannenbaum, aut Barghaum, aut Forenbaum vocant, quæ oblongas & dulces nuceas piceas profert, meo iudicio vera est pinus, quæ Hebr. Oren, Græc. *Pinus*, Serap. Sonbar & Oren

Arz (quæ vox ab *Ar*, mutatis duntaxat punctis vocalibus distat, quam Cedrum uterque interpretantur) appellatur. Kymhi, ut in margine scriptum habetur, ait quoddam Oren Hebræorum per Alzinobâr (quæ vox non multum à Sonobar abluat) Arabum interpretari, Esse verò plures alias voces, tam Hebræas, quam Chaldaicas, quas pro pinu reddant, sed non vacare illas adscribere. Nucamenta porò quibus piceæ nuceas in-

sunt, Græcis *conos*, *Nucleos*, *Strobilos*, Offic. *Pineas*, Coni. *Pinus*, Hippocrati *Cerealis* appellari, scribit Tragus. In eius autem descriptione non placet, quod ait folium capillamenti prætenuis modo esse. Displicet etiam icon posita sub titulo pinus *Barth.* oder *Bisserbaum*, nec conveniunt nomina Germanica. An autem in altissimis superioris Germaniæ Alpibus prope Valesiam proveniat, aut fortè Pinus Cembro sit, quod suspicor, inquirendum. Eidem Græcè *Pinus* dicitur, ut & Bellonio, qui eam non in hortis tantum conferi, & sativam esse, sed & in syl. locis spontè nasci tradit. Ipsius autem Bellonii iconem etiam reiiciendam censemus, quamvis Lacuna eam receperit.

Animadverti, inquit Marth. Plinium, recentioresque nonnullos eum secutos in plantarum historia, quæ resinas fundunt, longè ab eo dissentire, quod in Tridentinis montibus nostris oculis perspectum, apud alios etiam testatum relinquere possumus. Invenio Theophrastum duas Pini species adnotasse &c. Verum non desunt, qui contendunt Theophrast. hæc de Picea scripsisse, non autem de Pinu: eà ratione fieri, quod *Pinus*, de quâ hic differit Theophrast. Græcis Piceam, non Pinum significet. Bellonius communem Græcorum sententiam sequitur, & totum id Piceæ arbori reddidit contra Theodori interpretationem, quod Theophrast. *Pinus* & *Pinus* scripserat reliquit. Sed equidem Bellonium (pace viri boni dixerim) hallucinatum arbitror, non, quod propterea eum Græci sermonis imperitum iudicem, sed, quod mihi videatur non diu versatus in Theoph. & Galeni lectione, aut de iis plantis scripsisse, quarum non certam habuit noticiam. Mihi non dubium quin veteres Græci *Pinus* pro

Cordus tam  
nat. ex fibris  
non constat.

Pityides  
Fructus  
cons.

Locus.

Alzinobâr

Coni. *Pinus*,  
Hippocrati  
Cerealis  
Cerealis,  
Trag. nota  
est.

Antoræ  
Theoph.  
resins  
sententia.

Pini duo  
species  
Matthio

Belloni  
Pinus

Pinu



Pinū usurparint. Neque verisimile Theodorum Theoph. interpretem natione Græcum ignorasse, quid per illa usitata vocabula intelligerent Græci scriptores. Deinde Theophrastus πικρὸν nucem, στροβίλον vocat, quod non aliud designat, quam nucem pineam, ut aperte declarat Gal. de alim. fac. his verbis. Nucem pineam, appellant nunc Græci non κώνον, sed στροβίλον. Idem lib. de cibis boni & mali succi scribit. Nucleus pineus, qui κώνον vocatur, στροβίλον veteres etiam appellant. Item lib. 7. simpl. sic habet. Coni fructus quem & Coccalon, & Strobilon nominant. Adhæc com. 4. de vict. rat. in morb. acut. κώνον ab Hipp. dictus, non ita, sed κώνον magis ab antiquis Græcis appellatur, velut à recentioribus Medicis propemodum omnibus Strobilos vocatur. Galeno ad stipulatur Sim. Sethi, qui nucleos pineos κώνονα τῶν στροβίλων etiam nominat. Ex his itaque constare puto contra Bellonii opinionem, Theophrastum sub πικρὸν vocabulo Pinum descripsisse, non Piceam. Nam si Theophrasto Piceæ strobilum profert, quem Gal. inter cibos cōnumerat, non video, quomodo is Piceæ fructus esse possit, cuius nuclei non sunt edendo, Bellonii etiam testimonio. Quod insuper per πικρὸν Pinum intelligat Theophrastus, illud maximo esse potest argumento, quod nullquam Picea viā sit urbana, nisi forte è silvestrium semine ad spectaculum in hortis facta. Cuius tamen contrarium deprehenditur in Pinu, quæ domestica atque urbana frequentissima conspicitur. Hinc porro factum est, ut Bellonius suā ductus opinione, ex hoc in alium quoque errorem inciderit. Quippe illud falsum est, quod ex tedā Piceæ fit pix, ut Bellon. asserit, perperam Theophrastum interpretatus. Siquidem rara admodum est Picea, quæ tedam habeat, atque pix omnis, cuius est usus ex Pineæ tantum tedā conficitur in Italia, quemadmodum & in Bohemia. Cæterum non potui non admirari dixisse Plinium, scandulus è Pino ad contegendas domos, ex omnibus, quæ resinam fundunt arboribus apissimas esse, cum Laricem non ignoret materiei præstantiā duritiæ & firmitate, nulli æquiparandam esse. Scribit Theophrastus (nosque quotidie id videmus) quod Pini interitus est, ut tedā fiat. Cæterum, quod tedā opus sit ad picem conficiendam, & artificiosum fiat, docetur suo loco. Quamobrem putamus hac in re non parum cavuisse Plinium, quippe qui tedam propriam & per se arborem censet. Marcellus errat, qui Pinum tedam interpretatur. In hoc item errore versatur Lonicerus Ruellium secutus, qui fidam potius quam veram arborem pro tedā pinxisse videtur. Hactenus Matthiolum, qui sibi (quod non mirum) contradicit. Is enim huc usque Pinum πικρὸν, rectè vocari tradit, mox πικρὸν eum plerique Græci appellant. Adhæc in post. com. & Hist. Germ. fatetur picem non solum ex Pinu, sed etiam Pinu sylvestri fieri, quæ est Picea Bellonio. Et quod plus est, in Hist. Germ. dicit tantum silvestrem Pinum in Bohemia & Germania haberi, cum ex Pino solā in Bohemia pitem fieri ante dixisset, meritis igitur eam Bellonii reprehensionem in post. com. Ital. omisit. In suis epistolis contradicit Plinio dicenti, Pinum nullo flore exhibere, id quod Theoph. nec negari nec affirmari. Florere autem Pinum testatur Bohemiæ filvas, ubi floridæ quotannis inspiciantur Pinus odore, haud ingrato. O labilem viti memoriam! nonne recordatur ex Historia Germanica ni Bohemia silvestrem duntaxat Pinum haberi? nonne contradictionem animad-

vertit non esse arborem in Bohemiæ filvis, & ibi florere.

Amatus in Matth. invehitur, quod aliter, quam Theophrast. de speciebus Pini locutus sit. Nihil tamen adfert, quod alius sit momenti. Præterea si Pitys est Pinus, ut ipse his nomenclaturis [Pitys Pinus, Pinus hortenſis, Pinus urbana, Pinus domestica] se velle demonstrat, cur Pini diversas constituit species, quandoquidem Theophrast. non ita distinguit πικρὸν, sed πικρὸν. Matthiolum sanè imitatur reprehendendo Plinium.

Apollo assurgens adversus Matthiolum sibi persuadet πικρὸν esse Pinum, nec secus veterum & recentiorum Græcorum auctoritate comprobari posse. Verum nugatur Apollo, ineptias obtrudit, argumentaque nullius ponderis addit. πικρὸν enim Theophrasti non dubitavit asserere esse Pinum, qui Plin. cum Theoph. locis contulerit, facilliquè nostram opinionem, animadvertet veriorē.

Had. Iunio cum Ryffio Pinus est πικρὸν. Ve. Had. Iunio rium an ite ei assignent appellationes Germanicas [Forhen/Arben/Bargbaum & Byhnholz] dubito, quandoquidem in Germania provenire non soleat.

Dod. gall. cui Pinus sativa [πικρὸν ἡμετέρο] dicitur non laudabilem habet figuram. Verum laudabilem tenet sententiam. Afferit enim Pinum Græcè non πικρὸν, ut multi recentiorum exiſtimat, sed πικρὸν reddendam. Idem in Hist. lat. Pinum [πικρὸν] ex Theoph. duplicem statuit, unam cultivam, siue mansuetam [ἡμετέρος] & silvestrem [ἀγρίαν]. His ait Macedones tertiam addere, sterilem (δυσπρὸν, sine fructu) nobis incognitam. Mansuetam aut potius urbanam Macedones atque reliquos Græcos πικρὸν ἡμετέρο, sed Arcades πικρὸν appellare. Ex hac autem nominis permutatione accidere, ut fructus Pini in conis reperti, à Diof. Gal. & Paulo, aliisque Pitydes nominentur: esse verò & aliam πικρὸν, Piceam à Pinu multum differentem. Fructus porro πικρὸν Græcis dici, & Latinis similiter Conos & Nuces pineas, & à Mnesitheo ὀσπιδίτες, à Diode verò Carytito πικρὸν καρύας quæ tamen fructus esse arbore, à Theophrast. πικρὸν appellatæ Athenæus testatur. videri & eundem fructum totum, στροβίλον & πικρὸν Galeno appellari.

Quantum Turn. videt, Theophrast. πικρὸν appellat, quam Latini Pinum. Plinius autem πικρὸν Græcorū pro pinu accipit, ut idem ex Plinii verbis Pitys Pity colligit, qui Pityocampas Pinorum cernas vertit, non Piceæ, ut Theod. & alii multi. Errat interpretes Galeni, qui Pityn interpretantur Piceam, cum ei sit Pinus: ait enim Pityn maximos ferre conos. Verisimile est Galeni tempore Græcos, & quæcumque secuti sunt, semper πικρὸν pro Pino usasse: Gaza πικρὸν & πικρὸν vertit Pinum, Piceam, Pinastrum, & Laricem, confusè. Censet igitur Turn. Pityn esse Pinum apud Gal. Diof. Aetium & alios qui post Galenum scripserunt.

Haud facilè est cognitu, quid sibi velit Diof. dū ait cortices strobili & folia. Interpretum enim alii peculiarem arborem intelligunt, ut Cornarius, alii verò, ut Ruell. reddunt conum Pini. Apud nullum veterum lego Strobilum, peculiare arboris nomen, semper verò pro nuce, aut pino, interdum nucleo fructus: nisi forte, ubi meus Plinius ab Erasmo castigatus post Hermolaum Barbarum, Nicolaum Beroaldum, Guil. Budaum, & Io. Casareum, habet Tibulus, legendum sit Strobilus, non autem Tibulus, non magis firma

Amat. re. dargusur.

Pinus est πικρὸν.

Pinus sativa.

Pinus urbana πικρὸν.

Arcadib. πικρὸν.

Car. Fran. πικρὸν.

Officinali.

Pence Theophrast.

Pityocampas.

Interpretum Galeni.

Gaza con. fusi.

Cornarii lapsus.

**Pityides.** Merit ratio, Plinius strobilum facit per se arboris speciem, ergo est arbor, quam hæc, plinius Tedam particularem facit arbore, ergo tēda per se est arbor. Magis autem movent, quæ scribit Dioscorides, inquit enim, *τὸ πίνος τὸ αὐτὸ ἔστι τὸ πίνος ὡς ἡ δὲ τὸ πίνος τὸ αὐτὸ ἔστι τὸ πίνος* hoc est, præstant verò eadem & strobili cortex & folia pota. Iam verò nux pinea eiusdē generis est cum pino. Sed hoc repugnare videtur, quod ab initio capitis habetur, cum de quibus efficitur indicans, meminit pini duntaxat & piceæ, non autem strobili. Sed utrum hic strobili s nucem pineam significet, folia verò eiusdē sint pini, cuius paulò ante meminit Dioscorid. parum refert, quoniam omnes illic simul memoratæ arbores iisdem viribus sunt præditæ. Rob. Constant. in Lex. *πίνος* propriè Pinus, impropriè-que Piceæ arboris nuxes in conis (quas Poma Cybeles dixit Martialis, Nuxes verò pineas, *πίνος* & *πικρα* *πίνος* *πικρα* Dioscor. & Theoph.) contentæ. Græci etiam *καπνὸν* & *πυλιν* nomine appellant, ut nucis & nuclei voce Plinius.

**Poma Cybeles.** Lonicero Pinus dicitur Pitys. Isque conum tantum pingit, temerè adiungens conum Cedrinum, non agnoscens differentiam inter utrumque. Eum autem Pinum non agnovisse, indicio fuit, vel nomina Germanica *Fichtenbaum*, *Tannenbaum*, *Eichenholz*, *Bischofholz*, *Fichtenholz* quæ diversarum sunt plantarum.

**Petr. Cresc. figmentum.** Pro Pino absurdum figmentum habet Petrus Crescentius, sedum arborefcens referens quodammodo.

**Lobel. nomenclatur.** Dicitur hæc Lob. Pinus vulgarissima, quod mirum videtur, nec enim aded vulgaris est. Tabern. Pinus domestica. C. Bauh. phyt. de Pino obscurior est, Pinumque sylv. fortè intelligit cum dicit: *Peucedanon à πινον*, quæ Latinis Pinus vocatur, quod folia eius cum Pini foliis similitudinem quandam habeant, unde & *Pinastellum* quidam dicunt.

**J. Heron. mor.** Præter verò quotidianam experientiam communis authorum consensus, Feci in Genesim falsam opinionem meritò ridet. Pinus, inquit, nullum fructum fert, sed solum semen. Goro-pium consulere debuisset dicentem: Plinius glandes è pomorum numero exclusit, nescio quæ de causâ: cum mihi æquè atque Nuxes pineæ, de quibus non dubitatur, hanc nomenclaturam videantur mereri.

**Poma.** Pinus, græcè plurimis *πινον*, aliis *εἰς* malè, eem. *Tannenbaum*, *Fichtenbaum*. Belg. *Pinapfelbaum*, Gall. *Pin. Ital.* & *Hisp. Pino*, Angl. *Pine tree*, Bohem. *Borovics*, polon. *sofski*. pinus quidem ut Matthiolo placet à pinnato foliorum acumine. Cast. & Catal. *Pino negro*, portug. *Pinheira* negro. Fructus eius græcè *κεκρίναι*, Lat. *Serobili*, Nuxes pineæ, eem. *Tannenbaum*. Gall. *Pignus*.

**Epitheta Pini.** Pino à ποῖνις apud Ravennum hæc epitheta attribuantur. *Nautica*, pontica, *amans littora*, *virens*, *florida*, *procera*, *alta*, *ardua*, *conifera*, *picea*, *odora*, *pinguis*, *cornigera*, *acuta*, *multifida*, *capitata*, *nucans*, *sylvestris*, *hirsuta*, *cava*, *garrula*, *Berecynthia*, *Cibeleia*, cui sacram fecerunt, quanquam & pani sacram legerimus. His adde ex Theoph. *nodosa*, *ter squamosa*, *resinosa*, *ingens*, *recta surgens*, ex Guadone *flammiifera*, *prunosa*, *tumida*, ex Virg. *pinus in hortis pulcherrima*.

**Locos.** Frequens est, ut Ravennus prodit, in Atlante, Idæ, Lycæo, Simoënte, Mænalio, & Othry. In Germania, quod equidem sciam, spontè non provenit. Geneva non vidi, quamvis Gesnerus

se audisse scribat, vinum inibi in loco quodam publico spectari. Lutetia quidem in horto Regina vidit. Eam in Belgio, Angliâ, & Italiâ colit testatur Lobelius. Scribit Bellonius pinum locis permultis sylvescere etiam in planis, ut in Gallia Narbonensi (ubi ad aquas maritimas spontaneam perhibet quoque Lob.) & circa Massiliam, ac in multis Italiæ tractibus, ut circa Ravennam, quo loco sylvas ex se faciat amplissimas: ac sylvestria femina si in cultum demandentur solum, easdem proferre arbores, eisdemque fructus.

Seremus autem pinum, auctore Palladio, nucleis suis (semine enim teste Theophrast. tantum provenit) calidis & siccis regionibus, mensè Octobri, vel Novembri: frigidis & humidis, Februario, vel Martio. Amar locum gracilem, sæpè maritimum, inter montes, & saxa vastior, & procerior invenitur: ventosis & humidis arborum sunt incrementa latiora. Sed si montes velis conspiciere, seu spatia quacunquæ, hæc huic generi deputabis, quæ alteri utilia esse non possunt. Exarabis ergo ea loca diligenter, atque purgabis, & frumenti more semen asperges, ac levi sarculo curabis operire, nec enim plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calcetur invalida. proficiet, si nucleos aquâ ante triduum macerabis. Aliqui dicunt fructum pineum translatione mixescere: sed plantas hoc modo procurant, ut prius multa semina in caliculis terrâ & fimo repletis obruant, quæ ubi processerint, relicto eo, quod solidius est, auferunt alia: ubi iustum coeperit incrementum, trimam plantam cum ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrobe indulgent radicibus largitate. Terra tamen eque sterco admiscet, facientes straturam æterni ordine subinde crescentem. Servandum est tamen, ut eius, quæ radix una & directa est, usque ad summam suam possit integra & illesa transferri. Puzatio novellas Pini arbores tantum promovet (quod auctor se expertum ait) ut quæ speraveras incrementa, duplicentur.

Næces pineæ ulque in Novembrem esse possunt, & maturiores leguntur.

Nuclei verò ipsi purgati durare non possunt: tamen aliqui in vasis fictilibus novis, & terrâ repletis cum testis suis missos asserunt custodiri. Ex nucleis Pini missis Lugduno per honestum virum Sebast. Hiebertin & alios, Pinus in horto E.C. sæpius mihi provenit, sed faciliè perit. Eadem causâ fortè fuerit, quam Camer. in horto assignat. Pinus, inquit, Italica ex semine enata prodit, sed Hyemis frigore intensiore faciliè, nisi in fictili recondatur, perire solet. Dum recens à terra emergit, nuclei putamen non incommodè admittit, sed nucleum protrusus si auferatur priusquam sua sponte decidat, plerumque germen enascens, cui tanquam munimentum à natura datum est, & foliis coniunctis oblongioribus adheret, perire solet.

Proprium autem est huic arbori ut falso solo latissimè fructificet, quemadmodum apparet ex amœnissimo pineto prope Ravennam, Dignum etiam est observatio, excisam nullam remittere ex virgis radicem sobolem, sed prorsus emori. propterea Cræsus (ut est apud Herod.) minabatur se excurpaturum Lampacenos Pini in moriem. Dignum quoque & illud notatu, quod D. Basil. memorat prodidit, pinus incensas ac exustas flammis in querceta mutari.

Pini vires secundum antiquos videre est ante scriptas

Satio.

Tempus

Cultura

Maturatio

Asservatio

Observationes pini

proserbia

Pini in moriem

Pini vires

et usus



scriptas sub Pence titulo. Firmissima est adversus catiem & tincas. Nuces huius usitatissimae sunt, naturâ suâ, ut dicit Averrhoës, calidæ & siccae, phthificis & languescitibus commodissimæ. At fructus interior nucleus, ut Dodonæo placet, viâ habet concoctioriam & moderate exaltescentem, in medio quasi frigoris ac calidi consistentem: exasperata lenis: tussi veteri, & pectoris diuturnis viciis auxiliatur, per se, aut cum melle, aliâve eclegmate sumptus, phthificis ac tabescentibus utilis est: vires reparat: corpus alit ac reficit: crassi ac boni est succi, multumque nutrit, non tamen omnino facili concoquitur, ideo bellariis tritus admiscetur, ac Saccharo incoquitur. Prodest verò & idem Nephriticis ac adversus vesicæ rosas, utriusque doctores: acrimoniâ enim mitigat, dolores sedat, urinam clementer provocat, appetitem & lac, & semen genitale: venerem admodum etiam excitat. Totus conus cum Marrubio recenti decoctus, inquit Galenus, si postea addito melle modico iterum coquatur, donec ipsa decoctum mellis accipiat crassitudinem, medicamentum est ad thoracis pulmonisque excretaiones conveniens. Simile & Diosc. habet: integri, aut ac recentior ab arboribus decerpti, confecti, & in passo decocti, veteri tussi & tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni cyathi bibantur. Aqua Strobilorum Pini delet faciei rugas, impedit mammarum incrementum, si madefacti in ea rami sæpè apponantur. Utiles cum ea lotio in exidente matrice, collum enim eius constringit. Nuclei si comedantur per se, vel cum Saccharo naturam calefaciunt. Oleum eorum, si Averrhoi credimus, excellens est, in Hemiplexia, si eo inungantur partes resolutæ. Holerde morbi. intern. Paralytici præscribitur. sumuntur enim Pini & nucleorum, quod Duterus in controuersia: ut enim, Pinea gravis ab initio humida, quod oleositas sine & pinguis, ob id, ut dicitur. Vitis Pinea aculeis contrita, ac vino potui data, cordis dolorem aboleat, quod fructus eius cor refertur. Porta concludit. Pincolatum gratissimum, polycrophon, macilentis, pulmonum afflicti, us pro bellariis conveniens, componitur ex æquis partibus Pineorum & Sacchari soluti. Ex quibus sunt morselli, addito Moscho ad gratiam, si volueris. In distorsione penis ex nimia Venere, & ad præcavendam infectionem Venere, utitur Iul. Cæsar ex Aratio decocto nucum Pini, quod multum laudat.

PINVS CVI OSSICVLA FRAGILI  
PVTAMINE, SIVE  
Cembro.

Pini foliis breviora sunt Cembri folia, palmaria, itidem bina è tuberculo uno prognata, canaliculataque, videntur acutiora tamen. Conus minor quam Pini, hoc commune habet cum cono Abietis, quod squammæ facili à pediculo divellantur, in cæteris differt. Squamis compactis est minus multo extantibus & compressis, rugosis non lucidis, ut Pini præcedentis: nec firmiter compactis, extremam singularum marginem (non mediullam) occupante umbilico: pityides binæ [aut una] singulis squamis occultantur dimidio minores quam Pini domesticæ, oile triquetro, turbinato, rubente, tenui, & fragili. adeo ut digitorum pressu haud ita violento dissiliat, nucleo crassiore, brevior, sapore &



substantia cum pityidibus domesticis eadem.

An Hermol. Pinastrum seu Pinastrum silv. mira altitudine, à medio ramosa, sicut Pinus in vertice, copiosiorè dans resinam? An verò Ruellius per Pinea Larici nullo modo, hanc, intelligat, affirmare difficile, quia se non exponit, sed tantum verba Hermolait tran-

scribit pro suis, more sibi consueto.

Et hæc est, quam Stumpf. Hül. Helv. de Pinea silv. plant. Alp. Germ. Arben, lat. de Pinea silvestrem vocat, fructu esvigrato, sapore Avellanarum, cuius fructus in Valea Ardopoffen vocentur:

Munst. in Cosm. Pinus silv. Plinii, cuius fructus die Erschlender, si non fallitur Zimpernüsslin cognominant.

Tragum suspicor hanc arborem confudisse, cum Pino iam rectata, hancque exilimo ab eo tradi provenire in altissimis superioris Germaniæ Alpibus prodè Valsiam, iis maximè, quæ Italam spectant.

Itaque apud Cord. in Diosc. quam milè Piceam Pence Gorredt & Germ. Sybelina vocat, Pinus Cembro dicitur, cuius verba superius recitavimus.

Hanc Ballon. de Conf. Pinastrum appellat, eamque vulgus Gallicæ Celticæ Alve, vel Elvo vocat, tradit, præterea Theophrastum eam namquam agnovisse: in Græcia enim aut Asia montibus non nasci: sed Pini genus esse Tarenanum Phinio.

De hac idem de neglect. cult. hæc narrat. Aleves Pini sunt genus, minus duro sapidioreque nucleo, quàm vulgaris. Rustici in Rhetia eo vescuntur, & quatuor duntaxat assibus gallicis quadrantal vendunt: nos dum istâc iter faceremus, unico coronato tantam illius quantitatem emimus, ut ei ferendæ vix equus sufficeret. Sed rem admodum vilem esse oportet, quæ suâ vecturâ digna non censetur. Posset etiam vicino loco inveniri: nam quinque aut sex dispositorum equorum è Lugduno stationibus nullus est rusticus, præsertim apud S. Andream, qui eo non vescatur, atque in ædibus adservet. Memoria autem repetens suavitatem guttis huius seminis, quo etiam multi pauperes rustici saturari possent, si nostræ Galliæ opulentiores id scirent, multoties optavi. Idem de conf. Si per Allobrogem ex Galliâ Mediolanum tendas, sive per montem Iuniperorum, aut per montem Senesium (quem Galli vocant Gencure & mont Senys) nullus pagus in convallibus reperitur, qui Pinastrum sub Elvi nomine non agnoscat. Est etiam Pinastrum in orto regio Fontanæblæ ex semine enata, altera arbor vitæ dicta. Audio quandam ex navigatione novi Orbis ligni huius, quod lignum vitæ appellabat, multas arcas plenas exportasse, cum tamen pinastrum esset, eumque Regi Francico hoc nomine imposturam facere non

An Hermol.

Pinastrum seu Pinastrum.

silv. mira

altitudine, à

medio ramosa,

sicut Pinus in

vertice, copio-

siorè dans resi-

nam? An verò

Ruellius per

Pinea Larici

nullo modo, hanc,

intelligat, affir-

mare difficile,

quia se non ex-

ponit, sed tan-

tum verba

Hermolait tran-

scribit pro suis,

more sibi consu-

eto.

Et hæc est, quam

Stumpf. Hül. Helv.

de Pinea silv.

plant. Alp. Germ.

Arben, lat. de Pinea

silvestrem vocat,

fructu esvigrato,

sapore Avellanarum,

cuius fructus in

Valea Ardopoffen

vocentur:

Munst. in Cosm.

Pinus silv. Plinii,

cuius fructus die

Erschlender, si non

fallitur Zimpernüss-

lin cognominant.

Tragum suspicor hanc

arborem confudisse,

cum Pino iam rectata,

hancque exilimo ab eo

tradi provenire in altis-

simis superioris Germaniæ

Alpibus prodè Valsiam,

iis maximè, quæ

Italam spectant.

Itaque apud Cord.

in Diosc. quam milè

Piceam Pence Gor-

redt & Germ. Sybelina

vocat, Pinus Cembro

dicitur, cuius verba

superius recitavimus.

Hanc Ballon. de Conf.

Pinastrum appellat,

eamque vulgus Gallicæ

Celticæ Alve, vel Elvo

vocat, tradit, præterea

Theophrastum eam nam-

quam agnovisse: in Græcia

enim aut Asia montibus

non nasci: sed Pini genus

esse Tarenanum Phinio.

De hac idem de neglect.

cult. hæc narrat.

Aleves Pini sunt genus,

minus duro sapidiore-

que nucleo, quàm vul-

garis. Rustici in Rhetia

eo vescuntur, & quatuor

duntaxat assibus gallicis

quadrantal vendunt: nos

dum istâc iter faceremus,

unico coronato tantam

illius quantitatem emimus,

ut ei ferendæ vix equus

sufficeret. Sed rem ad-

modum vilem esse oportet,

quæ suâ vecturâ digna

non censetur. Posset etiam

vicino loco inveniri: nam

quinque aut sex disposito-

rum equorum è Lugduno

stationibus nullus est

rusticus, præsertim apud

S. Andream, qui eo non

vescatur, atque in ædibus

adservet. Memoria autem

repetens suavitatem guttis

huius seminis, quo etiam

multi pauperes rustici

saturari possent, si nostræ

Galliæ opulentiores id

scirent, multoties optavi.

Idem de conf. Si per

Allobrogem ex Galliâ

Mediolanum tendas, sive

per montem Iuniperorum,

aut per montem Senesium

(quem Galli vocant Gencure

& mont Senys) nullus

pagus in convallibus

reperitur, qui Pinastrum

sub Elvi nomine non

agnoscat. Est etiam

Pinastrum in orto regio

Fontanæblæ ex semine

enata, altera arbor vitæ

dicta. Audio quandam

ex navigatione novi Orbis

ligni huius, quod lignum

vitæ appellabat, multas

arcas plenas exportasse,

cum tamen pinastrum

esset, eumque Regi

Francico hoc nomine

imposturam facere non

erubuisse, lignumque hoc fungosum, leve, suo adhuc cortice obductum, quod non modò nulli unquam prodesse potuit, sed etiam valde obfuit. Cuius incommoda cum multi magno suo malo, sensissent, illud à suo usu abdicandum omnium calculo censuerunt.

ios. Siml-  
rus. &  
Gefn. com-  
fusi.

A Iosia Simlero & Gefner. confunditur Pinus propriè dicta, cum ea, quam Cembro dicunt. Ut id fit manifestum ex lib. h. ut. ipsiusmet Gefneri, dicentis: Pinus in Germania ferè nulla, &c. Pinafter, Pinus sylvestris in altis montibus Rhætorum & Valleflorum, nec ulla arborum (opinor inquit) altius nascitur *Ein milder Zierenbaum*. Nuclei quidem eius ut minores, ita etiam gratiores sunt, quàm Pini.

Pinus Zim-  
bron.  
Pinus Cem-  
bro, Cembri  
& Cirmoli.

Anguill. Pinus montana apud Gifones proveniens *Zimbron* vocata.

Bellon. no-  
catur.

Matth. Pinus sylvest. *Cembro, Cembri & Cirmoli* vulgò vocata, nucleis domesticæ similibus, fractu facilibus. Facile adducor, inquit is, ut credam hoc nucum pinearum esse illud genus, quod Plin. lib. 15. cap. 10. *Tarentinum* vocat. Bellon. loco iam citato hoc Pini genus Pinastrum esse censet, sed non rectè. In post. autem com. It. eadem dicit, ac addit errare Anguillaram, qui velit Pinum Tarentinum, vulgò dictam Cembro, esse Pinum montanum sylv. Theophrasti.

Pinus Ta-  
rentina.  
Anguill. er-  
ror.

Bellon. ex-  
cusatur.

Apollo rad. 9. non sine ratione videtur Bellonium excusare à censura Matthioli, ut qui non asseruerit hanc arborem esse Pinastrum Plinii, quamvis Pinastrum nominet, & in fine Plinii verba adducat: putatque Apollo hanc arborem esse Bellonio illegitimum Plinianum Pinastrum: & ex Bellonio vocat Pinum Tarentinum.

Suisse Bel-  
lonius nō est.

Dodonæo assentiri non possum, existimanti in Hist. Gall. *Zembro* esse Bellonii *Suisse*, quod non repetit in Hist. Lat. ubi Pinum sylv. alteram facit, & à Macedonum fœmina sylvestri nihil differre ait, nam tractabilem & ad multa opera materiam habere idoneam.

Pinus sylv.  
montana.  
Theoph.

Lob. Adv. Pinus à quibusdā *Cembro* vocata. Ic. Plant. Pinafter, Germ. *Wild Fiechtenbaum*. Gall. *Pin sauvage*: Pinus sylv. montana Theophrasti: Alpigena in Pini arboris præcella æmulationem, caudice recto & lævi accrescens: foliis Pini oblongis gemino ordine sitis: cono, strobilo & nucleo Pini minore, putamine minimè duro, sed cortice molliore.

Cembrum.

Audivit Cæsalp. in Tridentinis montibus differentiam quandam esse in genere sylvest. Pini, aspectu Picæ, foliis Pini, nucleis fragilibus, ut facile dentibus comminui possint, *Cembrum* vocatam. Fuerit autem huius fructus quem Tarentinum Plinius dixit, digitis fragili putamine, aviumque expositum furto in arbore.

Non est te-  
da.

Dalech. apud Plin. notat malè legi, Sextum genus [cognatarum arborum, cognatarum vet.] tedam esse propriè dictam. Etenim tedæ nomen non videtur esse, ac nunc Pini resinofum & pingue lignum [ *resinifera* ] significare, quòd lucernæ candeleve loco uratur: nunc arborem sui generis, Theophrasto ignotam, quam *Cembro* vocent Tridentini, Allobroges *Anuia*.

Locus.

Tabern. Pinus sylv. Cembro. Pini Cembro folia & Conum habeo ab Illust. Principe, allatum Oenoponto, cuius nuclei plantati in horto Excell. Comitibus provenere visu grato, veràm citò petière. Pinastrum maiorem (sic enim is vocat) crescere scribit Clus. in montibus Pyrenæis, & plerique aliis Hispaniæ locis.

## PINVS SYLVESTRIS, SIVE PINASTER.

### CAP. V.

PINASTRUM in pina Theophrastus partitur generatim. Alia enim *Idæa* est, alia *Maritima*, & tertia *Sterilis*, de quibus plura cap. de Peuce vet.

Meminerunt Pinastri plurimi, sed ticulo tenuis duntaxat, non demeritantes quam arborem intelligant. Alii quidem Pinum sylvestrem rectè statuunt: sed hanc non distinguunt. Hist. Lug. de Pinastro meliora docet. Sylvestrem enim Pinum sive Pinastrum (Pinafter enim ut scribit Plin. nihil aliud est quàm Pinus sylv.) in fructiferam partitur & sterilem, Fructiferam in *Idæam* sive montanam & *maritimam*. Montanamque sativæ, ut millem dicit, ac nuces edere similes, solidas, ex simili squammarum congerie compactas, resinofas, odoratas. Huiusmodi verò montanas Pinus in multis Hispaniæ & Lusitanæ montibus crescere, adeò fructuosas, ut inde maxima nucum pinearum copia per totam Galliam distrahatur. Sterilem autem vocat, non quòd nullum edat fructum (conos enim fert) sed quia nuclei edules non sint, nec abis utiles. Sterilibus [addit præterea] Pinastris Avennorum, Vellamorum & Allobrogum montes abundant, ex quibus resinam colligunt, & picem optimam conficiunt, vocantque *Pins sauvages & Pinnateaus*.

Pinastrum scribit Plinius mira esse altitudine quod minimè verum esse videtur. Nam in hoc arborum genere Abies, Piceæque nostrates altitudine mediocri, tamen Bellonius prodiderit & Dictæos Pinastris in vastitatem diffusos, ad insignem altitudinem assurgere, & eos qui in Olympi Phrygi montis aut aliorum gelidissimorum montium summis, culminibusque proveniunt, Abies esse rectitudine. Sed is Pinum Cembro pro Pinastro describit, depingitque absurdè. Iustior est Matthioli reprehensio, quam fugere non potest Bellonius, dum Pinastri vocem ex versione Latina frequenter se legisse scribit apud Theophrastum, eum tamen Theophr. fuisse incognitum, quod in Græciæ Asiæque montibus non nascatur. Itaque nullum esse ex Græcis authoribus, qui Pindus sylvestris, Pinastrive meminerit. Quid? nonne Theophr. *Pinus* aliam cultam, incultam aliam dicit. Nos equidem nihil aliud esse *Pinus*, quàm Pinum probavimus, & *Pinus* *Pinus* Theophr. Pinum sylv. sive Pinastrum esse statuimus.

Pinastrum appellat Clus. Pinum sylvestrem sequutus Plinium, qui quæ Theophr. *Pinus* dicit, ad Pinum sylv. transtulit. Eius autem in suis peregrinat. varia observavit genera: terna in Hispaniis, quaternaria in Austriacis Pannonicisque montibus, & sylvis.

Pinastri ergo nomen seu Pini sylvestris pluribus attribuit plantis. Pinastrum Plinii & *Pinus* *Pinus*, quidam eam Pinum existimant, quæ *Pinus* non est, alioqui similis sativæ, formâ non differens ab ea, ut cæteræ, quæ proponuntur. Pinastri vocabulum assumpsit quoque Pinus Cembro dicta. Pinafter dicitur de Pinu sylv. vulgari Genevensi. Item de Pinu sylv. Hispanica maiore Clus. *Pinus*, De Pinastro maiore Austriaco albo & nigro, De Pinastro Austriaco tenuifolio, De Pinu sylv. sive ut vult Bellonius de Picea sylvestri *Idæa Troadi*, cuius coni facile decidunt, De Pinu sylvestri *Mugbo*, sive



*Pinus maritima* five Creiti. Pinus silv. maritima conis firmiter adhaerentibus dicitur etiam Pinaster, ut & illa Pinus maritima Theophrasti. Lobelio, cum Pinus altera maritima Matthioli. Habet & tertium Pinastrium Hispanicum Clusius. His ita absolutis dicitur etiam de Pinus Indica Theveti, ex qua Bre conficiunt, De Pineæ nucis specie Melenken, De Pini conifacit fructu exotico, De Pini forma Cabbage, & similibus.

PINUS SILV. VULGARIS  
GENEVENSIS ET  
Tada.



**P**INUS silv. hinc floria mihi admodum obscura videtur: eius enim observantur variae differentiae parum differentes, quarum unam voco Genevensem, quae nobis variare videtur a sequentibus, posterius tamen diligentius examinabunt.

Nostra igitur Genevensis parum variare videtur a Pino silvestri Tada, quam subiunge-

mus. Pulchre convenit cum itone a Matthiolo in penult. comm. exhibita pro Pino silv. ex qua nosuricon desumpta est. Coni. v. Matth. de sua prius dixerat, parvi & breves & non turbinati, ut in Tada, aut Mugho five Crein, sed rotundiores, in ceteris similes Mugho, fragili & brevi pediculo adherentes ramis. Pinus, quam silvestrem voco ad Tadam cognomino, Taier in Burgundia dicitur, ubi provenit circa montem du Pré loco Malfagne nuncupato, vno miliari à Meche Castello, iidem in locis, in quibus aliud genus Pini silvi quam Crein vocant, & quæ Mugho, de qua postea. Arbor tamen Taier, ut aiunt, maior & crassior & vulgatur: folia eadem bina, sed latiora, albidiora, ut & tota arbor albidior: rami non ita abundant foliis, sed disposita sunt per fasciculos, ut pinguntur rami Pinus maritimæ Matthioli: atque etiam in tres partes solent rami dividi. Abundabat mense Septembri conis dependentibus ex pediculo satis tenui & fragili, deorsum nutantibus, similibus conis silv. Mugho five Crein, longis, turbinatis, non ita nigris, sed viridibus. Squamæ differunt, habent enim in earum medio elevationem. Ex hac arbore fit pix, & hac potissimum utuntur, tade inстар, loco candelarum, pinguior autem & fragilis admodum est. Audio in Saxonia & Misnia vocari Bûschre. Huic Pino silv. Teda, similis est quæ provenit circa Basileâ, & in agris, conorum squamæ non nihil differunt, alioqui abundat multa resina siccâ: Mense Maio & Iulio scatet nucamentis plurimis, parvis, five Iulis, supra quos in summitatum extremitate oriuntur minimi conis purpurei, qui florum locum tenent: nihilominus semper habet conos in sua magnitudine: summitates sunt acidæ, nec ingræ

Tom. I.

essent, nisi sapor resinolus adiunctus esset: cum Tiguri esse Gesn. præceptor meus Piceastrum vocabat. Burmii Rhetorum Chirurgus quidam dicebat Piceastrum vocari Menpf: provenit hæc Pinus silv. in quibusdam silvis prope Florimontium, item circa Besfordiam versus Raupach, ut non longè à Porentruo ex qua tubulos parant. Sæpius frustra plantavi in horto Ill. E. C. tandem una planta crevit in Theriotrophio ex semine ex Harcinia transmissa. Hæc eadem ni fallor est, quæ provenit copiosè in silvis prope Nidenfels Castellum, ex quibus vetustate corruptis, arcis Dominus insignis vir Beuterichus curabat picem excoqui, ut aliquando ipse vidi, eò comitatus Ill. nostrum Principem D. Ducem Frid. V. Viri. Hanc autem, aut valde similem videtur describere Clus. pro Pinastro Austriaco maiore.

Cordo in Diosc. arbor Pinus spontè provenit, Piceastrum vocata, seu, quod idem est, Pinus do. silv. copiosa in Alpibus, patriâ linguâ Cyrbelbaum appellata. Hæc autem nisi ea sit, quam in præsentem vulgarem Pinum silvestrem voco, ignoreo quam Pinum silv. Cordus intelligat: atque si alicubi in Germania vera Pinus, piceas puculas duras ferens spontè proveniret, de illa arbor Cordi intelligerem. Quam porro Pinum silvestrem vulgarem voco, ad Pinum silv. tediferam refero, de qua Cordus eodem c. scribit in hunc modum. Ad est propriè Tada arbor, quam Eist Baum, aut Bifferbaum, & Seuren vocant. Ex qua sumpta pinguißima materia, Tada Græcis, Bin Germanis, similiter ut arbor ipsa nominatur, unde etiam faces Ades, à Græcis dicuntur.

Cæterum, quoniam in Tada mentionem incidimus, stat sententia de eâ fusiùs pertractare. Transiunt in Tadam quandoque Picea & Larix, sed rarè admodum: Pini enim silvestris proprius ac peculiaris morbus est. In Tadam autem Teda morbus arbor conversa dicitur, cum non modò cor sit, ut sub Peuce veterum dictum est, sed & reliqua eius substantia in pinguedinem mutata est. Hinc Plinius non absque errore Tadam sui generis arborem esse existimavit, ac sextum Coniferarum genus statuit. Eundemque errorem Hermol. committit, Plinium dubio procul secutus, dicens: Teda propriè dicta, & à Græcis δῆς & δῆς vocata, sui generis arbor est redundantiore humore, quàm reliquæ, parciore liquidiorque quàm Picea, flammis & luminis sacrorum quoque grata. Improprie verò Teda appellantur, tū alia quoque ligna quæ flamma olei vel picis illitu concepta, faculæ modo lucent: Nunc (pergit Plin.) celeberrimis arborum dictis quadam in universum de cunctis indicanda sunt. Montes amant Cedrus, Larix, Teda, & cæteræ quibus Resina gignitur. Verum si quis Plinii defensor diceret, per Tadam ipsum hoc in loco non aliud intelligere, quàm Pinum, itaque eum tueri vellet: hanc tutelam illud (ut cum Matth. puto) vanam esse ostendit, quòd, cum eo capite Plinius resiniferas arbores omnes per genera describat, & primum omnium genus Pinum faciat, nullo pacto Pinum pro Teda accepisse videtur, cum sexto resinarum generi Tadam postea adscripserit. Adhæc ipse Plinius Laricis morbum esse ait, ut Teda fiat.

Est autem Teda variae significationis: Per Tadam enim videtur Munsterus intellexisse Pinum Cembro: alius Pinum silvestrem significat: alius vini vitium denotat: Tadamque in Alpibus vocari Piceam scribit Cæsalpinus. Ac præsertim Coniferarum arborum materia ob vitium pinguis fa-

Y

# HISTORIAE PLANTARVM.

**Teda Dio-**  
**scor. &**  
**Plin.**  
**Nulla ar-**  
**bor est, qua**  
**Teda voca-**  
**tur.**  
**Pinaſter.**  
**Tragynota**  
**tur.**  
**Abietis ge-**  
**neris.**  
**Gollus in**  
**gnarus.**  
**Picula.**  
**Picea.**  
**Picea mon-**  
**tium.**  
**An Picea**  
**dicta**  
**monti?**  
**Pin. ſylv.**  
**Error.**  
**Caſt. Dnr.**

Ar (ſi modò fiat) Teda nomine vocari poſſet. Verùm ex eo quòd Dioſcorides *Ar. mon. 2. 71.* Tadam particulatim ſectam, ſin aceto co-  
quatur, & decocto dens collatur dolores levare  
ſcribit: Atque cap. de Ol. Candido ubi tadam fu-  
ſiùs deſcribit: teda præpinguis pinus aſulatum  
tandem cum aliis pondus aliquod præſcribit. Ex  
eoque quod Plinius Laricis morbum eſſe ſcribit ſi  
teda fiat &c. Nec non etiã Theophræſti autoritate  
ſectus, concludit Bellonius planè perſpicuum eſſe,  
Tadam non eſſe arborem ſui generis, ac nullam  
eſſe arborem quæ peculiari nomine Teda voca-  
tur.  
Pinaſter, ut vult Tragus, in Germania vulga-  
ris eſt notitiã, & ſa-tilè provenit, quocunque lo-  
co plantetur. VVaſgoviz admodum familiaris  
eſt, præſertim oppido Caſareo Luthræ: folia ge-  
rit multò quàm Pinus craſſiora, duriora, & no-  
centioribus aculeis armata: conos quoque ac-  
quirit breviores & duriores, ex quibz prægnantes  
nuculis: multam hæc arbor reſinã deſtillat vul-  
nerata, Germani *Ein milden Bienenbaum / Byſſer-*  
*baum*, & in ſuperiori Germ. *Forenbaum* / aut  
*Bolz* nominant. Hæc ille. Si verò eandem  
quam nos, intelligit arborem, non in omnibus  
placet deſcriptio, poſſimùm quòd ait folia craſ-  
ſiora, quàm Pini. Seminibus etiã in vulgari  
noſtra ſylv. Pinu, nucularum nomen haud con-  
venit: Sed Pino Cembro potiùs congruit. Con-  
ſiderandum præterea Tragum ſcribere cap. ſe-  
quenti quafi de arbore à modò dictà diverſa, quæ  
ſequuntur. Pinguis illa arbor, quæ hybernã in  
quibzdam locis facies præbet, ad Abietem quo-  
que tanquam ſpecies eius referretur. Quartum hoc  
Abietis genus Germani *Tälten* nominant. Teda  
quibzdam appellatur, à quibus in præſentia non  
diſcedo. Diſticle autem aſſertu quid Tragus ve-  
lit, quia non demonſtrat quã in re diſſerat ſua  
Teda à ſuo Pinaſtro, quem deſcribit præcedenti  
capite. Is ut regeter ſuam ignorantiam ſo otio-  
ſis diligentiorẽ & exactiorẽ nominum in-  
quiſitionem relinquere ait: quos monet ut in  
hanc rem Vallefiz Alpes, maximeque eas, in  
quibus S. Bernhardus habitet, perluſtrent. At  
non fuiſſet ſanè otioſi hominis, ſed boni Botanici  
arborem deſcribere. De qua ſi, vel liquidatã ſen-  
tentiam ſuam protuliſſet, vel planè tacuiſſet:  
nullam nobis occaſionem vellicandi ipſius igno-  
rantiam præbuiſſet.  
Theoph. Gollus in Onom. Pinaſtrum *Wilden*  
*ſiederbaum* / à Teda *Bienenbaum* / ut à diverſa arbo-  
re ſeparat, demonſtrã ſe nesciviſſe quid ſcriberet.  
An Petro de Creſc. Abies & Piella?  
Bellon: conſ. *mon. 2. 71.* Picea, vulgi Græcorum  
*Pinus*, & circa Lugdunum Pinus aggreſſis, *Pin*  
*ſauvage*, ſed falſò: figura etiã quam habet non  
placet. Eidem de negl. cult. Picea montium, ut  
Taraz, omnium qui Lutetiã Lugdunum proſe-  
cutur, oculis ſubiecta. An verò eidem Obſ.  
& conſ. Picea dicta montis, ex qua Teda in  
Creta, & de qua ſub titulo, Pini ſylveſtris.  
Matth. in Dioſc. Pinus ſylv. numeroſa virens in  
Anatiliis, reliquique Tridentinis montibus, fru-  
ctu parvo, brevi, quamprimùm aſcente, aſſa-  
tim dehiſcente, & ex arbore decidente. Is figuram  
habet, eamque in prioribus comm. & Hiſt. Germ.  
Pinum ſylveſtrem inſcribit, atque ex ea in Bohe-  
miã & Germania picea fieri ait. In poſt. verò  
comm. Pinum montanã vocat.  
Caſt. Durant. non deſcribit ſuam Pinum ſyl-  
veſtrem, cuiusque figuram ſecundò proponit ſub  
hac inſcriptione *Pignoli purgati*, vi errore aliquo.

Pinus, ut apud Stumff. Hiſt. Helv. legitur, mul-  
tis dicitur de *Fordenbaum* / aut *Fiedien*, licet ſit  
particulare genus: quod a Plinio Pinaſter voca-  
tur.  
Lonc. ſub titulo *Feldenbaum* malam Pinaſtri  
figuram ex Trago depinxit. Vocat autem cap. ſe-  
quenti *Feuren* / oder *Tälten* / auch *Ellicher Bie-*  
*baum* & *Byſſern*, Lat. Tadam, Græcè *δεδά*.  
Anguill. Picea, *Pinus* Gr. Plinio dicta. Phico-  
phorum & Picea ſilva, & Teda. Habet is figu-  
ram Matthioli poſtremam, quæ convenit no-  
titæ Pino ſylv. *Taier* ſive Teda dicta: conveniunt  
& ea quæ dicit.  
An Lob. & Penz Adv. Pinus altera nuce mino-  
re, ſerè Laricina?  
An Dodon. Germ. *Pinus* *Pinus*, Pini ſylv. ſeu Pinaſ-  
tri prima ſpecies, & Pinus Tarentina Plinii. Gall.  
*Aleve* & *Eleve* Bellonii? Fallitur Dod. exiſtimans  
eſſe Pinum Tarentinã, Aleve & Eleve Bellonii,  
eſt enim Eleve Cembro Matthioli: deſcriptio  
etiã conſula videtur: ac præterea conſundit eu-  
ſiam Theophræſti *Pinus* arborem peculiarem, cum  
*Pinus*.  
Ryſſ. in Dioſc. cum dicit, Piceam aliis dici *Ein*  
*ſieder* *Danne* intelligit Pinum ſylveſtrem. Con-  
fundit autem, ut & Lacuna, Piceam Bellonij cum  
Picea Matthioli.  
An Caſalp. Pinaſter in cæteris [cum Pinu] ſimi-  
lis, ſed graciliori caudice: nuce pyramidalis: nu-  
cleiſque ob patetiam inutilibus, præterquam  
ad columbarum cibum?  
Apello contra Matthioli ſententiam exiſtimat  
Bellonii Piceam non alludere ad Pinaſtri aliquod  
genus à Matthiolo depictum. Ego verò potiùs  
huic quàm illi aſſentior, quoniam ſit cuius  
Matthiolum redarguam, quòd videlicet Theo-  
phraſtum *Pinus* *Pinus* ſcribentem malè intelligat:  
nam has duas voces coniungit non coniungen-  
das, ac Pinum ſylveſtrem interpretatur, quum  
*Pinus* ſit Aquifolium, non autem adiectivum, ut i-  
pſe putat, *Pinus*.  
Piceaſtrum, inquit Geſnerus de hortis, in altiſ-  
ſimis montium noſtrorum ſylvis naſci aiunt, mate-  
riã longè puriore & politiore quod nondum ſatis  
conſideravi. Piceaſtrum eſſe puto, cui maxima  
(ni fallor) rigidiffimãque in coniferarum genere  
folia ſunt. In Catalogo verò dicit Tadam vel Ta-  
dam Pinci generis arborem eſſe, cuius aſſulſis pro  
candelis uti poſſimus, *Pinus* Græcis: Germanis verò  
dicitur *Brenholz* dictam. An autem Piceaſter eius  
altiſſimorum montium huc referri debeat, dubito.  
Camer. ad hiſt. Matth. Germ. & Epit. Pinus ſylve-  
ſtris. Tabern. Teda. Thal. Pinaſter. Horto. Luſit. Teda  
Pinaſter & ſylveſtris: Pinaſter pumilio ex montibus Bo-  
hemiciſ.  
Pinus ſylv. vulgaris, Teda cognominata multis, Nomina  
*Pinus* *Pinus* Græcè, & *Pinus* Cordo, Belg. *Wilde*, *Pinus*  
*Pinus*, Gall. *Pin ſauvage*, Ital. *Pin ſalvatico*.  
*Pinus* *Pinus* ſylveſtris, Vng. *Vad ſenyo* / *Boz ſenyo*.  
Hæc arbor abundat locis vicinis in Burgundia  
circa Porentrium, in Sundgovia variis locis, ut  
circa Beffordiam ac Baſileam in itinere Montbel-  
gardum verſus, unde aliquot vicibus transla-  
tarum, & in horto Montbelgardenſi plantata:  
rum, ymnica ſuperſitos ma-ſit arbuſcula à prioribus  
annis lentè creſcens. Verùm ex ſeminibus ex Har-  
dina ſylvæ per E.C. miſſis egregiæ arbores adole-  
verunt in eius Theriotrophio.  
Ad tubulos pro fontibus expetitur. Cum eſſem  
in Palatinatu cum E.C. obſervavi celebrem virum  
D. Beuterichium in ſylvis iuxta arcem ſuam *Pinus*  
*Pinus* curariſe piceam excoqui ex Pinis ſylveſt.  
vulg.



*Vires.* vulg. vetustate corruptis. Folia, cortex, resina, nuces, eadem, autore Matthiolo, præstare possunt, quæ in domesticâ diximus, ac etiam valentius, sed nuces edendo non sunt. Nucum recentium succus, vulum angustiorē reddit infusus, & mammas, nimis in virginibus extuberantes cohibet. Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non adeo valenter. Cortex, inquit Schvv. calidior est domesticâ, ut & resina sicciore. Coni recentes decocti in infessu, vesicæ & uteri ulcera sanant. Ex teda fices sunt & fuligo ad atramentū librarij cōfectionem. Teda in aceto decocta collutu dentium dolores sopit. Emplastris addita, anthracibus pestilentialibus percommoda. Lignum verò Pinastrī pulchritudine præstat Fabris lignariis, & pulchrius, politur, & elegantius apparet præferim vernice obductum.

PINASTER, SIVE PINVS  
SILVESTRIS HISPAN.  
MAIOR.

*pinus.* IN Pini altitudinem excrescit, interdum etiam superat, à medio rathosus, folia habens Pini oblonga, bina semper simul iuncta, in viriditate nigricantia, acuminata & pungentia: strobilo paulo minore, quàm Pini, alato inter squammas quibus compactus est, nucleo molli & nullo putamine incluso, sed tenui cortice duntaxat tecto. Caudex rectus. Cortex levior & minus scaber quàm Pini. Plurimam resinam fundit. Crescit id genus in Aquitania, in Pyrenæis frequentissimè, & plerique ibi Hispaniæ locis. Pinus silv. montana Theophrasti nonnullis esse putatur, inquit Clusius.

PINASTER AVSTRIACVS  
MAIOR ALBVS ET  
niger.



Pinastrī primus Avstriacus maior Clusii duorum est generum, adeo inter se similitudinem, ut pauci nisi materię cæsores, discernere queant. Alterum tamen generi latiore & erectiore est caudice, leviori cortice, maiore cono, Avstriacis Weissæ fecerunt dictum: Alterum verò crassiore plerūque est caudice: scabriore corti-

cè, foliis paulo crassioribus ac minore cono, scymargæ ferunt appellatū. Tenuia porro & oblonga habet utrumque genus folia, pungentia, bina semper coniunctim, ex eodem tubulo prodeuntia, & circa ramos in orbem quasi nascentia. Maio mense in extremis ramis quasi botros; si ve avas quasdam, fert tenuibus squamis obitos, qui sponte aperientibus se squamis iulos ostent.

Tom. I.

dunt virescētes aut pallecentes, plenos tenui polline luteo, si ve farinā, quæ levis aura afflatu dispergitur. Ex mediis deinde botris nova germina eodem mense prodeunt suis novellis foliis tenui quadam veluti membranâ inclusis onusta, quæ extrema parte antequam folia succrescant & explicentur, fructus rudimenta dant; grandiore iam similitudine ad germinum basim inharēte superioris Autumnī immaturō fructu, viridi, ramorum alas spectante & reflexo. Nigri generis interdum invenitur tristiore arbore, contorto caudice, & in latum sparsis ramis, minore adhuc quàm præcedens cono. Vtrumque verò hoc genus Vagati Vad senyo & Boz senyo nominant.

Perpendendum autem an Pinastrī Avstriaci multum differant, à nostra Pinu silvestri, & Tenedæ antè descripta; vel an eadem.

Ceterum ex utroque hoc genere passim in montanis Avstriacis & Pannonicis conficiuntur asseres; totæ ab aqua versatæ operæ secti: ex albo etiam, quod parum ab Hispanico maiore, & scandinavia; forte natalibus differre videtur, scandulæ & vi-nearum pali.

PINASTER AVSTRIACVS  
TENUIFOLIVS.



CRESKIT ad Locum.

nonnullorum Avstriarum montium radices in scopulis, & supra Badenses thermas quatuor supra Vienne in miliaribus, in montium cre-pedine tenui gramine obstita, aliud quoddam genus, contorto admodum caudice, divaricatis ramis, quorum furculi multo graciliores, lentioresque sunt quàm in superioribus duobus

generibus: folia item habet illis longè tenuiora, & breviora, tamen bina semper coniunctim ex eodem tubulo in virgarum ambitu nascentia: extremis virgis botris, si ve avas exiguorum iulorum veluti nucamentō tenuiorum squamarum inclusa adnascitur, qui non virescunt, aut flavent, ut in antè dictis, sed purpurascunt, deinde in tenuissimum pulverem abeunt, succrescente ex eorum medio novo germine, suis novellis foliis membranâ vel vesiculâ inclusis, onusto; huius conus etiam minor est, & obtusio plerumque mucrone.

Investigandum annon Pinastrī Avstriacus tenuifolius, si ve tertius Clusii, accedat ad Pinum silvestrem à nobis Genevæ observatum.

PINVS SILVESTRIS, SIVE VT BEL-  
LONIVS, PICEA SILVESTRIS IDÆ  
Troadis, cuius conifacile decidunt.

Piceam, quæ in Ida Troadis nascitur, plurimum ab aliis discrepare compertit Bellon. Picea, seu Pinus Ida Troadis.

Tempus.

Pediculus.

arb. conif. Siquidem in Ida Martio mense breves julos, ut Corylus promit: quo tempore coni à Piceis montis Olympi decidunt, quod aliarum regionum Piceis non accidit. Pediculus, quo coni ramo adherent, gracillimus est, quare cum maturuerint leui ventorum flatu deturbantur, decutiunturque ab arbore, cæterorum fructuum modo, sed tamen in aliis ferè omnibus anniculi, cum nuper nascentibus in arbore permanere comperiuntur. Quod in Ida Cretæ, Lyssa Illyriæ & in Schiro Cycladum insula animaduertit & diligenter obseruauit.

PINI SILVESTRES, VEL VT BEL-  
LON. VOCAT, PICEÆ SILVESTRES, VT  
Picea planicie, Corcyrensis, Dictæ montis,  
Gallo-Græciæ, & Olympi.

Hæc.  
Locus.Picea  
Sectus.Picea gla-  
mici.  
Caudex.  
Rami.  
Materies.

Resina.

Non flores.  
Ipsi, Coni.An Pinus  
silo mari-  
tima conif.  
firmius ha-  
rentibus  
Picea Cor-  
cyrensis.An  
Pinus Mu-  
gho  
Picea Di-  
ctæ montis.

Rami.

Truncus.

Coni.

MVLTA sanè notata digna scribit Bellon. lib. conif. verba autem eius sic habent. *Nomen* [Pinus, Picea Bellon. malè] in planiciem descendit in trivis illo itinere, quo Lugduno Lutetiam itur, duobus ab vrbe diebus itineris, in transitu colliculi quem vulgus *Tatara* duntaxat, in quo Piceas [Pinus] vbique enatas & circa montem siluicere, videbis, quas solâ facione *exariare* comperi. Vbiigitur in arborem excrevit, siquidem in plano extra silvas sita sit, caudicem contortum habet, rubro cortice vestitum, rimis hinc, atque vbi consenuit fungosum, Mox vbi in ramos diffunditur, eos sinuosos liuentes, & perpetuâ fronde viuentes producit. Sed ea nunquam procerâ euadit, mediocri arboris altitudine contenta. Comam in latum expansantem explicat, materiem mollem, leuiter rubentem habet, cariei obnoxiam. Ramos fragiles proferit, qui cum crepitu rumpuntur. Enascens mox ab radice biachiatur, cuius si caudex paulò profundius vulneretur, largam fundit resinam, per iniectâ liquidam, transparentem vt Laricis, Postremò albescit & dura redditur, quæ si gustetur subamarâ cum iucundâ quadam saporis gratiâ & aromaticâ sentitur. Nullos flores ferre creditur, sed augor julos, quos Hieme proferit, florum loco esse censet. Coni rudimentum paulatim capessens incrementum compactili congerie nucamentorum turbidatur, tuncque pediculum, quo arbori inhaeret, rectum habet. Is autè postea augefcens ieflectitur. An verò hæc Picea planicie, sit Pinus silv. maritima conif. firmius harentibus, iudicent alii.

Piceæ [Pinus] in Corcyra nigra vastiores Ficubus non attolluntur. Radicem, ut omnes Piceæ, [Pinus] tanquam palum, humi rectâ defixam, lignosam, foris nigram, gustu acerbam habent. An verò hæc Pinus Mugho sit, certò asserere non audeamus, Piceæ, quæ in verticibus montis, vulgò Spachiz dictæ, consurgunt, in vastitatem diffunduntur, atque altitudinem consequuntur, nam cum iam Picea adulta est, tunc Pini insar, in vertices summos, hinc inde ramos diffundens comam facit latissimam: foliis æquè ut in reliquis perpetuò gemina habet, veluti ab uno tubulo ad ima annexa gracilia, & oblonga, acuta. Ramos mox ab uno caule emittit. Ea annicula trunco glabro est prædita, tensescentes verò caudicem consequitur scabrum, teneriores tamen ramuli glabri sunt. Hæc notâ Picea, quæ in plano dissilit, distinet, quòd conos impares quidem atque turbatos habet, sed non ut in iam dictis, quæ in plano nascuntur retrogressi harent: necita pediculo crasso human-

tur, sed caudici infimo pediculo annectuntur quorum rudimenta circa Martium mensem sepe produnt, neque tamen illi primo statim anno maturefcunt. Ex huiusmodi Picea [mugho Pinus] magna tede pars eius, quæ in Creta nascitur, excipitur, ex qua Cretenses Tedarii picem & cedriam conficere solent. An, ut nobis videtur, Picea, hæc Bellonii, est Pinus sylvestris vulgaris Genevensis, cognominata Teda?

Picea, quæ in Gallo-Græcia circa Abonimonia urbem & Conticum, quæ Turcico nomine *Cute* dicitur, & ea quæ in montis Olympi Phrygiæ iugo nascitur, ad cuius radices Bursa vrbs, de qua sæpè meminit Galenus, celebris nobili emporio, & balneis, & infinitis Græcorum & Romanorum monumentis, sita est, plurimum à se invicem distident. Ex porro, quæ ad summum montis Olympi cacumen, aut aliorum gelidissimorum montium proveniunt, Abietis rectitudine constant, cortice (si ad alias comparantur) glabro & subalbido, ramos serie quadam in caudicis ambitu, Abietis in modum, cruciformes mittunt, haud secus ac Rubiæ folia, quæ quemadmodum circa caulem stillatim decussantur, sic huius rami ex eodem geniculo stellatim prodeunt, non autem confuso ordine, ut in aliis Piceis & multis arboribus, tum Platano, tum Fago, tum cæteris aliis accidit. Paucioribus constat hæc folis geminis, aliis quidem Piceis similibus, sed minoribus: conos verò ad exiles habet, ut etiâ maiores Iuglandis nucis magnitudinem non excedant, qui etiam facillimè ab arbore decidunt. Proportidius piceæ, ut & Euxini Subere carentes, Picearum corticibus utuntur, quos Vallachi ad eos transmittunt, quibus non secus atque Subere sustinendis sagenis in piscationibus utuntur, quemadmodum & circa Athon montem cucurbitis. Ex montibus Olympi descendens Bellonius, peculiare quoddam Piceæ genus obseruauit, cono autem ricularis digiti extremitatem crassitudine vix fu-

PINVS SILV. MUGHO SIVE  
CREIN.



ARBOR quæ Ale Crein vocant in Burgundia, crescit in montibus quos Franche montagne vocant, in monte particulatim dicto du Pré loco qui nominatur Malvaigne vno milliar ab arce dicta Meche: est è genere Pini silv. Matthioli, loca pto. inferiora montis occupans, parua & pumila arbor, respectu aliarum resiniferarum arborum, & Pi-





# HISTORIAE PLANTARVM.

plures varietates, & conis, foliis, totiusque magnitudinis. Duæ namque in Lyguria, Gallo-provincia & Narbonensis, ora maritima passim silvescunt: foliorum prælongo rectoque capillitio persimiles, sed vna brachiata est, cui folia erunt à mediis glabris ramis, æquabili plurimum exortu lino. Altera persimilis, de qua mox.

Obf. & Icon. Plant. Pinus silv. altera maritima: Pinus primum genus Matthioli. Pinaster secundus Cl. fil. Aliterbat Solernus piceam esse Pinum maritimam. Iac. Theod. Tab. verò Pinus montana Theophrasti. Item, Pinus montana maritima prima. Is nobis videtur vnius plantæ more solito duas proponere icones & descriptiones, & harum vnam ex Matth. & alteram ex Clusio, quorum quidem figura in dispositione conveniunt, non item in foliis.

Pinus Lyguria Gallo-provincia & Narbon.

Picea.

Pin. montana Theophr. Tabern. notatur

## PINUS MARITIMA THEOPHRASTI LOBELII

Deser.

Deser. Lobelii.



na, sed ramis glabris caudice nigrioribus. Conus phœniceus, brevior, & supernè latior.


Icon. Plant. Pinus maritima Theophrasti. Videndum quantum differat à præcedenti Matthioli maritima figura, quam particularem habet Lobelius.

An Pinus maritima Matth.

## PINUS MARITIMA ALTERA MATTHIOLI.

Deser.

Pinus maritima altera Matthioli.



PINUS maritima altera, quæ plurima in maritimis Senensibus provenit, fructum fert spinosum longum, pyramidalem, firmum ac solidum, nec per se facile deliscentem.

Pinus maritima altera Matthioli. Is in composita figuram mutavit, licet inscriptionem eadem retinuerit. Ad hæc si duæ marinarum pinus solo fructu differunt,


cur tantum in figuris discrimen expressit?

Dod. Gall. dicitur Pini filij. vel Pinastri quartæ species, nomen idem [Pinus Idæa] Theoph.

Pinus Idæa Theophrasti. Lob. Obf. & Ic. Pl. Hæc, inquit, videtur vniûs maritimæ alterum genus Matthioli. Facile dignoscitur caudicis & ramorum cortice scabro, circa ramos foliorum fortior, & maioribus, longioribus, speciosioribusque numerosis conis. Iac. Theod. Tab. Pinus maritima secunda.

An Cæsalp. pinastri genus parvum in maritimis ortum, lavi cortice aut cinereo, nucem pinastro similem ferens, sed multò minorem: folia capillamentu modo tenuissima.

## PINASTER TERTIVS HISP. PYMILIS.



EIVSDEM Descrip. ferè cū quarto Austriaco altitudinis, rarè scilicet humanam excedentis, licet in lentis & obliques ramos divisus sit: non sunt tamen adeo crasso, rugolique cortice tecti, neque ita in latitudine diffusi. Virga etià gracilior, folia exilia, Laricis foliis non dissimilia, nō aded tamen mollia, neque ut illa decidua, sed immortalis viriditate prædita, ut superiorum folia: Strobili exigui & graciles, nucleus etiam pusillus & nigricans, alatus ut reliquorum.

Clus. autor descriptionis dubitat an Pinaster hic tertius Hisp. non sit fortè Piceæ genus alterum à Bellon. in Obf. descriptum?

Lobelio Obf. & Icon. Plant. Pinaster 3. Clusii pusillus omnium minimus. Non differt, opinatur is, à Pinastro humili Gallo-provincia & Narbonensis collibus ad Lupum montem oriundus.

An Bellon. Obf. Piceæ distincta species cum conis minimis in Olympi monte. Arb. conif. verò, picea in Gallo-Græciâ & Olympi Phrygiæ jugo ramis Abietis modo cruciformibus, conis exilibus. De quibus lege titulum (Pinus Syl. vel ut Bellon. &c.) paulò antè scriptum.

Solo Murciano regno genus hoc pinastri idque rarsissimè Clus. conspexit.

## PINI RESINA.

DE Pini resina superius quædam à nobis relata sunt, sed specialitè adhuc dicetur jamiam. Pinum autem Resinam fundere autor est Theophr. comprobatur Dioscor. subtribuit Plinius.

Pinum, inquit Theophr. & si quæ aliæ resinae faciant, cadendam post germinationem afficiant. Cæsura quidem eius, ut & reliquarum, annua, non

Pinus Idæa Theoph.

Pinus maritima.

Pinasteri genus.

Rami.

Cortex.

Folia.

Strobili. Nucleus.

An Pinus genus?

Pinaster omnium minimus.

Pinaster humilis Gallo-provincia.

An Picea conis minimis Olympi.

Locus.

Arbor Resinifera quæ cadenda.

Cæsura annua.

non



non annua, sed post plus temporis administrari solita est. Fit resina in hunc modum. Vbi iam vulnerata arbore, detracta tantum cortex est [non detracta teda, ut scribit Herm. fecutus Gazam] resinam hauriunt, sic enim in vulnus injectum, humor copiosior confluit: ex Abiete verò & Picea non cortice tantum spoliatis, sed ipso etiam corpore, id est ligno vulnerato: haud enim quamque secretionem modo eodem agi mos est. Et hinc Plinii lapsus perspicitur, è Picea detracta tantum cortice resinam fluere dicentis: quod de Pino scripsit Theophr. Deinde eiusdem depravata hæc lectio manifestatur: Nec corpori ipsi paritur in ceteris, vel ut in ceteris: sic a restituendis Plinius, corpori ipsi paritur, non ut in ceteris. Est hæc porro Resina, non ita levis, quam quæ ex Abiete & Larice & Picea

[*ἐκ τῆς ἀβιέτης*] insignis, verò Gazæ in sua versione, qui tres hic tradit plantas, ac alias *πίνου* modò interpretatur Laricem, modò Piceam] teda enim Pinus referta est. Sed vel ex hac Theophrasti sententia sequitur: è Pino non detracta teda, sed cortice tantum, Resinam colligi. Pinus siquidem non spoliata, sed referta teda est, ob quam gravior ceteris eius resina sit. Quam ob rem præclarè Hermol. è Pinu Resinam copiosissimam, ponderosissimam, picique proximam manare scribit. Plinius contra minimum resinæ de Pinu colligi tradit, sed errat, Larici enim omnia ei tribuit, quæ de Pinu Theophrast. dixit. Et sic Plinius Archetypum suum imitatur!

Cæterum, Resinæ succi pinguis, summa, ut antea quoque diximus, species duæ sunt, liquida & sicca. Liquida, ait Theophr. portatur utribus, dein spontè spissatur. Resinæ liquidæ, ut comprobatur Diosc. è Pinu & Picea manant. Hæc ex Gallia & Hætruria convehuntur. Quin & olim è Colophone asportabatur, quæ inde Colophoniarum cognomen sibi vindicavit. Ex siccis autem Resinis, alia est strobilina, alia abiogna, de qua dictum, cæu de alia picina, & alia denique pinica.

Confundit certè Corn. si non decipit studiosum, dum ait: Quorum arborum sint singulæ relatæ Resinæ, ipsæ appellationes indicant. Falsum siquidem hoc est. Nam strobilinae resinæ nomen, non strobilum, arborem particularem, designat [ut ipse sibi imaginariè persuadet,] sed eandem planè cum pinæ resinæ vocabulo quod Pinum denotat, significationem habet. Strobilus enim (ut iustus declaratum) unde vox strobilina derivata est, nihil aliud est, quam nux pinica. Strobilina igitur resina & pinica eiusdem arboris resina fuerit. Illa quidem pariter arboris [fructus,] hæc verò totius.

Nostra tempestate, inquit Bellon. eadem impostura utimur, quæ antiquissimi solerent, in adulteratione Thyris. Siquidem resinam Pini miscemus Thuri. Sed frausprehenditur odore, vulgusque nostrum resinam illam Gariporum nominat. Subolfecerat fraudem istam suo tempore Dioscorides, qui in cap. de Thure scribit Thuri in itinere, inquit, adulteratur Pini resina: quæ res mihi absurda videretur, nisi in itinere dixisset: utpote, quòd illa regiones externæ, quæ admodum calidæ sunt, Pinum non generent. Ideò, ut nobis Thure peregrinum est, ita & illis resina Pini. Præca ætas ea omnia adinvenit, quæ nunc à nobis persciantur, aut saltem his simillima. Ex quo liquet nihil à nobis

nunc scribi posse quod non antè ab aliò expogitatum sit.

Inferenda duo ex Plinio: Vnum, Resinæ florem crudum ab eo dici, tenuem resinæ crudæ & sicca partem quæ in ea veluti bullat, & efflorescit: Alterum permixtum id videri quod scribit: Resina omnis dissolvitur oleo: quidam & cæta figlinarum hoc fieri arbitrantur. Resinam enim cæta liquari aut dissolui posse verum non est, atque adeò si quis resinæ liquatæ cætæ, vel ali- quod aliud terræ pinguis genus admisceat, mas- sa fit durissima, & quovis cæmento solidior: quare locum sic corrigendum esse quidam arbitrantur. Resina omnis dissolvitur oleo: Pudet confiteri maximum iam honorem esse in evellendis pi- lis: Quidam cæta figlinarum hoc fieri arbitran- tur.

Est porro de resinæ coctura dicendum. Li- quida resina in ossas cogitur duras, & solidas, ducentorum fere pondo singulas, in aquæ dup- plo tantum cocta, quo usque odorem amittat, friabi- lique & tam arida reddatur, ut digitis iam non cædat, nec eorum vestigium recipiat, ut sit cum eius lentor nondum prius consumptus est. Est autem liquanda & colo defecanda, ut scæulen- tæ sordes læternantur, priusquam in æventem aquam conciciatur. Hoc coquendi artificio re- sina candidissima evadit, ac ferè nivea, etiam si antea, vel oleosa, aut, mellei coloris, ut Larig- na, fuerit. Ex quibus perspicere licet Ruel- lium Dioscoridis hæc de re verba rectè non ex- pressisse: Donec, inquit, friabilis, ac retorti- da reddatur, & digitis cædat, cum legendum sit, ut digitis non cædat: deinde: resina sit etiam eximè candoris, si omnis eliquata pereole- tur, &c. Vertendum erat, sit autem (hoc sub- audi, coquendi supra dicto modo) eximè can- dida. Omnem autem resinam liquare, & colo defecare antea, oportet. Sed & Dioscoridem ipsum mirantur plerique ac iure quidem, cum declarat modum spissandæ in aqua fervente resi- næ liquidæ, cum eam uti [*ῥαβδῶσαι*] dixisset, & non potius elixari [*ἐλίσσασθαι*]. Spissatur etiam resina cocta sine aqua in cortinis æneis subiecto pri- mùm igne lento: deinde ubi coire coepit, carbo- nibus liberalius aggestis, & aucto igne, ut quicquid feroci est exhalet. Si liquidam dura- re & in ossas redigere hac ratione libet, coquen- da ea est sine intermissione diebus ac noctibus tribus, quoad odoris ex pærs, friabilis, arida, nec sub digitis lentescens existat. Sin iam siccam in ossas ducere placeat, uno die coxisse suffi- ciet.

Haud absimilis est coquendi modus hodie Chymistis usitatus, oleum è Terebinthina eli- cientibus. Phialam ingentem vitream, luto ob- litam & resinâ ad dimidium usque, impletam fur- no imponunt, alterius vacuæ, & quod stillat ex- cepturæ collum in eius fauces inferentes. Dein eâ cautione, quâ dictum est, ignem accendant. Fluit primum liquidus sudor Resinæ, aquam Chy- mistæ vocant, Pissæaque veterum is respondet: abiicitur verò tanquam inutilis, tametsi ad ea va- leat, ad quæ Pissæon commendatur. Sequi- tur oleosus liquor, qui cum totus exstiterit, arida & friabilis in phialæ fundo resina superest: Colophoniam hodie nominant, magni, ut è olim, in medicina usus. Scire tamen licet nomi- nis Colophoniarum multiplicem significatum fuisse. Sic enim dicta quondam fuit Resina autore Ga- leno, & resina truda, ex Picea, Pinove sicca, hæc.

Resina flori- cruda Plin- io.

Resina dissolvitur oleo. Creta non dissolvitur.

Locus Plin- nis corre- ptus.

Resina co- cta in ge- nere.

Ruell. ex- tra.

Ruell. corri- gatur.

Diosc. im- propria lo- cutio. Resina spissata ra- tio.

Loquendi modus Chy- mistarum.

Aquæ resi- na. Viri.

Colophonia: c. d. p. omnia s. a. i. a. i. g. i. a. i. o. Resina cru- da.

Resina li-  
quida.

Chiaz Mastiche persimilis, ex Colophone advehi-  
solita: præterea Resina liquida ex eisdem arbori-  
bus, ab eodem loco, nulla, eodem Galeno teste,  
quæ, quod suavissimè olet, & admodum pauca  
colligeretur, summo erat in pretio. Cùm à Chy-  
mistis eo, quo diximus modo, vitur resina, æ-  
quum est ex singulis libris effluere aquosi festi-  
viciam unam, oleosi liquoris uncias quatuor. Et  
hanc postremam si quis ad lib. 3. vbi de Terebin-  
tho, eiusque resina agitur, referre malit, per nos ei  
licebit.

Nomina  
linguarum.  
Liquida.  
Spontè flu-  
ens.

Resina autem omnis Græcè *ῥηνίνη* dicitur:  
Germ. *Harz*: B. Ig. *Harst*. Gali. *ῥηίνη*: It. *Raga*:  
Hisp. *Resina*. Liquida autem subalbida & odo-  
rata resina ex Pinotum, præsertim silvestrium ge-  
neribus, non raro spontè, ex ramis tamen aut  
caudice, arbore in tedam conversâ, detractâ cor-  
tice vulneratis, profluens, Græcis *ῥηνίνη* nomen  
minatur, & à nonnullis *ἀπὸ τοῦ ῥήναι*, spontè fluens:  
à *Λαοδάμωνι* *ἁπλοῦς*, *ῥηνίνη* in Cilicia  
verò *ῥηνίνη*, ut Gal. 3. med. secund. gen. in of-  
ficialis v. *Resina Pini*. Contingit autem quandoque  
dum negligentius hæc collecta fuerit, ut quædam  
lignosa & lapidosa ei admixta sint, proptereaque  
Gal. *ῥηνίνη*, quasi confusam vocat. Ea au-  
tem liquefacta, ac à fordibus repurgata, cocta-  
que, dura redditur ac friabilis, ut tundi, ten-  
drique possit, quæ *ῥηνίνη* Græcè dicitur & non  
raro *ῥηνίνη*, Lat. *Fritia* & *Colophonia*. Altera  
arida è corticis rimis, vel circa abscissos ramos &  
quidem Piceæ vel Abietis exiens *ῥηνίνη* *ἁπλοῦς* nun-  
cupatur, præsertim ex Picea arbore, pinguedinis  
expers, & celeriter arefcens, quæ aut. Gal. 6. sec.  
gen. *ῥηνίνη* *ἁπλοῦς*: In Asia, è Picea admodum  
candida; Spargas vocatur teste Plinio. Tertia *ῥη-  
νίνη* *ἁπλοῦς* nomen accepit, quæ circa cónos seu  
strobilos concreta reperitur: eadem verò & *ῥη-  
νίνη* *ἁπλοῦς* dicitur, officinis incognita. Prostat  
autem in his arida quædam venalis resina ex pi-  
tyna, strobilina, abietinaque confusis permixta,  
quam *Garipor* nominant, à Thure, cuius loco non  
raro sufficit, multum differens.

Fritia.  
Colophonia.  
Arida.

Phytima pi-  
tynum.  
Spargas.

Phytima  
strobilina.

Garipor.

Locus.

Tempus.

Tempera-  
mentum in  
genere.

Ut aut, ubi singula Resina puræ & impermixtæ  
dubio procul inveniantur, scias, tibi singula-  
rum arborum natales indagandi, quos in cu-  
juslibet historiâ petere non gravaberis. Tempus  
quoque eas colligendi satis ex antè dictis pa-  
ret.

Strobilina.  
Terebinthi-  
na.  
Viti non  
phytima.

Abietina  
Colophonia.

Præstantia  
resinarum.

Galenus Resinas omnes siccare & exalface-  
re scribit. Cæterum, inter se discrepare, quodd  
plūs aut minūs habeant in gustu quidem acrimo-  
niæ, in facultate verò caliditatis. Et quodd alia  
plūs, alia minūs fortitè sint partium tenuitatis:  
Ac quodd nonnullæ adstrictionis sint participes,  
alia verò nequaquã. Resinarum addit calidissima  
est strobilina & celeritè siccatur, moderatissima  
Terebinthina: Pitynon Phytima siccatur & cale-  
facit, siccanda autem Strobilina non supera-  
tur, sed calefaciendo plurimum. Inter Pitynon,  
phytima & Strobilinam Resinam media calore  
est abietina, sicut etiam Colophonia Thus re-  
dolens, calore mediocri prædita, &c. Verum  
putabit forsitan aliquis (inquit Gal.) à nobis dis-  
sentire Dioscoridem, de Resinis sic scriben-  
tem: Ex omnibus principatus Terebinthina da-  
tur, post eam Lentiscina, sed his lib. 3. tum ei,  
quæ de Picea manat, & Abiete: Vltimum lo-  
cum pinea, strobilinaque obtinet, &c. Sed in  
his Dioscor. tanquam de infima Strobilina, opti-  
mã verò Terebinthina sentire videtur. Ego  
verò ex his tribus resinis, Strobilinã, Abietinã,  
Terebinthinã, principem certè Strobilinam calo-

re, secundam Abietinam, postremam Terebin-  
thinam esse dixi.

Viles sunt resina, Diosc. autore, ustra five  
fritia ad odorata malaginata & acopa: præter  
enim emollientem, quam scintem facultatem;  
etiam tenuitate partium suarum ac siccitate dige-  
rant: tumores idcirco & emolliunt ac discutunt:  
ac eadem etiam facultate acopis permixta lassitu-  
dinibus insidentur. Liquida unguentis ad re-  
centia vulnera solidand; commendatis, com-  
modissimè admiscetur, nam & ad suppuratione-  
nem, & ad facilem unionem faciunt.

Resinã condire multa vulgare est Italiæ, pro-  
vinciisque finitimis, inquit Plinius; vehemen-  
tiusque id fieri arbitrantur, crudo flore Resinæ,  
excitaturque lenitatem. Quidam apud Palla-  
dium resinã siccat ustra unc. tres dolio immer-  
gunt, & permovent, ac vina diuretica sic fieri  
posse persuadent. Columella inter medicami-  
na multo in deservitio ad tertias decocto adhi-  
cienda, resinã Terebinthinã sesquilibrium re-  
centet. Eã condituri feracitatem vini compescer-  
bant, viriditque frangebant, aut ubi pigra viri-  
lentia torperet, virus addebant, eã tamen mo-  
deratione, ut multis pugnacibus plūs indere-  
tur, lenibus partibus. Resinam verò sine curio-  
sa alia preparatione, ut ex arbore collecta fue-  
rat, multo permiscabant, aut florem resinæ sic  
preparatum. Eum cum affluis multis, tenui-  
bus, brevibus, quibus inhæret, minutum con-  
cisum & cibratum, in aqua fervida coquebant.  
Sic enim pinguis resina exprimebatur, rara, nec  
nisi paucis in locis subalpinæ Italiæ ad vini  
conditum excellens & medicinæ conveniens. Hanc  
conditum Plinius *Crapulam* vocat, quodd vina  
sic condita capitis dolorem & vertiginem excita-  
rent, præsertim novitia, nec inveterata. Qua-  
re ubi Columella enumerans aromata, quibus  
deservitum condiri solebat, eam Crispam pampi-  
naceam nominat, plerique Crapulam resinã  
ceam legunt, Hermolaus verò Sertam campani-  
cam, quodd eã, Palladio teste, ad vini condi-  
turam atterentur. Vina autem resinã condita  
frigidis stomachis utilia existimabantur, novitia ve-  
rò vomitoribus, sicut & multum & sapa, & pal-  
sum.

Excipitur tandem & fuligo, *ῥηνίνη* Græcis dicta,  
ex resinis perinde ac ex Thure, quæ ad palpe-  
bras ornantia (ῥηνίνη & ῥηνίνη) cōducit, & ad angulo-  
rum oculi erosiones & collachrymationes: citra  
mortem siquidem resecat.

Conficitur ex hac, inquit Diosc. atramentum,  
quod scribimus. Verum hac ætate non quo scri-  
bimus, sed, quodd à Typographis in excuden-  
dis libris usurpatur, ex hac fuligine, aliis non-  
nullis permixti, paratur. De vino resinato ita  
Dioscorides: Passim apud varias gentes fascitili  
solet, sed plurimum in Galatia: quoniam illic  
præ frigore non maturante uvas, vinũ facile coa-  
lescit, nisi pinea (ῥηνίνη) resina conditur, tem-  
pereturque. Tunditur autem cum cortice resi-  
næ, & amphora dimidia hemina permiscetur. A-  
liqui ubi effertur, excolant, separantque resi-  
nam: alii eandem relinquunt. Hæc porro vina  
vetustate suavia redduntur, sed capitis dolorem  
& vertiginem faciunt: concoctionem tamen ad-  
juvant, & uinam ciens: destillatione vexatis  
ac tussientibus profunt: item caliacis, dysente-  
ricis, hydropicis & feminis vulvæ fluore labo-  
rantibus: profundioribusque excitationibus  
eadem insunduntur. Cæterum in hoc genere  
nigricans albo magis constringit. Dignum no-  
tatu

Vires resina  
sapa.

Liquida vi-  
res.

Musta.

Flos resina.

Vina diu-  
retica.

Crapula  
resina.

Crispa pampi-  
nacea.

Serta cam-  
panica.

Frigiditas  
stomachi.

Fuligo resina.

Vires.

Atramentum.

Nota.

Vires &  
sapa.

Vina.

Tussis.

Dysente-  
ria. Hy-  
drops.

Vulva.

Locum Diosc.

resinam.



Error quodammodo. **T**atu in hoc Dioscoridis contextu resina piceam pro pinea [resinam] falso interpretari. Si enim Strobili pinei fructus sunt, ut abunde docuimus, vinumque est Strobilis eodem effectus cum resinato praeberet, ut autor est Dioscorides, quis sane facili conjectura assequitur, non piceam, sed pineam resina esse interpretandam.

## PIX IN GENERE.

**P**inguissimis, maximèque resinosis, & in tedam conversis, Pini praestitum, Piceaeque lignis, vixignis Pix elicitur. Quibusdam tamen in locis propter Pini Piceaeque penuriam, & Cedro, Terebintho, ceterisque similibus colligitur. Qui Macedoniam colunt, autore Theophrasto. ne Pinum quidem picis gratia urunt, praeterquam marem. Sterilem enim marem nuncupant. Famine verò radicem tantum accipiunt. Omnis etenim Pinus tedam in radice gerit.

A vero igitur alienum est, quod Plin. de picis materia scribit. Pix, inquit, nihil aliud est, quam combustae resinae fluxus. Quare Hermol. & cum secutus Bellon. cum hac definitione picis notionem parum explicatam esse intellexerent, dixerunt, picem esse combustae in tedam resinae fluxum. Sed hæc cum Plinii verbis coincidunt, nec meliora traduntur.

Picis faciendi modum Theoph. fusissimè describit. Picem, ait, vere [urendo elicere potius] hunc in modum consueverunt, cum locum aequalem preparaverint, & veluti arcam concursum habente, in medium diligenter pavimenta-rint, truncos persilos componunt: proximè sane compositioni carbonem facientium, praeterquam quod sine fossa opus perficiunt, lignis erectis & inter se coherentibus, ita ut altitudinem assidue pro multitudine capiant. Quod fieri ajunt cum compositionem desuperint circuitu centenorum octuagendorum cubitorum: altitudine verò cum plurimum sexagendorum, & centenorum, & quinquagendorum, ambabus, si tedam pinguissima sit. Cum igitur tedam ita construxerint, & materiam perrexerint, aliqua terra superfusa undique, summa cum diligentia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit. Pix enim peribit, si id acciderit. Succedunt autem per aditum relicti: dein eam quoque pariter superant materiam, & obstruunt terram, reliquasque omnes observant, & quacunque fumum protrudi viderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quò nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis verò per medium structus acervum, picem fluentem in foveam ducit, cubitus circiter quindecim ab acervo. Pix effluens tactu frigida fit. Vixit duos dies, & totidem noctes cum plurimum. Sæpe enim post die ante Solis occum exusta jam est, rogiisque cessat. Id enim evenit, cum nihil reliquum est, quod amplius fluat. Totum autem tempus, quo tedam uritur, vigilantes observant, ne quid ignis erumpat, et sacrificant & concelebrant precantes, ut pix sibi copiosa bonaque fiat benignitate, deorum. Macedones & Idæi, qui Pinos [resinarios] discernunt, & aliam Idæam [montanam] aliam marinam cognominant, picem fieri ajunt ex Idæa largiore nigriorem, dulciorem, tedatiorem, in totumque faciliorem, & odore gratiorem, dum cruda sit: Ex marina autem flavorem & crassiorem. Atque plus picis imbris frequentatis, quam squaloribus reddi volunt: & ex hybernis, opacisqueloc-

cis, plus quam ex apicis, serenisque. Bellon. lib. de conf. alium picis coquendi modum Cretensibus receptum tradit, cuius verba hic adponimus, quibus melius ea, quæ ex Theoph. annotavimus, intelligi possint. In Creta, inquit, nostro seculo eodem ferè modo picem excoquant, parvâ ab iis, quæ à Theoph. differentiâ. Furnum in sublimatum exstruunt, ad ima in angustum definentem, quâ parte crater paulo inferius construunt, deinde struem quandam lignorum superiniiciunt. Ignem postea desuper accendunt, qui oleum ligni liquorem inferius subsidere ad ima compellit, qui petens exitum per meatum descendit, seque in foveam vicinam recipit, ex qua pix nigerima emanat, quæ omnium optima censetur. Nigrior efficitur, si ligna multum sicca fuerint, & multo magis si assulatum scissa sub Solem totâ astate permanierint. Hoc modo pix fieri solet, sed ex prima fovea ad minores transfunditur, in quibus cum refrigit, cogitur, atque induratur. Pix optima purissimaque, quam loca admodum aprica & Aquilonia præbent. Contrâ, quamvis picea, horridior, limumque referens: locis enim admodum depressis atque opacis, nullo quidem pacto Picea [Pinus munda] gignitur.

Pix ut tradit Plinius duobus fit modis. Prior is est, quem à Macedonibus observati mox à Theoph. scriptum est. Posterior verò hic. Ingentibus valis terra desolis laminam ferream multis foraminibus perviam, vel ambiente canali cinctam adaptant. Super hanc, furnum extruunt, tedam assulatum castra complent, & obturant: ac ignem accensum extrorsum circumdant. Fervescens tedam picem duorum generum mittit, liquidiorè & spissiorè. Liquidior seu humidior ac primò defluens, aqua perquam similis est. Altera spissior & crassior, quæ vasis collecta, in quibus servatur, aceto densatur, ac cogitur.

Quæ alium ignem non experta est, quam cuius calore fluxit, quæ, id est cruda à Theoph. sæpe dicitur: Latinis verò pix liquida, quam nonnulli Dioscoride teste Conum [Kōvov] appellant. Arab. eers, Zefs, aut Kir: Germ. Weyß Bedy: Belg. Teer: Gall. Poix fondue: It. Pece liquida, Hisp. Pex liquida. Harum prior, inquit Plin. aqua modo canali fluens in Syria Cedrium, five Cedria cognominatur, quia Syri cum Pineis & Piceis caret, rarissimè Terebinthos, sæpius Cedros ad picem consiciendam urebant. Rectè igitur Diosc. Cedriam ex Cedro colligi scripsit. Et hinc merito Bellonii opinionem improbamus, qui ex quavis arbore resiniferâ huiusmodi fluentem liquorem Cedrium vocat. Altera autem liquida spissior, Pix brutia appellatur: in hoc solum apriori differens, quòd aceto aut diuturnitate spissata fit, ac colore fusco, & pinguior.

Picem autem liquidam in cortinas coniectam aceto spissat, tradit Plinius. Bellon. igne spissari censet. Nos verò nihil immutandum dicimus. Aceto enim siccaandi vim inesse, cuius perspicuum est.

Pix arida fit è liquida iterum cocta, cuius itidem duo genera. Coquitur enim duplici cura. Ac unâ quidem, ed usque tantum dum ad vici crassitudinem coacta sit. Alterâ verò igne tam valido, & tamdiu continuato, ut absumpso proflus humore (per quem alias tenax est) arida, fragilis, ac rasilis fiat. Hæc Græcis Empyda vocatur. Latin. Arida aut sicca pix, Germ. simpliciter Bedy: Belg. Stuckenbedch: Gall. Poix sèche: It. Pece secca: Hisp. Pex seca. Huius autem prior viscosa Boetio nominatur

Picis coquenda modus. Bellon.

Nigrior pix expressa reddi.

Quæ loca optima picem præbeant.

Picis faciendi modus. Plin.

Teda ferrea duplicem fundit picem. Liquidior. Spissior. Aceto densatur.

Pix cruda. Pix liquida. Nomina linguarum. Cedrium. Syri Pimis. Cedria. Bellon. opinio reprobanda.

Pix brutia. Bellon. censetur.

Pix arida. Nomina linguarum. Viscosa. Sicca.

Pix arida. Nomina linguarum. Viscosa. Sicca.

*Navalis.* in offic. pix navalis. *Βορδα* fortassis, quod in pel-  
libus [*πρωκιδίων*] pecudum, condoretur ac ven-  
deretur: Aut, quod pecudum scabiem sanaret:  
Aut, quod illitu greges privatum signarent. Na-  
valis, vt me fert opinio, quod hac naves pica-  
bantur. Vtraque porro tam viscida, quam  
*Palmipissa.* arida *πρωκιδίων* vocatur, quasi recocta ac his fa-  
cta pix. Hancque Corn. picem Græcam vocari  
scribit.

*Delectus.* Ex his Liquida præfertur splendens, levis, sicc-  
cera. Siccæ probatur pura, pinguis, odorata, sub-  
guia, & resinosa. Improbatur adusta, fumum re-  
dolens, & acida. Probatur verò ea, cuius fra-  
gmenta splendent, quæ dentibus pressa lentes-  
cit, & gustu est suavi, acore jucundo, qualis est  
*Brutia.* Brutia, à Brutis Italiae gente, & Lycia ab Asia  
*Lycia.* regione dicta, modicè cocta, nec lento, resinolô-  
que suo succo protius exuta, resinæ, picisque  
naturam simul habens. Paulus Africanam probat.  
*Idæa.* Asiae picē Idæam maximè etiā probabant, ab Idæ  
*Pieria.* celeberrimo Troadis monte. Græcia Pieriam, à  
Piero Thessaliæ monte, qui Macedoniam versus  
*Naresia.* protenditur. Virgil. Naresiam, non vt vult Bel-  
lon. Laticiam, à Naresis Liburniæ populis, quo-  
rum montes Pinorum sunt feracissim. Alij Na-  
riciam eligunt, à Nariciis Locorum populis, qui  
*Naricia.* optima pice abundant. Michael Anglicus Illy-  
*Illyrica.* ricam celebrat, quæ regio est Epiro contermina,  
propinqua Italiae. Theopompus scripsit refe-  
*Pix fossilis.* rente Plinio, in Apolloniatarum agro picem fos-  
silem non deteriorem Macedonicâ inveniri. Est  
autem illa *Pissaspphaltum* Dioscoridis, nempe ad  
*Pissaspphaltum.* spissitudinem picis coactum, temporis spatio. Pix  
etiam *Nemerica* olim dicta fuit, à Nemeturis Al-  
*Nemerica.* pinis populis, quorum meminit idem Plinius, li-  
cèt eam in Liguria confici scribat Columella. Ea  
pix liquida erat eodem autore. Ea verò quæ  
*Corticata.* utebantur Allobroges ad vini conduras, *Corti-  
cata* dicta est, fortasse quod in loculis ex arbo-  
rum cortice factis adheveretur: Aut, quod tam  
dura esset, vt in multiplices textus ac loricas, tan-  
quam in cortices ac phylaras divideretur. Hæcque  
siccæ erat, duræque, & quod vetustior, eò melior  
in vû, quoniam omni lentore amisso facilius in  
pulverem resolvebatur, atque cribrabatur. Co-  
*Columella.* cta esset nec ne, Columella non declarat. Co-  
*Laxa.* tione tamen duratam fuisse verisimile est.

Habetur & in vulgatis Columellæ exempla-  
*Pix rasis.* ribus *Pix rasis*, quæ *rasis* mea quidem sententia  
*Rasis.* dicenda est, igne quidem non exsiccata, sed cru-  
da, verum multis annis & vetustate sic durata, vt  
confusa in pulverem redigeretur, ac radi posset.  
*Rasulana.* Eandemque esse puto cum Hist. Lugd. quem Pli-  
*Rasulana.* nius *Rasulanum*, sive *Rasulanam*, aut *Rasulanam* &  
*Rasica.* secundum quosdam *Rheticam* vocat.

Præter hæc aliud quoddam genus reperitur,  
quod *πρωκιδίων* [Oleum picinum] appellant. Fit  
è pice, vt Diosc. docet, separato quod in ea a-  
quosum est, quodque eidem, veluti serum lactis,  
supernatat. Excipitur porro interea dum pix co-  
quitur, expansis supra eam mundis velleribus, si-  
ve lanis: quæ postquam halitu ex ea sublato per-  
maduerint in vas aliquod exprimuntur. Itera-  
turi; illud tantisper, dum pix ea coquitur. Sed à  
Diosc. dissentire velle videtur Galenus. Rurales,  
inquit *πρωκιδίων*, in Asia mulieres picem liquidam  
cum oleo permixtam Pisselæon vocant; quod al-  
liud est ab eo, quod Pissanthos [flos picis] appel-  
latur, quod ipsum liquidæ picis incumbit & super-  
stat, & magis tenuium partium est, quam ipsa  
pix, tum compage, tum etiâ facultate. Sed idem  
lib. 8. simpl. id ipsum *πρωκιδίων* vocat, quod hic

Dioscorides. Paulus etiam & Plin. pisselæon, *Pisselæon*,  
non ex pice & oleo compositum faciunt medi- *Pisselæon*,  
camentum, sed id, quod Gal. ante *πρωκιδίων* & *Pisselæon*,  
pōit *πρωκιδίων*. Idem etiam 8. simpl. pisselæon *Picis liqui-  
da serum.*  
ita etiam Aëtius; sed Paul. compositè *πρωκιδίων*. *Orrorissa.*  
Acapud Scribon. & Marcell. Pisselæon picis flos *Picis flos.*  
etiam exponitur.

Aliud picis genus *Zopissam* vocari, auctor est *Zopissa.*  
Diosc. ex Cera & Resina conflata, derafam  
scil. exaavibus, quæ diu in mari versatæ essent,  
ac, vt vult Plinius, velut vitam illic peregissent:  
Eaque per intensionem *Zopissa* quali efficacior  
dicta, & quod adiecto Salis marini callo stimula-  
ta sit, *Apochyma* appellata fuit. Modum autem quem-  
dam *Zopissam* præparandi ita docet Aëtius. Si na-  
vis derafam non habeas, Picis aridæ, inquit,  
lib. 1. picis liquidæ, ceræ anctientem, resinæ pinus  
sexuncem. Omnia liquata & excolata in pel-  
vim aquæ marinæ, vice communis plenam, mitti-  
to, & manibus velut pastillum subigito, ac vit-  
tor. Hanc Germani autore Corn. *Schiff-Bech*, *Navalis*  
picem nauticam sive navalem vocant. *Zopissam* *Pix.*  
Hæd. Jun. eandem cum pice rabulana Plinij ita-  
luit, eamque Germ. vocat *Abgeschaben Bech*, Belg.  
*Abgeschabt Peck*, Gall. *Pois racée*, Ital. *Pece rasica-  
ta, raspari*, Hisp. *La Pez que se rae de lana*.

In genere quamlibet picem absolute Græci  
*πίσιον* dicunt, *ἐξ* Aristoph. Interp. Germ. *Bech*/  
Belg. *Peck*, Gall. *Pois*. It. *Pece*, Hisp. *Pez*.

Pix à Potius vocatur dura, liquida, cruda, pin- *Eputhera.*  
guis, vapida, atra; vnde Ovid.

Torus pice nigritur atra.

Picis facultates Diosc. ita profequitur. Facit pix *Vires & vi-  
sus.*  
liquida ad lethalia medicamenta [ad venena H.  
Lugd.] phthisicos, purulenta excreantes, tusses,  
anhelationes, & humores intra pectus conten-  
tos ægè excreabiles, si cyathi mensura cum mel-  
le delingatur. Peruncta valet ad tonsillarum ac  
uix inflammationes & anginas, itemque ad aures  
purulentas cum rosaceo, nec non & ad ser-  
pentium morsus cum tito sale adhibita. Pari ve-  
rò ceræ admixta, scabros vngues detrahit: [Gal. &  
ex ipso Paul. & Aet. addunt, impetigines detertit,  
quod non necesse sequitur, Corn.] vulvæ taber-  
eula, sedisque duritias discutit [hic loco sedis,  
Hermol. ex Marcello penis legit.] Cum farina  
hordeacea vinnæque pueri decocta strumas cir-  
cumquaque rumpit. Cum sulphure, pineo cor-  
tice aut fursuribus illita, quæ serpunt vlcera co-  
hibet. Mannæ Thuris ac ceræto permixta, sinuo-  
sa vlcera agglutinat: pedum, sedisve rhagadi-  
bus commodè illinitur: vlcera replet, & cum  
melle purgat. Quin & cum uva passâ & melle  
carbunculos putrescentæque vlcera emarginat.  
Septicis quoque seu eto dentibus emplastris vti-  
liter immiscetur. Calefactoriam vim habet pix  
arida, mollit, pus movet, tubercula panôsque  
discutit, vlcera replet, ac vtiliter vulnerariis me-  
dicamentis permiscetur. *Zopissa* verò dissipandi  
facultatem obtinet, quoniam aqua marina mace-  
rata sit. Dosis in vnguents & emplastris ab Vnc.  
sem. ad Vnc. 4. & plures.

Pix siccæ Galenô desiccata, & exsiccata secun-  
do excessu, plûs tamen desiccata potest, quam  
calfacere: humida contrâ, plûs calfacit, quam  
desiccata, habetque nonnullam partium tenuita-  
tem, quâ & asthmaticos & purulentos adjuvat.  
Satis est autem cyathi linxisse mensuram melli  
mixtæ. Abstergerendi quondam vim habet, con-  
coquendi, digerendi, velut & in gustu subama-  
rum quidpiam & acre. Sic *leprosus* vngues exi-  
munt *Vngues le-  
prosi.*



chena  
mores.  
munt ambæ, mixtæ cum cera, Lichenasque de-  
tergunt: Concoquant item duos & crudos tu-  
mores omnes, cataplasinatis inditæ. Ad ea om-  
nia, humida valentior est, arida verò temetî ad  
ea quidem deterior, glutinandis tamen vulneri-  
bus magis convenit. Pix liquida calcfacta, in-  
quit Matth. vñ cum Thure & Mastiche abrafo  
occipitio adhibita, prolapsam columellam resti-  
tuit.

ut picis  
la picâ-  
Picis vsum duplicem fuisse, rei rusticæ Scripto-  
res tradiderunt: vnum ad dolia & ferias, cæterâ  
que vasa ante quadragesimum vindemiæ diem  
picanda, & aliter ea, quæ demissa essent humi,  
aliter ea, quæ starent supra terram. Nam in iis,  
quæ demissa essent, pix vetusta lateribus adhæ-  
rens liquabatur igne in lampade admoto, & ra-  
dulâ curvâ ligneo rutabulo præfixâ foras eicie-  
batur, post detersâ penicillo vasâ, ferventissima  
pice infusa, scopula rutabulo alligata & circum-  
ducta picabatur. At quæ supra terram consi-  
stebant, compures dies antequam curarentur,  
in Solem producebantur: Deinde cum satis in-  
solata essent, in os eversa, subiectis tribus par-  
vis lapidibus suspendebatur, atque ita ignis  
subiiciebatur tamdiu incensus donec ad fundum  
calor adeo vehementer perveniret, vt apposita  
manus patiens eius non esset, pixque vetusta li-  
quaretur: tum dolio in terram demisso, & in la-  
tus deposita, picæq; ferventissima infusa dolium vo-  
lutabatur, vt oēs eius partes linerentur. Picem  
autem duram & recoctam ad id commendabant,  
adiecta quinta parte picis brutiæ.

no firmi-  
m tri-  
Pix in Italia, ad vasâ, vino condendo, maxi-  
mè probatur Brutia, ait Plinius. Picis illius vi-  
no duratricem firmitatem præstat, inquit idem, ne  
vinum corumpatur, & sicubi rimosum vas sit,  
ne transfluat.

aditura.  
is odor  
nans  
gra-  
Picis alter usus erat ad condituras, Italiæ pars  
aliqua lenitatem vino excitat rabulanâ pice. Ra-  
tio condendi multa aspersu picis lib. 15. dicitur.  
Picis odor saporque Romanis olian suis gratissi-  
mus in vinis, quæ ob id picata appellabant, Ga-  
lenus *δινος κωνιας*, & *πικριστου*. Huiusmodi vina  
arte talia erant, vel naturæ sponte, qualia Vien-  
nensia, & Allobrogum. Sed de his loco iam  
citato. Quemadmodum autem cum vinum adeo  
infirum esset, ut perennare non posset,  
aut certe quousque venderetur, durare, peti-  
culumque esset, ne acceret, fugeret, muce-  
sceret, id resinâ, flore resinæ, crapulâ resinac-  
câ, sapâ, destituto, aliisque odoribus condie-  
bant: ita pice interdum solâ, interdum cum  
aliis mixta, & eâ quidem modò liquidâ, qualis  
fuit Nemeturica: vel sicca, qualis fuit corti-  
cata Allobrogum, Rasilis, Brutia, vina medica-  
bantur, prius tamen pici liquidæ semper aut ci-  
nerem lixivium infundentes, permiscensque,  
aut aquam marinam ex alto petitam: ut his &  
picis odorem auferrent, & spurcitiam elue-  
rent.

ut Guls.  
vortu-  
vortu-  
Alios præterea duos usus libet ascribere ho-  
die nondum penitus aboleto. Pice illitâ pilos  
avellunt, è corporis partibus, quas natura iis  
vestitas esse voluit, quod *πικρὸς* & *καταρρεῖ* Græ-  
ci dicunt, à materia quâ utuntur in eo sædo  
ministerio. Hoc verbo usus est sæpe Clem.  
Alexand. molle delicatūque institutum, ac  
improbiorum hominum artificium accusans. Præ-  
terea pice torquentur corpora hominum, quâ in  
re verbo *καταρρεῖ* longè alio intellectu quam in  
vasis linendis utuntur: valet enim, cruciatu illa  
& supplicio afficere. Intellexit hoc Lucretius,

cum pœnas mortalium, tormentâque brevî ex-  
ponit.

Verbera, carnifices, robur, pix, lumina, redæ.

Idem animadvertit & Plautus, cum Aristopho-  
nem adutam servi vocem, resellentem induxit,  
qui dixerat in eum:

Atta bilis agitât hominem:

At pol te, si hic sapiat senex, Atta pix agitet  
apud carnificem, ac tuo capiti illuceat. Apud  
Palladium Rutilium nonnulli coracinam [liqui-  
dam intelligo, ut quæ in cortis asservari soleat]  
picem contra formicas in arbore suspendendam  
[arboris trunco circumlinendam] esse confir-  
mant.

Materiæ  
quoque  
carnificii.

Formicæ.

Fieri porro & fuliginem è liquida pice hoc  
modo, autor est Diosc. In lucernam novam el-  
lychnium habentem aliquid picis infunditur, &  
accenditur, & lucerna novo vase fictili cibani  
formâ prædito, supernè quidem angusto & ro-  
tundo, infernè verò foramen habente, quem-  
admodum cibanus, operitur, & uti finitur. Quum  
autem prior picis humor consumptus est, alius  
infunditur, donec satis fuliginis collectum sine-  
rit. Ad eundem modum è resina, Thure, Myr-  
rha & styrace, aliisque his similibus fuligo con-  
ficitur. Vini habet acrem & adstringentem.  
Utendum est ipsâ ad medicamenta & illusiones,  
quibus palpebræ ornantur: & ubi glabras ge-  
nas producere pilos oportet. Est & ad debi-  
liores, & lachrymantes, ampliusque exulcera-  
tos oculos commoda.

Fuligô.

Facit Pisselæon [oleum picinum] ad eadem,  
ad quæ pix liquida. Cum hordeacea farina Alo-  
pecis adhibuit, capillos restituit. Id ipsum  
quoque præstat pix liquida, quæ præterea iumen-  
torum ulcera, scabiemque illita emendat. Vi-  
num picatum [*ἐν πικρῷ*] ex liquida pice &  
musto temperatur. Picem autem primum mari-  
nâ aut muniâ tantisper eluere oportet, dum in-  
albuerit, & sincera maris aqua defluat: mox a-  
qua dulci iterum proluenda. Tum in congios  
octo musti additur uncia picis una aut altera, at-  
que ita finitur. Post ubi effervuerit atque suble-  
verit, in vasâ diffunditur. Hoc genus vini exte-  
lescit [concoquit Plin.] concoctionem adjuvat,  
abstergit atque purgat: proindeque utile dolo-  
ribus pectoris, alvi, iocinotis, lienis & vulva-  
rum, si sine febre sint, itemque uteribus rheu-  
matismis & profundis exulcerationibus. Est &  
efficax contra tussim, tardam concoctionem, in-  
flationes & anhelationes: luxatis denique præ-  
sertim in succida lana, imponitur. Vide plura  
lib. 15. de Vinis.

Oleum pi-  
cinum.

Vinum pi-  
catum.

Vires &  
usus.

Pest. m.  
Alvum.  
Iecur. Lien.  
Vulvæ.  
Tussis.  
Anhelatio  
Luxatio.

## PINVS INDICÆ EX QVA BRE.

### CAP. VI.

IN Teneriffa, autore Theveto, in Gall. Antar- Locis  
Itica Fortunatarum sive Canariæ insula una,  
copiosissimum paratur Gummi [gomme] vel po- Gummi  
tius pix [poix] nigra, quam vocant Bre: deiciunt Pix  
autem Pinos, quibus abundant, eas dissecant,  
fasciculos componunt ad decem, aut undecim picis sa-  
plaustra, hos alternatim unum post alterum picis sa-  
crucis in formam supra foveam medicis pro- cienda ra-  
funditatis congerunt, ac firmem accendunt, quâ tis.  
accensâ, pix in foveam defluit. Alii verò facilio-  
ri viâ incedunt, faciliorque negotio rem ab-  
solvunt, factâ enim tantum circum arborem  
fossâ, eam incendunt.

Alia.

Hoc gummi in *peru* devehunt, magnoque Vitis

ex eo lucrum faciunt. Vñs autem eius duntaxat est ad naves picandas. Si quando cor de hac arbore rubri coloris montani indigentes offendunt, ipsum in assulas satis longas findunt, crassas instat pollicis, quæ candelarum loco illis inserviunt.

An Copei  
P. Mart.

An de hac Pinu Indica P. Mart. cum ait. Gignit ex duobus arborum generibus picem insula Hispaniola, ex Pinu puta & arbore dicta Copei, ex qua pix non aliter, quàm ex Pinu legitur, licet dicant plerique stillicidio colligi comburendo eius lignum. Fructus autem eius parvus est, uti prunum, elui satis aptus.

Fructus.

### PINEA INDA HISPANIS.

#### CAP. VII.

Pinea Indica  
Hispan.  
Boniamia  
Indus.  
Hyayama.  
Hyayagua.

**D**IGNVS Oviedus, ait Cardanus, cui fides habebatur. Is refert in Peru insula fructum esse omnium qui edi possint præstantissimum: quem Pineam Hispani à formæ similitudine; Indi Boniamia, seu Hyayama vocent, atque è cuius genere sit, qui Hyayagua nominatur. Esse enim formâ pulcherrimum, gustu jucundissimum, odore suavissimum, ut ex quinque sensibus tres in eo maximè delectentur. Oriti autem ex planta spinosa, referrèque Pineam figurâ, sed in summo vertice germen asperum, Liliæ caudicis quasi instar prominere: colore Mali Medici esse, dum acerbus sit, & dum maturuerit, odorem Cotonei, adeoque valdè, ut vnus ex his cubiculum totum redolere faciat. Corticem ut Pineis, inæqualem & inutilem, sed tamen non ut Pineis apertum, verum alio modo fructum ipsum mundari atque diuidi: Magnitudinem, qualis Medicis malis, Peponibusque: Odorem verò etsi Cotoneo similis sit, gratiorem tamen, quodd adulterinus, ac mixtus fragrantia variâ videatur: Succo præterea abundare, carnemque æqualem illi esse atque solidam, plantamque (vti dictum) spinosam, folio amplo: Vnicuique verò fructui castem suam subiici: maturecere autem spacio mensium decem: quodd si ante maturitatem præcidatur, plantam ipsam nulli vsui præterquam impinguandæ terræ vtilem esse. Caulem, qui supra fructum sit, detractum plantamque, genus suum renouare: folia verò similia Carduo, sed longiora, tenuioraque. Non seruari vltra 15. dies, & edendo pyri molcati speciem refert: suscitare appetentiam extinctam. Eundem tamen saporem vini ingratum reddere, & bilem gignere credi: adeò nihil in humanis absolutum esse.

Folium.  
Duratio.  
Vires & usus.  
Appetitus.  
Genera.

Hydropt.  
Hyayagua  
Boniamia.

Hyayama.

Cultra.

Multa autem illius tradit genera, acidâ, acerbâ, alteriusque saporis, velut etiam in Pyris, aliisque fructibus, cæli, folique varietate & specie diuersa, tum ipsarum plantarum cultu: habere & filia veluti Cardui albi, ob quæ dentibus noceat. Et neque aquam potam post ipsum sapere, adeò ut hydropticos, absterendo à potu, iuvare possit: Ex his etiam Hyayagua, albam intus & vinosam, sed saporis esse acerbioris: Boniamia, dulcem & ipsam albam, sed aliquantulum stupæ referre imaginem: anibas etiam has rotundiores: Hyayama verò oblongiorem, lutei coloris, intus obscuri: atque hanc omnium præstantissimam.

Additque rustici operam maximè fructum hunc sentire videri, quando agrestes cultis longè sint inferiores. Immaturos verò decerptas quandoque vique in Hispaniam transferri: attamen cum in propria arbore non maturuerint, gratiæ maio-

rem partem amittere: gemina quoque translati corrupta fuisse. Esse verò humidum, addit Cardan. in hoc fructu tenne, tum pingue, tum aqueum, ostendit copia succi, fragrans odor, brevis vita: & quodd marcescat cito.

### PINEÆ NVCIS SPECIES MELENKEN.

#### CAP. VIII.

**N**ARRAT Thevetus Necumere maris Indici insulam innumeris fructibus abundare, inter quos, qui ipsorum lingua Meliken nominatur, magnus est, nucis pineæ specie, cortice luteo, quo spoliatai carnem & in particulas confectam si degustaveris, saccharum ore continere dixeris, cum pauxilla nucis Moschatai potiuncula permixtum. Hoc Barbari præsertim ad sedandam sitim utuntur.

Locus  
Meliken.  
Detempus  
Caro.

Vnus  
Similis  
Nana  
Arbor  
Meliken.

Fructui Nana satis similis est, nisi quodd Meliken in arbore provenit, Mori ferè pccentitate, nigro cortice vestitus, folio quadantenus rubescente, longitudine & latitudine folii Angelicæ. Nana autem planta est foliis Iunco similis, nunquam ad tantam altitudinem crescens, de qua lib. 26.

### PINEI CONI FACIE FRVC- TUS EXOTICVS.

#### CAP. IX.



**P**ediculo mini-  
mi digiti ferè  
rè crassitudine,  
ruffo, duro at-  
que lignoso, fo-  
lia mutuo incu-  
bitu adnascuntur  
digitu ferè lon-  
ga, firma, sub-  
stantia lignosa,  
triquetra, prin-  
cipio angustius  
ore, reliqua  
parte latiora,  
& fastigio tenus  
recurva, nume-  
rosisque squam-  
mulis fohacis  
lucentibus, ni-  
grisque vestita.  
Hæc pars quæ  
recurva, modi-

Descriptio  
Folia.

Squamula.

cò inflexu separatur, ita ut fructum esse squam-  
mosum suspicio sit. Folia quæ intus delitefcunt,  
extimis breviora, & densiore dictorum folio-  
rum stipatu obsepta. Per quorum longitudinem  
extimam costa insignis angulum faciens excurrit,  
parte internâ carinata, Sapor nonnihil amari-  
cat, non sine adstrictione nidorulenta, ac si  
fructus in fumo esset exsiccat. Partes ex co-  
mestione, dentiumque attritu hærent, quod  
argumento est, substantiam nonnihil esse visco-  
sam.

Fructum hunc communicavit nobis charis-  
sime frater C. Bauh. qui cum coni speciem quodam-  
modo gereret, ut ex figura, colore, & folio-  
rum mutuo incubitu videre est, coni facie fru-  
ctum

Substantia  
Inferior  
nigra.



# LIBER IX.

265

cum appellare placuit. Dignus sanè hic fructus, qui cum Carduo ex *Madagascar* conseratur, de quo lib. 26.

## PINI FORMA CIBAGE.

CAP. X.

**E**X Orientalibus regionibus Cibages nomine à Paludano delatum esse semen colore nigrum, acumine donatum, ex quo prodierit planta Pini formâ, sed tenerior, videre est apud Cæmerarium.


## ARBORES FERVLÆ SIMILES NIGRÆ ET CANDIDÆ.

CAP. XI.

**I**N Fortunatarum Insularum prima *Ombion* vocatâ nullis adificiorum vestigiis haberi in montibus stagnum; arborisque similes Ferulæ, ex quibus aqua exprimitur, ex nigris amara, ex candidioribus potius iucunda, tradit, ex Inquisitione Iuba; Plinius Hist. nat. lib. 6. c. 32.

## ARBOR LAVENDVLÆ FOLIO.

CAP. XII.



**A**dmiranda naturæ est arbor live frutex, cuius ramus triū pedum longitudinem non excedebat, crassitudinis diameter circiter duarum unciarum erat: Cuiusque fastigium in nodosum caput nonnihil extuberans desinebat, è quo sesquipedales quinque minores rami profusiliabant, aded eleganti serie & ordine dispositi, quasi humana industria


fuisse insiti, inferiori ramo facie quidem similes, sed molliores, magisque succulentis: qui etiam procul dubio comprehendere & radices agere potuissent, si quis commodo loco telluri committere in animum induxisset.

In horum comosis fastigiis folia adhuc in hærebant, virentia, formâ, magnitudine, & colore Lavendulæ folia valdè referentia, sed succi plena, aromaticum quidpiam spirantia, medium inter Angelicæ sily radicem, gummi quod vocant Elemi, & Cunigundis herbam: qualibus totum ramum vestitum fuisse, ipsa in ramis vestigia indicium faciebant. Quantum verò ex resectione ramorum Clusio Exot. colligere licebat, densâ spissâque medullâ, instar Sambuci ramorum, præfusa fuisse debantur.

Ramus hic ex Orientali India in Angliam anno Tom. I.

## LARIX FOLIO DECIDVO, CONIFERA.

CAP. XIII.



**A**rborum resinosarum tanta natalium mixtura est, ut non facile discernantur in fronde, etiam à peritis. Larix enim caudice recto, ac procerò. Abijecti æqualis est: cortice crasso, scabro, fuscoque: Rami longi & graciles: deorsum propendentes: Folia leniter odorata, ramis confuso ordine ambientia, è tuberculis umbilicatis, duode-

cim aut viginti, & plura nonnunquam, penicillatim in morem coniuncta prodeunt, tenera, perangusta, crassitudine porcinas setas æquantia, uncialia & longiora, viridantia, nec antequam, donec ipsa Veris initio succedant, Hieme decidentia. Non igitur universa simul, sed singula paulatim recedunt, aliis interim successu ab eodem tuberculis prodeuntibus dilapsorum vicem occupaturis, ita ut non defluxisse folia, sed novæ iuventutis habitum induisse videantur. Cori, qui fructus eius sunt, pertinaciter ramis hærent, brevi, contorto, crassiusculo pediculo nutabundis: nucis Cupressi magnitudinis, sive unciales: Squamis contexti latiusculis, compressis, obtusis, tenuibus, ex rubro [inquit Clus.] purpureascentes. Qui dum novelli & recentes sunt, ex eisdem tuberculis è quibus folia prodierunt, petiolis brevissimis reflexo, nitentes, ut mucrone eorum spectent: illisque intercedunt squamulæ foliaceæ, tenellæ, in stylum acutiorem delinquentes quæ singula continent semina, parva, alata, gemina, tede [inquit Cord.] seminis figuram & quantitatem referentia, totis cinericeo cortice, intus autem candido nucleo constantia, sapore dulci, & pineam nucem æmulante. Materies firma satis & livida, in rectum fissilis, fulvâ, vel spadicea [Cordo] crispantibus saturatioris coloris callis, pectinibus rectis odorata, flammæ cens, odorem quoque iucundum nanibus aspirans.

Vitruvium antiquiss. scriptorum plantæ huius cognitionem habuisse, vel inde constat, quod, Arch. lib. 2. dicat. Larix verò, quæ non est nota nisi his municipibus, qui sunt ad ripam fluminis Padi, & littora maris Adriatici, foliis est Pini similibus, habetque resinam liquidam mellis Attici colore, quæ etiam Phlegisticis medetur.

Laricem quintum genus arborum resinam fundentium Plinius facit. Cui situs ident, inquit

Descriptio.

Caudex.

Cortex.

Rami.

Folia.

Coni.

Squama.

Squamula.

Semina.

Sapor.

Materies.

Odor.

Locus.

Arbor res.

inifera.

Plinius.

[cum Picea] eadem facies, Larix vocatur, materia præstantior longè incorrupta vis, emori contumax, rubens præterea, & odore acior: pluculum huic erumpit liquoris, melleo colore, atque lentius nunquam duræscens. Et licet alia resisterum arborum genera ætensa, fuligine immodicâ, carbonem repentè expuant, cum eruptionis crepitu, ei aculenturque longè, excipitur tamen Larix, quæ nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis vi consumitur, quàm lapides. Perpetuè hæc virescit, ut cætera. Hæc magis alta, & crassior (Dalech.) laxiorque folio, villosior & densior, molliorque flexu, coudm Picea, quæ radicibus ustis non repullulat. Nullo flore exhalatur, nec rat. Pomorum recurves annuos versicolori rancio promittit. Tripartitè, insuper ut Robur & Abies intermittit, ternaque germina edit. Plura de his vide cap. 1. de Abiete. Eius morbus est, ut teda fiat, huic succise humor diu effluit. Hæc arborum altissima una, quæ cæteris, vetustatèque ex reliquis tardissimè senescit. Potius sustinet validum, etiam in transversa, posita. Mortes amat. Folia trita & in aceto decocti de nuntio dolon præstant. Cinis corticem intertrigini & ambustis. Potus verò alvum sistit, utinamque movet.

Hermol. in descriptione Laricis Plinium sequutus hæc habet. Larix, inquit, quæ in Troade visenda quatuor & viginti pedum ambitu, altitudinè duorum iugerum prætereaque cubitorum quindecim: nam Theophr. Pinus atque Larix idem: Palladius lignum Gallicum vocando, aut Laricem, aut ei simile, quid significat? Nobis autè nec Hermol. nec illis alius persuadebit Plinium, sive *Larix*, Theophr. idem esse, cum Laricem, ex his lo deciduo, non perpetuo. Nec Plinius Laricem Gallicum vocat Laricem, aut ei quid simile. Ita siquidem in Novembri scribit. Viles autem ad fabricam sunt hæc maxime, Abies, quæ Gallicam vocant, nisi perluatur, levis, rigida, & in openbus sicis perenne durabilis. Larix utilissima, ex qua si tabulas suffragas tegulis in fronte, atque extremitate tectorum, præsidium contra incendium contulisti. Neque enim flammam recipiunt, aut carbonem creare possunt. Hinc itaque luce meridiana claris patet, Hermolauin Palladio imposuisse, siquidem non Laricem, sed Abietem lignum Gallicum vocant.

Cum nullus adhuc Latinorum (Cordo id perhibente in Diosc.) prodiderit, an Laricem Græci habuerint, vel cognoverint & quomodo eam appellarent, non temerè eum mirari subit, quæ ratione affirmet Laricem eam esse arborem, quæ ipsis *reseda* vocetur. Verùm non sanè satis erat dicere, non sine ratione, sed rationem proponere conveniebat, ut aliquid observatu & notatu dignum eum studiosis adferret.

Et quamvis à Trago Larix in censu Abietum habetur, & propterea, ex qua Terebinthina germanica effluit, exhibeatur, minis tamen ei cognitam fuisse conicimus. quod eam non describat, ac omnes Abietes Hieme quoque virere dicat, quod huic surgetur non convenit.

Bellonius Laricem Græcè ignotam fuisse tradit, utpote, cuius ne quidem unquam Theophrastus meminerit, ac Dioscorides qui de ea aliquid scripsisse videtur, tantum eum de re externa pronunciant. Ac præterea Plinium, Ruelliumque cum recentioribus alius corrigens, Pini & non Laricis morbum esse ait, Teda fiat, nec perpetuè virere, sed hyeme folia illi decidere, eamque in super florere: ac Conos, utiam proferre, & non

sterilem esse. Addens præterea contra Plinium huius lignum Pini ligno ad scandulas præstare: contra Fuchsum verò, legimam Terebinthinæ vice Larinam non Abietinam supponere: Ac contra Vitruvium aliosque recentiores, & flagrare & in carbonem verti, ut & contra Ruellium non Piceam sed Novellam cupressum æmulari: atque tandem contra Guilandinum nec Cedrum nec Cedrelatem esse.

Firmius verò nobis persuademus Guilandinum non novisse Laricem veram cum suas epistolæ scriberet, Laricem siquidem Libanum abundare putat, ac eam Cedrum nuncupat. Nec sine causa sententiam mutavit ut appareat ex defensione Pauli Hæsti: quæ sic habet: Hippocedrum sanè seu Cedrum magnam Græcorum Guilandinum Laricem esse Latinorum etiamnum sentit, sed an Cedrus, cuius mentio habetur in sacris litteris Larix sit curius heret. Nascuntur enim hodie in Libano monte Larix, Abies, Pinus & omnes præterea resinae arbores, cumque iis sui generis arbor nobilis, quæ nusquam in Europa provenit, quam qui Christum in Iudæa & Syria venerantur, Cedrum appellant. Ut tamen hanc Christianorum in Syria Cedrum, eandem esse cum Hebræorum Cedro Guilandinus credat, multa sunt quæ fidem faciunt, quæ libens præterea, cum quoque videam hanc ipsam Hebræorum Cedrum Græcos non raso, cum sua Hippocedro, hoc est, Larice confudisse. Apollo Guilandinum etiam notat dicens: Laricem Cedrum magnam esse Apolloniatico Timonis stilo astruere non videretur Guilandinus, in summo nixus argumento. Plinium verò & Ruellium defendit in eo quod dixerunt Larici folium non esse deciduum: Verùm quàm firmo argumento, ipse perpende: Quod autem tradunt nonnulli Laricem hodie vocatam ignis esse in viciniam, idem Apollo pro vano habet.

Scit Amatius ex omnibus Pini generibus, Laricis materiem durior, firmiterque esse, ac proinde in hoc Pliniano loco [scandula, ex omnibus, quæ resina ferunt, facillime, sed minime durant, præterquam è Pino] mendam esse: Cupressum præterea in totum persimilem facit, minime quidem Pino, ut Ruellius credit: Plinium verò merito taxat, quod crediderit Laricem esse sterilem: Ac eundem quoque cum Vitruvio & alijs errare scribit, qui Laricis lignum in igne non uti contendunt. Hæc ille, nec solus, alijs inter aliter sentientibus.

Quate metu valere iussu nostram proferamus sententiam. Multi sunt cum Clusio in ea opinione, Plinium cancta tribuere Larici, quæ de Pino [ad eum] Theophrastus scripsit. Quod ut nò omni ex parte negamus, nec illis cōcedimus. Hæc n. [materia præstantior longè, incorrupta vis, emori contumax, &c.] ubi quælo Theophrastus de Pini prodidit? Ostendant nobis & subscribemus. Nonne Matth. Amat. ac adeo ipse etiam Clus. Larici talem materiam attribuunt. Sed obiciunt, in hoc igitur Pliniano loco [scandula ex omnibus quæ resina ferunt facillime, sed minime durant, præterquam è Pino] menda subest. Non enim hic Laricis materiam longè præstantiorem, incorruptam, ac emori contumacem esse, affirmare videtur, sed Pini, ut cuius scandula, ex omnibus quæ resina ferunt, maxime durant. Necessario enim consequitur, eius materiam esse longè præstantiorem, magis incorruptam, ac emori contumacem, quæ maxime durat. Ergo Pini materiam, erit longè præstantior, incol.

Ter (qua-  
musa).Cassio-  
tardi se-  
nt.Pondus su-  
perioris Sa-  
aum.Pence Her-  
mol.Lignu Gal-  
licum.  
Theophrasti  
Pinus non  
est contra  
Hermol.  
Tullius de-  
scribit.Hermol.  
redargui-  
tur.Cord. ta-  
latur.

Cedrelate.

Abies.

Tragæ-  
latur.Larix Græc.  
ignota.  
Plin. & Ru-  
ell. notan-  
tur.Fuchsius  
repreh.Vitruvii  
error.Guiland.  
taxatur.Guiland.  
error.Hippoced-  
rus.  
Cedrus  
magna  
Græcorum  
Cedrus sa-  
crarum li-  
terarum.Cedrus  
Christi-  
anorum.

Pinus.

Plin. error.

Cupressi si-  
milis.Vitruvii  
error.Aurorum  
iudicium.Plin. de-  
ditur.



incorrupta magis ac emori contumax, quam Laricis. Sed dicamus Plinium in illo loco Laricem non intellexisse, sed duntaxat arbores resiniferas Theophrasto cognitās Abietem, Piceam, & Pinum quæ duabus prioribus materie præstat. Sed rogabit porro aliquis, quomodo Larici convenit, eam nec ardere, nec carbonem facere, nec ignis vi consumi: item nec foliis, nec fructum ferre, contrarium siquidem hodie ei eveniat, ac magis ipsi Pino: imò nulla arbor reperitur, quæ vi ignis ut lapides resistere valeat? His respondetur Plinium hæc non ex sua observatione habuisse, verum temerè ab aliis tradita, ceu alia multa, historia verè loco accepisse, eiusque loco retulisse. Nunc quod restare videtur, non negamus Plinium quædam Larici assignasse, quæ de Pinu Theoph. dixit, è quibus hoc maxime urget, eius morbum esse, ut tæda fiat, qui certè proprius Pini morbus est: ac sic fatemur eum Pinum & Laricem inter se confundisse, cum idem etiam arguat vis & facultas illa foliorum Laricis, quam Diosc. Pini foliis adscribit.

Cæterum, figura Dodonzi Gall. non placet, nec quod dicit folia esse *dechiquetées*, dissecta. In his autem Lat. errore agnovit, ac sic cortex: folia ab uno tuberculo multa simul coherentia. Pingit verò is arborem & ramulum qui omitti potuisset.

Laricem, inquit Turnerus quavis Diosc. non describat, Plinius tamè id facit, sed non vsq. veritatem assequitur. Recentiores, attestante quotidianà experientià, Laricis lignum, non minus quam aliarum fumitem ignibus præbere scriperunt. At Veteres vt Pallad. Vitruv. & ex his quoque Plinius non addere Laricem, nec carbonem facere prodiderunt. Hic præterea sempiterna habere folia scripsit, quod utrumque falsum esse deprehenditur. Aut ergo errarunt illi, aut hodie vera Larix incognita est. Sed nulla ferè videtur notior. Quod autem Plinius ait ab Homero Laricem enumerari, id lapsi memorie Goropii condonandum censet. Si quidem Poëta de Larice ne literulam adiecerit. Cæterum Stumpff. Laricis lignum duplex esse tradit, quemadmodum Laricis fungum Agaricum dictum, marem & feminam, quod nondum affirmaverim.

Iosias Simlerus hanc Theophrasto & Græciæ ignotam testatur, propriam autem Alpibus Valesianis: folia verò contra quam Plin. asserat, qui *πρόκλυ* Theophrasti Laricem trāstulisse videatur, Autumno amittere scribit. Ego contra non Autumno, sed Vere folia decidua observavi.

Prodit etiam Solerius eandem Dioscoridi ad eoque ipsi Theoph. ignotam fuisse: additque errasse Diosc. Laricem resinam Piceæ existimantem: ac Plinium Laricem & Piceam quoque confudisse. Ipsi autem Solerio ut & aliis ad stipulatur Gesner. hort. Laricem, inquit, Scaliger Græciæ ignotam prodidit. Theoph. quidem ignota fuit, aut sub *πίνος* nomine comprehensa secundum Gazam, qui tamen alibi Piceam vertit, tanquam generale nomen ad utramque arborem. Lacuna, qui figuram Bellonii non admodum commodam exhibet, Ruellium merito reprehendit, quod ei folia non decidua tribuat.

Lob. & Penz Adv. Obs. & ic. Pl. *Larix*, cuius etiam figura in Icon. sub titulo Cedri Libani & Palestina præstat.

Audiuit Cæsalp. in Tridentinis montibus Pini Tom. I.

silvestris differentiam reperiri, cui soli folia Hieme decidant, eximia proceritatis: cortice valde crasso, rimosoque intus rubente: ramis è caudice gradatim procedentibus, adnatis multis, more Salicis, lentis, colore lateo, odore non iniucundo, foliis densis, oblongis, mollibus, comosis, Pinea angustioribus, & minimè aculeatis: conis cūpresinis admodum similibus cui & similis existat, cum novella sit odore nõ ingrato: cui v. flores ineunte Vere emergant in cacuminibus in purpura valde rubentes, odoratique: materies durissima, præsertim in medutillio rubescens, in hac solum Agaricu reperiri: resinam fundere liquidā, quæ pro Terebenthina vendatur: atque hanc Laricem vocari. Et ita Laricem describit Cæsalpinus arguens & ipse Plinium, quodd ipsi Larici tribuat, quæ Theophrastus Pino. Quæ verò paulò post Larici adscribit, ex Plinio (quamvis eius mentionem non faciat) desumit. Dari autem Marem & feminam ait: in Macedonia quidem masculam vri ad Picem: feminæ radices tantum. Verum hæc non Larici, sed ipsi Pino Theoph. adscripsit, nec quidem apud Plinium legimus.

Ex eo autem quodd Plin. omnia [quædam] Larici adscribat, quæ Theoph. *πρόκλυ* tribuit, factum esse arbitratu Clusius, ut perpetuam comam ipsi concesserit, contrarium quidem ipsa experientià nos docente. Is etiam à Theoph. non esse descriptam Laricem confirmat: ait enim Gazæ Laricem, nihil aliud quam *πίνος* esse (quam Pinum silv. esse aut Piceam aliquam silvestrem Bello-nij antea diximus) licet eodem *πίνος* vocabulo & Piceam & Laricem interdum interpretetur.

*Larix*, Græcè similiter *ἀδελφὴ* multis, ceu Fuchsis, Matth. Dod. Clus. & aliis; *Larex* quoque Lat. Offic. & vulgo *Larga*, Germ. *Ein Lerchbaum*, Belg. *Lorbenboom*, Gall. *Méleze* Dod. & *Arbre revirant a un Pin ou Sapin*. Ital. ac Hisp. *Larice* Dod. & *Alerce* vt apud Clus. nonnulli asserunt, qui nullam in Hispaniis nascentem vidisse meminit: item *Larege* Matth. Angl. *Larchtree* / Boh. *Drin* / Hung. ut Nomenclator Pannon. tradit *Voros fenyo* / Bibol / terebintina *Lezón*.

Digna Larix arbor, quam *longævam* dicas, *robustam*, *impenetrabile lignum*, *incorruptam*, *ter squamosam*, *cavem nescientem*, *pondos valide sustentem*, *Valesianam*, ac *montes amantem*.

Ambrunense territorium adeò frequentem nutrit Laricem, ut nullo sumptu comparari possit, & integrum plaustrum vix asse Gallico constet. Tanta etiam nūc in Rhæticis Alpibus eius est frequentia, quanta unquam antea fuerit, atque adeò iidem locis, unde Tyberius Cæsar Romam advehi iussit ad Nautachiarum pontem concrematum restituendum. Apud Sedunenses live Valesianos abundat. Si quispiam tum in Vallaricem [locum absque dubio à Valle & Larice vocatum] tum in Briançonam appulerit, multas quidem ille Larices videbit, sed totum diem antè forsitā peragravit, quàm ei contingat, ut vel vnam Agariferam offendat. In Viennensi saltu, tum aliis montibus, Alpibus vicinis, exceptis summis iugis, abundare Laricem scribit Clusius. Habemus quoque Laricem Montbelgardii in orto E. C. quam accepimus ex montibus Italiae vicinis, quæ unica ex duodecim evasit.

Coni Autumno maturescunt.

Minimū in eius temperamento, Fuchsis auctore, ignis & ætis, humoris autem terreni plurimū. Hinc cum non habeat spatia foraminum, quæ possit ignis penetrare, fit ut eius vim (quem)

Descriptio  
Cæsalp.  
Corres.  
Rami.

Folia.  
Conis.

Flores.

Agaricus.  
Resina.

Cæsalp. notat.

Larici se-  
xum.

Larix Ga-  
za.

Synony-  
ma lin-  
guarum.

Epiletha.

Locus.

Tempus.  
Tempera-  
mentum.

# HISTORIAE PLANTARVM;

**Vires.** admodum paulo ante diximus reiciat, nec patitur ab eo citò lædi.

**Pannus.** Adstrictoriam itaque facultatem, eius folia & cortices, vt Piceæ [ & *Pinus* Diof. ] obtinent. Laticis lignum magnifici aduersus elephantiasim scribit Stumpsius; Simlerus contra lepram. Reperitur in caudice vetustissime Laticis, medullæ vice, album quoddam corio perlimile, quod pro constringendis & agglutinandis vulneribus ac compescendo sanguine ( undecunque fluxerit Amat. ) multi usurpant. Iam verò, ut testis est Clusius, sunt ex ea vinetorum pedamenta & palli circa Neapolim, & supra Badenenses [ Aultrix ] thermas, totoque illo tractu, ut quæ corruptioni minus sit obnoxia: item longissimi canales, testis supponendi, & aptandi, ad purium & imbres ex us accidentes accipiendum: sunt enim et immodicissimi: nam cum firmæ & solidæ materie consent, diutissimè Solis ardoribus & aliis aëris iniuriis resistere possunt, nec finduntur aut vitium contrahunt, eaque de causa non Piceis, nec alterius inductione egent. Horum magna copia Viennam aduehitur quinquaginta pedum, aut maiore longitudine. Veniuntque exponuntur ad portam Carinthiacam, quæ proxima est theinus Badenibus. Structurarum pondera, firmissimè & diutissimè durat, idque Baptista Albertus adnotasse scribit, cum alibi, tum apud Venetias ex vetustis operibus. Vetus est opinio, à Plinio quoque literis prodita, eam non ardere, nec carbonem facere, neque alio modo ignis vi consumi quàm lapides. Sed solum fuisse hanc persuasione inde constat, quòd apud Valesianos quibuldam in locis non alia ligna in usum foci adhibentur, ac alicubi etiam in Alpibus ad ferrarias fodinas carbonem ex calcunt.

## AGARICVM.

**Descriptio.** Concretu sangulo Laticis adnascitur Agaricū, nunc maioribus, nunc minoribus massis conglobatum, leve, candoris nivei, insipiam digitorum attritu friabile, sapore primū dulci, tandem amaricante. Reprobū, & candore cedit, magisque nigrescat, & minus facile fiat: pondere etiam vincit. Vtrumque verò ob vestit callosus cortex. Icon una cum Larice arbore iam ante est exhibitā.

Si autem consuleris Veterum memoriam de Agarico videbis circa hoc Recentiorum à Veteribus discrepantes penitus opiniones.

**Agaricum.** Agaricum inquit Dioscorides, radix fertur Sylphium similis, quæ non ita densa superficie, velut Sylphium, sed tota rata est. Duo eius genera sunt, alterum mas, alterum fœmina. Præstat, hæc strias rectas intus præferens. At mas rotundus est, & undique compactus. Sapor utrique similis, ab initio dulcis, deinde ex distributione amarescens. Nascitur in Agania Sarmatica regione. Et quidam plantæ radicem esse dicunt: Quiddam tamen ab arborum exputatione, velut fungi, nasci tradunt. Nascitur etiam in Galatia Asia, & Chætiæ, sed friabile & insipuum.

**Agaricū.** Agaricū verò nigri nomen inquit idem de lath. cap. 16. his verbis: Vetrarum album, & Thapsia, & Elaterium, & Agaricum nigrum, suffocationem inducunt, aut nimiam.

Agaricum, inquit Plinius, ut fungus nascitur arboribus circa Bosporum: color albus, & contritum.

fior, amariorque. Hic & capitis dolores facit. Fœmina solutior, initio gustus dulcis, mox in amaritudinem transit. Ita Plinius. Vetus tamen Cordus pro Gallatia, habet Gallia. Et sanè in Gallia refertur, nasci hodie certum est, in Delphinatu maximè, imò etiam in Alpibus Germaniæ, ubi pessimo errore *Sannenschwam*, quasi fungus Pinorum, aut potius Abietum appellatur.

Officinis notissimum est Agaricum, & nomen retinet, quod ab Agaria regione ductum esse, verisimile est.

De Agarico ita scribit GALEN. de Antid. lib. 1. cap. 14. Agaricum fraudem nullam admittit, de quo illud modo dicere sufficiet, quod est ab Autoribus ante nos proditum. Optimum id Agaricum, cuius cile, quod leuissimum esset: densum verò, grave, & lignosum abiectum. Quod autem inter hæc medium est, quantum signis, tantum & virtute ab utraque distat. Idem libro de Simplic. med. ipsi attributo. Agaricum ab arboribus excrescit, prout tubera, vel Boleti. Et est fractu leve, & quasi vapum: est pallidum valde & asperu subrobrium: ut penitus subalbidum, non dissimile fustui: gustui initio videtur dulce, sed ex lentio evadit amarissimum. Quod autem est optimum, in Ponto maximè invenitur. Quod autem in aliis locis nascitur, multum est ineptius.

Paucis, at sufficientibus sanè verbis, ortum, genus, & delectum eius describit Mesues, lib. 2. de med. si. appl. purg. dicens: Agaricus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vultuque iam putrescentium, & crofarum, tanquam eam vel Apostema, vel fungus. Est autem hic duplex mas & fœmina. Mas est maior, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis & qui in fragmentis, seu villos nervorum ostendit. Fœmina, si rotundior, alba, porosa, & valde rara, & frangi facilis, levis, dulcis primo gustau, mox amara & styptica, est melior, præcipue summa sui corporis parte. Nam stipes, quod ligni putrefacti aliquid præferat, malus est, & crotus Agarici.

Cordus in Diof. Agaricus fungi genus, Germanis ( quoniam plerumque in Abiete nascitur ) *Sannenschwam* vocatur. Hæc ille inibi: Vbi minus prudenter ab imprudente & minus animi auctoris intell gente, aut assequente, sequentia sunt annotata: Potius *Lerdenschwam* à Larice vocandus: Non assecutus est, inquam, mentem auctoris. Licet enim Autor, ab Abiete, Etymologiam nominis, *Sannenschwam* derivet: non ideo negat *Lerdenschwam*, à Larice vocandum. Quod comprobant, quæ idem in Obol. n. va posteritati reliquit, inquit: Agaricus in Picea silvestri, Teda, Abiete & Larice: sed omnium optimus Languis, hic enim solus est in usu Medicis.

Hellfric. in onom. nimis generaliter Agaricum *Solzschwam* germ. vocat.

In epist. Lonic. qui Agaricum Dioscor. fungum Abietum. [ *Sannenschwam* ] vocare audeat. Ego sanè in Abiete Agaricum nunquam observavi.

Theod. Dorst. eandem ineptias tradit. Eius etiam icon nullam arborem rite exprimit.

Agaricum veteres habere medicamentum dicebant, non quia famulis propter copiam facilitatemque tribui soleat, ut vult Io. Bodin. sed quia benignè evacuat.

Consudit Io. Maria Agaricum cum Antirrhino, tribuens utrique eadem vires.

Fallopium verò antiquis ignotum fuisse scribit, quid esset Agaricum, quod eorum abii radicem,



fungum faciebant: Præterea dicit tempore Dioscoridis bonum Agaricū in Cedro ortum: sed per Cedrum intelligendam Laricem, quod Cedrina arbor ē monte Libano, quā utebantur antiqui ad contiginationem pro templo Dei, nihil aliud erat, quam Larix. Atque notat idem præceptorem suum Brassavolam, erroris quæ magni eum incusat, quod Agaricu optimum in Cedro Quercus specie onit dixerit.

Merito contrariatur Tragus Dioscoridi qui Agaricum, non radicem, sed inter omnes fungos præcipuum agnovit. Eius mentio inquit Tragus, & duo genera facit Plinius. In glandiferis arboribus noctu relucens, teste Hermod. Barbaro.

Monachi & Cronenburgius unanimiter declarant, se nescire veram Agarici originem.

Audacter nimium autopsiam negat Dioscoridi Angellara quando ait Diosc. non vidit Agaricum erefcere, scriptū, quæ in aliquo autore legitur, aut quod relatum illi fuit. Cordo iam supradictio cōtra cōmentatorem eius tantū si mavis annotatorem, jã dextris stare videtur, sicut & contra Bellonium Turnerus part. 2. dum inquit: Miratur Bellonius, addere quæquam affirmare, Agaricum nasci in aliis arboribus, quàm in Larice, sed admiratio eius rursus admiranda, cum probati inveniantur autores, qui prodiderunt in aliis resiniferis posse reperiri, quod magno vauitum in Italia, Gallia, Germania, tum etiam in Anglia. Sed Angli mei si in Norvegiâ propinquam navigarent, tum Agaricum, tum Laricem abunde possent magis tolerabili pretio importare. Distant prius Luicem cōgnoscere, Agaricum eò facilis agnoscent; Fungi instar in juglandibus, non in ramis, sed caudice; colligendum autumno siccitate & maturitatem adeptum. Quod Vere & Aestate colligitur, nisi sit anni præteriti, tum corpori humano insalubre est, neque sine colligens periculo decerpitur: est enim tum temporis aqua plenum, quæ ubi effluit, vapore noxio caput tentat. Atque ut aquam immaturamque Agaricum insalubre est, ita biennio antiquius nullius est pretii.

Cōsultum nostra sententia est omnia ea quæ Tagant. de Agarico literis consignavit, indefesso lectori proponere. Agarici, inquit Intectam Dioscorides atque ambiguum sententiam protulit. Plinio, cui magis hac in re adherendum, verè Fungus est. Melue mati attribuit, dicitque mali Agarici notam esse, si in contractis suis (ut eius verbis utar) habeat veluti fila nervorum. Illiusque sententiam nostri omnes seplarij, tanquam verissimam, approbant. Aetio tamen Agaricum præstantius est, quod pectines rectos habet. Paulus cōsultit, eligendum esse albissimum, quod facillimè frangatur, nec sit valde lignosum, aut perforatum. Nostri quoque Pharmacopœe unum bonitatis indicium esse affirmant in Agarico, quod est friabile: seu, quod aiunt, quando ficatur, pulverisat facillè. Dioscorides tamen infimum illud Agaricum esse dicit, quod friabile est. Non est radix Agaricū, tametsi Galenus illud radicem appellet, fungus autem potius dicendū est, qui ad radices multarum diversarum arborum nascitur, non quidem ita albus, aut politus, ut in Officinis cernitur, sed cortice potius quodam coopertus, quo veterinarij, mulo-Medici dicti, plerumque utuntur, ex eo Clysteres pro irritandis jumentorum facibus parantes. Optimus hodie ex Africa affer-

Tom. I.

tur, ex Allobrogibus verò non ita bonus asportatur, quo universa Gallia, ac Italia utuntur. Agaricus tandem femina, à Dioscoride descriptus, intus rectas pectinum modo venas, & divisiones habens procul dubio pessimus judicandus est; quæ de re in isto textu mēdam esse aliquando sum suspicatus, siquidē quæ masculo pessimo debetur, Dioscorides feminæ, Agarico optimo tribuit femina, inquit Sylvius, rectis venarū discursibus fracta cōstat, qui dentiū murinorum vestigia in casco duro representent. Eadem levior, rarior. Mas verò in fractis filosis, nervorum modo, gravis, densus. Hæc Sylv. de comp. med. lib. 1. qui in Pharmacopœa hæc addit. Agarici *strophilia*, superficies, seu facies summa, seu cum Melue pars superior, quamvis tota undique superficies intelligi possit, quæ tamen profutur in arbore vana est. Agarici, inquam, pars superior, uti à Melue rectissimè dicitur potior videtur, quæ magis aërea, & ob id levior, ac rarior: cum aëreum ob insitam levitatem futurum feratur, ut in eodem tetrenum & aqueum deorsum; siue autem ea pars superior sola, siue etiam tota eius superficies optima est, non est nobis purgantibus Agaricum excidenda & abicienda quorundam more. Nec ita superficiem intellige, ut sola velut cuticula sit utilis: sed illæ partes quæ subsunt, quod ipsi optime sunt propiores, eò meliores. Hæc Sylvius.

De usdem autem hæc sunt verba Monachorum. Plinius etiam scripsit Agaricum esse odoratum, potest esse, quod loquatur de recenti, quod aliquo modo putamus habere odorem, quoniam in sicco nullus sentitur odor. Caveant omnino aromatarij à nigro Agarico, siue masculino, siue feminino (quoniam ut Diosc. lib. 6. testatur) stragulationes facit. Præterea sunt nonnulli male declarantes quædam verba Autoris nostri in dicto cap. de Agarico. Hæc videlicet. Et melior pars totius corporis eius est superior pars Agarici, quæ nascitur in superiore parte ipsius arboris, & non prope radices. Quod quidē, non solum Author non dixit, sed nunquam excogitavit. Author enim pro superiori Agarici parte, intelligit illam, quæ protenditur, & elongatur ab ipsa arbore: quia illa, quæ tangit arborem, est tanquam radix ipsius Agarici. Et sicut radix intelligitur inferior pars cuiuscunque plantæ, ita & in Agarico, Mulco, & similibus eū dependentibus. Pars verò quæ arbori coniungitur semper inferior judicatur. Vnde & in sequentibus verbis, ipse Author declarat, cum dicit: Et stipites eius non est bonus, habens quasi semitas ligni putrefacti, stipitem enim vocavit inferiorem partem arbori adnascentem.

Hic autem placet subnectere Rhythmos Othonis Cremonensis de electione meliorum simplicium.

Res frangi præsto, pretiosus Agaricus, esto,  
Candidus & splendens, libramine leveque pendens.

Claudamus tandem cum Dodonæo Hist. Gall. qui *in arboribus* in Larice provenire ait, vocarique Agaricum. Officinis Agaricum. Addit & præterea ex Democrito quibuldam Medicis medicamentæ familiæ appellari solitum, quia in omni tempore & omni ætate tutè dari possit: Gallis *Agaric* dicitur: ac Italos, Hispanos aliâque nationes Græcam vocem imitari.

Sed quid hæremus. Natales visamus, quorum quidem aliqui ex jam dictis patent. Restat inter alios, quem Plinius lib. 16. tradidit: Calliarum gland-

Agaricus;  
femina  
Diosc.

Error in  
Diosc.

De Agarici  
Sylv.

Agarici  
partes.

Agaricum  
an odoratum?

ritandum  
nigram Agaricum.

Melue explicatur.

Superior  
pars.

Superior  
pars.

Delictus;

Nomina  
lingua-  
rum,  
Medicamē  
familiz.

Locus, &  
Tempus,

# HISTORIAE PLANTARVM.

*Plin. refi-  
citur.*

disera[conifera vel resinifera], ut alibi dicitur, legendum] maximè arbores Agaricum ferunt. Hermolaus scribit in regione Sarmatarum, quæ Agria silvestris dicitur, nasci. Quodam codice non Agriam, sed Agarîa habent: utrumque aut tueri possumus: primum quidè ex Plinio: alterum verò ex Ptolomæo qui Agarum & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradiditque etiam ex Appiano Alexandrino qui Agaros Scythicam gentem contra serpentium morsus adhiberi solitos refert, propter quod Mithridates eos apud se habuerit. Hæc Hermolaus. Tagault. tradente in Italia & Agro Ferrariensi nascitur, & in Gallia frequenter circa radices Quercuum, sed non adeo efficax: Verum autem Agaricum, & Antidotis efficax ex Sarmatia per Illyrium Venetias affertur: etiam ex Galatia, & Cilicia Alexandriam, & ab Alexandria Venetias. In Gallia etiam Agaricum nasci certum est, in Delphinatu maximè, imò etiam in Alpibus Germaniæ. Agaricum præstantissimum habetur in Tridentinis montibus, ubi sapissimè suis Matth. manibus divulsit adactâ securicula. In his & reliquis Italiæ locis, quod equidem vident sol tantum Larici nascitur. Iam pridem autem desit ex his locis (ex quibus Fuchsius dicit) importari, ut testantur mercatores & Pharmacopœi. Sed omne ferè Agaricum, quod Venetiis venditur, partim ex Tridentinis montibus, in quibus sunt silvæ Laricibus refertæ, partim ex agro Vultureno, & aliis finitimis locis, partim ex Norico tractu defertur. Monachi verò in Meseum produunt, in Italia, scilicet in Alpibus atque Apenninis montibus, non modicum colligi Agaricum. Anguillara tradit Agaricum nasci in multis arborum generibus: Omnium verò optimum in Larice, ut in Agro Friuli videri possit. Atque id quod in aliis nascitur arboribus, nihil valere in medico usu, sed quosdam eo ut ad excitandum ignem. In montibus tandem etiam Allobrogum quosdam in Quercu & Larice legisse audivit du Choul. Sed quod Agaricum illud verum non sit, apparet ex eo, quod neque vim purgendi habeat, nec sit amarum.

*Agaricum  
Quercus est  
amarum.*

Vires.

Dofe.

*Dysente-  
ria  
dyschritia.*

Tabes.

*Ructus ac-  
idus.*

Ischias.

Febres.

Dofe.

Venenum.

Sed quid commodi nobis à loco, ni & vires quoque nobis constarent. Vim igitur habet adstringendi & calefaciendi, efficacem ad tormina, & cruditates, rupturæque & casus, duorum obolorum pondere datum, non febrientibus ex vino multo: Febrientibus ex aqua multa. Datur & Hepaticis & anhelosis, & in morbo regio, & dysentericis, & neque hæmorrhæis, & in vitiato colore, drach. pondere. Tabidis autem cum passo: Splenicis cum aceto multo: Stomachicis ita ut est manditur ac devoratur, nullo in superliquoze absorpto. Similiter etiam acidum ructantibus. Siste & sanguinis reiectiones, trium obolorum pondere cum aqua sumptum. Facit quoque ad coxendicium & articularum dolores, & comitalem morbum, si pari pondere cum aceto multo sumatur. Ducit & menses, & seminis vtero inflatis par pondus utiliter datur. Solvit etiam rigorem, si ante accessionem febris detur. Purgat alvum drachmæ vnius, aut duarum pondere potum cum aqua multa. Est & Antidotum lethalius medicamento- rum, si cum vino diluto drach. pondere sumatur. Quin & ad reptilium plagas ac morsus, trium obolorum pondere cum vino potum auxiliatur. Et in summa ad omnes internas affectiones convenit, si ad vires & ætatem detur, aliis cum aqua, aliis cum vino, aliis cum aceto multo, aliis cum aqua multa. Hæc Diosc. lib. 3. cap. 1.

Audiamus nunc Galenum. Agarici radix, inquit, hoc est, quæ tunc in nascitur, primo quidem gustu dulcis, sed paulò post subamara apparet, & acrimoniae quandam speciem temporis spatio inducit, leviculæque adstrictionis, est & consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem quæ superius dicta sunt meminimus, quod medicamentum hoc compositum est, ex substantia aërea, & terrea à caliditate extenuata. Porro minimè habet essentia æque. Hæc ratione & digerendi vim habet, & crassitudinem incidendi, tum infarctus viscerum expurgandi: proinde regio morbo laborantes sanat, eoique qui ab infarctu iccoris laborant. Iuvat & morbo comitiali obnoxios eadem facultate: tum rigores per circuitum recurrentes, ex crasis aut vitiosis humoribus natos sanat. Iuvat & morbos à bestis frigore lædentibus, aut compunctos, tum foris in affecta parte impostum, tum intra in corpus sumptum pondere drachmæ vnius, cum vino diluto. Est & purgatorium. Vires habet Agaricum acriter laxantes, sic & ventrem purgat aliquatenus & chole- ram & phlegma deponit: Idè nec dolorem, nec vomitum facit. Purgat Phlegma & Chole- ram, sed mediocriter. Dabis drach. cum melicrato, vel oxymelite. Est autem caco-stomachum, & quia leve est, superiora petit. Sit autem albisimè, & friabile, & non valde lignosum, neque robustum. Purgat Cholera, purgat splenem. Per os datum provocat sudores. Decoctum Agarici, si quis biberit, qui habet dolorem antiquum capitis, sanabitur. Hæc ille variis in locis, in quibus & alia videre licet, utpote: De ochonem Agarici Cerebri & Hepatis aggritudinibus conducere: Electuarius etiam Agarici dictum, &c.

*Ischa.*

*Epilepsia.*

*Ad Senecæ  
inter, &  
extra.*

*Purgat.*

*Dofe.*

*Superiora  
petit.*

*Sudores.*

*Dolor anti-  
cipia.*

*Elect. Aga-  
rici.*

Degustemus & illa, quæ ab Ægineta lib. 7. cap. memoria relicta sunt. Agaricum, ait, radix, est appendix è trunco exorta, compage laxâ, ex aërea ac terrea substantia composita, vim habens diffusoriam & hictoriam crassorum humorum, & obturationes in visceribus maximè repurgat. Agaricum similem Colocynthidi vim habet, tardè quidem operans, non autem valde stomacho noxium. Datur tritum duarum drachmarum pondere, cum aqua multa. Sit autem albissimum, & maximè friabile, & non ita lignosum, neque coriosum. Agaricum Plinio teste, potum obolis tribus in vini veteris cyathis uno, Lienem medetur. Idem diebus 7. in aceto multo obolis duobus sumptum lienem consumere dicitur. Cum farina Fœnugræci, vesicæ malis, contræque calculos, gravissimis cruciatibus, auxilio est: Agarico quidem & nervus, qui Platys appellatur, & hunc nervum dolor fasatur, obolis tribus in cyathis uno potu: Renibus prodest: morbum regium oppugnat: Ischiadicos dolores, & spinæ levat: Menstruum difficultatem emendat. Phthiricis potum duobus obolis in passo conducit. Crapulum discutit, post cibos in aqua calida potum.

*Incidit.*

*Dofe.*

*Deleſt.*

*Lien.*

*Vesicæ.*

*Ischia.*

Menses hæc autem notat: Calidus est Agaricus ordine primo, sicus secundo, consistatque substantia duplici, aëria superficiali, dulci primo gustu percepta: & terrea styptica, sed tenui obvincentem in hac igneam substantiam, amariudinis effectricem, quibus incidit, tenuat, terget, obstrueta omnia liberat, flatus dissipat, purgat. Pituitam autem crassam, lentam, putrem, & bilem flavam, & atram purgat, à cerebris, nervis, mulcu-

*Temperamentum.*



musculis, sensoriis, spinâ dorsî, thorace pulmone, vetriculo, hepate, lienē, renibus, vtero, & iucturis. Ob hæc medicamentum familia Democrito est dictum, quod ad omnes omnium partium internarum affectiones, præcipue Cephalalgiam veterem, Epilepsiam, Vertiginem, Maniam, Melancholiam, & alios cerebri ac nervorum affectus, etiam cum tumore coniunctos: Asthma item & spirandi difficultatem, & thoracis aut pulmonis ulcera: ad affectus ventriculi, & vasorum aliorum: ad Icterus, Hydropem, lienis duritiem, & dolorem, ac tumorem, tum ipsius, tum hepatis, & renium, & reliquos morbos obstructioni succedentes. Venam quoque movet, ac menses, veterumque repurgat. Cutis colorem flavidum reddit, lumbicos necat, Icthiadi & cæterorum articulorum doloribus confert, & febribus diuturnis ex materia varia natis, cæque ad typum aliquem reducit, præsertim potius cum idoneis illi materiae aliis medicamentis. Viscera reddit imbecilla, ob id tergentibus miscetur, ne in ea virtus eius altius penetret. Tardè quoque & imbecilliter vacuat. Nisi cum tertia parte salis gemmæ, & Manna cogatur. Per se tamē eisdē saluber dicitur ob substantiam & dulcem, & stypticam, legitimā portionem mistam. Humain verò mulsâ & vires, & celeritatem addit. Haly autem ex Agarici parte una, Ligustici, vel Dauci, parte sexta, salis gemmæ parte quarta, cum Polypodii recentis mucagine trochiscos virtutis miræ facit, quando est eo opus. Iudeus oxymelite scillitico vires eius auget. Galenus pulverem eius vino (cui infusum est Zingiber) macerat & cogit in trochiscos efficaces multum. Corticem & triurum medicorem sustinet. Datur pulvis à drach. j. ad ij. In Decocto verò datur aij. ad v. servaturque annos quatuor. Hec Mesius.

Siquinquit Rondeletius. cap. 4. lib. 2. de ponderibus, pituita tenuis evacuanda sit, iusticiæ Agarici drach. j. nisi in partibus multum remotis posita sit. Ad pituitæ verò viscida & crassa purgationem, drachma una & semis, vel duæ sumendæ erunt, additis granis aliquot Zingiberis, vel salis gemmæ, vel castorei. Quin etiam stomacho solutus, ut cibitenax non sit, & acida ructantibus manditur, & sine humore devoratur. Nobis omnibus nauseabundus est, fortasse quia deterior nunc ex Alpihus Gilicis & nostro Delphinatu adfertur, quam quæ n. Monibus mittebat Agaria Sarmatiæ regio (à qua illi nomen) & Galatia, & Cilicia. Ponticus Andromacho iuniori probatur. Corrigitur vino, Zingibere, Caryophyllis, nucem moschatâ, vel aliis stomachicis. Servatur annis quinque integer, præcipue cum Dauco, Libysico, Polypodio. Non solum autem sumitur, sed etiam foris admoveatur, ut Gal. docet lib. simpl. Et sine lib. 10.

Habentibus, inquit Montanus de compos. med. viscera debilia, aut subiectis colico dolori, Agaricum exhibetur, ipsum infundimus, ut ab infusione vim purgandi habeamus, & substantiam tanquam periculosam reiciamus, ne imbecillis intestinis adhareat, & tormina excitet, ut frequenter facere solet, cum alioquin ob levitatem raritatemque suæ substantiæ facile adhareat, & ad evulsionem pertinax sit.

Plzrique, ait Cronemb. de comp. med. omnes Medici, atque Sepalsarij in Agarico infundendo peccant, dum per raturum pilosum, sive sectaceum pannum benè fortiter exprimunt, ita ut sæpè ipsius Agarici portuiculae aliquot vnâ transmittantur, quæ quàm vehementes torio-

nes & punctiones in intestinis concitent, multi intolerabili dolore experiuntur: neque tamen huius mali causam agnoscere Medici quidam possunt, ac multò minus corrigere.

Nos junioribus Medicis consulumus, ut non facile in potione & clystere præscribant Agaricum, quod Horstius fecit in dysenteria: confideratis quæ scribit Montanus.

Vruntur autem hac ætate Agarico infectores, qui mos olim ignotabatur.

Trochisci Agarici traduntur suprà in loco ex Mesue citato. Hic verò subnectenda, quæ Amatus circa eos ait. Quia, inquit, Agarico acrimonia parva est, idèd sapientissimi, cum ex illo pastillos parant, Zingiber, vel Cinnamomum, aut Cassiam, cum sale gemmæ & oxymelite illi adjungunt, ut acrimonia parva à naturâ illi data, prædictis acerbis medicamentis fortior evadat, & consequenter potentius crassa incidat & educat. Sed in iis pastillis, sive trochiscis admonendum, Pharmacopolas omnes illos paratos in suis habere pyxidibus, ut quum à Medicis descriptum sit, ex trochiscorum de Agarico, illud ad eas, nulla interpositâ morâ, confugiant, parumque; alioquin animadvertere Medicos, in iis trochiscis vires Agarici deperditas esse, quia siccitate acquisita subtiliores particule, quibus opus perfici solet, evanuerunt, manentibus crassis, & terrestribus: & ea de causa, Medici prudentiores, & qui rerum curam habent, nunquam Agaricum, nisi noviter in pasta paratum agrotis præbent, scientes trochiscatum illum vires suas omnino amisisse. Proinde caveant Medici deinceps, ne suis egrotantibus trochiscatum istum præbeant Agaricum, imò Pharmacopolas, ut ab ista abstineant compositione, moneant, prudentius multò facturos, si quoties Agarico vti opus fuerit, de novo, ut diximus, conficiant, & in pastam redigant. Sic enim melius operabuntur, imò si in pastam, eo modo quo Pilularum massa, redigatur, longiori tempore, quàm formâ trochiscorum servabitur, nec ita celeriter suas amittere vires. Nunc verò rem tetigisse sufficit.

Cæterum de Agarico Aug. Ferrerium audire ne pigeat studiosum. Convenit enim ea, quæ magni vel commodi, vel incommodi causa sunt, paulò subtilius tractare, ut ita veritas clarius eluceat, & agrotis melius tandem prospiciatur, Medici quæ autoritati consulunt.

Posthabitis Elaterii, Turpeti, Ricini, Euphorbij, acrimine aliorum præparationibus. Agarico ad pituitæ purgationem pastilla vruntur Medici, etsi Diosc. Gal. & Avicenna adstringens esse dicant. In Agarico adhibendis errant, qui per Zingiberis additionem vomitum prohiberi putant. Nam ad flatulentiam castigandam id quidem prodesse poterit: ad oris ventriculi adstrictionem planè nihil. Quod ex Practicis nonnulli avim. divercentes, Zingiber addi dicunt, ut tenuitate suâ Agaricum penetrare faciat, & incisione, ad pituitæ crassæ educationem juvet: neque in tenuiore pituita eo opus esse. Videant ergo quàm longè à scopo aberrent, qui Agaricum cum vino infusionis Zingiberis trochiscatum, ut nauseam vitent, eligunt. Sed ajunt se trochiscatum illud in oxymellite, vel melle rosato idèd infundere. Quod est, ac si dicerent, se errore errore tueri. Neque enim Oxymelite, neque melle rosato ventriculus à subversione liberatur: imò inter vomitoria Oxymel etiam numeratur. Respondent verò se hoc saltem efficere, ut Agarici substantia, in qua noxia vis manet non propinetur; sed tantum li-

Horstii opinio non placet.

Correctio Agarici in troch.

In trochiscis de Agarico vires perierunt, cui referendum.

Cassio.

Pituita.

Error multorum.

Vomitum accersit.

Flatus parat.

Zingiber

cui additur.

tur.

Agaricus cum vino infusionis Zingiberis.

Error.

*Infusio.* quor, in quo per infusionem purgatoria facultas habet. Sed si hoc molitur, cur purum Agaricum non assumunt, qui d cum Zingib. Galang. & Sale gemmeo infundant: sic enim majorem habebunt vim purgatoriam, quæ in trochiscato per macerationem diminuta, in infusione iterum novam alterationem, ac diminutionem patitur. Unde, nec immerito miratur eos Augustinus tam stupidos esse, ut trochiscati infusorem valentiorum esse putent in infusione simplicis & puri.

*Trochiscati* autem Agarici duæ habentur præcipue descriptiones, quas examinare decet. Prima est Mesuae, ex vino infusionis Zingiberis, in quo sæpe maceretur pulvis Agarici, ut infractam vim Zingiberis exsugant. Sed agnoscerent præparatores isti, si considerarent, se nihil aliud cum novâ infusione agere, quàm id quod jam infusum ac maceratum est, iterum macerare ac infundere, debilitatâ semper medicamenti naturâ, ut vix in vltima infusione purgatoriae facultatis quicquam relinquatur.

*Simplior modus.* Altera vero simplicior descriptionem officinæ habent, quam ad Mesuem referunt. Constat autem pulvere Agarici in vino infusionis Zingiberis simpliciter, & non sæpe temperato. & cum vino ipso in trochiscato redactio: quo pacto quis etiam negabit Agarici vim remitti, cum simplici lotionne medicamentâ omnia debilitatâ contingat, ut ex Galeno & Mesue constat.

*Ab Agarico* Trochiscatum sanè in infusionem adhibitum, nec apud Mesuem nec apud Avicennam, neque apud alios meriti alicuius autores legitur. Quintus Mænes ipse Agarico puro, nunc trito solum, nunc infuso, aut decocto, addito tantum aliquo infricante vltus fuit: ac ipsum multiplici infusione, ut infusione & decoctione *Annam* bis perdere tradidit: Et si eius meminit, id tantum exaltorum sententia fecit: cum se non multum probare illius usum satis ostenderit usurpatione nulla. Et certè debilitato admodum Agarico qui vultur, quem purgationis succellum sperare possit.

*Agarici substantia.* Agarici autem verus usus est hic. Substantiam eius tritam dato, castigatam tamen modo jam dicto, quo nausea & status mitigentur. At si mitius ipsum optaveris, trochiscatum exhibeto, & quod stomachum roboret, & modicè adstringat, addito: nam, ut dictum, neque Zingibere, neque vino vomitus arceri potest. Tritum tamen hoc dabis, nec dum infusum, aut decoctum, ne cum sciò his illis erres. Si, quod plerique facient, medicamentum substantiam suspectam habeas, & infusionem ut delicatorem, sic salubriorem existimes, infunde purum Agaricum in Oxymelte simplici, vel Scyllitico, vel in Vino, aliòve convenienti liquore, cum Zingibere, Mentha, cæterisque infricantibus. Si cui (ut sit) lascivire placeat, trochiscato uti licebit iterum macerato, ac infuso, aut decocto: sed incidendi magis, quàm purgandi gratiâ, nisi delictis & mollibus naturis appareatur.

*Trochiscatum crassum.* Vix enim levis inde sequitur pituitosi humoris expurgatio, nisi qui assumpserit, valde lubrica alvo sit. Quod præ habet, qui solum nec cæteris permixtum dedit. Duplex est enim probandum medicamentorum modus. Vnus, cum solum,

*Infusio.* nec aliis cathartici admixtum datur, ut propria eius facultas exploretur. Alter, cum permixtum exhibetur, ut qui d cum cæteris efficiat, intelligatur. Sed quid opus est præscribere in decocto Agarici trochiscatum panis ligati drach. ij. iij. iv. cum Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

*Infusio.* Agarici puri substantia convenire videatur? Commonendi autem sunt Tyrones,

Agaricum officinarum, veteri Agarico molestius, atque in purgando imbecillius esse: quâ de causâ maiori copîa dari debet: Substantiæ enim drachmæ duæ vix satisfaciunt: ac in infusione drachmæ tres nihil ferè agunt, si solum ac citra aliorum catharticonum additionem apponatur. Quod cum experimentis didicerint, iudicabunt etiam trochiscati maiorem dosim parandam.

## LARICIS RESINA.

**R**ESINAM fundit Larix liquidam, nuncquam durecentem, liquidi mellis consistentiâ, colore flavam, nonnunquam etiam vitream, & transparentem, gustu plusquam amarescentem, mediocriter acrem, tenuem & odoratam, quæ hodie non tantum pro Terebinthina in vltimâ recepta est, verum etiam solo Terebinthina cognomento cognita, quamvis à quibusdam Italis etiam *Purgatum* & *Lachrymum*, id est, Lachryma appelletur. E' Gallia [in Cornario Græco *γαλατίας* malè, ut puto, & bene in Latin. versione Gallia] & Alpibus Germaniæ provenit, copiosissima autem circa Salzburgram colligitur. Ad hæc in Silesiâ, Moraviâque montibus, in finibus Bohemiæ, Laricea hæc [Larica] incolis vernaculâ voce vocatur. Vsurpat hanc Cornarius in Polyarchion medicamento, ex Galeno de Acopis tractante, qui Laricem Terebinthina paulo calidiorem esse dicit. Et non dubium est Laricis Resinam hodie etiam ad veram Terebinthinam admixtam reperiri. Nec desunt, qui in totum Laricis Resinam esse volunt, quam pro Terebinthina Officinæ habent: Præferim cum id confirmare videatur Matthiolus, qui ex Larice præstantissimâ manare Resinam testatur, quæ falsò Officinis Terebinthina vocatur. Fædus de compos. med. scribit, Pharmacopœos hinc legitimâ Terebinthinâ vice substituere, sed hæc in re fallitur. Tridentini verò, ac etiam qui his contentissimi sunt, vernaculo sermone *Larga* appellant, de flexâ à Larice, appellatione.

Longo terebro Laricis caudicem ad medullam usque per Acetatem perforant, & inde manantem Resinam vasculis quibusdam à Piceo cortice paratis excipiunt, quam splendidiorem juvenculæ, turbidiorem verò annosæ mittunt arbores.

Laricis resina, græcè *ῥηνὴν λαρικῆς*, ἢ *λαρίξ*. Lat. *Resina laricea*, & *Larigna* Offic. Terebinthina non sine errore. Germ. *Termenthin* aut *Terbenthin*. Veltkirchenfes Rhetorum, nonnullique alii *Glorie* vocant. Angl. verò *Temoth*, *Turpentine*.

Narravit Turnero Nobilis Rhetor Antonius Traversus, apud quem querendis in Alpibus platus defessus diverterat, lignatores eius provinciam, salubritatis *Laricæ* coscicos ubi in eius magnam copiam inciderunt. liberaliter bibere, adeoque ebrios reddi, ac vino generoso multo bibito.

Multi *Larignam* hodie ad calculum & morbos renum utiliter usurpant. Eadem teste Porta regio morbo occurrit, si cerea sit. Felix Plateus ad febres continuas Laricem [Resinam] prius cum vitello ovi dissolutam, in clisteribus præscribit, quæ præ cæteris stimulat. Per *Laricem* autem existimamus intelligi *Resinam*, quod vocabulum incuriâ Typographi fortè omisum. At idem: ex Terebinthina veteres pilulas exhibuerunt, loco Pilul. Rufi: cuius loco si illa desit, nos Resinam Laricem a quæ utilem, cum egregiè purget, substitui.

Descri-

ptio.

Color.

Gustus.

Larignum.

Lachry-

mum.

Resina Lar-

icea.

Terebin-

thina.

Fusch. eri-

ror.

Colliged-

modus.

Nomina

linguarum.

Vires &amp; vir-

sus.

Ebricitas ad

porum.

Calculum.

Icterus.

Dissolventia

varia.



mus syl-  
lus.

C A P. XIV.

ocus,

PLIN. loquens de arboribus Syriæ, ait: Iunipero similem habent Phœnices & Cedrum minorem. Duo eius genera, Lycia & Phœnicia. Differunt folio. Nam quæ durum, acutum spinulosum habet, Oxycedros vocatur, ramosa & nodis infesta. Altera odore præstat. Fructum ferunt Myrti magnitudine, dulcem sapore. Et maior Cedri duo genera: Quæ floret, fructum non fest. Frugi-

Cedri mi-  
nores dua  
Plinio.  
Oxycedrus  
Cedri ma-  
iores dua.

*Cedrelate.*

*Cedrus Ar-*  
*bor.*  
*Phrygia*  
*Armenia.*

*Terra non*  
*decidunt.*  
*capit-*  
*um.*  
*non*  
*decidunt.*  
*ad*  
*cedra vera.*  
*Cedrus*  
*magna.*  
*Cedrelate*  
*Virex.*

*Cedrus*  
*magna.*  
*Cedrus.*  
*Fructu lu-*  
*niperi*  
*Cedrus.*  
*Cedrus ge-*  
*nera Dio-*  
*scoridi.*

*Galenus.*

*Plinius.*

*Cedrus in*  
*sacris si-*  
*gnificatio.*

*Iustus Si*  
*Cedrus*  
*multipli-*  
*cabitur.*  
*Lignum be-*  
*neolens*  
*Lignum im-*  
*putribile.*  
*Cedrus se*  
*confirre.*

*Cedrus ex-*  
*altata.*

*Sapientia*  
*Salomonis.*

fera non floret, & in ea antecedentem fructum occupat novus. Semen eius Cupressillo simile. Quidam Cedrelaten vocant. Ex hac Resina laudatissima. Materie verò ipsi æternitas. Itaque & simulacra Deorum ex ea facta fuerunt. Cedrinus est Romæ in delubro Apollo Sossianus, Seleucia advectus. Cedro similis in Arcadia est arbor: in Phrygia frutex vocatur. Montes amat Cedrus, ut & cæteræ arbores, è quibus Resina gignitur. Aëstuosis hanc paribus natura dederat, at in Lyciis, Phrygiisque montibus nascitur. Huius folia non decidunt, quæ capillata sunt & pungentia. Laudatissima quidem Cedrus, in Creta, Africa, & Syria, cuius oleo perantæ materies, nec tineam, nec cariem sentiunt. Primus sudor aquæ modo fluit canali: hoc in Syria Cedrium vocatur, cui tanta vis est, ut in Aegypto corpora hominum defunctorum eo perfusa servantur. Cedrus magna, quam Cedrelaten vocant, dat Picem, quæ Cedria vocatur, dentium doloribus utilisimam: Frangit enim eos & extirpat: ac dolores sedat. Cedri succus magni ad lumina usus, huiusque scobe serpentes fugati, certum est. Cedrides, hoc est, fructus Cedri. Vide plura de viribus.

Cedrum arborem, ex qua Cedria appellata colligitur, magnam etiam esse statuit Diosc. lib. 1. Fructum verò producere veluti Juniperum, magnitudine Myrti bacca, rotundum: Ac Cedrides vocari Cedri arboris fructus.

Cæsalpino videtur Dioscorides duo Cedri genera ponere: magnam scilicet & parvam, quod quamvis verba eius non exprimant in vulgatis codicibus: in quodam tamen vetusto in hunc modum reperitur. Cedrus arbor magna est, ex qua Picem colligunt quæ Cedria vocatur: fructum fert ut Cupressus: sed ut plurimum non maiorem. Fertur tamen & altera Cedrus, parva, aculeata, quæ Juniperi modo baccas parit Myrti magnitudine, ac rotundas. Eidemque Cæsalpino in eandem sententiam ire videtur Galenus, cum ait, Cedrus specie duplex est, altera fruticosa Juniperi affinis, altera arbor non exigua: nec non & Plinius, quem ex supra citatis eius verbis, non solum maioris & minoris Cedri meminisse, sed etiam maioris Cedri duo genera tradidisse non abs te concludit. Ac præterea per Oxycedrum Juniperum montanum, per alteram verò odore præstantem nostram Sabinam vulgarem eum intellexisse existimat.

Cedrus, Aræz Hebraicè, arbor montis Libani excelssissima duplicem habet in Sacris interpretationem: si enim intelligentiam habet ad bonum, iustus designat. Et hinc Pfalter, iustus ut Palma florebit, sicut Cedrus multiplicabitur. Cedrus lignum benè olens, lignum unde templi testæ contestæ sunt, lignum imputribile. Eccl. Quasi Cedrus exaltata sum in Libano, & quasi plantatio Rosæ in Iericho. Hierem. Nunquid regnabis, quoniam confers te Cedro, patri tuo Iosiaz, videlicet regi iusto. Si verò intelligentiam habet ad malum, peccatores ac superbos ostendit. Vidit David impium super exaltatum, & elevatum sicut Cedros Libani. Vox Domini confingentis Cedros & confingit Dominus Cedros. Cedrus exaltata hic, est homo elatus, quem vox Domini in virtute, vox Domini in magnificentia, vox Domini iuste iudicans confinget & comminet. Deponet potentes [Cedros sublimes] & exaltabit humiles. Venerunt ab universis regibus de cunctis populis ad audiendam sapientiam Salomonis, qui dispu-

tavit super lignis à Cedro, quæ est in Libano, usque ad Hylosopum quæ egreditur de pariete: & discessit de iumentis, & volucribus, & reptilibus, & piscibus. Præcedebat enim sapientia eius sapientiam omnium Orientalium & Aegyptiorum, & erat sapientior cunctis.

Comprehendamus ergo cum D. August. Lignum Cedrinum, spem in Deo firmiter habitantem, quæ altitudine cælum petat: non simus lignum elatum, nullum ferens fructum, à Deo deponendum, sed humile & exaltandum.

Sed redeamus, vnde digressi sumus. Plinius descriptione (inquit Hermolaus) Cedrum maiorem non Juniperum demonstravit. De Cedro Authores variant. Plinius notas Cedri confundit. Cedris nomine frutex in Phrygia pusillus, frondis æternæ, arboris æternæ nunquam, à Theodoro vocatus. Cedrus hanc & Cedriam à Theophrasto dici puto, quatenus arbor est, non quatenus frutex: tunc enim Cedris est, non Cedria: Cedria Theophrasto differt à Cedro, arborque folio pungente, mucronibus perinde, ut Cedrus.

Hippocrates Cedrin Creticam, & Hederam Creticam fœminarum incommodis auxiliari scribit, in vino lacteo, id est tepido: sic enim ænogala interperantur nonnulli. Cedrealis Diana, ab Orchemeniis idè quæ vocata fuit, ut Paus. author est, quoddam eius simulacrum in ingenti esset Cedro erectum. Cedrus, inquit Pet. Berchorius est lignum magnæ soliditatis & diu durans. Cedrus secundum quosdam propter suam altitudinem & pulchritudinem omnium arborum est regina. Fructum dulcem fert & suavem, quitruplicis est saporis. Nam interior, mediū scilicet circa grana, est acetosum, exterius verò, scilicet cortex est dulcis: Carò autem, seu medulla est inter dulce & acetosum mediocriter. Quædam verò est species Cedri secundum Plinium, quæ servat omni tempore fructum: quia omni tempore invenitur fructibus plena, vnde semper alij sunt in flore, alij sunt acidi, alij sunt maturi, & istam multi Assyrii vocant. Aliqui volunt dicere, quoddam Juniperus idem est quod Cedrus, quantum ista infima & lata sit arbor, illa autem altissima reputetur, &c. Sed tum ex illis ita dictis, tum ex his quæ subiungit dilucidè apparet, Berchorium confundere Cedrum Libani cum Citro, siue Malo Assyrii, & cum Junipero.

Cornarius de Cedro hæc habet. Ignota est arbor Germaniæ, nec nisi in transmarinis nascitur, Syria maximè, & Lycia. Vnde eius multa mentio fit in Sacris literis & maximè Psalmis. Cedrides appellantur fructus Cedri, Myrti baccarum magnitudine, ut etiam Theophrastus & Plinius testantur, sapore illi sunt dulces: Vnde in quibusdam Officiis etiam hodie conditi habentur, Fructus à Syria Venetias allati, & inde aliò transvecti. E Syria etiam Cedria advehitur, quam alij Picem Cedri, alij Resinam, alij Lachrymam esse volunt. Fructum Cedri sæpe fit mentio apud Hipp. in mul. morb. Idem Hipp. in lib. de nat. mul. Cedrum Creticam in vino coctam in vteri exulceratione infundere jubet. Et paulò post Cedri ramenta suffire præcipit. Et lib. 2. m. m. Vinum Cedrinum bibendum præscribit, quum vteri velut ad viscera conversi strangularint. Verum ex his etiam liquido constat, Cornario non notam fuisse Cedrum Sacrarum paginarum: ac eum præterea eam à minoribus Cedris non distinguere: quia non fert baccas, nec eius sunt fructus, quos ait cõditos adferri: & quia quæ Hipp. scribit de Cedro, videntur pertinere ad minores Cedros.

Hanc



Hanc etiam non ite cognovisse Cordum, A-  
matum, Apollinem, Ruellum, & Gorrhaum,  
ut nec ipsum Dodonum, facile animadvertent,  
qui eorum scripta considerabunt. Indistincte  
etiam Porta de Cedro sic scribit: Aiunt Cedrum  
fructum ferre lignosis thecis inductum & sapore  
adstringentem.

Hanc Geln. de Hortis Germ. recte Cedrum,  
& arborem coniferam vocitat.

Examinandum quoque proponimus, an Go-  
ropius per Chithram vel Chytram Arabum Ce-  
dum Libani intelligat, vel Thuiam? Hac æ-  
tate, inquit ille, magna Cedri ligni, quod su-  
avissimo odore spirat, copia ex Helpeuo promon-  
torio, aliisque locis, partim citra, partim ul-  
tra Oceanum sitis, Antuerpiam adferunt. Nec  
verò Cedrina modò, sed aliarum quoque arbo-  
rum odoratissimi rami materia.

Sed hoc adhuc nonendum. Quod Lonicerus  
sub titulo Cedrebaumi, *Cedrus*, figuram  
Oxycedri ex Matthiolo habeat, nec distinguat,  
Cedrum arborem ab Oxycedro. Cedrique com-  
num exhibeat pro alia planta, ut postea dicitur.

Ni Cedri resarentur Aliquod vocationes, propo-  
siti nostro, quod nos equidem existimamus,  
recentissas circa veterum sententias, suscepi-  
mus: At quia orem superfluum, tempestivum est, ut  
eas nunc tradamus. Cedri itaque nomine quoni-  
am comprehendi diversas plantas comperimus,

de prima & celeberrima Libani montis, sive sa-  
crarum literarum primum dicimus Cedro. Est  
autem arbor *jura*, quæ existimatur Cedrus A-  
latica & Thyia. Quidam verò volunt, *Junipe-*  
*rum* esse Cedrum. Contendunt alii Cedri no-  
men obtinere Juniperi genus, quod vocant Ce-  
dum Phœniceum, sive Oxycedrum. Bellonius

scribit, quod Theriaca Cedri ramos admittat,  
quod de minoris Cedri ramis est intellige dum.  
Cedrus Atlantica dicitur à nonnullis d. Sibio,  
de qua postea suo trademus capite. Gu lan huius  
incurrit an Abbel Orientis sic Cedrus & Thyia.

Nunc Cedro resina Elemi, est Cedri lachryma,  
de qua nos scripsimus lib. 5. post ille arborem,  
cuius lachrymam esse quidam volunt. Apud Pl-  
nium lib. 16. c. 15. Acer operum elegantiæ & sub-  
tilitate Cedro est secundum. Hist. Lugd. tenet  
cum Hermolao legendum Citro. Fuerunt quo-  
que, qui isti narunt Cedri Mali arborem esse Ce-  
dum Libani, ut demonstratur lib. 1. cap. 25. Dio-

scoridi sanè & Athenæo Citrus pomifera dicitur  
lib. 7. c. 1. Petrus Martin Nabæ, sive Paluro A-  
thenæi creditur nomen Cedri Libani tribuit ut vi-  
dere est, lib. 6. Cedrum Lyciam quorundam fo-  
lio resuso, (de qua Celsus lib. 3. cap. 58.) Sabinam  
vulg. in maritimis, Theophrastus Juniperum vo-  
cat, licet ab aliis Cedrum vocari testetur. Santa-  
lani nam tamen in Olibonis quædam usum pari  
pro Cedro, dictum est lib. 4. de Santalo, quem  
errorem carpit Bellonius.

Restat ut de fructu, usu & facultate dicamus.  
Cedrus (Dioscor. verba sunt) porro vocatur  
Cedri arboris, fructus. Vim habent calefaci-  
endi stomacho incommodat: Auxiliantur tamen  
tussi, convulsis, ruptis, urinæ stercidiosis, &  
menfes ducent cum pipere trito posito. Ad le-  
poris etiam marini potum cum vino sumun-  
tur. Fugant item bestias venenatas si corpus ex  
ipsis cum adipe, aut medulla cervina oblinatur.

Admiserunt quoque in Antidotis.  
Cedrus ex Galieno: *med. lib. 7. specie du-*  
*plex est: altera fruticosa Juniperis adfinitis al-*  
*tera arbor non exigua, vtræque est calidæ, sic-*  
*etæque temperaturæ terti quodammodo ordinis*

secundum utrumque. Porro Cedrides (nam  
ita fructum Cedri nuncupant) moderatiores vi-  
res obtinent, quam Cedria, adeo ut comedi  
quoque possint. Attamen si liberalius utare,  
capiti dolorem inferunt, ardoremque ac mor-  
sum in ventre percipies. Confirma-  
Plinius dicens: Cedrides, hoc est, fructus Ce-  
dri, tussim sapant, urinam cient, alvum sistunt,  
vtilisque sunt ruptis, convulsis, spasticis, stran-  
guriæ, ut & vulvis admoti, & contra lepores ma-  
rinos, atque etiam collectionibus, ac magnis in-  
flammationibus.

Cedrinum, Juniperinum, Cupressinum, Lau-  
rinum, Pineum & Abiegnum vinû fundi ratione  
côcinnari docet nos Dioscorides. Arborû, sedum  
fructus edunt casum recens materiem oportet  
assulosè dividere, & Soli aut balneo ignive admo-  
vere, ut exudent, congioq; vini minâ vnam permi-  
scere, atque ita duorum mensium spacio finire:  
tum demum transfundere, Soli exponere, tan-  
demque recondere. Porro factorum huiusmo-  
di vinorum vasa impleri debent: namque illa  
non expletis vasis accendant. Nihilominus medi-  
cata vina rectè valëtibus haud quaquam idonea.

Ceterùm isthac omnia excalefaciunt, urinam  
cient & leviter adstringunt. Laurinum tamen  
vehementius exalefacit. Fit quoque vinum de  
Cedri maiori fructu, in unum multo congiu ad-  
dito bacca u n contularum minâ se nulle, S. d  
diebus quadraginta in solari, ac iis exactis, de-  
fecatum in vasa transferri debet. Fit & à baccis  
Juniperi vinum, similiter ut de Cedri fructu ad  
eandem valens.

## CEDRIA VETERVM.

Consequentia partium maximè alleci de Ce-  
dria veterum tractare constituimus. Notabis  
igitur hic Cedriâ Cedri lachrymâ esse: quod com-  
probat Plinius his verbis: Cedrus magna, quam  
Cedrelaten vocat, dat picē, quæ Cedria vocatur.

Cassius Hemina vetustissimus Annalium Autor,  
quarto eorum libro ut tradit Plinius lib. 15. cap.  
13. prodidit Cneum Terentium Scribam agrum  
suum in Ianiculo repaltinatem offendisse arcam  
in qua Numa, qui Romæ regnavit, situs fuisset,  
atque in eadem libros eius repertos P. Corri elio  
L. F. Ceteo, M. Belio Q. F. Pamphilo Coss. ad  
quos à regno Numæ colliguntur anni D. XXXV:  
& hos fuisse è charta maiore etiamnum miraculo,  
quod tot in fossi durauerant annis. Mirabantur  
alii, inquit Hemina, quo modo illi libri durare  
potuissent: ille tamen rationem reddebat, dicens  
se arbitrarier tineas non attigisse, easque non  
computruisse, propterea quod illi Cedriati fuis-  
sent. In illis autem libris scripta erant Philoso-  
phiæ Pythagoricæ: qui quod Philosophiæ scripta  
essent, à Q. Petilio Prætoris combusti fuerat.

Sic etiam scribit Vitruvius ex Cedro Oleum nas-  
ci, quo Libri aliæque res peruntæ, à tinea & carie  
non laduntur. Ad quod pertinere videtur illud  
Petrj Satyra prima. — Er Cedro digna loquuntur.

Item illud Ovidij:  
Nec titulus minio, nec Cedro charta notetur.  
Fit (testis est Plinius). Oleum ex malis Cedri,  
quod Cedrelæon vocant.

Cedria, quod placet Dioscoridi, optima est cras-  
sa, perlucida, gravis odoris, quæ dum effunditur  
guttatim, non dissipata coit.

De Cedria hoc scriptum reliquit Hermol. co-  
roll. 111. Cedria modò pux Cedri, modò Cedri  
resina vocatur, è Cedro magna, quæ Cedrelate  
dicitur: nihilque aliud est, si propriè loquendum  
sit, quam cruda Cedri lachryma. Cedrum verò

Cedrides.

Capas de  
dum.

Vrinam

Vinum ut  
Conscien-  
dum  
E ligno.

Cantio.

Bene Ga-  
lanti  
bus  
noxia.  
Vnes & u-  
fus  
E fructu.Libri Ce-  
drati.Cedria de-  
lectus ex  
Diosc.Cedria Ga-  
roll. 111. si  
nisi-  
cationis.

Cedrinum.

succus Cedri est, & teda eius concisa qui prius aqua modò fluxent in canali: nam sequens liquor pix jam, non Cedrium est. Sed confundunt Autores, nunc pro resina: nunc pro sudore tedarum: nunc pro pice: nunc etiam pro Oleo Cedrino Cedriam & Cedrium tradentes: quod minimè tamen est nocentia, siquidem omnibus his, quanquàm diversis, eadem tamen natura inest. Columella Cedrium liquorem vocavit.

Galenus & Paulus, non Cedriam, sed Cedream vocabant.

Cedria (docente Bellonio de arborib. conf. lib. 1.) ex quavis resinscedarum materia, modò pinguis sit, promiscuè fieri potest. Sed non quemadmodum quavis Picea Cedriam facit, neque quavis Cedrus pinguis est. Ex Larice porò, modò materia pinguis sit, Cedriam facimus. Ex Cupresso quoque, atque etiam Betula Cedriam fieri posse asseveratur. Omnium deterrima, quæ ex Iunipero sit: eam vulgus Oleum de Cade vocat. Vulgus nostrum Rothomagensis, Lutetia & Lugdani, apud quos copiosissima est aliunde advecta, Kattranum vocat. Cedriam ex teda fieri Plin. libro sexto cap. 11. his verbis testatur: Pix liquida, inquit, in Europa à Teda coquitur. Hoc in Syria Cedriū vocatur. Avicennas suā linguā Serbin vocat, sed Serapio Kitrā. Turcarum vulgus hodie, ut Gallorū quoque, Kattranum.

Et alibi: Cedriam & Cedri oleum pro eodem cum Galeno 7. simp. habet: nihilque aliud esse scribit, quam recentiorum mumiam quā condita olim fuerint corpora. Galeno verò Cedriam vocari modò resinam, modò lachrymam, modò picem, modò suo nomine Cedriam. Nam illam, inquit, quæ ex Cedro arbore munitur, Resinam appellat, seu crudam lachrymam, ad discrimen eius, quæ coquitur. Quæ autem, inquit idem, à Cedro proficiscuntur, aut spontè effluunt, ut resina, aut lachryma: aut arte parantur, ut Cedria.

Sed hæc vi ignis elicitur, quæ reverà à Turcis melius multò, quàm à Cretensibus perficitur. Sunt qui ex Cedria picem faciant. Vulgus Galliarum habet aliquid, quod Cedria, aut pici liquida prorsus respondeat: Duobus autem nominibus id appellare solet. Vno modo *huile de Cade*: alio verò, *du Tac*. Ex variis materiis fieri consuevit, velut Iunipero, Fraxino, Sabina, Cedro, & eiusmodi lignis adhuc viventibus. Indigenæ Avignonenses, Provinciales, & Linguosictones, eo maxime oleo utuntur, quod ex Phœnicea, & Lycia Cedro fit, & duobus nominibus *de Cade* & *Sabin* vocant. Id autem quo nostri hic in Gallia Celtica utuntur, quod Tacum vocant, verius è lignis Iuniperorum perfici videtur, idque à morbo ovium, cui mædri solet, nomen habet. Idem etiam de medicato funere. lib. 1. cap. 1. habet. Cedria, medicamentum quod ex Teda munitur, mortuorum vitam quidam appellaverunt. Manat, inquit Matthiolus in Dioscoridem, ab arbore maioris Cedri etiam resina, quæ propriè Cedria dicitur, vilis ad multos in Medicina usus: Sed hanc ad nos non adferunt Cyprii, neque mercatores, qui ex Syria mercimonia convellant, tamen illas regiones illa plurimis (ut aiunt) Cedris maioribus fecant. Petrus Bellonius lib. 1. de medicato funere, Item lib. de conf. arb. putat non modò Cedrum Cedriam fundere, sed & Picem, Tadam, Laricem, Cupressum, Iuniperum & Betulam. Quinetiam suis malè excogitatis Cedris eas omnes facultates assignavit, quas Diosc. Galen. & alii quàm plurimi auctores Cedriæ duntaxat reddiderunt: adeò ut magno &

ridendo errore dixerit suas hæc Cedrias definienda corpora conservare, quemadmodum ea conservat legitima Cedria, quasi idem quoque velit, quod Picea, Pinus, Larix, Cupressus, Iuniperus, & Betula nullis prorsus facultatibus inter se differant. Fuchsius lib. de comp. med. quem postremo locupletatum excudit, in compol. Mithridatis, pro Cedria, quando ea non potest inventiri, lachrymam Abietis substituendam præcipit, ratus utique eandem virtutem facultatem inesse. At ego quidem Galenum secutus, malim Ladanum substitui, donec ab aliis aptiora proferantur, quorum meliori iudicio subscribendum sit. Neque ineptè fortasse Iuniperinum gummi illius vicem supplere poterit: quandoquidem constat omnibus rei herbariæ studiosis tantam inter Cedrum & Iuniperum esse similitudinem, ut altera ab altera vix discerni possit, nisi ea esset differentia, quæ in bacis utriusque manifesta deprehenditur. Cedri liquor, ut Græcis *κεδρεα*, ita etiam Latinis Cedria dicitur, Arab. Kitrā, sive Alkitran, Ital. Cedria. Ex quibus ita dictis manifestum est Matthiolum nescire, ex qua arbore profluat Cedria, videtur autem existimare ex minore fieri, cum ait: Cedri differentiam à Iunipero ex bacis deprehendi. Deinde si Cedria est ex minore Cedro hæc fit, quid attinet eam quærere in Syria, cum ea sit propius & valde frequens.

Cedria substituta hæc observavimus. In Fuchsi Antballomeno pro Cedria, fructus Cedri substituitur, ubi demonstrandum erat, cuius Cedri fructus sumendus: puto intelligi debere Oxycedri: an verò bene substituitur, considerandum. Cedrio dicto, inquit Galenus, in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidiorum, rustici eius penuria pressi, Pistiselo, id est, pice & oleo mistis, liquidā formā utuntur. Cedri gummi meminit Fuchsi in anti-Mithrid. & pro eo lachrymam Abietis substituendam præcipit, ratus utique eandem virtutem facultatem inesse: at ego (dicit Matthiolus) quidem Galenum secutus, malim Ladanum substituire. Tract. quid pro quo: Pro Cedria, & Pice liquida, Ladanum. Fuchsi inter sua Antball. Ladanum quoque pro Cedria substituit. Cedri lachryma vide Gummi Elemis, Gesnerus in Cordum. Cedri lachryma loco, ut licet liquor germanicè Dögel dicto, qui ex Betula elicitur, Gesner in Cordum. Ex Bellonio autem antea vidimus ex Betula Cedriam fieri posse, sicut ex quavis resinifera materia, modò pinguis sit: Verum quæ pinguedo est in Betula? non negamus tamen eius succum in quibusdam supplere posse Cedriam. Videant itaque Lectores sententiam Matthioli antè positam de Cedria Bellonij. Cedriam facimus ex cupresso, inquit Bellonius. Cedria deterrima ex Iunipero, autore Bellonio, quam vulgus Oleum de Cade vocat. Non habetur, inquit Lacuna, Cedria legitima, cum qua maximam similitudinem habet, Oleum Iuniperi dictum in Castilia Miera. Ex lignis Iuniperi montanij vulgus lignis superpositi liquor extrahitur, qui Oleum de Iunipero vocatur apud Mesuem. Si hoc pro Cedria vteremur, puto non minorem in eo efficaciam futurā, quàm si ex magna Cedro haberemus. Matthiolus, ut antè dictum, non ineptè fortassis Iuniperinū Gummi Cedriam supplere poterit.

Vim habet Cedria (inquit Diosc.) quæ viventia quidem corrumpit, mortua verò corpora conservat. Vnde etiam mortui vitam quidam ipsam appellaverunt. Sed & veses, & pelles corrumpit, intensa suā caliditate ac siccitate. Commoda autem est ad

pix.

Error quorundam.

Cedrea

Gal. 17

Lutetia

Cedria ex

quavis ar-

bore resi-

nifera.

Oleum de

Cade.

Kattranum

Serbin.

Kitrā.

Turcarum

Mumia re-

centiorum

Cedria Ga-

leno:

Pix.

Oil Cade.

Tac.

Tacum.

Vita mor-

tuoarum.

Bellon re-

preh.

Fuchsi. vi-

preh.

Abietis

chryma pr-

Cedria.

Ladanum

Iuniperi

nisi Gum-

mi.

Cedri

Iuniperi

differen-

tia.

Matth.

sat.

Cedria

substituenda

ex aqua

carbone

Cedri

fructu

Oxycedri

Pistiselo

id est

pice &amp;

oleo mistis

liquidā

formā

utuntur

Cedri

gummi

meminit

Fuchsi

in anti-

Mithrid.

&amp; pro eo

lachrymam

Abietis

substituendam

præcipit

ratus

utique

eandem

virtutem

facultatem

in esse

at ego

(dicit

Matthiolus)

quidem

Galenum

secutus,

malim

Ladanum

substituere

Tract. quid

pro quo:

Pro Cedria,

&amp; Pice

liquida,

Ladanum

Fuchsi

inter sua

Antball.

Ladanum

quoque

pro Cedria

substituit

Cedri

lachryma

vide

Gummi

Elemis,

Gesnerus

in Cordum

Cedri

lachryma

loco,

ut

licet

liquor

germanicè

Dögel

dicto,

qui

ex

Betula

elicitur,

Gesner

in Cordum

Ex

Bellonio

autem

antè

vidimus

ex

Betula

Cedriam

fieri

posse,

sicut

ex

quavis

resinifera

materia,

modò

pinguis

sit:

Verum

quæ

pinguedo

est

in

Betula?

non

negamus

tamen

eius

succum

in

quibusdam

supplere

posse

Cedriam

Videant

itaque

Lectores

sententiam

Matthioli

antè

positam

de

Cedria

Bellonij

Cedriam

facimus

ex

cupresso,

inquit

Bellonius

Cedria

deterrima

ex

Iunipero,

autore

Bellonio,

quam

vulgus

Oleum

de

Cade

vocat

Non

habetur,

inquit

Lacuna,

Cedria

legitima,

cum

qua

maximam

similitudinem

habet,

Oleum

Iuniperi

dictum

in

Castilia

Miera

Ex

lignis

Iuniperi

montanij

vulgus

lignis

superpositi

liquor

extrahitur,

qui

Oleum

de

Iunipero

voca-

tur

apud

Mesuem

Si

hoc

pro

Cedria

vteremur,

puto

non

minorem

in

eo

efficaciam

futurā,

quàm

si

ex

magna

Cedro

haberemus

Matthiolus,

ut

antè

dictum,

non

ineptè

fortassis

Iuniperinū

Gum-

mi

Cedriam

supplere

poterit

Vim

habet

Cedria

(inquit

Diosc.)

quæ

viventia

quidem

corrumpit,

mortua

verò

corpora

conser-

vat

Vnde

etiam

mortui

vitam

quidam

ipsam

appel-

laverunt

Sed

&amp;

veses,

&amp;

pelles

corrumpit,

intensa

suā

caliditate

ac

siccitate

Commoda

autē

est

ad



est ad ocularia medicamenta, vt quæ illita visum acuat, & albugines ac cicatrices delect. Cum aceto verò infusilla, vermes in auribus necat, & cum Hyllopi degocto infusa, sonitus ac sibila sedat. Et in cava dentium indita, dentem frangit, & dolorem sedat. Idem facit etiam si cum aceto colluatur. In anginis etiam illinitur, & tonsillarum inflammationibus opitulatur. Pediculos item & lendes oblita perdit. Cerastræ verò serpentis morsibus cum sale imposita auxiliatur. Et adversus marini leporis potum, cum passo sumpta auxilio est. Prodest & Elephantias laborantibus, si delingatur, aut oblinatur. Purgat quoque ulcera in pulmone, eaque sanant, si cyathi mēsurā sorbeat. Ea autem optima est, quæ crassa est ac pellucida, gravis odoris, & quæ guttatiim emanans permanet & non diffunditur. Vermes & Acanthidas perdit, per clysterem infusa. Fit & Oleum ex ipsa quod separatur à cedria, si ita, velut de Pice dictum est, in coctura pura lana supertendatur. Hoc ad eadem facit, ad quæ etiam ipsa cedria. Privatum verò quadrupedum, & canum ac boum scabiem curat. Ricinos etiam in ipsis perdit, & ulcerationes, quæ ex tonsura ipsorum oboriuntur, ad cicatricem perducit. Fuligo verò ex ipsa colligenda est, velut ex pice, quæ eandem cum illa vim habet. Plinio annotante cedrus magna, quam cedrelaten vocant, dat picem, quæ cedria vocatur, dentium doloribus utilissimam, frangit enim eos, & extrahit, ac dolores sedat. Cedri lucus ex ea quomodo fieret, diximus, magni ad lumina vltus, ni capitis dolorem inferret. Defuncta corpora incorrupta avis servat, vivencia corrumpit; mira differentia! cum vitam auferat spirantibus, defunctis pro vita est. Vestes quoque corrumpit, & animalia necat.

Ob hoc non censem in anginis hoc remedio utendum, neque in cruditatibus, quod suasse aliqui: Dentes quoque colluere ex aceto in dolore timerim, vel gravitatis, aut vermibus aurium instillare. Phthiriasis perungere eo non dubitavi, itemque porrigines. Suadent & contra venenum Leporis marini bibere in passo. Facilius in Elephantias illinitur. Et ulcera sordida & excrecentia in iis auttores quidam & oculorum albugines, caliginæque innuxere eo. Et contra pulmonis ulcera cyathum eius sorbete iusserunt. Item ad vesitus tinea [fortè Tania CH.] Fit ex eo & oleum, quod miscelæon vocant, vehementioris ad omnia eadem usus. Cedri scobe serpentes fugati certum est: Item baccis tritis cum oleo, si qui perungantur. Cedrides, hoc est, fructus Cedri tussim sanant.

Hæc nos capite de Iuniperis posuimus, cunctis quibus nobis videtur plinius confudisse Cedrum magnam, ea enim non habet baccas. Ac etiam miramur plinium non reprehendere usum succi Cedri ad ulcera pulmonum, uti fecit in anginis, & cruditatibus: nam Galenus Cedriam ulcera irritare, & phlegmonem excitare, immò quod plus est, septicam esse tradit. Simili. Mollem itaque carnem promptè citraque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quæ cum eisdem sint in calefaciendo ordinis, adiunctam etiam habent substantiæ tenuitatem. At in duris plusculo eget tempore, & vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta, septica vocantur, & septa: sed inter se se maioris, minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo & infimissimo ordine Cedria: pleræque enim eorum admodum sunt effi-

ciacia. Talia mortuorum corporum carnes corrumpunt: at Cedria exsiccat, simulque à corruptione tuetur corpora demortua, usque humiditates eorum superfluas depascens: cæterum solida corpora haud attingens: At in viventibus calor ipse, qui in corporibus est, Cedriæ vires adaugens, causa efficitur, ut teneræ ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si cum tanta polleat potentia, lendes, pediculos, & tineas, & in auribus natos vermes interficere valeat, ac seotum mortuum eiciat. Alia multa eiusmodi particulatim efficit: Itaque argumentum est ipsam valenter excalefacere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur. Siquidem dolores eorum mitigat, sed & ipsos confingit. Extenuat quoque oculorum cicatrices: & vitus heretudini ab humorum crassitudine orta medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad unguem oleosum, quod suspensis supra eum, dum coquitur, Lanis excipitur, ac colligitur, tota Cedria tenuis quidem est: sed minus acre; quamquam non minus excalefaciens. Eandem quippe rationem habet ad id, quod reliquum est Cedriæ, crassius illud videlicet, quam Oleum ad amurcam. Proinde illud, utpote crassius, est mordacius, & maiore aperiendi facultate præditum. Itaque & ulcera irritat, phlegmonemque alis excitat. Porro oleola illa Cedria adeo clementibus est visibus, ut etiam plebei, experientiâ docente, vulnera ovibus occasione tendendi à forficte facta, illa illita sanant, atque etiam eâ & ad ovium scabiem & ad ricinos utantur.

Vinum autem Cedriter, ut nobis Author est Dioscorides, ita paratur. Cedria quæ dulci lavatur, & singula dolia cyatho uno proluntur, & sic multo replentur. Calefacit hoc vinum & attenuat, tussi veteri conveniens citra febrem. Thoracis item doloribus, & laterum torminibus, ulceribus in alvo & intestinis, pectore suppuratis, hydropicis, hystericiis, feminis uteri strangulati vexatis. Facit & ad lumbricos, & ad rigores. Auxiliatur commotis à bestiis venenatis, & animalia reptilia ac serpentes necat. Aurium quoque dolores instillatum sanat. Cedrites verò vinum Hippocratis, de quo antè, idem esse cum Cedrite hoc Dioscoridis scribit Cornarius, quod consideratione non vacat: quid si Hippintelligit vinum paratū ex baccis, vel ramentis Cedri Creticæ?

## CEDRVS MAGNA SIVE LIBANI CONIFERA. CAP. XV.



Cedri Libani ab annis multis servamus conos, ramos, lignum. Coni quatuor pollicibus altiores; octonos in ambitu circa basin colligunt, paulatim in obtusum turbinem fastigiat, squamis compactis fœcundam circiter latis, undeciam altis, modiciter crassis, rufis, per extrema exstata planis, alia aliis finitica subeunte, vt

te, vt quot sunt earū circumcirca agmina, totidem  
 zonis præcincti videatur: inferior aut vniuscuiusq;  
 ex his squammis pars Lambdoïdes mucrone suo  
 hæstæ adnascitur, iusto elato medio percurrente,  
*Nucula.* in valles laterales declivi, totidem consimili-  
 bus ex aduerso valliculis responderibus, quæ  
 totidē recipiunt nuculas, pomaceis, aut pyraceis  
 granis duplo, triplove maiores, formā nō ab simili,  
*Resina.* rutilante quadam resinā, durā, sed fragili, vehe-  
 menter odoratā, evidenter acri, fixas, quarum  
 unicuique vncialis triquetra tenuisque membra-  
 na affigitur, papilionis alam egregiē referens,  
 ita quidem, vt duæ membranæ, uni squammæ  
 maiori, averso incubitu, respondeant. Ceterū  
 pediculus coni validus existit, vncialis &  
 sextantis longitudinis, crassitudine ferē extre-  
 mi articuli digiti minimi, obliquus, aut in-  
 curvus, cortice rugoso, & squamulis exiguis  
 (vt in Pino & Pinastro) subindeloricatus. Ramus,  
*Ramus.* quem habeo i pollice crassior, cortice  
 crasso, rugoso, foris fusco, intus rufso vestitur,  
 materie dura, alba, in ramulos satis crebros di-  
 uisus. Lignum verd in assamenta iam conform-  
 matum, colore est vndique rufso, (qualem in  
 Pyri ligno subinde conspicimus) pectinibus re-  
 ctis fissile, solidum satis, media tamen inter fi-  
 bras spatia inania, vt lignum quernum, ostē-  
 dens, nullam cariam, nullam teredinem sen-  
 tiens. Hæc domo meā petita, vbi tres conos  
 unico ramo hærentes habuimus à Valerando  
 Dourez. Ceterū qui cominus in natali sito  
 loco terræ hærentem arborem obseruauit, eam  
 ita nobis depinxit vt Rauuolffius, Arbor est  
*Descriptio* Cedrus Libani perpetuū virens, robustis ramis  
*Rauuolffius* brachiata, & orgyias aliquot crassa, ad sum-  
*semper vi-* mam Abietum vltimarum proceritatem assu-  
*rens.* gens, quāto autem maiores accreverint rami,  
 quorum pondere gravatus caudex se inclinat,  
 tantum de arboris rectitudine decedit: Rami (vt  
 & copi magni, rotundi) sursum spectant, longi,  
 tam pulchro ordine dispositi, ac si artificis ma-  
 nus relectos æquatolque apposuisse: sic vt  
 eminus etiam circinatus æqualiter dispositorum  
 orbis egregiē appareat: ex quo etiam, ante-  
 quam cominus contempleris, facili inter hanc,  
 aliasque resiniferas arbores discrimen notes li-  
 cet: ceteroqui magna huic cum Larice simili-  
 tudo, potissimum in foliis, quæ parua, angusta,  
*Folia.* conferta, in exerto sulcello fusco, clavis Musci  
 terrestris longitudine & crassitie simili: quæ, vt  
 ait Bellonius, ab vno surculo exorla quadragin-  
 ta, vel quinquaginta simul, serie quadam in or-  
 dinem disposita, furculum radiantia, pectoris pe-  
 nicillum referte videntur, odorata, subacida, &  
 cum leui amaritudine adstringentia. Sola cedre-  
 late inter arbores, demptā Abiete, conos in cel-  
 lum tendentes mittit, qui quidem Abiegnis si-  
 miles, crassiores, duriores, ac multo maiores,  
*Coni.* quinum, vel senum digitorum turbinati, com-  
 pactili squammarum compressarū congetie coa-  
 gmentati, atque obtusi, ex cinereo fulvi, conis  
 Pini alioqui graciliores, tam firmiter ramo adhæ-  
 rentes, vt à parente diuelli non possint, nisi  
 avulsā arboris parte: Coni potè hiantes se pand-  
 unt, ac paulatim diffusi roribus & pluuiis de-  
 cidunt, relicto in ramo pediculo firmo & tereti.  
*Semen.* Semen habet Abieti simile, non vinaceo ma-  
 ius, dulcis saporis, vt Piceæ, ad cuius latus oleo-  
 sum quidpiam, includitur odoratissimum. Pe-  
 diculus squanunam non prius exiit, quàm co-  
 nus duos annos excesserit, quem integrum an-  
*Pediculus.* num fert, antequam maturescat, quod Hicme  
*Tempus.*

potissimum fieri solet. Duas profert resinas, *Resina duci*  
 quemadmodum & Abies, alteram in tuberculis  
 albam, nihil prorsus amarulentam, nec gravis  
 odoris: alteram sua sponte exudantem, quæ cum  
 retorrida sit, naribus adnota, fæta redolet, o-  
 doratæque gustatu percipitur, sed ita pertinaci-  
 ter dentibus inhæret, vt non nisi cum difficul-  
 tate auferatur. In monte Libani tantum 24. sup-  
 putavi. Ex hac Libani montis Cedro Salomon  
 templum Hierosolymitanum extruendum fecit.

De hac etiam Bætzlōn. Obser. In cacumine  
 montis Libani ostenduntur cedri altissimi, si-  
 miles iis, quibus Salomon exadificandum tem-  
 plum cutavit diuturnitatis ergo. Hæc sola ar-  
 bor cum Abiete sursum habet sursum vergen-  
 tem. Fert magnos conos, duros, Pini conis simi-  
 les, ni essent læviores. Item lib. 1. In monte Li-  
 bani Cedri viginti & octo plus minus. Cedros,  
 quas in Amano & Tauro vidimus, eandem cum  
 prædictis similitudine habere conperimus: Hoc  
 affirmare possum, Cedrum magnam nulquam in  
 Creta nasci. Audiui tamen à quibusdam fide di-  
 gnis hominibus, Cedrum magnam supra Niceam  
 in montibus nasci. Et hæc est Cedrus alta, & ce-  
 delate, etiam à Theophrasto tradita: A Diosc.  
 etiam cap. de Agaritem cap. de Cedro. Nec non  
 in sacris literis pro Cedro Libani & Salomonis:  
 Vt & à Plinio lib. 16. cap. 39. à quo confunditur  
 sæpenumero cum Oxycedris, siue Cedris mino-  
 ribus: de maiori autem loquitur Plinius, quum  
 ait Cedriam proferre, & eum collocat inter La-  
 riceas.

MELCHIOR Luffy, Eques, Præfectus, siue  
 Lands-Zimmerman in Unterwalden in sua peregrina-  
 tione Hierosolymitana cap. 13. narrat se spatio  
 tredecim horarum ascendisse montem Libanum,  
 & pervenisse ad locum Cedris confitum, quos  
 peroptabat videre: se autem reperisse Cedros,  
 Mirumque esse tantas arbores & tam pulchras i-  
 bi provenire supra rupes. Istud autem mirabi-  
 lius esse nullum posse numerare eas, licet paucae  
 sint, sequæ eas supputasse, quæ integræ & viren-  
 tes erant, ac comperisse 13. alios 24. alios 25. Tra-  
 ditque præterea hanc arborem celebrari in sacris  
 literis: Ac huic comparari Divam Virginem Mari-  
 am: cūm dicitur, Exaltata sum quasi Cedrus in  
 Libano. Arbores esse magnas & altas, sex aut  
 septem homines vix amplecti posse truncos: eas  
 ferre conos similes conis Piceæ [den forthen]  
 sed maiores, semper virentes esse arbores. Quam-  
 vis infideles cupiant perdere, manere integras.  
 Salomonem excellentiam huius arboris cognov-  
 isse, idè non sine causa ex loco prædicto (sci-  
 licet Libano) desumpsisse huius arboris ligna ad  
 templi Hierosolymitani adificium. Se vidisse ibi  
 veteres arbores à longo tempore deiectas, incor-  
 ruptas, quæ similes erant truncis Fraxini, Eschen,  
 aut Aceris, Aborn. Ac tandem datos fuisse sin-  
 gulis ramos cum duobus conis, dictūque fuisse  
 alio etiam in loco huius montis provenire hanc  
 Cedrum arborem, sed iam dictā minorem.

Anguill. Cedrum Hebræorum & Sacrarum Li-  
 terarum: quidam existimant Laricem esse mascu-  
 lam Plinio, verum non video, quomodo id dici  
 possit: Si autem ita res se habeat: aliam dicere  
 non possum, quàm Cedrum, cuius meminit  
 Theophrastus, dicens in Syria nasci. Existi-  
 mo Dioscoridem, cūm dixit Cedri fructum esse  
 similem Myrto, voluisse dicere potius Piceæ. Hac  
 ratione iuxta nostram opinionem Cedrus Dio-  
 scoridis, erit eadem cum Cedro sacrarum pagi-  
 narum.



Cedrelate  
plum.  
Cedrelate  
ande  
ur?

Cedri du-  
lex genus.

Matth. not.

amer. re-  
eb.

Matth. er-  
adus.  
Cedrus  
magna.

cedros.

in pota-

Cedrus  
vima.

is est.

Dodonæo, Cedrus magna, Cedrus maior co-  
nifera. Græcis *κεδρων*: Latinis similiter Cedrum:  
Plin. lib. 24. cap. 5. Cedrelatem nominat, quasi Ced-  
ri Abietem, aut Cedrinam Abietem, cum ad dif-  
ferentiam minoris Cedri, tum quod Abietem val-  
de referat.

Apud Matth. in Diof. hæc habentur Cedri ar-  
boris Theophrasto, Plinio, & Galeno duplex est  
genus, nempe maius & minus.

Et in Epit. Cedrus, duum generum est, maior  
& minor. Maioris duo genera, quemadmodum  
& minoris. Proceßa arbor est, Abieti perquam  
similis. Quæ in minoris genere est floret, & fru-  
ctum non fert. Altera verò contrà, nunquam  
floret, sed conos tamen profert, Cupressi longi  
maiores. Resinam fundit laudatissimam.

Idem Matthiolus reliquit suam reprehensi-  
onem Diofcoridis in post. com. Ital. quod miror:  
li enim lectio rectè restituta, à Matthiolo quæ oc-  
casio reprehensionis: Iconem exhibet in qua co-  
nspiciuntur bene respondentes nostris conis, quo-  
rum mentionem ante fecimus: an verò folia sint  
disposita prout pingit, non sine occasione dubi-  
tamus, quandoquidem alter longe disposita pin-  
guntur apud Rauvolfium, qui arborem viren-  
tem vidit: ille etiam nobis videtur suo nomine &  
nimium securè scribere duo genera esse, & cate-  
ra, quæ in Epitome tradit, de hac arbore, ab eo  
non visa, nec observata: Camerarius in Epitome  
modò dicta, & in hist. Germ. eius Iconem muta-  
vit, quæ partim desumpta videtur ex Rauvolfio,  
contra tamen eius historiam: folia non sunt  
Abietis modo disposita, sed multa simul ex uno  
veluti nodo, prout demonstrat nostra Icon, quæ  
nobis absentibus est facta ad Iconem Camerarij:  
sed minus concinne.

Matthiolus Cedrum magnam falsò bacciferam  
cum Diofcoride statuit, cum conum eam gerere  
Guiland. in epistola ad Rosarium comproba-  
rit. Ante omnia, inquit, conveniens est docere  
Cedrum magnam à Cedro simpliciter dictâ, quæ  
proprie Oxycedros vocatur, & Iuniperò differ-  
re. Hanc siquidem & Iuniperum eandem esse ar-  
borem non recentiores solum, sed etiam veteres  
quidam opinati sunt. Nónne quæ de Iunipero  
Theoph. refert, Plinius Cedro magnæ tribuit?  
Mirum minùs videri debet Gazam Cedrum apud  
Arist. Iuniperum convertisse. Illud fortasse le-  
viùs cuiquam videri possit, Plinium Cedrum ma-  
gnam cum Iunipero confudisse. Quis nisi vela-  
nus non animadvertit Cedrum hanc eandem esse  
arborem cum illa, quam Theoph. fructum Myrti  
baccis æqualem ferre scriptum reliquit? Cedrus,  
inquit Theoph. nodosa est, halosâ, & tortuosa, Iu-  
niperò non abfimilis, verùm brevior. Sed quid  
quæso, egregij magnificæ ex arbore Iunipero  
humiliore, nodosâ adhæc, halosâ, & materie tor-  
tuosâ constante strui poterit? trabesne, quibus  
magna ædium moles incumbit? an malus, quo  
nihil solidius, nihil firmitus in navi esse concedet:  
an denique templorum valvæ, columnæ, tecta,  
deorum simulachra? profecto nihil horum, ut  
Guiland. fert opinio. Quare alterius fuisse gene-  
ris Cedrum istam nobilem fatendum est. Narrat  
porrò Plinius Cedrum maximam in Cypro ad un-  
decimem Demetrii succifam 130. pedum, cras-  
situdinis verò ad trium hominum complexum.  
Comprobat in primis Theoph. Cedros in mon-  
tibus Syriæ cum longitudine, tum crassitudine  
præstantissimas exire, quippe quæ aded crasse-  
cant; ut sint quas ulnæ hominum quatuor ne-  
queant amplecti. Cæterum Cedrum hanc Lari-

cem esse, vel inde perspicuum fieri credit Guil-  
land. quod in hodiernum usque diem Larix co-  
piofissimè in Libano nascatur, & altitudine ex-  
cellat. Quod autem cum maximè movet, ut Ce-  
dum Laricem credat, illud est, quia Diofcor. Aga-  
ricum *κεδρων* nasci perhibet. At Agaricum  
in nullius alterius arboris trunco præterquam u-  
nius Laricis gigni, notius, quàm ut pluribus de-  
monstrare sit necesse, dicit. Proinde cortigen-  
dum Plinium ubi legit: Galliarum glandiferæ ma-  
ximè arbores Agaricum ferunt. Scribendum au-  
tem, Galliarum coniferæ, aut resiniferæ maximè  
arbores, Agaricum ferunt. Nam glandiferæ nul-  
lo modo genuinum Agaricum producere pos-  
sunt, quicquid dicat Brasavolus. Huc accedit  
quòd Plinius toto opere semel *κεδρων* Laricem  
convertit, ut subolevisse Plinium sibi firmiter  
persuadeat, Cedrum quam Cedrelatem vocat, re-  
ctè Latinis, Laricem nuncupari, nec transversum  
quidem digitum arbores hæc à se discedere.  
Habet quid somniet Guil. de Cedro magnâ, quàm  
falsò Laricem pronunciat. Larici folia decidunt,  
Cedrus magna perpetuò viret. Rami Laricis de-  
orsum propendent, Cedri magnæ sursù spectant.

Paulus verò Hess. Defens. II. pro Guill. incre-  
pans Matthiolum, quod neget se scripsisse Ce-  
drum magnam bacciferam ait, Nónne cum Diofco-  
rides Cedrum magnâ bacciferâ facit, ipse pro Cedro  
plantam bacciferam, per subiectam oculis Ico-  
nem proponit? Sed dicit Cedrum minorem, non  
maiorem eam esse, quam ille baccis onustam de-  
pingit. Quasi verò Cedrus Phœnicea minoris  
Cedrigenus sit, quam maiori Cedro esse adscri-  
bendam liquidò, Diofcoridis testimonio, contrà  
quàm censet Plinius, comprobatur. Etenim Dio-  
fcorides Cedrum magnam baccas Myrti magni-  
tudine ferre ait, quam notam Plinius falsò mi-  
nori Cedro reddidit, cùmque maioris Cedri eodem  
loco duo fastigia proponit, non maiorem Ce-  
dum, sed minorem, imò ne Cedrum quidem,  
sed Iuniperum attingit, cui sanè Iunipero notas  
illas omnes, à Plinio Cedro maiori ibi redditas,  
Theoph. assignat, qui etiam Iuniperum eodem  
lib. Cedrum vocari ait, unde Plinii errorem pro-  
fluxisse dubium non est. Sed utriusque authoris  
verba antè recitavimus, ex quibus palam est,  
confudisse Plinium duarum plantarum, Cedri sc. &  
Iuniperi, notas, idque nullo alio argumento,  
quàm quòd Iuniperum à Græcis Cedrum quo-  
que dici apud Theophrastum legisset, & quæ pro-  
prie Cedrus erat *κεδρων*, id est, Iuniperum etiam  
ab iisdem vocari in Theriæ Nicandri invenisset.  
Versiculus eius hic est: Nec te remedium lateat  
Poli herbæ, aut Cedri Arceuthis: quæ vox in  
communi significationis æstimatione, Iuniperi  
bacca nunc est, & nihilominus ille, cùm Cedrum  
dixisset, à Iuniperi appellatione baccam intulit,  
quam *κεδρων* dicturus erat. Quò fit, ut pro com-  
perto habendum sit, Cedrum, Iuniperumque  
mutuà invicem appellatione quondam dici & si-  
gnificari solitas: quod eiusdem Nicandri anti-  
quus interpret testatus est, dicens: *κεδρων* vocari  
fructum Cedri, quoniam & arbor ipsa *κεδρων*  
dicatur: quæ voce posteriores in Iunipero tantum  
uti sunt. Proinde mirum minùs videri debet, &  
Theodorum illum Gazam *κεδρων* apud Arist. ani-  
mal. 7. cap. 3. & Theoph. lib. 3. de caus. pl. cap. 23.  
Iuniperum convertisse. Cæterum ut Plinius Ce-  
dum in magnam & parvam divideret, quod ne-  
minem ex Latinis Plinio antiquioribus, cuius  
monumenta ad nostram ætatem pervenerunt, se-  
cisse constat, in causâ fuit, vel quia Diofcor. Iunipe-

Agaricu;

Plin. carri-  
gine.

Brassavo-  
lus laxatur

Guiland.  
notatur.

Matth. tai-  
xatur.  
Cedrus  
magna non  
est baccife-  
ra.

Cedrus  
Phœnicea  
magna.

Plin. repreh.

Iuniperus.

Cedrus ar-  
ceuthis.

Cedrus Iu-  
niperus  
quondam  
appellata.

*Galenus error.*

rum in magnam & parvam discrevit, vel quia alius quispiam Plinio vetustior, Cedrum, quæ Juniperus erat, eadem differentiâ maioris & minoris separavit. Nam quæ Cedrum propriè dictam in magnam & parvam ante Galenum diremerit, ignoramus, est eundem Galenum in Hippocrate, seu Cedro magna iisdem erroribus, in quos Dioscorides prolapsus est, implicitum esse videamus, & Juniperos Dioscoridis, nihil à Cedris Theophrasti differre putamus. Hactenus ille.

Inter Cardanum & Bellonium non parva controversia est, sitne illa arbor, quam in Libano vidit Bellon. pro Cedro, vera Cedrus, an potius Abietis quædam species? Argumenta negantia veram Cedrum possunt esse huiusmodi. Primum. Isti est Cedrus, quam Theoph. lib. 3. cap. 12. ex sententia Veterum proponit: ut & quam Dioscorides, quæ scilicet arbor est magna, ex qua Cedria colligitur fructu Juniperi. At hæc differentiæ quæ apud Theoph. significanter ad differentiam Juniperi & Oxycedrum & Cedrum simpliciter dictam arguit, Arbori quam Bell. in Libano vidit non conveniunt. Ergo. Arg. 2. Cedrus Costidis bacis seu non conis, authoribus 3 Theophrast. Diosc. & Galeno. 3. Specie sunt, imò genere differentes arbores baciferæ & coniferæ, non itaque in unum genus proximum aut speciem cogendæ. 4. Ad Abietes & Larices pertinet arbor Libani, non ergo ad Cedri genus. 5. Cedrinum oleum ex bacis fit, non ex conis arboris Libani. 6. Quæ arbor in lectione sacra apud Latinos & Græcos Cedrus Libani dicitur, ea Hebraicè vocatur Oretz. At hæc vox Pinum, vel Abietem, vel Laricem, vel Ornum magis designat, quam Cedrum Theophrasti. Immo Ravvolff. Cedri Libani iudex oculatus, indicat Larici similem esse, ut fit species quædam Laricis & non Cedri. Controversiæ igitur iudicium est, inquit Libavius, arboram Libani Cedrum Larignam, vel Laricis speciem esse, & Cedri nomen aliunde accepisse, cum à Cedris propriè dictis toto genere distet. Atque ut Cedrus Juniperina appellabatur olim, ita Larix hæc Cedrina, vel Cedrus Larigna.

Apollo rad. non. vocat hanc arbores Cedrum Libaniam, Hebraicamque: dicens, nos posse facillè assequi hanc non cognovisse, nec describere voluisse Theophrastum, vel illum secutum Dioscoridem: Plinium verò Juniperis semen Cupressi simile addidisse, ac ad Libaniam, Hebraicamque Cedram alluisse folis capillatis, Lariceis, Pincisve brevioribus, minimè tamen aculeatis.

Lonicerus pingit conum Cedri, cum cono Pini, nec ab eo distinguit, quàm benè autem iudicent lectiones. Riffus quoque sub nomine Nucis Pini pingit in suis Diosc. commentariis fructum Cedri Hebraicæ. Sic Pet. Crescent. pro Cedro, nescio quos floccos pingit. An Lacunæ Cedrus maior in insula Cypro proveniens, ex qua Salomon templum edificavit?

Castor. Durant. & Cedrus, Cedrolate proveniens in Syria in monte Libani.

An Cæsalpino fuerit Cedrus Libani & Magna, considerent lectores, & quam Cedrum intelligat per magnam, & per Syriacam Theophrasti, de quibus antea. Lob. & Penæ Adv. Cedrus Libania & Palestina, præcelsa Græcis, minùs verò à Matthiolo delineata. Lobelius in postremis figuram aliam proponit, sed si vera, quàm in re prior eius melior sit, quàm Matthioli, non animadvertimus. Had. Iun. Cedrus, Cedrus conifera, & Cedrus

*Cedrus Libania  
Matthioli not.  
Ioh. redar.  
Cedrus Sy.  
Cedrus*

Plin. Cedrus, & Cedrus Nicand. interp. Arab. bin. Cedarbaum / Belg. Cedarboom / Gal. Cedre, Cedre du Liban, Ital. Cedro, Hisp. Alerze, Angl. Cedar tree. Et hæc est quam Hist. Lugd. Cedrum Phœnicæam quoque appellat, atque eam eundem Theophrast. [ut Plin. interpretatus sit] Gazam ineptè Punicam dixisse, à Phœnicæ, quæ Syriæ pars, à qua etiam Syriaca. Cedrolate quoque nuncupari, quia præcitate & ad præcitate: Dendrolibanum in Geoponicis. Pediculum per medium coni tractum, à quo post biennium squammæ defluunt, malè Bellonium scribere vocari hastulam à Plinio, cum illi assula legatur, non hastula, & Cedri nulla fiat mentio, sed Piceæ. Vium & vires videndæ inter ea, quæ de Cedro diximus.

## CUPRESSVS

## CAP. XVI.



Inter arbores Coniferas & resiniferas: ure cōnumeratur, pro cæro siquidem, recto, crassoq; candore surgit Cupressus, cortice ferè spadicæo, materie firmæ, folida, odorata: supra medium in ramis abit, metum concussu suo effigiantes: folia Cedri recta, sæ, aut Sabinæ imbricatim connexa, perpetuò virentia: galbuli Juglandis nu-

ci pulvinato calice testæ æquales confragosi, rimas agunt in clavata tubera dehiscences, inter quorum commissuras femina continentur ruffa, sublonga, altera parte rotunda, altera acuminata, femiculmo latiora medullâ donata. Sapor acerbus, qui potissimum in conis elucet. Lignum pallidum, aut rubescens, nec cariem sentit, nec teredinem, firmum, durum, vndulis nonnihil crispatum, micis saturatioribus, nunc longis transversisque, nunc parvis, punctorum instar, variantibus. Illi Odor sitavus: sapor verò vix ulius excellens, præterquam in cortice, qui evidentè linguæ offert adstrictionem cum amarore, eoque haud ingrato in veteri quod excessit triginta annos.

Cæsalpinus sic describit: Cupressus arbor est quàm iuxta sacras ædes ferunt ornatus gratia, in re & tudine tantum crescens, more Abietis & Piceæ: ramis densè circumvestientibus, modò fastigiatis: quæ femina vocatur: modò ad latera sparsis, quæ mas: foliis nullis, sed ipsamet germina tenuiter Foeniculi modo scissa: folia videntur pulposa, infunt tamen in nuper nascentibus foliola brevia, acutave, sed hæc in adultis degenerant in brevissimas veluti squamas totos furculos convolventes: amentaceum quid exiliter, in lumnis germinibus, conum Nucis magnitudinè ex crassis & lignosis squamis constantem, quibus

Descriptio

Caudex.

Materia.

Folia.

Galbuli.

Semina.

Sapor.

Lignum.

Odor.

Descriptio

Salpinx.

Rami.

Sexus & crimen.

Folia.

Conus.



*Semina.* bus deficiente parva quadam semina decidunt. *Lignum.* Lignum odoratum, & resinofum, non sentiens putredinem.

*Mas & femina.* Olim nonnullos simplicium medicamentorum *Vitalis.* Cupressus mas ex femina quoque provenit. Sed adhuc ipso Theophrasto id attestante plerumque Cupressum quoque ex femina marem provenire affirmant. Neque hæc inter proceras erectasque brevem habet vitam. Mas omnino infecundus est, & femina pleraque steriles. Arborum quoque quarundam semina [scilicet *δυσπλάγη* & *αυγύνη*] parvula, vixque visu percipienda sunt, seu Cupressi. Huius enim fructus non id totum est, quod pile speciem gerit, sed quod cono innascitur, prætenue [λαττός] exile [αυγύνη] & quasi Laricis [πρωάδες] feminiproximum: id verò pilula sua deficiente evolat, & legi proinde non nisi ab experto homine potest. Exemplaria Aldinum & Basileense legunt *πρωάδες*: Giza verit Laricis, ut sapius *πρωά* Laricem interpretatur. Scaliger verò legit *πρωάδες* suffraganea, quod an bene restitutum adhuc dicere non possum, quia semen Cupressi maturum non tale: præterea comparat fructum Cupressi cum fructu *πρωά*. Seminum verò ipsorum nullus terminus est: Alia enim cum pulpis [cum eo quod ambit] destant: alia verò ut Pini Piceas & omnium Coniferarum Conts adhuc pendentes profusunt, vasque ipsa inania relinquunt: In istis verò in aliis omnibus perpetuò virentibus serò perfructur: suntque exilia membranacea. Huic alisque in quibus aliquid inest pinguedinis ut Oleæ & Cedro ligna Austri-

no cælo exundant quod quidem prodigium & ostentum esse crediunt. Punica enim, & Ficus, & Vitis, ætæ faciles: Palma & Cupressus difficiles. Cupressus cæteris quidem in locis semine provenit, in Creta autem insula etiam truncus, ut montosa in Tarta. Apud has enim Cupressus cardua [καρδία] est, quæ ex cætura [απὸ τούτου] germinat modis omnibus præcisa: nam & ab terra, & parte media, & superna: alibi etiam ex radicibus germinat, sed raro. Viret ex urbanis Cupressus quoque perpetuò. In Cyrenensi autem optime prodit, oleumque plurimum fit. Cupressum verò loca fervida magis habent, ut Creta, Lydia, & Rhodus. Huic folium carnosum, quin & minus fecundæ secundionibus, & deterius fructificantes, prohius fructificatibus magna ex parte firmiores, nisi aliquo in genere mas fructuosior esse soleat, ut alias quasdam affirmant, & Cupressum. Natura quidem perpetua Cupressus, sed inter cæteras diuturnior videtur: itaque in Epheso cupressina materies, ex qua valvæ templi nuper constructi Dianæ, quatuor ætates reservata duravit. Sola hæc nitorem etiam recipit, idèoque ex hac condere operum lautiora consuevere. Ex reliquis post Cupressum ac Thuiam, Alia plantarum magis finum & aquam diligunt, alia minus: ut Cupressus, quæ nullo pacto finum nec aquam concupiscit, sed etiam emori dicitur, si copiosè novella rigetur. Itaque in Creta insula montibus Idæis, Leucis que vocatis super summa, quibus nix nunquam deest, Cupressum comperiri affirmant. Et hæc sunt, quæ passim reperire licet apud Theophrastum, ex translatione Gazæ.

*Men exi-* Quæ verò iam sequuntur, ex Plinio collegimus. Cupressus advena, & difficillimè nascentium fuit, ut de quâ verbosius, sapientius quàm de omnibus aliis, prodiderit Cato. Natu morosa, fructu supervacua, baccis torva, folio amara, odore violenta, ac ne umbrâ quidem gratio-

sa, materie rara, ut pendè fraxinosi generis, Diti facta, & idèd funebri signo ad domos posita. Femina sterilis diu. Metæ demùm aspectu non repudiata, distinguendis tantùm Pinorum ordinibus: nunc verò consilis facta in densitate parietum, coercitæque gratitudine perpetuò tenera. Trahitur etiam in picturas opere historiali: venatus classisve, & imagines rerum tenui folio, brevique & virenti supervestiens. Duo generæ earum. Metæ in fastigium convoluta, quæ & femina appellatur. Mas spargit extra se ramos, deputaturque & accipit vitem. Vtraque autem immititur in perticas, asserisve amputatione ramorum, qui xiii. anno denariis singulis vireunt. Quæstuosissima in saturs ratione silva, vulgòque dotem Filiarum antiqui plantaria appellabant. Huic patria insula Creta, quanquam Cato Tarentinam eam appellat, credo, quòd pumidi cò venerit. Et in Ænaria succissa, regerminat. Sed in Creta quocunque loco terram moverit quispian, nisi feratur alia, hæc gignitur, proindeque emicat. Illa verò etiam non appellat solo, & spontè, maximèque in Idæis montibus, & quos Albos vocant, sum nisque iugis, unde pices nunquam absunt, plurima: quod miremur, alibi non nisi in tepore proveniens, & nunc cem magnopere fastidians. Nec terræ tantùm natura circa hæc æfert, aut perpetuè cæli, verùm & quædam temporaria vis. Imbres aliquæ plerumque semina afferunt, & certo fiunt genere, aliquando etiam incognito: quod accidit Cyrenæicæ regionis, cum primùm ibi Læscipitium natum est: ut in herbarum natura dicemus. Nata est & silva urbi Locusi: ei proxima imbre piceo, crassòque circiter urbis Romæ annu cccxxx. In Oriente post Terebinthum & Lentiscum optimam tenuissimamque fundit resinam Cupressus, acerrimam sapore. Fit & ex hac Oleum, quod Caryinon vocant. Hæc verò aquas odit, ut Iuglans, Castanea, Laburnum. Sed nec decidunt folia Cupressi, quæ carnosæ sunt. Trifera est & Cupressus. Namque bæccæ eius colliguntur mense Ianuario, & Maio, & Septembri, ternasque earum gerit magnitudines. Caviem vetustatèque non sentit Cupressus, nec timam fissuramque spontè capit, unde maximè æterna putatur. Sicut valvæ sunt & Cupressi, & iam quadringentis propè annis durat materia omnis novæ similis. Hoc quoque notandum valvas in glutinis compage quadriennio fuisse. Cupressus in eas electa, quoniam præter cætera uno in genere materis nitor maximè valeat æternus. Nonne simulachrum Vejovis in arce & Cupressi durat, à condita urbe quingentesimo primo anno dicatum? siquidem adversus caviem tineasque firmissima. Minimis granis constat semen Cupressi, ut vix percipi quædam possint, non omitendo naturæ miraculo, è tam parvo gigni arbores, tanto maiore Tritici & Hordei grano ne quis Fabam reputet. Ergo è Cupressi femina (mas enim ut diximus non gignit) pilule collectæ, quibus docui, mensibus siccantur Sole, ruptæque emittunt semen, formicis mirè expetitur: ampliatio etiam miraculo, tantuli animalis cibo absumi natalem tantarum arborum. Scitur mense Aprilis, aræ æquata Cylandris, aut volgiolis, densum: terræque cribris supercentitur pollicis crassitudine. Contra immane pondus atollere se non valet, retorqueturque sub terra. Ob hoc paritur vestigiis. Leniter rigatur à Solis ocaflu in trinis diebus, ut æqualiter bibat, donec erumpant. Differuntur post annum dodrantali filo, custodita temperie, ut viridi cælo ferantur,

*Materies rara.* *Femina.* *Tonsilis.* *Duo genera Plinio.* *Vitem recepit.* *Asseret.* *Silva dos plantaria.* *Creta Tarentina Cateni.* *Spontanea.* *Refina.* *Oleum.* *Aquas odit solium non decidunt.* *Folia carnosæ.* *Trifera.* *Bæccæ.* *Cariem.* *Scrupulæ.* *tempeque non sentit.* *Valvæ antiquissimæ.* *Simulachrum antiquissimū.* *Grana parva.* *Mas sterilis.* *Formicæ cibis.* *Serendi rebus & morantur.*

Tom. I.

*Mirum de Cupressu.* ac sine aura. Mirumque dictu, periculum ca- tantum die est, si rotaverit quantumcunque imbre, aut si afflaverit. De reliquo tuta sunt, perpetua securitate, aquasque postea odere. Nec aquam solim aspernatur, sed & fumum, & circumfoissuram amputationemque, & omnia remedia odit: quin etiam necatur. Hanc quidam Creticam dixerunt. Floret post Laurum Cupressus. Haec nus Plinius.

*Cupressus Cretica, Florendi tempus.* Ineptè scribit Marthiolus, eiusque figmentum secutus Lacuna, Cupressi semen adè minutis granis nasci, ut atomis comparari possit, atque ob id agrè perspicui, suam temeritatem demonstrantes, talia enim non viderunt femina: ea si in conis considerassent, non sanè talia scripsissent, aut si saltem legissent, quod scribit Scaliger, contra Theophrastum, cum abuti nostris sensibus. Semina, inquit, quod in de scriptuone diximus, sunt maiuscula, sublonga, semiculmo latiora. Merito igitur in Hist. Germ. tantam seminum tenuitatem omisit, quæ tactu non possint, ne dum visu distinguantur.

*Theoph. re- prehendit.* Dodon. Lat. in sol. duas habet Icones, primæ titulus est. Cupressus, alteri Cupressi ramus, cum fructu, quæ Lobelij est. Apud Bellonium prava est Icon: Sic Pet. Ctesc. pro Cupressu nescio quæ sarcamina ramis affingit.

*Ded. Icones duæ.* Cupressum Virgil. Cyparissum vocat, Offic. Cyparissum, Græci *κίπρις* & *κίπρις*. German. Cypressenbaum / Belg. Cypressenboom. Gall. Cypres, Ital. Cypresso & Cupressu, Hisp. Castil. & Angl. Cypress, Bohem. Cypriß, Hung. Cypres fa. Arab. (addit Lacuna) *Serin*, Catal. *Ciprer*, Portug. *Acipreste*.

*Erasm.* Dicitur autem *κίπρις* & *κίπρις* a *κίπρις*, à partu ramulorum parvum (ut inquit Didymus) vel quodd ex quo & ramos & fructus crecit.

*Chaucer.* Vocatas etiam cupressos *κίπρις* idem prodidit, quodd nobis essent oblectamento, vel quodd charites nobis aspectu sint iucundo.

*Nunq. nota.* Non rectè interpretatus est Munsterus illud Ezech. ubi Hebraice scribitur *Erez*, vertit enim ipse Cedrum, cum tamen scriptum sit Græcè *κίπρις*. Vbi porro Cant. legitur Hebr. *Berachin*, scribit Forsterus esse, qui velint Cupressum, ipse autem intelligit Fraxinum, ut copiosius annotatum alibi. Fructum Cupressi, Theophrasti & Dioscor. autoritate motus Turnebus, *κίπρις* a *κίπρις* a *κίπρις*, globalum Cupressi vocat, ac idem Varionem emendandum putat, qui Galbulum vocet, dicens lib. 1. c. 40. Semina quadam ad oriendum sunt usque adè parva, ut sint obscura, ut Cupressi, non enim Galbuli, qui nascuntur, tanquam pila parva cortice (corticæ) id semen sunt, sed in his intus primigenia femina dedit natura. Melius igitur faciunt, qui Nuces appellant, aut pilulas Cupressi cum officinis. Germ. *Frucht vom Cypressenbaum*, Belg. *Cypressenose*, Gallicè, *Noix de Cypres*. Attius Cupressi scobem & ramenta *κίπρις* a *κίπρις*, alias etiam *κίπρις* vocat.

*Telesma Actis Trifera. Epicheta.* Eam cum Poeta nominabimus *κίπρις* a *κίπρις*, acutam, arduam, teneram, plorantem, alioquin, rorantem, odorantem, viridem, celsam, nigram, odoriferam, deplorantem, viridantem, *Scyriam*, & cum O. vidio *seralene*.

*Teralis.* Funeris aræ mihi ferat cinctæ Cupressu, vt & acutam, Vallis erat piceis & acuta densa Cupressu cum Sylio *mastran*: At ferale decus *mastris* ad lustra cupressos, Funerem.

*Masla.*

Dicitur etiam eadem *funesta*, ed quodd & tardè *Funesta* crescat & succisa non repululet: quapropter funebri signo ante defunctorum aedes eam posuere Maiores, vnde Daniel Cerot.

I pter & postes *funesta* cinge cupressu. Trifera. Licebit & *trifera* cupressum cognominare, ter siquidem in anno fructus eius colliguntur, Januario scilicet, Maio, & Septembri.

Ceterum, uno cupressi nomine *mas* & *semina* Equivocali comprehenditur. Cupressu similis quoque *Thya*, seu cupressus silvestris Theoph. cuius fructum esse *Abbel orientalem* credimus, de quo mox. Cespilini autem Sabinam, vulgarem arborem in maritimis, crassiorum Iunipero, quam Dioscoridem in codice Hermolai Iuniperum maiorem vocare ait, seu cupressum silvestrem, Theophrastum etiam Iuniperum; licet ab aliis cedrum vocari testetur Dioscorides, mos cedrum Lyciam retulim Bellonii facimus. Thua item apud Theophrastum Catalogo ad cupressum reduci oportere videtur, de qua hoc lib. cap. de Thua & cedro Atlantis montis. *chamæcyparissum* etiam, quasi pumilam cupressum vocant, vulgè *du Cypres*, quod quasi sit cupressi arboris. Sunt qui hanc Abrotanum feminam esse putent, de qua suo loco, sub *chamæcyparissu*.

Frater C. Bauh. misit nobis Luteria arbusculas Cupressi quas plantavimus in horto Ill. C. V. V. Montbelgardi. Luteiz sanè copiosas & pulchras vidimus arbores magnas variis in hortis. Monspeii abundat ad magnam excrecens altitudinem, ferens nubes Autumno, quæ durant per totam Hyemem & Aestatem. In Italia etiam frequentem observavimus, ut Venetiis, Patavij, Mantuæ, Veronæ in cœnobio alfiati d. S. Ioan. de monte, ubi vestigia antiqui Theatri apparent. Lug. Jan. 1. V. V. in ignis Pharnacoparus misit ramos, quos plantavi in horto Ill. C. V. V. Teste Turnero in Ag. glia in horto, cui Sion nomen, copiosa. Odere [inquit Matth.] Cupressi flumina, lacus, omnèque aquosus tractus, quo sit, vt in eundem locis sita, statim inarescat. Quod si rectè scivisset Adamus Lonicerus, non tam facile, vt peto, scripsisset, Cupressum humidis gaudere locis. Minus rectè Bellon. Cupressus tamen advena & difficillimè nascentium fuerit, tamen nunc tam mares, quàm feminas vulgè factas, præcipuè apud Tircas, non in hortis modò, in quibus vbiq; capere propagari, verum etiam in agris feri & collibus folere comperio, ita vt circa Byzantium colles Cupressis pubescere videas, quemadmodum etiam in vineis & sepibus. In Creta Cupressum silvas nequaquam compertias, sed sparsim hinc vnam, ibi aliam in abruptissimis locis, aquas enim odit. Bellonio assentitur C. Bauh. apud Matth. ita scribens: Cupressus apud Italos in cœmeteriis colitur, cum funebri arbor olim fuerit habita: plurimas vidimas non longè Patavio in colle circa Eremitarum cœnobium: apud nos [Basileæ] sape licet ex semine germinari Iuniperinis foliis, non tamen ad aliquam altitudinem pervenit. Cupressus, inquit Dioscor. adstringit, refrigerat. Cuius folia cum passulo & modica Myrti pota, vesicae, fluidæ & vineæ difficultati auxiliatur. Pilulæ verò contusæ, & cum vino potæ, ad sanguinis reiectionem, & dysenteriam, alvi fluxionem, erectæ cervicis spirationem, & cussim commodant. Sed & decoctum ipsarum idem facit. Collunt etiam duritias, contusæ cum Ficis, & cum aceto coctæ & cum lupinis nunt & intestinorum Hernias im-

Trifera.

Equivocali Cupressus mas &amp; semina. Abbel fructus Orientis.

Cedrus Lycia retulim Bellonio. Thua.

Chamæcypariss.

Locus &amp; tempus.

Lonicer. error.

Aqua od.

Vicia: usus, &amp; modica.

Dioct. Prima.

Pilula.

Alve. flum. res.

Popski mod. rium.

Hernia.

poutre.



posita. Sed & folia eadem faciunt. Putantur etiam culices fugare pilulæ cum coma suffita. At folia trita imposita, vulnera glutinant: supprimunt & sanguinem. Cum aceto autem trita, capillos tingunt. Imponuntur etiam per se, & cum polenta ignibus sacris, herpeti proserpentis, Carbunculis & oculorum inflammationibus. In ceratum verò amixta si imponantur, stomachum corroborant. Eadem ferè a Galeno traduntur: Cupressi folia, germina, pilulæ, recentes & molles, magna vlcera conglutinant, in duris corporibus: ex quo clarum est, quòd resicandi vim habeat absque insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certè & gustus testificatur. Apparet enim in ea levis quedam acrimonia, sed plurius amaritudo, multoque etiam plus acerbatis in tota planta est. Tanta ei inest acrimonia, caliditasque, quanta satis sit deducenda in altum acerbatis, ita vt nullam tamen mordacitatem, aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie, tutòque depascitur, atque absumit, cum quæ calefaciunt simul, deficiantque, eas quidem quæ contentæ sunt, absumant, ceterum acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic enterocelicos iuvat: siquidem exsiccat, roburque addit, corporis partibus præ humiditate laxis: Quidam ea vtuntur ad carbunculos & herpetes, polentæ miscentes, tanquam absumente citra excalescentiam eos morbo facientem humiditatem. Sunt qui ad Erysipelata vtantur, admixta nimirum polenta cum aqua aut oxyrato aquoso. Cupressini vini faciendi modum docet Dioscor. cap. de Cedro antiquorum. Semina Cupressi (autore Plinio) folis tussis si miscantur, non sunt vermiculis obnoxia, nec si inter lunio ferantur: Cupressinum oleum eodem effusus habet, quos Myrtem & Citreum. Alius verò (teste Cornario) scobem & ramenta Cupressi ad corporis bonum colorem inducendū vsurpat cum oleo. Ligni etiam vsus aliquando ex Italia petitur ad mentas & tabulas & alveolos extornandos, & maximè odoris gratia. Sed & efficaciores sunt nuces, inquit Lonicerus, foliis: folia ex aceto decocta ad vineæ adorem bibuntur. Galbui recentes contusi vino macerantur, quod hæmopticois benefici bibitur. Nuces ex aceto decoctæ dolori dentium subveniunt. Contusi corticis pulvisculus ex aqua Sabuci stillatitia ebibitus calculus tam vesica, quam renum pellit. Tradit Matth. Cupressi folia in vino cocta, addita pauxilla Myrrha, ebibita auxiliari involuntariæ mictioni, & stranguriæ. Quætuosissima, ait Bellon. Cretensisbus esse solet Cupressus, quòd eius materiam assam externis diuendant. Caudices Cupressorum Cretensem ex crassitie comprobabis, quòd vel arcas ex asseribus quatuor pedum latas videre possis. Cum autem Cupressi materies oleosa & veluti resinacea sit, pici faciendæ: Teda modo, idonea esse creditur, quæ vel ex hoc maximè laudatur, quòd neque vetustatem, neque cæciem sentiat, & bonum semper odorem spiret. Sed hoc habet peculiare in Creta, quòd ab incolis fuccia, ex cespite tamen regerminet, vt nepotes, stolonsque ex radicibus cedræ silvæ modo procreantur: qui tandem in maximas arbores excrecent.

Nunc quod periculi plenum est, monere sanè oportet. Credere scilicet iis, qui de plantis scribunt, nec Medici sunt. Si Michael Neander Medicus fuisset, ille priusquam categoricè Physices suæ part. scripsisset, cupressi lignum frigidū esse, id degustasset, olfecisset, ac considerasset,

quæ Galenus scripsit de temperamento eius, & quæ Plinius de resina, quam acerrimam esse statuit. Inter ligna frigida etiam recentet VVecker. VVecker. rus cupressi lignum, cum tamen insignis odor & acrimonia demonstret esse calidum.

# ABHEL FRUCTVS ORIEN- TALIS.

## CAP. XVII.



**C**VILANDI-  
NVS nuper  
in Syria, Egypto  
& Arabia anno-  
tavit, ac Bellun-  
sis alicubi literis  
commentatus est,  
Abhel fructū esse  
in toto Oriente  
notissimum, pilu-  
larū cupressi ma-  
gnitudine, colore  
ruffo in nigrum  
declivi, qui ex ar-  
bore sui generis  
Cupresso simili-  
ma decerpitur:  
Vim ei eliciendi  
menstrua, & fec-  
tus emortuos ex  
vtero eliciendi,  
longè omniū va-

Abhel Ori-  
entalis.

Vii.

lidiſſimam: Ni verò *Θείος* vel *Θύος*, vel *Θύα*, Tro-  
getes, Citrum, & Cedrus arbor ab Homero, The-  
oph. Diosc. Strabone, Plin. Martiale, & Dione  
historico appelletur, nihil se porro de ea explo-  
ratum habere: Avicennam & Serapionem Ab-  
hel Sabinæ fructum si pronunciant, longius à ve-  
ritatis agnitione descivisse, quòd vniverſus ho-  
die Quens arb. vrem toto cælo ab vtraque Saba-  
na disparatam Abhel appellare soleat. Hinc fa-  
cile Clāsius in Guilandini sententiam concessit,  
plurimum ad Thyiæ historiam à Theophrasto  
proditam, accedere arborem, cuius fructus Ab-  
hel: Talem autem Habhel nomine insignitum  
fructum tibi dedisse scribit Bernhardum Paluda-  
num Enchusianum Poliatrium è peregrinatione  
sua, Sytiaca & Egyptiaca reducem. Eundem et-  
iam fructum Abhel Thyiæ Theophrasti tribuit  
Camerarius.

Thya, Tro-  
getes, Ci-  
trus, Ce-  
drus.

Avicenna  
& Sera-  
pionis Ab-  
hel non est  
Sabinæ  
fructus.  
Abhel ad  
Thyiæ The-  
oph. acce-  
dit.

# THVIA ET CEDRVS ATLAN- TIS MONTIS.

## CAP. XVIII.

**I**NCOGNITA hodierno die lateret, ni ex Histo-  
riis palam fieret. Quidam non piget pro virili  
studio lectori eam ex veteribus & recentiori-  
bus manifestare. Homerus igitur: Odyss. 5. hæc  
pauca literis consignavit.

Τηρόν δ' ὀδυσ,

Κίον δ' ἄλκον ὅθεν ἄν' ἴσθαι ὀδυσ.

De longinquo autem odor,

Cedrique sicca Thyique per insulam spirabant  
ardentium.

Ac mirum quidem alicui hoc videri posset, cur di-  
cat ardentium, cum Theophrasto teste, perpetuò  
vireat ex silvestribus *ἄν' ἴσθαι*, & sic eius natura ad

Perpetuò  
vireat.

<i>Thuia Theophr.</i>	ardendum minus idonea sit & habilis. Sed mirari cessabit, si fructum eius Fabae magnitudine refinosus n. esse & sulphureum, ut & arboris ipsam, ex Theophrasto intelligat [ <i>Euas. Theophr.</i> Plin. odore jucundior: Gaza vero, qui vixit sulphureum, legit <i>(Caudice)</i> Dalech. ]	congerie, quas ob id à similitudine <i>Apiatae</i> vocant. Summa verò omnium in colore. Hic maxime multi placent, suis resurgens venis. Posthac amplitudo est iam totius caudicis, ac iuvant plura quoque in vna mensa vitia. Item ligna venae similitudo, vel coloris & quibus maxime obnoxias fecere æstus ventique, rimæ, aut capillamenta rimas imitata. Postea murena [ <i>inellus Murthena, vel Murrhina</i> ] ac nigro transcarrens limite, variisque corticum punctis apprehensus Papaverum modo, & in totum atro propior color, inculæve discoloris. Vitiæ terra condunt Barbari, & stillunt cera. Artifices verò fumentis acervis imponunt septenis diebus, totidem inter missis: muremque, ponderi quantum ita detrahunt. Naufragia docuere nuper, hanc quoque materiam siccitam mari, duritie incorruptæ spissari, nec ullo modo vehementius. Nutriuntur optimè, splendescuntque manu siccata siccata à balneis maxime: nec à vivis læduntur, ut his genitur. Inter pauca iudioris vitæ instrumenta hæc arbor est: quapropter insistendum ei quoque paulum videtur.
<i>Thyades. ror.</i>	Locus.	Et cap. 15. <i>Thya</i> arbor, quæ notat etiam Homero fuit, <i>Thya</i> [ <i>alij Thya, &amp; Thya leg.</i> ] Græcè vocatur, ab alijs <i>Thya</i> . Hanc igitur inter odores uri tradit in deliciis (fallitur Plin. De Calypso, non de Circeid Homerus scripsit. Hanc ut pro illa citaret, fortassis in causa fuerunt hi Virgilij versus:
<i>Excell. Gazæ. Ger. sio suspensa.</i>	Excell. Gazæ. Ger. sio suspensa.	<i>Proxima Circeæ raduntur littora terra, Dives inaccessis ubi Solus Filia lucos Aspidio res. nat. cantu, relictisque superbu Fris odoratus in æthera in lumina Cedrum.</i>
<i>Locut. Fructus.</i>	Locut. Fructus.	notante Dalech. ] Circes, quam Deam volebat intelligi, magno errore eorum, qui odoramenta in eo vocabulo accipiunt, cum præsertim [ in versibus Homericis incepte Plinius pro voce Græca <i>Thya</i> , Laricem interpretatur ] eodem versu cedrum [ Laricem nve, Guillard. legit. Vide Leopardum c. 6. lib. 3. & Virgilium.
<i>Cupress. pin.</i>	Cupress. pin.	<i>Robora nec cuneis, &amp; olentem scindere Cedrum, Nec plantis cessant vestire gementibus Orni.</i>
<i>Contigna. rones.</i>	Contigna. rones.	apud Athenæum p. 231. vers. 3. Empedocles <i>Libano</i> vocat, suavit olentem.
<i>Duratio. Radix crispata.</i>	Duratio. Radix crispata.	<i>Libano</i> vocat, suavit olentem.
<i>Thuya Plin.</i>	Thuya Plin.	Dalech. ] Laricemque unâ tradat: in quo manifestum est de arboribus tantum locutum. Theophrastus, qui primus à magni Alexandri ætate scribit, quæ circa urbis Romæ quadringentesimum quadagesimum gesta sunt annum, magnam iam huic arbori honorem tribuit, memoratas ex eo referens temporum veterum conignationes, quandamque immortalitatem materiz in lectis, contra vitia omne [ omnia M. & C.H. ] incorrupte. Radice nihil crispis, nec aliunde pretiosiora opera. Præcipuam autem esse eam arbores [ mirum, cum idem Theophrastus lib. 4. cap. 1. Thuiam in montium cacuminibus, & locis algidis nasci. ] circa Hammonis delubrum. Nasci & in interiore [ inferiore M. ] Cyrenaica parte. De mensis tamen tacuit, & alijs nullis ante ciceronianam vetustior est memoria: ex quo novitiæ [ quæ novitiæ apparent C.H. quæ novitiæ apparent M. ] apparent. Alia est arbor [ citium, sive Altyriam malum intelligit Dalech. ] eodem nomine, malum ferens [ tenens M. ] execratum aliquibus odore & amaritudine, alijs expetitur, domos etiam decorans, nec dicenda verboris. Huius arboris mentionem fecisse videtur Virgil. Idque asserente Dalecham- pio.
<i>Arbor Cedri. Sel. Ciri.</i>	Arbor Cedri. Sel. Ciri.	
<i>Ciceroni mensa.</i>	Ciceroni mensa.	
<i>Mensura- rum am- plitudo.</i>	Mensura- rum am- plitudo.	
<i>Materia Tuber.</i>	Materia Tuber.	
<i>Cupress. similis odorata.</i>	Cupress. similis odorata.	
<i>Tigrina. Pantherina.</i>	Tigrina. Pantherina.	



Malum fe-  
hs.

Media feri tristes succos, & ardorque saporem  
Felicis mali, quo non praesentius ullum  
Pocula si quando, sacra inficere noverca.

Sed nemo inficias ibit arborem, ex qua celebres  
mensae fiebant, & Thuiam, & Thuium, *Thuiam, Thuium, & Thuium*, sibi etiam *Thuium*, & *Thuium* passim &  
citrum & Trogetem, à Theoph. & Plinio, vel  
Roberto Constantino teste, dictam esse, quibus  
addit Gesnerus idioma Germanicum *Ein strombe-  
der wolgeschmackter baum* / cui proximum sit  
lignum, quod Galli *Madarum* vel *Madrum* voc-  
cent, quod idem vult Ruell. An verò tale li-  
gnum extet odoratum, quod in Gallia Gallicè  
dicatur *Madré*, videant qui eam inhabitant, nos  
equidem tale quod ignoramus. *Thui* verò cum  
diphthongo legi, confirmat Gorop. in Vertumno  
apud Diosc. cap. de croco, qui Ruellium erroris  
quoque meritis inculcat, quòd eo loco, longè ab  
auctoris mente aberrans venterit. Gaza etiam per-  
peram transfert Tyium, vt & in codice Theo-  
phraستي corruptè legitur.

Ceterum, inquit Anguillara, Cedrus Atlanti-  
ca, non mihi videtur alia quàm Thua, vel Thia,  
quamvis in diversis capitibus de his scripserit Plin-  
ius: ille enim plantas non cognovit, sed ex  
diversis libris sua concinnavit. In Plinio de Thya  
errot ab eo commissus, vel textus corruptus: di-  
cit enim Homero notam arborem Trogetem, què  
aliis dicitur Thya, quod falsum, siquidem Hom-  
erus non meminit Trogetes [nec dicit Plin-  
ius] sed Thya: Dicit praterea Homerum intellexisse  
cedrum & Laricem, quod etiam falsum.

Eiusdem opinionis cum Anguill. est Matthio-  
lus, dicens in Diosc. cum magnis figuris: Sunt qui  
dicant, & rectè quidem cedrum Atlanticam à  
Thui siue Thya de qua Theophr. nihil differre.  
Quamvis enim Plinium edagant, quòd simulac-  
de cedro Atlanticà dissimulat, illicò caput pro-  
prium de Thui scripsit, tanquam de arbore  
diversa, verum longè aliter se habet sententia  
nostra: nam diligenter Plinij lectionem enu-  
cleantibus palam apertissimè sit, Thuiam Plin-  
io nil aliud designare, quàm Atlanticam ce-  
dram. In antiquis codicibus Plinianis Thuiæ  
caput à Mauritana cedro separatam non est,  
quod manifestè arguit, Plinium adhuc cedri hi-  
storiam profectus Thuiam agentem, quemad-  
modum scripti verè aduissimè indicant, quæ in  
aliquibus codicibus ita habent: Nota etiam Ho-  
mero fuit, Trogete vocatur, ab aliis Thia, id est,  
eadem cedrus nota etiam fuit Homero, quam a-  
lij Trogetem, alij Thiam appellant. Ideoque  
perperam egerunt, qui in Frobeniana editione  
Thuiæ siue Thya caput ab Atlanticà cedro divi-  
serunt, haud rectè Plinium intelligentes. Ac  
praterea lectionem eius corrumpunt, ubi se e-  
mendasse crediderant. Iussè itaque nostro iu-  
dicio reprehendit Matth. eos, qui caput de ce-  
dro Atlanticà separant à Thya. Dispicet et-  
iam nobis apud Bellonium & in editione Lug-  
dunensi pro Trogete, legi Thyon græcè: nullibi e-  
nim, quod observaverimus, legitur Trogete,  
quàm hoc Plinij capite. Cornarius, Cordus,  
Gesnerus, Brunfelsius, Matthiolus, Anguillara, &  
Casalpini, meminere Trogetes, sed nullum  
aliud locum citant, quàm Plinij antè dictum.

Animadvertes, inquit Scaliger Thuiam igno-  
tam nobis, nisi ex historia Theophrastea: cum a-  
lias species enumeraret, quod & alibi fecit. Est  
& aliud, quod à Plinio animadvertas. Ait ille in  
deliciis apud Homericam circen usum fuisse  
Thyæ arboris ad urendum. ceterum non apud

circen, sed apud calypso factum legas in quinto  
Vlyssæ. Fefellit tanti viri memoriam lecho Vir-  
giliana, in qua cedri usus eiusmodi attribuitur  
circes deliciis. Eam autem indiligentiam pri-  
mus Hermolaus sequutus est, tum autem usque  
ad Ruellium omnes.

In codice Pliniano veteri, Thia scriptum est, &  
in veteri Homérico *Thia*. recentiores verò partim  
*Thia* legunt, partim *Thia*. Haec tenus Scaligeri verba  
retulimus.

Nunc casalpini: Ad capressum reduci oportere  
videatur Thuiam apud Theoph. Plin. verò scribit  
hanc Cedri ab Homero Trogetem vocari, ab aliis  
Thiam celebrem. Laudatissimam fert mons An-  
choratus citerioris Mauritaniæ, præcipua dos  
menis in vena crispis, &c. Plura cap. de arbore  
vitæ, ibidemque Etymologiam.

De Thya, siue Thuiæ variae sunt opiniones, quarum  
una est de arbore Abhel Orientis, de qua iam  
dictum. Scribit Lacuna in Diosc. pro Aracatide  
semen Thuiæ demonstrari Pliniana, verum scitu  
admodum difficile, quam intelligat plantam pro  
Aracatide, vt dicitur suo loco. Ex Sabinâ Thiam  
quidam faciunt, et olim teste Goropio, ponebatur  
Sabina in suffumigia pro Thuiæ arbore odorife-  
ra. Cedrum Lyciam præcipue teste Bellonio,  
Thuiam Theoph. existimant. Arbor vitæ mul-  
tis est Thuiæ, ubi multa notatu digna de Thya ex  
Goropio occurrunt, ut Etymologia. Dubitat  
Cordus an Guaiacum fortè Trogetes seu Thuiæ,  
seu Citru n, de quo lib. 4. *Thia* apud Diosc. cap.  
de Croco, non intelligenda de mortario, teste  
Bellon. & aliis.

## BRUTA PLINIO.

## CAP. XIX.

Tanta mortalibus suarum rerum satietas est,  
& alienarum aviditas, ut petant [inquit Plin.  
lib. 12. cap. 17.] in Helmasos arborem Brutam  
[Brutam C. H.] Cupressi fuscæ similem, exalbi-  
dis ramis, iucundi odoris accensam & cum mira-  
culo histomis Claudii Cæsaris prædicatam. Folia  
eius inspergere potionibus Pothos tradit. Odo-  
rem esse proximum Cedro, fumumque eius contra  
ligna [quæ noxium & venenatum, vel gravem  
& iniucundum accensæ odorem mittunt] exsta-  
lia remediis. Nasitur ultra Pasitigrin in finibus  
oppidi Sitacæ. [opimis Scytæ. Vet. præve oppi-  
di Scytæ C. H.] monte Zagro [Scantio. Vet.  
Schantro C. H.]

Ruellius qui more suo eadem ex Plinio tran-  
scripsit, quamvis nomen eius subiceat, addit:  
Brutes arbor est soli Orienti cognita, neque La-  
tinis adeò celebrata. Sunt qui hanc in Europa,  
atque adeò Gallia iam nasci existimant, esseque  
alterum Sabinæ genus: nec profectò longè ab ea  
dissidère.

Nos quidem colligimus Ruellium intelligere  
Bellonij Sabinam alteram bacciferam, quam Bru-  
te putat, & arborem vitæ nominat, cuius descri-  
ptionem posuimus cap. de Sabina.

Bellonio subscribit Clus dum dicit: Non de-  
fuit, qui arborem vitæ, ad arborem Brutam Plin-  
ij referunt, quam describere videtur.

Ovidius, faciens arborem  
Filici similem.

Circen  
Calypso.Hermol. no-  
tatur.Thia apud  
Plinium.Cupressi  
affinis.  
Thuiæ.  
Cedrus.  
Locus.Arquivoca  
Abhel O-  
riensis.  
Aracatide.

Sabina.

Cedrus  
Lycia.  
Arbor Vita.

Guaiacum.

Mortarium

Bruta.  
Brutum.

Vfus.

Locus.

Ruell. ta-  
natur.Sabina sei-  
cunda.Brute Bel-  
lon.Arbor Fili-  
ci similis.

ARBOR VITÆ, SIVE PARADISIACA  
VVLGÒ DICTA, ODORATA AD  
Sabinam accedens.

C A P. XX.

Descriptio

Caudex.

Materies.

Rami.

Folia.

Flores.

Squamæ.

Semina.

Coni.

Odor.

Arbor Vita.

Sabinæ  
Lutetianæ.Cedrus in-  
dica silvestris.

centes divisi, abeunt denu in multa, oblonga folia, numerosis foliolis compressis, quaterna medium gibbosum complectentia ex ramulorum extremis, aut paulò citrà. Vere oriuntur flores pusilli, flavescentes, quorum nonnulli deinde in conos parvos sublongos, Pinei nuclei magnitudine efformantur, è sex tenellis squamulis compactos, initio virides, deinde palléscentes, postremò ubi planè maturuerunt nigricantes, qui in quatuor carinas dehiscetes, semina ostentant sublonga, quaterna, plerumque paleacea, medio paululùm extuberante, in quo medulla acris & amariusculi saporis. Coni hi non nisi detracti ferè, aut tabidi pediculo excidunt. Huius autem plantæ odor nobis non est gratus, de quo hæc Clusius: Tota arbor graviter odorata est reliquis congeneres longè superans odore, quem, si quis folium digitis nonnihil duntaxat confricaverit, faciliè eluere non possit. Hunc autem non modò viridis ex se exhalat, sed etiam multis in annis exsiccata & resiccata retinet.

Arbor porò de qua nunc agimus, & quam iconè exhibemus, passim *Arbor vite* dicitur, quavis hic titulus aliis pluribus arboribus conveniat. Ni multùm labat memoria, huius meminit Bellonius, nomine arboris vitæ, quæ provenit Lutetia, & aliis locis. Sed obscurè admodum, uti copiosius demonstrabimus cap. de Sabina, de hac tractavit Bellonius, & eum secutus Cardanus de varietate rerum lib. 6. cap. 20. ubi meminit Sabinæ Lutetianæ Bellonii, & arboris vitæ. Illud modò notandum hanc arborem à quamplurimis cum aliis confundi. Considerandum tamen an hæc arbor non tradatur à Francisco Loupez, & M. Fomme, cum scribunt: In India provenit arbor valdè alta, odorata, Cedrùmque referens. An etiam à Iacobo le Moine de Florida agente, qui meminit Infule, in qua erant tantùm celsissimæ Cedri, quapropter ea Cedrorum Infula cognominata? An verò ab Oviedo cum de Filici Hispanicæ simili arbore?

Thevetus etiam videtur eam agnovisse in sua America, quando ait: In Canadia silvestres ho-

mines cùm nives sunt satis profundæ, exploratà viâ cervorum, figunt in ea Cedri ramos [qui perpetuò virent] retium modo: sub quibus se occultant armati. Cervi autem allesti viriditate & trita viâ ed veniunt, ubi excipiuntur à silvestribus hominibus. Et: Hoc silvestribus singulare, quum laborant febribus, aut aliis intentionibus morbis, eos assumere folia arboris valdè similis Cedris quæ repetiuntur in monte Lugdunensi, & ius exprimere, ac bibere: nec dubitandum intra 24. horas, quemcumque morbum etiam in veteratum hoc potu curari, prout sæpiùs Christiani experti sunt, & in has regiones [nempe Galliam] plantam attulerunt. Item alio in loco: In insulis Ellores abundat species Cedri arboris, quæ silvestribus hominibus nominatur *Oracatin*, ex cuius ligno varia pulcherrima vtenilia parant: eò quòd sic valdè odoriferum putredini non obnoxium sive in aqua, sive in terra. Hæc Thevetus qui nostro iudicio de vna & eadem planta scribit, quamvis separet. Quamnam enim obsecro Cedrus, quæ provenit in Lugdunensi territorio? Provenire quidem audimus Pini filij. genus.

An porò, quòd suspicamur, Cedrus Thomaë Hariot cuius in histor. Virginez, mentionem fecit?

Celebratur Arbor vitæ à Libavio quando dicit: Citrus vel Cedrus Atlantica aliis cognominis nuncupatur *Aethiopica, Mauræ, Maurasiaca, Lybica, Hesperis, Cyrenica, Hammonia*: vnde Martialis.

*Gemmantes primâ fulgent resudine lætâ  
Et Maurasiaca pondera rara Citri.*

Lucanus scribit Cleopatram mentis exhibuisse, Magnificam pedamenta fuerint eburnea, orbes ex præstantissima Citro, quæ Trogetes & Thyas dicebatur.

*Dentibus hic niveis scissis Atlante silva  
Impresere orbes, quales ad Casarâ ora  
Nec capto venere Inbâ.*

Quia autem nascebatur olim in finibus Cyrenicæ iuxta Hammonem & in Atlante, iam dicta nomina sibi asciuit. *Africa incolæ etiam à nonnullis dicta: & Hesperis ab occasu non ab hortis filiarum Atlantus.*

Est alia arbor Medica, inquit Lemn. in conitura de lignis Sethim, etiam vocata Citrus, sed quæ Mala aurea non profert, silvestri Cupresso, aut Cedro non absumilis, ut nonnulli existimant esse *Serhim*. Lignum est à catie, teredine, vermibusque alienum, nec villo zæo corruptioni obnoxium. Hæc de ista Thyas seu Citro. Si ex argumento cognationis naturalis iudicandum est, ad hanc referendæ sunt Cupressus mas & femina & Citrus Atlantica minor, ut Arbor vitæ. Sed arbores vitæ teste Clusio, plurimi Theophrasti existimant. Quamvis non desint (inquit hist. lib. 5. cap. 5.) qui ad arborem Brutam Plinii referant, Cupresso fuscæ similem. Hæc quidem arbor [vitæ nimirum] ad Cupressum nonnihil accedit: verùm ramos sui sum non attollit, quem admodum illa, sed in planas veluti alas expansos, in latitudinem diffundit: Huius item folia tametsi ex foliolis squamatis compacta, omnino plana sunt, non rotunda, uti Cupressus, Iunipero maiori, Sabinæ: nec rotunditatem contrahunt, antè quàm in ramos excrecant. Galli *Arbre de vie*, hoc est, arborem vitæ nuncupant, nescio quâ ratione ducti, nisi fortè ob immortalitatem eius comam, quam habet, aut odoris eius vehementiam, quam salubrem esse existimant, hoc nomen indiderint. Vulgus Herbariorum & Thiam

*Cedrus Gallica similis, Vires insularum.*

*Thevetus noster, Pini filij genus.*

*Citrus vel Cedrus Atlantica, Aethiopica, Mauræ, Lybica.*

*Cyrenica, Hammonia, Africana, Hesperis.*

*Fruta Plinii.*

*Arbor, Syria.*



Thuiam & arborem vitæ appellat. Nonnulli plurima genera Thuiæ constituunt, & hanc arborem tertium genus esse volunt.

Nunc Goropij hac de re sententiam audiamus. Longè, inquit, à Plinii sententia discedunt, qui eo capite, quo de monstrosi pretij mensis tractat, Cedrum pro Citro scripserunt. Ceediderim Romanos arborem, è qua crispa materia fabricatur, principio Citrum nominasse, ac voce Africana, nonnihil corrupta, Chitram, vel ut alij legunt Chatram. Significatur enim hac voce Arabibus Cedrus. Quamobrem cum Pœni Chitram pronuntiarent, & in Cedro genere arboris illud genus, è cuius nodis mensæ fiebant, collocarent, Romani Citrum nominarunt. Ignari verò Cedrum, &c.

Et paulò pòst: Nos igitur in ea sumus opinione Thuiam Theophrasti esse Cedrum, sive Cedrelam masculam. Romani melius fecissent si mensas Cedrinas nominassent. Thuia tandem geminà de causâ ita vocatur: Alterâ, quod in sacrificiis Thuris loco haberetur: alterâ, quoniam [Cimbri] Thephui & inde Thui / nihil aliud est, quam custodia. Perdurat; Theophrasto teste, materies hæc omnino incorrupta, unde merito arborem vitæ vocant. In Plinij & Hometi codicibus Theoi, non Theoi, ut plerique habent, legendum: An verò per diphthongum scripserit Hometus, an non, id necdum puto satis liquere. Apud Dioscori, in cap. de Croco Syriæ cum diphthongo legimus, quo loco Ruellius mortarium vertit, longè ab autoris mente aberrans. Thuium tandem sive Thuia dicas, quam sacra litera ex India adferri dicunt, eam Theophrastus ex Cyrenaica, Plinius ab Atlante & Anchorario Mauritanie monte adferri scribunt. Concludit tandem dicens: ad templum Salomonis non solum aurum ex Atlantico orbe petebatur, sed ligna quoque Thyina eadem navigatione adferebantur, quæ an ex Atlantidis salibus, è quibus pòst à Romanis magnis sumptibus petita legimus, an ex orbe quoque Opher advecta sint, cum utrumque commodè fieri potuerit, ignoro.

Gesnerus quoque huius arboris recordatus est, his verbis: Arborem vitæ à quibusdam vocati, Lutetia revertens nuper amicus quidam mihi retulit: cuius ramulum ostendebat, ex America translatus, dicens, & in horto quodam Lutetiæ à Petro Bellonio sibi demonstratam. Sabinæ videtur genus, quod quidam Buteon esse volunt, simillimamque Cupressò: sed baccam fert dissimilem, odoratam tamen & nigriorem: folia Salviam olent. Verùm Gesnerus, Bellonium imitatus, confundit hanc plantam cum alia quadam: Siquidem Arbor vitæ non fert baccas, sed veluti oblongos minimos conos, qui semine maturo conorum modo dehiscunt: hanc arborem Bellon. de conf. vocavit Arborem vitæ & Sabinam & Brutes secundum, cuius duas descriptiones ponit, quas posuimus capite de Sabina.

Lyciam Cedrum, (aiunt Lob. & Pen. Adv.) jam diu vidimus Lutetiæ in quibusdam hortis folio Cupressi compresso, semper virentibus squamulis, loraticis capitulis, semen Latricis claudentibus: Belgicis herbariorum viretis hodie notissima Arboris vitæ nomine. Eius folia trita suavissimum fundunt odorem. Ibi tradebant quandam bacciferam Cedrù Lyciam. Mirum autem, quid sibi voluerint autores Adversariorum: primò cum sua Lycia Cedro baccifera Lutetiæ visa, quum nunc aliam eodem nomine tradant, quæ nullas baccas fert. Quæ in Advers. dicuntur de Aegy-

ptiaca Sabina Bononiensi, & de Abrotono peregrino Cupressi foliis videntur aliquatenus convenire cum arbore vitæ. Ex iam itaque adductis luce meridiana clarius patet, neque Lobelio & Penæ bene notam fuisse hanc arborem.

Dicitur & arbor vitæ (inquit Dod.) Thuia Theophrasti, aut Plinij Bruta esse, quod asserere non fuerit facilè. Novi orbis nova stirps habenda est.

An Arbor vitæ, arbor de qua scribit Levinus Apollonius Peruana sua regione, dum dicit: Miri odoris arborum ligna cremantur, ex quibus dum cortices detrahuntur, tam acri odore adeps defluit, ut olentium nares, cerebrumque deterimine afficiat; illita verò defunctis, aut guttis instillata (quemadmodum Cupressò permanens resina) perpetuò ab vermiculorum iniuria, carieque, mortuorum cadavera vindictet.

Tabernamont. Arbor vitæ, Buium deff. Lob. in Hist. verò Lugd. Thuiæ genus tertium, Arbor vitæ Gallis, Lutetiæ paradisica arbor. Vocatur à Camer. Paradisea in hort. Thuia sive Thya, vulgò arbor vitæ, ut Arbor. Galli nominant. Goropius in suo Vertamno, Arborem vitæ sive Thuiam cum Cedro antiquorum coniungit & allegat Virgilij versum:

Vitis odoratam nocturna ad lumina Cedrum.

C. Bauh. apud Matth. In classem Cedrorum refert arborem vitæ. Multis videtur Thuia Theophrasti, alij ad Brutam Plinij referunt, licet paucissimæ notæ Pliniana, nostræ conveniant. Arbustula est admodum odorata, perpetuò virens, altitudine virum longè superans: flores ut in Cupressò. Hæc ex Canadæ Septentrionalis Americæ provincia in Galliam primò illata & Francisco Regi Arboris vitæ nomine donata, quam Lutetiæ cum effemus, ex regio horto, quem Io. Robinus colit, accepimus.

Primum Clusio conspecta hæc arbor in horto Locus: regio Fontainebleau, non procul Aureliana Gallorum, eò ex Americæ Septentrionali ora, Canadæ dicta, delata, Gallorum imperium obtinente Francisco huius nominis primo, litteratorum omnium summo Mecenate, nec antè, ut existimat, Europæ cognita. Deinde apud Doctissimam Viram Nicolaum Rassiunt Regis Chirurgum, qui primus sua opera eam Belgio communicavit, ubi nunc adeò frequens est, ut nullus sit rei herbariæ studiosus, qui eam in suo horto non alat: inde porro in pluresq; Germaniæ hortos transit: facile enim rami depacti radices agunt, quemadmodum sæpè est expertus, præsertim loco vmbroso & feruli, pinguique solo. Nascitur etiam semine: sed tenellæ plantæ antè quàm in ramos dividantur & explicentur, Oxycedrum, Juniperumque maiorem primùm enatas admodum amulantur. Frigoris patientissima est: Hieme tamen fuscum & fuliginosum colorem contrahentibus foliis, quæ novo Vere pristinum nitorem & viriditatem recipiunt. Sed & Camerario primùm à Rasio missa, facile sepinè nascitur, & surculis propagatur, fertque Hiemem parùm stramine vel simili re munita. Sati autem debet in vasis terra optima & cibrata plenis, ut semen quarta parte digiti eà tegatur. Cum verò rigare opus est, terra linteo imposito irriganda, aliqui semina fuscum ascendunt & nudantur: quòd etiam in aliis observandum est. Novellæ plantulæ à Sole meridiano per maiores ætus defendendæ, atque hac ratione plurimas arbusculas brevi consequi possumus: Nobis autem primùm visa operâ fratris Bauh. qui misit Lutetiæ nomine Arboris Paradisi, quam plantavimus in horto Illust. Cels. VV. ea excrevit

Sabina Aegyptiaca. Abrotonum peregrinum.

Radices facile agere.

Semine nascitur.

Frigoris patienti.

Satio;

Cultura.

Arbor Paradisi.

Temperamentum.  
Vfus.

Digerit.  
Abstergit.

Ames. Oleum.  
Dolores po-  
angens.

in arborem pulchram, semper virentem, quæ ex ramis faciliè radicatur, ac Hiemem commodè sine nocumento perfert: non tamen profundè radicatur, quin oportet maiores fulcire, ne à vento deficiantur, vt accidit nostræ primæ arbori quæ anno 1604. deiecta fuit, licet palis retineretur. Habet Basilæ D. Fœlix Plateris in suo horto per me missam. Stutgardia etiam pulchras vidi arborea. Ex sapore & odore [autore Tabern.] faciliè colligitur hanc arborem calidæ & siccæ temperiei esse. Non dubium Clusio, quin ad pleraque sit utilis: nemo verò illius facultates suo ævo prodidit, quod sciat. Cùm tamen magnam habeat partium tenuitatem, & amari scula sit, verisimile est digerendi & abstergendi facultate præditâ esse. Hæc arbor, inquit Camer. in pretio habenda est, non solum propter eius odoris fragrantiam, cuius contusi ramuli naribus impositi, quandoque sanguinem eliciunt, sed etiam propter alias eius facultates non contemnendas. Elicitur quoque ex ea aqua & oleum per Chymica organa, vtile ad dolores podagricos, ritè impositum.

### SABINA BACCIFERA ET STERILIS.

#### CAP. XXI.

Descriptio

Humilior.

Vulgarior.  
Folia Myrtice.

Folia Cupressi.

Caudex.  
Odor. Sappor.

Bacca.

Tubercula.

Apex.

Bacca matu-  
ra.

Flores simi-  
li.



dentia, ex tribus, quatuor, aut quinque exiguis,

viridantibus tuberculis, instar Myrticeæ verrucæ parvulæ, composita. Quandoquidem autem Lobel tres species facit, eius descriptiones hic subiiciemus: Boreales, Meridianique horti, præsertim in Clausitis Vestalium, Sabinam vulgariorē alunt, longè notissimam Tamaricifolia, sed rigidioribus, pungentibus, tetrūque odorem halantibus, perpetuò virentibus, & baccarum expersibus. Vulgarior itenli Sabinæ (quæ tamen flosculos ex herbido luteo promit) ortu, totaque facie simillima, sed folio pauld minus acuto, minusque rigido, & pungente, bacca, sine grano testinolo, Iunipero nostrati pari & concolori. Nostra vireta Belgica cultiora hanc alunt munere Io. Monom. Altera superius coningenda, tanquam exilitate & foliorum lenitate duntaxat diversa: media inter Sabinas & Cedros Phœniceas, folio Sabinæ aut Cupressi vocatas, videtur: sed folia tenuiora & delicatiora, minimè aspera & pungentia sunt. Fructus Iuniperi minoris par, similis & concolor. Natalibus gaudet montosis Calabriae & Apuliæ, ni labat memoria.

Nostra Sabinæ non emptius, demonstrat tantum baccharum ramum, cum foliis non spinosis qualem variis in locis etiam spontaneam observavimus. Alteram autem sterilem ex Matth. desumpimus.

Cæteterum, Sabinam in genere novisse Dioscoridem, ex sequentibus eius verbis didicimus. Brathy Brathy, aliqui Brathy appellant nonnulli Baryton, Barathron & Baron. Eius species duæ sunt. Altera enim foliis est similis Cupressi, sed spinosior & graveolens, acris & fervida. Est autem arbor curta & in latitudinem magis se fundens. Et quidam foliis eius ad fustius vivunt. Altera Myrticea [Tamaricis] foliis similis est. Plinio Herba Sabinæ Brathy appellata à Græcis, duorum generum est. Altera Tamaricis similis folio: altera Cupressi. Quare quidam Creticam Cupressum dixerunt. Est tamen & Selago appellata, similis herba Sabinæ. Sabinæ herba propagine feritur & avulsione. Tradunt fœce vini, aut è parietibus latere tulo, mirè ali. Huic semen nullum.

Dioscorides hoc loco (inquit Herm.) Baryton vocat Savinam tradit à nonnullis. Vt fortasse de hac intelligant Scriptores, præsertimque Dioscorus, cùm in Arabia nasci dicunt Boraton Iuniperum, Cedrumque, quasi Boraton pro Baryto, vel contrà exemplariorum vitio legatur. Testatur Ruellius Sabinam nomen ubique retinere, ac in quibusdam Gallia tractibus Savinieram nominari. Hæc (ait ille) Brutes arbor est, foli Orienti cognita, neque Latinis adeò celebrata. Sunt qui hanc in Europa atque adeò Galliam nasci existiment, etsi quæ alterum Sabine genus: nec profectò longè ab ea diffidet. Addunt & quadamtenus tum odore, tum colore immutatam, quia & cælum & solum inventu quoque mutaverit. Huic facit etiam, quod rudimentum nominis Græci Brathy luxatis literis, & aspiratione summa videatur elucere. Quodnam autem sit Sabinæ fecundum genus Ruellio, quod Brutes existimat, investigandum. Videtur intelligere Sabinam fecundam, quam habet Bellonius, quam etiam Brutes putat. Perpendendum insuper an eam intelligat Ruell. quam Bellon Arborem vitæ nominat, de qua suo proprio capite.

Nunc subiiciamus, quæ traduntur à Bellon. conf. arb. de Sabinis duabus: scribit autem: Itali quemadmodum & multi incolæ Epyri & magna Græciæ pars non studens agriculturæ, paucas alunt in hortis herbas, præter eas, ex quibus proventum

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata

Labello

Vulgata



ventum sentiunt. Ideo neque Sabinam primam, neque alteram, id est neque sativam, neque silvestrem bene norunt. Ambas autem suas sponte nascentes in montis Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus vidimus. Nos in hortis sativam tantum colimus. Frigorum patientissima est Sabinæ, id est ea nobis feliciter provenit, culta altius attollitur. Silvestris humi comam dispergit. Prisci Sabinam arborem dividentes in primam & secundam partiebantur: de prima iam dictum est. Alterius autem Sabinæ folium, Cupressi aut Tamaricis simile est. Hoc namque modo ab authoribus descendi solet, quos sane non parum adorior, quod eam arborem herbæ nomine vocaverint. Non erit quoque mirum, si, cum ambæ silvestres sint, alteram cultam dixerim, quam vulgus nostrum agnoscat: alteram incultam nostris olitoribus, ab ovis inuisam. Ut autem Sabinam alteram hanc, qualem in montis Tauri excelsum vertice descripsimus, prosequamur, adiciendum fuit aliam frequentiore arborem, quam Sabinam utramque videri non posse. Sylvas hæc de se in summis Amani & Olympi montibus faciunt, in quibus nullam arborem præter hæc copiosiorrem videas. Altera Sabinæ tota facie Iuniperum maiorem refertet, nisi latioribus ramis prædita esset, & magis divulsis: & appendices multas in ramis, ut Sapinus produceret, atque eundem in nascendo, quem Taxus, morem servaret. Resinam profert in caudice, ut Iuniperus utraque, eodemque modo resinam comanducata, tota in os pulverulenta diffunditur, nec amplius cogitur. Ideo hæc in se similes est gummæ Iuniperi minoris. Resinas inter se contuli, quæ quidem plurimum distare mihi visæ sunt. Siquidem maioris Iuniperi resina Mastichis, vel Terebinthinæ in modum in ore cumulat, & nunquam in ore dissolvitur, aut divelli potest. Præterea Iuniperi maioris resina insigniter amara est. Transparentem resinam Sabinæ altera habet, duram ut Iuniperi, veluti fumo tactam. Arboris caudex sinuosus est, crassior plerumque, quàm ut vis in ulnas capiat. Corticem Vitis habet modice crassum, rulum, materiam foris albam, intus veluti gilvam, cui nullam aliam similem reperimus. Est enim ei veluti indulus quidam rubor degenerans in subnigrum. Perpetuam comam viret, suis scrobibus gravidam in Hyeme compertur, sed Lentifici naturam servat, quod fructus perpetuè suæ arbori insideant, deciduibus scilicet anniculis, cum alii iam ad maturitatem pervenerint. Fructus autem, qui non perfectè maturuerint, egregie virent. Cum autem ad maturitatem venerint, ex atro in cyaneum degenerant. Arbor ipsa elegantissimo vitore nitet, quæ tota fructibus nigris fugiatur. Est autem arbor feracissima, cuius bacce vix Cedeisibus crassiores evadunt. Arbor Amygdali bene magnæ altitudinem petie, multum ad Cupressum sativam accedens, sed crassiori caudice constat [nam silvestres in Creta sativæ crassiores sunt.] Huius folia omnino Cupressi correspondunt, frequentiora tamen sunt. Ideo si arbor à longè spectetur, etiam à quovis perito à Cupressi vix dignoscitur, siquidem illa feminibus vidua fuerit, nisi attentè inspicatur. Atque cum eam primam inspicissem, nihil de hoc dubitans, Cupressum esse censebam. Cum autem aliam postea suis bacis, quas in ramis singulares profert, onustam vidissem, ea omne dubium sustulit. Folia eius gustata amara sentiuntur, aromaque oleum, resinaceum quiddam præ se ferentia. Os leviter extom. I.

calefaciunt bacce, quæ in huius extremis ramulorum surculis oriuntur, ita ut perpetuè singularis quivis surculus suam tantummodò ferat, & eam rotundam. Hæc merulis & turdis gratissimus cibus, amara est & subodora, & ut dixi, ex caneo subnigra. Habitus ramorum & foliorum in arbo re Filici quodammodo similis est. Filix enim cum servat ritum, ut folium appianatum esse diceret, & veluti compressum, quod & ramis Cedri maioris accidet. Florem non promittit, sed statim feminis rudimentum apparet. Quantum ad lignum huius attinet. Agebam in Myria in ea urbe, quæ Iconium vocatur, vulgò Tagna, cum inter urendum Iuniperi maioris & Cedri Phœnicæ, & Sabinæ alterius ligna, quæ simul contuli, notam quærens, quæ unumquodque ab alio dignoscere, utpote quorum tanta sit affinitas, ut eorum trium ex monibus vicinis in urbes allata ligna nullo ex sese discrimine dignosci possint. Num in Asia apud Conicum & Iconium nullum istis frequenter incuendum occurrat. Eorum singulorum, ut periculum facerem, unumquodque gustavi, ussi, carbonem feci, sed id frustra. Cum verò in eum locum pervenissem, ubi magna horum lignorum strues asservabatur, ex foliis tantum uniuscuiusque discrimen deprehendi, quod tam exiguum est, ut vix etiam à perito lignario artifice intellosci possit. Eorum nempe tum caudex, tum rami vix penè cortice obducuntur, rubro, lemniscos longos supra se invicem iunctos diceret. Omnium autem materies intus rubet, in gyrum albiat, carbonem seu fulgurum faciunt, materies leves sunt igni expetite, quæ facilius, quàm Piceæ uruntur, cædi faciles sunt. Sed Sabinæ hæc multo magis, quam cæteræ ad testudines faciendas Turcis expetita, quod in rimas nunquam diffundatur. Hanc autem excavant, totam, ex eodem ligni fructu testudinem perficientes, mediocrem quidem illam, nostris tamen quinternis aliquantò maiorem. Plinius arborem soli Orienti, neque Launis idè celebratam tradit Brutes nomine, Cupressi fuisse similem, albicantibus ramis, odore Cedri, cum accenditur, quam ego Sabinam alteram esse interpretor. Eam fortassis, quam Theophrastus Thuiam vocavit, Dioscorides alteram Sabinam nominat. Nota certè omnes, quæ supra dictæ arbori tribuntur Brutes appellatæ, omnino cum illis conveniunt, quas ego Sabinæ alteri paulò antè tribuebam. Huius alterius Sabinæ arbores Locos iam in Europa atque aded in Gallia, multis (ut paulò infra scribam) locis videntur, in Regia potissimum Fontanabla, quam ille, qui Francisco Galliarum regi attulit, vitæ arborem cognominavit. Ex hac arbore, cum adhuc exigua admodum existeret, ramulos vulsimus: quos cum olim Renatus Bellayus Episcopus Cenomanensis, qui upicè rei herbariæ studebat, nostræ operæ accepisset, eorum alterum domi suæ consecravit, alterum verò in hortis divæ Mariæ Lutetiæ, qui usque eò excrevit, sesequæ à Solo crexit, ut proceritate longè parentem vicerit. Est & arbor alia in eisdem locis hortis regis enata, quam Plinius frumescere asseverò, cum tamen prædicto nomine (Arboris vitæ) ab eo, qui Regi donavit, appellata fuerit. Nunc videndum est an notæ huius arboris vitæ, eam eadem, quam iam in Asia, & monte Tauro observaveram, conveniant, quæ multam nostram operam Gallie horti vident. Ea rectos promerget ramos, nisi parumper ad foliorum productionem reflecteretur. Ramos mittit geniculo bene robusto artissimè caudicem am-

Cibus Tur-dorum.

Filici simili-  
folium ap-  
planatum.  
Cedrus  
maior.  
Flores caret.  
Lignum.

Icôcus.

Corticis.

Sabinæ ul-  
terius usus.

Brutes.

Thuiam  
Theophr.  
Sabinæ al-  
tera Diosc.

Locos.

Arbor vitæ.

Pithecel.

Alia de-  
scriptio

*Folia applanata.*

plectentes, in quibus folia Cupresso similia essent, nisi supra invicem fessilia, & compacti nucamento procumberent. Ramus totus cum foliis applanatus videtur esse, eo, inquam, modo, tanquam si quis studio eum praelo presserit. Arbor hæc in tantam altitudinem apud Fontanæbleum excrevit, ut quamvis nondum nonum excesserit annum, brachio tamen elato à quolibet procerò homine vix posset ad eius cacumen pertingi: Ea nondum semina prompsit. Gustata folia amara sentiuntur & odorata, maximè ad Salviam accedentia. De cortice nihil adhuc certi tradi potest, quoad in ampliori vastitate excreverit. Hæc Bellonius, quæ censuram nostram nullo modo recusant.

*Bellon. not.*

Arbor itaque vitæ postrema, quam describit Bellonius, nullas fert baccas, sed veluti parvos conda, ergo non potest esse eius Sabina altera, cui baccæ sunt: Quod, præterea scribit de sua Sabina altera folio Filicis veluti applanato, ac cætera omnia de odore, & aliis, exceptis baccis, conveniunt cum ea arbore, quæ Parisijs dicitur arbor vitæ: an extet in rerum natura talis arbor aliqua odorata, baccifera, indicent docti, nulla nobis visa, nec audita: suspicamur Bellonium ignorare quid scribat, & confunderè diversas plantas: nec existimamus eis visam arborem vitæ in horto regio, quæ nullas tulerit baccas. Capite de Arbore vitæ, huius Sabinae secunda fecimus mentionem ex Gesnero, qui etiam arborem vitæ vocat, & ex America translata, malè addens, baccam ferre, quod ex Bellonio desumptum videtur. Quæ autem Bellonius scripsit de altera Arbore vitæ, quæ Pinaster, & de impostura, nos posuimus capite de Pino Combro.

*Gesn. not.*

*Cardan. not.*

Obscurè admodum Cardanus Bellonium secutus huius arboris [Sabinae Lutétiæ Bellonij, & arboris vitæ] meminit, dicens: Est etiam Lutétiæ Sabinae genus (ut etiam Bellon. refert) quam quidam Bruton esse voluntissimam est Cupresso, ut vix ab ea distingui queat, sed baccam fert dissimilem, odoratam tamen ac nigriorem, folia Salviam olent: vnde ferunt, Tartaros spargere pulverem super cibos. Vocant ob id quidam vitæ arborem, fortè quod in contignationibus nulli vitium hoc lignum sentiat: eaque Turcæ vtuntur. Ex hoc aut Cedri genere ferè est ea planta apud Indos occidentales Cumanæ provincie, cuius tabulis si naves conficiantur, non sentiunt teredinem, malum illi regioni ingens: si arce, quæ reponuntur, omnia bene olent: quod verò mirum dictu est, edulia tantum amaroris contrahunt, ut cui ingrata reddantur.

*Sabina.*

Sabina planta est (ait Matth.) in Italia vulgaris notitia, illa scilicet quæ à Dioscoride primo generi assignatur, foliis Cupresso similis, spinosior. Verum eius folia non adeo plene virent, ut Cupressi & in acumine aculeata conspiciantur. Quod tamen sæpe peritis negotium exhibet. Cæterum non defunt, qui plantam, cuius imaginem dedimus, negent legittimam Sabinam esse, hoc, ni fallor, argumento, quod hæc baccas profert, quam in sua Diosc. non meminit. Vnde factum est, ut quidam putaverint, eam maiorem Iuniperum esse, alij verò Thuam, quam Theophrastus memorie prodidit lib. & cap. 5. de hist. pl. Verum utique meo iudicio in errore versantur. Illi quidem, quod hæc planta nec folio, nec flore, nec fructu, non materia, non odore, neque sapore, non cæteris denique notis Iuniperum referat. Hi verò, quod Thuia, ut est apud Theophrastum, nascatur apud Agnensis delubrum, atque

*Contra eos, qui Sabinam negant.*

*Iuniperum maior. Thuia.*

*Thuia negatur.*

in Cyrenensi agro, fornam Cupresso similis tamen ramis, cum foliis, caudice, fructuque: vel potius, ceu Cupressus silvestris. Præterea quod, ut idem scribit, Thuia materies omnino incorrupta perduret, nihil eius radice crispis sit, atque simulacra ex ea antiqui sculperè sint soliti, quemadmodum ex Cedro, Cupresso, Loto, & Buxo. Hæc autem arbor conos, seu galbulas non fert Cupressi modo, sed baccas: caudicè non attollitur longo, sed eo brevi contenta est; materie non constat incorrupta, solidaque, sed caducà & fungosa: non ut Thuia peculiaribus locis gaudet, sed ubique ferè locorum nascitur, ut hinc maius atque evidenti discrimen in his plantis appareat, quam ut illorum error, qui eas vnam faciunt Thuiam, plurius explodi mereatur.

Sed certe relinquitur, ut miremur eos, qui stirpem hanc, quam depictam exhibemus, veram Sabinam esse inficiantur, cum nullis careat notis ex his, quas illi Diosc. reddidit. Ea enim arbor conspicitur coactæ brevitatis, quæ in latitudinem magis effunditur, foliis Cupresso similis, spinosior tamen: quin & gravius olet, & acris, ferènsque sentitur. Atqui illud nobis obiciunt, quod Diosc. in describenda Sabina nullam baccam mentionem fecerit: id mehercule quod legatur non fecit. Sed quid dicent ii, si in quamplurimis plantis ex his etiam, quæ ab omnibus legitime habentur, plures notæ, & ex quidem præcipue, nonnunquam desiderantur: quas nimirum Dioscoridem omisisse credendum est, vel quod plantæ eæ essent aliqui vulgè cognitæ, vel quod oes earum partes non satis exploratas haberet, vel alias ob causas, quas prosequi non est hic locus, quarum omnium aliqua facile potuit esse: cur Sabinae baccas non adnotatas reliquerit. Addam & id, fortasse ex eo evenisse, quod Sabina frequenter sterilis occurrat, quam fructifera. Nam (ut equidem fatei possum) inter innumeras Sabinae plantas, quas variis in locis mihi videre contigit, tres duntaxat memini me observasse, quæ baccas ferrent, & eas quidem rubentes, ac Iuniperinis maiores. Id quod me quandoque adduxit, ut putaverim in hoc Sabinae genere marem & feminam reperiri: atque alteram raram esse in Italia quemadmodum eam quoque rarè vidimus, quam Dioscorides secundo loco representavit, Tamarici foliis similem, non autem aculeatam. Ex his igitur metud colligendum esse arbitror, hanc nostram Sabinam esse legitimum, ut quæ non solum notis Dioscoridis delineationis pulchrè respondeat, sed etiam facultatibus.

Potè Petrus Bellon. de arboribus confiteri differens, iis in præfatis, meo quidem iudicio, Sabinam admiscet, atque in ea describenda, quam secundo loco ponit Dioscorides, mihi non parum hallucinatus deprehenditur, quod constanter affirmaverit, se vidisse frequentissimum hoc Sabinae genus in Amano & Olympo Phrygiæ montibus, totà facie Iuniperum maiorem referens, magnitudine Amygdalæ arboris maioris, foliis Cupresso, per omnia similibus, baccis per maturitatem in cæruleo nigricantibus, & caudice resinam ferente. Beniam Diosc. non tradit, quæ sit huius plantæ facies, & quæ magnitudo, sed eam in foliis tantum à priori variare scriptum reliquit. Quod non alia de causa autem hunc fecisse reor, quam quod sciret, nullum veriusque esse in reliquis notis discrimen. Sed quod hanc rem turpiter confuderit Bellonius, vel ex eo manifestum esse puto, quod quam plantam nunc Dioscoridis alteram Sabinam asserit, eandem paulo post

*Sabinam vulgarem esse veram Sabinam.*

*Bacca vni bene Iuniperinis maior.*

*Sabina Tamarici foliis non aculeata, a. m. a. Bellonius et. tur.*



Id post arborem illam constituit, quam Plinius Brutam appellat, quasi Plinius non meminerit vniuersique Sabina. Quod autem idem Bellonius primum Sabinae genus, eam arborem suspicetur, quam Theophrastus Thuiam nominat, non miror: nam & alij idem sentiunt. Verum hanc opinionem improbavimus. Adhuc bacciferam Sabinaem Guilandinus si nunquam vidit, cur Fuchsius & Matthaeolum reprehendit? Matthaeolum scio ego de baccifera ramo suam pinxisse Sabinaem, nec veror quin etiam Fuchsius suam quoque ex viva planta delineari curaverit. Sed huiusce censuram inanem pronunciant Avicenna ac etiam Serapio, qui de Sabinae baccis apertissimè meminere, & in medicum vsum vertere.

Matthiolus obscurior in post. com. Ital. positis duabus figuris, dicit duas esse species, vnam sterilem magis vulgarem: alteram fructiferam in Italia raram, odore minus gravi, eiusque duas facit differentias, vni enim baccas rubras, ac Iuniperinis maiores, alteri purpureas [Turchinas.] Nos autem non intelligimus Matthiolum, cum ait baccas Sabinae rubentes, ac Iuniperinis maiores, tales enim in Sabina non observavimus & illae quas vidimus, sunt ferè concolores, & eiusdem quasi magnitudinis cum Iuniperinis, vnde minores potius dixerimus, quam maiores: ac veremur ne confundat Cedrum quibuldam dictam Lyci cum Sabina. Sed quod magis miramur in postremis comm. facit manifestè tres species.

Camerarius in Matthioli hist. Germ. duas posuit alias figuras, addens in Liguria, & in finibus Galliae iuxta Narbonam in monte Cetho inveniri Sabinaem baccis rubris, erebris, alibi ex coeruleo nigricantibus. Nos quidem non otiosi fuimus motus Cethi spectatores, sed ibi nobis sola Cedrus retulit Belloni observata, cui baccæ rubrae.

Qui Matthioli patrocinium suscepit ex Dioscorid. duplicem facit, alteram vulgatiorem folio Tamarisci, alteram folio Cupressi, quas in eo convenire dicit, quòd immortali comâ vireant, & vtraque baccas ferat nigras Iuniperinis similes: nullam enim esse quæ sterilis omnino sit, sibi persuadet, quod falsum. Eam quidem, quæ furculis feritur, rarius fructum proferre scribit. Is Sabinaem nostram vulgatiorem folio Myricæ, Sabinaem secundam folio Tamarisci vocat: Sabinaem Brunfels. Fuchsius, Dodonæus. Sabinaem minorem Gesn. hort. Savinam Lonic. Savinam marem, Sabinaem minorem Lob. Sabinaem Tamarisci similem Hist. Lugdunensis. Alteram Sabinaem nostram folio Cupressi, nominat Sabinaem primam Dioscoridis. Sabinaem maiorem. Gesn. Sab. alteram Dod. Sab. fructiferam Cast. Genuinam bacciferam atrocaruleam Lob. Sab. folio Cupressi similem Cord. in Dioscor. Cupressi similem Hist. Lugd. bacciferam Camer. seminam maiorem Tabern.

Matthiolus adhuc oppugnat Guilandinum cui Paulus Hestus patrocinatur, ita differens: Nihil mihi attulisse videtur Matthaeolus hoc in loco, quòd Guilandinus non multò antè in Theone suo circumscriptis, iis verbis: Ceterum Sabinaem, quam ego cum Plinio sentem esse auguror, ipse fructiferam cum Fuchσιο pingit: quamquam me non praterit Arabum eam re sententia. Vide quot mysteria Guilandinus arctissimis verbis cõcluserit. Sabinaem fructiferam esse negat, ductus autoritate & experientia, neque tamen interim ignorasse se, aliter sentire Mauritanæ factionis scriptores demonstrat. Matthaeolus verò Plinii nomen tempestivè praterit, & sententiam suam Avicennæ & Serapionis auctoritate stabilire cõ-

natur, ac si non apertissimè Serapio, quæ ille Sabinae fecerit.

errori suo patrocinari putat: sterdem esse Sabinaem & omni fructu carentem cap. 280. simplicis medicinae scripserit, Abhel, id est, Sabina; inquit, quæ & Brathys dicitur, non habet fructum. His calculum adiciunt quotidiana experientia, & Plinii testimonium, quibus Sabinaem semine carere li-

quidò comprobatur. Jam verò Sabinaem nullum vnquam fructum expulisse, norunt omnes, qui veram legitimamque Sabinaem terræ harentem observarunt. Reliquum est, vt quæ ab Avicenna de Sabina dicuntur, pari gravitate expendamus, quem profectò tantum abest, vt fructiferam eam esse asseruisse sentiamus, vt contra etiam affirmare non dubitemus, nusquam id apud illum toto suo volumine legi. Quod autem Matthaeolo apud ipsum imposuisse videtur, illud est, quòd cum Sabina à Mauritanis Abhel vocari apud Serapionem legisset, & Avicennam Abhel, fructum Alharar definitum esse observasset, Alharar idem esse, quod Abhel ratus, Sabinaem de Avicennæ sententia fructiferam esse voluit. Verum Avicennæ Abhel, inquit, fructus est Alharar, similis Alzarar, hoc est, Abhel fructus est Iuniperi, similis Mespilo. Cum verò paulò post Abhel duo fastigia constituit, non sanè Iuniperum describit, quam alibi sub nomine Harar, in magnam & parvam distinguit, sed vtramque Sabinaem cum Abhel confundit, haud secus, atque cap. 666. Sche-

am quoque, hoc est, Abrotanum, vel certè Absinthium aliquod rursus cum duobus Sabinae generibus gravi & pudendo errore permiscet. In similem huic lapsum Serapionem incidisse palam est, quem Matthaeolus quoque in Mespilorum historia adnotavit, quòd Sorbi titulo autor ille, omnia referat, quæ de vtroque Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Præterea si Abhel Sabinae fructus esset, turpiter admodum semetipsum Avicennæ dedisset, qui idem per idem definire instituisse. Et hæc Paulus Hestus in Apologia pro Guilandino.

Sed & Gesnero teste coll. stirp. Sabinae semina, rudimenta quædam germinum exiguum, seu flosculos subuleos ostendit, quadripartitos, albicantes.

Sabina tandem vera [vt rectè Cæsalpino videtur] arbuscula est brevis, catumine & omnibus ramis deorsum inflexis in terram, vt in quodam genere Iuniperi contingit: folia Cupressi videntur, nisi squamula auctiores essent, odore acriter fructum non vidimus: Dioscorides duas affert, vnam quam modo descripsimus, & alteram Tamarici similem.

Lobel. obseru. & Icon. Plantin. tres Sabinae figuras habent, quarum vni titulus, Sabina: Alteri, Genuina Sabina baccifera atrocarulea: Tertiæ verò, Sabina baccata altera, granitrem atro-caruleo; in montosis Calabria & Apuleia.

Monstrosi autem nobis videntur flores à Lobelio appicti: sunt enim à nobis ubique locorum & quocunque tempore, minimi lutei, & veluti Iuli in extremitatibus observati.

Ex omnibus autem huc vsque allatis colligere licet Sabinae nomen à variis de variis dici plantis. Et primò de Sabina vulgari sterili, & baccifera. Rursus de Sabina vera & baccifera Bellonii, quam confundit cum arbore vitæ. Sabinaem præterea vulgarem, arborem in maritimis nascentem Cæsalpinus dixit: Arbor vitæ etiam à quibusdam Sabina falsò putatur. Testatur Matthiolus, se vidisse, qui herbam inodoram fumerent pro Sabina,

Sabinae fecerit.

Abhel. Brathy.

Sabina legetima caret semine.

Abhel.

Alharar.

Harar.

Avicenna error Absinthium cum Sabina confundit.

Serap. error.

Sorbus.

Mespilus.

Avicenn. notatur.

Sabina Geodetura.

Sabinae tres icones Lobelii.

Lobelii icon monstruosa.

Aequicoccyus.

Sabina vulgaris.

Sabina baccifera.

Arbor vitæ.

*Cedrus*  
*Lycia sive*  
*retusa Bello-*  
*nomi*  
*Nomina*  
*linguarū.*

*Locus &*  
*tempus.*

*Vires & u-*  
*sus.*  
*ex Disj.*  
*Vlcera.*  
*Carbunculi*

*Tantum pel-*  
*lis.*

*Tempera-*  
*mentum*  
*ex Galeno.*

*Gal. taxo-*  
*nur.*

*Vulnera.*

*Putredines*

*Abstrigit.*  
*Men.*  
*movent.*

*Fetus.*

nos Muscum repentem, inquit, Tragi intelligimus. Ad extremum à nonnullis Cedrus Lycia, sive retusa Bellonij dicitur.

Sabina Latinis dicta à Sabinorum regione, in qua multum nasceretur, Græcis *ῥοδδω*, Latin. etiam Savina, Savinera, & Trago teste, Nerion, German. *Seuenbaum* / *Seuenpalmen* / Belg. *Seuenboom* / Bohem. *Blasierska smogka*, Angl. *Savin*, Gall. *Savinier*, Ital. *Sabina*, Hisp. *yerva Sabina*. Castil. & Portug. *Savina*. Arab. *Abel*, *Abbel*, seu *Alharar*. *Herbam Sabinam* Latini appellant *ῥοδδω* Græcis dictam, etiam si herba non sit, nec etiam frutex, sed iuxta ferè magnitudinis arbor.

Habemus plantam in horto Illust. Exc. Celf. Montbelgardi ex ramis à me collectis ex arbore mediocrius magnitudinis in horto ceneri mei Theobaldi Noblot, Pharmacopœi Illust. E. Celf. qui fuit aliquando hortus Medici simul ac Pharmacopœi Montbelg. Florentem sepius vidi, verum in ea nullas unquam baccas observavi. Sterilis etiam manet à me variis in locis plantata. In hortum transili Sabina ramos ex Brunicoff. Castello, ubi multis bacis gravidam observavi. In horto nostro fert etiam baccas. In Burgundia in Castello Beveuge onustam bacis multis, foliis non spinosis collegi. Habui Basileæ in horto satis magnam, interdum bacciferam: Tubingæ Sabinam vidi spontaneam cum multis bacis, foliis partim spinosis, partim non spinosis. Sabinas pulcherrimas exhibentes varias animalium figuras, alias etiam topiarias, præterea eius arbores duas magnas vidi Veronæ, nec alibi pulchriores. Apud D. Alexandrum Serratium Medicum insignem, apud quem varia & plurima scelerata erant, Ferrariæ in monasterio S. Dominici à l'Angeli, Patavij, Genevæ, & Lugduni præclaras Sabinæ plantas intuebar. Gelnoro autem Sabinas baccas profert Septembri.

Ambarum [Sabinarum] autore Dioscor. folia ulcera pascendo prosperentia sunt, & inflammationes imposita mitigant. Cum melle verò indurata, nigritias & sordes depurgant, & carbunculos circumscribunt. At cum vino pota etiam sanguinem per urinas ducunt, & foetus extrudunt. Idem faciunt etiam apposita & suffusa. Ammifcentur etiam calefacientibus unguentis, & privatim glaucino. Sabina, inquit Gal. ex numero etiam fortiter exsiccatum, idque secundum tres qualitates, quas in gustu præ se fert, similiter Cupresso, nisi quod ea & acrior est, & ut sic dixerim, magis aromatica, seu odorator. Nostra Sabina contra Galenum nobis videtur multò gravioris odoris, quàm Cupressi ac etiam ingrati. Igitur huius, quam modò dixi, qualitatis est particeps, nempe acrimonie consistentis in temperamento calido, propterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris, quàm in Cupresso. Quantum enim ipsa Cupressum superat in acrimonia, tantum ab ipso superat in adstrictione. Quod manifestum est, ex eo quod omnino calidior est Cupresso, unde etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit vulnera, ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utitur quæ illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter Cuoreffo accommodari potest, maxime ubi rebelliores fuerint & diuturniores. Nam hæc citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item solvit. Porro essentia tenuitate mensos quoque provocat, ut si quid aliud, & sanguinem, per urinas movet. Fœtum etiam vi-

ventem interficit, & mortuum eicit. Est autem hoc medicamentum tertij ordinis tum exalefacientium, tum desiccantium, ex numero eorum, quæ vel maxime tenuium sunt partium. Et hoc utique nomine unguentis indicitur, & maxime glaucino, & in multis antidotos iniicitur. Quidam verò etiam Cinnamomi vice duplum eius subiiciunt. Est enim extenuandi & digerendi facultatis, si epotum fuerit. Hæc Galenus.

Ad Plinium accedamus. Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis verò duplicato pondere eisdem affectus habere, quos Cinnamomum, traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita ulcera purgat. & Partus emortuos extrahit suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & vino pota regio morbo medetur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

Sed hæc de Sabina Tragus. Est & Sabinæ herbæ in medicandis iumentis haud contemnendus usus, eà enim purgari consueverunt iumenta. Sed prudenter medicamentis è Sabina petitis uti convenit, propter strenuas eius in exsicando & calefaciendo facultates. Folia Sabinæ herbæ in pulverem redacta, ex melle illita, fluentibus ulceribus medentur, nomas sistunt, & collectiones mitigant. Cum pinguedine verò lacti supernatante (Germani *Milchsaum* vocant) temperata scabiei capitis puerorum vnicè profunt. Sabinæ recentia folia tusa, ac phagedenis (Germani *den yorn* vocant) imposita, eas enecare dicuntur. Aqua è foliis Sabinæ destillata maculas faciei absterget, & ut quidam asserunt, vertigini conducit. Montbelgardi utuntur venatores ad curandam scabiem canum.

## SELAGO.

## CAP. XXII.

**B**RATHY Sabinæ, Cupressi folio, similis est Herba Selago appellata (inquit Plin. lib. 24. c. 11.) quæ legitur sine ferro dextra manu per tunicam, quæ (quæ M.) sinistra exiit, velut à furante, candida veste vestito, puræque (puræque Dalech.) lotis, nudis pedibus; sacro facto prius, quàm legatur, pane (ex pane Dal.) vinòque. Fertur in mappa nova. Hanc contra omnem perniciem habendam prodidit Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia sumum eius prodesse. Hucusque Plinius.

Cæterum, Selaginem quidam suspicantur Iuniperum minorem Alpinam. Non desunt quoque, qui Cedrum minorem, quæ Retusa Bellonio dicitur, Selaginem existiment. Interpres præterea Theophrasti de causis lib. 2. cap. 7. Coronopodem reddidit Selaginem. Selago tandem existimata videtur Matthiolo Muscus terrestris repens Tragi.

## DE IUNIPERO IN GENERE.

## CAP. XXIII.

**T**ECTIS (inquit Theophr.) Materia huius fabricis idonea, tum subdialibus, tum obruendis sub terram: durat enim immunis à putredine. At Macedoniæ incolæ, ne illam quidem florere arbitrantur. Nonnulli Duplicem esse dicunt, & alteram florere quidem, sed fructum non ferre: Fructus ostent-

*Temperat.*

*Cinnamomum*  
*substitu-*  
*tur.*

*Vires ex*  
*Plinio.*

*Noma.*

*Gallinarii*  
*pituita.*

*Purgat iu-*  
*menta.*

*Scabies cap-*  
*itis.*

*Phagedenis*

*Aqua ad*  
*Serragmela.*

*Canum*  
*scabiem.*

*Descriptio*

*Superfluitas*

*Vid.*

*Aequivo-*  
*ca*

*Iuniperum*  
*minor.*

*Cedrus*  
*retusa Bello-*  
*nomi.*

*Coronopus*

*Muscus*  
*terrestris*

*Testa.*

*Materia*

*Durat.*

*Duplicem*  
*Iuniperum*

*Theophr.*

*Fructus*  
*ostent-*



alterum non florere, sed protinus fructum ostendere, ut Ficum gulosos. Toto anno fructum habere videtur, quippe cum novus anni exacti fructum occupet. Nascitur hæc quidem sed non procera. Huic porro cortex sponte detrahitur, eique humor etiam in lachryma modum gignitur. Cedro Punicea excellit Iuniperus, folium eius quoque mollius nati videtur, &c.

Hæc paululum immutans Philius ita tradit: Nec Iuniperi flores. Quidam eorum duo genera tradunt. Alteram florere, nec fructum ferre. Quæ verò non florēt, ferre protinus, bacis subnatiscentibus, quæ biennio hæceant. Sed id falsum, omnibusque iis dura facies semper. Et lib. 24. c. 8. Iuniperus Cedro affinis, & eius duo genera: altera maior, altera minor. Montes amat, nec folia deidit Iuniperi: annifera habetur, novusque fructus in hac cum annotino pendet. Caritem vetustatemque non sentit. Iuniperi eadem virtus quæ Cedro, vasta hæc in Hispania, maxime, ut bacca eius. Medulla ubiqueque solidior etiam, quam Cedrus. Et hæc passim apud Plinium legimus.

Dioscoridi Iuniperus (ἀμύδι) alia parva, alia magna est. Acres autem amba, & urinam cientes & calefacientes, suffituque bectas venenatas fugantes. Fructus ipsarum alter Nucis (propter eas, legendum forte *νύκας*, id est, Fabæ, ut habet Serapio, Corni) magnitudine repentur; alter Nucis pontice æqualis, rotundus, odoratus, dulcis dum manducatur & subanarus, qui *ἀμύδις* (Iuniperi bacca) appellatur. Sed inter spuria Dioscori. Iuniperum parvam alij *αρενχίδα* vocant, alij *Μυεσθημ*, alij *αρενχίδα*, Aphr. *Ζυμψη*, Egypti *Libium*, Romani *Iuniperum*, Galli *Pinetellum*. Iuniperum magnam, alij *Cupressum aggregatum* appellant, alij *Μυεσθημ*, alij *ακατεμ*, Romani *Iuniperum*. Est autem hæc plurimis notis, similis Cupresso. Nascitur plerumque in asperis, ac maritimis locis.

Anguillara ostendit, Iuniperum Dioscoridis ac nostram, unam esse ex Cedris Theophrasti, ac in eo errasse Dioscoridem.

Cedrum magnam & Iuniperum eandem esse arborem non recentiores solum (inquit Guiliad.) sed etiam veteres quidam opinati sunt. Idem præterea Dioscoridem etiam Cedrum magnam cum Iuniperi confudisse demonstrare conatur. Ad eundem etiam modum, notante Gesnero, Cedrum Galenus Iuniperum appellat; Et è contrà: Vnde quid videri non debet Gazam *κίδων* aquid Arist. & Theophr. Iuniperum vertisse.

Paulus Hællus etiam in defensione Guiliandina, Cedros Theophrasti, esse Dioscoridis Iuniperos asserit: idque ex Plinii verbis colligi posse sentit.

Apollo sibi persuadet Cedrum Theophrasti esse fructu Iuniperino, & ex hac Cedro olim trabes, statuas, ac columnas extructas. Ita ut videatur idem ferè sentire, quod Cordus. An verò tam magnæ Iuniperi in Syria reperiantur discutendum relinquo iis, qui in Syria fuere. Clusius quidem observavit in Hispania maximas.

Ad æquivoca quod attinet: Iuniperus vulgaris bacis parvis purpureis, Cæsalpino dicitur. Iuniperus montana, & semina ab eo etiam reperta fructu flavo. Cedrus phœnicea Bellonio, quibusdam dicitur Iuniperus maior, Cæsalpino autem Iuniperus marina & Iuniperus minor Dioscoridis. Sabinam vulgarem, arborem in maritimis Dioscorides in codice Hermolai Iuniperum maiorem vocat, seu Cupressum silvestrem Theophrasti, licet ab aliis Cedrum vocari testetur. Ac contendit idem c. 53. Plinium per Oxycedrum videri intelligere Iuniperum montanam, id est, vulgarem nostram.

# IVNIPERVS VVLGARIS BAC- CIS PARVIS, PUR- pureis.



**P**LAVUMQUE Descrip-  
tento ramorū  
stipatu fuitat dū-  
taxat Iuniperus, a-  
liqua do in iusta  
magnitudinis ar-  
borea adolebit, *Candex.*  
candee tamē in  
multū crasso, cor-  
tice scabro & deci-  
duo, rubente, ma-  
terie firmā, non ni-  
hil enī subest, etē,  
maximē si siccatā  
siccit. oia. re-  
fuso grato: ramuli  
in furculos multos  
dividuntur, rami-  
cibus foliis sepe  
virentibus, aculea-  
tisque armati, ri-  
gidis, superne gracilis, inferne virentibus splen-  
didis, tardè viciā longioribus, sæpè breviori-  
bus, valdè angustis (Cæsalp. Piceæ robustiori-  
bus & magis pungentibus: ) Bacca per ramos  
sparte numerosæ, rotundæ, umbilico in tres ra-  
dios, totidem seminum loculos ostendentes, di-  
stincto donatæ, duplo maiores granis Piperis, pri-  
mū virentes, per maturitatem atroceruleæ,  
aut nigre, in quarum singulis grana tria oblon-  
ga, triangula (nonnunquam quatuor Cæsalp.)  
pulpā nonnihil ruffā, involuta, sapore acri, reli-  
noso, cum quadam dulcedine, tactu quoque vbi  
inveterarint, glutinolo & oleoso: pro flore tri-  
bus foliis minutissimis, obseptum insidet fu-  
tura bacca rudimentum, tam exiguum, ut non  
nisi à diligenter inspicenti anima invertatur, unde  
scripsit Cæsalpinus. Quæ fructum fert, non flo-  
ret.

Per se liqua similis est huic Iuniperus, quæ sæ-  
mina dici potest, flores producens plurimos, a-  
liās, quæ fons ulis, sparsos per ramulos, alias con-  
fectos, conorum exiguorum instar habentes, pur-  
purā cum croco mixto pictos, ex plurimis cor-  
pusculis rotundis, Papaveris semine minoribus,  
pulvisculo fœtinaceo fæctis compactiles, interce-  
dentibus raris quibusdam viridantibus, acuminatis  
foliis, squammatim corpuscula dicta obte-  
gentibus: Vidcas autem cum dehiscunt, effigiem  
capituli Equisei florentis, vnicuique squammatæ  
adnatis apicibus ruffis, Cæsalp. vocat flosculos  
amentaceos, exiles. Cæterū, tantum florum  
apparatum, quasi ad ostentationem compara-  
tum, nullus fructus sequitur, sed in auras abiens,  
pulvisculus vanam baccarum spem elidit.

Vulgarem itaque Iuniperum duplicem novi-  
mus, unam quidem baccas ferentem, alteram flo-  
res tantum, quam quis fœminam dixerit, ut ex  
modò dictis liquidū sit. Miramur autē diligentem  
alias Botanicum Euricium Cordum hosce flores  
non observasse: Dicit enim in Diosc. Iuniperus  
minor altera, cuius duplex genus, unū florens sine  
fructu, aliud non florens, fructum tamen ferens,  
ne flore,

*Candex.*  
*C. v. c.*  
*Macr. c.*

*Odor.*  
*Ravuli.*  
*i. h.*

*Bacca.*

*Pulpā baci.*  
*carum.*

*Flos.*

*Iuniperus*  
*semina Iun-*  
*iperus*  
*Descrip.*  
*Floris.*

*Foliola.*

*Duplex Au-*  
*torum Iun-*  
*iperus*  
*Sul-*  
*garis.*  
*Cord ta-*  
*xatur.*  
*Flos sine*  
*fructu*  
*Ernstia si-*  
*ne flore,*





rum videtur montanum nostrum sive vulgare  
intelligere.

Nomina  
linguarum

*Aperidos*, & *apudis* Græc. Latin. *Iuniperulus*,  
germ. *Wacholder* / *wacholder* / *wachol-*  
*derbaum* / *wacholderbaum* / *Brametbaum* /  
*Brametstand*. Bacca verò *apudis* Græc. germ.  
*Wacholderbeer* / *Brametbeer* / *Wacholder-*  
*beer* / Belg. *Geneuer* / *Geneuerboom*. Angl. *Ju-*  
*niper* vel *Jeniper*, *Junipertree*. Bohem. *Jalo-*  
*lovac*. Hung. *Tervifcseny*. Gall. *Genevre*. Ital.  
*Ginebre*. Portug. *Zimbro*. Arab. *Arconas*, &  
fructus *Abel*. Ital. *Ginepro*. Castil. & Hisp. *Enebro*,  
Bacca autem *Neurinas*. Serapioni, *Habagur* Hebr.  
*Rothum*.

Locus.

Elias Propheta cum Isabelis crudelitatem fu-  
gens in desertum devenisset, sub Iunipero dor-  
mivit, ut Sacra refert Scriptura. Ac ex his intel-  
ligimus Iuniperum valis desertis, altissimisque  
montibus, frigidaque, limosa & lapidosa terra,  
ut plurimum nasci; nam in eiusmodi locis, apud  
nos quoque Germanos frequentissime occurrit,  
maximè verò apud Mediomatricos, ut & in VVal-  
goia & Creichgoia, in quibus partibus perpetua  
virens comà luxuriat.

Tempus.

Maior mensis floret: post florem bacca pro-  
rumpunt exigua, virides, quæ altero demum  
anno, appetente Autumno, quod illis maturita-  
tis tempus est, æruleo tinguntur. Copiosè  
quoque provenit, teste Turnero, in Angliæ Can-  
tio, nec non in Episcopatu Duramenli & Nor-  
thumbria: In Germania quoque multis locis fre-  
quens, nullibi tamen magis, quam prope Bon-  
nam. Sed auctore Clusio, Iuniperus, cui ipsa  
pro folio est, vix totâ Lusitanâ reperitur. In  
Castella verò nova, a modum frequens est: sed  
ex præsertim, quæ excellentior & arborescens supra  
Segobiam, quâ Madremuritur, ut illic trabes &  
contignationes adium sibi incolæ fabricent: ut  
non imperit Plinius dixerit, *vassam hanc in Hi-*  
*spania nasci*. At & in Belgio, & plerisque Germa-  
niæ locis, vulgare Iuniperum in iustam ferè ar-  
boris magnitudinem excreverit observabam,  
præsertim in hortis & cultioribus locis. Iuniperus  
baccas ut Octobri, inquit Gesnerus. At Cæsal-  
pino fructus maturat anno secundo, ut ali-  
quando fructus trium annorum continentur,  
cùm is, qui maturus est, servatur ad tertij anni  
fructum nascentem. Nos verò curavimus co-  
piosè plantandam in horto E. Cels. licet abundet  
multis in locis Comitatus vicinis urbi, ut in monte  
*la Chaux*, circa *Vandoncourt* & *Blaumontiam*,  
ac alibi magna arborescentes proveniant Iunipe-  
ri, ad altitudinem duorum hominum, ac al-  
tiores, crassò caudice Nucis, ut inde cyphi tor-  
nentur. Inter Basileam & Rothum Maij princi-  
pio vidi Iuniperum florentem, flores instar nu-  
camentorum sunt minimi, ut vix appareant.  
Lugduni & Genevæ & per Alsatiam abundat. Pa-  
tavij magnam arborem vidi in horto Nobilis  
Bembi mense Ianuario.

ires & u-  
ex & ve-  
ribus.  
omachus.  
borax.  
ornina.  
rina.  
lia.  
lorum  
ceus.  
venum.  
ortes.  
amata  
belta.  
nam.

Arceuthis moderatè calefacit, & adstringit,  
stomachoque commoda est, faciens ad affectio-  
nes in thorace, tussis, inflationes, tormina [se-  
que] & bestias venenatas, si bibatur. Vinum etiam  
habet ciendi urinam, unde ruptis, convulsis, &  
ab utero strangulatis confert. Folia etiam acria  
habet, quare & imposita & pota, tum ipsa, tum  
fuccus ipsorum cum vino, ad commensus a vipe-  
ra faciunt. At cortex utilis, & cum aqua illitus,  
lepras removet. Ramenta verò ipsius ligni devo-  
rata interficiunt, Dioscorides. Ut porro vinum  
Iuniperi fieri conveniat è baccis, similiter ut è  
Tom. I.

Cedri fructu, dicitur cap. de Cedro antiquorum.

Iuniperus, Gal. de simpl. med. facul. lib. 6. teile, *Temper.*  
calida & sicca, utrinque tertij ordinis. At fructus  
similiter sicus. Verum in hoc [m. s. s. s.] piumi  
suerit ordinis.

Iuniperus vel ante cetera omnia [inquit Plin.  
varis in locis] excalefacit, extenuat, Cedro affi-  
milis. Et eius duo genera, altera maior, altera  
minor. Vtque accensa serpentes fugat. Sc-  
imen, stomachi, pectoris, lateris doloribus utile.  
Inflationes, algore &que discutit, tussis conco-  
quit & duritias, illi tumores sistit: item al-  
vum, baccis ex vino nigro potis: item ventris tu-  
more, illitis iisdè. Misceatur & antidotis oxyptoris.  
Virinas ciet. Illinitur & oculis in Epiphoris. Da-  
tat convulsis, ruptis, torminibus, vulvis, ischia-  
dicis cum vino albo potum, pilulis quaterenis, aut  
decoctis viginti in vino. Sunt qui & perungant  
corpus è semine eius in serpentiâ unctu.

Vires Iuniperi Antiquorum ante sunt positæ:  
Nunc intelligamus quid de hisce Neoterici sen-  
tiant.

Tragus inquit: Iuniperi bacca calidæ sunt in  
tertio, & sicca in primo ordine. Nemo verò uti-  
litates eius, quib. sciet, satis explicare potest. Bacca  
Iuniperi maturæ viles ad multas affectiones pro-  
sunt, meoque iudicio Pæpere salubiores. Nam  
in cibo citata stomacho frigido utiles sunt, pitui-  
tamque, quæ in illo coit, digerunt: contra in-  
flammationes [inflationes foris melius legen-  
dum] & tormina faciunt, vitia pectoris purgant,  
tussis que medentur, urinam efficaciter ducunt,  
venenique à corde repellunt. Apud Germa-  
nos singulari remedio, ad grassantia Pestilentia  
contagia depellenda utuntur. Ex semine menses  
& coxendicium viscosos humores expellunt. Et  
quid multa? ad quamplurima hæc bacca utiles  
sunt, quapropter eorum illas ad culinas vocantur,  
condientes his cibos. Dioscorides ramenta ligni  
devorata interficere scribit, quod equidem mi-  
nor. Nam lixivium è vino & cinere Iuniperi ulti-  
simum ac potum, urinam potenter trahit, ita  
quidem, ut eo remedio, multi Hydropici libera-  
ti fuerint. E' baccis Oleum pretiosissimum, & ad  
Balsamum ferè accedens elicitur. Præterea & ex  
arido ligno oleum odoratissimum ac efficacissi-  
mum, adeoque ad multa utilissimum distillatur. Mul-  
ti multa de Gummi, quod Vernix dicitur, scri-  
bunt, sed oleum Iuniperi longo illud post se,  
quod ad facultates attinet, intervallo relinquit.  
Et ut semel finiamus, facultates Iuniperi nemo facili-  
ter explicabit omnes. Vnum est, quod in Iunipero  
figiendum, & detestandum fuerit, nimirum tum-  
bra, quæ noxia est, si Virgilio credimus.

*Surgamus, solet esse gravis, tunc antibus umbra.*

Iuniperi gravis umbra nocent & frugibus umbra.

Iuniperi fructus (pergit Corn.) Officinis in usu  
sunt & rami ac virgula, & totum aded lignum:  
ad ærem. n. emendandum, incensa suffumigantur.

Addit Matthiolus: Oleum, quod ex Iuniperi ma-  
terie per descensionem, tum patitur vitreis in-  
strumentis elicitur, calidum ore contentum den-  
tium dolores mirræ mulcet, si tamen frigida  
defluxione afficiantur. Fir ex baccis hoc longè  
præstantius, odore perquam iucundo. Nolimus  
autem nos cum Matthiolo putidum & insigniter  
acre oleum Iuniperi in ore continere, quale il-  
lud, quod è lignis per descensum elicitur. Af-  
ferit Clusius Narbonenses Gallos ex Iunipe-  
ri baccis oleum expumere, quod ipsi de Ca-  
de, Hispani verò *Miera* cognominant, capitis  
scabiei, ut pecorum etiam scabiei & ul-

*Serpentes;*

*Inflationes;*  
*Alcum si-*  
*stis.*

*Venter.*  
*Oculi.*  
*Convulsio;*  
*Ischia.*

*Vires & v-*  
*sus ex*  
*Neoterici*

*Temper.*

*Ventriculi*  
*Tragi le-*  
*dio suspe-*  
*da.*

*Tormina;*  
*Pectoris Si-*  
*ria.*  
*Diuretum;*  
*Pestilentia.*

*Contra*  
*Dioc.*

*Lixivium.*

*Hydropis;*

*Oleum.*

*Imbrici*

*Lignum.*

*Oleum ex*  
*ligno &*  
*baccis.*  
*Dolor den-*  
*tium.*

*Matth. no.*

*Oleum de*  
*Cade, s. s.;*  
*Miera.*

ceribus, quibus à tonsione interdum infestantur, adprimè vitile. Perhibet Cam. ad Hist. Germ. interiora baccarum Iuniperi maioris, cum vtilitate Medicos Africanos exhibere loco Guaiaci. Medicos Africanos exhibere loco Guaiaci. Medicos Africanos exhibere loco Guaiaci.

*Guaiaco substituitur. Lues Venerea. Calculus.*

sem. Hiscæ in phiala tantum affundas Spiritus vini, quantum baccas operire valeat: sicque obturata phiala, quatuor dies stent, subinde agitata. Exactis quatuor diebus excoletur vini spiritus expressis bene baccis: aliusque recentibus baccis affusum; quatrduo tursum exacto, colato: hoc tertio iterandum: spiritus vini reserve- tur, optimè repositus: & urgente calculo huius cochlearia duo ex vino albo calidè propinentur: moxque in fenicupio, cui infusum Malux & Chamæm. li decoctum, se niboros sedeat: Illinatur subindè facies, manu aqua ros. aut vino Cretico ad arcendam lassitudinem, quoad eliciatur calculus, quod dubio procul accidit. Cavendum inter- rim, ne statim à cibo, pleno adhuc ventriculo, aut astrictà alvo fenicupium ingrediat. Ager.

*Menses.* Ad menses ciendos: R. Baccarum Iuniperi Manip. iij. contusis affunde album ghe- rosumque vinum. Coquantur ad medias. Cola- to vino adde Croci-pulverati Drach. j. hoc vi- incipiet, quo tempore expectari debent men- ses, quotidieque manè, continuatis quibusdam diebus, haustum bonum bibet. Prodest tamen prius, si necesse videbitur, Sphenam viranque aperire. Baccarum Iuniperi decocto ex aceto vi- ni rubri, vtiliter collunantur dentes dolentes. Ad diurnarum febrium rigores, R. Bacc. Iunip. Rutæ, Salviæ an. Manip. j. affunde aq. lib. 4. coq. ad tertias. duabus ante accessionem horis ieiunio ventriculo sumat Theriacæ bonæ Drach. ij. ex vino albo calente: post horam in sudatorio ex- tus penitus, papilionem, vel peripetasma subeat, affusque dicta decoctione, calculis duobus tri- busve cadentibus in pelvi, cui superstabit, toto corpore vaporem excipiat, quoad sudet, sudorè- que deterio componat se in lecto calido cooper- tus, ita fiet vt indices sensum, rigor minuat, tan- demque penitus desinat. Non est autem hoc me- dicamento prius vtendum, quam corpus antè sit ex docti Medici consilio preparatum, purga- tumque. Contra podagram, paralyfim & contra- ctiones. R. Iuniperi lignum incisum minutim abrafo cortice: in aqua coque: ac decocto in tina insideto ieiunus, purgato prius corpore. Si con- tra podagram vtens, præstiterit nondum præsen- tibus doloribus præcautionis loco vti.

*Vim diure- tica.* Vim diureticam in Iuniperi baccis (inquit Iac. Cargill.) earumque oleo in me expertus sum sa- pius manifestam, & tum ex illis paucas devoratas, tum panem huius guttula unctum euidenter vio- larum odore urinas imbuere, non secus ac Tere- binthinam vulgarem, eiusque oleum stillatium: cuius vim talem sapit pro cathedra referebat, Cl. D. D. Felix Platerus Poliater Basiliensis. Com- probatur hæc eadem baccarum vis Iuniperarum diuretica à Cl. V. D. D. Tobia Pitipachio, Pro- fessore Viennensi Excellentissimo, si cum gene- roso vino albo decoquantur, eiusque decocti singulo mane (sumpto etiam cibo aliquo) haustus calculosis propinetur. Vt autem vinum hoc cum palato gratiam ineat, huic saccharum ebi- bitus admixtum iubet.

*Ex lignis Iuniperi Montana Liquor. Cuius.* Nunc, ut nobis auctor est Cæsalpinus, ex li- gnis Iuniperi montana igne superposito liquor etiam extrahitur, qui Oleum de Iunipero voca- tur apud Meliæm, efficacissimum ad cutis infe-

ctiones & alia multa: Si hoc pro Cedria utere- mur, puto non minorem in eo efficaciam futu- ram, quam si ex magna Cedro haberemus. Ex fructibus quoque oleum extrahitur per sublima- tionem prius vino madefactis; qua operatione & aqua & Oleum elicitur: Aqua ad calculum renum & vesicæ prodest: urinam & menses elicit, singu- lis diebus pota à duabus uncias ad tres; extrahit quoque factum mortuum uncis quatuor bibita: & ad verlatur venenis: Olei efficacius ad omnia prædicta: extrinsecus quoque inungitur ad frigi- dos articulorum dolores, & tetra ulcera. Reci- pitur in aqua ardente adiectis aliis quibusdam aromatis, & pugnantibus adversus putredinem pestilentem, ut ex omni miscella aqua iterum di- stilletur, præsentaneum remedium in febre pesti- lenti, exhibitæ drachimis duabus, usque ad qua- tuor cum totidem uncias aquæ Acetose pauld an- tæ accessionem: Nam veluti fulgur propellit ab in- ternis, & dissipat malignam putredinem, nunc sudores movendo; nunc urinam copiosam, aut aliam insensibilem excretionem, repetitur ad potio ulque ad tres uncias. Ex fructibus iisdem, aut Iuniperi marini, cuius maturi sunt, vino remollitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus, utilis- simus in tempore pestis: præstervat enim, & ex pulmone ac pectore educit purulenta.

Notat tandem Hercules Saxonia, decocto Iuniperi plures uti, tanquam luis alexipharmaco, cum tamen Rondeletius Dioscoridis autoritate motus, radicis usum, tanquam veneficum, im- probet, & solos fructus admittat: Scaliger tamen contra Card. exerc. 180. ait Afros Medicos, uti hu- ius radicis decocto ad luen expugnandam fecerit, reddiditque causam, cur non sit venefica, licet Diosc. illam venenatam protulerit. Ait enim aliam esse corticis radicis facultatem, aliam verò substantiæ medullaris. Corticem verò cuius virtus recipitur in decocto, ait non esse venena- tam. Itaque si fortasse distanti fueritis his medi- camentis, quæ præstantiora putantur, Iuniperi decoctum non improbat, & si radices fue- rint suspectæ, sumantur folia & fructus, vel le- mina, si atque infusio sic: R. Fol. Iunip. Manip. vj Sem. Iunip. Manip. iij. infundantur in aq. lib. xii. bulliant ad consumptionem medietatis facta expressione fervetur Syrupus, quantitas sit Vnc. 8. cum ea vivendi ratione quæ in ligno.

Accipiendum quoque præcipit Io. de monte Exper. quantitatem Nucis Iuglandis cinetis ra- morum Iuniperi cum baccis, ponendam in lin- teolum, suspendendamque in vino, vt de ea bibat æger cum voluerit. Hocque remedio usum esse Martinum Gushertz Coloniz, qui dicit fuerit hy- dropicus, & tumidus, ac ei multum profuisse. Oleum baccarum conferte difficulter urinam reddentibus, & calculosis & Cerevisia calidà po- tissimum in balneo sumptum. Accipendas por- rò summitates Iuniperi, & coquendas in aqua, donec ea rubra omnino, reddatur tandem verò balnea in fenicupio ad umbilicum usque quoti- die, quantum fieri poterit, calidèque horis tri- bus facienda, ac si hoc ad decem dies fecerit, la- natum in à calculo.

Succus extractus è baccis Iuniperi, ad duode- cim annos servari potest (inquit Evonymi The- saurus) fuit è lico factus.

Valeat ad calculi præventionem, expertus enim est eius vsum in multis, qui antehac graviter luo- rabant, & multa prophylactica adhibuerant, à nullo tamen tantopere sunt, atque ab hoc adiuti. Calidum quidem medicamentum est, ideoque re- nes

Cedria substituitur. Lues Venerea. Calculus.

Oleum ex fructibus. Aqua ad calculos. Urina. Menses.

Arthritis. Ulcera.

Pestis.

Iunip. ma- rina.

An Iuniperi radix venenata? Rondeletius not.

Lues Venerea.

Cum cum baccis ad Hydropem.

Oleum baccarum. Urina diffi- cilis. Balneum ad calculum.

Succus baccarum.

Cathartici.



nes fortassis nimium calefacere posset, ut aliquis existimaret, sed propter parandi modum, qui calorem non nihil frangere existimatur, non nimium poterit. Pituitum in ventriculo, vel concoquit, vel consumit, vel educit, & ventriculū abstergit ac roborat. Vfus eius non tam est ad morbos præcavendos, quàm curandos. Omne genus de-

stillatione per descensum: deinde totum simul in bociam infusum destillato sursum, vel in balneo, quod tardius fit, sed pulchrius: vel in cinere, arenave, quod fit magis rufum.

Salem è baccis & ligno Juniperi, sic paravit Gesnerus. Accepi, inquit, virgulta Juniperi arida, vna cum suis baccis, in magna quantitate, & in cinerem redegi (oportet autem exatissime comburere, aliqui in magna olla figulina nova, & in qua liquor nullus antè fuerit, comburunt) cum hoc cinere fiat lixivium, cum aqua mediocriter calida: aut potest in vase ligneo cinis cum aqua relinqui, ut subsideat, ac postea aqua seorsim effundi, & cinis cum aqua turbida separari. His alia aqua affundenda, idque aliquoties, quoad nullus sapor lixivij in aquam deponatur, ac postea aqua decoctione consumenda, ad exiccationem materia, & eiusdem albedinem: odore autem refert boracem & vrinam, ac acris est, & penetrans.

E Ligno Juniperi veru factum carnes omnes, quæ in eo torrentur, odore efficit jucundo. Ad tornum denique, ad delicias, ad fuffimigia vtile lignum Juniperi. Observavi etiam in vineis Montbelgardi Palos Juniperinos multis durare annis, possimum si vratur pars, quæ in terram defoditur.

CEDRVS PHOENICEA BELLO-  
NIO, SIVE OXYCEDRVS; QVIBVS DAM  
Juniperus maior, baccis nigra, rubra.

CAP. XXIV.



**J**UNIPERO si- Descrip.  
milis Cedi\*, cu- Folia.  
iustamè folia du-  
plo sunt longio-  
ra, latiora quo-  
que, rigida, in-  
festo mucrone  
pungentia: bac-  
cæ duplo aut tri-  
plo Juniperinis  
maiores, coloris  
non ut illæ cæ-  
rulei, sed rufi,  
sapore tamen &  
odore simili.  
Clustis sic ha-  
bet: Junipero  
ferè similis est  
Oxycedrus: ma-  
gna ex parte  
contorto, ut illa,  
caudice, inter-  
Cortex.

dum etiam in arbusculam excrefcens, tenui & rufefcente cortice: folia habet Juniperi vulgaris modo pungentia, aliquantulum tamen longiora & rariora, terna semper circa ramulos simul nascentia, ut in Junipero: fructum initio viridem, deinde flavescentem, postremò cum maturuit, puniceis coloris, Juniperi fructu multò maiorem, ut interdum Avellanam magnitudine æquet, & tuberculis quibusdam, veluti squamarum rudimentis obfutum, nucleos tres aut quatuor inæquales continentem, maiores, quàm in superiore, medulla intus alba. Floret Juniperi modo, & eodem tempore utriusque fructus maturitatem adipiscitur.

Iudicium fallax, ut ita liceat dicere: Nam fru-  
ctus,

Pituita in  
Ventriculo.

Destillatio-  
nes.

Vertigo.  
Raucedo.

Colica.  
Menfes.

Syncope.  
Pessus.

Mania.  
Hydrops.

Fætor oris.  
Epilepsia.

Tremor.  
Apostema.

Veniens re-  
bus.

Theriaca  
Germano-  
rum.

Enenium.  
Oleum.

Tormina.  
Gonorrhæa.

Modus de-  
stillandi.

Resina.

er expres-  
sionem.

istule.  
Cancer.

lei præpa-  
randa mo-  
us è lignis.

Oleum è li-  
vo rectifi-  
catum.

Salem è bac-  
cis & li-  
gno.

Veru.

Deser.  
Clustis.

Folia.

Fructus.

Nuclei.

Juniperi  
maioris  
baccæ.

Cus, inquit Cordus, cum nuper in Germaniam importarentur, nonnulli etiam doctissimorum Iuniperi maioris baccas crediderunt, non animadvertentes, manifestè Authores Iunipero nigrum, Cedro verò rufum tribuere fructum. Phœniceæ Cedri (ait Bellon. arb. resinif.) meminit Plinius in Gargano monte Calabriae, cuius baccas sunt qui credant Iuniperi maioris esse, falsà quadam opinione ducti. Oxycedrus Græcis dicta. Punica Cedrus antiquum retinet nomen in Creta, quam vulgus Cedri nomine appellat. Minorem istam Cedrum Plinius Phœniceā appellat Iunipero similem: Fructus v. Cedrides, ego Cedrum acutam Phœniceam voco. Oxycedri gummi nostri falsò Sandaracham, alij verò Vernicem nominant. Ex Cedri malis Plinius posse fieri scribit, quod Cedrelæon vocat. Galeno Cedri fructus Cedris dicitur. Et: Cedrides multi Pharmacopolæ & Medici Venetiis eas maioris Iuniperi baccas esse credunt magno errore. Gummi sudat, quod vulgò Vernicem dicunt. Et Obf. Cedri phœniceæ diversæ à Cedro Lyciæ ob folia obtusa. Cedri Lyciæ dicuntur Oxycedri. Sed Bellonem sibi contradicere videbunt, qui verba modò citata diligentius examinant. Primum isthic albos carbones conspexit, ex Oxycedrorum stipitibus confatos. Qui Sarfanam Genuesi agro pervenerit, & inde ultra Vencam arcem in Marchionatu Marzano transierit; Oxycedrorum silvulam ingredietur, apud Montignosam castrum Lucenhum, non procul à mari, quorum fructus Avellanis crassitudine non cedunt. Cardanus considerare debebat Cedrelatem ab Abiete & Cedro denominationem habere (nam hæc parva Cedrus baccas fert, eam ob causam baccifera cognominatur, at altera conifera) ut nomen ipsum testatur: siquidem Elæe Abietem significat: itaque Cedretale Gallicè reddi posset Cedre sapin. Sed ipsius verba impugnabimus in nostra stirpium historia. *Hæc ubi latet?*  
 De præfenti planta tractat & Hist. Lugd. sequentibus verbis: Cedrus Lycia, quam Oxycedrum etiam appellant: Theoph. *sed elæa*, Gaza, Cedulam. Quodam tamen loco *sed elæa* pro *sed elæa* mendosè legitur, quod Gaza cum non animadvertet, Cedrias convertit, Cedrides verò multitudinis numero sunt Dioscoridi & Galeno. Oxycedri bacca. Oxycedrus, sive Cedrus Lycia, Cedro Phœnicia minor [sive Libani,] Iunipero maior. Cortice Cupressum æmulatur, ut ait Theophrast. non semine, ut, malè Plinius, Iuniperi modo. Locus Theophrasti ex integrioribus libris est emendandus: *ὁ δὲ δὲ ἡμῶν ἢ πολυμυρία, ἢ ἐπερὰ μὲν ἡ χερσὶ τῶν ἑνῶν, αὐτῶν ἢ ἀπὸ τοῦ ἡμῶν ἢ πύκνους*, id est, nodosam ambo [Iuniperus & Oxycedrus] in alas multas divisam, & distortam habent materiam, maximè verò Iuniperus cordenfium. Oxycedri fructus flavus est, Myrti magnitudine, odoratus, esu suavis, non ut Gaza convertit, odoratus, pulcher, gustuque suavis.  
 Cedridas inquit Gal. 2. alim. nominant Cedri fructum, qui colore & figurà fructui Iuniperi est similis (subflavus enim est, ac rotundus) diffidet autem ab eo acrimoniâ. Fundit gummi durum, pellucidum, Mastiches tam simile, ut hæc sèrè solà notâ internofcatur, quod Mastiche mansa in ore coit, ac spissescit: Oxycedri verò gummi in tenuissimum pulverem friatur, nec coigitur.  
 Id gummi, ut & Iuniperi, vulgus Vernicem appellat. Præterea ex Oxycedro lignis assulaum

concisus, toto Massiliensi agro pastores & rustici picis liquidæ genus, nigrum videlicet ac fœtidum liquorem oleosum eliciunt, quem suâ lingua corrupto Cedri vocabulo *Huile de Cade* nominant.

Lonicerus Cedri magnæ, parvæque, seu Oxycedri figuras, vires, usumque commiscet ac confundit.

Tenebras effudit Plinius, qui oscitans admodum Cedri differentias ex Theophrasto exscripsit. Primum contra Theophrasti sententiam scripsit minoris Cedri genera duo esse, maiorisque totidem, & Phœnicibus Cedrum minorem esse Iunipero similem. Quare Theophrastus nostro quidem iudicio considerandus dum ait, Oxycedri fructum Myrti magnitudine: illud etiam Galeni examinandum, quod dicit Cedri fructum colore & figurâ fructus Iuniperi.

Pauci admodum etiam sunt, inquit Matth. qui non putent Oxycedrum esse Iuniperum maiorem, adeò ut plerique vulgatum illam ab hac nesciant distinguere: quemadmodum & incolæ Istriæ, Cedrum minorem, sive Oxycedrum nesciunt distinguere à Iunipero.

Camerac. ad hist. germ. Matthioli posuit novam figuram, sub hoc titulo *Cederbaum*. Cedrus phœnicia addito visco ex Clusij figura. Quam figuram cap. 26. reddidit cum hac inscriptione: *Groß Weidholder / Iuniperus maior*, quam ait in Galliæ Provincia vocati *Cade*, & præbere liquorem, *Oleum de Cade* nominatum. Scilicet quæ dicit maiorem Iuniperum, ab Arabibus *Harar*: cum tamen *Cade* nihil aliud sit, quam Oxycedrus. Existimo igitur Camerarium ponere duas figuras unius plantæ, cur verò id fecerit nescio. Matthiolus nullam posuerat nomine Iuniperi maioris: nec ipse Camerarius discrimen ostendit, inter eam, & Matthioli Cedrum phœnicæam.

Guilandinus testatur Cedrum simpliciter dictam, quam & *Oxycedrus* vocant, Iuniperum, Oxycedrum, & Cedrum quandoque absolute appellari, eandemque esse cum Cedro magna permixtis existimari.

Nunc, quod Amatus perhibet, ex liquore Cedri arboris oleum paratur, quod Hispanis *Mera* dicitur, & Iuniperi oleum appellant: sed non sine errore, quum arbor, ex qua *Meram* colligunt, Cedrus sit.

Erravit Dioscorides, inquit Anguill. vocando Cedros Theophrasti Iuniperos, & idèd Iuniperi Dioscoridis sunt Cedri Theophrasti: ac si hodie etiam Cedrus dicitur *Ginepro*. Nicander etiam fructum Cedri Iuniperum vocat.

Huius resinam, scribit Gesn. de horto Sandaracham vulgò appellari. Dicitur Cedrus minor, Cedrus phœnicia Bellonio. Sed Iunipero similis (ut vult Dodon.) Oxycedrus, quæ & minor Cedrus dicitur. Huius duo genera, Theophrasto & Plinio authoribus, Lycia videlicet & Phœnicæa. Phœnicæa Cedrus, quæ & Oxycedrus, *ὀξυῆς* est ac *ὀξυῆς* est. Oxycedrum Theophrasti & Plinij, sive Cedrum phœnicæam *Gros Cade* Provin dici tradit.

Lob. & Pena Adv. Oxyarceuthin, sive acutum Iuniperum, Iuniperum maiorem dicunt in galloprovincia *Cade*. Obf. & Ic. Pl. Iuniperus maior Montpellier. Cedrus phœnicæa Matth. Ital. Cedro minore.

Theophr. hunc fruticem (dicit Clus. in Hist.) *thia*, Iuniperi *ὀξυῆς* est appellat, & *ὀξυῆς* est. Plin. Oxycedrum & Cedrum Lyciam. Hispani à Iunipero non discernunt, sed eodem vocabulo *Enebro* vocant.

Cedrus phœnicæa. Bellonij Iunip. maior non est.

Cedrus minor. Cedrus acuta Phœnicæa. Vernix falsò. Cedrelæon. Error Medicorum Venetorum.

Cedrus Lyciæ non est. Bellonij sibi contrarius.

Cardanus taxatur.

xidetes Cedrus. Theoph. corrig.

Oxycedrus.

Plinij error Theoph. emendatur.

Gaza error.

Cedridas quid.

Gummi.

Vernix.

Huile de Cade.

Lonice. error.

Plinij error.

Oxycedrus Iuniperus maior.

viscum.

Cade. Oleum de Cade.

Camerac. nate.

Oxycedrus.

Mera Hispanorum.

Dioscor. repreh.

Cedrus minor. Cedrus phœnicæa Bellonio.

Cedrus Lyciæ & Phœnicæa.

Cade prævin.

Oxyarceuthin.

Oxycedrum.



# LIBER IX.

cant, Narb. Cade, Oleum eius de Cade, Hispan. Mica.

Calsalpino Iuniperi alterum genus in maritimis, fructu Nucis Avellanae magnitudine, in maturitate flavo, magna ex parte crassius, quam Iuniperus montana vulgatis. Dioscorides Iuniperum minore vocat, fructu Avellanae magnitudine.

Goropius Cedros minores Iuniperinis cognatas statuit. Tabernaemont. Cedrum Phoeniceam Matthioli dicit: Cederbaum aus Phoenicia. Idem rursus Iuniperum maiorem Germanicam, groß Teusch Wechholder / ex qua in Gallia oleum de Cade, & Gummi Sandarach, aut vernix. Existimamus Compilatores ponere duas figuras vnius plantae, ac duas historias: ille etiam non demonstrat ubi viderit, nec diligenter describit aut discrimen tradit.

Lacuna tandem appellatur Cedrus minor, quae provenit in quibusdam locis Italiae in montibus similis Iunipero, fructu tamen rubro maiore. Errant, inquit, qui Iuniperum maiorem putant.

Provenientem observavit Clusius plerisque Hispaniae, & Narbonensis Galliae asperis locis. Nusquam autem maiorem se vidisse meminit, quam supra Segobiam, & Guadarama; itinere Madritiano, ubi in procerâ altitudinem, cum crassitudine corporis humani truncum aequante, excrevit.

Ego verò Oxycedri Bellonii baccas accepi à fratre Calparo Bauh. nomine Iuniperi maioris, quas in horto Ill. E. C. Montbelgardi seminavi: Ea mihi primum visa fuerat Monspelij, ubi eo modo abundat, quo Iuniperus vulgaris circa Basileam, & Montbelgardum, quam ibi non vidi. Monspelio verò nobis delata arbor, & plantata Montbelgardi in horto Ill. C. VV. baccis toto anno grauida.

Ex trunco Iuniperi, annotante Clusio, adium trabes & contiguationes Hispaniae incolae faciunt. Addit praeterea ex eo fieri oleum, quod Narbonenses Huile de Cade appellant, capitis scabiei, pectorumque scabiei & ulceribus, quibus à tonsura nonnunquam infestantur, adprimè utile. Id Oleum Cedrix simile est. Calsalpino ex fructibus Iuniperi maioris, cum maturi sunt, vino remollitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus, utilissimus: utpote qui ex pulmone & pectore educit purulentia: ac tempore pestis praeservatur loco esse potest.

## VISCUM OXYCEDRI.

IN Hispania inquit Clusius in Oxycedri ramis mense Octobri, observabam plantulam, digitulolongitudine, instar visci, ramosam, geniculatam, viridem, interdum flavescentem, ramulis Myrica, recenter enatis, sive eius plantae, quam nonnulli Salicorniam, Mompeliani sempervivum marinum vocant, sed paullo minoribus constanter, quorum extremis interdum veluti fructus inhæret, Musci, qui in arboribus, aut saxis nascitur, fructui persimilis; acido autem & perquam adstringente gustu tota plantula haec est, Oxycedro, veluti Viscum in aliis arboribus, innascens.

Caeter. apud Matth. Germ. Visci genus, in Cedro phoenicea, cuius meminit Clusius.

## VERNIX SIVE SANDARACHA Arabum.

Vernix in stiracis longas densatur in pallido flavescetes, Succini colore & perspicuitate,

fragiles, quæque dentibus friata æquidistanti nudo coeunt, sapore nullo evidente, & adoleretur, resinoso.

Cæterum, Arabes Gandarac & Sandarach, vernicem vocant, & exponunt esse gammæ boris Iuniperi, simile Carabe. Quare diligenter observandum est his, qui illos sequuntur, ut pro salutari medicamento, Sandaracham Græcorum pernititolium pharmacum agnoscant. Deinde ex vernice Iuniperi lachryma etiam factitiam vernicem cum Lini seminis oleo fieri dicunt, & sic Succinum cum Iuniperi lachryma confundunt. Cörn. in Diosc. Proferit ex se Iuniperus gummi Mastiche simile, quod & Sandaracham & Vernicem appellant. Hoc primum cum metitur, candido ipsendescit colore, senescens vero in rufum abit. Porro haud ignorandum est, hanc Arabum Sandaracham à Dioscoridis Sandaracha, perquam longè dissidere. Namque Græcis Sandaracha est fossilis. Verum hæc Sandarachæ nomenclatio, in gummi Iuniperi injecta, fuit à Medicis, qui Mauritanos secuti, Sandarach Arabicum nomen (sic enim Arabes Iuniperi gummi vocant) in Sandaracham converterunt. Quamobrem illud adnotandum esse videtur, quod ubi Arabes, Sandaracham medicamentis inferendam esse præcipiunt, Gummi Iuniperi immiscendum intelligunt, ubi verò à Græcis de Sandaracha fit mentio, fossilis illa, ruffa & Anipigmento similis, est intelligenda: non desunt tamen, qui velint Mauritanorum Sandaracham, non esse gummi Iuniperi, sed Oxycedri. Quorum equidem iudicio censet Matthiolus inscribendum: etenim pauci admodum sunt, qui non putent Oxycedrum esse Iuniperum maiorem: aded ut plerique vulgare, illam ab hac nesciant distinguere.

Tradit Plin. lib. 13. cap. 11. plura gummi generaj ubi Gummi Iuniperinum ad nihil vile esse scribit. Cuius tamen frequens usus in medicamentis contrarium indicat, & quod hoc sincero & oleo ex lini semine pressio fit vernix liquidus, cuius est usus ad illustrandas picturas, & ad nitorem ferri conciliandum: utilis etiam ad ambusta, est præcipuus ad dolores, & tumores hæmorrhoidum. Græce dicitur κόκκος ἀγνός, Lat. gummi Iuniperi; Mauritanis Sandarach, Halis gomma de Ginepro, Germ. Vernix / Hilp. Vernix, Gall. Vernix.

Ex Cedro phoenicea gummi exsudat: durum perspicuum, ut Mastiche (Nostris, inquit Bellon. de consil. falsè Sandaracham [Græcorum puta] alii vernicem nominant) quibus tanta inter se affinitas est, ut si cõmixta simul essent, vix discernentur, nisi hæc nota ab eo deprehendas Mastichen, quod Mastiche cõmanducata ore coit, gummi autem Cedri diffunditur & in partes tenuissimas redigitur, quod in ore amplius non coit.

Gummi Mastiche simile, quod eo Iunipero fluit, & Vernix dicitur, aut Sandarach Arabicæ, vocamus, inquit Lacuna, vulgò in Castillia Grassa.

Gummi Oxycedri, ut & Iuniperi, vulgus Vernicem appellat, Hist. Lugd. Iuniperus (aut Calsalp.) tenuem lachrymam fundit, resinosa, Vernicem vulgo appellant, fabris & pictoribus utilem ad tinctoria cum oleo. Sed quàm bene hi sentiant, considerandum proponimus. Siquidem opinionem hanc de Vernice pictorum, refutata videtur Cornarius, cuius verba antè posuimus.

A quamplurimis autem Vernix, sive Sandarach æquivoce Arabum, & gummi Iuniperi arboris, de una eademque re & habetur & dicitur. Sicut & Succinum Cornario, dum dicit: In Curiensis liticoris tractu, maxime tamen in Dantiaca Prussia urbes

Obj. 50.

Sandaracha Vernix Arab.

Sandaracha Diosc. alia Sandarachæ Arabum.

Sandarax.

Sandaracha Arab. quibusdam Oxycedri Gummi.

Vernix Gummi Iuniperi, quoniam nullum existimet Plin.

Nomina linguarum.

Cedrus Phoenicea.

Sandaracha Vernix.

Sandaracha Arabum.

Græci Mastichen agnoscunt.

Grassa Lacuna. Vernix.

Error multorum.

Vires & v.  
sus.  
Destillatio-  
nes.  
Menstrum  
profluvia.  
Animalia  
ventru.  
Nervorum  
resolutio.  
Excretionis  
sanguinis.  
Hamorrhoi-  
des.  
Fistula.  
Dentes.

Hamorrhoi-  
des natus.  
Vermis.

succinum cum Lini semine, videlicet eius oleo, in id, quod Vernicem, sive Verriginem vocant, non pictoribus & multis opificibus familiarem, & quæ Bituminis usum hodie in plerisque locis præbet, apparatus. Sandaracha destillationes suspendit (Serapionis est oratio) mensum profluvia sistit, sinus exsiccat immixtus, haustus vero pituitam, quæ ventriculo & intestinis hæserit: tinea & cætera ventris animalia necat: nervorum resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur: capitis destillationes suffusa diffundit: idem exceptus sanguinis excretionis supprimit, & hamorrhoides fluentes sistit: additum rosaceo, tum myrtino sedis rimas coarctet. & hiantibus frigore manuum, pedumque fissuris illitu succurrit. In summa calfacit & siccit primo recessu. Sandaracha (pergit Matth.) sicca proptertate quadam facit ad dentium dolorem. Initiat carbonibus, sumisquæ per siphunculum excipit dens malè affectus. Vel eius decocto calido ex aceto os colluitur. Vel æ. Rosæ Chamæ. Oregan. an. Manip. sem. Verricis sicca drach. ij. coquantur in mensura vna vini dimidia aceti, ad tertias, Excolati liquoris scoblear vnum ore tonnetur caldum, subinde expuendum, de quoque continuatis vicibus iterandum. Vel Recip. Vinum Malvaticum, quod chalybem candentem restinxerit, hinc tantandem affunde spiritus vini, verricis sicca pulveratæ parum adde. Hæc miscella calida dolentem dentem foveto. Efficacius tamen ad prædictæ oleum è gummi stillatum. Sicca Vernix cum albumine ovi mixta, fronti & temporibus indacta, hamorrhagiam ratiū sistit. Gum albo ovi & Thure ventriculo inposita, vomitum compescit, alvi quæ profluvium.


## IVNIPERVS MAXIMA ILLY.

R. I. C. A.

## CAP. XXV.

Iuniperus  
isriensis.

Iunip.  
lycia ma-  
xima.



Lugd. Iuniperus maior.

IVNIPERIS-  
Iquint Loh. &  
Pera Adv. Ex I-  
stria quadam habuimus plantas, non dispares fronde & figura Oxycanthidi, sive aculei Junipero, sed fructus erat teres, oblongior, medioctis Oliva par. Iisdem in Obi. & Ic. Pl. Iuniperus maxima Illyrica, exrulea bacca, videtur. Discordis maior Iuniperus, aut congener. Tabern. Iuniperus maior Illyrica. Hist.

## CEDRVS LYCIA RETVSA

BELLONIO DICTA.

## CAP. XXVI.

Descript.

CEDRVS Lycia in monte Cethi ipsi observata, arbor est pumila, terebinthalis, nec, an



Cupressina: in ramulorum extremitate bacce parve etiam cum conis Cupressinos tuberculis nonnullis quodammodo amulantes, odore bacæarum Juniperi resinoso, acri cum quadam amaritudine: quæ ubi adoluerunt colore phœniceo rubent, magnitudine interdum ad Oxycedi baccas accedentes, à quibus sicca vix dignoscantur, nisi abesse lineæ triquetra, quæ in Oxycedris pulchre conspicitur: nucleos, seu granaria continens parva, striata, resinosa, in quibus medulla alba, Oryze quodammodo similis: in Oxycedris autem terni esse solent nuclei maiores.

Descriptio Celsij videtur nobis digna, quæ hic ponatur, quæ eiusmodi est: Iuniperus, quam nunc jorem appeio, frutex est humanam altitudinem raro superans; caudice contorto, non recto, multis ramis prædito, scabro cortice: folia habet carnosa, & ex continua quaternorum foliorum mutuo connexorum serie composita, quemadmodum Cupressus: flores Iunipero vulgari, & Oxycedo similes, flauos, sed extremis foliis insidentes, utriusque Cupressi & Thuæ: quibus succedit fructus bacæarum magnitudine Myrti, rotundus, primum viridis, deinde ad phœniceum colorem tendens, qui maturitate non nihil mollescit, sapore & odore Iuniperi bacis simili, qui terria, aut quaterna, vel etiam plura grana oblonga & striata habet, medullam albam & resinam olentem continens. Vere floret, fructumque diu retinet, antequam matureseat, uti Iuniperus. Primum semine natus hic frutex, & adhuc tener, folia habet omnino dissimilia, utpote quæ alterius Iuniperi folia æmulentur, nisi breviora & patuliora molliora essent: cum vero iam tertium, aut quartum annum attigit, rotunda & cupressæ folia efformare incipit, vs inferiores rami pungentibus & acutis foliis, summi vero obtusis & rotundis onuli interdum conspiciantur. Quam metamorphosin nisi quis diligehter obseruaverit, facile in errorem induci possit, ut credat adolefcentem à iam adultæ diuersam plantam esse.

Ceterum hæc Cedrus interdum spinosa est, qualem Matthioli pingit: quæ doque non spinosa. Nos ramum habemus unum cum, alterum vero sine spinis. Scribit Bellon. de cons. Lyciam Cedrum plerisque eam, quam Theoph. Thui appellat, existimare: se vero Cedrum Lyciam rectius vocare maluisse, propter folia dubio procul obtula. Miraculum inquit, Pharmacopæorum & Medicorum Epidauri incitiam, qui cum verè

alibi maior: scit: Cortice subru-  
bro, odore Cu-  
pressi, grato: sa-  
pore adtingen-  
te amarefcente  
cum acrimonia,  
lentis & flexili-  
bus ramis. Fo-  
lia cupressinas si-  
milis, ut nihil li-  
milis, vel Sabinæ,  
interdum longiuscula, aculeata, ceu Iuniperi  
vulgaris: nonnunquam utriusque generis, in  
eodem ramulo  
folia videas: ut  
plurimum tamè

Bacca.

Odor.

Nuclei.

Medulla.

Classi de-  
scrip.Iuniperus  
maior Cla-  
ssis

Caudex.

Cortex.

Flores.

Fructus.

Sapor &amp; odor.

Grana.

Medulla.

Tempus.

Folia.

Adula

plantæ m-

tamapho-

fir.

Spinæ

Cedrus

Lycia

Theoph.

Error

rorum.

verè



verâ Sabinâ careant, in Officiis pro Sabina utuntur, quo errore video magnam Græciæ partem, Illyriæ, Epyri, atque etiam Venetiæ ipsas infestari. Circa Massiliam vulgus *Morveine* vocat, Avinionenses *Decade Serbin*, apud Sirponte verò versus Massiliam, *Cotranum* voce Arabica appellatur. Putaverit fortè Bellon. Cedrum Lyciam, quam retusam vocat, Plinio *Selaginem* dictam. At Theophrasti interpretis *Selaginem* pro *Coronopode* vertit Cordus aliquando cum eum comitaretur & Lyciam Cedrum offendissent Thysiam esse coniecit, atque cum amicis ramos impetiretur, Lyciæ offerre asserbat.

Idem Obs. Cedrum parvam folio retuso nominat, ac alibi eam tradit nomine Cedrorum parvarum Lyciarum, folio pungente, quæ Græcis dicantur *Oxycedri*, quibus contrariè sint Cedri phœniceæ, quæ folia habeant retula. Sed videant lectores, quomodo suspensus oblitus à contrarietate eximi possit Bellonius.

Suspiciamus quoque Matthiolum non bene distinxisse Sabinam à Lycia Cedro, sed cum ea miscuisse, dicit enim Lyciam vocatam ab illo, qui Moraviæ attulit Cedrus. Deinde tribuit uni Sabinæ, in post. foliis. com. Ital. baccas rubentes. Hinc fortè Durantes occasionem lapsus, quòd *Abies* vocatur, Sabinam fructiferam appellavit. Ab eodem verò scilicet Castore Dur. duæ *Isones* vnius plantæ exhibentur, meliorem autem eam censemus, cui titulus *Sabina fructifera*.

An Anguill. Sabina secunda in Slavonia incolis *Smyrichi Gluchi*.

Dodonæo hæc *Oxycedrus Lycia* dicitur. Altera humilis, Cedrus Lycia ex retuso folio, *Abies* Theoph. Plinio similiter Lycia Cedrus dicitur. Sicut qui & *Sabina*, sive Thymum esse existimant: sed Thymum auctore Theoph. non modo caudice, foliis & ramis, sed & fructu Cupressi similis.

Gesnero de hort. Cedri species altera, Cedrum Lycia Bellonio.

Cedrus Lycia Adv. iamdiu Lutetiz visa in quibusdam hortis, folio Iuniperi multo minore, ad Sabinam accedente, baccâ phœniceæ minore: videretur Bellonij Sabina altera, nisi Lob. Obs. pro ea plantam pingeret, quæ non fert baccas, ac etiam sua non bene scripta fateatur dum aliter legi vult. Qui fuerit Lutetiz, rem perpendat.

Lob. & Pena Adv. & Icon. Plant. Sabina baccata. Obs. & Icon. Plant. Cedrus phœnicea altera Plinij & Theoph. *Oxycedrus folio Cupressi*, aut Sabina maior *Monspeliensis*. Item Obs. & Icon. Plant. Cedrus phœnicea media, Iuniperus maior, folio Cupressi, inter notha Diofcoridis Clusio. Hæc superiori planè similis, sed omnia longè minora. In adversariis nostris Sabinam baccatam dixeramus: meliùs tamen quadrare videtur cum altera Cedro minori Theoph. Meo tempore *Mespeliensis* vocabatur *Oxycedrus folio Cupressi*. 3. Cedrus phœnicea minor, eodem modo fructifera.

Lobel. in Adv. utrumque genus foliorum pingit, quamvis non in omnibus placeat eius figura. Clusius unicam tradit speciem. Testis est C. Bauh. Plantinum duas habere figuras unius plantæ, nempe Sabinæ bacciferæ & Cedri phœniceæ mediæ. Illi verò quam facit Cedrum phœniceam alteram, multo maior est, potissimum fructu, & longè etiam amplexor, ea quam habeo, foliis non ut *Monspeliensis* ex virore luteis, sed ex virore nigricantibus. Fructus etiam triplo *Monspeliensis* maior.

Tom. I.

Iuniperi duo genera veteres constituunt maius & minus. Dioscor. unius fructum Nucis Iuglandis magnitudine interdum augeri: alterius verò Nucem ponticam aquare ait: cum tamen reliqui Iuniperi fructum non maiorem, quam Myrto tribuant: sed nec ipse cap. de Cedro. Convenit optimè hic frutex cum Iunipero maiore Dioscori disinter spuria reiecto & dicto. Iuniperus maior aliquibus silvestris Cupressus. Nisi quis fortè ad Cedrum minorem alteram, quam Theoph. & Plinius phœniceam vocari scribunt, referre malit. Nonnulli ex Neoterics Sabina baccifera nomine appellant, cum tamen à Sabinâ multum differat odore & forma. Sunt qui *Oxycedrum folio Sabina* appellant. Galli Bellonij teste *Serbin*. Quam alii pro Cedro Lycia exhibent, meo iudicio [Clusij] nihil aliud est, quam novella Iuniperi maioris, sive Cedri minoris phœniceæ planta, quæ baccas proferre non solet, donec Tamaricis, sive Cupressi folia contraxerit, licet non desint, qui quantum Thuiæ genus ex ea scire non vereantur. Hispani à Iunipero non discernunt, sed eodem vocabulo *Enebro* vocant.

Camer. ad Hist. Matth. ponit novam figuram, sub titulo *Cedrobaum*. Cedrus Lycia foliis cupressinis non spinosis: Matthioli autem erat cum omnibus foliis spinosis. Tab. Ic. & Hist. videtur nobis unius plantæ duas ponere figuras, unam sub Cedro Phœnicea, & alteram sub Sabina minima maiore, quamvis descriptio variet.

Frater C. Bauh. mihi Patavio ex horto Muzinigi ramum attulit hoc nomine, Sabina baccifera quibusdam, Cedrus Guilandino: in eodem ramo folia Cupressina retusa, & Iuniperina aculeata. *Monspeliensis* dum essem, imperiti quidam Sabinam vocabant.

Hist. Lugd. Cedrum tertiam, raram sanè & egregiam plantam, Matthiolo in Moraviæ montibus nascentem, quidam Thuiam Massiliensium esse putant, negligentius depictam.

Bellonio circa Massiliam affatim provenire dicitur, quemadmodum & apud Avinionenses apud quos frequentissima est. Clusio autem nascitur in Tyrtheni maritimis, veluti inter Calpen & Malacam Bæticæ oræ maritimæ, & Gallicitem Narbonensis. Semina mihi Patavio à fratre C. Bauh. missa, terra mandavi in horto Ill. C. V. Vitt. Oberavii in Italia Bononiæ baccis gravidam mense Aprilis in horto Nobilis di Gonzadinis, maiorem *Monspeliacâ* quam *Monspelij* agens repeti in monte Cetho, mense Aprilis baccis cætu conis onustam.

## IUNIPERVS ALPINA.

## CAP. XXVII.

EX Delphinatu olim Lugdunum mihi allatus. Est Iuniperi Alpinae ramus (quam quidam Selaginem existimabant) rugulo, nigricanteque, cortice amictus, multis adnatis furculis fistulis, tamque densis foliorum agmine stipatus, ut vix folia ramuli possint conspici. Sunt autem ea breviora, latioraque, quam in Iunipero vulgari, supra viridantia, infra glauca, baccæ non minus numerozæ, quam in vulgari, eisque pares, per maturitatem item ex nigro glauca.

Nobis ut videtur eam Clusius in Pannon. & post. Hist. sequentibus depingit, ac describit: Eleganter, inquit, Iuniperum pungentibus foliis

Iuniperus maior.

Cupressi filio. Cedrus minor. Sabina baccifera. Oxycedrus.

Cedrus Lycia quibusdam.

Thuiæ.

Enebro. Hist.

Cedrus Lycia Matth.

Sabina baccifera. quorundam. Cedrus Guiland. Sabina.

Thuiæ Massiliens.

Locus & tempus.

Locus.

Selago.

Descriptio.

Folia.

Bacca.

Descriptio  
Clusii.

Rami.

Folia.

Color.

Flor.

Fructus.

Locus.

Facultas.



lia, æqualiter sepe patentia, ut in vulgari, ærùm  
lariora, breviora, crassiora, nec minùs, quàm illa,  
pungentia: colore intèus ex cæruleo candican-  
te, extèrus viridi: florem non conspexi: fru-  
ctum autem in ramulis gestat vulgari similem,  
paulo tamen (ut mihi quidem videbatur) longio-  
rem, antè quàm plenam maturitatem consequa-  
tur inde, ubi maturuit, nigrum, eiusdemque  
cum illo saporis. Crescit in scopulis *Syrrens-*  
*stein & Eschen* quibus dunderat locis invenie-  
bam Augusto mense pauculas stirpes fructu ma-  
turo & immaturo onustas. Gustus autem indica-  
bat, facultates à vulgari non dissimiles possidere.  
Hacenus Clus.

# ETTALCHE.

CAP. XXVIII.

Sangu.  
Lignum  
Violaceum.

Junip. ma-  
ior.

Harar.  
Ettalch.

Guaiaco  
succedat.  
Scalig. no-  
tatur.

ARbor non est magna, spinosa, foliis Juniperi,  
quæ gummi simile Masticht emittit: eo A-  
fricani adulterant Mastichten, quia odore, & non  
nihil colore Mastichten refert. In Nymidia li-  
gnum album, in Lybia violaceum & nigerrimum,  
in Æthiopia nigerrimum, quod vocant  
Itali *Sangu*, ex quibus parant instrumenta musica.  
Violaceum lignum est in usu inter Medicos, ad  
curandum morbum Neapolitanum, ut refert Leo  
Afric. lib. 9.

Eiusdem meminisse Scalig. videtur exerc. 181.  
part. 19. his verbis: Grandiorem Juniperum, quæ  
Cedrum maxime æmulatur, *Harar* vocant Ara-  
bes, Afri nominant *Ettalch*. Eius medulla in Nu-  
midia candida, in Æthiopia nigra, in Lybia pur-  
purea: quæ in scobem comminuta dicuntur Afri  
Medici felicissimo successu; vice Guaiaci ad mor-  
bum Indicum profligandum uti. Nimium autem  
nostro quidem iudicio, obscure loquitur Scali-  
ger, non enim constat ex verbis ipsius, quàm ar-  
boris intelligat, cum eam non describat.

Hæc eadem arbor apud Hist. Lugd. ex Scalige-  
ro grandior Juniperus dicitur, *Harar* Arabibus,  
Aphris *Ettalch*: Ea tamen in descriptione novæ  
partis Africae *Ettalch* se legisse ait, sibi que proflus  
videri esse *Oxycedrum*: ac meminisse eius The-  
vætum sub nomine arboris *Elabehen* quæ in insula  
Ciconæ provenit valde spinosa & Junipero simi-  
lis.

Non porro inciciasimus, si nonnulli statue-  
re velint, hæc nostram arborem eandem fortassis

in Austriacarum  
Alpium quibus-  
dam iugis mihi  
primùm obser-  
vatam hic ad-  
iungam:

Cubitale altitudinem ea  
non excedit, sed  
depressa est, &  
quasi humi spar-  
gitur, multoque  
crassioribus &  
brevioribus con-  
stat ramis, quàm  
vulgaris, levis  
etiam fractique  
contumacibus,  
& contortis: ten-  
ellos ramos  
ambiunt terna fo-

esse cum Hermolai in Diosc. lib. 1. cap. 108. *Capida*, *Ad Capida*  
arbore Junipero virtute simili, quàm à Catone *Hermol.*  
ita dictam invenit ad locum movendum: nec  
quid sit dicere coniectura potest.

# LIGNVM EXOTICVM ANO- NYMVM.

CAP. XXIX.

ANNO à nato Christo 1661. mittebat ad Clu-  
sium, Petrus Garetus Jacobi frater ligni eu-  
Descriptionis



iusdam fragmen-  
tum pedalis lon-  
gitudinis, crassum  
in ambitu uncias  
penè tredecim,  
cuiusque diame-  
ter uncia quatuor  
cum semisse: con-  
tortum sive tor-  
tuosum, satis cras-  
so, lævi tamen,  
cortice tectum,  
sed qui totus res-  
ina cuiusdam sub-  
flavi coloris gru-  
nibus, quasi tessella-  
tim dispositis, ef-  
fret oblitus, quæ o-  
doris quidem, si i-  
gni admoveatur,  
non inuicundi, &  
qui Mastichen re-

doleret, digitis autem nonnihil attrita, valde  
friabilis esset. Ligni materies gravis, dura, firma,  
& candicans. *Cortex.* *Odor.* *Materies.*

Cæterum à Cheirurgo, qui stagmentum attu-  
lerat, intelligebat, arborem, ex qua resectum  
fuerat, non esse proceram, sed ad octo circiter  
pedum altitudinem assurgere, latèque sese in  
multos ramos spinosos spargere, & folia habere  
instar foliorum spinæ appendicis dissecta, magis  
tamen virentia, & ad foliorum Rutæ colorem  
accedentia. Nullius autem usus apud incolas esse  
hanc arborem arbitrat, nisi quod crassiores il-  
lius ramos ad quinque pedum longitudinem re-  
sectos, viginti, aut plures coniunctim in terram  
figebant, deinde eos, subiectis fistilibus incen-  
debant ad refinam ignis calore liquecentem &  
diffluentem excipiendum, quæ picis vice suas  
cymbas illinerent & stiparent. *Arboris des-  
crip.* *Folia.* *vsus.* *Refina.*

Crescebat autem ea arbor, referente Cheirur-  
go, in ea America parte, quæ *Punta el Rey* nuncu-  
patur. *Locus.*

An, porro affinis arbori *Ettalch* in Africa na-  
scenti, cuius meminit Ioannes Leo lib. 9. Descri-  
ptionis Africae? Verùm & arboris magnitudo, &  
foliorum forma refragati videntur, nisi Cheirur-  
gus suæ arboris notas rectè exprimere non qui-  
verit. *An Ettalch.*

# THVS.

CAP. XXX.

PRÆMISSIS, more nostro, notiori-  
bus nobis, Abiete, Piceâ, Taxo, Pino, Lari-  
co, Cedro, Cupressu, Sabinâ, & Junipero, ad  
alia transcendendum, exotica scilicet, quæ etiam  
Descriptionis





resinā vel gummi in se habent, Thus, Sarcocolam, Myrrhā, Staeten, Carpinum, Bdellium, Benioinū, Ambaram, Styracem, & alia quādam his inferenda.

Sicca autem, at pinguior tamē est Thuris lachryma, quā Mastiche, statimque in luculentam, pertinacemque flammam exardet, odore multo imbecilliore, sed nihil per incendium stilat, ut Mastiche: dentibus statim friatur, verūm friatura non cogitur denud, ut Mastiche, neque ut ea liberē volutari potest, cū dentibus, eorūque præsepiolis adhærekat. Sapore est amaro & modicē acri, non ingrato tamen, Cæsalpino adstringente, subamaro: colore est ex albo fulvescente, minūque pellucet, quā Mastiche colore candicante, aut subfusco, translucente gutta, alijs singulares, alijs gemellæ testiculos aut mammas prout ex maiores, minoresve fuerint, imitantur, unde & Mammosi & Masculi Thuris cognomenta: interdum quateritæ, aut quinæ, magnitudine Ciceris, Avellana, & maiores: adherentes nonnunquam suo cortici, unde excludunt: friatura verō immundior ex grumorum attritu decussa, Manna Thuris apud Græcos appellatur.

Icon, quæ à nobis exhibetur, ex Theveto desumpta est, folia autem non respondent iis, quæ ab autoribus diversis de hac arbore scribuntur, ut ex sequentibus videre licebit: fidem eius reliquimus eius autoribus: posterius, qui in Arabiam devenient, considerent.

Theophrastus interea scribit. *Alsi*, arbor non magna, quins ferē cubitis attollitur, ramosa: folium autem habet simile Pyro, & colore planē herbaceo, ut Rūta, corticem verō lævem omni ex parte, ut Lauris. Myrrhæ minoris altitudo, sed eam fruticosior est. Alij verō qui se vidisse affirmant, de magnitudine ferē non consentiunt. Neutram earum arborum magnam referunt, minorem verō Myrrhæ, & humiliorem. Folium autem habere Thuris. Sed huius Laurinum & læve folium. Esse autem & radices & ramos incisos, sed alijs veluti fecui percussos videri, alios tenuiores incisos habere. Lachrymam verō aliam decidere, aliam arbori inhætere. Alicubi subiectas tegetes (i. e. *Adonis*) ex Palmis contextas, alicubi folium tantum circumpavimentatum & purum esse. Thus, quod tegete exciperetur, purum esse ac perlicundum: quod terræ minis: quod arboribus inhæreret, serro deradi, & corticem ideò nonnullis adiungi. Montem universum Sabæjs divisum. Alij verō quidam aiunt, arborem Thuris similem esse Lentisco, & fructum quoque Lentisci, folium verō subrubrum. Thus recentium arborum candidus esse, minūque odoratum. Veterum magis flavum odoratiūque, Myrrhæ autem similem. Sola hæc arbor omnem penitus cultum naturā aspernatur. Quidam di-

cunt suavius Thus in Arabia nasci, pulchrius verō in vicinis insulis, in quibus hæc arbores proveniunt. Quoddam aded magna gleba consistit, ut mole sua manum implere, pondere verō plusquam tertiam partem minæ æquare possit. Hæc de Thure Theophrastus, cuius historiam ex Plinio quoque describere, non iniucundum fuerit.

Arboris Thuris quæ sit facies non constat, à Incertum qualis arbor. nullo enim Latino, quod equidem sciam (inquit Plin.) tradita: Græcorum verō exempla variant: Alij folio Pyri minore duntaxat, herbidi coloris prodidère. Alij Lentisco similem subrubilo folio, quidam Terebinthum esse, & hoc visum Antigono Regi, allato fructe. Iuba rex iis voluminibus, quæ scripsit ad Caium Cæsarem, Augusti filium ardentem famā Arabiæ, tradit contorti esse caudicis, ramis Aceris, maxime Pontici: ac Locum succum Amygdalæ modo emitte, talisque in Carmania apparere; & in Egypto fatis studio Ptolemæorum Regnantium. Coruce Lauri esse constat: quidam & folium simile dixere. Talis certe fuit arbor Sardibus. Nam & Asiæ Reges lendicuram habuere. Qui mea ætate Legati ex Arabia venerunt, omnia incertiora fecerunt, quod iure miremur, virgis etiam Thuris ad nos commeantibus, quibus credi potest, matrem quoque teretem enodi fructare trunco. Apud nos adulteratur Resinæ candidæ gemmā perquam simili. Probatur candore, amplitudine, fragilitate, carbone, ut statim ardeat: item ne dentem recipiat potius, quā in micæ frietur. Primæ vindemiæ Thus, Carpheotum: Secundæ, Dathatum vocant. Quod ex eo rotunditate guttæ pependit, Masculum vocamus, cū alijs non ferē mas vocetur, ubi non sit femina. Masculum alijs putant à specie testium dictum, præcipua autem gratia est Mammoso, cū hærente lachrymā priore, consecuta alia miscuit se. Græci Stagoniam & Atomum tali modo appellant, minorem autem, Orobiā. Micæ concussu elias, Mannam vocamus.

Thus, inquit Dioscorides in ea gignitur Arabia, quæ Thaurifera cognominatur. Primitatum tenet in eo genere masculum, quod stagonias vocatur, naturaliter rotundum. Est autem tale non sectum, album & fractum, intrus pingue, & ad suffitum accensum statim ardet. At Indicum suffulvum est, & lividum colore. Fit etiam ex industria rotundum. Secant enim ipsum in quadrangula frustra, & in fistilia coniectum tandiu volutant, donec rotundam figuram acquirat. Tale verō tempore flavescit, & sectum, aut syagrum appellatur. Secundum locum habet Arabicum, & quod in Smilo nascitur, quod aliqui Copiscum vocant, & minus, actulvius existit. Dicitur & quoddam Amamites, alioqui album quidem, sed quod dum molitur, velut Mastiche remittit. Adulteratur ortu ne Thus, fraude tractatum cum Resinā Pineæ & gummi. Verūm facilis est dignotio. Gummi enim incensum in flammam non exardescit: Resinā verō in fumum ablit. Thus autem ardet. Sed & odor adulteratum prodit.

Cortex Thuris præstat crassus, pinguis, & odoratus, recens lævis, & non scaber, aut membranis oblitus. Adulteratur ammixto cortice strobilino aut Pineo. Sed & horum, index ignis est. Reliqui enim accensi non ardent, sed citra odorem in fumum abeunt. At Thuris cortex ardet, & cū odoris gratia sufficit. Vitur autem & hic, velut ipsum Thus. Manna Thuris Manna Thuris.

Magna gleba.

Folio Pyri. Folio Lentisco. Terebinthus. Caudice contorto. Ramis Aceris. Succus. Cortex. Folio Lauri.

Virga.

Adulterium. Delectum.

Vindemia bina. Carpheotum. Dathatum. Masculum.

Stagonia. Atomum. Orobia. Manna.

Genera.

Stagonias.

Indicum.

Quomodo per adulterium rotundum fiat. Syagrum. Arabicum. Copiscum. Amomites.

Adulterium.

Cortex.

Adulterium.

Manna Thuris.

probat alba, pura, & granulosa. Quidam adulterantes ipsam commiscant resinam Pini cribratam, & farinam pollinem: aut etiam Thuris corticem confusum. Sed & hæc igne deprahenduntur. Neque enim æqualiter & pari vigore accenditur, ut æreum vaporem emittat, sed fuliginosum, & non purum: Sed & odoris gratia mixtum quandam odorem naribus offeret.

*Delestus Galeno.*

*Adulteri.*

*Locus.*

*Olibanum. Ronder. Thon unde dicitur. Tm. Dendrol. bous. Libanos. Libanos unde dicitur. Fabula Gracorum.*

*Manna Thuris. Manna depravata apud Plinium. A Thure. Manna differt. Thuris Chondros. Thurus granum. Aethalon. Ethal. Petrus Crinitus re- darguitur.*

*Cortex Thuris.*

*M. cell. ripreh.*

*M. n. a. differetia*

*Scrapion error A. mao.*

Galeno etiam Thus optimum, quod masculum dicitur, subruffum, rotundum, & naturaliter leve, fragile, & si pinsatur, in miculas minutas, ut sabulum dissipatur, & quod ad ignem cito accenditur, ac odorem suavem, & copiosum emittit. Adulteratur resina pityna, & gummi & Thure commistis, & fit in speciem sinceri Thuris fortis. Idem & Manna adulterant aliqui, levigata resina pityna, vel farina, & cortice Thuris: & cortice nucleis Pinei. Sedprehenduntur ita Thus enim quod resinam, vel gummi habet, si masticetur, fit quasi mastiche, & ad ignem non cito accenditur, nec talem odorem habet. Similiter & Manna, & cortex, si sincera non sint, tardius & fumosius incenduntur. Idem quoque libro de Simpl. med. hæc habet. Thus, lachryma est arboris, quæ in Arabia & India nascitur, quæ Græcè λιβανον dicitur: quod ergo de Arabiæ arbore manat, candidius est: quod de India, subruffum. Verum utrumque Masculum appellatur. Est & tertium minutum valde & ruffum, de quo maxime Manna conficitur.

Hoc aut à verbo Græco θύω, sacrificio: aut certe à tenuis glebis; (aut, quod non aspernandum à contrito corde, quo offerri soleat) ita ut sine aspiratione Tus Latine scribi debeat, deducitur. Arbor ipsa Libanos & Dendrolibanos: Lachryma verò Libanotos à Galeno dicitur. Euripides contra Libanum pro Lachryma, Libanoton pro arbore Thuris accipit. Aiuvene Assyrio, cui nomen esset Libanos, in hunc fruticem converso, dictam Græci fabulantur, quem Deus studiosissime colentem invidi occiderunt: hinc nihil esse Diis Thure gratius. Orii apud Sabæos Larimum fuisse odoratissimum tradit Strabo: nec tamen quid & quale sit demonstrat.

Habetur ergo Manna Thuris & cortex [quædam exinde λιβανον] Manna Thuris (inquit Hermol. est Hyposilina quod Plinius micæ concussis elisas interpretatus est, ubi depravata dictione, Manna non Manna vulgè legitur. Differt à Thure Manna, quod plus adstringit propter corticis fragmenta, quæ femerent. Nam quod Thuris Chondros à Græcis dicitur: Nos Plautum secuti Thuris granum interpretamur. Subiungit idem corollæq. 87. Fuligo Thuris, Græcè Lygnis, & Aethalon, & Ethal nominata. At Manna Libani, dicit Monardus, Dioscoridis, non est nostra recentiorum Manna, ut voluit Petrus Crinitus l. de honesta voluptate.

De Cortice Thuris ita Amatus lib. 1. cap. 75. huic negotio dicato, tradit, dicens: Cortex Thuris, si corticosum Thus, lachryma Thuris crusta coniuncta dicitur, quæ constringendi ac exsiccandi vires potentiores, quam Thus habet, unde Marcellum Virgilium in hac re non rectè sensisse dicendum est, quum dicat, quod in cortice Thuris laudatur, Thus est. Idem ita dixerit: Manna Thuris Officinatum Olibanum est, non verò Arabum Manna. Quum huic laxandi, atque subducendi alvum vis inhaereat: illi verò adstringendi potius: unde Serapio hæc non animadvertens, utramque in eptè admodum confudit. At quum in hac re (ut Amati verbis utar) perplexior sit

controversia, quam quæ paucis explicari queat, non absurdum mihi fore videtur, si & Cornarij, & Cæsalpini verba hæc de re hic subicerem, ut studiosi iuvenes legendo veritatem eliciant.

Vocantur igitur grana & micæ, quæ ex magnis Thuris glebis, una cum ipsis Thuris cortice excutuntur: & in hoc ipso Manna præstat Thuri, quæ ex ammixto cortice modicum quiddam adstringentis facultatis est adepta, ut docet Galenus, Item in Gal. lib. 5. de comp. med. sec. loc. cap. 1. Thus άριον, non sectum, hoc est, masculum, & natura sua rotundum: quod enim arte fit rotundum, άριον dicitur: appellantur & hæc genera πυκνόν & άριον. Item etiam lib. 10. cap. 3. λιβανον άριον. Sic enim legendum, non λιβανον άριον, velut exemplar habet: posset tamen non minus rectè λιβανον άριον, id est, masculi, legi. Idem enim Thus est, quod & masculum & non sectum appellatur. Hæc Cornarius, sequuntur autem quæ Cæsalpinus memorie prodidit. Hodie ad nos, inquit, neque cortex per se advehitur, neque Thuris ramenta, quæ Mannam vocant, leparata à Thure. Quondam cum arte constringeretur rotundum, attritione pulverem fieri oportebat: idcirco separatim vendebant, sed promiscuè nunc cum Thure cortices venduntur & ramenta: Probatur autem cartilaginosa Manna, id est, consistentia cartilaginea, non pulverulenta, ut Chondri, quam Alicam vocamus. Recentiores nomine Manna non Thuris retinimentum intelligunt, sed rorem melleum, quo ad purgationes utuntur.

Garcias de aromat. tradit, Thus Arabibus Libanum vocari, Avicennæ verò Conder, resinam, Serapionem, corrupto vocabulo. A Lusitanis etiam se intellexisse arborem, quæ Thus producit duplicem esse: alteram montanam, alteram in planis nascentem: montanam optimum Thus proferre: in planis verò nigrum & improbum, quo cum aliarum arborum resinis permixto naves piceat & obliant. Atque has arbores illius Provincie Regi cedere, nec cuiquam colligere Thuscitum esse, nisi Regis permisso. Confluere verò eò Negotiatores ex Adem, Xael, & aliis Arabiæ locis, & cum Rege de Thuris quantitate, quam avechuti sint, de pretio convenire solent, modò laudatum sit & legitimum, ac quod ipsi masculum vocent, eum Melato appellare. Laudatissimi autem inde etiam delati, vile esse pretium, centenas enim libras duobus duntaxat Lusitanicis aureis emi, improbumque interdum cum optimo misceri, cui nonnunquam & corticum fragmenta inhæreant atque huc deferri, sed vilissimi esse pretij. Thus idem nullam aliam adulterationem novisse. Nam quis quæso, inquit, id ad ulterius veller, cum tam vili emanet? Ac Thuris tantem arborem humilem esse & folia habere Garciam Lentisco similia. Sed hoc ultimum dictum infirmat Theophrasti auctoritas, qui Thuris arborem folio Pyri, ut etiam Lauri, esse dixit.

Quis nunc cum Guilandino statuerit Abietes in Arabia Thure manare? Theoph. sanè Diosc. & Plinius, cum Neotericis penitioribus arborem sui generis veridè pronuntiant.

Pertinaciter nimium, nostro equidem iudicio, assent Cæsalpinus, arborem Thuris, quam Barbari Olibanum appellant ex nostris neminem vidisse, apudque Antiquos solum Theopli. descripsisse.

Theophrastus à Garcia dissidens, scribit arborem Pinus similis, Thuri nam Pinus resinifera ferebat, & succum Theveri, fundere: qui tempore durecat, & Thus vocatur cum

*Ma*

*Thur.*

*Atomum.*

*Eutonium.*

*Tmetum.*

*Arctium.*

*Gal. res.*

*Thuris.*

*Cortex.*

*Manna.*

*Thuris.*

*Delestus.*

*Libanum.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*

*Libanos.*



tum quo granula reperiantur arenæ aut fabulo similia, quæ *Mammam Thuri* vocent. Multas autem insulas & regiones huius esse feraces, non solum Arabiam: & quibuldam in locis tam vulgarem esse, quam Aurantiæ Malum in Galliæ Provinciâ: Thus tamen quod in Arabia crescat, & à *Pecher & Eartach* regni Aden oppidis deferatur, ut olim, ita etiam hodie, præstantissimum haberi, quod à præcis magna cum superstitione colligebatur. Id verò duplex esse: Vnum, quod *Æstate*, & quamdiu Sol sub cane est, colligitur, candicans, purum, nitidum, pellucidum: alterum, quod Vere, rubescens, pondere, pretio, bonitate, & viribus superiore multò inferius, quia illud maturius, & à Sole sub cortice suæ arboris magis excoctum esse videatur. Ac Arabes cultis arbores vulnerare, ut copiosior liquor effluat, quem *Albucor* vocant. Nec non etiam exiis arboribus quasdam sexaginta *Thuris* libras, & eo plus emitte. Ex his a. quæ *Thevetus* scribit, nihil minus convenit, quam quod ipsemet tradidit arborem *Thuriferam* Pinus resiniferas referre: Iconi enim nostræ quæ ex eo desumpta est, cum Pinis nulla est similitudo.

Thus ab *Avicenna* *Olibanum*. à *Rhase* verò Thus dictum. *Alcau* & *Alcau* Græcis dicitur, Lat. Thus, quod & arborem significat, & lachrymam, quam particulatim Germ. *Weyrauch*, Belg. *Weyroes*, Gall. *Encens*, Ital. *Incenso*, Hisp. *Encenso*, Boh. *Badido* nominent.

Quia porro lachryma hæc in divinis quoque sacrificiis & templorum suffimentis adhibetur, i. ded. variis eam Poëtæ Epithetis adornarunt, qualia sunt, *Thus* pium, votivum, sacrum, vaporosum, odoratum, redolens, fragrans, odoratum, fumans. A loco quoque *Panchaium*, *Sabæum*, *Eoum*, *Niliacum*, *Narbatheum*, *Panichæum* &c. vocant: *Sabell*.

*Sacrificii Nabathea foci dant Thura ministri.*  
Ovid Metam.

*Templa tibi statuum: solvam tibi Thuris honores.*

Gignitur etiam Thus (*Theoph.* sermo est) in regione Arabum media (*Theod.* legit *uion*, alij *uion*). Nascuntur *Thuris* & *Myrrha* arbores, aliæ super montem, aliæ in radice montis, locis in eam rem exculis. Quamobrem aliæ coluntur, aliæ non. Montem autem aiunt præaltum esse & arboribus densum & nive tegi solitum. Amnes quoque de eo in plana fluere. Thus autem sub cane ferventissimis diebus incidi referunt. Quod & ex *Plinio* constat dicente. Meti semel anno solebat, minore occasione vendendi: iam quæstus alteram vindemiam affert, prior atque naturalis vindemia canis circa ortum flagrantissimo æstu, incidentibus, quâ maximè videatur esse prægnans, tenuissimisque tendi cortex, Autumnino legitur in æstivo partu. Secunda vindemia est Vere, ad eam Hyeme corticibus incisus. Quidam & in insulis melius putant gigni. Iuba in insulis negat nasci Thura præter Arabiam, nullis, ac ne Arabia quidem universæ. *Thuris* arboris ab omnibus Arabibus non videri scribit idem *Plinius*: ac M.M.M. [Amatus legit C.C.C.] non amplius esse familiarium quod ius per successiones id sibi vendicent: quæ etiam ob id *Sacræ* vocentur: nullo præterea fœminarum, funerumve congressu polui cum incidant eas arbores aut metant: ac ita religione merces augeri. Essetque tandem qui promissum iis populis ius in sylvis esse existimant: alios verò qui per vices annorum dividi.

Tradidit *Dioscorides* (testis est *Matth.*) præter

*Arabicum* inveniri & *Indicum*, id tamen flavescere, quod indicat Thus & in aliis regionibus nasci præter illud, quod ex Arabia devehitur. Quod cum *Theoph.* & *Plinius* satis compertum haberent, quamvis prius scripsissent, Thus præter Arabiam nullis gigni: dixere tamen postea, quod ex relatione acceperant, id etiam nasci in quibuldam insulis: quod etiam bene annotat *Hermolaus* concludi posse ex *Ovidio* in *Fastis* dicente:

*Thuraneus Euphrates, nec miserat India Cossus.*

Ex *Garcia* quoque per universam Indiam Thus non nasci certissimum est: cum quicquid *Thuris* hic consumitur, & hinc in *Lusitaniam* invehitur, ex Arabia deferatur. Non possum ergo non mirari, inquit ipse, à quo *Dioscorides* (quem tamen & *Avicenna* sequutus est) Thus in India nasci acceperit. De Arabibus minus mirum, qui nigricantem colorem, quo Thus *Indicum* præditum esse vult *Dioscorides*, Indum plerumque vocant, ut ex *Myrobalano* nigro, quem Indum appellant, patet. Thus solum provenit apud Arabes. Scribunt tamen Hispani in novo Orbe etiam Thus inveniri, sed penes eos sit fides, ego cerò de eo nihil pronunciarè possum. Nunc Thus, vel *Amati* autoritate, ex regione *Syr* apud Indos cognominata ad nos portatur.

Sed relictis disceptationibus, ad vires nos accingamus. Potest itaque, prout *Diosc.* in præsentis loco testatur, calefacere, adstringere, ea quæ pupillis tenebras obducunt depurgare: cava vlcera replere, & ad cicatricem perducere, vulnera cruenta glutinare: omnem sanguinis eruptionem, & eam, quæ ex *Cerebri* membranis contingit, cohibere. Mitigat etiam vlcera maligna circa scedem, & reliquas partes, tritum cum lacte & lineamento exceptum: Verrucas formicarias & impetigines in principio tollit, cum aceto & pice illitum. Ambusta item & pernioles sanat, cum adipe porcino, aut anserino. Vlcera capitis manantia cum nitro affictum sanat: Et vnguim reducias cum melle: & aures contusas cum pice. Verum ad reliquos aurium dolores, cum vino dulci infunditur. Prodest etiam mamma à partu inflammatis, cum *Cimolia* & *Rosaceo* illitum. Utiliter itidem ammicetur medicamentis, quæ ad antetiam & vlcera præparantur. Et sanguinem spuentibus potum prodest. At si à sanis bibatur, insatiam inducit: Copiosius autem cum vino potum, etiam occidit. Vritur Thus in fictili puro positum, & succensum à gramo de lucerna accenso, donec exuratur. Oportet autem post perfectam vitionem operculò integere, donec fuerit extinctum. Sic enim in cinetum non redigitur. Quidam æneum vas cavi in medio perforatum ollæ superponunt, ad fuliginem excipendam. Alij in ollam crudam immisissum, luto oblita ollâ, in fornace vritur. Torretur etiam in fictili novo carbonibus ignitis, donec non amplius bullas edit, neque pinguedinem aut vaporem emitit. Facile autem frangitur, quod combustum non est.

Porro autem Cortex *Thuris* vim habet eandem, quam Thus, efficacior tamen est, & magis adstringit. Quare potius magis commodat sanguinem spuentibus, & fluidis affectionibus appositus. Facit etiam ad oculorum cicatrices, cavitatesque ac sordes. Torrefactus autem etiam ad scabras lippitudines facit. Manna tandem vim eandem habet, quam Thus, sed magis remissè: Fuligo autem mitigandi inflammationes oculorum, sistendi fluxiones, repurgandi vlcera, & explendi cava, cõpescendiq; carcinomata. Fuliginem porro

Thus non  
provenit in  
India au-  
tere Gar-  
cia.

Thus cur  
Indicum di-  
ctum?  
An in novo  
Orbe pro-  
veniat.

Vires & v-  
sus.

Vlcera.

Cerebri

membra-  
na.

Sedis Gl-  
cera.

Verruca.

Ambustâ.

Pernioles.

Vlcera ca-  
pit.

Vngues.

Aures.

Mamma.

Viscera.

Potum in-  
satiâ fa-  
cit.

Lethale.

Thus Gren-  
di modus.

Corres

Thuris.

Oculi.

Manna.

Fuligo.

Fuliginis

præpara-  
tio.

ita facito. Grumum Thuris singulatim forcipe comprehensum & de lucerna accellum, in novam fictilem cavam ollam imposito. Deinde æneum vas concavum in medio perforatum & probe extersum superponito; & juxta alteram ipsius partem, aut utraque, lapillos quatuor digitorum altitudinis subicito, ut an vratur appareat, & ut locus sit semper alios grumos supponendi, prius quam prior penitus extingatur. Et hoc facito, donec satis multam fuliginem te collegisse putaveris. Assidue tamen spongia ex frigida aqua externas ænei vasis partes detergito. Ita enim omnis fuligo inhærebit, si non nimio seruore vas ipsum incalcescat: alioqui ob levitatem dilabens fuligo, Thuris cineri ammisceatur. Derasa itaque priore fuligine, idem quousque collibuerit facito. Sed & vsti Thuris cinerem seorsum colligito. Eodem modo paratur etiam fuligo ex Myrrha, & Resina, ac Syrace. Et ad eadem commodè sunt. Sed & ex reliquis lachrymis fuliginem similiter colligito.

Thuris cinis.

Temperamentum Galeni. Cortex.

Vsui interuenit.

Fuligo.

Oculorum vlcera.

Manna. Thuis.

In quibus proluat carnem, vel pus.

Manna.

Galenus per totam eius doctrinam, tanquam constringente medicamento in omnibus suis adstrictoribus medicamentis & compositionibus vitur, velut apparebit ex mox adducendis eius aliquot locis. De simplicibus lib. 7. sicut & lib. de oculis part. 4. cap. 5. dicit: Thus exalcat ordine secundo, desiccatur primo, habet quoque adstringens pusillum, sed minimè manifestè est adstrictio: Cortex eius evidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoque desiccatur, adeò, ut ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium, quam ipsum Thus, & minimè particeps acrimonie. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multus est eius vsus apud Medicos in hæmoptoicis, stomachicis, cæliacis, ac dysentericis, non tantum iis, quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & iis, quæ intro in corpus sumuntur. Fuligo eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quam ipsum Thus, adeò ut ad tertium vsque excessum perveniat. Habet verd etiam absterforium quiddam. Itaque & eo nomine expurgare, & implere, quæ in oculis consistunt, vlcera videtur, velut & quæ ex Myrrha, & quæ de Syrace. Lib. autem 5. M. cap. 4. Est Manna medicamentum quod magis, quam Thus adstringat. Thus verd, quam Manna, magis emplasticum. Itaque magis tenax, ac (ut sic dicam) resinosius deligas Thus, oportet, cum magis emplasticum esse medicamentum studebis: id sanè tum mollius est, tum albidius, tum quod mansum ritu Aloës & Mannæ non comminuitur, sed partes suas sibi coherentes defendit, veluti Chia Mastiche. Idem lib. 3. M. cap. 3. Thus igitur ut ad humani corporis naturam, eiusmodi obtinet temperamentum, quod cum temperatis & mediis naturis consentit, humidiores autem pauld liberalius siccatur, sicuti rursum iis, quæ ad summum sunt siccæ, pauld est humidius. Meritò itaque Thus in quibusdam tum vlcibus, tum naturis, pus quidem movet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. Itaque si observaveris, rationi respondere eventa deprehendes. In humidior namque natura carnem producere potest, in siccior non potest. Præterea in modicè humidis vlcibus, carnem efficere potest: in iis, quæ præhumida sunt, non potest. Lib. quoque 13. M. cap. 5. Post excisam cutim, medicamento, quod Græci Mannam vocant, affectam partem implebimus. Est autem ea purgamentum Thuris, levi adstrictione prædita, atque hoc nomine etiam Thuis ipso ad nonnulla

utilior. Thus enim puris tantum movendi facultatem obtinet, utpote nullam adstringendi vim habens. Magisque id facit, quod pinguis ex eo est, & magis albicans: sicut etiam, quod flauum ex eo magis est, validius siccatur. Mannæ verd etiam corticis Thuris paululum est admixtum: vnde Corticis Thuis. sicut, adstringendi vim habet. Ipse verd cortex Thuris, tum adstringit, tum siccatur insigniter. Itaque etiam ad moderatores sanguinis perfusiones eo vitur solo, sicuti etiam ad valentiores solo vsto, sed tunc & cribrato, & in mollissimum pulverem redacto. Lib. 5. de comp. med. sec. loc. cap. 1. Thus concoquit & pus movet, si tanquam ad probe temperatam naturam respiciamus, &c. Ipsi autem Galeno author fuit, magnus ille & admirandus Hipp. lib. 2. de fract. qui vteretur contritione narium. batur Manna Thuris ad fracturam & contusionem narium, quæ de re hæc Galenus. Adde quòd inde etiam tenax esse hoc subactum farinæ velle Hippocratem, manifestum est: quod si huiusmodi non sit, Mannam ipsi, aut gummi misceri iubet. Manna autem Thuris succensio ac pollen nuncupatur, quæ si non effuerit, Thus ipsum, quod pinguis sit sumptum terere ad hunc usum poteris. Ego porro cum neque Thus, neque Gummi suppeteret, liquidam resinam, quæ fortè aderat, adhibui. Sed si hæc quoque desit, melle vtendum est. Satis tamen est, si Mannam, aut Gummi imponamus: quippe cum mel, & resina quodammodo calefaciant, id quod inter initia inutile est.

Cæterum quod Diosc. dicit, facile frangi Thus, quod combustum non est, de eo dictum accipit. Corn. quod & vti & torrerit dixit Dioscorides. Torrefactum itaque Thus, quod combustum non est, facile frangitur. Est enim inter boni Thuris notas, ut fragile sit, & non velut Mastiche remittat, dum mollior: aut ut Plin. ait, ne dentem recipiat potius, quam in micæ frangatur. Porro quod paxillis dicitur in meso diti. Diosc. dicit, non accipiendum est sceminarum fluxionibus solum, subditum sive appositum commodare, sed omnibus etiam fluidis affectionibus: quum Galenus etiam de cæliacis & dysentericis id testetur. Intelligenda autem est vox *ad diti* in voce *paxillis*. Mannæ etiam non remissior, quam ipsimet Thuri esse vim dicit Gal. contra Diosc. scor. Meth. lib. 13. sed aliquantò intentam magis, maxime in adstringendo, ob corticis Thuris ammixtionem. Et hoc ipsum idem Galen. 5. Meth. appetitus declarat, ubi Mannam aliquando pro Thure se accepisse ait. Est mannæ magis adstringens medicamentum testatur: Thus autem maiorem meatus obducendi vim habere, quam Mannam.

Matthioli qui & ipse ex prof. sso de plantis scripsit, thure, cui admixtum sit ætæum & Oleum Olivarum, cutem malam, scabiosam & leprosam, si a balneo inungatur, puram & politam reddit. Cum vino dule & calido in aures ulcerosis infuso, dolores tollit. Contra vomitiones verd recipit Thus, Mastichen & Aloën, singulorum partes æquales, coctæ in pulverem, hocque albo ovi & rosarum aqua mixtum, stomacho imponit. Thus cum lacte non sine utilitate, faciei a Sole combulte inungit. Ad tenellum Thus solum, vel adhibita pice nig à in ignitis carbonibus iniicit, & fuliginem per postiora ascendere sinit. Contra luti vitæ certissimum experimentum, recipit Thus album, huiusque particulam cuspide cuiusdam conit, & ad candelam incendit: incensum aqua Rosæ

Corticis Thuis.

Thuis.

Substantia.

Diosc. illi.

Galeni.

Contra Diosc.

Scabies leprosa.

Aures ulcerosæ.

Vomitiones.

Stomach.

Combustio.

Facies a Sole.

Tenellum.

Lippitudo.



duorum cochlearium extinguit, extinctum iterum incendit, ac aqua Rosarum vicissim mergit, idque trigies iterat. Tum demum mixtum aquae Rosaceae & lactis mulieris unius cochlearis, oculis instillat: lenit non solum dolores: verum etiam fluxum & rubedinem tollit. Saepius probatum est, inquit. Verum si necessitas exigit, prius venam tundit, & corpus purgat. Et quoniam Dioscorides dixerit, Thus in secunda valetudine haustum, insaniam facere, & largius cum vino sumptum interficere, hinc Avicennam errasse credit, qui & depravatis sensibus, & abolita memoriae Thus opem ferre tradiderit.

Nos consulimus, ut nulli affectui interno praescribatur: nec etiam in suffumigis, si vera scriptis Diosc. de eius natura, quicquid dicat inferius Apollon. Sunt nobis alia tutiora medicamenta, pro roboranda memoria, & adversus alios prava affectus internos.

Pergit Matth. In Galeni loco citato non solum Gerardi Gaudani versio reprehendenda (quod tamen Interpreti vitio minime dandum est) sed etiam in Graecis tum ipsius Galeni, tum Pauli codicibus communis lectio depravata videtur, quippe ubi in Thuris capite legitur apud Galenum, *ἡ θύρα καὶ αὐτὸ ἔχει τὰς αἰσθήσεις*, hoc est, ut vertit Gerardus, Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quam ipsum Thus, rectius legendum putaverim: *ἡ θύρα καὶ αὐτὸ αἰσθάνεται*, hoc est, Fuligo eius. Quae quidem lectio, primo Dioscoridis testimonio comprobatur: qui praeferquam quod ramorum non meminit, ipsi Thuris fuligini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quae in oculis consistunt ulcera, facultatem inesse testatur. Deinde Galeni ipsius lib. 7, de fulig. scribentis, Thuris fuligine utuntur, in ocularias medicinas mista. Ac etiam Serapionis: qui cum hunc Galeni locum suo tempore legitimum, & incorruptum haberet, quae hoc Galeni loco nostra aetate de Thuris ramo leguntur, ea ipse Galeno accepta referens, de Thuris fumo seu fuligine legit. Nec non ipsius Aetij tamen Paulus, vel sua vel Librarium culpa hic mendā non vacet.

De hoc verò & Amatius vir non mediocriter doctus, inter receptiores connumerandus, ita loquitur: Thuris maximus est usus in lustrandis mortuorum cadaveribus, & mirum dictū, ut hic mos per omnes aetates inter omnes ferè gentes & religiones inoleverit.

Vnde sic Stat. i. Theb.

Coniugu ara tua cumulo cur Thuris Fœi

Lara calet.

Et Ovid.

Aspicit ara preces, voti vāque Thura piorum.

Non deest, inquit Apollo, nigrum Thus omnium ignavissimum, quo tamen in ceratis, aliisque extra admovendis, ne dicam uti, sed abuti consuevere, ac si topica humanæ vitæ emolumento futura negentur, quum tamen ex deteriori hoc compolitis, vulnera non coalescant, non cicatricem ducant, & putredini obnoxia reddantur. Quidam etiam rubrum Thus, in Indigigni memoriae prodidit. Cæterum in Latino volumine Matthioli, Avicennam errasse sibi persuasit; quodd depravatis sensibus, & abolita memoriae Thus opem præstat tradidit, quum ex Dioscoride in secunda valetudine haustum, insaniam faciat, & largius cum vino sumptum interficiat.

Garcias autem de Thuris usu hæc scribit. Multus est Thuris usus apud Medicos Indicos in un-

guentis & suffimentis. Nonnunquam & in corpus assumitur ad varios capitis affectus, & alvi profluvia. Sed maxima Thuris pars hinc in Olibarum regionem exportatur (quoniam isthic plurimum eo utuntur) & in regiones Malacæ vicinas.

Porro ad memoriam hinc revocandum est, quodd præter Dioscoridem, Thus in secunda valetudine haustum insaniam inovere, nullus alius Græcorum scriptorum; quod Hist. Lugd. sciat, prodiderit. Contra verò Avicenna notarit, Thus conferre rationi, ipsamque corroborare, & esse quosdam, quibus præcipitur, ut eius infusum bibere assuescant ieiuni, sed eius usum plurimum dolorem capitis excitare. Nec Dioscoridi omni ex parte contrarius Avicennas: Si enim ille dixit, Thus largius cum vino potum, interficere. Avicenna etiam usum eius plurimum cum vino interficere pronuntiavit ac similiter cum aceto. Vnde etiam Serapio locum Dioscoridis sic convertit: Et quando bibunt de eo sani, parum meliorat eos, sed si nimis cum vino bibent, inducit maniam, & amplius cum vino occidit.

Pulvis ex thure carnem gignit (inquit Clem. Clementin. lib. i. de Med. mat. virt. & compos. cap. 7.) & cooperit ossa denudata, post digestionem & absterstonem laniei, & maxime valet in fractura cranij. *Thuris*, Sarcocollæ, Ireos, sanguinis Draconis, Myrrhæ, Aristolochiæ longæ ana drach. sem. fiat pulvis. Electuarium verò (teste eodem cap. 5.) thurinum constringit vomitum & fluxum, calefacit & confortat omnia membra, & virtutes naturales, reducit gustum, & resolvit ventositatem. *Granor. Myrrunc. iij. Fl. Rosmarin. drach. ij. Myrobal. Indor. Embl. Bellyric. adustor. ana. drach. j. & sem. thuris, Rosar. Costi, Spicæ, Nucis Mosch. Calam. arom. Gæryophyll. Macis, Cardamom. Nasturtij. Balauft. Cort. Citri, Fol. ramarisc. ana. drach. j. Zingib. drach. sem. Bull. parum in optim. vino, & exsiccentur & postea bulliant cum succo Citoniorum in olla vitreata & exsiccentur & subtilissimè terantur & consiciantur cum miva Citoniorum, vel Sapa, & dentur drach. ii. cum aqua chalybeata.*

### THURIS LIMPIDI FOLIUM.



R Arum est quod spectatorem in sui admirationem rapiat, è Floridâ sine nomine delatū, glabrum, pediculo fibroso, & fungoso, & quâ patte à matre avulsus fuit, canulato, quatuor ferè unciarum, à quo ad extremum porrigitur dodrantale folium, latitudinis circiter vncialis, venulis rectis striatum, ex fusco rubescens

Locus:

nonnihil, ex geminis commissum membranis

continuis, infundibulum (cuius apex ad pediculum) faciens, atque ita gemina illa tunica à cucullato vertice tantam efficiunt cavitatem, quantam ipsarum est latitudo: paulatim verò descendendo minorem relinquunt, sic ut pediculum versus cavitatis ultra medium non propterdat, coëuntibus in reliquo medio tunicis. Pars folij suprema in latere scissa, utrum histriionis deformem ostentat, supra quem quod superest folij cucullam imitatur. Interior infundibuli facies ruffa est, & hirsuta.

Descript.  
Lobel.  
Thuris.

Conuenit autem hoc folium, cum eo, quod Lobel. & Penain Adv. pingunt & describunt in hunc modum. Thuris limpidi, pellucidi & resinæ Cedriæ æmuli, nitorem puritatemque Succini affectui, nobis & visendi & habendi fuit copia multis in locis, quod non perperam Dioscoridis notis quadrat, si notas, usumque perpendas: nam & dum adoletur suavissimum habet odorem, & vulneribus, tumoribusque, discutendi vi, nonnulla reliqua adstrictione, ad robur partis, opem certam fert. Rupellæ occidui maris quadriennium ferme est, cum doctus Medicus Launatus nos gummi istius glebis, arboris fructu & folio donavit: assererat nihil tamen, sed sibi relatum à nautis utrumque, trunci Pino similis sobolem esse: at folium, quia valde quàm rarum, neque dum ab ullo depictum, hic dedimus, magis scissitatur, siue resinsera plantæ, quàm asserturi. Est namque, quod raro contingit aliis, ab imo pediculo ad summum vsque cuculli verticem duplicatum, quasi ex glumis conflatum tennibus tunicis, vagina scilicet palmum longa, instar infundibuli, hians histriionis speciem præ se ferentis. Superne v. galeata videtur, quod de floribus Napelli & Lonchitide, non de folijs vllis, memorant auctores. Hæc Adversaria, ex quibus peutam figuram, cum nostra coniunctam, damus.

Vis.

Descript.  
fo 4.

Icon.

## SARCOCOLLA OFFICINARVM.

### CAP. XXXI.

Descript.

Sapor.

Descript.  
Casalp.

Thuri simili  
lis Diof.  
Vires.  
Adulterium.  
Delectum.  
Plinio.

Vires.

Sarcocollæ grumi, albicantes, aut ex alio ruffi sunt, spongiosi, micis lucentibus subinde mistis: globularum lachrymarum fragmina Pisi, aut parvæ Auellanae magnitudine, tanta est enim fragilitas, ut in pulverem crassiusculum, vel concussilem frietur. Saporis amari cum quadam ingrata dulcedine obscura: Sub dente lentescit, & candelæ admota primùm bullat, postmodum in claram flammam exardet: admista repetiuntur aliquando folia ex candido flavescentia, Tithymali Mirsinis folia sicca egregiè referentia.

Hanc Casalp. sic describit: Sarcocolla inter lachrymas affertur minutissimis guttis constans, veluti sudore concreto, friabilis, subcandida, aut subruffa: sapore subamaro ac medicamentofo, in igne difficile ardet: artollitur in spumam, odore ingrato: de ea Diof. Plin. & Mes.

Dioscoridi lachryma est arboris in Perside nascentis, similis Thuri tenui, subfulva [ad ruborem inclians] in gustu amara. Vim habet glutinandi vulnera, & cohibendi fluxiones. Miscetur & Emplastris: adulteratur gummi ammixto. Verùm Plinio ea potius alba laudatur. Scribit enim esse qui & Sarcocollam spinæ lachrymam putent, polini Thuri similem, cum quadam acrimonia dulcem [in hoc à Dioscoridis & Galeni placitis maxime abcedit Plinius.] Cum vino tusam sistere

fluxiones; illini infantibus: vetustate & hanc maxime nigrescere: meliorem verò quò candidorem. Lachrymam hanc, inquit Matthiolus, Sarcocollam dixere Græci: quoniam sicuti glutinum lignum, ita hæc sauciata exulterataque corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos aduehitur, non omnis legitima est: quippe quod ea plerumque (vt de aliis quoque pluribus Lachrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lachrymis adulterata deferatur, & talis in officinis inueniatur. Verùm fraus gustu facile deprehenditur: quandoquidem, quæ amara non est adulterium sensit.

Plinio ad stipularem videtur Mesue dicens: Sarcocolla, est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori impressis, gummi album, Thuris modo, vel pallidum, idque amarum, & ob id valentius. Calfacit ordine secundo, siccatur minus, coquit, terget, aperit, digerit, vulnera etiam vetera, putrida terget, carne implet, glutinat [unde illi nomen.] Purgat pituitam crudam, & humores alios crassos, præcipuè à cerebro nervis, iunctis, ut ischio, & pulmonibus. Ob id lenibus, pituitosis, asthmaticis, tussientibus prodest, sed calvitium accersit, corpus impinguat, & sperma auget. Diof. Ophthalmicæ & lippitudinem, & alios oculorum morbos, mirè iuvat nutrita in vase vitreo dies quinque in lacte asinae, novo quotidie affuso. Aurium ulcers putrido, & sanioso utiliter imponitur, linamentum multa mersum, & pulvere huius inspersum. Datur cum Zingibere & Cardamomo, ut citius & valentius agat, vel hic Catapotius Haly lenis. Sarcocollæ ʒij. Turbith. ʒiij. Medullæ Colocythidis Zingiberis an. drach. j. f. Salis gemmæ drach. j. Sarcocollâ in aqua Rosarum solutâ, fiant pilule in dicta opera efficacissimæ. Ventriculo calido & bilioso est nocentissima Sarcocolla: ob id vitanda picrocholis est: aliis datur à drach. j. ad ij.

Sed notas has habet in hunc textum Sylvius. Quod carnem glutinet Græcis dicta, tanquam sit carnis colla, nam vulnera glutinat, & sine morfu siccatur Gal. Albam ruffæ præfert Plin. & annis nigrescere scribit. Aliis primo aut circiter calida videtur, nam Dioscoridi subamara, Plinio cum quadam acrimonia dulcis, Galeno emplastica, & parum amara dicitur, siccans sine morfu. Sperma verò augere, non legit in Diof. Ophthalmias discutere expertus est Manardus, ubi hæc constituerint: initio enim cum vino fluxiones oculorum sistit Dioscoridi & Plinio. Inquit præterea, Sarcocollâ veteres tantum vsi sunt foris, purgancem autem vim non dederunt, quæ etiam hodie parum est cognita. Si purgat, & ventriculo calido est noxia, impinguare videtur tantum per accidens: vacuus scilicet excrementis, probam nutritionem impediens, id quod aliis purgantibus est commune: sed dum correctæ est lacte asinino, calida humida evadit, ac ob id semen augere & promovere potest. Hanc dies quinque asinino lacte, in dies mutando, macerant: post aqua Rosarum dissolvunt, vt castigent. Huc vsque Sylvius.

## MYRRHA IN GENERE.

### CAP. XXXII.

TRIA aut saltem vno plura Myrrhæ genera etiam Veteribus fuisse cognita, Hippocratem de superfectione & natura muliebri satis continuis

Sarcocolla  
qua optima?  
Mesue.

Temperamentum.  
Vulnera.  
Humores crassi.  
Asthma.  
Sperma.  
Oculorum morbi.

Aurium & cetera.

Pilula de Sarcocolla.

Noxia.

Gracis Sui de datur. Annosa nigra.

Emplastrica Ophthalmia.

Purgandi Sui Veteribus inco-gnita.

Corrigens.

Genera.



Smyrna  
prima.  
Myrrha  
Calonia.Arbor A-  
rabia.Pediasimos.  
Strabe.

Gabyrea.

Troglodyti-  
ca.

Alba, mollis

Caucalis.

Ergati.

Pessima.

Aminnea.

reprobatur.

Exprimitur

ad oleum.

Adulterii.

Delebens.

Aminnea.

Smyrniacum.

Scyras o-

dore Myr-

rha.

Diole. cau-

rux falsiole-

gi admyria

pro myria

Troglodyti-

ca.

Culta.

Diole. pro

Myrrha

arboris.

demonstrare ducimus, dicentem: Σμύρνακος, τῆς, aut Myrrham Caloniam fuisse convenire rosaceo asfuso ad veteri procidentiam.

Ceterum, ut quæ, & quot sint Myrrhæ genera clarius fiat, in genere nonnulla de his præmittere conveniet, ipitum petitus à Dioscoride. Est igitur huic Myrrha lachryma arboris, nascentis in Arabia, similis Spinæ Egyptiacæ. Quæ ubi inciditur, defluit lachryma in substratas teges, partim etiam circum truncum concrevit. Et

quædam ex ipsa Pediasimos appellatur, pinguis, quæ dum exprimitur, statim excipitur: quædam Gabyrea pinguis, in fœcundis ac pinguibus locis nascentis, quæ etiam multam statim remittit.

Primas obtinet Troglodytica, à regione ipsam producente appellata, quæ subviridis [σποδία], melius ut puto ætendum subalbida Cæsp. pellucida & mordax est. Colligitur etiam quædam alba, quæ post Troglodyticam numeratur, mollis ut Bdellium, gravi aliquantulum odore, in apricis locis proveniens. Quædam

Caucalis vocatur, exoleta [βύρρατος], nigra, tota [ἐκ παντός]. Pessima verò inter omnes Ergati-  
ma appellatur, friabilis, non pinguis, actis, & asperius, & ubi bus gannetur res. Sed Aminnea [ἀμινnea] vocata reprobatur. Sed & expressio-  
nes ex ipsa sunt, à pinguibus odorata & pingues: à siccis, neque pingues, neque odorata, sed inefficaces, eò quod oleum assumpserunt in

efformando. Adulteratur gummi maceratum in Myrrha cremore. Elige recentem, friabilem, levem, unde quaque concolorem, & quæ inscandendo, albas, ad ungum speciem, laves strias intus habeat, & quæ in parvam glebam coacta est, amarum, odoratam, acceptam. Quæ verò gravis est, & colore piceo [vide sub proprio titulo] inuultu est.

Hæc Dioscor. qui Smyrni semen dicisse sapore Myrrhæ. Et: inveniri Syracis lachrymam gummi similem, pellucidam, Myrrham odore recentem.

Cornarius in notis in Diosc. asserit falsè legi *amynia* pro *myria*, non solum hic, sed etiam multis in locis, apud alios Græcos Medicos. Vi-

pote Galeno, Aetio, Paulo atque alijs. *myria* autem à loco, ubi nascitur, appellata est Myrrha, velut Gal. lib. 1. de antidotis testatur, eandem asserens esse Troglodyticam ac Minnæam. Vnde

magis mirum est, inquit. Dioscoridem tradere Troglodyticam Myrrham primas tenere, Minnæam, Aminneam illi didicam, vnde reprobat esse: Cùm etiam Plinius lib. 2. cap. 16. Troglodyticam

primam faciat, inter Myrrhæ genera, Erythream verò & Minnæam secundam, quibus generibus adhuc alia quatuor deinceps annumerat. Idem certè Plinius [addit] Thus Minnæam, à Minnæorum pago dictum tradit, eiusdem lib. cap. 14. ut certum sit Minnæam, & non Aminneam Myrrham appellari, quum in iisdem proveniant locis, Thus & Myrrhæ, eodem teste. Sed nobis mirum sanè videretur, quomodo fieri poterit, ut tot locis mendum sit.

Theophrastus Myrrham sub câne, ferventissimisque diebus incidi refert. Locum autem ubi gignatur Myrrha esse regionem Arabum mediam [μυρία] circa Sabe & Adramyta, & Citibana, & Mamati. Nasci quidem Myrrhæ arbores quoque alias super montem, alias in radice montis, locis in eam rem excelsis. Quamobrem alias colli, alias non. Montem autem præaltum esse & arboribus densum [δασύς] & nive tegi solitum. Amnes quoque de eo in plana fluere. Myrrham

miorem altitudine [Thuis scilicet] fruticosa-

remque: candide duro, contortèque iuxta terram, crassiorèque furā hominis: Corticem verò habere lævem, similem τῆς ἀδράχης. Alios verò qui se vidisse asserunt, de magnitudine, se se non consentire, neutram earum arborum magnam refert; minorem verò Myrrham, & humiliorem. Folium habere thuris. Sed huius Latium & læve [λευκὸν καὶ λεῖον] Myrrhæ autem aculeatum & non læve: Folium etiam simile habere Vitæ [στέκελον], Hemolans & Ruellius suspicantur cum Plinio legendum τῆς ἐλέγ[ας] πάλιν λέγει, ὅτι δάκρυ spinis horridum, ut Ilicis σπείνου. Esse autem & caudices & ramos incisos, sed alios veluti securi percussos videri: alios tenuiores incisuras habere. Lachrymā verò aliā decidere, aliam arbori inherere: Aliam subiectas teges ex palis contextas: albi solum eredi n parvum putum esse.

Tradit præterea idem theophrastus montem univertim Sabæis, divisum. Hòque il-  
lius loci Dominos esse, iustitiamque mutui dege-  
re, quamobrem nullum tuas ibores cultodire.

Vnde & thus & Myrrham sese largè ad naves, cùm solitudo [ἐρημία] foret, deprecasse. Eisdem quoque audivisse, Myrrham, thūisque collectum, undique ad Solis delubrum convehere, quod Sabæorum sit sanctissimu inter omnia

regionis illius, ac custodes Arabes armatos habere, singulique suum in thuris acervatum, & Myrrham eodem modo relinquere, postea super acervum tabulā, scriptam habente multitudinem mensurarum & pretij, quod pro singulis mensuris ponendum sit. Mercatores verò venientes illuc, tibellas adverte, eisque quod placuerit, ubi mensi fuerint, pretium in eodem

ponere loco, unde merces acceperint: facerdotem deinde venire, partemque tertiam pretij Deo accepta, reliquum ibidem relinquere: Idque servari tutissimè Dominis, donec acceptum venerint. Item hanc arborem similem esse terebintho, alios etiam quosdam dicere: Alios verò omnino esse terebinthum. Dicere eos, qui ab Arabibus thus advexerint, attulisse signa huius arboris Antigono, quæ nihil differant à terebintho, sed hos quidem alteri ignorantia quoque longè quidem maiore labore, qui

thus & Myrrham ex eadem arbore nasci putant. Myrrham adhuc aliam quandam stillatiam, aliam fictitiam, probatque meliorem gustu, & postea concolorem accipi. De thure & Myrrhæ fore se accepisse. Ac tandem testatur ex Hippocr. lino nati lachrymam similem Myrrhæ, quam quidam omnino Myrrham dicant.

Galenus (lib. de simpl. med. facult.) Myrrha lachryma est arboris eiusdem nominis, quæ maxime in Arabia invenitur, quæque aliquo loco incisa, hanc ipsam lachrymam emittit. Est ei optima Myrrha, quæ mundissima & tacta quidem aspera, & arida, & fragilis, & levis, & globulis pulillis: extinguitur uno colore, intrinsecus deinde subrufa, & veluti vênulas habens albicantes, odore suavi, gustu amara & exalefaciens. Hanc in montibus invenit scribit. Col-

ligi alteram autem Myrrham in planis, quæ & ipsa sit melior & pinguior, quamque exprime in liquorem soleant. Quod illius quasi liquidi-

sum est, in vascula reponi: & Græcis Myrrham stadem appellari. Verum, omnem esse stypticam, & acrem, & exalefactoriam. Huius itaque effectus vehementer commovere posse. Hanc nequaquam cogniti difficilem hisce, qui prius viderint, Novisse tamen opus esse, Myrrham, quam vulgo Troglodyticam appellant, antidotis ido-

*Mina.* mena esse. Hanc quidem *urdaia* vocant, à loco, in quo optima nasci feratur. Maxime verò hanc bene olere, nec *Opocalpasi* quicquam admissum habere.

*Opocalpasum.* Nos de hoc *Opocalpaso* plura postea ex Galeno, & aliis, ut & de eius veneno, ubi ostendemus oportuisse Galenum, alioqui Asiaticum, descripsisse & demonstrasse differentiam inter Myrrham & *Opocalpasum*.

*Myrrha; Plin.* Nunc historiam arboris Myrrham ferentis quam hactenus recitati diminutam dereliquerunt, Plin. cap. 15. lib. 12. complet, dicens: Myrrham in iisdem silvis [cum rhure] permixta arbore nasci tradidit aliqui, plures separatim.

*Locus.* Quippe multis in locis Arabia gignitur, ut apparebit in generibus. Convehitur & ex insulis laudata, petuntque eam etiam ad Troglodytas Sabæi transiti maris. Sativa quoque provenit, multum sylvestri prælata. Gaudet raris atque ablaqueationibus, melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spinâ, caduce duro & intorto, crassiore, quam rhuris, & ab radice etiam, quam reliqua sui parte. Corticem lævem, similemque unedoni: [rheoph. Adrachne] scabrum alij, spinosumque dixerunt. Foliolum Olivæ, verum crispus & aculeatum. Inba Olusatri. Aliqui similem Iunipero, scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuisse, qui è rhuris arbore, utrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Sativa.* Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spinâ, caduce duro & intorto, crassiore, quam rhuris, & ab radice etiam, quam reliqua sui parte. Corticem lævem, similemque unedoni: [rheoph. Adrachne] scabrum alij, spinosumque dixerunt. Foliolum Olivæ, verum crispus & aculeatum. Inba Olusatri. Aliqui similem Iunipero, scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuisse, qui è rhuris arbore, utrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Arbori descript.* Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spinâ, caduce duro & intorto, crassiore, quam rhuris, & ab radice etiam, quam reliqua sui parte. Corticem lævem, similemque unedoni: [rheoph. Adrachne] scabrum alij, spinosumque dixerunt. Foliolum Olivæ, verum crispus & aculeatum. Inba Olusatri. Aliqui similem Iunipero, scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuisse, qui è rhuris arbore, utrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Folio Olea aculeato.* Foliolum Olivæ, verum crispus & aculeatum. Inba Olusatri. Aliqui similem Iunipero, scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Iuniperi. Nec non fuisse, qui è rhuris arbore, utrumque nasci mentirentur. Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Inciso.* Inciduntur bis & ipsæ, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Stacte suda sponte.* Sudat autem sponte priusquam incidatur, Stacte dicta, cui nulla præfertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior æstiva. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regiam Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Cæterò passim à vulgo coemptam, in foliis confarcunt, ipsique Vnguentarii digerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.

*Genera.* Genera verò complura Myrrhæ. Troglodytica sylvestrium prima: sequens Minea, in qua & Aramiatica est & Anaritis Gebanitarum regno. tertia Dianitis. Quarta Collatiua. Quinta Sembracena, à civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Troglodytica.* Troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris. Sembracena prædictis caret vitis, ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem probatio est minutis glebis, nec rotundis, in concretu albicantis succi, & tabescentis: utque fracta candidos ungues habeat, gustu leviter amara. Secunda bonitas intus variæ. Pessima intus nigra: peior si etiam foris. Prætia ex occasione ementium varia. Adulteratur Lentisculis glebis, & gummi. Item Cucumeris succo amaritudinis causa, sicut ponderis, spuma argenti. Reliqua vitia deprehenduntur sapore gummi dente lentescens. Fallacissimè autem adulteratur Indica Myrrha, quæ ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum peius India affert facili distinctione. Requiescit hinc Plin.

*Mina.* Mina, in qua & Aramiatica est & Anaritis Gebanitarum regno. tertia Dianitis. Quarta Collatiua. Quinta Sembracena, à civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Dianitis.* Dianitis, in qua & Aramiatica est & Anaritis Gebanitarum regno. tertia Dianitis. Quarta Collatiua. Quinta Sembracena, à civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Collatiua.* Collatiua, in qua & Aramiatica est & Anaritis Gebanitarum regno. tertia Dianitis. Quarta Collatiua. Quinta Sembracena, à civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Sembracena.* Sembracena, à civitate regni Sabæorum mari proxima. Sexta, quam Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Dufartim.* Dufartim [Dufyrtim CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quæ in Messalam Oppidum confertur. Probatur troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed actior cæteris.

*Indica.* Indica Myrrha, quæ ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum peius India affert facili distinctione. Requiescit hinc Plin.

*Myrrha facinum pascinum.* Nominata hæc quoque Myrrha in sacris paginis: Ut Ecclesiastici cap. 24. Tanquam Cinnamonum & tanquam pila aromatica, & tanquam Myrrha electa emittit odorem bonum. Tanquam Galbanum, & Onyx, & Stacte, utque Thuris nidor in tabernaculo. Exod. cap. 30. Tu autem accipe tibi

aromatum præstantissimum, myrrhæ ingenue Sidos sacros quingentos & Cinamomi odorati dimidium eius, id est, ducentos & quinquaginta: & calami odorati ducentos & quinquaginta, & Cassiæ quingentos, prout est pondus sacrum: Et olei Olivæ Hinem. Et parabis ex illo Oleum vntionis factæ, vnguentum vnguentaria opere vnguentarii: Oleum vntionis sacre esto: Eoque vnguentorum conventus, & aream testimonij. Et paulò post. Edixit Iehova Moschi: Accipe tibi aromata Stactem & Onychem & Galbanum, Nardi folia cum Spicis, & Thus puram: vnumquodque solum cum altero solo esto: Et parabis ex eo solum, &c. Res sancta sanctarum esto vobis. Et Evangelij secundum Iohannem cap. 19. Venit autem Nicodemus, (is qui venerat ad Iesum nocte primùm) ferens misturam Myrrhæ & aloës libras quasi centum. Meminit huius ad extremum D. Hieron ad principium expl. Pl. 44. Myrrha & gutta, & cassia à vestimentis tuis. Quotidie Christo offers Myrrham, Christi bonus odor es & propterea Stactem, id est, Stellam, vel Guttam exhibes Domino. Narrant & ij, qui aromatatum novere virtutes, Stactem florem esse Myrrhæ. At ubi in nostris Codicibus Scriptum est Gutta vel Stacte, in Hebraico Ahaloth legitur.

Sed tempestivum, ut equivocationes, adulteria & substituta adumbremus. Voluntateque intelligi & Myrrham Stactem, & Succum, vel liquorem Myrrhæ, de quo mox: Alij verò Myrrham Bæoticam. Bælitum quidam Myrrhæ genus censent, ut suo capite paulò post demonstrabitur. Sub suo titulo quoque de Myrrha venenata (*Opocalpasum* Galeno dicta, & quæ cum Myrrhâ reperitur) tractabitur, quæ & ipsa nonnunquam pro legitima Myrrha habetur. Præterea Belzuinum quidam Myrrhæ Troglodyticam existimant, quæ opinio displicet. Anime insuper Indicum, quidam Myrrham Mineam, sive Ammineam putant, ut Amarus, quibus non assentimur. Nunc & Myrrhæ Stactem, inquit Sylv. Scyrax rubra dicitur Arabum familia. Adhæc dicit: Myrrha Stactem multo rarior ipsâ Myrrhâ est, nam quæ Scyrax liquida vulgò dicitur, si vera esset, Myrrha fuerit Stacte: sed cum odore sit retentissimo, à Myrrha alienissima res est. Hæc insuper (teste Diosc. & Plin.) adulteratur Gummi, vntant de monstratum, quod nos sapius observavimus, ac vidimus ignaros pharmacopæos, eligentes pro meliori Myrrha: verum id facili distingui potest: gustatum liquidum amarum non est, vel parum vntum crepitat, nec liquefit, lucidius quoque quam Myrrha, quod aqua liquefit, ac viscidum redditur. Sed & antè ex Plinio ostendimus, adulterari Lentisculis glebis, Cucumeris succo, & spuma argenti, ubi etiam traditur, quomodo adulterium deprehendi queat. Scribit & Theophrastus ex Hippofelino nasci lachrymam similem Myrrhæ, quam aliquomino dicant Myrrham. Plura qui volet hæc de re legat librum vmbelliferarum capite de Hippofelino.

Cæterò, ubi Myrrha deest, Galenus in succedaneis, si tamen liberis Galeni est (nobis enim, ait, calamus substatuatur), odoratum calami substituit: Constantinus autem Amygdalas amaras, Myropolæ verò nullo pacto sequuntur doctrinam eorū, qui iubent Avicennæ autoritate male intellectâ, Myrrhæ loco piper nigrum supponere. Piper namque Avicennæ hanc sententiam refellit, cum vntatur his verbis: pro Myrrhâ substituendum Piperis nigri dimidium aliqui perhibent, sed hoc falsum est.



# LIBER IX.

**Nomina** Myrrha, græcis *μύρρα*, Arab. *Ler*, *Mur*, seu *Mor*,  
**ling.** *Mirrha* Ital. *Myrrhen* germanis, & *Myrrhe* gal-  
 lis, Indis *Bola*, *Mira* Hispanis.

**Epitheta.** A Poëtis cognominatur *Arabs*, *Achæia*, *Assyria*, à  
 regione: *Orentia* & *Orontis* ab Oronte, *Cynareia*  
 & *Cynareis* à patre cui concubuit, à acido etiam  
 libidinosæ, incestuæ, sceleratæ, lævæ, maculosæ, & la-  
 chrymata: adhuc pinguis, fulvæ, olens, stillatæ, stil-  
 lans & decora. Fabulantur autem Poëtæ fuisse  
 Myrrham Cynaræ Cypriorum regis filiam, quæ  
 patri suo concubuit: ex eoque coitu suscep-  
 erit Adonidem, quæ postea cum pœnitens fa-  
 ctum desieret, in plantam sui nominis Deorum  
 commiseratione commutata sit. De hoc incestu  
 Ovid. lib. 1.  
*Accipit obsceno genitor sua viscera lecto,*  
*Virgineque metus levat, hinc atque rimentem.*  
*Plena patris thalamis, excedit, & iuppia divo*  
*Semina fert uter, conceptæque crimina portat.*  
 De eadem Prop. lib. 3.  
*Crimen & illa fuit patriâ succensa senectâ,*  
*Arboris in fronde tandem a Myrrha novæ.*

**Vires & v-** Myrrhæ vires refert Dioscorides his verbis:  
**ius.** Vm habet calefaciendi, soporem inducendi,  
 glutinandi, siccandi, adstringendi, mollit etiam  
 uterum conclusum & aperit. Ducit item menses  
 & sanguis celeriter cum Absinthio, aut Lupino-  
 rum cremore, ad Rutæ succo apposita. Sumitur  
 etiam & pro catapotio magnitudine Fabæ, ad  
 tussim veterem, & erectæ ter vice spirationem, &  
 luteris ac thoracis dolorem, alviq; solutionem,  
 & dysenterias. Solvit quoque tiores, duabus  
 horis ante accessionem cum Piperis & aqua ma-  
 gnitudine Fabæ pota. Arteriz etiam asperitatem,  
 & vocis raucitatem corrigit, lingua supposita, &  
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad  
 oris graveolentiam manducatur. Ad alarum do-  
 lores [nove] illinitur cum alumine liquido. Si ve-  
 rō cum vino & oleo collatur, dentes & gingi-  
 vas corroborat. Insuper quoque, vulnera in ca-  
 pite glutinat. Et confusas aures, & denudata os-  
 sa, cum cochleæ carne imposita sanat. Et pure  
 fluentes ac inflammatas aures, cum Papaveris  
 succo, Castorio ac Glaucio illita. Ad varos au-  
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines  
 dederit cum aceto. Desfluos item capillos cum  
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-  
 rat. Mitigat quoque diurnas destillationes, nati-  
 bus cum penna illitis. Replet ulcera in oculis, &  
 albugines, ac ea, quæ pupillis tenebras offun-  
 dunt, & asperitates dederit. Fit & fuligo & Myr-  
 rha similiter, ut ex Thure, velut mox ostende-  
 mus, ad eadem quoque commodans. At verō  
 Bœotica Myrrha, &c. vide postea.

**Tempera-** Galenus cum de Myrrha scripsisset, hæc de eius  
**mentum** facultate & usu literis mandavit: Myrrha secun-  
**Galen.** di ordinis est, tum excalefacientium, tum desic-  
**Vulnera.** cantium. Itaque capitum vulneribus illita gluti-  
 nare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per  
 quam setum & lumbricos, tum enecat, tum e-  
 citat. Adest hinc ei & abstergentis potentia. Sic i-  
 gitor ocularibus miscetur facultatibus, utique  
 quæ ad ulcera & crassas cicatrices præparantur.  
 Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad  
 tussim veterem & asthma, sive anhelationem ex-  
 hibentur, non tamen arteriam exasperat, ut  
 sunt abstergentium nonnulla. Verum adeo mo-  
 deratam obtinet absterfionem, ut nonnulli eam  
 arteriacis, quam vocant, medicamentis, commi-  
 sceant, tanquam sufficienter excalefaciens, & desic-  
 cans medicamen.

**Noxæ.** Alit Myrrha non ex omni parte beata. Scimus

enim cum Galeno Myrrhæ odorem plurimis et-  
 iam sanis dolorem capitis inducere, quare sanè  
 eos ipsos, qui iam caput dolent, non parum of-  
 fendet. Pastulas oculorum mundificat, utidem  
 Galenus testatur, qui te iubet ad podagram acci-  
 pere Myrrham *Mur* vocatam, herbamque Polica-  
 tem, aut pyzurcatum mystri mensura exaceto, &  
 pedes illinit. Dat præterea consilium, ut ad  
 temporum actotius capitis dolorem citra mani-  
 festas causas obortum, Myrrham vino quàm o-  
 ptimo tritam, & ad succi pitianæ crassitudinem  
 redactam illinas. Myrrham ungento pretiosissi-  
 mo tritam similiter adhibeas. In pueris autem,  
 incipit dolentibus, Myrrha cum oleo trita utri-  
 usque. Admonet tandem operæ precium esse, scire,  
 in quantum facultas ipsius sit concessoria hu-  
 morum præter naturam, & vitiosorum, in tan-  
 tum etiam convenienter, amitteri. In quan-  
 tum autem medicamentum sit, non convenien-  
 ter. Verum paucitatem eius ad concessionem  
 quippiam conferre, qualitate autem peregrini-  
 tatem non apparere, utpote viam ab odoratis.  
 Seditaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha  
 præparatè consuevit, ad securitatem perducere  
 semper tentantem ulum omnium pharmaco-  
 rum, præsertim ubi in acuta febris tale quid exhi-  
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-  
 scos vina erant Myrrhæ odore condita, ut appa-  
 ret in Plin. fabula, quæ Persa inscribitur. Mem-  
 init quoque Sabæos, cibos Thuris ligno co-  
 xisse, alios Myrrhæ. Myrrha citra additionem  
 (ait Actuarius) non insistentem discutit ac humidi-  
 tates consumit.

Caput of-  
fendit.

Podagra.

Consilium.

Vinum  
myrrhatum.

## MYRRHA

**C**LEBÆ Myrrhæ, aliæ pugillares ferè, aliæ  
 villanæ magnitudine & minoræ, colore  
 fulvo, ruffo, aut ferrugineo, aliæ pellucidæ, aliæ  
 minis, subinde etiam unguibus eximis albis  
 præditæ: sapore amaro, subacri: odore nares fe-  
 rit acriter, ubi adoletur: Nam flammam concipit,  
 dentibus attrita friabilius apparent, quàm  
 quod pro Bdellio exhibent, nec aquæ immeritè  
 dissolvuntur, ut gummi, sed diutius in ea relictæ,  
 limi instar dissolunt & flavescunt. Digitis etiam  
 facilius confringuntur, teranturque.

Descriptio  
Color

Sapor.  
Odor

Quibus notis faciliè distingues ab admixto a-  
 dulterato gummi, & suppositis glebis: quamvis  
 autem Myrrha rarior sit pura, talem tamen ha-  
 bemus, qualem descripsimus, ac sæpè cum adul-  
 terata reperitur, quæ minis amara, quàm sine-  
 ra, ac minus odorata: puræ odor incundior, li-  
 trita calefiat, ut liquidò apparuit nobis, tum ad  
 expressionem præpararetur, ut fieret Stactæ: Hac  
 Myrrha utebatur insignis ac peritissimus pharma-  
 copæus Valerandus Dourez, cum me protectore  
 præpararet Lugduni & Genevæ celebrem The-  
 riacam, quam Excellentissimorum earum urbium  
 Medicorum collegia approbaverunt.

Fracti Me-  
regitur in  
adulterio  
commissa

Nobis videtur contra sententiam Cordi, Myr-  
 rham puram esse resinam, & non liquorem, qui  
 dissolvatur in aqua, quod contra naturam resina-  
 rum. Sed hanc nostram opinionem stabilimus c.  
 de Myrrha Bœotica.

Cordus ne  
satur.

Optima quidem & vera Myrrhæ, vel Fuchsi  
 attestante, inventu rara est: ut hoc nomine me-  
 tuendum sit, Officinarum Myrrham non esse le-  
 gitimam. Suspicionem hanc auget, quod notæ,  
 quæ sunt apud Dioscorid. illi non conveniant.  
 Quin ipsi Bdellij indicia magis respondere vi-

Bdellium.

dentur, quàm Myrrha, ut ea de causa Bdellij potius, quàm Myrrha species quibuscum esse putetur. Quicquid autem sit, constat non esse optimam, nec inter Myrrhas deterimam. Apparet autem, eam esse Myrrha speciem, quæ *Caucalis* Dioscoridi nominatur. Quippe hæc *ὀπώρα*, hoc est, ultra tempestivatem suam producta, bonitatem suam amisit & exoletorum more arefcit, nigraque ac torrida exiit.

Fuchfio assentitur Cronemburg, supra antidotum Hoemagogam, dicens: Eligenda Myrrha non usualis nostra, quàm esse suspicor Dioscoridis *Caucalis* & *Ergasine* cognominatam, genuinam enim caremus. Galeus omnibus [Myrrhis] prætulit Minzæ, Diosc. Amminzæ damnavit, de diversis sicut Myrrha genere loquentes, ut ego arbitror. Audio tunc legitimam Myrrham ad nos advehi, sed tam paucam, ut hæcenus non viderim.

Cronemburgio subscribit Iqan. Agric. ita scribens: Myrrha, quam nos habemus, ea est, quæ secundo loco à Diosc. scribitur & *Caucalis* vocatur. Ipsi verò adscribitur Iodoc. V. Villich. in sua Dialectica, & Brunfeli. in suo libello de cons. Med. in cognosc. simpl. dum inquit, Myrrha vera non habetur, nisi fortè nostra communis sit, quæ à Dioscoride dicitur *Caucalis* sive *Ergasine*.

Myrrha rubra Aduario (inquit Syl.) *quæpiā admodum*, Myrrha verax eidem. Improbatur *dunypia* nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur Troglodytis, quæ & Minzæ dicitur à regione ubi præstantissimam gigni assument. Ea gravissimi est odoris, & nullo vitata liquore. Myrrha igitur Officinarum omninè adulteratæ parum turis est usus in fumendis.

Hic dicit Corn. ex hæcenus dictis Myrrham vulgè esse notam, sed generà à Dioscoride præscripta manere ignota. At iam lectis neglectis intelligat Matthiolum, cui Myrrha, quæ ex Alexandria Egypti hac ætate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter præstantissimas Myrrha species recensuit Diosc. Quippe universa ferè Myrrha, quæ in Officinarum usu habetur, iis omnibus qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Verùm si cuiuspiam fortasse videretur & hæc inter Myrrhas species esse recipienda (quod tamen non satis compertum habeo) aut *Caucalis*, aut *Ergasine*, esse crederim, aut potius, quam Plinius ex India deferri ait, cùm hæc cæteris deterioribus habeantur, certoque sciamus ex India in Alexandriam Myrrham importari. Nam ea, quæ plurimam ad nos affertur, non modò sicca, nigraque est, sed etiam retorrída, macilenta, & cavo quodam situ obducta: & quamquam inter huiusmodi globulos aliquod quandoque reperitur fragmentum, quod & clarum sit, & pellucens, contractum tamen diversicolor apparet. Ecquid magis? nec gustui insigniter amarum, nec Myrrha odore prædium sentitur. Quo fit, ut credere liceat, eiusmodi Myrrham, aut è deterioribus esse, aut gummi alieuius, aliorumque misturam adulterio minimè vacare. Cæterum electam Myrrham iam ad nos advehi scimus, quæ & legitima, & probatissima esse censetur. Verùm ea hæcenus tam rara est, ut non nisi ad ostentationem asservetur, & ad aliarum dignoscendarum regulam. Adhæc Brassavolo Ferrariensi animus inclinare videtur, ut existimet Myrrham, Officinis vulgarem Bdellium esse. Cui haudquaquam assensuendum putaverim: siquidem Myrrha hæc

pellucens adeò non est, nec Taurino glutino similis, ut Bdellium esse tradit Dioscorides. Et licet quadam nostratis Myrrha frustra quandoque translucida repetantur, sunt tamen potius hæc (ut dictum est) gummi adulteria, quàm Myrrha, vel Bdellium: nempe gustu maleficium detegitur. Præterea Bdellium ingenium, Dioscoridis testimonio, odorem unguibus odoratis similem spirat, quod in nostrate Myrrha nunquam, factò periculo, sum consecutus. Huic etiam alia accedit ratio, quæ magis ac magis Brassavoli animum immutare poterit: quod scilicet Bdellium diu digitis ductum, tractumque facillè lentescit, & contractum pingue spectetur. Myrrha verò, quæ Officinis venditur, digitorum attritu conteritur, & si frangatur, perquam arida sese offert. Cæterum improbat Diofcorides, omniumque Myrrharum specierum deterimam iudicavit, quæ aliquibus Minzæ, aliis Amineæ vocatur, quam cùm Galeus probaverit lib. 1. de Anat. omnibusque Troglodytum prætulit, factum est, ut existimaverint quidam, in hoc loco Dioscoridis codici mendam subesse. Sed cùm in Dioscoride Græco legatur Amineæ, & in Galeo Minzæ, ego potius crediderim, eos non idem Myrrha genus intellexisse. Quò fit, ut facillè crediderim nostri usus Myrrham, Indicam esse: namque per mare rubrum, & inde per Carovanas (vulgo dicunt) Alexandriam importatur. Postremò illud etiam notandum est, quod (ut Galeus inquit) Myrrha semper medicamentis esse commiscenda, cùm ab igne tolluntur: quippe, quæ coqui minimè patiatur, veluti etiam Thus & Aloë.

Sed quid Val. Cord. sentiat, audiamus. Iam dudum, inquit, de Myrrha incidit controversia negantibus etiam doctissimis viis nos veram Myrrham habere. Qui verò res ipsas diligenter inquisiverit, non poterit non videre, quod non tantum mediocri, verùm etiam optima Myrrha afferatur, quamvis hoc fiat rariss. Quod autem non frequenter contingat, sola in causa est Atomatopolæum, quos hodie Materialistas vocant, ignavia & infidia. Hi enim cùm partim etiam in Alexandriam navigent, facillè possent optimaque eligere & adportare.

Sed quid sit illud Officinarum Belzoini, ab aliis Ben Iudæum dictum scire haud dubiè malles (inquit Lang.) Troglodyte præstantiorem Myrrham electam arbitror, quæ item ex arboris in Arabia, Egypti spinæ similitudine nascentis, lachryma, cuius cortice inciso, in substratas palmeas tegetes, liquor eius defluit, aut in trunco arboris adeò tenaciter concrefcit, ut unà cum cortice avellatur, quem in Benzoi crebrò quoque conspiciamus. Habet sanè omnes Myrrhæ electæ proprietates, est namque friabilis: & fractum, in eo candida humanis unguibus similes, macule evulgent, ac (ut Ecclesiastes ait) fragrantissimum Deorum in templis suissimigium, Egypti ex tali Myrrha & Bdellio, humani vnguis colorem referente componebant: quod Damocrates τὸ κόπρι appellat. At nostra vulgaris Myrrha incensa, planè virolo odore foetet: quam adeò ab optima Myrrha degenerem, à Diosc. Ergasine dici arbitror. Sed etiam haud igroro, te amaritudinem Myrrhæ in Benzoi requirere, quod commascatum plàs dulcescit, quàm amarescit. Verùm scias, amaritudinem illam non omnibus Myrrhæ speciebus inesse. Nam Troglodytica leniter in ore lentescit, & (ut Diosc. ait) erosione quadam linguam pungit. Nec ob id quod amaritudinis expertus sit, interte poteris,

*Dilectum  
Bdellij &  
Myrrha.*

*Minzæ &  
Amineæ.*

*Diosc. locus  
suspectus.*

*Myrrha  
vulgaris est  
Indica.*

*Myrrha non  
est coquina.*

*Belzoini.  
Ben Iu-  
dæum.*

*Ergasine.*

Belzoini



Belzoin esse *Assam dulcem* : quum hæc apud Serapionem & Avicennam à Græcorum Lacerptio nihil differat : quod non amplius extare, satis, supérque probavimus. Quod si Officinarum Belzoin Myrrham dulcem appellare voles, nil moror: solet enim natura sæpè in rebus eiusdem speciei ad voluptatem, contrariis saporum qualitatibus ludere. Nam si Poma & Mala Punica, atque Arantia, tam dulcia, quàm acetosa, Amygdalas item tam dulces, quàm amaras, procreat: quid obsecro obstat poterit, quin etiam Myrrham tam dulcem, quàm amarā procreet? Nihil certè: pròinde obsecro, ut meam de Silphio, Assa dulci, & Myrrha & Belzoin censuram, ad commissitones tuos referas: illorumque iudicium quamptimum ad nos referbas. Hæc Langius.

Monachi verò, tenentes aliam opinionem, iniquunt. Veram Myrrham nunquam volumus videre: Nam illud, quod communiter pro Myrrha videntur aromarari, non esse Myrrham, nec Myrrhæ speciem facillimè ab inquirentibus deprehenditur. Nam ubi amaritudo insupportabilis: ubi odor suavissimus? Et quod Myrrha amara, immò amarissima sit, non solum per Dioscoridem, & alios rei medicæ auctores, verum etiam & per sacrum Evangelij Marcæ textum probatur: cum legitur, quod Servatori nostro, Christo, dederunt myrrhatum vinum, quod cum gustasset, propter amaritudinem insupportabilem (ut nonnulli sancti viri contemplantur) non accepit. Et quod Myrrha sit odoratissima, bonum videlicet odorem spirans, & per eosdem auctores, & per Sacros codices passim probari potest. Hæc autem falsò vocata Myrrha malè olet, & amaritudo eius est valdè debilis. Aliquorum iudicium non est spernendum, qui dicunt istam Officinam Myrrham, esse Bdellij speciem. Et licet Myrrhæ (ut testantur omnes fide digni auctores) sint plura genera & species, hæc tamen, quam falsò diximus vocari Myrrham (siquidem Myrrha est ea tertè est, quæ à Dioscoride Ergasima cognominatur, quæ omnium est deterius: vel ea ab eodem auctore damnata Aminnea dicta: quoniam aliarum specierum esse posse nobis non videtur. Sta-ctæ igitur loco Myrrhæ, admittenda est. Hæc Monachi, qui plura tradunt in Hist. nostra generali cap. de Syrace, quæ videre ibidem poteris.

Nos verò de Belzuino postea agemus, quod quicquid dicat Amato nullo modo Myrrham existimamus, cum Monachi & Langio: nec Sta-ctæ ex eo fieri potest, quæ respondeat Sta-ctæ veræ. Dum Langius (ut postea dicitur) vult Benzoinum esse Myrrham, reiciit Myrrham vulgarem, quam virosam odorem dicit habere, & non suavissimum. Verum vulgarem Myrrham propter odorem graviolem & non omnibus gratum, non censemus reiciendam: in legitima siquidem Myrrha non requiritur ita suavis, qualis Benzoini, cum dicat Diosc. tantum, esse *δωδύλον*: quod idem de Onyche sive vngue, ut etiam de radice Asclepiadis, & de foliis Aristolochiæ rotundæ. Quod ad locum Ecclesiastici, quem citant tum Langius, tum Monachi, non videtur facere ad approbandum Belzuin, vel ad reiciendam Myrrham vulgarem, ut utriusque volunt, ex eo enim, & altero, qui est in Exodo, argumentum desumimus, quo ostendimus nostram Myrrham ob odorem non usque adeò suavem nostris naribus, non esse reiciendam. Si inter aromata pretiosa ad vnguentum tam pretiosum & ad odores sumebantur Galbanum & Onyx (quæ quidem odorata sunt, sed nobis non suavia, & quibus fortè nunc nollemus

Tom. I.

uti, etiam Thure nolent uti delicates: verisimilias eos assumpsisse Myrrham potissimam qualem descripsimus, quæ nostro seculo rarior: quæ sanè non iniucundi odoris nobis videtur collata ad prædicta, licet aliquid gravitatis habeat, quæ quibuldam non est odiosa, ut antiquis non fuit, quamvis fortè delicatulis minùs grata, quales fuerunt Monachi, qui dixerunt malè olere. Itaque nullo modo sumendum Benzoinum, maxime cum nullam amaritudinem habeat, ipso etiam Langio teste, quod vnum ex signis bonitatis est Dioscoridi. Quod ad argumentum Monachorum de amaritudine, ob quam respuunt Myrrham vulgarem, dicentes esse valdè debilem, ac debere esse amaritudinis insupportabilis, ut dicunt fuisse vinum, quod oblatum fuerit Christo, Salvatori nostro, ac propterea non bibisse. Nal-lum vi-tes, quæ dixerit Myrrhæ insupportabilem amaritudinem, nec etiam apud D. Marcum dicitur enim ait: *Καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸν σωτῆρα τῆς πόλεως ἵδεν ὅτι ἡλός ἐστιν.* Hic non dicitur cur Salvator noster Iesus Christus non biberit: quumquam verisimile sit, quandoquidem apud Matth. scriptum. Dederunt ei acetum cum felle mistum, & quum gustasset, noluit bibere.

Purima (scribit Garc. arom.) adfertur etiam ex Arabia ad nos Myrrha, quæ Indis B. la dicitur: tum etiam ex regione Abessin, quæ AEthiopia est. Qualis verò sit arbor, quæ eam profert, aut quâ ratione resina eliciatur, nunquam scire potui. Intellexi duntaxat à quodam mercatore, qui in Melinde, & Mosambique negotiabat, quodam Siccifico AEthiopie, Episcopoque Armenio, genus esse quoddam hominum monachorum & sylvestre, quos *Bodoms* vocant, linguæque pura Arabica, quæ non nihil ad Chaldaicam, aut Syriacam antiquam accedat, ut perhibent. Id inquam hominum genus Myrrham in *Braon* & *Maqadago* Locis terrestri itinere adfert, & de Chaldaea regione sic illis vocata se adferre asserit.

Notat Hist. Lugd. Plinium, dicitque eum magnam Myrrhæ Historiæ partem ex Theophrasto mutatum esse. Ac negare plerosque Myrrham genuinam ad nos adferri.

Perhibent Lobel. & Peña Myrrham, quasi suavitè & odore fluentis, vnguentariæ dictæ, nomen indicare lachrymæ: multam esse huic affinitatem cum Bdellio. Myrrhâ item nos non carere certum esse, & hæc ab illo non tam specie, quàm accidentibus distare. Vtrum autem Bdellium præferendum sit, ambigunt. Frustra verò [addunt] velitari scriptores istos, & de colore refragari Herbario Senensi. Nam se vidisse in Officina Guillelmi Driesch periti Pharmacopœi Antuerpiensis.

Credit Cæsalpinus, quod Indica Myrrha [Plinio] è Spina quadam ibidem colligatur, tantò deterior, ut facilis sit distinctio: quod hoc nomine vendatur hodie lachryma, non in pastillos coacta, sed dissoluta in parva fragmenta, colore ruffo, aut livido, nigroque, gustu amara, odore parvo, non iucundo, ideo solis Medicis in vlu non vnguentariis: Et quæ vili pretio vendatur. Putat Indicam Myrrham esse à Plinio vocatam, sed facili distinctione, ac huiusmodi etiam apud Dioscoridem esse genera improbat. At Myrrham, unde exprimitur Sta-ctæ, rem odoratam esse, hoc è que Belzoi vocari. Nos verò diximus antè Myrrham veram adferri, sed sæpius adulteratam cum Guim, quæ minùs amara, quicquid dicat Cæsalpinus ex Plinio, meliorem verò esse gustu leviter amarant: Dioscorides enim dixit *συμφορεῖται*.

Dd.

Dissimulans non sumendum.

Ex Arabia.

Bola Indica. Ex Aethiopia.

Notatur Plin.

Myrrha unde dicta Bdellio.

Myrrha cum Bdellio magna affinitas.

Vulgaris Myrrha est Indica Plinio.

Cæsalpinus notatur.

Veram myrrham suapte natura amaram apparet ex ipsomet Plinio, dicente: adulterari gummi & Cucumeris succo, amaritudinis causa: Fortè Papius dixit meliorem leviter amatam, respectu adulteratæ cum Succo Cucumeris silv. Amara est certè vera myrrha, & non sine amaritudine, vt Benzoi, quod Myrrham vult Casalp. myrrham verò amatam esse, videtur etiam id demonstrare, quòd adversus lumbicos præscribat Dioscorides. Quinimò Monachi volunt veram Myrrham esse insupportabilis, vt aiunt, amaritudinis, allegantes Salvatorem nostrum propterea non voluisse bibere vinum: non tamen, vt antè dixi, concedo requiri tantam amaritudinem in Myrrha. Nomina recitavimus, dum Myrrhæ Historiam in genere prosequeremur.

**Vires & usus.** Myrrhæ quoque vires ex veteribus, iam antè posuimus, quare superest, vt, quæ recentiores de his scriptis mandarunt, annotemus.

Conducit igitur hæc [vt author est Matth.] hydropicis, cum Agrimonia pota. Iubet præterea quantanios famete de rad. j. Myrrhæ, cum Piperis tantundem, & bibere cum vino Malvatico calido horà vnà ante febris paroxysmum, quo epoto se contineat in lecto ad sudandum, id ter si faciant, febrem mitiorem evadere, vel tolli. Myrrhæ vsus est in medicamentis repugnantibus venenis, ac pesti: arcet enim putredinem. Si mulier rugas arcere voluerit à facie: accipiat laminâ ferri novam aut patellam, quam ignitam reddat, deinde os vino releat, ac subito ignito ferro aspergat, caput coopriat panno, ac vaporem in faciem recipiat. Postea iterum accendatur ferrum & superiniiciatur frustulum bonæ Myrrhæ, ac recipiat in faciem vaporem sub panno, quem deinde toti faciei superliget, ac superdormiat, si hoc bis in mense egerit, non est quod vereatur rugas. Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Rugæ faciei.** Myrrhæ quoque vires ex veteribus, iam antè posuimus, quare superest, vt, quæ recentiores de his scriptis mandarunt, annotemus.

Conducit igitur hæc [vt author est Matth.] hydropicis, cum Agrimonia pota. Iubet præterea quantanios famete de rad. j. Myrrhæ, cum Piperis tantundem, & bibere cum vino Malvatico calido horà vnà ante febris paroxysmum, quo epoto se contineat in lecto ad sudandum, id ter si faciant, febrem mitiorem evadere, vel tolli. Myrrhæ vsus est in medicamentis repugnantibus venenis, ac pesti: arcet enim putredinem. Si mulier rugas arcere voluerit à facie: accipiat laminâ ferri novam aut patellam, quam ignitam reddat, deinde os vino releat, ac subito ignito ferro aspergat, caput coopriat panno, ac vaporem in faciem recipiat. Postea iterum accendatur ferrum & superiniiciatur frustulum bonæ Myrrhæ, ac recipiat in faciem vaporem sub panno, quem deinde toti faciei superliget, ac superdormiat, si hoc bis in mense egerit, non est quod vereatur rugas. Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Alarum sudores.** Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Tædia.** Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Vlcus Scissæ.** Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Fontanus not.** Myrrhæ lachryma arboris in Arabia nascentis, adversus alarum sudores, & tædia cum liquido alumine à Porta illinitur: diurnas destillationes lenit, & oculorum ulcera complet: nudatque ossibus medetur. A Font. de morb. inter. purificato vlcere vesicæ dissolvitur trochisc. Gordonii in lacte ouillo, & per catheterem in vesicam iniicitur. Nos contra non possumus probare iniectionem hanc Fontani, propter pulverem Spodii, Myrrhæ & aliorum, quæ trochisci illi recipiunt.

**Oleum.** Myrrhinum oleum præparatum ab aliquibus paratur, contra Chiragram, & Podagram. Cicatrices insuper delet. A rugis quoque faciem frequens eius illinimentum præservat. Conficiens id autem hoc modo: Coquito ovum donec coctione durum fiat, partitor secundum longitudinem, in duas partes æquales, vitellum eximito, ac Myrrham eius loco pulverisatam imponito, ac in cellam vinariam, aut alium locum humidum, dum Myrrham disfluat, ac oleum fiat, reponito.

**Cicatrices.** Myrrhinum oleum præparatum ab aliquibus paratur, contra Chiragram, & Podagram. Cicatrices insuper delet. A rugis quoque faciem frequens eius illinimentum præservat. Conficiens id autem hoc modo: Coquito ovum donec coctione durum fiat, partitor secundum longitudinem, in duas partes æquales, vitellum eximito, ac Myrrham eius loco pulverisatam imponito, ac in cellam vinariam, aut alium locum humidum, dum Myrrham disfluat, ac oleum fiat, reponito.

**Ruga.** Myrrhinum oleum præparatum ab aliquibus paratur, contra Chiragram, & Podagram. Cicatrices insuper delet. A rugis quoque faciem frequens eius illinimentum præservat. Conficiens id autem hoc modo: Coquito ovum donec coctione durum fiat, partitor secundum longitudinem, in duas partes æquales, vitellum eximito, ac Myrrham eius loco pulverisatam imponito, ac in cellam vinariam, aut alium locum humidum, dum Myrrham disfluat, ac oleum fiat, reponito.

**Modus faciendi oleum.** Myrrhinum oleum præparatum ab aliquibus paratur, contra Chiragram, & Podagram. Cicatrices insuper delet. A rugis quoque faciem frequens eius illinimentum præservat. Conficiens id autem hoc modo: Coquito ovum donec coctione durum fiat, partitor secundum longitudinem, in duas partes æquales, vitellum eximito, ac Myrrham eius loco pulverisatam imponito, ac in cellam vinariam, aut alium locum humidum, dum Myrrham disfluat, ac oleum fiat, reponito.

**Electuarium.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Morbi stomachi.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Oppilationes.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Ventositates.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Putredo.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Dolores intestinorum.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

**Trochisci.** Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clementinus) sanat veteres morbos stomachi, hepatis, & splenis, remouet oppilationes, resolvit ventositates, & humores aquosos: prohibet putredinem, digerit crassos humores, & sedat dolores intestinorum. R. Myrrh. drach. iij. Croci, Acori, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauci, Apii, Ameos, Fœnic. Siler. mont. Carpopals. Trinum Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica, Mentha, Marrub. an. drach. j. Confice cum melle spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Trochisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

passiones, quæ ex retentione mēstruorum pro-  
veniant. R. Myrrh. drach. iij. Farinæ Lupinor.  
drach. v. Fol. Rutæ, Mentha, Puleg. Cumin. Ru-  
bear. unct. Alie. fœed. Serapini, Opopanac. an.  
drach. ij. Fac Throchisc. cum succo Cidamin. i. e.  
Panis porc. & da drach. ij. cum coctione seminis  
Juniperi. Vnguentum ex myrrha prohibet san-  
guinem & putredinem, generat carnem, & citò  
consolidat plagas. R. Myrrh. Aloës, Thuris, Sar-  
cocoll. an. unc. sem. mellis spumati vnc. iij. vini  
alb. boni vnc. ij. Coq. cum facilitate vsque ad spis-  
situdinem: sed si velles consumere carnem super-  
fluam eminentem, vel mortuam, adde Vitrioli  
drach. ij. Constat (inquit Ruell.) è myrrha  
vnguentum regibus Persicis dictum, quod illi  
capite, ceu diadematis vice gestabant, sed adde-  
batur myrrha Labiaz appellata, quàm multo præ-  
tiosiorē myrrhâ Dinon scribit.

## MYRRHA BOEOTICA.

**A**rboris cuiusdam in Bœotia nascentis [vt no-  
bis author est Dioscor.] conca radix est.  
Eligit autem eam, quæ odoris gratiâ similis est  
Myrrhæ. Vim habet calefacientem, molliendi,  
diffundendi: Vtiliter etiam in suffusis misce-  
tur.

Bœoticam myrrham necesse est, ait Cordus si-  
militer lachrymam esse. Quemadmodum enim  
myrrha arboris sui nominis la-  
chryma est, quæ in aqua dissolvitur: hoc addo vt à  
resinosi lachrymis, quæ in aqua minimè resol-  
vuntur, distinguatur: sic etiam par est Bœoti-  
cam myrrham, ex alicuius arboris parte aliqua  
manare: non enim frustra, sed ob similitudinem  
substantiæ, & qualitatis, quas cum myrrha paul-  
minut, quàm easdem habet, myrrhæ vocabulo  
appellata fuit. In hoc verò Dioscor. exemplari,  
quod marcellus Virgilius interpretatus est, clare  
legitur, Bœoticam myrrham nascentis cuiusdam in  
Bœotia arboris radicem esse, sed malè quantam  
mihi videtur: neque hoc interpretis culpa, ver-  
um exemplaris Græci vitio factum est, in quo sic  
scriptum reperitur: *ἡ δὲ βωτική ἐστὶν ἀπὸ τοῦ  
καὶ βωτική γέννηται τῆς ῥίζης*. h. e. Bœotica ve-  
rò myrrha est arboris cuiusdam in Bœotia na-  
scentis radix incisa. Fuisse autem alium verbo-  
rum ordinem & sensum in hoc capite Serapio in-  
dicat, cum in myrrhæ capite sic ait. Sed myrrha,  
quæ est ex terra, quæ dicitur Laptoteno [Bœo-  
tia] absconditur ex radice arboris, quæ est in ter-  
ris illis. Sic ille hoc Dioscor. caput reddidit, nec  
dicit Bœoticam myrrham incisam esse radicem,  
sed ex radice excindi, quemadmodum solent in-  
cisione elici reliquiliquores. Idem nobiscum sen-  
tit suis commentariis Marcell. Virg. interpres.  
myrrha autem hæc hodie omnino non cognosci-  
tur. Sed hic author Cordus est admodum dilu-  
tax fidei, & parum probatæ, idè considerandum  
proponimus an veram scribât myrrham lachry-  
mam quæ in aqua dissolvatur, & non resinam:  
Nos sanè contrarium sentimus.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.

De Bœotica Myrrha, quod dicat Matthiolus,  
non habet, quòd ætate sua (ut arbitratur) omni-  
bus incognita.



Arboris  
Myrrhae  
Descriptio.

ptum : suspicati sumus, esse arborem Myrrhæ: contorto est caudice, denso, horrentibusque spinis obfuso, folia habens Acaciae similia, sed paulo maiora. Bellonius Observat. lib. 2. cap. 30.

## DE STACTE IN GENERE.

STACTE, ut apud Diosc. videre est, appellatur recentis Myrrhæ, cum modica aqua confusæ, & per organum expressæ, pinguitudo, [id est nunc est] Odorata est valde, & pretiosa, & per seipsam est unguentum, quod Stacte appellatur. Probatum quæ oleum amixtum non habet, & quæ in minima portione plurimum vim possidet, atque hanc calefactoriam, ad Myrrhæ & unguentorum calefacientium proportionem.

Quæ Plinius de Stacte prodidit, eadem leguntur apud Corn. qui ita scribit : Quandoquidem Stactei ipsa per seipsam unguentum est, & Myrrhæ (ut Plinius ait) per se unguentum facit, sine oleo, Stacte (ita enim legendum est, & non Stactea) duntaxat, alioqui nimiam amaritudinem affert; inde adeo inter unguenta Diosc. de ea tractat. Et de arboribus Myrrhæ idem Plinius; Sudent, inquit, sponte pueri quæ non inciduntur, Stactem dictam, cui nulla præferunt. At contra hoc Diosc. non eam Stactem appellari dicit, quam sudent arbores, sed pinguitudinem recentis Myrrhæ cum modica aqua confusæ, & per organum expressæ, ut ita videatur Diosc. Plinij Stactem ignorasse. Plinius autem Dioscoridis Stactem improbat, ut quæ cum Stacte non sit, sed expressæ, nimiam amaritudinem afferat. Theophrastus lib. 9. duas Myrrhæ species facit, alteram Stactem, alteram Platæm. Hanc eundem ut arbitror, quod in grumum & glebam efformaretur, velut idem de Thure dixit, ut manum mole sua impleat, & pondere tertiam minorem partem excederet. Vnde etiam Diosc. in Narcisso, & Irino, Myrrhæ grumum addicere iussit. Hodie porro Stactem Officinæ, & barbari Medici Syracem liquidum vocant, quum Græci unum saltem Syracem agnoscerent; Stactem autem pro Balsamiliquore in Arabiæ & Syriæ affumunt.

Sed unde quæso colligit Corn. nimiam amaritudinem Stactem expressæ, nihil tale invenimus apud Plinium. Parum attendit quoque Plinius existimavit Stactem sudare ex arbore Myrrhæ, ait (citante Dalech.) Brodæus lib. 5. cap. 7. Non autem ex ipsa Myrrhæ. Quod Basilus in Pl. 4. confirmat, qui Stactem Myrrhæ tenuissimæ genus esse scribit. Quod enim primo effluit, in Stactem seponitur, quod crassum restat, Myrrhæ vocatur.

Stactem autem ex Ruellio dicitur, quoniam è stillatitia duntaxat fiat. Hodie Stactem Officinæ & Medicorum vulgus Syracem liquidum appellant, cum sit tulle Myrrhæ recentis pinguis flos. Factionis Mauritanicæ aut Arabicæ familiæ auctores citant Dioscoridis testimonium in Syracem liquido. Syracem pro Stacte usurparunt, vel nominis vicinitate falsi, vel quod duo Storacis (sic loquuntur) statuunt genera, liquidi & sicci, qui recentioribus Calamita dicitur, cum Græci quicunque de Syracæ quicquam prodiderint, unius duntaxat meminerint.

Stactem (Amanus enim quodque audiendus) pinguedo recentis Myrrhæ est, quæ hodie omnium votis Serapionem imitantium, Storax liquida est, quæ odoratissima pretiosissimæque ad paranda poma odorifera, & suffusis, Vnguentarij passim

Tom. I.

utuntur : apud verò Psalmistam, ut multi putant, Gutta, sive lachryma nominatur, quum legitur : *Gutta.* Propterea unxit te DEVS, DEVS tuus, oleo lætitie, præ confortibus tuis : Myrrhæ, & Guttæ, & Cassiæ. At reverà textus Davidicus non ita habet, ut Hebraica veritas indicat; quemita ad verbum Munsterus vertit : Dilexisti iustitiam, & odisti impietatem : propterea unxit te DEVS, DEVS tuus, oleo lætitie præ confortibus tuis, Myrrham, Aloën, & Kezam (redolent) omnia vestimenta tua. Hactenus Munsteri interpretatio, in qua, meâ quidem sententiâ, optimè verbum (redolent) supplet, & ex ea satis constat, Hieronymum, non bene Guttam pro Ahalod interpretatum, quum vox ipsa clamet Agallochum Græcorum esse, Romanorum verò lignum Aloës. Vnde Munsterus emendandus à me quoque venit, quum verbum Ahalod, Aloën vertit, cum reverà lignum Aloës, & non Aloen dicere debuisset : nam Aloë succus herbæ est quem Hebræi sua voce Aloë appellant, Ahalod verò lignum Aloës est, quomobrem Munsterus rectius sic interpretaretur, dicendo, Myrrham, lignum Aloës & Kezam (redolent) omnia vestimenta tua : sed quid per Kezam intelligere debeamus, quia Munsterus vocem istam, inconvertit, sam relinquit, dicamus, quod multi Rabbinorum, locum istum enarrantem, per Keizod, sive Keizam Costu intelligunt, sed reverà non sine ingenti, nec dicam pudendo errore, quum Costus bene Costus apud Hebræos Kerah dicatur. Est igitur Que Kerah Heziod, Cassia, quæ à Cinnamomo, ut diximus distat, in quam sententiam, vox ipsa Hebraica legitur, nam quæ Cassia à Ciziod derivata fuit, adeo ut loco Keizam, Cassiam interpretari licet, erat.

Et quamvis iam multa satis de Stactæ hic adscripta sint, non veremur tamen plura notatu digna hic subijcere. Monachis itaque verba facienda locum offerimus. Stactem autem, ut probari potest per Serapionem & alios plures, illa est, quæ ab ipso Serapione, Syrax, sive mavis Storax liquida appellatur. Nam ipse Serapio cap. de Storace, quod incipit Miha (Storax) primam loquitur auctoritate Isaac eben Amram, de pluribus speciebus Storacis. Hinc cum loquitur de liquida, auctoritate Dioscoridis : capitulum ipsius Dioscoridis de Stactæ, ad litteram ponit. Vnde quod Græci Stactem, Arabes Storacem liquidam vocant. Item ipse Serapio cap. de Myrrhæ, cuius principium est Ler, ait : Et est de ipsa res, quæ dicitur Bathnalas, & est grossa, à qua egreditur Miha, id est, Storax liquida, quoniam exprimitur, & dicitur Mirnastactem. Mirnastactem dixit, quasi diceret Myrrhæ, sive Myrrhæam Stactem. Ex quibus patet Græcorum Stactem, Storacem liquidam Arabum esse. Etenim Storax apud Arabes est species Myrrhæ liquidæ, quam Miham vocant. Vnde Haliabbas etiam in 2. pract. cap. 41. ait, Storacæ, & est species Miha. Quomobrem nihil dubites apponere pro Myrrhæ, optimam (si habes) Syracem liquidam, id est, Stactem Myrrhæ, vel Storacem liquidam veram, ab optima Storacæ expressam. Vel si non habes liquidam veram, præsentem apponito, & erit melius, quàm hoc, quod pro Myrrhæ venditur, quodque ignoramus quid sit.

Ita porro Aloisius Mundella, ne eius desideres verba, inquit : Si verà & pinguis Myrrhæ, Brasavolui ex qua Stactem fieri certum est, caremus, rationi consentaneum est, Stactem etiam verà nos carere : fieri enim hanc ex Pedialino, & Gabyrea, quæ

D d 2

Stactem unguentum.  
Dich. 1. 1. 1.

Plinij le-  
ctio corrigi-  
tur.

Stactem Plin-  
ius dicitur  
a, Diosc.

Theophrastus  
lib. 9.

Syrax li-  
quidum.

Corn. notat.  
Plin. re-  
preh.

Stactem un-  
do.

Error  
Munsteri-  
anorum.

Storax li-  
quida.

Ahalod.

Agallochus  
Ahalod non  
est Aloë id  
est Mun-  
sterum.

Aloë He-  
braicæ.

Keizod &  
Keizam  
Rabini nō  
bene Costus

Keizam  
Hebraicæ  
est Cusian.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

Storax li-  
quida.

Miha.

*Styrax*  
*guidus,*

li- sunt Myrrhae species, Diosc. tradit. Styrax autem hic noster liquidus, Staete esse non potest, cum nullam gustui amaritudinem adferat, quemadmodum ipse [Brassavole] infra etiam annotasti: neque ita ut Staete vehementer odorifer sit. Congruum enim videtur, cum Staete pinguitudo Myrrhae sit, Myrrhaeque amaritudinem praeferat, & odorem vehementem: Staeten quoque ambas illas qualitates penitus, vel certe multum earum repraesentare. Adde etiam, quod Styrax liquidus subviridis non est, quo colore prima omnium Troglodytica Myrrha à Diosc. describitur, cuius coloris quoque Staeten esse debere existimamus. Ruellius praeterea Styracem liquidum non esse Staeten, ut Medicorum vulgus opinatur, ostendit: verum infirmioribus quidem rationibus: non enim id, quod assumpsit, confirmat, & contrarium destruit: sed tantum causam erroris Arabum, vicinitatem nominis fuisse dicit, vel quia duo Storacis [sic enim loquuntur illi] generis, liquidi & siccis statuerunt, qui recentioribus Calamita dicitur, cum antiqui de imo tantum genere agant. Quare Ruellius si rectè dispicio, quod refellendum suscepit, his non confutat rationibus, Styracem scilicet liquidum non esse Staeten. Quocirca opinio illa, cui favere videtur, quod Styrax hic noster liquidus vulgaris, Staete sit, non valde nobis probatur, nisi & Staetes verè saporem, odorem, & colorem [ut scripti] manifestè reddiderit.

*Ruell nota-*  
*tur.*

*Styrax li-*  
*quidum non*  
*est Staete*  
*ut Sult*  
*Brassavol.*

Nec aspernandus Cordus, qui à dextris Aloisij stat, dicens: Antonius Musa, Styracem liquidam, Staeten esse constanter affirmat, sed malè meo quidem iudicio. Sunt enim naturè penitus diversae Styracis & Myrrhae arbores: & huius lachryma in aqua resolvitur, illius verò in oleo, vel oleo simili humore tantum. Myrrha praeterea optima ex aqua fit. Staete per se magno emittit. Styrax verò liquida admodum parvo. Quare cum ex plurima Myrrha, quantumvis bona, minimum exprimitur Staetes, & Storax liquida longe è minoris [quamquam Myrrha etiam longè vilius] veneat, nemo temerè affirmabit, eam Staeten esse. Quod si non satis efficax hoc argumentum contradicentibus videbitur, electa Myrrha Staeten expressissimam: quia vix aliqua reperitur, quae diutius & latius oleat, odore aromatum modo incundo. Sed propter gravitatem aliquam sensu irrepentem, facile somnum conciliat. Possunt nostro exemplo volentes, si veram Myrrham, eoque opumam eligant, non magno labore eam exprimere. Nam vulgò hodie apud nos non exprimitur, ob recentis Myrrhae inopiam, sed in Arabia Mecha copiosè adhuc confici negotiatores referant.

*Staeten*  
*expressit.*

*Somnum*  
*conciliat.*

*In Arabia*  
*Mecha co-*  
*ficitur.*

*Styrax li-*  
*quidus.*

Tandem his ita dictis, proxima sunt illa, quae Matthiolus refert, dicens: Staete Serapioni quemadmodum & reliquis Mauritanis, pariterque Officinis Styrax liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetis ubique venalis habetur, sed & in omnibus ferè Officinis reperitur, quae medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Staete Myrrha sit liquidus vocatus Styrax, facile probat Serapio: quippe qui capite de Styrace Calamita, liquidum Styracem ex Myrrha, primum aqua conspersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: quia in re Dioscoridem ad unguem imitatur. Cui quidem sententiae, illud ad stipulatur, quod liquidus Styrax (de legitimo sanè loquor) sit perquam odoratus, & gustui non obsecrè amarus. Porro animadvertendum est, quod hoc vero sincerum haud facile invenias, ut fermè

*Styracem*  
*sincerum*  
*haud facile*  
*invenias.*

evenit cum ceteris medicamentis, quae ex Alexandria Aegypti, vel Syria ad nos convehuntur. Siquidem cum omnia haec per Mauritanorum, Turcarum, Iudaeorumque manus transeant, qui nobis Christicolis semper dolos, fraudesque moluntur, acceptum Diis sacrificium facere sibi persuadent, cum nos aliqua in re fallere possunt. Ceterum, mea quidem fert opinio, si sinceram Staeten nancisci possemus, non alienum fore, ipsam in Myrrha locum substituere. Sed certè perquam difficile erit legitimam inveniri: nisi fortè verè Staete sit liquor ille, de quo superius in Balsami commentatione diximus. Huc usque Matth.

Staeten demum praeparabat pro Theriaca Valerandus Dourez ex Myrrha à nobis descripta eo modo, quo praescribit Diosc. quam tritum calefaciebat ad expressionem, quā sanè satis iucundi odoris, & amaram experiebatur. Vnde non immeritò, quondam Lucretius,

*Ant Amaracini blandum, Staeteque liquorem.*  
Columella.

Et melior Staete ponatur Achaea Myrrha. Finem facit Fuchl. de compos. med. lib. 1. Myrrha Staete, i. e. Ballastina, non est, nisi expressa recentis Myrrhae pinguitudo. Siquidem ex Myrrha recente pingui & solo latiore nata, largior exudat, ac extillat: dein cum aqua pauca tunditur, ac tandem exprimitur, amaritudine praecipua, odoratissima, pretiosissima, minima proportionem efficitur: Arabibus, & recentioribus Styrax, vel ut ipsi loquuntur Storax liquidus appellatur, id quod ex historia veterumque autorum cum Graecorum, cum Arabum facile patet.

Staete igitur, ut ex haecenus dictis colligere est propriè & communissimè dicitur de liquore Myrrhae, de quo dictum. Quare frustra se torquet Matth. dubitans an Balsamum sit Staete. Antonius verò Musa Styracem liquidam Staeten esse constanter affirmat: sed malè vel Cordi iudicio. Ruellio etiam teste, Staeten Officinæ & Medicorum vulgus Styracem liquidam quoque appellant, de qua postea. Amatus insuper malè statuit aelzuinum esse Myrrham.

Nec Ruellium praeterit Graecos etiam interdum Staeten pro lixivo, quod cineris elotio est, usurpasse, sed vel addere, vel subaudire nominis: Staete, Gutta, & pinguisimus flos Myrrhae Latini: Graecis sarrin: Hesp. Storace liquida: Ital. Storace liquida: Germ. Storax.

## CARPASVS ET OPOCAR-

PASYM.

### CAP. XXXIII.

QVAMQVAM minds constet quid Carpasus & Opocarpasum veteribus sit, non tamen praeteribimus, quin annotemus id, quod Diosc. Gal. Aëtius, Aegineta, Plin. Hermol. Rob. Confl. Gorrh. Matth. Corn. & Amatus de his posteritati transfunderunt.

Infit Diosc. in Alexiopharm. cap. 13. Epotus quoque Carpasus succus [ἐκ τῆς καρπασίνης] saporis inducit, ac repentim strangulationem infert. Adjuvantur itidem, qui hunc hauserunt epotæ citæ remedia. Sed v. Galen. lib. 1. de antid. cap. 12. perhibet: In optima Myrrha [ἡ ἀριστεύουσα] Opocarpasum reperitur, quod tamen à Myrrha differt. At Opocarpasum exitiali est, multosque nos forte quadam vidimus, nostræ ætatis decursu mori, quod

*Carpasus*  
*succus.*  
*Nocum.*  
*Remedium*  
*Opocarpasum.*



ri, quod Myrrham, cui Opocalpasum admistum esse nesciebant, assumpsissent. De industria namque qui Antidotos conficiunt, tanquam optimam talem Myrrham imponebant, eò quod viderant ipsam in collyriis optimam fuisse medicinam. Nempe saniem absque mordicatione extenuat, & interdum incipientes oculorum suffusiones, & adhuc tenues aufert. Atque siue in Emplastrum, siue in Ceratum, siue in extenuans aliquod medicamentum foris imponendum, talem Myrrham coniicias, remedij vim augebis. Ac intra corpus assumpta exitium affert. Succo huius illic [Capillos] & manebunt crispi ac nigri.

Nunc quid Aëcius apportet, percipiamus: Carpasi succus potatus soporem graviorem inducit, & sensus hebetat absque dolore, exudationem etiam facit & repentinam suffocationem cum exitiosa saniei reiectione. Opem verò sentiunt ex his, quibus curantur, qui Cicutam hauserunt & toxicum, atque item Ephemerum.

Nec recedit ab his Paulus Aegineta, dicens: Et Carpasi succus potatus soporem inducit, & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & Cicutæ, auxiliatur.

Sed Plin. Asinino lacte potio venena restinguit, peculiariter, si Opocarpatham [Dalech. Opocarpasum, Diosc. Aët. Aëgin.] potum sit. Qui & contra Dorycnium echini maximè prodesse scribit, & iis qui [Dalech. Carpasi ex Gal. & Diosc.] biberint, præcipuè eius iure sumpto [præcipuè iure sumptu Dal.] Hermol. quoque apud Plinium (& iis, qui succum Carpathi biberint) legit succum Carpathi, non Carpathi: quem Diosc. & ceteri Opocarpatham & Opocarpasum appellant inter venena. Adstruit præterea, quod cinis crematorum muricum potus contra Opocarpatham [Dalech. Opocarpasum alij] antidoto vicem obtineat. Legit idem contra Dorycnium aut Opocarpatum & non Dorigium aut Opocartum. Esse autem Opocarpatham id, quod Plinius aliquando succum vocavit Carpathi. Apud Diosc. verò ait, Opocarpasum, h. e. lac è Carpatho, siue Carpatho, vt Diosc. appeller, siue Carpatha, & Carpesia, vt Paulus, ex eodemne sint genere, an diverso non constare. Illud certum esse inter deleteria venena ponere succum. Notat Rob. Const. apud Plinium succum Carpathi, pro Carpathi: & Opocarpatham, pro Opocarpasum legi. Apud Paulum verò pro καρπάδα, corruptè scriptum esse καρπάδα: passim quoque apud Galenum depravatè legi οπωκαλπασι. Sed οπωκαλπασι & Gorth. legit, definit succum esse quandam venenatum & frigidum. Quid autem sit Carpasum non constare: Hoc vnum certum esse, non esse, quod dicitur, Carpesium, sed maximè diversum.

Quodnam hodie plantæ genus nobis Carpasum dici possit, fateor [inquit Matth.] me ignorare. Paulus Carpesiam vocat. Si quis asseret Opocalpasum, de quo scripsit Gal. lib. 1. de antid. & Opocarpasum à Dioscor. descriptum, vnum & idem esse medicamentum, is, meo iudicio, rem, vt aiunt, acu tetigisset. Licet idem Galenus non Opocalpasi, sed αὐτὸν καρπάδα mentionem faciat, tum lib. 1. comp. med. loc. tum lib. 5.

Hanc Matthioli sententiam recipit Cornarius, cuius etiam testimonio, falsò καρπάδα legitur apud Paulum. Quamvis in Galeni exemplis vulgaris οπωκαλπασι legatur: tamen non dubium est, ipsum de eodem Carpasi succo loqui, de quo Paulus, Aët. & Plin. Sed quæ de Calpaso mens Amati sit tandem percipe. Galeni tempore Myrrha adulterabatur succo arboris Calpasi dictæ, vnum

de succus iste Opocalpasus dicitur, omnino venenosus, & vitæ humanæ adversarius: quæ verò arbor sit Calpasus dicta, aut eius succus, non opus est scire, cum humano generi inimica. Eò quid: divinaturne vel somniat Amatus, ne dicam insanit? Galenus non declarat, an succus sit arboris, vel herbæ. Opus mehercle scire foret, quale sit Opocalpasum, quo adulteratur Myrrha evitandi periculi causâ, idè decebat Galenum ostendere, discrimen inter Myrrham & Opocalpasum, ut posteri ab ea cavere possent: quinimò utile fuisset indicasse symptomata, quæ assumpto Opocalpaso subsecuta essent.

Meminerimus autem ex iam dictis, quod Carpasi succus, ab Opocarpaso, aut Opocalpaso, non aliter quàm nominum duntaxat varietate differat. Ast vana proterus est illorum opinio, qui credidere [inquit Matth.] Carpasum, Carpesiam, & Carpesium vnam & eandem esse plantam. Nos de Carpesia Hist. nost. gener. lib. 27. iuxta Valerianas. Quæ tandem planta sit Carpasum, nondum apud Græcos invenit. Corn. reperit tamen ex Barbaris, qui Carpusiam, siue Carpasum arborem esse dicant, quæ item Oxyacantha vocetur. Sed incerta res est: nec satis tutum Barbaris de Græca voce pronuntiantibus fidem habere.

## BDELLIVM.

## CAP. XXXIV.



## BDELLI VERI Descrip.

Nomine magnas habeo glebas, Taurino glutini, vt habet Dioscor. aliquatenus similes, colore, inquam, ex fulco nonnihil rufescente, concretioneq; quâquam hac molli & tenaci, ad gummi magis accedente: sapore sub amarum est, multum tamen à Myrrhæ relinquitur. Odorem non insuavem spirat, flammamq; concipit, & quidem

pertinacem, licet cum crepitu. In superficie granula exudantis glebæ hinc inde apparent. In glebarum medio subinde digitals crassitudinis bacilli reperiuntur, spinosi. Exterior facies glebarum aliquando Myrrham vulgarem refert, coloris ferruginei, sed non tam intensi amaroris. Aliæ glebæ pro Bdellio adulterino exhibitæ, nigricantes, micis [si scindantur] pellucetibus, alioqui visis aciem nequaquam admittentes, consistentiâ & sapore gummi, cuius modo tenaciter dentibus hærent: concipiunt tamen flammam, relicto interitum crassamento copioso.

Bdellium, Βδέλλιον, quod alij αὐδελλον, alij βοκκόν nominant, lachryma est Officinarum iuxialis, Saracenicæ [αὐδελλον] potiùs, ut habent Plin. Galen. Oribas. Matth. arboris, quæ tamen rarò bona; & sincera, qualis à Diosc. describitur, habetur.

Gummi de-  
lectus.

Diof. Scie  
flustratur.  
Differen-  
tia.

Adulterin.

Brochom.  
Malachra.  
Hadrobolo.

Iocus.  
Peraticum.

Indicum  
Adulterin.  
adbor.

Balfrianu  
Candidi  
Pretium.

Mira ar-  
borum na-  
tura.

Bdellium  
Sarraceni-  
cum.  
Balfrianu  
Arabicum.  
Seythicum  
Diof. lectio  
ambigua.

De odore  
Onychis in-  
telligenda.

gummi scilicet gustu amarum, translucentum, Taurini glutinis in morem, intus pingue, lique- scens facile (Græcus codex *duarum* addit id est, quod facile mollescit, ligni ac fordis expers, sus- titu odoratum, ungui simile. Est etiamnum Bdellij genus, sordidum, nigrum, & uberius glebulis in offas conuolutum, Aspalathi odore in Basil. cod. *agda dūdes*: quidam *aspar dūdes*, vel po- tius *aspar dūdes*. Casalp. ait Serapio non *aspar dūdes* legit, id est, coactum in massam, sed *aspar dūdes*, id est, odore Aspalathi. Hoc Galenus Scoti- cum vocari tradit] ex India advectum. Defertur etiam à Petra oppido siccum, resinofum, subli- dum, sed facultate secundum. Adulteratur gum- mi, sed ita adulteratum, non perinde gustui ama- nitudinem representat, nec uque adeo suffitioni- bus odoratum.

Diminutam & hic dereliquerunt historiam Diof. & Galen. arboris ferentis Bdellium, quam Plin. lib. 12. cap. 9. complevit, dicens: Vicina est Bactriana, in qua Bdellium nominatissimum. Arbor nigra est, magnitudine Oleæ, folio Roboris. fructu Caprifici naturæque. Gummi alij Brochom appellant, alij Malachram, alij Maldacon. Ni- grum verò & in offas conuolutum Hadrobolon. Esse autem debet translucentum simile ceræ, odo- ratum, & cum ficitur pingue, gustu amarum ci- tra acorem. In sacris vino persulum odoratus. Nasaitur & in Arabia, Indiæque, & Media ac Ba- bylone. Aliqui Peraticum vocant ex Media ad- uectum. Facilius hoc & crustosius, amariùsque. At Indicum humidius, ac gummosum. Adultera- tur Amygdalæ nuce. Cætera eius genera cortice Scordasti. Ita vocatur arbor amula gummi. Sed deprehenduntur odore, colore, pondere, gustu, igne. Bactriano nidor siccus, multique candidi ungues. Præterea suum pondus, quod grauius esse, aut leuius non debeat. Pretium sincero in libras x. terni. Gentès supradictas Persis attingit, rubro mari (quod ibi Persicum vocauimus) longè in terra æstus agente, mirâ arborum natu- rā. Nam erosæ fale, inuictis derelictisque simi- les, sicco littore radicibus nudis polyporum mo- do amplexæ steriles harenas spectantur. Eadem mari adueniente fluctibus pulsata, resiliunt im- mobiles. Quin & pleno æstu operiuntur tota, ap- præteque arguentis rerum asperitate aquarum illas ali. Magnitudo miranda est, species similis lunedonis, pomum Amygdalis extrā, intus con- tortis nucleis.

Cæterò, Bdellium (inquit Corn.) & re, & no- mine, retinent Officinæ. Sed appellationes Sar- racenicæ, si tamen hæc rectè in Diof. legitur: & Ba- ftrianu, *Arbriani* apud Plinium, & *Arabici* & *Seythici* apud Galenum & Medicos Græcos exoleuerunt. Quod verò nigrum, crassarum glebarum esse Diof. di- cit, & Aspalathi odore, hoc est, *aspar dūdes*, *aspar dūdes*, ambiguum est, an *aspar dūdes* legendum sit, aut *aspar dūdes*, id est, in massam coactum, ut sit, quod Plin. dixit, Nigrum & in offas conuolutum hadrobolum, atque sic altera vox alteram expo- nat: aut si potius hoc accipiendum, ut ipse *aspar dūdes* vocem, in offas conuolutum exponat. De o- dore certè Aspalathi non adiecit. Et hoc tamen Aspalathi odorem habere potuit, sicut id, de qui prius dixit, Onychis. Sed & hic ambiguum est, quod Diof. dixit, *aspar dūdes* *aspar dūdes*, *aspar dūdes* quoniam Plinius dicat, Bactriano nidor siccus, mul- tique candidi ungues. Quod Diof. dixit, in sus- titu odoratum est, Onychi simile, de nulla alia si- militudine accipio, quàm ea, quæ odoris est in sus- titu Bdellij, ad eum odorem, qui ex Onychis

Indici conchilij testæ suffitu emergit. Et hinc a- ded Bdellium Onyx appellatur variis in locis a- Onyx. pud Gal. Posset autem huius odoris experimen- tum facile sumi, si verum Onychem haberemus. Quo modo verò multi illi candidi ungues in Plinio intelligi ac excusari possint, ex commentariis nostris cognosci potest. Nam ad ungues huma- nos nequaquam referendos illos esse, quod à mul- tis factum est, docuimus, quum nulla penitus unguum similitudo Bdellio conspiciatur. Pro Bdellio etiam *Onyx* femineo genere habetur apud eundem Galenum.

Quod Diof. ungui simile dixit (inquit Casalp.) de colore intelligit Plinius, non de odore, ut multi vertunt. Arabes autem Bdellium duplex tra- dunt, appellantes unum Bdellium de Mecca, arbo- ris fructum, ut tradit Avic. Alterum Bdellium In- daicum, lachrymam ipsam, fortè quia in suffumi- gis uti soletur à Iudeis, scribiturque à Moysè in Paradiso voluptatis oriri. Serapio duplici men- tione de Bdellio agit, una inter Palmas: de qua nos tractamus, sub titulo: *Palma minor Iudaica*. Alterà verò mentione Bdellium Iudaicum ap- pellans, gummi esse tradit, tantum scribens, quæ- pud Dioscoridem & Galenum de Bdellio scri- buntur.

Notandum venit, Bdellium hodie non Scy- thicum, aut Arabicum Myropolas appellare, sed Iudaicum potius, sub cuius nomine Olivus de co- quoque mentionem facit, qui dicit: Bdellium Iu- daicum, lucidum & fulgore coruscans, nufquam videram præclatis illis notis insigni, nisi in Ap- pollineo lactario Galeolani. Lachrymam arbo- ris Sarracenicæ verè appellaveris. Non desunt, qui non admittant Moysi sententiam asserentis, aurum quidem purum nasci in Phisonde fluvio, Græci vocant Getram & cum eo gigni Bdellium, pro quo alij intelligunt Carbunculos, & alij Cri- stallum, nescientes Iudaicum esse plantam, quæ & fructum, & gummi proferat. Vox Hebraica sonat Bdellion: placet itaque antiqua lectio. Eius fructus haud ita pridem ex Iudæa cæpit ad nos deuehi: quem Antonius Corneus Dodonæo miserat. De Bdellio Plinium consulito. Arabes plurimum de eo inepit videntur. Sed fructus eius magnitudine Nucis Iuglandis est; odoratus, ac putamine durissimus.

Sed suam nobis Martholus de Bdellio men- tem his recludit verbi. Bdellium. Mauritaniis *Molochil*, *Molochal*, *Mochol*, aut *Mochel*. Si nostro tempore in Italiam importatur, adeo rarum est, ut ad ostentationem tantum asservetur, vel ad a- adulterinæ & reprobati notam. Credidèrè qui- tam, hoc vulgare Bdellium, cuius passim in Offi- cinis est usus, constare partim ex nigro, quod In- lia mittit, partim verò ex eo Arabici generis, quod siccum & resinofum, livensque ex Petra defertur, cum tamen parum, vel nihil amaroris sentiat, est potius opinandum adulterinum esse. Huius, quo passim utimur, plura quidem habentur ge- nera, vidi nigrum, resinofum, odore fœtidum, Laseri quadantenus simile: aliud translucentum, nigrum, utpote taurinum glutinum, amaroris expers: quoddam adeo vulgari Myrrhæ persimile, ut ab ea vix dignosci possit. Quæ omnia genera, tametsi illegitima censentur, Officinis tamen, tanquam legitima passim usurpantur. Serapio Diof. Bdellium appellavit Iudaicum, licet Sarracenicæ arbo- ris fructus. Plinius, Galenus & Onbasime- nentur Bdellij Arabici. Per *aspar dūdes*, non fa- cile



collegi potest, quid intelligat Diosc. Ed tamen inclinatur animus, ut putem humanum unguem intelligi, quod Plinius de Bdellio differens Bactriano unguem reddat candidos. Id quod videtur etiam Bdellio assignasse Damocrates in suis carminibus, quibus cyphoeos compositionem cecinit, & quæ à Galeno referuntur. Bdellium tuum Qualebone, cum nigro sit colore, nec ulla in parte pellucidum, nec suffitu odoratum; sed virus potius redolens, cur id legitimum dicam non habeo. Quandoquidem sola amaritudo, quæ illi inest, ut cæteris ferè lachrymis, ac resinis, non sufficit, aliis non ad stipulantis notis, ut adulterinum hoc Bdellium, legitimum faciamus. Hætenus Matth. apud quem C. Bauh. has sex differentias habet: 1. Maioribus glebis rufum, & cum frangitur in plurimos grumulos diffiliens, mediocriter splendens: 2. Minoribus glebis subfufum, intus rufum, cum frangitur in duas partes quasi diffectum se dividens, translucens, densum, lentum, glutinosum, pingue & lachrymas albas calido in loco emittens: 3. Nigrum, intus nigro rufum, glutinosum, medium inter Thus & gummi Ceraforum qualitatem respiciens: 4. Nigrum quoque, sed intus alvum, purpureo colore, maxime translucens, molle, glutinosum, Cerasi gummi simile, eiusdemque saporis: 5. Colore & sapore priori simile, sed intus pallidis, aut candicantibus maculis distinguitur: 6. Pallidum, aut candidum, grumis oblongis, mediocribus, multis, longis, guttis densatis concretum, amarum, ingratum, omnibus speciebus accerrimum. Eligendum porro scribit in quovis genere, aspectu eodem frangitur, nudum, cornu, aut taurino glutini simile, magis translucens, pinguius & mollius, cum hoc recentis indicium sit.

Qualcebo.  
metatur.Differentia  
C. Bauh.

Delectus.

Myrrha  
species.Bdellij  
lignum.Bdellium  
unde de-  
ditum.

Fructum.

Cucio-phori  
fructum.

scribit modum: Iuglandis Nucis magnitudine; aut etiam amplior, triangulari ferè formâ, oblongiore tamen, & ad Ficum quodammodo accedente, odoratus, colore subcinereo, durissimo putamine, quod prægnans esse, & nucleum continere videtur.

Figura nostra, quam proponimus, est ex Lobe-  
Icon.

lio. Nos simile sanè lignum spinosum, cum bdellio à nobis descripto, observavimus. De fructu pro bdellio exhibitio, sub Cucio-phoro traditur. In Iconibus Plantin. figura Ligni & spinæ bdellij, malè posita est sub titulo Lacca. Exhibet iconem Hilt. Lugd. sub hac inscriptione, Myrrha aut bdellij suo furculo spinoso hærens. Penæ Herb. ant. Io. Cubæ tradit bdellium Serapioni Arab. vocati Melyalyend, & provenire in Hispania. Ex hac arbore provenire gummi dictum de Meka: de bdellio proveniente in Meka, scriptum esse Genes. 2. In Paradyso arbor cuius fructus est sars dulcis: Esse etiam bdellium Indicum, ac adulterari gummi Ceraforum aut Pyrorum. Herb. Cu-  
Plant er-  
ror.  
Myrrha  
aut Bdellium.  
Melyalyend  
Serapioni  
Paradyssi  
arbor.  
Gummi Py-  
rorum.  
Io. cubæ  
figmentum  
bæ pro bdellij icone habet monstrosam figmentum. Neque in Pyris nos observavimus Gummi. bdellium porro in Hispania provenire Euch. Ro-  
Euch taxa-  
tur.  
efs. quoque scribit, & Hispanicum melius fingi-  
tum esse, Indicum verò calidum. Sed hi, quem hac de re allegant, non habent. Quod genus bdellium exulatum volunt?

Bdellium quidem ab aliquibus (teste Plinio) AEquivocatur Scordalitis arbor, & nunc gummi bdellij, cuius cortice idem adulteratur. Dicitur Arabibus bdellium de Meccha arboris fructus Avicennæ Serapioni autem de Meccha arbore lunci folio. Audit Casalp. in Sicilia ex Palmis iis (quas Cefalones vulgò dicunt) effluere gummi odoratum, quod gentis bdellij fuerit apud Arabes. Habetur tandem bdellium Cucio-phoros.

Quidam somniaverunt communem Myrrham legitimum esse bdellium, teste Matthiolo. Sunt qui Animæ verum bdellium esse putant, inquit Clusius, ob multas, quas habet cum bdellij historia notas communes, de quibus suo loco dicimus. Olivo teste pro bdellio alij intelligunt Carbunculos, & alij Crystallum. Matth. pro bdellio in comp. Cyphoeos Damocratis Belzium supponendum censet: Nec abs re factum ipsi videbitur si bdellij loco selectissimus addatur Sty-rax. Quidam docti Medici Gallia, inter quos à Clusio Rondeletius censetur, existimant posse bdellio substitui Propolin. Si quis præterea bono caruerit bdellio, Galeni consilio in suis succedaneis (Amato eum allegante, eius loco arborum muscho utatur. Codex Galeni ascriptus de suppos. med. in bdellij penuria Sphaganum supponit, sed eum nulla sit Sphagani Musci arboris) cum bdellio communis facultas, id sanè cum Matth. probare non possum. Cornarius in compos. Cyphoeos, ubi vnguium bdellij meminit Diosc. fideles, loco vnguium bdellij apud Aetium Vnguem odoratum immisceat.

Bdellium, ut nobis author est Dioscorides, ca-  
Vires,  
lescit, & emollit duritias, turgentia guttura, humidasque hernias [Hernia.  
[Hernia, cum ieiuna saliva diluam] impositum.  
Vulvæ spiracula laxat appositum & suffitu, & par-  
tus, humiditatesque omnes extrahit, calculos potu  
Tus.  
Ad serpen-  
tes,  
comminuit, vinam movet, tussientibus & à serpente percussis vtilissime [vtiliter] datur.  
Tus.  
Ad serpen-  
tes,  
tur. Valet ad rupta, yssa, laterum dolores, & discursantes spiritus. Magnis interitus, quæ contra duritias, & nervorum nodos profunt: contusum verò resolvitur affuso vino, aut aqua calida.

# HISTORIAE PLANTARVM.

Galenus verò adellij facultates describens, ita inquit: adellum, quod Scythicum nominant, quod sanè & artius est, & resinofum magis, emollientis admodum est, & efficacia virtutis: at alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis desiccatur, quàm emollientia. Igitur quod recens & humidum est, & contusum faciliè mollescit, & ad omnia, ad quæ Scythicum idoneum est: ita quòd antiquius est, & admodum gustu amarum & acre, & ficcum, ab eorum, quæ indurata emolliunt, mediocritate recedit. Vtuntur autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad bronchocelas & hydrocelas, saliva matutinâ, ieiunâque, subigentes vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in potum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crurorum flatuum discursus, præterea laterum dolores & rupturas perferare. Bdelio etiâ maximè pro laxandis atque emolliendis tumorib. vtuntur.

Tumores.

## BELENIZAN AVT BELENZAN AVERRHOIS.

CAP. XXXV.

Nominum saltè, si res non alta, confinitas efficit, vt quidam, anthore Garcia, *Belenzan* existiment esse *Benivinum*, quæ quidem opinio ei non placet, vt mox apparebit ex eo capite, de *Benivino*.

Temperamentum.

Vires & vius.

Cæterum *Belenizan* [vt tradit Auerth.] aut *Belenzan*, siue *Petrozan*, exsiccantem & calefacientem in secundo excessu habet facultatem, stomachum humidum & languescentem exsiccatur & roboratur, oris odorem commendat, partes corporis confirmat, & venerem excitat.

Sed ex hac adèdè luccincta & brevi historia persuadere sibi non potest Garcia, esse *Benivi* quod sequenti capite describitur, quod si quis tamen contra sentiat, per ipsum licet.

## BENIOINVM, CVIVS ARBOR FOLIO CITRI.

CAP. XXXVI.

Benioini resina. Color.

Vngues. Substantia.

Odor.

Cortex.

Arbor ex Garcia.

Caudex. Relia Citri.

RESINA nomine Benioini Officinis cognita, magis constat glebis inæqualibus, puris, nec villa ferè sordè vt plurimum infectis: colore sunt massæ aliàs rutilante, aliàs magis ad albedinem vergente, & creberrimis ceu vnguibus, aut Amygdalarum friatura remissa: verum in rutilis illis massis obscurius lucent vngues, in aliis candidi admodum, sed non ita pellucidi: substantia omnibus satis compacta, sed vel attritu digitorum in pulverem friari potis, nec quæ sub dentibus lentescat, saporis ferè expers, verum odor suavissimus qui accenso vegetior. Eidem interdum adhaerescens invenitur cortex, qui magnæ satis arboris suspicionem iniicit, foris rugosus, ad cineraceum inclinans, substantiâ compactâ, colore intrinsecus ruffo ceu Cancellæ, qui gustanti nihil præter siccitatem quandam offerre videtur. Hæc nobis de Resina ista nobilissima comperta.

Arboris faciem tradit Garcia, Arbor, inquit, *Benivifera* procera est, vasta, pulchra, magnam spargens umbram, ob tumorum frequentia, quos pulcherrimo ordine digestos, & in aërem elatos habet. Caudice est crasso, materie prædura & summa. Eius folia partim aceto condita, partim

adhuc adhærentia accepi: minora sunt ea aliquatim Citri, siue Limonii foliis, non tamen adèdè virentia, sed parte adversâ candicantia, quæ verò in ipsi maioribus ramis nascuntur, ad Salicis folia magis accedere videntur, latiora tamen sunt, sed minus longa. Vulnerantur arbores, vt gummi, quod est *Benivi* de *Boninas*, emittant, quod est ex provincia *Baytros*, idque præstantius est eo, quod in *Sian* nascitur: natum verò in *Sian* reliquis generibus præstantius est.

Arbori scarificatio Locus.

*Benivi* plura sunt genera. Id autem maximè mercatoribus expetitur, quod Amygdaloide vocant, quòdque vngues, seu maculas candidas admixtas habet, Amygdalarum instar: quòd enim pluribus huiusmodi maculis abundat, tantò præstantius habetur. Maximè id provenit in *Sian*, & eius contermina *Mirtaban*. Erant illæ provincie supra regnum *Malacac* ad fluminum *Aræ* & *Menan* in Oceanum Indicum influxum supra *Gangeticum* sinum. Eius meminisse puto Antonium Musam, idque permixta eius radicem scobe adferri asserere: sed falsò, quandoquidem vnum idemque est gummi, aliud videlicet crassiori consistentiâ, aliud liquidiori, & aliud non plenè durâ, quæ deinde à Sole exusta magis albet. Id *Benivi* sic exsiccatum nonnunquam in farinam resolvitur, quam *Musa* radicem scobem esse putavit.

Benivi generis. Amygdaloides. Delectum.

Musa sapientis.

Aliud genus nigrius invenitur in *Iaoa* & *Samatra*, quod vilioris est pretii. Est & genus nigrum in *Samatra* è novellis arboribus profluens, quod ab odore grato *Benivi* de *Boninas* vocant: id superiore decuplo carius est: quod sapientiæ estimavi nihil aliud esse, quàm *Benivi* cum cum *Stryrace* liquida, quam *Chinenses* *Rocamalha* vocant, permixtum, quod volui semel experiri, mixto *Benivi* cum *Stryrace* liquida. Sed licet *Benivi* sic permixtum vulgari odoratus esset, odoris tamen fragrantia & suavitate à *Benivi* de *Boninas* superabatur.

Nigrius. Nigrum.

Rocamalha. Chinensis.

Cæterum *benivi* è novellis plantis profluens Amygdaloide odoratus esse, causam esse puto, quòd gummi multum innatae suæ fragrantie vetustate amittat, ut ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegatius est, nigrum verò & novellum odoratus, utrumque permiscere solent, ut odoris fragrantie etiam elegantiam concilient.

Benioi de Boninas cum novello permiscetur.

At quoque odorata non est *benivinum*, tamen nonnulli docti viri in ea fuerint sententia. Nunc illud restat, vt nostram sententiam vris argumentis comprobemus.

Asa non est.

Neminem *benivi* vquam in condimenta recepisse certum est: *Asa* verò ferè frequens est vltus condiendis cibis apud Indos. Adhæc maxima pars *Laseris* (*Asæ* ferè idè) ex India ultra *Gangetem* advchitur. *benivi* verò, quod in Indiam adfertur, quòdque Amygdaloide vocant, nascitur in *Samatra* & *Sian* [non in Armenia, aut Syria, Africa, aut Cyrene] cuiusque maxima pars huc convehitur: deinde in Arabiam, Persiam, & Asiam minorem deferitur, atque etiam [vt ex viro tunc fide dignorum relatu intellexi] in *Palæstinam*, *Syriam*, *Armeniam* & *Africam*. Anton. *Musa* imposuerunt igitur ij Lusitani, qui incolas, apud quos nascitur *benivi*, id gummi etiamnum *Laserpitium* vocare significarunt: quandoquidè ab indigenis *Caminham* appellatur. Ad *Ruellii* autem obiectionem, quem capite de *Lasere*, *Imperatoriam*, *Laser gallicum*, atque *Officinarum Benivinum* esse, contendere scripsi, sic respondeo. Cum is inter reliquis Imperatorie facultates hanc illi tribuat, vt libidines extinguat: in *Lasere* verò demonstratum sit eo vt ad venerem excitant dam

Benioini in condimentis non recipitur.

Laser ex India. Benioi de Samatra.

Laserpitium. Caminhia.

Imperatoria. Laser Gallicum.

Ruell. vt. fessitur.



Imperatoria Laferis genus esse non potest.

*Peteribus  
ignotum*

Nostrium Benivi veteribus ignotum fuisse omnino puto : siquidem nec Graecorum quempiam, neque quempiam Arabum hoc describere memini. Veteribus etiam Iudæis ignotum fuisse, ex eo conicietur, quod neque David, neque Salomon eius meminere, tamen si odores & suffimenta summo per e commendarent.

*Ruell. la-  
p. m.  
Ben in.  
daum.*

Fieri autem potest ut Ruellius [ in eo, quod Benivi, Ben Iudæum vocat ] lapsus fuerit nominum affinitate, debueritque potius nuncupare *Beniroy*, id est, filium de laaa, ubi plurimum nascitur.

*Locus.*

Scribit Mediolanensis quidam nasci Benivi in monte Paropanisio, & preter Macedones quosdam, qui in Monte Caucaio, odoratissimum, nostris quod multo præstantius se vidisse asserant, Ludovicum etiam Romanum citat.

*Lud. Rom.  
na.*

Ego verò neque huic Mediolanensi, neque illis Macedonibus facile crediderim, quandoquidem videre licet huc commentes tot Thraces (quos illi *Rumes* vocant) & tot Turcos, qui Benivi mercium gratia hinc trahunt: quos, si apud eos, Benivi nasceretur, alias potius merces, quæ maiors essent emolumentis & quæstus, transportaretur credibile est. Fieri autem potest, ut illi Macedones Styracem pro Benivi intellexerint: sed tamen nullibi Styracem nasci scimus, præterquam in Æthiopia, ubi etiam Myrrhæ reputatur.

*Cominham  
Lovanac.*

Benivi genera vocantur à Chinenfibus *Cominham*, ab Arabibus *Evaniay*, quasi dicas Thus de Iacon, quod hæc regio primùm Arabibus innotuit, Arabes enim Thus *Lovan* dicunt, Guzarate & Decan incolæ, *Udo*

*Scrip. de  
seripio.*

Scaligeri descriptio, quæ est exercit. 174. non parum variat, eam autem integram hic subiiciamus: Est mihi, inquit, arboris ipsius furculus, in meis Musarum thesauris, etiamnum aliquid è Benivium retinens ac spirans. Quin compressus non nihil lenti succi, qualis est Benivium, remittit. Quem à Ioa. Valada ex India delatum dono accepi. Is, ait, arborem esse, Amygdali facie, folio longiore: nullum ferre fructum, præter oblongas siliquas, compellat, oleo plenas, non semine: quo ex oleo ipsato conficiunt Benivium. Surculi constituti molli, lenta, striata, qualis foliis Caricis, aut Palmæ arefactis.

*Benivyn.*

Benivyn & in Iava habetur (Linschot. testimonio) sed copiosissimè in *Baros* & *Speriamen*, quæ duo sunt loca insulæ Samatæ Indiæ Orientalis. Appellatur ab incolis *Mignay* vel *Comignan*. Benivyn album æquè carè vendunt, ac ipsum etiam Caxas in Iava. Pari enim pondere vendunt, nec dispari pretio. Nigrum verò triplo carius dividitur quàm Caxas. Est & genus quoddam ibi

*Caxas.*

quod Benivyn vocant *Amenadado*, fragile, atque friabile, quales ferè sunt Amygdalæ contusæ, quod cæteris bonitate præstat. Omnium vilissimum crescit in *Palimban*, & *Samatra*.

*Meminit etiam huius Alois. Mund. in exam.*

Meminit etiam huius Alois. Mund. in exam. ad Brasl. Quàm rectè agant, inquiens, hi (è quorum numero est etiam Hieron. Eugub.) qui eo, quod belzivium vocant, Myrrhæ loco utuntur, viderint ipsi: certum enim est (ut alia omitam) omnis illud amaritudinis expertus esse.

*Substitu-  
Myrrhæ.*

Officinæ hodie duos habent succos spissos quos aliqui gummi esse putant: alterum vocant *Asam* dulcem, alterum *Asam* fœtidum. Hos ego inquit Corn. esse credo Silphij succos, sed unde allatos, non satis constat. Cyrenaicum sua ætate interisse scribit Plinius, nisi fortassis postea re-

*Asa dulci-  
silphij suc-  
cus.*

natum fuerit. Inde certè dulcem *Asam* esse verisimile esset, sicut ex Medico & Syriaco fœtidum. Nam Medicum & Syriacum Silphij succum Dioscor. virosi & graveolentis odoris esse testatur, sicut Cyrenaicum lenis & grati. Ex Indicis navigationibus hodie utrumque ad nos affertur satis notum est. Nam illorum lingua belzoi nominari, quod Latinis sit *Lafer*, ipsi nautæ testantur. Et *Asa* vocem ex *Lafer* esse corruptam minimè dubium est. Fœtidam propter graveolentiam, nostri vulgò *Merda* Diaboli appellant.

*Belzoi.*

*Merda*

*Diaboli.*

*Ben Iudæi.*

Ruell. benivium Officinis, sive *Ben Iudæum*, quod Iudæa parens huius, mittat ad nos prolem suam. Andern. libello de peste vocat simpliciter *Ben* & *Ben Iudæum*, ac ibidè etiam per *Asam* dulcem, sive *Laferpitium* intelligit benivium: in catal. verò Franc. belzoinum & benzoinum.

*Ben.*

*Asa.*

Cord. in Diosc. erroris eos accusat, qui *Asa* dulcem, sive benzoi, verum *Laferpitium* esse putant, in quorum numero est Ruellius, qui benivium pro benzoinum scripsit & interpretatus est prolem Iudææ parentis, cum tamen ex India adferatur. Idem in hist. benzoinum, sive benzoi, quod etiam *Asa* dulcis appellatur. Langij verò de benioino sententiam vide antè capite de Myrrha.

*Ruellij ar-  
ror.*

*Lafer non  
est.*

*Error quo-  
rundam.*

Cæterò, Beniovin (pergit Scalig. in Card. exerc. 142.) quod vos Itali *Belzoi* dicitis, falsò putant esse *Lafer* ab India: nec verum est, quod aiunt: à Vartomano scriptum in suis Navigationibus è *Lafer* fieri beniovin ac qui Latunum fecit, inscientiam addit audaciæ manifestam.

*Benzoi.*

Costa Italæadem ferè tradit de *Bengivo* (ita enim cum Garcia vocat) quæ Garcias, comprehensens Ruellium, Musam, & Mediolanensem, negansque esse *Asam*, vel *Laferpitium*, ac addens Matthiolum dicere, se veritate victum, coactum mutare sententiam: ut & Monachos in Mesuem dicere Cancamum non cognitum, quamvis aliqui belzionium existiment. Cancamum adhuc non esse belgioin, ut bene annotat Amatus. Atque etiam apud Valleriolam *Laferpitii* Indici *Lachrymam*, vulgò benioin vocari.

*Cancamum  
non est.  
Laferpitium.*

Lob. & Pena Adv. benzoin recentiorum non est succus Cyrenaicus, sed inventum recentioribus, & à Cancamo differt. Et alibi benzoin non est Cancamum Diosc. Licet censeat Anguillara, à Montano persuasus benzoin esse Cancamum. Si quidem is dicat epist. 1. Cancamum pronuntio cum Montano nihil aliud esse, quàm belzoinum, & corruptum textum ubi dicitur sapore incundo, quod demonstrari potest ex Paulo, & Serapione, ut etiam ostendit Matthiolum. Sed animus inclinat Agricola *Laferpitium* lachrymam illam esse, à se belzivium vocatam.

*Anguill.  
nor. qui  
Cancamum cum  
Montan.  
Benzoin  
esse dicit.*

Agricolæ partes susceperat Matth. quas postea infirmat. Credidimus iamdudum *Laferpitii* lachrymam nihil aliud esse, quàm illud iucundi ac suavis odoris gummi, quod Pharmacopœis atque Vnguentariis belzoinum nominatur. Verùm cum postea cepissem *Laferpitii* ac *Laferis* historiam diligentius examinare, faciliè in aliam deductus sum opinionem. Id gummi, quod *Seplasia* belzoinum dicunt, meò quidem iudicio, verum Silphij liquorem mentietur potius, quàm sit. Validi cortices, qui plerumque belzoino implicati repetiuntur, arguunt id arboris magnæ potius, quàm ferulaceæ plantæ lachrymam esse: quod etiam nuper retulit mihi quidam Medicus Cyprius, qui belzoinum nostrum in Cyprio ex arbore satis procera manare affirmavit. Quid autem veteribus fuerit gummi illud elegantissi-

*Laferpitium.*

*Belzoinum  
non est feru-  
lacea  
planta.*

*Ex arbore  
procera.*

*Myrrha  
non est.*

*Afa dulcis.*

*Laferpi-  
tium falsu.*

*Math. re-  
preh.  
Non Lafer.*

*Affa, iuxta  
eand.*

*Belzuinum  
Amygdali-  
num.*

*Sapor a-  
marus.*

*Orbi discre-  
pta à Dio-  
scoride.*

*Mineae.*

*Adversus  
Mauar.*

*Stalfe.*

*Vulgata.*

*Caucalis.*

*Locus.*

num, quod belzoinum appellant, mihi haecenus incompertum est. Non enim est, ut quidam volunt, probatissima Myrrha. Idem hinc. Germ. benioinum pretiosum est gummi & odorem ex India, alio nomine Afa dulcis dictum ad differentiam Afae scædæ. Sunt enim, qui hoc gummi, Laferpitij esse putent, sed falso.

Camer. ad Math. Arbor, quæ benioinum fert, magna & procera est: folia minora, quam Limonium, alterâ parte incana: locum autem, ubi provenit, non facile est adire, quam magno agmine armatorum propter Tigridem.

Ex Theoph. & Diosc. didicit Turnerus, Matthiolum, & quicumque benzoinum putant esse Lafer dulce Cyrenaicum, graviter errare. Theophrasto enim & Dioscoridi Laferpitium herba est, quotannis interiens, saltem quoad caulem, & summitates, cuius succus exsiccatum sit Lafer. Sumus autem ex fragmentis ramulorum ligneorum admixtis, tum experientia Ludovici Romani (quem citat etiam Matthiolum, alius scilicet contra seipsum arma subministrans) benzoinum, sive benzoinum, resinam esse arboris cuiusdam, non autem herbae lachrymam. Quod autem ad Afaam faciendam, non negaverim esse Lafer Medicum aut Syriacum, ut Matthiolum & alij docuerunt.

Anato præterea benzoinum non est Cancamum, sed Arabum Afa odorifera, quam ipse Silphium, sive Laferpitium odoratum vocat, precipue subnigrum, quod Lusitani à Beninis appellant.

Diffusit præterea lachryma ex arbore incisa, quæ Myrrha dicitur. Aliquando tamen in trunco ipsius arboris, lachryma ipsa concrevit. Quæ omnibus præstantior est Troglodytica, hodie apud Lusitanos, simul & reliquos Hispanos in Officiis, sub nomine belzuini Amygdalini, recepta, levis, subnigra, undique sibi concolor, fragilis, quæ confecta, album quid, ungues humanos, vel Amygdalas dealbatas referens ostendit: unde Lusitani qui ex India eam adferunt, belzoinum Amygdalinum vocant, ut inter eam & alteram nigram, propriè belzuinum bonum, sive ut illi dicunt, à boninas differentiam ponant, de quo cap. de Laferpitio sermo agitur. Verùm inest huic, de qua agimus lachryma, Myrrha Troglodytica, quam Hispani belzuinum Amygdalinum [ut dixi] vocant, sapor amarus, odor verò bonus, sed ita acer & vehemens, ac intensus, ut omnes affilentes, quum ex ea suffusiones fiunt, in sternutamenta prorumpunt, quæ de causa indies ab Hispanis magis despiciuntur, delicatioribus odoramentis abundantibus. Hunc odorem considerans Diosc. gravem odorem Myrrham habere dixit. Gal. verò lib. de Antid. eam gratissimi odoris esse tradit, quem ita esse deprehendimus, intensiorem tamen: sed animadvertendum, quod Gal. ibidem à Diosc. discrepat, quia Myrrham Mineam à regione, in qua nascitur, sic dictam, præstantissimam facit, quam tamen Diosc. ut improbam, & ceteris Myrrhæ speciebus peiorem, derelinquit. Hanc verò lachrymam belzuinum Amygdalinum dictum, rarè aut nunquam Italia vidit, quæ de causa non mirum est, si Marquardus vir diligentissimus lib. de Insul. epist. dixerit, non solum optimâ, sed etiam bonâ Myrrhâ caremus: ex hac verò Myrrhæ specie Stalfe præcipue conficitur, ac destillatur cum colore tum odore & sapore illi maximè conveniens. Ceterum vulgata & communis Myrrha, Diosc. Caulalis est, arida, colore nigro, & velut ab igne torrida, quæ ex

India quoque, præcipue in insula Farico dicta ad nos adfertur. Hanc verò falsò nonnulli adellum apud Diosc. esse contendunt.

Quid Amatus intelligat difficilè est scire: dubitamus enim, an eam intelligat, quam nos exhibemus pro Myrrha Troglodytica, quia dicit vocari belzuinum Amygdalinum, quamquam capite de Laferpitio aliud habeat, quod dicit vocari belzuinum boninas, quod quidem dulce est, ac à Langio existimatum Myrrha, cui opinioni se opposuit Aloisius Mundella. Notæ tamen, quas tribuit Amatus suo belzuino Amygdalino, veræ Myrrhæ conveniunt, quam exhibemus. Monachi in Mesuem dicunt, se nunquam vidisse Myrrham, & eam, quæ vultur aromatarij, non esse Secien Myrrhæ: quod si sit, esse Ergalinam: aut præterea non sine mendum iudicium eorum, qui de eant vulgarem Myrrham esse adellij speciem. Bacchanellus dicit nos veram Myrrham non habere, nisi fortè noisaa, Caulalis sit, vel Ergasine Diosc.

Quicquid porro dicat Amatus, non existimo, in belzuino Amygdalino, vulgò vocato, reperiri ullam amaritudinem, quod & alij testantur, nec ullum belzuinum amarum novi: quæ occasio, ut nullo modo Myrrham censeam, nec etiam verisimile est, Laferpitium, siye Silphium esse, cum herba fuerit. Adelli autem arbori, ineptè etiam germanicè nomen Mastervurz addicum. Langio etiam & Monachis non assentior, ut antè indicatum, belzuinum esse Myrrham. Odoratum Afa genus, inquit Apollon, à paucis annis illustres medicæ materiam indagantes, id quod Lafer Cyrenaicum, vulgò belzuinum, multò ante Cardanum & illustriarunt, & approbarunt. Matthiolum tamen priori suæ opinioni contrarius, belzuinum huius esse Laferem odoratum primum ex S. rabone defendit. Vbi verò Lafer, vel Allâ, sive succus Cyrenæicus simpliciter scribitur, belzuinum accipienda n. Montuo Afa odorata, & Beninum dicitur: Cardano & Gualtero Afa dulcis, Belza, Benzai.

Toxites in Onom. philol. Benquin / Wolric / chender Lafer / Wilder Gnanbaum / Arb. r tremula, arbor Grauat / sylvestris, Aspalathus, arbor Crispinus, Azarath, Aza dulcis, Afa odorata, Azarath, Darfischam Arab. Pharmacopœum Toxitem dixeris compositionem cuiusdam medicamenti miram instituentem, qui tot plantas hinc misceat.

An Saracen. de peste Lafer Indicum seu liquor Cyrenæicus Arabum interpret. bus Afa dicitur?

Afam dulcem à scæda distinguit Avicennas: Vnusque autem vicem supplere potest belzuinum nostrum: nec est Lafer ipsam, ut plerique falsò arbitrantur.

Varignana in Secretis de Afa aliquid. Verùm ego existimo Varignanam nescivisse quid esset Afa.

Disp. Colonien. Afa dulcis, Benzoi ex Taprobana insula hodie. Idem. Afa corruptè denominata à Lafer videtur: est autem duplex, videlicet aromatica & odorata Afa, & scæda. Afa aromatica seu odorata est Laferis seu Silphij opus, sive liquor Cyrenæicus, seu potius Indicus hoc tempore. Etenim Indicus etiam Mesie laudatur. Nam ex Taprobana insula in mari Indico maxima hodie à Lusitanis convehitur teste Lud. Romano belzoi indigenis dictus. Hæc ex Sylvio. Sed fatius est faceri Laferem, seu Laferpitium, seu Silphium non exire amplius, quod prægnatibus rationibus Io. Lang. docet in epist. med. Afa itaque dul-

*Adellum  
falsu.*

*Amatus  
dubius.*

*Laferpi-  
tium.  
Belzu-  
inum.*

*Myrrha  
Langio.*

*Monachi  
revertunt  
vulgarem.*

*Ergasine.  
Vulgare  
Myrrha  
Adelli  
species.*

*Caulalis.  
Ergasine.*

*Amat.  
notatur.  
Indicum  
authorum.*

*Math. mo-  
natur.  
Lafer.  
Afa.*

*Succus Cy-  
renæicus.*

*Afa odora-  
ta.  
Arbor tre-  
mula  
arb. Gra-  
uat silv.*

*Aspalathus  
arb. Cris-  
pina.  
Toxitei re-  
preh.*

*Saracen.*

*Afa du-  
cis.  
Benzoi.  
Duplex  
Afa.*

*Afa aro-  
matica.  
Liquor In-  
dicus.*

*Lafer non  
amplius ex-  
tat.*



dis seu benzoin, quodd apud Serap. & Avic. à Græcorum Lasepitiu nihil differat, Laseis succos esse non potest. Secundò Lud. Rom. refert belzoin esse gummi arboris, atque Lasei non arbor, sed *Βελζοϊν* ἢ *ἀλχημ* veteribus est. Cuius vero Officinarum *Belzoin* sive *Assa dulcis* sit, indicabitur paulò pòst.

*Harb.* in Ench. Liqueor Cyrenaicus aut Indicus non extat in Officinis: Namis, quem illa ostentant pro Indico & Cyrenaico liquore, quem gummi benzui vocant, potius est selectissima Myrrha. Quanquam non desint, qui hunc liquorem, quem Officina peculiari nomine Assam odoratam vocant, legitimum esse negent, quodd Assa odorata apud Indos in vñs condendorum ciborum veniat, benzui minimè.

Fuchsiò de comp. med. Cyrenaicus liquor, Officinis Medicorum Assa dulcis & belzoe, vel belzoin, & belzuinum nominatur. Sed qui sub hoc nomine in Officinis prostat, non legitimum, aut saltem quarundam rerum accessione depravatus, quodd nec acer, neque mordax sit. Præterea itaque, inquit, succo Lasepitiu Germanici, quodd *Μαγιστηριον* nominant nostri, ad compositionem medicamentorum vii. Ego quidem contra Fuchsi belzoe non putarim depravatum: sed quia non est opus Lasepitiu: idè etiam non habet signa.

Camerario apud Matth. Germ. Benzoi vocatur Assa dulcis, de quo legi possit Garcias.

Adolpho Occoni in pharm. Assa dulcis, ὀπός, *Σιλαφ*, Benzoi & Benioi, Lazer.

Acosta Ital. refutat eorum opinionem, qui volunt Assam odoratam esse Benginum atque inter illos Antonium Musam.

Tabern. apud V. Vilius, *Assa dulcis*, Benzoinum, Assa dulcis Officinarum, Assant Benzue / vel Assa dulcis.

Hadriano in Nom. Lasei Cyrenaicus ὀπός *κρυπταίνος*, vulgò Assa dulcis, odorata & gummi Benzoinum, Belg. Benzuyen.

Rhegino in exercit. Assa odorata, pro liquore Syrenaico Galeno vsurpatur: Myropola, inquit ille, Benzoin appellant: Lasei, aut Lasepitiu non est. Idem: Laseis liquor duplex: prior quidem Assa odorata, Galeno liquor Cyrenaicus dictus, & Benzuinum vulgarib. Medicis. Ex arbore, aut ferulaceo frutice non ex herba erumpit uttaque Lachryma, sive liquor, cum plarumque cortex adhaerens vsatur: quod nusquam apprehenditur in herbarum succis, nisi adulteratis. Sed quam bene sibi confert Rheginus apparet ex iam annotatis & magis apparebit in Lasei.

Lacuna ὀπός, Lasei, Arab. *Alruh* & Assa Castill. Benivy & Ben Iudaica. Liqueor Cyrenaicus Benivy existimatur.

Monachi huc usque non viderunt propriam & veram odoriferam Assam. Et quamvis aliqui, vt Manardus & Brassavolus, velint Benzuin vulgò vocatum esse Assam odoriferam, tamen hoc illis non clarè constat.

Bacchanel. in cons. Assa odorata, Lasei odoratus vulgò dicitur *Belzoino*. Notat verò non haberi Assam dulcem, & se eius loco succum Glyzyrrhizæ ponere, seu potius Belzoino.

Belzoi vulgò appellari Lachrymam ex Oriente advectam: Colligi ex arbore in India vt vult Lud. Rom. aut Lasepitiu esse apud Antiquos credere non possum, ait Cæspelinus: Hæc præterea addès Lachrymam odoratiorem appellant Belgioinum de Boninas: faspicor Myrrham esse. De Myrrha Theophrast. Dioscor. similiter tradit Lachrymam Arabiæ arboris, Myrrha, vnde exprimitur Sta-

te, res odorata est, quam Vnguentarii in folles confarciant, digeruntque odoris ac pinguedinis argumentis, vt inquit Plinius. Hæc hodie *Belzoi* vocatur, aliis *Bengioinum*: deest quidem amaritudo, gustu enim suavis potius est, quod cum his, quæ à Theophrast. traduntur, convenit. Nos verò Myrrham amaram esse demonstravimus capite de Myrrha, & idè non potest esse belzoinum, vt vult Cæsalp. & alii: Gefnero in catal. pl. *Cæsalp.* Lasei: *Lasepitiu*: cuius altera species odorata *nar.* Assa dulcis dicitur, sive *Benivinum*, quasi *Ben Iudaicum* ex sententia Ruellii. At mihi sanè verius arboris Lachrymà videtur.

## RESINA AMERICANA SIVE CARTHAGINENSIS, NOVI ORBIS.

### C A P. XXXVII.

**L**ACHRYMÆ Americana nomine Resina, à Descrip. D. Paludano communicata Ill. E. C. à qua nos habuimus, flammescit, odore ferè Picis, sapore subacri. Huc fortè eadem, eodem nomine, ab eodem D. Paludano data, consistentia, odore & sapore haud ita ab simili, colore rutilo, perspicua, cum prior visus aciem non transmittit.

Meminit Monard. Resinæ Carthaginensis, quæ an eadem sit, cum iam dicta, asserere non audeamus, de ea hæc tradit. Nunc etiam nobis nuntiat Carthago, novi Orbis provincia, resinam quandam purissimam, & odoratissimam, Abiegnâ aut Terebinthinâ Venetâ multò præstantiorem, iisdem facultatib. seu maioribus præditam, quam sit selectissima Terebinthina. Experientia docuit, utiliter iniici nervorum, articulorum, pedumque vulneribus, & antiquis vlcibus: magno etiam commodo, ea elota & preparata matronæ sibi faciem oblinunt.

## LIQUIDAMBAR RESINA ARBORIS OCOSOL DICTÆ, FOLIIS HEDERÆ, odore Styracis liquidæ.

### C A P. XXXVIII.

**L**IQUIDÆ Ambra nomine data à D. Paludano Resina, missa Ill. C. V. Virt. à qua habui, ceram mollitie imitatur, coloris ferè melini, non nihil obscuri, odore Styracis liquidi remissiore, tum accensa, tum non accensa, sapore quoque non ab simili. De hac autem resina ac eius arbore hæc tradit Monard.

Resina, quam Liquidambar, & oleosum quiddam, quod oleum de Liquidambar vocamus, ad nos ex Hispania nova adferuntur, utrumque odoratissimum, præsertim oleum, quod delicatioris Locis. & suavioris odoris est. Est verò Liquidambar resina effluens incisis arboribus, vastæ magnitudinis, pulchris & ramosis, quarum folia Hederaceis similia sunt, *Ocosol* Indi vocant, cortice crasso, *Cifolia*. nereio, qui incisus aut vulneratus crassum Liquidambar ei aculatur, cui cortex comminutus, odoris causa admiscetur, vt scilicet suavis & diutius spiret in suffutibus. Vbi nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est ætèr odor, adè vt Hispani primum eò appellentes, istic aromata nascantur, adè eas aromatiferas esse arbores existimarent. Tanta quantitate in Hispaniam infertur Liquidambar, vt mercium vicem suppleat, vñbus & doliis eo impletis: eo etenim hîc vtimur, in

*Cæsalp.*

*nar.*

*Descrip.*

*Descrip.*

*Resina. Li.*

*quidam-*

*bar.*

*Locus.*

*Arbor.*

*Hederaceæ*

*folia.*

*Ocosol.*

*Odor.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Quant. mai.*

*Styracis* l.  
quida sub  
speciem.

fuffibus, odoramentis, pallillis, Styracis liquida loco, cuius odor proximè ad hunc accedit : adeò autem validus est, ut celari, etiam fuffibus non additum, non possit, & totas ædes, si eius sit copia, atque adeò plateas suo odore repleat.

V(us.

Plurimum in Medicina illius usus, nam calefacit, roborat, resolvit, & anodinum est. Cerebrum, per se illitum, aut alius aromatibus mixtum, roborat, & doloribus liberat, omnigenosque dolores à causa frigida, emplatrum modo impostum, mitigat. Ventriculo adprimè utile, stomachici instar adhibitur: etenim ipsum roborat, concoctionem iuvat, digerit, concoquit, & appetentiam excitat. Cum Syracis, Ambrai, & Moschi momento mixtum Emplatrum consistens, & scuti forma super alutam extensum, omnibus prædictis morbis maxime prodest. Calidum in fine secundæ gradus, humidum in primo. Ex eo recens collecto, & istic reposito, ubi per se tenuior eius

Liquidum  
her

Oleum,

Latitudo  
 altitudo  
 vires  
 Tempera

*Адмиралъ*

7:05 14m.  
mitatuna  
arboris.

Locus.

Advchitur [inquit Clus. apud Monard.] Hi-  
palim, totius non dicam Bæricæ, sed etiam Hi-  
paniæ celeberrimum emporium, olei quoddam  
genus ex America, subruſſi coloris, cuius mira-  
biles prædicant effectus in omnibus uteri morbis.

TERMS

*Medera fo-*  
*us.*  
*fus.*

145.

tyracis  
nus.  
quidam-

Arbor foliis  
edera.  
leum spō-  
Rillans.

local ar- H  
be

Caterum ad Storacis genera reduci posse videtur Cæſalpino, quod ex India Occidentali affertur Liquidambar vocatum. Refina liquida albe odorata apprehenſis & arboris corticibus nullimo odore Styraeis. Eius arboremin nova ſuſcipia magnam tradunt : frequentibus ramis foliis Hederae, craſſo cortice, quo incifo laryma funditur prædicta: ex hac recenti ſtillare tradit per fe oleum quoddam odoratus, ac eximi quoque ut maiorem quantitatem habeant, minus perfectum quo chirotheas ſufficiunt. ſt. Lugd. *Liquidambar* elle dicit ex Ocool arbor, ſed qualis ſit ea arbor, non demonſtrat.

feris ( quæ neque Pinus , neque Cupressi dici possunt ) Pino altioribus & Cupressi modo re-  
ctis. In harum arborum cacamine vesiculæ quæ-  
dam enascuntur magnæ & parvæ, quibus confractis  
guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi  
diligenter concis expiunt, sed tanto labore &  
molestiâ, ut multi viri exiguam admodum quanti-  
tatem possint coere.

Hinc Monardes author descriptionis ex ver-  
sione Clusij Resinam abiegnam inscribit, & ex eo  
Hist. Lugd. quæ Indicæ nomen adiunxit.

Eius usus est in omnibus ad quæ Balsamum  
convenit, siquidem vulnera optimè curat; dolo-  
res ex materia frigida & flatulenta progentos  
mitigat. Vtilis est etiam stomachi vitiiis ab humo-  
re frigido, aut flatibus, sumpta ex modico vino  
albo.

CAN CAMVM.

С А Р. XL.

D E Cancamo [inquit Cornar.] Paulus inter simpliciaidem, quod Diosc. tradit. Sed pro voce *Cenamo*, quæ gravem ac virosum odorem significat, habet *Candis*, quæ odoratum ac gratum odorem indicat. Serapio cum Arabum gentis Medica, *Laccam* appellat, & Dioscoridis & Pauli verba citat. Citat etiam Galeni de Lacca verba, quæ ego neque in Græco exemplari reperio, neque in Latina nostrâ, magna ex parte, translationis editione habentur. Recipitur autem in mulas Arabum compositionibus, & eam, quæ *Dialacca* appellatur, de se cognominat. Et Officinis quoque hodie satis hæc nota est. Galenus *γυνή* quidem radicem habet, rem à Cancamo diversissimam. Sed non Cancani, sed Cancant legendum esse, ex Paulô constat, qui eadem de *ισο* lib. 7. inter simplicia tradit, quæ Galenus habet. Quid verò sit Cancanum, & an idem sit, quod Bacanum, utrumque enim reperitur lib. 3. *Βα* dolabellarum cap. 46. considerandum proponitur in Paulum Ægipetam.

Cancamum, uicunque, Laccam quidam esse  
tutunt. Hottum mirus error deprehenditur.  
um Cancamum gummi odoriferum sit, Lacc  
ntem non gummi arboris, aut plantæ aliuscu  
d potius formicarum alatarum fercus (ut Ama  
us quoque attestatur) favagove, velut cera a  
um. Sed hæc de Lacca hoc loco sufficient, & ad  
stitutum nostrum, hoc est, an Cancamum sit  
enzoinum (quod voluerunt aliqui, inter quos  
t Anguillara, & olim Amatus,) revertamur.  
cancamum igitur ælzuinum non est, ut rece  
ui canam, inquit Amatus. benzoinum siquid  
Silphium, five Lasepticum odoratum no  
um est, præcipue subnigrum, cum quodam ru  
re. Vult tandem Amatus Cancamum esse gum  
quoddam, quod Anium vocetur. Sed quã  
ntis autentate hoc afferat, fatemur nos latere.  
os de Anime cap. sequenti.

Cgnerus hodie loco non probat eos, qui Can- Err  
rum apud Diofcor. per c. aspiratum fcribunt: runc  
autem, inquit, nullam huius lachrymæ  
mentionem à Galeno fieri. Ex confinio Cafiz  
namque & Cancium & Turum in vehi no-  
Plinius, nec alibi plura. Serapio & alij Arabes  
appellant: Laccam vertunt interpretes. Sed Lacc  
hodie in Officiis Laca vocatur, nec odo-  
rati, nec fimiles habere vires videtur. Ego  
ncam, five Laccæ [ ut vertunt Arabes ] loco, medica-

Resina .  
bign. .  
Indica.

Vires.  
Vulnera.

1455.

ALABAMA.

SC 675472A.

equivoco.

之曰曰氣。

145. 200-  
45.

24

ABIEGNA RESINA INDICA LI-  
QUIDA.

САР. XXXIX.

Locus?

**I**N novi orbis continente colligitur liquor five  
resina, quam Abiegnam vocant, ex arboribus



*Cancami* medicamentis, Myrrham potiùs iniecerim. Mo-  
*substitu-* nachi autem [teste Amato] qui nuper Antido-  
*rum.* tarium exposuerunt, altà mente cæcutiunt, de-  
*Monachi* lirantve, quum in compositione Dialacæ, di-  
*repreh.* cant: Si defecerit Cancamum sive Lacca, eius lo-  
 eo iniciatur lachryma sanguinis Draconis. Quan-  
 to verò errore, omnes norunt, quum Lacca aperi-  
 tiva sit, & menses provocet: sanguis verò Dra-  
 conis tantum abest, ut aperiatur, ut potiùs miro  
 modo constituitur.

*Nomina* Cancamum Græcè *κάνκαμος*, Hisp. & Lusit. *Ani-*  
*linguar.* *me blanco*, Arab. *Sac, Labi*, Officinis *Lacca*.

*Locus.* Loci & vitium n meminit etiam Paulus lib. 7. suæ  
 Medicinæ, dicens: Cancamum Lachryma est ar-  
 boris in Arabia Myrrhæ similis, odore grato, quâ  
 etiam ad luthum utuntur.

*Vit.* Vis eius est obesos extenuare, abstergere &  
 aperire obstructa. Cancamum, inquit Dioscori-  
 des, Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodam-  
 modo similis, virosi gustus, quam ad luthimenta  
 usurpant. Vestes eo additis Styace & myrrhæ  
 suffiuntur, datur lienosis, comitialibus & suspi-  
 ciosis: menses cum aqua multa pellit, oculorum  
 cicatrices confestim emendat: ac vino madefa-  
 ctum, eorum medetur hebetudinibus, adversus  
 gingivas humore prægnantes non aliud effica-  
 cius, ut & ad dolores dentium ac per pluresculos  
 dies ternum obolorum pondere: ex aqua aut a-  
 ceto mullo bibitum obesos extenuat.

## ANIME ET COPAL.

## CAP. XLI.

*Folia Myr-*  
*ti*  
*Animum*  
*album.*  
*Animum*  
*subnigrum.*  
*Myrrha.*  
*Cancami.*  
*Myrrha*  
*Minea Sel*  
*Aminea:*  
*Animum*  
*guami*  
*ab hinc Ca-*  
*camum*  
*Nigrum.*  
*Myrrha.*  
*Amat. m.*  
 ANIME mentionem fecit Amat. Lusit. lib. 1.  
 Anar. 23. in Diosc. his verbis: Cancamum Dio-  
 scorides est gummi quoddam, quod ex Guinea  
 Mina, Africæ, & insulis illi circumiacentibus  
 Lusitani nostri advehunt, *Animum* appellant,  
 quod testantur decidere ex proceris arboribus  
 quibus folia Myrti, unum album, alterum subni-  
 grum, Myrrhæ quodammodo simile, odoratum,  
 quod Diosc. inter Myrrhæ species, tanquam im-  
 probam commemorat, & Mineam, à certa unde  
 præcipue nascitur, eam appellat: quanquam Se-  
 rapio Mineam nominet, unde Lusitani voce  
 corruptâ, pro Minea, vel Aminea, *Animum* vo-  
 cant. Hanc verò assertionem primò adstruxit Cri-  
 sotus Gallus, & Cancamum esse dixit.

Sed ad memoriam hinc revocandum est, quòd  
 non solum Galeno in antidotis Myrrha Minea,  
 vel Aminea dicta cognita fuerit, sed hodie quo-  
 que in Lusitania & universa Hispania paucis im-  
 mutatis litens habeatur, *Gummi Animum* appel-  
 lantibus, cuius duo genera, album, & nigrum.  
 Nam album Cancamum esse ex Aristoto didici-  
 mus: nigrum verò Minea Myrrha Dioscoridis  
 est. An verò Minea hæc regio, Mina hodie di-  
 cta, Regi Lusitanicæ parens sit, Cosmographis in-  
 quirendum relinquo. Scio enim in hac regione,  
 Animum optimum quoque reperiri, à qua quo-  
 tannis Lusitani nostri in Portugalliam adferunt.  
 Galenus verò Mineam Myrrham inter cæteras  
 species præcipuam collocavit, quâ de causâ in illo  
 textu libri de Antidotis, aut in Dioscoridis,  
 mendum esse suspicor, quum Dioscorides ex dia-  
 metro contradicat.

Amatis ergo, [non aspernandus aliàs botani-  
 cus] Anime plantam Cancamum esse scriptum  
 reliquit, sed, [quod citra ullum animi pathema  
 dixerim,] non sine menda, quum in Anime

Tom. I.

Cancami notas non comperimus, ut ex Diosco-  
 ridis verbis percipitur, quæ ita habent: *ἀνίμου*  
*αὐτῶν περὶ τὸν ἰσθμὸν τῆς γῆς.* Sed Anime  
 proprie Resinam potiùs aliquis appellaverit,  
 quàm Gummi.

Erut Græcorum Cancamum meâ (inquit Gar-  
 cias) sententiâ, id quod nos *Anime* vocamus,  
 quod in Lusitaniam ex Æthiopia, Arabiæ finiti-  
 ma, advehitur. Hallucinantur, qui Anime in  
 Brasiliânâ regione inveniri contendunt, & genus  
 illud picis, sive bituminis, resinæve, in *Sivam*, ut  
 aiunt, non procul à Maluccis repertum, Anime  
 esse credunt. Nam eius picis multa copia huc ex  
 Samatra, aliisque regionibus advehitur, qua pi-  
 candis navibus utuntur. Sed hac odore præditum  
 est Cancamo simili, & duntaxat resinam, aut  
 quodvis vulgare gummi olet.

Confirmat Clusius apud Garciam Amari duo  
 Anime, ac insuper tertium addit, quod pallidum  
 est & resinaceum, retortidumque. Omnia ve-  
 rò, ait, iucundum in suffragis is spirant odorem,  
 idemque videntur temperamentum sortita. Po-  
 steriora duo degustata magis siccare & amaresce-  
 reprehenduntur. *Anime* cur *Animum* Ametus  
 vocet, nescio. Dioscor. habet Amineam. Non  
 desunt, qui Anime legitimum Bdellium esse pu-  
 tant, ob multas, quas habet, notas, cum Bdellij  
 historia communes. Vnum tamen præterire  
 non est, quòd, ut Cæsalpinus inquit, Staete  
 quondam cum oleo Styacino ex Alexandria ad-  
 ferebatur sub nomine Balsami: sed postea desit,  
 cum ex India Occidentali novum genus Balsami  
 afferri cepit. Sola autem expressa Myrrhæ as-  
 fertur glebis magnis coacta. Ex hoc genere vide-  
 tur esse, quod vulgè anime vocatur à nostris qua-  
 si Amineæ Myrrhæ: Ex Oriente affertur duorum  
 generum, odoris suavis, quibus Vnguentarii ut-  
 untur. Vnum candidum: alterum flavum: al-  
 bum autem præstantius. Referunt Hispani in In-  
 dia Occidentali, in suffraginis odoratis loco  
 Thuris sacerdotes uti quadam candida resina,  
 quam *Copal* vocant, translucida magnis glebis,  
 Orii & Anime flavius, in granulis Thuri simile:  
 valde autem odoratum est & suave. Dioscori-  
 des autem inter reprobata Myrrhas, Amineam  
 vocat: sed Galenus Mineam, ut Plinius appellat,  
 quam & cæteris præfert, quia ei non admittum  
 est Opocalpasum, quod est genus veneni.

Duo, ait Monardus, resinarum genera multum  
 similia ex Hispania nova adferuntur, quorum u-  
 num *Copal* vocatur, alterum *Anime*. *Copal* resina  
 est admodum candida & transparentis, magnis fra-  
 gmentis ducti valde tritipieris huiusdismili-  
 bus: sitis odorata, sed non perinde ut Ani-  
 me. Anime arboris est lachryma, seu resina alba,  
 ad Thuris colorem nonnihil vergens, verum  
 Copali magis oleaginosa. Desertur granis Thu-  
 ris, sed crassioribus, quæ contracta luteum colo-  
 rem ostendunt in utroque: gratissimi & suavissi-  
 mi odoris est, & prunis imposita facillè consu-  
 mitur. Differt ab Anime Orientali, quòd neque  
 tam candidum, neque tam lucidum sit. Orientale  
 item magnis fragmentis adfertur transparentibus,  
 ita ut nonnulli Carabæ, seu Succini speciem  
 esse suspicati sint, cum nihil sit minus.

Hermolaus ait Anime colligi vicinis locis pa-  
 go, in quo Thus nascitur, & ab illius pagi nomi-  
 ne Anime dici.

Novæ Hispaniæ Animæ colligitur ex arboribus  
 mediocri magnitudinis, vulneratis, non aliter,  
 quam Thus, aut Mastiche.

Scibit Clusius se nobilioris illius Orientalis  
 Ee

*Cancami**Pix sive bitumen, resinæve ex Sivâ.**Tempera- me itam Bdellium.**Staete.**Balsamum Myrrhæ.**Anime.**Copal.**Opocalpa- sum.**Copal.**Anime.**Anime Ori- entale.**Carabæ seu Succini num.*

- Copal.* Anime fragmento, quod aliquot uncias pendebat donatum esse ab Hugone Morgano Pharmacopola Londinensi. Gomara porro in Mexicana historia, duò *Copali* genera facit, alterum rugosum, quod *Colochiopalli* vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum multò præstantius, *Copalcabultri*, quod plerique Myrrham existimant: liquor scilicet albus qui vulneratà arbore guttatim stillat ac statim concrescit.
- Myrrha.*
- Synonyma.* Hist. Lugd. p. 1791. nomina hæc habet: *Copals Anime: Anime Occidentale: Aminaam Myrrham* esse putat Hermol.
- Vires.* Lusitanorum mulieres *Animo* maximè pro suffumigijs, & Medici contra dolores à frigiditate ortos præcipuè utantur, maximè capitis, ut A-matum adnotasse legimus. Confirmatur hoc idem testimonio Manardi, dicentis: Huius ulus est in plerisque, sed capitis præsertim morbis, à frigiditate provenientibus, & de fluxionibus purgationis subsequenibus, cubiculis per Hyemem (etenim aciem purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, sufficit: quintem ipso capite, si qui Cephalæa & Hemicania laborant: nam caput roborat. Miscetur emplastris & cerotjs: ubi roborare, & frigidos humores, statimque resolvere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffutibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquasque partes nervosas, cerati modo, tertia parte ceræ admixta: atque sic gestatum duntaxat, & subinde renovatum, frigiditatem è quacunque corporis parte elicit. Calidum est secundo gradu, humidum primo.
- Thuris vicem supplet*
- Temperamentum.*

#### ANIMES SPECIES AD SVCCINVM LVTEVM ACCEDENS.

##### CAP. XLII.

- Descriptio.* **I**NTER *Animen* Paludani & *Copal* medio se habet imodo ad vulgare succinum proximè accedens, à quo tamen duritie parum vincitur, croceo hiliore colore tineta, & *Animes Paludani* modo pellucida: sub dente in grumos minutissimos dissilit, & candelæ ardenti admota non ita promptè liquefcit, vt *Copal*: quo tamen flammam & luculentiorē & pertinaciorē fovet, minutissimas bullas eructans, odore non multum differens, quo & ardendi modo magis refert *Animen* à Paludano missam. Hanc misit Antuerpia Coldenbergius.
- Color.*

#### ANIME SIMILIS RESINA EX ALBO FLAVESCENS.

##### CAP. XLIII.

- Descriptio.* **P**ETAVS Garetus dedit, Clusio scribente Exoticorum lib. 4. cap. 8. resinam delatam ex longinqua navigatione anno 1600. quæ Succino non absimilis erat, transparens & lucida, penè instar *Anime Americanorum*, cuius fortasse genus: color ex albo flavescens, odor non iniucundus, sapor amariusculus, deinde acriusculus: in micæ potius dissiliebat, quàm vt dentibus cederet, aut ore retenta, mollesceret: igni tamen admota, liquefcibat, flammamque concipiebat & ardebat.

#### ANIME ALBA PERLUCIDA.

##### CAP. XLIV.

**A**NIMES albæ nomine peregrinam quandam resinam Ill. C. VVirt. misit D. Paludanus, vnde & specimen asservo. Succini nostratis consistentia paullo fragilior, Vernicis solidæ, seu Sandarachæ arborum modo, non nihil albicans, & pellucens, vitri modo, sapore Vernici non absimili odore, cum adoletur, Mastiches: nec penitus vivo carboni imposita, flammam concipit, liquefcit & evanescit, crassamentum quoddam resinarum more relinquit, sub dentibus dissilit, nec facile coit, eà ratione, quâ Sandarachæ. Anno 1605. ex Anglia rediens Gener Cherlerus attulit magnum fragmentum cum inscriptione *Anime*.

*Descriptio*

*Sapor.*

*Oder.*

#### ANIME COLORE COLOPHONIÆ.

##### CAP. XLV.

**I**MPERIOR hæc *Anime*, cæteris speciebus, Colophonitæ aut Tauræcollæ colore, obscurâ quàmq; acies oculi nequaquam penetraverit: vnguibz quibusdam ferè nigricantibus respersa, Colophonitæ concrectione, flammam & promptam & pertinacem concipit, reliquarumque more ardendo bullit, bullis tamen maioribus: gustantis saporē quandam austerm imptimit: odor acutior paullo videtur & ingrator, quàm reliquarum specierum. Hanc habui Antuerpiâ à Coldenbergio.

*Descriptio*

*Yngues.*

*Sapor.*

#### ANIMES SPECIES ALBA COPAL INDIS.

##### CAP. XLVI.

**C**OPAL *Americanorum* & *Animes quartæ* nomine missa Antuerpiâ à Coldenbergio resina, fusa videtur: ita cylindri sulphurei fusilis portionem refert semicircularem: externâ parte gibbâ, coloris albi: internâ, flavi: concrectione densâ, *Animes* à D. Paludano missæ, sed non vitilla, visûs aciem transmittens: etsi interim diffractæ micæ pellucidæ sint: flammam promptè concipit, nisi hanc præperpet liquatio: odore iucundior, quàm resina strobilina, sed ad *Animes* Paludani gratiam non accedente, nescio quid tamen Styracem redolente: sub dente lentescit Mastiches modo, nec adhærescit, & albescit, sapore grato. Gener Cherlerus ex Anglia redux attulit similem resinam, anno 1605. cum hac inscriptione: *Animes albæ* à D. Gareto fragmentum satis magnum semicirculare.

*Descriptio*

*Oder.*

#### AMBARVM.

##### CAP. XLVII.

**N**ON desunt Monardi, qui Ambar ex fructu quodam ad maris litus nascente fieri dicunt, qui mensibus Aprilis & Maio maturefcit, & odoratus fit, quem decidentem vorant Balanæ: quasi fructus in alimentum cedens, aliud quàm sanguinem & carnem generare possit. Hæc Monardes, qui nobis præbet occasionem scribendi de Ambar.



Ambaro, & tradendæ eius historiar, in hoc Botanico nostro opere.

Varia circa  
generatio-  
nem opinio.  
Sperma  
Balana.  
Excrementum  
bellua.  
Mara spu-  
ma.

Ambari ergo [ quantum quidem colligere licet ] Simeon Sethi, Aëtius, Avicennas, & Serapio cum Averrhoë ex veteribus meminerunt. Ex Neotericis autem Ferdinandus Lopez, Iulius Cæsar Scaliger, Garcias, Monardes & Clusius. Quorum quidem circa huius generationem discrepans est opinio. Alij siquidem sperma Balenæ esse asserunt: alijs belluæ cuiusdam marinæ excrementum, aut matis spumam, [ quæ sanè opinioniones ratione carent, quod nullum Ambarum invenitur, ubi frequentissime sunt Balenæ, & ubi fluctum reciprocationis spuma plurima excitatur, ] alijs bituminis modo ex miris alveo emanare: quæ opinio melior, & veritati magis consona plerique visa est.

Bitumen.

Ambar non  
est sperma  
Balana.

Inter Græcos autem solus Simeon Sethi & Aëtius huius recordati sunt, è quibus prior, Bituminis modo è fontibus suis manare asserit, pessimumque id esse, quod à piscibus devoretur. Inde convellitur, inquit Monardes, eorum opinio, qui Balenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti quod interdum in Balenarum ventriculis invenitur, quæ illud aquis innatans nonnunquam devorant, alimentum esse existimantes. Verum est, meo tempore Balenam circa Canarias, quas Fortunatas Insulas putant, captam, in qua inventa sunt plus quam quatuor Ambari arrovæ, [ ponderis apud Hispanos genus, quod viginti quinque libras pèdet, ] sive centenæ libræ: postea tamen infinitas Balenas, cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inventum est. Sed & quæ Florida adveniunt, referunt Balenas in illo mari versari: quas tamen cum suis catulis necavit, in neutris Ambarum reperisse. Illos catulos porro Americani fumina dexteritate in hunc modum capere solent. Sumpto longo & forti fune, cui innexus sit laqueus, cymbam ingreditur Americanus, & Balenæ cum suis catulis advenienti obviam progreditur: uni ex catulis vicinior factus insillit, & laqueo rostrum induit. Illic id sentiens catulus in altum se mergit una cum Americano ipsum amplectente [ summum etenim natatores sunt Americani, diuque in aqua peristere queunt: ] Balenæ autem catulo respirare volenti, sumnum aequor repetere necesse est: interea Americanus per eius nares, sive meatus illos, quibus respirat, cuneum vel paxillum acuminatum pugno adigit, ut minimè excuti possit: deinde laxato fune suam cymbam conscendens illum subsequitur, donec obstructis meatibus respirare nequens, suffocetur, & in terram eiiciatur. Lucunda sanè at non minus periculosa est ista venatio: sed adeò industrij & agiles sunt isti Americani, ut etiam *Caymanem* [ Lacerti, sive Crocodili genus est, binos & triginta pedes longum, ferocissimum omnium quæ in mari versantur, belluarum ] unus Americanus occidere queat.

In mari  
& Neotericis

Ex Arabibus verò Avicenna lib. xii. cap. 67. & Serapio lib. simpl. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorum in rupibus & arboribus more Ambarum in mari generari, & tempestatibus unà cum faxis interdum in litus eiici: quæ sententia verisimilior est reliquis ab Avicenna productis. Nam multum flantibus Euris, magna eius copia *Sosalema*, & in insulis *Comaro*, *Demgoxa*, *Mosambicam*, totumque eum tractum efficitur è *Maldivis* insulis quæ ad Orientem spectant. Flantibus verò Favonius, copiosè invenitur in insulis, quæ vulgò è *Maldiva* nuncupantur corrupto vocabulo,

Tom. I.

cum de *Nalediva* dicendum sit: etenim *hale* lingua Malabrica significat quatuor, & *Diva* insulam: *Nalediva* igitur pronunciandum erat: quasi dicas, Quatuor insulas, simili planè ratione, quæ *Angediva* vocamus eas insulas, quæ à *Goa*, Orientalis Indiæ emporio, duodecim leucis distant, quod quinque sint numero conterminæ, *Ange* enim eorum lingua quinque est. Sed hæc præter institutum: non potui tamen horum non meminisse, cum in *Maldiva* mentionem incidissem.

Scribunt iisdem locis supra citatis, Ambarum devorari à pisce quodam *Azel* nuncupato, sed qui eo devorato statim extinguatur. Hunc deinde undis fluctuantem regionis illius incolæ uncis in sicum trahunt, eoque exenterato Ambarum colligunt: verum non omne improbari, præter id, quod spinæ adhaereat, id enim pro temporis diuturnitate purum & legitimum esse. Sed hæc eorum opinio erroris mihi videtur. Nam veluti certum est animalia querere alimentum naturæ suæ conveniens, & minime novum [ nisi forte cibis innoxius admixto decipiantur, quomodo mures fallere solemus ] sic etiam haudquaquam verisimile videtur, hunc piscem Ambarum venari: si eo devorato sit periturus. Imò cum Ambarum sit ex eorum numero, quæ maximè cordis vires rescitunt, dixerim hunc piscem præsentaneum esse venenum, quandoquidem tam eximio medicamento devorato perit.

Scribit Averrhoës 5. coll. cap. 56. Caphuræ genus inveniri natum in maris alveo, quod deinde aquis supernatet: laudatissimum verò id censeri, quod Arabibus *Aseap* dicitur. Quam verò eius opinionio à veritate sit aliena, & tanto viro, insignique Philosopho indigna, clarius est, quam ut multis demonstrari debeat: primam quod Caphuram in mari nasci dicat, deinde, quod eandem, quæ frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat, quod calidum & sicum constituit secundo ordine.

Averrhoë  
preb.

Cæterum ex Neotericis Ferdinandus Lopez de Castagneda, qui rerum à Lusitanis in India Orientali gestarum historiam scripsit, lib. 4. cap. 35. dicit, selectissimam Ambram in insula *Maldiva* inveniri, cuius generationem cum fieri tradat diversam, ab ea, quam cæteri scribunt, non abs re futurum existimavi, si, quæ de generatione Ambræ tradit ex Italico sermone à Clusio conversa, hic subicerem.

Maiores insulæ de *Maldiva*, Archipelagi illius interioris, multas odoríferas herbas produunt, quas depastum veniunt magnæ quædam aves ab incolis *Anacangris* qui nuncupantur. Istæ aves in rupibus & scopulis earum insularum secundum maris litus suis versantes & aggregatæ, sterces egerunt, quod *Ambræ* est, cuius tria genera faciunt: unum album, ipsis scopulis, uti egestum est, inhaerens, quod probatissimè censent, & *Panahambar*, h. e. auream Ambram appellant, maioris quam reliqua, pretij, quod pauca quantitate & maiore difficultate reperitur, quam alia duo genera, quæ cinerææ & nigri sunt coloris, ac ex albo originem trahunt. Ex istis quos dixi scopulis, tempestatum vehementia temporis succellu, magnis fragmentis in mare cadit hæc *Ambræ*, & in litus eicitur: id *Coambar* dicitur, id est, aquæ *Ambræ*, quoniam aquarum fluctibus valde eluta, magnam suæ probitatis partem perdidit. Tertium, quod nigrum, *Maniambur* vocant, quod significat piscis Ambram: nigredinem enim contraxisse existimant, quod à Balenis, aut alijs pis-

Aves mæ-  
gna.

Stercus  
açu.

Coambar

Maniambur

scibus inter istas insulas versantibus devoratum fuerit, qui illud concoquere non valentes, rursus evomerunt: id autem est omnium vilissimum, quia penè totam facultatem amisit. Hæc Castagneda.

Alit opinio Garciz de Ambaro hæc est. Veluti pro regionum naturâ terra interdum rubra est, ut Bolus armenus, interdum candida, ut Creta, nonnunquam nigricans: sic verisimile est, aut insulas, aut terras similes cum Ambaro formæ inveniri, quod terra sit aut fungosa, aut alterius generis. Quod verum esse testatur, magna eius, quæ reperitur, quantitas. Siquidem interdum inventa sunt fragmenta humanæ magnitudinis, interdum nonaginta palmorum longitudinis, duo de viginti latitudinis. Affirmarunt nonnulli se Insulam ex puro Ambaro vidisse, eamque cum postea requirerent, nusquam comparuisse. Refertur verò est plerumque avium rostris, quas in eo nidulari credibile est: ac interdum conchyliis, testisque ostreorum permixtum invenitur, quæ contactu Ambaro adherent.

*Ambar bitumen est.*

Varia est, pergit Monardes, circa Ambari originem opinio: sed verissimum est, Bituminis genus esse, ex fortibus in alto mari manans, quod aëri expositum, illicò densatur, ut solent pleraque, quæ sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua exemptâ, durantur, ut Corallium, Succinum.

*Ambarum legitimum.*

Quid potè sit legitimum Ambarum, atque quo modo nascatur, dicam, ait Clusius, quod Francoforti ad Mœnum anno 1593. paulò antè meum ex ea urbe abitus, mihi referebat vir probæ fidei, mihiq; amicus D. Servatius Marel, Burgundus, qui multas regiones peragraverat, Ambarique, Moschi, Gemmarum & similibus rerum mercaturam exercuerat. Quum enim de Ambaro inter nos sermo incidisset, ille ad me, Exploratūne habes quidpiam de Ambaro? Non inquam, præterea, quæ ex Garciz Aromatum historia, & libello Nicolai Monardis de simpl. med. è novo Orbe delatis didici. Legi, inquit, utrumque illum quidem à te Latinum factum, hunc verò Hispanico sermone evulgatum. Sed quid aliud asserunt, quàm authorum dubia testimonia, qui cæcutescentes, tanquam in tenebris versantur?

*Recrementum Balenæ vera.*

Mihi autem crede, Ambarum nihil aliud esse, quàm recrementa quædam in ventriculo Balenæ verè multo tempore collecta, verè inquam, quia plerique Cetaceos alios pisces, ut Orcadem, Physeterem & similes magnis dentibus præditos Balenæ appellatione donant. Balena autem legitima, nulos dentes habet, sed integros pisces vorat, & mollibus inprimis delectatur, ut Polypis, Septiis & similibus, quibus in ventriculo non bene confectis, necesse est, multam viscidam materiam in eo generari, quam postea simul congestam, & ventriculum nimis gravantem, vel singulis annis, vel breviori temporis spatio reiicit. Ista materia tamdiu in ventriculo adseruat, dein reiecta, & mari innatans, Ambarum est, in quo interdum Polyporum devoratorum rostellâ deprehenduntur. Si Balenæ, liberato iam recens ab illa materia ventriculo, capiuntur, nullum Ambarum habere reperientur, si aliquantè post eieciatam materiam, aliquid quidem habebunt, sed deterioris, nec probè excocti, atque ita paulatim crescens illa materia congesta, prohibetam vetustate adquire, ut sit, antè quàm ventriculus illâ materiâ liberatus sit, Balena capiatur, plurimum & optimum reperietur. In aliorum verò Cetaceorum, quos antè retuli, ventriculo, frustra

requiras: itaque nihil mirum, si qui captos eos secuerunt, Balenas esse existimantes, nihil Ambari in illorum ventriculo repererunt. Probari autem assererat Ambarum cinereo quodammodo colore prædictum, illud verò optimæ esse notæ indicium, si eius fragmentum candenti ferro, laminæ ferreæ bene calefactæ, aut cultello applicatum, veluti in oleum resolvatur, quod naribus admodum suavem odorem spiret. Monardes etiam optimi delectus esse tradit, quod ad rubedinem non nihil tendit, albūque non æquè bonum asserit, nigrum verò deterimum facit.

*Pretium.*

Eius autem pretium, ut nobis author est Garcias, intenditur pro fragmentorum magnitudine: quantò enim maius est fragmentum, tantò eius intensius est pretium, non secus atque in gemmis. Sed nusquam plaris venditur, quàm in Sinarum regione. Cum enim à nostris Lusitanis eius exigua copia è delata esset, pretium fuit mille quingenti aurei in singula Cate, quod apud eos ponderis genus est, pendens viginti uncias. Huius lucri cupiditate deinde alij mercatores allecti, tantam Ambari è detulerunt copiam, ut nunc multò vilioris æstimentur.

Subiciamus modò nonnulla vocabula, quæ apud Serapionem & Avicennam occurrunt. Magnam eius copiam ex regione Zing Serap. libr. simpl. cap. 196. adferri asserit. Hæc est *Sofala*. Nam *Zingæ* aut *Zangue* Persis aut Arabibus idem significat, quod niger Latinis: & quoniam totus ille maritimus Æthiopie tractus à Nigris incolitur, Serapio eam *Zingæ* vocat. Sic Avicenna lib. 2. cap. 63. epitheton illi addit *Almendeli*, quasi de Melinda: item *Selachiticum* [posteriora exemplaria habent *Aleleheti*], à Zeilan fortè laudatissima totius Orientis insula, quare falsò urbem esse Lacuna comm. in Dioscorid. existimavit, cum sit insula multis urbibus exculsa.

*Nomina.*

Ambarum Latinis, *Ambar* Arabibus dicitur, quo nomine omnibus quas sciam [Garcias] nationibus notum est, aut immutato duntaxat paululum vocabulo. Sed quid adhuc Hadrian. Iun. percipere quas Garcia. Maris flos, inquit, vocatur, *ἄλως ἀνθ' ὅ*, *Aspetma* Ceti, vel *Balenarum* Officinis. & *Ambar* subalbidum, Germ. *Walrach* / *Baldrach* / quasi præsentaneam opem adferens, Belg. *Walschot* / quod sonat *Balenarum* eieciamentum genitale, sive semen.

Locus assignatur varius. Anno 1555. circa promontorium Comorin, quod è regione insularum de *Maldiva* est, fragmentum trium ferè millium pondo repertum est: sed cum is, qui invenerat, picem, aut bituminis genus esse existimaret, vili admodum vendidit. Maximum verò quod unquam viderim (inquit Garcias) fragmentum, quindecim libras pendebat. Sed qui in Æthiopiam commercii causa navigant, multò maiora fragmenta se vidisse affirmant: totus enim ille Æthiopie tractus, à *Sofala* ad *Brava* usque, Ambaro abundat. Nunc mittit Florida novi orbis provincia *Ambar*, quod vocant *Grieseum*, idque in littus eieciatū invenitur à Canaveral ad promontorium usque D. Helenæ.

Vires perstringit, Garcias dicens: Nota est *Manardis* contradictio, qui in *Electario* de Gemmis dist. 1. in compos. Mel. Ambarum rem novam esse affirmat, eamque non magno æstimat, sed paulò post in *Electario* *Diambra* ibidem, quasi sui oblitus, hanc compositionem ob Ambarum multig

*Vires & v. l.*



multis laudibus effert, eoque se in mulierum & senum morbis sepe numerum uti asserit. Ac magna in æstimatione esse apud opulentiores Indos asserit, ut pote quo cibis permixto frequenter utuntur medicamenti loco. Excalefacit, resolvit, roborat, quocunque tandem modo applicetur: nam calidi est temperamenti & sicci, cum pinguedine quadam, quâ emolliendi facultate præditum est. Variæ sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum Mali Arantii, sive Assyrii in calente mortario permixtum, & vnguenti modo capiti illitum, illius dolorem levat, cerebrum corroborat & nervos, & frigidus, qui infarcti sunt, humores resolvit: ad eadem efficax, emplastri modo cum Alypta muscata assidue gestatum. Eius solius, aut cum Moscho & ligno Aloës permixti, olfactu cerebrum roboratur, memoria augetur, spiritus vigor & cordis vires rescitantur: ideoque in pestis contagii illius odor adprimè utilis est: nec minus his, qui frigidis fluxionibus vexantur, convenit, si capitis tegmina, atque etiam cubiculum, ubi dormiunt, per Hiemem eo suffiantur: Maximè prodest senibus, quod illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roboret, & crassos, lentosque humores, quibus plurimum abundant, extenuet, sive cibis indatur, sive vestes suffiantur, sive cerebro, cordisque regioni applicentur, sive vino, quo sibi faciem & manus abluunt, permisceatur. Scobi Magnetis, Galbanæque miscetur, & emplastri modo mulierum umbilico impositum, vterum suo loco retinet, & reliquos eius morbos profigit, eius autem assiduus odoratus prodest vteri procidentia: suffocationibus verò, in Liquidambar dissolutum, ex xylo exceptum, vterique ori impositum. Sterilitatis à frigidis humoribus orta, hac compositione mederi soleo, quæ recipit Ambari partes duas, rasuræ Eboris tenuissimè trita vnam, pulveris ligni Aloës partem dimidiam, cum Algaliæ momento: sunt catapotia, quorum tria penduntia 3j. singulis triduis dantur, & emplastrum umbilico, pessum uteri colo imponetur, purgatis tamen prius uti decet. Ex eo, alypta muscata, & styrace fit emplastrum sciti formæ, quod stomacho adpositum, ipsum doloribus liberat & excalefacit. Ex eadem massa factæ pilulæ, & manè sumptæ, status discutiant, concoctionem emulant, & appetentiam excitant: idem præstat ex vino odorifero manè sumpta hac massa. Tritum Ambar, & cerâ flavâ exceptum, cordis regioni utilissimè imponitur, ad sedandos dolores è flatibus, aut alia quavis causâ (modò calida non sit) provenientes. Eadem ratione, quâ sensibus, melancholiæ laborantibus etiam convenit, & paralyticis, si eo aut eius mixtura suffiantur, aut cerebrum totaque spina eo inungantur: etenim Ambar præ cæteris medicamentis nervos & cerebrum roborat. Quinetiam epilepticis fumus illius, naribus exceptus, convenit, siquidem illos excitat, & si assidue id odorantur, non tam faciliè, neque tam vehementer eo morbo cortipiuntur. Illud admiratione dignum, quod Simeon Sethi scribit: Si quis Ambar odoratur antequam vinum bibat, eum veluti ebrium fieri: si verò iniciatur vinò maximè inebriare.

POPULO SIMILIS TOCOTGEBIT, CVI  
RESINA THVRIS CANDIDIOR.

C A P. XLVIII.

REFERT Fragosus in India Occidentali arborem inveniri Tocotguebit, i. e. lignum  
Tom. I.

desiderii, seu exoptatum dictam, Populo similem, summi candoris, cuius materies ob candorem, lavorem & splendorem, summe expecebatur ad idola fabricanda. Sub eius cortice nascitur gummi, seu Resina Thuri nostro simili, sed candidior, & minoribus fragmentis, quo isthæ utuntur, ut nos Thure. Clus. apud Monardem post Copal & Anime ponit hanc arborem, non tamen eandem facit cum Copal. Observandum autem Tacamahacam dici similem Populo. Est & apud Lobel. Populus novi orbis, de qua nos histor. nostr. lib. præced. 8. cap. Consideretur sequens Resina.

CARANNÆ GARCIE NOMINE

DATÆ RESINA.

C A P. XLIX.

DOMINVS Volmarius Pharmacopœus Elingensis insignis, dedit anno 1581. Carannæ Garcie nomine, Resinam Galbanæ coloris duriusculam, quæ etsi friata pulverem remitteret luteum, lentescerebat tamen: resinæ Strobilina odore: nidorem, cum flammis adolevit, reddens ferè Animes.

De hac Monard. Caragna Indis dicta & Hispanis, resinâ, colore Tacamahacæ, paulò limpidior, odore simili, sed graviore. Alibi in vers. Clus. Caranna medicamentum novum est, quod decem annis elapsi primùm allatum est, & oleaginosa, ideoque tenax sine multa adglutinatione & colloquatione. Colligitur vulneratis arboribus. Est & alia quædam prior, & Crystalli modo limpida, multò præstantior, velior & odoratior.

Hist. Lugd. Caragna etiam dicitur.

Ex Continentis parte interiore per Carageniâ Locus, & Nomen DEI deserti scripsit Monard.

Eayuntur Indi in tumoribus & omnis generis doloribus. Ad eosdem morbos laudatur, quos Tacamahaca curare solet, & minore temporis spatio vires suas exerit: sic ut quos Tacamahaca non curant, Caranna sanat. Exemplum vidimus in eo qui ob humeri cruciatus iam multo tempore brachium movere non poterat, tamen Tacamahaca usus esset: sed postquam Caranna uti cepit, tri-duo sanitati restitutus est. Mira est eius vis in iuncturarum doloribus: nam imposita, faciliè illos curat, modò nulla sit calidiorum humorum influxio. Tumores inveteratos dissolvit, fluxiones humorum frigidorum, aut mixtorum sistit: ad quovis nervorum & cerebri dolores valde utilis, vulneraque recentia, nervorum præsertim & iuncturarum nullo alio admixto medicamento sanat. Fluxiones in oculis, & alias partes reprimi, pone aures, ac temporibus imposita. Excedit secundum caloris gradum.

SANDARACHÆ SIVE VERNICI

QUIBUSDAM DACTO, AC Mastiche accedens Resina.

C A P. L.

EST nobis resina delata anno 1605. ex Anglia per generum Cherlerum cum hac inscriptione: *Lachryma suavis spirans: Anime speciem Cl.D.D. David Selinus Medicus Londinensis estimabat: mihi sanè odorifera resina gratus videtur ut ligni, quod Thuris vocant, minus tamen placet: igne accensa, faciliè liquefit & con-*

Et 3

fumitur: cortex cui adhæret, non crassus, sapore percipitur nonnihil falgulinofo, resinæ parvi grumi valdè friabiles, qui dentibus facillè atteruntur, terè similes Mastiche, minùs tamen albi, sed flavi, lucidi, ad Sandaracham accedentes.

*Tecotgebit.*

Perpendenda resina arboris Tecotgebit, de qua antè. A' nostra resina non videtur multum differre, si non eadem, ac sequens etiam ex Clusio Mastichina resinæ non valdè ab similibus succis.

### MASTICHINÆ RESINÆ NON VALDE ABSIMILIS SVCCVS.

#### CAP. LI.

*Descriptio*

**T**RADITVR à Clus. Exot. lib. 4. cap. 8. resina ci data, per Petrum Garetum ex longinqua navigatione anni 1600. Mastichinæ autem resinæ, inquit, non valdè ab similibus erat sextus hic succus, minùs tamen albus, friabilis, ut resina, manibus tamen emollius, aut ore retentus aliquantisper, lentescerebat, nec ingrati odoris deprehendebatur, ut neque etiam saporis, aliquantulum tamen actis, igni admotus, flammam etiam concipiebat, quæ statim exstingueretur, atq; instar ceræ liquecebat. Erat etiam hic succus, sive veridis resina, foliis quibudam involuta; quibus recentior fluentem exceptam fuisse verisimile est.

### AMBRÆ FACIE RESINÆ

#### CAP. LII.

*Descriptio*  
*Color.*

**Q**VI ex India anno 1601. redibant Batavi nautæ, auctore Clusio. Exot. lib. 4. cap. 6. Magnum resinæ cuiusdam fragmentum afferebant, quod libram & sex uncias pendebat, coloris ex fusco cineracei, & plarisque partibus Ambræ odorata colorem referentis, sic ut qui ab arbore detraxissent, legitimam Ambram esse sibi persuaderent: resinaceus tamen odor, licet non ingratus, ab ea opinione illos dimovere debuerat.

In quem autem usum adhiberent, ignorabat honestissimus vir Franciscus Peninus, civis Amstelredamensis, qui ab illis redemerat, & permittebat ut describere possem.

### ELECTRVM SIVE SVCCINVM IN GENERE.

#### CAP. LIII.

*Electrum*  
*Succinum.*  
*Carabe. d.*  
*lambrium.*

**M**VLTI [infit Amat.] verbis Dioscoridis innixi crediderunt Electrum, sive Succinum, quod Carabe Arabes appellant, & vulgus Alambrium, Populi gummi esse, non animadvertentes, Dioscoridem aliorum opinione verba illa retulisse, & ut falsa reliquisset, minimè que approbasse.

*Mendacia*  
*de Succino.*

Vt autem planius noscatur, ait Plinius, quàm mentiti sint authores de Succino, verba eorum hinc subiciam. Proximum igitur locum in deliciis seminarum tamen adhuc tantum, eandemque omnia hæc, quàm gemmæ, authoritatem, sanè maiorem aliquibus de causis crystallina & muricina, rigidi [frigidi vet.] potus utraque. In Succinis causam ne deliciae quidem adhuc excogitaverunt. Occasio est vanitas Græcorum diligen-

tia. Legentes modò equè perpetiantur me de ortu eorum dicere, cum hoc quoque intersit vitæ, scire posteros, quicquid illi prodidèrunt mirandum.

*Pect. arboris*  
*fabula.*

Phæthontis fulmine icti, sorores luctu mutatas in arbores Populos, lachrymis Electrum omnibus annis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocamus: & Electrum appellatum, quoniam Sol vocitatus sit Elector, plurimi Poætæ dixerunt, primique, ut, arbitror Aeschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Satyrus. Quod esse falsum, Italiae testimonio patet. Diligentiores eorum, Electridas insulas in mari Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus. Quà appellatione nullas unquam ibi fuisse, certum est: nec verò ullas ibi appositas esse, in quas quicquam cursu Padi devchi possit. Nam quòd Aeschylus in Iberia, hoc est, in Hispania Eridanum esse dixit, eundemque appellari Rhodanum, Euripides rursus & Apollonius, in Adriatico litore confluisse Rhodanum & Padum, feliciorem veniam facit ignorati Succini in tanta Orbis ignorantia. Modestiores, sed æquè falsum, prodidèrunt in extremis Adriatici sinûs rupibus in viis arbores scire, quæ Canis ortu hoc effunderent gummi. Theophrastus in Liguria effodi dixit. Phæthontem in Aethiopia Hammonis obisse: ob id delubrum ibi esse atque oraculum, *electrumque* gigni. Philemon fossile esse, & in Scythia crui duobus locis: candidum atque ceræ coloris, quod vocaretur *Electrum*: in alio loco fulvum, quod appellaretur *Sualternicum*. Demosthras *Lyncurion* id vocat, & fieri ex urina Lyncum bestiarum, & maribus fulvum & igneum, è feminis languidius atque candidum. Alij dixerunt *Langurium*, & esse in Italia bestias *Langurias*: Zenothemis *Langas* vocat eadem, & circa Padum iis vitam affirmat. Sudnes arborem, quæ gignat in Liguria. In eadem sententia & Metrodorus fuit. Sotacus credit in Britannia arboribus effluere, quas *Electridas* vocavit. Pytheas Guttonibus Germaniæ genti accoli æstuarium Oceani Mentonhom nomine, spatio stadiorum sex millium: ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum: illò vete fluctibus advehi, & esse concreti maris purgamentum: incolas pro ligno ad ignem uti eo, proximòque Teutonibus vendere. Huic & Timæus credidit, sed insulam Baltiam vocavit. Philemon negavit flammam ab Electro reddi. Niceas radiorum Solis succum intelligi voluit. Hos circa casum credit vehementiores in terram actos, pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere, deinde æstus in Germanorum littora eici. Et in Ægypto nasci simili modo; & vocari Sacal: item in India, gratiùsque Thure esse Indis. In Syria quoque semina verticillos inde facere, & vocare harpaga, quia folia & paleas, vestiumque fimbrias rapiat. Theophrastus Oceano id exstante ad Pyrenæi promontorium eici: quod & Xenocrates credidit, qui de iis nuperimè scripsit. Vivit adhuc Asarubas, qui tradidit iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephalida, quem Mauri vocant Electrum. Hunc Sole excalescentem è limo dare Electrum fluitans. Mnestas Africa locum Sicyonem appellatum, & Crathin amnem in Oceanum effluentem è lacu, in quo aves, quas Meleagridas & Penelopas vocat, vivere. Ibi nasci ratione eadem, quæ supra dictum est, de Electride lacu. Theomenes dicit, iuxta Syrtim magnam hortum Hesperidum esse, ex quo in Stagnum cadat, colligi verò à virginibus Hesperidum. Ctesias Indis flumen esse Hypobarum, quo vocabulo significetur omnia vasa ferre bona:

*Fluit ex*  
*arboribus.*

*Concreti*  
*maris pur-*  
*gamentum.*

*Sacal dicitur*  
*Ægypti.*

*Harpaga*  
*famina-*  
*rum Syria.*

*è limo m-*  
*rin.*

fluere



fluere à Septentrione in exortivum Oceanum iuxta montem silvestrem arboribus Electrum ferentibus. Arboree eas asphytaoras vocant, quæ appellatione significetur prædulcis suavitas. Mithridates in Germaniæ litoribus esse insulam, vocarique eam Olenidam: Cedri genere silvæ: inde defluere in petras. Xenocrates non Succinum tantum in Italia, verum etiam Thieum vocari à Scythis verò Sacrium, quoniam & ibi nascatur. Alios putare in Numidia gigni. Super omnes est Sophocles Tragicus Poëta, quod equidem miror tanta gravitate cothurni, & præterea vitæ famâ, alias principe loco genitus Athenis, rebus gestis, exercitu ducto. Hic ultra Indiam fieri dixit è lachrymis Meleagridum avium Meleagrum desilientum.

Quod & credidisse eum, vel sperasse aliis persuaderi posse, quis non miretur, quæve pueritiam tam impertitam posse reperiiri, quæ avium ploratus annuos credat, lachrymæ tam grandes, avèsque è Græcia, ubi Melesiger perierit, ploratum ille in Indos? Quid ergo non multa æquæ fabulosa produnt Poëtæ? Sed hoc eam in re, quæ quotidie invehatur atque abundat, & hoc mendaciam coarguat, ferò quemquam dixisse, summam hominum contempti, est, & intolerandam mendaciorum impunitas. Idem rursus eodem libro 37. cap. seq. de ortu & medicinis, & generibus & luxuria succinorum, inquit: Cærtum est gigni in Insulis Septentrionalis Oceani, & à Germanis appellari Glessum: itaque & à nostris vnam insulam ob id Glessariam appellatam, Germanico Cæsare ibi clisibus rem gerente, Austraviam à Barbaris dictam. Nascitur autem defluente medulla pinei generis arboribus, ut gummi in Cerasis, resina piceis. Erumpit humoris abundantia: densatur rigore, vel tepore autumnali. Cum intumescebat estus rapuit ex insulis, certè in litora expellitur, ita volubile, ut pendere videatur, atque considerare in vado: quod arboris succum esse præfati nostri credidere, ob id succinum appellantes. Pinea autem arboris esse indicio est pineus in attritu odor, & quoddam accensum tædè modo ac nidore flagret. Affertur à Germanis in Pannoniam maximè Provinciam. Inde Veneti primum, quos Græci Henetos vocant rei famam fecere, proximi Pannonia, id accipientes circa mare Adriaticum. Pado verò, annexa fabulæ videtur causa, hodièque transpadanarum agrestibus fœminis, monilium vice succina gestantibus, maximè decoris gratia, sed & Medicinæ: quando tonsillis creditur resistere, & faucium vitis, vario genere aquarum iuxta illos infestante guttura ac vicinas carnes. D. C. ferè M. pass. à Carnuto Pannoniæ abest litus id Germania, ex quo invehitur, per cognitum nuper. Vidit enim eques Romanus missus ad id comparandum à Italianò curante gladiatorum munus Neronis principis, qui hæc commercia & litora peragravit, tanta copia inventa, ut retia arcendis feris podium protegentia Succinis notarentur, arma verò & libitina, totisque vniùs diei apparatus esset à Succino. Maximum pondus is glebæ attulit 13. librarum. Nasci & in India certum est. Archelaus, qui regnavit in Cappadocia, illinc cortice inherente tradit advehi rude, polirique adipe suis lactentis incoctum. Liquidum primò destillare, argumento sunt quadam, intus translucentia, ut formicæ aut culices, lacertæque, quas adhærens melleo non est dubium, & inclusas indurescenti. Genera eius plura. Candida odoris præstantissimi. Sed ne his, nec cereis pretium, Fulvis ma-

ior autoritas. Ex his etiamnum amplior translucenibus, præterquam si nimio ardore flagrent, imaginemque igneam inesse, non ignem, placet. Summa laus Falernis à vini colore dictis, molli fulgore perspicuis. Sunt & in quibus decocti mellis lenitas placeat. Verum hoc quoque notum fieri oportet, quocunque libeat, tingi, hædorum sevo & Anchusæ radice: quippe etiam conchylio inficiuntur. Cæterum attritu digitorum accepta caloris anima trahunt in se paleas ac folia arida ac phylaras, ut magnes lapis ferrum. Ramen ta quoque eius in oleo addita flagrant & lucidiùs, diutiusque, quam linei medulla. Taxatio in delictis tanta, ut hominis quamvis parva effigies, vivorum hominum vigentiùmque pretium superet, proflus ut castigatio una non sit satis. In Corinthiis æs placet, auro, argentoque misto, in cælati ars & ingenia. Morrhinorum & Crystalinorum diximus gratiam: uniones, quod capite circumferuntur, gemmæ digitis in omnibus denique aliis vitis ostentatio, aut usus placet: in Saccinis deliciarum tantum conscientia. Domitius Nero in cæteris vitæ sue portenis, capillos quoque coniugis suæ Poppeæ in hoc nomen adaptaverat, quod n. etiam carmine Succina appellando. Et quoniam nullis vitis defuit pretiosa nomina, ex eo tertius quidam hic colos cepit expeti à matronis. Vnus tamen Succinorum invenitur aliquis in medicina: sed non ob hoc fœminis placent. Infantibus adalligari amuleti ratione prodest. Callistratus & cuiusque ætati contralympationes prodesse tradit, & utinæ difficultatibus potum, adalligatumque. Hic & differentiam novam attulit appellando Chryseletrum, quasi coloris aurei, & matutino gratissimo aspectu, rapacissimum ignium, & si iuxta fuerint, celerrimè ardescens. Hoc collo adalligatum, mederi febribus & morbis: tritum cum melle ac rosaceo aurium vitis: & si cum melle Attico conteratur, oculorum quoque obscuritatibus. Stomachi etiam vitis vel per se fatina eius sumpta, vel cum Mastiche aqua pota. Succina etiam gemmis, quæ sunt translucide, adulterandis in ignem habent locum, maximè Amethystis, cum omni, ut diximus, colore tingantur. Hactenus Plinius.

Huius verba (pergit Amat.) vera esse hodie cognoscimus, quam in mari Germanico, Baltheo dicto, Electrum sive Succinum, ex quo perculæ sive coronæ fiunt, colligatur; & nusquam alibi: quod verò gummi arboris pineæ simile sit, ipsius in attritu pineus odor attestatur, imò qui apud Germanos in urbe libera Dantisco, nobiscum versati sunt; tanquam de re conspecta iudicium suum ferebant, nec in re aliqua à Plinio dissidebant. Nascitur enim Electrum, liquidum tanquam Pini resina, quod quum musteum fluit, formicas, mulcas, paleas, & alia rapit, quæ omnia postea in eo densato, videntur, ut Martialis hoc disticho complexus est:

Quum Phæthintæa formica vagatur in umbra

Implicuit tenuem succina gutta feram.

Vario potè colore Electrum reperitur, quoddam se festucas & paleas trahit, velut magnes ferrum.

Hallucinatur Manardis Fœtrentensis, & alij quibus facillè Tragus subscripserunt; qui sine auctoritate & ratione contendunt, Succinum longè aliam rem esse videri, quam quæ ex arboribus exudare, destillare, durari ac coire in Electrum soleat; quin potius in mari hæc existimari possit;

Plinio Cædidum.  
Cecum.  
Fulvum.  
Translucere.

Falernum.

Attrahunt paleas.

Pretium.

Amuleti.

Lymphatio.

Prima.

Chrysele-

trum Cal-

istrati.

Febres.

Aures.

Oculi.

Stomachus.

Impostura.

Omni colo-

re tinguntur.

Corona precaria.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Manardus & Tragus repreh.

Ex arboribus.

Thieum. Sacrium.

Sophocles vivatur.

Elachrymis avium.

Locus.

Glessum Germanis.

Medulla arboris.

Vires & vus.

Tonsilla.

Arma è succino.

Gleba 13 librarum.

Liquidum destillat.

Genera Succini.

Sed de re sibi ignota, non est quodd multa verba faciant.

Cordum audiamus, multis hac de re differenter. Succinum, quod Græci *ῥαυτεν*, & fabuloso nomine *κρυβέειν*, Arabes *Karabē*, & *Kakabre*, Galli *Ambram*, seu *Ambram Citrinam*, Germani veteres Glessum, recentiores Zgstein & Bernstein, Sudani *Gentar* appellant: inter præcipua numeratur, quæ Deus ad hominum usum condidit, Medicinæ pariter & luxui, multisque aliis usibus materiam præbens: quamvis nostra ætate magis tuendæ sanitati, quàm luxuriæ inserviat. Nostri Succino, à proprietatibus, quas habet, nomina indidère. Siquidem veteres Germani Glessum/id appellant, quod si interpreteris, vitreum sonat: quoniam vitæ instar lucem transmittat. Vitrum enim Glasz & vitreum Glesen dicimus. Zgstein autem, id est, *Gagatem lapidem* id vocamus: quoniam à Gagate nigro, materia, viribus, & aliis proprietatibus nihil differat. Bernstein verò, hoc est, ardens lapis nominatur, quoniam accensum ardeat. Est autem res omnibus agnita, & paratè facilis, præsertim cereum & pellucidum, quod Romani à vini colore, Falernum cognominant. Candidum verò, cui olim nulla fuit auctoritas, quoniam parciùs gignitur, nunc auri pretium aequat. Vera sunt quæ Plinius iam antè prodidit, excepto eo, quod Pinei generis arborum resinam esse credat, ut paulò post ostendemus. Nam quod ad originem [materiam & generationem] eius attinet, nullus unquam authorum vera tradidit. Ideò rem iucundam maximè quæ necessariam, & cogniti dignissimam produuros nos arbitramur, si de natalibus, causis & origine eius, nostram quoque sententiam protulerimus: de qua cum multis doctis, præsertim Georgio Agricola Medico, naturalium rerum omnium sagacissimo & prudentissimo indagatore, multos iam annos contulimus, eamque loci liberatione utrinque ita perpe- dimus, ne quidquam de origine eius temerè pronunciaremus. Editurus est propediem Georgius Agricola, inter alia, quæ de ortu & materia fossilium re. un conscripserit, etiam suum de Succino rubicuum, cui nos hoc commentario subscribimus: existimamus autem nobis hominibus Germanis, Succinum in nostro Orbe genitum quotidie attentantibus, eiusque naturam quotidiano usu & experientia cognoscenibus, potiùs alias gentes fidem habituras, quàm Græcis, qui relicta Philosophia in consideratione, ad fimenta absurdissima, & aniles, & plusquam pueriles fabulas sunt conversi: rem longè pulcherrimam, cuius cognitionem ingenio assequi desperabant, ludibriis & levibus figmentis conspurcantes. Qua quidem in re non tam hominibus imposuerunt, quàm sitam in confingendis nugis levitatem, & Electri ignorantiam prodiderunt: quamvis Graius ingenium, quamvis Graius ore rotundo Musa loqui dederit. Et si autem palam sit, ubi reperitur Succinum, tamen quia & loca, & natales perspecta habere ad rei cognitionem non parum faciat, decrevimus hoc de Electro commentario, primùm indicare ubi legatur, & ad quæ littora plurimum, & quomodo feratur: deinde ostendemus non esse succum, neque Gummi, neque resinam, quomodo cumque eas appellent, arborum: postremò materiam eius, & quid sit, explicabimus. Et hæc quidem ea qua licebit brevitate, ne si longius de eo differuerimus, commentarius hic finem suum modumque excedat.

Vfus.

Codanus sinus appellatur Plinio immanissi-

mus, à sevo immenso monte, nec Ripheis iugis minore, qui ad Cimbrorum usque promontorium excurrens, refertus est insulis, quarum clarissima sit Scandinavia, incomperata olim magnitudinis, nunc verò classibus nostris negotiatoribus & militibus cognita & perlustrata tota: qui non insulam, sed peninsulam pluribus Isthmis coherentem affirmant. In eo situ inter Cimbricam Cheronesum, & Scandinaviam sparsæ sunt insulæ: Burchana, Austravia, Adavia. olim vocate: ad quas fluctibus pelli Electrum Romanæ olim classes deprehenderunt. Ideoque eam, quam Germani Austravia vocabant, Romani Glessariam, hoc est, Electridem dixerunt. Quinetiam præter hanc plures aliæ Glessiæ nominatæ sunt. Universum autem mare, quod Codanus sinus amplectitur, succinum habet, quod fluctibus nunc retrò ad Scandinaviæ, Norvegiæ, Sueciæ & Gothiæ littora agit: nunc ad insulas, ut ipsi etiam deprehendimus: nam & nos quoque illud in Burchana, Austravia, & Scandinaviæ littoribus invenimus. Nunc ad nostra littora, videlicet Cimbricæ Cheronesi, ducatus Melchelsburgiaci, Pomeraniæ, Prussicæ, Samelandiæ & Livoniæ. Sed quamvis toto hoc nostro maritimo tractu non rarò legatur succinum, exiguum tamen id est, in parvas micæ concretum. Plurimum verò, & maximis glebis constans ad Samelandiam expellitur, quæ Prussicæ vicina est regio, & Prussicæ Duciparet: ad eam tanta copia tempestatibus fertur, ut toti terrarum Orbi satisfacere possit, quantum vis multis vlibus expetitur. Atqui non ad totum Samelandiæ litus tanta vis Electri expellitur, sed ad eum tractum tantum, quem Germani dajß *Granawische* vocant, non longè à pago Sudavis & Samelandis *Kraxtepelles* dicto, quod retinctum significat. Nudi enim homines retia venienti succino prætendentes, sapidi fluctibus retncti obruuntur, unde pago nomen patriæ lingua fecerunt. Locum autem quo tanta eius copia colligitur, patet tantum decem millia passuum, hæc duo Germanica miliaria. Habent eius piscationis gnari sua signa & indicia, quibus venturi Electri copiam æstimant. Sunt aliæ quædam diversi generis, sed maximè quædam cordis exigui imaginem referentes, & velicatum modo inflatæ: quæ si copiosè ad litus ferantur, plurimum succini adventare certum, his enim involutum tanquam rebus capitur. Cùm verò parciùs hæc algæ litus appulerint, minùs succini insequitur. Fluctibus deinde ereptum, Dantiicum vehitur: quæ vrbis præterquam quodd totius Prussicæ caput sit, etiam celebratissimum est emporium. Vbi primùm certis venditur negotiatoribus, ex pacto pretium pro certamatura, secundum glebarum magnitudinem, Principi numerantibus. Rude ad hoc ut colligitur, asperum, scabrumque est tota superficie, nec quidquam attrahit, quantumvis calefiat: levigatum verò & politum, primùm rapere incipit, qui ex attritu calefacto admoventur furculos. Nam alia quacunque ratione præter conficationem incallescens, perinde ut rude, rapere nequit, quas proprietates neminem antea prodidisse scimus. Nos autem id ideo affirmamus, quoniam sapidi eius rei periculum scimus. Potrò longum foret, omnia statuta legesque Succini gratia latas enumerare, quia alij ex nostris hæc attigerunt. Nos autem quæ antea tradita sunt relinquentes, quod illi præteriverunt, indicabimus. Nam neque hoc referre necessarium existimamus, quot habeat succinum colore differencias, & quantum vilitatem hominibus adferat

Maxima copia.

Succinum rude.

Græci non habenda fides.



rat, non in Medicina tantum, in qua magnum vsum habet: verum etiam in mechanicis artibus, in quibus multo maiorem. Nunc autem antequam quid sit explicemus, quid non sit, ostendendum duximus: alius succum, aliis gummi, aliis resina, aliis tertiam, aliis lapidem esse contendentes. Nam hæ opiniones multa iam secula hominum mentes detinent. Sed lecturos istarum opinionum confutationem prius novisse oportet, lycci, gummi, resinæ, terræ, & lapidum, differentiam, materiam qualitatem, & alias, quas habent, proprietates: ita facilius dicta intelligent & diiudicabunt. Succum autem cuiuscunque arboris, aut plantæ non esse *Succinum*; sed neque vinam alicuius animalis, succi & vine substantia & qualitates ostendunt. Constat enim utrumque aqueo humore: qui etsi Solis, aut ignis calore densetur, aqua tamen qualicunque, infusus diluitur, ideoque in mare delapsa, quamprimum dissolverentur.

*Succinum non est succus, non est vinum.*

*Liquidum in mare influit, mox densatur. At hic locum non habet, quod dicitur, salem adstringere & densare succos, quod nemo concedet, cui salis natura perfecta est. Sali enim arido densandi facultas, sed non tanta, ut liquidum succum denset: atque ea densandi vis nequaquam est propter imbibendi aqueum, vel similem humorem, potentiam. Sals enim propriissima natura est, facillime aquam, vinum, vel tale quiddam imbibere, & in tali quoque humore dissolvere. Quapropter, quod confersas carnes & caseos densat, & solidiores reddit, per accidens sit, non propria, aut distinguendi facultate, sed quia carnes, & casei recentes, aqueo succo tingentes, succum suum sali combibendum dimittunt, quo fit ut hæc densentur, sicca, duraque & ideo densiora evadunt. Succi vero aliquid nihil habeant terrenæ consistentiæ, qualem carnes & casei, sed toti aqueo humore consistent, sale humorem, quæ appetit imbibente, minime densatur, sed sui similes permanent, si serena sit, nec calida aeris consistentia: si vero turbida, aut humida, etiam liquidiores evadunt, sive humidum aerem imbibente, & succo, cui mixtus est, communicante: quod manifestè omnes, etiam densati coctura, aut sole, ostendunt succi, si sal admisceatur. Continuo enim humescunt & dissolvunt, maxime humidâ & frigida aeris consistentia. Ergo si aridus sal succos etiam spissos liquidiores reddit, quanto magis liquidus sal, cum mare est, liquidos succos dissolvit & penitus dissipat. Si etiam densatus succus esset *Succinum*, aqua incoctum dissolveretur, cum Aloë vulgaris, Hypocistis & eiusmodi: sed etiam si quis integro ævo in aqua, aut vino decoquat, nihil penitus tamen eliquari potest. Adipi vero, aut oleo incoctum dissolvitur, quod alienissimum est à succis, qui aquei sunt. Est itaque *Succinum* pinguis substantia, & à succis diversissima. Quod autem etiam gummi non sit, ostendunt argumenta, quæ iam de succis attulimus. Nihil hæc quoque, cuiuscunque sint generis, in quo vis aqueo humore dissolvuntur, in oleo vero minime: eadem, perinde ut densati succi, turbida & humida aeris temperie humescunt & dissolvunt, nec sine ratione, cum viscosi & concreti calore succi existant. Quidquid enim siccitate densatur, humido resolvi potest. Qui vero resina contendunt, propius ad materiam similitudinem & naturam eius accedunt. Quemadmodum enim resina præguës sunt, & accensæ flagrant, oleoque incoctæ dissolvuntur omnes, ita etiam *Succinum* flammâ accensum ar-*

det, & in oleo, si coquatur, resolvitur, & accensum flagrat. Resinam tamen non esse, statim forma glebarum ostendit. Resinæ enim partim paulatim distillant, & in parvas micæ, guttisque concrevunt, ut Lentisci, Iuniperi proceræ, quam Sandaracam Arabes vocant: Thæ misculum, & quod Orabias, ab Erui figura & magnitudine, vocatur. Partim ex pluribus guttis, longo temporis intervallo collectis, in massas scabras, porosas, & cavernosas concrevunt, ut Pini, Abietis, Piceæ, Piceæ, & eiusmodi arborum: quamvis & hæc frequenter in parvas micæ densentur.

*Succinum* genuino diversus est à resina habitus: neque enim in guttas oblongas densatur, quæ ex arbore se pendisse indicarent, neque in scabra, cavernosæque, & guttis compactæ frigiditate coalescit, sed solidas glebas. Glebarum etiam magnitudo resinam esse negat: siquidem Plinius Romanam allatam esse scribit tredecim librarum pondere, per libram duodecim uncias intelligens. Nos vero scimus multo maiores interdum inveniri: & nonnunquam etiam in continente ultra viginti millia passuum à littore aratris excitari: & in fundamentis ædificiorum in illo in quibus undecim, & tredecim est unciarum pondus. Itaque maximum glebæ pondus nostra memoria inventæ, librarum fuit septendecim & unciarum quatuor.

*Maxima Succini gleba Cerdæ.*

Hæ autem grandes glebæ poculis splendidiorebus à magnatibus apud nos expetuntur, quemadmodum olim apud Romanos ex Oriente Murthinnum: quod & ipsum sine dubio ad Succinæ referri debet, ut Georg. Agricola in suis libris de rebus metallicis indicabit. Puerile autem est credere, in tantas glebas concrevere resinam aliquam: ac multo puerilius, credere tantum ex arboribus defluere posse resinam, ut maria, & littora & terram in Continente impleat. Reclamat etiam experientia, nullæ enim profus in nostro littore sunt Pinei generis, aut resiniferæ arbores, à Cimbrorum extremo promontorio usque ad Scandinaviæ Isthmum, quo Asia maiori coheret, h. e. toto illo inmani sinu Codano, nullæ enim temere in littore arbores, præter Alnos, & Corylos, videntur. Oderunt etiam naturæ resiniferæ omnes salum, aut mari irringuam, solum. Simili modo neque in Norvegiæ, neque Scandinaviæ minoris, neque Succie littoribus, ullo, visitur resinifera, aut Pinei generis arbor, quatenus nos eam oram lustravimus, & quatenus militibus, & negotiatoribus nostris cognita est, qui quotidie legunt Scandinaviæ littora. In montibus vero procul à mari magnæ sunt Tadarum, Abietum, & Picearum silvæ. Sed ex his impossibile est ad mare delabi resinam. Præterea si in inviis cauitibus starent hæc arbores, ut aliqui veterum prodidit, in terram & rupes delaberetur resina. Et si maxime ex rupibus assu raperetur, ut Plinius credidit, sordidum totum esset, calculis, arenis, foliis & aliis rebus mixtum, sed rarissime reperitur, quod tale quippiam complectatur. At neque hoc rationi consentaneum est, ex arboribus è præcipitiis in mare procumbentibus defillare: tum enim paulatim & guttatim defillaret, & in parvas tantum guttas densaretur: sed impossibile est, totin præcipitiis stare arbores, ut tantum resinæ fundant. Addè si hoc modo defillaret, neque ranas, neque lacertas, neque formicas, muscas, culices, aut quidquam tale complecteretur. Mirum etiam esset, si resina sit, non inveniri in eo Pinei generis folia, cum in aliis resinis sua folia frequenter deprehendantur. Esset etiam præter naturam, eo loco resinam in tantam soliditatem densari,

*Gummi non est.*

*Resina non est.*

cum quavis alia resina, five frigida, five calida aqua densatur, maxime salsa, arida, spissabileque evadant, ac sponte dissiliant. Quod si olfactum consulas, exacte nullum resinæ odorem percipies, sed medium quendam inter Bitumen & Ambram, quæ res in terra gignuntur. Quod autem paleas, & alia similia attrahit, magnum est argumentum, multumid à resina differre. Nulla enim id præstat resina. Differunt etiam viribus Resina, & Succinum. Nam hoc præter alia, quibus ab illis discrepat, etiam comitiales suffuui deprehendit, & eos collapsos excitar, quod in illa unquam deprehensum est resina. Facit etiam ad nostrum argumentum coloris diversitas; nam si certæ alicuius arboris resina esset, eundem semper colorem haberet, ut Terebinthi, Laricis, Lenisci, Abietis, Pini, & aliarum resinarum, quæ semper sui sunt similes, Succino verò nunc sero similis, nunc cereus, nunc fulvus, nunc turbidus, nunc omnino pellucidus, nunc niveus, nunc ex quibusdam eorum, adt simul omnibus mixtus, & ceu convolutus, nunc omnino niger est color. Nani gagates ille lapis paleas attrahens nihil est aliud, quàm nigrum Succinum; quare eodem eum Germani vocabulo, quo aliud Succinum, appellant, adiecto coloris discrimine. Necessè igitur est, rem diversissimam à resina esse. Quapropter non possum non Græcorum vanum commentum carpere, qui etiam certa nomina arboribus, Succinum ferentibus, indidère, eas aliàs Elecrides, aliàs Aphitacoras, nominantium, quo vocabulo Indis prædulcis suavisitas significetur. Omitto reliquas fabulas, quibus ipsi suam vanitatem, & inconstantiam palam fecerint. Qui autem resinam non esse contendunt, lapideum esse contendunt: quoniam vulgò Germanis, lapidis nomine veneat: sed nihil in eo est, quod cum lapide comune habeat: lapides enim omnes teruntur, nec quicquam in igne omittunt, nisi alterius cuiusdam rei participes sint, neque accenduntur, neque in pinguedine aliqua dissolvuntur, aut igne in sublimem feruntur, neque leves sunt, ut aquæ innatent: quæ omnia succino sunt propria: quod usque ad eod tenuitate à terrena lapidum materia distat, ut certa ratione totum in vaporem & liquidissimum oleum dissolvi queat, quod nemo ante nos invenit, aut tentavit: variis enim ingressis viis sumus, ut naturam, originem, & materiam eius investigaremus. Præter eos, qui lapidem esse credunt, sunt & qui terram esse dicant: quod ne per somnium quidem alicui in mentem potuisse venire sperassemus. Quoniam verò hæc opinio his annis à multis est accepta, iisdem esse confutanda argumentis, quibus lapidem non esse probavimus, quamvis id paucis verbis egerimus cum non existimemus, sanæ mentis, & iudicii homines, eod erroris delabi posse, ut lapidem esse credant. Decessit hoc anno, cum hæc conderemus, admodum confectus ætate Gregorius Dunckerus, vir haud vulgari experientia præditus: qui multa etiam in Succino observavit, quæ nostrum de eo iudicium confirmant: tamè in eum errorem incidit, ut crederet, Succinum veteribus Samiam terram fuisse dictum, regionem hominibus deceptis: nam hæc Germaniæ ora, quam Effluvi habitant, hodie Sameland nostris, h. e. Samia regio vocatur, petinde ut Samus insula, in Aegeo mari sita. Nihil enim commune Succinum cum sigulina creta habet, qualis est Samia terra, ex qua factæ ollæ, igne in lapidis duritiem coquuntur, nulla sui amissa parte, ut alia quævis signata terra. Succinum verò ignis impatientissimum

existit: flamma enim accensum eod usque flagrat, donec totum in fuliginem abeat: prunis autem impositum æquè ut flamma accensum consumitur, siquidem totum in vaporem resolvitur.

Porro hæcenus eorum confutavimus opiniones, qui Succinum, aut succum, aut gummi, aut resinam, aut terram, aut lapidem esse tradiderunt: quamvis plurima, quæ ad temerem opinionem: maxime quod ad diluendam Scriptorum auctoritatem pertinet. Nos verò minime nuda auctoritate, sed rationibus & argumentis rem tractandam esse censuimus. Nam quod Solinus scribit, Germanico Cæsare omnes Germaniæ oras scrutante, compertam esse arborem Pinei generis, cuius medulla Autumni tempore Succinola chrymet, falsum penitus est, ut ea, quæ antea diximus, testantur: quemadmodum & hoc, quod tradit: Germanicum Cæsarem omnes Germaniæ oras scrutatum esse. Quæ autem Solinus de Succino scripsit, è Plinio excerptis, quibus suum addit commentum.

Restat igitur nunc, ut nostram de materia, & origine eius, sententiam, rerum naturæ studiose communicemus, qui semper credidimus, Succinum liquorem esse à terra in mare fluentem, arcanas ac nondum compertas ob causas paulatim eam, quam præ se fert, soliditatem durescentem, quod Georgius Agricola etiam sentit, & Gregorius Dunckerus, cuius modò mentionem fecimus, omnino affirmat, natione Samelandus, qui in eo littore, ad quod maxime expellitur, ultra quinquaginta tres annos vixit, maximæque curâ totâ vitâ suâ eod incubuit, ut originem & materiam eius perdisceret. Nam hie eos quoque reprehendit, qui arborum lachrymam esse prodiderunt, clarisque verbis dicit, liquidum primò esse liquorem è terra in mare fluentem. Quod, tanquam certissimum, omnibus est amplectendum. Ad stipulatur nostræ sententiæ etiam Veterum nonnulli, ceu Nicias, Philemon, Alarbus, & Mnesias, quos Plinius citat. Nicias enim Solis radiorum succum esse succinum tradidit, quos circa Occasum vehementiores in terram actos credidit pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere: qui deinde in Germanorum littora efflueret, haud absurdâ opinione. Non quòd hic succus ipsis Solaribus radis, nihil præter qualitatem exsistentibus, insit: sed quòd radiorum fervore, pinguis ille terræ sudor foras eliceretur: quod plarique in locis apud nos Æstatis calore, & Veris, Autumni quoque tempore in liquido Bitumine deprehendimus: cuius speciem Succinum quoque esse diximus. Bitumen enim hoc in terræ poris latrans, paulatim foras Sole terram calefaciente, & pinguedinem eius eliquatè in lacus, puteos, rivulosve emanat: Hyeme verò præclusis terræ meatibus, & densata pinguedine nihil profus manat. Philemon fossile est, & in Scythia eui prodidit, candidi, cerei, & fulvi coloris: procul dubio comperta scribens. Nam in Parthia quoque & Germania Murthra, quæ absque dubio Succini genus sunt, è terra effodiuntur, quæ nullus unquam resinam credidit. Quare cum fossile sit Succinum, quæ est amenia resina id esse contendere, cum apud nos quoque sapissimæ grandes glebe inter arandum excidentur, & è puteorum, & adificiorum fundamentis eruantur, multis à littore passuum millibus. Nos tamen eas ibi minime natas, sed in terra, mari, ut plerique in locis contigit, longius à Continente recedente, reliquas iudicamus, quamvis plarique ibi gentes credant, in quorum numero etiam fuit, Gregorius Dunckerus.

Differentia  
Resinarum  
& Succini.

Gagates  
m. nunc est  
Succinum.

Græci  
repreh.

Lapis non  
est.

Non est ter  
ra.

Dunckerus  
error.

Solinus ja-  
lit. ar.

Liquor est à  
terra in  
mare flu-  
ens.

Arborum  
lachryma  
non est.

Solis radi-  
um succum

Nicias ibi  
instratur.

Fossile in  
Scythia.

Amenia  
quorundam.



kerus. Asfarubas, qui Plinio scribente adhuc vixit, apertius rem prodidit, tradens: iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephisida, quem Mauri *Electrum* vocant, huncque Sole excalescitur è limo dare *Electrum* fluitans. Asfarubæ subscibit Mnefias, locum quemdam Aphricæ Sicyonem vocans, & Cratim annem in Oceanum affluentem è lacu, ibi eadem ratione nasci, quâ in Cephiside lacu Asfarubas tradidit. Nos utrumque verissima scripsisse credimus, non vanis argumentis induciti: primum quidem, quoniam apud nos eodem modo Sole excalescitur Lacanæ & Putei, è limo emittunt Bitumen aquæ innatans. Deinde quoniam certò comperimus etiam in Aphrica reperi

Locus.

ri *Succinum*: idque ea parte, quâ Canariis spectat insulas. Nam eam Aphricæ oram Atlanticum mare alluit: Misit ad nos ex Antuerpia Aphricani *Succini* unam atque alteram glebam Gruningus natione Frisius (qui ea loca lustravit, & ipse id in ripa fluminis cuiusdam ibidem legit) nostrati addidit similem, ut dignosci nequeat, quas inter cetera, quæ chara nobis sunt, ed libentius reposuimus, quoniam & Mnefias & Asfarubæ fidem & auctoritatem firmam nobis faciunt. Quare immerito Plinius eorum tradita, aliorum Græcorum commentis adnumerasse videtur. Gigni autem in terra Aphricanum *Succinum* quoque, nec esse arborum resinam, vel inde perspicuum est, quoniam nostrati simillimum colore, substantia, & qualitatibus eum sit, eandem quoque originis causam habere necesse est. Sigitur Picei, aut Pinei generis arborum resina esset, quales arbores in Septentrione videntur, necesse esset etiam in ea Aphricæ ora easdem nasci arbores, quæ similem & eiusdem speciei resinam lachrymarentur. Cum verò experientiâ constet, nullas ibi resiniferas similes provenire arbores, non male ratio cinamur, id resinam minime esse. Quæ enim ibi proveniunt arbores, nostratibus dissimilima sunt, ut referunt, qui ea loca inspexerunt. Precipue autem abundant Sandali, Brasilij, Guaiaci, & ex quæ sanguinem Draconis dictam lachrymam fundunt: multæque aliæ nostris, quia nondum vñs alicuius gratiæ expetuntur, incognitæ. Etsi autem Gregorius Dunckerus quoque deprehenderit, è terra fluentem liquorem esse, non tamen explicat, cuius generis, cuiusve substantiæ, aut naturæ sit hic liquor, quod nobis est nunc dicendum.

Liquor dicitur.

Aquei.

Oleum. Bitumen. Succinum. Generis.

Consistens.

ita.

Liquores omnes, seu fontes, qui è terra, ac montibus fluunt, ad duo præcipue referuntur genera, aut enim aquei sunt, aut olei modo pingues. Aquei autem multum differunt secundum terrarum, per quas fluunt, diversas qualitates, hinc alibi dulces, alibi nitrosi, alibi salsi, alibi Chalcantio infecti sentiuntur: ad nullum autem horum referri potest *Succinum*: quare necesse est ad alterum liquoris genus id pertinere, quod pingue existit, & Olei æmulum. Liquor autem hic pinguis, suum apud autores nomen habet, nempe Bituminis, cuius species solidum, & liquidum, quæ & ipsæ in plures differentias dividuntur. Est autem Bituminis genus *Succinum*, eius materia, colores, odor, medica vis, & ignis rapacitas, manifestè convincunt. Substantiam enim si consideres, deprehendes pinguem, flammam faciliè concipientem, æquè ut Bitumen. Atqui antea à nobis dictum est, pinguem terræ liquorem Bitumen esse, talem autem consistentiam *Succinum* habet. Quamvis præter Bitumen etiam aliud quiddam in terra genitum pingue sit, videlicet Sulphur. Sed ad hoc referri non debet, quoniam metallicum est medicamentum, pluribus à *Succini*

no differens. Colores etiam *Succino* totidem, quot *Coler*.

Bitumini: est enim nigrum quoddam; Gagates & Thracius lapis dictum, ut vulgare Bitumen: est fuscum in purpura, ut Iudaicum Bitumen. Et candidum quoddam, ut candida Naphtha. Est fulvum & perspicuum quoddam, ut Naphtha fulva; quæ liquidissimum est Bitumen. Si autem olfactum consulas, manifestè Bituminis qualitatem odore percipies. Quoddam verò suavis oleat alio Bitumine, puritati substantiæ referendum est, quâ tantum à vulgari differt. Vires etiam originem, & materiam eius produunt, de quibus paulò post, ut etiam de quotidiano eius in re domestica, & mechanicis artibus usu, qui & ipse Bituminis genus esse testatur. Et certè eius genus, ut Callistratus Plinio citante prodidit, Chrysele-

Olor.

Vires.

Vfus.

Chrysele-

trum Cal-

-stratus Plinio

Naph-

tha Diofco-

ridis.

Nata'is.

terram.

Liquidum

quandoque,

trum vocatum, quoddam sit rapacissimum ignum, & si iuxta fuerit, celeritè exardescens. Quod Callistratus Plinio de nulla unquam alia re autores tradiderunt, quàm Naphtha, quæ Bitumen est liquidissimum: in hunc enim modum de Naphtha Diocorides quoque scriptum relinquit: vim habet rapacem ignis: aded etiam, ut ex intervallo rapiat illum: idcirco cum Callistratus id *Succino* tribuat, quod Naphthæ sit proprium, quis alteri, quâ n Bituminis generi adscribat? Accedit postremo naturalium vicinitas, ubicunque enim *Succinum*, ibidem etiam bitumen gignitur, ut in Perside, Parthia, Carmania, Aegypto, Mauretania, & nostro Septentrione. Omnium autem argumentorum, quæ

iam adduximus, firmissimum est, quod interdum molle adhuc & flexile invenitur: interdum omnino liquidum, in superficie solum tenui crusta vestitum. Inventa est ante paucos annos in Prussic littore oblonga gleba furcæ figura, cuius alterum cornu mollis ceræ instar flexile fuit. Quin & ipsi Lyphæ apud avunculorum nostrum Ioannem Rallam Pharmacopolam, in *Succino* à Prussia recenter allato, septimo hinc anno, invenimus glebam, in qua conclusa, ut in ovo veterascenti, humidus adhuc fluctuabat liquor. Ducti itaque rei attea non compertâ novitate glebam confrégimus, tenui crusta lepidissimum, & prorsus liquidum humorem continentem: deprehendimus autem crustam *Succino* vulgari similem, liquorem verò Naphthæ fulvæ, id est, Petroleo similem, paulò tamen crassior, odore succinum prunis impositum omnino referentem, & nihil minus, quàm resinæ alicuius habitum præferentem. Cogitantibus igitur nobis per quam resolutionem partes, quibus constat *Succinum*, ab invicem discretæ palam fieri possent: tandem hoc anno artem invenimus, quâ id fieri posset: deprehendimus igitur in hac arte, in partes, & elementa sua resolutum magna ex parte in bitumen transire, vero Iudaico bitumini aded simile, ut neque colore, neque pondere, neque substantia, neque odore, nec quacunque alia notâ ab eo distingui possit. Quin & ipsi nos ista [id] dignoscere huc possemus, nisi [si] Iudaici Alphati glebulis misceretur: ut autem alia omittamus, etiam confractum, ceu alarum & pennarum fibras Iudaici modo ostendit. Quapropter cum substantiæ similitudo, colores, odoris qualitas, virium proportio, ignis rapacitas, natalium vicinitas, quotidianus vñs, & manibus nostris atrectata, sensibilibusque diiudicata materia, & singulari arte deprehensum in eo bitumen, *Succinum* bitumini cognatum esse testentur, nec ulla sit nota, quæ repugnet: clarum tandem & perspicuum est, neque resinam, neque gummi; neque arborum succum, neque urinam, neque lapidem, neque

Ipsa Succini

resolutio.

Ritum.

que terram esse: sed purissimum, levissimum, optimum sui generis bitumen: Quemadmodum & Ambra, & Camphora, quod huius loci non est multis demonstrare argumentis. Porro quâ ratione lacertas, ranas, culices, muscas, & alia insecta, quæ in eo transluent, atque metallica etiam medicamenta quædam, seu Aluminis, Chalcanthique venas, quas ipsi in eo deprehendimus, involvat, & complectatur, hoc commentario preterimus: quemadmodum & hoc, an in ipso maris vado, aut littore, an utroque loco eius sint fontes. Huc usque Cordus.

Chrysophorum.  
Vernix.  
Pharmacum.

Cui in eo Cornarius, quod scilicet succum faciat, contrariatur, cuius historia ita habet: Succinum ab aliis *χρυσόπριον*, dicitur, si tamen hæc vox recedat legitur hoc loco, & non *χρυσόπριον* legendum est, velut lib. 2. cap. 70. de Lyncutio habetur, ut sit à trahendis pinnis, ac paleis appellatio. Num autem non trahit, nec illâ voce aurum referre, accipi potest, quum hoc mox subdat, esse ipsum *χρυσόπριον* hoc ubi. Hæc itaque fabulosè dicitur, si *χρυσόπριον* dicitur, & idem etiam Lyncutio dicitur, si *χρυσόπριον* dicitur, vana etiam illa appellatio ac historia, quum utina Lyncis non sit. Quum igitur non quid sit, sed quid non sit, ostendunt, videtur hoc ignorasse, & nos ambigunt relinquit, ut in multis illis opinionibus incerti adhuc versetur, quas Plinius per longum recensuit, & partim damnavit ac refutavit, & nos propolimus, ut legant, quibus ista cognoscere libet. brevibus autem repetemus de loco, ubi colligitur, an fortassis inde, quid sit, aliquatenus deprehendere possimus. Nam res ipsa alioqui ob omnium oculos versatur, & nemini non nota est. *Electrum* itaque quod & *Succinum* dicitur, & Plinius in insulis Septentrionalis Oceani gigni, & à Germanis *Glessum* appellari dicit, hodie magna copia ad littus Curienfè & Samlandiæ Oceani æstibus elicitur, & tum à Livonia, quos Efflues dixisse Tacitus videtur, tum Prussia incolis mulierculis pro ornamento, instar Corallij apud alios, circum colla appenditur ac gestatur. Id quod quum olim agrestes Transpadanæ terrine facerent, & monilium vice *Succina* gestarent, neglegentia id tunc ab incolis Germani in Pannoniam vixerunt, & inde proximi Pannoniæ Veneti, id ab illis circa Adriaticum mare acceperunt, & ad Transpadanos detulerunt. Apud nos quum non decoctis modo, sed etiam Medecinæ, & amuleti gratiæ gestaretur, creditum est ibi natum esse, & conficta est fabula, Populorum nigrarum lachrymas esse, in quas Populos Phaëtoniades essent mutata. Credibile autem est *Glessum* Plinij ac Taciti veritate appellatum à Germanis. Verum hodie ea vox aliud nobis, nempe vitrum sonat, nisi translucendi respectu primum ita sit appellatum. Hodie sanè vulgè Germanorum isthic habitantium *Veruffen* & *Bernffen* vocatur, appellatione ut videtur, ex eo, quod accentum redæ modo ac nidore flagret, facta. Quod ita fieri etiam Plinius & Tacitus de eo testantur. At quod revera arborum succus sit, & inde *succini* appellationem traxerit, & is ex pinei generis arboribus. Plinius constanter affirmat, & adhuc à nemine satis reprobatur, sed & Taciti etiam testimonio confirmatum, qui, succum tamen arborum esse, inquit, intelligas, quia terrena quædam, atque etiam volucris animalia plerumque interfluent, quæ implicata humore, mox durefcente materia cluduntur. Hoc autem Plinius sic tradidit. Liquidum primum destillare, argumento sunt quædam translucencia, ut formicæ, aut culices, lacer-

Lycocytis.  
Dioscorid.  
Lycis.  
Dioscorid.  
Lycis.

Locus.

Glossum.

Moule.

Fabula.

Glessum.

Arborum  
succus  
Pinei generis  
in arbor.

æque, quas adhæsisse multæ non est dubium, & inclusas durefcenti. Nec Poëta Virgilius in alia sententia fuisse videtur, dum in Pharmaceutria dixit:

*Pinguia corticibus sadent Electra Myrica.*

In eodem portò Cunenensis litonis tractu, quem vulgè den *Burischen Straudi* appellant, maxime tamen in Dantiaco Prussiae urbe *Succinum* cum Lini semine, in id quod Vernicem sive Verniginem vocant, rem pecturibus, & multis opificibus familiare, & quæ bituminis usum hodie in plerisque locis præbet, apparatur. Sic autem Plinius de bitumine scripsit: In reliquo usu æramenis illinitur, firmatque ea contra ignes. Diximus & tingi solitas ex eo statuas & illini. Placuit in ferrariis fabricorum officinis, tingendo ferro, clavorumque capitibus, & multis aliis usibus. Ex quo argumento vel solo, aliqua *Succinum cum Bitumine affinitas* asseri potest. Verum quiddam bituminis sit genus quoddam ipsum Succinum, & ipsum adeo penitus bitumen, quod pinguis sit terræ succus alter: Nam Alumen & eius genera, alterum ab hoc faciunt illi: hoc mihi nondum persuaserunt ipsi, qui nuper hoc editis scriptis asseruerunt. Neque enim de effusè adeo larga ac varia magnificæ naturæ liberalitate, ita parcè & iliberaliter iudicare convenit, & tam multas ac varias res, quas illi recensent, sub unum illud bituminis genus contrahere, ita ut nomina solum illæ existant. Porro *Succinum* Arabes Carabe appellare satis constat, quæ vox aut ex Græca *καρύνη* corrupta est, aut idem, quod illa significat, raptum videlicet palearum, qui etiam *καρύνη* nomine intelligitur. Sed idem Arabes Gandaron ac Sandaracham, Vernicem vocant, & exponunt esse gummi arboris Iuniperi, simile Carabe. Quare diligenter observandum est his, qui illos sequuntur, ne pro salutari medicamento, Sandaracham Græcorum perniciosum Pharmacum agnoscant. Deinde ex Vernicè Iuniperi lachryma, etiam factam Vernicem cum Lini seminis oleo fieri dicunt, & sic Succinum cum Iuniperi lachryma confundunt. Nam de Succino intelligendum est, ex quo Vernix paratur, cum oleo seminis Lini.

Vernix cum  
Lini semine.  
Et Succinum.Carabe  
unde dicitur.Gandaron.  
Sandaracham.  
Vernix.Arabes confundunt.  
Succinum cum Iuniperi lachryma.Ambra.  
Succinum.  
Camphora.  
Electrum.

Pterigophoron.

Pinus.

Electrum.

Succinum.  
Sudor terræ pinguis.

Gagates.

Succin.



Succinum ( inquit Guil. Gilb. de Magnete )

Græci vocant *ἀμύγδαλον*, quia ad se paleas trahit, attritu calefactum, inde *ἀμύγδαλον* dicitur, & *χρυσοκόμην*, ab aureo colore. Mauri verò Carabem appellant, quia solebant in facilius, & Deorum cultu ipsum libare. *Carab* enim significat offerre Arabicè: ita *Carabe*, res oblata. Non rapiens paleas, ut Scaliger ex Abahali citat ex lingua Arabica, vel Persica. *Ambra* etiam nonnulli appellant, præsertim Succinum Indicum & Aethiopicum. Succinum quasi succum, Sudavienfes seu Sudini Gevites appellant, quasi genitum terra. Explosis Veterum erroribus de natura, eiusque origine, constat Succinum maxima ex parte ex mari provenire. Colligunt rustici in Sudinis Prussia, etiam in Britannia nostræ littore aliquando reperitur. Non solum Succinum & Gagates ( ut illi putant ) allestant corpuscula: sed & Adamas, Sapphirus, Carbunculus, Iris, gemma. Alii cunctas: omnia non solum modò, & paleas, sed metalla omnia, ligna, folia, lapides, terras, aquam ipsam, & oleum: omniâque, quæ sensibus nostris subiciuntur, aut solida sunt: quamquam scribant non attrahere Succinum ( nisi paleas &amenta quadam ) quare falsò Alexander Aphrodisæus dicit de Succino, quòd tantum siccas attrahat paleas, & non folia Ocyri, Succinum non calore allicit, ut Cardanus & Pictorius existimant: nec à singulari aliqua proprietate substantiæ, aut familiaritate. Succinum in maiori mole positum si fuerit, allicit: in minori & impuriori sine fructione non videtur allicere. Quæ potest cur Succinum aquam alliceret, cum aqua in superficie posita, actionem tollit: sicut, quia aliud est in exortu ipsò supponere, aliud emissum relinquere. Ita & Seticum rarum, tenuissimumque, citò supra Succinum, postquam fricatum fuerit, impositum, attractionem corporis impedit: at si in mediis intervallis impositum fuerit, non penitus obstat. Humor etiam in vapo aëte, & omnis ab ore afflatus, tum aqua imposita vires restituit illud. At oleum, quod leve purumque est non impedit: nam et si calido digito oleo imbuto Succinum affricetur, tamen trahit. At Succinum si illud à fructione persulum fuerit aqua vitæ, non allicit.

Nomina.

Electrum.  
Glossum.  
Chrysophorum.  
Perysophorum.  
Harpa.  
Lyncurium.

Theophrastus.  
Lachryma filiarum.  
Solu.  
Carabe.  
Genera.  
Theophr.

Hadrian. Iunium adeamus, qui in nomenclatura sua Succinum inter lapides connumerat, dicens: Plinio lachryma, vel resina arborum odoratarum, Pini & Pinasti præsertim, cui rei indicio est odor similis cum accenditur, atteriturque. Electrum Ovidius, Glossum veteres dixere, à translucida vitri in modum specie. *ἀμύγδαλον*, *χρυσοκόμην*, & *ἀμύγδαλον* Plinio, quòd folia, paleas, plumasque ad se rapiat, attritu concepta caloris vi. Dicitur & *λύνκον*, Lyncurium, ut vult Strabo lib. 4. velut è lyncis lotio natum, quòd aggesta terra obruit animal, quasi humano id usui invidet, in quo Theophrastus dissentire videtur, qui Lyncurium trahere ad modum Electri, non paleas modò, sed bractæas etiam metalli, scribit in lib. de lapid. ita ut inter ea discrimen manifestum ponat: quin & Electrum lapidem esse in Liguria fossilem idem ait, sed quam verè nescio. Vocatur & *ἀμύγδαλον* apud Poetas, quasi lachrymæ Solis filiarum, quas existillat in morte Phaëtonis fratris. *Carabe* Officinis vocatur. Succinigenus primum ( quod semine differentia insignit Theophrastus ) flavus est, & pellucidus, quod Glossum & Glossum Germani dixerunt, hodie Agstein, illis vocatur, & Bornstein. Belg. Amber / Gal. Ambre, Ital. Ambra gialla, Ambra

Tom. I.

dicorona, Hisp. Esclarimente, Ambar. Alterum genus album, & obscurum, quod spumum & bastardum vocant Germani.

Gagates Plin. vel Gangitis, lapis odore gravis, qui ustus sulphureum Plinio, vel bituminosum odorem Orpheo & Dioscoridi vomit. *γὰγας*, *ἐλγας* Nicand. Alem. Gagastein / Agastein / Bornstein / Bernstein / Belg. Aghet / Gal. Agathe Hisp. Azavale. Thracius lapis, Gaudis species est apud Nicandrum, quem aqua accendit, oleum restituit, nigri coloris. *γὰγας*, Alem. Schwarzer Aghestein / oder Birnstein. Belg. Schwar Aghet. Locum & tempus hæcenus dicta per spicuum faciunt.

Vlcera glutinat, mollit, sufficit, olfactuque, vires & vulvæ strangulatione correptis mulieribus succit. Comitiales prunis impositum deprehendit, & deprehensos rursam restituit. Menfes cit, venenis adversatur: Concretum in thorace sanguinem discutit & resolvit: dysenteria laborantibus succit. Tussis, & à capite in subiectas partes destillationes, suffitu sistit: dentium dolores mulcet. Omnes denique facultates nostræ in Succino celebrant, quas veteres bituminis speciebus adscriperunt, præterque has aliæ etiam Succino tribuuntur, quas consilud præterimus ( inquit Cord. ) quoniam eas Veteres non nominat recensuerunt, sed in genere indicaverunt. Quod enim fictos calculos excrevit, & Ictericis medetur, Succinum, ex incidendi, attenuandi, abstergeendi, aperiendi, & discutendi facultatibus procedit: quas Bitumini auctores assignant. Hoc præterea, clavorum capita; ac alia fermenta in nigrum colorem tingebantur, in quem vsum multi nostrorum ubi abundat, Succinum recipiant. Expetuntur etiam lucerna lumina, ut Bitumen,amenta eius. Rapax admodum est ignium. Utuntur Medici ad omnes fluxiones sistendas, seu sanguinis, seu humorum: ad vomitus compescendos, & destillationes: potu, & infusu aerem pestilentem fugat. Pastilli ex hoc olim fiebant pro sistenda sanguinis fluxione apud Grecos, quos Arabes sub nomine Caraber pro eodem effectu construunt, & in officinis hodiernis repositi habentur. Valet autem flavum Electrum ad multa, nam pueris pro amuleto contra falcinationes appenditur, contra dysuria quoque habetur. Album verò cum aqua stillata è Raphano Nephritum curat ebibitum, nec minus cordis tremori, & orthopnoæ prædest: nam in spersum rhagadibus, dolorem & pruritum præsentis auxilio mitigare traditur.

Non sat erit attulisse vires atque facultates ipsius Succini, de oïco etiam agehdam, in quo multo efficaciores: nam quicquid efficacia & virum inest, quinque, sex, vel septem Succini libris, in unam libram faciliè redigi potest unde superat suam facultate omnes Aquas vitæ, omne aurum potabile, hæc Evonymus Gesn. ubi alia multa circa præparationem, & circa vasa ad Olei extractionem traduntur, quæ nolumus recensere brevitate studentes: verum ea, quæ Tyrocinium chymicum habet, his verbis accipe: Digere lbj. Succini triti, in vini albi lbj. Tum adde manipulum salis præparati: destilla per retortam: servatis ignis gradibus. Rectificatur bis destillando, cum sale tantum. Sacrum hoc Oleum olim appellatum fuit, ob vires eius eximias, quas cum per se, tum cum aliis mixtum, præstat: in Epilepsia, Apoplexia, Melancholia spasmò, vertigine, peste, calculo, frigidis capitis defluxionibus, animi deliquiis, ictero, difficultate respirandi, dysuria, uteri strangu-

Gagates.

Vires &

Calculus.

Hamor-

rhagia.

Vomitus.

Pastilli.

Caraber.

Tasferatio-

nes.

Dysuria.

Nephritis.

Orthopnoa.

Rhagades.

Oleum.

Oleum sa-

crum.

Morbi qui-

buses.

duci.

Ff

# HISTORIAE PLANTARVM

gulationibus, mēstrum retentionibus, fluore matricis albo, vermibus, & febribus.

## CAPHURA QVÆ SALICIS FO- LIO DICITVR.

CAP. LIV.

**Descriptio** IN panes fusiles ingentes coacta importatur, pellucidos & candidos toros, factus Nitri instar, qui pulsus etiam unittum edunt argutum, substantia pinguiscula, & quæ facili flammam concipiat, quam in mediis etiam aquis inextinguibilem pertinaciter retinet, sub dentibus lentescens, & exigua portione totum os veluti in flammans, odore vehemēti.

**Serapioni** Kafir, seu *Campora* gummi est arboris in Indiæ montanis nascentis, teneræ, subnigræ. Proventus eius uberioris prælagium est, ex crebro tonitru, fulgetro, & terræ motu. Eius species una, *Campora de Panzor* ab insulis Panzor. Prima tamen laus *Campora Ribach*, quæ sponte sua ex arbore fluxit, colore rubeo, quæ sublimatione dealbatur, nomen adepta à Rege *Ribach*, qui primus ibi regnavit. Proxima bonitate est, quæ *Fausen* dicitur: deinde *Carfab* nominata.

**Avicennæ** species Caphoræ sunt, *Alkanfuri* & *Ariagie*, deinde *Alzeid* & *Alesick*: & est alba, quæ permixta ligno suo, quidam dixerunt arborem magnam, sub cuius umbra morentur plurima animalia, ut *Alvemus*, seu *Alvemer* [Lupos Cervarios interpretatur Bellinensis] certo anni tempore. Lignum sæpids vidi album, fragile, leve, cum vestigiis Caphoræ in rimis.

**Adulteriū.** Caphuram Mastiche, ardenti aqua, Zedoariæque adulteriari scribit Matthiolus, ac esse gummi arboris cuiusdam in India nascentis, tanta magnitudine, ut sub eius umbra hominum centuriæ recondi possint. Fuchsum quidem putare Caphuram esse Bituminis Indici genus. Sed dissentire ab eo opinionem suam: quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum quorumcunque hanc fuisse sententiam existimet. Præterea oscitanter nimium de hac scripsisse Platearium: quippe qui Caphuram gummi arboris esse inficietur: Dioscoridis & complurium testimonio ex succo cuiusdam herbæ fieri tradens. Quod profectò falsum sit, cum nullibi Caphuræ meminerit Dioscorides. Eam autem esse Gummi, non solam Avicennæ & Serapionis testimonio probari, sed & Lusitanorum, qui nostro ævo per Meridiem ad Calicut Orientalis Indiæ emporium naviganti Arabibus

**Kaphor.** *Kaphor*, seu *Casur*, recentioribus Græcis *κασουρα*. Lat. *Caphura*. Ital. *Caphora*. Germ. *Champfer*, Boh.

**Arabia.** *Basse*. Legitimæ autem Caphoræ probationem hanc tradit. In calido pane è furno recentissimè sublato, bipartitoque manibus scisso, Caphura ponatur. Quod si humore madeat, sinceræ est argumentum: sin contra perarefcat, spuræ ac falsitatis signum. Cæterum nisi diligenter asservetur, ex operculatis etiam capsulis nonnunquam evanescit: itaque sæpè deluduntur Sepulchritij. Asservatur tamen securè vale marmoreo, aut Alabastrino, Lini & Phyllis semine sepulta. Nec desunt, qui eam Piperis fasciis asservari putent, quod nec planè comprobandum videtur. Venetias Caphoram omnem rudem important, ibique igne & arte vitreis organis, sic ut candescat & pelluceat, elaboratur.

**Purgatio.** Lucanæ Alcamphor, dicitur Latinis *Caphura*, antiquis Græcis incognitum gummi, provenit

in magna arbore Indiæ.

Garcie de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphuræ nec Galenus, nec quisquam veterum Græcorum meminit præter Aëtiū, tamen si Scapionis vulgata exemplaria, Dioscoridis auctoritatem citent, falsò enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & quæ ex China advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltē, cum isthic essem, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tanti emitur, quanti centenaræ libræ eius, quæ ex China adfertur, quæ secundum genus est, cæque in Europam deferuntur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quæ magnitudine est Milij, aut paulò maior, maximè ex parte vilior est. Constituant enim Gentiles, & Baucantes, & Arabes, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quæ ex capite est, libra, pendit *pardan* octoginta [est verò *pardan* moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem *regales Castellanos*] quæ ex pectore aureis viginti: quæ ex cruribus, duodecim: quæ ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cuprea sumunt in aqualibus foraminibus pertusa [qualia, quæ uniones vendunt, habere solent] ac per ea Caphoram transmittunt. Ea quæ per instrumentum maiuscula foramina contingens, transmissa est, certum habet pretium: quæ per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea verò discernenda, adeò sunt experti *Baneanes* isti, ut Caphuram Caphuræ permixtam dextrè distinguere norint, pretiumque iustum imponere. nec facile inveniunt, qui eos fallere possint. Multa nascitur hæc Caphura in Burneo, Bairos, Samatra, & Pacen. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. simpl. cap. 144. de Panzor vocat, est de Pacen in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 134. Alçuz appellat, de Sonda esse potest, quæ insula est Malacæ vicina: quam verò Serapio ex regione Calca advehit tradit, corruptum est vocabulum, debebatque de Malacca dicere, quandoquidem in Bairos, loco Malacæ vicino, nascitur.

Monendam ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint *Alfuz*, sed *Alkanfuri* duntaxat, & *Ariagie*, deinde *Alzeid* & *Alesick*.

Est autem Caphura [pergit Garcias] gummi, non medulla, aut cor, ut Avicenna loco supra citato, & alij quidam putant, quod in medullam ligni cadens deinde extrahitur, aut peritimas exudat. Id vidi in mensa ex Caphuræ arbore constructa apud Pharmacopolam quandam, deinde in ligno quodam femoris crassitie donato Gubernatori Domino Ioanni de Crasto, denique in tabella palmum lata apud quandam mercatorem. Non tamen negaverim, quin interdum in arboris concavum decadat. Principio verò exudat admodum candida sine rubentibus, aut nigricantibus maculis: non autem organis educitur, veluti quidam scripserunt, neque ad candorem, conciliandum decoquitur, ut falsò Avicennæ & Serapioni persuasum est. Pro certo mihi relatum est, solè quælibet prodire huius colligendæ gratia, quæ ubi cucurbitam impleverit, si quis validior hunc cum cucurbita viderit, illud eum impu-

Caput. Ca-  
fol.

Disce falsi-  
tatem a  
Serapione.

Caphura  
duplex ge-  
nus de  
Burneo. 1.

2 Caphura  
ex China.

Caphura  
de Burneo  
genera 4.  
Caput. Pe-  
tus.  
Crura. Pe-  
des.  
Pretium.

Locus.

De Panzor.  
De Alçuz.

De Calca.

Gummi, non  
medulla, aut  
cor.  
Avicenna  
error.  
Mensa ex  
Caphuræ.

Avic. et  
Serap. ar-  
ror.



*Caphura adulterii Chanderros gummi. Ligni scobis.*

impane posse occidere & cucurbitam auferre, fortuna nimirum id illis [ut aiunt] elargiente. Quæ ex Burneo adfertur, plerumque admista habet minutissima lapidum fragmenta, aut gummi quoddam *Chanderros* illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdam scobem. Sed facile maleficiū deprehenditur. Nullam præter hæc adulterandi rationem novi. Nam si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis confersa videtur: id vitium ex fordidarum & impurarum manuum contrectatione, aut ex madore contrahi affirmant. Sed facile à *Baneanis* id vitium emendatur: Si quidem in panno lineo colligatam, in calidam aquam clam demittunt, addito saponis & Limonium succo, deinde probe elotam in umbra siccant: sic multò candidior redditur, pondere multum imminuto. Id ab amico quodam *Baneane* fieri vidi, qui hoc arcanum mihi credidit.

*Modus de albanis Caphoram.*

*Duo genera Scriptio- nis & interpretatio.*

Viriusque generis meminisse videtur Serapio. loco supra citato: sed obscure admodum, cum ait maiorem quantitatem esse de *itaris*, minorem tamen esse, quam quæ à *Sin* adfertur. Quod si intelligendum puto, maiorem quantitatem ex *Chiniceo* adferri, maioreque formâ esse, quam quæ ex *Burneo* advehitur: quandoquidem eius quantitas drachma maior non invenitur: panes verò, sive orbiculi ex *Chiniceo* allati quatuor sunt unciarum aut amphores. A viris fide dignis mihi relatum est, arborem esse *Nuci* *Iuglandi* similem, foliis tamen candicantibus, *Salignis* similibus, fructum, verò aut florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse, ut utrumque ferat. Illud autem certò scio, materiam esse cinerei coloris, fagine ferè similem, interdum nigriorem, nec eam quidè levem, aut fungosam, ut retulit *Avicenna* (nisi fortè etate iam caducam & emortuam viderit) sed mediocriter solidam. Addunt plerique valtam & præaltam esse arborem, latissimè sese fundentem, & aspectu perpulchram.

*Avicenna error.*

*Fabula de umbra. Fabula de tonitruo.*

Fabulosum est, quod ad eius umbram omne animantium genus confugere aiunt, ut ferociora animalia evitent. Nec minùs fabulosum, quod quidà, Serapionem secuti, scribunt, huius largioris proveniunt augurium esse, cum frequenterbus fulgētis cælum coruscet, aut crebro tonitru perstrepat. Nam cum *Insula Samatra* [quam nonnulli *Taprobana* putant] & circumiacentia loca *Lince* æquinoctiali vicina sint: multis tonitribus subiecta sint necesse est, eamque ob causam singulis diebus imbres aut levès pluvias habent. Singulis itaque annis *Caphura* abundare debebat. Ex quibus perspicuum est, totius largioris *Caphuræ* proveniunt causam, aut indicium non esse. Nonnullis *Caphura de China*, composita videtur, ex eius parte, quæ ex *Burneo* advehitur. Affirmarunt præterea mihi, panes illos orbiculares, qui ex *Chinâ* advehuntur, compositos esse, quoniam *Caphura de Burneo* in *Chiniceo* deferatur, idè incolis expetita, ut eam alteri viliori permisceant. Cui opinioni suffragatur *Baneanes de Cambaya*, qui pro arcano dicunt, deficiente *Caphura de Burneo*, solere se eius exiguum quantitatem cum multa *Chinensi* commiscere, eamque falsò de *Burneo* nuncupare. Addunt item isti *Baneanes*, *Chinensem* *Chaphuram* compositum esse medicamentum, quod temporis lapsu evaporet, & corrumpatur, *Caphuram* verò de *Burneo* minimè.

*Caphura Chinensis Compositum medicamentum.*

*Contra Manard.*

Mihi sanè compositum medicamentum non videtur, tamen *Manard*. in comp. Mes. dist. 8. contra sentire videatur. Sin verò sit, ex duobus *Caphuræ* generibus conficti necesse est. Nan tamen evaporet, non est tamen admodum corruptu-

Tom. I.

ptioni obnoxia: quod indicium est, minimè compositam, aut fictitiam esse, quandoquidem cōposita longè facilius corrumpi soleant. Si enim *Rhabbarum* vix quadimestre illud, quo in hac regione pluit, ferre potest, multum sanè est *Chinensem* *Caphuram* incorruptam hic in India manere.

*Avenrois* 5. Coll. cap. 56. aliud *Caphura* genus facit, longè à superioribus diversum, scribitque *Ambarum*, eius *Caphura* genus esse. Cum autem eius opinionem cap. de *Ambaro* satis abundè confutaverimus, plura de his agere super vacaneum esse iudico.

*Caphura Avenrois.*

*Ambarum.*

Scribit *Andreas Bellunensis* in suo Dictionario secundam Arabes, *aquam Caphuratam* ex arbore *Caphuræ* stillare, eamque cum arbore calidam esse tertio ordine. De hac aqua à multis cum Medicis, tum mercatoribus sollicitatus sum, neminem tamen invenire licuit, qui eam se vidisse assereret. Quare facile adducor, ut credam *Bellunensem* cum in hac aqua describendam, tum in eius temperamento, lapsum esse.

*Aqua Caphurata.*

*Bellunensis reproch.*

Scribit *Ruellius* lib. 1. cap. 21. & hunc per omnia secutus *Marrholus* in lib. 1. Diosc. cap. 75. utraque verò ex *Serapione*, hanc *Caphuram* ceteris bonitate præstat, quæ à Rege quodam *Ribah* (qui primus dealbandæ *Caphuræ* ratione adinvenit) *Riachina* sit denominata: Ego verò, ut id credam, adduci non possum, quandoquidem *Indiæ* Reges potentiores sunt, quam ut tali manigonio operam dare opus habeant. Hactenus *Garcias*.

*Ruellius Matth. reprobandum.*

Nos verò considerandum proponimus, an *M. Copei*. *Fumei* in hist. gener. *Indiæ* occid. lib. 3. cap. 95. *Copei* in *Beroly* *Insula* arbor ferens *Caphoram*, ab arbore *Papyracea Copei* differens, vel eadem sit, cum *Caphura* arbore, quæ à *Garcia* folio *Salicis* exhibetur.

Port. Hist. Gal. I. 13. part. 8. Omnes *Insulæ* Molacenes producant *Caphoram*, gummi *Illians*, *Insulanis* dictam *Capar*. Arbor pulchra, frondosa, proveniens in montibus mari vicinis, ligno levi, ramis tenuibus: *Caphoræ* autem quatuor species: una inter ligni fibras, similis *Iguam* parvis alicuius metalli: altera extra corticem resinæ instar, Gummi modo adhærens, notata parvis maculis rubris, postea omnino albescit, melior & purior præcedenti. Tertia, nigrior, minoris pretij. Quarta, vilissima, quia fordida ligni fragmentis, quibus adhæret, magnitudine *Amygdalæ*, aut *Fabæ*.

*Gummi Capar. Lignum Caphora 4 species.*

*Linsibur*. *Campfor*, aliàs *Casur* appellatum reperitur in *Bantam* *Indiæ* Orientalis, ad quem locum ex *Baros* advehitur, in forma placentarum paucarum, coloris albi: Asportatur etiam ex *Borneo*, *Bardarmachen*, & *Laue*, magnitudine seminis *Mili*, aut ad summum ovorum formæ carum, quod ceteris bonitate præstat. *Chinenses* in dictis locis copiosè emunt, & in *Chiram* vehitur. Emitur autem ponderis quodam genere, ipsi *Cate* dicto.

*Campfor. Locus. Placenta.*

*Mily magnitudine.*

In genere [Populi] videntur esse arbores, quæ *Campforam* ferunt (ait *Cæsalp.* in *India Orientali*: *populi generis* nam & nostris bituminosus quidam liquor nascitur, quem in *Elechum* densari, *Dioscorides* testatur est: & *Plinius* de *Beula* bitumen in *Gallia* excoqui scripsit. Videtur autem *Campfora* esse generis Bituminis esse, quoniam rapacissimè ignem excipit, & ardet in aqua substantia gummi similis, candidissima & translucida: odore valido, non ingrato, facillimè evanescit in auram, nisi in loco frigido & concluso servetur. Arabes *Caphur* vocant, & recentiores *Græci Caphoram*.

*Electrum.*

*Campfora.*

*Delcrip.*

ff 2

Regensitis haecenus diversis diversorum authorum opinionibus, restat ut dicamus, quid Hist. Lug. l. sentiat. *Capbor*, inquit, seu *Casur*, recentioribus Græcis *κασουρα*, ut etiam Latinis, Gallis, *Camphre*: de hac (nostro ad stipulante iudicio) certius Garcias, quam Avicennas iudicat.

Facultates primus exposuit Serapio, scribens: *Camphora frigida est, & sicca in tertio gradu, confert calefactis, & cephalalgia calida natus obiecta, per se, aut cum aqua rosacea, aut Santalis, odore quoque furores veneros coërctet, maior vis potæ: momentum eius committit ventrem stringentibus in Cholera morbo, eorum vim auget: Camforæ usus canos accelerat. Errhinum ex duobus eius granis cum aqua La-*

*Etnece, calidam cerebri intemperiem contemperat, ac somnum conciliat, narium hæmorrhagiam sistit trita ex Omphacio: undecunque manantem sanguinem cohibet: nimius Camphoræ usus vigilas facit, potu sumpta renes refrigerat & vesicæ morbos frigidos, in frigidis potissimum paribus generat. Credidit igitur Serapio & Avicenna, Camphoram tertio abscessu & siccare, & refrigerare: quæ tamen, cum vehementer ardeat, ac etiam in aquam proiecta conflaret, & sit perquam odore odorata, & aded tenuium partium, ut sæpe per se in auram evanescat, illis reclamant Matth.*

*Quo sit, ut quis suspicari possit, aut legitimam Camphoram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumenta (ut in aliis quamplurimis) esse vitia. Circumlationibus imponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad arcendas tam vulnere, quam ulcerum inflammationes, Erysipelata extinguit, & adversus gonorrhæam, & albas vulvæ fluxiones efficax est, cum Succino, & aqua Nymphæ hæstausa. Idem præstat pubi, seu imo ventri, testibus, ténibusque illita: quæ tamen antea Psyllij seminis spissamento, aut Omphacio, aut Solani succo probè sit macerata. Sanguinem è naribus profluentem sistit, aut cum Vrticæ semine immissa, aut ex maioris Sedi & Plantaginis succo fronti circumlita. Collyriū ad calidas oculorū lippitudines utiliter imponitur. Renibus ac testibus illita Venerè extinguit, corpora à putredine præservat: proinde commodè antidotis miscetur, quæ contra venena, venenosorum animalium ictum, & pestilentes affectus conficiuntur. Novi, qui hac Antidoto à peste immunes se præstiterunt. *ss. Camph. drach. j. Zedoarie in pulv. redactæ unc. sem. sacculo lineo excepta in cantharo vini suspendunt. Omnis vini bibitur quotidie manè haustus unus calidus. Varrigiana multam tribuit Camphoræ in calidis pestiferis febribus, Eius gr. 3, aut 4, cum Syrupis quotidianis exhibens: putredinem enim arceat, hæmorrhagiam causam. Possent quoque Camphoræ grana duo ex Syrupi de Papavere unc. j. sem. Aqu. Lactæ unc. ij. somni tempore propinari. Dissolvitur Camphora guttâ vini ardentis, aut Amygdalis. Camphoræ granum unum aut alterum ex vini ardentis gutta dissolutæ; aquæ Cardui benedicti, Tormentillæ, vel Portulacæ cochlearia tria, miscentur, lumbricos puerorum bibita potenter pellunt. Tormentill. Bistortæ, ana. drach. ij. Cinamomi, Galang. Caryophyll. ana. drachm. sem. in pulverem redacta in vino veteri decoquantur: Vino colato assunde Camphoræ drach. sem. De hoc vino aliquot dies manè haustus calidus, sanguinis fluxorem qualemcumque tam mulierum, quam virorum sistit. Accutum, in quo dissolverit Camphorâ, calidum ore retentum, facit ad dentium dolores. Rhafis Camphoram æsti-**

*Cerebrum.*

*Somnus.*

*Hæmorrhagia.*

*Vigilia.*

*Arbore frigida.*

*Non f. da.*

*Suffusio de legit. ma.*

*Camphora.*

*Cutis.*

*Inflammationes.*

*Erysipelata.*

*Gonorrhæa.*

*Hamorrhæia.*

*Id.*

*Venena.*

*Pestis.*

*Dissolvenda.*

*Amo.*

*Lumbri.*

*Dolor den-*

*tium.*

nat odore frigidam & frigida temperaturæ, Sed ego Leon. Iacchius puto Veteres, de alio fuisse, vel gummi loquutos, quam nos modò habemus: quocumque enim modo examines, calidam invenies. Nihil est aquæ ignibile, unde inextinguibilem ferè ignis materiam ad bellum parant. Sed & Rondeletius in Pharmacop. in Elest. de succo Rosarum, Caphuram calidam esse & tenuium partium asserit: quæ, si pura sit, species sit Alpalathi: si spuria, sublimatio Mastiches. Caphuram præterea ex Electuario de succo Rosarum expungendam censet, quia nimis tenuium sit partium, & calefaciat potius, quam refrigeret, quod inutile sit ad bilem: ingrato enim odore suo Caphura hic non convenit, Tenuitas verò partium in medicamentis solvenibus est fugienda. Nam deducit ad cor, & per additissimas ventriculi partes purgans medicamentum, quod est ex genere venenosorum. Caphuram tandem frigidam esse docet Garcias Arom. hist. lib. 1. cap. 9. hæc scribens. Rhafes de re med. lib. 3. cap. 22. eam frigidam & humidam, Avicenna verò, quem plerique sequuntur, lib. 2. cap. 174. frigidam & siccam tertio ordine constituit. Ego autem in ea aliquando opinione cum multis recentioribus fui, Caphuram calidam esse, ob illum odorem & partium tenuitatem, quibus prædita est. Sed posteaquam experimento didici Ophthalmiis & oculorum inflammationibus, cum etiam ambustis impositam, nivis frigiditatem retulisse, illic sententiam mutavi. Adde, quod omnes, apud quos nascitur, frigidam asserant. Neque verò huic sententiæ repugnat quod odorata sit, quandoquidem ob partium tenuitatem facile evaporat & exhalat, qui in superficie est odor, contra quam in Santalo & Rosa, quæ ob suam adstrictionem odorem in se retinent. Refert Avicenna vigilas excitare Caphuram. Qui fieri autem id potest, quandoquidem ipsius testimonio frigida est, soleantque frigida somnum conciliare? Somnum quidem inducit foris, aut intus exigua quantitate usurpata. Si quis verò sæpius odoretur, & narius adhibeat, cerebrum exsiccat, & vigilas creat. Magnus eius usus est in his regionibus, cum multis in rebus, tum etiam in cibis.

Nullus equidem nobis facile persuadebit vulgarem Camphoram refrigerare, nisi per accidens, sua tenuitate: si namque iungatur frigidis, ea ad profundiora loca deducet, hæcque ratione, non quidem per se, sed frigida deducendo, refrigerabit. Miramur autem Matthiolum, credentem calidam esse Camphoram, commendare in multis morbis calidis, ut ad vulnere, & ulcerum inflammationes, erysipelata, fluxorem sanguinis, ac ad calidas oculorum lippitudines, in quibus affectibus nolumus uti, quicquid dicat Garcias.

Finem huic historię Cæsalpinus imponat, dicens: dimisso sensu rationem quaerit, qui contendunt Camphoram non esse arboris lachrymam, sed rem fossilem inter genera Bituminis, ut Naphtha, neque temperamenti frigidi & succi, refragante scilicet odoris vehemennâ, & mirâ familiaritate cum igne, sed calidi & sicci, nam etiam eius nimis usus vigilas facit, teste Serapione & Avicenna. At quid prohibet sub exhalatione tenuissima, quæ calida & sicca est, latere frigidam substantiam: quæ extincta exhalationis flammula ob tenuitatem minimè urentem agat, & penitens, quod profundius ob tenuitatem exhalationis penetraverit? vigilas autem nimio usu efficere non est absurdum, ut in fenestrate. Philosophi sanè considerationem non excludit, quomodo

*Alpalathi species.*  
*Ex El. rosato tollenda Caphura.*

*Temperamentum.*

*Garcia refrigerat.*

*An somnum conciliet.*

*In cibis.*

*Matthiolum.*

*Cæsalpinus.*



do exhalatio tenuissima, calida & sicca sub frigida lateat substantia.

## CAPURA RESINA.

## CAP. LV.

**C**ENVIS quoddam resinæ prodidit Qualebe-  
nus ad Matthiolum, quod Constantinopo-  
li à Persâ mercatore *Capura viva* est cognomina-  
tum. Venerem in primis stimulare contraria vir-  
tute ab Arabibus attributâ Caphuræ, idem mer-  
cator referebat. Odor certè, saporque, non me-  
diocrem caliditatem possidere tantum testantur.  
Hanc, Matthiolus ait, *vivam Caphuram* plurimi  
facio. Cogitabo posthac, an legitima sit Stacte,  
nam ad odore placet, ut credam non obscura  
facultatis esse medicamentum.


## STYRAX ARBOR ET LACHRYMA.

## CAP. LVI.

Descrip.

Caudex.  
Cortex. Fo-  
lium.

Flos.  
Fructus.



constantes, odoratos. Fructum magnitudi-  
ne Avellanæ æqualem, incanum, callo  
fusco, amariçante, qui in duos, tres, quatuorve  
carinas dehiscens, exhibet lignosum ossiculum  
buxei coloris, nucleum claudens aliquando uni-  
cum, quatuor lineis sulcatum, aliquando gemi-  
num, angulosum, interdum & tetrum. Medul-  
la, Cæsalpino autore, insuavis interna.

Cordus fructum ut reperitur, cum Styraçe sic  
describit: Nux Styracina globosæ figuræ fructus  
est, mediocri Avellanæ magnitudine, duplici  
cortice, nucleoque constans: exterior cortex car-  
nosâ substantiâ, & in viridi cæso colore, supre-  
mum Amygdalæ putamen refert, is in maturita-  
te tribus rimis in tres partes dehiscit: alterum li-  
gnosum, durum, flavum; aut subrossum corti-  
cem ostendens, quo continetur nucleus pinguis,  
oleosus, gustu acris, odoratis & resinosa Styra-  
cis qualitatibus respondens, sed multo actior, &  
fauces scariçans.

De Styraçe arbore, cuiusque Lachrymâ apud  
Theophrastum, quod equidem sciamus, nihil  
habetur. Est autem hæc arbor, Dioscoride & Phi-  
lippo testibus, Malo Cotoneo similis. Huic Sera-

pio fructum tribuit candidum, Avellanâ maiore,  
Pruni albi similem, duplici cortice.

Sed liceat hîc de eius resinâ ex Veterum fen-  
tentis quædam annotare, cum præsertim diver-  
sa authorum dicta, controversiam parere videan-  
tur.

Dioscor. duplicem tradit, dicens: Præstat au-  
tem, qui flavus est, & pinguis, ac resinosus, & qui  
grumos habet subalbicantes, & qui quàm diutius  
simè in odoris gratia perseverat, & dum molli-  
tut, melleam quandam humiditatem remittit. Talis  
autem est Catabalites [Marcellus dicit potius le-  
gendum Gabalitem, ut habet Plin. & Oribas.] &  
Pissidiacus & Cilicius. Vtilis est niger & friabilis,  
ac fursuri similis. Invenitur etiam lachryma gum-  
mi similis, pellacida, Myrrham odore referens.  
Sed hæc pauca gigni: ur. Adulterant ipsum admi-  
xta arboris scobe, quæ à vermiculis eroditur, &  
melle ac Irini unguenti sece, & quibusdam aliis.  
Quidam ceram, aut adipem aromatis imbutum,  
in ferventissimo Sole vna cum Styraçe molliunt,  
& per colum amplis foraminibus præditum, in  
aquam frigidam exprimunt, & vermiculos effin-  
gunt, ac vendunt, vermicularem Styraçem appel-  
lantes: Talem verò imperiti, velut lyncerum proban-  
tes, non considerantes odoris vigorem. Acris  
enim est, qui adulteratus non est.

Plinius cap. 25. lib. 12. primam tantum descri-  
bens, non discessit à Dioscoride, sic enim habet:  
Proxima Iudeæ Syria Phœnicen Styraçem gignit,  
circa Gabala & Marathinta, & Cæsium Seleuciæ  
montem. Arbor est eodem nomine, Cotoneo  
Malo similis, lachrymæ ex austero mündioris, in-  
tus similitudo harundinis, succo prægnans. In  
hanc circa Canis ortum advolant pennæ vermi-  
culi erodentes, ob id in scobe fordescit. Styraç lau-  
datur post supra dicta ex Pissidia, Sidone: Cypro;  
Cilicia: Creta minimè. Ex Amano Syriæ Mædicis;  
sed unguentatis magis. Colos in quacunque na-  
tione præfertur rufus, & pinguis lentus: dete-  
rior fursurosus, & cano situ obductus. Adultera-  
tur Cedri resinâ, vel gummi, aliâ melle, aut  
Amygdalis amaris: omniâque ea deprehendun-  
tur gustu. Pretium optimo xix. Exit & in Pam-  
philia, sed aridior, minusque succolus. Eiusdem  
verò libri capite 17. hæc habentur: Ex Syria reve-  
hant styraçem acris odore eius in focis abigentes  
suorum fastidium.

Sed veri Styraçis verum odorem notat Gal. de  
antid. lib. 1. cap. 14. quando ait: Manifestum in-  
super est, Styraçem, qui in calamis è Pamphilia  
apportatur, Andromachum præcipere. Parcissi-  
mus autem illic Styraç nascitur, tantumque ab  
hoc vulgari distat, quantum à vino, quod in ta-  
bernis venditur, Falernum. Accipere verò Sty-  
racem oportet, maximè pallidum, quem & odo-  
rem, & saporem quoque vehementissimum habere,  
perspicuum est. Serapionis verba paulò post apud  
Cæsalpium invenies. De Styraçe quoque La-  
chrymâ apud Theophrastum nil reperitur, præ-  
terquam lib. 9. capite 7. quod sit inter odora-  
ta: quæ unguentis permisceri sumptuosissimis  
soleant.

Cætèrum quid Hærmolao videatur de Styraçe,  
præsertim verò de eius qualitatibus dicendum.  
Qualitatem non unam esse Styraçis, argumen-  
to sunt cognomina, in compositione medica-  
rum frequentia Chymatias, Calamitis, Aspros, Chryma-  
h. e. [ut puto] candicans. Chymatias Arabesin-  
terpretantur eum, qui rarus inventus, & gummi  
similis describitur. Idem Calamitin: quanquam  
harundine sua mixtus ipso nomine significatur;

Describitur  
fructus  
à Cordo.  
Nux  
Magnitu-  
do.  
Cortex ex-  
terior.

Arbor quæ  
lib. Diosc. &  
Philippo.

*Styrax li-  
quida pro  
Styrace  
Stadia.*

*Bruta.*

*Locus.*

*Elmas qui?*

*Styrax ar-  
bus.*

*Styrax du-  
plex.*

*Arceut.*

*Catalaba-  
te.*

*Catalaba-  
te.*

*Calamita  
Cypri.*

*Locus.*

*Hæta sty-  
racina.*

*Succino si-  
milis succus.*

*Cord. nota-  
tur.*

*Styracis re-  
sina de-  
scriptio.*

*In oleo re-  
solvitur.*

pro liquido tamen accipiunt: & fastigia Styracis duo faciunt, siccum & liquidum, confusione magna, quod aliquando liquidum Styracem pro Myrrha Stacte sumunt, aliquando ex eadem arbore colligi utrumque putant, liquidum atque siccum. Aiant Arabes Styracem esse Syria petentes in pellibus hircinis urere, ut odorem suorum Thuris & Myrrhae satietatem acrimonia peregrini igni redimant: idem petunt in Elimæos arborem Brutam, Cupressio fusæ similem, ex albidis ramis, iucundi odoris, accensam, & miraculo, ut inquit Plinius, huiusmodi Claudij Cæsaris celebratam, cuius Parthi folia potionibus inspergant, odore Cedri, cuiusque sumum contra ligna alia remedio esse prædicent. Nasitur ultra Phasim, Tigrimque, in finibus oppidi Scinæ in monte Scanthio. Sunt autem Elimæi, Assyriæ gens, Sufiana Persiæ contermina. Petunt & in Carmanis arborem Strobilum, quam vino palmeo perfusam urunt, suffiuntque testa. Nidor à lacunaribus ad solum iocundus reciprocatur, qui citra dolorem caput aggravet, & vinum agris conciliet. Hanc autem suam miscellam unde sumperit Hermolaus, mittit.

Audivisti Cornari Hermolaum de Styrace deferentem, nunc quid tu sentias aperito. Styrax hodie Officinis, & Barbaris Storar appellatur, & in sicum, ac liquidum distinguitur, quam Græci unum tantum Styracem agnoscant: & liquidum, Myrrham Stactem esse tradant. Dioscorides probat pinguem (arceut.) Sed pleraque exemplaria Græca puræ, habent, id est, sordidum. Verum nostræ lectioni suffragatur Plinius, qui pinguitatem probat, & sursusum damnat. Et apud Aëtium (apud arceut.) habetur. Natales autem Styracis loci multi sunt. Nec multum refert, an Catalabites, an Gabalites rectius appelletur. Gileus tamen lib. de Antid. eum, qui harundibus ex Pamphilia affertur, & paucissimus gignitur, præstantissimum esse dicit, & tantò præstare multo villo Styrace, quantum præstat vinum Falernum, eo, quod in cauponis venditur. Addit ex hoc sumendum esse pallidissimum, ut qui & odore, & sapore validissimus sit. Videtur itaque & hic esse, quem Dioscorides gummi similem, & paucum nasci dicit. Et Calamita Styracis in Officinis appellatio, ex eo facta videtur, quod in calamis & harundinibus, velut Galen. dicit, afferebatur. Quamquam & ex eo esse possit, quod Plinius arboris Styracis intus similitudinem esse dicit. Quod si ita est, & non harundinibus, in quibus afferebatur, deceptus est: consideratione eget, id, quod Stæbo lib. 12. de Selgia Pisdia urbe dicit, plurimum isthic Styracem nasci, arborum non magnam, rectam, ex qua hacta Styracina, corneis similes fiant. Idem etiam liquoris meminit, qui ex ea defillat, ac facili coaguletur, Succino similis. Quod porro de fuligine dixi, uritur, & ex ipso fuligo fit, in Græcis corrupta voce dactylus legitur, præterea.

Quod autem Cordus vult, Styracem lachrymam, quæ quidem ex Styrace manat, resinosa esse substantiam, minimè in aqua resolui. Eam verò, quæ è Myrrha arbore distillaverit Lachrymam, facili in quovis aquoso humore dissolvi; De Myrrha gummi adulterata, non autem de pura, Cordo conceditur. Dicit enim hoc non solum in comm. in Diosc. verum & hist. pl. lib. 4. ubi hæc habet: Styrax nascens in minore Asia arboris cuiusdam lachryma est, in parvas micæ, aut grumos concreta, substantia r. l. inosa, pinguis, in longum, ubi incaluit ductilis, in oleo resolvable

admodum, cum gravitate non pauca, odorata, veluti propolis, præsertim cum prunis imponitur, cuius tres cognoscuntur species, colore tantum differentes, prima candidat, altera ruffa est, tertia nigricat, simulque livet, ruffa fortis plus rubet, quam intus: candida, ac nigra per totam substantiam eundem colorem habet, reperitur etiam flava quædam, inter ruffam & candidam, media. Meminit præterea Diosc. candidæ, pellucidæque Styracis, gummi similitudinem habentis, quam mihi videre nondum licuit, quamvis diligentissimè eam inquisiverim: prædictarum enim nulla pellucet, neque ulla ex his copiosè & sola affertur, sed omnes commixtæ, atque arboris hæc scribe quamplurimè adulterate, adeo etiam, ut, ex integra eius livet, vix uncia sinceræ eligi queat, sic allatam hodie, omnes Storacem Calamitam vocant. Eligito puram, in longum ductilem, pinguem, odoratissimam, atque cum suavitate caput aggravantem, & somnum invitantem. Adulteratam, fursurosam, aridam, cano situ oblitam, & scribe plenam multis medicamentis admisceas, præterquam iis, quæ odoris causa conficiuntur: præstaret tamen iis quovis potius sinceram miscere, quam adulteratam, liquidem puriorem, vehementiorémque vaporem sinceram emittit: adulterata autem imbecilliorum. Fit in quibusdam confectioibus rubra Storacis mentio, ubi ruffa lachryma Styracis accipienda est, & minimè cortex ille fuscus & aridus, falsæ Storar rubra vocatus. Addit præterea Diosc. lib. 1. cap. 81. Styracis & Myrrhae arbores penitus sunt diversæ, quod etiam ad natales attinet, nihil prorsus commune habent: hæc enim in India & Arabia, illa verò in Asia minoris Pisdia, & Cilicia, diversi cæli regionibus, provenit. Si verò substantiam ipsam, quæ ex his emanant lachrymarum, consideraverimus, omnino diversas deprehendemus. Lachryma enim, quæ ex Styrace manat, præter omnes alias, quas iam taceo, notas, resinosa est substantia: cuius præputium est, in sibi simili humore aliquo resolvi, & minimè in aqua. Quæ verò è Myrrha arbore distillaverit lachryma, facili etiam propter substantiæ similitudinem in quovis aquoso humore dissolvitur. Hæc idem dico, ut sciamus liquidum Styracem, nihil minus esse, quam Stactem, quod pluribus etiam demonstrare argumentis possemus, si huius loci esset falsas Dioscororum opiniones & iudicia consultare. Styracis autem hodie triplex habetur differentia. Est Styrax calamita, quæ in candicantes, & rufescentes grumos concrevit. Est & Liquida Styrax, quæ in duas dividitur differentias: altera enim resinosa est pinguedo, ex arbore quadam spontè distillans, aut coctura elicit: & altera, quæ ex Styracis nucleis exprimitur, sed huius rarissimus apud nos est usus. Tertia differentia, Styrax sicca est, à quibusdam etiam Thymia vocata: estque cortex in ruffo colore nigricans, quem aiant è Styracis arbore colligi. Quidam impropiè siccam Styracem, etiam Rubeam cognominant. Rubea enim Styrax, est Calamita Styrax, quæ non candidum, sed suffum colorem habet. Hodie autem Pharmacopola non amplius Styrax, sed Storar pronunciant.

Gefnerus in Cordum ait, Nascaphthum corticem impropiè Storarum rubrum vocari: eam Styrax ruber, non cortex, sed huius coloris liquor sit.

Euchf. de comp. med. lib. 1. A Galeno lib. 1. de antid. Calamitis, quod olim in calamis & harundinibus ex Pamphilia adheeretur, dictus est, & reliquis

*Styrax  
resinosa.*

*Styrax pol-  
lucens Cor-  
do non dis-  
tinguitur.*

*Adulterata.*

*Storax cal-  
lamita.*

*Delectus.*

*Adulterata.*

*Storax rub-  
ra falsis.*

*Styrax cy-  
perus.*

*Myrrha  
arbores dis-  
versis, sicut  
et natales.*

*Styrax.*

*Non conce-  
ditur de  
adulterata  
Styrace.*

*Styrax non  
est Styrax  
liquida.*

*Styrax ca-  
lamita.*

*Styrax li-  
quida du-  
plex.*

*Styrax ex  
nucleis.*

*Tertia diff-  
ferentia.*

*Styrax sic-  
ca.*

*Thymia  
ma.*

*Styrax Ru-  
bea.*

*Nascaph-  
thum.*

*Styrax ru-  
beus quid-  
am Calamita.*

*Styrax.*



reliquis præstantior fuit. Atque hinc est, quod in hodiernum vique diem vsitatum sit Medicis, vt Syraci semper *Calamita* nomen adiungant, præstantiorem significare volentes. Hic teverali liquidus fuit, & dicebatur, quanquam diversus ab eo, qui ita Arabibus nominatur. Hodie afferri desit. Hic candicans & rufescentis grumos, seu micas concrevit, & siccus dicitur, hodieque adfertur. Huic *Calamita* Syraci interdum liquida resina & oleum additur, & fit Syrax, qualis officinarum liquidus, de quo postea. Quoties autem in Græcorum libris Syracis fit mentio, semper *Calamites* inauditus erit.

Sed vnde clarissimus meus præceptor Fuchsius colligit, *Calamitem* Syracem liquidum fuisse, nescio: Galeno *Calamites* præstantissimus est: præstantis autem grumos habet teste Diosco. *Calamitis* ex Pamphilia affuit, qui verò in Pamphilia provenit, teste Plinio, aridus: ego sanè Syracis lachrymas à scobe mundas, pulcherrimas vidi Lugduni, & adhuc habeo odoratissimas, de quibus postea sub titulo Storacis *Calamita* officinarum. Merito igitur reprehensus fuit hac in parte Fuchsi, per Matthiolum. Idem Fuchsio ex Arabum, & recentiorum traditione, tres sunt Syracæ: unus liquidus, qui est Myrrha Staete; alter rubeus, qui nihil aliud est, quam exterior cortex, fuscus & aridus, qui post lachrymam subactam & expressam remanet, quod Serapion confirmat: Tertius est *Lachryma Syracis*, quæ ex eius nominis arbore exsudat.

Cronenburgus quoque probatur, quod paulò ante Fuchsius annotavit, quod sc. quotiescunque simpliciter effertur Syrax, *Calamites*, sive aridum intelligatur. Anistoteles, inquit is, Dioscorides, Plinius, Galenus, & ceteri distinctim Syracem habent, non per liquidum & siccum, sed per proprias quasdam qualitates. In tabernis Storax vocatur, & vehementer ignavus, vt plurimum habetur. In Alienta Moschata hæc Syracis *Calamita* & rubeæ nomine intelligitur, rubicundiore colore, aut fax illius, aut quod ex Myrrha exprimitur, Magna.

Scuibunt Monachi in Antid. Med. cens. dist. 2. c. 1. *Storacem*, sive Syracem (quod rectius vt diximus) non esse aliud, quam speciem Myrrhæ: siquidem Dioscorides post descriptionem specierum Myrrhæ immediatè subjunxit capitulum de Syrace: Serapio autem capitulo de Storace, ad authoritatem Diosco. descripto, sub nomine Storacis liquidæ comprehendit caput Dioscoridis de Staete, quæ est pinguitudo Myrrhæ: cui continuo subiunxit capitulum dicti Dioscoridis de Syrace, vbi dicit: Et Storax est species Meba, sive Miha. Meba, autem, sive Meba secundum ipsum, est Storax liquidæ. Et quæ ex Myrrha exprimitur, debet hic intelligi scil. Staete, quæ etiam Myrrha liquida potest dici, nam aliter non erit consonum. Myrrha verò non liquida ab ipso Serapione vocatur, Ler & Bathnais. Vnde idem Serapio cap. de Myrrha, secundum authoritatem Diosco. dicit: Et est de ipsa res, quæ dicitur Bathnais, & est grossa, à qua egreditur Miha, id est, Storax liquidæ, quando exprimitur, & dicitur MirraStaete. Et est de ea, quæ dicitur Aizon, & est pinguis multum: & arbor est in terra, quæ dicitur Parthemia, & est pinguis, & quando exprimitur succus, egreditur velut Storax multum. Hæc Serapio. Ex quibus patet, quod Syrax, i.e. Storax, non multum elongatur à Myrrha, & per consequens potest dici species Myrrhæ. Etiam Diosco. cap. de Syrace dicit, quod in-

venitur Syrax, sive Syracis lachryma perlucida, & Myrrha æmula. Etiam per ipsos Autores probatur, quod tam de speciebus Myrrhæ, quam de Syrace liquor exprimitur, velut mel. Sed liquor Myrrhæ à Græcis Staete dicitur. Liquoris autem Syracis à Diosco. non scribitur particulare nomen, bene autem potest subintelligi mel Syracis. Arabes verò, teste ipso Serapione vtrumque liquorem Storacem liquidam appellant. Syrax autem liquidæ est Myrrha, i.e. Staete, parum, aut nihil differt à Myrrha in odore, sapore, & virtute. Et sicut Myrrha est odoratio, amarior & præstantior Syrace, ita Staete, i.e. est mel Myrrhæ, est odoratio, amarior, nec non & nobilior Syracis melle. Quamobrem Storax liquidæ, quam aliqui Sigiam vocant, quæ & pro vera Storace liquida videntur omnes, non potest esse Myrrha [Staete] vt voluit Bravvolus, & recentiorum nonnulli. Non enim habet conditiones Staetes. Nos enim opinati sumus potius esse mel Syracis, adulteratum tamen, quam Staete Myrrhæ. Syrax autem, sive Storax non liquida, vt communis opinio Medicorum tenet, est ipsa, quæ vrimur, quæ vulgò dicitur Storax Calamita, & per varios autores legitur Syrax, Storax sicca & Ambra, seu Lubnes, aut Lubne, seu Storax Heremitarum, & Thue, sive incensum, sive Thymiam Iudeorum, & Cuminum, & Storax, & aliis pluribus nominibus appellatur. Quamvis sit & alia Storacis species, quæ peculiari nomine Storax rubea nuncupatur, vt in confectioe Alienta Moschata Nicolai legitur, vbi ingreditur & Storax Calamita, & Storax rubea. Et propriè est illa, quæ assimilatur Maci, quæ scribitur à Serapione, quod est exterior cortex fructus ipsius Storacis. Doctor autem noster in præsentì descriptione petit Storacem liquidam, vt Rhazes: filius Serap. autem habet simpliciter Staeten. Sed quia (vt dictum est supra) Arabes tam Staeten, quam mel Storacis, Storacem liquidam vocant, Staeten tanquam meliorem speciem Storacis liquidæ nos hic apponendam esse consilimus. Vbi autem quæritur mel Storacis, manifestè intelligitur, Staeten non esse apponendam. Sed quia Staete vera minime hac nostra tempestate haberi potest, vel si habetur (quod haud credimus) non caret plurimis adulterationum vitis, eius loco vtendum melle Syracis puro censemus. Si autem prout mel Syracis non invenitur, Storax sicca pro eo erit commodissima: quoniam ita (vt diximus) habet filius Serapionis, per Storacem absolute descriptam, semper intelligitur sicca. Præterea autor non hac descriptione etiam Myrrham petit, quæ vera nos carere supra diximus in Sagzeneæ, & quod pro ea debemus sumere Staeten. Hic autem (quæ Staete non habetur) dicimus, quod loco Myrrhæ post Staeten, melitis est substitueret bonam Storacem Calamitam, quam illam falsò vocatam Myrrham. Et secundum aliquos Gummi Hedera optimum, in Myrrhæ vicem apponere non vituperamus, tamen Myrrham perfectè supplere nequeat, neque cum eo comparari.

Tradit Matthiol. Syracem passim in Italia Storacem Calamitam appellari. Ac Manardum ait, ubi in Dioscoridis codice legitur *ῥακὴ* & *ῥακὴ* *ῥακὴ*, existimasse potius legendum esse *Calamites*. Neque probasse lectionem mutandam in Gabaliten, quemadmodum Marcellus fecerit. Sed profectò magis Marcelli sententiam probandum videri. Quippe quæ Plinii testimonio comprobetur. Cum etiam ei ad stipuletur Oribasii

Staete li.  
quor Myr-  
rha.  
Syracis li-  
quor mel  
lici potest.  
Storax li-  
guida.  
Syrax li-  
guida.  
Syrax li-  
guida è  
Myrrha.  
Storax li-  
guida vulg.  
Scipia.  
Non est  
Staete, Ge-  
Suli Bras-  
sa Solan.  
Mel Syra-  
cis adulte-  
ratum  
Syrax co-  
muni Ca-  
lamita.  
Ambra.  
Thue. Thy-  
miam.  
Syrax ru-  
bea  
Storax ru-  
bea pecu-  
liari nomi-  
ne.

In Mesue  
pro Storac-  
ce liquida  
suscenda  
Staete.

Mel Sto-  
racis.

Staete vera  
non habetur.

Substitu-  
tum.  
Syrax sic-  
ca.

Gummi  
Hedera.

Manardi  
not.

Ex manu-scriptis. Iuchium porro Styrcem Calamitem liquidum fuisse censuisse. Verum in hoc à veritate discessisse.

Lacuna sunt hæc: *Syrax*, Castil. & Portug. *Esforaque*, Catalon. *Storace*. Ex hac Balsamum ex nova Hispania.

Ex Amato hæc traduntur: *Gabalites* (ut optime Marcell. interpretatur) legendum, non vero *Carabites*, vel *Calamites*. In hanc quoque lectionem eunt Hermob. & Ruell. Notis temporibus sincerus ex Zana, apud Indos insula, *Syrax* portatur.

1. Serapio, inquit Cæsalpinus, *Syracem* dividit in liquidum, & siccum: per liquidum intelligit, modò oleum ex nucleis extractum, modò ipsam arboris lachrymam, modò stillatum humorem è recenti Myrrha extractum, quem Dioscor. *Storace* vocat: per siccum, intelligit corticem fructus, postquam expressum est oleum.

Avicenna similiter humidum & siccum esse. Humidum: autem nunc spontè fluentem ex arbore, coloris citrini, quem *Storacem* Calamitam vocant. Alterum per decoctionem, coloris nigri, quem *Storacem* liquidum appellant: Facies autem *Storacem* siccum esse. Quæ Avicennæ explicatio videtur magis cum Dioscor. consentire, ut quædam sit arboris lachryma, spontè fluens, quæ cum in ligno locò reperitur, veluti leprosa redditur: congeri enim circa caudicem multam scobem erodentibus vermiculis testatur Strabo. Quidam artificio extrahitur per decoctionem, ex *Syracis* lignis, aut ipsam scobem per ignem refudat *Syrax* liquidus, quem Dioscor. Oleum *Syracinum* vocat, ipsa verò scobs exsiccata & retorrida, *Syrax* siccus est. Nigrum Dioscor. damnat.

Hodie tria eadè habentur: nam arboris lachryma, non sine scobe quadam, *Syrax* cognomine Calamita, tanquam optima ad suffumigia præfusa venit. Arida quoque ipsa scobs modò ruffa, quæ laudatur, modò nigra, quæ damnatur, similiter ad suffummenta odorata. *Syracinum* verò oleum vendebatur Balsami loco ex Syria advectum: sed desit posteaquam novum genus Balsami ferri cepit ex Occidente: liquor autem ille putridus, quo ad scabiem inungendam utuntur, vilissimo etiam pretio, quamvis *Storax* liquidus vulgò appetitur, aliena omniò res est. Fortè *Ælcomeli* Dioscoridis, quod è pinguitudine furculorum fieri scribit, cuiusdam arboris in Syria: ex qua spontè manat pleum melle crassius: sapore dulci: ad purgationes aptum, addens arte quoque fieri oleum è pinguedine furculorum, optimum vetus, pingue, non turbidum. Testantur autem: vulgarem *Storacem* liquidam, ex decoctione quorundam furculorum in aqua fieri.

*Syrax* siccus. *Syrax* Calamita. *Syrax* arida. *Syracinum* oleum Dioscor. per Balsamum venditum. Balsamum novum.

*Storax* liquidus. *Ælcomeli* Dioscor. *Storax* siccus. *Storax* Calamita. *Storax* arida. *Syracinum* oleum Dioscor. per Balsamum venditum. Balsamum novum.

*Storax* siccus. *Storax* Calamita. *Storax* arida. *Syracinum* oleum Dioscor. per Balsamum venditum. Balsamum novum.

Cur *Syrax* 429. his verbis: Quodd ex *Syrace* emanaret liquor, ac veluti stirciam exillaret, *Syrax* dicta videtur. Eius feracissimus ille tractus Galloprovincia, qui à trium Mariæ sororum Fano antiquissimo, ad forum Iulium usque porrigitur: est namque prope oppidum Solarium collis latissimus & opertus frequenti *Syrace*, nullidum illic cognita, quam primò nos, iuvenitque, multum Pharmacopœis & studiosis, tum Monspensuli professoribus ostendimus: nam iamdiu videramus Venetiis in Franciscanorum orto: truncus ipse ipse similis Betula ligno, aut Mali Cotoneæ: folia utraque minora, & quàm Cotoneæ minùs rigida, minùsque aversà parte cana: flos albidus, Arantiz magnitudine, non odore. Baccæ multæ Staphylodendri magnitudine, rotundior-

restamen, quas excipiunt angule ternæ atque amplectuntur, quæ pediculo longo hærent. Inibi tamet si tanta copia est, nihil tamen liquoris effluit, sed Lachryma *Syracis* Venetiis defertur purissima, perquam odorata, inque grana & glebas ammoniaci modo coactas, quibus inest quidam melligenis similis liquor, qualis è favis defluit. Hæcenus Adv.

Nunc verò *Syrax* *Catabalites*, vel *Gabalites*, sicut & *Syrax* similis *Gummi*, Myrrham odore referens Dioscoridi synonyma sunt. *Storacem* insuper liquidum dici de Myrrha *Stacte*, videndum antè ex Corn. & Cæsalpino.

Adulteratur verò *Syrax* arboris scobe, melle, Irino unguento, cerâ, adipè, aromatibus, Plinio Cedri resina, vel gummi, aut Amygdalis amaris, quæ omnia deprehenduntur gustu.

Pro *Syrace* quoque rubeâ, ruffa *Syracis* lachryma sumenda, non cortex fuscus, falsò *Storax* rubeus vocatus. Quomodo porro *Syrax* fiat ex Belzuino, vide in Belzuini capite, ex Edoardi Barbossæ navigatione: & apud Garciam lib. 1. c. 5. de *Syrace* liquida Sinensibus *Rocamartha*, quæ scripsimus capite Benivino.

*Syrax* ut Græcè, ita etiam Latine *Syrax*: *Storax* tamen Calamita officinis: Germ. *Storax*: Hisp. *Esforaque*, *Storace*: It. *Storace*, *Storace*: Arab. *Miba*, *Meba*, *Mehaba*, seu *Astarch*.

*Syracis* arbor viret Venetiis pluribus in locis auctore Marthiolo, præsertim in viridario Maffei à Maffeo. Bellon. in suis Obs. scribit in Creta montibus spontè provenire *Syraces* arbores, ipsam autem *Syracem*, videlicet resinam, nobis adferri per Halep. Anguillarâ teste; licet *Syrax* inveniatur quibuldam in locis Italiæ, non propterea lachrymam producit, ut faciunt *Syraces* *Syræ*, & *Palestina*: quod autè dicit, videri potest in horto P. A. Michielis & A. Filetti in S. Luca. Et in horto Monachorum S. Francisci dalla vigna. Inveniuntur etiam in itinere à Tivoli, Romanitem in Abruzzo. Attestatè apud Mathiæ. Camerario, in Apuleia provenit, & in Latio in villa Adriani, & Gallia Provincia. Sed Amati temporibus *Syrax* sincerus, ex Zana apud Indos insula portabatur. Regio est (scriptore Andrea Corfalo Florentino) inter Goam & Carmaniam, Cambadia dicta, ubi fluvius Indus influit in mare, in qua regione nascitur *Syrax* liquida: In agro Romano prope Tivolum Cæsalpin. provenit in Italia lachrymam paucam fert.

Nobis *Syracis* officinâ missa Augustâ Vindelicorum per meorum studiorum & peregrinationum socium, clarissimum virum Leonhardum Rauvvolf: plantavimus Montbelgard in horto E. C. Arbusculas, è nucleis natas, vidimus Basileæ apud D. Doctorem Felicem Platerum, sed Hieme reponebant, florent & nucas mutant: Ea arbor, quæ à Gesnero visa Augustæ & quæ ibi Hiemem perferbat, ut scribit in lib. hort. non erat *Syrax*, sed *Coccygia*, sive *Cotinosa*. *Syracis* arboris ramos primùm habui à Lobelio, qui ex Hiere attulerat, habui etiam à Valerando Dourez.

Cæterum vim habet, testis est Dioscoridis, calesaciendi, molliendi, concoquendi. Facit ad tussis, destillationes, gravedines, rauces, & vocem interreptam. Convenit etiam ad uteri præclusiones, & durities. Et menses potius & ap-positus ducit. Alvum quoque leniter molliat, si modicum ex ipso cum resina Terebinthina devoretur. Misceatur etiam utiliter malagmatis discutientibus, & acopis. Vitur autem & allatur, & torretur, & fuligo ex ipso fit, velut ex Thure. Et commodat

Descriptio ipse ipse similis Betula ligno, aut Mali Cotoneæ: folia utraque minora, & quàm Cotoneæ minùs rigida, minùsque aversà parte cana: flos albidus, Arantiz magnitudine, non odore. Baccæ multæ Staphylodendri magnitudine, rotundior-

Acquiva

Adulteri.

Substitu.

Syrax ex Belzuino.

Nomina

linguaru.

Locus.

Vires.

Tussis.

Pierm.

Alvus.

Fuligo.



commodat fuligo Syracis ad eadem, ad quæ etiam Thuris fuligo. Quod verò ex ipso præparatur in Syria Syracinum unguentum calefacit, & mollit fortiter. Capitis tamen dolores inducit, & gravitatem ac soporem efficit. Galenus & Paulus præteriam dicta à Dioscoride, nulla tradunt. Authore Plinio, ex Syria revehunt Syracem, acri odore eius in focis abigentes suorum fastidium. Cæterò, non alia ligni genera sunt in usu, quàm odorata: Cibòsque Sabæi coquunt Thuris ligno, alij Myrrhæ, oppidorum, vicorùmque non alia, quàm ex aris fumo, atque nidore, adeò nulla est voluptas, quæ non assidue sui fastidium pariat. Eundem ad serpentes fugandas urunt in odoriferis silvis fetentissimas. Syracis autem naturam in peregrinis arboribus exposuimus. Placet præter illa, quæ diximus, maximè pinguis, purus, albicantibus fragrantis. Medetur iussu, faucibus, pectoris vitis, vulvæ pignus, dantiæve laboranti. Ciet menses potu, appositivè, alvum mollit. Invenio potu medico tristitiam animi resolvi, largiorè contrahi. Sonitus aurium emendat infusus, iturus illius, nervorùmque nodos. Adversatur venenis, quæ frigore nocent, idèd & Cicuta. Serapio exteriorem Syracis arboris corticem mandi, quamvis amarum: ex interno autem nucleo oleum exprimi perhibet. Sylv. de comp. mod. Syracis drach. j. miscet ex Andromacho arboriæ. Syrax, Crocus, Myrrha, quantitate sunt deleteria: nam largius pota quedam, demerant: quedam morem inferunt, sed mensurà aptè aliamissalutant. *Syrax? Smilax*, Hispanum cognominatum A.uario in Trochisco Neapolite. Oleum Syracis, quod optimè sedat dolorem ventris puerorum, recipit Ol. Aneth. Camom. ll. ana. vnc. ij. Ol. Rut. Syrac. liquid. ana. vnc. sem. pulv. Cymin. vnc. j. quæ parum bullire sinantur, servanturque ad usum.

#### STYRAX CALAMITA OFFICINARVM IMPRIOR ET purior.

STYRACIS fursurose plerumque adferuntur Smalle, & scobe ligni fordidate, in his tamen genuinus Syrax reperitur, qualem habemus, parvis confans grumis, relucetibus, colore fulvo, vel ruffo, saturatioreque, sub dente lentescens, coloreque ductilibus, cæra instat, sapore non ingrato, odore fragranti, potissimum ubi prunis iniectæ fuerint, vel micæ sole, vel ut sunt scobe adulterate, flammam verò cæra facillimè concipiunt, & claro incendio lucent.

Lugduni & Genevæ habuimus pro paranda Theriaca Valerandi Dourez, cuius protector publice suisque sanè munde, pulcherrime, odoratissimæ etiam post plurimos annos.

#### STYRAX LIQVIDVS RVBER OFFICINARVM.

STYRAX liquidus melleæ & tenacis substantiæ est, coloris fusci, aut ex fusco rubentis, aut ex cinereo fusci, odore valido, atque ob vehementiam ferè ingrato, in quo tamen videtur apparete, remissus ille Syracis calamitæ odor, multò tamen magis, si lingue admoveatur conspicuus, dum in naves inde pauca quantitate anathymias ascendit, sapore autem acrisulso.

Cordus Hist. pl. sic describit: Syrax liquidus,

qui ad nos pervenit, liquidæ aut Laticeæ resine consentientiam & crassitudinem habet: colorem in cinereo candicantem: odorem Syraci similem, vehementem, acrem, & gravem, præsertim cum prunis imponitur, per se latius spirat, quàm prædictus Syrax, propter liquidiorè substantiam. Idem natus non est, sed fit additis pauca Calamitæ Storaci, copiosiore, laricea resina, oleo, & vino, simulque coctis, expressis, atque cum resifixerit, donec candorem acquirat, ligneo pistillo agitur: Ex ea mixtura duo resulant, videlicet Syrax liquidus, & oleum Syracinum: dimissis enim uno atque altero mense, quod deinde tenuissimum, liquidissimum, atque odoratissimum in mictorum illorum medicaminum substantia fuerit, à crassiore discedit, eidemque ad fundum vasis descendenti, superius innatant oleo crassior, laricæ resine liquidior, colore fulva & pellucida, Syracinum oleum appellata, quæ à reliquo aufertur, & separatim versatur, reliquum verò rursus agitur, ut cando em induat. Eligito in liquido Syrace odoratissimum, odore ad purum Syracem prorsus accedentem, sed multò vehementius & gravius redolentem, colore candicantem in cinereo, Oleum Syracinum ad nos rarissimè affertur, in quo probatur fulvum, pellucidum, odoratissimum, & suavis, quàm liquidum Syrax redolens, & quod lentum, sequatissimumque fuerit, dum ab inuncto digito defluens dependet.

Petrus Bellon. (inquit Gelsæus) scripsit mihi se à Lusitano quodam Pharmacopola didicisse Syracem liquidam à verâ Syrace omnino discrepare, esseque resinam è peculiari quadam arbore manantem in monte F. à inter Galliam & Hispaniam. Hac itaque ratione dux sunt liquidæ Syracis species.

Aut Fuch. de comp. med. lib. i. Syracem liquidum, qui in Officinis prostat, quum teterimo propemodum sit odore, legitimum, aut sincerum esse nequire: ut & Syrace Calamitæ interdum liquidam resinam & oleum addi, ut liquidior factas magis redoleat, & viliori pretio vendatur: qualis est, qui in Officinis Medicorum sub Syracis liquidi nomine hodie prostat.

An Amato, Staetæ Serapionis, Officinis Syrax liquidus, cuius copia non solum Venetiis, sed & in omnibus ferè officinis coacervatur?

Hodie porrò Staetæ Officinæ & Barbari Medici Syracem liquidum vocant, teste Cornario, quò Graeci unum saltem Syracem agnoscant: Staetæ autem pro Balsami liquore in *arabum* assument.

Sed licet species quedam, quæ adhuc in officinis invenitur, Syracis, quem liquidum vocant, nihil aliud sit, inquit Clusius, iuxta doctiorum opiniohem, quàm Staetæ expressa antiquorum. Nilominus tamen retinet aliquem odorem Syracis Calamitæ, sed potentior est, & odoris vehementioris, quod efficit, ut existimem, esse posse resinam liquidiorè Syracis, cum aqua sit permixta Myrrha, sæpè enim evenit in eadem arbore una liquidior altera.

Monachis in Mes. ut existimo, Storax liquida, quam aliqui Sigiam, quæ non est Mel Myrrhæ, id est, Staetæ, ut voluit Brassavolus & recentiorum nonnulli: cætera videant Lectores antè ex verbis Monachorum, quæ sub Syrace iam tradita sunt.

Garcias Arom. lib. i. cap. 5. sæpius existimavit illud Boniçi de Boninas nihil aliud esse, quàm Beni-vi cum Syrace liquida, quam Chineses Rocamal-ha vocent permixtum, quoniam eius odor ali-

Color. Odor.

Vnde fiat.

Oleum Syracinum.

Delectus Syracis liquidus.

Delectus Syracis.

Syrax liquidus, Resina discreta à Syrace. Locus.

Syrax liquidus quid?

Staetæ.

Syrax liquidus. Non est Staetæ Syracis. Brasavolus.

Beniçi de Boninas.

Vng. Syracinum.

Locus. Quæ acris.

Serpentes.

Delectus.

Vires.

Menses.

Syrax.

Venena.

Oleum.

Quantitate.

deter.

Oleum.

Syrax liquidus.

quantum ad Benivi de Boninas accederet: eamque ob causam id aliquando experiri voluit, mixto Benivi cum Styrace liquida. Sed licet id Benivi sic permixtum vulgari odoratus esset, odoris tamen fragrantia & suavitate à Benivi de Boninas superabatur. Multis quoque malè olent Styrax liquida & Algalia propter validum odorem, cum tamen maxima ex parte odorata sint. Fieri autem potest ut illi Macedones Styracem pro Benivi intellexerint, tamen nullibi Styracem nasci scimus, præterquam in Æthiopia, ubi etiam Myrha reperitur.

Cæterum liquor ille Cæsalpini putridus, quo ad scabiem inungendam utuntur, vilissimo etiam pretio, quamvis Storax liquidus vulgò appellatur, aliena omnino res est. Fortè Ælcomeli Dioscor. De Styracino autem oleo, quod solebat vendi pro Balsamo, & desit adferri, vide antè ex Cæsalpino.

VSVB ARBOR GVMMI  
FERENS.

CAP. LVII.

Scriptit Thevetus de Francia Antartica c. 32. Homines sylvestres Americanos, quum invitentur ad computationes *Cahemage*, priusquam ex suis pagis discedant, detrahare corticem cuiusdam arboris, cuius interior pars sit rubra, lutea, aut alterius coloris, quem conscindant in minutas partes, & gummi postea extrahere ex arbore, quam vocant *Vsub*, ac totum corpus eo inungere: quod ad vulnera etiam utile, ut sibi experientia compertum.

Clusius dubitat an *Vsub* Theyeti idem sit, cum suo *Vsub*, de quo proximè.

Considerandum quæ de *Bixa Oviedi* annotavimus ex Clusio historia nostræ lib. 12. & lib. 3. post Sanguinem draconis, de Succo rubro colore inficiente.

VSYC ET GYP SVCCVS ATER  
INVOLVTVS MYSE FOLIIS,  
Anethi ferè odoris.

CAP. LVIII.

ANNO 1599. mittebat ad me (Inquit Clus. Exot.) Amstelrodamo honestissimus vir VValichius Syvertz succum, cui adscripta erant nomina *Vsub* & Gyp. Musæ foliis involutum, atrum, splendens, non iniucundi tamen odoris, sed qui ad Anethinum quodammodo accederet. Hoc uti solere incolas assererebat, ad suffumigia, tetrumque cadaverum foetorem tollendum, toto illo tempore, quo cadavera domi retinere pro consuetudine solent. Isto etiam inducunt arborum cortices ventri applicandos in etus doloribus.

ALOES SIMILIS SVCCVS IRAI-  
TVCH ET AIAVVE INVOLVTVS MYSE  
foliis, gravis odoris ad picandum.

CAP. LIX.

EODEM anno idem Syvertz mittebat alium succum, Iraituch & Aiauve appellatum, non

valdè dissimilem Aloës succo, tum colore, tum substantiâ, gravis odoris, qui recens & liquidior, Musæ tenerioribus foliis fuerat exceptus: nam iis adhuc involutum accipiebat Clusius. Illo naviculas & scaphas induci ab inquilinis, referebat, quemadmodum à nostris pice fieri solet. An verò ex aliqua arbore fluat, aut bituminis instar è terra emanet, nihil erat adscriptum.

SVCCVS VEL RESINA ASPHAL-  
TO SIMILIS, ANETHI  
ferè odore.

CAP. LX.

AMSTELREDAMI anno 1600. honestus vir Petrus Garetus dabat Clusio aliquot succos concretos nuper delatos ex longinqua navigatione, quorum primus ater proflus erat haud secus ac Asphaltum, durus & solidus, illoque [ut apparebat] usi ferant nautæ ad fili stamina, picis, aut cera, vice, inducenda: manibus enim aliquantisper emollitus lentior fiebat, nec incunctum spirabat odorem, anethinum enim quidpià respiciebat, nec ingratum habebat saporem, illum tamen acutiusculum, flammæ verò admotus, non secus ac resina quædam liquecebat. Observabat porro hunc succum, sive quis malit refinam appellare, dentibus cedere & mollescere, ore retentum.

SVCCVS ALTER, ACRIS SVB-  
STANTIA SOLIDIORE.

PRIORI non valdè dissimilis erat hic succus, substantiâ tamen solidiore constabat, ut quæ in micis potius dissiliret, quam manibus emolliri posset, imò ne longo quidem tempore in ore retentus ullam unguis impressionem admittere volebat: nullum in eo gratum odorem Clusius observare poterat, sed quandam duntaxat acrimoniam. Exot. lib. 4. c. 8.

SVCQVS TERTIVS ATER,  
ALBIS MICIS.

TERTIVS etiam erat ater, quasdam tamen albas micas inspersas habebat: licet autem superiore impurius & magis retorridus videretur, unguis tamen impressionem admittiebat, nec ingrati erat odoris, illius etiam sapor nonnullâ acrimoniam præditus: manducatus, dentibus cedebat: igni etiam admotus, liquecebat & flammam concipiebat. Clus. lib. & c. modò citatus.

TACAMAHACA POPULO SIMILIS  
FRVCTV, COLORE  
similis Præonia.

CAP. LX.

AD resiniferas merito referenda est Tacamahaca dicta, coloris rutili partim, partim flavi pallidioris, veluti ex unguibus diversis compacta, resinæ strobilinae concrezione, bullatis tamen scrobiculis alicubi cava: sub dente in pulverem dissiliret.

Styrax li-  
quida Ga-  
lialia odor  
alio fieret.

Locus.

Cahemage  
Ex.

Curtis.

Vsub.

An Vsub?

Descript.

Vius.

Iraituch.  
Aiauve.  
Descript.

Vius.

Vius.

Odor.

Sapor.

Descript.  
Substantia  
Similis.

Acrimonia.

Descript.  
Sapor.

Descript.  
Color.



*Sapor.* dissilit primum, mox rursus recolligitur, lente-  
*Odor.* scensque pro arbitrio ducitur: sapore amarican-  
 te, haud ingrato & aromatico. Suffita iucundum  
 spirat odorem, Mastiches ferè æmulum, minus  
 vehementem & suaviorem, nulloque relicto  
 crassamento confemitur. Porro importatur, ut  
 mihi quidem nancisci contigit, Cucurbitino cor-  
 tice comprehensa, punctulis nigricantibus ex-  
 terna parte notato, intrinsecus innumeris scro-  
 biculis, non usque adeò profundis, veluti forami-  
 nulentis.

*Descript.* *arbor.* Camer. in hort. *Tacamahaca.* Monardi de med.  
 ex Occid. Ind. lib. 1. cap. 2. in versione Clusij *Taca-*  
*mahaca* Indorum & Hispanorum resina est, quæ ef-  
 fluit vulnerata arbore magna, Populo æquali, o-  
 doratissima, colore est Galbanj (nec desunt, qui  
 idem esse putent) unguibus albis, uti Ammonia-  
 cum, cuius fructus colore est seminis Pæoniæ.

Gummi Taccamaca, ait Linschottanus, in par-  
 va quadam Insula, Indiæ Orientalis reperitur. Pro-  
 fluit è celsa arbore, cuius folia sunt longa, angu-  
 staque. Fructus magnitudinè Prunorum nostratium.  
 Ipsum verò Gummi colore est albo, odoris  
 suavissimi, ac proinde in magno pretio.

*Locus.* Hist. Lugd. *Tacamahacam* affecti scribit ex Hi-  
 spania nova.

*Vires.* Magni est apud Indos usus in quocunque af-  
 fectu, præsertim in omnis generis tumoribus in  
 quacunque corporis parte: siquidem misticè re-  
 solvit, maturat, & dissipat. Omnia compescit  
 dolorem ex humore frigido, aut flatibus natum,  
 uteri suffocatione laborantes suffitu naribus ex-  
 cepto revocat, emplastri modo si umbilico indu-  
 catur, matricem sistit, ac efficacius id præstat addi-  
 ta Ambra & Moscho. Expertissimum creditur re-  
 medium contra defluxiones quasvis, sistit enim:  
*Defluxio- nes.* rheumatismos in oculos, faciem, aliasque partes  
 subiectas, si siustulum in utramque aurem, aut  
 eius duntaxat lateris, indatur; in quod destillatio  
 incumbit, aut temporibus emplastri in morem  
 applicetur. Dolorem dentium levat, foramini  
 dentis corrupti imposita: contra dolorem omo-  
 platæ, & distentiones cervicis inducta confert.

*Dolor den- tium.* Ventriculū roborat, appetentiam revocat, conco-  
 ctionem adiuvat, statūque dissipat emplastrum  
 de *Tacamahaca*, cum triente Styracis & pauca  
*Ventricu- lū.* Ambra eodemque modo & capiti inductum, do-  
 lores cerebri profligat, eique robur addit, pluri-  
 mum confert dolori ischiadico, & iuncturarum,  
*Ischias.* præsertim ex frigida admista causa orto, parti indu-  
 cta, cum resolutione astrictionem quandam ha-  
 bet coniunctam: nervorum costusa, & convul-

siones perfanat. Denique vulgaris eius in omni  
 dolore usus. Ego (Monardes) trientem cere flava  
 addo. Cavebis tamen in principio inflamma-  
 tionum & tumorum p. n. calidorum, quorum ta-  
 men reliquis discutendis apprimè utilis est. Ca-  
 lida est in principio tertij gradus, & astrictione  
 vehementi, & vi roborandi: sicca verò in secundo.  
 De *Tacamahaca* ita Ioannes Posthius p. m.  
 cecinit.

*Indomitam lenit si Tacamahaca podagram*

*Et omne corporis partibus.*

*Illam ego præstulerim, quas vendicat India, gem-  
 ma,*

*Arabūque Gazæ omnibus*

*Nam quis divitiis validos non præferat artus*

*Tristisque sensu liberos.*

## VISCI INSTAR SVCCVS.

## CAP. LXII.

*Descriptio* *Color.* *Similis succus eius.* *Color.* *Lignum.* *Sapor.*  
 Succi concreti magnum fragmentum ad  
 Clus. mittebat Londino Iac. Gareus, cuius  
 frequentem in Exot. facit mentionem. Erat ve-  
 rò is succus, dum adhuc recens & lentus, circa  
 bacillum pedalis longitudinis, multiplici circum-  
 volutione adaptus, donec in brachialem crassitu-  
 dinem evaderet: varius erat eius color, nam ex  
 parte nonnihil candicabat, ex parte cineraceus, &  
 ex parte nigricans erat, durus & firmus quem ta-  
 men igni expositum liquecere & lentum fieri  
 intelligebat, visci instar, quo aucupes ad capiendas  
 aviculas uti solent: atque rem ita se habere expe-  
 riebat Clusius. Vnde porro allatus, & ad quam  
 rem utilis esset, nihil adscriptum.

Cæterum biennio post mittebat ad eundem  
 idem Gareus similis succi concreti, multiplici spi-  
 ra circa bacillum convoluti fragmentum, quinque  
 unciarum longitudinis, & novem uncias ambu-  
 tu comprehendens, quippe cuius diameter pen-  
 trum unciarum esset, externâ parte omnino su-  
 scus, ex frequenti, ut putat manuum contricta-  
 tione, internâ verò candicans, siccus admodum,  
 & fractu adeò contumax, ut lignum veriùs, quam  
 succus censei posset, igni tamen admotus statim  
 flammam concipiens, in nigrum & lentum liquo-  
 rem resolvebatur, instar Visci, valde lentum & te-  
 nacissimum, nullius initio manifesti sa-  
 poris, sed paulò post, acrimoniæ  
 cuiusdam non expertis.

FINIS LIBRI NONI.



1861

Received of the  
Hon. Secy of the Navy  
the sum of \$1000  
for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"

for the purchase of  
the ship "Albatross"







# HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER DECIMVS.

DE ARBORIBVS ET FRVTICIBVS SCOPARIIS.

**D**EDIMVS cuique arborum generi, naturâ quadam consimiliun, suam propriam quasi tribum. Nunc & Scopariis producemus, unâ classe, quâ ipsas uniuert & quâ in consortiun quoddam cœgit rerum parens natura, ne scopas dissolutas dedisse videamur.

DE MYRICA SIVE TAMARICE IN GENERE.

CAP. I.

Tamarix  
arbor Dio-  
scor.  
Locus.



ENIMVS ad Scopariarum & Ericarum nobile decus, Myricam siue Tamaricem, quam Dioscor. tradidit esse arborem [N. d. c. v.] vulgò cognitam, quæ apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructumque quasi florem

Sativa, Sil-  
vestris

ferat, compage mulcosum [N. d. c. v.] Egyptum Syriamque fatuam quandam gignere, syluestri cætera quidem similem, & fructum parere Gallæ proximum, gustu inæqualiter adstringentem.

Tamaricis  
lignum du-  
plex Theo-  
phrast.  
Myrrhine  
pro Myrica  
Gaza er-  
ror.

Tamaricis meminit & Theophrast. hist. pl. his verbis: Addunt etiam Tamaricis [N. d. c. v.] lignum non vt apud nos imbecillum, sed validum sicut Iligneum, aut aliquid fermè materiæ huiusmodi, ibidem [scilicet in Tylo Arabiz insula] comperiri. Videtur autem nobis Theophr. hoc in loco demonstrare duo genera Tamaricis: vnum ligno valido, alterum imbecillo. Inueniri aut potè plantas quasdam communes, & quasi vitam ancipitem agentes [N. d. c. v.] vt Myrica [Gaza Myrtum malè, legendum enim, Myrtum, quæ ancipitis vitæ potius, quàm Myrtus, de qua hoc nondum obseruamus.] Myricam etiam Amphibion facit Basilus Magnus, vt quæ inter aquatiles numeretur, & copiosa sit in desertis, ac propterea diuini illam Hieremiam haud iniuriâ huic & similibus stirpibus hominum improbiore, ancipitèscantur mores similes esse dicere.

Semen non  
fert.

Galla.

Sed Plinium adeamus qui Tamaricem inter eas arbores numerat quæ arborum solè nullum ferunt fructum, hoc est, ne semen quidem, copis innascentem. Is præterea scribit Myricen & Italiam ferre, quam alii Tamaricem vocent: insigne in hac esse, quod Sativa tantum ferat, Galla similem

Tom. 1.

fructum: In Syria & Aegypto copiosam hanc esse, eiuque ligna infelicia appellari, quæ tamen infelicia sint Græciæ. Ad hæc Tamarici folia non decidere & carnosâ esse, quo in loco ego quidem existimo Plinium loqui de Tamarice arborea, verum non obseruavi vllam Tamariscum foliis non deciditibus.

Contra Dioscoridem etiam & falsò quidem Plinius Myricam [Siquidem Myrica eadem est cum Tamarice] nullum fructum, h. e. ne semen quidem ferre, propterea quæ à vulgo infelicem arborem appellari, scribit. Ipsemet quidem sui velut immemor lib. 24. cap. 9. Satiuæ Tamarici duplicem enim constituit, syluestrem inquam sterilem, & satiuam mitiorem] fructum lignosum maiorem gallâ tribuit: rursumque dum Tamaricis vires persequitur, seminis peculiarem vsum minime prætermittit. Cæterùm Plinius Myricam à Lenao etiam Ericam vocari scribit, vt minus mirum sit vulgus Medicorum Myricam etiamnum malè Ericam [Heyden] appellare.

Hippocrates m. m. [N. d. c. v.] bis habet, quæ voce Cornarius Myricam accipit, vt fastus infra dicitur. Scribit Theophrast. Myricam folium habere carnosum & densum. Plinius etiam in genere de Plantarum foliis scribens, Cupressum inquit & Myricam folio esse carnosò, quod non est ita accipiendum, ac si singula per se folia essent carnosâ, sed ita appellari, quod conferum in ramis nascantur.

Cordus in Dioscor. & ex eo Casp. Bauh. qui tamen eum non citat, sed pro suis vendit, Tamaricem duum generum esse statuit. Alteram satiuam & proceram [arborem Casp. Bauh. facit] in Aegypto nascentem: Et alteram humilem [syluestrem, quæ frutex lignosus C. Bauh.] quam di-

Infelicia  
ligna.  
Folia.

Plin. nos

Plin. error  
alius.

Arbor in-  
felix.

Erica malè  
Promelas  
Hipp.

Myrica ge-  
nera Cor-  
di.  
C. Bauh.  
nos.

Proceram  
arbor.  
Humilis  
frutex.  
Humilis ge-  
neri dupli.

Gg

minutiâ voce Tamariscum vocat, cuiusque in Germania duplex genus inueniri ait: alterum folioidere ligno, medullâque admodum exili, & foliis tenuioribus, copiosè ad Rhenum circa Argentoratam nascens: alterum ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoque non vsque aded lolido, quod frequens in Danubii & VVertachii ripis in Vindelicia proveniat, præsertim iuxta Augustam. Hæc Cordus.

Myrica  
N. erica  
neof. &  
Germanica  
discremen.

Addit Capud Matth. differre Narbonensem à Germanica, illam exiguis habere flosculos, non papposos sed rotundos, ex albo puniceos, & acinulis subsilicentibus à vermiculo intus orto agitato: hanc verò flores producere tomentosos & papposos purpureos, qui vnâ cum semine disfluunt.

Vatidica.

Legitur apud Nicandri interpretem in theriacis, Apollinem Vates sanxisse iurificam pronunciare mortalibus futura, virgis myricinis vtentes:

Mantis.

ac propterea hunc fruticem Nicander *Matth. vatem* vocat. Apollo inde in Lesbò tenebat maru virgas myricinas, quare *Myricens* dictus. Et plerumque locis virgarum vi Dion auctores quos fuisse vaticinos scriptum reliquit. Legimus præterea Magos virgas vertisse in Diacones, & miracula à Mose vi virgarum facta, quæ certo diuino afflate fiebant, non magico, vt impiè Plin. opinatus fuit, magices factiorem à Mose memorans.

Plin. impia opinio.

Epitheta.

Poëtæ suis epithetis Myricam non tam adornant, quam ipsi detrahunt, non enim perpetuè est tenuis, fragilis, tenera, sterilis, syluestris, parua, & humilis. Virgil.

Nomina linguar.

Non omnes arbuscula iuuant, benevolæque Myrica. MYRICÆ, Lat. etiam Myrica, Myrica Tamarix in Corintho, nonnullis etiam *Amarix*. Plin. etiam *Tamarices* in Achaia *Bria sylu.* Trago. Hist. Lugd. & Clusio, sed falluntur meo iudicio, nec id Plin. lib. 13. c. 21. asserit. J. Offic. *Tamariscus*: Octauio Horatiano *Murica*, Arab. *Tarfaleu* Carfa. Serap. *Carmezur*, Auerth. *Alcarphar*. Germ. *Tamarisckenbaum* oder *holz*, / *Portz* / aut *Birthenbenz*. Belg. *Tamariscken boom*. Gall. *Tamarisque*. Ital. *Tamarice*, *T. marigio*, aut *Altarse*. Hisp. *Taray*, Castell. *Tamariz*, Catal. *Tamaril*, Portug. *Tamargueira*, Lacun Angl. *Tamaris tree* Boh. *Tamarysff*.

Aequiuoc.

Et vtiam Tamaricis siue Myricæ æquiuoca dicamus, quod vnum reliquum est: Tamarix siue Myrica Narbonensis & Italica, cum Tamarice Germanica fruticosa: itemque Tamarice Aegyptiæ gallifera malè à quibusdam commissentur. Etiam quoque nonnulli confundunt cum Tamarice, vt alibi demonstratum. Turnerus annotat, cum scribat Theophr. & Diosc. Etiam folio esse Myricæ, toto cælo errare Londinenses, quod cortices Sorbi Atcupariæ pro Myricæ corticibus, vsurpent, cum nulla eis intercedat similitudo: Imò, inquit eadem, rectius Erica [cortex radices] substituetur Myricæ, quam Sorbus, quod Dioscorides eam proximè Myricæ subiungat, solitus plantas facie & viribus conuiles coniungere, & quod apud Aeginetam in remediis splenis sæpè legatur Erica. Minus congruè ponitur pro Myrica Marina. Tandem apud Dodon. Gull. ignarus quibusdam Pharmacopœis Taxus Tamariscus est. At ab oniscus salibus ad particulare descendamus.

Myrica Marina. Tamar.

### TAMARIX MAIOR SIVE ARBOREA NARBONENSIS.

Descriptio Ericæ facie.

Vigatiorem prostrum, inquit Pen: & Lob. Aduert. facieque Ericæ videas, præcipuè in



rignis & mari. Locustimis Gallo. Vasa è prouinciæ & Tamarice.

Lio Venetorù, in cotonei magnitudinem, caudicemque abire, è quo ad splenes detornantur pocula. Narbonensis autem ramosi exigui flosculi, nec papposi, sed rotundi Oleæ, ex albo puniceos sunt, & acinulis quos interdum totum triduum Soli obiectos obseruauimus subsilientes &

Narbonensis descriptio.

tripudiantes, vermicello intus orto agitante, & tripudii auctore, qui pertusis & desiliensibus tandem granis foras i. d. bat. Hanc sic describit Myrica syluestris magna ex parte tantummodò fruticet, interdum in vastam arborem adolefcit: scabro caudicis cortice, ramorum verò puniceo: folia habet Cupressi, aut Ericæ humilis vulgaris, coloris ex viridi ad cinereum tendentis: flores extremis ramis in oblongis pediculis confertos & racematim compactos exiguis foris purpureascentes, cum expansi sunt, candidos, quinque foliis constantes: qui deinde in exiguum semen tomerito inuolutum efformantur, exiguis veluti valulis inclusum, quibus maturitate dehiscitibus effluit, vt in Salice, Populo & similibus. Ter plerumque in anno floret, Vere, Aestate, Autumno: recentibus floribus semen iam euanelescentis emper subsequenteribus.

Descriptio Clusii Myrica sylu. Cortex. Folia. Flores.

Semen.

Ter flores.

Plin. error.

Hanc Plinius inter eas recenseret, quæ nullum fructum, imò ne semen quidem præferunt: cum tamen Dioscorides illi fructum tribuat compage mulsosum.

Myrica, quæ alibi reperitur in hortis mitior credita, non alia est, quam syluestris, in loca mitiora translata. Cuius rei certo sunt indicio fructus & flores, quos omnino syluestris similes profert. Vmbra arboris, insigni proceritate, sæpè per Aestatem Romæ se Matth. oblectatum fuisse recordatur ad Tiberis ripas, in hortulo quodam hospitalis S. Spiritus: quæ etsi domestica haberetur ab omnibus: florem tamen & fructum ferrebat syluestri similem. Myricæ radices pro odorata cassia venditabant impostores. Sed postquam fraus à penitis medicæ materis vitis deprehensa est, eius in officinis vltis penitus exoleuit. Camer. in hort. & Hist. Matth. posuit nouam figuram & vocat Myricam, siue Tamaricem Gallicam & primameminit eius ex Pena & Lobelio. De qua Tamarice siue Myrica loquitur Lacuna non demonstrat: licet figuram Matthioli habeat. Lob. & Penz. Adu. & Icon. Plant. Tamariscus Narbonensis Clus. Hisp. & in fol. Myrica syluestris prima. Pann. Gallica aut Hispanica Tamarix. Alpin. Tamaricis syluestre genus, Italici notissimum. Iac. Theod. Hist. Lugd. & C. Bauh. apud Matth. [cui & Myricæ 2. & Tamariscus Narbonensis] Tamarix Narbonensis.

Myrica sylu.

Arbores magna Roma.

Pro cassia odorata. Radix cædita.

Tamarix Gallica.

Myrica circa Monspelium Gesn. hort. Myrica Cæsalp. Dodon. Lat. in fol. huius iconem exhibet, titulo, Tamaricis ramulus cum floribus. Eam tamen

Locus & tempus.



men à Germanica fruticosa non distinguit. Tamarix autore Fuchſio Lugduni impreſſo in Gallia Narbonenſi luxuriat, nunc etiam in hortis regis, quos ſons Bellæ aquæ irrigat & in hortis Bellai Pariſienſis Epilcopi. Eſt & inſignis proceritatis Romæ ad Tiberis ripas in hortulo quodam Hoſpitalis S. Spiritus : item in fluminum ripis frequentiffima in Italia.

Dioſc. not.

Quare non potuit Matthioli. non mirari Dioſcoridem: quippe qui dicat tantum naſci Myricam apud paludes ac reſides aquas, cum oppoſitum fanè veniat in Italia. Quod ipſum ſæpius adduxit ut crediderit aut Dioſcoridis codicem hoc loco deprauatum eſſe, aut in Græcia ſecus quam in Italia Myricam oriri. Naſcitur plerumque iuxta flumina, aliquando ſatis etiam procul ab illis. Obſeruabat & in Narbonenſi Gallia Cluſi ſtagno Volcarum vicinam: nuſquam tamen ampliorem vid ſiſe meminit, quam ſupra Madentium Regum Hiſpaniæ Regiam, plantis multis huiusmodi arboribus conſita, non procul à fluminum Xarama & Henares confluentibus ſub Compluto: Hiſpaniæ, *Alcala de Henares* nuncupato, quod fluiuius Henares eam vibem alluat: magnæ tamen iſtæ arbores, quas hominis vlna amplecti vix potu ſſet, diuerſum florem non ferunt ab eo, qui in fruticantibus duntaxat Tamaricibus prouenit. Frequens etiã hæc eſt Belgicis hortis. Nuſquam eam, neque in Hiſpania, neque in Gallia, perpetuã comã videntem vidit, ſed nouo Vere ſingulis annis, noua foliorum germina proferentem. Myricam Gallicam diu in hortis durare, modò Hyeme reponatur, teſtatur Camer. Is etiam huius Tamaricis magnas vidit arbores Monſpeli atque Lyteuz.

& Myricam Pannonicam, ait nagnum eſſe fruticem, nunquam arboreſcentem, brumam tamen ferentem, flores ex albo purpuſcentes, quinque foliolis conſtare Gallicæ Myricæ maioribus: virgas acquirere craſſiores, quam arboreæ: ex maiuſculorum foliorum, ſutculos ambientium, alis, enaſci alios ramulos, qui ſint exguis foliis onuſti.

Myrica Pannonica Cluſio.

Tamaricum fruticem lignotum pingit Tragus vocans eum cum Lacuna ac Gen. hort. Myricam Fuchſ. Tamaricem ſylueſtrem: Dodon. Gall. Myricam humilem, *petit Tamarix*, Tabern. & Dodon. Lat. in fol. Tamaricem: Turner. Myricam [hi duo leonem Fuchſi habent quæ nobis videtur nimis arborea, nec ita proteſtamentem obſeruauimus.] Tamaricum Germanicam cognominat Lob. Adu. & Icon. Plant. Hiſt. Lugd. & Caſp. Bauh. apud Matthioli. cui & Myrica prima dicitur. Cord. in Dioſcor. Tamaricem humilem, in hiſt. Tamaricum ſæminam. Lobel. Obſ. Anguill. Lonnic. Brunſell. Tamaricem. Quam Amarus intelligat Tamaricum neſcimus, pictura ei appoſita eſt Tamaricis minoris. Camer. hort. Myrica ſiue Tamaricis altera: ad Matthioli. Germ. Tamarix ſecunda vulgaris: à qua Cluſii Pannonicam ſeparat, quam minorem ſiuticoſam vocamus, quod non exiſtimamus faciendum.

Copioſe ad flumen *Dräſen*, ante D. Hippolyti vrbera, vulgò *S. Pelten* nuncupatum, octo à Vienna Aultriæ inferioris vrbe miliaribus diſtanti creſcit: ad annem etiam *Schwarze*, oppidum *Neutirſche* alluens binis ſupra Neapolim Aultriæ miliaribus, præterum arenofiſ illis locis, quæ hyeme ab iis amnibus inundantur. Obſeruat & circa ipſam Aultriæ Metropolim Viennam, iuxta Danubium arenofiſ illis locis, qui Pontibus longis [*den langen Brücken*] adiacent. Extra pagum quoque *Dornbach* non procul à ſylua in riguis conſpicitur.

Locus.

Floret Maio & Iunio ac deinceps tota ſerè eſtate flores & ſemen proferre non deſinit. Huic ſimilem, quibuldam Germaniæ locis ad Rhenum fluiuium, & in Tyrolenſi comitatu naſci intelligit Cluſ. Frequentem etiam vidit ante paucos annos Londini in aliquot hortis. Miror Lobelium ſcribere plerumque in hortis Angliæ brumã perire, cum, autore Turnero in Anglia non creſcat. Fuchſ. copioſam vidit in Germania ad Rhenum & Iſarum. Turnerus præterea in Italia in inſula inter Francolinum & Venetias: in Rhetiæ lapidoſo quodam loco, quem Rhenus interdum quotannis inundat. Camer. in hort. pag. 101. Tamaricus ſiue Myrica in Germania paſſim ad Danubii ripas creſcit, non ſcilicet culturam hortenſem recipit, niſi ad aquas collocata. Secus profluentes amnes, ac quandoque exorbitantes fluiuios, non rarè etiam circa paludes [naſcitur inquit Dodon.] ſolo frequenter ſaxoſo: humidiores ſiquidem & lapidoſos amat tractus. Feliciter in hortis E. C. Montb. prouenit, plantata floreret, & flores in pappos reſoluuntur. Quum eſſem Horburgi curauim adſerendas plantas ex ripa Rheni, ubi abundat, aliquot annis durauit, tandem perire: iterum inde delata durat & ſemen profert, ex qua etiam in hortis proueniunt plantulæ. Vidit ſatis magnam & copioſam ad Rhenum propè Briſacum vrberem & circa Neoburgum inter Briſacum & Baſileam. Frater Caſp. Bauhinus copioſam inuenit in Huningen ad Rheni litus non longè à Baſilea. Vidi adſerentes Baſileam, virentem, Pharmacopœis. Obſeruauim non longè à Geneva florentem Junior Tiguri, Lugduni: Patavii. Epiſcopatum Salisburgenſem Tamarico luxuria.

Tempus.

## TAMARIX GERMANICA, SIVE MINOR FRUTICOSA.

Deſcriptio

Radix.

Cortex.

Folia.

Color.

Flos.

Caliculi.

Pappus.

Semen.



Quas amat Tamaricus noſtras, radice craſſa, & quæ crus æquet craſſitudine, cortice craſſiſculo inſigniter amaro teſta, quæ multam ſtolonum veluti ſegstem emittit virgultorum fragilium, purpuſcente cortice obduktorum, & in frequentes ramos diuiſorū: per quos folia longã coherent ſerie, Ericæ vulgaris, maiora quam Tamaricis

Monſpeliensis, duplice verſu aſcendentia, coloris ſerè glauci, ſapore adſtringenti, longitudinis palmaris aut ſempedalidis: Flores ſpicatim in extremis ramulis digeſti, foliolis conſtant externis vireſcentibus, aliis purpuſcentibus, apicibus in medio luteolis: ſequuntur calyculi, ſiue pericarpia mucronata, triquetra: quibus dehiſcentibus pappus euolat delicatiſſimus, candidiſſimus, appenſo ſemine minutiſſimo, coloris rari.

Cluſius qui eam vocat Myricæ ſpeciem alteram

Ton. I.

re argumento esse possunt doliola, quæ Viennam vsque inde venalia è ligno eius artificiosè concinnata deferuntur.

# TAMARISCVS ÆGYPTIA

GALLIFERA.

Descriptio



Locus.

Carbones.

Vasa  
Fructus  
Syl. Gallia.

Synonyma

Ale Aegy.  
Tamarix  
sativa.

Locus.

Vires Ta-  
maricum.

**T**amaricis domesticū genus, in Ægypto, auctore Alpino, spectatur, proceritate, figuræque admodum à sylvestri diuersum, quod ad magnæ Clusii magnitudinem crescat, addiōque etiā supra Ægyptum in loco Sabir ab iis populis vocato, crescere ad magnæ Quercus magnitudinem, cuius ex lignis carbonēs faciūt, quibus tota Ægyptus & Arabia vitur, ex quo etiā ligno multa vasa conficiunt, ad multorum ægotantium vsum. Folia fert sylvestris Tamarisci foliis proxima tamen longiora, & graciliora, appatēntque multa capillamenta viridia, qualia in aliquibus equisetis videntur, ramo appenda, semper vitentia, fructus fert paucos, rarios, virides, Nucum magnitudine, duros, lignosos, sine nucleo, & videntur eiusdem substantiæ esse cum gallis: omnes verò figurā inter se differant, quamquam in omnibus aspera & inæqualis obstruatur, quando alii longi, alii breues, alii rotundi, alii lati, alii crassi, alii que graciles existant.

Tamaricem hanc Dioscorides, siue satiam aut vrbānam nominat, & fructu nāc proferre, Galis perisimilem, gustu inæqualiter adstringentem. Tamaricis præaltas, & aliarum arborum instar magnas, fert Pet. Bellon. Obseru. vidisse refert: & locis quidem quandoque humidis locus flām nāc non raro verò etiā in aridis & sabulosis, vbi nulla alia nasceretur arbor, quæ Gallas, incolis Chermesel dictas, subinde adeo multas è ramis dependentes ferrent, vt onere earum grauata ferè fauiscerent. Alpino dicitur alterum Tamaricis seu Tamarisci domesticum genus, Arle vocatum in Ægypto: Fuchs. Hist. Myrice siue Tamarix altera satiam in Syria & Ægypto. Clusius Myricam satiam à Dioscoride vocatam nunquam conspexit. Dodon. Gall. Tamarix magnā arborelscens, fructum instar gallæ proferens, Neoterice adhuc incognita. Camer. apud Matth. Germ. Tamaricis genus satium Dioscoridis, quod inuenit Bello- rus in Ægypto, vbi humida amat & arepola.

In Ægypto autem ac Syria hanc gigni, auctor est Dioscorides, in Tylo & Arabia insula Theophrastus. Quarum, inquit, lignum, non vt apud nos Græcos imbecillum, sed validum veluti lignum {spum} aut aliud quoddam folio. Verū enim uero, cum omnia, quæ hæc genus tractauerimus ad Theophrastum disciplinam spectare videantur: Et nos ob solam scientiam, quantum quidem possumus, sequeper fuerit, ne mi-

nima dicta velimus, idēque ad operationem, tanquam ad communem finem, nostra dirigamus, iure merito, Vires & vsus, quibus amissa hominis sanitas, instauratur, præter vsu conseruatur, hoc in loco dicenda supersunt. Fructu gallæ proximo, inæqualiter adstringente gustu, conuenienter vitur Dioscorides, vice gallæ in medicaminibus oculorum, orisque. Datur cruentæ excretionis in potu, & colicis, & contra profusum sanguinem, regium inebriū, & phalangiorum morsus: illius tumores inhibet. Cortex in eodem vsu adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit, ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ opportunis in deflectionibus, phthiriasi, lenthibusque circumfuso prodest: abundantiam sceminarum sistit impositus arboris cinis: potioris calices à caudice lienosis moluntur, quo datus in his potus proficit. Myrica dicitur apud Plinium sanari Carcinoma, in vino decocta tritaque cum melle iusta. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeoque mirabilem eius Antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, vt afficent, si ex aluis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et idē homini quoque splenetico cibum potumque dant in valis ex ea factis. Grauis auctor in medicina, virgam ex ea defractam, vt neque terram neque ferrum attingeret, sedare ventris dolores, alseuerant impositam, ita vt tunica cinthique corpori apprimereetur. Lignum autem & flos, & folia, & cortex in eodem vsu adhibentur, quamquam remissiora. Datur sanguinem reitientibus cortex tritus, & contra profusum sanguinem, colicis quoque. Idem vtilis impositusque collectiones omnes inhibet. Folius exprimitur succus ad hæc eadem, & in vino decoquitur, ipsa verò adiectio melle gangræni stilinuntur. Decoctum eorum in vino potum, vel impositum cum rosaceo & cera eas sedit. Sic & epynctidas sanat. Ad dentium dolorem, aurumque decoctum eorum salutare est: radix ad eadem: similiter & folia. Hæc amplius ad ea que sepius imponuntur cum polenta. Semen drachmæ pondere aduersus phalangia & scarapheos habetur. Cum stilium verò pingui surunculis imponitur. Efficax & contra serpentium ictus, præterquam aspidum. Nec non morbo regio, phthiriasi, lenthibusque decoctum insulum prodest, abundantiamque multorum sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest. Aiant si bouis castram vrinae immisceatur, velin potu velin cibo, Venereis finiri. Carbōque ex eo genere vrina eā restitutus in vmbra conditur: idem cum libeat accendere, resoluatur. Magi & id ex spadonis vrina fieri tradiderunt.

Myrice iuxta Galenum abstergentis est ac incidens facultatis absque perspicua desiccatione: habet verò etiā adstringentem nonnullam. Has ob qualitates facultatēque admodum prodest lienī indurato decocta cum aceto, aut vino: siue radice, siue foliis, siue extremis ramulis decoctis. Sanat porro dentium dolores. Cortex in fluxibus & cortex non paucam sortita sunt adstringentem, adeo vt gallæ Omphacitidi proximæ sint, nisi quia acerbitas euident est in galla, & Myrice fructui temperatura inest inæqualis: immissa enim est natura eius multa partium tenuitas, atque vis abstergerendi: quod sanè gallæ non accidit. Attamen vbi galla ad manum fortè non erit, ea vti licet ad omnia, ad quæ illa vimur: ad eadem & cortice. Porro Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoris facultatis est, plurimam habens abstergerendi

Galle Myr.

Myrica  
Ocusi. Or  
Regius  
maris. Ve-  
nenum.  
Tamaris  
Cortice  
Foliorum  
decoct.  
Lien. Dolos  
dentium.  
Lendec.  
Calices

Carcinoma.

Myrica de  
Myrica.  
Sues sine  
Liene.  
Splenetici.

Ventris dolor.

Sanguis  
profusus  
sanguinis  
Succus. Fo-  
lia. Gang-  
rana. Epi-  
nctida.

Aurum  
dolor.

Radix.  
Serpentia,  
Doli. semi-  
hum  
Furunculi  
Serpentis  
ictus.  
Phthiriasi.

Cinis.

Téperatib.

Lien. Den-  
tes. Gallia.

Myrica co-  
nu.



# LIBER X.

## ERICA IN GENERE.

### CAP. II.

stergendi & incidendi facultatem, paucillam adstringendi. Sues si quando ætate splenis incremento laborant, his succuri scribit Columella, si fabricentur canales ex Tamaricibus, & Rusco, repleanturque aqua, & deinde succentibus admoveantur: quippe ligni succus medicabilis, epotus intestinorum tu nocem compescit. Sed forte legendum ut monet Thyr. ex Ruellio, canales Tamaricis è tritico & non è Rusco, qualem habet Tamarix maior arboræa. Quod verò Diosc. & Plinius de valis & calicibus ex ea factis dicunt, hoc aliquando propolis hodie, teste Cornano, fitur, ab his qui in superiore ad Rhenum Germania vina Tamariscina appellata, ex virgulis Tamaricis præparant, quæ splenis vilitatibus. Quinquam apud Constantinum Cæsarini Cornarianæ translationis in eundem usum vini prunis Myrica superfusi potus magis probetur. Hippocr. porro cum lib. 2. m. m. *περὶ αἰσθητῶν* bis habet, Corn. ea voce Myricam accipit, ac posteriore quidem loco ad suffitus, ubi vteri transitorio prelesserit, probat: pitore verò ubi pertinacior fuerit eorum fluxus. Porro Myrica cinerem omnia vlcera ignis exustionæ contracta, efficaciter exsiccat: author est Serapio. Folia quoque, ut notat Matthiolus ex Alcarzio Arabe simul cum tota planta fœtu frigidas collectiones inhihent, ac reprimunt. Elephantiasim ex henis vitio obortam Myricæ radicem decoctum & cum passis vuis epotum sanat: id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, quæ hac labe laborarunt. Ex quo illi persuasum est, id non incongruum in Gillica pelle fore medicamentum, Guaiaco forsitan ligno non abim le. Vitis, inquit Prosp. Alpini de plant. Aegypti cap. 9. Tamarici tum in Aegypto, tum magis supra Aegyptum, ubi harum arborum copiosius est proventus, est, ad ignem maior, quando ferè nulla alia ligna ad comburendū habeant. Folia huiusce arboris vltim habent ad lienem induratum obstruendum, & refrigeratum. Vasæque ex ligno, ut dictum est, conficiuntur, quibus lienos vi conficiunt: ob eorumque multam, quæ ex hoc ligno habetur, ad id morbi genus utilitatem, mirari non debemus si Plinius (quod tamen fabulosum est) dixerit, Sues assuetos cibum capere in valis è ligno Tamaricis confectis, Lienem carere: mulieres decocto ex cortice parato vuntur per os sumpto, ad sistendas menstruas purgationes, ex quo parant etiam infusiones, & clystribus in vterum iniiciunt decoctum. Idem quoque fructus facere aiantis siquidem vuntur in ipso sanguinis, in Lienteriis & in mensuris plus iusto fluentibus, atque hæmorrhoidarum immodico fluxu: dentes etiam commotos atque colabentes ipsorum decocto firmant: atque in iis concitatum dolorem demulcent. Vuntur etiam ad oculorum lipprudines incipientes, in collyriis, atque ad oris vlcera. Cinis quoque corticum & fructuum vlcera curat. De ligno verò multi decoctum, non secus quam nostri ex ligno Indo ad curandum Luem Gallicam facere soleant, parant, quod exhibent leprosis, scabiosis, atque aliis multis, pustulis & vlcibus affectis, faciliiori cum successu. Idemque faciunt in Melancholicis, Lientericis nigris, & Hydropicis ex refrigerato, obstruendo ac indurato lienem concitatis. Ex Arabum dictis rectè Turnero videtur Matthiolus colligere, vilitate posse contra luem veneream preparari Myricam sicuti paratur Guaiacum. Non autem in eum duntaxat usum preparari vult Turn. sed etiam aduersus omnes morbos splenicis. Probatur verò ipsi vinum Myricæ.

Tom. I.

Quoniam de Tamariscis iam verba fecimus, de Ericis deinceps disseramus. Erica siquidem (Eben) Dioscoridi lib. primo arbor est fruticosa, similis Myricæ (Mueken) sed multo minor, uis flore ubi apes vuntur, mel non bonum efficiunt. Huius coma & flos imposita, serpentum morsus sanant: lib. verò 3. *Corin* esse scribit folio Ericæ purpureo ac immore. Contra Theophrastus inter frutices numerat, qui cacuminibus fructum ferunt. Ericen quoque apud Plinium lib. 24. cap. 9. Græci vocant fruticem non multum à Myricæ differentem, colore, Rosimanni & penè folio. Hunc aduersari serpentibus tradunt. Idem Plin. lib. 11. memoriæ prodidit post primos Autumnii umbres Ericem (Frithacem C.H.) solam florere in sylvis, ac ad æquinoctium quidem plurimam esse: Athenienses Tetralicem appellare, Eubœam verò Sifarum (Sifarum alii cum Varrone) quam putent apibus gratissimam, fortassis quia nulla tunc alia sit (florum) copia. Dalechampsius notat Plinium, ac dicit aliam esse spinosam & aculeatis foliis pungentem Tetralicem, Theophrasto cap. 4. lib. 6. huius memoratam.

Quod apud Hermol. habetur Theophrastum quemdam fruticem appellare Tetralicem, non Tetradicem, fallam est. Sed Tetralicis æquiuocationes & Theophr. verba petes ex lib. Hist. n. 28. Is porro Ericen apud Venetos Tamaricen suæ Amaricen vocari scribit. Quod si verum, non absque gravi errore duas distinctas plantas confundunt. Alii *Quadrangulam*, *Quadraram*, & *Amaricum* (nam & Columella flores Amaricinos dixit, pro quo rectius Enceos legi posse existimat Tragus, imitatione Pliniana) vocant. Sed errat Tragus qui Dioscoridis Ericam Genistellam esse credit.

Confidenter nimis Anguillæ non videntur veræ quæ demonstrantur Ericæ. Nomenclator Hadr. Ignius confundit Ericam cum *Brya sylvestri* Plinij, qui nostro iudicio, eas ab inuicem voce distinctas [ & ] diuersa esse tradit, ita enim inquit lib. 3. cap. 21. Tragion fruticem sola Creta insula gignit: Tragion & Asia fert, siue Scorpionem &c. Myricen & Italia, quam alii Tamaricen vocant: Achaia autem Bryam sylvestrem. Adde Plinium Bryæ non meminisse alibi, ubi de Ericæ nominibus egit, nec hoc capite Ericam nominare. Nimiùm etiam audeat Tetralicem Theophrast. vocat, quæ ab ipso inter Carduos recensetur, quàmque alibi separatim nominat. Ipsum quoque annotare decebat officinas, quibus Genistella dicatur. Is præterea Ericen & Ericam in genere vocari scribit. Græcè *ἐρίκη*, Germ. *Heyden*, Belg. *Heyde*, Gall. *Brière*, *Bruyère*, Ital. *Erica*, Hesp. *Quiero*. Angl. addit Lob. *Scith* Boh. *Wees*. Matthiol.

Nomine Ericæ plures hodie plantæ occurrunt, quas recensere placuit esto. Est autem vi ex iam dictis colligere licet, & ex dicendis clarum fiet, duum generum. Quorum primum Tamarisci folio est. Et huius duæ sunt species, scilicet *Erica vulgaris humilis* temper. vitens, flore purpureo & albo. *Erica tomentosa* & incana foliis. Alterum *Corios* est foliis, duum quoque generum: quorum vnum bacciferum de quo lib. 5. alterum non bacciferum, de quo hoc libro. Est hoc plu-

Arbor Dioscor.  
scor.  
Myrica folio.  
Vires  
Corin folio.

Frutes  
Gracorum,  
Colare ex  
folio Rosimanni.  
Ericæ. Eri  
thace.  
Tetralicæ  
Sifara.

Pliniana  
natur  
Tetralicæ.  
spinosæ.

Hermol.  
lappus.

Tamarik.

Amarix  
Venetorum  
error.

Tragion.  
ror.

Anguill.  
reprehendi  
tur.  
Hadrian.  
Iunimultri  
Plek lappus.

Nomina  
Lingua  
Aequivoca

Erica duo  
genera.  
Tamarisci  
folio  
Erica vulgæ  
Erica tomentosa  
Corios folio.  
Bacciferum.  
Non Bacciferum.

Species plu-  
res.

Erica flore

albo

Purpura-

scente

Exallopur-

purascere

Muriiflora,

arboriflora

flore luteo

arboriflora

flore pur-

pur.

Ex rubra

pur. purasc.

flore

Flore dilu-

re purpu-

rea

Brabantica

folio qua-

ternis

Pannon ca-

pit. Thymi

Anglicana

cap. hirsu-

tus

Peregrina

Tamaris-

fens.

Vaccinia

palustris

Viti Idæa

affinis ra-

dex

Sesamoides

minus.

Tartarica

Helianthe-

renifolia

Genifolia

aculeata.

Genifolia an-

gula

Rufinaria

nivalis.

Vires

rium specierum magnitudine, foliorum & florum formâ, coloreque inter se differentium. Alia enim est Erica flore albo. Alia foliis quaternis flore purpureo. Alia item foliis quaternis floribus herbaceis, deinde ex albo purpureis: & alia multiflora. Variat à dictis arborens floribus luteolis, vel herbaceis minimis. Ludit item arborens Monspell. flore purpureo, ramulis ternis. Humilis est ramulis ternis floribus saturatioribus purpureis. Diuersa est quoque ramis & foliis Corios, ternis floribus ex rubro purpureis maioribus. Nec vna ex iam dictis est, foliis Corios flore purpureo dilutionis coloris. Recedit ab his Brabantica folio Corios hirsuto quaternis. Degenerat parua foliis Corios quaternis, flore herbaceo, foliaceis capitulis. Nec eadem est parua Pannonica foliis ternis, flore carneo, capitulis Thymi. Est & parua Anglicana capitulis hirsutis. Ad species autem Græcorum, Ericam seu Ericen Latinorum referendas esse has omnes plantas, præsertim ad id genus quod est Coris folio, censemus. His se iungit Erica peregrina Lobelii, ac eiuſdem peregrina altera, itemque Erica ramis & foliis Corios ternis floribus ex rubro purpureis maioribus, frutice affinis, cum suffrutice Tamoxi nuncupato.

Cæterum Ericam confundi cum Tamarisco diximus antè. Cur præterea Matth. Vacciniam palustrem, Ericam baciferam indiget, vide lib. 5. Erica bacifera latifolia Tabernæ. An Viti Idæa affinis radix Idæa, de qua lib. 15. Erica Alexandrina Italorum tradetur lib. 26. sub Sesamoide minore Dalechampi.

Erica Alexandrina, Sesamoides maius, est ea herba, quæ Tartaricè appellatur, de qua lib. 5. Erica minima, Chrysanthemis Lobelii, est nobis Helianthe tenuifolia, de quo lib. 13. Genistellam aculeatam Ruellius apud Tragum Ericam quorundam esse tradit, magno sanè errore. Genistam [angulosam] ad Ericam Diofcoridis pertinere securè nimis Tragus credit. Rosmarinum sylvestrem, teste Matthiolo, volunt aliqui esse Ericam Diofcoridis, sed falluntur. Ex his igitur palam est plura esse Ericæ genera, de quibus in posterum agemus.

Vires prosequitur Galen. Erice, inquit, digerendi per habitum facultatem obunet. Floræ eius potissimum ac foliis utendum: Addit Paulus lib. 7. Encen vi pollere discutiente circa rosionem.

## ERICA VULGARIS, HUMILIS

SEMPER VIRENS, FLORE PURPUREO &amp; albo.

Descriptio

Radix.

Virgulta

Color

Folia.

Flosculi.

Culm.

Radix humilis est nostra vulgaris Erica, radicibus longissimis, fractu contumacibus, spadicis, virgulta numerosa, lignosa, dura, dodrantalia, aut cubitalia, longioraque, ramosa, colore eidem spadiceo prædita, vel in nigro rubescentia: folia frequentia, semper virentia, quatuor verticulis squammatum incumbentium foliorum minimorum constant, vt supernè deorsum insipienti cruce continuz videantur, ad Cupressum & Tamaricem accedunt, quæ, vt ait Clusius, temporis successu in ramulos efformantur: Flosculi veluti spicam exprimentes secundum ramulos à medio ad summum vsque propendunt bullati quodam modo, purpureos, vel, vt ait Clusius, elegantissimo purpureo dilutionis colore, interdum albi Trago perbreui-

bus petiolis appensi, è quatuor foliolis componuntur, quorum medium occupant apices rufi.

Fuchsi figura non placet, folia enim sunt latiora: Isin Hist. Ericam vocat. In Icon. verò Ericen. Buchan. in Hist. Scot. Ericam meminit, vt ait Camerarius, ex qua lecti parantur, vnde suspicamus Ericam potius intelligendam esse minorem, de qua hoc capite agimus, quàm Italianam.

Erica à nostris ait Cornar. ac cum eo Cordus Heyde appellatur, quamquam Lenæus apud Plinium Myricam etiam Encam vocet, & ob similitudinem quandam, vtrique inter se confundat, quod ipsum Palladius lib. 12. cap. 8. fecisse quoque cognoscitur, vbi de Tamarisco tradit, quod Plin. l. 11. cap. 16. de Erica dixit.

Dodon. Gall. dubitat an forte sit Selago Plinii.

His assentitur Tragus, qui Myricam Hieremiam [Aræar. cap. 17.] de hac planta interpretantur. Concludit autem Tamarici exiguum genus esse: nec enim Ericam nostram eam esse opinatur, quam Veteres hoc nomine appellauerunt, sed Genistellam, qua in re errat. Est hæc Ericarum i. genus Clusio. Hisp. & post. Hist. Erica Myrica seu Tamarici folio, quam Hisp. Quirihuella. Lusit. Queiro appellari scribit. Germ. Heyden. Hungar. Teli zdo i. e. Hiemale viride.

Lob. & Pena Adu. Erica vulgaris folio Myricæ, saxosis tamen Angliæ occidentis exiliis, tota tesquipalmata, sed densior fruticans &c. Obs. Vulgarior humilis Septentrionalium & Meridionalium Erica folio Myricæ. Turner. Erica Diofcoridis. Thal. Harc. Erica vulgaris: Eadem tenerior ac foliolis multò tenuioribus.

Cæsalp. Scop. frutex in incultis, foliolis perpetuis, flosculi concaui, vt in Arbuto albi aut purpurantes. Eius differentiz plures: nam quædam flosculos in quatuor particulas dissectos fert, quædam tanquam minuta granula habet, virentia, quæ nequaquam debescunt: frutice quoque distant, magnitudine & paruitate, & inter eas quædam ramos humi stratos fert circa stagna maritima.

Frustra ponit duas figuras Tabernæ, vnam titulo Erica: alteram, Erica alba. Gesner. de collect. stirp. Erica vel Selago. Item in Catal. plant. Erica. Officina Genistella. Genistellæ nomen non placet: Ea enim multum differt ab Erica. Nescio an ab Erica vulgari differat, quàm Gesnerus de coll. stirp. vocat Ericam montanam.

Euch. Roëlin in Herb. Heyd. Erica, Myrica Robert. Constant. in Lexico hanc recipere videtur, cum ait, Herbariorum consensus Ericam esse prodi, quæ vulgò Bruyère.

Matthiol. Erica ab incolis Goritienſis agri Gironne vocata. Dodon. Latin fol. Erica prior. Hist. Lugd. Erica. Matthiol. Dodon. Gall. Cordo in Diofcor. Lonic. & Camer. in Epit. & Hist. Matth. Germ. Erica. C. Bauh. apud eundem Ericam folio Tamarici Erica Diofcoridis.

Cæterum, ex adductis autoribus hanc pro vera ac propria Veterum Erica recipiunt, Corn. Cord. Dodon. Turner. Euch. Roëlin. Rob. Conſt. Matthiol. & Cæsp. Bauhinus. Nos autem Diofcor. & Veterum Ericam asserere non ausimus quia Diofcor. ait *ἡνδὲν ἐν δρυοῖς*, ita excrescens, vt possit dici fruticosa arbor. Nondum præterea obseruauimus, nescimus an competant folia, quæ vult esse Coridi similia. Matthiol. quidem & Cæsalp. Erica meminerunt excrescentis, quæ Scop. dicitur: verum considerandum an bene distinguant à vulgari humili Ericas arboreas. Cæsalpinus sanè dū dicit plures differentias, nostras,

Error Pal-

ladi.

An Selago.

Myrica

Hieremias.

Tamarici

flos

Error Tragi

et.

Hiemale

viride.

Scop.

Descriptio

Cæsalp.

Tabern.

not

Selago.

Genistella.

Erica montana.



Aras arboreas nomine Scopæ potissimum intelligere videtur: Leæ flores, si possunt, in Cæsalpino separant à vulgari & cæteris adiungant.

**Locus & Tempus.** Erica vulgaris abundat circa Montbelgardum. Plantata in horto Ill. E. C. non prouenit. Flore albo aliquando reperi inter Montbelgardum & Bessfordiam, quæ etiam plantata in horto perit. Locus vicinis floret Iunio & Augusto. Basileæ abundat. Circa Geneuam ad montem Saleuæ reperi. Monspelii in Sylua Agremant. Cherlerus Gener attulit ex Alpibus Sphegel. Septentrionalibus, autore Clusio, regionibus maximè familiaris, locis incultis, rariùs in calidioribus profertur. Bis quidem floret, sed maiore ex parte Autumno tantum, licet nonnunquam etiam Vere: Erica folio Myricæ passim multarum prouinciarum solitudinibus obuia, frequentissima per Pannoniam nascitur.

**Vires & Vitis.** Hactenus descriptionem, nomina, tempus & locum abundè diximus, nunc ad vires deuenimus. Recentiores (inquit Fuchs) Herbarii præter anteq. Veterum sententia commemoratas, facultates alias addunt, nimirum florum decoctum, laborum ac ventris dolores, lenire posse. Succum ex foliis, floribusque elicuit, oculis imbecillibus guttatim instillatum, aut locis inunctum conferre. Sicca Erica ingentes Ovium greges saluberrimo poculo nutrit, & à pulmonis, lienis, icterisque obstructionibus præseruat: harum si carnes Galenus gustasset, ait Gorop. inter laudatissimas eas enumerasset. Nec mel quod de floribus legunt apes, tam aspernandum est quam Dioscorides & Plinius scripserunt, Ericæ præsertim flores tumores & collectiones citra caloris alicuius incommodum digerunt. Enceta Scotiæ, referente Jac. Cargillo, præterquam quod in vastis solitudinibus ovium gregibus pabulum præbent, supplem in ignibus fouendis sæpe lignorum vicem. Materiari è terra pulla inculcato stramine ex aqua subacta leuiter, & alternis Ericæ stratis, extrorsum utrinque spectantibus comis, concurrentibus in medio lignosis radicibus, peritos tum casatum culticaram, tum hortorum artificiosè exstruunt, qui vinculo straminis & Ericæ nec pluias metuentes, nec atterentium iumentorum afflicibus concussi in multis annos durant. Aquam è floribus Ericæ distillatam colica laborantibus, præsertim si calor & sitis adsint, vtiliter exhiberi expertus est Tragus. Eadem ruborem oculorum tollit & dolorem illorum mitigat. Quidam è recentibus Ericæ floribus, fomenta & balnea sudatoria faciunt podagricis & paralyticis membris: persuadent namque sibi hoc pacto inueteratos & viscosos humores, unde morbus articulorum oritur, dissolui & discuti. In Hetruria longè magis adolescit Erica, fiuntque ex ea Scopæ aptissimæ ad mundandas ædes. Aquam in qua Erica decocta sit, sumpta tepida tam manè quam vespere, triginta dies quinque viciarum pondere tribus horis ante cibum, valet ad vesicæ calculos comminuendos & expellendos. Verùm post id tempus malè affecti in balneum decoctionis eiusdem plantæ ingredi, atque inibi dum morantur, super Ericam decoctam sedere debent, idque pluries repetendum est. Equidem notui aliquos, inquit Matthiolus, qui seruata victus ratione, hoc tantum potu vesicæ calculum in minimas partes comminutum eiecerunt. Sunt qui ex recentibus Ericæ floribus balneum sudatorium adornent ad podagram, quo affirmant viscidam materiam, doloris articularis causam, dissipari. Camer. Erica ut facie non abudit à Tamarice, ita à multis eodem

modo ad splenem emolliendum & calculum confundendum vsurpatur. Succus dolores oculorum compellit impositus. Foliorum Ericæ succus oculorum imbecillitatem sanat, si oculis instilletur. Meminit, dum Monspelii ageret Clusius clarissimum D. Rondeletium, Regium tum professorem, magno successu vsu fuisse oleo ex Ericæ floribus confecto ad tollendos herpes stodes & iam inueteratos totam faciem occupantes.

Monemus hoc in loco considerandum esse, utrum omnes arboreæ Ericæ easdem facultates habeant, & quæ potissimum ex arboreis Dioscoridis & Galeni sūt. Illud etiam obseruandum præcipimus, ab quæ Matthiolus rescenset de viribus Ericæ, competant arboreæ potius. Clusius vires iam adscriptas subnectit arboreis, non tamen demonstrat, cui potissimum conueniant. Stutgardia pro Ericis cum Bombyces inuadere volunt parietes Erica vulgaris adornant.

Obseruatio

Clusius adnotatur.

Ericæ.

#### ERICA MYRICÆ FOLIO, TOMENTOSIS ET INCANIS FOLIIS, Clusio.

Erica Myricæ folio, prior est per omnia similis, paulò elatior, foliis mentosioribus, & incanis, flore etiam paulò dilutiore, quam Clusius inuenit locis incultis, super Windelstram Regum Angliæ Regiam. Hanc asseruamus inter nostras siccas, ad quam annotatum inuenimus similem huic plantæ esse Anglicanam hirsutam Casparo Bauhino.

#### ERICA FOLIIS CORIOS, FLORE ALBO.

Alterum Ericæ genus, diuerso à superiore est folio: etenim Myricæ folio non respon-

Descriptio



det, sed Coriæ, foliorum formâ & situ admodum æmulatur. Istius autem generis multe sunt species, magnitudine, foliorum & florum formâ, coloreque inter se differentes. Prima igitur omnium quam vnam Clusius conspexit, maxima, humanam altitudinem interdum superat, fruticosa admodum, ligno duro, ex rubro nigricante: foliis exilibus & breui-

bus, quaterno ordine ramos obfidentibus, gustu admodum adstringente: flore copioso, racematim penè totos ramulos occupante, ut interdum maiores rami pedali longitudine onusti conspiciantur: est autem is flos concauus, veluti exiguum cymbalum, oblongus, odoratus, pulcher, albus.

Clus. Hisp. & H. st. post. Erica Coris folio. Erica alterius generis prima, Lusitanis Argera vocata. Lob. Obs. & Icon. Plant. Erica maior flore albo,

Gg 4

prima Clusii. Hist. Lugd. Erica prima omnium maxima Clusii; Erica prima Matthioli, quam nos aliò referimus. Tabern. Erica Clusii.

Locus & Tempus.

Nascitur in Lusitaniæ solitudinibus inter Vlyssipponem & Cq̃nimbriam celebrem eius Regni Academiam. Inueniebam etiam circa Tagum decimo ab Vlyssipponem milliari. Floret Nouembri, Decembri, & Ianuario.

#### ERICA, FOLIIS CORIOS QVATERNIS, flore purpurascente.

Descriptio

Ram.  
Color.  
Folia.  
Flores.

Eiusdem ferè altitudinis cum prima, etiam fruticosa, tenuioribus ramis tamen eiusdem coloris, foliis Corios similiter exilibus, quaternis, ramulos amplectentibus, quorum extremis insident flores oblongiusculi, superioribus similes, colore purpurascens. Tota etiam adstrictioris particeps.

Aequiuoca

Clus. Hist. & Hist. post. Erica Coris folio secunda. Lob. Obs. Et Icon. Plant. Erica maior floribus purpurantibus, & cum Hist. Lugd. & Tabern. Erica secunda Clusii: Dodon. in fol. Erica altera.

Locus & Tempus.

Prouenit iisdem, quibus prima [folio Coris] locis: illà etiam frequentior & eodem tempore floret.

#### ERICA FOLIIS CORIOS QVATERNIS, floribus herbaceis, deinde ex albo purpurascens.

Descriptio

Folia.  
Flores.  
Color.  
Synonyma

Præcedentibus admodum similis, sed paulò humilior: Folia maiora & latiuscula aliquantum, nigrioraque habet, quaternis ordinibus circum ramulos nascentia, flores plurimos per intervalla, secundum ramulorum longitudinem nascentes, superioribus formâ similes, primum herbacei coloris, deinde ex albo purpurascens. Tota etiam adstrictiora facultate prædita.

Clus. Hist. & Hist. post. Erica Coris folio tertia. Lob. Obs. & Icon. Plant. Erica maior floribus herbaceis purpurantibus & cum Hist. Lugd. & Tabern. Erica 3. Clusii.


Locus & Tempus.

Supra Vlyssipponem, frequens inter superiores, pluribus tamen locis occurrit, vt etiam citra Tagum. Floret autem Decembri & Ianuario.

#### ERICA FOLIIS CORIOS MULTIFLORA.

Descriptio

Folia



Inter Ericas meas siccas, est vnà à duabus Monspeulianis arborecentibus diuersa, qualem nullà vidi figurâ exprimi apud Clusium. Huius sanè folia abietina dicas, multis tamè numeris minora, nec enim multò longiora & latiora sunt, quam in Icone Matthioli. In sigtis superiori parte vnà veluti costa apparet, in inferiori duâ, crebra

admodum sunt folia, quæ in ramulis vestigia relinquunt, qualia in Abiete, vel potius Pino relicta cernuntur, ramuli enim non remanent politis illis decidentibus, vt in Monspeliana nostra arborecente, faciliè etiam decidunt, extremitates ramulorum abundant copiosissimis floribus simul iunctis, vltra folia eminentibus, hi flores plures veluti ex paruis nodis erumpunt, è pediculis paruis & tenuibus pendentes, minores quam in Monspeuliana arborecente, maiores tamen quam in ea quæ in Italia à nobis visa, magis etiam hiare videntur, ac ex iis apices multi prominent. Sicca nostra confrens cum omnibus descriptionibus & iconibus cui aptius respondeat, quam Erica à Matthiolo depicta sine descriptione, quam ait sibi missam à Fallopio, nullam video. Quum in similem Ericam incident Lectores, perpendant, an eadem sit, de qua sequentes locuti sunt, vel diuerfa.

Flores.

Clusius in Hist. & Hist. post. hanc videtur tradere pro Erica Coris folio secunda alterâ specie, de qua ait: Non multum ab similibus Ericæ, Coris folio quæ Narbonensi agro frequens, longiore paulò & copiosiore folio, flore purpureo minore & extremis ramulis confertim stipato.

Huius iconem exhibere videtur Matthiol. in Dioscor. titulo: Erica alia, Et in post. com. Ital. & Hist. Germ. Welsche Heyde, Erica Italica. Camer. in hort. Erica maior & procerior Italica, cuius meminisse ait Buchananum in Hist. Scotica, quam ego ad vulgarem minorem refero. Hist. Lugd. Erica altera à Matthiolo depicta, quæ fortasse non minus, quam superior Ericam alteram referat &c. Eius florem apes confectari potius credibile est quam superioris &c. Item postea, secunda Clusii ferè similis est Narbonensi agro frequens, longiore paulò, & copiosiore folio, flore purpureo minore &c. Hæc videtur Matthiol. esse Erica à Fallopio missa. Tabern. Erica secunda Matthioli, Heyde. Castor, ipse Erica, arbuscula non multum differens à Tamarisco, in Tuleia ex ea scopas parant & vocant vulgò Ericam scopariam. Erica secunda ramos habet subtiliores, folia longiora &c. Lob. & Pena Aduers. Erica maior Narbonensium Chamæpythæos folio quam si floridam pedibus truiisset in Italia Matthiolus, nequitiam Fallopio, seu plantam peregrinam acceptam tulisset. Obs. Erica luniperi folio, densè fruticans Narbonensis, Erica secunda altera Clusii, & Matthioli secunda Casp. Bauhin. apud Matthiol.

Erica scoparia.

Matthiol. notatum.

#### ERICA ARBORESCENS, FLORIBUS luteolis vel herbaceis minimis.

Ericam hanc ex argumento arborecentem nominamus: in arborem enim excreuit, ligno duro: folia longiora, quam in arborecente nostra purpurascens: quæ facillimè decidunt: flores lutei, vel virentes, valde parui. Hæc subcisa opera aliquando obiter memoriæ causa antonavimus: quare pleniorum Clusii descriptionem subiicimus. Fruticosa est, duorum cubitorum altitudine, nonnunquam amplior, ligno fragili, foliis tenuibus & minutis, vt in Corrua prima ferè, viridibus, quæ in ramis nonnihil desiccatis faciliè defluunt: istius flos reliquis minor est, caulis etiam & coloris herbacei. Nonnunquam extremis ramulis capitula ex multis foliis compacta gignit, non multum ab similia his, quæ in vulgari & durior Thymo aliquando conspiciuntur.

Descriptio  
Lignum.  
Folia.

Descriptio  
Clusii

Folia.  
Flor.

Clus.




**Synonyma** Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio quarta*, Lusitanis *Vrs* & *Vrquerra*: Hisp. Breco vocata. Lob. Obs. & Icon. Plant. *Erica scoparia*, foliulis item herbaceis. Videndum an ad quartam Clusii *Ericam* sit referenda *Phaus* Græcorum Bellonii Obs. vel ad aliam. Hist. Lugdunensis, *Ericam quartam* Clusii, malè eandem facit cum ea, quam ipsa Hist. pro quarta & depinxit & descripsit. Si quidem quarta Historiæ Lugdunensis, *Erica* Monspessulana flore est purpureo, Clusii autem coloris herbacei. Tabern. *Erica quarta* Clusii Seyde. A. Cæsalpini *Scopa*, granula minuta, non dehiscencia habens?

**Locus** Obseruauimus nos in sylua Aggremont, prope Monspesium, vnde etiam attulit Gener Cherlerus. Recordamur quoque eandem, vel similem, admodum florentem vidisse nos mense Aprilis, in Italia monte Apennino, inter Florentiam & Bononiam. Chaniff. Frater Cals. Bughinus attulit nobis ramulos, Patavii collectos, in monte Rua, in quibus apparent capitula Thymi à Clusio descripti, & ramuli terni & quaterni ordine additis his nominibus *Ficula* Patavii, *Selago* Plinii, *Pirrhæa* Theophrasti Guiland. Gener Cherlerus p.m. attulit Nemauso: cum foliis in capitula glomeratis. Vulgaris est, auctore Clusio, toti Hispaniæ & Aquitanie: namque spatiosis illis solitudinibus & incultis locis supra Burdigalam nullum ferè aliud virgultum conspicitur. Nota est etiam Gallie Narbonensi, scopis faciendis maximè idonea. Veris tempore & sub hyemem floret.

**Capitula**  
*Thymi*  
*Ficula*  
*Patavina*  
*Selago* Plinii  
*Pirrhæa*  
*Theophr.*

### ERICA ARBORESCENS MONSP. FLORE purpurascens ramulis ternis.

**Descriptio**  
**Ramuli.**



**Flores.**

**Descriptio**  
**Clusii.**

**Rami.**

**Folia.**

**Floris.**

**Color.**

**Synonyma**

**E**Rica arborescens ramuli, cuticula tenui cineracea sunt inuestiti, terni, sæpe maioribus circumpositi, foliis non ubiq; præditi, iis tamen Corundæ ferè similibus, longiusculis, tenuibus, deciduis: in ramulorum extremitate flores ex cæruleo purpurascens. satis magni: Placet etiam Clusii descriptionem

subiungere quæ eiusmodi est: Minor hæc est superioribus, cubitali tantum altitudine plerumque, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per interualla ramuli ambiunt, ternis foliis admodum exilibus circa illos disposito quodam ordine & serie nascentibus, flores plurimos habet, superioribus paulo maiores: & confertis circum ramulos longis pediculis inhaerentes, colore purpureo obsole-  
tore.

Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio quinta*. An Hist. Lugd. *Erica* quatuor genus in agro Monspessulano, flore *Ericæ* vulgaris exiguo purpureo: Est autem hæc *Erica quarta* Monsp. non

exactè picta in Historia: an huic referenda sit, vel ad sequentem dubito: quam verò *Ericam* arborescentem flore purpureo voco, optimè quadrat figuræ à Clusio posite pro quinta: aliqui descriptio sextæ non malè conueniunt. Monspeli collectam descripsi. Hist. Lugd. *Erica quinta* Clusii minor, ternis foliis, flore coloris purpurei oboletioris. Lob. Obs. Icon. Plant. & Tabern. *Erica quinta* Clusii.

*Erica* hæc arborescens in montibus Gallie Narbonensis circa *Gangem* & *Esper.* florere visamense Octobri: incultis Lusitanie locis supra Vlyssipponem frequens: florebat isthic Decembri.

**Hist. Lugd.**  
**Icon. Plant.**

**Locus & Tempus**

### ERICA RAMVLIS TERNIS ELORIBVS saturationibus purpureis.

**S**imilis admodum quintæ, paulò tamen humior, neque fruticosa, sed omnes ferè virgas seu tenues ramos à radice proferens singulares, cortice cinereo obduetos, quos ambiunt ordine terna ramulorum rudimenta, seu germina ex multis foliis confertim nascentibus constantia, nigrioris quàm alterius coloris: flores concaui, iam postremò descriptæ floribus formâ similes, colore saturationis purpuræ elegantissimo, è longis pediculis verticillato ambitu per interualla, & è summis ramis dependent.

Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio sexta*. Lob. Obs. *Erica* pumila densè fruticans, calyculato Vnedonis flore: Eadem varians flore albo Icon. Plant. *Erica* pumila calyculato Vnedonis flore. Hist. Lugd. & Tabern. *Erica sexta* Clusii. Hanc *Ericam* aliquando collegi, ni fallor, cum essem Monspeli, pulchram plantam, Attulit nobis etiam Gener Cherlerus ex Gallia Narbonensi. Nascentem hanc conspexit Clusius, in Castella veteri Hispaniæ, tum in Gallia supra Lutetiam, & in Anglia supra Windeforam, mense Septembri florentem.

**Descriptio**  
**Rami.**  
**Folia.**  
**Floris.**

### ERICA RAMIS ET FOLIIS CORYOS ternis, Floribus ex rubro purpurascens maioribus.

**C**ubitali ferè est altitudine, fruticosa etiam & tenuibus ramulis prædita, qui terni semper circa maiores ex interuallis nascuntur: folia similiter etiam terna nascuntur, exigua quidem, sed latiora quàm in reliquis supradictis, in inferiore parte nonnihil candicante, birsuta & gustu adstringente: summi ramuli ad foliorum ex ortus verticillatum exornantur, per interualla ternis semper floribus æquali distantia semper inter se nascentibus, & in vnâ partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concauis, prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurascens, nouem numero, duod. cum, quindecim aut pluribus. Sem. men huic quale in reliquis superius descriptis (exceptis bacciferis) exiguum nigricans.

Est hæc *Erica Coris folio*, Clusio in Hist. 8. in post. Hist. 12. *Lemerintha* Lusitanis dicta. Lob. Obs. Hist. Lugd. *Erica octaua* Clusii.

Fallitur Tabern. qui *Ericam* hanc, septimam Clusii facit. Est enim Clusio in Hisp. 8. in fol. 12. nec enim eam in Pannonicis posuit.

Idem cum *Erica baccifera* Lusitanica Lusitanie arenosis locis crescit vtpurimum. Floret Octobri mense, & subinde semen exiguum, nigricans profert.

**Descriptio**  
**Ramuli.**  
**Folia.**  
**Floris.**

**Color.**

**Synon**

**Locus & Tempus**

ERICA POLIUS CORIOS FLORE PUR-  
pureo dilutioris coloris.

**Descriptio** **Rami.** **Folia.** **Flosculi.** **Semina.**  
**M**ultos teretes humique procumbentes ram-  
 mos habet, pedales, interdum etiam cubi-  
 tales, ex atro purpureiscentibus. Hos plurima graci-  
 lia ambiunt foliola, Tertiz foliis penè similia,  
 paulò tamen longiora, quaternis plerumque, interdum  
 quinis versib. ordine disposita, adstringente gustu:  
 flosculi in sumis ramulis oblongi, concaui, purpurei  
 dilutioris coloris, ex quatuor foliolis eiusdem fe-  
 re coloris prodeuntes, qui maturi & resiccati, ni-  
 gricans & minutum semen continent: radix du-  
 ra, lignosa, in diuersa tendens, ipsi tamen pro-  
 cumbentes rami, humique diffusi, tenues, capil-  
 larésque fibras nonnunquam agunt.

**Locus & Tempus.** Copiosè admodum crescit supra Seehoff in  
 ascensu Berrenalben magno miliari Germanico  
 supra Garingam: inueniebam etiam inter saxa &  
 scopulos in ipsis Durnstein/ Seecalben, atque a-  
 liarum Styriacarum & Austriacarum Alpium pre-  
 altiusiugis, ubi Iunio & etiam serius floret. Inter  
 Pragam & Nonibergam etiam Iunio florentem  
 colligebam.

ERICA BRABANTICA FOLIO CORIS  
HIRSVTO QVATERNO.

**Descriptio** **Locus** **Virga.** **Folia.** **Flores.** **Tempus.**  
**H**aud multum ab Erica ramis & foliis Co-  
 rios ternis, floribus ex rubro purpureiscenti-  
 bus, foliarum formà differens plerisque Bra-  
 bantiz & Geldriz locis crescit: nonnullis item  
 Castellæ veteris, præsertim circa collem, *la pen-  
 na de Francia* vulgò appellatum, in quo Mo-  
 nasterium Duæ Virgini sacrum, pedibus so-  
 luummodò fruticans virgis, tenuibus, ex ruo  
 nigricantibus, frequentibus eas cingentibus foli-  
 is, quaterno ordine dispositis, superiore ordine  
 angustioribus & Thymi vulgaris minoribus, hir-  
 sutis tamen & pilosis: summis ramulis plerum-  
 que dependet. quini aut sen flores simul iun-  
 cti, Lili conuallium floribus similes, paulò ta-  
 men oblongiores, neque aded ventricosi sicut  
 priores flores, coloris vt plurimum ex rubro  
 dilutius purpureiscentis, interdum etiam albi. Flo-  
 ret Vere & Autumno.

Clus. in Hisp. Erica Coris folio nona: in post.  
 Hist. decima tertia.

Dodon. Gall. Erica altera, Erica sine dubio  
 species minor. Lob. Obs. Erica pusilla altera Belgarum,  
 nona Clusii. Hist. Lugd. Erica tertia Dodonæi:  
 Erica alia humilis, ex quibus scopæ Gallis fiunt.  
 Item postea Erica nona Clusii. Ast fallitur Hist.  
 Lugdun. vocando hæc tertiam Dodonæi Gallici,  
 cum duas faciat tantum species.

ERICA PARVA FOLIIS CO-  
RIOS QVATERNIS, FLORE HER-  
baceo, foliaceis ca-  
pitulis.

**Descriptio** **Folia.** **Flores.** **Radix.**  
**P**edalem altitudinem raro superat, magna  
 ex parte humi procumbit, foliis quaternis,  
 ramulos contrario exortu semper ambientibus:  
 flores secundum ramulorum summam lon-  
 gitudinem inter folia dependent, cani, pusilli,  
 in quatuor angulos desinentes, herbaceo colo-  
 re præditi, deinde semen. Radix etiam dura &  
 lignosa.

**Synonyma** Clus. in Hisp. Erica Coris folio quartæ alia spe-  
 cies minor. In Pannon. Ericatertia. In Hist.  
 post. Erica Coris folio 8. Lob. Obs. Erica altera  
 Clusii superioribus minor, cubitali tantum alti-  
 tudine. Hist. Lugd. Erica quartæ Clusii similis

sed minor, flore herbaceo.

Maximè copia nascitur in ascensu montis illius, **Locus & tempus.**  
 qui superandus est iis qui Garinga ad Seehoff/  
 vicinæque loca proficisci cupiunt, quo loco &  
 florentem & foliacea capitula proferentem Au-  
 gusto mense collegit Clusius, nusquam alibi sibi  
 conspectam. Quartæ genus esse videtur pumi-  
 lum.

ERICA PARVA PANNONICA, FOLIIS  
CORIOS TERNIS, FLORE CARNEO,  
capitulis Thymi.

**Descriptio** **Virgula.** **Folia.** **Flosculi.** **Semina.**  
**A**equali cum priore hæc excrescit altitudine  
 [pedali,] tenuibusque virgulis prædita, **Descriptio**  
 humi diffusa, ex purpureo nigricantibus, quæ  
 summa parte in multis plerumque ramulos di-  
 uidi solent: folia in ordines & versus digesta, vt  
 in reliquis, tenuia admodum, Ericæ sextæ in Hi-  
 spania & Gallia nascentis foliis similia, ternasem-  
 per, quemadmodum in illa, æquali inter se situ  
 ambiunt: summi ramuli onusti sunt concauis &  
 oblongis flosculis extrema parte in quatuor an-  
 gulos sectis, coloris cum quatuor illis foliolis  
 vnde enascuntur, carnei, octonis staminibus ni-  
 gricantibus, styloque purpureo: hæc è medio  
 flosculo emergentibus: semen maturitate nigri-  
 cans exiguum habet: radicem alii similem ligno-  
 sam. Adnascuntur interdum huius etiam ramu-  
 lis viridia capitula, è latioribus foliis compa-  
 cta, capitulorum Thymi modo. **Capitulum.**

Clusii Erica Pannonica quarta, quam in post.  
 Hist. nonam facit, inuenitur apud arcem Strib-  
 stein in sylua illi imminenti, quæ ad Sineberg ex  
 arce iter est, alia item ad sinistram oppidi Veu-  
 firdi syluâ, & nonnullis montanis Pannoniæ  
 syluis. Floret vt plurimum April & Maio, quo  
 tempore aspectu iucundissima est.

Eandem si fallor olim inueni in monte Rha-  
 tiz Nombret & Burmij: frutex erat parvus vt Erica  
 Vngarica, flores cærulei mense Iunio. Tunc re-  
 posui nomine Chamæpeuces. **Locus & tempus.**

Erica tertiz Corusii nomine ex montibus  
 Heluetiæ fruticem valdè paruum attulit Frater,  
 Erica Rhatiz similem, si non eandem: folia si-  
 quidem similia, creberrima, labiufcula, glabra:  
 cauliculi non apparent ita albicantes: flosculi et-  
 iam multò minores, herbacei, qui nondum ex-  
 pansi videntur. **Chama-  
peuce  
Erica 3  
Corusii**

ERICA ANGLICANA PARVA CAPI-  
TVLIS HIRSVTIS.

**Descriptio** **Ramuli.** **Folia.**  
**E**ricæ nomi-  
 ne siccam  
 accepimus plâ-  
 tam, à Domino  
 Petro Turnero  
 Anglo. Totà  
 pulchella, vix  
 dodrantalis, ra-  
 muli tenues,  
 multi: folia  
 admodum bre-  
 uia, crebra, in  
 ambitu hirsuta,  
 ex modicis in-  
 tervallis ceu  
 geniculis terna  
 vel quaternariò  
 summitate ca-  
 pitula hirsuta.





ERICA PEREGRINA BRANCIO-  
NIS LOBELII.

Locus.

Folium.

Flosculi.



tem, peregrinam appellavit. Est & altera Erica  
Lobelii, de qua vide Obser. pag. 623.

ERICA FOLIIS CORIOS AFFI-  
NIS PLANTA.Descriptio  
Folia.

ERICA ramis & foliis Corios tetrinis, floribus ex  
affinem, Lugdunum ex Hispanis à Barone Ger-  
mano allatum vidimus: descriptionem. a. quam  
tum concepimus, adponimus, ne quis fallatur,  
si diuersa esset fortè planta: Folia igitur satis cre-  
bra sunt parua, quodammodo Erica Monspe-  
liensi similia, sensim latiuscula euadentia, su-  
pernè viridantia, pilis paucis ac minimis pube-  
scentia, infetnè incana, nonnihil adstringentia,  
non sine aliqua acrimonia: Verùm illa foliorum  
crebritas non est perpetua: quidam enim ramuli  
cum paucis foliis producuntur, quibus insident  
aliquot pulchri flores, sursum spectantes, satis  
magni, in medio nonnihil aperti.

Flores.

## TAMOXO VFFRUTEX CLVSIO.

Vffrutex quem Hispani, auctore Clusio, Ta-  
moxo appellant, assurgit pedali altitudine, fre-  
quentibus ramusculis præditus, qui foliis adeò  
exiguis & confertis onusti sunt, vt nullum ferè li-  
gnum conspiciatur: ea ex cinere virescunt, &  
extremæ sunt amaritudinis. Caterùm in incultis  
nascitur.

FINIS LIBRI DECIMI









# HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM, LIBER VNDECIMVS.

(649)

ARBORES, FRUTICES ET SUFFRUTICES SILIQVOSI, ET LEGV-  
MINOSI FLORIBVS, SPINIS CARENTES ATQVE SPINOSI,  
AC HIS QVÆDAM SIMILES.

**P**ERSTAREMV in Arborum historiâ, si non & Fruticum, & humiliorum Suffructicum consilium  
naturâ egiſſet tranſierit. Proximè dicantur noſtrates poſſimian ſiliquoſi, quibus ſi non omnibus ma-  
gnitud., ac fructûs congeneris faciès & nomen eſt conſimile, aut certè proximum: iis proinde ſimul  
redactû, unus limes præſtituatur, iidem cancellis circumſcribantur, ut ſub ſiliquoſarum tribum meritiò  
conducti videantur.

LABVRNV, ARBOR TRIFOLIÀ ANAGYRIDI SIMILIS.

CAP. I.

Deſcriptio

Folia

Florès.



bina à lateribus, quartum noſtratum pallidum, in  
quo apices croci, complexu ſuo coercent. Nul-  
Tom. I.

lum in hoc fertorem ſive foliis, ſive floribus, ani-  
maduertimus.

Arbor hæc fruticoſa eſt, aut frutex arboreſcens;  
inquit Solerius de Cytiſo tractans, trium quatuor-  
ue vlnarum altitudine, caudice non admodum  
cræſſo, ramis hinc & inde diffuſis. Nonnun-  
quam fruticoſa tantùm ſpectatur (quia plerumq;  
cæditur, & Coryli modo ab imo caudice reger-  
minat) ſtolones innumeros ab vna radice fun-  
dens, longos rectos, ex viridi candicantes, Vi-  
ticis virgis ſimiles, ex quibus per certa intervalla  
erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia,  
Viticis foliis ſimilia, lævia, ſupernè viridia, infer-  
nè candicantia. Ex ramis prope foliorum pedicu-  
los emergunt flores lutei, & quales flores Geniſtæ  
aut Braſſicæ, longis pediculis inæqualiter depen-  
dentes, rariore que illa ac prælonga textura cubi-  
talem æquantem longitudinem, apibus ingrati.  
Floribus decuſſis ſuccedunt cornicula, ſiliquæ  
ue, piſorum hortenſium ſiliquis ſimiles, compref-  
ſiores, ſtractu contumaces. In extremis ac non-  
nunquam intermediis ſpatiis continetur ſemen  
Lentis magnitudine, ex latitudine ſubrotundum,  
imo loco quâ ſiliquæ per petiolum hæret, tantu-  
lum excauatum, renis præſus effigie, quod ante-  
quam maturuſcit viret, poſt maturitatem va-  
rium, durum, & ob lævorem ſplendidum.

De hoc Plinius. Alpina hæc arbor eſt, nec vul-  
go nota, durâ ac candidâ materie, cuius florem  
cubitalem longitudine (floris cubitalem longi-  
tudinem, alijs) apes non attingunt: odit aquas.

Cord. in Hiſt. ſub Trifolia arbore, Laburnum  
H h

Plin. de  
Laburno.  
Materiet.

Trifolia  
arbor,

*Cytisus*.  
Laburnum.  
anagyris.  
laburnum.

*Heloni* (e-  
canda spe-  
cies Theophr.  
Locus.

*Anagyris*  
Alpina.

Locus.  
Rubi dura-  
biles

*Apes non*  
ta. (misi.  
Arcus.

*Anagyris*  
altera mi-  
nor montana.

*Matth.*  
Non *Cytis*  
genus

*Eghelus*.  
Contra

*Anguillaria*  
non esse E-  
benum.

*Matthiolus*  
notatur.

describit, cui quidem iconem apposuit, ibidem-  
que annotavit, *Cytisum* quorundam esse, *Labur-*  
*num* Plinij, & *Anagyris* alteram maiorem *Matthioli*.  
*Laburnum* Plinij, multi volunt esse plantam in  
locis Italiae dictam *Eghano* & *Giegano*: verum eo-  
rum opinioni non assentitur *Anguillaria*, sed po-  
tius dixerit *Hebeni* secundam speciem *Theophras-*  
*ti*. Omne siquidem *Hebenum*, quo Venetiis vitatur,  
sit ex medietullo huius *Eghani*, quod adferatur  
ex Syria & Cypro, quodque hodie adhuc vocetur  
*Heberum*.

Gen. hort. *Anagyris Alpina*, *Laburnum* Plinij.  
*Laburnum*, inquit *Belloni*, de neglect. cult., quod  
Galli *Auburni* vocant, adeo abunde nascitur om-  
nibus montibus atque Alpibus, *Diclaudi*, *Cham-*  
*bergi* & *Lausanne* vicinis, ut rustici palis ex eo con-  
fectis suos agros septiant, nam materies est dura-  
bilis. Iam nonnullis hortis vulgare est, sed non  
sine errore *Cytisum* nuncupatur (aliunde enim  
*Cytisum* fermen nobis comparavimus). Florem ha-  
bet cubitalem, flauum, quem apes nunquam at-  
tingunt. Ex eius materia fiunt arcus nigri, tergore  
aibi.

*Matth.* in *Diosc.* *Anagyris altera*, *Anagyris minor*,  
*Anagyris montana*, *Eghelo*, non *Laburnum* Plinij, nec  
*Cytisum* montanum genus, ut vult *Gesnerus*. Idem  
miratur *Gesnerum*, in suo libro quadrip. ubi con-  
tendit arborem, quam rura *Tridentina Eghelum*  
vocant, esse *Laburnum*, non fuisse memorem illo-  
rum verborum, quibus paulo ante asseruerat *De-*  
*moerati* testimonio, apes nunquam defore, *Cyti-*  
*si* pabulo contingente. *Anguillariam* etiam in  
posse com. Ital. & Lat. reprehendit quod mino-  
rem *Anagyris*, quam *Ananienfes Eghenum*, vel  
*Eghelum* vocant, vocis tantum similitudine fretus,  
secundum *Ebeni* genus (rudenda sane opinto-  
ne) *Theophrasti* esse censet. Cum *Eghenus* sac-  
tidissima sit planta. Ex verbis autem *Matth.* cli-  
satis apparet, ei non notum fuisse discrimen inter  
*Eghenum* ipsum, siue *Anagyridem* alteram, & ve-  
ram *Anagyridem* in *Egheno* etiam nos fectorem il-  
lum, quem ei adhuc in *Hist. Germ.* adscribit, non  
animadvertimus.

*Camer.* ad *Epit.* *Matth.* iconem nouam addi-  
quam etiam retinet in eisdem *Hist. Germ.* cum  
hac censura est *Author* (*Matthiolus*) duas *Ana-*  
*gyridis* species faciat, *Veteres* tamen vnus dun-  
taxat meminerunt, cuius folia forteant: alterius  
vero *Anagyridis* *Matthioli* folia nequaquam for-  
teant, & hyemem apud nos in hortis perfert, & à  
nonnullis, ut *Colutea*, *Welschlinfen* appellatur,  
propter semen. Sunt qui velut *Anagyris* alte-  
ram *Laburnum* esse Plinij, & mea quidem senten-  
cia, ait in *Epit.* non aberrant, cum hie digni, rei-  
que herbarie peritiss. se in monte *Iura* cubito longiores  
florum racemos inuenisse referant.

*Anagyris* altera siue minor, Græcè ἀνὰ πύλιν τρι-  
φυλλ., Ital. *Anagyris minore*, *Ananienfis* in agro *Tri-*  
*dentino*, *Eghelo* dicitur & *Auernello*: & hinc ait  
*Dodon.* Gall. *Laburnum*, non *Anagyris* aut *Lo-*  
*tus* est, ut quidam existimarunt. Et Lat. in fol.  
*Eghelo*, frutex *Anagyris* haud multum dissimilis,  
non raro arborefcens: folio Trifolij: floribus lu-  
teis, racematim palmi longitudine digestis: fili-  
quis ac semine, uti *Anagyris*: frutex ipse non  
modò graui, sed omni destitutus est odore.

*Cast.* Dur. *Anagyris minor*. *Lobel.* & *Pena*  
*Adv.* Minus fectentem *Anagyridem*, vel *Laburnum*,  
seu *Anagyridem* non fectendam nonnulli autu-  
mant esse *Laburnum* Plinij, quod valde verissi-  
mum. *Lob.* *Obf.* & *ic. Plant.* *Anagyris* minus fæ-  
tens. *Cytisus* secundus *Theophr.* *Guillandino*.

*Tabern.* *Baumbonen*, *Anagyris* secunda. Malè  
*Lonic.* *Laburni* figuram ponit pro *Medica*: & *La-*  
*burni* *Italicum* nomen *Eghelo* tribuit *Anagyri-*  
*di*.

Arborem eam quam ab Alpium & montium  
serpionum *Delphinatus* & *Sabaudia* vmbroso-  
rum & silvorum, sæpiusque siccorum indige-  
nis, voce ex *Laburno* detorta *Albour* & *Aulbour*  
nuncupari, scribit *Dalechampsius*, rectè Plinij  
*Laburnum* esse putat, quamvis *Matth.* *Anagyris*  
*Diosc.* esse existimet: Cum *Anagyris* *Dioscor.* sit  
perquam graui odore frutex, *Laburni* nostri, nec  
flores, nec folia forteant: Illius semen in corni-  
culis longis (in *varietis* *quaguis*) huius in breuib.  
contineatur: Folia maiora, latioraque habeat  
quam *Anagyris*: cum Alpina sit arbor, materie  
durâ, ideòque palis apta, nec flores eius apes at-  
tingunt, quæ nullus *Anagyridi*, at *Laburno* certè  
Plinij tribuit, quæ hic depictam arborem non  
*Anagyridem*, sed *Laburnum* esse testantur.

In eadem fuit sententia *Cordus* & *Gesnerus*  
quam reprehendit *Matthiolus*. *Laburni*, inquit,  
materies à Plinio candida describitur, non con-  
tra medullitibus nigra, corticetenus lutea, modo  
*Guaiaci*, qualis *Eghelo* materies cernitur.

Ad hæc *Eghelus* arbor est omnibus ferè cog-  
nita, ut de *Laburno* refert *Plinius*. Iam verò *Egheli*  
flores, qui in arbore ramorum instar pendent, pal-  
mi longitudinem non excedunt, quos *Laburno*  
*Plinius* cubitales tribuit. Postremò, illud experi-  
entia compertum, quòd *Apes* *Egheli* flores non  
aspernantur. Hæc sententiam nostram labefacta-  
re, aut infirmare non possunt. *Laburnum* enim  
hic *Matthiolus* accepit, quod secundum seu mi-  
nus *Anagyridis* genus ipse constituit, quòdque  
rura *Tridentina* vocant *Eghelo*. At quod *Gesnerus*  
*Laburnum*, quòdque nos intelligimus, primum  
est à *Matthiolo* positum ac depictum *Anagyridis*  
genus, ut ex pictura apparet, & quod maius ap-  
pellat, ut paulò ante indicauimus. Huic omnia  
quæ adscriptimus optimè conueniunt, minimè  
verò ea quæ secundo *Anagyridis* generi ipse ad-  
scripsit. Quod si nostra *Gesnerique* sententia *La-*  
*burnum* Plinij sit ea arbor quam hic proponi-  
mus, & quam *Matthiolus* pro primo *Anagyridis*  
genere depinxit, Cur non secundum eiusdem  
*Matthioli* *Anagyridis* genus, alterum etiam *La-*  
*burnum* iure dicitur, cum similes natales habeat,  
foliorum figuram, situmque similes, vires ferè  
easdem, ac materiam similiter duram?

*Maio* & *Junio* mensibus grato in montibus  
spectaculo florèt. Micat enim aureo flore, primo  
*Anagyridis* siue *Laburni* nostri generi simili: foli-  
o est non fectente, nec ingrati saporis, Trifolij  
pratenfis ferè. Huic cornicula prodeunt *Genistæ*  
æmula, in quibus semen continetur, feminis  
eiusdem *Genistæ* magnitudine, sed oblongum,  
*Phaseoli* modo, colore subnigro.

*Matthiolus* igitur duas *Anagyridis* species de-  
pinxit, quas non *Anagyridis*, sed *Laburni* spe-  
cies esse ita demonstrauit *Dalechampsius*. Verùm  
duo *Laburna* esse vix puto, sed duas figuras v-  
nius *Laburni* apud *Matthiolum*, qui confudit  
meo iudicio *Anagyridis* historiam cum *Labur-*  
*no*.

*Arbor Iude* videtur quibusdam esse vel *Labur-*  
*num*, vel eius species: à *Laburno* tamen pluri-  
mum differt, quoniam *Laburnum Alpina* est ar-  
bor, flore nonnunquam cubitali, quæ arbori Iudæ  
non conueniunt.

*Laburni* semen missum mihi fuit *Stutgardia*, Locus &  
nomine *Schwartz Linsen*, quod optimè proue-  
nit in



nit in horto Ill. E. C. Montisbelgardi: excrevit in mediocres arbores, quarum truncus ad crassitudinem cruris, quæ hiemem faciliè tolerant. Observavimus cum effemus Genevæ in monte *Salève* & *Thuyris* florens Iulio: In itinere Genevæ Lugdunum inter *Gardon* & *S. Jean le vieux* in Sabaudia florens Aprilis: Patavij in horto publico. Bononiæ in montibus Apenninis, vbi mense Aprilis flores nondum erant aperti; in itinere Florentiam. Parmæ florens in horto Nobilis Antonij Lafacæ: in montibus circa *Clareval* Burgundiæ: Basileæ in horto D. Fælicis Plateri: Lugduni habuit in horto ex seminibus satis: Huius semini missum à D. Rasso Lutetiâ, nomine Laburni, & à fratre C. Bauhino cum hac inscriptione: *Anagyris seu Lingua avis horri Fulsari*. D. Christoph. Schwartz præfectus Ill. Ducis VVirttembergici misit mihi nomine Lori arboris.

Cum essem Patavij D. Presburger annotarat esse Laburnum Plinij, Ebenum & Cytisum secundum Theophr. Guilandino. Omnia posse præstare quæ *Anagyris* scribit Math. Camer. verò dicit odore mures occidere, ac plantæ cinerem ad calculum commendari. Verùm cum hi illi odorem ingratum tribuant, & nostrum Laburnum eo destituatur, iam ambam vires miserè confundere videntur. Sæpenuerò Laburnum, ob Ligni ducitatem & nigritatem pro Ebenò vānit, ex quo pulchræ sunt pectinum thecæ.

## ANAGYRIS VETERIBVS.

## CAP. II.

*Anagyris* quæ alij *Andryver*, alij *Andryon* [Orbas. *Andryon*] vocant autore Dioscoride frutex [dicitur] est arboris instar, foliis & virgis virgatis [dicitur] assimilis, [dicitur] perquam gravis odore: flore Bracticea, [dicitur] Plin. Oleris] semine longis coriiculis [dicitur] renibus figurâ simili, versicolore ac solido, quod uva maturefcente durefcit [dicitur]. V. 773, 774, alius h. 2, 774, 775. Inter Notha, si dicitur *Andryon*. *Anagyris* Plinio quam alij *Acopon* [Acorionem] vocant, frutesca est, gravis odore, flore oleris: Semen in corniculis non brevibus gignit, simile renibus, quod durefcit [uva maturefcente Diosc.] per menses in quibus cum Diosc. consentit: Nihil enim refert, an per menses, an uva maturefcente semen durefcere dicat. Caterùm, *Anagyris* odore tetro [Anagyrtin mures, *Andryver* mures] peperit, contra cum, qui in suam ipsius perniciem quæpiam irritat, vt ob futura commoveat, & libripfi malorum auctor sit. Vnde verò dicta sit paræmia variè narratur ab autoribus. Alij ad fruticis naturam referunt, cuius hic sit mentio, quem *Magyrum* quidam appellant: nonnulli *Acopon*: medicamentis quidem efficacem, verùm odore maiorem in modum gravi: maximè si manu teratur: cuius fructus gustatus vehementem vomitum promovet. Vnde vel ab odoris molestia, quæ carpentem consequitur, adagium ductum videri potest (quandoquidem & *Acopi* vocabulum indidem apparet repertum) vel à concitandi vomitus efficacia. Sunt qui dicant *Anagyrum* locum esse in Attica, qui ad tribum pertineat Erechtideum, auctore Stephano, vbi frutex quidam gravissimè odoris plurimum proveniat: vt *Anagyrum* pro frutice non fecus accipiamus quàm *Anticyram* pro Elleboro. Rursum alij *Anagyrum* genium quendam existimant, qui propter

violatum facellum suum vicinos omnes funditis everterit. atque huius adagij mentionem fieri apud Aristophanem in *Lylistrat*.

Cur autem *Anagyridem* alij *Acopon* vocaverint, non satis certam Marcellus, ex nominis interpretatione & vi rationem habet. *Acopo* enim communi nomine à Græcis cuncta illa remedia dicta sunt, quæ contra lassitudines in antiqua Medicina conficiebantur: sic dicta quoniam contra labores [dicitur], lassitudines sive defatigationes] in usu essent.

Appellatio autem hæc *Anacopos* [Agnacopos] ex vitice [Agnos] & *Acopo* facta est: quoniam Vitis virgas *Anagyris* habet.

Rob. Const. in Lex. *Andryver*, & *Andryon*, & *Andryon* Diosc. & Gal. *Andryver* Suidæ (quamvis Nicander aliter) *Nautea* apud Plautum & Fellum: *Anagyros* Plinij. Sed non possum satis mirari, quid velit Constantinus, quod *Anagyrum* faciat herbam, ac eandem quam *Anagyrtin*, & remittat ad *Anagyrtin*, de qua antè egerat, quæ non est herba, sed frutex arborefcens. Cur etiam *Anagyrtin* dicit esse *Nauteam* Plauti & Festi: auctorem non habet, cum Plautus manifestè dicat herbam, vt sub *Nautea* monstrabitur, in cuius descriptione nihil commune cum *Anagyride*. *Onagris* etiam Nicandri, non respondet *Anagyrti*, cum sit ferrata. *Anagyris* frutex trifolius, fœtens, malè existimatur & dicitur quibusdam Laburnum. Considerandum etiam quam plan- tam pro *Malva terrestris*, genere pedis Columbinij, quod Pandeet. *Anagyron* Gal. 6. simpl. vocari scribit, intelligat. *Anagyris* Ruellio Recentioribus *Malva terrestris*, quod humi *Malva* modo jaceat, dicitur, rusticis *puridum lignum*. Quid Ruell. *Malva* & cum eo Gorrh. Ryff. & Gesnerus intelligant per suam *Anagyridem* considerandum: Omnia, quæ scribit præter modò dicta sunt conscrinata ex Plinio & Diosc. ac Hermolao: Quod ait humi jacere suam *Malvam* non convenit cum *Anagyride* vera: Si per rusticos, suos Gallos intelligit, nec etiam convenit: *Anagyris* enim non est vulgaris in Gallia, vt ei rustici proprium nomen indere potuerint.

Ignorant Officinæ *Anagyrtin*, inquit Corn. nec satis inter Herbarios constat de ea: nam qui *Malvam* terrestrem vocant, eos ego penitus nihil docere puto: Quæ verò planta vulgò *Lignum sœridum* dicitur, ab *Anagyrti* longissimè differt. Quæ planta sit *Lignum sœridum* perquirant lectores. Caterùm *Anagyris* Cornariæ est, quam vocat Scheyßberbaum / de qua sub *Alno nigra* Hist. g. lib. 5. vbi ostendimus absurdam esse opinionem.

*Onogyrum* Nicandri quidam interpretantur *Onagyrtin*, cum tamen non respondeat, vt dicitur capite de *Onogyro*.

*Nautea* sunt qui existimant eandem cum *A. Nautea*, *nagyride*, vt postea dicitur, sub titulo de *Nautea* cum tamen sit herba diversa.

*Anagyrtin* voluerunt quidam esse *Vulvariam*, quàm *Attriplicem sœridam* nominamus.

*Anagyrtin* sunt qui putent *Evonymum*.

## ONOGYROS.

HERBA asperfa & spinosa *Onogyros* Nicandri, cuius usus aduersus venena, vt inquit Rob. Const. in Lex. aliàs *Andryon*, & *Andryon* Suidæ, & *Nautea* Plauto cognominatur. Præscribit

Contra  
Phaenon

quidem Nicander ad arcendos serpentes à decubentibus sub dio, in circuitu spargendum Onogryon. Onogryum uero exponit Anagryum, idem etiam facit Phauorinus, ut patet ex precedentibus. Verum quod ait *εὐαρεῖον*, & glossa scho-  
liasta, non convenit cum Anagryde frutice ar-  
boris, cui folia nec serrata, nec spinosa, nec as-  
pera. Veteres qui recensere medicamenta ex  
Nicandro, ut Paulus, non meminerunt Anagry-  
ridis. Nescio etiam an serpentes abhorreant ab  
Anagryde, facile tamen crediderim. Plinius qui-  
dem scribit folia in vino vetere bibi ad Phalangi-  
norum morsus.

Onogry-  
on  
quod vocati-  
on.  
Onogryos  
Nicander  
Anagry.  
Chamaepi-  
tyl.  
Oman-  
gria.

Onogryos Nicandro serrata, & eius Scholiasta  
Græco *ὁς ἀκανθώδης*, quis sit nondum mihi constat.  
Anguill. sententiâ posset esse Onopordum Athe-  
næi, de quo agemus lib. 26. sub titulo Acanthij  
Illyrici. Anagrus Phauorino, & aliis, ut antè di-  
ctum, est eadem, quæ Onogryos: eam autem  
opinionem iam refutauimus. Nicandri interpres  
exponit, *ὀνόγρυον*, *χαμαεπιτυν*, *καὶ ὀνιδρυγίαν*, sed  
ineptè.

#### AB ONO SIVE ASINO DENOMI- NATÆ PLANTÆ.

Onogryos  
æc de adu-  
gri.  
Vni asini  
fita.

**P**ER MULTA sunt plantæ, quæ ab Ono, siue  
Asino nomen habent, inter quas Onogryus,  
quam alii Anagryum vocant. Sed ego Onogryon  
Nicandri existimo diuersam ab Anagryde, ut  
iam dictum. pro quo diuersæ proponuntur plan-  
tæ: Inter vnas damnantur visu cinerea & rubus-  
cula & *asimifera*, à colore nimirum dicta: cui fortè  
eadem fuerit *ἐρίων* Varino memorata. *Asinifera*,  
Macrobio, si benè meministis Gesn. de quadrup.  
inter Ficuum genera nominantur. Brunsfels. O-  
nom. *βίος*, Ficos Tarentinas prædulces nominat.  
Sic Gesn. Quadr. *Præma* seriora maioraque *asinina*  
cognominata à vilitate, eodem colore, quo Hor-  
dearia Plinii: item *onocoridas*, Gallas, quæ  
grandescunt, de quibus Gallis lib. 7. sub Quercu.  
De *ποπόζα* verò, seu Buxo *asimino*, folio & caulis  
spinoso, pro quo diuersa genera Carduorum pro-  
ponuntur, scriptum hist. n. g. lib. 26. Onocardi-  
on, inquit Gesn. Quad. Dipterus intelligitur  
(quasi *asimius Carduus*) Diptarum nonnulli etiam  
virgæ pastoris vocant & Lactucam asini cum ea  
confundunt. Onopordon herba Plinio, *Onomordon*  
corruptè apud Hæsch. Rob. Const. Anonin, qui-  
dam *Onomida* malunt vocare. Onocichla Plinij in-  
cognita, de qua agemus lib. 13. inter Anchusas,  
ubi etiam scribitur de *Anchusa* & *Ancholo*, *Onocichla*,  
& *Onosmate*. *Onophyllon* eadem Anchusa est, quæ  
Arabice linguæ Autocibus etiam *Asini Lactuca* voca-  
tur. Anchusam quoque ipsam Græci *Onocleam*  
vocant. *Onoblarum* Hisp. herbam linguæ similem  
Gal. inter eas refert, quæ ab Asino nominantur,  
tradetur verò hist. n. g. lib. 35. sub titulo Sedi,  
siue Aizois. De *Onopteri* Tabern. l. 37. de Adian-  
tho nigro. Auriculam Asini, Galli quidam vo-  
cât *Symphycum* alterum, Sabaudi Lotum pratensis  
panè Asini. Onitis inter Attributa Dioscori ponitur  
de Apocyno, de qua hist. n. g. lib. 15. Sic Onomar-  
dia de Helxine: Asini sanguis. Egyptiorum, de  
Filice: Asinus Ichrei Magorum de Sampsucho.  
Asini nomen præ se ferre Onitidin, Origanum spe-  
ciem, annotauit Gesnerus Quad. lib. & Nican-  
dandum vocasse *ἰσπεταλέον*, de his autem agimus  
Hist. n. g. lib. 28. cap. de Origano, ubi tradentur  
diuersæ plantæ, quæ onitides existimatae fuere.  
Onoselinum, Cerefolium silvestre, Tabern. An  
Anticifus quorundam Gesn. Quad. Onobrychi-

Ficus.

Pinna.

Galla.

Onopord.  
Carduus.

Declarus.  
Vigna pa-  
storia  
Carduus  
Onopordon  
Anagyris.

Anchusa.  
Onosma.  
Onophyl-  
lon.

Seda, siue  
Aizois.  
Adiantum  
nigrum.  
Symply-  
tum.  
Apocynon.  
Lotus par-  
tensis.  
Helxine. Fi-  
lix.  
Sampsu-  
chus.  
Origanum  
An. Antif-  
us quoru-

dem Dioscoridis refert ad plantas, quæ nomen ab  
Asino habent: Verum pro ea plurimæ & diuersæ  
plantæ perhibentur, de quibus scribimus Hist. n.  
g. l. 17. Viticam marinam Galli vulgò vocant *Cul-  
d'asne*. Græci hodie *Colicenam*. Lingua Asini est  
planta, habens folia rugosa non magna, & radicū-  
las odore ligni Cupressi fragrantibus, silvaticas. *Onu-  
rus* Gelsneri aliàs *Onothera* dicta Plinio, vel *Oni he-  
ris*, *Oenothera*, *Anagria*, *Oinobrychis*, *Onobrychis* & *Ona-  
græa*.

#### NAVTEA.

**N**AVTEA communis consensu authores  
Hermol. & Ruell. (qui eadem quæ Hermol.  
de verbo ad verbum suo nomine habet) Bened.  
Curt. de hortis, Car. Steph. in frut. aiant cum Festo  
esse herbam fetidam ac gravem, quæ Coriarij vo-  
cantur. Nomen tamen, ut videre est apud Th. Lau-  
rum linguæ Latinæ, & Alcium in Lexico Plau-  
tino, Nautea est aqua de coriis, vel (quod verius  
est) aqua ex navi de sentina, à nausea, quasi nau-  
seam facere soleat, S. scilicet litera in T. permuta-  
tâ, dicta Plaut. in Asinaria.

Du. (Democrite) amabo, an setet anima vxoris  
tuæ?

Dæmon.

Nauteam bibere maxime necesse est,  
quædam illam oscularier.

Robert. verò Const. in Lex. Cam. hort. & alij,  
Nauteam apud Plautum & Festum Anagryon esse  
putant, sed authorem non habent. Si Paulus Dia-  
conus bene descripsit, Nauteam herbam granis  
nigris, quæ coriarij vrantur, Anagryis certè esse  
non potest. Et hinc Had. Jun. Nomenclator Nau-  
deam Festi potius Bryoniam nigram, vel Vitium  
nigram granis nigris esse suspicatur.

Ruell. not.

Herba se-  
tiosa.

Aqua de  
Corio  
aqua de  
sentina.

Herba græ-  
na nigris.  
Anagry-  
non est  
Bryonia ni-  
gra.

#### ANAGRIS VERA FOETIDA.



**A**NAGRIS Descriptio.  
A vera La-  
burno simili  
fuit arbore-  
scens ramis fre-  
quentibus satis  
donatus, corti-  
ce, inquit Clus.  
ex viridi nigri-  
cante, matere  
pallida, Folia  
terna, oblonga,  
acuminata, su-  
perius virentia,  
inferius albicor-  
ta, odore adeo  
gravi & tetro  
pædatis, potissi-  
mum si teran-  
tur, ut transeun-  
tibus suo fetore  
caput offen-  
dant, in vnius pediculi vncialis caput inserta. Ex  
folorum sedibus & alis, flores ex calyce in quin-  
que laciniis secto, glauco ac veluti argenteo emi-  
nent bini, terni aut quaterni, oblongi quinque  
foliis constantes, Geristæ ferè aut Cythi modo,  
sed quorum supremum, quodque reliqua inte-  
git, breuius est & minime reflexum, ut in illis, &  
colore intensè aureo, reliquis palliscentibus, &  
quo-

Cortex.

Folia.

Odor.

Flores.



*Color.* quorum sinu apiculi pluculi emicant, flori con-  
*Stigma.* colores. Floribus succedunt siliquæ digitali  
 longitudine, pollicari verò latitudine, cartilagi-  
 nex in quibus terna aut quaterna femina, non-  
 nunquam plura, satis magna, exiguis phaeolis  
 similia, renis formâ, quæ initio albent, deinde co-  
*Semen.* lororum purpurascens contrahunt, tandem per  
 maturitatem ex cæruleo nigricant: vt apertissimè  
 Dioscorides *monachis* dixerit, cum in eodem fru-  
 ctu non benè maturo tres differentes colores  
 subinde conspiciantur, vt diligenter notauit Clu-  
 sius.

*Descriptio* Anagyrin ita describit Marcellus in Dioscor.  
*Marcelli.* Floret Maio & Iunio mensibus grato inter alios  
*Locus &* frutices per siluas spectaculo, multoque flore,  
*Tempus.* quem flauum ex longinquo offendit, prætereun-  
*Hos.* tum oculos faciliè in se conuertens: & si abesse  
 ingratus odor, quo meritò spretus, damnatusque  
 est, antiquorum coronas primus nobilitasset.

*Odor.* Fruticosa stirps magis quam arbor est. Nos tamen  
*Stirps fru-* vidimus tonsurâ, putationeque coactam ad legiti-  
*itosa.* timam arboris altitudinem crescere. Nullumque  
 florentem eâ latius spectaculum, aut siluæ aut agri,  
 si fortè confita in eis fuerit, ostendunt. Respon-  
 dent autem eius naturæ omnia ea, quæ in Hist. à  
 Dioscor. illi tribuuntur.

*Descriptio* Descriptam plantam existimo legitimam Ana-  
*Marcelli.* gyryn, Diosc. Plin. Galen. Pauli, Ægyptæ. Ex re-  
*Locus &* centionibus nonnulli Anagryris duo genera po-  
*Tempus.* suerunt, verum me Iudice Bened. Curt. lib. hort.  
*Hos.* rectè alterum ab antiquo [hoc nostro] arborem  
 aliam existimauit. Mateti [inquit Clus.] non-  
 nulli [vt Matth.] plura Anagryris genera fè vidisse  
 referant, ego vnicum legitimum quale videlicet  
 à Veteribus descriptum est, tantum obseruasse in-  
 genuè profiteor. Et licet Honor. Bell. se in Creta  
 passim, focus vias differentem Anagyrin ab ea,  
 quam hic describo obseruasse dicat, quæ rotun-  
 diora proferat folia: non tamen ob sola folia quæ  
 parum variant, diuersam existimo faciendam,  
 cum præsertim exosus odor, & facultates à Vete-  
 ribus huic adscriptæ, eandem esse clarè demon-  
 strant. Facilior etiam naturæ lusus in foliis, quam  
 in viribus.

*Descriptio* Pandect. Anagyrin Columbini pedis speciem  
*Marcelli.* esse fateor: sed Dioscoride perlecto, nullam si-  
*Locus &* militudinem habere percepit Braslav. quippe A-  
*Tempus.* nagryris folia & virgas viticis, id est, Agni casti  
*Hos.* habet, Pes verò Columbinus Maluæ foliorum æ-  
 mula. Cordo in Hist. addita est figura Tragi, ac  
 adscriptum, Tragi esse Fabam inuersam, vel (vt  
 alij nominare malunt) scetidam.

*Descriptio* Anagryris Turneto ramis & folijs Agni casti I-  
*Marcelli.* talici: verum folia maiora brevioraque sunt, ter-  
*Locus &* nuntaxat iuncta, cum Agnus quina semper  
*Tempus.* coniuncta habeat, odore vehementer scetudo.  
 Anguill. Anagryris, in Apulia vocata *Faba inuer-*  
*sa & Faba lupina.*

*Descriptio* An Matthiolo in Diosc. *anagyris*? Item in post.  
*Marcelli.* com. Ital. & Lat. & Hist. Germ. Anagryris maior,  
 vel prima? Fructus enim descriptio videtur con-  
 uenire. Bellon. Obs. Anagryris: In Creta vulgò A-  
 nagyros, Hist. Gall. lib. 6. cap. 66. Græcè *Anagyris*:  
 Latin. *Anagyris*, Gallic. *Bois puant*. Idem Hist.  
 Latin. *Anagyris* aut *Anagyris*. Thef. ling. Latin.  
 perperam Anagyrin Eghelo nominat, dum  
 scribit: Anagryris herba est, quæ odore tetro pro-  
 uerbium peperit, in eos iactari solitum, qui ob-  
 futura sibi commouent, vulgò Eghelo. Cast. Du-  
 rant. Anagryris, Anagryris maior. Amat. in Diosc.  
 Anagryris Galeni.

Lonic. sui non memior, vocat modò *Cheuant*

bonen & Baumbonen / Lat. *Faba inuersa*: Iam  
 alibi figuram aliam habet, appellans *Stin-*  
*fenbbaum* Anagyrin Acopon Latin. *Lignum pu-*  
*ridum &* quibuldam *Maluam terrestrem*. Sed pro  
 suo more omnia confundit, figura non conuenit:  
 nomen Maluz ad quid? licet Pandectarius sit v-  
 sus.

Gefnerus hort. Anagryris, quæ & Anagryrus & Lonicus  
 Onogryrus: Anagryris inquit is prope Arelaten  
 gignitur, Matthiolo ignota ex sententia Dale-  
 champii, vt qui pro ea Laburnum duplex osten-  
 derit: Ea etiam quam Bened. Aret. putat Anagy-  
 rin Laburnum Plinii est floribus luteis, oblonga  
 serie dependentibus, cuius lignum apes fugere, &  
 Plinius tradit, & à rusticis Sabaudia audiui. Ve-  
 netis vidi arborem similiter trifoliam, sed diuersâ  
 foliorum specie, quæ mecum attuli, fortè conge-  
 neres fuerint. Nec rectè Anagryris Indica, voca-  
 tus sius Fabiformis secundi generis à quibus-  
 dam crediuit.

Lacuna de Anagryride nihil habet præter verba  
 Dioscor. Figura & cætera pertinent ad Labur-  
 num.

Camer. Hort. Anagryris prima Plauto, vt puta-  
 tur, Nautea.

Nos sub titulo de Nautea diximus eius de-  
 scriptionem ex Paulo Dracono Anagyridi non  
 conuenire.

Lob. & Pena Adu. Obs. & Icon. Pl. Anagryris  
 scetida arborefcens, Anagryris Diosc.

Cæsalp. Anagyrin quam aliqui Faleolariam vo-  
 cant, Diosc. describit.

Apud Plinium Anagyros, non multum ab hac  
 recedere videtur colytea apud Theophrast. quasi  
 Anagryris quædam magnâ sit, minore tamen se-  
 mine.

Hist. Lugd. duas figuras habet vnus plantæ,  
 sub his titulis, 1. Anagryris Dodonæi, 2. Anagryris  
 vera ex agro Arelateni.

Tabern. quàm benè distinguat à Laburno  
 videant lectores, Matthiolum imitatur.

*Anagyris* Gr. & Lat. dicitur, & *Anagyris*: Clus.  
 Herbariorum *Faba inuersa*, quo nomine Venetiis  
 in Aromatatorum officinis, semen eius ex Creta de-  
 latum prostat, Germ. *Baumbonen* & *Gewant-*  
*bonen*: Dicit etiam potest non præter rationem  
*Stinfcndbaum*, *Arbor scetida*, vt à Lonicero no-  
 minatur, summè enim fortet, vnde ortum com-  
 mune dictum, *Mouere Anagryridem*: Gall. *Bois puant*:  
 Ital. *Anagryris*, & *Faba lupina* Lob. Possit Angl. ap-  
 pellari, ait Turn. *Beane trifolye*.

Anagyrin in hortulo [Tiguri] colit folio sceti-  
 do. Turn. Anagyrin in Anglia, quod sciat, non vi-  
 dit. Ex semine (quod dederat Theobaldus No-  
 blot Pharmacopæus Gener meus) natam alui  
 Montbelgardi quæ primo anno excreuit ad  
 cubitalem altitudinem. Vbi aliquot annis durauit,  
 tandem gelu confecta perit. Vidi Monspelii, Ti-  
 guri apud præceptorem Gefnerum: item Patauij  
 Februario & Martio virentem, apud Vlysses Al-  
 drandum cum siliquis. Primum omnium hunc  
 fruticem nascentem Clusius inueniebat primò ab  
 Arelate lapide, saxoso quodam colle, qui dicitur  
 D. Antonij, monente D. Guillelmo Rondeletio.  
 Deinde frequentem circa Hispalim totius Boicæ  
 Emporium celeberrimū, tum etiam ad Mundam,  
 Malacam & Valentiam. Floret isthic Ianuario &  
 Februario, æstate semen maturefcit. Huius por-  
 rō ligni matrix siue cor, non nigricat sed nonni-  
 hil potius pallefcit. Bellonio ingredientium hortum  
 simplicium Pontificis Romæ, Anagryris sit obuia,  
 quam Scipio Pontificis Simplicista in *Belvedere*,  
 Hy - 68 3

*Lignum*  
*putridum.*  
*Malua ter-*  
*restris.*

*Matthiolo*  
*notatur.*

*Ve- Fructus*  
*Fabiformis*  
*secundi ge-*  
*neris.*

*Lacuna de*  
*Anagryride*  
*notatur.*

*Nautea.*  
*Camer &*  
*alii notan-*  
*tur.*

*Faleolaria.*

*Colytea.*

*Tabern. no-*  
*tatur.*  
*Nomina*  
*linguarum*

*Locus &*  
*Tempus.*

*Natalis.*

*Matrix.*

*Color.*

*Semen.*

*Descriptio*  
*Marcelli.*  
*Locus &*  
*Tempus.*  
*Hos.*

*Odor.*

*Stirps fru-*  
*itosa.*

*Anagryris*  
*Veterum.*  
*Error quo-*  
*vundauit.*

*Anagryris*  
*Una solam.*

*In Creta*  
*Iudic. vortu-*  
*ditore folio.*

*Pes Colum-*  
*binus.*  
*Faba in-*  
*uersa sine*  
*scetida.*

*Faba Lupi-*  
*sa & Faba*  
*lupina.*  
*na.*

*Anagryris*  
*Cretæ.*

*Theophrasti*  
*error.*  
*Eghelo.*

semine natam aluit, & ex illa integram sepe-  
m construxit.

Vites.  
Tumores.  
Partus.  
Menstr.

Tenera siue recentia eius folia trita, inquit Dio-  
scorides, tumores illitu reprimunt: si partus hæ-  
reat, & secunda mensēque morentur drachmæ  
pondere sicca bibuntur in passo: sic & suspensio-  
sis dantur & contra dolores capitis in vino, amuleti  
etiam instar difficulter parientibus adalligantur,  
sed à partu statim auferri oportet. Radicis cortex  
concoquendis discutendisque adhibetur. Semen  
commandacatum vomitiones vehementer cit.

Vomitum.

Hæc Diosc. In quibus verba ista, Radicis cortex  
concoquendis &c. aliter vertit Ruellius quàm  
Græci significant: ῥίζης φλοιός διασπείρειται, &c.

Collectio-  
nes.

Id est radicis succus, discutit & concoquit.  
Plinius: Folia collectionibus imponuntur, diffi-  
cultérque parientibus adalligantur, ita vt à partu  
statim auferatur. Quod si factus emortuus he-  
reat, & secunda mensēque morentur, drachmæ  
pondere bibuntur in passo folia. Sic & suspensio-  
sis dantur, & in vino vetere ad phalangiorum morsus.  
Radix discutendis concoquendisque adhibe-  
tur. Semen commandacatum vomitiones facit.  
In his Plinius in quibusdā à Dioscoride dissen-  
tit: illi enim radix, huic radicis succus discutit & conco-  
quit: Galeno & Orbasio radicis cortex, nisi quis  
dicat quòd Plinius simpliciter de radice, Galenus  
de radicis cortice dixerit, fieri posse, vt in Diosco-  
ride cum Ruellio ῥίζης φλοιός & non ῥίζης χυμός  
legendus sit. Quod verò sequitur multò maio-  
rior est momenti: In vino vetere folia dari ad pha-  
langiorum morsus Plinius ait, Dioscorides πρὸς τὴν  
καταλάρῃαν συνήρηται id est ad capitis dolorem in vi-  
no, ita vt vox καταλάρῃαν pro voce καταλάρῃαν in  
Plinio supposita sit, aut in Dioscoride pro κατα-  
λάρῃαν voce, τὴν καταλάρῃαν legere oporteat. At cer-  
tè verisimilius est [vt testis est Corn.] in Diosco-  
ride τὴν καταλάρῃαν pro καταλάρῃαν legendum esse.  
Quid enim Anagyridis folia quæ subacta sunt,  
excalefacientisque ac incidentis facultatis, ad capi-  
tis dolores valere possunt? Proclinius quidem  
fuit, vt vox καταλάρῃαν in Diosc. pro τὴν καταλάρῃαν  
supponeretur, quàm vt Plinius τὴν καταλάρῃαν pro  
καταλάρῃαν veteret.

Galenus de Anagyridis natura hæc scripsit.  
Anagyris frutex est grauius olens, & digerentis  
excalefacientisque facultatis. Sed folia etiamnum  
virentia cum propter humiditatis admissionem  
minùs sint actia, idcirco tumentia reprimunt. At  
resiccata incidentis sunt, excalefacientisque fa-  
cultatis. Similem ferè facultatem habet radicis  
cortex. Semen autem est magis subtilium par-  
tium. Sed & vomitum provocat. Eadem omni-  
no Orbasius quoque habet. Alph. emp. ad dys-  
suriam Anagyridis grana triginta septem cum cō-  
dito à balneo pota commendat. Sed si semen vo-  
mitum mouet, vt facillè credideri n, quis exhibeat  
triginta septem grana ad dysuriam, ego tantam  
quantitatem experiri noli, alterique experimē-  
tum committere malim. Si præterea Onogryos  
Nicandri est idem cum Anagyride, vt aliquos vel-  
le antè ostendimus, ea à stratis arcebit serpentes.  
Per Onogryum tamen, vt dictum, non videtur  
intelligi Anagyris: non negarim propterea eam  
aduerti venenatis animalibus: scribit enim Æ-  
gineta in genere fustum graveolentium valere  
ad præseruandum à venenum eiulantibus ani-  
mantibus. Accidit interdum, vt Capræ & oues in  
Creta fame vexatæ huius folia depascant, licet  
odoris sit ingratiissimi, & postea ex harum lacte  
caseus conficiatur: quo si fortè ignarus aliquis ve-  
scatur, aut lac bibat, statim excidentur tum vehē-

Dysuria.  
Alph. Emp.  
venerat.

Contra ve-  
nenata a-  
nimalia.

mentissimi vomitus, tum fluxus ventris, & cum  
hoc sepius acidat, multi in discrimen vite ve-  
niant: quam ob causam frutex hic omnibus sit  
exolus.

Vomitum.  
Fluxus vē-  
tris.

## CYTISVS IN GENERE.

## CAP. III.

IN tanta Cytisi varietate in genere ex Veteribus  
& Neotericis petrastrandum.

Cytisum igitur Theophrastus adeò insensum  
[χαλεπόν] cæteris esse plantis ait, vt subrepto ali-  
mento ferè omnes enecat: eiusque medullam  
tam duram esse ac ipsissimam, [quod Atrium cogno-  
minant,] vt proximè ad Ebenum accedere videat-  
ur. Frutex [ἄμυγρον] est autore Dioscoride, albus  
in totum, velut Rhamnus [ῥάμνον] ramos produ-  
cens cubitales & maiores: folia Foenugræco aut  
Loto Trifolio [τρίφυλλον] similia, sed  
minora, & maius dorsum habentia, quæ dum di-  
gito conteruntur Erucam [ῥαπανάριον] redolent, in  
gustu verò Cicer viride [ῥαπανάριον] referunt.  
Folia vim habent refrigeratioriam, [δυσκρινία], addit  
Lac. ἡ δὲ σπυγνία gustu adstringentem ac oedemata  
inter initia discutit, si cum pane tria ill. nan-  
tur. Eorum quoque decoctum vrinam potu ciet.  
Cæterum, nonnulli, quòd Apes alliciat, cum pro-  
pè Alvearia ferunt. Frutex Cytisus ab Aristoma-  
cho Atheniensi, vt videre est apud Plinium, [qui  
eadem ferè cum Varrone & Columella tradit, ex  
quibus sua fortè desumpsit] mitis laudibus præ-  
dicatus pabulo ovium, aridus verò etiam sūdum.  
Vtilitas ad valetudinem & signam Dal.] quæ Et-  
uo, sed ocyor fatietas, perquam modico pingue-  
cente quadrupede, ita vt iumenta hordeum sper-  
nant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut  
melior, supra omnia pecorum à morbis omni vfu  
præstante. Quin & nutritibus in defectu lactis  
aridum, atque in aqua decoctum, potui cum vi-  
no dari iubet [iunat, & M.] firmiores, celerio-  
resque tradens infantes fore. Viridem etiam  
Gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quo-  
que nunquam de fere Cytisi pabulo contingente,  
promittunt Democritus & Aristomachus. Nec al-  
liud minoris impendit est. Seritur cum Hordeo,  
aut Vere [Eruo Dal.] semine, vt Porrum ἐς ἄρ-  
σιν, [ramo Pomum malè vertit Plin.] vel caule  
Autumno ante brumam. Si semine madidum, &  
si desint imbres, satum spargitur [rigatur quin-  
decim proximis diebus Colum.] Plantæ cubita-  
les transferuntur scrobe pedali. Seritur per [post  
vet.] æquinoctia tenero frutice. Perficitur trien-  
nio. Demeritur verno æquinoctio [nam tota  
Hieme floret, Dal.] cum florere desit, vel pue-  
ri, vel andr. viliissima opéra. Canus aspectu [v-  
traque Cytisus: est enim sativa & altera suæ spon-  
tis, Colum.] breuiterque si quis similitudinem  
exprimere velit, angustioris amplioris vet.] Tri-  
foli frutex. Datur animalibus post bidentum sem-  
per. Hieme, madefacti [aridum enim maiores  
vires habet, & nimis satiat] fatiant equos denz  
libræ, & portione minor animalia: obiterque  
inter ordines Allium & Cape feri fertile est. In-  
uentus hic frutex in Cythno insula, inde trans-  
latus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græ-  
cas, magno calce proventus: propter quod maxi-  
mè miror rarum esse in Italia. Non æstuum, non  
frigoram, non grandinum, aut nivis iniuriam ex-  
pavescit. Adiciat Higinius, ne hostium quidem,  
propter nullam gratiam ligni. Galenus etiam lib.

Theophr. de  
Cytiso.  
Medulla  
Ebena.  
Diosc. de  
Cytiso.  
Rhamnus sū-  
milis.  
Diosc. illa-  
stratur.

Odor Eruc.  
ca.  
Gustum Ci-  
ceris.

Vires & v-  
sus.

Diosc. di-  
versale.  
Aro-  
Oedema-  
ta.

Vrina.

Apes.  
Eun. Cytis-  
us.

Suum est a-  
lium pab-  
ulum.

Clas. alia-  
stratur.]

Vtilitas.  
Lac.

Apes.

Satio.

Plinij er-  
ror.

Cultura.

Tempus.

Trifolij fa-  
cie.

Exhibetis  
ratio.

Locus.

Rarum in  
Italia.

Cytis. Ga-  
leno.

de An.



Locus.

Mel.

Frutex.

Facultas.

Cytisus

Marcella.

Marcel.

natur.

Dodon.

re-

darguitur.

Basil. Fab.

repreh.

Corn.

natur.

Cytisus

arbor.

strab.

Non arbor.

Corn.

natur.

Adagium.

Cytisus

arbor.

frut.

Arnohy-

lum.

Cytisum.

Felin.

de Antid. Cytisum fruticem esse, scribit his verbis. In Myria, qua parte nostra Provincia finitima est, tractus occurrit quem Brotton nominant, in quo locus est Cytiso plenus, ex cuius floribus plurimum mellis apes excerpere vno ore tradunt. Fruticosa verò planta est, eam altitudinem attingens, ad quam Myrti crescunt. Folia verò, inquit 7. simpl. digerendi facultatem obtinent, aquosa tepida facultate ammixta, sicut & Malve folia. Hæc Galenus. Herba vel frutetum, quod maximè circa sepes vinearum nascitur, ait Marc. Med. Empiricus, Latine Cytisus dicitur, virgultus est subortus, vel curvis: foliis oblongis, benè virentibus: floribus conclusis, oblongis albis, vel galbaneis, benè olentibus, i.e. mellito odore: frutetum ipsa n. semper virens, ætate acque Hieme. Verum & Dodonæo videtur, hæc descriptione Marcellus alium delineat Cytisum, à Græcorum nostro differentem, quem non impentorum pabulo laudat, aut ad lactis copiam augendam commendat, sed mirum esse remedium trahe a lyeus ilh adem & archutim. Alii neptse Dodon. foveam effugit, quam fecit. Recitans enim Veterum verba, non demonstrat quam intelligat. Basil. Fab. in Thes. vocans Cytisum Weiglee & Spiglee / Loto similem, & capris fruticem gratum, nescit quid scribat.

Cornarius occurrit nuntius Cytisum aut nunquam ad Germanos transisse, aut dudum perisse credit, ex eo, quod Plinius iam suo tempore rarum in Italia fuisse dixerit: tantum abest ut ab illo persuadeat, in Germania nihil eorum posse nasci, quod rarum sit in Italia.

Stabo contra Dioscoridem, Plinium, & Galenum Cytisum arborem esse velle videtur, eam siquidem cum Ballamo arbore odorata similem facit. Quæ forte occasio, cur hanc arbuticulæ propiorem Cornarius esse dixerit: quod quidem ex eo colligi posse putat, quod Plinius ait nullam gratiam ligni esse. Quam enim nulla sit ligni gratia, ramos omnino producere oportere sibi persuadet lignosus, non velut in herbatenoros & molles. Sed nec arborem esse, nec arbuticulæ propiorem, Virgilius ostendit, dum in Buc. Eclog. 1. ait.

--- non me pascente, Capella  
Florentes vix in Salicis carpentes amaras. Eclog. 9  
Sic Cytisus pasta deservit vbera vacca. Eclog. 10.  
Nec Cytisus saturatur apes, nec fronde Capella.  
Virgilius, inquam, satis indicat his versibus, nec arborem esse, nec arbuticulæ herbam propiorem. Non enim solent Capræ, nec possent, si solerent, florentes arbores depascere. Quare nec illud Cornarii valebit, quando Plinius ait, nullam esse ligni gratiam, ramos omnino producere oportere lignosus, imò contrarium potius verum erit, nullam esse ligni gratiam, ramos ferre vimineos & lentos quibus capella saturari nequeant. Esse. a. capres Cytisum desideratum pabulum lepidè expresse Theophrastus.

Adagium. Η αἰς τὸν νινωρὸν ὁ κῆρ τὸν αἰς τὸν κῆρ.  
Capra Cytisi m. lupus capellam, sequitur.  
Amatus ut hanc difficultatem effugiat, concludit Cytisum, & inter arbores, & inter frutices, siue herbas censei posse, generis quæ differentia, à Plinio distingui, ut in arbore, semineo utatur, in frutice, masculino, quod sanè observatione non dignum. Cytiso in feminino genere vitur Columella, in masculino Theophrastus & alij passim, ut Rob. Constin. Lex. qui & ἀνδροφύτων ab Hesychio vocat scribit. Theophrastus etiam hunc fruticem αὐτὸν δὲν nonnulli αὐτὸν δὲν, alij τῆς αὐτῆς. A Cithno, Tom. I.

aut ut alij, à Cithia insula nomen, auctore Seruio habet. Inter Dioscoridis verba hæc in quibusdam codicibus falsè adscripta reperiuntur, a. Teline, Triphyllon alios, alios Lotum grandem.

Cytisi Dioscoridis descriptio tam accurata non est, ut ex ea verus Cytisus cunctis innoteat, quo factum est, ut diuersi auctores diuersos exhibuerint Cytisos.

Cytisi nomine donatæ sunt sequentes plantæ.

Cytisus siliqua incurua folio candicante à Marantha descriptus de quo proximè.

Cytisus Hisp. Clus. folio virescente.

Cytisus montis Calcaris.

Cytisus Hisp. Clus. 2.

Cytisus spicato flore.

Cytisus 3. Hisp. Clus. non breui pediculo.

Cytisus hirsuta.

Cytisus Pann. Clus. omnia incana.

Cytisus 2. Pannon. Clus. species altera, hirsuta valde.

Cytisus Pann. 3. Clus. sparsis ramis.

Cytisus Pannon. 3. Clus. species altera, supinis ramulis.

Cytisus siliqua angusta glabra.

Cytisus glabra lata siliqua.

Cytisi genus flore purpureo.

Cytisi facie Alysson fruticans.

In hac quidem multitudine de Cytiso, licet indicare difficile sit, quis legitimus Cytisus Veteribus descriptus, peiores tamen eum existimant esse, quem Marantha proponit. Cæterum, nemo, uti spero, inficias ibit, quin quos enumeravi frutices ad Cytisi genera etiam referri debeant.

Præter has tamen alia quædam occurrunt plantæ, Cytisi titulo gaudentes, quas à prædictis merito seunximus. Autore Dodonæo, Trifolium fruticans, siue palemonium quorundam, non benè Cytisus à plerisque appellatur. Laburnum quibusdam Cytisus dicitur. Quidam putarunt Coluteam multis dictam esse Cytisum. Cytisi cognata est Colutea scorpioides auctore Clusio. Camerarius putat Dorycnium Monspelii existimatum, esse Cytiso Columellæ cognatum. Trifolium candidum Dodonæo quibusdam dicitur Cytisus Columellæ, de quo lib. Hist. n. g. 17. de Trifoliis herbaceis. Quidam volunt Marcelli Empirici ac etiam Diosc. Columellæ & Virgilii Cytisum esse Trifolium quoddam magnum. Tragus scribit repudiandam sententiam eorum qui Trifolium pratense, Cytisum interpretantur. Trifolium candidum Dodon. rectum. Melilotum vulgarem quidam Cytisum Veterum esse contendunt, inquit Dodonæus, verum non veritatem assensu videntur. Ruellius scribit se vereri ne Marcellus Cytisum pro Medica viderit. Lotus sativa, odorata, quibusdam censetur Cytisus, quod aliis displicet.

Cytisus siliqua incurua folio candicante.  
Cytisus Clusio folio virescente.  
Cytisus montis Calcaris.  
Cytisus Pannon.  
Cytisus 2. Pannon.  
Cytisus 3. Pannon.

Trifolium fruticans.  
Laburnum.  
Colutea multis.  
Colutea scorpioides.  
Dorycnium.  
Monspelii.  
Trifolium candidum.  
Dod. rectum.  
Trifolium magnum.  
Cytisus.  
Tragus.  
Trifolium pratense.  
Trifolium purpureum.  
Trifolium candidum.  
Dod. rectum.  
Melilotus.  
Gulgaris.  
Medica.  
Lotus sativa odorata.

# CYTISVS SILIQA INCURVA, FOLIO CANDICANTE.

CYTISVS quam hic exhibemus, pulcher Descrip-  
tione est frutex, qui primo anno à satum mibi  
cubitali altitudinem excreuit, cubitali quo-  
que & recta radice, aliqui ad cubitos aliquot  
assurgens, totus candicans, in ramos tenues  
diuisus, foliis ternis retusis & nonnihil fissis,  
quæ sustinent longiores pediculi, quam in cæ-  
teris Cytisus. Flores ex longis pediculis multi,  
parui, lutei, nascuntur plosæ floribus proximi,  
Hh 4

Radix.  
Folia.  
Flores.

Siliqua.

Marantha  
descriptio.Altitudo  
Myrti.  
Folia.Odor Eru-  
ca.  
Gustus.  
Flos. Color.

quos sequuntur  
siliquæ, pulchræ,  
late circumflexæ.

Maranth. in hunc modum describit: Cytisus frutex, totus candidus est, eam altitudinem attingens, ad quam Myrtus crescit. Folia si- gulis pediculis ternata, sed ramulosa profert [quod Plinius expressit], quæ si digitis terantur, odorem Erucae proximum, gustata verò Cicer recens emulatur.

Florem recludit in ramulorum cacuminibus latum, aspectuque pulcherrimum, colore luteum, sed saturato, quemadmodum quæ pro Calcha ostendi solet, & arantiorum cortex. Siliquas producit contortas, unâ & nonnunquam pluribus spicis, paruas, in quibus semina parua, vix ineunte ætate maturefcentia. Caudex nigrum cor retinet, Ebeni simillimum, *Vasfasciæta* ab artificibus nuncupatum.

Quod verò Cor retineat Cytisus nigrum, arbitratur Marantha euenire ratione vetustatis, hocque Veteribus, sicuti & multa alia, incomper- tum fuisse: Hisce siquidem Lectorem adhortatur: Cùm de Cytiso leges, in eius trunci medio nigrum colorem contineri, Ebeni similem, caue, de quacunque intelligas, quia non nisi in inue- teratis, caudicem crassissimum habentibus, par- tem nigram mediam reperies, quamquam in adolescente, tenerimoque adhuc frutice qua- fieris, non dubium est, quin Cytisus semper tibi incognita futura sit. Scit esse Cytisum totum candidum (color enim in herbis ait loci ratione permutatur) ut non immeritò illam Rhamno Dioscorides comparauerit, hoc tamen habet, dum in suo natali loco permanet: nam transplan- tata candidum illum colorem multa ex parte a- mittit, ut virentem potius, quam candicantem diceret, quæ nota deperdita sui cognitionem faciliè præpedire posset his, qui ex loco id fieri ne- scierint.

Matth. in Diosc. cum magn. fig. Lat. & in Ital. Cytisi plantam misit Iac. Anton. Cortusius, legiti- mam referentem Cytisum omnibus notis, mate- rie ligni nigra, & Ebeni modo firmissima. Hist. Germ. & Epit. cum add. Camer. Cytisus, *virgatus*, Ital. Cytiso, Germ. *Geysflee*.

Dodon. Lat. in fol. Cytisus, ut existimatur.

An Anguill. Cytisus flexibilis, species foliis albis & lucidis, ut argentum, respondens aliqua- tenus Barbæ Iovis Plinii.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Cytisus Maranthæ & Matthioli.

Cytisum à Matthiolo exhibitam misit ad Camer. ut ipse in Hist. Matth. Germ. scribit, Bartolo- mæus Marantha nomine Cytisi Galeni, ex eo lo- co cuius etiam meminit Galenus: Tabiis nimi- rum, non longè Surrento & Vesuvio monte.

Clus. qui in genere Cytisum, Hung. *Zanrh* vo- cati ait, legitimam Cytisum veteribus descriptam, cum peritioribus rectè sentit, eam esse, quam

Marantha proponit.

Portæ Cytisi figura intortis siliquis instar ca- prarum cornu, non in omnibus nobis proba- tur.

Lignum Rhodium, quod Matthioli. Oliua- strum, nonnulli Agallochu'm vocant, à quamplu- rimis etiam pro legitimo Alpalatho in Tœniacis usurpatum, non est: neque oleæ, & multò minus Alpalathi, sed veræ & legitimæ Cytisi, perouam similis Cytiso à Marantha descripto, sic ut eun- dem esse, nunc credat Honor. Bell. & se quoque errasse deprehendat, quando Cytisum Creticum, *quod quidam* vocatum, legitimum fuisse putauit. Nam differt ab hoc foliis, quæ longiora & angu- stiora sunt, neque semper vno pediculo ternata si- mul profert, sed quaterna & quina, ut nuper ob- seruauimus, semineque non in siliquis, sed Tripli modo profert: Hinc ob causam, non amplius Cytisum, sed Ebenum Creticum vocandam hanc stirpem censet. Materies enim ligni plurimùm ad Ebenum accedit, colore nigro, splendore, & duritie.

Monendi lectores, nobis valde suspectam Alpalathum Creticam Alpini, de qua egimus l. 4. Veremur enim ne huius Cytisi tribuat dotes Alpalatho, Luculentus accedit testis veram Cytisum iam inuentam esse, Iac. Dalechampius: Ita ita plantam depingit: Cytisus in hortis Francisca- norum Lugduni visitur, frutex vltimè altus, ra- mis multis, canis, folio perpetuo sæuigracæ, flo- re pisi, luteo, nigris maculis compuncto. Ego autem nullum inuenio præter Robertum Con- stantinum, qui tradat vltimè Cytisum, flore ni- gris maculis compuncto: quid si descripsit Cytisi florem sicum, quem scio interdum nigrescere, nisi diligenter siccetur: quod autem ait flore pi- si, dubium mouet, an Maranthæ Cytisum intelli- gat, is enim valde paruus, quamvis figura pisi esse dici possit.

Matthiolus cùm deprehendisset Cytisum non herbam, sed fruticem esse Myrti magnitudine a- pud Galenum legisset, imò inter arbores recen- seri à Plinio & Strabone inuenisset, Cytisi plan- tam à Cortulo missam pingendam curauit, quam legitimum Cytisum notis omnibus referre rectè putat, ligni materie nigra, & Ebeni modo firmis- sima, quod de Cytiso Theophrastus & Plinius tradidit. At non Cytisum, sed Medicæ spe- ciem esse malè autumant cum Hist. Lugd. quidam Herbarij.

Tabern. Cytisus cornutus Geßner / Geiß- flee.

I. Gerard. Angl. Cytisus 7. cornutus. The hor- ned shrub Trefolye.

Marantha hunc fruticem sæpius collegit pro- Locis. pe Neapolim colle quodam, quâ ad Nesidem insulam itur. Oritur hic frutex, Honorio Bello re- ferente, in Insulis Rhodo propinquis, & Rhodo ipsâ, vnde ramos & truncos accepit, frequen- tius tamen in parua quadam Insula prope Rhodum sita, cui nomen Astachida, vbi singulis an- nis quamplurimi caduntur trunci [mercimoniū enim non vile est] Rhodumque, & Pathmon, & Constantinopolim, aliæque loca adportatur. Ra- mulum primū ex Italia mihi attulit Frater C. Bauh. ex horto Patavino, à D. Cortulo nominata fue- rit Cytisus. Ex semine mihi prouenit Montbel- gardi in hort. Illust. E. C. VVirtemb. Pforzhemiz apud insignem Pharmacopœum Grunnigerum vidi pulchram arbuticulam aliquot cubitorum, florentem & siliquas ferentem mense Octobri, iam rectam ad vitandam hyemis iniuriam, vnde nobis.

Siliqua.  
Semina.  
Caudex.  
Cor.  
Vasfasciæta dictum

Color niger  
quando re-  
peritur.

Lignum  
Rhodium,  
Oliuastrum,  
Agallochu,  
Alpalath.

Cytisus Cre-  
ticus.

Cytisum  
Creticum.  
Archont.  
Zydon.

Ebenus  
Creticus.

Alpalathus.  
Creticus  
Alpini.  
Cytisus

Robert.  
Const. nos.

Matth. nos.

Tempus.




nobiscum defunctissimum semina seminanda. Nunc Montbelg. repositam per hyemem servamus, ac nobis floret Autumno : extra tectum hyemem apud nos ferre non potest.

Vilus.

Angull.  
err. or.Error quo-  
rundam, ut  
Pataunorum  
collegij.

Ex huius ligno [quod equidem Hono. Bellus notat:] ensium manubria Turcæ conficiunt, & Caloterni Pathmi sphaerulas precarias efformant. Caterum errat, inquit Anguillarius cum suo Rhodensi Pharmacopæo, qui illud suffumigij genus somniauit, hoc enim scire diligentissimè cupiens, mendacium esse deprehendi. Sed maximè in errore versantur, qui hoc ligno in Theriacis pro pro Aspalatho rectè uti iudicant, quemadmodum celeberrimum Pataunorum collegium.

## CYTISVS CLYSII PANNONICVS

ALTER FOLIIS OMNINO  
incanis.Descript.  
Virga.

Folia.

Flores.

Color.

Siliqua  
semen.

Radix.

Locus

**C**YBITALES  
horumquæ  
feri virgas, re-  
ctas, tenues, vi-  
mineas & ter-  
tas, quas ab infi-  
mo ad summum  
usque exornant  
folia, terna vni  
pediculo inha-  
rentia, Cytiso  
Gelteri ferè si-  
milia, sed omni-  
nò incana, an-  
gustiora, gustu  
amaro, quæve  
trita pinguis ef-  
se videntur : ex  
singulis interdù  
foliorum sinu-  
bus ramuli pro-  
deunt, similibus

foliis sed minoribus, obstiti, ferentes in summo  
quinos aut fenos flores. Loti pratensis herbæ,  
[quam à prægrandibus siliquis nonnulli siliquo  
sam cognominant] floribus persimiles, coloris  
aurei, odoris non expertes : & ex folliculis dein-  
de siliquas planas, oblongiusculas, hirsutas omni-  
nò, atque in his semen tubulosum, plarum non-  
nunquam tumidiusculum & rotundiusculum, du-  
rum, quod maturitate debilentibus siliquis ex-  
cidit : radix dura est & lignosa, nigricans & sum-  
ma tellure sparsa.

Clas. Pannon. Cytisus alter : Hist. post. Cytisus  
5. Tabern. Icon Cytisus sextus : Hist. Cytisus  
xi. Gerard. Angl. Cytisus quintus incanus, Boae-  
rie schrub Trefolce.

Clusio frequens est toto agro Viennensi, præ-  
sertim supra Phasianorum fabricam, in campo  
Morano ( auf dem Marktfeld ] & multis aliis,  
cùm Austriz superiors & inferioris, tum Panno-  
niæ locis aridis propter vias. Floret Iulio & sub-  
inde usque in Autumnum, semen sub Augusti fi-  
nem, & Septembri maturefcit. Integras sæpenu-  
merò huius fruticis plantas Cuscuta vulgaris ob-  
tas inveni.

## CYTISI SECUNDA, SPECIES

ALTERA PANNONICA CLYSIO  
hirsuta valdè.

**E**ST. multò Descript.  
maior, cras-  
sioribus virgis,  
admodum hirsuta, erectis : fo-  
liis duplo am-  
plioribus : flori-  
bus & siliquis  
maioribus : ipsi  
etiam flores, co-  
lore magis aureo  
rutilant. Iuxta  
sepes nascitur,  
raris tam n &  
minùs obuius,  
Cytiso Pannoni-  
co altero. Sem-  
en vermiculus  
obnoxium.

Cytisi 2. in  
Pannon. & Cy-  
tisi 5. in Hist.

post. aliud genus, siue species altera. Tabern.  
Icon. Cytisus septimus. In Hist. duodecimus.  
Cur autem Gerard. Angl. Cytisum pinnatum ;  
winged schrub Trefolce dixerit nescio.

## CYTISVS HISPANICVS, PRI-

MVS, CLYSII FOLIO  
virescente.

**I**NTERDYM Descript.  
arbuscula ma-  
gnitudine ex-  
crescit, duro sti-  
pite, cuius ma-  
teria flavescit,  
sed cor siue pars  
interior nigri-  
cat : is autem  
cum maioribus  
ramis & virgul-  
is candicante  
cortice obduci-  
tur : tenelli rami  
multi toti villo  
obsciti : folia nu-  
merosa ramos  
ambiunt, terna  
vni pediculo in-  
herentia Medi-  
cæ modo, dilu-  
toris viriditatis,

saporis viridiù leguminum, amari tamen : aliquot  
flores extremis ramulis quasi spicæ instar nascun-  
tur, Genistæ similes, minores, Lutei, nonni-  
hil odorati : deinde Lobi Genistæ pares, oblon-  
gi asperi tamen & hirsuti, in quibus exiguum se-  
men, tumidiusculum nigricans, Genistæ minus :  
radix lignosa, & in diversa tendens.

Cul. Hisp. & Hist. post. Cytisus prior. Lob. Synony-  
ma.  
Obs. & Icon. Plant. & Hist. Lugd. Cytisus Hi-  
spanicus, primus Clusij. Tabern. Icon. Cytisus  
nonus Hispanicus. Hist. Cytisus septimus Hi-  
spanicus. Gerard. Angl. Pseudocytisus primus,  
The first bastard schrub Trefolce.

Pseudocytisus  
fuit.

Locus &  
Tempus.

Crescit, vt testatur Clusius, in Salamanticensi agro, & aliis vtriusque Castellæ locis, secus vias. Floret Iunio, semen profert Iulio & Augusto. Creuit in Belgio feminibus ex Hispania missis: nunc hyemis rigoribus penisse existimatur.

## CYTISVS MONTIS CALCARIS.

Locus.  
Tempus.  
Descript.  
Propag.  
ner.

Folia.

Flores.

**R**AMI Cytisi cuiusdam nobis delati per Genium Cherlerum, & D. I. ac. Mieg, ex monte Calcar Gallia Narbonensis, florentis Iunio, qui teretes, tenues propagines alternatim producit, tantillum hirsutas in extremis, per quas folia terna Dorycnii ferè Monspeliensi para, quadam brevissimo & perè nullo pediculo, inter Cytisi genera, minora folia non obseruavi; qui collegerunt, dicunt ad aliquot cubitos excrecere: Flores pediculo breui hærent, longo per ramulorum extrema agmine, Genistellæ pares, lutei, calyculo subhirsuto, in acutas lacinias diuiso: Quales siliquas, nescimus. Rami interdum candidi cum deflorescit.

Vt existimo, Lobelius describit sequentibus verbis: Quà quis Romæ regiâ viâ Florentiam adit, oppidulo, cui nomen Aquapendulæ, decliui & depressæ etiam planitie feracissima, Cytisum fruticem quinque, sexve cubitis proceriorem Genistæ sarmentis pluribus gracilibus præditis, litriatis, vidimus statim ab imò aut paulò superius ligno radice è tenuibus pediculis, folia terna, non ita numerosa, similia sœnugræco, angustiora, habitiora, rutacea; Genistæ vel Sparti aut Pisi flores lutei, sed minores: siliqua Genistæ par, cinetia, gracilior, compressior, intus loculis sunt discepta semina nitentia ex atore Genistæ, est cana vniuersa planta: vti Rhamnus Monspel. aut Halimus, Sapor Ciceris aut similis Leguminis, odor sanè iam non succurrit: arida enim & inodora duntaxat habemus vullam Narbonæ, præsertim, ad radices montis Calcarj prope Veganium: minùs procera tamen, sed tenerior, pabulòque aptior est, fortè quia dum in montes abigunt pecus, vt quotannis faciunt, pastionis lætioris, arque æstus conuallium declinandi causâ, ineunte Maio & Iunio, Sole in Arietem ingressò, teneriusculos germinationum fœtus, florum siliquarumque spem liguriunt oues & capellæ.

Locus.

Cytisus.

Lobelius  
notatur.

Admoni-  
tio.

Lobelius & Pena: Cytisus, Trifolius frutex, Lotusve gentilem cognominis insule Cinthiæ, quæ vna è Cycladibus est, appellationem fateatur, vnde reliquæ Græciæ, Latineque sædus communis fuit. Qui *ῥόδινα* ex Poëtis legunt, possunt aptè interpretari secundum sœnum. Quam descripsimus, vt si quæ alia, apprimè quadrat Dioscoridis, Galenique Cytiso.

Theophrastus in delinebenda Cytiso minùs sollicitus fuit.

Icon. Plant. Cytisus.

Lobelius proponit figuram, quæ non placet, flores enim malè picti. In Obs. aliam tradit Cytisum, nempe Maranthæ, cuius folia dicit Erucam olere, & Legumen sapere, vt Dioscor. exprimit.

Lobelii Cytisum antè descriptum non separarem, ab Hispanico primo Clusii, nisi ipse Clusius, ac etiam Lobelius separarent. Qui per ea loca transibunt, vbi Clusius & Lobelius obseruauerunt suas Cytisos, omnia diligentius considerent, & nos moncant.

Hist. Lugd. Cytisus prior Penæ. Tabern. Icon. & Hist. Cytisus 4.

Compiler Tabern. ingeniosus sanè, si dicere fas est mutauit figuram Lobelii, & pulchiores addidit flores, quos si vidisset, benè fecisset: sed proculdubio, si in iis fuisset locis, aut missa illi planta, annotasset: descriptio est ex Lobelio, quamuis non nominet illum.

Gerard. Angl. Cytisus 3. The 8. Schrüb Trefolye. Cytisus Penæ. Castor Dur. Cytisus, qui figuram malam Lobelii habet.


CYTISVS HISPANICVS. CLVSII  
SECUNDVS.

**D**VORVM Descript.  
Cubitorum  
duntaxat altitu-  
dinis est, fructico-  
sus, virgas pro-  
fert candidas om-  
ninò, tenues,  
ramosas, folia su-  
periori [primo]  
similia, terna,  
semper ex vno  
pediculo nascenti-  
a, minora, prop-  
ter incana, nun-  
quam expansa,  
sed semper qua-  
si complicata,  
prominènte dor-  
so impensè ama-  
ra: flores, vt in  
altero, extremis  
ramis insident

superioribus forma similes, sed intensior & planè  
aureus color: siliquæ etiam longiusculæ, alperæ, lignæ.  
ex purpura nigrescentes, mucrone deorsum in-  
flexo: semen paulò maius est, & subnigris altero, Semen.  
radix similis.

Clus. Hisp. & Hist. post. Cytisus secundus. Lob. Synony-  
Obs. & Icon. Plant. Cytisus hispanicus, secundus  
Clusii. Tabern. icon. Cytisus decimus Hisp. se-  
cundus. Gerard. Angl. Pseudocytisus secundus,  
The second Bastard Schrüb Trefolye.

Iisdem, autore Clusio, provent locis, eodem  
que tempore floret, quo prior hispanicus. Locus  
Tempus.

CYTISVS GESNERI, CUI FLORES  
FERÈ SPICATI.

**Q**VAM ego Descript.  
Gesneri Cy-  
tisi appello,  
virgultis est cu-  
bito longioribus,  
lentis, & multis  
alis tenuibus,  
concavis, breui  
pilo circa fasti-  
giū ramulorum  
hirsutis: folia  
semper terna vni  
pediculo inha-  
rent, prona par-  
te hirsuta, quo-  
rū longitudinem  
nervus percur-  
rit, Clusio folia  
saporis amarioris  
culi, ramorum  
extrema in lon-  
gas abeunt spi-  
gas

GA3



*Flori.* cas florum luteorum, Pisi floribus similitum, sed minorum, & brevibus pediculis hærentium, odoris grati, Clusio melleum quiddam spirantis, quibus siliquæ superveniunt, vnciam aut fescunciam longæ, planæ, culum latæ, compressæ, hirsutæ: Semen parvum spadiceum, Clusio flavescens, continentis: Pictor noster pro proportionem figuræ, nimis magnas & latas pinxit siliquas, Radix dura, lignosa, longa, rarioribus hbris donata.

*Radix.* Gesner. hort. Cytisus suffrutex, vel Cytisus minor. Item in Epit. ad Zuing. Cytisus meus, à tuo diversus, quatuor ferè cubitorum arbuscula, odoratis & oblongis florum ceu spicis, aut paniculis plüs quàm millenis: puto nunc mihi floret.

Clus. Pann. Cytisus 1. & Hist. flor. post. Cytisus 4.

*Stirps trifolia lignosa.* Dodon. Descriptio. Caliculi. Folia. Color. Florescens. Dodonæo Lat. in Eol. Occurrunt Trifoliæ, lignosæ, ac fruticosa stirpes, quæ cum Cytiso similitudinem habere videntur. Allurgit vna à radice cauliculis teretibus, fragilibus, complurimis, in alas ac ramulos diuisis: folia circa quos crebra, minora quàm Trifolij pratensis, colore virentia: strobili circa virgularum fastigia spicato quodammodo ordine digesti, lutei, minores quàm Genistæ, aliqui consimiles: succedunt siliquæ tenues, oblongæ, angustæ, & ipsis Genistæ siliquis minores: in quibus semina exigua nigricantia: radix longa, altè descendit, quandoque in obliquum tendit.

*Siliqua.* Dodon. re. *Radix.* Dodonæi descriptio prior nobis convenire videtur, cum Cytiso nostro, cui flores spicati, verum Clusii Icon posita sub titulo Pseudocytisii prioris non placet: est autem Cytisii Hispanici Clusij prima. Altera respondere videtur nostro hirsuto Cytiso: cum quo minime quadrat Icon, ex Clus. posita pro Pseudocytiso altera, quæ Clusio est Cytisii Hisp. secundi: Non placet, quod scribit Clusij genera ab istis [ à se adscriptis ] exiguum vel nihil differre videri, & differentiam, si quæ sit, soli, celique occasione contingere: transferantur in Germaniam Cytisii Hispanicæ Clusij, quarum Dodonæus icones proponit, nunquam ita mutantur, quin maxime differant, ab iis quas describit.

*Locus.* Camer. hort. Cytisus supinus prope Lausannam. De Cytiso miratur Hier. Heroldus in epit. ad Matthiol. quod non pingatur, cum copiosè nascatur in Italia: ante aliquot annos quum per Apenninum iret Florentiam, oblatus Cytisus, quem agnoscent, decerpebat ramulos, quos Ghino post ostendebat. Isdem cum Hier. sentiebat, atque in suo horto eum fruticem spinosum ex montibus translatum ostendebat: monstravit Heroldo eum etiam Contra. Gesnerus in suo hortulo. Quem verò Cytisum viderit Hier. Heroldus in Apennino me nunc latet, vereor tamen ne sit diversus à Cytiso Gesneri proveniente circa Scaphusiam, qui nobis probè notus, qui nullo modo spinosus evadit, nec puto vllum eorum, qui Cytisi dicuntur, spinas acquirere: inquirendum igitur, an Cytisus spinosus visus per Heroldum in horto Ghini non fuerit potius Trifolius frutex spinosus, Acacia Matthioli dictus.

*Cytisus spinosus.* Cytisii imaginem cur in suo Dioscoride non appinxerit Matthioli, id in causâ fuit, quod non solum eius planta non esset ad nos, sed quod etiam dubitaverit, an legitima in Italia proveniret, ubi raram haberi omnino scribat Plinius. Is ait se hæcenus nullam vidisse quæ omnes præ ferret Cytisii notas: se habere adhuc plantam quam pro Cytiso ad se Ghinus miserit, sed cum folia nullam ostentarent canitiem, sed potius sa-

turatè virelcerent, non ducere eam in suo libro pingendam.

Hist. Lugd. Cytisum, cuius imago hæc appicta est, Conradus Gesnerus ad Dalechampium misit. Est autem, ut eius verbis utar, Frutex *teuallæ*, Cytisii sapore glutinoso Malvæ, id quod in eo Galre. quirit. Alia Cytisii effigies sequitur, quem à natalibus Alpinum vocant. In Apennino crescit. Cytisus Alpinus Dalechampi. Pena cum diu anxius in Cytisii veri historia hæsitasset, subductis hinc inde rationum momentis, tandem eum probatum iri credit candidis arbitris, quem vidit in via regia, quæ Romæ Florentiam itur, &c. Cytisus prior Penæ.

De Cytiso priore Penæ egimus antè, sub Cytiso Calcaris montis: Considerent etiam lectores an in Hist. Lugdun. duæ figuræ, quarum prima habet hunc titulum Cytisus Gesneri: altera, Cytisus Alpinus Dalechampi. non sint eiusdem plantæ, quæ pulchrè apud Clusium depinguntur in Pannonicis pro Cytiso priore: & hist. post. Cytiso quarto, cuius historiam Lobelium in Adu. prodidisse existimat. Mihi tamen dubium est, an Lob. huius Cytisii meminerit, & non ipsius Clusii Hispanici primi, vel potius eius, quem à monte Calcaris denominamus, quod exercitatis lectoribus in stirpium cognitione, qui plantas, de quibus agitur, viderint, diu dicandum relinquimus.

Cord. in Dioscor. sylvestris frutex in Germania spontè proveniens Geißflœ & Bergflœ. Item Hist. Cytisus albus sylv. Figura Cordo addita est à Gesnero, cum hoc titulo: Effigies Cytisii, qualis circa Scaphusiam.

Taberna. Icon. Et Hist. Cytisus primus. Et Hist. ac Icon. Cytisus secundus, priori valde similis, virgis versus terram inclinantibus, siliquis maioribus, longioribus primo.

Compilator Tabern. tribuit primò caules quadrangulos & flores luteos & rubellos. Nos Cytisum, quem pingit rubello flore, non vidimus, nec scimus, qui talem tradat. An secundus sit diversus à præcedente, quis affirmet? quum Compilator non annotet, ubi eum vident, vel ex quo authore desumpserit, pro suo candore & peritiâ.

Gerard. Cytisus primus The forsi shrub Treas folye. Item Cytisus tertius. Nescio quo iudicio Gerardus utramque figuram ex Tabern. proponens satis similes, interponat dissimilem.

E. colle prope Scaphusiam Gesnero pulchrè virescit Tiguri. Clusio copiosè nascitur non modò in omnibus sylvis Viennensis agri, & ad vias: sed plerisque etiam Pannoniæ locis, atque in ea Austria inferioris parte, quæ veteri circumscriptione non continetur: Crescit in Hercynia sylva, quæ Bohemiam vndique cingit, ubi florere incipit sub finem Iunii, & Augusto plerumque desinere solet: at in Austria & Pannonia maturis. Cytisum Gesneri habui in horto Illust. E.C.V. Viremb. Montbelgardi, quæ secundo anno copiosos protulit flores mense Septembri. Tiguri vidimus apud Gesnerum; Basileæ in horto D. Theodori Zvvingeri: circa Stutgardiam copiosam observavimus.

Isdem cum Cytiso Veterum esse facultatibus Vires prædicit venisimile videtur Clusio.

## CYTISVS TERTIVS HISP.

CVM BREVI PEDICVLO.

Edalibus, rarò cubitalibus assurgit ramulis, tenuib., omnino incanis: quos exornat terna-

Cytisii  
Gesneri.

Tabern.  
notatur.

Gerardus  
notatur.

Locus.

Tempus.

*Cytisus notum nota Matthioli.*

Folia.

Color.

Sapor.

Flora.



simul nascentibus ex molli quadam, & candida lanugine hirsuta vaginula similis cum superioriibus formæ, sed minoribus. Semen non obseruauimus.

Clus. Hisp. cytiscus 3. & Hist. post. 6. Valentini Baga aut Boxablanca dictus. Lobel. Obferu. & Icon. Plant. & hist. Lugd. cytiscus tertius, hispanicus clusij. Tabern. Icon. cytiscus vnde- cimus, hispanicus tertius. cytiscus nonus, hispanicus tertius. I. Gerard. Angl. Cytiscus tertius semper virens. The enet greene schrub Tresfolye. Quis docuit Gerardum semperuire, vel non virere?

Gerard. notatur. Locus. Vltus.

Inuenitur, annotante cluso, variis hispaniæ Baticæ locis: sed nusquam abundantiore vidi, quam in regno Valentino.

Eius plurimus est Vltus, siquidem illius ramis nudis & à suis foliis liberis supra tegetes sparsis, ab his qui bombyces alunt, iam saturi Mori foliis bombyces stamina sua sericea his ramis aduoluunt, quæ deinde à mulierculis & pueris explicantur.

Ad Bombyces.


CYTISVS HIRSVTVS.

Descriptio Virga.

Folia.

Flora.

Etiqua.



Descriptio Clusij. Virga.

giores, paulò triente viciæ latiores. Hunc Clusius sic describit: humanam altitudinem attingit, virgæque habet longas, non admodum fructuosas, neque lentas, nigrescente cortice ob-

sempet folia, breui pediculo inharætia, quorum medium duplò longius est reliquis, cinerei & canescentis coloris, adtingentis vtrò & linguam exsiccatum saporis: ramusculi ferè ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus, floribus aureo colore fulgentibus iucundi odoris, onusti sunt, binis aut ternis

ductas: folia trifoliola aut Medicæ, terna simul vni petiolo inharætia, supina parte viridia, prona verò subiuscula lanugine hirsuta, leguminum amarisculi saporis: flores ex alarum sinu reliquis maiores, cum Genistæ maioribus floribus comparandi, aureo colore fulgentes. huius semen obseruare non licuit, cum solùmmodo ad montium radices circa calpè & Baticæ maritimas inuenerim.

Clus. Hisp. cytiscus quarta, & post. hist. cytiscus tertius Escabon nupsdictus. An æscro hort. cytiscus in Italia nascens maior? cytiscus à Bellonio nullus, candidior, hirsutiorque? Lob. Obferu. Icon. Plant. & hist. Lugd. cytiscus quartus hispanicus. Nusquàm spontè natum vidit cytiscum Turnerus, quàm in Apennino iuxta Bononiam, idque copiosè: coluit in horto suo olim Boloniæ: iam etiam V. Visenburi frutices instar arbuscularum, altitudine hominem æquantes: ramis albicantibus, Lanugine incana obfistis siliquis, vt in Apyo Fuchsi, sed brevioribus quantum meminit. Figura pessima à Turn. part. 1. quæ iterum posita parte 2. pro Trifolio quincio, descriptio ieiuna. Tab. Icon. cytiscus duodecimus, Hist. Cytif. x. Gerard. Angl. Pseudocytiscus hirsutus The hairie bastard Tresfolye [vt antè diximus sub cytiso spicato,] videtur hunc cytiscum describere secundo loco, licet eius iconem non proponat.

Sapor. Flores.

Turnerus notatur. Pseudo cytiscus hirsutus.

Cytiscum repertam circa Baume oppidum Burgundiæ transiit in hortum Ill. E. C. V. Virt. Mont. belg. vbi feliciter pluribus annis floruit, & siliquas suas tulit. Eandem reperi in Sundgouia, circa Frigidum fontem, vbi priusatus: primò videram in Italia. Frater C. Bauhinus attulit collectam in montibus Enganeis circa Patavium. Clus. solùmmodo ad montium radices circa calpen & Baticæ maritimas florentem inuenit.

Locus & Tempus.

CYTISVS TERTIA CLVSII, PANNONICA, SPARSIS ramis.



Aliquot ramis præditus est, sparsis & humi fufis, tenuibus, lentis & fractu contumacibus, qui nullis, aut cerè rarissimis foliis sunt obfisti, multos autem ex lateribus ramulos proferunt tenellos, hirsutos, in quibus sola longis pediculis innitentia, terno semper numero, superiorib. breuiora. elato dorso, supernè viridia, infernè in-

Descriptio Ram.

Folia.

Sapor.

Flora.

canà lanugine pubescentia, amarisculi saporis & herbacei odoris. Ex alarum in extremis ramulis, nonnunquam & per totos ramulos prodèunt terni aut quaterni flores simul iuncti, superiori formà similes, coloris lutei, qui tamen, dum marcescere incipiunt, aureum colorem aded saturum contrahunt, vt purpurea cerè videantur: folliculi vnde flores emergunt, pallent, & lanugine pubescent;



*Siliqua* *Se-*  
*men* *Radi-*  
boscant: siliquæ plantæ, hirsutæ, semen continet exiguum, subfuscum: Radix dura, lignosa, iuxta quam rami per terram sparsi, subinde fibras agunt.

Clus. Pannon. *Cytisus* 3. & Hist. post. septimus. Tabern. Icon. *Cytisus* octauus, Geißflee. & Hist. *Cytisus* sextus. Gerard. Angl. *Cytisus* quartus, hirsutus *Sairie schrub* Trefoile. Hort. Lus. *Cytisus* 3. Clusii, & 8. Tabernæmontani.

Locus & tempus. — Anno 1595. Iulii 7. Argentinæ accepimus à D. Vldancho Chelio, ex plantis diligentissimi Botanici, D. Agerii, cum hac inscriptione, *Cytisus Pannonica Clusii*. Spontè provenit, sic enim tradit Clusius, in silvula quadà ad *Lachen*, primo ab urbe Vienna milliari, & plerisque aliis locis urbi vicinis: tum etiam in utriusque Pannoniæ silvis, atque etiam in Interamni, ultra Dravum flumen, Maturis floret superioribus Pannonicis, Maio videlicet, nonnunquam etiam Aprilis, & novos interdum ex ramulis flores per totam deinde astatem profert.

### CYTISI TERTII PANNONICI TERTIA SPECIES CLUSIO, supinis ramis.

Descriptio. *Virga.* *Folia.* *Flores.* *Cytis* tertii in Pannon. in post. verò Hist. *Cytis* tertii septimi, species altera Clusii, pedibus virgis inuenta, tenuibus, virdibus, supinis & humi fissis, quas ambiunt folia superioribus *Cytis*is similia: flores etiam similes, extremis virgis quini, lenti, aut plures simul congesti innascentur: nulli autem per virgas sparsi, ut in superioribus: siliquæ & semina non differunt, virgæ, foliorum pars prona, & siliquæ molli hirsutæ pubescent.


Locus. Invenitur in Pannoniæ silvis, florétque Maio.

### CYTISVS GLABER, SILIQVA ANGUST A.

Descriptio  
*Folia.*

*Flores.*

*Siliqua.*



**F**OLIA huic *Cytis*o, terna quidem illa, ex rotundo sublonga, ut *Cytis*o Gesnerii, verum glabra: flores ad virgularum angulosarum latera, ex foliorum alis, singulares, quantum animadvertere licuit, satis magni, longiore calyce quam in *Cytis*o glabro siliquâ latâ: à quo & siliquæ distinguunt, ex latere, ut mox de floribus dicebamus, prorum-pentes, culmo

angustiores, vncias duas longæ, pediculo brevissimo harentes, glabræ, quæ sicca nigra: inter *Cytis*os tenuiores siliquas non observauimus, nec etiam omnes vidimus, in quibus semen orbiculatum, rufum, compressum, lente minus.

Aliis iudicandum relinquit Anguill. an de hac Tom. I.

*Cytis*o intellexerint Dioscorides, Theophrast. & agriculturæ authores, esse autem Galeni *Cytisum* l. 1. de Antidotis statuit, quia semper habuerit ex ea regione, vbi provenire dicant. An Cordo in Hist. Pseudo-*Cytisus*, siue niger *Cytisus*, Tubingæ proveniens solus absque albo? Tubingæ aliquando vilus à me *Cytisus* quem eundem tunc putabam cum Gesnerii *Cytis*o, nunc non ausim asserere: nec etiam an hic de quo nuncagitur. Frater C. Bauh. plantæ sicca, quam Patavio nobis miserat, adscripserat *Genista Alpina*, *Cytisus angustifolius* Galeni. Trifolium fruticans Guilandino. An Camer. hort. *Cytisus niger* siue maior Pseudo-*Cytisus* forsitan Clusii?

*Pseudo-cy-*  
*rtisus.*  
*Cytisum ni-*  
*ger.*

*Genista al-*  
*pina.*  
*Trifolium*  
*fruticans.*

### CYTISVS GLABER, SILIQVA LATA.



Descriptio

**A**CCOMMODVS est tonsilibus arearum marginibus reliquisque topiarii operis delictis, obsequiosis virgulis, quæ alicubi ad tertium & quartum cubitum assurgunt, glabræ, & vbi attenuati occipiunt, angulose: per has folia ter-na, semper iuncta, cœcinna & rotunda, vnciæ brevioribus pediculis harent, at verò in ramulorum, qui flores,

*Virgula.*

*Folia.*

*Flores.*

*Siliqua.*

*Semen.*

aut siliquas sustinent, extremis, non iam à ter-na, sed bina, aut singularia, fortuito posita, latiora, & in acumen desinentia, Verum tum hæc tum illa læto virore arident, nullis obsita pilis. Flores summitatibus ramulorum acutius in-fident, lutei, Genistellæ amuli, ex pedicellis semunciarum brevioribus, quibus succedunt siliquæ, vnciæ vnam aut alteram longæ, semunciam latæ, compressæ, glabræ, in quibus semina fusca, subrotunda, compressa.

An Anguill. *Cytisus* in Prouincia & Corsica proveniens, quam quidam monstrant, dicentes, folia habere *Eruca* odorem? Lobelius & Pena Adu. *Cytisus* altera minor & vulgarior. Icon. Plant. *Cytisus* alter, cuius figura satis infeliciter picta est. Hist. Lugd. *Cytisus* alter Penæ, notior, frequentiorque Italiæ & Gallo-prouinciæ, foliis ternis (quæ pictor omisit, binis tantum pictis) maioribus, rotundioribus, quam in priore *Cytis*o, ex atroreutibus. Verum fateatur Hist. pessime enim tum floribus, tum foliis est pictus *Cytisus*, nec scio quenquam præter Lobelium & Penam qui depinxerit. Tabern. Icon. & Hist. *Cytisus* quintus rotundifolius, *Runder Geißflee*. Perperam appinguntur siliquæ hirsutæ, quæ etiam à Compilatore Tabernæ non bene describuntur. Gerard. Angl. *Cytisus* secundus Theophrast. Trefoile, qui & ipse malam habet figuram Tabernæ.

*Tabernæp.*  
*natur.*

Hunc *Cytisum* vidi in Italiæ, & Basiliæ in hort. Locus II.

to Domini Doctoris Felicis Plateri, & I. Herzmā Pharmacop. ac Argentinæ in horto Domini Friderici Meier, à quo habui semina Montbelgardi ferenda in hortum Illust. Excel. Cels. VVirtemb.

CYTISI GENVS MISSVM, NO-  
MINE EBENI SECVNDI, FLO-  
ribus purpureis.

Descrip.

Virgula.

Folia.

Flora.

Semen.

Ebeni  
Candide.

Descriptio  
Bell.

Folia.

Flora.

Semen.  
Materies.

Locus.



FRUTICO-  
SAM quan-  
dam plantam  
Ebeni secundi  
nomine dona-  
runt Itali, vir-  
gultis lentis, te-  
retibus, canā la-  
nugine pube-  
scenubus, per  
quæ folia con-  
spiciuntur, vn-  
cialibus pedicu-  
lis appensa, ter-  
na, cythorum  
modo longa, a-  
cuta, villosa, al-  
bida. Flores in  
spicam diges-  
tos, pariter ac  
Trifoliū maius,  
siue cythus

Tragi, gerit, purpurantes, ex folliculo lanugino-  
so candicante, in plumatas cuspides desinentes,  
vnicuique verò folliculo folium subiicitur, acu-  
minatum: semen involucre Trifolii bituminosi  
clauditur, album, oblongum, ad Milium vulgare  
accedens.

Iosephus Casabona Ducis Florentini hortula-  
nus misit semen, cum hac inscriptione, *Ebeno Can-  
dia*. Frutex cythus alter Candide, vel Ebanum  
floribus purpureis, in catalogo horti Bemb. Pa-  
tauni.

De hoc cythi genere existimamus Honor. Bel-  
lum hæc scribere Epistola ad Clusium. cythus  
creticus frutex est totus obliquus, ad quatuor aut  
quinque cubitorum altitudinem assurgens: folia  
profert terna simul iuncta, argentea, Trifolii æ-  
mula, dorso aliquantulum prominente: flores  
Trifolii maioris, adhuc tamen maiores, rubros in  
quib. intermixti sunt albi quidam villi, qui Stru-  
thiocameli pennas, easq; in minutissimas partes  
diuisas æmulantur, ea ratione flos elegantissimus  
apparet: videtur enim ex purpura & argento  
quodammodo formatus: succedunt semina Mi-  
lio maiora: materies ligni agra, durissimæque  
est, cortex cinereus, & totus profundis scissuris  
plenus, oritur vbique in asperis collum locis  
& præcipitiis, vocaturque vulgò, ἀρχονδύλον, quod  
nobile lignum sonat. Hunc fruticem cytu-  
sum, & fortasse legitimum esse iudico.

Laudandus candor & veritatis studium, stir-  
pium diligentissimi & peritissimi Honor. Belli,  
dum ait, se errasse nunc deprehendere, quando  
cythum Creticum ἀρχονδύλον vocatum, legiti-  
mum fuisse putauerit. Nam differre ab hoc foliis,  
quæ angustiora & longiora sunt, neque semper  
vno pediculo terna simul, sed quaterna & quina,  
seménque non in siliquis, sed Trifolii modo pro-  
ferre, hancque ob causam non amplius cythum,  
sed Ebenum creticam vocandam hanc stirpem  
censendam, materiem enim ligni plurimam ac-

cedente colore nigro, splendore & duritie.

Gener Cherlerus attulit nobis pulchros ramos  
cum flore ex Horto Florentino Mag. Ducis He-  
truriz. Prius verò semine Florentino à Casabo-  
na misso prouenerat nobis in horto Ill. E. C. Vvir-  
temb.

CYTISI FACIE ALYSSON

FRUTICANS QUORVNDAM, Lob.



PER quam pa-  
rum notus  
hic perelegans,  
& parum fre-  
quens exoticus  
frutex, nisi cul-  
tionibus Belgii  
viretis, vbi flo-  
ribus luteis  
leucoii minoris,  
Ætate lucet, &  
sparsis numero-  
sis, anfractuosis  
Polemoni flua-  
tis coliculis: Fo-  
lia cythi habi-  
tiora, albida,  
hispida, cetaceis  
pilis rigida: ra-  
dice lignosa, du-  
nre: & in folli-  
culis semine.

Lob. Obs. & Icon. Plant. vocat Cythi facie  
Alysson fruticans quorundam. Tabern. Icon. &  
Hist. Cythus adulterinus, Alysson fruticans,  
Vermechter Geißlee. Gerard. Cythus adulteri-  
nus, siue Alysson fruticans Eschard s. s. rub. Tre-  
foile. Hist. Lugd. cythus facie Alysson quorun-  
dam, Lobelii.

TRIFOLIUM FRUTICANS,

QUIBUSDAM POLEMONIUM  
fl. teo.

ore lu



Vario im-  
plexu ser-  
pit radix alba, ac  
ex pluribus pro-  
germinat locis:  
vnde tricubita-  
les exsurgunt  
rami, angulosi,  
virides: in qui-  
bus alternatim  
furculi surgunt,  
folia producen-  
tes, lato virore  
splendentia, ter-  
na ferè, vt in  
Trifoliis: singu-  
lar porciones ad  
Rutæ vulgaris  
porciones acce-  
dunt: sapore in-  
grato & feruido.  
In ramulorum

extremis, flores oriuntur lasini facie vel Arthri-  
tica, siue Primulæ veris, quinquepartiti, lutei:



*Bacca.* Iis decidentibus succedunt baccae satis magnae, rotundae, rubrae, in quibus continetur semen, simile ferè Piso vulgari minori, intus album, ingrati saporis.

*Polemonium* *Monsp.* Polemonium Monspeli olim vocabant, sicut & Lugduni *Iasmin ianthe*. Ruellius de hoc Cytisifolium loquitur, dum dicit: postquam Polygoni Dioscoridis historiam pertractauit Plinius alterum genus adiecit, quod Polygonum sylvestrem nominat, cuius descriptio in plerisque cum superiore Dioscoridis pictura dissonat, quapropter aliud esse genus non dubitaverim: penè arboris modo frutex, radice lignosa, stirpe cedri rubicundo: ramis Sparti, binum palmorum, nigris geniculorum ternis, quaternisque articulis: lator mali cotonei. Hac mihi certè facie demonstratum, quod Polygonum sylvestrem appellatum, fruticibus magis, quam herbis annumerandum, ut quod arbutularum minetur altitudinem, stipite & ramis sparti, atro virore saturatis, binum palmorum, ternis Rutæ foliis, nigricantibus, ex interuallo fatis, sapore mali cotonei, radice lignosa. Sed iam, quod ramis herbaceis, fronde minutà Genistæ, quam vocant Sparton, foliatis vestiatur, multi Genistellam audent appellare apud nos in Gallia.

*Polygonum* *sylv.* Gesnerus hort. *Polemonia Monspeliensis* plerique, herba *Ruta capraria* dicta. Item *Limonium Monspeliensis*: foliis ferè Polemonii, flosculis luteis, confectis, exilibus, oblongis. Quod quidem ipsi cum Limonio nihil commune habere videtur: & suspicatur enim propter vocum vicinitatem Limonium aliquem pro Polemonio protulisse: Pingi à Dodonæo tanquam alteram Polemonii speciem, sed errat. Item vocat Rutam capratiam Gallorum, Monspeli vulgò sic dictam, foliis Rutæ, quam quidam Polemonium Dioscoridis esse, multis persuaserint. Facile crediderim ego Gesnero Limonium scriptum fuisse, pro Polemonio, non tamen propterea concesserim Polemonii alteram speciem Dodonæi. Is enim ait in Hist. frum. cytisum quem plerique appellant Trifolium fruticans nominare malui: cum cytiso enim non convenit, nisi Marcelli cytisus sit, cum quo aliquam fortè similitudinem habere videri posset, si flos, qui ei luteus est, albus esset, aut galbineus: galbineus autem color, idem videtur cum coeruleo, aut similis.

*Ruta ch.* *præta.* Sunt verò & nonnulli, qui Trifolium istud Polemonium esse existimant, quod videlicet cum vulgaris Rutæ, aliquam huius folia similitudinem habere videantur. Sed Polemonium non vulgaris Rutæ est folio, sed alterius, Hypericoidis videlicet, veluti Hypericum Anonis, & Centaurium minus, quæ etiam folio Rutæ describuntur.

*Cytisus.* Ruellius authoribus Lob. & Peña perperam adstruit Polygonatum silvestre Plinianum, folio Rutæ, Polemonium fruticem, quem non novit isto nomine, & fieri potest, ut hallucinatio sit Polygonati ad Polemonium.

*Ruta duplex.* *Ruta Hypericoides.* Polemonium Monspeliensis, pro *Androsæthæ*, auctore Dioscoride Gallis, Belgis, & Anglis putata & vocata Genista peregrina quadam species. Obs. & Icon. Plant. Polemonium. Hist. Lugd. Polemonium Monsp. *Iasminum luteum*. Tabern. Icon. & Hist. Trifolium fruticans *Baumeinther wiesenflee*. Gerard. Angl. Polemonium, siue Trifolium fruticans *Schrub bie Trifoile*. C. Bauh. Ph. Trifolium tricesimum secundum, siue fruticans *bacciferum*.

*Androsæthæ* *luteum.* Reperitur, ut scribit Dodonæus, apud Belgas in studioforum hortis aliunde inuectus: floret æ

*Locus.* Tom. I.

state: Autumno semen maturum. Florentem vidimus mense Martio, Aprili, Maio & Iunio. Baccae autem ferentem copiosè mense Augusto, quæ per Autumnum & Hyemem durant. Prouenientem autem obseruauimus Monspeli in sepibus, & inter Monspelum & Nemausum, ac Lugduni cultum in hortis propter pulchritudinem. Præterea vidimus in horto Publico Patau. Genevæ in horto nostro proueniebat. Lugduni florens mense Septembri in horto, ibi vocant, *Iasmin ianthe*, inde Montbelgardum curauimus adferendum ad Principis hortum. Bononiæ in horto S. Saluatoris obseruauimus, nec non Basileæ in horto D. D. Felicis Plateri: Stutzgardia in horto Ducis. Rickenvilla in horto domus Illust. Exc. Celf. V. Virtemb. vnde etiam Montbelgardum copiosè evulsum transulimus: interdum summities geli perdantur, nec faciliè fructum fert apud nos.

Dodon. Trifolium fruticans, nullius quidem vñs est: nec animantium cuiquam, multò minus apibus, quod sciatur, gratum.

Vñs nullus.

### TRIFOLIUM FRUTEX GENISTÆ FOLIO.



*Plantæ* *hu-* *ius* *cubitale* *adseruamus* *ramum*, *rectum*, *teretem*, *Genistæ* *facie*, *striatum*, *fungosum*, *in alas* *alternò* *positu* *diuisum*, *quarum* *commisuris* *folia* *herent* *unà* *parte* *trifolia*, *extremà* *singularia*, *Genistæ* *apprimè* *similia*: *ramorum* *extremis*, *veluti* *spicati*, *sed* *maiore* *positu*, *flosculorum* *capitula*, *ex longiusculis* *pedicellis* *alternatim* *herent*, *flaua*, (ut sicca ostendit) oblonga, ad quorum insertionem minutissima foliola adnascuntur.

A clarissimo Domino. Domino Stuartio Illust. Ducis V. Virtemberg. Medico ex Italia illatam dono accepimus. Vbi autem eam locorum collegit, non recordamur.

### ASPALATHVS SECUNDA, TRI-FOLIA, QUÆ ACACIA SECUNDA Matthioli Trifolia.

*Pedales* *adseruamus* *ramos* *aliquot*, *rigidos*, *fimos*, *atque* *lignosos*, *cortice* *subcinereo* *striato* *obtectos*, *ligno* *albicante*: *pro ramis* *hac* *illac* *spinas* *exerit* *feroces*, *duarum*, *aut* *trium* *vinciarum*, *quarum* *nonnullæ* *bifidæ*, *aut* *trifidæ*, *striatæ* *&* *ipse*, *reliquoque* *ramo* *concolores*: *quarumque* *non* *commixtus* *modò*, *sed* *ipsimet* *etiam* *medietati*, *ex longiusculis* *pediculis*, *folia* *herent*






deinde in ramos, quartoque anno arborefcit.

*Colytea* *arbor.* Ea autem circa Idam proveniens, quam vocant *καλὴταν*, genus aliud est, fruticosum & ramosum [ *ἔχιδνα* ], nodosum vertit Dalechampius ] multas alas habens, rarum verò, non multum. Habet folium Laurinum, Lauri Latifolia, sed rotundioris ampliorisque, ut vel vlnco simile appareat, oblongius tamen: colore parte altera herbido: [ *χλωρόν* ] tergo autem albedo, nervosque, à posteriore parte nervuli tenues, inter eas propaggines, & inter partes similes costis de media protenduntur. Cortice non lævi, sed quasi vitigineo: ligno verò duro, spissoque, radicibus per summa tenuibus & solutis & crispis, atque flavis maiorem in modum. Fructum & florem non ferre dicunt. Cachryn autem in vertice [ *καρυδίδων* ] geminosque [ *ἑρδιδων* ] circa folia, admodum læves, pingues, candidosque facie, Cachrys similes: praefixa & vsta, ab imis subnascitur atque resurgit [ *ἐκ τῆς ἀρχῆς* ]. Hæc Theophrastus.

*Cachrys.*



Plinius de Ceride (quam Theophr. lib. 1. c. 18. cum Colætia [ *καλὴταν* ] circa Liparam, arboribus semen in siliquis habentibus annumerat) nihil de Colutea: autem ubi agit, videbis. *καλὴταν* inibi, ut notat Scaliger mendosè legitur, *καλὴταν* in tertio appellat, ubi Liparitanam vocat arborem, *καλὴταν* verò & diuersam, & Idæ propriam.

Colytea, siue Colutea, siue Coloitea nomine Theophrastum intelligere tres plantas scribit Solerius, verum nullam esse *Bagueaudia*, ut voluerint Fuchsi, Ruellius & Mitholus.

Sed Colytea & Colutea spectemus æquiuoca. Existimabat Solerius Colyteam folio Salicis Theophr. 1. c. 14. esse Dioscoridis Anagyridem & Plinii Laburnum, de qua nos hoc libro 11. sub Laburno. Ab Anagyride non multum cedere videtur Colytea apud Theophrastum folio copioso (quamuis in aliam abeat sententiam Theodorus), Cæsalpino. Colutea multis, de qua paulò post, sub Colutea vulgaris titulo. Coluteam præterea non pauci, *Senam* vulgarem esse credunt. Nonnulli Coluteam Scorpoidem faciunt: Clusius in Pannonicis Eliorem. Idem etiam in Pann. Coluteam Scorpoidem humiliorem contendit. Tandem est Colutea Scorpoides altera Clusio in Pann. Hæc an Polygala affinis Clusii. Colutea Scorpoides peculiaris species folio Ruræ, per hyemem & frigori diligenter munienda: Depinxit etiam aliam Clusius in Obseru. Pann. Crescit in Gallia circa Montepellum & vicinis Viennæ montibus. Considerandum adhuc ad quam præcedentum pertineat. Colutea Scorpoides coronata Lobelio, Polygala Clusio. An Polygala Cornusii similis? Colutea minima, Polygala Valentina prima Clusii. Vlnco quodammodo similis arbor à Theoph. Colytea dicitur, videtur autem Vlnus sylv. Plinii Inquirendum proponunt Aduersaria Penæ & Lobelii, Germanorum *Paulbaum* an Colytea sit Theophrasti? De hoc fructu Hist. nostræ generalis lib. 5. sub Alno nigra baccifera. Colyteam Theophr. in Ida provenientem suspicatur esse Apocynon Dioscoridis, Solerius De ea Hist. nostræ generalis 1. 15. Colytea Theoph. quibusdam Arbor Iudæ, de qua Hist. nostræ lib. 12. Staphylo dendros aliquibus Colytea, de qua Hist. nostræ lib. 3.

*Colytea* & *Colutea* æquiuoca. *Laburnum.* *Anagyris.*

*Colutea* *vulgaris.* *Senæ.* *Colutea* *Scorpoides.* *Colutea* *Scorpoides* *humilis.* *An Polygala* *Clusii* *affinis.* *Colutea* *minima.* *Polygala* *Valentina* *prima* *Clusii.* *Vlnco.*

*Alnus nigra* *baccifera.* *Apocynon.*

*Iudæa* *arbor.* *Staphylo dendros.*

## S E N A.

Descriptio *Senæ Orientalis.* **S**ENa, quam ex Oriente Infitores important, Sprime est note: caulibus cubitalibus, aut paulo Tom. I.

Id altioribus, lignescens: ex quibus alternatim exeunt pediculi tenues, palmo longiores, ad quos ex medio-cribus interuallis adnexæ sunt foliorum quatuor aut sex coniugationes, nullo impari alam claudente, quod animaduertentibus adhuc: singularia folia, autem folia ex videnti in flavum declinant, proximæque costæ adhaerescunt, Glycyrrhizæ foliis simili- *Canter.* *Gustum.*

lia, sed acutiora, gustus nonnihil viscidus & amari, non sine nausæ aliqua. Siliquæ falcatæ, compressæ, nigricant: semen continentes paruum, gigantis simile, sed compressum, album vel nigricans. Porro, quam Florentinam dicunt, foliis quidem est similiter dispositis, sed multo maioribus, nervosioribus, non acuminatis, sed per extremitatem latis ac penè cordatis.

Hanc Cæsalp. sequentibus verbis describit: Sena nostras frequens est in agro Pistoriensi, ferturque in quibusdam Florentiæ locis: caule constat cubitali: foliis latioribus Senæ Orientali: gustu glutinoso: flores fert luteos: siliquas compressas, & falcatas, angustiores Orientali, linea vtrinque per medium inæqualiter extuberante, seminibus nigris, compressis, figura cordis: vtuntur hac Medici loco Senæ Orientalis, sed longè inefficacior est ad purgandos atros humores. Huius meminit Serap. ex auctoritate Abohanisa. Sena asseruatur fibra, siliquas lunatas, & oblongas profert: in quibus semina in ordinem digesta clauduntur. Siliquæ tenui pediculo pendunt: idèque ab eo facili ventorum impetu deturbantur. Caducas opiliones colligunt.

Senna inquit Mesue, est folliculus plantæ, Persis dictæ *Abalzemer*, Orobi modo nascentis: Sattua est, & aggregatis.

Frutex est, Ruellio teste, quadriennio se in arborem effrens, ramis exilibus, folio Fœnugreci, membranaceo folliculo, pellucente, prætumido, & veluti quodam spiritu distente turgido, ita ut si digitis prematur, crepitans dissiliat, in quo semen atrum, durum, latum, lentis magnitudine, Pisi gustu.

Videntur Actuarii tempore siliquæ potissimum in usu fuisse: scribit enim Sena à Barbaris appellatus siliquosus ille fructus est, qui citra noxam drachmæ pondusculo in aquam coctus, sumptisque pituitam & bilem purgare affirmatur.

Contra Cordus Hist. Senam sic describit: caulem erigit cubitali altitudine, paucis ramis fruticosum, foliis in singulis pediculis, vtrinque tribus, vel quatuor, binis semper per interualla ex contrario & rubente adnexu erumpentibus, Portulacæ foliis figurâ similibus. Flores lutei & pallescentes, quinque foliis in concanitate aliquam reflexis constantes, eiusdem coloris stamina habentes. Radix tenuis & inutilis.

Fuchsi vocat Colutea alterum genus, & siliquas ferre ait non ita tumidas, vt Colutea, in quo

*Siliqua Senæ.*

*Senna Florentina.*

*Descriptio Cæsalp.* *Caulis Folia, Floi, Siliqua.*

*Semen.* *Senæ Orientalis* *substitutum.* *Serapio de Sena.*

*Genera Mesue.* *Abalzemer.*

*Descriptio Ruellii.* *Rami, Folia.*

*Semen.*

*Descriptio Cordi.*

*Caulis Folia.*

*Radix.* *Colutea altera Fuchsi.* *Buchsi.*

nobis non placet: eò quòd filiquas Senæ tumidas fuisse aut esse, animaduertere hæcenus nobis non licuerit.

Candido in fastigiis & violæ adsimili emicante est flore qui in nigras abit, & incuruas instar Genistæ filiquas: Semine aliquantùm lato, ac incano, quod à me, inquit Tragus, aliquando factum, plantulas Senæ protulit.

Locus.

Senæ alioquin ex Italia in Germaniam magna in copia deportatur, nam in illis regionibus sicut & in Gallia sponte sua gignitur, præstantissima verò ex Alexandria defertur. Ea luteos profert flores, alteræ vulgari similes. A Theophrasto descripta est, Liparæ peculiarem speciem asserente. Quod verò quidam Senam Delphinium, seu Alypū, aut Peplium Dioscori. esse dixissent, nihil me mouet, quominus Senam cum Ruellio Coluteam Theophrasti cum Euchar. Rœlin. esse statuam. Galli hanc *Bagueaudier* vocant. Serap. *Habbanisa*, Mesue *Abazemer*, A Æturiis fructum filiquosum appellat. Ex his autem Tragi verbis satis apparet eam miscuisse Coluteam cum Sena. In Gallia an proueniat nescio, nec in eadem aliud nomen habet quàm Senæ. Præterea Italicam ab Orientali distinguit floris colore: vni namque candidum, alteri luteum florem tribuit, quæ distinctio an sit vera considerandum.

Delphinium.  
Alypū.  
Peplium.

Trag. re-  
preh.

Delphinium.

Non deesse autem qui Senam Mauritanis vocatam Delphinium esse credant attestatur Matth. quorum grauis error euident. Constat enim Senæ Mauritanicæ folia sapore Fabarum esse prædita: flores ei emicant aurci, veluti Brassicæ, purpureis intercurantibus venulis: quibus succedunt folliculi falcati in quibus semen continetur in nigro subuilescens.

Ruell. Senam eam arborem esse existimauit, quam Theophrast. Coluteam appellat & magno errore putauit Senam non herbam esse, sed arborem.

Senæ Alex-  
andrina.

Senæ non  
est Delphi-  
nium.

Ceterùm è Sena, ea magis præstat, quæ ex Alexandria Ægypti vel ex Syria affertur: quæ de Sena cõmuni & viliori sentire, quæ minor & efficacior est Alexandrinâ, Gesner. hort. Marantha dicit. Si Dioscor. vult Delphinii folia Delphinatorum effigiem repræsentare, reprehendendi sunt, quia Senam Arabum Delphinium esse credunt, quia folliculos, habet contortos Delphinatorum effigie: quâquam minùs culpandi sunt, qui eundem Delphinium plantam esse volunt, quæ Consolida regalis vulgò dicitur: quæquæ à Fuchsio pro Eranthemone depingitur: hi enim contextum tanquam deprauatum ita emendant, vt Similitudo [Delphini ad flores referatur:] delphini ad flores referant, non ad folia. Verùm illi nullo pacto contextum immutantes, quod foliis tribuendum est, folliculis tribuunt, neque aduertunt florum colorem non purpureum, sed luteum Senam habere, nullamque ex aliis notis adesse, neque facultates respondere. Senam ergo Arabum, qui volunt esse Delphinium, Delphinatorum effigiem ad folliculos non ad folia, vt Dioscorides deducunt.

Manifestus error volentium Senam esse Theophrast. Coluteam, quæ arbor est, cum Sena herba sit, quæ feritur, quæ vltra annum restibilis.

Senæ non

Sesondron.

Senam nonnulli apud Io. Agricola Alipon Dioscoridis, quidam Empetron, Marcell. Delphinium iudicat, Sesondron à quibusdam cognominatum quòd hominem sospitet. Verùm nec Alypon, nec Empetron, nec Delphinium est.

Senæ ab antiquis nusquam descripta est, nam & Auerrhoes nouam herbam esse adstruit, & præcisignotam. Si apud Dioscor. lib. 3. capite de

Androsace legèdum est *Androsace*, nihil aliud monstrare posse existimat Anguill. pro Androsace quàm Senam vulgarem Lob. & Penæ Adu. & placet ab Arabum Alba semer, Senæ detortam esse dictionem.

Androsace  
Senæ vulg.  
dicta.

Senam Officinæ potiùs è fundo vernaculo, nēpe Orientis emporiis, petunt, eamque pluri faciunt, quàm Italicam, duas autem foliorum differentias aut varietates habent infiores è diuersis plantis Senæ: probatius & laudatius ad purgationes (*finum* vocant) est oblongus, acutius, Myrti maioris effigie: alterum rotundius, breuius, quod vilius habetur: non secus atq; Myrtus maior & minor, foliis videntur hæc duo inter se distare, vt præstantius sit folium domesticæ: alterum syluestris Senæ. Ad persuadendum autem alterutram earum esse sylu. multam spiritilla stercoreis caprini aut ouini faciunt, quæ frequenter inter Senæ Orientalis, folia, folliculos & quicquid passim ad nos allata reperiuntur, vbi empturis prostant: feritur namque & adolefcit probarius in fimeo ouillo inibi. Flores ex pallido lutei sunt, rubellis vestigiis venosi, graciles caules pedem & sesquipedem alti. Arabum & Æturiarum Sena fatiua & sylu. Nescimus quare de Anguillara Senam & Cassitham huiusmodi &c. Obscurior videtur Lobelius in distinctione Senæ: nobis verò sit verisimile Senam domesticam maiore esse syluestri: laudat tamen eam quæ acutior folio, quam crediderimus minorem Florentinâ, quantum quidem animaduertere potuimus. Tab. & Gerardo Sena Orientalis, Item Sena Italica semine paulò nigriore quàm Alexandrinæ, facultate etiam imbecilliori. Senam Italicam annuam esse plantam Camer. hort. scribit, ac folia nocte contrahere, sicut multa alia eius generis leguminosa: Alexandrinam ne quidè in Italia vltra annum duret, ideoque pro fructu haberi non posse. De Sena item quædam Galeno Mesuen addicere, quæ ille ne fornauerit quidem.

Senæ differe-  
ntia.

Finum.

Senæ Ori-  
entalis.

Anguilla-  
ra notatur.  
Cassitha.

1.  
2.  
Senæ Itali-  
ca.

Alexandri-  
na.

Mesue  
notat.

Alexand.  
minores for-  
siones excu-  
tat.

Mechina.

Sæcto.

Senæ simpl.

Porro apud Matthioli. Germ. duas esse species Senæ tradit, atque vnam dici Orientalem aut Alexandrinam, folio longiusculo Myrto ferè simili: Siliqua crassiuscula, semine multò abidiore quàm in aliis: quæ torsiones minùs excitat quàm Italicæ: Eamque rursus duplicem Mechinam, ex Mecha delatam, præstantissimam folio longiusculo, angusto nonnihil acuto & crassiusculo colore ex luteo virenti: Alteram denominatam à loco vbi proueniat Sæcto, quæ paulò viliori pretio vendatur, nec præcedentis bonitatem assequatur, melior tamen sit Italica, folio latiore & rotundiore, ac semine nigricante: Sena si simpliciter scribatur assumenda folia & filiquas. Is duas habet figuras: prior est qualis nostra Fuchsiana foliis rotundioribus, quam vocat Senam vulgarem, altera, cui titulus est Sena Alexandrina, cui folia sunt acuta: verùm differt ab omnibus figuris, quas hæcenus vidimus, ac ipsius Tabern. in fine enim pediculorum folia singularia pinguntur quæ Cordus Senæ negat: Nos ramum pingimus Senæ exhibetæ pro Orientali, & folium dictum pro Sena Florentina.

C. Bauh. apud Matthioli. Sena duplex est, vna rotundifolia, altera acutioribus foliis.

Planta, autore Matthioli est frigoris impatientissima: ob idq; feri vult Maio nec vltra Autumnum perdurat, siquidem (ut pluries expertus sum) prius fata facillè frigore perditur, tenus verò Hyemem similiter non tolerat. Seritur vt vult Dodon. in Syria & Ægypto: item in Italia, Proincia, ac Narbonensi Gallia. Apud Germanos & Belgas

Locus &  
tempus.



Belgas difficulter prouenit. Amat calidas regiones. Hactenus non obseruauimus nec intelleximus in Gallia prouenire, Lobelius etiam non annotauit ibi obseruatam: In Liguria, Thuscæ, Romani agri, & Apuliæ variis locis legitur Autumno, nec feritur ante Maium: in hortis Septentrionum vix trimestre viuit, nec promit, nec maturat flores vel filiquas. Quare Officinæ ex Orientis emporiis potius petunt, quàm istam, aut Italicam. Duplex est genus obseruatum: unum semine nigro, alterum albo. Aliquoties per me fata est Môtbelgardi in horto C. V. Virt. sed frustra. Vidi Basilæ in horto Io. Heitzman Pharmacopœi Florentinam Sennam cum flore: item apud fratrem C. Bauhinum, qui portionem dedit. Est mihi filiqua Senæ missa ex Creta per Dominum Honor. Bellû Fratrî Casparo fusco semine. Bayrus ad Sodam frigidam in lixiuio externè vtitur foliis Senæ. Senæ filiquosus fructus (quantum quidem ex Actuario colligere licet) citra noxam, drachmæ pondulculo potus, pituitam & bilem deiciit, post hos reliquos humores modestissimè purgat, retorndam attramque bilem, eiusque suffusionem ex gallinaceo iure depellit. Vetusito capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini succurrit. Sed seruata cû potius quàm triti farina propinatur. Interaneorum obstructions tollit. Sena, inquit Serapio, misicè prodest delitio, amentia, fissuris totius corporis, resolutioni neruorum, phthirasi, cephalalgia, scabiei, pustulis, pruritu, & epilepsia. Cor etiam roborat, si tamen iis potissimum in comin scatur medicamentis, quæ ipsum maximè confirmant, veluti Viola.

Foliorum Senæ & Chamæmeli decoctum lotionem cerebrû & neruos roborare, deinde & quoties modo sumptam Senam visum & auditum firmare, melancholicis & antiquis febris succurrere scribit Mesues, Viscerum obstructions aperit, augeat iuuentutem, seniumque retardat. Folia in capitis perfusionibus vtiliter decoquuntur, præsertim addita Anthemide. Trago perhibente Sena medicorè calefacit & exiccat. Virguntur filiquæ & semina, dehinc folia ad purgationes. Inter omnes purgatorias, & expultrices medicinas, vix aliam reperias vtiliorem, vltatiorem, & minùs noxiam. Decoctio namque Senæ pota, crassos & viscosos humores educit, melancholiam expurgat, sanguinem mundat, exhilarat cor, & omnia interaneis. Decoctio. a. sic conficitur. Sumitur Senæ foliorum vicia vna & dimidia, eaq̃ue probè abluuntur, caulibus crassioribus & reliqua immunditie amota, Caryophylla 12. gingiberis, non tusti radix minutim concisa seminum Fœniculi, Anisi, ana drachmæ ij. Hæc omnia in olla nova & munda lento igne supra tertias in vino aut aqua pro ægritudinis ratione, decoquuntur, mox per pannum percolantur, Saccharumque addicitur, quantum quidem videtur res ipsa postulare, tum ægro manè & vespere cubitum iuro, decoctionis huius calefactæ medicocris exhibetur cyathus, ita tamen vt nullum, postquam potionem accepit, intra quatuor horas cibum assumat, Hæc decoctio citra periculum puero vel adulto exhiberi potest. Puerperis benedicta est medicina, sed his quidem non cum Saccharo condienda fuerit prædicta potio: Sunt qui illi pauxillum Rhabarbari tusti admiscant, tum enim purgabit efficacius: Serapio drachmam foliorum Senæ in puluerem redactorum, in iusculo gallinaceo sumptam pares, facultates habere tradit. Caterulum. è Sena adhuc in agro virente, & rosarum diluto Matth. quotannis Syrupum parare consuevit, qui tunc, largè-

que omnes [ vt inquit ipse ] purgauit humores. Datùque commodè prægnantibus & pueris, & cuiuscumque ætatis hominibus: Dilutum tamen magis præstat, quàm decoctum, quòd nulla ex parte exhalet: cuius viciæ quinque, vel sex alvum modestissimè, & sine molestia solvunt. Quòd tunc dari possit prægnantibus, & pueris, experientia docuit, cui subscribit Actuarius, qui Senam citra noxam purgare tradidit. Redditur medicamentum hoc in deicienda aluo præstantius, atque valentius, si Cassiæ nigrae, aut Mannæ, aut Rhabarbaro, aut Rosarum diluto, aut Rhodopharmaco, quod Officinæ Syrupum rosatum solutivum vocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino fero. Præstantissimum dilutum hoc modo paratur. Sumuntur foliorum electissimæ Senæ drachmæ sex, Gingiberis, aut Cinnamomi contriti drachma vna, florum Buglossi drachmæ duæ: miscenturque omnia & fictili vitro circumlito, siue stanneo vase angustî Orificii excipiuntur, & affusis feruentis aquæ, aut feri caprini viciis decem, vasis osculum adeò occluditur, vt nullus penitus spirandi pateat exitus. His peractis puluinarî plumis aspersis fæcto, ignique calefacto vas inuoluitur, reponiturque in arca, vbi pernoctare sinitur. Sic enim conseruato calore, dilutum omnem facultatem in se recipit. Sunt præterea, qui vindemiæ tempore Senæ folia in mustam coniiciunt, vinum inde conficientes, quod alvi deiectionem vim obtinet. Syrupi de Pomis cum Sena conficiendi modum hunc præ alius probamus, ac etiam Quercetani præferimus.

32. Fol. Senæ lb. j. Succ. pomor. redolent lb. iij. Cinn. Anisi ana vnc. j. Succ. Limon. lb. Sp. Vitriol. ad lubitum. Sacch. lb. j. vnc. ij. infusio, leuis ebullitio, colatio, dein Syr. coctio fa. Est vsu iucundissimus & gustu gratissimus, cetera quæuis purgantia & Syrupos facile superans: ad huius normam plures alios componere licebit. Dosis huius Syrupi erunt ad vnc. ij. in morbis acutis, pro blanda primarum viarum expurgatione, quibus si addas 4. vel 5. grana Diagridii, exoptatam reddes evacuationem.

Sena ingratiuiscula tota gustanti, inquit Lob. tantillùm amara: calida & sicca folia, quibus ad purgandum consultis semper, quàm si per se, infusa puluere infuso aut decocto dentur, quæ statim stat puluerem discutiant & nonnihil lubricent, adduntur. Aliàs enim turbarum multum ciere, & intestina, stomachumque torquere, vel plebecula conqueritur. Eapropter qui aduersum Mesuem tueretur non esse corrigenda, imò siccitate sua atque quadam adstrictione ventriculum iuuare, nescit quid commentetur: nam si Brassicæ marinæ, Thymelææ & Chamæleæ siccitas, stomachum iuuaret, quem tamen lædunt illo viroso odore, & purgatrice qualitate, à quâ non longè absunt folia Senæ, vt dum virent adhuc, aut macerantur, odorantur, proinde ritè Mesue folliculos tutius purgare monet: nempe membranei sunt, minùsque flatulenta semina quàm folia: sed hæc plùs mouent, præsertim infusa, quàm decocta, quia ebulliendo nonnihil virium absuntur & status dissipatur: vt vsus ipse castigare valeat illum Commentatorem, qui nihil addendum ad eius noxam corrigendam autumat. Lobelius igitur cum Mesue probat magis folliculos, quàm folia. Veruntamen ego cum Fallopio foliis libentius vtor, quia folliculi sunt vt plurimum acerbi & immaturi, nam metunt se, antequam Sena antequàm sit matura, idque faciunt ne folia concidant, cum maiorem quæstum faciant ex foliis, quàm ex folliculis. Si autem folliculorum

Dilutum.

Dosis.

Stimulus.

Diluti præparandi modus.

Alius.

Syr. de Pomis cura Sena.

Dosis.

Temperâ.

Infusio præparandi.

Aduersus Matth. Sena corrigenda.

Vires &amp;

Ausi:

Sedat.

Dosis.

Dolor capi-

tu

Comitialis

morbus.

Obstructio-

nes.

Delirium.

Neruarum

resolutio

Epilepsia.

C. r.

Extrinfec-

tio.

Temperâ.

Dosis.

Syrupus.

vellent exspicere maturitatem, caderent prius omnia folia, & si aliqui folliculi habentur maturi, sunt certe illi tantum quos reliquerunt pro noua semente.

*Sena triplex* vsus: vel n. Foliorū eius puluis ad drach. ij. exhibetur. Fallop. exhibet puluerem foliorum Senæ, vnā cum Cassia optimo cum succellu à duobus scrupulis ascendendo vsq; ad quatuor: vel in vino aut alio conuenienti liquore folia à drachmis tribus, ad vnciam semis per noctem macerata propinquantur. Mirum, inquit Brassav. anno 1538. Caninam appetentiam Ferrariz fuisse morbum Epidemicum, & potius fuisse ex atrabile, os ventriculi occupante, quam ex acida pituita. Omnes autem quos curavi [ fuisse autem non pauci ] ex infusione Senæ sanitati restituti sunt. Vel denique ex his decoctum cum vnc. j. paratur. Qui difficilem habent aluum nec minus raro constipatam, ij decoquunt fol. Senæ vnc. 5. cum prunis & passulis. Huius decoctionem sumant; aluūque lubricam continuò habebunt.

## COLUTEA VESICARIA.

Descript.



Materies

Cortex.

Folia.

Flores.

Mater. notatur.  
Folliculi.

Mater. notatur.

foliis molliora, rotundiora, nec in acutum mucronem desinentia, supernè glabra magisque viridantia, infernè albidiora, & hirsuta, gustu amaro: flores ex longo pediculo multi, vt in Pisis & Cicerculis, crocei, formā similes prædictorum floribus & Genistæ angulosæ ac rotundæ, non quinquepartiti, vt olim pingebantur à Matthiolo: quibus decidentib. succrescunt folliculi membranei, pellucidi, interdum rubentes, spiritu veluti quodam distendente turgidi, ita vt pressu digitorum cum crepitu, eliso aëre, dissiliant: in quibus continentur semina ad folliculi futuram tantquam costam, quæ maturo semine dehiscit, pediculis breuib. appendi, formā renis, ante maturitatem, lutea, sapore Fabarum seu Pisqum, per maturitatem minora, Lentæ æmulantia quodammodo, minora tamen, nec ita rotunda, nigra ferè, dura, compressa, lacunā in medio prædita, saporem pristinum retinentia: amaritudinem in eis non sentimus vt perhibet Matthioli.

Nostram Coluteam Theophrast. esse, quam describit hist. lib. 3. cap. 17. Adhuc asserere non auisim, nec fit mihi verisimile oues ex fructu pinguescere, (quod voluit Theophrast.) si semen vomitiones cit[ vt affirmat Matthioli. ] & folia pur-

gent. Quæ Theophrast. de Colutea scripsit, iam antè tradita sunt. Ruellius Coluteam cum Sena confundit. Idem etiam facit Tragus: Senam tamen melius nouit. Fuchs. Colutea officinis incongnita. Germani Welschlinfen appellant. Galli Baguenaudier. Differt à Sena magnitudine, siquidem maior est, vt pote quæ quadriennio Theophr. teste se in arborem efferat. Ac etiam quòd siliquæ illius magis turgidi spiritu distendantur.

Matthioli. in Dioscor. attestatur lib. 3. capit. 70. Ruellium deceptum Senam eam esse arborem existimare quam Theophr. Coluteam appellat: ratum verò esse Senam non herbam, sed Arborem, Coluteam vocatam, & easdem plantas esse: Fuchsum plantam hanc non Coluteam sed Coluteam à suo errore vindicantem, appellandam censere, & rectè quidem suo iudicio: nam Coluteam longè aliam esse ab illa Theophrast. teste: Ceterum non deesse qui sibi persuadeant atque etiam scriptis tradant [ vt Gesnerus in lib. de quadrup. ] se Cytisum vidisse, legisseque in Italia in silvis aliisque silu. locis: Sed quantum ex eorum scriptis colligi possit, eos decipi. Ac Gesnerum, cum scribit ex autoritate Democriti Cytisum apibus aduersari, non esse memorem eorum quæ paulò ante asseruit. Ait in Hist. Germ. Colutea Theophrasti Schaffinsen, non est Senna vt quidam Neoterici existimantur: circa purgatricem facultatem hæret, quam ei attributam putat ab iis qui Sennam putabant. Colutea arbor est, quam nonnulli rei rustica scriptores, Alburnum appellant: Itali verò & nonnulli Hispanorum, Aorno vocant, quam quum primò vidit Amatus, Senam esse putauerat: Sed quum poitea Senam herbam, & non arborem esse deprehendit, ab ea discessit opinione: Non definit tamen vnum fatari, quòd Colutea à Theophrasto descripta Senæ magis videatur, quam Coluteæ conuenire. Matthioli. in Apol. Amatam reprehendit, Alburnum plantam non esse, sed partem tantum arboris, teste Plinio Coluteam utramque Theophrast. arborem esse, non herbam. Lonic. titulo, Senet/Theophrast. *καλυτρία*, Welschlinfen, malam iconem habet. Gesn. hort. Colutea Theophr. quorundam, nonnullorum Sena syluestris, quam non rectè Germ. quidam vocant Verbrüte Büchle. Senam sylu. vocare mauult: non quòd verè gentilis sit Senæ, sed quia magnam in foliis ac viribus similitudinem habet: soluit enim aluum paulò minus efficaciter, quam ipsa Sena. In Cat. pl. Cytisus, Bassæ dictus frutex Verbrüte Büchle. Colutea arbor Theophrast. vulgò Sena, vt placet Ruellio, Trifolium maius &c. Et de coll. plant. Colutea Fuchsij. Sed vel solum nomen Trifolij satis demonstrat Plantam de qua hic agitur non esse Cytisum. Dodon. Hist. Gall. Theophrasti *καλυτρία* Lat. Cytisus, vt Columelle, Varroni, Palladio, & Virgilio, Gallis Baguenaudier. Germ. Welschlinfen/ Belg. Lombaertschlinfen / à quibusdam ignaris, Sencbaum. Hist. Lat. in fol. Colutea Theophrast. Falluntur qui Semen esse rentur. Prior figura Dodonzi ex Fuchs. in postremis non astruit Cytisum, vt olim faciebat, & benè. Leuina. Lemn. l. 3. de occult. nar. cap. 9. Sena. Nec magis Theophrast. Colutea arbor Liparæ peculiaris potest esse vulgaris Sena, ait Robert. Const. apud Amat. quum vocamus etiam Baguenaudier, quia hæc frutex humilis est, illa verò arbor procera. Idem in Lexico *καλυτρία* arbor est quam vulgò Baguenaudier vocamus. Ratio Constantini quæ reicit Coluteam non nobis satisfacit: magna sæpè est varietas plantarum pro ratione locorum vbi pro-

Ruellius et  
ror.Ruellius et  
ror.  
Sena.

Colutea.

Colutea.  
Fuchsij  
notatur.Gesnerus  
notatur.  
Cytisus.

Vires:

Alburnum.

Aorno.

Sena.

Colutea.  
Amatis or-  
ror.

Sena sylu.

Cytisus.

Gesnerus  
notatur.

Cytisus.

Theophr.  
corrigenda



proueniunt: quid si non legendum *duydes*, sed corrigendum & dicendum *uella* non magnum, facili lapsu. Colytea nomine Theophr. apud Solerium intelligit tres plantas, quarum trium neutra est, *Bagnaudier*, vt voluerunt Fuchf. Ruellius & Matthioli. Provincialibus dicitur *Bensiques*. Tabern. & Castori. Colutea *Linsfenbaum*. C. Bauh. apud Matth. Colutea corniculata. I. Gerard. Angl. Colutea, *Bastard* Gene. Colytea Theophr. Apoll. Colutea arbor magnitudine præstans, folio non

Colutea e-  
ymologia.

ab simili *Fœnugræco*, cuius semen vomitiones lacessit. Lob. & Pena Adu. Colutea. Gallis, *Bagneaudier*. Putatur Colutea dicta, quod mutilata, effractave eius virgulta (non præcisa) intereant, Plerique non inerediti Senam syluestrem vulgò persuasuerunt. Nobis frutescit, quapropter apud Theophr. fatiis legeretur *δὲν ἐν τῷ ὄρει ὑγῖαδες*, non *δουγῖαδες* quod ex consequente paulò pòst inferunt verba Theophr. *οὗτοι γὰρ ἀνδρὶν ὄρεσι*. Obseru. & Icon. Plant. Colutea Theophr. Clus. Colutea spontè nascens in quibusdam Austriæ montanis, egregiè à Theophr. descripta ante Colyteam, satis vulgus vbiq. notitia, eam Galli *Bagneaudier* appellant. Petro Lindeberg, de horto Henr. Rantzani, Colutea à solo Theophrasto descripta, quam propterea Senam Arabum faciunt. Camer. ad Matth. Germ. spontanea est in Insula Lipara, Monspelii, & alibi in hortis faciliè adolefcit: sæpè in arboris effusum. Hort. Lusit. Colutea vesicaria *Schaffinsfen / linsfenbaum / welscheschurten*. Casalp. plantam de qua hic agimus describit lib. 3. c. 38. post plantam quam vocauit Embrum: deinde subdit. Ex hoc genere videtur apud Theophr. esse Colutea Lipara propria arbor magnitudine præstans: cum hac aut eadem, aut non ab similis fuerit apud eundem Theophrastum. Colutea arbor Lipara propria, semen in siliquis ferens, &c. Camer. in hort. Colutea vesicaria, *Welsch Senerbaum / Gallis Bagneaudier*.

Sena non  
est  
Colutea  
Aegypti.

Colasia.

Locus &  
Tempus.

Non pauci propter raritatem, ac pulchritudinem, aut etiam vsum medicum hanc in hortis alunt: vt Montbelgardi in horto Ill. E. C. VVirt. quæ faciliè prouenit: florèsq. tulit & semina, licet fignore sæpè perierit, vel patuit, vel in totum. Vidi Coluteam Patavii in horto D. Cortulii: Ferraria in horto Monasterii S. Dominici à l'Angeli: Florentiæ: Lugduni copiosè mihi prouenit ex femine, vbi florentem obseruavi Maio, ac etiam Septembri & Octobri cum folliculis. Montbelg. mihi semel à facione quinto anno floruit, alias etiam citius: vt tertio Basileæ in horto Fratris & alii, florentem vidi Maio, Iunio, Augusto, Septembri, ac siliquas habentem Iulio & Augusto. Tiguri in horto insignis Chirurgi, Petri Figuli Lichotomi florentem Octobri, Monspelii in quibusdam hortis, vt D. Laurentii Iouberti, florentem Aprilis, & siliquas cum floribus ferentem Maio. Geneuæ in quibusdam hortis. Montbelgardi in horto Ill. E. C. Semen quoddam nomine Colutea Aegyptiaca terræ mandauit. Coluteam cum siliquis florentem nempe Octobri in horto habebat Iacobus Braun in Ducatu VVirtemb. Colutea expressè vix iuxta Castellum *Sponeck* ad Rhenum arcem vbi primum spontanea vixit. Io. Fabr. Senam, siluestrem [coluteam] cum siliquis, propè Curiam Rhetorum in silua florentem & fructificantem obseruauit.

Semina.

Colutea Theophr. Arbor primum vniculis emicat, autore Porta, trima concidendis scipionibus, & baculis idonea. Si quis nimis decurtauerit, mox emouitur, quippe quæ lateribus haud

quaquam fruticet: spargitur deinde in ramos, quadrima prorsus arborefcit vesica.

Quum non forma tantum, imò etiam sapore duo hæc Coluteæ genera sibi similia sint, colligit Fuchsius facultate inter se minimè differre. Quare vtrumque citra molestiam atram bilem retortidamque educet, caputque ac cerebrum, & instrumenta sensuum à noxiis purgabit humoribus. Quid multa? aduersus omnia vitia ab atra bile valebit. Huic folia & folliculos, Senæ loco, non sine viribus substituent pauperes. Sed quamuis adferat Fuchsius, has plantas facultate inter se minimè differre: cum tamen in errore versati putat Matthioli, quod certò sciat Coluteæ semen non minùs, quàm Genistæ vomitiones cecere. Viri quidam docti tradunt, inquit is, in Hist. Germ. Coluteæ & Senæ eadem esse vires. Sed falluntur in eo quòd Senam & Coluteam eiusdem generis esse censent. Sed quandoquidem multa intercedit his cum Genistâ, tum foliorum tum fructus similitudo, non eo inficias hanc purgare & fortasse non infernè duntaxat, sed superne quoque per vomitionem, vt Genistâ: sic quoque differentia est in Sena, quæ vt Actuar. & viri periri testantur) sine molestia acque torsione humores educit. Folia & semina planta dictæ *Bagneaudier*, calore & humiditate temperata esse statuit Dodonæus. Audiui ego foliorum huius Coluteæ vnciam vnam leuiter purgare, sed ipse non sum expertus.

Vires.

Bile atra.

Substitutū

Sena.


Fuchsius.

Semen Co-

mitum mo-

uer.

## COLUTEA SCORPIOIDES.



SVFFRVTES Descrip.  
Rarior.

Sex radice se spargente, satis lentis & fractu contumacibus ramulis, maioribus, cinereo cortice obdactis, minoribus, viridantibus, stratis & angulosis, Folia quina, septena aut nouena, ad Lentis folia accedentia, rotundiora, pingiulcula, Coluteæ vesicariæ, si magnitudinem excipias, confimilia, flores inter

Folia.

Flores.

folia ex pediculis semuncialibus & vncialibus, lutei, bini ferè, raris singulares, aut terni, vnciam circiter longi: Genistæ floribus similes, labello duplici inferiore rotundo, integro, striato, superiore bifido, & quasi alato duobus cruciatis innixo: galea in rostri acutiem mucronata, ex luteo virelens, apicem albicantem scitris oculis, quos subsequuntur siliquæ longæ, siliquis *Siliqua* Telephii siue Scorpioidis Matthioli similes, Clus. teretes, quibusdam veluti articulis distinctæ, quæ oblonga, læuia, subfusi coloris & ingrati saporis, semina singula, singulis articulis inclusa habent flores nonnihil odorati Folia ingrati & amari admodum saporis.

Semina

Ruta.

An Cordo in silv. Observ. Ruta quædam siluestris in Alpibus VVirtemb. quam nonnulli Co-

luteam Scorpoidem vocant

verbi-  
a minor.

Rondeletius non raro ratus fuit Glycyrrhizam minorem nuncupandam esse, radice buxæ, minus dulci, aut potius dulci-amarâ, & minus grata.

Colutea  
Scorpoides

Apud Lobelium in Observ. & Icon. Plant. flos in figura Coluteæ Scorpoidis, non placet. Icon à nobis etiam propofita corrupta fuit per sculptorem. Cluf. Pann. & Hist. post. Colutea Scorpoides i. elatior, foliis gultu ingrato admodum & amaro, femine læui, oblongo, subfufci coloris, & ingrati faporis, fingulo in fingulis filiquarum articulis: Cytifo cognata. Cæfalp. Embrys vulgò. Camer. hort. Colutea Scorp. à Clufio depicta. Tabern. Icon. & Hist. Colutea Scorpoides 2. Schæf-ferenfienfem nunc Scorpions frucht schötlein. Cæfalp. Bauh. apud Matth. Colutea Siliquosa. Gerard. Angl. Colutea Scorpoides.

Locus &  
Tempus.

Montepelilicis multis nemorosis inter Buxos, Iunio & Iulio erumpit. Narbonæ copiosa in Valena fylua & prope fluminis crepidines. Lobelius spontè ad Calenberg vicinifque Viennæ montibus abundè, tum etiam in nonnullis Pannoniæ montibus locis: in Belgicis hortis antè vidit Clufius: Floret Maio, in hortis, culta longè maior euadit. Montbelg. in hortum Ill. E. C. V. Virt. à nobis plantata: spontè prouenit. In Comitatu Montbelg. variis in locis, vt prope Clareual ciufdem Ill. C. V. Virtemb. oppidum in Burgundia. Bafilæ in monte Monteg: Frater C. Bauh. prope Mündenfeiu obseruauit. Vidi in Italia in monte Gippi florentem Aprili: Parmæ in horto Nobilis Lalatæ: Patauini in horto D. Cortufi, & D. Mufcati Al ponte Montin. Spontè autem in Apennino monte, non longè Bononiâ florebat Aprili. Montpelii cum flore, mense Iunio. circa tres pontes magnos, qui notatu digni, non longè Nemaufo, admodum vasti, & magno artificio ab antiquis extructi alter super alterum: fuprà videtur Aquæductus fuisse. Lugduni in hortis: Geneuæ quâ itur Collognium, in monte Salene, confpexi virentem Decembri, florentem mense Maio, filiquis maturis Augusto iuxta Arue ad Rhodanum

### COLVTEA SCORPIOIDES,

HYMILIS.

Descript.



Virga.

Radix.

spargit, & fibris aliquot donata est.

EST iam didicta humilior, humique diffusa, neque foliorum numero, aut situ, aut formâ, neque florum formâ & colore, à superiore differens: sed huius Virgæ palmares aut pedales duntaxat hyeme, interdum marcescere solent, & nouo vere denuò e radice noua germinare: filiquæ & femina patia: radix similiter dura & lignosa latè se

Cluf. Pannon. & Hist. post. Colutea Scorpoides i. humilior. An Cæfalp. Telephii quoddam genus fruticosum peregrinum, cauliculis multis: lignosis: foliis diuifis, vt leucidaceæ, sed crassis, Portulacæ modo, & candicantibus, binis appendicibus rotundis, vt alterum: fopore magis adstringente, & vrente linguam: floribus pluribus in vno pediculo, vt Meliloti vulgaris luteis, & filiquis tequibus, caudam Scorpionum imitantibus.

An Telephium

Tab. Icon. & Hist. Colutea Scorpoides.

Gerard. Angl. Colutea Scorpoides humilis; Swarffe bastard Sene.

Coluteam Scorpoidem humiliorem accepi ex plantis ficcis C. Argerii Argentinz. Spontè nascitur ad Calenberg vicinifque Viennæ montibus abundè, tum etiam in nonnullis Pannoniæ montanis locis, in hortis culta, paulò maior fit, vt plurimum virgashyeme retinet. Floret Maio.

Tempus

### COLVTEA SCORPIOIDES QUADAM SIVE POLYGALO CORTUSI similis planta, sed maior.



CORTUSI Polygalo diuifus quondam inter meas plantas fectas inuenio, duplo maiorem longèque speciosior: radices, filiquæ, floresque respondent: at folia duplo triplove maiora sunt, quæ etiam adstringunt. Eadem plâta à Clufio ni fallor dicitur Colutea Scorpoides altera, de qua ait: nititur radice crassa, & lignosa, lenta tamen & flauescen-

Descript.  
Anonymus

te, cortice obductâ, multisque fibris præditæ: ex qua plures fingulis annis in eunte vere nouas præducit virgas pedales, nonniquam etiam cubitales, lentas vimineas, læues, virides, & in his temerè sparsa alata folia, quina, septena, aut nouena vni costæ inhærentia, exsiccantis primùm gustus, deinde nonnihil acrimoniæ in summis labris relinquentis, flores in foliorum oblongis virgulis inhærent copiosi, leguminacei, in orbicularem coronam dispositi flauî, nullo grato odore commendati: quibus succedunt articulatum distinctæ filiquæ, superioribus breviores, semen in fingulis articulis continentes, Coluteæ parue siue Polygalæ Valentinz Clusij modo.

Virga.

Folia.

Gustus.

Flora.

Siliqua.

Semen.

Tabern. Icon. & Hist. Colutea Scorpoides tertia.

Anno 1594. accepi huius semen inter semina Stutgardia per Cassabonam missâ, cui titulus erat, Scorpoides arborefcens: Ex ea facta Montbelg. in horto E. C. prouenit planta, quæ ad præcedentem accedit si non eadem. Crescit in montium qui à Danubio & Calenberg illi imminenti ad Alperetorundum, radicibus, inter vepres, & ad vinetorum margines. Floret Iunio, nonniquam etiam Maio: subsequens hyems virgas corrumpit.

Locus

Scorpoides arborefcens

Tempus

COLV.



COLVTEÆ PARVA SPECIES, POLY-  
GALA VALENTINA CLUS.Descriptio  
Virgula.

Folia.

Flosculi.

Siliqua,  
seca.Clusii  
descriptio.Virgula,  
folia.

Flores.

Siliqua,  
seca.Polygala 2.  
Clusii.Polygala,  
Coronilla  
del Rey,  
Medicina,  
Lenticula.Corona va-  
gia,  
Colutea  
minima.

**M**INOR est Scorpioi-  
de Colutea no-  
strati, duris, li-  
gnosisque vir-  
gultis, crebro  
veluti genicula-  
tis: foliola quo-  
que minora  
multis numeris,  
crassa, tribus,  
duabûve con-  
figurationibus di-  
sposta, impari-  
tatem faciente  
extremo coliculi  
fastigio, flosculi  
circumpentiles  
Corollam imita-  
ti, vt in Meliloti  
nobili Tragi, di-  
midio minores,

crocei. Siliquæ Coluteæ Scorpioi-  
dis angulosæ, geniculatæ, breuioribus: figura à nobis posita est ex  
Guar. quæ quodammodo exprimit pl. nam à no-  
bis descriptam: non tamen in omnibus placet,  
quia in ramos non diuisa: putamus eandem cum  
Clusii Polygala Valentina prima & secunda. Pri-  
mam sic descriptam: Cytilo subicienda est elegans  
planta, quam nusquam alibi, quam in Hispaniis  
obseruauit. Fruticosa est hæc planta, binos pal-  
mos alta, multas ferens virgulas lætias, Sparti  
antiunci instar: folia singulis collis inhaerent im-  
pari plerumque numero, quina, septena, aut plu-  
ra, Lenticulæ similia, magis tamen carnosa, & ad  
Rutæ colorem accedentia, adtingentis & ingra-  
ti gustus: flores Meliloti similes, lutei, coronæ in-  
modum, summis virgultis [ quæ magna ex parte  
nuda sunt, & maturo semine exarelicere solent ]  
insident: incuruæ, deinde, longæ & teretes suc-  
cedunt siliquæ, tribus aut quatuor internodiis di-  
stinctæ, quæ semen continent durum, oblon-  
giculusculum, nigritum, ingrati saporis: radix longa,  
dura, lenta, crassiuscula est. Polygala secunda  
huic admodum similis est, maioribus virgis, fir-  
mioribus, & virentibus rubentibus, maioribus et-  
iam viridioribus, frequentioribus & carnosis fo-  
liis: maioribus & dilutioris coloris floribus: fili-  
quis etiam paulo crassioribus: semine verò omni-  
no simili.

Clus. Hisp. & Hist. post. Polygala Valentina 1.  
Salmanticensibus Coronilla del Rey vulgò appellata,  
quasi Sertula regiæ, quæ istic Officinæ Meliloti  
vice vtuntur, Granatenfisbus & Murcianis Len-  
ticulæ, id est Lenticula dicta, Valentinis Polygala  
appellata.

Lob. Observ. Coluteæ Scorpioi-  
dis varietas:  
Colutea Scorpioi-  
dis coronata: Coronilla del Rey  
Hispanorum: A superiore [intellige vulgarem  
Coluteam Scorpioidem] non nisi exilitate, &  
floribus speciosioribus, hilationibusque corollam  
sertulamque auream effigiantibus differens, vnde  
Hispanis Corona Regia dicta fuit: Belgij hor-  
tensium cultioribus frequens. Item Obs. & Icon. Plant.  
Coronella siue Colutea minima Polygala Valen-  
tina prima Clusii, surrectis foliis, Rutulæ con-  
coloribus, alioqui æsimilis cæteris [Coluteæ  
Scorpioi-  
dis] spitameo cauliculo Belgis hortensis.

Effigiem suæ 2. Clusius non habet, nec etiam  
Lob. cui prima est.

Nostri figura, respondet aliquomodo primæ  
Clusii, seu minimæ Lobellii, ambo enim eandem  
habent. Tabern. Icon. & Hist. Colutea Scorpioi-  
dis 4. minor. Et Polygala Valentina Clusii. Duas  
figuras planè similes ponit Tabern. nec scio quā  
in re differant nisi quod vni subiungit portionem  
veluti trunci, prior planè imitatur figuram Clu-  
sii, cui tamen alium imposuit titulum. Existimo  
vnius plantæ duas factas icones ex Clusio, quod  
animaduertens Compiler, vt videretur aliquid  
scire, diuersas fecit plantas & duobus diuersis ca-  
pitibus posuit. Gerard. Colutea minima siue Co-  
ronilla. Item Colutea siue Polygala Valentina  
Clusii. Gerardus imitatur Compil. Tabern.

Tabern. no-  
strat.Gerard. no-  
strat.Lotus en-  
neaphyllon  
Mellilotus

An Ponæ in Baldo Lotus enneaphyllon Dale-  
champii, quo multi ex Pharnacopocis Veronen-  
sibus pro vera Melliloti vtuntur. Optatè vide-  
re Mellilotum hanc Ponæ: Lotum enneaphyllon  
Dalechampij suspicor eandem cum Polygala  
Cortusi & Matthioli: gratum entis Ponæ aliquam  
nobis mittat, aut vtramque plantam.

Gener Cherlerus attulit mihi Monspelio Co-  
luteæ vel Polygale paruum speciem, collectam  
Iunio cum flore & siliquis in plano campo Lu-  
pum versus. Polygala 1. Clusii, perpetuò viret, flo-  
ret, Aprili, Maio & Iunio, sermen verò Iulio ma-  
tutum est. Inuenit etiam Februarij & Septem-  
bri florentem. Apes ex eius flore plurimum mel  
colligere creduntur. Agro Salmanticensi, Murcia-  
no & Valentino regnis, locis arenosis & collum  
decliuibus obseruauit. Secunda in collibus siluo-  
sis Valentia Hispania vicinis inuenitur, viret  
perpetuò & diutissime floret, & Vere & Autum-  
no. Aluntur etiam prima & secunda in Belgitis  
horris.

Locus &  
tempus.Apibus  
grata.COLVTEA CAULE GENISTÆ  
EVNGOSO.

**M**ONSPELII Descriptio  
nobis ob-  
latus est ramus  
cubitalis, Geni-  
stæ Hispaniæ  
firmitudine, cras-  
sitiæque, dilute  
virens, nudus,  
fungosus ex pal-  
mari distantia in  
ramos diuatica-  
tus. Quorum  
commisuris fo-  
lia haerent quina  
Polygalæ Valæt.  
Clus. crassitie,  
angustiora lon-  
gioraque. Exter-  
nis ramis floscu-  
li insident dictæ  
Polygalæ quo-  
que, exigui satis

Ramus.

Folia.

Flosculi.

in orbem coaggesti. Succedunt siliquæ angustæ  
articulatæ, vt in Scorpioide folio Portulacæ, in  
tenuissimum vt Scorpiois simillimum spiculum  
terminatæ.

Huic apprimè competit descriptio Clusii sub  
nomine Polygalæ tertiæ, quæ sic habet: Inueni-  
tur in Valentia Hispania vrbis maritimis Poly-  
Clusii.

Siliquæ.

Polygala 3  
Clusii.

Descript.  
Fragra.  
Folia.  
Flos.

gala tertia, oblongis, lentis, fungosis, seu medullosis & omnino virentibus virgis prædita, quas rara obsepiunt folia, superiorib. adhuc crassiora & molliora: flos secundæ par: senten obferuare non potui.

### COLUTEAE FOLIS ANIL NOMINATVM.

Descriptio

Ramulus



Nitida  
et alia.

posse. Alia verò planta pro Nil & Anil tradetur post hæc idem fuit. post. hb. 22 ubi etiam sunt equivocationes.

### SOPHERA ALPINI.

Descriptio  
Rami.

Folia.



Flores.

Caprariz folia accedant tum magnitudine tum figura, quippe prædictis angustiora, acutiora longioraque sunt, qualia Alpinus pingit. Quod an in adukis conueniat, an loci varietate, nondum nobis competum est. Ex foliorum porò diuisura flores uncialibus pediculis prodeunt crocei, bini aut terri, sex foliis constantes, saturatioribus nervulis delineati, in medio stamina plurima rufia oblonga. Cassia floribus non malè contulit Alpinus, cui inodori dicuntur: nec quis malè etiam formam eorum cum Capparidis floribus conse-

rat, si colorem excipiat: Succedunt siliquæ admodum speciose digitum longæ obtusæ in extremo, vtrinque commissurarum flauescences, per media spadicæ, cellulis plurima, quinquaginta circiter, Alpino verò quatuor aut quinque continentes semina lentis magnitudine atque, colore, compressa, angulo acuto donata, sapore sicut & folia amaro, admodum ingrato.

Alpin. de pl. Aegypti, Sopheram suam sic describit. Sophera est planta fruticosa, cubitalis altitudinis, galeæ proxima, duris ramis, foliis Myrti, tenuioribus multis, utrinque ordinatim alæ appendicis: flores fert croceos, Cassia florum æmulos, inodoros: ex quibus Siliquæ paræ promanant, quatuor aut quinque semina habentes, Seshan planè similia. Aiunt semina esse venenum hominibus.

Eandem plantam sic describit nisi fallimur Cæmer. hort. Hoxocoquomacilit (sub quo Bárbaro vel Indico nomine fuit Florentiam & inde Norimbergam missa) folia habet propemodum Fraxinellæ, vel potius eodem ferè modo quo Cassia siliquosa prodit, nullo in colte extremitate imparitatem faciente folio. Caules & ramuli & foliorum ora rubent, flores flauis sunt, Cassia floribus similes. Hinc emergunt siliquæ oblongæ, Cylindraceæ, exterius per maturitatem fulcæ, intus purpureascentes, fuscis granis distentæ. Radix nigro cortice obducitur, quo abrafo flauescit, & fibris plurimis constat, vitiisque sex tantum menses, gelu impetientissima planta, & apicum Vulturæque expositum locum desiderans, alioquin nec flosculos explicat, nec spem frugis tacit. Odor illi grauius & planè abominandus, sapor subdulcis non ingratus cum aliqua adstrictione, penè uti Chebulotum, minus tamen alitrigens: radicis verò amarus & Polypodii saporem repræsentans cum dulcedine aliqua, nisi quod non ita siliaceum quiddam sapiat. Folia explicat Oriente Sole, cadente remittit & in se contrahit ut petiatura videtur, usque antea non obleruatur & hoc quidem cum aliis quibusdam leguminosis habet commune. Sed hoc imprimis notatu dignum, alarum causis, quæ parte caulem amplectitur latior costarum extremitas, innasci verruculas paruas rubentes, quæ intensissimo æstu exudant liquorem candidum, purum, pellucidum, vt minutas margaritas referret, si paulò maior eius copia emitteretur. Viscositas est ac dulcissima, ideoque à muscis avidissimè expetitur. Inelle huic plantæ vim quædam planè peculiarem, nemo negarit qui semel attentius paulò ipsam cõsiderauerit. Quandoquidem porò Honorius Bellus suam Sopheram diuersam ab Alpini Sophera existimat, totam eius descriptionem, in qua multa notatu digna proponimus. Sophera, inquit, est ad duorum, triumve cubitorum altitudinem assurgens, caule firmo, recto, fibroso, multos ramos firmos è foliorum alis vndique spargente, in quibus folia Myrti foliis similia quidem, verum angustiora, alata, hoc est, in ligno pediculo vtrinque sita, contrariis semper inter se petiolis, numeroque paria, vt in Lenusci folio conspici licet, superne latè virentia, inferne verò saturà viriditate prædita, grauius olentia, vespere, superne à folii parte quæ petiolo inhaerent, coeuntia, inferne à parte terram spectante, sicque clausa tota nocte permanent, manè verò circa Solis ortum denudè expanduntur: croceos fert flores inodoros, plures in vno ramulo pendentes, multaque intus stannina cum siliquæ rudimento continentes, in caulis & ramorum summitatibus nascentes, quibus succedunt siliquæ rotundæ.

Descriptio  
Alpini.  
Rami.  
Folia.  
Flores.

Hoxocoquomacilit.

Folia.

Flores.  
Siliqua.

Radix.

Odor.  
Sapor.

Verrucula.  
Liquor.

Descriptio  
Bellus.  
Caulis.



tandæ, digitum longa & cœlum spectantes, plurima semina continentes rotunda, aliquantulum compressa: non omnes tamen siliquæ ad perfectionem veniunt, sed plurima ante decidunt. Elegans planta est, diutissimeque floret, subinde nouos & recentes flores proferens semperque virens: radicem habet multissimam, lignosam. Semine primum nata, duo, vt obseruauimus, duntaxat profert folia, deinde quatuor, longo pediculo inherentia, vtrinque bina, postea sex, vtrinque terna, atque ita deinceps quemadmodum caulis augetur, foliorum numerus crescit, eaque maiora apparent: duodecimum tamen numerum non excedunt ea quæ caulem ambiunt, hoc est, vtrinque sena: nam ramorum folia tametsi eodem modo numero crescant, decimum tamen non superant, quina videlicet vtrinque. Hieme (quam satis commodè terre posse videtur, si diligens aliqua cura adhibeatur & loco quidem calidiore & à ventis libero adseruetur, faciliè æuentis præsertim septentrionalibus læditur, qui folia & flores exsiccant: ea tamen, licet sicissima, à ramis non defluunt, vt in mihi natis plantis obferto, imò ferè statim noua folia & ramos proferre ceperunt. Hoc eodem nomine Alpinus plantam itaq; supra descripsit, quæ tamen plurimum (inquit Bellus) ab hac differre videtur, vt ex ipsius descriptione & icone colligere licet.

Siliqua.

Radix.  
Descriptio  
recentior  
mala.Locus &  
tempus.

Sophora n. vidimus B. silica Anno 1595. Augusti fine penè florentem in horto Domini Iacobi Zyvingeri, ea fuit rotundioribus foliis: ramum etiam habuimus datum per Dominum Iacobum Miege, puto Basileæ collectum, idem foliis eius etiam ramum vidi apud scireum Cap. Bauhinum cum flore, in quo quædam foliola angustiora paulo. Sophora autem missa per Dominum Honorium Bellum ex Creta, tum fratri, tum Domino Zyvingero foliola habet angusta & longiuscula, prout pinguntur apud Alpinum.

TAXOCOQ VAMOCLIT  
INDICVM.

Siliqua.

Color.  
Semen.

dentem, colore ferè spadiceo, obscuriore, quam ambit circumiecta orbita satis lata, coloris ex fusco cinerei: atque huic cortici subest, veluti in leguminosis, pellicula tenuis membranca, coloris ex albedo subfusci creberrimis transuersis interstitiis inæqualis, pro semine numero totide veluti cellulas facientibus, & in nostra quidem siliqua

Tom. I.

semine comprehendebantur vigintiquatuor Genista vulgaris seminibus similia, lucida, dura, ex rotundo oblonga, coloris fusci, dilutiore area in vtraque facie medium obsidente. Ea vicinitate nominis existimaret quispiam nostrum Taxocoquamoditidem esse cum Camerarii Hoxocoquamoclit, de quo capite præcedenti: verum ei siliqua Cylindracea & oblonga, huic autem nostro compressa valdequæ longa.

Hoxoco-  
quamoclit,  
diuersa  
planta.IOVIS BARBA PVLCHRE  
LYCENS.VAGAS qui Descriptionis  
dem signi- Materies.

ficacionis est Barba Iouis, quam nos hic pro suffrutice quodam accipimus: cuius materiem duram atq; lignosam ferè, incanus & lanuginosus tegit cortex, rami huic frequentes satis, folia quinquè aut sex, aut septem etiam coniugationibus contexta, quarum singularia Lentis foliis, paria villosa, argenteo

Folia.

colore fulgent, ex pediculi foliorum ala, appendices singulares exoriantur lanuginose, quarum extremis inhaerent acervatum congesti floculi, lutei, quorum singuli non magnitudine, sed formâ Genistæ flores æmulantur. Nos cubitalem habemus caulem.

Flos.

Hist. Lugd. sic describit, Fruticosa est arbuscula, magnitudine hominis, ramis densissimis, folio Lentis, argenteo, sic collocato, vt lateribus folia paria sint, impar autem foliis versum claudat: coma in opere topiario tonsilis, & in rotunditatem spissa, elegantissimi aspectus, si quis in hortis ferat, vestiendis arearum viarumque marginibus, vt à nobis de Lauendula fieri solet, flore in summis ramis copioso, coaceruato velut in cumulum, luteo, Genistæ simili, si sumas singulas quasque floris coaceruati partes.

Flos.

Hist. Lugd. Frutex, Iovis Barbam Plinii putant. Anguill. Barba Iovis Plinii aliquomodo conueniens in Monte nigro, propè Liornam in Tuscanâ, foliis dispositis Lentis modo, candidis, nitentibus angustioribus, flore luteo, flexilibus ramis. Hæc planta olim nobis pro Dorycnio Dioscor. & Argemone nonnullorum Metis data per Dom. Santalbinum Medicum.

Dorycnium  
Argemone.

Per Dominum Kentzium collecta Florentiæ & Locus & Patavii in horto Bembii, nomine Barba Iovis, missa etiam fratri Cap. Bauhino ex Italia pro Barba Iovis Plinii. Dominus Agerius dedit collectam in Herfurio monte Nigro ad literni maris Thyrrheni. Gignitur in lapidosis & saxosis locis maritimis, præsertim montibus ad littora positis: Pulcherrimam hanc plantam mons Setius (hodie cap de Sette vocant) ab Agatha & Bliternis non admodum semotus nutrit.

K k

## SESBAN, FOLIIS

HEBYSARI.

**Descriptio** SEBAN specioso assurgit, veluti virgulto, recto, tereti, fistuloso, tuberculis asperiusculis obfito, medulla farcto, quod ex longiusculis interuallis in ramis diuiditur. Folia sunt longa foliorum serie altrinfecus stipata, foliorum Hedydari alterius Dodon. similia, angustiorum, pallide viridibus, subpinnatis: foliorum 14. coniugationes supputauimus. Per quorum media neruulus excurrit, aucta parte lineam atroirentem exprimens. Ex aliarum verò geniculis pediculi prominent luteo croceis, atris punctulis conspersis floribus conspicui, Genistæ ferè similibus, ratemacum digestis. Quos excipiunt filiquæ digito longiores, angustissimæ, in acutissimum mucronem desinentes, ac quibusdam internodiis articulatum torosa. In quibus semen oblongum, spadicum ad Fœnugraci semen aliquo modo accedens: cuius sapor acris linguam velicans calore suo.

Fores.

Siliqua.

Semen.

Sapor.

Alpin. Sesban frutex Myrti magnitudine. Ex Anil semine Alexandria misso [cuius planta istic magnè in usu est] nata. Clusio apud Garciam, stirpis, Legtis seu Coluteæ minoris foliis, flore luteo spatu Græcorum (quod Hispani Retama vocant) omnino simili. Postquam enim Alpini librum Clusio videre contigit, animaduertit semen missum pro Anil Sesban fuisse, ac eius fortè errore, qui mittebat, nomen Anil ascriptum esse pro Sesban.

Anill.

Locus.

In Ægypto ab Alpino obseruata & inde ad Italos illata. Nobis ramulum frater Casp. Bauhinus elegantissimum in horto Nobiliss. Bembii Patauino lectum communicauit. Anno autem 1599. in horto Montbelgardenf. sata creuit ad quatuor cubitorum altitudinem, floruitque Augusto & Septembri: Basileæ vidi in horto Domini Jac. Zvingeri.

Tempus.

Ægyptii, referente Alpino, his fructibus sepes suas texunt ad agrorum distinctionem: stomachi humiditatem semen eius absorbet, eumque roborat.

Vires &amp; u-

fus.

Puleis ex doctoro alui fluxum, mensiumque immoderata profluuiâ refrinat: Omnes denique vacationes immodicas cohibet. Sed quum sit acris nolum cum Alpino expetiri ad prohibendum fluxum nimium mensium. Dorycnium [dorycnium] Dorycnium in genere, quod Crateus Halicacabum aut Caleam [dorycnium] vocat, frutex est auctore Dioscor. Oleæ nuper prodeunt (ἐλαία ἀπὸ τοῦ) similis, nascitur in petris non procul à Mari, ramis cubito breuioribus, foliis Oleæ (ἐλαία) similibus colore, ac minoribus firmioribusque (angustioribus autem & longioribus aliis, Lac. in vet. cod.) ac vehementer asperis, flore candido, folliculis in cacumine densis, ceu Ciceris, in quib. quinas, senave minuta femina, rotunda, exigui Erii magnitudine, leuia, firma & versicoloria: radix ad digitum crassitudine & cubiti longitudinem adolefcit. Et hoc quoque somniterum (ὄρνιθον) esse creditur: Copiosius verò hauritum, enecare.

Halicacabus.

Calea.

Oleæ similis

Ciceris fol.

liculi.

Orbis semē

Non desunt qui dicant eius semen in amatoria (ἀνὰ φάρμακον) expetiri

De eo fusè & obsecrè Nicander. Hac verò eius Scholiastes. Dorycnium, inquit, quod etiam Melissophyllum (μελισσοφυλλον) vocatur, Sylvestris planta est. Cæsa liquorem destillat similem lacti secundum aspectum, & odorem, & gustum. Unde etiam difficilè iudicatu est libentè, vtrum sit, aut non. Demophon autem nominis rationem afferens, dixit ita vocari, quod hactè simile sit secundum sublationem (scilicet è medio) Lyfimachus verò Hippocraticis quod lignum sit pruritum mouens, iis qui eo vsi sunt.

Lactale.

Melissophyllum.

Elymon.

De symptomatibus quæ Dorycnio epoto contingere soleant, item remediis, quibus succo. Lignum. rendum, ita scribit Dioscorides lib. 9. Alexiph. in præmio.

Dorycnium [quod aliqui Solanum manicum (σπύρον μανικόν), hoc est, furiosum appellarunt] epotum, veluti lactis saporem gustui representat, crebros singulæ ciens, lingua humiditatem (ὕγρυν ἀπὸ τοῦ) Paulum in Aldino Cod. ὕγρυν Nicander ait (ἀπὸ τοῦ) Sar. conciliat & effusorem sanguinis reiectionem concitat: ipsi verò potionati mucosa quædam perinde atque dysenterici aluo egerunt. Itaque antequam aliquid exhibere symptomatis superuehiant, auxilio sunt antè dicta: vomitus, inquam, Clyster, & quæcunque potum venenum expellere apta nata sunt. Piuatim iis opulantur, aqua mulsa, lac asininum, aut caprinum, ac dulce vinum, quod quidem tepidum cum Aniso (ἀνισόν) bibatur, Amygdalæ amaræ, (ἀμυγδαλὰ πικρὰ) & elix Gallinaceæ pectuscula. Quin etiam omnis generis Conchyliæ, cruda pariter ac tosta, esse (edere) salutare est. Conueniunt & Locustæ marinæ (καλαβὶ) & Gamnari (γάμναι) ac potum eorum deiniuculum. Idem de parab. ait Contra Dorycnium succurrunt Lac passum tepidum, gallinacei pectusculi elixi triti succus haustus, ipsumque ius epotum: echini denique conchæ, purpuræ, squillæ, pinnæ, γαργύρες, πτείνες. Gelsæ (γελσά), temia (τέμια) pectines, buccina, seu cruda seu elix comedantur. Consideratis symptomatibus, quæ superueniunt post assumptum Dorycnium, placet exhibitio Olei dulcis cum succo siue iure Gallinaceo.

Symptomata.

Sapor.

Lactis.

Singulæ.

Sanguinis.

Reiectionis.

Vomitibus.

Remedia.

Aqua mulsa.

Lac asininum.

Lac asininum.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Lactis.

Plin. Dorycnium ita tradit, vt à Solano marito vix videatur distinguere. Quare eius verba repetes ex Historiæ nostræ Vniuersalis libro trigésimo quarto, capite de Solanis.

Oleum dulc.

Dorycnium, attestante Galeno, temperamentum Papaueri simile est, & Mandragoræ, ac cæteris, quæ parem habent refrigerandi potentiam: excellit & frigiditate aquea: quamobrem pauculum quidem, saporem conciliat, plusculum verò sumptum interimit.

Temperamentum.

Pauculum.

Saporem conciliat.

Plusculum interimit.

Potum quidem, gustum ceu lactis representat, singulos crebros facit, inquit Paulus, lingua humiditatem, & cumulatam sanguinis educationem, per alium mucosa fetuitur simillima terminosis. Auxilio sunt (antequam horum aliquot fuerint fecerunt) vomitus & clyster, & quæcunque potum venenum possunt excernere. Proprie autem ipsi succurrit aqua mulsa, aut Lac Asininum, Caprillumve, & dulce vinum tepidum cum Anisi modico potum: item Amygdalæ, & elix gallinarum pectorasidem præstant Conchyliæ cruda pariter & tosta, in cibo, adhuc Locustæ marinæ & Gamnari.

Lac caprinum.

Lac dulce.

Amygdalæ.

Conchyliæ.

Lac caprinum.

Lac dulce.

Amygdalæ.

Conchyliæ.

Lac caprinum.

Lac dulce.

Amygdalæ.

Conchyliæ.

Lac caprinum.

Lac dulce.

Amygdalæ.

Conchyliæ.



*Gammari.* Gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

Quantum vires Dorycnii & Solani furiosi similes sint, ipsæ tamen inter se diuersæ à Diosc. describuntur.

Galenus quoque de Dorycnio agens, simile id temperamento facit Papaueri & Mandragoræ, & aliis ita frigefaciendi vi præditis, vt in quo obtineat aquola frigiditas valde efficax.

Nullus ex Veteribus tum Græcis, tum Latinis, teste Cordo, Dorycnium descripsit præter Diosc. qui historiam eius ex Crateo desumpsit.

*Plinij error.* Plinius & alii quidam crediderunt Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod falsum esse Nicander, Dioscor. & plures alii testantur. Rob.

*Dorycnium Dorycnii, Helych. error.* Constat in Lexico notat *Δορυχνιον* Diosc. & *Δορυχνιον* Gal. & Nicander etiam *Δορυχνιον* dici apud Suidam, & Helych. corrupte de *Δορυχνιον*.

Matthiolo, Dorycnium hæcenus non contigit inuenire.

Brunk. onom. rectè Dorycnium siue Dorycnium aliud à Solano somnifero tradit, sic dictum fortasse, quod cuspides telorum inficere mos esset illo.

*Dorycnium cur dictum? Corrh. reprehenditur.* Gortebus contrà, malè ex Dioscor. dicit Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quum Dioscor. tantum dicat Solanum manicum quod etiam Dorychnium vocant.

*Dorycnium Gortebus Solanum furiosum.* Matthiolus [ inquit Greuius ] nequaquam consentit id quod Græci appellauerunt Solanum furiosum esse Dorycnium. Si tamen quæ Diosc. l. 6. & Theoph. & Plinius scripserunt considerare volumus, re ipsa profectò comperiemus, aut errasse Dioscor. aut Dorycnium simile aliquid Solano furioso habere &c. Matth. institit; nemo tamen hinc inferre debet ex lib. 6. eum idem sensisse, sed quod aliqui tantum ita vocarint. Hoc tamen Matth. responsum non viquequeque satisfacit, nam ea quæ Theoph. & Plinius de Dorycnio literis tradiderunt, à Diosc. de Solano furioso dicuntur.

Tamen quod sub finem præmii idem ex sua sententia & non alterum affirmare videtur. Auicenna Vuam vulpinam vocat, quod, vt ego existimo, Acinos ferat. Vix non dissimiles, quemadmodum Diosc. in ipsius descriptione affirmat. Dicitur etiam Solanum furiosum, quod in eo qui id in potu acceperit firem commouet; idque præstat non ob qualitates suas, quæ frigida sunt & sicca, sed ob innatam & peculiarem malignitatem: tantum enim abest, vt frigus firem excitet, quin potius egrum somnolentum & gtauem reddit, sicuti alibi diximus. Nicander tamen in descriptione Accidentium, quæ ab hoc veneno veniunt, furoris non meminit. Hæc Greuius obrudat. Verùm Theophr. non meminit Dorycnii, sed tantum Stryeni. Vires à Diosc. attributæ lib. 4. cap. 75. conueniunt sanè cum viribus attributis à Theophr. Strychno ac etiam ab ipsomet, capite præcedenti Solano Manico, quæ vires sanè planè repugnant viribus quas Diosc. lib. 6. cap. 6. Dorycnio attribuit, ac etiam Nicander, vt fortè liceat suspicari lib. 4. Diosc. malè additas vires Dorycnio competentes: nec vilo modo concludi potest Dorycnium & Solanum manicum eandem plantam: Greuius aut non legit textum Græcum in fine præmii aut non intelligit; ait enim Dioscor. *καλεῖται*. Vbi obsecro scripsit Diosc. Dorycnium acinos ferre. Greuius confundit Dorycnium Nicandri cum Solano verè dicto furioso aut manico Diosc. & Theophr. licet omnia ea quæ Nicander scribit ex Diosc. l. 6. de Dorycnio planè non respondeant, sed manifestè demonstrant a-

liam plantam à Solano furioso: hæc occasio vt Greuius, dum vult diuersarum plantarum, diuersas vires conciliare frustra se torquet. Quomodo Dorycnium Nicandri intestina exulcerans, abradens &c. [ Greuii verbis vtat ] præstabit, quod Plinius scribit, vt inter dormiendum cum formosis puellis, &c. innocentiss. dicitur venenum, quod dicit Plinius de suo Dorycnio diuerso à Nicandri & Dioscoridis. Vti igitur [ auctore Sarac. ] insitipium historia Dioscor. Anazarbus Dorycnium & Solanum manicum distinxit & ceu diuersas plantas diuersis descripsit capitibus, ita & lib. *αὐτὸν*. Altero, vtiusque veneni diuersis capitibus propria & peculiaria tradit remedia: quæ tamen omnia hoc loco vni Dorycnio accommodantur. Atque vel hinc patet, Dioscoridem hunc libri de venenis auctorem, alium ab illo Anazarbo extitisse.

Scribit Cornar. sibi videri communem esse appellationem Dorycnii, omnibus iis, quibus hæc

Acquivoca

& tela tingerentur. Appellamus Dorycnium Mompelientæ & Hispanicum, non Anguillaræ, vt visum Clusio: nec Veterum, vt Gesnero, de quo mox. Est & Dorycnio Hispanico congener Clusio, de quo proximè. Dorycnium habet Cassibona, quod nos Trifolium album rectum inscribimus. Dorycnii nomine nobis aliquando data

*Dorycnium Momp.*

Ionis Barba, de qua paulò antè dictum Lob. & Penia scribunt, quoddam Phylliream huiusmodi Dorycnium, quod non probant, quæ de re vide Hist. n. g. lib. 5. Pro Dorycnio aliqui, inquit Gesner. de hortis, habent suffruticem quandam montanum quem Viæ Idææ speciem putamus. Cæsalp. & Ferd. Imperator Dorycnium est, quod Daletham-

*Dorycnio Hisp. congener Clusio*

*Trifol. alb. rectum*

*Phylliream*

*Viæ Idææ*

picio dicitur Cneorum album: eiusdem etiam nomine Dorycnii meminit Clusius, quod Dorycnium nō negamus, cuius historia à nobis posita est in fine l. 5. Dorycnio est & cōgener quædam platanæ Cæsalpino foliis nigrioribus, de quolibet modò dicto. Cordus pro Dorycnio Nicandri exhibet Halicacabum peregrinum, quod improbant Gesnerus, Matthiolus & Lobelius, vt dicitur lib. 5. de Scandentibus. Dorycnio multum simile Anguill. Trifolium Halicacabum, quibusdam satis ineptè Dorycnium auctore Camerario appellatum, de quo agemus Hist. n. lib. 17. Dorycnii appellationem, inquit Cornarius, Plinius Solano furioso attribuit. Inter Diosc. reiect. Halicacabum, aliis Dorycnium dicitur, infra tamen etiam lib. 2. cap. 12. de

*Cneorum album. Daletham.*

*Dorycnio congener Cæsalp.*

*Halicacabum peregr.*

*Trifolium Halicacabum.*

lethalibus medicamentis, Dorycnion appellari dicit, Solanum furiosum. Quartum Solanum [ Genssueff ] per me quidem esto, inquit Trogius, quod *Δορυχνιον* Plinii, quo cuspides tingebantur, de hac planta lib. 23. inter Atriplices. Quibusdam etiam Dorycnium de Lunaria & Pyrethro dici suo loco hac in nostra Generali Histor. dicitur.

*Solanum furiosum. Dorycnium de Solano Atriplex dicta.*

*Pes Asinerianus.*

*Lunaria. Pyrethrum.*

#### DORICNIUM MONSPESSVLANVM FRUTICOSVM.

**D**ORICNIUM Crateæ Mompelii vocabant Fruticem totum albidum ad sequebunt al-  
titudinem excrecere solitum, cuius nouelli adhuc ramuli obsequiuntur, stragulae contumaces existunt, adulescentes aut loco asperiori nati, multum durefcunt, folia ex intervallis, terna, quaterna, sena, radiata, sine pediculis adhaerent, oblonga, angusta, alba lanugine pubescentia, Clusio adtingentis gustus. Flores extremis ramulorum innascuntur in orbem glomerati, albi, quorum singulares ad Trifolii pratensis albi flores accedunt;

*Dorycnium Crateæ.*

*Descriptio*

*Ramuli. Folia.*

*Floræ.*



noſter male ſculpſit hanc iconem.

*Dorycnium* Geſner. hort. & colk ſtirp. *Dorycnium* à quibusdam ſiſo dictum circa Monſpelium: Obſeru. & Linn. Plant. *Dorycnium* Monſpel. Quotquot erat ſalu. a: tica rei herbarie ſtudioſi, *Dorycnium* vocaſant: quo iſte Cluſius verſabatur tempore: quo nomine etiam apud Mompelianos ante multos annos donatum fuit. Anguillara etiam hanc ſenſentiam amplecti videtur. Eius ſemen ab Aldebrando aliquando miſſum Trifolii albi nomine. Salmaticum vulgus *Minedega* vocat. Licet cum *Dorycnio* Dioſcoridi deſcripto nonnullas notas communes habeat, non tamen per omnia reſpondere videtur eius deſcriptioni. Hæc Cluſius qui *Dorycnium* Hiſpanicum vocat. Opiniori autem eius non adhaeremus exiſtimantes eſſe *Dorycnium* Anguill. aliam enim plantam ipſius intelligit. Hiſt. Lugd. A *Dorycnio* Veterum multum abeſt, quod Monſpelienſes hoc nomine habent, cuius facultas nondum experta, an ſomniferiſis, nec ne. Vocat autem Hiſt. Lugd. *Dorycnium* Monſpelulanum Dalechampi, idemque putat *Dorycnium* Hiſpanicum Cluſij. *Dorycnium* Monſp. à Cluſio accuratè pictum, vel ſimillimum ſaltem ſingoliſ in Buaria inuenit Camer. hort. quod Cyſio Columella: in maritimis naſcenti cognatum eſſe exiſtimat. Tab. icon. & hiſt. *Dorycnium* Hiſpanicum. Gerard. Angl. *Dorycnium* Hiſpanicum, The venoms of Monſpeliers qui ſecutus cæcum ducem Compilatorum cadit in foueam. Quis obſecro vocauit hanc plantam *Dorycnium* Monſpel. id ſanè nō fecit Cluſ. qui primus eam demonſtrauit. C. Bauh. Phyt. Trifoliuſ 8. ſiue album latiore folio. Hiſt. Lugd. *Dorycnii* congener planta Cluſij.

*Dorycnium*  
alium.

Trifolium  
alium.

*Minedega*.

*Dorycnium*  
alium.

*Cluſius*  
alium.

Locus,  
Cyſio Ce.

Locus, Cyſio Ce.

Trifolium.

Locus &  
compus.

*Dorycnium* Hiſpanicum exit copioſè agro Sal-mantienſi, & aliis Hiſpaniæ locis, ſecundum vias, & incultis: meminit etiam Cluſius agro Narbonenſi videri: frequentiffimum etiam non modo Viennenſi agro, ſed & plerique Pannoniæ locis. Hæc Mart. C. Inſp. ſemen valuiſis maturitate deſuſcentibus exiit Iulio: *Dorycnium* floreſ vidi menſe Auguſto & Autumnio, nec non Iunio menſe. Prouenit quā itur *Perau*: prouenit & apud mare, ac inter Monſpelium & *Perau*. Baſileæ cum flore obſeruauit in horto D. Feliciſ Plateri. Caſp. Bauh. frater re-perit non longè à *Perau* & in-tet *S. mittere* ac Monſpel-ium: item eundo *Fronton* menſe Maio.

ſapore vt nobis quidem videtur, nonnihil altringente, holce excipiunt folliculi plures ſimul iūcti, parui, in quibus ſingulis ſemina continē. ur ſingula, verticillaria, vt prodidit Cluſius, ſeu varia, quolia ſerè Tithymali pareliſamina cum ſigura, tum colore, tū magnitudine. Radix ſatis craſſa, dura & lignoſa, exterius nigra, interiùs alba. Sculptor

## DORYCNIO CONGENER PLANTA.



**D**orycnio Hiſpanico (Monſpelienſi) congener planta Cluſij, regno Valentino, & quibusdam Beticæ locis naſcitur, cubitalibus, & viminis modo obſequioſis virgis, ſuperiore gracilioribus, foliis breuioribus & latioribus, breuique pediculo ternis aut quinis ſimul iunctis & ramulos amplectentibus, ſalſi & nonnihil acrimoniæ obtinentis

Locus:  
Deſcriptio  
Virga.

Folia.

Gustus.  
Flores.

aut quinos flores ſuſtinent Medici maiores, coloris viridis: alioqui tota planta candidior eſt præcedenti, imò tota incana: eius neque ſemen neque radicem obſeruabam, ſed ramulum qualem equitando abruptere potui, exprimere iuſſi.

Tab. icon. & hiſt. *Dorycnii* ſpecies. Gerard. Angl. *Dorycnium* Monſpelienſium, The venoms of Monſpeliers qui ſecutus cæcum ducem Compilatorum cadit in foueam. Quis obſecro vocauit hanc plantam *Dorycnium* Monſpel. id ſanè nō fecit Cluſ. qui primus eam demonſtrauit. C. Bauh. Phyt. Trifoliuſ 8. ſiue album latiore folio. Hiſt. Lugd. *Dorycnii* congener planta Cluſij.

Gerard. monſtratur.

Trifolium  
alium.

## GENISTA ANGVLOSA TRIFOLIA.



**R**utæ eſt Deſcript. ſarmentofus duos aut tres cubitos altus, denſis & crebris ramis anguloſis, flexilibus, viſceſcentibus: in quibus folia crebra hirtuta, prioris Trifolii, alia ſimplicia, acuminata: flores ſpecioſi, crocei, Laburni, maiores, galericulati, ſtaminibus recuruis cum apicibus croceis; ſiliquæ; ſiliquæ; compreſſæ, latæ, nigra, hirtulae in quibus ſemen multum eſt. Radix grauior oler & amari eſt ſaporis.

Rami. Folia.

Flores.

Siliqua.

Semen.  
Radix.

Sapor & odor.

Colutæ veſicariæ fuſcum, compreſſum. Radix multiſida neruoſa, lenta flexilis, lutea. Tota ſtirps grauior oler & amari eſt ſaporis.

An Ruellius de hac loquitur dicens, Inuenio & ſcopas



*Scopa Amerina* Genistella Amerina, Genista angulosa, cui male apposita ex Trago Chamaepartifigura. Trago Genista pfrimmen / grisse pfrimmi, quam quosdam putare ait eandem cum Spartio & fieri posse putat, vt Dioscor. lib. 3. cap. 152. Pfrimmi sub Spartio intellexit, quod etiam nomen Lygon, Lobon & Yimen: verum is etiam dubitet cum Plinio [qui lib. 24. c. 9.] Genistam eandem facit cum Spartio ] lubens tamen assereret Genistam vel pfrimmi esse.

*Spartium.*

*Lygon.*

*Lobon.*

*Erica.*

*Myrica.*

*Albrahen.*

*Tragus.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

*Compil.*

*Gerard.*

*Tabern.*

à genium flexilitate deducunt nonnulli, quæ duratæ species Sparti dici potest. Falluntur qui Diosc. Spartium existimant. Observ. p. 531. Genista Scoparia, vulgò Genista Plinii. Icon. Plant. Genista Scoparia vulgò Genistella, Spartum Lobelii. Is quidem non observavit trifolium esse, ponit tamen quam habet Dodonæus cum Rapa iuncta. Hist. Lugd. Genista angulosa seu vulgaris, Camer. hort. Genista vulgaris. Item apud Matth. Germ. & Epit. Genista, Ital. Ginestra, Hisp. Giestra, Giesta, huc Giestrua, Germ. Ginst, Gall. Geste.

Figura quæ apponitur Matthiolo satis laudabilis, mihi tamen non probatur poni eius plantæ, quam non intelligit Matth. & quæ non parum diuersa.

Tabern. Icon. & Hist. Genista, pfrimmi: Item Genista alba, ivera pfrimmi, n. h. d. f. c. s. ad præcedenti nisi colore albo: Adhuc Genistelli, flein pfrimmi. Similis omnino est primæ, tui quod non ita frutescit ac minor est, nec tot virgibus abundat. Quod erat opus ob solum colorem fingere nouam figuram, nec indicare ubi visi fuerint eius modi genista flore albo, verum hæc industria Compil. Tabern. cui fortè nulla trium suarum genistarum bene nota: priorem enim vulgissimam non bene describit.

Gerard. Angl. Browme. Et genista quarta tenuifolia, Small tucesdrome genista alba: Item Chama genista Anglica English Swarff Browme. Cur Gerardus mutat titulum & separat à priore genista, vocans genistam tenuifoliam, cum tantum differat colore, teste ipso Compilatore Tabern.

C. Buh. apud Matth. Genista angulosa, qui al. sumptis figuram quam Compil. Tabern. posuerat pro alba.

Genistam vulgaris apud Germanos notitiae in- Loc. & cultus agris, campisque neque non quibusdam montanis arbutis, quæ statim temporibus cedi solent, gigni prodit Tragus: Fuchsius peracida loca amare, idè quæ in syluis & iuxta sylvas nasci locis arenosis iuxta vias: omnium notissimam tum apud Borcos, tum Meridionales, sterilibus præsertim, arenosis, montosis, & frigidioribus Clusius per vniuersam ferè Germaniam, Galliam, Angliam atque Belgiam vulgissimam esse. Is verò spontè nascentis nulla vestigia observare potuit in Pannonia & Bohemia, neque totâ Austria & Moravia. Genistas, in Hetturia aded frequentissimas provenire testatur Matth. vt Maio & Iunio mensibus magnum & iucundum spectaculum præbeant viatoribus, quoniam tam copiosè speciosis luis ac fulgentibus floribus ornantur & vestiuntur colles, vt procul auri videantur. Seminari aliquoties in aliquot locis comitatus Montbelg. quæ provenit: abundat propè M. R. uill. Castellum, vidi folia protrudentem noua & flores novos mense Septembri inter Bessardiam & Mafmunster, olim inter Montpelium & Lugdunum mense Iulio cum siliquis & foliis ex vno pediculo ternis, pilosis. Lugduni abundat florens Maio: ex ea scopas parant: In Hircynia hyeme cum siliquis: Basileæ florentem Iunio. Inter Placentiam & Mediolanum florentem cum foliis mense Aprilis: iuxta Castellum Abbatis Luxensis Passauant copiosa & versus Thermas Plumaras Lotharingæ.

Empetrici genistæ flores & semina ad internas vires ac qualdam affectiones exhibere hodie solent. A. Temperamentum. quæ de floribus genistæ distillata & pota, calculo. Aqua. Calculo.

his prodesse apud Tragum traditur, sicut & Calculo.

Kk 3

*Scopa Amerina* Genistella Amerina, Genista angulosa, cui male apposita ex Trago Chamaepartifigura. Trago Genista pfrimmi / grisse pfrimmi, quam quosdam putare ait eandem cum Spartio & fieri posse putat, vt Dioscor. lib. 3. cap. 152. Pfrimmi sub Spartio intellexit, quod etiam nomen Lygon, Lobon & Yimen: verum is etiam dubitet cum Plinio [qui lib. 24. c. 9.] Genistam eandem facit cum Spartio ] lubens tamen assereret Genistam vel pfrimmi esse.

Diosc. lib. 3. cap. 152. Pfrimmi sub Spartio intellexit, quod etiam nomen Lygon, Lobon & Yimen: verum is etiam dubitet cum Plinio [qui lib. 24. c. 9.] Genistam eandem facit cum Spartio ] lubens tamen assereret Genistam vel pfrimmi esse.

Sed Erica Dioscoridis non est, vt nec Spartium. Figura etiam Tragi parum feliciter picta: nec nomina conueniunt.

Gesl. de col. Herp. Genista maior.

Fuch. Genista Latinorum rei rusticæ scriptorum & Plinii: Officinatum & Barbaram sectantium medicinam, Genista & Giestra, Germ. Ginst & Ginsti, Gall. Gester, alia à Spartio.

Sed nec Genistam Plinii esse Corn. in Dioscor. comprobat, Sparta, inquit, Homerica neque ad Spartium Dioscoridis, cuius vires Plinius Genista adscripsit, peruenit: Est enim inter Spartium & Genistam hoc discrimen, quod Spartium foliis caret: Genista folia habet. Nota est Genista, Spartion Dioscoridi appellata pfrime & ginstæ & gense.

Distinctio Camerarii non placet. Turn. Genista, Angl. broonne, Plinii Genista à Diosc. Sparto diuersa, quod concedo Turnero: Genistam autem Plinii esse non dixerim: Huius figura posita apud Turnerum fol. 144. partis secundæ nomine Spartii, licet eius in contextu nulla fiat mentio. Mihi aliquando denominabat D. Presburger Hemerocallidem Theophr. ex sententia Guilandini. Cronemburg. de comp. medic. vulgaris vltus Genistam Plinium pinxisse lib. 24. sibi persuasum habet. Tanta inter Spartium & Genistam intercedit similitudo, tum facie, tum etiam viribus, vt eorum affinitate deceptus Matthiolus crediderit, omnino errasse eos, qui alterum ab altera secernebant: præsertim cum hac re deprehendisset Plinium lib. 24. cap. 9. dubitasse. Verum cum admonitus accuratius Dioscoridem perlegisset, comperit planè inter has plantas discrimen esse. Quippe quod Spartium Dioscoridi frutex sit foliis viduus: & floribus constet albæ violæ similibus. Genista verò folia proferat longiuscula, lani ferè modo: & flores luteos, lunatos. Hinc itaque factum est, vt nunc in eorum sententiâ consistat, qui Spartium à Genista differre docent. Non tamen quod diuersi prorsus generis has plantas esse putet: nam tanta, vt dictum, vni cum altera cognatio est, vt etiam non eadem sint: tamen congeneres esse videantur.

Dodon. Gall. Genista, Genista, & Giestra, Germ. Ginst & pfrimmi. Belgicè Brene. Sine dubio Spartii species. Latin fol. Genista germanica. Clus. in Pann. lib. 1. c. 11. Genista vulgaris Germanica, Austriacis Vngaris vicinis Gelbe Hee / hoc est trifolium luteum appellata. Hisp. & Hist. pol. Genista vulgaris & Septentrionalis, Hisp. Scobas, [quod illa, quemadmodum nostrates, Scoparum quibus ædes purgant & euerrunt, loco vtantur] dicta.


Lob. & Pena Adu. Spartium, Genista Scoparia vulgi Gal. Gense. Angl. Brome & Brem. Genistam

Tom. I.

minis per se tunc tertia parte drachmæ sumpta, ad sudorem interim eliciendum cuncto corpore. Apes flores Genistæ amant, sed mellatio ex illis facta improbat. Opiliones quidem è Genista vnguentum faciunt, quod Scabiei ouium medetur. Calefacit & siccatur in altero ordine. id quod Fuchium amaritudo quam gustata refert, & eius facultates abundè docent. Sparto & Genistæ, non obstant, quod forma non nihil distent, eadem inest facultas: ut enim spartum pituitam per superna & inferna purgare potest, sic etiam Genista: Hinc adeo fit ut eius seminis hodierno tempore contra Podagram magnus sit usus. Vrinam etiam amaritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidem in renibus, tum in vesica confingere, ut etiam recentiores tradunt, potest. Strumas denique, alios tumores discutere posse idem scribunt. Calida & sicca, autore Dodonæo, proximè ad tertium gradum abstergit ac partes tenues habet. Folia, ramuli & sumitates Genistæ, cocta in vino aut aqua uti sunt hydropicis, ac omnibus obstructionibus hepatis, splenis, renum, aut vesicæ, partim enim purgat & pellit omnes humores seriosos & aquosos ac superfluos, per aluum: partim per vrinam. Eadem præstat semen sumptum pondere circiter drachmæ vnius. Denique eandem facultates habet quas Genista Hispanica, acidem eius in morbis vtilis esse potest, qui Genistæ Hispanicæ. Genista Germanica sub sipem Aprilis aut Maio mense floret, atque tunc rudimenta florum adhuc virentia, prius videlicet quam Lutea fiant, decerpta, muria aut sale conduntur, quæ postea clota & decocta, Capparum in obsonis loco habentur, nec minore, cum suauitate mandantur: ac languentem excitant appetentiam, & hepatis ac lienis infarctus expellunt. Paratur ex Genistæ ramulorum ac virgultorum aridorum & combustorum cinere, cum viho tenui albo, cuius modum Rhenanum est, Lixiuum, quod ad Cachexiam & Leucophlegmatiam à nonnullis valde commendatur: & potenter quidem aquosos ac seriosos humores cum vrina & per vesicam expellit: sed & acrimonia sua interna viscera quandoque lædit & exedit. Purgat, ut vult Matthiol. Genistæ semen non minus potenter ferè quam spartum aut Helleborus drachmæ vnius & semis pondere ex hydromelite ventriculo ieiuno sumptum. Quare eius magnus est hodie vsus contra podagram: potenter enim per aluum educit lentos viscidusque humores ex quibus podagra generatur. Virgulæ cum foliis in aceto dies aliquot macerantur & contulæ, succum reddunt, cuius si quis semunciam bibat, non paruum sentiet emolumentum contra dolorem ischiadicum. Semen Bronchocele, omnemque tumorem discutit. Genista cum axungia contulæ, gonagram perfrangat. Semine Genistæ Scopariæ vomitum, non secus ac Spartio Diolc. sapis duarum vnciarum decocto propinato, citra magnam contentionem mouit. Lobelius. Verum flores recens decerptos sèpissimè quamplurimos, & per se acetanis inditos, vorat plebecula Aruerhiæ, & Aquitaniz, maxima copia, inuocuos non modò, sed etiam admodum gustu suas: nec quicquam vomitionis nauseæ vilius, aut commotionis mouere solitos. Quin apud Brabantios gemmantes conduntur, sale & aceto flores, mensisque inferuntur, Capparum, Oleumque pari commendatione: creduntur enim non modò cordi vires, ac stomacho appetitum augere, sed etiam obstructiones referare, & calculum frangere. Idcirco fallantur, fallantque

qui hosce flores officinis vomitioni mouenda faciendos præcipiunt, rati istam Genistam esse Diolcor. Ellebori luppar, deiectionum Spartium: non enim deiectione insigni, sed tantum leuiore conatu excludunt, qui eorum vel Seminis decoctum hauserunt.

## GENISTA CVM RAPO



Fruticosa stirps Descript. Genista est, caules, aut potius Cauler. tenues caudices, habet lignosos, à quibus plurimæ tenues sparguntur virgulæ, angulose, virentes, lentæ & flexiles necitque faciles, non raro quoque in aëre diuisæ, circa quas folia exigua, Folis. obscure virentia, & flosculi. & flosculi eleganticolor, lutei, & tandem siliquæ. Siliqua. planæ, per maturitatem nigricantes veluti Phaceli, siue Bonæ, à Dodonæo

dictæ, in quibus semina plana dura, subrusta, lentibus minora. Radix dura & lignosa, fibras quasdam obliquas subinde à se dimittit. Attollitur autem Genista frequenter in satis magnam altitudinem, hominis staturam attingens: floribus hæc multis sæpe grauida: quandoque verò humilis permanet, quæ raro florifera. Huius verò radicem fibris adnascitur quod Rapum appellant Genisse. Est autem hoc tuberosum quoddam, turbinatum, subnigricantibus squamis opertum, pulpa interiore sublutea, à quo caulis assurgit dorante breuior, floribus circa fastigium, subcandidis, Lamii ferè æmulis, succedentibus oblongis, crassis, teretibus, non tamen magnis, loculis, in quibus semina minutissima & superuacanea. Totam autem faciem istud orobanchen Diolcor. refert: hoc solo ab eo differens, quod non inter legumina exeat: sed è fibris radicis Genistæ quib. abhæret, scit.

Dodon. gall. Genista parua, non differens à maiore nisi quod non excedat altitudinem trium pedum, ad huius radicem reperitur planta Belgis dicta, Brenrape, Lat. Rapum Geniste, & Rapo Genistæ, Gall. Nageau de Genestre, hoc procul dubio species Orobanche & Limodori. Lat. in fol. Genista cum Rapo. Olim Dodonæus non iunxerat Rapum Genistæ, ipsi Genistæ, nunc autem iungit: præterea olim differentem faciebat Orobanchem à Rapo, nunc tantum separat, à nascendi loco: licet nobis persuadeamus eius Genistam eandem cum angulosa, quia tamen nūquam vidimus cum Rapo, ac præterea ipse non meminerit trium foliorum ex vno pediculo in sua Genista, ac minorem dicat, nos eius picturam proposuimus, quam sculptor corruptit potissimum in floribus Rapi Genistæ.

Lob. & Pena Adu. vocant, Herbariorum Rapum Genistæ siue Hypopartium æmulum. floribus galeatis Tragorchidis Radicibus. Genistæ & Genistellæ adnascitur quasi soboles spuria: sed specie videnda & raritate, extremum non ab simile ortu, concretu.

Flora non  
mouetur  
mutatur  
spartium.

Virgula.

Folis.

Flosculi.

Siliqua.

Semeb.

Radix.

Rapum.

Orobanche.

Genista  
parua.

Rapum.

Orobanche.

Limodori.

Hypopartium.



concretu, incremento, caule & effigie Hypocystidis vel Orobanche. Obferu. Hippocystidium Rapum Genistæ. Icon. plant. Genista Scoparia vulgi. Item Hypogenista, Rapum Genistæ à similitudine. Lobel. in Obferu. & Icon. Iungit Rapum Genistæ Scopariæ vt Dodon. in qua folia non sunt trifolia.

Gerard. Angl. Rapum Genistæ, Brenape Orobanche, qui ponit pro Rapo Genistæ iconem propositam à Tabern. titulo Orobanche secundæ.

Clus. Pann. Orobanche illa maior, quam Belgæ, quoniam ad Genistæ vulgaris, radices interdum nascitur, Rapum Genistæ cognominant. Vngaris *Misegyerthia*, id est, missalis candelæ siue cereus dicta. Et Hist. post. Orobanche omnium maxima, quam, quia apud Belgas sapientia Genistæ vulgaris radicibus innascitur, Herbariorum turba Rapum Genistæ appellat. Vide plura sub Orobanche.

Camer. ad Marthiol. Germ. Orobanche genus ad Genistam provenire solum, vulgò Rapum Genistæ dictum, quod Clus. Pannon. Orobanchen maiorem vocat.

Genista, autore Dodon. parua provenit locis siccis ac glareosis secus itinera, nonnunquam in sylvis. Rapum Genistæ reperitur in terra sterili, macra & arenosa, ad Genistæ parvæ radicem, quæ ad perfectionem non venit, & quæ non fert flores, aut paucos: inveniuntur mense Junio & Julio. Rapum Genistæ aulit Lobel in Flandriæ, Gallia, & Angliæ locis maiore Genistæ scæntibus, aliqui frustra quæsitum & diu alibi: At Sabaudia & Pedemontani colles parvæ feracissimi, etiam istud copiosum fundunt. Rapum Genistæ Belgarum Clusio passim multis Austriæ & Pannoniæ sylvis nascitur.

Rapum Genistæ habetur apud Dodonæum à nonnullis Empeiricis recentioribus, pro summo remedio aduersus calculum, ad mouendas vrinas, decoctum in vino deinde potum: vt enim aiunt, soluit renum obstructiones, producit ac prouocat vrinam, calculum frangit ac arenulas pellit. Succus recens glutinat ac sanat omnia vulnera recentia & abstergit deteriora ac sordida reddita: vsus esse potest ad alia vlcera maligna, abstergit enim ac ad sanitatem producit. Vt autem succus melius conferuetur, postquam ex radicibus recentibus erit expressus, Soli exponendus donec crassescat, aut additur aliquid mellis, & Soli exponitur: hinc enim melior erit ac commodior extergendis vulneribus & vlcibus putridis. Potest etiam ex radicibus semisiccis extrahi Oleum vtile ad omnia ad quæ confert succus. Hoc Oleum delet omnes maculas, ac faciei exanthemata, ac totius corporis, sæpius illitum. Ait Clus. & post eum Camer. qui tamen eum nominare non dignatur more suo, puluerem cum calido vino exhibitum insignie medicamentum aduersus colicum dolorem, nonnullos credere. Rapum Genistæ magnis votis & peregrinationibus Chymistas Maio mense venari scribit Lob. Ad vtriusque Genistæ radices, subleuatosq; teneriores asparagos cum radicibus siue appendicibus à Genista auclendis alembico indunt: & indeigne Oleum eliciunt, ad calculos perquam celebre.

tium: quibus alternatim adnascuntur folia, Hypocystidis, maiora, interdum paria, supra infusque atrourentia, satuo lentore mandentis os implentia: flores in thysis lutei, Genistæ angulosa minores, quorum singulis appositi: siliquæ vniat longæ, lacuscula, glabra, in quibus multa semina parua.



Ruell. hanc *Lysimachion* & *Ruticorun* *Carne lami* vocat, quo etiam nomine in humidis eam inueniunt, ut. Et tum Officinis opumè notam. Hinc præterea *Corneola*.

vulgò notæ singulas inesse notas, quas *Lysimachium* tribuit: Lyron tam Dioscoridem quam Plinium alio nomine appellat tradere, quod putetur pro Luteo deprauatum. Nam, vt Vitruuius author sit, eos qui non possint Chrysolilla vti, herbâ, quæ Luteum appelleretur, cæruleum inficere ac viridissimo vi colore. Et talem esse *Lysimachium* siue Litron, siue Luteum vocat apud insectores vsu: nam cæruleo colore, quo clausum tingat, eam superinducentes, viridem efficere colorem: per se autem luteum vel flauum præbere: solere enim pictores ex luteo & cæruleo contritis viridem efficere colorem. Addit porò rura nonnunquam hunc florem luteum non à colore, quo tingat, sed à flore potius, qui luteo micet conspectu, Aquatilem Solisam appellare. Ruellius ergo affirmat hanc *Lysimachiam* esse, quamuis inibi aliam verius tradat. An eadem *Acipitrinus pes*, vulgò *Corneola* dictus, folio Salicis ferè pusillæ, flore subluteo, cum siliquis Ciceri similibus, in quibus semen? Cordo in Dioscor. *Lysimachium* Leoniceo *Corneola* putatum, qua tinctores viridem colorem inficiunt. Cui sententiæ Ruellium subscribere dicit, quamuis post aliam herbam *Lysimachium* esse putet. Sed Cordus illis nullo modo assentire potest, qui *Corneola* *Lysimachion* esse putet. Quoniam *Corneola* fruticosa herba sit, quæ à Germaphis Gilsfrant appellatur, in editis, nec aquosis nascens. Ruellium reprehendit Cordus quod loco dicto putet Lyri vocabulum corruptum esse à Luteo, cum nequaquam ibi Vitruuius per Luteum *Lysimachium* intelligat, quod Lytron etiam appelleretur, sed sui generis herbam.

Florem tinctorum depingit & describit Tragus sub nomine *Ferula*, quam etiam florem tinctorum vocat & Thapsiam, & male ad Spartion referri posse credit quod *Galsfrutblumen* interpretatur. Vtrum autem *Ferula* Veterum sit, in *Ferula* præsentia quidem nec asserit, neque negat. *Ferulam* tamen nuncupauit. Quæ opiniones vique aded erroneæ sunt, vt refutationem non mereantur. Credat quousque velit Spartion id esse, ex quo Asia lina piscatoria conficere solita est.

Fuchsius Hist. Tinctorium florem appellat, Ger. *Galsboder* *Serichsard blumen* & *Ackerpsrimmen* nonnullorum. Gall. *Herbe à ianlinr*. Is quum apud illum essem Genistellam non ac-

Folia.

Corneola.

Lysimachium.  
Litron.  
Luteum.  
Chrysolilla.  
Succida-nam.Solis a.  
quadrata.Lysimachion Leoniceum.  
Corneola.  
Ruell. Ger.  
Lonic. re-  
preh.Spartion.  
Piscatoria.  
lina.

## TINCTORIVS FLOS

Radice lignosa densa viminum seges fruticat, tenuium, cubitalium & longiorum, tere-

Tom. I.

K k 4

leatam dixit. cefn. in fine hift. Cordi. Tinctorius  
flos Fuchij geniftæ species, de coll. ftrep. genifta  
minor non spinofa, Tigutinatorum Pfingft bla-  
men, Flos tinctorius Fuchij.

Matthiol. in D. ofcor. notat Ruellium Lyfima-  
machiam eam putare, quam Hetrufci vulgò ap-  
pellent *Cerreta*, fiue *Braglia*, Porci uentes verò  
*Cefaria*: fcd hac rē cum apertè falli.

Dodon. Gall. Genifta humilis, Belg. Aferbren.  
Herm. Flos tinctorius farbbumen, Galfarb bla-  
men/ Seydenshamet. Lat. in fol. Genifta tin-  
ctoria Plinij.

Cluf. Genifta, fiue Flos tinctorius vulgò, Vng-  
ris *Fefte Verag*.

*Corneola*. A Cafalpino ita traditur. Corneola fiue Coro-  
neola vulgò ab infectioribus lanarum appellatur  
fuffrutex lignofus cubito breuior: rectis ramulis,  
ftriatis, folis fimplicibus, figura Lini, latioribus,  
copiofo flore luteo, fimili Geniftæ, fed tenuiori,  
filiquis exilibus: oritur in fyluis, eo inficiunt co-  
lorem luteo, vnde non immeritò *Lutea herba* dici  
poffit apud Plinium quā ngebatur Chryfocol-  
la. vt Linum & Lana.

Lobel. & Pena Adu. vulgò *Geniftella infectoria*, an  
Lutea Plinii? Angl. *Diers werde*. Obferu. Vul-  
gi Geniftella infectoria, an Lutea Plinii? Adu. per-  
peram Ferula Tragi. E folio latiore fecundam dif-  
ferentiam alit Murtonus. Et tertiam iuxta Zut-  
phantiam lectam, procumbentibus pedibus ra-  
mulis, cæteroquin non abfimilem. Icon. Pl. Vul-  
gi geniftella infectoria.

Hift. Lugd. Tinctorius flos, fiue Genifta humilis,  
call. perit genefi vel petire genefte.

Tab. icon. & Hift. geniftella tinctoria, Blein  
farbbpfummen.

Gerard. geniftella tinctoria Greme werde vel  
*Diers werde*.

*Locus & Tempus*. Suffruticem illum qui à tingendi vfu, floris  
Tinctorii vel geniftæ tinctoriae nomen inuenit,  
in Hifpaniis vidiffe non meminit Clufius: ac in  
Auffria & Pannonia fyluofis locis, & ad monta-  
norum pratorum margines frequentiffimum  
confpexit. Frequentiffimus etiam in omnibus  
pratis quibus proximæ fyluæ, cum Francofordia-  
no agro, tum plerifque alijs Germaniæ locis. Tin-  
ctorum florem vidi Tubingæ. Monfpeli cum  
elfem & inuiferem Treipontes du Gab: inter eos  
& Begnol, inueni florentem Iunio. Genevæ, &  
Ebrudum abundat, florens mēfe Maio, Iunio, Iu-  
lio, Montbelgardi in horto ferarum, & paffim  
propè *Murwillars* florentem mēfe Augufto obfer-  
uauimus: Patavii in horto publico qui in arbuf-  
culam creverat.

*Vires & Tempera-  
mentum*. Amara eft Planta haud alter quàm genifta, vt  
calefcere illam & ficcare in altero ordine fit eui-  
dentiffimum. Vt forma & Temperamento ge-  
niftæ fimilis effe itauit Fuchius: fic etiam facultati-  
bus haud dubiè eidem refpondere dicit, verum  
melioribus. Florum vfu iuxta Tragum, in tingend-  
is libris & alijs vt lineis veftribus & laneis, quæ  
eo optimè tinguntur, luteo colore.



tis, facis argu-  
ftis, in obtutum  
angulum dela-  
nentibus, ali-  
quid affine ha-  
bentibus cum  
Dorycnio Mō-  
fpelienf. Flores  
multi, parui, lu-  
tei, hiantes,  
vt in cæuens  
geniftis, exte-  
rius hirtuti &  
albicantes in  
planta fcca.

Quum non fi-  
mus certi an eam-  
dem fit cum  
Genifta tinctoria  
Hifp. Clufij  
eius defcri-  
ptionem sub-

iiicimus, quæ fic habet: Ad duorum cubitorum al-  
titudinem crefcit interdum hic fitutex, nudo fpi-  
rite, enodi, recto, digitali craffitudine, cand. can-  
te coruice recto, qui in multiplices, breuifque ra-  
mos tenellos & fragiles fumma parte diuiditur:  
hos ornaat folia Lini aut Thymelæ, frequentia,  
fuperne virentia, inferne verò incana, & argentea  
planè fplendoris, gultus initio exficantis & non-  
nihil adftringentis, deinde fubamari: flores fum-  
mis ramulis nafcuntur fpicatim congefti, Geniftæ  
tinctoriae Germanicæ fimiles, lutei. Tota plan-  
ta elegans eft afpectu. Quo tempore floret, fub  
ea crefcit Hæmoderi quoddam genus elegans, pe-  
dalis altitudinis, brachialis interdum craffitudinis,  
multis floribus à medio feapo ad fumum vfque  
exornatum, magnis, oblongis, luteis, extrema  
parte hiantibus & in quinque partes diuifis: to-  
tum humidum eft, pingui oleaginoſaque materia  
turgit.

Dodon. Lat. in fol. Genifta tinctoria altera icon,  
Genifta altera Clufio. Lob. Obl. & Icon. Plant.  
Geniftella infectoria. Adu. p. 407. geniftella tin-  
ctoria Clufij. Scoba Murianis. In Aduerſariis  
de hac nihil inuenio. Hift. Lugd. Genifta tin-  
ctoria Clufij. Theuetus in Canariis Infulis, ea præ-  
fertim, quæ Ferrea cognominata eft, locis lapido-  
fis & montofis, nafci herbam refert, quam Ori-  
celle vocant, Arabes Sereth, quæ cotia eleganter  
tingunt ex hifpanis eò delata. Tabern. icon. &  
hift. genifta infectoria hifpanica, Spanniſh  
ferbpfummen. Gerard. Angl. geniftella infecto-  
ria. Werde diers Werde.

Nufquam hunc fruticem conſpicebam, quàm  
Murciano regno fecundum vias naſcentem, &  
Martio mēfe florentem. Incola ftirpem ipſam  
Scopa appellabant, hæmoderum autem fub ea  
naſcens, Yerua tora, quia forſitan fi vacet eo ve-  
ſcantur, ad Venerem excitat taurum appet-  
tunt.

#### GENISTELLA TINCTORIA HISPANICA.

*Defcrip-  
tio*. Cenerofus quidam Baro germanus, olim Lu-  
geduni nobis demonſtrauit geniftæ ſpeciem  
ex Hifpania delatam, quàm ita deſcripſimus:  
Frutex eft multis ramulis abundans: Onuſtus  
multis paruis & breuibus folijs albidis, hirtu-

#### GENISTA TINCTORIA LATIFO- LIA LVGENSIS.

*Defcrip-  
tio*. Hoc nomine exhibitum fculo eft lignoſo, dē-  
fo, ſtriato, nodulis ab ima præfertim parte cō-  
torto. Quem ad intermedia mox alij ſupant mi-  
nores, facis numeroſi: folia quàm in vulgari tin-  
ctoria dicta multò latiora, molliora, breuioraque:  
alternatim

Flores.

Defcrip-  
tio Clufij.

Stipes.

Rami.

Folia.

Gustus.  
Flores.

Aquis opes.

Oricelle.

Sereth.

Locus &  
Tempus.Defcrip-  
tio.





Flos.

Locus.

ne genista tinctoria.

alternatim posita, viridia & aduersa. parte subcineritia, per ambitum leuiter hirsuta: nerui insigni per medium excurrente, & in apicem terminante. Flos luteus, hians more reliquarum genistarum. In sicca nullus gustus notabilis.

Dominus Aegerius dedit collectam in montibus Lucensibus nomi-

certè perexiguo odore præditi, nonnullis locis sat odorati nascuntur: quibus deinde succedunt planæ filiquæ, hirsutæ, exiguum flauescens semen, Cylindri generibus simile, continentes: radix est dura, lignosa, aliquot fibris donata: sed & virgula secundum radicem, quæ terra integuntur, plerumque fibras agunt.

Hist. Lugd. *Genista minima*. Camer. hort. *Geni-Synonyma stella, Genista pumila*, An Thal. in Hircyn. genista minoris species. Tabern. Icon. & Hist. genistella Pannonica *Ungarisch erdpfritzen*. Gerard. Anglie. *Chama genista Pannonica* *Swarzke Bromes of Hungaria*.

Transilunius in hortum Illustr. Excell. Celsi. VVirtemb. coll. etiam prope *Mansfelder*, vbi abundat cum trifolia angulosa. In itinere ad Plumarías thermas copiose reperimus locis siccis bicubitali repentem: in monte prope *Wattweiler*, Anno 1592. tum etiam in *Sulz* Alsatia vidimus copiam, missam cuidam mulieri ad mouendam fotu menstrua à Medicastra ex valle *Mansfelder*, ad *Mein* quæ denominat *Hein Benden*. Hæc eadem plantata est, & multum fallor, quam obseruari Monspelii ac descripsi ibi. Reperitur in sylua *Aigrenon* florens mense Aprilis.

Locus.

Gener Cherlerus obseruauit eam ad pedem Tempus.

Montis Lupi cum esset Monspelii. In sabulosis & lapidosis tumulis, Oeno fluuij per Sequanos labenti propinquis, nascens quæ è *Lyons Salinario Nozeretum* oppidum itur. Claf. Nascitur multis Pannoniæ locis ad viarum & sylvarum margines editis, siccis, atque desertis, nonnunquam agris incultis, & inter vepres aliquando magis luxuriat, ac in maiorem altitudinem extrescit. Floret Maio, quandoque etiam Aprilis.

## GENISTELLA PILOSA.

Descriptio

Radix.

Vimina.

Ramuli.

Folia.

Flores.

Siliquæ.

Icon.

Descriptio

Clusii.

Virgula.

Folia.

Flores.

GENISTELLA pilosa nobis dicta, suffrutex est cubitalis & bicubitalis. radice longa, oblique serpente, fibris aliquot donata: vimina habet lenta, tenuia, teretia, in multos ramulos angulosos, striatos diuisa, per terram vt plurimum se spargentia: folia admodum exigua, inferius lanugine canâ pubescentia, superius

glabra: flores ad ramulorum latera multi, crocei ex hirsuto calyculo, Alpalathi Monspelienfis vel genistæ vulgaris formâ, & odore, sed multo minores, exterius pilosi, intus glabri. Succeedunt siliquæ parua, vniciales, latiusculæ, hirsutæ, in quibus plura semina. Surculi in figura facta, nobis absentibus ad Clusianam Iconem, licet nobis non deessent plantæ ex horto, nimis crassi picti proportionem plantæ, erant etiam appingendæ siliquæ, & folia melius exprimenda.

Lubet, ne quisquam fallatur, Clusii descriptionem Chamagenistæ primæ proponere, de qua ait: Multis palmaribus, interdum etiam pedali-bus aut maioribus virgulis humi diffunditur, teretibus, lentis, striatis, virentibus, & in aliquot ramulos diuisis: per quos confuso ordine, & quasi temerè sparsa sunt foliola, bina, terna, aut quaterna, ab eodem exortu & tuberculo prodeuntia, genistæ vulgaris germanicæ foliis similia, eminentiore dorso, & quasi complicata, superne viridia, inferne nonnihil incana, amariuscule gustus: ex illorum alis singuli aut bini flores lutei, quatuor foliolis constantes, genistæ germanicæ florum æmuli, sed minores, nullo interdum aut

## GENISTELLA HERBACEA, SIVE CHAMÆSPARTIVM.



Genista gra- Descriptio  
minica her-  
ba est pouds li-  
gnosa, quam  
frutex, raro cu-  
bitum excedens.  
ramuli molles,  
hirsuti, duabus  
fimbriis latis  
mollioribus orna-  
ti, internodiis  
velut distincti,  
ac ad singula  
internodia, fo-  
lum vnum ob-  
longum, obtu-  
sum, pilosum,  
sine pediculo,  
maius quàm in  
Angulosa, nec  
triplex vt in ea:  
in virgularum  
summitate flo-  
res.

Ramuli.

Folium.

res lutei, parui, hiantes, spicam serè efficientes, non tamen incertam, vt in figura Cordo appo- sita, quam exhibuit *Lonicerus* pro Chamæspartio, Siliquarum & ante eum *Tragus*, quibus succedunt siliquæ valde pilosæ: radix lignosa, cubitalis in aliquot portiones magnas diuisa.

*Tragus* *Erdsprimm* / *Heinschneidblumen*. *Genista hu-*  
*Humilis Genista*. *Chama genista*, *Humile Spartium*, aut *infima Genista*. Quam si quis ad lotos syluestres referendam putet, cum eo non magno-

Genista hu-

Chama

Spartium

Lotus syl-

*Tinctorium*  
flor.

*Genista ge-*  
*mus*

*Chama-*  
*spartium.*

*Chama-*  
*genista*

*Genista*  
*terrestris*

*Gen. sagit-*  
*ulum*

*Gen. gra-*  
*minca.*

*Lob. nota-*  
*re.*

*Tab.*

*Gerardus*  
*notatur.*

*Locus &*  
*tempus.*

perè contenderit. Is alibi *Tinctorium flore* appel-  
lat, quem germ. *Akerpfrimmen* dicant.

Apud Cordum in Hist. Icon Tragi malè poni-  
tur pro *Genista angulosa* Cordi.

Gesner. hort. *Genista* genus, *Chamaespartium*.

Clusius Pannon. & Hist. post. *Chamaenista altera*,

germ. *Erdpfrimmen* id est, *terrestris Genista*,

nonnullis *sagittalis* *Genista*: plano, eoque altero,

ex altero nascente folio, quod deinde in caulicu-  
lum conuertitur.

Lob. & Pena Adu. *Genistella graminea montana*,

*Spartia herbula*. Obseru. *Genistella montana*, *geni-*

*stella angulosa* Cordi, *Genista sagittalis* nuperorum.

*Chamaespartium* Tragi: capiti in Aduersariis lu-

xatum. Item Plant. *Genistella montana*. *Genistella*

Cordi non est, perperam ita nuncupat. Figura in

Aduer. posita non est melior quam Tragi.

Hist. Lugd. *Chamaespartium* Tragi.

Gesnerus eius picturam descriptioni apud Cor-

dum apposuit. Sed si eam *Genistam* angulosam

Cordi esse existimauit, eam non satis in pexisse vi-

detur.

1. Tab. icon. & Hist. *Chamaespartium* 1. *Chama-*
2. *spartium* n. 2. & *Chamaespartium* 3. Narbonense
3. *Spanisch Erdpfrimmen*.

Frustula Compil. Tab. figuras tres habet, secun-

da ad Tragi iconem facta videtur, quam non bon-

nam esse ex Tragi descriptione facile est colligere:

tertia autem ad Lobelii imaginem efficta, Lobe-

lius tamen non distinguit suam à Tragiana sed eā-

dem facit, verum hæc industria Compil. qui, con-

sideratis tantum figuris, tres proponit icones

vnus plantæ, quasi diuersæ sint, quia descrip-  
tiones non intellexit plantarum: In omnibus ico-

nibus Tabern. displicet caules non esse foliatis &

fimbriatos.

Gerard. Angl. *Genistella globulata*, *Glebe Gree-*

*ne weede*: *Genistella Lagopoides maior*. hæc foæ-

*le Greene weede*, *Genistella Lagopoides minor*,

*Emal Green weede with hæcca foote flowers*. Ger-

ardus tribus iconibus affingit nouos titulos,

quasi essent diuersæ plantæ.

Geneuæ audiuit rusticum vocantem hanc plan-

tam, *de la spargelle*. Camer. hort. *Genista sagit-*

*talis Pannonica*. Lonicerus *Chamaespartium*. Do-

don. in Lat. in fol. *Genista* nonnullis à germ.

*Erdpfrimmen*, hoc est, *Chamaenista*. Nescio

cur Dod. assumpserit figuram quam Lobelius po-

luit pro *Chamaenista hispanica*.

Multis in locis provenit circa Montbelgardum:

Obseruauit geneuæ in *Thuri*. Basilæ florentem

Mense Maio: Monspelit, Lugduni *au bû*, *de la*

*bonne Alemande*. In Alfata, in hercynia sylua, in

Italia. *Spartea herbula* Lobelii paucis duntaxat mō-

tium celsiorum conuallibus aridis obuia, vt Cal-

cari montis Narbonensis propter Connobium: in

Geritanie etiam arduis multo longiores spargens

culmos: Eam videre est virentem etiamnum Lon-

dini. Olim hæc plautula apud heluetios, cum istac

interfaceret, & quibusdam germaniæ locis se col-

legisse meminit Clusius. Deinde in Pannonia

spontè copiosè nascentem obseruabat in sylua

*Remethuuyua*: Ill. V. Balthasaris de Bathyan

vrbis & æri minutissimæ proximæ, atque supra

Soponium urbem vulgò *Oedenburg* dictam,

Austriacis: sed omnium affluentiissimè inter Saktur-

nya Ill. Comitæ de Zrinio munitissimam arcem

& *Findau* Magnifici Dn. Michaelis de Zest at-

cem in collibus: & nunc proximè in sylua qua-

dam militari circiter infra Francofortum, ad fini-

stram Meni fluminis. *Chamaespartium* colles apri-

ci in Helu. abundant, crescit in colle iuxta Limagū

fluum infra Wettingam Monasterium proximè. Vlt. &

Hi flores puerorum quoque crepundis & lusi-

bis inferunt. Et quantum Trago quidem vi-

detur, temperamentum Orobi & Fcenogræci ob-

tinent.

## GENISTELLA HERBACEA

PLATYPHYLLOS.



**A**ro quidam **Locus.**

Germanus ex **Descript.**

Hispaniis reuer-

sus Lugdunum

attulit plantam,

quam *Genistam*

*Platypyllos* vo-

co, insignis sanè

frutæ aliquid af-

finitatis habens

cum *Chamaespar-*

*tio* Tragi, ramu-

li constant latis

fimbriis, apiculis,

veluti foliis, per

interualla distin-

ctis, dices folia

è foliis enasci, vt

in Ficu Indica

vulgò dicta, ad

vnunquodque

interrum sunt

veluti tres cusp-

des, ex vno aliud oritur folium, oriuntur etiam

alii ramuli eodem modo distincti. In ramulo- **Flores.**

rum summitatibus sunt flores similes quodam-

modo aliis *Genistis*, hiantes, lutei, exterius pi-

lis multis candicantes: saporem in planta manife-

stum non sentio: hanc verò Lugduni ante 40. an-

nos curauit depingendam.

Eam sic describit Clusius: *Chamaenista pe-*

regrina vix palmari magnitudine allurgebat, ad-

modum tamen fruticola, foliis *Chamaezæ* prox-

imis, breuioribus, duris & carnosis, aliquantulum

in ambitu sinuosis & crispis, rigidiusculisque,

vno ex ætero è medio folii nervo prodeunte quem-

admodum in superiore, interdum etiam binis, ter-

minisue simul ex orientibus: hic verò nervus paulatim

intumescit, & in ramulum conuertitur, sic

cum tota planta foliosa sit, & non nisi foliis con-

stare videatur, sit tandem admodum fruticola: in **Floresq.**

extremis istis foliis quini, senive, aut plures flores

simul iuncti, ex villosis calyculis nascuntur, mi-

nores quam in *Genista*, aurei planè coloris, nisi

bina inferiora folia incana lanugine pubescent.

Florentem duntaxat colligebam quo dicam loco,

mense Martio. Postea tamen resciccas plantas

nactus sum pedales aut ampliores.

Lobel. Obs. & Icon. *Genistella pinnata altera* Synony-

ma. **Hispanica.** *Chamaenista peregrina* Clusii. Hist. Lugd.

*Chamaenista peregrina* Clusii, quam Lobelius pin-

gendam curauit. Tabern. *Chamaespartium tertium*

*Spanisch Erdpfrimmen*. Gerard. Anglo. *ge-*

*nistella pinnata*, wie ged Greene weede. Dodon.

Lat. in fol. *Genista humilis*, quoad Iconem, quæ

eadem est cum ea quam Lobelius posuit pro his-

panica, descriptio autem est vulgaris *Chamae-*

*genista*.

*Chamaenistam* peregrinam in solis Valentini

regni locis incultis & alperis obseruauit floren-

tem Clusius Monte Maio.

GENISTA



## GENISTA IUNCEA.

Descriptio

Pinnula.

Folia.

Flores.



Siliqua.

Semina.

Matthiolum.

Sapor.

Spartium  
Dioscoridi  
qui Sagrio  
illustratur.

Spartium  
Hispani-  
um ex A-  
fricam.

Myrica.  
Arborum  
capitulum.  
Genista cur-  
dica?

Non Spar-  
tum.

Ruellii opi-  
brio explor.

Genista iuncea frutex est ad quatuor aut quinque cubito- rum altitudinem ex- crescens, inter- dum minor. Vi- mina iuncea, te- rectia, obliquosa, viridantia, per quæ, dum floret, & nouella adhuc planta, sparsa sunt rara quedam fo- lia, decidua, ob- longa, ramis con- coloria ferè: flo- res in virgulto- rum summitati- bus multi, lutei, aspectu lato, flo- ribus similes Pi- forum & Cicerularum, gustu dulces. Floribus succedunt siliquæ vicius quatuor vel quinque longæ, compressæ, aliquantulum incuruæ, colore ferè Castaneæ, in iis ad viginti circiter semina vel pauciora, compressa, rubentia, lucida, Lente minora, non ita circinata. Lentem potius refe- runt, quàm Eruium aut Viciam, quicquid scribat Matthiolus. Sapor leguminosus qualis Pilo- rum.

Et hic est frutex [δύω] ille, quem Dioscori- des Spartium [Σπάρτιον σπάρτον & σπάρτον vet.] vo- cat, virgas proferens longas [καυκράς, & non μικράς, vt Marcell.] sine foliis, firmas [ἀσπίλους σπέρμι, vet. non habet] fractu contumaces; in alligandis vi- tibus vinculi vsum præstantes: siliquas cen Pha- scolos [cen φάσκολος, addit vet.] in quibus semina Len- tis [σπάρκον] florem melinum [αἰθὴν μύλητον ἀσπὴν λευκοῦ] inftar Leucii.

Ceterum, ad Spartion Dioscoridis Plinii geni- stam referendam omnino existimo, quam spartium nominat. Libro autem 24. cap. 9. de hac copiosius tractat, genistam inquit, quoque vinculi vsum præ- stat, flores apibus gratissimi, dubito an hæc sit, quam Græci authores Spartion appellauere, cum ex ea Lina piscatoria apud eos fabricari didicerim, docuerim, & nunquid hanc designauerit Home- rus, cum dixit, hautum Sparta dissoluta. Non- dum enim fuisse Africanum vel Hispanum Spar- tum in vfu, certum est: & cum stiles fierent na- ues, Lino tantum, non Sparto vquam futas. Se- men eius quod Græci, eodem nomine appellat, in folliculis Phascolorum modo nascens purgat, Spartium; inquit Mesues, genista Latinis & My- rica, est Arborum capitulum. Spartum siue Spar- tion, genistam Veneti [vt vult Hermol.] vocant, fortasse, quia genu modo flexilis, adnexus sit, vel quia genubus medeatur dolentibus: Diosc. certè cum Sparton dixit, genistam videtur intelligere: cuius florem in coronas addebant.

Falluntur, vt vult Ruellius, qui genistam ean- dem esse cum Sparto contendunt, siquidem geni- sta foliis scateat, & florem ferat Piso similem. Ast ipsummet falli certum est. Argumenta, qui- bus probare conatur, nulla sunt: Alterum à foliis, quæ habeat genista, desumptum, quibus carere ait Dioscorides. Etenim solet plurimum conspici- line iis. Exemplar vetus etiam verba sine foliis

non habet. Alterum verò arguentum, quod genista florem ferat Piso similem: Spartum au- tem Violæ albæ Verba sunt. Nam Dioscor. dedit florem colore, [αἰθὴν μύλητον ἀσπὴν λευκοῦ] non fi- gurâ, violæ albæ similem.

Apud Cordum in Hist. posita falsa figura cum floribus Leucoii sub titulo Sparti Hispanici & Ge- nistæ iuncea, nec flores in nostra Fuchiana be- nè picti.

Tanta, tum facie, tum etiam viribus, inter Spartium, & genistam intercedit similitudo, vt eorum affinitate deceptus iam crediderim, in- quit Matthiolus, omnino errasse eos, qui alte- rum ab altera fecerunt &c. Verum cum accu- ratius Dioscoridem perlegissem, hac de re prius admonitus à Clariss. Medico Petrò Cannizero Hispano, Sereniss. Ferd. Romanorum Regis Pro- topophysico, qui in Hispania copiosissimum Spar- tum numerosumque genistam se vidisse testatus est, comperi planè inter has plantas discrimen ef- fice. Quippe quod Spartium Dioscoridi frutex sit foliis viduus: & floribus constet albæ violæ simi- libus, genista verò folia proferat longiucula, Li- ni ferè modo: & flores luteos, pisi modo luna- tos. Hinc itaque factum est, vt nunc in eorum sententia consistam, qui Spartium à genista di- fferre existimant. Non tamen quoddam protu- sus generis has plantas esse putem, nam tanta vt dixi vni cum altera cognatio est, vt etiam non ean- dem sint tamen congeneres esse videantur. Me- fues genistæ semen non rectè obseruasse videtur, quandoquidem id Erui vel vicie faciem potius referat quàm Lentis.

Idem in post. com. cum mag. fig. Lat. & Ital. Item Hist. germ. qui duas habet figuras, vnam pro Spar- tio, alteram pro genista. Spartii nomine posita cum floribus Leucoii falsa est: non erat necesse vt Matthiolus fallam exhiberet Iconem, cum flo- ribus Leucoii, nec Diosc. formâ tales requirit, sed colore vt dictum. Mehercle nunquam vidit plantam à se effictam, si vidisset, vique docuisset, vbi obseruasset, ac etiam ostendisset, quâ in re differret, suum Spartium à genistâ quam propo- nit, tantum ex auditu quadam narrat, confun- dens Spartium iuncum Hispanum Plinii cum genistâ. In Mesuem malè pronunciat, videri ipsi genistæ semen non rectè obseruasse, quandoqui- dem id Erui, vel Vicie faciem potius referat quàm Lentis. Mesue non erat redarguendus, non enim Matth. considerat Mesuen eandem tradere cum Dioscoride, qui ait σπάρτιον φάσκολον: & reuera nostra Genista refert potius semina Lentis, quàm Erui aut Vicie, quicquid dicat Matthiolus.

Fuchius huius etiam falsam exhibet figuram in qua flores quadripartiti, & siliquæ malè pictæ, falsum etiam quod ait sine foliis provenire.

Icon quam nos proponimus, ex Guarinianis est, quas emimus, in qua apparet quale fuerit figmentum Fuchii. Spartio etiam tribuit quæ vi- dentur tribuenda Sparto herbæ. Mesue non re- darguendus, quia semen dicit Lentis, in eo Dio- scoridem secutus eandem plantam cum Dioscor. Spartio tradens.

Camer. apud Matthiolum reiecit Iconem Spar- ti ipsius ac etiam genistæ, eorumque loco alia- rum plantarum reposuit, quod non probò.

Lacuna in Diosc. pro Spartio, quod ait depin- gere Dioscoridem, elsq̃ue Latinorum geni- stam, non parum differentem à vulgari Sparto, ex quo fiant fortes funes: Vtramque Matth. figu- ram retinet, sub his titulis, Spartij, & Spartij al- teri: Sed non demonstrat discrimina quod do-

Matth. no-  
tatur.

Mesue ex-  
cujatur.

Fuch-  
figmentum

Mesue ex-  
cujatur.

Camer. no-

Spartium.  
Genista.

Lacuna  
not.

buerat facere, si ei notae illae plantae.

Denique his assensit qui genistam & Spartium Dioscor. idem sentiant. Super eo autem quod Dioscorides *gallia* dixerit: Plinius vero ramos cum fronde ferre dixit, observandum Dioscor. describere eam uti sepe conspicitur sine foliis. Vere enim solent apparere, ut optime notavit Cordus in Genista iuncea, postea decidunt. Florem quidam dicunt figura Leucoio similem, talem etiam falsè appingunt. Dioscor. autem dixit *gallia* dicitur *gallia* dicitur *gallia* dicitur. Spartum autem Hispanicum Plinii cum Sparto Dioscoridis mihi miscendum non videtur, etiam si Ruellius & post eum Matthiolus id faciant, quod sanè Cordus non fecit: est enim herba teste Plinio lib. 19. cap. 2. Spartion autem Dioscoridis *gallia* dicitur *gallia* dicitur *gallia* dicitur. Spartum Hispanicum est quo texunt calathicum, & funes neantur, quos solent habere Monspelii, sicuti & herbam nondum adaptatam, non multum excedentem cubitum: genistam quoque Mesue eandem cum Sparto Dioscor. existimo, quamvis aliter sentire videatur Matthiolus.

Ruell. & Matthiol. *gallia* dicitur.

Matthiol. *gallia* dicitur.

Mesue ex- *gallia* dicitur.

Gesner. Genista iuncea Cordo, Spartus vel spartium. Lobel. & Pena Adu. Obi. & Icon. Plant. Spartium Dioscor. rideum Hispanicum & Narbonense, Viminum maius. Ait autem in Aduar. huius semina & flores in Officinis habenda ut pote legumi Sparti, cuius ne pictam quidem effigiem, nedum viam stirpem videtur intuitus Commentator, insulsus balbutor, si puduit miserè recantationis, cur non piguit etiam calumniam Mesue inuisse, qui lentis semen dixerit esse Genistae, sequutus Dioscor. Plurique perdocti fruticem quem Angli, inquit Turnerus Browne, Latini Genistam vocant, cum spartio Græcorum eundem esse arbitrati sunt, ac Plinius lib. 12. cap. 9. de Genista scribens, utrum Genista sit Græcorum Spartium, an non? Sed si Neoteici, qui cum spartio genistam confuderunt, & Plinius qui ambigebat Genistane esset spartio eadem, vidissent, tum genistam nostram [angulosam] passim in campis vulgarem, tum illam quæ in hortis duntaxat colitur: & quæ quæ vitramarina est, freuche Browne vulgò appellatur, id est gallica genista: Nec illi ista confudissent, nec Plinius dubitasset. Genista gallica quæ paucos ante annos ex Hispania huc importata est, lentior est vulgari: sarmenta longa, leuia, vitidantia, iuncis perfamilia, nisi quod alicubi foliorum vestigia subinde appareant, foliorum nomine vix digna. Arbitror, quod Dioscor. ea tam minuta, tamque pauca viderit, noluisse folia appellare.

Genista autem huius vimineæ figuram ponit par. 2. fol. 144. ubi de ea hæc scribit Turnerus. Spartium Angl. freuche Browne, vel Spanische Browne folia habet reuera, sed adeò exigua ut Dioscor. foliorum nomine non sit dignatus, etiam saltem ramum sine foliis viderit. Semen, quod Græci eodem nomine appellant, per maturitatem rufum nigrumque, lentiusculis non ab simile, quod Phaeolorum modo, Siliquis per ætatem nigris, in vasis dehiscenibus etiam cum crepitu, ut spontè decidat, continetur. Dubitabat enim Plinius, an hæc sit, quam Græci autores Spartum appellare: & nunquid eam designauerit Homerus cum cecinit.

Kal. dñi dñe cecinit vñ, vel cecinit dñe. In via autem Africanam aut Hispanum minimè certum est, ut ille scribit. Ut, cum fierent subtiles naues, Lino, non Sparto fuebant. Gellius tamen ex illo Homero carmine contrà asserit. Sed

nunc in confesso est, aliud esse Spartum, aliud esse genistam. Cuius illud Virgils, absque foliis, & flore violæ albae constet. Sunt tamen qui hanc controuersiam diuimere vagantes, duo Sparti genera assignent. Vnum, quod genista sit: alterum, quod in Hispania & Africa nascatur, quod supra descriptum est. Asia, inquit Plin. & genista decem diebus madefacta, Lina facit, ad reuā piscatu durantiā contextenda. Ait etiam Aetius videtur apud suos rectè genista solere. In Pharmacopœa Adolphi Otconis inuenio vñ in loco genistam *gallia* dicitur: Item in alio genistam Spartium non esse. Lectores igitur concilient hanc contrarietatem.

Amatus in Dioscor. tradit Spartium suum Spartum hodie longè aliud esse à genista quod in Bactica regione Hispaniæ nascatur. Quod autem Hispanicum diuersum sit à genista lubens concedo, non item Spartum Dioscoridis in quem commentatur Anguillara, Ac genistam per totam Græciam adhuc dici *gallia* dicitur & eandem esse quæ genista, nec dubitandum quin sit Dioscor. Spartum.

Amatus *gallia* dicitur.

Spartium *gallia* dicitur.

Dodon. Gall. habet malam figuram cum flore Leucoii. Idem de frum. negat. Spartum esse genistam Italianam, & tamen hist. Lat. in fol. sub genista Italica Spartii Dioscor. figuram exhibet. Castor. Durant Spartium Græcorum. Camer. hort. Genista transalpina siue Hispanica arborecens: Spartium, genista peregrina siue Africana vulgò dicta grandis Italica genista.

Dorsth. pro Spartio Dioscor. Iconem habet genistæ nostræ angulosæ & trifoliæ: existimamus autem ei non fuisse notam genistam iuncea.

Dorsth. *gallia* dicitur.

hist. Lugd. Spartium Dioscor. siue genista, Spartium Matthiol. ferè genista. Is historia ascendentum putat, qui Spartium Dioscoridis & Græcorum, genistam esse arbitrantur: Nam Ruellii, Matthiolique rationes facile dilui posse: A Mesue genistæ semen non rectè obseruatum esse Matth. scribere, quod Erui aut Vicie faciem potius referat, quàm Lentis. Imò verò Matthioli negligentiam hic mirari licet, genistæ in Italia vulgatissima semen adeò officanter contemplati Cornartum genistam quandam hisp. confinxisse. Sed non placet Rhaph. hist. ponere falsam figuram Matthioli, nec monere eandem esse cum ea, quam ponit pro Spartio Dioscor.

Tabern. icon. & hist. Spartium Hispanicum 1. Spartium Hispanicum 2. Spartium Hispanicum 3. Compiler Tabern. tres Icones vnius stirpis habet, quarum prima falsa est ad Dioscor. descriptionem malè intellectam facta, præterea descriptiones componit pro arbitrio.

Tabern. *gallia* dicitur.

Gerard. Angl. genista 3. Hispanica, Spanisch Browne. Item postea pseudo-spartium Hispanicum Bastard Spanisch Browne. Quid venerit in mentem Gerardo nescimus, quum duas figuras & descriptiones vnius plantæ posuerit, idque diuersis capitibus.

Gerardus *gallia* dicitur.

C. Bauh. apud Matthiol. similiter duas icones exhibet, vni titulus Spartium i. siue Spartium Matthiol. Alteri genista iuncea longifolia. Quæ non dux vel diuersæ plantæ prior figura floribus falsis ornata est, appictis siliquis breuioribus quàm par sit.

C. Bauh. *gallia* dicitur.

Erasmus, genista, genista iuncea, Germ. pflim. Nominia men / Genist / oder Ginst. gall. Gener ou Genestre d'Espagne, Ital. Ginepro, hisp. Bimesta, meste & scobar, quod illa scoparum, quibus nostrates ades purgant & euerunt, hinc videntur.

Locus & tempus *gallia* dicitur.

Genistas in ætate adeò & sequentissimas pro-



testatur Matthioli, ut Maio & Iunio mensibus magnum & iucundum spectaculum præbeant viatoribus, quoniam tam copiose suis speciosis ac fulgentibus floribus ornentur, & vestiantur colles, ut procul aurei videantur. Hispaniis & Narbonensibus, præsertim maritimis, vel non procul à littoribus, ut in Grammontia sylva Monspelii & vicinis collibus, passim obuia fuit Lobelia, etiam Taurino finitimis, & in Prouincia vltima meminit Virgil. Georg.

*Spontè sua veniunt, senent campisque Genista*  
*Lenta.*

stipite eadem maiore lignosiore adolescit in Angliæ, Belgii, & Galliæ hortis. Genista iuncea sæpe mihi provenit ex semine, floruique, verum crebro gelu absumpta, si non in totum, partes saltem superiores. Lugduni crebra in hortis flores Maio, ubi *Genet d'Espagne* vocant. Genevæ magnos frutices, qui anno 1568. ad radices ferè congelati: sequenti anno tota hyeme virides permanserunt cum foliis. Basileæ arboream vidi. Patauii in hortis & in montibus Euganiis inter montem Gemulam & Arqua, aliisque in locis: Veronæ in horto Nobilis Alexandri Galeard, Ferrariæ à la montagne, colle quem arte extruendum curavit Dux, & in horto S. Dominici à l'Angeli. Adnotavi florere mense Aprili, spontèque provenire Monspelii in monte circa *Castelnouf*: Item mense Iunio inter Monspelium & Lunel.

Spartii semen, referente Dioscoride, & flores bibuntur cum aqua multa, obolorum quinque pondere, & purgant sursum cum intentione, velut Veratrum citra periculum. Semen mouet etiam infernam purgationem: Sed & ipsis ramis in aqua maceratis, deinde contusis, & expressis, succus Cyathi vnus mensura potus ieiunis, auxilium affert, in coxendicam affectione & anginis. Nonnulli autem ipsos macerant muria vel aqua marina, quam Clystere infundunt Ischiadicis. Educti enim crudum quendam humorem & veluti intestinorum ramenta. Spartii, ait Galenus, quo & vites alligant, tum fructus, tum virgarum succus non inirenuè trahentis est facultatis. Semen Spartii, ut monet Plinius, quod Græci eodem nomine appellant, in folliculis, Phascolorum modo nascens, purgat Ellebori vice, drachma & dimidia pota, in aquæ multa Cyathis quatuor, ieiunis. Rami similiter cum fronde in aceto macerati pluribus diebus, & tusi, succum dant Ischiadicis vtilem cyathi vnus potu.

Quidam marina aqua macerare malunt & infundere Clystere. Perùguntur eodem succo Ischiadici addito oleo. Quidam ad stranguriam vtuntur semine. Genista tusa cum axungia, genua dolentia sanat. Alueorum, cum mel eximitur, illini oposter exitus Melisophyllo aut Genista tuitis. Genistæ temperamentum adscribit Mesue: Ultra marina inquit & Orientalis genista est melior, calida, sicca ordine secundo. Semen verò calidius: floribus & ramulis humiditas inest incidens, sed excrementosa, & ob id vomitoria. Quin planta hæc omnibus suis partibus conturbat, prouocat, incidit, tenuat. Pituitam & materiâ è iuncturis violenter purgat. Vomitu & deiectione renes omnibus excrementis perpurgat, vtinas valenter mouet, calculum frangit in renibus, atque adeo in vesica, nec in his materiis figi ac in calculum durescere finit. Flores quoque huius cum melle rosato aut ouo, strumas resolvunt. Oxy-mel ex his vel feminibus, tumores Lienis resoluit. Vomitus quoque cum his frequens Ischiadi, Podagra, & renum doloribus prodest. Nocet stoma-

cho & Cordi: ob id cum melle rosato sumi vult Philagrius, ut his partibus nocere desinat, & eadem ratione cum rosâ & Mastiche. Semen verò eius cum aqua mellis rosati fumendum est: Anisum quoque & Fœniculi, vel Dauci semen eius noxas castgant: flos modicum coqui potest, semen diutius. Datur præsertim flore, à drachmis duabus ad drachmas quatuor. Videntur Dodonæo quæ Mesues de vomitoria vi scribit, non de Genista, sed de Sparto scripta, videlicet Clusii Lobis rotundis. Gaudent Genistarum floribus apes, proinde aluearis circumferuntur. Genista nobis, inquit Matth. ligandis vitibus Salicis vicem explet, maceraturque etiam Cannabis modo, fiuntque inde funes, & rudia linteamina, quæ faciendis saccis aptissima sunt. Expetitur Genistæ lignum etiam figulis, qui in Italia id valorum fœculum genus conficiunt, quod vulgò de *masdua* vocant: quippe quod [ ut ipsi affirmant ] nullo alterius arboris ligno fornax succendi possit, quo aureus ille color, conseruatur in opere. Valeat ad vrinæ difficultatem aqua distillata è floribus Genistæ. E Genista quidam vnguentum faciunt, ad otium scabiem utile. Spartii Hispanici & Narbonensis siliqua, semen, & flores, prorsum sunt Genistæ, sed maiora & efficaciora: cuiusmodi vult Diosc. & Mesue, qui à duabus ad quinque drachmas florum dandas vomituris imperat: Seminis verò, à duabus ad quatuor. Cum tamen Genistæ vulgaris flores, plenos discos multi in acetariis ex multo oleo vorent, nec quicquam nauscent, & seminis tripla aut quadrupla dosi, opus sit vomituro etiam puero. Oleum genistæ conficitur sicut Oleum Chamæmelinum, ex floribus eius, quod in splenis obstructionibus, referente Villanovano vtiliter adhibetur, si in fimo ad quindecim aut viginti dies fermentetur.

## SPARTIVM HISPANICVM, LOBIS

ROTUNDIVSCYLIS, FLORE

LVTEO.



Stipite cubi- tali plerumque pollicem crasso, cortice scabro & striato tecto, qui in plures ramos cubi- tales virentes & striatos diuiditur, & hi deinde in virgulas iunceas, virides etiam & striatas, quæ nouellæ adhuc & primum germinant, & aliquot foliis exornantur, statim atque planta florere incipit deciduis, ut tota deinde conspiciatur, è virgularum lateribus prodeant oblongi pediculi, ex quibus dependent flores aliquot exigui, Glycyrrhizæ vulgari aut trifolio pratensi, floribus penè similes, latei, inodori:

Descriptio

Rami.

Virgulae.

Folia.

Flores.

Sili.

*Semen.* succedunt Lobcartilaginei, rotundiufculi, Fabæ vulgari, quæ in iumentorum pabulum cedit perquam similes, ex flauo rubefcentes, in quibus semen vnicum maxima ex parte continetur [raro bina], durum, nigrum, exiguo teni simile, quod in Lobis, dum agitantur aut quatuntur, crepitat, & sonitum edit, radix dura, lignosa.

*Radix.* Clusius suum hoc spartium secundum, cum tertio, quod utrumque Hispani vernaculo sermone *Retama* vocant ad primum, Dioscor. scilicet *εραγισ*, referendum, omnino existimat, an verò iisdem facultatibus prædum sit, non intellexit.

*Spartium.* De hoc Dodon. Lat. in fol. Spartum frutex Hispani *Retama*. Spartium frutex maius. Cur autem Dodonæus hunc fruticem potius Spartium Dioscor. existimet nescio: male titulus figuræ appositus maioris Spartij, cum sit minoris Clusio: Parum sibi in Spartij historia constare videtur, perhibente hoc Hist. Lugdunensi, quæ Spartium Hispanicum alterum Clusij vocat.

*Dodon. notatur.* Lobel. Obseru. & Icon. Plant. Spartium Hispanicum alterum flore luteo Clusij. *Spartium monospermum*, Hist. Mutoni. Camer. apud Matthiolum. Germ. & Epit. *pfeimmen*, Spartium 1. Nefas est ponere figuram Clusij nomine Spartij apud Matthiolum, cui non erat illud Clusianum notum: aut saltem inuentorem nominare decebat, nec ita turpiter Clusij laborem & studium alienare, alterique appropriare.

Tabern. icon. & Hist. Spartium Hispanicum 4. Clusij. 1.

Gerard. Angl. *Pseudo spartium hispanicum æqualis*.

C. Bauhin. apud Matthiolum. Spartium hispanicum.

*Locus & tempus.* Variis Castellæ locis crescit Autori, arenoso solo, florétque Maio, Semen maturum est Iulio. Semine reperto in Viis Damascenis, in Belgio enatum habuit Muttonus.

#### SPARTIVM HISPANICVM FLORE CANDIDO.

Descriptio

Virgula.

Flos.

Labi.

Semen.

Camer notatur.




*Genista* Longè prædicto maius & hominis altitudinem superans inuenitur, virgulis tenuioribus & lentioribus magisque obsequiis, flore eiusdem cum superiore formæ, sed paulò maiore & omnino albo: Lobis etiam conveniunt: minores tamen sunt & minus semen continent. Camer. apud Matthiolum. Hist. Germ. & Epitome *pfeimmen*/Spartium 2. Non placet poni figuram sine descriptione sub titulo à Matthiolo ei plantæ, vt incognitæ non attributo. Lobel. Obseru. & Icon. Plant. *Spartium* 2. floribus albis Clusij. *Genista damascena* odorata flore albo. Tabern.

icon. & Hist. *Spartium* 5. *Hispanicum*, Clusij 2. Gerard. Angl. *Pseudo spartium* 3. album Apyllo n. The werbe Basse/ Spanisch Bromie. Dodon. Lat. in fol. *Spartium* frutex minus, cuius inscriptio non conuenit iconi: Clusius dicit maius esse, cur Dodonæus non ponat descriptionem miror, sed foliam iconem ex Clusio. Hist. Lugd. Spartium aliud hispanicum Clusij.

Spartium alterum Gadibus duntaxat, & locis vicinis, aurâ marinâ perfatus, Autori conspectum est arenolo & sterili solo, & Februario florens, cuius Lobos, quos in planta non obseruauit, ex Hispaniis in Belgium deinde ad ipsum amicus misit.

Locus & Tempus

#### GENISTA ARGENTEA.



Descriptio. Vireulo hæc Sadolescit lignoso, multiplici, in multas alas tranfluens diuiso, tereti argenteo. Ad ramulorum exitum folia he- rent singularia, oblonga, angusta, argentea hirsutie obfita.

Folia.

Fructus.

Fructus succulorum internodiis atque extremis haret similis Carpopallami officinarum vulgaris, calyculo foliaceo contentu; spadice coloris, corticosus, in summo apiculâ acutâ donatus: in quo semen continetur nigrum subrotundum, rugosum, ac ferè euanidum, in sicca quam describo, ac proinde nullo sapore effatu digno prædum. Surculi & folia modicè amaricant.

Semen.

Dodon. Lat. in fol. Hirsuta quædam Genista est, candidioribus & mollioribus foliis, qualis in Hispaniæ nonnullis regnis & præsertim iuxta Calpem nascitur: meminisse huius Titum Calphurnium Bucolicon Ecloga secunda scribit, his verbis:

Genista hirsuta.

Cernis vt, ecce pater, quas tradidit Ornithæ vicia

Molle sub hirsuta latus explicuere genista:

Considerandum tamen, an supra dicta conuenire possint nostræ argenteæ genistæ.

Gener Cherlerus attulit collectam in horto Patuino Iunio, nomine Cytisi argentei, postea cum fructu accepi à Domino Agerio, qui collegerat in horto Pisano, sed sine nomine.

Locus & Tempus.

#### CAXVMBIA INDIS FLOERS AD TINCTVRAM.

Floers reperitur in Bantam, vbi Caxumba vocatur. Viuntur in cibis & ad tingendas vestes ex Bombyce. Confectur etiam copiosè ex Infulis Nacasser, Bati & Cambaua, quæ omnes optimos & celeberrimos habent portus. Venditur id Bantam cum Cate, Linschottanus.

Descriptio

GENISTA



GENISTA RADIATA SIVE  
STELLARIS.

### Descriptio

*Caulis.*

*Folia.*

*Mores.*

Cassali-  
gne. i  
Cassia Al-  
pina.  
Scopa Plinij



**G**Enista, quā  
radiatam si-  
cut stellarem vo-  
camus, pulch-  
rissima planta, rā-  
mosa: Caulis vi-  
nus in tres diui-  
ditur ramos, hi  
rursus in alios bi-  
s, aut ter, aut  
quater, semper  
ternos internodia  
duas vnicuique  
longa: folia ad  
vnumquodque  
geniculum sex  
verticillatim  
cauli circumpo-  
sita, vt in Gallico  
vel Apatine, la-  
tiora quam Gal-  
lica & molliora.

lacina, hirsuta, vti tota plantarum viminum valde  
tenuorum angulorumque extremis flores  
densi genistrum, eo ordine quo in *Vulneraria*  
rustica, lutei, si rectè memini.

Hist. Lugd. dicitur, genista Iuensis. C. Bauh.  
frater his nominibus appositus ex Horto Patau-  
no attulit: *Caslia lignea* Officinarum, & Plinii Guil-  
landino: *Genista Alpina* Recentiorum: *Scopa* Plin-  
ii.


GENISTA ACULEATA FOLIOSA.

### Description

Rami.

Folia.

Spine.



**H**orridus frutex est genistella aculeata, genistâ trifoliâ angulosâ minor, densis tamen ramis fruticans, in quibus folia hirsuta alterno positu nascuntur, genistâ vulgaris formâ, acuminatâ: sed præter folia longis creberrimisq; spinis minacibus armatur, maioreque spinâ minorum sobolem infesto mucrone pungentium & lateribus paritunt: flo- vulgaris, semen blutea.

An Celasp. suffrutex Coroneolae similis, altior: ramulis obsequiosis, lanuginosisque, qui anno secundo aculeis rectis armanitur, quibus alii à latere insunt aculei: vt in ea, quam Spinam Christi vocant: folia fert Polygoni: flores geniste, minuti: filiquias breues & latas Lenis modo, in quibus pauca semina continentur. Tota planta sapore austero & glutinoso prædita est cum modica amaritudine: nascitur in inculis, & hume-

Tom. I.

Etis. Videtur hæc apud Dioscoridam esse alterum  
Acacia genus, quod in Cappadocia & Ponto nasci-  
tur.

Fuchsius affecit genistellam, Germ. appellari  
posse, de Storchend Gall/ Erd pssimmen / oder  
Hein Storchblumen, Gall. Peris genet : Elle qui non  
sine magno errore pro genista vntatur. Item qui  
Rosmarinum aculeatum nomennt. Clus. Pan-  
non. & Hist. post. geniste species à nonnullis ge-  
nistella speciosa nominata, Vngaris Tolcz, hoc est,  
aculeata, Storchend pssimmen. Gesner. de hor-  
tis genista vel genistella aculeata, Dodon. Gall. &  
Latin. fol. genistella vel genestella, Belg. Storch-  
end Brom/ Gall. gener piquant. Mihi autem cum  
in Italia essem, quidam vocabant Terrachin & A-  
caciun alteram Diole. Alii Rosemarinum acule-  
atum Diole. Lob. & Pen. Adu. genistella acu-  
leata, è radice exigua, virgis graciles, rectas, com-  
plices, spinulis infestis submutens, foliolo Thy-  
mi vel Erice: flore luteo pallente, geniste mino-  
re: etiamque breviorè, rotundiorèque siliqua, &  
semine Erui subrucco. Obseru. & Icon. Plant. ge-  
nistella aculeata fortè Vlex Plinii.

Figura Tragi minus placet, nec etiam arridet in  
omnibus Lobeltiana siue Dodonæi : Descriptio  
Lobelii competit penè nostræ genistæ spinosæ,  
Aspalathoidi.

Hist. Lugd. genistella. Tabern. genistella aculeata, Flein Streckend pfrimmen. Gerard. Angl. genistella aculeata. Nodds ferrug. or rose. rhinoc.

*Geniella aculeata*, & *leedle purpurea* & *peric rhynium*.  
*Geniella aculeata* provenit in comitatu Montebelg. Observari Geniæ cum eilem, circa montem Saleæ: florentem Junio, Lugduni cum foliis tenetis Octobri, Basileæ multis in locis. Frater C. Baubinus in itine Basileæ versus Augstam Rauracorum. Eam etiam vidit iuxta Mafmunster, Tubingæ in Ducatu VVirtembergico, & in Italia montibus Euganeis. Non vidit hoc genus *geniella* reperiri, teltis est Tragus, sed in arenosis ac laxioris duntaxat locis provenit, vt & in sylva quæ vocant den dyar ad Mosellam & in Vvafio quæ. Fuchf. Nactitur arenosis locis fecus vias. Pluribus per Brabantiam locis incurrat, non nihil humidentibus, sed incultis quoque ac neglectis. Per Pannoniam vulgatissima: Frequens circa Francofurtum & multis aliis Germaniæ atque Belgiciæ locis.

Sunt qui non sine magno errore pro gehista Vites:  
vitant, quum facultatibus diuersis predata sit:  
Maio mens flores luteos producit, quibus patet  
apes improbum mel conficiunt. Adtingentem  
cum amantidine facultatem possidet: ac profe-  
de valenter, simulque citra mordacitatem exi-  
trantem. Semen eius persequitur aduersari tra-  
dunt. Decoctum solorum, profluuium men-  
struorum sistit. Idem etiam potum Ventris fluo-  
ri succurrit. Et, vi reni in partem contraham, idem  
genistella, quod Hippuris potest.

SCORPIVS SPINOSVS VETE-  
RIBVS.

Infer spinosa auctore Theophrasto : Scorpis  
[spinosa, Gaba Nepa] simpliciter eff. spina. Non  
enim vllum habet folium, præter spinam : radi-  
cem verò simplicem & breuem [scorpiæ, Gaba  
Nepa] profundamque [scorpiæ, Gaba Nepa]  
male. Quomodo enim potest esse radice breui,  
eademque profunda] Quare melius Scalig. legit  
[scorpiæ, Gaba Nepa] radice. Idem lib. 9. c. 14. Scribit de  
radice Scorpis, vi Gaba quodque verit Nepa: ve-

rūm ea alterius plantæ est, nempe Telipho-  
ni, quod alii Scorpionem appellant, de qua scribit c.  
19. eiusdem libri. Nos autem hist. n. g. lib. 34. de  
Aconito. De Plinii Tragico [Tragon legendum  
volunt Sarrac. & Gesner.] quem Asia fert siue  
Scorpione vepre, vide cap. de Trago Veterum:  
vbi ostendimus nos dissentire à Sarraceno existi-  
mante Tragon hunc Plinii eundem esse cum  
Scorpione spinoso Theophrasti, quamvis conce-  
damus Plinium fortè non bene distinguere Scor-  
pionem Theophrasti à Trago. Meminit tamen Pli-  
nius lib. 22. cap. 15. Scorpium ex Theophrasto, dum  
ait: Spinofarum multa species. In totum spina  
est Asparagus & Scorpium, nullum habet folium.  
Item lib. 22. cap. 15. Ex argumento nomen accepit  
Scorpius [Scorpioides Dal. de Scorpioides vi-  
de hist. n. g. l. de imo septimo.] Est & alia eiusdem  
nominis effructusque, sine foliis, Asparagi caule,  
in acumine aculeum habens & inde nomen. Et  
hanc Dal. ait esse Tragon Dioscoridis, quam &  
Tragandon vocari, & Scorpium tradit. Ego ta-  
men existimo de Scorpione Theophrasti potius  
loquuntur esse Dioscoridem. Est alia herba Tra-  
gos eodem Plinio lib. 22. cap. 13. quam alii Scorpionem  
vocant, de qua vide cap. de Trago Veterum. In-  
eptè putavit Hermolaus Asparagum & Scorpionem  
vnicam esse plantam quod apparet ex Theo-  
phra. & Plinio.

Asparagus

### GENISTELLA MONTIS VENTOSI SPINOSA.

Descrip.

Genista lu-  
tea.

Rami.

Folia.

Flores.




ri genistella spinosa angustioribus: flores in sum-  
mitatibus aliquot aurei, maiores quam in prædi-  
cta genista. Si hæc non est particularis genista,  
certè egregia est varietas, quæ nobis ob id visa est  
mereri propriam iconem,

### GENISTELLÆ SPINOSÆ AFFI- NIS NEPÆ QVIBVS DAM.

Descrip.  
Spina pro  
folio.

Rami.

Nepa fenticosus frutex pro folio spinam ge-  
nit mocrone pungentem, cr-berriamam,  
longitudine inæquali, Iuniperinis foliis angustio-  
rem, & noua spinarum minorum sobole fecun-  
dam, vindantem, striatam, sæpe glabram, alias  
pilo breui oblatam, quo & obducti sunt rami. Fel-



quicubiales  
striati, & non-  
nunquam hirsu-  
ti, talis fuit Ne-  
pa Valerandi, à  
qua non dissimi-  
lis, pro Bononiæ.  
Nepa Bg-  
nariensis.  
si Nepa delata,  
quæ sanè mul-  
tum habent si-  
militudinis cum  
genistella acu-  
leata foliosa vul-  
gari quo tempore  
folis destitu-  
tur.

Nepa quoque  
mihi visa Bono-  
niæ Anno 1563.  
concolor, & pla-  
nè similis, nisi  
quod Spinæ erāt

longiores, minus rotundæ, & sumæ, quam in  
Atpalatho Montpelienfi, sed angulosæ, quæ in a-  
liis subdividuntur, in summitate ramulorum mæ-  
se Aprilis apparebant florum pediculi, & veluti ca-  
lyces hirsuti. Videtur hic frutex variare pro Anni

tempore, & pro aritate. Is enim nobis prouenit  
in horto, nomine Nepæ satius, sed primo anno ac-  
secundo omnino responderebat figuræ Lobelij, cuius  
ramulum in nostra tabella curauimus pingend-  
um ex Valerandi Dourez planta sicca: tertio an-  
no accedebat ad iconem Dodonæi genistæ spinosæ  
nomine exhibitam, nulla folia nobis apparue-  
runt. Icon autem nostra ficta est ex ramis tri-  
bus nobis ex Angliā missis, in quorum vno sunt  
in summitate veluti folia latiuscula, hirsuta, in a-  
culeum desinentia, in altero flores lutei, maiores  
quàm in genistâ spinosâ vulgari, ex breui pedicu-  
lo multi simul inter spinas, non ex longiusculis ra-  
mis foliosis & sine spinis, vt in genistâ aculeata  
foliosa vulgari: in tertio ramo inter spinas erant  
siliquæ latiusculæ, compressæ, breues, nigre, hirsu-  
tæ, calycibus foliosis æquæ ferè longis obtectæ,  
in quibus femina bina deprehendimus.

Est & apud nos (Gallos inquit Ruell.) fruticis  
genus in montibus & asperis nascens, quo & fe-  
pes tam viuas quàm fructiles etiam rusticis sti-  
pant. Is vice foliorum spinarum armatur vallo,  
flore luteo, siliqua breui, in qua pauca semina la-  
ta clauduntur, rura nostra luncum marinum vel  
potius Iomarinum appellant, cui aliquantum ad-  
stipulari Paliuri delineatio videtur, an tamen Pa-  
liurus sit non ausim asserere, quòd ei spina pro fo-  
lio sit. Quam autem officinæ genistellam vocant,  
Græci quantum aliqui suspiciantur Ericen, humilior  
tantum & exilior: colore Marini roris & penè fo-  
lio, flore luteo, semine rufo, quod serpentibus  
aduersari tradunt. Sunt qui hanc esse putant quâ  
Galli Rosmarinum vel Iomarinum appellant, Li-  
banotidis folio, sed rigido ac pungente &c. Hæc  
ille qui an vnam vel duas plantas intelligat confi-  
detes ipse. Nostræ genistellæ affini Nepæ, Spi-  
na pro folio est.

Dodon. Gall. qui genistam spinosam & genistam  
sylvæ Belg. Gaspeldorn vocat, negatque esse Tra-  
gacantham, id est, Hirci spinam aut Paliurum, vt  
quidam putant, tribuit ei siliquas similes Geni-  
stæ, non tamen tales pingit in Hist. Lat. in folio.  
Is præterea in folio suam descriptionem compo-  
nit ex sua priore Gallica & ex Clusij Scorpione i.  
Hispanico. Miror item apud Dodonæum Scor-

Locus.

Vfus.

Semina.

Iuncus ma-  
rinus.

Iomarinus.

Paliurus.

Erica.

Rosma-  
rinus.Genista  
spinosa.Tragacanthæ  
ruba.Paliurus  
non est.Dodonæus  
necatur.



pii secundum Clusii Iconem poni, pro genistæ spinosæ altera Icone, licet Clusius non parum differentes tradat Scorpionem primum & secundum.

Scorpius.  
Nepa.

Descriptio  
Clusii.  
Verga.

Spina.

Flores.

Saliqua.

Semen.  
Rudus.

Nepa Lobelii.  
Scorpius.

Corruca  
facie.

Genista spinosa.

Scorpius.  
Vicia Plinii.

Aspalathus

Ad Scorpium, inquit Clusius, quem Gaza Nepam vertit accedere videtur Scorpius noster. folio nullo, nisi primo Vere apparente, quod breui decidit, Galli tunc *marin* appellant, Aquitani *lange*, Belgæ *Gaspeldorn*: cubitali verò, aut ampliore altitudine assurgit, multis virgis ex atro intertibus, striatis, densissimo spinarum vallo obstitis, fruticosis, quæ deinde spinæ aliis minoribus sunt circumsepte: folia nulla, nisi primo Vere, apparent, breui decidit: Flores genistæ minores, pallidi, interdum verò ad eò rufescentes, vt rubere videntur, præsertim sub Autumno: filiquæ deinde succedunt breues, cyindraceæ, magnæ ex parte inanæ, aliquando tamen ferentes exiguum semen pallidum, aut subfuscum, vt genistæ vulgaris Septentrionalium: radix singularis in alias tenues se spargens, & interdum latè se propagans. Quod verò Clusius foliola, & filiquas Cylindraceas tribuit huic Scorpio, nobis dubium mouet, & quod Germani faciat familiarem, & quod non deat simile genistellæ spinosæ, cuius meminit inter Pannonicas. Diligentes stirpium inuestigatores accertant Scorpium ex Hispania, & conferant cum genistâ spinosa Belgica, ac perpendant an eadem vel diuersæ sit species: Clusius præterea pro Scorpio primo in post. hist. ponit genistam spinosam Dodonæi.

Lob. & Pena Aduerf Nepa [Scorpius] apud Theophrastum diuersa est à Scorpione, quam inter Cali collocatam oportuit. Nepa cui nomen fœdè conuincit cum Scorpione planta, paucis adhuc nota, nulli dum Recentiorum descripta. Lignæ sunt radices, multiplices, implexæ, tenues: à quibus in octo spinulæ, rigidulæ, densæ, Corruca similium, aliquantò maiores, vniuersa virgula summo tenus vestiunt, sicque tota planta densis horret aculeis pro foliis: & faciem Corruca præfert gustu amariante. Icon. pl. Nepa apud Theophrastum. Ceterum qui adhibent loca infertis notanda, vbi proveniat Nepa, obseruabunt hanc Nepam Lobelii esse eandem cum genistâ spinosa Dodonæi.

Considerandum etiam quantum differat à genistellâ spinosâ Fuchiana quam nos foliosam vocamus: ea enim mure lude.

Hist. Lugd. Scorpius alter siue genistâ spinosa à Dodonæo pro genistâ spinosa 2. descripta. Vlicem Plinii quidam esse volunt, Belgæ *Gaspeldorn* vocant, Armoici apud quos syluæ huius plantæ sunt tan proceræ, vt propemodum arborum rescat vocant *des Lans*.

De spinosa hac planta, quæ sequuntur Pena tradit. Prorsum cognata genistæ hæc, sed multum aspectu horrida, senibus præduris, innumeris, cancellatum armata, semper virentibus, striatis, lignosis virgultis, spatio similibus, spinis penè folia occultentibus. Quare doctioribus nonnullis placuit, Gaze Nepam esse, aut Scorpium Theophrasti. Clusius etiam Aspalathum alteram, tum Salamanticæ, tum Monspelii sic dictam, pinxit: eadem est cum genistâ spinosa, aut ei admodum per similes.

Rhapodus Hist. Lugdunensis stirpem parum peritum, nullo iudicio huius plantæ historiam confusè tradidit, subiungens Lobelii verba, nec animaduertens Scorpionem descriptum primo loco, misceri & comprehendî à Lobelio & Pena sub vno titulo, cum genistâ spinosa Dodonæi, nec et-

Tom. I.

iam obseruauit Clusii Aspalathum, non esse genistam spinosam.

Camerar. hort. Nepa (sic enim Scorpionum vertit apud Theophrastum Theodorus) in hœtilibus asseruanda: In Gallia & Hispania frequens. Cæsalp. *spina Christi* vulgò appellata, frutex in totum spinosus, nullis foliis, quem Theophr. Scorpionum vocare videtur, & Theodorus Nepam vertit, sed flore candido accedente ad purpuram, quæ conditiones in hoc frutice non insunt.

Tabern. Icon. & Hist. Nepa Theophrasti: Lobelius Nepam describit, an verò eius Nepæ descriptio conueniat cum proposita Icone iudicent alii. Item Icon. & Hist. Scorpionum secundum Scorpionfructu. Tabernamontanus cuius prior Icon est cum floribus, nullam proponit descriptionem præter Lobelii qui florum non meminit, nec in sua habet figura: per secundam Iconem existimo illum intell. gere genistam spinosam Dodonæi, quumuis Compilat. Tabern. descriptio ieiuna sit & figura imperfecta.

Gerard. Angl. genistâ spinosa flore albo, teste flourent furces. Gerardus exhibet Icones Tabern. qui Scorpionum suum dixit flore luteo non albo.

Genistellæ affinem Nepam siccam à multis annis habemus, quam inter Valerianis plantis inuenimus. Nepæ etiam nomine vidimus Bononiæ in horto mense Aprilis fruticem præcedenti similem. Frater C. Bauhinus attulit nobis ex Italia ramum priori similem, cum hac inscriptione, Nepa Bononiæ, Cortusio genistellæ aculeata Fuchii. Ex femine Nepæ nomine ex Italia missa, provenit nobis frutex, qui Montebelardi in horto Illust. Exc. Cels. y Vitt. per triennium hyemem pertulit, tandem frigore consumptus. Jac. Gargillius Scotus misit nobis Londino Angliæ pulchros ramos cum flore & filiquis nomine Aspalathi Narbonensis. Lob. Nepam nullibi præterquam in Prouincia vidit, locis montosis vberè fruticantem, præsertim propè montium radices, qui *Magdalena Fano* & Specui sancto nuncupato finitimi sunt, viâ quâ *Aguas Sextius* itur. Locis saxosis & acidis, & *Sterellæ* montis decliubus, ac propter Argenteam amnem, *Argens* vulgò Galloprovinciæ dictum, multa. Genistam spinosam reperit Dodonæus in quibusdam Brabantia locis, vbi planities. Scorpius. i. Clusii, floret Maio, Junio & quandoque tota æstate: circa verò Autumnum, denud floribus onusta hac planta conspicitur, eoque tempore, saturatiore & magis tutuli sunt vltimum flores. Variis Belgicæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, Angliæ locis conspexit, nullam tamen frequentius, quam incultis illis locis supra *Burdegalam*, *Bayonen* sitinere, & apud *Cantabros* *Pyrenæorum* iugum accolat, vbi tantâ magnitudine assurgit, vt duorum hominum altitudinem æquare nonnunquam viderit, crassitudine verò brachium humanum.

## GENISTELLA MINOR ASPALATHOIDES.

EX Angliâ Aspalathi nomine misit nobis Locus. Dominus Iacobus Gargillius Scotus, fruticis Aspalathi partii vix cubitalis, cortice quasi cinereo, virgas aliquot, spinis breuioribus, alternatim dispositis, horrentes: foliis iuxta spinas ferè rotundis, Lenti palustri penè æqualibus: floribus

Nepa.  
Scorpius.

Spina  
Christi.

Genista  
spinosa.

Gerard  
mont.  
natur.

Locus &  
tempus.

Aspalathus  
Nepa.

Locus.  
Aspalathus  
Descriptio  
Spina.  
foliola.  
Flores.



aureis, minori-  
bus, quam Tin-  
ctorum floris, ma-  
gis patentibus  
quam genista  
spinose vulga-  
ris, inter spinas  
per totos ferè  
ramos copiosis.  
Si hæc planta  
non diuersa  
est à Scorpio  
aut ab Aspal-  
tho Monipe-  
liensi insignis  
videtur variatio.

quis censeat. Totâ plâta cubitû nō excedit, frutice-  
sa admodû, & ramosa multis horrens spinis deorsû  
in flexis, flemis, acutis, in quib. enascitur pusilla fo-  
lia Lentis magnitudine, viridia, qualia etiâ (sed te-  
neriora) fert in nouellis ramulis, quibus sub sunt  
recens nati aculei: flores in firmioribus & rigidio-  
ribus spinis, terni, quaterni aut plures simul na-  
scentur, genistæ similes, minores, coloris nunc  
lutei, nunc pallidissimi; semen in parvis siliquis  
exiguum. Aliud eius genus robustius est & ali-  
quantulo firmitus, nonnunquam altius non excre-  
scens, cuius flos perpetuè pallidior est, alioqui nō  
multum priori dissimile. Primum genus & Her-  
baræ sei studiofis Salmantica & Montpelii Aspa-  
lathus alter vocabatur, vulgo Salmaticensium &  
aliorum apud quos nascitur, Hispanorum Eulalia,  
secundum Castellanos Aulaga. Icon apud Clu-  
sium in Hulp. posita, erat pro Aspalatho altero, i.  
in post. autem Hist. [forte errore Typographi]  
pro Aspalatho altero in.

Color Ge-  
niss.  
Flos.

Aspalathus  
alter.  
Mont.  
Eulalia.  
Aulaga.

### ASPALATHVS SECVNDA MON- PELIIENSIS.

Descript.

Spina

Folia.

Florci.

Odor.



**A** Spalathus  
secunda  
Möspeli dicta,  
frutex est bicu-  
bitalis aut circi-  
ter, totus spinis  
horrens, longis,  
virentibus, qui  
color est etiam  
toti plantæ, ex  
quibus prodeunt  
folia parua sub-  
rotunda, non-  
nihil pilosa: ex  
uisdem flores lu-  
tei, pulchri, Cy-  
ræi florum for-  
mâ, odore Me-  
lioti Officinarum,  
sapore nullo  
manifesto, si-  
cuti & folia, quæ

Autumno cum floribus prodeunt, lucrescenti-  
bus siliquis, parvis longis. Interdum etiam flo-  
rens foliis spoliata obseruatur.

Siliqua.

An Acacia  
Angull. 2.

Folia.

Florci.

Rami.

Siliqua.

Semina.

Acacia 2.  
Dioscoridis

Aspalathus

Scorpius.

Angullaræ hæc fortè est Acacia secunda, de  
qua scribit. Repert in Corsica circa Liazum  
fruticem simillimum Scorpio Theophrasti, colore  
similem genistæ, cum ramis atque spinis tenuibus,  
foliis paruis Rutæ foliis similibus, spicatum sibi in-  
uicem appositum per ramulorum ascensum. Flores  
fort luteos, quales Cornicula quæ Lychnachia do-  
ctissimi Leoniceri. Ramis etiam tubercula ligno-  
sa adnascuntur, à quibus emergunt animalcula  
coloris crocei. Siliquas fert læues sicut genistæ,  
tres ac interdum quatuor, continentes semina  
compressa Lentis exigie, sed parua. Quapropter  
tot animaduertens in hac planta notas Acacia se-  
cundæ Dioscoridis respondentes, facile mihi per-  
suaserim eandem esse. Tamen autem Clusius  
sciat, fruticem hunc [de quo nunc ago] non esse  
legitimum Aspalathum alterum: quia verò tale  
nomen à plebisque obtinuit immutandum non  
putauit, præsertim cum ad quem fruticem Vete-  
ribus descriptum referri debeat, adhuc ignoret,  
nisi fortè Scorpij generibus adscribendum esse

Gesner. hort. nobis videtur Aspalathum Mon-  
pelienæ 2. non distinguere à secunda Acacia  
Matthioli.

Gesner. mo-  
tatur.

Lob. & Pena Adu. & Icon. plant. genista Spar-  
tium spinosum maius, Belgis Gaspeldorn. Angl.  
Bride Bromme. Doctiorum Nepa aut Scorpius,  
foliis tenuis Rutæ. Montpelij Aspalathus vulgò o-  
pinata, tamen inodora & lenis instar peruinax  
frangendo. Oberu. Aspalathus secunda Montpelien-  
sium. An Scorpio Theophrasti Clusio & Anguil-  
laræ? Merito scribit Lobelius adimenda folia ter-  
na Rutæ in Aduersariis & Lentis reponenda:  
Iconem Clusii habet. Verum tamen Clusius di-  
uerfam fecit genistam spinosam, Gaspeldorn di-  
ctam, ab Aspalatho 2. Montpeliana: Nescimus  
etiam quomodo possit Aspalathus secunda Mösp.  
esse Scorpio Theophrasti Clusio, quandoquidem  
ille proprio & sequenti capite distinguit Scorpio-  
nem ab Aspalatho, nisi dicatur Clusius bis eandè  
descripsisse & quod annotare debuerat Lobelius  
si ita sensit: An aut Aspalathus Angullaræ pluri-  
mus ab annis dubitamus multa enim res ostendit:  
venit illud notandum Angullaræ Acaciam secun-  
dam videri nobis melius conuenire.

Lobelia nota-  
tur.

Acacia  
2.  
Gaza er-  
ror.

Hist. Lugd. Scorpius Theophrasti, Gaza Nepa vo-  
catus qui Scorpium siue Thelyphonum cum Scor-  
pio spinoso perperam confundit: Scorpius spinosus,  
radice est crassa, lignosa, nigra, simplici, di-  
midium pedem longa: Caulibus multis, qui plu-  
rimis aculeis rigidis, firmisque horrent: foliis in  
parua & rotella planta, minimis Tragacanthæ  
similibus, in vetusta & dura nullis: flore parua-  
lo, semine in siliquis lauiusculis incluso: Hinc as-  
sinem vel eandem Scorpium descripsit Clusius.  
De secundo Scorpione Clusij intelligit non pa-  
rum differente, quod inducat descriptione se-  
minis, quod cum non animaduertit Rhapso-  
dus, is etiam non bene Clusij Aspalathum 2. se-  
parat à prædicto, & ad genistam spinosam Dodo-  
nei refert, in quo Lobelium imitatur.

Compil.  
Hist. Lugd.  
notatur.

Tab. icon. & Hist. scorpius 1. Scorpionsfraue.  
Gerard. genista 2. spinosa minor, The final furze  
bulji.

Obseruavi Montpelii loco petrolo in monte Locus &  
Castellens. Frater C. Bauhinus annotauit Aspa-  
lathum alterum Clusij à se repertum inter Summiere  
& Montpelium florenti Maio. Vidi Bernæ in orto  
Bernardi Aretii. Aspalathi primi genus Clusij  
crecit eum in Cantabris superato Pyrenæo, cum  
variis aliis Hispaniæ locis, atque etiam in Gallia  
Narbonensi. Secundum in Castellâ veteri tan-  
tummodo obseruatur.

Floribus



Vires & Floribus quidam apud Lobelium lubentes ad iterum viridem vtuntur, & toto cremio calfaciunt furnos. Aspalathi floribus prioris cum Saccaro fermentatis, Salmanticenses ad firmandas & restaurandas collapsas vires vtuntur, Clus.

### ASPALATHVS ABROTONI FACIE INCANA.

**Descriptio** AD rubiti nonnunquam magnitudinem accedit Aspalathi 2. genus tertium Clusii, Hallada Cantabris vocatum: plerumque tamen minus & pedali tantum altitudine, totum etiam tenerius: ramuli in multo plures spinas diuisi, & istæ denuò in alias, sic vt singulæ spinæ totidem folia Abrotoni multifida videantur, nisi aculei obfisterent, qui, nisi quis accuratius consideret, vix animaduertuntur: ex ramulorum lateribus exi-  
**Ramuli** **Spina.** **Folia.** **Ramuli** **Folia.** **Flores.** **Locus.**  
gui alii Vere prodeunt ramusculi incani & hirsuti, quibus adnata sunt folia mollia & incana Lenticis, sed maiora quàm in primo genere: & in summis istis ramusculis flores seni aut octoni genistæ aut Pisi formæ, sed maiores, quàm in primo, colore luteo.  
In Cantabris solum ad radices Pyrenæorum, quæ Hispaniam spectant, tertio à Victoria miliarum.

### ASPALATHO MONSPELIANO AFFINIS SCORPIVS 2. CLUSIO.

**Descriptio** AD Scorpium quæ Gaza Nepam interpretatur, inquit Clusius, etiam secundum Scorpium genus accedere videtur, quod pedis altitudinem raro superat, totum densissimis spinis horrens, quæ non confuso ordine, vt in superiore nascuntur, sed seriem quandam seruant; & semper còtrario inter se exortu binæ nascuntur,  
**Descriptio** **Spina.** **Flores.** **Siliqua.** **Radix.** **An Echino-poda?** **Genista spinosa.** **Dodonæus.**



virentes quidem, sed languidiùs quàm superioris, neque aliæ ex aliis: summis ramulis inhaerent bini aut terni flores superiori similes, lutei coloris, mense Martio: quo tempore exiguas, breuèsq; siliquas, vel poutis femina Erui magnitudine, inclusà membranà quadam multà, incanæque lanugine hirsutà, deprehendebat densissimis ipsius plantæ spinis occultata, ut ex superiore ætate deciderant: adedò verò canescebant, vt initio araneorum telas esse existimaret: radix singularis, sed in plures deinde propagines sparsa, dura & lignosa est.

Hoc genus Granatenles Melino vocant. An Echino-poda cuius Bellus meminisse plurimum certè Clusio ad illam accedere videtur.

Dodon. Lat. in fol. *Genista spinosa* altera Icon. Genistam vocat Dodonæus præter mentem Clusio. Tom. I.

sui, cuius Icon à Dodonæo proposita.

Lobel. Obs. & Icon. Plant. *Genista*, *Spartium spinosum alterum*. Scorpius 2. Clusii. Debetur hæc Nepa Carolo Clusio, qui eam primus ab altero Spartio spinoso distinxit.

Hist. Lugd. *Scorpiæ Theophrasti* [sive Aspalatho Monspeliano] affinis, vel idem *Scorpius* à Clusio descriptus, Fallitur Compilator. Non enim parum diuersum, & non eandem ostendit manifestè seminis descriptio.

Tabern. Icon. & Hist. Scorpius 3: *Scorpiæ* *Fruct.* Ecce Compilat. Tabern. vocat fruticem Geum. *Fruct.*

Gerard. *genista* 1. spinosa maior. *Great fürze* *bush.*

Collibus Granatæ vicinis iungere Cordubens. Locus: duntaxat, nec vsquam alibi Clusio conspectum.

### GENISTA ERINACEA.



**Planè noua, Descriptio** & tota elegans est hæc planta dodrantalis, in orbem per solum d'fusa, multis spinis virentibus, siue aculeis horrida. flores genistæ, ex ceruleo purpurascentes, minores, calyculis inclusi hispidis, villosis, omnino ferè incanis, bini aut terni simul semper còiuncti: foliola interdum, dum floret, producit, sed raro, eaque  
**Spina.** **Flores.** **Foliola.** **Radix.**

perpauca, Lenticulæ similia, quæ cùm breui marcescant & decidant, tota planta maxima ex parte sine foliis spectatur, & multiplici spinarum vallo Erinaceum in se conuolutum repleant: radix lignosa & magna est pro plantæ portione.

Incolæ erizæ vocant, hoc est, *Erinaceum*, quoniam Erinaceum animal terreste, dum in orbem se contrahit, aut marinum, aculeorum & spinarum vallo planè æmulatur: quæ adedò causa fuit, vt illi Erinacæ nomen inderem, donec commodius aliquod ex veteribus Scriptoris dare possumus. An verò incolæ ad modicum aliquem fructum adhibeant, non intellexi.

Lobel. Obs. & Icon. Plant. sub falso titulo huius Iconem habet. Est autem is titulus *Spartum aphyllon*. Hic enim inscriptione in Aduersariis, genistam siue Spartum nostrum pungens exhibuerat antè. Erroris huius causa est; quia vnam eandemque plantam esse, sibi imaginari persuadet, vt mox dicemus.

Hist. Lugd. *Erinacea* Clusii. Tabern. Icon. qui nō nouit discernere inter fruticem & herbam vocat *Scorpium* 4. *Scorpiæ* *Fruct.*

Gerard. *genista* spinosa humilis dicitur *orloise fürze*.

Nascitur regno Valentino, affluenter verò circa *Siete aguas* oppidulum, septimo ab vrbe Valentia miliarum, Madritano itinere, asperis locis & Locus.

fecus vias. Aprilis florentem obseruabam & eruebam iter isthac faciens, anno 1565. semen obseruare non potui, mense sequente in Belgium reuersus.

## ECHINOPODA CRETENSIBVS.

**E**chinopoda, inquit Honorius Bellus, vulgarissima in Creta planta est, & multum cum Erinacea à Clusio descripta conuenit, nisi quod hæc foliis caret, & flores luteos profert, totaque viridi colore ærnitur in orbem diffusa, & Erinaceam mitum in modum multitudine spinarum repræsentans. Genus fruticis censenda hæc planta. Meminit huius Plutarch. Symposiac. lib. 1. quæst. 4. Et lib. de auditione, hoc Disticho:

*Inter Echinopodas, vetus asperam & inter Anmin  
Interdum crescunt mollia Leucosia.*

*Dalech. er-  
ror.*

*Locus.*

*Chenopod.*

*Viros. ①*

Athenæus quoque huius stirpis mentionem fecit lib. Dipnos. tertio: Perinde ac si semper inter Echinopodas & asperam Ononin versetis. Sed fallitur in margine Dalecham. Athenæi interpres, quod per Echinopodiam Cardui Chii genus intelligat: nam Echinopoda, tam Cretæ, quam in Insula Chio, totaque Græcia vulgarissima est, non Cardui genus, sed fruticis censenda: & hanc sub Chenopodis nomine intellexisse Plinium existimo lib. 11. c. 8. quod etiam ante me animaduerterrat Turnebus, vir summa laude dignus, Aduers. lib. 23. cap. 12. nam licet hæc planta copiosissimos flores proferat, & vbi que oriatur, eius tamen flores apes non attingunt, vt quotidie obseruari potest.

Excellentiss. p.m. Melchior Guilandinus Echinopodam non nouit, nam epistola ad Langium eam inter ignotas stirpes enumerat.

Ballonius verò lib. 1. Obser. c. 18. ipsam nouisse videtur, sed non descripsit, neque ita congener est Aspalatho, vt ipse putat. Nam Aspalathus frutex satis magnus videtur, folia terna simul iuncta ferens, licet a state ipsa amittat, vt Autumno aliis induatur, nec spinis aded crebris scatet vt ista.

## GENISTA SIVE SPARTVM


PVRGANS.

*Descriptio  
virescens  
vires.*

*Virga.*

*Acules.*

*Vux mari-  
na similis.*



**D**Vos obseruamus ramos, prior sesquicubitalis est, firmus, rigidus, ac penitus lignosus, cortice crasso, amari- cante, ligno inter- nurne albicante, in numerosam virgarum pro- lem temere ac nullo ordine diuicatus, in virgarum extremis aculei quidam appa- rent, totus por- ro ramus virgul- torum denso stipatu, Vux

## PLANTARVM.

deant furculi. Ramorum extremorum potissi- mum geniculis foliola hærent parua, angusta, ci- neritia quadam lanugine vestita. Hædem quo- que flores ex longiuculis pedicellis hærent lutei genistæ vulgaris, apparentibus adhuc apicibus in lucca. Posterior hic colore & ramorum diuisura similis, verum quam illa senticosior & strigiosior: quippe numerosioribus ramulis, veluti in spinas de- finentibus, quæ facillè rumpuntur innumeris no- dulis torosus, vix pedalis, incuruo ligno. Hic floribus & foliis orbatas in extremis quibusdam capitula incurua, & nutantia gerit, hirsuta, quod in hac planta superfluum & quasi monstruosum existimo.

*Ramulal-  
ter.*

Lobel. & Pena in Adu. genistam hanc pungentem ita describunt. Spartum aphyllon frutic- osum, iunceis aculeis, lanatis capitulis: Fruticellus, latiusculè in latera, aliquot sparteos, striatos, ex pullo buxeo, è radice Tragacanthæ prolixiore, lignosus & sesquipedales furculos spargit: nullis foliis, sed multis senticosis, rigidis stylis pungentibus, iunceis, aduncis in summo tantum: quibus singulis aduoluuntur fastigiola, tomentaceæ gemmulæ vitis, minores, sed concolores, partim longiusculæ & incuruæ, partim breuiusculæ: nullum folium, siccisque videtur: gustus perparum amaricantis, exsicantis, adstringentis.

Lobel. in Obs. Icon. Plant. & Hist. Lugd. eundem titulum, quem Adu. habent. Verum Lob. relicta gemina figura, Erinaceam Clusij assumit, quam cum Sparto aphylo fruticoso iunceis aculeis, lanatis capitulis eandem esse tradit, quod ramulorum spinosorum positus, folia, flores atque alia, quæ breuitatis causa prætereo, conferenti cum figuris ipsas descriptiones, aperte oronem esse demonstrant.

Tabern. icon. & histor. spartum aculeatum aphyllon.

Vnde præcedentes ramos nactus sum asserere non ausim: compenio me annotasse cum essem Lugduni, priorè esse ex monte Pilati alterum verò per rhizotomum Lugdunum delatum. Lobe- lio inuentu minus frequens fuit, in asperioribus, præruptisque declinibus Alpium Magdalene in Gallo Prouincia.

## ASPALATHO AFFINIS TRAGVS

FORTE RHAMNI SPECIES EX CAN- dia Valerandi Dourez.

**F**rustulam est fruticis alicuius palmare, furculis inconditis frequentibus, rigidis, in spinam ac- cutam definitibus, diuisem, Vux mariæ dictæ non ab simile & par colore ferè fuluescente, raris Zonulis nigricantibus obiter cinctum, striatum, sapore nullo.

*Descriptio  
Succuli.  
Vux mari-  
na similis.*

## ASPALATHO SECVNDÆ MONSP.

SIMILIS SCORPIO SEV NEPA ANGVILL.  
flore ex albo palléscente, vel ad pur- puram accedente.

**S**corpion vel Nepa Anguill. in Græcia copio- sissimè reperitur: provenit etiam in Gallo Pro- uincia inter Lanonam & Pennam, aliisque pluri- mis in locis circa Massiliam. Suffrutex lignosissi- mus est, cortice, lignoque genistæ simili. Rami cubitales, longiores, breuiorèsq; pro ætatis ra- tione, terni, quaterni, in quorum summis spicatus glomeri denso, & rotundus, colore atro viriden- te.

*Descriptio.  
rami.*



re, absque foliis: diuisus tamen in exiguis frequentisque ramulis: hique rursus in spinas durissimas breues viridantes: intra quos vt plurimum alia subnascuntur: flores florentes ex albo flauiccentes, quidam etiam ad purpuram accedentes. Floret mense Septembri. Decidunt postea flores nullum post se relinquentes fructum [ quantum quidem obseruatione nostra consequi potuimus ] exceptis quibusdam cœu vasculorum specie, figura okuari, in quibus tamen nihil reperitur. Radice vnica & simplice vtitur, haud magna valde.

Si Anguillara non tradidisset Acaciam alteram, quæ videtur conuenire cum Aspalatho secundo Monspelienfium hanc eod referendam fortè putarem, considerandum an sit Scorpium primum Clusii diuersus ab Aspalatho Monspelienfi secundo, quem suspicamus genitellæ spinosæ affinem, Nepam quibusdam dictam.

AGVL ET ALHAGI ARABIBVS  
PLANTA SPINOSA MANNAM  
reſipiens.

## Descriptio

Spina.

Flores.

Siliqua.

Semen.

Manna.

Surculi.

Folia.

Radix.


Synonyma

Agul.

Alhagi.

Agul.

Locus.



FRutæx est cubitalis, aut altior, densissimo, spinarum acutissimarum gracilium flexiliumque stipatu refertus: Ex quibus plurimi pendent flores rubelli: eis decidētibus succedunt siliquæ rubentes, quales in Scorpio Monspelienfi me vidisse memini, semine concolori factæ. Ex hac Halepi incolæ nouum quoddâ Mannæ genus legunt, cuius na

Coriandro nostro maiora paulo, adeoque figurâ & sapore Mannæ nostræ Laricæ persimilis. Surculi porro infinis propemodum donatur teretibus, & à trunco eleganti ordine hinc inde spatulis, maiori ferè parte Culcata obtusis, velut in Thymo. Folia ad spinarum exortum hærent oblongâ Polygoni figurâ, cinerea: radix satis longa, purpurea. De Manna in Alhagi vel Agul proueniente scriptimus lib. 8. cap. de melle aërio siue Manna sub titulo: Mannæ Italicæ Tereniabin aut Trungebin.

Ravvol. Arabibus Agul & Alhagi frutex, ex quo colligunt Persæ Manna: supra spinosos autem frutices prouenit Mannam restantur Serap. Auicenna, ac etiam Clusius in epit. Indicarum plantarum. Idem Icon. Peregrinus frutex Æthiopibus Agul & Algul, supra quem potissimum cadit in Persia Manna, quam ipsi Transchibin, Arabes autem Teneriabin & Trangibin nominant.

Hist. Lugd. app. Planta rara spinosa Maurorum Alhagi, Agul, & Algul. Manna quæ his arboribus illabitur, Tinamiabin à Costa vocatur, qui & Carduis insidere scribit.

Prouenit in Persia & circa Halepum: & circa Kacka vrbe Mesopotamiæ.

Folia eius calidæ sunt siccæque naturæ. Horum Vires. vsus incolis ad purgandum, quibus se purgaturis manipulus vnus ex aqua coctus, in singulas doses sufficit.

## TRAGVS VETERIBVS.

Non noui si hodie adhuc plures de Trago Vetterum habeantur opiniones, cum iam prioribus auctore Dioscoride Τράγον aliqui σκόπιον, alii τράγον [ quasi edule dicas, vet. κόκκος σκόπιος, Coccum baphicam addit Sarrac. ] vocarint. Est autem vt Diosc. prodidit, frutex pusillus [ δεικνύμενος ] in montibus maxime nascens, per terram [ παρὰ ] [ δεικνύμενος ], quibus Vetus caret ] oblongas, at non ita magnus, palmi altitudine, aut paulo amplior: & is quidem sine foliis est: circa ramos autem hærentes habet velut acinos pusillos, rufos, tritici grani magnitudine, summa parte acuminatos, numerosos, gustuque admodum adstringentes. Racemorum acini decem ex vino potu cœliaci, feminisque fluore laborantibus auxiliantur. Sunt & qui ufos digerunt in pastillos, quod scilicet asseruntur, usque ita vtrunt.

Eundem hunc Dioscoridis Tragum ita depingit Plinius. Tragion & Alhagi, siue Scorpionem veprem [ imò Iunci genus Dalech. ] sine foliis, racemis rubentibus [ subeantibus M. ] ad Medicinæ vsum. Idem alibi, Est & alia herba Tragos, quam aliqui Scorpion vocant, semperdem alta, fruticosi, sine foliis, pusillis racemis rubentibus, grano Tritici, acuto cacumine & ipsa in maritimis nascens. Huius ramorum decem aut duodecim cacumina trita [ huius racemorum acini decem triti, legend. ex Diosc. ] ex vino pota [ poti ] Cœliaci, Dysenterici, sanguinem excreantibus, mensiumque abundantia auxiliantur. Dalech. apud Plinium lib. 22. cap. 15. vbi Plinius ait: Est & alia eiusdem nominis scilicet Scorpionis &c. scribit intelligi Tragon Dioscoridis, nos autem quia dubitamus num potius intellexerit Scorpionem siue Nepam, vt etiam censet Sarrac. Theophrasti totum locum sub Scorpione Veterum posuimus.

Ceterò, Tragum de multis plantis dici, ita demonstrat. Tragus siue Scorpium Diosc. dicitur de Vua marina vulgò, quem verum censemus Tragum. Et hæc opinio fuit Dalechampi & Gesneri, nec displicet Clusio, nec etiam Löbelio. Apud

Castorem Durantem pro Trago siue Vua marina, posita est Icon Tragacanthæ: de qua paulò post: Plinius auctore Cæsalp. miscuit Tragon Dioscoridis cum Scorpio Theophrasti, quem Nepam interpretatur Gaza, de ea opinione vide Hist. n. g. lib. 17. titulo Tragus Cæsalpini. De Trago Matthioli, qui à plerisque, ac à me reicitur, & Tragus Match. pungentibus foliis inscribitur, agetur suo loco. Cals Amato est Tragus, quæ opinio merito non placet Cæsalp. Salicornia Dodonæo est species Tragi, quam opinionem non probò nec etiam Cæsalpinus: Tragus Eurtio Cordo

& filio Valerio & Leonicerio est sedum minus flore candido, quæ sententia à me eiicitur. Tragus sylu. Cordo, mihi sedum filio circinato. De his quatuor lib. 55. Ruellium hallucinatum esse scribit Amatus quum Tragum Iunci speciem esse dixerit, cui quoque Matthioli subscipit. Tragi genus minus & alterum grandius Cæsalpini, vide Hist. n. g. lib. 17. post Trifolium album rectum. Inter spuria nomina Dioscoridis, inuenio Tragon alterum dici Tragon, quidam volunt Fraxinellam Hist.

Diosc. Variè illustratur. Tragus. Scorpium.

Tragum. Cals. B. a. phica.

Locus. Diosc. locum restituit. Sine foliis. Acini. Triticeæ grana. Vires. Daps.

Tragi æmonstro. Tragus siue Scorpium Diosc. dicitur de Vua marina vulgò, quem verum censemus Tragum. Et hæc opinio fuit Dalechampi & Gesneri, nec displicet Clusio, nec etiam Löbelio. Apud

Tragacanthæ Icon.

Scorpium Theophr. Tragos Matth. pūgentibus foliis. Cals. genit. culatum.

Sedum minus flore candido. Sedum folio circinato.

Iunci species. Tragi duo Cæsalp.

Fraxinella.

ing. lib. 30. Tragos de Etneo arbore diuersa à Ficū apud Gesnerum quadrup. Ex Caelio Tragos videtur etiam panis nomen fuisse Gesner. quad. Dodon. de purgantibus allerit Trago Dulcicherum dici, quod nos Trasi appellamus, de quo hist. n. g. lib. 18. Tragos inter frumentacea de quo Dioscor. lib. 2. & Sarrac. in scholis. De hachist n. g. lib. etiam 18.

## TRAGVS SIVE VVA MARINA.

De script.



Medulla.

Flores.

Fructus  
sapor.

Semen.

Iuncus mar-  
tinus  
Cassor. no-  
tatur.  
Sarrac. no-  
tatur.Rubus ma-  
rinus  
Tragos  
Diosc.

**T**ragus fruticarius, vix interdum pal- mum excedens, nonnunquam cubitalis, stipite lignolo, simpliciter, qui potest ex vno veluti capite complures profert ramos viridates, striatos, fractu cōtumaces, adstringentes, medulla viscosa [quæ resiccata rubescit] plenos, crebris geniculis interceptos, inque frequentes ramu-

los rursus diuiduos, quibus ex articulis durat est exortus: atque in his quidem nec folia nec foliorum vlla comparent vestigia: Verum è geniculis Equiseti modo prodeuntes ramuli, flores in summo sustinent glomeratim congestos, multos, paruos, luteos: in fructum abituros Rubi, Moris similem, ex acinis rubris compactilem, sapore dulci, nec ita tamen vt Mora, gratum, edulem tamen: Hisce femina insunt gemella, oblonga, quæ se mutuò spectant, plana, alterà parte leuiter in gibbum protuberantia.

Anguill. Croton Commentatoris Nicandri. An Matth. in post. com. Lat. & Ital. cum mag. fig. *Coda di Cavallo* 4. id. est *Equisetum quattum*, pingit nec descabit. An Gort. de med. *tray*, Herbariorum Iuncus marinus, ab al quibus *exipetio* vocatus. An Gesn. in Cat. pl. *tray*? Vbi Cassor. *trayon* & *exipetio* nominat, ibi descriptio est *Vua marina*, Icon autem *Tragacantha*. Sarraceno non possit concedere *Tragum* seu *Scorpium* Plinii lib. 21. cap. 15. esse *Scorpiorem* Theophrasti siue *Nepam*, quia acinos rubentes ei tribuit, quod Theophrast. de suo *Scorpio* non scribit: Plinius fortè non benè veptem dixit, non distinguens *Tragon* Dioscor. à *Scorpio* Theophrasti. Hist. Lugd. *Tragus* siue *Scorpius marinus* Dalechampi. Item *Equisetum quattum* Matthioli. l. 10. cap. 67. Item *Osteocollon*, quod fracta ossa ferminet. Abundat Hist. duabus figuris & descriptionibus, quæ certo indicio sunt Compilatore Historiæ non nouisse platas, ac idèd ignorasse quid pingeret aut scriberet. Rustici vocant *Mora marina*, quæ occasio vt olem appellari *Rubum marinum* donec à Domino Dalechampio & Gesn. intellexi esse *Tragon* Dioscor. quæ sanè opinio placet: quamquam non intelligam quid velit Dioscor. cum de *Tragi* fructu ait *ἐξ ἑκαστοῦ ἀκροῦ*. Gesnerus olim annotauerat ad *Anguillaram*, vbi

de *Crotone* ait: An *Polygoni* species Gesnero. *Polygoni* Camer. hort. *Tragus Vva marina*, cuius icon ex *specie*. Gesneriano typo deprompta. Sciat autem Camer. Gesneri figuram factam esse ad meam plantam siccam. Casp. Bauh. Phyt. *Vua marina* 2. siue minor. Item *Vua terria* *Osteocollon* Lugd. idem præcedenti aut certè eius species aliqua. Tabern. icon. *Vua marina* *Monspeliaca* *Meertrauben von Mompelien*. Clusius vocat *Polygonum quattum minus*, *Vuam marinam*, *raisins de mer* Gallie Narbonensis: Meo tempore, inquit, peritiores ad *Dioscoridis* *Tragum* siue *Tragum* lib. 4. *Tragus*, descriptum referebant: cuius sanè aliquot notæ non ineptè huic plantæ quadrant: Nonnulli postea ad *Androsacen* retulerunt *Bellonium* secuti, qui lib. 3. obseru. cap. 41. de *Androsace* agens, hæc innuere videtur. *Anguillara* *Crotonis* cuius *Nicandri* interpres mentionem facit) nomine hanc ni fallor, describit editione duodecima. Multis verò notis, primum præsertim huius plantæ genus, mihi cum *Polygono* quarto Plinii quadrare videtur, quod describit lib. 27. cap. 12. Posset tamen ad eundem *Ephedram* fortè etiam referri, quæ quibusdam *Anabasis* etiam dicitur. Hanc *Bellonium* lib. 1. & 3. obseru. arbores confendere dicit, cuius fructum, *Androsaces* similem, rubrum edidisse refert. Ego verò hanc solam plantam ferè nascentem, & sese sustentem, neque vllò adminiculo egentem inueniebam. Fuit quando *Lobel.* & *Pena*, *Tragum*, *Androsacen* opinati fuerunt: *Tragus*, sed illos retinuit *Pliniana* versio, quæ hic accuratior quàm quæuis alia. Idem alibi dubitant, An *racemosa* *Biquetii* facie planta, sit *Tragos* vel *Traganon* *Dioscoridis*: & postea, *Traganon* vocant, profitenturque *Monspeli* *Raisins de mer* seu *marinam* *Vuam* vocari. *Lobel.* Obseru. *Tragos* siue *Vua marina* maior. Num *Equisetum quattum* *Matthioli*, depictum non descriptum? An *Croton* *Nicandri* *Anguillara*? Titulum *Lobellii* huc refero, non figuram, quæ sequentis *Tragi* est: *Vua marina* *Monspeliensis*.

*Monspeli* *Tragos*, frutex copiosè provenit apud mares: Florentem vidi vere, & fructum ferentem mense Augusto & Autumno. Hanc eandem plantam vidi Bernè in orto *Benedicti* *Retij*: *Basilæ* durat à plurimis annis in orto *D. Jac. Zvingeri*. *Montbelgardi* aliquando mihi provenit in orto *Ill. E.C.* *Frater* obseruauit *Monspeli* fuli florere Maio & Iunio. *Reinaudetus* *Pharmacopœus* misit hoc titulo ex *Provincia*, *Planta marina* *Equiseti* similis: *Gener Cherlerus* pulchras plantas attulit *Monspelio*. *D. Doldius* misit plantulam *Norimbergæ*. Frequentem inueniebat *Clusius* in colle quodam à *Salmantica* miliari, longissimè à mari, quod equidem satis mirari non potui, cum antea copiosum obseruasset locis marinis, & toto illo tractu inter stagnum *Volcarum* & *Mare Mediterraneum* supra *Peraul* & *Megalmam* ad mor tem vsque *Selum*.

*Vires* antè recensuimus ex *Diosc.* quæ videntur meliùs conuenire furculis quàm acinis.

## TRAGVS SIVE VVA MARINA MAIOR.

**H**umana interdum altitudine fruticat, *Spartij*, quod *Hispani* *Rotama* vocant, modo, brachialis crassitudinis aiquando stipite, oblongis ramis, nigricantibus, qui deinde multas virgulas *Rami*. ferunt pedales, tenues, multis internodiis distinctas, vt *Equisetum* ferè, propendentes, sine foliis, admodum

Vua marina.

Tragus.

Androsace, Croton.

Polygonum a. Plinii. Ephedra.

Tragus.

Androsace Tragacantha.

Locis &amp; tempus.

Vires.





**Radix.** liainsunt, foris nigra, intus alba: radix dura, lignosaque est.

Vua marina vulgaris *Polygonum amais*: Hispani *Bulbo* vocant. Lobel. Plant. Iapan. *Tragus* siue *Vua marina maior* Eandem in Obi. sub precedentis titulo exhibet. C. Bauhinus Phyt. *Vua marina* siue maior.

**Locus & tempus.** Florat cum precedenti mense Maio, fructus Angusto, etiamque ferulis maturefcit, initio Martii floribus onusta etiam deprehenditur, circa *Felezet* radis, regno Murcano, vbi plurima nascitur, nusquam alibi Clusio conspecta.

### TRAGACANTHA VETERIEVS.

**L.** Achyma non habet & Tragacantha [in *Tragacantha* *Crete Hircisina* reddit] vocata. Hanc autem compit a put. bant folium in Crete nasci. Nunc autem in multis locis, & in Asia Poloponneti, & alibi. Et in Asia circa Mediam comperiri certum est. Huius quidem, vt ceterorum sponte succus consistit, in lachryma modum, Hanc enim egdere non est necesse. In Arcadia copiosa nascitur, & nihil deteror, vt geritur, Crete, sed & aspectu pulchrior.

**Radix.** Tragacantha radix, inquit Dioscorides, lata est & lignosa, ac supra tectam etiam eminet, à qua succuli humiles [Oris addit *πικρὴ*, id est, crebri] robusti, latissime tusi & in ipsis foliola [in altero codice additur *πικρὴ*, id est, parua] numerosa, tenuia [non *πικρὴ*, *λεπτὰ* Satriæ. vel est transpositio vocis *πικρὴ*, iungendaque est voci, *λεπτὰ*: vel *αὐτὴν ὡς λεπτὰ, λεπτὰ* legendum videtur, nimium *οὐκ ἔστιν*] inter quæ aculei sese proferunt, quos ipsa occultant, candidi, firmi, reliquæ. Est & Tragacantha lachryma, quæ super relectâ radice con- crefcit: quo in genere præstat pellucens *λεπτή*] lævis, gracilis, sincera ac subdulcis.

**Lachryma. Delectus.** Vim porro habet aquæ ac gummi cutis spiracula obstruendi. Huius autem increbuit vsus ad oculorum medicamenta, item ad tussim, exasperatas voces & vocem interceptam, atque distillationes, cum melle in delinctu. Sed & lingua subdita liquefcere sinitur. Bibitur quoque drachmæ pondere in passo macerata contra renum dolorem, & vesicæ resonem, mixto cornu cerui uto & cloro, aut scissi aluminis momento.

### TRAGACANTHA MASSILIENSIS.

**Defcript.** **F.** Rutæ est virgis mediocriter crassiss donatus, extremum versus magis crassescens, usque



spinas verò siue spicula folijs utrinque quasi pri- mus donata scribunt, quæ ima & vetustiora nihil aliud quàm veprem, aut arista nudâ effigiem ostentent, qualia nos ex sicca planta iam descripsimus: porro autem & vni t. idici plures virgas, cubitales cum pterocissimâ sunt, rigidas, lignosas: flores colore albo de scribunt: siliquam numerosam, rectam, genistellæ spinolæ modo, sed multò minorem & candidam, in qua semina exilia, albicantia includuntur, Sinapi magnitudine, angulosa.

Tragacantha plantam à qua effigiem quam passim, exhibet Math. deprompsit, ad eum misit studiosus qui illam attulerat ex Apuleiæ Gargono monte. Ea certè, quæ nullis prioribus notis à Diosc. historia dissentiat. Et rursus: Poterium ad id Tragacantha proximum habetur, vt illi omnibus notis congener esse videatur. Peculiariter autem supromos ramos habet in vertice extuberantes & tenui lanugine obductos, quod in Tragacantha non videntur. Plantam quam idem pro Poterio appinxit, elque Constantinopoli Augerius à Bulbecke misit, eandem suspicor stirpem cum eius Tragacantha: ramus enim mihi datus Pataui per D. Cortusum pro Poterio, qui non videtur differre à Tragacantha Massiliensi.

Nobiscum sentire videtur Camer. ad eiusdem Hist. Germ. qui dicit, Tragacantha appiæ non dissimile Poterium, aut Tragacantha 2. Clusii in Hispania proueniens.

Dodon. Lat. in fol. Tragacantham Latinè Spina hicci dixerit. Apud Cast. Dur. pro Trago siue Vua marina posita Tragacantha Icon. Tragacantham aliquando Massilæ florentem & fructu pregnantem obseruauit Clusius. Tragacantha Hircispina poterit vocari, *Esine de boue*, flos albicans, interdum distinctus lineis purpureis. Rauuolf. in itin. Tragacantha tres species facit, inter quas vnam similem Tragacantha Clusii dicit, quam veteræ Tragacantha valdè similem æstimat. Quod autem Clusius duas habet species, idè minis constat quam intelligat Rauuolfius, an eam de quâ hic agimus vel sequentem. Tabern. Icon. & Hist. Tragacantha prima. Item Poterium. Vna eademque figura. Lonic. Tragacantha figuram habet Matthioli. Bellon. lib. 1. Obseru. cap. 17. duas Tragacantha herbæ species circa Montem Idam inuenit, quarum fortè hæc erit vna ex iis, quas Matthiolus tradit & nos hoc loco. Anguill. hanc fortè describit epist. 8. pro Tragacantha. Huc pertinet Tra-

albidis & lanuginosis, è quibus squammam p- deurt spinæ candidæ, creberrimæ sextantales aut vnciales, rigidæ, infestæ, ramos comitantes, inter quas flores extremis ramulis hærent, simul aliquot iuncti, genistellæ floribus *Flores.* similes. Huc Aduers. na radicem trahunt albam, longam, in os- san, c. assue d- gri, pr. d. n. fl- xibus subter hu- m. a. meriam,

*Virga.*

*Flores.*

*Siliqua.*

*Semina.*

*Vulpina  
herba.*

gacantha Lob. & Penz. Adv. & Icon. Plant. hircinos spirillos & aruncosimitata, vera Tragacantha, Massiliæ Barbe Renard & Ramebus, id est vulpina herba & furculus hircinus vocatus: Item Matthiol. Poterion Constantinopoli missum, de quo idem arunt: nihil aliud quam Tragacantha est, aut ex eius iconne depictum cuius descriptionem tacuit: Verum tamen dicit esse Tragacanthæ simile, sed verius dixisset eandem esse. Hist. Lugd. Tragacantha Matthioli: Item figura altera & descriptio Poterionum Matthioli.

*Locus.*

Plurima fruticat in Galloprovincia propè ad Pomoeria Massiliæ, in marinis collibus ad Austum aliisque finitimis locis passim multa: Mechliniæ Mercator fouit domi totam glaciælem hyemem. Tragacantha nunc in multis Italia locis præsertim Potino vocato Brutiæ monte reperiri, certissimum esse afficiat Marantha. Tragacantham prout pulchrè à Matthiolo depicta, vidi Montepelium allatam ex Massilia. Ante quadraginta annos Doctus Pharmacopæus Jac. Reinaudetus mihi misit ex Galloprovincia cum aliis multis. Frater attulit mihi Ramulum datum à Domino Cortuso pro Poterion, quod discernere non possum à Tragacantha.

### TRAGACANTHA GVMMI.

*Descriptio.*

E vulnere spinosæ plantæ Tragacanthæ manat, Equale autè adnos adfertur gummi, est glutinosum candidum, aut flauum, aut ex rufco pallens, contortum in erucarum, vermiculorumve formam, tanquam violentiore pressu per densius eolum transmissum, sapore subdulci & ferè saturo, aquam cui infunditur in lentam sequacemque muciginem conuertens.

*Sapor.*

Lachrymam à vulnere radice Tragacanthæ manantem [quam Sepalsarii vulgè vocant Gummi Tragacanthum] & quæ passim in Officiis con creta videntur (è Creta Asia & Græcia aduectam) Monachi in Mesuem apud Matthiol. veram esse Tragacanthæ Lachrymam negant, quòd legitima linguae subdita facit Dioscoridi testimonio colligescat, hæc verò nunquam: quæ quidem in re eos toto cælo aberrare scribit Matthiol. vt qui Dioscoridis sententiam perperam acceperint, siquidè Dioscor. non de sola Lachryma linguae subdita, sed in eclegmate cum melle conformata, vt mox patebit, illud fieri scribit. Huic & alia accedit ratio. quòd si intellexisset Dioscorides lachrymam per se tantum linguae submittendam, subianisset quibus in morbis id facitandum, esset: quòd quidè planè absurdum foret scribere, quòd ali quod gummi linguae subiiciendum paulatim liquefcat, ac deinde silentio prætere, in quem usum & quibus in morbis id faciendum.

*Nomina*

*Linguarum.*

Τραγάκανθα, Lat. & Ital. Tragacantha, Arab. Chirica, trica, Charerb, Alentred, seu Alchataad: Germ. Dragan, Hisp. Alquetira.

*Locus.*

Tragacanthem in Creta nasci Plinius nouit, spinæ albe radice multum prælatam, apud Medos aut in Achaia nascenti. Theophrastus autem lib. 9. ait, ἐν Ἀρκαδίᾳ ὅν τι τραγάκανθα πικρὴν, καὶ ἰσχυρὰν ὡς κισσὸς ἢ κρητάνη, ἀλλὰ οὐ τὴν ἴσην αὐτῇ.

*Vires &*

*Vitis.*


*Oculi. Tho.*

*rax.*

Vim habet, autore Dioscoride, meatus obducendi similem gummi. Vfus eius est ad medicamentum oculum, & ad tussis, & arteriæ asperitates, & vocem retusam, & destillationes, in eclegmate cum melle. Subdita etiam linguae liquefcente succo deuoratur. Sed & macerata in passo drachmæ pondere bibitur ad renum dolorem & vesicæ ro-

sionem, ammixto cornu ceruino vsto ac loto, aut modico alumine scisso. Galenus velut Dioscor. Tragacantham similem gummi vim habere ait, meatus obducentem, & acrimonias obtundentem. Sed & similiter, inquit, vt illud siccit. Tragacanthæ lachrymæ Officina gummi Dragacanthi vocant: notissima est & familiarissima ex ea maxime cõpositione, quæ ex ipsa Dragacanthu appellatur, & in asperæ arteriæ ac pectoris vitii vlturpatur.

### TRAGACANTHA ALTERA, POTERION FORTE Clusio.



*Descriptio.*  
Tragacantha, quam aliquando Massiliæ florentem & fructu præditam obseruasse meminit Clusius, similissima est hæc Tragacantha altera, fruticosa admodum, multos pedales habens ramulos flexibiles, latè circumuenaque sese diffundentes, candidantes, & dum adhuc tenelli sunt, lanuginosos, multis longis canescentibus spinis horrentes: foliorum plurimæ simul

inundæ ale, Lenticulæ aut Tragacanthæ proximæ, exiguæ, candidæ, lanuginosæque primo Vere per interualla exeunt, dulcis saporis: foliis hyeme decidentibus, nervi illi medi quibus folia inhaerebant in rigidas & acutas spinas euadunt, vt eo tempore tota planta sine foliis conspiciatur, contra quam in Tragacantha, quæ hyeme etiam folia retinet, nec ea abiicit donec noua sequente anno adquisierit: tum denum, deciduis vetastis, nervi illi medii etiam in spinas abeunt. Istam neque florentem, neque semen ferentem autor vidit, sed sub ea plurimos folliculos bombycinis similes, aut Alceæ illius, quam Matthiolus Hypecõu appellat, folliculis ferè pares, inanes inuenit, quos ab illa excidisse, & florem ex similibus prædire album, non magnum, incolè referebant: de semine nihil certi intelligere potui: radix lenta, longa, in multos ramos diuisa, nigro cortice foris obducta, materie intus candida, fungosâ, dulci, interior pars gummosum quidpiam & subdulce refert.

Tragacanthæ est adeò similis, vt sibi autor facile persuadeat poterion esse, quod ab Ionibus vocatur, vocari Dioscor. ait: Nisi fortè ea sit quam Strabo circa Carthaginem esse scribit, de cuius cortice telæ pulcherrimæ conficiuntur. Bellon. lib. 1. Obseru. cap. 17. Fortè Tragacanthæ secundum genus verum Cretensium montium. Lob. Plant. Icon. Tragacantha altera fortè, siue Hist. Lugd. Poterion Clusio. Tabern. Icon. Tragacantha 2. Bodæborn Dragan 2. An Rauvvolf in itinere. lib. 2. c. 12. Tragacantha minor altera, satis aliqui similis primæ, deimptis floribus luteis, qui singuli sunt in folliculo rotundo, sublateo, aliquot in longo pediculo, de qua mox?

*Nascentur*



Locus.

Nascitur plurima circa *Guadia & la ventia el perul*, Granatenſi regno, in collibus, arido, & inuicili ſolo, nec alio loco conſpexit Cluſius.

## TRAGACANTHA RAUVVOLFI.

**Deſcriptio** **T**ragacantha altera Rauuſvolſi, paulò humilior eſt primà, perſimilis tamen, niſi quòd ſtoliculoſi fert luteos, conſertos, pediculis longis hærentes, quorum ſingulares rotundis & flauoſcentibus folliculis inſident. Tertiæ altitudo par, virgæ robuſtæ rubentiores, in quibus conſpiciuntur alba lanuginofa Poterii capitula, purpureis ſtoliculis ornata.

Inter ſpecies Rauuſvolſi n. 281. Spinæ Tragacanthæ aliud genus. Hiſt. Lugd. in Append. Tragacanthæ alterum genus.

## POTERIVM ANTIQVIS.

**Deſcriptio** **P**oterion Iones, quod apud Dioſcoridem, Neurada vocant. Frutex eſt magnus, ramos habens longos, molles, lori modo lentos, tennes, Tragacanthæ ſimiles; folia parua, rotunda. Totus autem frutex tenuem lanofam lanuginem obſitam habet, & eſt ſpinofus. Flores ſunt parui, albi. Fructum autem fert guſtu odoratum, & acrem, inutilem. Nascitur in paluſtribus, & locis terræ editioris. Radices ſubſunt duorum, aut trium cubitorum, robuſtæ, neruoſæ, quæ ad terram reſectæ lachrymam remittunt gummi ſimilem. Hæ conſuæ & in cataplaſmate impoſitæ, neruos diſſectos & vulnera glutinant. Sed & decoctum ipſarum potum, neruorum affectionibus conuenit. Sunt & ranis venena, rubetis maximè, vidimùſque, inquit Plinius, Phyſlos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quam aſpidum perniciæ. Auxiliatur eis Phrynion in vino pota: aliqui Neurada appellant, alij Poterion, floribus paruis, radicibus multis, neruoſis benè olentibus. Item poſtea i Poterion, aut vt alij vocant Phrynion vel Neuras, largè fructicat, ſpinis retorrida, lanugine ſpiſſa, foliis paruis, rotundis, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, flore longo, herbacei coloris: feminis nullus vſus, ſed guſtu eſt acuto & odorato. Inuenitur in aquoſis collibus. Radices habet duas aut tres, binum cubitorum in altitudinem, neruoſas, candidas, firmas. Circumſoditur Autumno, & præciſo frutice dat ſuccum gummi ſimilem. Radix mira vulneribus ſanandis traditur, præcipuè que neruis vel præciſis ilita. Decoctum quoque cum melle potum, diſſolutiones neruorum, & infirmitates, & inciſuras iuuat. Ego, inquit Cornarius, non aliam plantam Poterion eſſe ſentio, quam eam ſpinam ac ſentem, quæ à noſtris Prunus ſylu. [*Schledorn*] appellatur, cui & parui albi flores ſunt, & reliqua omnia Poterio à Dioſc. attributa, maximè tamen fructus guſtu odoratus, velut Dioſcor. ait, κατὰ τὴν οὐρανὴν οὐρανὴν αἰχμησάν. His enim locis de Græcis conuerſis Plinius non cognouiſſe videtur, quæ planta Poterion eſſet: alioqui enim priore loco non flores paruos, quæ αἰὲν μικρὰ legit, ei attribuiſſet: poſteriore verò flores longos, eòſque herbacei coloris, velut qui αἰὲν μικρὰ χλοὰν legerit: quum recte lectio ſit, αἰὲν μικρὰ λευκὰ, velut Dioſc. habet. Plinius huius velut ignarus κατὰ τὴν οὐρανὴν αἰχμησάν acutum reddidit, quum neque acutus, neque αἰχμησάν propriè ſit, ſed ὑποκρίνεται.

Locus.

Gummi.

Vires.

Rana Generata.

Phrynion.

Neuras.

Poterion.

Vires.

Decoctum.

Rhin. por.

Cornarius malè ſibi perſuadens Prunum ſylueſtre eſſe Poterium Plinium videtur nobis ſine cauſa redarguere, quoddam dixerit acutum: ſi Plinius ſignorauiſſet Poterium ipſi etiam fuiſſe incongruum, non enim poteſt eſſe Prunus ſylueſtris, vt indicatum lib. 2. cap. de Pruno. Galenus Neurada, quam aliqui Poterion vocant, ſiccantem citra mordacitatem vim habere ait, vt neruos diſſectos glutinare credatur. Sunt autem, inquit, radices eius maximè tales. Et ſanè etiam decoctum ipſarum quidam his qui ex affectis neruis laborant exhibent. Caterum, quòd neruis peramica ſit viſa, vocarunt, & Poterion fortè, quia potrix paluſi, riguique ſoli amans ſit.

Iam diximus Cornarium malè exiſtimariſſe Prunum ſylueſtre eſſe Poterium. Pimpinella ſpinofi, vt paulò poſt dicitur à quibuſdam cenſetur Poterion, quod non placet Honorio Ballo, nec nobis.

Cluſius pro Poterio exhibet Tragacanthæ genus, de quo paulò ante.

Lobelius aſſecit Poterium Matthioli nihil aliud eſſe quam Tragacantham, quæ & noſtra eſt opinio.

Aiunt, inquit Anguill. Poterion reperiri in Cantania & Meſſina Siciliæ, verum quia eam plantam non viderim, nihil præterea dicere poſſum.

Paluſtria vacinia ſive Oxicozum Cordi, ſunt auctore Lobelio, Poterion Dalechampi.

## POTERIVM QVIBVSDAM SIVE PIMPINELLA SPINOSA.

**Deſcriptio** **L**ignofiſ ramulis palmaribus & longioribus, denſiſſimè fructicabat mihi in orto, cancellata ramulorum minorum & ſpinarum breuium rigidarumque agmine parulo, cortice rubente & hirsuto: foliola pimpinellæ languiforbæ, multò minora, hirsuta, eadem inciſura in alæ formam diſpoſita coſtæ adhærent à ſpinis diuerſæ, ſubtus glauca; ſuperius ſaturatè virentia. Natali verò ſolo hærentem plantam Rauuſvolſius in Hodeper. ſcribit, fruticem peregrinum ſpinofum, caulibus cubitalibus denſè fructicare, multis in terram procumbentibus ramis, pleròſque verò omnes ſtationes ſtatim ex radice rubente, ſaporis ſicci & nonnihil amaricantis oriri, cortice teſtoſo, exteriorè incano tenero, cuiuſius ſubſit rubens: foliis eſſe tenellis longiuſculis in pediculis ordine ex aduerſo poſitis, ſuperius vtrinque virentibus, infernè cinereis, noſtræ pimpinellæ languiforbæ ſimilibus: flores primo Vere conſpici. herbacei coloris, ſtellatos, paruos, quibus ſuccedant bacce exiguæ, albicantes, cuius pauxillo rubore, ordine quodam ad ramos ſeſſiles, i Ribis noſtri bacis haud abſimiles, conſpicio adhuc in vniuſcuſque bacce vmbilico flore.

De hac planta hæc tradit Honorius Bellus in Epiſt. ad Cluſium. Elegantiffima planta, quam [ni fallor] nonnulli Poterion perperam appellant, alij pimpinellam ſpinofam. Planta hæc perpetuò in Creta viret, multòſque annos durat, in orbem diſſuſa, in vno pediculo folia plura vtrinque diſpoſita, quæ cum Autumno primum erumpunt in ſe contracta videntur; & Apſeni folia quodammodo imitantur, ſed longè minora, quæ tamen ſuccellu temporis maiora apparent, & pimpinellam ſorbæſtellam vocatam foliorum poſitu & diuiſuris emulantur, minora verò ſunt. Totà planta crebris figuris & tenuibus ſpinis ſcatet: ſemina fructus Rubi aut Mori imitantur, plures e-

Plinius ex-  
cuſatur &  
Corn re-  
prehendit.  
Prunus ſyl.  
neſt. non eſt  
Poterion.  
Tempera-  
mentum.  
Neruis.

Vires Neu-  
ras Galo-  
ni  
Neuras  
Vnde.  
Poterion cur  
Prunus ſyl.  
Pimpinella  
ſpinofi  
Tragacanthæ.

Locus.

Vaccinia  
paluſtria.

Deſcriptio.

Ramuli.  
Spina.  
Folia.

Deſcriptio  
Rauuſvolſii.  
Caulis.

Rami.

Folia.

Flores.  
Bacca.

Deſcriptio  
Bellus.

Spina. Sa-  
mina.

# HISTORIAE PLANTARVM;

enim simul congesti sunt, initio virides, postea ad rufum tendentes: flores paruos, carnosos ex viridi rufescentes multoque simul congestos profert. Super hac stirpem nascitur Epithymum, quemadmodum super Thymum iisdem collibus frequentissime inuenitur, in quibus & Thymum & Thymbra & Asparagus proueniunt, nunquam autem inuenitur palustris. Adstringendi vñ pollet, vulgariterque in tota Graecia *rosidus* vocatur. Quod autem sit Dioscoridis Stoebe, & Phlecos Theophrasti, non Phleum quod a Phleco diuersum] Stoebe Plutarchi, & Stoebe Aetii, vt cum Honorio sentimus, dicemus ibi, vbi de Veterum Stoebe & Phleco scripsimus.

Planta à Rauuolffio hic descripta Tripoli ab incolis in inter, lib. 2. cap. 12. pag. 286. & 287. de plantis Bellan vocatur: ex similitudine autem is esse Hippophaeum Dioscori, propter figuram. Vires non est expertus, nec succum. Idem intericon. Num. 287. Pateriam quam sonnam Aethiopijs Bellan dicunt, non sinit, propter mensuram id, An Hippophaes Dioscori. Sed Hippophaes Dioscoridis esse non potest Bellan, cui non sunt folia Oleæ, nec succus lacteus, nec facultas purgandi sed contra adstringendi.

Loh. & Pena Adu. Poterion aut Napes. Obseru. Poterion Cyprijs Mazino & Striuda. Icon. pl. Poterion. Hist. Lugd. Poterion Penz & Lobelii: Item in append. Maurorum Bellan fortasse Sanguisorba spinosa. Item lib. 4. cap. 31. Poterion Penz & Lobelii. Existimamus Compil. Hist. Lugd. non admodum peritum stirpium, confudisse cum Lobelii Poterio Vaccinia palustris quæ quondam Dalec. Poterion censuit, teste Lobelio: Nobis etiam non sit verisimile Pimpinellam spinosam loco modo dicendo prouenire. Dalechampius inquit Clusius: Poterion in Allobrogibus propè Muram oppidulum Gratianopoli vicinum in siluosis conuallibus reperit ait. Sed si eam intelligit à Tragacantha differat: nonnullis Pimpinella spinosa appellatur: Nonnunquam etiam mihi misit eius semen Stoebes Theophrasti nomine, & vulgò adhuc ipsam plantam in Creta vocari Aercia & *desidus* scriptum. Anguill. videtur ad *desidus* siue Aerciam Theophrasti. referre. Quandoquidem autem Pimpinella spinosa, folia non habet Lentis, nec fundit Lac, nobis non videtur Aercia Anguillaræ: hac in parte igitur dissentimus à Clusio & Camerario hort. dicente: *Astuidia* Cretensium à *desidus* vt quidam putant corrupto nomine Pimpinella spinosa, forsitan Chalcomia & Aercia Anguillaræ. Poterion Lobelii idem cum Pimpinella spinosa. Hort. Patau. Stoebe quorundam *Astuidia*.

In decliui montis Libani parte nasci vidit Rauuolffius, Angusto scitum prouenire, sed hyeme perire. Lobelius primum vidit in quadam areola horti Patauini opera Guilandini: Deinde ex Australi tractu Pedemontane regionis vultum ipsi misit Pharmacop. Massiliensis Iacobus Renaudet. Priusquam scriberet Lab. & Pena multis annis Poterii nomine Dominus Cortusius Patauini demonstrauit plantam siccam & viridem, quæ hic erat etiam in horto publico virens Martio. Dominus Cortusius alebat in vase, folia accedebant ad Sanguisorbam: sed minora, multa, spinæ etiam multæ longæ, plantæ altitudo vix ad quinque digitos proueniebat. Montbelgardi fata in Horto ill. E. C. quæ primum autè animaduerte-


tem prouenientem, dubitabam an esset Sanguisorba: reposita, hieme perierit. Frater Casp. Bauhinus mihi indicauit Cortuso esse *Chalcomia* & *Aerciam* Anguillare. Ex Burgundia missum mihi semen nomine *Astuidia* Cretensium. Semen mihi præterea missum Sturgardia ex seminibus ab Hortulano Dni Florentiæ missis cum hoc titulo: Pimpinella spinosa à Stoebe vera Cretica.

Stiuda facultatis est adstringentis & adhuc sanandis alui fluoribus indistinctè à rusticis Cretensibus usurpatur. Nam eius in aqua decoctionem ieiuni bibunt, & à morbo vt aunt liberantur, Bellus.

## HIPPOPHAES ANGVILLARAE

ET DODONÆI, SIVE SPINA

purgatrix.



**H**ippophaes inquit Anguillara, epist. 8. Sabulosis Peloponnesi maritimis, quæ nunc Morea dicitur, Vires. oritur, cuius radix ob vehementem vim purgandi quibusdam spinæ purgantibus radice nominatur, suffutur est spinis durissimis: spargit se in comam rotundam, albam: folia Oleæ longiora, angustiora & teneriora: Loc. Vires. Spina purgatrix. Descriptio Spina. Folia. Radix. Odg.

nec florem, nec fructum vidi, fortè cum offendendi non erat tempus: radices palmos longiores, lacteum succum frangendo fundunt amarissimum, odore graui, similem plantam in Italia non reperi.

Dodon. Lat. in fol. hippophaes ex Cod. Casp. hippophaes Anguillara, hippophaes Dioscoridis & Plinii. Lobel. & Pena Adu. Hippophaes, hippophaestum vocatur vulgò Spina purgatoria. Casp. Bauh. Phyt. hippophaes ex Cod. Casp. Dodon. Anguill. non nouim. Hist. Lugd. hippophaes Dodon. & Anguill.

## HIPPOPHAESTVM, QVORVMDAM

DALECHAMPIO.

**S**pina hic depicta, ad Dalechamp. Hippophaes. Ssti nomine missa est, è Melita insula, de qua apud Hist. Lugd. nihil asserit, sed leætoribus liberam iudicandipotesstatè relinquit. Est autè spina candida, diffusis huc illuc ramulis, aut potius spinis, sparsa: flore exiguo, albo, veluti racematim congesto. An Cathartica sit, an succus lacteus purgatorius, radice, caulibus, folijs exprimitur, asseuerare non potest, quoniam arida missa est planta, nulla adiuncta nutrentis historia. ECHI-

Floris.

Stirpium.

Locus.

Thymus.

Thymbra.

Asparagus.

Stoebe.

Phlecos.

Phleum.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.

Phlecos.

Stoebe.



ECHINOPVS PLVTARCHI  
QVIBVS DAM.Descriptio  
Rarior.

Spina.



Ramis mult-  
tibus, r. f.  
felsenibus fru-  
tuitat, pro foliis  
sunt spinę con-  
colores, vnciam  
longe, lunc pri-  
nis foliis, rigidi-  
tate aliquate-  
nus ascenden-  
tes, pari cum il-  
lis latitudine,  
planę, paulim  
exteriorum re-  
flexę, in fibras  
fufcentes, tam  
denso agmine  
positę, vt vbi  
plantulam im-  
punę attingas,  
nescias, squam-  
matim circa ex-

ortu uicinis incumbentes: pro Echinopo Plu-  
tarchi accepi nescio vnde: Pręterea chariss. Fra-  
ter Casp. Bauhinus dedit portionem nomine E-  
chini maioris Theophrasti Cortuso, qui ex magna  
planta desumpserat. Obseruent lectores quę an-  
tę scripsimus sub titulo Echinopodę Cretensium.

E. hinc  
maior Theo-  
phrastus  
Echinopoda  
Cretensium.

## CHALCIOS, AVT ÆRERIA.

Locus.  
Descriptio  
Spina.

Folia.

Lac.  
Chalcoma.

Hodierno adhuc die, auctore Anguillara, re-  
peritur planta in Peloponneso, & al Zante,  
quę suffrutex est spinosus, coloris rufi, ei spinę  
subtiles, folia similia Lentis foliis, sed minora, &  
eodem ordine in ramulo, ea fracta instar Tithy-  
malorum lac fundunt: in prædictis provinciis  
vocant Chalcoma, quę vox æs denotat.

GALASTIVIDA, SPINOSA PLAN-  
TA, FOLIIS LEUCOI, FLORI-  
BUS ALBIS.

Nomina  
varia.  
Locus

Galastivida, inquit Honor. Bellus epi-  
stola ad Clusium, sic vocata ob similitudinem,



quę cum Sti-  
vida [huc pim-  
pinella spinosa]  
habet, multitu-  
dine spinarum,  
oritur in parte  
Australi Insulę  
[Cretę] quę  
quinquaginta  
milliaribus di-  
stat à Cydonia,  
eius formę non  
rectę memini:  
semina, quę  
mitto, terrę mę-  
dare poteris, &  
ipse eam obser-  
uare. Hanc ta-  
men sic postea  
describit idē Ho-  
norius, Galasti-  
vida, cuius semē

Descriptio

Radix  
Caulis.

Spina.

Folia.

Flores.

Siliquę.

aliās nisi, radicem habet multifidam lignosam,  
firmam, longam, multos caules coniun-  
ctim proferens, in orbem diffunditur, & late  
fruticat, pedem altitudine non excedens: caules  
albi sunt, crebris, firmisque spinis præditi: inter  
quos folia Leucoi albi foliis similia, licet minora,  
& quędam lanugine obsita: flores Verbasco, aut  
Blattarię similes, albi, paululum ad flauum ten-  
dentes, in quorum medio stamina quędam pur-  
purea: floribus succedunt exiles siliquę, rotun-  
dę, tenuissimum semen continentes.

Rustici ad struendum ignem, calefaciendę  
que fornaces, eā vtuntur, ob similitudinem verd  
spinarum, quę cum Stębe habet, & album co-  
lorem, Galam-stiuidam nuncupant, non quod  
lac emittat. Posset fortę hęc non incommode po-  
ni post Leucoium: siue Thlaspi spinosum, siliquę  
rotundę, flore luteo.

GALASTIVIDA ALTERA, SIVE  
TITHYMALI GENVS SPINOSVM.

Cretensibus est alia plantę, inquit Bellus, ex  
Tithymali genere Galastividę nomine do-  
nata, quę spinas, vt prima profert, luteos flores,  
folia parua, rotunda, lac copiosum effundens, ra-  
dice [si rectę memini] carnosę, cuius historiam  
aliās dabit author.

Spina.  
Flor. Folia.  
Lac. Radix.

FINIS LIBRI VNDECIMI









# HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM, LIBER DVODECIMVS.


(CCLXIX)

QVI EST ARBORVM SILIQVOSARVM RARIORVM,  
HISQVE SIMILIVM.

EST & Siliquosis arboribus sua tribus. Vt frustra Vereres plerique fuisse videantur, qui filiqui illegimi-  
natis tantum tribuerint. Quamquam & Plinius, & Columella, & Galenus Siliquam arborem per emi-  
nentiam ita dictam vtrique agnoverint. Est sanè Siliqua repansio Græcis, omne siliculum seu integumentum,  
potissimum oblongum atque bivalve, quod grana in se continet, ordine quodam disposita, aut tale quid si-  
mile. Nam in arboribus varietas quædam obseruatur. Itaque bonis auiibus ad exequendas eas accingamur.

SILIQVÆ ARBOR, SIVE CERATIA.

CAP. I.



ARBOR, cui fructus  
cornu modo intor- *Etymon.*  
tus, siliquæ & *κωνίαν*  
nomen fecit, calidio-  
ris soli amantior,  
crasso, vt tradunt,  
caudice, in magnam *Locos.*  
excreuit altitudinem, latè ramos spar- *Descrip.*  
gens, longos, firmos: filia in alam  
disposita, (Clus. alata vt Terebinthi  
aut Pistacia, maiora) quorum singu-  
laria breui pediculo ad costam anne-  
xa, subrotunda, tres uncias, plùs mi-  
nùs lata, paulò longiora, crassa, rigi-  
da, nervosa: crebris obliquis venulis  
in margines excurrentibus, superius  
atro vitore splendent, insectis Nou.  
& Decemb. iulium instar iuglandis ferè  
in flores ex rubro purpurascètes sese *Siliquea,*  
aperientem emittunt: deinde siliquæ  
non tantùm digito indici æquales,  
sed & altero interdum longiores, la-

tiores, modicè intorta, compressæ, cal-  
lo dulci, eduli, semina claudunt membranis di-  
stincta, seminibus Cassiæ solutius ferè æqualia, mi-  
nora tamen, colore spadiceo obscuriore, compres-  
sa modicè, altero sine in acumen leuiter desinente,  
altero latiusculo, pulpâ buxæ, dura, & leguminosi  
quid respiciente.

Nostri icon nobis absentibus facta est ad ico-  
nem Alpini, quæ parum placet. Quare aliam ex  
Camer. apud Matthioli. Germ. eiusdem Epitome  
proponimus iconem, quæ melius allubescit, quam-

uis & in ipsa desideremus aliquid: Si enim flores  
sunt tales, & eo ordine quo Camer. exprimit, in  
ipsius icone siliquæ non videntur folis scitè ap-  
penasæ. Præterea si flores sunt racemosi nec figu-  
ra Matthioli. Lobel. & aliorum bona erit, in quibus  
singulares siliquæ ex ramis pendunt de breuibus  
pediculis: Est nobis solum in binas diuisum alas,  
datum Bononiæ anno 1563. per celeberrimum Me-  
dicum, omnique naturæ scientissimum, protecto-  
rem excellentissimum Dominum Vlysseni Aldro-  
andum.

Pulpa se-  
minum.

Tom. I.

Mm

Dioscoridi dicitur Siliqua [ *καρπύνη* ], vti etiam in Euangelio Diui Luca cap. 15. in parabola de Acolasto seu filio prodigo, qui cum porcis veluti *καρπύνη* dicitur, quod malè in versione Germanica *Träberen* id est Vinacea, redditur, vel *früsch* vt habet Tigurina, id est, surfur. Non enim Galli benè conuerterunt *Esforces* : & Itali *le sorze*. Horat. *uiuus siliquis & pans secunda*.

Siliqua.  
Ceronia  
Theophr.  
Ficus Aegyptia.  
Syl. Aegyptia.  
Ceronia.

Siliquam, ait Theophrast. grandibus ex ramis [ *καρπύνην* ] fructicare dicunt. Hæc [ *καρπύνη* ] enim fructum, vel ex iis fert, sed non multum : vocant enim Siliquam [ *καρπύνην* ] ex qua Ficus Aegyptiæ appellatur [ *καρπύνην αἰγυπτίαν* ] produciuntur. Fico Cypriæ similis est, quam Iones Ceroniam vocant : nam & ipsa caudice maximam fructus partem expellit, ramis autem [ vt diximus ] paucum fert fructum, Siliquosum verò [ *ἐλλοειν* ] quem aliqui Ficum Aegyptiam vocant errantes, ( nulla siquidem penitus in Aegypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum, Rhodumque ) foliis semper comantibus, flore candido & olente grauissimè, radice leuiter sublimi, atque omnino plantigera imis partibus est, superius tamen subarscens : Fructum anniculum simul, & nouum habet : altero namque detracto post Canis ortum, protinus alterum gigni patet : gignitur enim Vuæ modo indiscretus, atque vniformis : tum auctus circa Arcturum, & Aequinoctium florere : dehinc hyeme exacta, durat vsque ad canis ortum.

Siliqua  
Græca  
Ceronia.

Columell. huius obiter meminit : Siliqua Græca, inquit, quam quidem *καρπύνην* vocant ante brumam per Autumnum serenda.

Ceraunia.  
Ficus Aegyptia.

De hac Plin. lib. 13. c. 8. Similis his [ Fici Aegyptiæ ] Siliqua quam Iones Cerauniā vocant, trūco & ipsa fertilis, sed pōmo Siliquæ [ Siliquato Dalec. ] Ob id quidam Aegyptiam Ficum dixere, errore manifestio. Non enim in Aegypto nascitur, sed in Syria, Ioniæque & circa Gnidum, atque in Rhodo, semper comantibus foliis, flore candido, cum vehementia odoris : plantigera imis partibus, & idèd superficie flauescens, succum auferente foliole : pōmo antecedentis anni circa canis ortus detracto, statim alterum parit : postea florem per [ post ] Arcturum hyeme fœtus enutrient. Ad hęc lib. 15. cap. 24. Haud procul abesse videntur [ à Castaneis ] & perdulces siliquæ, nisi quodd in iis cortex ipsè manditur, digitorum hominis longitudo illis, & interim falcata pollicari latitudine. Ceratia quorū tertia syllaba per literam T & scribitur & pronuntiatur, nihil habet cum Cerasiis, per S. scriptis, similitudinis, monente Galeo. Scribit Hermol. Georgium Tiphernatem Ceraunium in Strabone pessimè interpretatum esse Siliquastrum. Gatinaria pro Xylocarata, vel Xara, vel Squila legendum putat & rectè, Siliquam. Arbitratus est aliquando Gesnerus, Siliquam *καρπύνην* & *καρπύνην* à Ceronia [ *καρπύνην* ] longe aliam esse arborem, cui opinioni non adhæreo, sed Clusium sequor, qui nullo discrimine eandem esse censet. Siliquas autem Græcis esse *καρπύνην* & *καρπύνην*, attestatur Cornarius, & hinc Xylocaractas officinas corrupta voce appellare. Enitè a tēn fuscus arbor, quæ *καρπύνην* vocetur.

Xylocaractas offic.

Siliquæ, inquit Matth. quæ Græcis *καρπύνη* dicuntur, in Italia officinis vulgò *Carobe*, & *Carobole* : in regno Neapolitano *Salequa* vulgò nominant, vocabulo nimirum à Siliqua detorto. Arabicè *Charub*. Germ. Sancti Johannisbrodi. Hisp. *Alfarabas*, Gall. *Caronge*. Aliud Siliquarum genus quod Ficum Aegyptium cognominant scripse-

Charub  
Arab.  
Ficus Aegyptia.

tradiderunt Theophr. & Plinius de quibus mihi differendum non proposui, quod Italici non cognoscantur. Hæc ille, qui mihi videtur parum considerasse verba Theophrasti & Plinii, quæ iam recitauimus, qui putant Siliquam siue Ceroniam, aliquibus Ficum Aegyptium dictam, diuersam à Siliqua siue Ceratia.

Merf. a Ceronia.

Matth. 23.

Et hanc erroneam Matthioli opinionem secuti sunt Cæsalpinus & C. Bauh. suspicantes Theophrast. & Plinium intellexisse Cassiam purgatricem, quæ longè diuersa, vt patet ex collatione vtriusque descriptionis : nempe Ceratiæ & Cassiæ, vt postea cap. de Cassia monemus. Meritò igitur Dalech. scribit apud Plinium : Siliquæ hæc nostra Carotia est. Falluntur qui arborem Iudæ esse putant, quoniam arboris eius ruber flos est, non albus, qui præterea Cassiam nostram fistularem opinantur non minus quàm illi decipiuntur. Est enim illi flos luteus, teste Theophrasto. Dalechampi sententiam equidem probamus : sed eius argumentum non validum, arbor enim Iudæ fert etiam flores albos, teste Clusio.

Cæsalp.  
C. Bauh.  
notantur.

Cassia purgatoria non est Siliqua. Arbor Iudæ non est fistulæ.

Dalech. not.

Lonicerus Sancti Johannisbrodi, quasi panem S. Iohannis diceret, Græcè Ceratiam, Latine Siliquam : & sic etiam Cordus in Diosc. Lacuna & Castor vocant. Scaliger in Theophr. Car. Cham. Turn. part. 2. Siliqua. Angl. *Carob* vel *Beane tree*, fructus *Carob coddes* vel *Carob beano* : malè Angli interpretes noui testamenti verterunt *Coddes* simpliciter, hoc enim vocabulum omni legumini commune est.

Péris S. Iohannis.

Caroba.  
Error interpretis. non in Testam.

Apud Turnerum pro Siliqua malè posita est figura Piperis Siliquastris. Anguill. describit, dicens, Siliquam arborem vocari Carobe, & *Cornaschie marine*. Lob. & Penz Adu. *καρπύνη*, Siliqua Carobe, Carobia Actuarii, & vulgò Prouincialium, antiquorum *καρπύνη*. Obleru. *καρπύνη* Siliqua : Gall. & Prouincialibus Carobe à Chaldeis, sic etiam dicta. Angl. *Selch tree* / Ital. *Siliqua* & *Carobe*, Hisp. *Algarrobas*. Icon. Plant. & Tabern. Ceratia siliqua. Prosp. Alpin. Siliqua dulcis, Carob, vel Carnab ab Aegyptiis dicta. Camer. hort. Siliqua siue Ceratia. Dodon. Gall. & Lat. in fol. *Ceratonia arborem* vocat. Hisp. *Garono* : *καρπύνη* autem, siliquam, aut Siliquam dulcem, in offic. nonnullis Xylocaractas : in aliis *Carobe* aut *Carobole* vocibus Italicis : ab Apulis verò *Salequa* vocatur : Hisp. *Alfarobas*, aut *Algarrobas*, & abque articulo *Garonas*. Cæsalp. Siliquam arborem appellat, *Carrubias*. Clus. Siliqua, Græcis *Καρπύνη* : Arborem Gall. *Caronger*, fructum *Caronger* : Ger. fructum cum Belgis S. Johannisbrodi, Hisp. arb. *Algarrobas* & *Garono*, & fructum : *Garono*, Hungari Germanos imitantur, vocantque fructum *Szent Iannis Renyeré*, id est, D. Iohannis panem.

Turneri error.

Quia autem in Siliqua, arboris propriè dictæ, Aequivoca tractatione versamur, scire hoc in loco conuenit, *Arbori Iudæ* Clusium Siliquæ sylu. nomen indidisse, non quodd Siliquæ Veteribus descriptio similis sit, sed quodd nonnullis Hispaniæ locis vulgari nomine appelletur. *Cassia purgatoria* à pluribus Siliqua Aegyptia, Indica, aut purgatrix cognominatur. Siliqua Gellii & Serui in Flaminiciis, quæ est Rhododender *siliquat* Dalechampi nobis Netium vocatur. *Azadarache* arborem Bellon. Siliquam nominat, quod meritò miratur Gesn. hort. cum baccas non Siliquas ferat, vide lib. 4. Siliquam Theophrasti Monardo & Hermolao *Smilacem hortensem* Dioscoridis cum Trago & aliis esse reor. Siliquam verò Columellæ, cum eodem & aliis *Fœnugracum* facio. de his lib. 17.

Arbor Iudæ.

Cassia purgatrix.

Netium. Azadarache.

Smilax hortensis. Fœnugracum.

Nascuntur.



**Locus:** Nascuntur arbores, quæ siliquas ferunt in regno Neapolitano, præsertim in Apulia, ac etiam in Campania, ut optimè sciunt iij, inquit Matth. qui Fundo Itrum, & hinc Molam iter faciunt. Valentino regno frequentissima est, autore Clusio, conspicitur & aliis Hispaniæ locis: nascitur verò apud Indos, aliòsque Orientales populos. Si Camerario fides non deneganda, ex semine facile crescit, sed in alterum, vel tertium annum, si vel parum negligatur, vix perdurat. Florere Ceratonia mox soluta Hycme prodidit Dodon. Vere appetente: fructus autem maturos sub Autumnum proferre. Xylocaratam vidi Patavij virentem Ianuario in olla apud D. Cortusium item in horto Palqualigo satis magnam arborem. Sicca folia accepi Bononiæ à Do. Vlyssè Aldroando: ex semine atbes nata est Montebelgard: & Sargardiz Ill. nostræ Ducissæ Sybillæ Anhaltinæ.

**Vires.** Siliquæ quidem virides sumptæ, autor est Dioscorides, & post eum Plinius, stomacho incommode sunt, & alium solvunt. Eadem siccatæ alium siccant, stomachoque commodiores sunt, & Urinam cient, maxime quæ Vuarum recrementis compositæ asseruntur (in *ἡ σιλικὴν οὐροβλήσινα*, Basilicæ Cod.) Locus hic haud dubie depravatus est, nec dum tamen mihi, ait Sarra-cenus, satis compertum est, quomodo restitui rectè possit. Plerique Græcos hæc siliquas, non minus quam Vvas ollares, & Olias quoque ipsas, in vinaceis condi componiue, quò diutius tutiusque conferuntur, atque de Siliquis eiusmodi conditiuis hic agere Dioscoridem existimant: sed non satis video, quamobrem ex instratis eo modo vinaceis Siliquæ ciende vinarum vim sibi ascriberent. Andreas Lacuna legendum censet, *τὴν ἐκ τῶν ἡλιουφύλων ἐκδομένην*, quæ sit n demum vinarum diece Siliquas voluerit Dioscorides, cum earum pulpa seu medulla prædulcis sola manditur, reiectis nimirum internis granis seu seminibus ac etiamnum cortice: quo modo congeneris plantæ, cassiæ nigre quæ & Aegyptia Siliqua dicitur, solam medullam seu pulpam usurpamus. Plinius certè quidem lib. 15. cap. 28. cum in pluribus semina placeant, in Siliqua damnari prodidit. Fortassis etiam ad differentiam cuiusdam Siliquarum generis, quod seminis granorumve experts fuerit, tale quid pronuntiare potuit Dioscorides. Serapio interpretatus videtur, Siliquas quæ multo aut sapa condiuntur: quod minus certè placet. Enimvero *σιλικὴν* quidem nomine non tantum musti reliquias hoc est, vinacea, olearumve nucleos, sed & τὴν αὐτὴν κατὰ τὴν φύσιν seu *σικκὴν ἡλιουφύλων*, hoc est, solida recrementa quæ vuis oleisve torculari expressis reliqua sunt, significari testantur Galenus & Athenæus: unde & Analogia quadam ipsa quoque Siliquarum semina & earundem tusarum expressarumque reliquiarum seu recrementa intelligi posse videntur. At verò *σιλικὴν* Græcis pro multo sapave accipi nesciam, quod sciam observatum est.

**Temperamentum.** Ceratonia, porro Galeno, exsiccantis est & astringentis facultatis, sicut & fructus eius, quem Ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis quiddam simile Cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt: sicca verò magis siccant, ut pote cum humiditatem expirent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant. Est Ceratia parvi succi edulium ac lignosum: quam rem necessario sequitur, ut concoctum sit difficile: nihil enim, quod lignosum est, facile concoquitur. Quin etiam incommodo id ipsis inest, haudquaquam

Tom. I.

aspernandum: quod non celeriter deiciantur. Proinde satius est à regionibus Orientalibus in quibus nascitur, ad nos non importari. Ex Siliqua dulci arbore, Aegyptii Siliquarum tantum usum cognoscunt. Alpino scribente, mel quidam ex ipsis extrahunt dulcissimum, quo Arabes Sacchari loco Cassias solutivas recentes ac paruas, zinziger, Mirobalanos, Tamarindos, atque alios multos fructus condiunt. Huius quoque mellis usus est frequentissimus vice veri mellis ad Clysteres, & aliqui etiam per os sumendum concedunt ad subducendam aluum: ipso etenim alius non minus quam pulpa Cassiæ ibi ad excretionem movetur. Utuntur etiam in renum inflammationibus eo, intus extraque appposito. Ad tussientes & asthmaticos ipsum non secus quam Cassiam exhibent, valdeque ipsos iuvat, nec minus decoctum ex siliquis paratum, eadem hæc præstat. Siliquæ recentior ab arbore decerpente ingrato displicent sapore, sed tractu temporis in cratibus expansæ & siccatæ, adeò mitescunt, ut & dulces evadant, & gustui admodum suaves fiant: Apud Indos siliquæ melleo adeò redundant succo, ut eo ad condituram Zinzibeis, aliorumque fructuum utantur, ut Matthiolus refert. Valentino in regno iumentorum in pabulum cedit, Clusius.

*Mel . . .  
Egypt ex siliquis.*

*Conditura  
in Clysteribus.  
Aluum movet.*

*Renes.*

*Pulmones.*

*Decoctum  
Siliquæ virides in  
grati saporem.*

## MANGLE PYRI FOLIIS CVM

SILIQVIS LONGIS FICV

Indicæ affinis.

**M**angle arbor est, inter eas, quæ in Occidentali India vulgariter nascuntur, selectissima cum ad edificiorum fabricas, tum ad reliqua fabrilia. Crescit viginosis locis, littore maris, saluginosisque fluminum & torrentium in mare delabentium ripis: folia habet maioribus Pyri foliis similia, crassiora tamen, & paulò longiora: Siliquas binos palmos longas, aut maiores, easque crassas, Cassiæ solutivæ fructui pares, fusci coloris, pulpam instar coaguli siue medullæ ossium similem continentes, quæ Indi aliorum eduliorum penuriâ vescuntur: etenim licet amara sit, salubrem tamen cibum esse ferunt. Ego nihilominus, [inquit Ouedus apud Clus. Exot.] ab eius usu in morbum incidi, tamen si adeò delicatus non sim, nec ab iis cibis abstinere in penuria soleam, quibus alios vesci video: quinimò nulla etiam virgente necessitate degustare non piget, ut commodius describere queam: easque de causa hunc fructum degustabam: sed brutorum animalium, & sylvestrium hominum potius cibis dicendus videtur. Admiranda autem eius arboris est natura: plurimæ enim simul crescunt, multive eius rami deorsum vergere, & in radices conuerti videntur: nam præter multos, quos erectos, folisque onustos atque ab invicem seiunctos, reliquarum arborum instar, habet, frequentibus etiam aliis crassioribus & tenuioribus *αφύλλους* sese ad aquam demittentibus, aut sub terra aut arena radices figentibus, prædita est: qui ubi apprehenderint, alios ramos sursum vergentes proferunt: etenim non minus firmiter hærent, quam primarius arboris truncus, sic ut ex multis caudicibus simul connexis videatur arbor: egregio sanè spectaculo, & singulari huius arboris natura: Hæc Ouedus.

Ferdinand. Lobez. de Castagnela cap. 3. lib. 7. *in Man.* Historiæ Orientalis Indiæ, meminit cuiusdam arboris nascentis in Prouincia Malaca, quam *Man-Lopez* appellat, radices caudicum instar sursum attol-

M m 2

lensis : An hæc nostra Ficus Indica inquit Clusius : Nos *Mangia* hic ponimus propter affinitatem nominis cum *Mangle*, cum qua etiam arbore respondere videntur, quæ Ferdinandus Lopez tradit.

## CASSIA PURGATRIX.

## CAP. II.

Descriptio

Folia.

Flores.



Siliqua.

Pulpa.

Semen.

Alpin de  
scrip.  
Ternera.  
Cortex.  
Folia.

Flores.  
Colore flo-  
ris variat  
Calyx.

Siliqua.

**C**assia fistularis sæpius mihi è semine natæ plantule, folio Nucis Iuglandis, oblongo mucronato: flores longis tenuibus pediculis herent, plures nudi veluti racematim ex ligula, eo modo, quo flores Laburni, foliis ea latitudine, vt vngue tegas, striatis, è quibus stamina longa emicant, quibus apices sulcati in-

fident : ex his nondum planè delapsis succrescunt Siliquæ, quæ paulatim grandæscentes, ad cubitorum duum longitudinem cylindraceâ formâ, digitum transuersum in diametro habent, colore nigricante, in quibus secundum longitudinem commissuratum veluti vestigia apparent spadicea, alterâ quidem parte duo, alterâ tria, intrinsecus membranulis ordine dispositis, intercipitur pulpa Eclysmatis consistentia, dulcis, nigricans, atque vna semen Tamarindo grano minus, compressius, coloris fului, ex oblongo rotundum, durum, nitida superficie, quod medium secat stria rubra singularis: rarius gemella semina inter parietes hosce veluti intergerinos inueniuntur.

Actur. arborem non attingit, ast Siliquam eius ita describit. Nigra Cassia est fructus fistulosus, teres, oblongusque, concretum intus humorem ferens, non vna coalescentem continuitate, sed ex intervallo intercedentibus lignosis tenuibusque membranulis septum, seminalibus granis, figurâ & specie non dissimilibus iis, quæ cognita nobis Siliqua profert. Porro non tantum ramos foliaque Nuci proxima scribit Alpinus, sed & truncum, cui cortex sit planus, mollis & cinericeus, qualis omnino in crescente Nuce spectatur: Folia multa, plura quam in Nuce, alata, ex quinque coniugationibus contexta, duplo Nucis foliis longiora, & in extremo aculeata [vel potius acuminata,] floribus colorem adscribit aureum. Cæsalpinus album, odorem valdè gratum præsertim Oriente Sole, quo fiat vt Aegyptii diluculo per Cassiarum loca deambulare sæpius odoris causâ confueuerint, quodd aurâ à Cassiis eximium ac gratissimum odorem spirantibus, ad ipsos delatâ, oblectentur, nasci autem Siliquas primùm contortas, pèrque maturitatem denuò dirigi: Quæ Pelusii in arboribus legantur, corticem habere crassorem, & parum intus substantiæ continere: Cayrinas verò & Alexandinas cortice

constare tenuiori, multaque substantiâ intus plenas, ex quo hæc cæteris omnibus bonitate præferantur. Et has duplicis esse differentie: etonim alias subrubras, quas *Abes* vocent, à calore illiusce gentis, cerni, quæ sint omnium optime: & alias nigras.

Est huius folij Pyri folio ferè simile, inquit Monardus: flos verò exiguus, albus, quinque foliis constans, ex quo enascuntur oblongæ Cassiæ Siliquæ.

Foliis, vt tradit Acofta, Mali Persici similibus est, nonnunquam angustioribus, locis præsertim ficioribus nata: floribus luteosis, aut flauis: arbor ipsa Amygdalæ magnitudinem æquat.

Garcia verò foliis est Mali Persicæ [non similibus] angustioribus tamen aliquantum, & virentibus: floribus Genistæ perquam similibus, luteis, Gnyophyllum odore referentibus: Quibus decidens succedunt oblongæ siliquæ, virentes admodum ante maturitatem, [non rubentes, vt Lac. Garcias] quæ maturitate nigredinem consequuntur, Monard.

Acoft. & Garc. eidem longitudine interdum quinque palmorum, nonnunquam infra binos palmos.

Persicæ Mali folia quodammodo æmulantur, si singularia separet, inquit Clusius: Quoniam verò coniugatim bina semper in oblongo neruo nascuntur, & summa ala postremum impari numerum faciunt, commodius meo iudicio, comparantur cum Fraxini foliis, aut similibus arborum, quæ alata folia ferre solite, & integra plerumque abscidere confueverunt, quemadmodum Iuglans, Sorbus, Rhus, Ceratua, &c.

Cæterum dispiciendum est, an stirps hæc Veteribus fuerit cognita, eiusve historia literarum monumentis mandata.

Ad Theophrastum igitur quod attinet, non videtur is huius meminisse, nisi sit ipsi, quod tamen non credimus lib. 4. cap. 5. Arbor Indica, cui fructum longum, nec rectum, sed contortum, cibo dulcem adscribit: sed morsus in aluo, difficultatèque facientem intestinorum: ob quod Alexander ne quis mandaret interdixit. Vide Hist. nostr. lib. 1. post Ficum Indicam, Arbores Indicas.

De Eiarxamber, id est, Cassia fistula ita scribit Serapio. Sunt canne concavæ, quarum color est rubrus, ad nigredinem declivis, & intra ipsas sunt Laminæ ex carne nigra, & parietes diuidentes inter eas, & inter Laminam & Laminam sunt grana Xylocaractæ & eiusdem magnitudinis, quarum color est inter glaucedinem & ruborem, & Cassia quidem afferretur ex India & Babylonia, & terra Aliemem. Et electa ex ea est illa, quæ est in Canna sua interiùs nigra, & grauis, & lucida, & quod de ipsa vitæ est cor vel caro eius interiùs.

Auic. Cassiam fistulam [Chaiarlander] duplicem facit. Dicit enim aliam *Kebuliam*, aliam *Aegyptiam*, Melliozem esse illam, quæ sumitur à Canna, & quæ est splendidior & pinguior: Et meliorem Cannam ipsius esse illam, quæ splendida est & plana.

Cassia genus est, quam ætas nostra, inquit Hermol. cognomento fistula appellat, & ab aromatica lignea discriminat, Veteribus ignotam. Quare scire oportet, si quando Cassiam Syringa [fistulam à Diosc. & Aretio & c.] lata fistula nuncupata] apud antiquos Græcos legere contigerit, non pro ea capiendam esse, quæ nunc ex Arabibus] *Cassia fistula* dicitur, colore rubro nigras, Lami.

Eiarxamber Serapioni.

Grana Xylocaractæ Locus.

Delectum. Vfus corporis, & vel carnis.

Chaiarlander. Auic. differentia.

Delectum pulpa. Canna delectum.



Laminis intus carnofis, quas parietina difcludit, feminibus Siliquæ Ceratæ, ad deiiciendam bilem vitam mirè valens: Inuenio, apud Græcos autem qui Paulum & Oribasium ita loquentes induxerit. Cassia Syrinx aduersus flauam bilem prodest: & item eos qui præter naturam pallescent: item Anginas & Laterum dolores & peripneumonicos: Hæc Paulus. At Oribasius refrigerari eâ inquit iecinoris calores inæperatos. Hanc recentiores Græci calidam & humidam abcessu primo perhibent, idem ferè Mauritanæ de Cassia quâ bilis per aluum detrahitur, & quæ propterea Cathartica dici potest.

Cassia Syrinx.

Cassia Cathartica.

Fistula non bene dicitur.

Cassia Syringodes, Veteribus ignota. Cassia fistulacea. Calamus. Cannas.

Cassia nunc appellatæ parum rectè *Fistula* nomen adiectum comprobat Marcellus: ait enim Siliquæ magis quàm *Fistula* nomen illi congruere: Veteres eam ignorasse aut vti noluisse.

Ignotam autem fuisse Dioscoridis, Plinii, & Galeni ætatibus Cassiam testatur Ruell. qui à Recentioribus Græcis Cassiam Syringodem id est, fistulaceam: ab Aëtuario Cassiam nigram: ab aliquibus Calamum, id est, Arundinem seu potius Indicam Cannam nominari scribit.

Curius sit esse Cassiam Syringodem (fistularem) arborem, non fruticem, itaque etiam vulgaris Iuglandis magnitudine, ex illorum monumentis qui eam viderunt & delinearunt, vocari Cassiam Catharticam, & Aegyptiam Siliquam, multis eam arbitrari, quæ antiquis Ligneæ Cassia dicta sit, quæ tamen subscribentibus Monachis in Mesueme eiusdem generis cum Cassia fistula non est, quæ antiquis Græcis incognita fuit. Idem tamen scriptum quandoque reperiri aiunt, siue impressum, Cassia fistula, vbi debeat intelligi Cassia ligneæ, vt e.g. in Antidot. Nicol. in el. quod intitatur Anudotum hæmagogum &c. quoniam plures sint species Cassiæ ligneæ, vt alibi ex Galeno ostensum.

Cardan. Siliquam Indicam, Cassiam nostram vocat.

Apud Syluium Cassiæ cortex, vt e.g. & Agnoscas, Cassia Aegyptiæ: Cassia Cathartica (purgatrix) Cassia fistula Arabum veteribus Græcis indicta, recentiorum Cassia Syringodes (fistulacea & nigra Aëtuario (scribenti passim *naucias* quæ dicitur *noctis*), à quo belle describitur), Synonyma sunt.

Cord. in Dioscor. Cassia fistula in usum Medicum ab Arabibus introducta, à recentioribus Græcis Cassia nigra appellata, cuius fructum Aristobulus Fabam Indicam vocat: Item hist. Siliqua Indica Veterum, Fabia Indica Recentiorum, Cassia solutiva seu laxativa.

Siliqua Indica. Fabia Indica.

Fuchs. de comp. med. Cassia purgatrix & Aegyptiæ. Nicolao *Fistula* & *fistularia*.

Quando Galen. i. de antid. plures enumerat Cassiæ species, & præcisè ab aliquibus fistulam dictam, quam iunior Andromach. reiiciendam censet, ne quis tam *quærens* aut fatuus sit, vt Cassiam illam fistulam cum hac Arabum & Officinarum solente Siliqua Aegyptiæ dicta confundat, prudenter monet Amatus, Ac etiam Theod. Dorsthenius: præsertim quum multum inter se differant, cuius inanimadvertentiâ multi, quum Cassiam pro euocandis mensibus legebant, non Cassiam illam Græcorum, sed potius Siliquæ huius purgantis cortices, mulienbus non sine ingenti periculo propinabant, vt Leoniceus prius aperuit.

Siliqua Aegyptiæ.

Error. Med.

Siliqua purgans.

Amatus de descriptio. Lignum fistulatum.

Arbor Cassiam fistularem ferens procera est, inquit Amatus, foliis Nucis, per ordinem veluti in Fraxino dispositis, cui cortex cinericei coloris, quo detracto rubicat in superficie lignum solidum, intus nigrum, quod dum vritur pessimè

olet. Ceratium propter semina, quæ huic Siliquæ Aegyptiæ, Cassia fistularis dictæ, feminibus sunt similia, Cassia fistularis appellanda non est, quam omnino non abs re esset, affirmare Siliquæ arborem, speciem Cassiæ huius fistularis esse, unde non immeritò quidam Cassiam fistularem, Siliquam Aegyptiam appellant: Imò Federicus à Rocha; sola tantum ratione has arbores differre putat, propter siliquas, quas maximam habere similitudinem ait, & vtrasque in arbore eodem modo pendere.

Non est Cassia Veterum inquit Corn. quæ hodie Cassia fistula vocatur, & cui fructus ad cornu similitudinem teres ac longus est, nigrum habens intus medullam, quam etiam atramentum vocat, membranis distinctam, & nucleis talibus, quales in Siliqua quam vulgus *panensis*. Ioannis vocat, cernuntur.

Cassia fistula.

Culm. in Aegypto tanta proueniat copia arborum Cassiæ, mirabatur Belsionius Veteres eius nullo modo meminisse: vt & Theophrastum, qui penè de omnibus reliquis plantis Aegypti locutus sit, eius non meminisse: nisi q. capite lib. 4. eius mentionem fecerit, vbi ait sibi relatum, tantæ magnitudinis arbores ibi prouenire, vt tres homines non possint amplecti. Suspicio autem eius inde proficitur, quod Cassiæ arbores inibi sint crassitudinis & altitudinis Nucum Iuglandium, simileque folium habeant.

Arbores maxima. Theophrastus.

A Matthiol. in Dioscor. vocatur Cassia solutiva, Aegyptiæ Siliqua Recentiorum quorundam, cuius arbor inter valdè proceras annuerari possit, materie solidâ, compactâque: cortice tenui buxo colore, medullitibus verò nigra, non secus ac Ebenum, siue Guaiacum: Recente grauius olente, sicca tamen minime: folio Siliquæ, sed magis in acutum tendente, cortice cineritio: radicibus magnis Iuglandis modo: à ramis siliquis pendentibus prelongis, terebibus, densis, nigra dulcique medullâ repletis, non vt in ossibus continuâ, sed crebris lignosisq; membranis distincta: inherente vnique membranæ semine duro, Siliquarum semini aded simili, vt alterum ab altero discerni non possit: ex quo eum non errasse putauerit, qui crediderit has plantas esse congenere. Sed quicquid dicat Matthiolus, attamen semina in Siliqua arbore non sunt ita similia Cassiæ feminibus, quin facile discernantur: enim sunt minora, & diuersi coloris: Apud Matthiol. olim nulli appicti flores, in Italicis verò & Germ. Hist. additi, non tamen eo ordine quo oportebat, flores enim non sunt singulares, sed multi dependentes ex longo pediculo, eo modo quo Laburno: particulares aliqui flores satis commodè expressi essent in Matthiolo si haberent apices multos.

Siliqua. Materies. Cortex.

Matthiol. vocatur.

Camer. hort. Cassia Aegyptiæ siue purgans. Epit. & Hist. Matthiol. Germ. [vbi pulchram appositam figuram particulariam florum] Cassia solutiva.

Flores aliquando communicari Gesnero, Florentiæ mihi siccos datos, cuius rei testimonium extat in eius epist. quadam ad Ottonem vbi ait. Cassiæ Aegyptiæ florem vnum atque alterum attulerat mihi ex India Ioh. Bauhinus, quem pingendum curavi: Matthioli editio Germ. flores aliquot habet, sed non ita bene pictos, neque in sua serie. Idem de hort. Cassia fistula, seu nigra, Alexandrina, Siliqua Indica. Castor falsam Matthiol. figuram habet. Alpini figura placeret, si flores particulares exprimerentur. Tabern. malam habet figuram. Apud Theod. Dorst. similiter inepta icon, quam pro Cassia ligneâ pos-

Matth. misit. natur.

Theod. Dorst. vocatur.

nit, Cassia fistula dicitur. Monardo, à Costæ & Garcia Cassia solitaria.

Euch. Roessl.  
mutatur.

Euch. Roessl. per Cassiam fistulam, Cassiam solutam intelligit, verum pictura eius mala: inest præterea Cassiæ fistulæ semina cum Pæoriz feminibus comparat. Leoni Afric. figura mihi videtur falsa. Dodon. Lat. in fol. Cassia nigra Veteribus incognita, vel adeo neglectim habita, vt eius non meminerint.

Siliqua.

Lobel. Obseru. Cassia purgatrix: Officinis, Gallicis, Germ. Belgis, Italis, Anglis Cassia: Hisp. Canna fistula. Icon. Plant. Siliqua, aut Cassia purgatrix Arabum, Carobius similis. Figura non bona, nec etiam Dodonzi.

F. Mori.

Cæsalp. Cassia, cuius Siliquæ afferuntur ex Alexandria, meliores & ex Occidentali India, tradunt arborem in Aegypto nasci crassissimam: foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, [nos vidimus ex semine nuper natam folia Siliquæ produxisse] flore lato, candido: copioso fructu, vt præponderare rumpantur rami, nisi ante maturitatem leuentur. In India traditur arbor Pyri magnitudine: foliis Persici angustioribus, & videntioribus: foliis [floribus] lego Genistæ luteis, odore Gariophylli, quibus decidentibus Siliquæ longæ subnascuntur &c. Videtur Theophr. hanc intellexisse, cum Siliquas quasdam Ficus Aegyptias appellari scribit, & fructum anniculum nouum exipere, subnasci aut nouellum fructum sub Cane: postquam alter detractus fuerit, veluti racemum vniiformem, qui in Autumno explicetur in flores candidos, deinde per Hyemem vsque in Aestatem enutriti: folio perpetuo. Quæ omnia magis Cassiæ conueniunt, quam Siliquæ supradictæ. Plinius quoque tanquam alteram videtur intellexisse, cum de Ceronia appellata, transcribit ex Theophrasto ea, quæ dicta sunt. Hæc Cæsalpinus, cuius opinio erronea. Non enim Theophr. libro quarto capite secundo. Et ex eo Plinius, intellexit Cassiam purgatricem, sed Ceroniam siue Siliquam, vbi ea describitur & non diuersa planta: Vbi etiam obseruat Cæsalpinus albo flore non demonstrat: Fortè Cæsalpinus id scribit, quia existimabat à Theophrasto traditam, cur dicat folium à Theophrasto perpetuum dictum magis conuenire Cassiæ quam Siliquæ, nescimus: Certum est Ceroniam folio esse perpetuo: Cassiam Aegyptiam foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, & prodiisse foliis Siliquæ mirum est: folia enim trium harum arborum multifariam inter se differunt: à nobis satis feminibus sæpius prouenerunt plantulæ, in quibus folia acuminata, qualia pinguntur ab Alpino & in figura nostra emptina, non rotunda vt Siliquæ, quod ille ait. Quid si Cæsalpinus seuerit Ceroniam pro Cassia, vel vtramque, & prouenerit tantum Ceronia, quæ melius durat faciliusque prouenit, quam Cassia: illud etiam considerandum, an Indica Cassia differat foliis Persici ab Aegypto, flore non differre iam ex Alpino [qui in Aegypto aurei coloris esse scribit] demonstratum, quamuis differenter, nempe coloris lutei dicat Cæsalpinus. Theophrasti & verba Plinii demonstrant manifestè Cassiam diuersam: Siliquæ enim non ex trunco, vel ex ramis crassioribus, sed ex extremitatibus, ex longo pediculo, Laburni vel Anagyridis modo. Idem nobiscum sentit Dalechampi cum scribit, falli qui Plinii Siliquam Ceroniam, Cassiam fistularem nostram putent, Cassiæ forem luteum esse, non album.

Genista flor.

Ficus Aegypti.

Siliqua altera.

Cassia p. mori.

Cæsalp. Cassia, cuius Siliquæ afferuntur ex Alexandria, meliores & ex Occidentali India, tradunt arborem in Aegypto nasci crassissimam: foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, [nos vidimus ex semine nuper natam folia Siliquæ produxisse] flore lato, candido: copioso fructu, vt præponderare rumpantur rami, nisi ante maturitatem leuentur. In India traditur arbor Pyri magnitudine: foliis Persici angustioribus, & videntioribus: foliis [floribus] lego Genistæ luteis, odore Gariophylli, quibus decidentibus Siliquæ longæ subnascuntur &c. Videtur Theophr. hanc intellexisse, cum Siliquas quasdam Ficus Aegyptias appellari scribit, & fructum anniculum nouum exipere, subnasci aut nouellum fructum sub Cane: postquam alter detractus fuerit, veluti racemum vniiformem, qui in Autumno explicetur in flores candidos, deinde per Hyemem vsque in Aestatem enutriti: folio perpetuo. Quæ omnia magis Cassiæ conueniunt, quam Siliquæ supradictæ. Plinius quoque tanquam alteram videtur intellexisse, cum de Ceronia appellata, transcribit ex Theophrasto ea, quæ dicta sunt. Hæc Cæsalpinus, cuius opinio erronea. Non enim Theophr. libro quarto capite secundo. Et ex eo Plinius, intellexit Cassiam purgatricem, sed Ceroniam siue Siliquam, vbi ea describitur & non diuersa planta: Vbi etiam obseruat Cæsalpinus albo flore non demonstrat: Fortè Cæsalpinus id scribit, quia existimabat à Theophrasto traditam, cur dicat folium à Theophrasto perpetuum dictum magis conuenire Cassiæ quam Siliquæ, nescimus: Certum est Ceroniam folio esse perpetuo: Cassiam Aegyptiam foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, & prodiisse foliis Siliquæ mirum est: folia enim trium harum arborum multifariam inter se differunt: à nobis satis feminibus sæpius prouenerunt plantulæ, in quibus folia acuminata, qualia pinguntur ab Alpino & in figura nostra emptina, non rotunda vt Siliquæ, quod ille ait. Quid si Cæsalpinus seuerit Ceroniam pro Cassia, vel vtramque, & prouenerit tantum Ceronia, quæ melius durat faciliusque prouenit, quam Cassia: illud etiam considerandum, an Indica Cassia differat foliis Persici ab Aegypto, flore non differre iam ex Alpino [qui in Aegypto aurei coloris esse scribit] demonstratum, quamuis differenter, nempe coloris lutei dicat Cæsalpinus. Theophrasti & verba Plinii demonstrant manifestè Cassiam diuersam: Siliquæ enim non ex trunco, vel ex ramis crassioribus, sed ex extremitatibus, ex longo pediculo, Laburni vel Anagyridis modo. Idem nobiscum sentit Dalechampi cum scribit, falli qui Plinii Siliquam Ceroniam, Cassiam fistularem nostram putent, Cassiæ forem luteum esse, non album.

Hist. Lugd. καροία μέλαινα, Lat. Cassia nigra, Me-

dici, Sepalsarique Arabum, à quibus inuenta est, sectatores, Cassiam fistulam vocant, alii Cassiam solutiam, alii Siliquam Aegyptiam, siue Catharticam. Siliqua de Italis Cassia & vulgo Cannella, Germ. Zimmetkörz, Optina/ Hisp. Canela, Gallicis, Caste. Compilator Hist. Lugdunensis ineptè adscribit Siliquæ Aegyptiæ, siue Cassiæ nigre, siue Cathartice, vulgo dictæ etiam Cassiæ fistula, Canella appellationes, & Zimmetkörz.

Porro, à Costæ & Garcia testibus, Arab. vulgariter dicitur Hiarramber, vt & Persis, atque Turcis, asserit tamen Coggecel Medicus Persa, hoc vocabulum merè Persicum, Arabicum verò legitimum esse Gazafalus: in Malauar Comdaca, vel Condaca: in Canara Bauasinga, Hafasinga & Bauasinga, in Decan & à Bramenis Bauasinga, arbor verò Baua, & Baboo, quemadmodum & in Canara, in Guzarate & à Mauritanis regnum Decan incolentibus Gramala, seu Gramalla. Cæsp. Bauh. dum apud Matthiol. non citato Cæsalp. annotat [an Cassiam purgatricem intellexerit Theophr. cum Siliquas quasdam Ficus Aegyptias appellari scribit] finistram opinionem Cæsalp. propriam facit, quod non fecisset si textum Græcum consuluisset, & Cæsalpini nomine eam opinionem introduxisset, vt debebat, siue bonam siue malam.

Cassia Cathartica partim in India, partim in Aegypto nascitur folio Iuglandis. Alexandria sibi visam Ponticus Facinus Hermolao retulit. Negotiatores in hortis Alexandria nascentem proferunt, iam & Asiæ communis facta dicitur. Scribit & apud nos, [Venetianos] verum frustra: quia nec ad frugem peruenit & celeriter opprimitur. Ruellius & Curtius alienis penis se ornantes, hæc de loco transcribunt suo nomine. Insulæ Divorum Dominici & Ioannis de Portu diuite, tantâ quantitatē nobis transmittunt Cassiam solutiam, vt non modò Hispaniæ, sed etiam toti Europæ, atque adeo vniuerso orbi sufficiat: nam & in Orientem, vnde deferri solebat, plures naues eâ onustæ vehuntur, quàm Cantabri ferrum mittunt. Multa Cassia solutia nascitur in Cayro, & perlicque aliis Prouinciis tum Orientalis tum Occidæ Indiæ. Præfertur tamen quæ ex Orientali delata est, quæque locis ad Septentrionem magis vergentibus nascitur. Tanta est eius frequentia in Cambaya, vnde præstantissimam aduehunt, vt vnus Candil [quingentarum & viginti duarum librarum pondus hoc est] pretium, non æstimetur plus quàm nummo aureo, qui trecentos & sexaginta marauedis [æreos obolos Hispanicos valet. In montibus verò Cranganor, & per vniuersam Prouinciā Malabar [quando eius maxima pretium] singulæ libræ viginti marauedis redimipossunt, hoc est, paulò plus quàm dimidio regali Castellano, siue batzio Germanico. Nascitur in Malauar, Canara, cuius prouincia est Goa, Decan, Guzarate, præstantissima tamen & durabilior locis ad Septentrionem magis vergentibus, vt in Cambaya. Inuenitur & in Cayro, tum in Malaca, Sofala, Sian, totòque orbe tractu. Hanc non nisi syluestribus spontè factam, vidi, inquit Garcias, in America tamen, [quam falsò Indiam Occidentalem appellant, quandoquidem vnica sit India ab Indo flumine denominata, Veteribus cognita] intelligo è syluestribus locis tralatam esse in hortos & agros, ita vt nunc istic frequentissima sit. Fortunatiores tamen nostros Lusitanos puto, apud quos sine fatione tantâ copiâ nascitur, vt vnus Candil, hoc est, quingentarum & viginti duarum librarum pretium non excedat, decem regales Castellanos, qui

Locus & tempus.

Ruell. & Curt. not. Cassia solitaria.

Candil.

Cassia sponte nascitur.

Error 1860, gni pens omnium.

Candil quid sit



*Pardoon.* qui constituunt aureum Indicum Pardoon nuncupatum. Camer. scribit si semina bene macerentur provenire instar Siliquæ. Arborem florere incipere mense Iunio, florere toto mense Iulio Alexandriæ & Cayri tradit Alpinus: Pelusij verò, nuac Damiatæ, mense etiam Septembri florere vidit. Cannæ vel fistulæ toto anni spatio maturantur, totoque anno in arbore manent, quas Aegyptij Iunio tantum Cayri colligunt, quo tempore multæ parvæ recenter ex primis floribus productæ virides spectantur, Phaeolorum siliquis valde similes: quæ paulò post crescentes, paulatim viridem colorem in nigrum commutant. Quæ in America reperitur arbor, Cassiam ferentes, non ita præstant vt Aegyptiaca aut Arabica autore Theueto. Ad litus à Sumatra dictum, Cassia fistula crescit adeò ingenti copia in sylvis, vt ex ea multitudine, teste Linschottano, naues onerariè repleti possent, sed non colligitur ab incolis. Arbores celsæ sunt & patulæ ex quibus dependent Ceratiorum instar Siliquæ, virentes aut Cineræ: Sed quæ maturæ factæ, sunt spadicæ. Crescit copiosè in Sunda.

*Vires & Tempera.* Cassia fistula, auctore Mesue, calido frigido temperata, nisi quod paulò est calidior, humida primo gradu, clementer & innoxie à ventriculo bilem & pituitam purgat leniendū, febribus inde ortis confert, sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac eius sanguinis & bilis fluxu acrimoniam frangit, resolvit thoracis pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas, cæque partes lenit, ipsa morbus expers, sitim sedat, præsertim sumpta cum succo Intybi, vel Cichorii, vel Solani arte depurato, Intèperiem denique renum calidam mitigat, cum diureticis sumpta & Glycyrrhizæ decocto, ob idque calculum in his gigni prohibet. Si autem viscera sunt sicciora, Cassiæ lubricitas augenda est oleo Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrtobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel spica addita: Si ad vias Vrinariæ ferri eam volumus, vetrica misceantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale Thymum, Hysopum) actionem intendens, misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: effaciatque purgat, hæc, si ex fero lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, vt omni ætati & ipsis etiam pueris, & prægnantibus tutò sumatur. Sapor eius est dulcis, inquit Aben Meshar, & virtus eius prompta est, quòd ipsa est æqualis complexionis: Et virtus eius tertia est, virtus quæ extinguit acuitatem sanguinis, & sedat apostematata dura, quæ sunt in gingivis & gutture, quàm sit ex ea gargarisma, & confert icteritiæ, & dolori hepatis. Et proprietas eius est purgare cholera adustam, & mollicare ventrem mediocri mollicatione, & dosis eius est à drach. iij. vsque ad decem: mundificat nervos. Rhasis: Melior ex ea est, quando extrahitur à Canna, & est æqualis inter caliditatem & frigiditatem, laxat ventrem cum temperamento, confert apostematibus calidis, & maximè gutturis, & declinat ad caliditatem, plùs quàm ad frigiditatem, adeò vt ferè perueniat ad principium primi gradus, & desertur de Babilonia & Alabastra.

*Apothema.* Chaia randeri iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Correptio.* sunt sicciora, Cassiæ lubricitas augenda est oleo Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrtobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel spica addita: Si ad vias Vrinariæ ferri eam volumus, vetrica misceantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale Thymum, Hysopum) actionem intendens, misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: effaciatque purgat, hæc, si ex fero lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, vt omni ætati & ipsis etiam pueris, & prægnantibus tutò sumatur. Sapor eius est dulcis, inquit Aben Meshar, & virtus eius prompta est, quòd ipsa est æqualis complexionis: Et virtus eius tertia est, virtus quæ extinguit acuitatem sanguinis, & sedat apostematata dura, quæ sunt in gingivis & gutture, quàm sit ex ea gargarisma, & confert icteritiæ, & dolori hepatis. Et proprietas eius est purgare cholera adustam, & mollicare ventrem mediocri mollicatione, & dosis eius est à drach. iij. vsque ad decem: mundificat nervos. Rhasis: Melior ex ea est, quando extrahitur à Canna, & est æqualis inter caliditatem & frigiditatem, laxat ventrem cum temperamento, confert apostematibus calidis, & maximè gutturis, & declinat ad caliditatem, plùs quàm ad frigiditatem, adeò vt ferè perueniat ad principium primi gradus, & desertur de Babilonia & Alabastra.

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

*Chaiarlanderi* iuxta Auicennam est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida, Est resolutiva & lenitiva. Confert apostematibus calidis in visceribus, & propriè gutturis, quando ex ea fit gargarismus cum aqua Solatri, & lenitur super apostematata dura, & confert eis. Leniuntur ex ea Podagritæ, & iunctura dolorosa: Gargarismus ex ea

cum mucilagine Pssyllij dissoluta praefocioni confert. Mundificat hepar & confert icteritiæ & dolori hepatis. Est lenificativa ventris: Et educit cholera adustam & phlegma: & soluit sine no-cumento, & absque mordicatione, adeò quòd ipsa est conueniens prægnantibus, & soluit eas. Loco eius ponitur pondus ipsius de Teneribin: & triplum ponderis ipsius de carne passæ: & octaua ponderis ipsius de Turbith: & quandoque ponitur loco passularum succus Liquiritiæ: Cassia vt docet Aetarius, tribus vel quatuor drachmis vix mouet aluum: fluxuam bilem, sed magis retortidam, & quæ iam in atram degenerauit, extrahit, quin etiam pituitam edocit medicorem: præbemus quibus potentius medicamen aliud dari non potest: nimirum pueris & sceminis vtero ferentibus, commoditate & necessitate urgente representamus, & iis quibus exuperans febris reliquorum medicaminum vltus respicit. Temperatos, inquit Monardus, illos efficit, qui Cassia ventur: vtilis maximè in renum & vine morbo, duabus horis ante cenam sumpta: Desfluxionibus prodest, duabus à cena horis. Assiduus illius vsus ante prandium aut cenam calculi generationem prohibet. Foris cum Amygdalarum dulcium oleo illita, graues pulmonum & renum dolores mitigat. Dosis pulpæ eius est a. 3. ad sescunciam vsque: non eximptæ verò, quatuor vnciarum. Lenit, resolvit, sanguinem depurat, eiusque & bilis calorem infingit. Humida est in primo gradu, ad calorem, sed mitem tendens. Porro huius flos duobus modis condiri solet, nepe aut cum Saccharo tritum, rosati Sacchari modo: vel flos integer Saccharo exceptus, & vnà coctus: vtrique ratione bene sapit, & sine molestia euacuat, sumptus ad duarum aut trium vnciarum pondus: si aliquod inest vitium, inde accidit, quòd viliore Saccharo excipiat ureole dem effectus præbet, quos ipsa fructus pulpa. Carterum, eos qui Cassiam solutiuam ad ventrem leniendum & euacuandas faeces præscribunt, admonitos volo: ait idem ille, vt eam breui admodum spatio ante prandium sumendam esse præcipiant, nempe ad summum dimidia hora, quoniam cum cibis mixta, simul cum illis facultates exerit, eaque ratione facilius & sine molestia opus suum molitur, quod minimè facere potest, quæ duabus aut tribus horis ante cibum sumitur, vt hodie vulgò fit, quoniam cibi summptionem differendo, peragere suum opus cupit: & eam sit valde debilis, prorsus in vapores resoluatur, per vniuersum corpus sese diffundentes: & si diutius cibum differatur, in alimentum conueritur: quod multorum annorum, quibus medicinam feci, experientia didici: propterea semper illam solummodo dimidia ad summum horâ ante cibum exhibere soleo: facillique est eius operatio: si verò multis horis ante cibum datur, parum admodum euacuat: Purgantia verò medicamenta cum cibis permisceri, auctor est Hippocrates multis locis, atque etiam Galenus in commentariis. Verum quidem est, multis horis ante cibum dari solere, quando non euacuare, sed vapores, duntaxat per renes & reliquum corpus diffundi cupimus. Cassiam salubrem perhibet Syluius fanis & agris, ad aluum clementer leniendam, quouis tempore tutam, etiam initio e-pulartum, aut paulò ante cenam: hodie dari cortice, membranâ, & seminibus per cibum purgatam, ab Vncia dimidia ad sescunciam, vel drach. 10. manè vel ante cenam: sed paulò ante passus duos, tres quatuorve proximos, drachmis duabus vel tribus: his, quibus sit alius naturâ pi-

*Hepar.*  
*Cholera ad-*  
*usta &*  
*phlegma*  
*Prægnan-*  
*tes*  
*Substitu-*  
*Dosis.*  
*Triplum*  
*Pituita.*  
*Gravitas*  
*et puritas.*

*Cassia  
munda.  
Semen ab  
purgari*

grior : In quem vsum quibundam incundius sit pulpari lata cuspide exceptam deuorare : conditam Saccharo ab Indigenis dum recens sit ostendere Lusitanos & Venetos : Quam autem vim purgatoriam tribuit Monardus [ Syluius imponit Monardo, apud eum hæc non legimus, sed apud Fallopium ] semini ipsius [ maiorem scilicet quam pulpæ ipsi ] non recipiendam confirmare Musam suo multiplici experimento, se periculum nondum fecisse. Corticem verò eius ad mouendos menses, aut putum inuadendum iustitiationem esse multò, quàm Cassiam aromaticam.

Mutan Ambrosium Paracram insignem aliqui Chirurgam Regiam & alios plures adhuc præscribere cortices Cassiæ fistularis, ut vocant, ad facilitandum partum, hæc à pluribus præmoniti id potius obitare & obesse, quàm prodesse intellexerint.

Hallucinantur, seu antè insinuatam, qui Cassiæ fistulæ [ Græcorum antiquorum ] loco, Siliquam Aegyptiam siue Cassiam solutiuam vulgò dictam medicamentis adniscunt, Muritanos fecerunt, siquidem Serapio, Auicennas, Mesuëque, siue scitiorum, suas Interpretum lapsus, inquit Matth. Cassiam nigram, Cassium fistulum vocant : certè crediderim dici posse in omnibus iis medicamentis à Mauritanis inuentis [ quibus verbis excluduntur compositiones eorum à Græcis transcriptæ ] quæ Cassiam fistulam expetant, solutiuam illam esse inferendam, nisi Medici in eum errorem labi velint, in quem Leoniceus quosdam incurrisse testatur, qui ad commouendos menses, difficiles partus, remorantēque secundinas, Cassiæ deiectione corticibus, odoratæ loco utebantur. Sed nimis temerè Matthiolus Serapienem, Auicennam, Mesuëque erroris inculcat : Mauritanii loco Cassiæ fistulæ Græcorum non adniscunt Cassiam solutiuam, sed id fictitantur imperiti quidam, non animaduertentes Cassiam solutiuam ab illis quoque fistulam nuncupari. Ipsum distinguere potius decebat, inter Græcorum antiquorum Cassiam fistulam, quæ est Cassia odorata à Dioscoride, & Galeno descripta, & inter Cassiam fistulam Arabum, iuniorumque quorundam Græcorum, [ vt Aëthari & Nicol. Myrepsi ] quæ est Cassia purgatrix. Nunquid porro Cassia hæc eadem ratione, quâ Cassia Galeni fistula dici meretur ? Sed exterius illa Erysipelas extinguit, cæteræque inflammationes, quæ cuti tenus emergunt.

*Inflammasiones.*

*Picra pulvis.*

Sunt è recentioribus Medicis qui eam nunquam suis ægrotantibus exhibent, ni Picra puluerem admiscant, quod consilium factum existimat Matthiolus, præsertim si ventriculi & intestinorum imbecillitas adsit. Ego verò malim separatim dare alternis diebus, mirè enim ingrata Cassia cum Hiera. Post illius sumptionem cibum non quidem statim : sed aliquanto & exiguo post tempore exhiberi optimum esse existimat Mundella, quem sequitur Amatus quamuis eum non nominet.

*Error quorundam.*

Quod de Cassiis aliqui dixere optimas cannas manibus concussas sonum non edere, ibi planè falsum obseruatur [ teste Alpino ] quando omnes recentes motæ sonum edant, atque etiam in arboribus Cannas à ventis motas, seminibus intus matris, multum sonum edere, quotidie prope eas habitantes audiant. Quod etiam dulces Siliquæ faciunt. Quæ verò ex Cassiis non sonant ab Aegyptiis vituperantur opinantibus id ob aqueam humiditatem intus collectam vitiatâ pulpâ accideret.

*Sonum edunt. Delectus.*

Neque immaturæ colliguntur vt aliqui referunt, emittunt verò sæpe sæpius ab aduenis mæcatoribus senio confectæ, cum ingens copia sæpe in ædibus ad eam rem parata, annos ad vique quadraginta conferuntur : collectas enim ex arbore continuè in opportuna loca sic ita claudunt, vt nullus aer ingrediatur, cum ex minimo aeris contactu Cassiæ corrumpantur. Hincque sæpius ad nos vetustate vitiatæ ac etiam acidæ mitti solent : quam obrem monitos esse velim omnes Medicos ac Pharmacopæos ne posthac se decipi sinant, & semper ex illis seligant recentes, quantum quærit amentem : quandoquidem iuniores recentioresque inutiles, neque à noxa immunes obseruantur. Vtuntur verò nostri quoque fistularum pulpa vel in bolis, vel in potione parata. Est hæc pulpa quoad calorem temperata, atque humida supra primum gradum, bilemque ac etiam pituitam à stomacho, atque venis mesenterici educt, & sanguinem calidiorem temperat atque puriorem reddit. Abyssina vocata cæteris præfertur ad morbos biliosos, ac melancholicos, præcipueque in affectibus pectoris à distillatione acutorum humorum concitatis, quibus mirè subuenit : pulpa hac cum Saccharo candido, & Liquiritia pro secreto vti solent, ad renem velicæque vitia : renem enim extinguit immodicum calorem, humorēque ab his partibus abstergit, atque per vrinam expellit, proinde ipsius frequentu vti homines se à calculis præcauent. Eà etiam vntur ad tussim antiquam dispoenam, asthma & orthopnoeam, cum Agatice, pro calidis articulis doloribus, maximeque in podagra dolentibus partibus emplastri modo ipsam adhibent, nec non ad calidas inflammationes eodem modo eius vsum sequuntur : Siliquas verò Cassiarum, proinde ac Phaeoli paruas vides, in aqua prius parum ebullitas, & mox in ymbra ab humiditate siccata Saccharo vel melle coniungunt, atque ad vsum seruunt puerorum delicatarumque mulierum, exhibent verò ad summum eas vique ad vncias quatuor, & ad vnciam in pueris, hisque vtuntur ad eosdem nuper dictos affectus. Errare eos scribit Camer. qui existimant semina Cassiæ purgare, quia potius adstringant, nec credendum esse cortices Siliquarum eius mouere menses & pellere secundinas. Quibus naufragibus est ventriculus, iis ex sententia Tabern. non est danda Cassia, sicuti nec iis quibus ventriculus imbecillis & humidus aut quos diarrhoea tenet, adeo autem elementer purgat, vt præterquam ex ventriculo aut ex paulo vlterioribus visceribus trahat, in ardentibus febribus & imbecillitatibus, consilium est, id quod nullis familiare, ante venæ sectionem corpus Cassia purgare : primas verò tenet, inter cholagoga. Vtiliter quinetiam datur in Thoracis morbis, quos saluti catathi concitauerunt, ad calorem committamque bilem mitigandam, educendamque : prodest etiam hepati calidiori, aduersusque omnes febres ardentes, tempore potissimum calidiore.

*Reservatur ad 40. annos.*

*Aeris contactu corrumpitur.*

*Recentes eligenda.*

*Vsum apud Aegyptios.*

*Pulpa. Bilem pituita.*

*Thoracis affectus.*

*Secretum.*

*Renem.*

*Præseruatio à calculo.*

*Arthritidis.*

*Siliqua condita.*

*Dosis.*

*Semina non purgant.*

*Febriu ardens.*

*Thorax.*

*Ardori vrinæ non conuenit.*

*Cassia trita.*

semina



*Semen pur- gat.* semina tradit Fallopius; eò quòd in omni parte lignosa robustior sit euacuandi facultas, quàm in pulpa ipsa, id quòd se expertum habet, & casu primum in duabus Simiis inuenisse scribit:

*Cassia Ceyrina.* Ait præterea Cassiam in officinis vscatam vnam haberi ex Cairo, nigriorem & maiorem: & alter ex Alexandria rubicundiorē & minorem. Ex ambabus autem eligendas esse maturas: maturitatem quidem autim naturitatem, non ex rubedine & nigredine, ex paritate & magnitudine: sed ex aciditate diu licenda n esse: si enim mordet valde fauces, indicari quòd sit matura: de-  
*Maturitas tur indicat.* cipi vòd eos, qui contrarium teneant, pronun-  
*Lapsus multorum.* ciat. Pulpa Cassiæ recens extractæ in vulgari est vsu, in grauissi nœ capitis affectibus, quum etiam Lenituum singulare & benignum planè medicamentum existit. Sed in me ipso, ait Quercetanus, sæpius contrarium n animaduerti. Cùm enim Cassia sapore sit dulcis, faciliè blescit in bilio-  
*Cassia bi- tescit.* so temperamento, vt & Manna. Adde etiam si ex ea in balneo vaporoso proluciat distillatione aqua, ex illa promanare (vt ex melle) aquam mirum in modum fortem, acrem & mordacem, atque adeò summè calefacientem. Idcirco cùm vscipabitur Cassiæ vsus: id summa cautione & circumspectè faciendum est: exploratà videlicet vniuersumque naturà & constitutione, cui ea præscribitur, siquidem pituitosus, & obesi & crassi corporis constitutione præditus eger, eà vti tutè possit: alius vòd citra noxam & commodè nequaquam queat. Non vbiq; aut semper in omni subiecto illius vsus est recipiendus: ac ne pleuriticis quidem etià omnibus aliis purgantibus, illis interdicitur, ea tuta est, licet benignum & temperatum, inter alia omnia, iudicetur esse medicamentum. Quin etiam eiusdem pulpà solà exhibità, vsque adeò ventriculus distenditur & intumescit, vt magnà flatuum copià perturbetur, ac vehementer torqueatur, quòd eà ventibus valde noxiū & perniciosum est. Si autem ea in maiori etiam dosi, aliquo apto decocto & idoneo diluatur, decoctumque clarificetur ac colo traiciatur, adiectione vnà syrup. de Cichorio cum Rhabarb. aut Symp. ros. solut. melius agitur cum ægris quibus propinatur ex Medicorum nonnullorum sententia.

*Cassia ex- hibenda ratio.* Sæpius miratus est Garcias Monardum in lib. simol. melius scripsisse grana siue semina huius Cassiæ, purgatorià facultate prædita esse, cùm tamen potius adstringentem facultatem obtinere videantur quàm solutiuam.

*Monardus lapsus.* Illud vòd omni reprehensione dignum est quòd ait Sepulveda, nimirum ad mouendos menses, difficilè sique partus, remorantè sique secundinas, decoctum corticum harum siliquarum cum Artemisia propinati, aut ex Ouo forbili cum vncis quatuor mellis exhiberi. Nam, etsi demus, magno, vt ipse ait, successu propinatum esse huiusmodi medicamentum, Artemisiæ potius facultatem hos effectus præbuisse confestim, quàm harum siliquarum cortices tale quid præstitisse, qui frigidi & siccī sunt temperamenti. Huic adde secundinas sæpius etiam sine medicamento reici, naturæ propria vi. Nam quòd Auicenna lib. 2. cap. 197. præscribit ad partus difficultatem, multi non abs re suspectum habent locum: censetque Bellonius in contextu Cucumerem sicum reponi debere. Hanc ob causam statuerunt Doctores, Cassiam solutiuam intelligendam esse, quotiescunque

*Cassia bi- tescit.* Cassiæ meminisset in purgante medicamento, reliquis locis Cassiam ligneam denotari.

*Aqua distillata.* Ridiculum vòd est quòd de Lusitanis quibusdam, idem profert, qui crediderunt plerisque huius regionis homines continuà alui solutione laborare, quòd boues, quatum carnibus vescerentur, Cassiam solutiuam depascere. Nam arbores altiores sunt quàm vt à bobus depasci possint, neque tanta est copia arborum, vt numerum infinitum vaccarum siquidem multas isti alunt, nullius vòd carnibus indigenæ vescuntur ] alere possint. Deinde cùm cortice prædita sit Siliqua, verisimile est [etiamsi pertingere possint] vaccas graminis pabulum, quòd semper ferè hic viret; istarum siliquarum auditate non reliquas.

*Cassio.* Miran. meth. Sepalsarij (fraudem hanc apertente Marantha) Cassiam Catharticum viginis quibusdam latebris, cauernisq; reponunt: quidam etiam arena opertam quotidie aqua aspersione: vel per aliquod spatium singulis diebus aqua macerant, quò plenior fiat, atque ob imbibitum humorem recens etiam appareat: quæ deinde deuorata, flatus, tormina, aliæque id genº symptomata efficit, quæ perpetuò illam plius minùs concomitantur. Vnde & sapienter natura flatuosam esse hodierni Medici existimant, [namque ob id etiam eam Cinnamonomī, aut Didamni Cretici, aut An. sorum, aliorumque, quæ flatus dissipare solent, adiectione corrigunt] & tamen neque Meluens, neque Asturius tale ei incommodum tribuunt.

*Cassia ex- hibenda ratio.* GERATIVM MONOCOCCON INDICVM.

*Monardus lapsus.* CAP. III.

*Sepulveda error.* Arum huc fructu primum nobis exhibit D. Thomas Platerus vir eruditus solertia inuestigadis singolaribus solertissimus, idcirco Medicus, dono acceptum à Robino Regio hortulano. Fructus est quinque vncias longus, duas ferè latus, pediculo breui, crasso, sermo, nò fructui superficie tenus inferto, sed cortici continuo. Cortex

porè crassus (Taleri crassitudinem superans) extimà facie spadicea, rugosa, quadam sui parte pellucente, cum quibusdam verrucosis tuberculis: internà fusca, poluerulenta digitorum contactum fusca quadam fuligine, veluti vtilago (quæ è fructus superficie) inficiens. Ipsi ceterum corticis substantia, veluti ex arenosis quibusdam micis firmiter adeò compactus est, vt sine vi quadam rumpere hanc ita sit facili. Quod cauitatem replet intus, non faba est, aut Phasiolus, sed Phallosides fungosus quidam fructus, internæ atque conuexæ corticis cauitati exterius respon-

*Strueta de Cassio latus per- fusio.*

*Impossibilitate Pharmacopolarum.*

*Corrigenda.*

## GERATIVM MONOCOCCON INDICVM.

### CAP. III.



Arum huc fructu primum nobis exhibit D. Thomas Platerus vir eruditus solertia inuestigadis singolaribus solertissimus, idcirco Medicus, dono acceptum à Robino Regio hortulano. Fructus est quinque vncias longus, duas ferè latus, pediculo breui, crasso, sermo, nò fructui superficie tenus inferto, sed cortici continuo. Cortex

porè crassus (Taleri crassitudinem superans) extimà facie spadicea, rugosa, quadam sui parte pellucente, cum quibusdam verrucosis tuberculis: internà fusca, poluerulenta digitorum contactum fusca quadam fuligine, veluti vtilago (quæ è fructus superficie) inficiens. Ipsi ceterum corticis substantia, veluti ex arenosis quibusdam micis firmiter adeò compactus est, vt sine vi quadam rumpere hanc ita sit facili. Quod cauitatem replet intus, non faba est, aut Phasiolus, sed Phallosides fungosus quidam fructus, internæ atque conuexæ corticis cauitati exterius respon-


*Substantia*

*Phallosides*

*Color.* dens magnitudine, vt integer fructus agitatus, sonitum intus edat: puluerulentus quoque est, teres, modicè recuruus, ex fungosa quadam materie compactus, colore fulco, intus forisque, sapor fatuus, nec olfactu dignus, priusquam aperuisse-  
*Sapor.* mus Siliquam suspicabamur esse Phaeoli Brasili-  
 ani, cum quo similitudinem aliquam habet.

## TAMARINDI.

## CAP. IV.

*Descript.**Radix.**Stipes.**Folia.**Ramuli.**Pulpa.**Sapor.**Semina.**Nervus sive  
Villi.**Siliqua.  
Alpina.*

tenuioribus, quibus semina alterum ab altero se-  
 parantur, color verò feminibus pulchrè spadi-  
 ceus, moles maior quàm Cassiæ fistularis semi-  
 nibus, quibus rotundiora & latiora sunt, minùs  
 compressa quàm Cassiæ, licet & quadrata inue-  
 niantur, vtriusque faciei superficiem corticofam  
 area circularis pingit: sapor strenuè huic adstrin-  
 gens, adhuc pulpæ commisti reperiuntur nervi  
 cartilaginei, duri, qui secundum longitudinem  
 commissurarum, in siliquis videntur producti,  
 fert enim teste Alpino, siliquas crassas, primò vi-  
 rides, tandem per maturitatem cinericeas, pul-  
 pam cum seminibus vt descriptissimus continen-  
 tes.

Eodem scribente, Arbor est Pruni magnitudi-

ne, ramis densis Myrti: flores albi, Mali Auranti-  
 tii floribus perquam similes, è quorum medio  
 exeunt quatuor fila alba & tenuissima, ex quibus  
 siliquæ producuntur. Mirabile, inquit idem, hoc  
 habet hæc planta, quòd eius folia Solem semper  
 sequuntur, *Solisque sequi dicuntur*: nam ipso  
 Occidente omnia in se clauduntur, eodèmq;  
 oriente aperiuntur, atque hæc motio tantam vim  
 habere in iis obseruatur, vt Siliquas dum habent  
 Occidente Sole, easdem foliis in se arctissimè  
 claudant & retinere spectentur, eodèmq; oriente  
 aperiantur, Siliquæque relinquant.

Quare qui cum Monachis sibi persuadent no-  
 stros Tamarindos non esse veros, sed pulpam  
 prunorum cum seminibus Cassiæ, non parum  
 falluntur, vt nobiscum sentiunt Garcias & Aco-  
 sta: si conferrent semina illa cum iis quæ Tama-  
 rindi admixta, animaduertent, longè diuersa,  
 nempe maiora, nigriora, non ita plana, ac habere  
 veluti formam cordis in medio, cum femina Cas-  
 siæ sint æqualia, & vndiqueque vnius coloris: Ad-  
 de quòd Cassiæ & Tamarindorum semina nostri  
 etiam solo commissa diuersas plantulas, mul-  
 tumque inter se dissimiles producunt. Nam Cas-  
 siæ tenellæ plantæ latifolium, acuminatum,  
 Glycyrrhizæ quadamtenus simile folium habent:  
 at verò Tamarindorum prima germinatio, simile  
 omnino folium ostendit, quale depingitur & de-  
 scribitur Alpino, Sesban videlicet, vt dictum, seu  
 Orobi Matthioli.

Arbor est, inquit Garcias, Fraxini, aut Iuglan-  
 dis, Castaneæve amplitudine, materie firma, non  
 fungosa siue spongiosa: rami foliis ornati multis  
 minutimque incisus, palmi magnitudine: fructus  
 in arcus aut digiti incurui figuram efformatur.  
 Huius immaturi cortex viret, siccatus verò cine-  
 reus est, & facillè auellitur: nucleos intus con-  
 tinet satiuorum Lupinorum magnitudine, quo-  
 dammodo rotundos, sed planos, colore fuluos,  
 sed læues: quibus abiectis pulpæ vltus est, quæ  
 lenta & viscida est. Sed illud obseruatione dig-  
 num, quòd hic fructus in arbore adhuc pen-  
 dens noctu foliis sese inuoluat vitandi frigoris  
 causa, interdiu verò sese expedit, & è medio  
 foliorum emergat. Acidus est dum viret, sed ta-  
 men ea aciditas suauitate non caret.

Sunt Tamarindi, vt tradit Acosta, fructus ele-  
 gantis & aspectu pulchræ arboris, Castaneæ aut  
 Ceratiorum arboris magnitudine, multis ramis  
 præditus, & foliis latam vmbra præbentibus,  
 materie solidà admodum: folia filicis femine  
 foliis persimilia, dilutè virentia, valdè elegantia,  
 gustu acido, gratoque, è quibus condimentum  
 fit [*salsam* vocant] perinde atque è petroselinæ [*Salsa*]  
 no: flores candidi, aureæ Mali similibus admo-  
 dum similes formæ exteriori, & odore: attamen  
 octonis foliis constant, quorum quatuor inte-  
 riora alba sunt & crassiora, velut Mali aureæ flo-  
 rum folia, quatuor verò exteriora tenuiora, &  
 bina ex his eleganti nervo radiata: è medio flo-  
 re quatuor enascuntur, stamina cornicularum  
 modo inflexa, candida & tenuia. Fructus ad-  
 modum similis est Ceratiis. [Tamarindorum fructus  
 descriptio verior apud Garciam conspicitur,  
 Clusius.] foris virefcentis initio. deinde per siccita-  
 tem cinereus, continens officula, rotunda  
 Cassiæ solutius modo, aut paruis Lupinis similia,  
 dura admodum, & colore nitido terreo, haud-  
 quaquam flauo, quemadmodum, nonnulli referunt.

Nunc superest, vt ex Authorum Arabum scri-  
 ptis hoc medicamentum examinemus, cum Ve-  
 tentibus



teribus Græcis fuerit incognitum.

**Synonyma.** Tamarindi igitur, autore Mesue, Daçtily sunt acidi fructus Palmæ sylu. Indicæ: precellunt subnigri, splendentes teneri, villis similibus radicibus permixti, recentes, pingues (viscidi) non exsuccidi, dulcissimi, siceri. Adulterantur carne Prunorum, sed obscura nigredo dolium detegit: præterea humiditas largior, & prunorum tum odor, tum sapor: Quidam liccos vino puro humectant, vtrecentes videantur. Hæc ille, cui licet Tamarindorum pulpa fuerit cognita, ignoranter tamen scribit daçtylos esse fructus palmæ Indicæ: nisi is error sit interpretis. Mesue, inquit, Garcias, facit non etiam credendum Serapioni dicenti ex sententia Habohanisæ folia habere Salicis, melius tamen ex Aben Mesue scribit quod nos in nostro Mesue non legimus) plus medullâ habere quàm Xylocaracta [Siliqua.] Verba autem Serapionis hæc sunt, Habohanisæ autore, Abundanter in Cæsarea terrisque Haimem proueniunt Tamarindi, folia Salicis foliis similia. Aben Mesue ex India deferunt fructus rubei coloris plus medullæ quàm Xylocaracta continens, eamque duram croceam, ad nigredinem vergentem, mel sapiens, vel si ita effari liceat mellicatam habens, idque ipsum est, quod ingreditur compositiones, prius granis eiectis. Selectiores puta Tamarindos, novos, recentes, non aridos, saporis acerrimi [imò acidissimi.] Virtus eorum in tertio gradu frigida censetur: Vis & proprietates laxare choleram, eius acuitatem refrænare, vomitum abscondere pruritumque tollere. Dosis aquæ eorum est ab vncis duabus ad quinque: Abugerijs scribit Tamarindos choleram extinguere, sitim auferre, & vomitum sedare, vomitum à stomachi fluxu causatum Stipticat: Annotat Meschalî Tamarindum esse frigidum in tertio gradu, ventremque mollire: Mesuringa ait, Tamarindum Prunis similem esse, hoc excepto quod sit subtilior, minusve humidus.

**Synonyma.** Sylu. Tamarindus, Daçtylus Indus Barbaris, Oxyphœnix Veteribus indicus. Tagault. de purg. Sylicis palmæ fructus existimati Recentioribus quos Olibanæ Tamarindos nominât, & nonnulli à saporis acore Oxyphœnicis; Cæterum, nullus inuenitur Veterum, qui de hoc genere fructus prodiderit: Non desunt qui Phœnicobalanos Myrobalanos esse existiment tametsi utriusque vis in ista tristitia. Acoſta ex vers. Clusij, ait Tamarindi fructus in Canaria Chincha vocatur, officula verò Chincharo, in Malabar Pulis, & in Guzarate Garica. Ambili. Arabibus, Persis & Turcis Tamarindi, officula Abes, arbor, siger Tamarindi. Clusius not. in Garciam dicit, Tamarindi, Daçtylum Indicum, in Malaya Affa vocari. Apellare autem Arabes Tamarindi quasi Palmulas Indicas dicas, testis est Garcias. Nam Tamar eorum lingua Daçtylū significat. Palmulas autem vocant Arabes hunc fructum, non quod arbor eius Palmæ similis sit, sed quia aliud nomen magis aptum non inueniunt, officula etiam in se continere conspicientes. Nonnulli [vt Cord. in Dioscor.] Tamarindos à saporis aciditate Oxyphœnicem faciunt, quorum sententiam nec improbat (vt fecit Acoſta) nec approbat Garcias. Sed quod Lacuna à Thebaicis palmulis non differre scribit, non probat: quemadmodum nec quod eius arborem cum. Marth. Palmæ sylvestris genus facit foliis oblongis, & per extremum acutis, quoniam, præferat folia minutissima.

**Hist.** Lugd. in append. Tamarindus Alpino Tamarindus Derelide appellata;

Cordo in hist. Tamarindus, Acacia Indica Siliquæ similis fructus semine ruffo aut flauo.

**Ryff.** in Dioscor. *Agroin* pictus Aduario & alijs quibusdam Græcis recentioribus ab acido sapore Palmæ sylu. fructus, Tamar Indus, id est, Daçtylus Indus, Germ. Tamarinden & Saurdattel Oxyphœnix Veteribus indicus fructus.

**Euch. R. cœl.** Tamarindi *Eim saure frucht* / proueniens in Cæsarea, folio simili Salici: fructu rotundo, medullâ multâ, coloris Croci, dulcissimæ mellis. Proh, quantas fabulas Euch. scribit: contraria dicit, fructum acidum [Saur] & postea dulcem instar mellis.

**Gorop.** in Vertumno, Tamar-Indi, siue Daçtily acerbis Indorum. Bry Fratres Icon. Tamarindi aut Affa.

**Linkh.** Tamarindus folio Pimpinellæ, Siliqua Fabis simili. Nec magis Græcis olim, nec minus nobis inquit Adnerf. Lobeli & Penæ) notum hodie fructus, quos Tamarindos quasi palmulas aut Daçtylos minus apte vocant. Non enim Indi Orientales, vnde adieciuntur, palmæ similis arboris tradunt esse sed Prunis folio Saligno, vt Fraxino minutum incisio. Fructus Daçtylon, siue digitum in flexum profert: semina Cassia.

**Matthioli.** Palmatum genus, Officinis Mauritano secutus Tamarindi appellatum, Græcis verò Oxyphœnica: Tamarindi, inquit C. Bauh. apud Matthioli. censetur ut Oxyphœnica (Palmulæ acidæ) & Palmæ sylu. fructus: at videntur potius ad Siliquas, quàm ad Palmas pertinere. Dicuntur Tamarindi Lat. Lob. Cæsalp. Camerario: Palma sylu. Lonicero: Oxyphœ uia Castori.

In Aegypto iuxta Alpium non sunt admodum hæc arbores copiosæ, neque sunt patriæ, ex suis licet enim Arabia atque Aethiopia illic conuehantur, in viridarijsque seruantur: Miraculo loco habetur, quod dicitur, vnam arborem in Deserto Diui Machabii, propè Monasterium Assyriorum viuere, in quo solo nulla alia planta viuit. Serapio ex autoritate Habohanisæ in Cæsarea Apian prouenire asserit. Sed, pace eius dictum vult Garcias: nullos Tamarindos in Cæsarea Amā, quæ est Syria, prouenire certum est, cum à negotiatoribus mercimonijs gratia eò ex India deportentur, ubi multis in locis nascitur, sed qui montosis & ad Septentrionem versis proueniunt, præfuerunt & diutius incorrupti manent: quales Cambiare & Guzarate gignit. Tamarindus, vt vult Camerarius, ex nucleo enata nunquam durat alteri annum. Ego autem plantulas plurimum annorum vidi Heidelbergæ in horto D. Sprengeri, & earam vnam iconem curavi parandam.

Tamarindi, autore Mesue, medicamentum ex-vires & cellens ac innocens frigidum siccum ordine fecit. Temperamentum. Ardores. Febres. Icterus. Dorigen-114. Maceratio. Tamarindi, autore Mesue, medicamentum ex-vires & cellens ac innocens frigidum siccum ordine fecit. Temperamentum. Ardores. Febres. Icterus. Dorigen-114. Maceratio. Tamarindi, autore Mesue, medicamentum ex-vires & cellens ac innocens frigidum siccum ordine fecit. Temperamentum. Ardores. Febres. Icterus. Dorigen-114. Maceratio.

vt potentiùs refrigerent. Non colati quoque dantur, quando potentiùs ille ardor extinguendus est. Addunt quidam Prunorum par pondus. Mediocriter coqui [viribus seruatis] possunt, si opus est, quas tamen immodica coctio admittit. Ob id verò quòd imbecilliter purgant, ab vncijs duabus ad quinque propinquant. Annos tres seruantur in vase vitreato bene obstructo, & in locum purum & persflatilem seposito, nisi externus vel calor vel humor putredinis initium ipsis attulerit. Serap. ex sententia Aben Mesuai dicit Tamarindos frigidos in tertio gradu, vt antè notatum in eius verbis. Tamarindi secundum Auicennam frigidi sunt & sicci in secundo: de his opinio est, quòd confortent cor. Videtur tamen quòd illud proprium sit in habentibus malam complexionem, ad naturam cholericiam declinantem. Etenim temperant in frigidando & à cholera mundant cum virtute solutiuà, quam habent. Turcæ & Arabes ætate longinquum iter suscepturi, ait Bellon. Tamarindos coemunt, magni in Turcia vsus, sic vt nullus elabatur annus, quin Caisi plusquam ter millenæ libræ veneant, non medicinæ, sed sitis restinguendæ gratia. Lectu & notatu sanè dignissimum quod M. B. Ven. narrat, cum inquit, Sunt in regno *Gozurath* plurimi piratæ, qui quum mercatores ceperint, cogunt eos bibere Tamarindos cum aqua maris, & illicò fluxum ventris patiuntur. Quod idè faciunt, quia Mercatores, quando procul Piratas aduentare vident, solent deglutire margaritas & lapides pretiosiores, ne illis per Piratas eripiantur, sed illi horum astutiam non ignorantes, cogunt eos illicò egerere glutinos lapides.

Hic fructus probè sumptus quibusdam morbis est præsentissimum remedium, vt recitat Gabr. Fallop. de Medic. purg. simpl. his verbis, Ego soleo Tamarindorum pulpam exhibere felicissimo cum successu in Gonorrhœa biliosa, quando volo extinguere feruorem sanguinis & bilis. Exhibeo autem Tamarindos non solos, sed mixtos cum Cassia, vt v. g. Accipio duas drachmas pulpæ Tamarindorum & misceo cum vñcia floris Cassiæ, & si velim magis adstringere, commisceo dimidium scrupulum corticis seminum Tamarindorum, redigendo, scilicet, corticem illorum seminum in puluerem. Plurimis mederi morbis Tamarindum Alpinus fusè his verbis demonstrat. Utuntur foliis, in pueris, ad vermes necandos, atque etiam ipsorum, vel infuso, vel decocto ad soluendam aluum, acida sunt folia atque gustui non insauia. Arabes coniunt Siliquas seu Cannas huius arboris paruas ac virides saccharo vel melle *Carrub*, tum etiam grandiores factas atque maturas, coniunt ipsarum pulpam saccharo, quam peritumera, quæ in desertis Africa locis conficiunt, secum viatores deferunt. Qua sæpè, calefacti ac ex calore itineræque inflammati valdè sitientes refrigerantur, atque sitim restinguunt, per alium plurimum calidorum humorum lubducentes atque vacuantes. In febribus verò pestilentibus, atque omnibus aliis ex putridis exurentibus, aquam in qua multa copia Tamarindorum infusa fuerit cum saccharo exhibunt: potus siquidem sitientibus ex calore incundissimus est, maximèque refrigerat & sitim extinguit. Ad omnes denique febres putridas à biliosis exustisque humoribus concitatas, & ad hepatis atque renum calefactiones ac inflammationes, præterea ad Gonorrhœam vsusum Tamarindorum frequentant. Plurimùm illis expurgatis vt, inquit Garcias, cum saccharo, atque id maio-

ri cum successu, quàm si Syrupò acetoso vterent. Soleo etiam plerumque ægros Tamarindorum infusione purgare. Tamarindorum v. g. quatuor vñcia aqua frigida aut stillatio intubi liquore macerantur per tres horas, deinde factà expressione eximantur Tamarindi, quos modico saccharo inperfos vtiliter exhibeo, euacuant enim ex parte biliosum humorem, atque pituitosum incidunt & attenuant. Huius regionis incolæ sine molestia sese purgant Tamarindis cum oleo Nucis Indicæ sumptis. Medici verò Indici, folia Tamarindorum trita partibus corporis erysipelate infectis imponunt. Nos hîc Tamarindis acetici loco vtimur, gravior enim palato est eorum aciditas, præsertim maturorum. Deferuntur in Arabiam, Persiam, Asiam minorem, & Lusitaniam sale conditi, vt temporis iniuriam melius ferre possint. Ego verò sine fale domi assuetare cum suo cortice soleo. Fit ex iis recentibus cum saccharo conferua, præclarum proculdubio medicamentum ad digerendos & expurgandos humores, nec minùs palato gratum, Tamarindorum stillatio liquore pro digestiuo aliquando vsus sum: verùm cum nimis dulcem & insipidum ferè inuenirem, eo vti desii. Caterùm Tamarindi ex Arabum testimonio refrigerant & exsiccant tertio ordine, tametsi aliquot exemplaria Mesur, sed mendosa, secundo ordine refrigerantium & siccantium collocent. Tamarindi infundi solent pondere vñc. iiii. in qua frigida, aut stillatio Intybi liquore per tres horas, vt factà expressione exempti, inperfsique modico saccharo propinentur ad purgandos biliosos humores & pituitosos incidendos & attenuandos. De Tamarindis ita Poëthius:

*Et modicè siccatur, modicèque refrigerat horum Pulpæ, reseruatque acidum gustanti grata saporem,*

*Et vales arduentes purgando euincere febres.*

Nec sicco pede transigenda quæ de Tamarindo Christophorus A Costa Arom. lib. præclare recenset. Sola pulpa vtitur, quæ nonnihil lenta & viscida est, iucundâ tamen aciditate grata, tametsi nonnulli indigenæ asserant officula assata & in pollinem redacta ex oxygala in alui profluuiis vtiliter exhiberi: Folia trita partibus Erysipelate infectis imponunt, atque etiam circa phlegmonas ad arcendum qui insluit humorem: iidem cum sale Ormuziano phlegmonas resoluunt, & cum cineribus ex Canibaia pituitosos & melancholicos tumores: vsu compertum est huius arboris vmbra sub eâ dormientibus non minùs noxiam esse, quàm arboris Iuglandis. Illud pro conclusione monendum videbatur, quomodo per numeros præscribantur apud Felicem Platerum Tamarindi, quum ad nos non soleant adferri integri: sed vt ego suspicor lapsus erit Typographicus, nec industriò & perito Viro impetandus, quid si legendum Sebesten, de febribus pag. 158. 3. Prunor. Damasc. n. x. Tamarind. n. xii.

#### TAMARINDI SEMINIS FACIE FRUCTVS INDICVS.

C A P. V.

Tamarindi seminis maioris ferè figurâ, fructum Indicum ab Illustrissimæ Domine nostræ Sybillæ Anhaltinæ Ducissæ V Virembergicæ

Tamar.  
ind. confer.  
na.

Aqua still.  
latitia Ta.  
marindorû.

In fusio.

Pulpæ dele.  
tis.

Officula.  
Alius pro.  
fluuium.  
Folia.

Phlegmo.  
nas.

Platerum  
nos.

Ad venum  
inflama.  
ad Gonor.  
thæam.



Descriptio



munificentia habemus. Vnciam longus est, tertiam vnciam partem latus, ovatus, compressus, fulcus & paullo minus quam niger, supernè quà adhæsisse videtur leviter umbilicatus, infernè acutus: vtriusque linea ovata ad fructus figuram impressa notatus.



Descriptio

nem non superabat, Cacao formam quodammodo referebat, non oblique tamen in partes diuisus, sed in binas duntaxat secundum longitudinem, perinde ac Faba vulgaris, inaequales tamen, solidas & duras, adstrictionis quidem participes, sed non ingratifloris: externa pars rugosa erat & nigra, interdum (plures enim fructus ac-

Superior:

capiebat magnitudine etiam inter se differentes) solummodò fusca, tribus aut quatuor nervis distincta, licet in binas tantum partes diuidua esset, grauis, & in aquam injecta subsidens: Lobo autem fuisse inclusum hunc fructum, semper existimauerat, ex eius forma coniecturam faciens, quæ nostræ maiori Fabæ non valde dissimilis. Hæc porro eius opinionem postea magis confirmabat Doctiss. vir. Tobias Rælius Medicusburgensis Medicus, cum binos eiusmodi fructus ad ipsum mitteret, & Coles ab iis, apud quos crescebat, appellari scriberet: cuius verba, quia Cæles historiam exactè exprimunt, recensenda esse putabat. Coles, inquit, fructus arboreus est: huicque arbori folia sunt ferè Pyri, sed longiora. Oportet autem ut arbor quæ fructu Coles fert, ex fructu arborum siliquas ferentiu sit numero: etenim Bonæ, Fabæ nostratis, similitudinè gerit, nisi quoddam Siliquæ Bonis, Phaeolisve longiores, maioreque sunt, & colore candidæ, in quibus sunt quatuor aut quinque fructus: horum singuli suo putamine albo fuerunt tecti: quo ablato, interior fructus pars, ex rubicundo colore purpurascit, Cinnabarisque ac Minii colorem habet, quem Medicusburgensi Idiomate Chirurgus, à quo habui vermillion root, exprimebat, facillè etiam decorticator fructus in duas semiles spontè finditur, vni nostrates fabæ. Coles fructus ressecatus, valde durus ac solidus est: ut mitum sit quoddam referant stomacho conducere, & quemlibet potum magis sapidum fieri, præmanso Coles fructu. Sumunt autem hos fructus incolæ in Africæ tractu, iuxta Promontorium viride, semper ieiuni: perferuntque [ut perhibent] ieiunium toto die, ubi tres aut quatuor ederint. Hactenus Rælius. Illud porro obseruabat Clusius, cum hos fructus quos à Rælio, tum quos à Garcto accipiebat, per medium pertulos & filo traiecerat fuisse, ut ex vestigiis coniceret liceret, quod facillè sibi persuadet [suspensum ressecarentur, & in usum confectuari possent.

Folia.

Arbor siliqua.

Fructus.

Color.

Fructus.

Optima quorundam reprobatum. Stomacho conducit. Potum sapidum reddidit. Locum. Vnus ieiunium.

Asseruitur.

# OXYACANTHÆ COLORE FRUCTVS PEREGRINVS DVRS.

## CAP. VI.

Cassia similis Ceratostemmi.



Cassia solutior aut Ceratostemmi semen magnitudine aequat: cui etiam formæ satis respondet, tumidiorem tamen aliquantulum & colore differens, qui in hoc egregiè rubet, ut in spinâ appendicis, vulgo Herbariorum Oxycantha creditur, fructu, solidus & durus, atque in aqua subsidens & immutans: Siliquâ aut lobo aliquo inclusum fuisse

arbitror, inquit Clus. Exot. eum autem nomine Mates accepi. Idem Pann. Mates fructus Indicus: Et Hist. post. Phaeol. Indicus Mares, cuius meis in Garciam notis memini, quoniam tamen isthic eius pictura probè expressa non fuit, meliorem apponere volui.

Apud Taber. ex Clusio etiam depictus est pro fructu peregrino decimo. Hist. Lugdun. Fructus 10. fructus rubens, ut in Oxycantha: Mates. Huius Icon eadem cum Icone Bunæ.

# COLES, CACAO FORMAM QVODAM MODO REFERENS EXTERNA PARTE RUGOSVS & NIGER.

## CAP. VII.

Fructus peregrinus Clusio Exot. missus anno 1591. à Iacobo Garcto, Vncialem magnitudinis. Tom. I.

# COLES FRUCTVS ALIVS SIMILIS; NIGER SPLENDENS, CVM MACULA SUBRUFFA.

Cum Coles fructu quandam affinitatem, inquit Clusius, habere mihi videbatur alius peregrinus fructus, quem adquirebâ, seiscunciam longus; Nn

Descriptio

semunciam latus, dorso tamen latiore, rugosus aliquantulum, & satis levis, solidus tamen, nec cauus, nec in binas partes diuiduus, niger, splendens, subrufa maculâ satis amplâ præditus, eâ parte, quâ putamini adhæserat: lobo enim, vel saltem aliquo corice tectus fuisse videbatur.

FRUCTVS PEREGRINVS EX  
BENGALA.

## CAP. VIII.

Descriptio



\*

duros, coloris ex fusco subrufi, saporis adstringentis, linguam exsiccantis, post aliquod tamen temporis interuallum non ingrati, sed vires resistentis & sitim sedantis, quo in vsu apud indigenas esse, facillè sibi persuaserit: certè & substantiâ & colore, & sapore plurimum accedere videbatur ad fructum *Coles*.

Hunc fructum Petrus Garetus ipsi mittebat, quem in *Bengala* natum esse adscribebat.

## CORAL ARBOR SILIQVOSA.

Descriptio

Locus.



\*

seolis pleni. Arbor est Indica dicta Coral, ob eius florem, similem Corallo, folia eius valdè similia

Quinque penè vncias erat longus, totidem ambitu completens vnâ parte gibberosus, rugosus & inæquali cortice cõstans, satis crasso, duro & lignoso, cineracei ex fusco coloris, qui binas nuces, siue verius nucleos continuisse videbatur, eosque vncialis longitudinis, quadrifariam seu in quatuor partes diuiduos, valdè

sunt foliis Arboris Indæ, sed spinas illa habet quibus hæc caret. An verò istam adumbrare voluerit Matth. Icone *Acacia* quæ spinosa, signoratur Clusius, sed si hanc arborem noluit, pictor iconem feliciter non expresit. In Icone proposita à Clusio folia sunt *Phaseolorum* foliis similia & non Arbori Indæ, nec *Acacia* primæ Matthioli: quæ nihil aliud est, quàm Arbor Indæ cui appicitur spinæ, vt existimetur *Acacia*.

Spina.  
Acacia  
Matth.

Phaseolifolia.

## CORALLI ARBORI SIMILIS.



IN horto Illustrat. Principis, Anno 1606. factum genus *Phaseoli*, in quo Iunio apparebat pro magnitudine plantæ caulis crassius, palmum longus, spinosus. Variant folia, duo enim priora subrotunda, ampla, singularia: cætera terna, trifolia, ad Cyclamini folia quodammodo accedentia, nondum apparet an scandat vel sit amplexi caulis, Coralli

arboris species dicitur Illustr. Principis, in ea nullas spinas adhuc obseruauit.

Coral arbor depicta à Clusio provenit in horto Principis Sturgardiæ, multis abundans spinis, quæ anno 1608. pedalis fuit, & frigore hyemali perit. Item & alia minus spinosa.

## ACACIA IN GENERE.

DE *Acacia* in genere verba facere cogunt Auctorum discrepantes penitus opinionēs. *Acanthos* igitur, authore Theophrasto, [et *acacia*, Spina] ita vocatur, quòd tota arbor aculeis horret, excepto trunco: etenim & super germina, foliaque aculeos gent. Altitudine procerà [et *acacia*], vix potest, tectis Idonea, vi habet Gaza] est, vt quæ ad 12. cubitos perueniat. Eius duo genera sunt, quædam enim candida, quædam nigra. Hæc imbecillis facillè putrescens. Nigra autem robustior & incorruptibilis, ob id in nauibis fabricandis ad costas ventriq; latera eâ vtuntur. Arbor verò recta, non valdè affurgit. Fructus in Siliqua, modo leguminum, quo incolæ corna perficiunt Gallæ vice: Flos autem est pulcher aspectu, vt coronas ex eo faciunt: est & medicamentis perutilis, quæ de causa à Medicis colligi solet. Manat & gummi ex ea, tum vulnerata, tum spontè sine vlla plaga. Cum autem cæsa fuerit, tertio anno statim renascitur: Copia huius arboris largè habetur, & sylva ingens circa agrum Thebanum, vbi & Quercus [et *acacia*] & *Pessæ* plurima & Olea. Materies arboris dura: & cæsa, colorem Loti utique representat. Humor quibuldam in lachrymæ modum densatur, Spina *Ægyptiæ*, [et *acacia*] nam ea quoque fert Gummi, verum non ex cortice, sed in vase.

Acanthos  
Theophr.

Erythrina.

Disersa le-  
dio.

Genera  
Theophrasti  
duo.

Nigra.

Arbor.

Siliqua.

Ad Curia.

Vit.

Gummi.

Materies.

Loti color.

Nec



*Spina Aegyptia Plin.*  
Nigra.  
Vfus in manibus.

Nec minus apud Plinium Spina celebratur Aegyptia, duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiā in aquis durat, ob id vilissima nauium costis: candida facile putrescit, aculeus spinarum & in foliis. Semen in siliquis, quo coria perficiuntur Gallæ vice. Flos & Coronis iucundus, & medicamentis vilis: manat & gummi ex ea. Sed precipua vtilitas, quod cesa anno tertio resurgit. Circa Thebas hæc, vbi & Quercus & Persica, & Oliva trecentis à Nilo stadiis, syluestri tractu, & suis fontibus riguo. Item Spinæ Arabicæ laudes, in odorum loco diximus: & ipsa Arabica Hist. Lugd. legendum censet.] Ipsar, stringitque distillationes omnes, & sanguinis excreationes, mensumque abundantiam, etiamnum radice valentior. Est & Acaciæ spina (est & Acaciæ spinæ succus Hist. Lugd. sic emendat ex vetusto codic. Fit in Aegypto alba (ex alba) nigraque arbore: Item viridi (è semine viridi, aut maturo, Hist. Lugd.) sed longè melior è prioribus (è priori Hist. Lugd.) Fit & in Galatia tenerima (teterima M. deterima Vet. & CH.) spinosiore arbore. Semen omniū [huius Diofcor. nam Aegyptiæ Lupino simile, Hist. Lugd.] lenticulæ simile: minore est tantum & grano & folliculo. Colligitur Autumno: ante collectum (quia Aestate fructus immaturus acerbissimus est) nimio validius. Spissatur Succus ex folliculis aqua coelesti perfusus, mox in pila tulsis exprimitur organis, tunc desatur in Sole mortariis (densatusque Sole in mortariis agitur Hist. Lugd.) in pastillos. Fit & ex foliis minus efficax. Ad coria perficienda semine pro galla vtuntur. Foliorum succus & Galatiæ [Galatiæ Hist. Lugd.] Acaciæ nigerimus improbat: Item qui valde rufus. Purgæ aut Leucophæa, & quæ facillimè diluitur, vi summa ad spissandū, refrigerandūque est, oculorum medicamentis, ante alias viles. Lauantur in eos vfus pastilli ab aliis, torrentur ab aliis. Capillum tingunt: fannant ignem sacrum, vlcera quæ serpunt, & humida vitia corporis, collectiones, articulos confusos, perniciōes, pterygia. Abundantiam mensem feminis sistant, vuluamque & sedem procidentem. Item oculos, oris vitia & genitalium.

*Candida.*  
*Ad Coria.*  
*Flas Coriarii.*  
*Gummi.*  
*Locus.*  
*Spina Arabica.*  
*Vfus.*  
*Plurim locus restitutus.*  
*Distillationes.*  
*Acacia duplex.*

*Acacia succus quomodo paratur.*

*Delectus.*

*Vfus.*  
*Oculis.*

*Capilli.*

*Vlcera.*  
*Collectiones.*  
*Menstr.*

*pro Ebena.*

*Acacia fructus.*  
*Succus paratio.*

*Delectus.*

*Acanthi duo genera.*  
*Theophr.*  
*Guiland.*  
*Acanthi.*

Guilandino subscribit Harchius. Acacia, inquit, Spina est in Aegypto: sed nostratibus incognita. Serap. vocat Acaciæ succum Gummi Arabicum, quod tamen longè diuersum est à Gummi Arabico Officinarum. Nos autem cortices, spinas, siliquas & semina, quæ reperiuntur cum Gummi Arabico, satis demonstrare censemus verisimile esse id Gummi provenire ex Acacia, vt asserit etiam Bellonius, & meritò quidem nostre iudicio, ac propterea Harchio quoque non contentimus.

Actio: Spina Aegyptia ex qua Acacia præparatur. *Spina Aegyptia.*

Michaël de Capella in syno. apud Haly Abbatem, Acacia Græcum est, Arabes *Auxia* dicunt Stephanus Acaquia scripsit: Et fit Acacia, ex fructu arboris spinosæ, quæ maximè in Aegypto nascitur.

Acaciam fundentem idem videt Hermolaus accepisse Authores, cum Spina Aegyptia, testis Orib. & Aëtius, nisi quod Acacia etiam alicubi quàm in Aegypto nascitur. Hæc & Syria quoque Spina dicitur.

Nunc Acaciam ex syluestri Pruno colligit officinarum delidia. Illud meminertimus semen Aegyptiæ, à Diofcor. Lupino simile reddi Ponticæ, seu, quod idem puto, Galatiæ. Lenticulæ. Plinius nihil distinguit, sed vtrumque semen Lenticulæ par existimat, minore tamen grano & folliculo. *Syria spina prunus.* *lylu substituitur acacia.* *Plinius.*

Demetrius in Aegypto spinam quæ sit arborum coronarum specie natua effundere, in quibus semen rotundum sit flore suboscuro, ex quâ Tyndizæ & Abylæas coronas in Aegypto fieri docuimus in Myrto. Spinam porro Aegyptiam, sunt qui & Arabicam vocant, vt Diofcor. & Galenus. Acanthon Arabicam eandem cum Aegyptia spina Acaciam fundente nonnulli faciunt, quoniam Galenus & Paulus hanc & Aegyptiam & Arabicam appellant. Ruell. hæc Hermolai verba transcribit, ac more ipsi consueto (pessimè quidem) pro suis recitat. In Aegypto autem, addit de suo, spinam, aliam, nigram, & viridem arbore conspici. Paliurum præterea Theophrasto genus quoddam esse putat Aegyptiæ Spinæ, quæ instar arboris insurgit, frutice spinoso, semine in siliquis concluso è quo Acaciam expriment. *Corona.* *Paliurus.*

Veram Acaciam 1. ex Aegyptia spina factam, quam lachrymam Cyaneam vocauerit primus Andromachus, in Italia deesse putat Manardus. *Acacia.*

Hallucinari Ruellium testis est Marantha & Ruell. *notatum.* Cronenburgus, dum scilicet Acaciam ex Arabica spina fieri credit; nam Diofcor. & Plinius locis supra dictis, atque Gal. 6. simpl. alteram ab altera separauerunt.

Acaciam spinam in Aegypto nascentem, etiam Spinam Aegyptiam vocari, notat etiam Corn. & maximè intelligi scribit cum additione, ex qua Acacia præparatur, ex Actio apparere: ita vt Acaciæ nomine & Spina & succus ex fructu spinæ expressus accipiat: Spinæ verò Aegyptiæ appellatione, ipsa arbor Acacia intelligatur: Sic enim videtur etiam Diofcor. vsurpasse, qui non aliam spinam Aegyptiam, quàm Acaciam habet, & infra lib. 3. ab ipsa diuersam Arabicam appellatam. Galenus tamen 6. simpl. pharm. Spinam Aegyptiam aliquos Arabicam nominare scribit. Et fortissimè etiam de Acacia planta & succo agit. Sed & Plinius Arabicam Spinam, aliam facit ab Acaciæ spina, quæ fit, inquit, in Aegypto alba, nigraque arbore, item viridi, sed longè melior è prioribus. Sed idem mox alteram Acaciæ speciem, in Cappadocia ac Ponto nascentem, Galatiam appellat, & *Spina Arabica.* *Plinius notatum.*

cum priore confundit, dum semen omnino Lenticulæ simile facit. Est ergo duplex Spina Aegyptia, & hæc quæ etiam Acacia vocatur, & altera quæ etiam Arabica dicitur: Et apparet Aetium hac parte aberrasse, dum ait: Spina Aegyptia ex qua Acacia præparatur, adstringendi & siccandi vim habet: Quare & fluxui muliebri prodest, & vlcera sedis inflata ad cicatricem perducit. Est enim alia Spina Aegyptia, ex qua Acacia fit: alia item Spina Aegyptia & Arabica dicta, quæ vires illas habet, velut etiam Galenus tradit. Duas itaque diuersas plantas Aetius *ὀξυμύρτα* deceptus in vnam confundit. Idem lapsus contigit etiam Plinio. Sed hac parte minus laborandum nobis habet, qui Acaciam hanc nullam habemus, & penitus ignoramus.

An Cornat. Plinio faciat iniuriam, examinabimus, ubi agemus de Spina Aegyptia. Quod de Acanthi natali solo Virgilius tradit [ & baccas semper frondentis Acanthi ] clarissimum facere affirmat Marantha, eum non locutum fuisse de Melampyllo [ vide Brancam Vrsinam ] quandoquidem hæc vbique gentium oriatur, nedum in India. Ceterum, in non leuem suspitionem duxit Marantham Plinius, vt crederet Acanthum hanc esse Ebeni speciem, de qua Plin. lib. 12. cap. 5. verba fecerit, nam cum cap. 4. locutus sit de Ebeni altera specie, qua fruticosa fit Cythi modo, & statim cap. 5. subdat: Ibi & spina similis, sed deprehenfa lucernis, igni protinus transfliente: sibi videri spinam Acanthi nomen exprimere. Hæc quæ spinæ genus idem esse ipsi videtur, quod Dioscoridis Scelamina aut Spinaligna: quæ ob similitudinem pro Ebena venibant: quod discernebatur ex eo, quod fungosa erant, & in purpureas haustulas resolvebantur: vnde fortè propterea lucernis apta erant & ignis rapacia.

Seruius arboris genus esse in Aegypto semper frondentis scribit: sed quæ id coniectura affectus sit non declarat: In hoc eruditores cogitent. Ex Acacia quadam Aegypti spina, ex cuius semine seu fructu, interdum & foliis, inquit Ryff. & ex eo Sylius Acacia fuscus exprimitur, manat gummi in vermiculorum speciem contractum, vini modo perlucidum, refrigerat, densat. Huius non meminit Galen. in Acacia lib. 6. simpl. vti nec Acaciz mentionem facit paulò post in Acantha Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi vocatur): vnde colligas licet, Acaciam & Acantham Aegyptiam seu Arabicam diuersas esse in Aegypto Spinæ arbores. Tamen in lib. comp. pharm. part. frequenter leges *καύμυ* absolute Tragacanthæ coniunctum pro Gummi Arabico, quod *καύμυ ὀξυμύρτα* vocat, lib. 7. comp. pharm. part. à Thebis opinor Aegypti centifloribus, vti etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis, *καύμυ δρόν*, ἀγαθὸν περὶ ἀπὲρ Ἀκταριος vocat.

Fuchf. de comp. med. Acacia vera succus, eius fructus decerpitur è spina, vnde Arabicum Gummi manat. Hæc hodie rarò aut nunquam habetur.

Matthioli sententia, Sylius manifestè aberrasse deprehenditur, quandoquidem Galen. Acantha Aegyptia arbor vtiq; non est, sed herba è Carduorum genere, quemadmodum & Dioscoridi libro 3. ἀγυδὴ λευκὴ, hoc est, spinæ albae similis, quam Mauritani Suchan appellant. Quocirca eo capite Acaciz meminisse Galenum omnino fuisset absurdum. Errasse eos idem crediderit, qui sibi persuaserunt Arabicam spinam, cuius hic meminit Dioscor. eam aculeatam esse arborem,

quam Acaciam vocant: Arabicam spinam non esse Acaciam, vt Ruellius hallucinetur: Plinium lib. 24. cap. 12. alteram ab altera separasse. Veram autem Acaciam non fuisse notam Matthiolo satis demonstrat falsa figura, quam posuit in post. com. Ital. de qua paulò post loquemur. In Hist. Germ. pro prima Acacia nihil demonstrat: dicit quidem Gummi Arabicum esse Acacia gummi, sed non nostrum Arabicum, quod ait ex diuersis arboribus congregari: mirum etiam eum in Hist. Germ. quam ante secundam Acaciam vocauit, simpliciter Acaciam nominare.

Serapionis caput, aiunt Monachi, qui cum pluribus aliis dicit arborem Acaciz (quam ipse Spinam Babylonicam vocat) producere Gummi Arabicum, idem est cum Dioscoridis capite de Acacia, hoc excepto, quòd Dioscorides pro Babylonica, scribit Aegyptia, & dicit producere gummi: sed non nominat: Andreas Bellunenſis autem in suis interpretationibus, in littera Alcarad, dicit sic: Alcarad vel Alcharad, est fructus arboris spinosæ in Aegypto & in regione dicta Bassera, & talis arbor ab Aegyptiis appellatur Setan: & licet ex hac arbore colligatur gummi simile Arabico, tamen Gummi Arabicum est illud, quod colligitur ex arbore dicta Amgailam, & Acacia fit ex fructu arboris Setan: qui fructus, Alcharad appellatur, & est fructus stypticus in vaginis: hæc ille. Ex dictis igitur contigit dubitare, an fit verum Gummi Arabicum, quo vtitur, & an arbor Acacia ferat illud, vt Serapio scribit: siue sit altera arbor, vt Bellunenſis tradit. Et si est verum Gummi Arabicum, quo vtitur, productum ex arbore Acaciz: Vnde ergo est, quòd de ipso gummi exportatur in tanta copia, & de Acacia, siue ex fructibus, vnde ipsa conficitur, nihil præterea Serap. cap. de gummi Arabico, dicit idem quod dicit Dioscor. præfatio cap. de Acacia, præter quòd [ vt diximus ] Dioscor. non specificat Arabicum. Aiunt enim ipsum esse simile vermiculis in figura sua, & quod aliquid ex eo est, vt vitrum translucens & aliud candidum. Hæc Monachi, quibus non magis assentimur quàm Matthiolo: nolo seculo inueniuntur Siliquæ & Spinæ cum Gummi Arabico vulgari quod melius conuenit descriptioni Veterum, quam Tragacanthæ quicquid censent Monachi, Matthiolus, Collegium Florentinum & Eur. Cordus, qui Gummi Arabicum idem putat cum Tragacantha.

Hist. Lugdun. *Α'αχία*, Acacia, Arab. Achachie. Theophr. *Ἀχάδα* simpliciter, id est, spina, & *ἄκαδα* Theophr. *αἰγυπτία*, Spina Aegyptia vocata, ita vt Acaciz nomine & Spinam, & succum ex fructu Spinæ expressum accipiamus: spinæ verò Aegyptiæ appellatione ipsam arborem Acaciam intelligamus. Acacia, inquit Diosc. in Aegypto nascitur, Spina arboris instat, & rursum, Alterum genus in Cappadocia, Pontoque. Plinius lib. 24. cap. 12. Spinam Arabicam, ab Acaciz Spina distinxit. Aetius, qui Spinam Aegyptiam vocat, ex qua Acacia præparatur, duas diuersas plantas in vnam confundit. Plinius alteram Acaciz speciem, quam in Cappadocia & Ponto nasci ait Dioscorides, Galatiam appellat, & cum priore, Aegyptia scilicet, confundit. Scire oportet Gummi Arabicum Officinis dictum, multam à Spinæ Aegyptiæ gummi differre. Hæc Hist. Lugd. Ausim ego contra asserere Gummi Arabicum plurimarum offinarum à multis annis esse Spinæ Acaciz, id vti dictum demonstrantibus spinis & feminibus de Gummi vermiculato à me crebro obseruatis.

Robert. Const. in Lexico *Α'αχία* Spinæ arboreæ genus

Aetius not.

Plin. not. Acaciam nullam habemus.

Acanthi baccæ.

Ebeni speciei altera.

Spina pro lucerna. Spina Acacia. Scelamina. Diosc. Spina lignea. Lucerna.

Gummi Vermiculatum.

*καύμυ*. Gummi Arabicum. *καύμυ ὀξυμύρτα*. Gummi Babylonicum. *καύμυ δρόν* Arab.

Sylius notatur. Acantha Aegypt.

Est herba, non arbor.

Matthioli error.

Spina Babylonica. Gummi Arabicum.

Alcarad. Alcharad. Setan.

Amgailam. Setan.

Dubium Monachorum.

Monachi notantur.

Acantha Theophr.

Acacia duplex genus. Diosc.

Spina Arabica. Acacia non est. Aetij error. Plinij error.

Gummi Arabicum.

Hist. Lugd. resellitur.



gens Diofcoridi, *Στην γαλακτι* Herba medicinalis dicta.

Non ignorat Amatus Oribaf. & Aetium Acaciæ arbuculam cum Arabica siue Aegyptia spina, idem facere, quos Ruellius fecutus sit, sed non sine errore. Prependit Agricola Diofcoridem, quod in Aegypto solum nacti memorat, quum tamen & alibi proueniat: Nam & Syriam spinam dici constare: Errare etiam in super eos dicit qui Acaciæ fieri putent ex spina Arabica: Gummi Arabicum, quod à quibusdam Babylonicum dicatur, Serapionem ex arbore Acacia promanare scribere, quæ sit spina Aegyptia cuius meminerit Plinius lib. 13. cap. 11. Latine igitur vocari hoc gummi, Acaciæ gummi, vel gummi Aegyptiæ Spinæ.

Frischlinus, qui Acaciæ modum fruticem (Dornbusch) modum arborem Aegyptiacam spinosam appellat minus attentè succu è pomis exprimi scribit. Acacia arbor non fert poma, sed siliquæ è quibus succus exprimi potest.

Frischlini errorem sequitur Helfricus, qui & ipse non nouit Arabicum gummi esse ex eadem arbore.

dem Ioubertum Acaciæ substituere Gummi Arabicum: quod (licet ex eadem planta, ex qua Acacia, proueniat) tum sapore, tum viribus multum differat. Sed hæc breuiter annotasse sufficiat.

## ACACIA VERA.



Acaciæ plânta Descriptionem adulescentiore

ex semine natam Parauit vidit, spinis horrentem, similibus ferè spinis Crescini, siue Berberis vulgæ spinis.

quæ ferè ordine dispositis, binis vel plurimum simul iunctis, à semine, à uarietatis, albis, cortice ex nigro

ex luto pallente, folijs ad

Lentis folia acaciæ d. nubus pin-

naum, multis ad

cohaerentibus:

ut pollice, teste

Bellonio, possis

regere 350. folia:

Siliquæ, quas

hactenus habere

contigit, Lusitaniæ

pini Siliquis

quodammodo

similes, nigricantes siue succo,

compressæ angustissimo

intereceptæ, (an pluribus quam

duobus soleat isthmis distin-

gui, autem non habeo quod

dicam) eoque fragili, vnicuique loculo ad latera

apertum semen inest vnicum, minus quam Carrubæ siue Siliquæ, spadiceum, circulo in vnguem

ducto, veluti in Tamarindis notatum, oblongum, dentium contempti dunc in eo medulla. Ceterum, Siliquam intrinsecus succingit pellicula rufescens inter quam & extumum corticem concretus liquor apparet, qualis ferè in Caiis, sed valde paucus. Flores pulcherrimi sunt spherica rotunditate: globuli magnitudinis maioris Pili, qui constant veluti lanugine molli, ex se puluerem remittentes, coloris sunt flauis, pediculi singulorum globulorum, tenues, unciales: Alpini ait odore esse non ingrato Gayri quidem flauo, vel pallido: In montanis verò Arabie, albo: Arborem magnitudine Mori, ramisque esse latius expansis, caudice Pruni, trunco equali.

De Acacia loquitur Rauwolf. cum ait: Circa Halepum conspicitur Spinosa frutex Acaciæ, qui

Nn 3

Oribaf. Aet. Ruell. error.

Spina.

Quorum error. Gummi Arabicum.

Frisch. car. Helfricus.

Aequiuoca

Tamarindus Arbor Indica.

Prunus Sylva.

Succus Prunorum Sylva.

Acacia altera.

Aspalathus 2. tris. folia.

Aspalathus 2. Moris.

Acacia Conuolu- lus.

Substituta Succus Prunorum Sylva.

Hypocistis.

Succus Lentis.

Rhois folia. Rhois paipa. Rhois semina. Rhois aut. foliorum succu.

Tom. 1.

Descriptio  
Rau. Gouff.  
Odoriferus  
Ramulis  
Spina.  
Folia.  
Siliquæ.

incolis dicitur *Schack* & Arabib. *Schamur*, in his partibus parvus est & humilis, potissimum in aruis, ubi non minus odiosus eorum agricolis, quam Filix & Anonis sunt nostris: ramuli sunt cinerei, curui, spinæ eis multæ similes Rosarum spinis. Foliola Tragacanthæ, plumæ modo dispositæ, vt in Filice fœminâ, flores in ea non vidi, Siliquæ eius sunt externæ fuscæ, crassiores & rotundiores Faba, internæ fungosæ, quæ continent duo aut tria rubentia semina, prope urbem *Bir* ad Euphratem inueni Acaciam, maiorem arbore & fructu quam alius in locis: Item in Arabia ad Euphratem genus cum rotundis fuscis siliquis, quod *Schack* & *Schamur* Arabibus dicitur, circa Babylonem in arena.

Est Acacia, inquit Cord. in Dioscor. secundum omnes Græcos, Latinos & Arabes Scriptores, in Aegypto nascens arbuscula, cuius Siliquæ in Gummi Arabico vocato, quod ex Acacia arbore manat, sæpè à me inuentæ: Gummi verò eius affertur, non succus: In margine scribitur, *Sethim* in sacris Litteris vocatur: Acantha simpliciter Theophrasto. Venditur hodie non minus quam olim, Indicæ & Aegyptiacæ spinæ, hoc est, Acaciæ materia pro Ebano, quæ propter similitudinem faciliè ementibus imponit: Gummi eius Arabicum cognominatum.

Semen.  
Acacia Ga.  
retia.

Gummi A.  
arabicum.  
sethim.

Ebenum.  
Gummi A.  
arabicum.

Locus.  
Gummi A.  
arabicum.  
Siliquæ est A.  
lucina.

Acacia, ait Bellon. Obseru. Constantinopoli *Argelia* vocatur: Inueniuntur eius arbores circa mare rubrum, ex quibus colligitur ab Arabibus gummi id quo vitmur in Europa in atramento & coloribus conficiendis, licet quidam Recentiorum aliter senserint: recensetur Acacia inter arbores semper videntes. Figura Bellonii infelicitè picta, in qua nec folia, nec Siliquæ bene exprimuntur: felicius depingitur sine siliquis à Dodo, x. Castor. Durant. in fine Hebra. xii inter figuras Acacia Alexandrina. Lacuna in Diosc. pro Acacia figuram habet, quæ non placet. Fuch. Hist. Hispanica Antwerp. impressa p. 557. Iconem habet cum hoc titulo *Acacia*, Acaciæ nuper erumpentis rudimentum. Et Verdadero *arbor del Acacia*. Anguill. Acacia prima: Item Acanthis Theophrasti, Acacia Dioscor. Dodon. Gall. Acacia Aegyptia: Lat. in fol. Acacia, quæ & Aegyptia Spina, cuiusque Gummi in officinis *Arabicum gummi* dicitur. Lobel. Spina Acacia, Spina Arabica Diosc. Hist. Lugd. cui Acacia Aegyptiaca dicitur, notat *Argelia* dici ab *Argelia* quod est acuo, vnde Acacia quasi acuta: Apud Plinium lib. 24. cap. 12. legendum, Spinæ Aegyptiæ laudes in odorum loco diximus, Arabica spissat &c. Eum enim huic Spinæ omnia, quæ à Dioscor. Arabicæ tribuuntur, rectè adscribere: de Aegyptia Spina Plinii locum citantem Ruellium in Spinæ Arabicæ Historia, Spinam Aegyptiam & Arabicam pro eadem planta non sine errore vlturpare.

Camer. Epit. ad Matth. Acacia, & ad eiusdem Hist. Germ. Acacia prima. Eandem locis iam dictis, sub signatura crucis ad Acaciam alteram proponit, quam Bellonii esse ait in Hist. Germ. quod falsum: Bellonius enim suæ nullas Siliquas appingit, quam tamen & ipsam malè expressit.

Alpino Acacia [quam *Sant* Aegyptii appellant]: Huius arboris mas atque fœmina reperitur. Mas spinis horridus, fructus non edit: fœmina spinis paucioribus mollioribusque referta est, easque intra ramos non habet, sed extrâ tantum. Errant qui putant gummam quam arborem hanc ferre multi meminerunt, apud nos vique non reperiri, neque ex Aegypto veram comportari, quod ipsam forma vermiculari constare Dioscori-

Sexus Aca.  
cia.  
Mas. Fœ.  
mina.

des prodiderit: hoc enim certò scio me sæpissimè Gummam hanc, quam falsè aliarum arborum similem esse aiunt, bisce manibus Cayri in viridariis multis Acaciæ Arboribus referens, ex ipsorum truncis multam collegisse.

Guillard. multos non potest non vehementer admirari, qui nesciant Acaciæ verum succum huc ex Aegypto quotidie comportari. Nunc enim pauci Pharmacopolæ existunt Patavii ac Velleitii, qui hunc succum ignorent. Neque minds etiam miratur nonnullos, quod hanc plantam non à clarissimorum Consulum Venetorum Medicis vel Pharmacopolis, in Aegypto multos annos versatis acceperint, potius quam ex Græcia, quam Acaciæ teracem fuisse nemo Antiquorum dixit, veluti multi, quod in Aegypto hæc planta viuat, spinam Aegyptiam ipsam nominarunt.

Huiusmodi itaque plantæ genus non ex Græcia, vt Matthiolus Bizantiu se habuisse ait, in quod tamen non parum fuit deceptus, sed ab Aegypto foret petendum: Acaciæ igitur Matthioli imaginem planè falsam esse notissimum est.

C. Bauh. apud Matth. Acacia Aegyptiaca.

Ignota hæcenus quidem multis, nunc verò in Italico solo hospitatur, nec aeris inclementiam horret. Duplex genus Acanthis à Theophr. ponitur, duasque esse Acacias Dioscoridis Anguilli contendit, cuius authoritatem, plurimi faciendam censeo.

Acaciæ fœminam in horto Illust. Exc. Celsit. Semen missum fuit Luteiæ per insignem Chirur-gum Regiæ Dom. Rasse, cum hoc titulo, *Acacia Bizanti*: Fruticem ex semine natum vidi olim Patavii: Vidi etiam siccam plantam, apud clarissimum Cortusium cum siliquis Lupinis similibus. Valerandus Dourez Venetiæ cum esset, ex siliquis viridibus edo allatis, expresserat succum quem gustavi, sapore austero & graui, colore nigro, tenacem. Cum gummi Arabico pellucido siue Scolicoide albicante sæpius Lugduni reperi spinas & fœmina, quæ manifestè indicant ex Acacia illud colligi Gummi. Habeo etiam ramulum huius fruticis à Fratre Bauh. datum, quem ait Hierosolymâ reportatum. Siliquæ mihi datæ fuerunt Patavii à Ioan. Genuesii Pharmacopœo. Dom. Cortusius misit mihi Patavio ferendum, cum hac inscriptione, *Acacia Alexandrina*: & Paludanus cum hoc titulo: *Carat Acacia*. Honorius Bellus ex cortice Cidonia misit Fratri C. Bauh. qui me ramulo donauit, & postea etiam mihi, scribens: Mitto Acaciæ folia & flores, quos hic nunc Cydonia profert sphaerica rotunditate sunt & pulcherrimi, pediculo vno flos vnus exit, & cido in terram decidit: plantam ad sex cubitos se attolentem alo, quæ nondum semen produxit. In Aegyptii locis à mari remotis Acaciæ arbores, copiosissimæ autem, teste Alpino, in montibus *Sinay* penes rubrum mare positæ, proueniunt: Fœmina arbor est fœcundissima, florereque orientibus pleiadibus, Nouembri mense incipit, & rursum iisdem occidentibus, scil. mense Martio: bisque in anno fructus fert atque maturat. Bellon. lib. 2. cap. 56. In Arabia ad mare rubrum, circa Suej in deserto sterili, nulla planta ibi prouenit præter arbores Acaciæ, quæ ibi abundant, ex quibus Arabes diligenter Gummi colligunt.

Acacia, [id est succus] vim habet, authore Dioscoride, adstringentem, refrigerantem: succus commodus est ad oculorum medicamenta, & ignes sacros, herpes, perniones, pterygia & vlcera in ore. Sed & oculos procidentes continet, & fluxum muliebrem, [Mensium abundantiam] siliq.

Gummi in  
Aegypto ex  
Acacia.

Acacia Ge.  
ræ succum  
in Italia.

Matth. no.

Acanthis  
duplex ge-  
nus Theophr.

Locus &  
tempus.

Carat.

Vires &  
lus.

Oculi.  
ignis facer.  
Pterygia.



Ruellii de-  
prunaria  
lactio.  
Viterus.  
Alnus.  
Capilli.  
Loto ad-  
colorum  
medicami-  
ta  
Vitis.  
Torretur.  
Decoctum  
spina.  
Galen. ex-  
plicatur.

sistit, malè Ruellius Plinium imitatus Hist. Lugd.)  
cohibet, & vtrum prolabentem reprimat: al-  
uūque fluentem sistit, potus & infusus: Capil-  
los item nigros facit. Lanatur etiam ad oculorum  
medicamenta tritus cum aqua, ita vt quod super-  
stat, diffundatur donec pura aqua superflet,  
atque sic in pastillos efformatur. Vritur quo-  
que in cruda olla cum ipso fideili in camino. Tor-  
retur eadem super prunas suspensa, vrita exsus-  
fletur. At spinæ decoctum affusum, articulos so-  
lutos compingit. Dicit Galen. plantam ipsam  
Acaciae acerbam esse & fructum & succum, qui  
lotus quidem imbecillior & minus mordax red-  
datur, vt pote acrimoniam quandam in lauatione  
deponens (id est vehementius astrigentem vim), quā  
contracta corpora dilabit, ac veluti dilacerat. Ea  
scilicet vis aquæ perfusione diluitur & obtunditur. Sic locum hunc exponit Da-  
lech. omnis enim acrimoniam prorsus expers est  
Acacia, etiam si Galeno credamus partes quasdam  
calidas in eius substantiam mixtas esse] porro si  
parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & sicciorem  
& contractam efficit, nullum quidem caloris  
sensum inuehens, sed, nec frigoris admodum  
valentem. Vnde constat medicamen id esse frigi-  
dum & terrosum, ammissa quadam etiam essentia  
aquea. Et sanè coniectura est, non esse simile,  
verum quādam in se se dispersas habere partes re-  
tines & calidas, quæ in ipsa ablutione segeten-  
tur. Estque tertii ordinis exiccantiam & secun-  
di refrigerantiam, vbi quidem elotum fuerit, abs-  
que eo verò primi. Ee hinc Aetius ait Spinam  
Aegyptiam, ex qua Acacia præparatur, adstrin-  
gendi ac siccandi vim habere, quare & fluxui mu-  
liebri prodest, & vlcera sedis infusillata ad cicatri-  
cem perducit. Aegyptii apud Babylonem ad ornā-  
da coria vtuntur liquis Acacia, quas vendunt  
copiosè in Officinis Castrinis: In Arabia lōga per-  
tica decutitur liqua quæ arbutibus edenda præbēt.  
Aegyptij ex oblatione Alpini, Acaciæ arboris  
vtuntur succo, ex siliquis in maturis expresso vel  
etiam ex floribus, solus, vel ex fructibus etiam.  
Sacci huius vsus apud eos frequentissimus & ad  
oculos roborandos, atque ab inflammationibus  
quæ ibi sunt frequentissimæ, tuendos: ad oris au-  
riumque omnia vlcera. Nec non ad labiorum fis-  
suras. Ad dentes collabentes roborandos, atque  
firmandos, succo in puluerem redacto, post ab-  
lutionem ex decocto eiusdem succi, vel foliorum  
vel florum parato, factam, vtuntur supra gingiuas  
asperso, ab eo dentibus conficitur. Sanguinem  
spuentib<sup>9</sup> diachmam singulo manè aliquo liquore  
dissolutam, potandam offerunt: miræque ad  
quacunque sanguinis fluxionem firmandam semper  
vires habuisse apud eos cognitum est. Ego si-  
pissimè hoc solo auxilio multas mulieres ab im-  
modico vteri profluuii penè mortuas reuixisse,  
atque sanatas fuisse, certò scio. In iis quidem quæ  
has immodicas patiuntur vacuationes, Clysteri-  
bus ex Acaciæ foliorum florumque decocto paratis,  
in uterum iniectis vtuntur. Atque etiam succo  
puluerizato prædicto, cum decocto dissoluto,  
atque immisso. In alui fluxionibus eodem tum  
clysteres frequentantur, tum per os succum foeliciter  
exhibent. Ad aluum vterumque foras procidentem,  
succo dissoluto cum foliorum florumque decocto,  
nihil habent præstantius ac frequentius  
quo vtantur. Ad eos qui ex quacunque causa articu-  
los debiles habent, sumentum ex iisdem omni-  
bus paratum, pro presentaneo auxilio habent. Neq;  
immeritò, eam. n. Acacia præualidissima ad-  
stringendi vi prædita sit, omnes eius sumentum v-

Noxæ.

Tempera-  
mentum.Fluxus  
muliebri.Siliqua ad  
coria.  
Folia arie-  
tum pabu-  
lum.  
Siliqua  
Succus.  
Oculi.Vlcera oris  
& aurium  
Dentes.Ad fluxum  
sanguinis  
mulierum,  
exper.  
Clysteres.Iniectio in  
uterum.  
Alui fluxio-  
nes  
Vteri pro-  
cidentia.Articuli  
dum imbe-  
cillius  
sumentum.

tuntur, ad defendendos articulos ab humorum  
decurſu, atque non nimis in iisdem tumeta-  
tis atque inflammatis, præsertim in principio  
dum humores adhuc in cursu existunt. Hincque  
vsus ad podagricos dolores frequentissimus est,  
maximèque vim habet Acacia, vt à podagricis  
in cursibus homines præseruet. Non desunt, qui  
ad ea mala non modò foris sumentum vel balnei  
modo Acacia vtuntur, verum etiam succi modicu-  
m, per os sumere ante fluxionis tempus per al-  
iquot dies consueſcunt, vt ipse internæ viæ, an-  
guitiores factæ minus cursui humorum pateant.  
Aliqui etiam ex succo Acaciæ atque aceto  
Linimentum parant, ad liniendos articulos de-  
bilitatos, quo sanè misicè eos roborant ac firmant.  
Multi recentèr à podagra tentati, vsu assiduo  
Acaciæ planè conualuerunt, qui singulis diebus  
per horam ad minus pedes in decoctum Acaciæ  
calidum decinebant, eoque sumentabantur, pedesque  
absterſos, Linimento ex succo Acaciæ, opobalsamo,  
acetoque parato etiam inungebant. Ad puscedorum  
aliamque debiliū purium vlcera difficilia, succi aqua  
pluries Loti puluerizati vsus est illis familiarissimus:  
decocto etiam vtuntur ad exsiccandas pustulas omnes  
præsertimque Gallicas, sed decoctum parant etiam cum  
modico ligni Guaiaci: in pueris etiam ad achores  
in capite Oedentes, & decocto & puluere vtuntur.  
Non possum autem cum Baptista Condronchio  
probare Auicennam & Mesuem, qui aiunt in laxata  
Colicella, caput illinendum esse cum succo  
Acaciæ, nam hic succus intemperiem capitis  
frigida magis augere potest.

GUMMI ARABICVM SIVE  
ACATIAE.

Gummi hodie Arabicum nominatum, grumis  
concretum viſitur, Nucis ponticæ aut Iugandis  
magnitudine, vel etiam lex Inglandium (vt mihi  
contigit aliquando in offic. Basilienſi, affinis  
mei Ioh. Iacobi Frey Aromatarij inuenire) cum  
adhærente cortice cinereo, globosis, aliàs  
contortis, in se conuolutum erucum imitantibus,  
pellucidis, ex flauo palleſcentibus aut omninò  
flauis aut rutilis, extrema parte ferè rugosis & veluti  
corroſis, fragilibus quàm Tragacanthæ, lentescen-  
tibus tamen & manibus adhærentibus, sapore  
dulciſculo, humoriū quæ maceratur lentorem  
viscidum conciliantibus. Commixta reperiuntur  
spinæ & semina, Lenticulis aut Lupinis similia,  
vt Lugdani sæpius obseruaui quæ manifestò  
indicant ipsum ex Acacia colligi vt ante dictum.  
Gummi [arabicum] ex spina [arabica] videlicet  
Acaciæ nasci auctor est Dioscorides: prætere  
verò vermiculatum (στρωματωδες) vitrum refe-  
rens [arabicum] pellucidum [arabicum] ligni expert  
[arabicum] Proximum esse candidum [arabicum] Refi-  
nosum verò ac fœdum [arabicum] inutile [arabicum] cenſeri.

Plinius hæc & alia quædam ita recenset. Gummi  
optimum esse ex Aegyptia spina conuenit, ver-  
miculatum, odore glauco, puium sine cortice,  
dentibus adhærens, precium eius in libris xiii.  
(Denarios tres. Serap. Arabicum nuncupat,  
quod ex Arabia suo tempore apportaretur: Ga-  
lenus verò de comp. med. xxiij vocat, Gummi  
Arabicum ait Agricola à quibusdam vocari Baby-  
lonicum à nonnullis Sarracenicum. Gummi ex  
Acacia spina nasci Dioscor. tradit, quod Corn. non  
aliud esse meritò credit, quàm quod Arabicum  
officinæ vocant. Multa enim gummi genera sunt,

Articuli

Podagra

Sumentum

tar.

Linimen-  
tum

Articuli

Podagra.

Vlcera ex-  
siccanda.

Pustula

Gallica

Achores.

Aur. &amp;

Mucositas

tatur.

Descriptio

Magnitudo

Forma.

Color.

Qualitas

Sapor.

Synonyma

Gummi

ex spina

Dioscorides

Illustratio

Descriptio.

Descriptio

Plinio

Preterea

Gummi

Arabicum

Serap.

Babylonicum

Sarracenicum

Corn.

Gummi

rab. Offic.

& in diuersis arboribus proueniunt. Quibus omnibus in communi siccandi & meatus obducendi vim Galenus attribuit, & quod asperitates sanant: maximè tamen hæ facultates in hoc ex Acacia spina gummi habentur. Et Plinius ex Ægyptia Spina Gummi optimum esse dicit, quod apud Galenum lib. 4. *ἡ ἀπὸ τῆς σπίνης* etiam simpliciter gummi appellatur, itémque Thebaicum & Alexandrinum, velut in comm. eiusdem ostenditur.

Gummi A.  
lexandr.

Negat  
Matth.  
Gummi A.  
rabicum ex  
Acacia esse.

Sp. gummi  
Thebaicum  
(i. e.) spina-  
rium, Beryl-  
lum.

Scire etiānum conuenit, tradit Matth. Gummi, quod ab arbore Acacia manat, idèd Serapioni, Arabicum nuncupari, quòd ab Arabia regione, Ægypto contermina, suo tempore importaretur: Sed animaduertere oportere, quòd Arabicum vulgaris vltus gummi, tenet hanc falsam opinionem etiam Hist. Lugdun. longè quidem ab illo differt, quod ab Acacia colligitur, namque illud non contractis vermiculis simile, sed in ramis vermicoloribus conspici, quorum alii luccinum, alii topatium, alii chrysopatium, alii beryllum colore & nitore referunt. Quod autem Gummi Acaciae desit, illud argumento esse posset, quòd ipsa quoque legitima Acacia hætenus, quod sciat, non defertur. Nam si hoc quo vitur, sincerum legitimūque Acaciae esset Gummi, procul dubio ipsa quoque Acacia ad nos conueheretur, cum longè magis in paranda Theriaca, aliisque componendis medicamentis expetatur, quàm gummi. Vulgate igitur gummi, illud equidem esse existimauerim, quod Græcis gummi simpliciter vocatur. In quam sententiam adduxit eum Galenus, siquidem lib. 7. simpl. medic. sic inquit. Gummi lachryma est congelata, concretæque in truncis arborum, ipsam fundentium, velut resina quoque in multis visitur plantis, quæ resinam fundere possunt. Cæterum, quòd exicatoria Emplasticeque sit facultatis, constet. Hæc Galenus. Ex cuius verbis palam est, Gummi sic in vniuersum Græcis appellatum, nostrum Gummi esse, vulgò Arabicum dictum. Quod quidem [quantum sensum iudicio consequi potest Matth.] ex pluribus arborum Gummi miscellaneum est. Cuius rei, manifestò indicio sunt, cum gumorum formæ diuersitas, tum colorum varietas. Huc etiam accedit quòd Galenus vnica nomenclatione, omnium eorum arborum Gummi comprehendit, quæ resinam non proferunt. Quamobrem omninò explodenda videtur eorum sententia, qui, vbi Græci Gummi absolutè scriptum relinquunt, illud Gummi intelligendum esse contendunt, quod è Spina Ægyptia manat. Galenus lib. 7. de comp. med. per genera, Acaciae gummi *κόμμι ἀπὸ τῆς ἀκακίας* vocat, hoc fortasse argumento, quòd scripserit Theophr. ingentem huiusce spinæ syluam esse in agro Thebano: Sed cum ad nos non perferatur Acacia, nec etiam eius gummi importari credendum est. Matth. Hist. Germ. Acacia, Ger. *Ägyptische Schortendorn*. Errant, qui Arabicum officinis dictum Gummi Acaciae esse arbitrantur.

Gummi mi-  
scellaneum.

Gummi la-  
ta signifi-  
catio  
Error quo-  
rundam  
(i. e.) gummi ab-  
solute.

Gummi  
Thebaicum

Error quo-  
rundam  
Matth. not.

Sed fallit Matthiolus in post. comm. Italicis pro Acacia ponens arborem Iudæ cui appictæ falsò spinæ: Ei non assentior dum reuicet nostrum Gummi, spinæ & semina Acaciae verè in eo reperiata satis demonstrant, ad nos adferri verum: *ἡ ἀπὸ τῆς σπίνης καὶ τῆς ἀκακίας*. Quod Acacia à mercatoribus non adferatur, perinde vt Gummi, sit igno- rantia & negligentia Medicorum & Pharmacopæorum, qui non expetunt à mercatoribus: vt vendibilia eis nota potius aduehant, quàm incognita & non expetita.

Iouert. sa-  
nat.

Miror dubitare Iouertum an repetiatur Gum-

mi Arabicum, quod abundabat in Emporiis, cum suam pharmaciam scribebat.

Prosper. Alpin. hoc de Acacia notandum monet, nimirum multos errasse, qui putarint gummi, quam arborem hanc ferre multi meminerunt, non reperi, neque ex Ægypto veram comportari, quòd ipsam forma vermiculari constare Dioscor. prodiderit, Gummiæque hanc quam falsò Arabicum appellant, dicant esse similem potius aliarum arborum, quippe Ceraforum, Prunorum, Persicorum, Pomorum, Pyrorumque gummi. Sed, quòd, pace Dioscoridis dixerit, non tota, sed paucissima, vermiculari formâ spectetur, neque tota alba & clara. Gummas Acaciae figura atque colore pleraque Ceraforum, Prunorumve gummi haud dissimiles vidit. Scit totam gummarum quantitatem, quæ ex Ægypto conuehitur esse Acaciae arborum: quando nulla ibi arbor sit excepta hac quæ gummas educat: ac Ægyptus & Arabia Prunis, Cerasis atque Pomis careat.

Hist. Lugdun. Gummi Arabicum Officinis dictum, multum à spinæ Ægyptiæ Gummi differt.

Gummi Arabicum vermiculatum quod ex Arabia defertur, habet Calceolarius (non illud officinarum vulgi) à Serapione decantatum, quod notandum cenfeo, inquit Oliuus, & inter potiora referendum. Quid? Gummi Officinarum non fuit hætenus diuersum ab Arabico, vt tenet Oliuus, quamuis non nunquam fordidum, cum quo etiam vermiculatum reperiebatur: præfractiones an morosiores, qui Sepalsiarum Gummi Arabicum ex Acacia colligi pertinaciter negant? Quod Acacia destituimur, nil aliud quam quæritus & compendii sui studiosos arguit, mercatoribus Ægypti visitata est, hodièque Græca appellatio *κακία*.

Error mpt-  
torum  
Gummi.

Arabica  
falsè.

Diosc. not.

Gummi A.  
rabicum ab  
Officinaris  
diuersum.

Oliuus not.

Vim habet Gummi meatus obducendi, acia medicamenta, quibus commiscetur hebetandi. Et in ambustis pustulas excitari non sinit, illitum cum ouo auctore Dioscoride.

Vites.  
Ambustis.

## DE ACACIA SECVNDA VETERIBVS.

Altera quoque Acacia, eodem Dioscoride auctore, in Cappadocia & Ponto prouenit, similis Ægyptiæ, multò tamen minor, & ad humum depressa, at tenerior, sed spina aculeorum specie obsita, folia habens Rutæ similia. Semen autem in folliculis coniunctis, trium aut quatuor capacibus, minus lente.

Locus.  
Descript.

Folia.  
Semen.

Vites.

Hæc ipsa tota in succum expressa adstringit, verum inferior est facultate, & ad ocularia medicamenta inepta.

## CARDUM SIVE ACACIA DIOSCORIDIS QVIBVS DAM.

Hælepi in mercatorum Tabernis nomine Cardem, reperit Rauuoullus, venales filiquas, Castaneæ modo fuscas quæ duos aut tres faculos habent compressos, & in vnoquoque est semen rubens simile Balsaminæ nostræ mari: maximè adferuntur ex Ægypto: quidam existimant veram Dioscoridis Acatiam [putamus legendum Acaciam] quod affirmare non possum, quando quidem frutex mihi incognitus est.

Locus.  
Siliquas  
Semen.

Acacia  
Diosc.

ACA-



## ACACIÆ COGNATA PLANTA.

Descriptio  
Sarculi.  
Aculei.

Folia.

**Q**uædam Acatiz congener est foliis & spinis  
lucubæ concoloribus, cui Sarculi tortiles  
per crebra interualla geminis aculeis donantur,  
cornua limacis exerta referentibus, interque, cirri  
exiles foliola Acatiz primæ positu & similitudine  
gerunt. Lob. & Pena Adu.

## ACACIÆ COGNATA ALIA.

**E**X Peruvianis Infulis alia quæ non foliolis dis-  
similis, in viminibus sesquipedalibus, spinu-  
lis aduncis donatur, concoloribus Vux crispæ,  
fed exilioribus. Adu. Lob. & Penæ.

CERCIS VETERIBVS ET  
ÆQUIVOCA.

Cercis  
Theophr.

Cercis  
Lybica.  
Populus Al-  
pina Ga-  
za.  
Rami.  
Folia.

Color.

Cortex.

Æquivo-  
ca.  
Iudaica  
Arbor.  
Siliqua  
filia.

Populus.

Herba.

**C**ercis nupier, arbor annua semina in siliquis  
inclusa continet, inquit Theophrast. lib. 8.  
cap. 8. Libro tamen 3. cap. 14. Cercidem [Alpinam  
Populum Gaza interpretatur,] particulatim de-  
scribens, siliquarum non meminit. Alpina (Ly-  
bica quibusdam) Populo albæ non abimilis, cum  
magnitudine tum verò ramis albicantibus spar-  
sis, folio Hederæ, sed parte alterâ sine angulo,  
alterâ oblongo, neque angulum exeunte acu-  
tum: colore parte resupina, pronæque fermè si-  
mili: pediculo prolixo, tenuique annexo, quam-  
obrem non erecto, sed inflexo, cortice asperiori,  
quàm Populus alba, scabriorique quàm Pyrus  
sylvestris. De Cercide Plinius nihil, teste Scali-  
gero.

Cercidem priorem Theophrasti multi censent  
Arborem Iudæ, siue Iudaicam arborem, de qua  
mox dicitur. Eadem videtur Cæsalpino Siliqua  
sylvestris, quam Cercin appellatam scribit, ob  
circinatam folii rotunditatem, quæ tamen in si-  
liquis fert. Alteram apud eundem Theophrastum  
Cercin, & apud Aristot. anim. lib. 8. cap. 5. & He-  
sichium de populo, quidam Lybicam, quidam  
Alpinam Populum faciunt, de qua alibi. Hermol.  
in Dioscor. ait: Herba quædam Cercis est, è qua  
radii fiunt textoribus, vnde & nomen.

## IYDAICA ARBOR.


Descrip-  
tio.  
Magnitu-  
do.  
Rami.

Floris.

Sapor.

Siliqua.

**I**ydaica arbor vix nisi culta arboream magnitu-  
dinem assequitur, neglecta, inquit Clusius, &  
spontè nascens, plerumque inter fructus potiùs  
quàm arbores censenda est. Rariores fert ramos  
alternatim ex lateribus nascentes, cortice ex pur-  
pura nigricante tectos: primo Vere flores eru-  
punt, ante folia plures coaceruati, amœni, pur-  
purantes, breuibz nigricantibus pediculis hæ-  
rentes, Pisorum ferè, vel Genistæ Clusio, floribus  
similes, quinque foliis contexti, quibus duo infe-  
riora magnitudinem superant, reliqua tria supe-  
riora, simul iuncta apicibus è medio multis emi-  
cantibus, saporis subdulcis & nonnihil acidi: flo-  
ribus & succedunt siliquæ, yncialibus & longiori-  
bus pediculis pendulæ, palmari aut sesquipalma-  
rî longitudine, membranaceæ, purpurascences,



compressæ, vn-  
ciam ferè latæ,  
in quibus semi-  
na coloris spa-  
dicei, dura, lē-  
tibus maiora,  
oblonga: folia  
circinatæ rotū-  
ditatis, Afari,  
subinde maiora  
multo, nervosa,  
vñ Aristolo-  
chiarum Clusio  
& dura, supe-  
rius virent, in-  
ferius inalbi-  
cant. Eodem  
autore aliud  
genus inueni-  
tur per omnia  
præcedenti fe-  
rè simile præ-  
ter florē, qui candicat potiùs quàm purpurascit.

Varietas.

Flus.

Gefnerus de hortis dicit, Arborem Iudæ  
rumque Siliquas rectas ferre, non falcatas: nec  
nucamentum, sed, vt Dodonæus pingit, florem  
quasi leguminis, vel ut anagyris: quamobrem  
acutius hæc perpendent, qui arbores istas Lu-  
tetiæ viderint.

Quo nomine hæc arbor Veteribus sit appellata  
teste, Clusio, non facile dictū est. Nonnulli ad  
Cercin priorem Theophr. referunt. Alii etiam ad  
alteram, quam Gaza Alpinam reddidit, quæ nihil  
aliud est, quàm Populus Lybica. Plinius lib. 31. c.  
2. meminit Siliquæ sylu. quam purpureum florem  
ferre ait: an verò hæc nostra sit, difficile est vnicâ  
illâ notâ iudicare. Montpelii peritiores rei  
herbariæ referunt ad Colyteam Theophrast. lib. 3.  
cap. 17. descriptam & 14. cuius notas Arboris Iu-  
dæ plurimū conuenire Clus. quidem affirmat,  
sed de his ampliùs cogitandum. Qui putant  
Plin. siliquam, quæ dicta fuit Ficus ægyptia, ef-  
se arborem Iudæ, falluntur. Petrus Bellon. in l.  
1. de admirab. operum antiq. & rerum fuscipien-  
darum præstantia cap. 17. agens de arboribus sep-  
pulis inferi solitis, id est, quorum vñs maxi-  
mè in rebus funebribz fuit: peculiare inquit,  
est arboris genus sterilis, idè antiquo nomine  
carens, quæ cum eximie pulchritudinis florem in  
Vere producat, Turcis tantoperè commendatur,  
vt nullum Byzantii aut Adrianopoli Cœmeterium  
videas, quod non hac constitum sit. Eam autem  
quoniam Siliquas pro fructu edit, Siliqua-  
stri nomine appellamus. Idem de cult. prob. 6.  
scribit inter siliquos arbores & fructus siliquas  
ferentes, Arborem Iudæ vulgò nuncupatam com-  
perimus. probl. 3. in catalogo arborum propo-  
situm regi, arbores Iudæ, quas Græci vulgò Cou-  
chonchias nuncupat vnde Fabagines & Siliqua-  
stræ dictæ. Locis iam citatis Bellonium de ar-  
bore Iudæ loquutum existimamus, sed quale il-  
lud sit Siliquastrum, primo loco dictum, consi-  
derandum quod Siliquas pro fructu gerat & ste-  
rile sit, quasi Siliqua non sit fructus: libro de cul-  
tura nullam arborem inter Siliquos recenset  
quæ respondeat, præter arborem Iudæ, cui appi-  
cè falsò spinq.

Acaciæ imaginem Constantinopoli ad se detu-  
lisse Augerium de Busbeck Flandrum ait Mat-  
thiolus, quæ omnibus suis partibus, notisque, ve-  
ram legitimamque Acaciæ imitata sit. Floribus  
ex albo purpurascens, & siliquis, & semino

Lupino similibus. Et quia Dioscorides Acaciae albos reddit flores, is vt suam sententiam confirmet, subterfugium hoc quaerit acaciam Theophrast. & Plinio tum nigram, tum albam, generis diuersitate haberi, ac adeo non durum credere albam, album proferre florem: nigram verò [vt sua hec sit] purpureum. Ast Matthiolus Acaciae appingit spinas: nec ulla siliquæ aut seminis similitudo cum Lupino quicquid dicat, confundens hanc arborem Iudaicam cum vera acacia.

Matthioli astutiam nouit quoque Dodonæus, dicens. Matthiolus pro Acacia arborem Iudæ recentioribus dictam picturâ exhibet, nam præter veritatem spinas addidit, vt Acaciam mentiretur.

Castor Durant. pro *Acacia* ponit figmentum Matthioli, nempe Arborem Iudæ, cui appictæ spinæ, descriptio eius est vera Acacia, quæ non conuenit figuræ: præterea eiusdem plantæ figuram demptis spinis ponit postea nomine Siliquastris, & arboris Iudæ ac arboris amoris.

Matthiolus vt apud Hist. Lugd. quoque legitur, per suam Acaciam primam depictam [de qua Pena] non Acaciam, sed, si spinas demas, Arbori Iudæ similem pictam dedisse videtur. Et reperitur hoc alibi. Arborem Iudæ Matth. secundâ Commentariorum in Diosc. editione, pro vera Acacia depinxit: in cuius pictura spinas commentitias esse multi suspicantur. Et hæc Hist. Lugdun. quæ duas habet figuras vnius arboris, meliorem nomine arboris Iudæ, deteriorem nomine Acaciae primæ Matthioli.

Arbor Iudæ, videtur Dodonæo Laburnum, vel eius species: Sunt, inquit is, qui sentiant Theophrast. Colyteam esse. Verum à Laburno, Colyteaque plurimum differre rectè censet Gesnerus hort. Eam autem eandem esse suspicatur Ruellii Sycomoro [nam ita Gallos arborem Iudæ vocare ait] frondosa, Moro non dissimili, quæ fortè, vt quidam putent, Aceris species sit. Arbor Iudæ, inquit, vocatur *Cucunajia* in Obleru. Bellonii, Ceratia sylu. quibusdam dicta, *Gaynera*, Gallis, *Carobaria*, Italis. Sed arbor Iudæ nihil nobis videtur habere commune cum Sycomoro Ruellii.

Lobel. & Penz Adu. Arborem Iudæ Monspehensium, vocant Cercin Theophrast. Verum in margine dubitant. Matth. reprehendunt, quod hanc Constantinopoli acceperit, quum in Hetruria propè Senas proueniat. Iidem capite de Acacia dicunt: Ridiculam nobis dedit Acaciam Senensis, cui si spinas demas, arborem Iudæ iudices, vt merito suspicere spinas non naturæ, sed pictoris aut commentatoris commentum. Illa igitur erit Cercis arbor Lobel. Obs. Arbor Iudæ, Siliqua sylu. Clusii: Acacia Matthioli. Icon. Plant. Arbor Iudæ Monspehensium.

Arbori Iudæ Siliquæ syluestris nomen indidit Clusius, non quod Siliquæ Veteribus descriptæ similis sit, sed quia nullis Hispaniæ locis vulgari nomine Herbariorum Arbor Iudæ appelletur: nam à siliquarum siue lobiurum generatione *Fabaginem* cognominant: Granatenles vulgari sermone *Algarouo* loco [Siliquam suam siue syluestrem.] Mauritani illius regionis incolæ *Dit*. Castellani propter elegantiam & venustatem *Arbol d'Amor*: Galli *Guamier*, quali *vaginalem*, quia eius Siliquæ cultrorem vaginas æmulentur: Nomencl. Pannon. *Lenche fa*, arborem Lentis. Camer. apud Hist. Germ. & Epit. Matth. *Siliquam syluestrem*, & Arborem Iudæ Germ. Wild. Johannes brode / *Zwdaebäum* / Ital. *Carobaria*. Siliquam

quidem syluestrem, non quod huius species esse possit, sed quod in siliquis oblongis semina ferat lauia, purpurea, Siliquæ similia, sed minora, Matthiolo ab imperito rei herbariæ falsò pro Acacia prima missa.

Gesnero Tiguri è semine pronata: nascitur cica Bononiam copiosè. Lobel. inueniri dicit peruenustam hanc arborem, propè riuos, aut lætiores margines, interdum & in collibus Veronæ amœnis, & Norbonæ, Hetruriæ etiam non procul Senis. Clus. de locis quibus gaudet hæc tradit. Spontè nascitur primum genus Granatenfi regno, & quibusdam aliis Hispaniæ atque Narbonensis Galliæ locis inter sepes. Alitur etiam in hortis non modò in Germania & Belgica, sed etiam in Hispanica Castella ob venustatem. Secundum genus candido flore, spontè nascens non vidi, sed semine duntaxat natum quibusdam Belgicis hortis. Iudaicam arborem per plures annos habuimus, Montbelgardi in orto Ill. E. Cell. semen attulerat Theobaldus Nobiliter gener noster Illust. E. Cell. Pharmacopœus: sepius floruit, quotannis summitates gelu absumebantur, tandem gelu tota petiit: Siliquas compressas longas fert Iulio, semina intus parua. Obseruauit inter Valentiam & Lugdunum, vbi in orto nostro pulchre plantæ ex semine nate: Item Patavii mense Februario cum Siliquis, Mantuæ florentem Martio. Florentiæ in orto Nicolai Ferrariensis. Basileæ in orto Dom. Doctoris Fælicis Plateri florentem. Cùm esset Bononiæ Clusii vir Vlysses Aldroandus vocabat Circin Theophrasti, florebat Aprilis in orto di S. Saluator, al Burgo di S. Catharina, & in orto alio S. Saluatoris.

## DE ACACALIDE VETERIBVS.

Hanc Dioscorides lib. i. statim post Ericem inter frutes recenset, *Ακακάλις*, inquit, fructus est fruticis in Ægypto nascentis, [ἡ ὀνόματι δὲ δίδυμον γὰρ οὖρα ἐν Αἰγύπτῳ] qui Myricæ (*μυρίκη*) fructui aliquo modo similis est. Cuius cremor [diluatum Paul.] collyriis admiscetur, quæ ad visum acuendum [visus alacritati] conueniunt. Acacalidè Paulus a callida [Attallida Brunfels. in onom.] nominat. Galenus vbi meminerit, Hermol. nondum comperit.

Brunfels. in Dioscor. breuibus se expedit, inquit, Acacalidem nondum cognoui.

Consentit Riffin Diosc. lib. i. c. 101. Acacalis hodie planè incognita.

Dicit Lonicin Diosc. lib. i. cap. 113. apud Paulum fortè legendum Acacalis. Et Cornar. in Diosc. ait se nullum reperisse qui traderet de acacalide, præter Dioscoridem & Paulum, qui Dioscoridis verba transcripsit.

In eandem sententiam cadit Matth. in Diosc. lib. i. cap. 101. dicens: Acacalum Ægyptiæ arbusculæ semen ad nos hac ætate conuehi non equidem arbitror.

Acacalum Ægypti arbusculam sua ætate planè incognitam scribunt Brunfels. in Diosc. Ryff. Cornar. & Matthiolus. Extat hoc titulus (non tamen conueniens descriptioni Dioscoridis & Pauli, qui Dioscoridis verba transcripsit) acacalis siue Kefmesin quorundam, foliis Cerauæ de qua proxime. Acacalis [*ακακάλις*] Gesnero in cat. plant. est frutex spinosus. Stephanus in Synon. vt puto, inquit esse Acacalidem speciem Tarsis, quod est Tamariscus, idem sentit Michael Capella in Synon. apud Haly Abbatem, & Bacchin consensu, Acacalis,

Matth. reprob.

Acacia Matthioli. Matth. falsum.

Durantiæ error.

Laburnum Chyrea.

Sycomorum.

Arbor Iudæ Cucunajia. Ceratia sylu.

Cercis. Matth. reprobat.

Locus.

Cercis? Siliqua.

Varia nomina Siliqua syl.

Fabago. Siliqua syluestre.

Arbor singularis.

Arbor Lentis. Panis S. Iohann.

Locus.

Circin.

Myrica.

Ad visum.

Acacalidis æquivocationes.

Kefmesin.

Frutex spinosus. Tamariscus.



calis, vt vulg. Lacuna, solò nomine est in Europa, licet aliqui exhibeant pro ea semen Thüia Pliniana. Amatus sanè obscurus est in hac sententia: Thüia Pliniana æquè ignota ac Acacalis Dioscoridis. Is acacalim & Cacaliam, putat esse Ericam bacciferam. Sed videant obsecro, inquit Matthiol. in Censura Amati, qui rem Medicam profitentur, quàm negligenter Dioscoridem legerit Lusitanus, quin & quâ autoritate, vel ratione ductus affirmare ausus sit, acacalis semen pusillis margaritis non esse ab simile: quum antiquorum quispiam (quod sciam) nusquam id scriptis commendauerit. Acacalis vt fert opinio Cordi in Dioscor. non amplius affectur, nisi aliquis ex Myrobalanis, Emblicum seu Belliticum hanc esse existimet, quod vt non affirmat ita etiam non negat. Toxites in onom. Phil. *Audaxius*, Acacalis, Ballerium al. Emblicum al. Buetia, Myrica &c. multa miscet indistinctè pro more consueti. Aud. ræ Calap. Cusum cum Enea nascentem (an Corim Monsip.) Acacalim dicere, nisi inter fructus à Dioscoride recensetur. Rob. Const. in Lex. & Gortius in Desin. *Audaxius* nominant florem Narcissi Cretensium, Helychio. Sic & apud Herm. in Dioscorid. Eumachus Cyrenus in Rhizotomico etiam Cretalon & Acacalida Narcissum vocari tradidit.

#### ACACALIS QVORVNDAM SIVE KESMESEN FOLIIS CERATIE.


**Descript.** EX Oeenni femine enata tenella planta instar  
**Folia.** Ceratæ primùm erumpentis, rotundis foliis, quaternis, vtrinque costæ annexis binis, caliculus subhirsutus: quæ sub Autumni initium tursus exaruit. Semen, altera parte rotundum, latiusculum, altera in mucronem collectum.

**Kesmesen** Acacalim Constantinopoli Turcis dici *Kesmesen* legitur apud Bellonium aut vt Qualcebe, apud Matthiol. tradit. *Chefmesen* quod tam vulgare Constantinopoli ad oculorum morbos est remedium, vt tritum sit prouerbium: *Si desant oculi habes Chefmesen*: Is aut Bellonium Acacalim efficit affirmare, & ex Aegypto adferri certò sibi constare: eaque abundantia, vt nummo quantara vix requiras emere possis. Matthiol. semen sibi incomptum ingenue fateatur.

Hoc semen aliquoties à me fatum Montbelg. in hort. Ill. E. C. non mihi prouenit, miserat frater C. Bauhinus cum hac inscriptione *Kismesen* Id est Cayrina Corusii, *Acalis* Dioscor. Habui etiam à Kazio medico & Chirurgo insigni Lutetiâ.

#### MORINGA LENTISCI FOLIO, FRUCTU MAGNO ANGYLOSO IN QVO femina Erui.

**Descriptio** LENTISCI magnitudine est Moringa cui persimilia habet folia: paucis prædita est ramis eamque ob causam exiguum præbet umbram, multis nodis scatur, adeoque fragilis est, vt facillimè cum ipse frutex, tum rami confringantur: folia saturatis virent, viuideque coloris sunt: saporis verd foliorum Napi: fructum fert pedalem, Raphani crassitie, octo angulis insignitum, colore dilutior inter viridem & cinereum, & intus candidum, medullosum, & in certa receptacula distinctum, quibus continentur rotunda femina Eruo similia virentia, & admodum tenera, sed sapore quàm folia aciore, Eduntur hic fructus cum



*Mangate* vbi admodum luxuriat, multoque fructus profert, qui vulgò in foro venduntur. Huius arboris radix vnicornis, & Lapidis Bezaar vices supplet, veraque theriaca est, qua vulgò incole vtuntur, cum aduersus omnis generis venena, tum ad morsus serpentium, maxime noxiorum, vulgò *Culebras de Capids* dictorum ahoiisque insectorum, & virulentorum animalium, cum intus sumpta, tum totis applicata. In cholera, & Cholera qua uocant, passione singularis efficacie esse apprehendit Acoſta: miscetur remediis Melancholicos humores purgantibus: & probè nota est Elephantiâsi Laborantibus, quorum plurimos eius continuo viù sanari perhibent.

cirribus co- Synonymizatus, aut alio modo paratus.

A Costæ *Moringa*, Arabibus & Turcis *Moria* Persis *Tame*, Guzaratenibus *Surra*. Hall. Lugd. *Moringa*. Castor. Durant. *Moringa*, Arab. Turcis *Moriaben*: Persis tamen *Guazarai* *Trenida*.

Abundè na- Locus.

scitur variis Indæ locis, & præsertim tota Prouincia *Malabar*, secundum flumen

Succedaneum.

Venena.


Cholera.

Elephantia.

#### SILIQVA PARVA INDICA SEMINE OB LONGO, NIGRO.

Inter fructus peregrinos Ill. C. VV. remb. Stur- Defectio  
gard. 1608. reperta est Siliqua, vnciam vnam & semis longa, vnciam fere semis lata, exterius rugosa, cinerea, quinque interstitiis distincta intus femina quinque, nigra, lucida, sublonga, inaequalia & vtrinque extuberantia: pistor notat lineolam quam non animaduertit. Figuram huius in sequenti tabella exprimendam curauimus sub. No. 1. Item.

#### ORVRCORIA FRVCTVS SILIQVOSVS.



**Descript.** Fructus ille ab Illustrissima Principe nostra nobis donatus fuit anno 1608. Siliquam refert maiorem compressam, crassiusculam, fescicam longam, & vnciam fere latam, subluteam partim, partim autem subsuscâ, vtrinque multis maioribus & minoribus, partim ad latera recedentibus sulcis, par-

*Petiolus.* tim ad Siliquæ incurtæ ductum obliquè dispersis, petiolum gerit exiguum, teretem atque fuscum Siliquam totam sustinentem, à parte petioli superiore pergendo deorsum, latiusculam, vnciamque ferè longam impressionem obtinet, quæ dein rursus in ascensu superioris partis gibberosè rotundatur, & attenuatur, partis exterioris circuitus plusquam semicircularis in ambitu, magis quàm tres vncias longus est, latiusculus, atque in medio neruum inhaerentem fortitur, qui si euellatur, Siliquam in duas partes æquales diuidit atque seiungit: concussa feminis intus latens manifestum præbet sonitu argumentum, indiciumque. Siliqua verò isthæc aliquid similitudinis habet cum Siliqua Senæ. Dum aperiretur facile sectioni cedebat, intus verò substantiam Siliquæ spissam facis vtrinque exhibebat, & duriusculam, vnicum tantum nucleum Phascolium æmulantem compressum tamen condebat, læui, tenuique tunica rugola inuestitum, colore aliquo modo violaceo imbutum, superat pulpa duriuscula albicans, quæ nobis nonnullam dulcedinem gustando imprimere videbatur.


*Semina.* Prædictum fructum sic tradit Clusius Exot. O-  
*Substantia.* rucotia fructus [redemptus à nautis redicibus  
*Nucleus.* ex America 1599.] arboris in ITIapock nascentis, Iuruvva appellatione, quo ad curanda vulnera vtuntur, hostium telis & iaculis in bello inflicta: fructus enim contuli vel contracti succum in vulnera instillare ferunt, ad ea consolidanda. Phnus autem is erat fructus, penè vnciam latus, & binas longus: sed contortus instat Siliquæ Cythi legitimi, longè tamen maior, valdè rugosus, cineracei coloris, semen plantum continens.

*Pulpa.*  
*Orecotia.*  
*Clusius.*  
*Locus.*  
*Iuruvva.*  
*Vilus.*  
*Vulnera.*  
*Deceptione.*  
*Semen.*

LOBVS QVADRANGVLARIS MAGNVS, GRANA LENTICULÆ NIGRÆ.

*Descriptio.*

*Forma.*



*Color.*

*Semina.*

*Granum lenticula.*

Vnde allatus est hic Lobus, inquit Clusius Exot. intelligere non potui multò adhuc minùs quàm appellatione donatus esset, quibusve facultatibus prædites. Quadrangularis autem erat formæ, septem vncias longus, penè binas latus, prominentibus & protuberantibus quodammodo in acumen dorso & ventre, ac longo vtrin-

que sulco à capite ad infimum Lobum, laterales alas superante: eius color fuscus & splendens. Cōtinebat autem hic Lobus in mediâ spina aliquot semina, vt ex agitatione deprehendere poteram: horum vnicum magna cum difficultate, nec eum integrum, sed per partes duntaxat educere licuit: verebar enim, ne Lobum [qui mihi solummodo concessus ad describendum] corrumperem: erat verò illud granum nigro & splendente cortice tectum, lenticulæ ferè magnitudine, cui suberat al-

ba membrana viridem pulpam continens non infusam, sed instar nuclei pitaciorum, feruidiore tamen sapore: ipsæ Lobi alæ intus inanes, nihilominus [vbi circa sulcos intumescabant] succo quodam dulci, qualis penè Cerationum, prædicte esse deprehendebantur.

LOBVS EX VVINGANDECAOVV.



Lobus iste singulari munificentiâ nobis ab Illustrissima nostra Principe donatus Anno 1608. insignis est crassitudinis, longitudinis autem sex minimum vncias æquans, & tres vncias latus, extensus est sabasper, tuberculis minimis inæqualis redditus, durissimus, Castaneæ saturati coloris vna in parte, oppositâ verò fuscâ, nigricantique magis ac splendens, in extremitate vna secundum longitudinem confidrata, ductu suo continuo in tumorem magis, ac magis allurgit, ex oppositâ verò Lobi parte sulcus insignis ipsi impressus conspicuus apparet: in latitudine eius Lobi ad mediam partem evidentior intumescit, ad latera verò sensim detumescit, tumore solummodo in extre-

ma longitudinis parte pediculo opposita liberatius excurrente: pediculum denique plus quàm vncialem obtinet obliquè infixum, duobus internodiis prædictum, ad Lobum tenuior est & rotundus, asperiusculus, fuscusq; vltèrius verò progrediendo versus vtrumque internodium crassior & asperior euadit, donec tandem in extremitatem latam teretemque abeat: aperti iam Lobi crassities pennæ scriptoriæ vulgaris crassitudinem adimplet, substantiâ albicante fuscâque donatâ: cavitatis eius vncialis est interiùs plusquàm fusca, nigricansque, ad pediculi regionem extremam angustior fit, & in se omni ex parte coarctatur, in oppositâ verò parte finali rotundatur & arcuatur conficantis digitum tenuissimo pulvere fusco aspergit inficitque: crustam habet anteriorem cavitatem vndique succingentem, quæ tenuior eum sit, leui opera à reliqua crassiore substantia abstrahi

*Pediculus.*

*Substantia.*



abstrahi auelliquis potest, cui subest splendens quædam substantia fuscedine interdum sibi consuetâ obrita, imbutaque. Iconem foliorum prædicta pnceps curauerat parandam ad plantam, quæ ei prouenerat, ex officulo ab ipsâ terræ mandato.

## ICON CLVSII



Locus

Lobi de-secipio.

Cortex.

Pediculus.

Color.

Pulpa.

Officula, Nucleus.

## CLVSIVS

**C**in. Exot. hunc Lobum sic tradit: Magnus & crassus erat hic Lobus quem à Iacobo Garcto accipiebam, non tamen ex Brasilia, sed ex alia prouincia procul ab ea distita relatum. Bini autem huius generis Lobi mittebantur: Vnus sex uncias longus, duas cum semelle latus: Alter quinque duntaxat uncias longus, binas latus: uterque unciam densus, crasso validoque duro & firmo cortice reclusus, binis nervis sine costis à pediculo, qui crassus & firmus ad extremum Lobum, secundum dorsum longitudinem productus, foris coloris fusci, internè cineracei, & tam exteriori quàm interiori parte scabri, continens fungosam pulpâ cineracci coloris, in qualitate bant quina aut fena officula veriùs quàm phaseoli, vncialis longitudinis, Auellanae siue Nucis Ponticæ fatuæ magnitudine, dura, nigra, album nucleum continentia, amygdalæ vel Auellanae sapore. Quia mittebat ex VVingandecau Americae versus Septentrionem tendentis prouincia, ad poli Arctici eleuationem 35 gradibus sita, quàm Angli ducè VValtero Raulzo detectam, Virginiam à sua Regina virgine nuncuparunt, allatum afferbat.

## ANIME GVMMI, FRVCTVS.

**S**imilem præcedenti Lobum, sed minorem ad me denud mittebat, ait Clus. in Exot. lib. anno 1590. ex cuius arbore *gummi Animæ* (de quo Hist. n. lib. 9.) sibi scribebat: vnde autem aduectum, non indicabat, nisi quis putet ex *Guyana* Prouincia allatum: nam *Guyana* fructus illos, quorum cap. 6.

libri secundi memini, simul accipiebam. Sed illis adhuc ampliorem, vt pote septem vncias longum, tres fere cum semelle latum, mihi Amstelredami ostendebat anno 1600. honestus vir Stephanus Ioannes Scharin, eiusdem vrbs Pharmacopæus: minùs tamen crassus erat, & coloris magis spadicei, nec plenam maturitatem adhuc adeptus videbatur, alioqui eiusdem prorsus formæ erat cum superiore. Ex insula *Hayri* siue *Isabellæ* vicina, deserta & inculta, ad quam fortè naus delata fuisset, recens allatum hunc fructum dicebat. Qualis autem esset arbor quæ eum tulisset, non potuisse intelligere. An porro alteruter istorum Loborum, *Guama Ouiedi*, cuius mentionem facit cap. 8. lib. 7. primæ partis hystoria Generalis & Naturalis?

LOBVS BRASILIANVS CRASSVS  
HYMIDVS CITRII SEMINE.

**L**obus Brasiliensis octo vnciarum longitudinem habebat; quatuor cum semelle latitudinem, planus, dorso gibbero & alio crassioribus & magis tumentibus ipso medullio, quia fortè ad plenam maturitatem nondum peruenerat quum legeretur: spissitas tamen dorsi & alui, à lacunarum, in quibus semen latebat, cau, uncie vnius, materiâ apprime spissâ consistens, Lacunæ binas uncias longæ numero decem, in quibus semen quasi quadrangulare vnciam longum, oblique situm: Lobi color externè ex fusco cineraceus.

Alium eiusdè generis longè minorem cum eodem accipiebat Clus. colore ex fusco rubescēte foris prædictum, qui per me-

Descriptio

Materia.

Lacuna.

Semen.

Color.

Varietas.

Color.

Lacuna.

Curry semen.

Locus.

nabatur, non adscribebat, quia ab his qui attulerant, forsassis intelligere nequuerat.

LOBVS MAGNVS EX GVINEA  
FOETIDVS CVM GRANIS  
Arboris Iudz.

Descript.  
Forma.

Forma.

Cortex.  
Color.

Pulpa.  
Odor.

Grana.  
Siliqua  
sive.

Vires gra-

norum.

Vulnera  
perniciosa.


Odor.

**V**aldè planus, ait Clusius Exot. hic Lobus, pro amplitudinis eius ratione: nam quum decem vncias longus esset, & trium vnciarum vel ampliore latitudinem haberet, vix quadrantis vncie erat eius crassitudo siue spissitas, sic vt antè maturitatem ab arbore lectum fuisse quispiam existimare potuisset: maturum tamen illam esse, semina in ipso reperta euincebant. Lento autem & veluti cutaceo cortice constabat, ex spadiceo fusci coloris, frequentissimis venis ab infima Siliquæ parte ex pediculo dependente sursum, & in latera vtrique sparsis, prædicto atque quodam modo ornato, medullam siue pulpam continēbat pallescentem, satis grauis odoris, & caput etiam ferientis, imò cerebrum offendentis, quā inuoluebantur aliquot grana, dura, ex spadiceo fusca, non valdè dissimilia granis, quæ in Siliquæ syluestris, vulgò arboris Iudzæ cognominatæ, Lobis reperuntur. Qualis porro esset & cuiusmodi folia proferret arbor similes Lobos gestans [arboris etenim fructum esse arbitrabar] mihi incomperum, nec qui hunc Lobum ad me mittebat honestus vir V Vilhelmus Pardynus, ex Guynea aduectum, vllam mentionem faciebat: sed illud duntaxat addebat, Chirurgum à quo acceperat, asserere incolas illius regionis in qua nascitur, grana fructu comprehensa in pollinem comminuerat, quo ad vulnera curanda vterentur, intra corpus verò non assumenda, quia perniciofa essent. Eam ob causam, pulpam gustare verebar, ad temperamentum eius explorandum: præterea ipsius grauis & teter odor, à gustandi desiderio satis me deterrebat, tametsi non suilem admominatus.

LOBVS BRASILIANVS INGENS  
SILIQUÆ ACACIÆ. FORMA.

Locus.  
Iuglandis  
sele.

Icon.



articulis distincta, Viennam Austriæ, mittebat Londino Iacobus Gareus.

Descript.

Erat porro hic Lobus articulatum distinctus in-

PLANTARVM.

**S**ar Siliquarum Acaciæ, singulorum articulorum medio etiam tumente, quo videlicet semen continebatur, binos pedes Romanos cum triente longus, quatuor vncias [vbi latitudo maior] latus, atque planus instar prædictarum Siliquarum Acaciæ, cineraceo quodammodo colore præditus, qui tamen ante maturitatem lectus fuisse videbatur: nam semina contracta & rugosa erant, orbiculari penè figurâ, Nuci vomicæ non valdè dissimilia, quodam vestigio impresso eâ parte, quâ Lobo adhæserant, coloris ex albo rufescentis.

Acacia Si-  
liqua  
Longitudo:  
Latitudo.

Color.

Semina:  
Vomica  
Nux.

SILIQUA SEMINE COLVTEÆ.

**A**bat Paludanus Clusio Exot. Siliquam tres vncias longam [licet interdum breuior reperiatur], satis gracilem, rugosam & inæqualem, cineracea cute constantem, quæ secundum longitudinem in binas partes dehiscerebat, multa grana continens plana, dura, Coluteæ granorum ferè æmula.

Descript.  
Longitudo.

Cutis.

Grana Co-  
luteæ.

LOBVS LONGVS AROMATICVS  
ODORE FERÈ BELZVINI.

**L**ondino ad Clusium mittebat Hugo Morgagnus Sereniss. Regiæ Angliæ Elizabethæ pharmacopœus anno à nato Christo 1602. quinos aut senos Lobos peregrinos, quid de illis sentiret eius opinionem exquirens: quam sane, quia similes antè nunquam ipsi conspecti, difficulter admodum se pronuntiare potuisse, ingenue fateatur.

Erant porro illi Lobi variæ magnitudinis: nam nonnulli sex duntaxat vncias longi, alii septem, quidam etiam octo vncias longitudine superabant: singuli vix semunciam erant lati, omnes teretes & rugosi, subfusci coloris, eâ parte quâ pediculo inhæserant non nihil recurui, extimâ parte obtusa, breuiter formâ non valdè dissimiles quibusdam oblongis & teretibus corniculis, quæ in Terebinthi arbutculis olim obseruare meministi: qui aperti (in binas enim partes æquales secundum longitudinem aliorum Loborum instar diuidebantur) nihil continere deprehendebantur, quàm tenuem quandam pollinem nigrum & splendens, tenaciter interiori Lobi parti inhærentem, odoris ferè Belzuii iniud, sed si quis naribus admoueret, capitis grauedinem inducentem. Vnde autem habuisset, & an quidpiam intellexisset, nati ne essent in humili aliqua planta, an in arbore, aut quæ Prouincia eos produxisset, nihil adscribebat.

Descript.  
Magnitudo.

Color.

Pollen:  
Belzuii  
odor.

SILIQUA THYMIAMATIS  
ODORE.

**G**ener Cherlerus anno 1606. attulit ex Angliâ fructum nomine Siliquæ Thymiamatis odore, quem habuit munere humaniss. & præstantiss. pharmacopœi Londinensis Iacobi Gareti: ea Siliqua est coloris ferè Castaneæ, diluoris tamen, octo vncias longa circiter, crassitudine circiter Siliquarum Nerii, virentem multò crassiore non dubitamus, secundum longitudinem rugosa, & tota sulcis constans, à principio ad extimam partem, quam existimamus in acutum definere, eam in nostra Siliqua quæ nobis vnica est, tantillum abrupta est: principium est latiusculum, & nonnihil

Descript.

Color.



nonnihil contortum quasi deorsum pependit in sua planta, non est rotunda Siliqua, facile tamen credimus fuisse, sed exsiccatam, compressam & corrugatam, est enim caua, & plena minimis seminibus, minoribus quam Peti, nigris, splendens, sub dentibus stridentibus: odorata & degustata Siliqua suauem præbet odorem, ac post se relinquit aliquam acrimoniam, cum ab Illustri Principis nostri pharmacopæo Theobaldo Nobili Genero nostro peteremus quem odorem referret, respondit Styriaci. Nos facile patiemur nobis persuaderi eandem esse cum precedenti Lobo.

Semina.

Odor Siliquæ.

### LOBO FORTE INCLUSVS FLA- VESCENS FRUCTVS.

Descriptio

Cortex.



Nucleus.

Descriptio Clusii.

Color.

Fructus hic liberali Illustrissimæ nostræ Principis munere nobis anno 1608. donatus, fescunciam circiter in longitudine sua adæquans, vnciam verò in latitudine adimplens, corticem habet ex vna parte dimidia semitotundum & vndique ferè tectum, flauescens, lauem, in medio tamen aliquatenus fassigiatum, vnde ad

verumque latus costa quædam elatior decurrit, vsque ad sirem huius dimidii fructus, parte etiam huius superiore gibbus quidam eminentior visitur, tandem fructus hic in duo quasi segmenta distinguitur, sulcis quibusdam obliquis Græcorum penè ypsilon imitantibus, secundum latera utraque ad finem penè corticis productis: ex altera fructus istius parte dimidia cortice prior denudatus detestulive conspicitur, ita quidem ut alteri alicui rei adhaerisse priusquam auelleretur credibile sit, nam in extremitate in orbem circumducta caua quædam fossula, partem interiorem ambiens conspicua sit, nucleus verò in medio cortice contextus inæquali multique scrobiculis nunc profundioribus, nunc verò parte intermedia elatiore foueolæ minime occurrunt, in fossula verò extrema hinc & inde Lineæ nunc semitotundæ: nunc verò decussatim se intersectantes offeruntur, spectandæ fossulæ denique ora extrema à corticis prius descripti extremitate inæquali fimbria donatur, modò enim elatiori sine intrò curuata alius assurgit, modò retrusior hebetiorque apparet.

De hoc fructu hæc tradit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. Fructus à Jacobo Gareto missus qui Lobo inclusus fuisse videbatur, aut saltem alio operimento, nam vestigium supinâ parte retinebat quâ alteri rei inhaererat: alioqui firmo putamine præditus erat, licet valde tenui, & præ politura splendens, coloris ex spadiceo flauescens, nucleum putamini non adherentem continentem, in binas partes diuiduum, internè candicantem, subacido sapore.

De lobo incluso Fructu incluso nigricante & candicantibus venis distincto. Item de lobo simili Fructu quodam, vt & de Samparatra Indorum lobo spinoso & de alio simili Fructu consulari idem Clusius in Exot.

### LOBVS EXINADHÆ CVM PISO

DVRO CINEREI COLORIS.

Lobus hic, vt recenset Clusius Exot. membratissimo, cortice constabat tres vncias longus, binas latus, fusco, subrubente, & frequentibus pinnulis hirsuto: meminit etiam vidisse minores,

Descriptio

Fructus.



& vnciam vel fescunciam longitudinem non excedentes, sed qui singulares fructus duntaxat continerent, hic verò binos instar magni Pisi, coloris ex albo cineracei, paruo hilo fusco præditos: quâ Lobo inhaerant, aded solidos & duro putamine contextos, vt faxei videretur, & cum difficultate constringi possent, contra autem,

album nucleum continere deprehenderentur, impensè amari saporis, non minus quam Lupini, Maiorem à Richardo Gathacipiebat, cum inscriptione è Brasilia allatum esse: minorem mittebat Jacobus Garatus. Minori similes, sed detestis spinis, referebant ex Iava Batavi anno 1597: Habuit etiam ex Virginia Lobum cum suis pinnulis: tum Pila nuda Loboque exempta, reperta inter Aromata è Tripoli Syriæ aduecta: vt variis locis hoc legumen nasci videatur. Nam nullæ ferè naues ex Africa, America, aut aliis peregrinis regionibus calidioribus redeunt, quin & hæc Pila nuda referant. Sed etiam anno 1602. mittebat ad nostrum authorem Clusium doctissimus vir Iohannes de Castaneda nudum Pisum cum hac inscriptione *Mates de India pardo*, hoc est, *Mates Indicum* cineracei coloris: [de Pilo Ochreæ colore, illi non ab simili, Londino misso vide eundem Clus.] Observabat autem illud nomen *Mates* pluribus leguminibus peregrinis ab Hispanis tribui. Eiusdem porò magnitudinis cum priore illo, Lobum, tres videlicet vncias longum, & duas latum, eumque valde integrum, & suo oblongo pediculo [qui nonnihil spinosus] adhuc inhaerentem, ipsi ostendebat anno 1599. honestus vir Iohannes Gouerts Amstelred. ciuis & mercator, qui valde integer erat, nec detritus spinis. Considerent Lectores, quæ dicta sunt Hist. nostræ lib. 3. de fructibus qui sunt tanquam torridè elaborati.

Mates.

### DABVRI FOLLICVLVS AMERICANVS, AD DATVRAM ACCEDENS SEMINE RUBRO.

Aburi fructum misit Clusio VValichius Syduerts Amstelredamo, qui anno 1599. red-

Descriptio

Color.

*Spina.  
Membrana*

*Bacca.  
Alum.*

metat à nautis ex America reducibus membrana-  
ceus erat folliculus quem an in arbore nasci di-  
cat, an in frutice, dubius est: eum enim dunta-  
taxat accipiebat bacillo suo satis tereti adhuc in-  
hærentem, & qui plures folliculos sustinuisse vi-  
debatur, anno 1585. Viennæ Austriæ à Richardo  
Garch Londino missum. Erat autem is folliculus  
spadicei ad fuscum tendentis coloris forinsecus,  
extremâ parte mucronatus, toto corpore hisp-  
idus, & mollibus spinulis præditus, lescuncialis



aut amplioris  
longitudinis, &  
vncialis latitudi-  
nis, qui in binas  
partes dehiscens,  
internè cauus,  
& veluti in qua-  
tuor loculamen-  
ta distinctus te-  
nellam mem-  
bianam conti-  
nebat, in qua  
veluti exiguari  
baccarum Vu-  
la Pyri formam  
exprimentium  
& pusillis petio-  
lis inherentium,  
coloris rubri &  
quasi miniati,  
quibus inspersæ  
tanquam auræ

micæ, præsertim in ipso umbilico.

Similem deinde decimo quarto post anno  
Amstelredamo missum accipiebat ab honestissi-  
mo viro V Valichio Syuerts *Daburi* appellatione,  
quum præcedens sine nomine missus esset.

*Arbor fi-  
nium re-  
gundorum.*

Cæterum grana illa miniata quæ in priore con-  
spiciebantur, suspensionem faciebant, an fructus  
esset Arboris finium regundorum, de qua Iulius  
Scaliger, lib. Exoticorum Exercit. 6. certè huius  
grana, tametsi vetusta, dentibus attrita, rubro vel  
miniato colore inficiebant, eiusque rei causâ, An-  
gulus quidam in Brasilia habitans, Londinum mit-  
tebat pro specimine, an ex eo quæsitum facere pos-  
set. An Bixa Ouiedi?

#### OVIEDI BIXA.

*De scripto  
Color.*

**M**Eam suspensionem, inquit Clus. Exotic. quam  
de folliculo præscripto habebam, non pro-  
fus vanam fuisse, Anno 1602. demùm intelli-  
gimus. Nam Septembri mense eiusdem anni, inter



quædam serena  
quæ mittebat  
Doctiss. vir Io-  
hannes Castane-  
da, erat similis  
folliculus, bre-  
uior tamen, vt  
quæ lescunciam  
longus duntaxat  
esset, vnciam la-  
tus in binas par-  
tes dehiscens, &  
cuius spinulæ at-  
trita: externa  
pars fusci colo-  
ris quemadmo-  
dum etiam in-  
terna, sed hæc  
laevis & paulu-  
lùm splendens,  
in cuius medio  
aliquatulum ca-

uo, vtrique pars quindecim aut sexdecim grana  
saturè rubra, exigui etiam Pyri formam referen-  
tia; brevissimo, tenuissimoque petiolo singula  
suspensa, habebat, eaque nullis aureis micis asper-  
sa, nisi extimâ parte, quæ splendens & veluti au-  
rea, minimâ nigrâ maculâ tanquam puncto erat  
insignita: nullam verò obseruabam in eo follicu-  
lo siue capite loculamentorum distinctionem:  
nam, vt dixi, dimidia vtrique folliculi siue capitis  
pars, grana serie quadam disposita in media con-  
caua parte continebat, maiora & magis matura,  
quàm quæ ex Anglia mittebantur, & saluâ dun-  
taxat paululùm aspersa, eleganti minù colore infi-  
ciebant: chartæ autem, qua folliculus involutus,  
inscriptum erat, *en que se vnt an los Indios*, hoc est,  
quo se inungunt vel inficiunt Indi. Octobri ve-  
rò insequente, alium elegantem ramum [cuius  
descriptio ex eodem loco petenda] ad eum misit  
honestissimus vir Petrus Garetus, significans  
Brasilianos vt ad corpus rubro colore inficien-  
dum. cui addiderat Vicæ Africanæ ramulum &  
quo plures Siliquæ dependebant, nonnullæ sua  
grana rubra adhuc reuolutes, & ramum *Iuni-  
pappee* vna, sustinentem fructum suum, verùm  
longè minorem, quem Clusius cap. 10. lib. prim.

*GRANA.*

*Bixa Ame-  
ricanorum.*

*Vfus.  
Vicæ Afri-  
cana.  
Siliqua.  
Grana.  
Iunipap-  
pee.*

Exotico. exhibet. De quo nos supra Historia no-  
stra generali lib. 3. cap. de Genipot, siue Iuni-  
pappee vna Brasilianorum tractauimus. Cæte-  
rùm non dubium est quin hic fructus illi similis  
sit, quem Ouiedus Bixa appellat, cuius fructicem  
in humanam altitudinem, interdum etiam am-  
pliolem, assurgere scribit, & folia Xyli foliis simi-  
lia proferre.

*Bixa.*

*Xyli folia.*

FINIS LIBRI DVODECIMI.







ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

# OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM

QVAE TVM IN PRIMA TVM IN SECVND A PARTE

TOMI PRIMI HISTORIAE VNIVERSALIS

PLANTARVM CONTINENTVR.

## INDEX

Per pp. denotatur pars prima : per p. 2. verò pars secunda, quæ incipit à LIBRO SEXTO.



Baues, Aethiopicus fructus pag. 109.	Anime & Copal	325.p.2
partis primæ.	Animes species ad Succinum luteum accedens	326.p.2
Abelicea siue Sauralus adulterina	Anime similis resina, ex albo flavescent	Ibid.
Cretica	Anime alba perlucida	Ibid.
Abhel, Fructus Orientalis	Anime colore Colophonia	Ibid.
Abies semina	Animos species alba Copal Indis	Ibid.
Abietina resina, liquida, & arida.	Anon Omede	112.p.p.
Abies Mas Theophrasti, siue Picea Latinorum.	Antrirheumaticus Cortex	463.p.p.
Acacalis Veterum.	Antispodia	223.p.2
Acacalis quorundam siue Kefinesen	Ab Ono seu Asino denominata Planta	364.p.2
Acacia in generè.	Aquisfolium, vide supra Agrifolium	114.p.2
Acacia vera	Arara Fructus Americanus	333.p.p.
Acacia Gummi, siue Gummi Arabicum.	Arat acou Brasil. semine Melonis fusco, feruido.	315.p.p.
Acacia Dissol. quibusdam, aliis Cardem	Aracynappil, Aurantiis parvis similis fructus	106.p.p.
Acacia cognata planta	Arbor fructum Melonis facie proferens.	108.p.p.
Acacia cognata alia	Arbor cucurbitifera, Ficus Nigritarum	113.p.p.
Acer ex Veteribus in genere	Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitæ ex Guinea	113.p.p.
Acer vulgare minori folio	Arbor peregrina fructum ficus similem gerens	144.p.p.
Acer Monspessulanum.	Arbor fico similis venenata	147.p.p.
Acer mains, multis falso Platanus	Arbores Indica Theophrasti tres	147.p.p.
Adrachne Theophrasti	Arbor pomifera, An Musa?	151.p.p.
Aereia aut Chalcios	Arbor Muniscus	169.p.p.
Agalochum Veterum in genere	Arbor Persea	Ibid.
Agalochi & ligni Aloes substituta, adulteria, & equivocationes	Arbor Mamay	172.p.p.
Agaricum	Arbor vinifera, Couton, in Angliis similis	254.p.p.
Agriaholid Aegyptium folio Buxi	Arbor Tinctoria	254.p.p.
Agnus Scythica, Borometæ.	Arbor Americana Fenoabjou	255.p.p.
Agnus siue vitex	Arbor Gebuph siue Cobham	325.p.p.
Agnus folio non serrato	Arbor peregrina lanifera	347.p.p.
Agnus folio serrato	Arbor Manicongo nucifera, & de aliis quibusdam arboribus Guineæ	385.p.p.
Agria siue Aquisfolia glandifera Anguillara	Arbor Pacal	463.p.p.
Aquisfolium seu agrifolium vulgò	Arbor aquam stillans	Ibid.
Agul & Albagi Arabibus, planta spinosa Mannam resipiens	Arbor Myrsosydaios Scaligeri	492.p.p.
Ahorabi, fructus venenatus	Arbor sinum regundorum	110.p.2.
Alnus vulgaris	Arbores ferule similes, nigra & candida	265.p.2.
Alnus incana & hirsuta	Arbor Lauendula folio	Ibid.
Alno similis arbor	Arbor vitæ, siue Paradisiaca vulgò dicta	286.p.2
Ambare Indica	Arbutus	83.p.p.
Amba siue Mangas	Arecha arboris fructus Cosselo	374.p.p.
Ambarum	Aria siue Phellarys	99.p.2
Amurca	Aria siue Acilagua Bellonii	Ibid.
Amygdalus dulcis & amara	Aspalathus, ac de eo sententia Veterum	464.p.p.
Amygdaloperficum	Aspalathus Rhodius	466.p.p.
Amygdala Peruviana	Aspalathi adulterium fortè Oleastri radix	471.p.p.
Amygdala Guzanensis	Aspalathus Cretica Alpini, odoris persuasus	472.p.p.
Anacardium	Aspalathus Rhodius rubens odoratissimus	473.p.p.
Anagris Veteribus	Aspalathi nomine datum lignum grauius olens	Ibid.
Anagris vera ferida	Aspalathus Dioscoridis, Plinii, & Galeni	474.p.p.
Anisum Indicum, siue Enigi fructus stellatus	Aspalathus secunda trifolia, quæ Acacia secunda	
Angor, arbor Castanæ fructu amaro	Matthiolo trifolia	375.p.2
	Aspalathus secunda Monspeliensis	402.p.2

# INDEX

<i>Aspalathus Abrotomi facie incana</i>	403.p.2	<i>Cephura que salicis folio dicitur</i>	338.p.2
<i>Aspalathus Monspeliensis affinis Scorpius secunda Clusio</i>		<i>Caprificus</i>	344.p.p.
<i>Ibid.</i>		<i>Caphura resins</i>	344.p.p.
<i>Aspalatho affinis Tragus, forte Rhamni species ex Candia Valerandi Doures</i>	404.p.2	<i>Carambolas Acoffe</i>	177.p.p.
<i>Aspalatho secunda Monsp. similis Scorpio, seu Nepa</i>		<i>Carandas Indica arbuti facie</i>	88.p.p.
<i>Anguill. flore ex albo pallescente, vel ad purpuram accedente</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Caranna Garcia nomine data resina</i>	329.p.2
<i>Anacardi facie Myrti</i>	318.p.p.	<i>Cardem siue Acacia Dioscor. quibusdam</i>	432.p.2
<i>Auellana Byzantina</i>	270.p.p.	<i>Carcapuli</i>	105.p.p.
<i>Auellana Indica maiores Cortusi nigricantes</i>	293.p.p.	<i>Caries lignorum</i>	145.p.2
<i>Auellana Indica maior subrusa Clusio</i>	494.p.p.	<i>Carpasus &amp; Opocarpasum</i>	316.p.2.
<i>Auellana Indica pro Balsami fructu missa, eiusque species alia minor</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Caryophylli Indici</i>	423.p.p.
<i>Auellana Indica Mehemberbene Cortusi</i>	307.p.p.	<i>Caryophyllorum resins</i>	429.p.p.
<i>Auellana India Mehemberbene valde similis fructus</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cariophyllo aromatico similis fructus</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Ibid.</i>		<i>Cassia Moslyrica nomine datus Cortex</i>	451.p.p.
<i>Auellana Indica peculiaris Camerarii</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cassia lignea fusca Aromatica, Cinnamomum ex Sarmatia dicta</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Auellana Indica villosa foraminata</i>	308.p.p.	<i>Cassia lignea fusca Aromatici &amp; glutinosi saporis.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Auellana Mehemberbene Cortusi species alia, nuda &amp; vestita Villo</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cassia lignea fusca aromatica acrior</i>	452.p.p.
<i>Auellana compressa facie fructus vel semen</i>	314.p.p.	<i>Cassia externa parte insipida</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Auellana purgatrix noui Orbis</i>	322.p.p.	<i>Cassia an forte Veterum?</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Aurantio simili fructu arbor</i>	106.p.p.	<i>Cassia Apum, Coronaria, &amp; Poetica: &amp; etiam de Cneoro</i>	457.p.p.
<i>Aurantii formâ, coloris Cineracei fructus, stypticum edens</i>	332.p.p.	<i>Cassia lignea Monspeliensium</i>	458.p.p.
	<b>B</b>	<i>Cassie officinarum adulterina</i>	459.p.p.
<i>Bacca cuiusdam pregrandis officulm</i>	332.p.p.	<i>Cassie adulterina vel Pseudocassie nomine datus cortex</i>	460.p.p.
<i>Balaustia Hispanica</i>	82.p.p.	<i>Cassia purgatrix</i>	416.p.2
<i>Balsami Peruaniani fructus Clusii</i>	294.p.p.	<i>Castanea</i>	121.p.2
<i>Balsami Peruaniani Fructus Metæ formâ</i>	295.p.p.	<i>Castanea humilis racemosa</i>	127.p.2
<i>Balsamum ex Peru</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Castanella peregrina</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Balsamum de Tolu</i>	296.p.p.	<i>Castanea equina folio multifido</i>	128.p.2
<i>Balsamum nouum fructu racemoso</i>	297.p.p.	<i>Castanea Peruaniana</i>	129.p.2
<i>Balsamum verum, Xylbalsamum, Carpobalsamum, Opobalsamum</i>	298.p.p.	<i>Castanea purgatrice</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Balsamum certarum quarundâ plantarum quas Copalbas vocant</i>	306.p.p.	<i>Castanea species fructus peregrinus</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Babab, sine Abano Clusii</i>	119.p.p.	<i>Castanea fructu Leucoma.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Baruce fructus è pluribus mucibus, arboris Hura</i>	333.p.p.	<i>Cedrus, atque de ea Antiquorum sententia</i>	273.p.2
<i>Bdellium</i>	317.p.2.	<i>Cedria' etetum</i>	275.p.2
<i>Belenzan aut Belenzan Auerois</i>	320.p.2	<i>Cedrus magna siue Libani confiera</i>	277.p.2
<i>Benioinum obuolutum folio, maximum.</i>	153.p.p.	<i>Cedrus Atlantis Montis</i>	283.p.2
<i>Benioinum cuius arbor folio Citri</i>	320.p.2	<i>Cedrus Phænicea siue Oxycedrus</i>	297.p.2.
<i>Ber Indica fructu Iniubino</i>	44.p.2	<i>Cedrus Lycia reclusa Bellonio dicta</i>	300.p.2
<i>Berberis vulgo que &amp; Oxia cantha putata</i>	52.p.2.	<i>Cetarium monococcon Indicum</i>	421.p.2
<i>Betre, Berelle</i>	437.p.p.	<i>Cerasus in genere</i>	216.p.p.
<i>Betula</i>	148.p.2	<i>Cerasus syluestris fructu rubro &amp; nigro</i>	220.p.p.
<i>Bixa Quicdi</i>	440.p.2	<i>Cerasa duracena oblonga</i>	221.p.p.
<i>Bon vel, Ban Arbor</i>	422.p.p.	<i>Cerasa acida rubella</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Brindones Indici, fructus rubentes, acidi</i>	89.p.p.	<i>Cerasa acida nigricantia, solidiora, tardius maturifcentia</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Brisat haer China</i>	112.p.p.	<i>Cerasus pumila</i>	222.p.p.
<i>Bruta Plinii</i>	285.p.2.	<i>Cerasus flore plena</i>	223.p.p.
<i>Buna, Bannu, &amp; Bonchos Arabum</i>	421.p.p.	<i>Cerasus vno pediculo plura ferens</i>	<i>Ibid.</i>
	<b>C</b>	<i>Cerasus racemosa</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Cacao similis fructus</i>	291.p.p.	<i>Cerasus syluestris amara, Mahaleb putata</i>	227.p.p.
<i>Cacao America, seu Auellana Mexicana</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cerasus racemosa quibusdam, alius Padus</i>	228.p.p.
<i>Cachos</i>	118.p.p.	<i>Cerasi fructu Lotus arbor</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Caïom</i>	336.p.p.	<i>Cercis Veteribus, &amp; equiuoca</i>	433.p.2.
<i>Calaf, seu Ban Alpini</i>	220.p.2	<i>Chalcos</i>	
<i>Canamum</i>	324.p.2	<i>Chamaesepilus</i>	72.p.p.
<i>Canella Acoffe</i>	436.p.p.	<i>Chamaebuxus, siue chamaepyxos quibusdam</i>	524.p.p.
<i>Canell. fructus quibusdam, nobis potius folij Indi</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Chamaecerasus monti generosi</i>	229.p.p.
<i>Canella seu Cinnamomum vulgare</i>	446.p.p.	<i>Chamaescus</i>	128.p.p.
<i>Canella crassiore cortice</i>	451.p.p.	<i>Champe flores Indici</i>	107.p.p.
<i>Canella ad Cinnamomum vulgare accedens</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Chamariphes officulo non dissimili sed maior, orbicularis penè</i>	314.p.p.
<i>Canella alba quorundam</i>	461.p.p.	<i>Chamariphe peregrina</i>	371.p.p.
<i>Canella folio mali Punica</i>	455.p.p.	<i>Chamariphes forte folium</i>	372.p.p.
<i>Canella peruana fructu pileo simili, &amp; alia ei simili arbor</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Charamei Acoffe fol. Pyri</i>	88.p.p.
		<i>Chiroef Theueri</i>	112.p.p.
		<i>Choyne Americana</i>	<i>Ibid.</i>
		<i>Cinnamomum &amp; Cassia: atque de iis placita Antiquorum</i>	440.p.p.
			Cinna-



# INDEX.

Cinnamomum & canella vulgaris	446.p.p.	Draco arbor, & de eius lachryma, seu sanguine Draconis, Cinnabari Veterum	402.p.p.
Cinnamomi arbor Thenece	ibidem	Draconis sanguinis fructus Monardi, Draconis effigiem impressam habens	405.p.p.
Cinnamomi folium Clusii	455.p.p.	Duriones Acofia	214.p.p.
Cinnamomi Castia substituta & supposititia, item adulteria & aquiuoca	456.p.p.	E.	
Citra, Indis lignum	106.p.p.	Ebenus.	394.p.p.
Citrum monstrosum de maximis	96.p.p.	Ebeni versicoloris materia arbor pyrifolia	397.p.p.
Coca Indiarum foliis Myrti	440.p.p.	Ebulus sine Sambucus herbacea.	549.p.p.
Coccigria sine Cotinus putata	494.p.p.	Echinopoda Cretensis.	404.p.p.
Coccus radicum	312.p.p.	Echinopus Plutarchi	411.p.p.
Cocci Orientales	348.p.p.	Elemeli	23.p.p.
Cola fructus ad sitim	210.p.p.	Eleustaphylos	26.p.p.
Coles, Cacao formam quodammodo referens externa parte rugosus & niger	425.p.p.	Electrum sine succinum in genere.	330.p.p.
Coles, fructus alius similis, niger, splendens, cum macula subrufa	425.p.p.	Elemi resina.	335.p.p.
Colutea & Colytea Veterum	376.p.p.	Ensda siccus Indica modo nascens	447.p.p.
Colutea Vesicaria	380.p.p.	Erica in genere.	353.p.p.
Colutea Scorpioides	381.p.p.	Erica baccifera Matthioli.	322.p.p.
Colutea Scorpioides humilis	382.p.p.	Erica baccifera Lusitanica	323.p.p.
Colutea Scorpioides quadam sine Polygalo Coruasi similis planta, sed maior	ibidem	Erica vulgaris, humilis, sempervivens, flore purpureo & albo	354.p.p.
Colutea parva species, Polygala Valentina Clusii	383.p.p.	Erica Myrica folio, camentosis & incanis foliis Clusio	355.p.p.
Colutea Canle Geniste fungosa	ibid.	Erica folijs Coris, flore albo	356.p.p.
Colutea foliis Anil nominatum	384.p.p.	Erica, foliis Corios quaternis, flore Purpurascens	356.p.p.
Coral arbor filiquosa	426.p.p.	Erica folijs Corios quaternis, floribus herbaceis, deinde ex albo purpurascens.	ibid.
Coralli arbori similis	ibid.	Erica folijs Corios multiflora	ibid.
Cornus sativa seu domestica	210.p.p.	Erica arborescens, floribus luteolis vel herbaceis minimis	357.p.p.
Cornus semina, purata Virga sanguinea	214.p.p.	Erica arborescens Monpel. flore purpurascens, ramulis ternis	ibid.
Cornus adulterina seu Pse. durania Cordo	216.p.p.	Erica ramulis ternis floribus saturatoribus purpureis	358.p.p.
Cortex VVinteranus acris, sine Canella alba	460.p.p.	Erica ramulis & folijs Coris ternis, floribus ex rubro purpurascens maioribus.	
Cortex Antirheumaticus	463.p.p.	Erica folijs corios flore purpureo dilute	ibid.
Cortex Eriophorus	461.p.p.	Erica Brabantica folio Coris hirsuto quaternis	359.p.p.
Cornu Canarica, Arbutio, vel malo aurea similis	89.p.p.	Erica parva folijs Corios quaternis, flore herbaceo, foliaceis Capitulis	ibid.
Corylus sativa	266.p.p.	Erica parva Pannonica folijs Corios ternis, flore carneo, Capitulis Thymi	ibid.
Coroneaster	73.p.p.	Erica Anglicana parva capitulis hirsutis	360.p.p.
Cunane fructus Arboris Morremor longus vel ovalis, ferè niger	335.p.p.	Erica peregrina Brancionis Lobelii	ibid.
Cunane nucis similis, cinereo coloris	334.p.p.	Erica folijs Corios affinis planta	ibid.
Cupressus	280.p.p.	Erinaceus fructus Indicus	315.p.p.
Curcas auellana magnitudine	292.p.p.	Eseulus vel Phegus	74.p.p.
Cyanus arborea	74.p.p.	Euonymus Veterum	201.p.p.
Cytisus in genere	366.p.p.	Euonymus multis, altis Tetragonia	ibid.
Cytisus filiqua incurva, folio candicante	367.p.p.	Euonymus latifolia	202.p.p.
Cytisus Clusii Pannonicus alter foliis omnino incanis	369.p.p.	Euonymus flore Phoeniceo	203.p.p.
Cytisus secunda species altera Pannonica Clusio, hirsuta valde	ibid.	Et alche	302.p.p.
Cytisus Hispanicus primus Clusii, folio virecente	ibid.	F.	
Cytisus montis Calcaris	370.p.p.	Fagara maior & minor	350.p.p.
Cytisus Hispanicus Clusii secundus	ibid.	Fagus latinorum, Oxya Gracorum	117.p.p.
Cytisus Gesneri cuius flores ferè spicati	ibid.	Fagus sepium vulgo Ostrya Throphastris	146.p.p.
Cytisus tertius Hispanicus cum breui pediculo	371.p.p.	Fausel sine Areca palmae foliis, eiusque fructus varietates	389.p.p.
Cytisus hirsutus	372.p.p.	Fausel accedens Nux	393.p.p.
Cytisus tertia Clusii Pannonica sparsis ramis	ibid.	Ficus	128.p.p.
Cytisus tertius Pannonici tertia species Clusio supinis ramis	373.p.p.	Ficui fructus similis	144.p.p.
Cytisus glaber, filiqua angusta	ibid.	Ficus Indica	145.p.p.
Cytisus glaber filiqua lata	ib.	Ficus Indica Linschotani	151.p.p.
Cytisus genus missum, nomine Ebeni secundi floribus purpureis	374.p.p.	Ficus Nigritarum	111.p.p.
Cytisus facie Alysson fruticans quorundam Lob.	ibid.	Filum arboreum tenuissimum, & candidissimum	384.p.p.
D.		Fraxinus vulgaris	174.p.p.
Daburi folliculus Americanus ad Daturam accedens, semine rubro	439.p.p.	Fraxinus tenuiori & minori folio	177.p.p.
Datura semine fructus	332.p.p.	Fraxinus rotundiore folio	ibid.
Diospyros	75.p.p.	Fructus Brasiliensis ovalis figura instar Limonis	106.p.p.
Doricinum Monspellanum fruticosum	387.p.p.		
Doricinio congener planta	388.p.p.		
Tom. I,			

- Fructus Indicus Pyriformis, granis intus nigris, cucur-  
bitani secundis generis 114.p.p.  
Fructus similis nucis Persica, nucleo venenato 172.  
p.p.  
Fructus bifusus Amygdalam referens 183.p.p.  
Fructus exoticus bifusus Amygdali facie 184.p.p.  
Fructus Pruni facie, è Guinea, in quo semina 200.  
p.p.  
Fructus sonorus, acidus, pruni parvi magnitudine ibid.  
Fructus Pentagonus, vel Oficulum 210.p.p.  
Fructus exoticus non valde dissimilis Myrobalani ni-  
gris, ficulo ibid.  
Fructus Indus admirabilis 266.p.p.  
Fructus Brasiliæ rum perniciiosus 291.p.p.  
Fructus Amygdaloides nigrus peregrinus 292.p.p.  
Fructus Peruanus Amygdaloides, sub terra nascentis ib.  
Fructus exotici prona parte in arcum elatus, supina  
planis, fuscus 293.p.p.  
Fructus binalus Indicus niger 293.p.p.  
Fructus accedens nucis Cypore, orbicularis, laevis, spadiceo  
coloris ibid.p.p.  
Fructus Iuglandis ferè magnitudine durissimus, Indis  
Carairi sapore nucis M. sebata 308.p.p.  
Fructus peregrinus ouatus similis lapidi Iudaico 309.  
p.p.  
Fructus fuscus, durus, striatus, strepitum edens 309.p.p.  
Fructus exotici fisci similis 310.p.p.  
Fructus Pyriformis, rugosus, niger, duro corio rectus  
310.p.p.  
Fructus Pyriformis laevis, spadiceo coloris, fragili cortice  
rectus ibid.  
Fructus peregrinus sulcatus ibid.  
Fructus omnino rotundus, luteus, non splensens cum  
sua frutice 311.p.p.  
Fructus peregrinus tanquam torno elaboratus, argen-  
teus 311.p.p.  
Fructus peregrinus tanquam torno elaboratus, flauus  
ibid.  
Fructus Indicus tanquam torno elaboratus, viridis 312.  
p.p.  
Fructus peregrinus Clusii durissimus, aliusque similis  
ibid.  
Fructus peregrinus orbicularis, cuspidatus ibid.  
Fructus similis Lauri Bacca ibid.  
Fructus rugosus, parvus, grauis, orbiculatus pene figura,  
quasi compressus 313.p.p.  
Fructus planus, forma cordis, cum multis tuberculis, ib.  
Fructus orbicularis, perpolitus, mucrone glandis ibid.  
Fructus sublongus, cortice duro, fusca rectus Epidermi-  
de 314.p.p.  
Fructus Indicus, vel nucleus luteus parvus, Auellana  
oblonga facie, compressus ibid.  
Fructus dysentericus flauus 316.p.p.  
Fructus Indicus grandiosus, vel tuberosus minor ibid.  
Fructus Pyriformis fuscus, laevis, striatus, cum coronula,  
in quo nucleus 317.p.p.  
Fructus triangularis scissuras ostendens ibid.  
Fructus Beretinus 323.p.p.  
Fructus quodammodo similis glandi iligneæ, cortice fra-  
gili ibid.  
Fructus Indicus villosus, parvus ibid.  
Fructus Indicus qui parvi ferè forma 324.p.p.  
Fructus exotici oficulum aliud ib.  
Fructus Indicus Corni figura 325.p.p.  
Fructus Indici oficulum perelegans ibid.  
Fructus orbicularis, crassi corticis, tuberculosi, nigri co-  
loris ibid.  
Fructus multifariam fissus 326.p.p.  
Fructus Indicus Iuglandis similis, tuberosus ibid.  
Fructus Indicus ovalis, rugosus ibid.  
Fructus exotici, oblongus, angulosus, cineraceus ibid.
- Fructus Indicus echinatus, sonorus ibid.  
Fructus exotici Stomonia modo, tuberculis obtusis  
327.p.p.  
Fructus peregrinus nouem nervis distinctus ibid.  
Fructus peregrinus, orbicularis, nouem nervis distin-  
ctus minor cum oficulo anguloso ibid.  
Fructus peregrinus, orbicularis, sentis nervis distinctus  
ibid.  
Fructus peregrinus, exiguus, orbicularis cum sex nervis  
ibid.  
Fructus Guyanensis ovalis, cineraceus ibidem  
Fructus reticulato corio peregrinus 328.p.p.  
Fructus exotici Bamia instar angulosus ibidem  
Fructus exotici cinereus, cum lineis & tuberculis du-  
ris ibid.  
Fructus Malo Aurantio rescicato similis, leuiss, aurei co-  
loris, octo nervis distinctus 329.p.p.  
Fructus Indicus rotundus, tuberculis asperatus, niger  
ibid.  
Fructus exotici duobus angulis distinctus ibid.  
Fructus Hepaticus Indicus ibidem  
Fructus Indicus decussatus 330.p.p.  
Fructus alter quatuor sulcis distinctus ibid.  
Fructus orbicularis ferè, cum tribus sulcis & tribus fo-  
raminibus ibidem  
Fructus orbicularis ferè forma, fusci coloris ibid.  
Fructus planus, rugosus, niger, semina continens 331.p.p.  
Fructus inferna parte planus, membrana spadiceo colo-  
ris rectus ibid.  
Fructus ficula terna, aut quaternaria simul iuncta, cor-  
tice non valet duro, rugoso, cineraceique coloris 332.  
p.p.  
Fructus oliuæ oficulum referens, rugosum cum tribus  
lineis ibid.  
Fructus planus subpurpureus, nucleo impenitè amaro  
334.p.p.  
Fructus exotici inaequalis fusci coloris ibidem  
Fructus torus niger, binis foraminibus insignitus ib.p.p.  
Fructus orbicularis, peregrinus, cum granis nuiis vomi-  
co similibus 341.p.p.  
Fructus exotici, latus, compressus, colore suberis 342.  
p.p.  
Fructus quadrangulus, niger, cum membrana miniatæ  
351.p.p.  
Fructus peregrini duntaxat nucleus 387.p.p.  
Fructus una parte sessili, velut sulcu distinctus instar  
nucis Fausel 398.p.p.  
Fructus peregrinus tetragonus 397.p.p.  
Fructus peregrinus crassus, in quo magnus nucleus  
398.p.p.  
Fructus peregrinus Abiegnae nucis persimilis ibid.  
Fructus peregrini nucleus ibidem  
Fructus exotici Iuglandis ferè facie sulcatus, tubero-  
sus 399.p.p.  
Fructus Canna de Bengala creditus 400.p.p.  
Fructus peregrinus elegans squamosus ibidem  
Fructus Insulae Baly Pyri forma, asper 401.p.p.  
Fructus peregrinus lerasus ibidem  
Fructus Caryophyllo Aromatico similis 429.p.p.  
Fructus redolens Caryophyllos 430.p.p.  
Fructus Canelle quibusdam nobis potius foliis Indi 436.  
p.p.  
Fructus peregrinus ex Bengala 426.p.2
- G  
Galla & alia Quercuum excrementa 81.p.1  
Galla maxima exotica 82.p.1  
Galla tertiae provinciales, Illyrice ibidem  
Galla Orientales, & alia diuersa 83.p.2  
Galla Istriaca ibidem  
Galla fungum quodammodo exprimens ib.  
Galla Indica 84.p.2



# INDEX.

<i>Galla umbilicata</i> , item quercus excrementum villosum, vel potius muscosum	ibid.
<i>Galla</i> simile excrementum quinquangulum Brasiliianum	85.p.2.
<i>Gale frutex odoratus</i> Septentrionalium <i>Elaeagnus Cord.</i> , <i>Chamaeagnus</i> Dod.	224.p.2.
<i>Galla</i> siuida, spinosa planta folijs Loucoj, floribus albis	411.p.2.
<i>Galla</i> siuida altera, sive <i>Tibymali</i> genus spinosum	ibid.
<i>Gayana Indica</i> , fructu mali facie	108.p.p.
<i>Gethup</i> arbor sive <i>Cobban</i>	325.p.p.
<i>Gemma</i> foraminulata folij <i>Quercus</i>	87.p.2.
<i>Genipar</i> America fructus <i>Tinctorius</i> : & alius edulis	255.p.p.
<i>Genista angulosa</i> trifolia	388.p.2.
<i>Genista</i> cum rapo	290.p.2.
<i>Genistella</i> <i>Tinctoria</i> Hispanica	392.p.2.
<i>Genistella</i> pilosa	393.p.2.
<i>Genistella</i> herbacea sive <i>Chamaespartium</i>	ibid.
<i>Genistella</i> herbacea platyphyllos	394.p.2.
<i>Genista</i> limica	395.p.2.
<i>Genista</i> argentea	399.p.2.
<i>Genistarradiata</i> seu stellaria	ibid.
<i>Genista aculeata</i> folijsa	ibid.
<i>Genistella</i> montis ventosi spinosa	400.p.2.
<i>Genistella</i> spinosa affinis <i>Nepa</i> quibusdam	ibid.
<i>Genistella</i> minor <i>Aspalathoides</i>	401.p.2.
<i>Genista</i> <i>Erinacea</i>	403.p.2.
<i>Genista</i> sive <i>Spartum</i> purgans	404.p.2.
<i>Glans</i> <i>Ceni</i> , <i>Aegilops</i> , <i>Aspris</i> <i>Theoph.</i>	77.p.2.
<i>Glandis</i> <i>Magnus</i> calix	78.p.2.
<i>Glans</i> <i>Indica</i> du <i>Choul</i>	119.p.2.
<i>Glans</i> <i>Indica</i>	130.p.2.
<i>Glans</i> <i>Indica</i> magna subrotunda	ibid.
<i>Goan</i> arbor <i>Tutia</i> cui nucleus cum putamine	325.p.p.
<i>Grossularia</i> spinosa fructu obscure purpurascens	42.p.2.
<i>Guaiacana</i>	235.p.p.
<i>Guanabamus</i> <i>Scaligeri</i>	109.p.p.
<i>Guanabamus</i> <i>Ouedi</i> , fructu <i>Squammato</i>	114.p.p.
<i>Gummi</i> <i>Arabum</i> sive <i>Acacia</i>	431.p.2.

## H.

<i>Halimon</i> seu <i>Halimos</i>	219.p.2.
<i>Halimus</i> <i>Classi</i>	217.p.2.
<i>Halimus</i> <i>Dalechamp.</i>	ibid.
<i>Halimus</i> <i>Valerandi</i>	ibid.
<i>Higuero</i> <i>Ouedi</i>	111.p.p.
<i>Hippophaes</i> <i>Anguillare</i> , & <i>Dodon.</i> sive spina purgatrix	410.p.2.
<i>Hippophaesum</i> quorundam <i>Dalechamp.</i>	ibid.
<i>Hobus</i> seu <i>Houns</i> <i>Indica</i> <i>Pruni</i> facie	199.p.p.
<i>Hybocoubu</i> <i>Americanus</i> , itemque <i>Carameno</i> fructus <i>off.</i>	325.p.p.
<i>Hybourabe</i> <i>Americae</i> <i>Pruni</i> fructu	200.p.p.

## I.

<i>Iaca</i> <i>Indica</i>	115.p.p.
<i>Iambolains</i> <i>Indica</i> folio arbuti	88.p.p.
<i>Iambos</i> <i>Acofte</i>	116.p.p.
<i>Iambos</i> <i>Linschott.</i>	117.p.p.
<i>Iangomas</i> <i>Pruni</i> similis	200.p.p.
<i>Ilex</i> arborea	95.p.2.
<i>Ilex</i> <i>coccigera</i>	106.p.2.
<i>Ilex</i> <i>semina</i>	99.p.2.
<i>Iou</i> <i>barba</i> <i>Lucens</i>	335.p.2.
<i>Indica</i> arbor	433.p.2.
<i>Unipappeyua</i> <i>Brasilianorum</i> <i>Nucum</i> folijs sive <i>Genipar</i>	253.p.p.
<i>Unipappeyua</i> similis pene fructus orbicularis in quo semina <i>staphyragie</i> similis	254.p.p.
<i>Unipappeyua</i> alius similis fructus	ibid.

Tom. I,

<i>Juniperus</i> in genere	292.p.2.
<i>Juniperus</i> <i>vulgaris</i> baccis parvis purpureis	293.p.2.
<i>Juniperus</i> maior, baccæ nigra & rubra	297.p.2.
<i>Juniperus</i> maxima <i>illyrica</i>	300.p.2.
<i>Juniperus</i> <i>Alpina</i>	301.p.2.

## L.

<i>Laburnum</i> arbor trifolia <i>anagridi</i> similis	361.p.2.
<i>Lagenula</i> <i>America</i>	113.p.p.
<i>Lacca</i>	44.p.2.
<i>Lapides</i> <i>Quercuum</i>	85.p.2.
<i>Larix</i> folio deciduo, coniferâ	265.p.2.
<i>Laricis</i> resina	272.p.2.
<i>Laricis</i> muscus	273.p.2.
<i>Laurus</i>	409.p.p.
<i>Laurus</i> <i>Tinus</i> seu <i>Sylvestris</i> trium generum.	411.p.p.
<i>Laurus</i> <i>Tinus</i> altera	418.p.p.
<i>Laurocerasus</i>	420.p.p.
<i>Laurocerasus</i> folio <i>Arbor</i>	421.p.p.
<i>Lentiscus</i>	285.p.p.
<i>Lentiscina</i> resina <i>Mastiche</i>	288.p.p.
<i>Leucoma</i> fructu <i>Castanea</i>	129.p.2.
<i>Lignum</i> <i>Copau</i> simile <i>Luglandis</i> ligno	254.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Moluccence</i> <i>Pauana</i> dictum fructu <i>auellana</i>	342.p.p.
<i>Lignum</i> exhibitum <i>Cinnamomi</i> nomine, nobis lignum folij <i>Indi</i> officinarum	435.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Aromaticum</i> , seu potius cortex <i>Morard.</i>	460.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Rhodium</i>	466.p.p.
<i>Lignum</i> <i>R</i> se odore, alijs <i>Lignum</i> , <i>Thuris</i> , alijs <i>Aspalathus</i>	472.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Aspalathi</i> nomine datum graniter oleis,	473.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Aloes</i> officinarum & <i>Agallochum</i> plarisque puratum	477.p.p.
<i>Ligni</i> <i>Albes</i> & <i>Agallochi</i> substituta adulteria, & equis. uocationes	461.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Anisi</i>	485.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Brasilium</i>	490.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Vernimbuck</i> Germanis dictum, simile <i>Bresilio</i>	492.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Bresilio</i> simile cæruleo tingens	ibid.
<i>Lignum</i> violaceum <i>Bresilianum</i>	ibid.
<i>Lignum</i> <i>Nephriticum</i> cæruleo & flavo tingens	ibid.
<i>Lignum</i> <i>Croceum</i> tingens	493.p.p.
<i>Lignum</i> candidum fungosum cori vicem prabens	493.p.p.
<i>Lignum</i> <i>Brasilianum</i> candidissimum	494.p.p.
<i>Lignum</i> <i>leuissimum</i>	ibid.
<i>Lignum</i> exoticum anonymum	302.p.2.
<i>Ligustrum</i>	528.p.p.
<i>Ligustrum</i> <i>Aegyptium</i> : <i>Cyprus</i> <i>Græcorum</i> , <i>Elahne</i> <i>Arabum</i>	532.p.p.
<i>Lobus</i> quadrangularis magnus, grana lenticula nigra.	ibid.
<i>Lobus</i> ex <i>Vvingandecacouh</i>	ibid.
<i>Lobus</i> <i>Classi</i> .	437.p.2.
<i>Lobus</i> <i>Brasilianus</i> crassus humidus. <i>Citri</i> semine	ibid.
<i>Lobus</i> magnus ex <i>Guinea</i> siccus cum granis arboris <i>Iudæ</i>	439.p.2.
<i>Lobus</i> <i>Brasilianus</i> ingens siliqua <i>Acacia</i> forma	ibid.
<i>Lobus</i> longus, aromaticus odore fræ <i>Belzumi</i>	ibid.
<i>Lobo</i> forte inclusus flauescens fructus	439.p.2.
<i>Lobus</i> <i>exodius</i> cum <i>Piso</i> duro cinerei coloris	ibid.
<i>Lorus</i> arbor fructu <i>cerasti</i>	229.p.p.
<i>Lycium</i> <i>veterum</i>	57.p.2.
<i>Lycium</i> <i>Gallicum</i>	57.p.2.
<i>Lycium</i> <i>Cretense</i> sive <i>Berberis</i> <i>Creticu</i>	60.p.2.
<i>Lyciū</i> quorundam folio <i>Myrti</i> <i>Tarctini</i> aut <i>Buxi</i> simile	ibid.
<i>Lycium</i> <i>Garcia</i> , sive <i>Cate</i>	ibid.
<i>Lycium</i> <i>Indicum</i> Alpino puratum.	92.p.2.

*Zycum* forte *Agrah* & *Aegyptium* folio *Buxi* 62.p.2

## M

*Macocner Virginisum* 254.p.p.  
*Maier Doflor. & Gracorum* 262.p.p.  
*Malabathrum & filium Indum Officinatum* 430.p.p.  
*Malus de Malis* 26.p.p.  
*Mali fyluefres* Ibid.  
*Mali Syria & Gomorrha* 27.p.p.  
*Malus Cotonea* Ibid.  
*Malus Cotonea fylueftris* 35.p.p.  
*Malus Punica* 76.p.p.  
*Punica Balauifera* 82.p.p.  
*Balauftra Hispanica* Ibid.  
*Malu Medica* que etiam *Perfica* vel *Citria* dicuntur, veterum & recentiorum fententia, & differentia in genere 90.p.p.  
*Malus Citria*, cum fructu magnus, & mediocri 94.p.p.  
*Malus Limonia* 96.p.p.  
*Malus Arantia* 97.p.p.  
*Malus aurea foliis praeandibns* 153.p.p.  
*Malus perfica* 157.p.p.  
*Malus perfica Hispanica Melocotonea* quorundam 162.p.p.  
*Mala Armeniaca minora* 167.p.p.  
*Mala Armeniaca maiora* Ibid.  
*Manna arbor* 172.p.p.  
*Mangas sine Amba* 173.p.p.  
*Mangle Lyrifolia cum filiquis longa ficu Indica affinis* 415.p.2.  
*Mangifera* 107.p.p.  
*Mann sine Manna facrum licet erarum* 188.p.2.  
*Manna Laricea sine Brianfona* 191.p.2.  
*Manna Cala brina Fraxini & Orni.* 192.p.p.  
*Manna Orientalis Maslibina* 198.p.2.  
*Manna Xirqueft Indica ex arbore Queft, & Siracoft* 199.p.2.  
*Manna Indica Tiriniabin, aut Trunghim* Ibid.  
*Manna Indica Calabrina perfimilis* 200.p.2.  
*Manna Indica melli Candido fimilis* Ibid.  
*Manna adulterina* Ibid.  
*Mannarum equinoca* Ibid.  
*Manobi Leri* 292.p.p.  
*Mel aereum, Manna, Tereniabin, & Saccharum Albu-* 180.p.2.  
*zar in genere* 190.p.2.  
*Mel Cedrinum* 106.p.p.  
*Melo corcopali arbor Cydonii facie* 106.p.p.  
*Mefpilus, de Mefpilo, Epimelide, Vnedone, Amamelide, Hummelide, Oromelide & Hypomelide, & de* 66.p.p.  
*Mefpilo aronia in specie* 67.p.p.  
*Mefpilus Aromia Veterum* 69.p.p.  
*Mefpilus vulgaris* 72.p.p.  
*Mefpilus Officulo leui coloris fpadicei, Lata Guinea* Ibid.  
*Mefpilo valde fimilis fructus sine granis* Ibid.  
*Mefpilo valde fimilis fructus Americanus* Ibid.  
*Mefpilus Chamamefpilus* 72.p.p.  
*Mogori flores, odoris florum mali aera* 107.p.p.  
*Molle* 94.p.p.  
*Mollis arboris refina fimiles feniuli odore* 535.p.p.  
*Morus, Morus nigra* 118.p.p.  
*Moringa Lenticifolia folio, fructu magno angulofo in quo* 435.p.2.  
*femina Erui* 169.p.p.  
*Muniacum Arbor* 148.p.p.  
*Mufa* Ibid.  
*Mufa arbor* Ibid.  
*Mufa cum fructu* Ibid.  
*Myrrha in Genere* 308.p.2.  
*Myrrha* 311.p.2.  
*Myrrha Boeotica* 314.p.2.

*Myrrha Arbor Bellonia* Ibid.  
*Myrrha in genere* 349.p.2.  
*Myrobalani Arabum in genere* 201.p.p.  
*Myrobalani Inda, nigra, sine nucleis, Citrina, Che-* 205.p.p.  
*bula, Citrinis fimiles, nigricantes, Emblica, in fe-* 206.p.p.  
*gmentis Nucleum habentes, angulofo, Bellerica,* 209.p.p.  
*rotundiores* Ibid.  
*Myrobalani Inda nigra sine nucleis.* 204.p.p.  
*Myrobalani Citrina* 205.p.p.  
*Myrobalani Chebula Citrinis fimiles nigricantes* Ibid.  
*Myrobalani Emblica* 206.p.p.  
*Myrobalani Bellerica rotundiores* Ibid.  
*Myrobalani fpecies Rauuolfo* 209.p.p.  
*Myrobalani facie fructus Indici* Ibid.  
*Myrobalani orentes* 210.p.p.  
*Myrobalano Citrino aliquomodo fimilis fructus cauis* Ibid.  
*Myrobalani nigri oficulo non valde difimilis fructus* 210.p.p.  
*exoticus* Ibid.  
*Myrobalani oficulo fimilis angulofo* Ibid.  
*Myrrus, de Myrris in Genere* 507.p.p.  
*Myrrus vulgaris nigra & alba, facina & fylueftris* 510.p.p.  
*Myrrus Boeotica Latifolia Domestica.* 511.p.p.  
*Myrrus exotica angulifolia* Ibid.  
*Myrrus Latifolia Belgica, forte Romana* 512.p.p.  
*Myrrus Tarentina* Ibid.  
*Myrrus angulifolia Minor* 513.p.p.  
*Pseudomyrrus Bellonii* 518.p.p.  
*Myrridanum* 514.p.p.  
*Myrris facie Avacari* 518.p.p.  
*Myrrillus grandis, quibusdam Viris Idaa magna* 518.p.p.  
*Myxa feu Sebesten* 197.p.p.  
*Myxa Domestica* 198.p.p.  
*Myxa fylueftris* Ibid.

## N

*Nabca folio Rhamni vel Iuiuba* 39.p.2.  
*Navea* 304.p.2.  
*Nicaragua pomum nuce rotunda* 210.p.p.  
*Nimbo folio & fructu olea* 27.p.p.  
*Nux Ingians* 241.p.p.  
*Nux Carya feu Eubrica Theophrasti* 251.p.p.  
*Nux Indica non biforis 10 glandis fimilis* 255.p.p.  
*Nux Couleoul* 255.p.p.  
*Nux Aromatica vulgo Mofchara* Ibid.  
*Masis Arabum, aut cortex Arcmaticus* 260.p.p.  
*Nux Aromatica femina* 264.p.p.  
*Nux Aromatica* 265.p.p.  
*Nucula exortia pistacii specie* 290.p.p.  
*Nucula peregrina alia* Ibid.  
*Nux fuae Officulum Cypore, fimile Nuci Balsami Peru-* 294.p.p.  
*uanu* 308.p.p.  
*Nux fuae Officulum, fructus ex Palmarum genere* 309.p.p.  
*Nux Indica pulchra, cui unguis albus.* 310.p.p.  
*Nucula Indica Lobel. & Pena* Ibid.  
*Nucula Indica peculiaris* Ibid.  
*Nucula Indica ab Hercul. Saccenia miffa* Ibid.  
*Nux purgatrix fimilis fpherule faponaria, fufca* 313.p.p.  
*Nuces infana Belgis prunula infana, putamine fufco,* 315.p.p.  
*oficulo membranaceo nigro, cum macula alba* 316.p.p.  
*Nucula ex Guinea* Ibid.  
*Nucula Indica alia* 317.p.p.  
*Nucula Indica globosa, fonora* Ibid.  
*Nucula pyriformis Indica & fonora* Ibid.  
*Nucula*



# INDEX

<i>Nux. unguentaria Arbor</i>	ibid.
<i>Nucula siue glans unguentaria</i>	ibid.
<i>Nucula siuei Maluam siue purgatorij</i>	322.p.p.
<i>Nux. portica nuci non valde abmiliis, spadicea coloris</i>	323.p.p.
<i>Nucula Indica cortice tenero, forte Beretini fructus</i>	ibid.
<i>Nucula Indica altera compressa, cortice duro coloris castaneae, sonora</i>	ibid.
<i>Nucula Indica tertia splendidior</i>	ibid.
<i>Nucula sublonga vel os fructus alicuius Indici</i>	324.p.p.
<i>Nucula triangularis, Indica, castanella fere facie</i>	ibid.
<i>Nucula Indica ouata fere</i>	ibid.
<i>Nucula quedam Africana</i>	ibid.
<i>Nucleus ex Gaziana spadicea coloris membrana testis</i>	327.p.p.
<i>Nux. trifida exortica</i>	328.p.p.
<i>Nux. orbicularis, Cineracei coloris</i>	330.p.p.
<i>Nux. orbicularis peregrina, glabra, spadicea</i>	331.p.p.
<i>Nucis Amygdalinae penes forma fructus rugosus, siliquis ex fisco. loru, una parte planus</i>	ibid.
<i>Nucleus nucis quodammodo conuolutus</i>	332.p.p.
<i>Nucula quedam fide Higuero &amp; Ahouai putata</i>	333.p.p.
<i>Nux. peregrina, oculata, compressa</i>	ibid.
<i>Nux. Metibil Scrapianus</i>	339.p.p.
<i>Nux. Henden Arabum</i>	ibid.
<i>Nux. uanica vulgo offic. compressa, hirsuta</i>	ibid.
<i>Nucula Taphet Herculi. Saxonia</i>	34.p.p.
<i>Nux. conili figura, plana, cineracei coloris</i>	ibid.
<i>Nux. Indica</i>	376.p.p.
<i>Nucis Indica folium quibusdam</i>	383.p.p.
<i>Nux. indica minor</i>	384.p.p.
<i>Nux. Indica ad venena celebrata: siue Cocum de maladia</i>	ibid.
<i>Nux. Indica velut laruam ostendens, &amp; alia ei similis si uim cadem</i>	387.p.p.
<i>Nux. peregrina nigra, angulosa, cum tribus canalicibus velut nucleis</i>	ibid.
<i>Nuci Mischata &amp; Fauzel similis nucleis</i>	392.p.p.
<i>Nucleus pyramidalis Indicus, ad Fauzel accedens uenis</i>	393.p.p.
<i>Nux. Indica oblonga, intrinsecum similis nuci Mischata</i>	399.p.p.
<i>Nux. Indica oblonga cortice contracta</i>	400.p.p.
<i>Nux. Indica ressecta a perelegant</i>	ibid.
<i>Nux. minima conifera</i>	273.p.p.

## O

<i>Ogeche Indica</i>	200.p.p.
<i>De Olea satina</i>	1.p.2.
<i>De Olea specialius, eiusque differentiis &amp; usu</i>	17.p.2.
<i>Oleum Sicyonium</i>	19.p.2.
<i>Oleum ex olea surculis</i>	20.p.2.
<i>Amurca</i>	ibid.
<i>Olea viscum</i>	21.p.2.
<i>Oleaster siue olea silyuestris</i>	ibid.
<i>Elasmeli</i>	23.p.2.
<i>Olea Aethiopica eiusque lachrima</i>	25.p.2.
<i>Olea Karamiscum Aristotelis</i>	ibid.
<i>Olea Indica</i>	26.p.2.
<i>Elaeosiphilos</i>	ibid.
<i>Olea, oleastri, &amp; oliuella aquiuoca, &amp; succedanea</i>	ibid.
<i>Oleum proferens spina, &amp; alse spina</i>	ibid.
<i>Omagyris</i>	363.p.2.
<i>Opuntia vulgo Herbariorum</i>	154.p.p.
<i>Opuntia vulgo dicta cognata ferruginatris</i>	156.p.p.
<i>Opobalsamum solidum</i>	306.p.p.
<i>Oregioella</i>	351.p.p.
<i>Orucaria fructus siliquosus</i>	435.p.2.

<i>Oficulum fructus Indici Taberc.</i>	314.p.p.
<i>Oficulum fulcatum fructus peregrini</i>	324.p.p.
<i>Oficulum Tamarindus admistum</i>	ibid.
<i>Oficulum fructus orbiculare, aliquantulum mucronatum</i>	333.p.p.
<i>Oxieds Bixa</i>	440.p.2.
<i>Oxyacantha, pixacantha, &amp; pyracantha</i>	48.p.2.
<i>Oxyacantha vulgaris seu Spinus albus</i>	49.p.2.
<i>Oxyacantha colore fructus peregrinus durus</i>	425.p.2.
<i>Oxycoctus siue vaccinia palustris</i>	525.p.p.

## P

<i>Pacal arbor</i>	463.p.p.
<i>Pacura Americana, musa (ut videtur) species</i>	152.p.p.
<i>Palturus folio insubino, siue Rhamnus</i>	35.p.2.
<i>Palturus Africana</i>	37.p.2.
<i>Palma</i>	351.p.p.
<i>Palma uinifera Theueri</i>	369.p.p.
<i>Palma Guinea</i>	ibid.
<i>Palma humilis seu Chamariphes</i>	ibid.
<i>Palma humilis Hispanica non spinosa</i>	ibid.
<i>Palma humilis spinosa</i>	370.p.p.
<i>Palma humilis Papyracea, &amp; de papyro ex Palmis</i>	372.p.p.
<i>Palma Indica genus Lantor dictum</i>	373.p.p.
<i>Palma Indica nucifera</i>	375.p.p.
<i>Palma Elephantis Acofa</i>	376.p.p.
<i>Palma facifera</i>	383.p.p.
<i>Palma ad insula S. Thoma, &amp; fructus Abanga, &amp; caryocetes</i>	386.p.p.
<i>Palma facie cuciofera</i>	388.p.p.
<i>Palma facie Hairi</i>	393.p.p.
<i>Palma Tri</i>	394.p.p.
<i>Palma Pinus siue conifera</i>	398.p.p.
<i>Palmites</i>	153.p.p.
<i>Palmitu similes arbores altissima</i>	ibid.
<i>Papaie Peruanianus</i>	147.p.p.
<i>Papyrus veterum Paludano</i>	374.p.p.
<i>Papyracea arbor Tal</i>	ibid.
<i>Papyracea arbor Guaiabara</i>	ibid.
<i>Papyracea arbor Copeia</i>	ibid.
<i>Papyracea arbor amplissimo &amp; tenuissimo folio</i>	375.p.p.
<i>Papyrus arborea tenuissima ex laua</i>	ibid.
<i>Papyracea arbor, cuius liber subpunicis coloris</i>	ibid.
<i>Pendoabsou arbor Americana</i>	255.p.p.
<i>Perica Peruanus aliusque similis fructus</i>	292.p.p.
<i>Peuce veterum</i>	245.p.2.
<i>Phegus vel Esculus</i>	742.p.
<i>Phellodrys Matthioli</i>	1002.p.
<i>Phellodrys nigra &amp; alia Dalechamp.</i>	ibid.
<i>Phellodrys foliis muricatis, calice glandis Echinato Dalechamp.</i>	1012.p.2.
<i>Phillyrea &amp; Mahaleb.</i>	536.p.p.
<i>Phillyrea angustifolia eiusque varietas</i>	538.p.p.
<i>Phillyrea latiusculo folio</i>	539.p.p.
<i>Phillyrea arbor Lobelia</i>	540.p.p.
<i>Phillyrea folio Alaterni</i>	541.p.p.
<i>Phillyrea folio Ilicis</i>	ibid.
<i>Picea Latimorum</i>	238.p.2.
<i>Picea pumila</i>	241.p.2.
<i>Pimpinich arbor lactescens</i>	145.p.p.
<i>Pini aquiuoca</i>	246.p.2.
<i>Pinus officulis duris foliis longis</i>	248.p.2.
<i>Pinus cui officula fragilis putamine, siue Cembro</i>	251.p.2.
<i>Pinus silyuestris siue Pinaster</i>	252.p.2.
<i>Pinus silyuestris vulgaris Genesensis &amp; Tada</i>	253.p.2.
<i>Pinaster seu pinus silyuestris Hispan. maior</i>	255.p.2.
<i>Pinaster Austriacus albus &amp; niger</i>	ibid.
<i>Pinaster Austriacus tenuis folius</i>	ibid.
<i>Pinus silyuestris, siue vt Bellonius, Picea silyuestris Ida</i>	ibid.
<i>Troadis cuius coni facile decidunt.</i>	ibid.




















3 vols







RARE  
• FOLIO  
QK  
41  
B34  
1650 v.1

Inv.#  
71



